



聖濟總錄

百七

庫文閣内	
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (169)
函號	300 212





大學東
校典藉
局之印

大德重校聖濟總錄卷第一百七十一
小兒門

小兒軀啼

小兒驚癇

小兒風癇

小兒食癇

小兒諸癇

日本醫學圖書印

總錄卷一百七十一

治小兒軀啼脾胃傷風冷心下虛痞腹中疼痛胸脇逆
滿白朮丸方

白朮長八分木白 乾薑炮 人參六分

甘草炙到各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸沸

湯化下量兒大小加減

治小兒軀啼不止牛黃丸方

牛黃研壹分 代赭煨過研參分 麝香研壹錢

牡丹皮參分

右四味搗研為末鍊蜜和丸如菉豆大每服兩丸溫

水下

治小兒軀啼腹堅滿雀屎丸方

雀屎壹兩 當歸切焙壹兩

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大五十日兒每

服一丸以乳汁下空心午後各一服量兒大小以意

加減

治小兒軀啼及一切氣逆心腹刺痛紫蘇子丸方

紫蘇子煉 陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

高良薑 桂皮去麤 人參各半兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸米

飲或溫酒化下不計時候乳母亦可加丸數服

治小兒軀啼脾胃虛冷心腹疔痛胸膈滿悶養脾丸方

乾薑炮

縮沙蜜去皮各壹兩白茯苓去黑皮半兩

甘草炙參分

大麥蘖炒

人參各半兩

白朮壹分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服五丸生

薑湯化下不計時候乳母亦可加丸數服

治小兒胎寒軀啼驚癇腹脹滿不嗜食大便青黃色或

有實不可吐下馬齒礬石丸方

馬齒礬石燒作灰貳兩

右一味細研以棗肉和丸如菉豆大每服三丸米飲

下加至五丸以意增減以腹中溫煖為度

治小兒軀啼方

右取柏子人末溫水調半錢匕服之

小兒驚癇

論曰小兒氣血微弱易為傷害若卒驚動傷亂精神心

氣不定因驚而發則為驚癇凡養小兒當須持護或聞

大聲或見異類必當安撫無令恐怖若初覺兒驚急保

抱之其驚自止若忽因驚成癇宜按圖灸兼以摩膏不

可大下蓋以心氣不足若下之則內愈虛手足抽掣者

並不可持捉使氣血失道傷動樞紐耳

治小兒驚癇發動經年不斷根源鴟頭丸方

鴟頭壹炙焦

蜣螂去足炙

桂去麤皮壹

芍藥兩壹

蚱蟬去翅足

蛇蛻炙伍

白茯苓兩壹分

露蜂房兩炙半

甘草炙

黃芩去黑

當歸切

芎藭

丹參各壹

麝香研壹

牛黃研半

葶若子酒浸壹宿暴

大黃濕紙裹

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆或如黍米

治大臨時量小兒大小虛實與服用溫水下

治小兒頻驚壯熱欲作癇此胡煎方

此胡去

升麻

梔子人

芍藥各壹

釣藤壹

凝水石研

黃芩去黑

知母切焙各

生葛汁壹

甘草炙壹

蜜壹

淡竹葉細切

杏人湯浸去皮尖雙

右一十三味內十味麤搗篩以水三升入銀石銚內

文武火煎至一升綿濾去滓再入鍋內下蜜并葛汁

杏人等煎如飴以瓷器盛百日兒每服如菉豆大一

歲兒如杏人大日三服更量大小加減並用溫漿水

化破服

治小兒驚癇體羸極五癇釣藤煎方

釣藤壹分 黃芩去黑心 知母切

凝水石各壹兩 升麻參分 沙參兩半

蚱蟬去翅足 蛻蝦炙貳枚 甘草炙參分

蜜伍兩

右一十味除蜜外搗羅為末與蜜同入銀石鍋內慢

煎火土熬成煎每服一杏子大溫水化下日三服量兒

大小加減

治小兒自一歲至大患癲癇發動無時口內沫出小便不覺呼喚不應真珠丸方

真珠研壹分 虎睛左睛為上酒浸暴乾研壹隻

露蜂房 麻黃去根節 釣藤各半兩

鐵粉細研參分 防葵壹兩 大黃剉炒

黃芩各參分 龍齒研壹兩 銀屑

梔子各參分 獨活去蘆頭半兩 苳胡去苗

升麻 白鮮皮各參分 雷丸壹分

沙參 細辛去苗葉各半兩 蛇蛻燒灰壹分

石膏研半兩 牛黃研壹分 蚱蟬去翅足熱肆枚

右二十三味搗研為末鍊蜜丸如麻子大一二歲兒
每服五丸研破米飲下量兒大小加減服一方有羌
活三分無獨活有丹參一兩無真珠

治小兒諸般癩驚惕瘰癧及中客忤人參丸方

人參 牛黃 細辛 去苗葉 各半兩

蚱蟬 去翅足 炙 大黃 濕紙裹煨 剉壹兩 芍藥

當歸 切焙各 半兩 蛇蛻 炙 參 寸 甘草 炙 剉 參分

栝樓根 防風 去叉各 半兩 巴豆 去皮心膜別 研如膏 參拾

麝香 研半 兩

右一十三味除巴豆牛黃麝香外搗羅為末研勻鍊

蜜和丸如麻子大初生至百日兒每服二九一歲至
五歲兒每服三九五九並用薄荷湯下若兒驚惕及
客忤溫壯發熱腹滿增丸數服之以快利為度更量
兒大小加減

治小兒諸般癩及驚常服除熱芍藥丸方

芍藥 鐵粉 研各 參分 蚱蟬 去翅足 炙肆枚

當歸 切焙 參分 大黃 剉炒 兩 石膏 碎 參分

桂 去麤皮 半兩 人參 壹兩 分 銀屑 研

芎藭 龍骨 研 細辛 去苗 葉

黃芩 去黑心 各半兩 牛黃 研壹 分

右一十四味搗研為末鍊蜜丸和麻子大每服三丸
米飲下日三更量兒大小加減

治小兒邪熱驚癇口噤人參湯方

人參兩

木通剉

黃芩去黑心

升麻各半兩

龍齒研分

犀角鎊炒

赤茯苓去黑皮剉

鐵粉研各半兩

蛻蝦拾枚去足炙

釣藤兩

蚱蟬去翅足炙

右一十一味麤搗篩二四歲兒每一錢匕水一小盞
煎至五分入竹瀝少許更煎三兩沸去滓分為三服
日三更量兒大小加減

治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏丹砂虎睛丸方

丹砂研壹兩

虎睛研對

牛黃研

麝香研

犀角末各壹分

釣藤兩

白茯苓去黑皮剉

黃芩去黑心

人參

梔子人兩各壹

大黃濕紙裹煨熟剉貳兩

右一十二味搗研為末鍊蜜丸如雞頭實大每服一
丸至兩丸煎金銀湯化下人參湯亦得更量兒大小

加減

治小兒驚癇身熱手足癱瘓目睛上視狀如中風保和

丸方

大丹砂研壹錢

蠍梢貳柒箇

雄黃研貳錢

小盧會研

熊膽研各半錢

蛇蛻燒灰壹錢

瓜蒂貳柒枚

蟾酥壹皂子大湯浸

膩粉研

龍腦研

麝香研

牛黃研各半錢

右一十二味搗研如粉用浸蟾酥并麩糊同研為丸如黍米大每服用倒流水先化一丸滴鼻內良久嚏訖即用薄荷水下一丸

治小兒驚癇丹砂牛黃丸方

丹砂研

雄黃研各半兩

牛黃研

乾蠍炒

龍腦研

輕粉

水銀沙

硃砂研過水飛各壹分

右八味並研為末棗肉和丸如粟米大每服三丸至五丸量兒大小加減薄荷湯下

治小兒驚癇手足癱瘓頭項強鞭狀如角弓安神散方

蠍梢炒壹錢半

蜈蚣赤脚全者壹條

輕粉壹字

烏頭尖生用柒箇

天南星用生薑同搗作餅子焙乾釋半錢

麝香

龍腦研各壹字

右七味搗研為散每服一字七量兒大小加減金銀

薄荷湯調下

治小兒驚癇風癇手足癱瘓口眼相引烏蛇牛黃散方

烏蛇項下柒寸酒浸壹宿去皮骨炙秤壹錢青黛研貳錢

蠍梢炒拾枚牛黃研半錢麝香研壹字

蓬砂研龍腦研水銀沙各半錢

烏蛇尾酒浸壹宿去皮骨炙秤壹錢金薄

銀薄並研各拾片蛇黃煨醋淬參徧墨燒

天南星用生薑同搗作餅子焙乾半夏用生薑同搗作餅子焙乾

各壹錢

右一十五味並搗研為散每服半錢匕量兒大小加

減金銀薄荷湯調下

治小兒驚癇風癇掣動定後再作香耆散方

雞舌香研壹錢黃耆剉壹分丹砂研貳錢

五靈脂半錢

右四味搗研為散每服半錢匕量兒大小加減陳米

飲調下

治小兒驚癇掣方

虎睛壹隻或壹對生者尤佳

右一味細研水調灌之量兒大小加減

治小兒驚癇二砂散方

夜明沙研壹錢丹砂研壹錢

輕粉研半錢

蠍梢炒柒枚

右四味搗研為散每服半錢七童子小便并酒各少許調下更量大小加減服

治小兒驚癇涎盛搐搦不定福銀丸方

天南星炮半

青黛研壹

蠟梢炒肆拾枚

粉霜研

水銀

滑石各壹錢

半夏

柴枚用生薑汁煮

龍腦研

麝香研各半字

膩粉研半錢

右一十味搗研為末用水浸炊餅和丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅至二餅量大小加減服薄荷湯化下

治小兒驚癇乳癖萬病丸方

雄黃研

丹砂研

麝香研

龍腦研

盧會研

木香

檳榔到各壹分

牛黃研半兩

胡黃連壹分

青黛研半兩

巴豆去皮心膜去麤研出油盡

人參各壹分

右一十三味搗研為末鍊蜜丸如小豆大每服一丸至二丸溫水下更量大小加減十五歲已下常服永無諸疾

治小兒驚癇腹中乳癖牛黃散方

牛黃研壹分

人參兩

大黃炒

當歸切

芍藥

甘草炙兩

右六味搗研為散每服一錢匕以水七分煎取三分去滓量兒大小加減溫服微利為度

治小兒驚癇積熱痰涎欬嗽青金煎方

天南星牛膽內兩

馬牙消研

天竺黃研各壹分

青黛兩

龍齒研

蟬蛻去土為末各半兩

鉛白霜研

蓬砂研各壹分

甘草生末

麝香研壹分

龍腦研

牛黃研各半錢

右一十二味並研勻細鍊蜜和為膏瓷合內收每服一小雞頭實大更量兒大小加減薄荷水化下

治小兒癇疾釣藤飲方

釣藤

黃芩去黑心

犀角鎊各半兩

石膏碎

龍齒各壹兩

升麻

甘草炙各壹分

竹葉肆拾片

右八味咬咀如麻豆大每服一錢匕水一盞煎至半盞去滓入麝香少許溫服更量兒大小加減

治小兒發癇壯熱大釣藤飲方

釣藤

黃芩去黑心

麻黃去節各壹兩

當歸切焙參分

龍齒研壹兩

石膏碎貳兩半

赤芍藥去黑皮

桂去麤皮

龍膽去土

牛黃研各壹兩

杏人去雙皮尖麩炒研半兩

甘草炙剉壹分

右一十二味先麤搗篩十味每服三錢匕以水一盞

煎至六分去滓下牛黃杏人加白蜜竹瀝各少許鍊

如錫湯調服如人行五里再服

治小兒驚癇搐搦涎潮昏塞歸魂丸方

使君子

兩枚以麩裹於慢火中燬候麩黃為度去麩不用

木銀子結沙

香墨

盧會

熊膽研

臘茶研

乳香研

龍腦研各壹錢

蠟稍參柴炒

天竺黃研

青黛研

丹砂研各半錢

輕粉貳錢

寒食麩壹錢半

右一十四味同研令勻細滴水丸如菉豆大每服

一丸薄荷蜜水化下如小兒稍覺驚著化半丸與喫

若能常服永無驚疾量兒大小加減

治小兒未滿月及出月壯熱發癇釣藤湯方

釣藤壹分

蚱蟬壹枚炙去足頭翅

苡胡去苗

升麻

黃芩去黑心

甘草炙

大黃剉炒各半兩 石膏參分碎

蛇蛻皮貳寸炙

右九味麤搗篩每服一錢匕水六分煎至三分去滓入竹瀝數滴更煎一沸溫服

治小兒驚癇邪氣身熱嘔吐下痢五色虎睛丸方

虎睛壹枚研 牛黃研

麝香研各半分

升麻 鈞藤

生犀角鎊

桂去麤皮各壹分

山梔子壹兩

蚱蟬炙去頭足翅

蛻蝦

蛇蛻皮伍寸燒灰

大黃蒸參度剉焙貳兩

右一十二味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三九至五九食後米飲研下日再

治小兒驚癇鎮心丸方

銀薄研壹百片

蛻蝦參枚去頭足炙

大黃剉炒

丹砂研各壹兩半

升麻

黃芩去黑心

犀角屑

山梔子人

龍齒

麥門冬去心焙

鐵粉各壹兩

右一十一味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大食後及乳後新汲水研一丸灌之三歲及五歲兩丸至三九七歲至十歲五丸如大人患者溫漿水下十五丸如冬月以溫水研灌之

治小兒驚癇體虛鈞藤子芩湯方

試小釣藤

黃芩

沙參各參

知母焙

升麻

犀角鎊各

蚱蟬

貳枚炙去翅頭足

蛇蛻皮

參寸炙

苡胡去苗

甘草

炙

白朮

各半兩

右一十一味麤搗篩以水二升煎去滓取六合入蜜二合竹瀝三合再鍊如飴每服一錢匕微微與服以

意量之

小兒風癩

論曰諸癩之病本於風者名風癩此由乳養失宜氣血不和或汗出腠理開致風邪乘虛而入初得之時發熱

身軟時作時省或先屈指如數乃發掣縮是也不可令人持促恐曲戾不隨若先身熱癩癢驚啼呬呼而後發其脉浮者為陽癩病屬六府易治若先身冷不驚不啼而發其脉沉者為陰癩病屬五藏極則難治又有風癩如癩不可不知但身強直反張如尸不時省者宜當消息之

治小兒風癩筋脉抽掣夜臥驚悸皮膚壯熱天竺黃散方

天竺黃

研

牛黃

研

知母

剉

釣藤

剉

芍藥

犀角

鎊微炒

升麻

龍膽去土

苡胡

去苗剉

防風去義

人參各半

桔梗炒

大黃剉炒

山梔子人

玄參各壹

雄蠶炒

白茯苓去黑皮

蜣螂去足

龍骨

別搗研如粉各參分 欖榔壹枚紙裏煨過

右二十味搗羅為散每服半錢匕用米飲調下如角

服弓等風用竹瀝調下連夜三四服隨兒大小以意加

而減其風消者公劍麻散風立效以麻油調下又宜加減

治小兒諸種風癩無時發動天麻散方

天麻

防葵炙

真珠末研

天竺黃搗

威靈仙去土

蜣螂微炙去足

芒消研各

牛黃壹分

右八味搗研令勻每服半錢匕取雞冠血三兩滴新

汲水一合打散令勻調下隨兒大小以意加減一日

三服

治小兒諸種風癩吐痢寒熱百病不食大黃湯方

大黃

碎剉炒令香熟壹兩 當歸切

赤芍藥

黃芩去黑心

栝樓根

桂去麤皮

人參

赤石脂

麻黃去節先煎

牡蠣粉微

紫石英碎

甘草炙剉各半兩

右一十二味麤搗篩七八歲兒每服二錢匕水一盞

入棗三枚擘同煎至五分去滓一日四五服帶熱服
隨兒大小以意加減

治小兒風癩龍齒飲方

龍齒搗研

石膏

搗研各壹兩壹分

黃芩

去黑心

大黃

剉炒令香熟各壹兩

龍膽

梔子人

甘草

炙剉各半兩

釣藤

參分

右八味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水半盞煎至
三分去滓連夜三五服隨兒大小以意加減

治小兒風癩疾白鮮皮湯方

白鮮皮

細辛

去苗葉

釣藤

各半兩

蚱蟬

微炙壹枚

大黃

剉碎炒令香熟

甘草

炙剉各參分

蛇蛻皮

伍寸炙令黃色

右七味麤搗篩五六歲兒每服一錢匕水七分煎至
四分去滓入牛黃末少許至夜三四服隨兒大小以
意加減

治小兒風癩撮口天矯諸癩乾薑湯方

乾薑

炮裂

當歸

切焙各半兩

大黃

剉炒令香熟

人參

細辛

去苗葉

甘草

炙剉各參分

右六味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三
分去滓分溫二服至夜令盡隨兒大小以意加減

治小兒風癩發無時數下之後風虛不足黃耆湯方

黃耆剉 麻黃節去 甘草剉

當歸切 細辛去 桂去

芍藥 人參各壹 牛黃研壹

蛇蛻壹寸炙 蚱蟬炒 蜣螂各肆枚并微

右一十二味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分

煎至四分去滓放溫服日三四隨兒大小以意加減

治小兒風癩搖擗及天癆驚風丹砂丸方

丹砂 雄黃各壹 蠟梢貳柴

牛黃半 麝香兩 附子尖參枚炮去

巴豆壹粒燈上燎 右七味擣研令細以水浸寒食蒸餅和為丸如萊菔

子大濃煎荊芥湯下一丸以衣被蓋少時出汗即差

治風癩化涎水銀丸方

水銀壹 黑豆末壹 棗柴枚煮熟

右三味同研水銀星盡丸棗豆大乳汁下一丸良久

吐出涎為効量兒大小加減不計時

治小兒風癩癰瘰壯熱涎盛雄黃丸方

雄黃兩 龍腦半 蠟梢炒柴

防風去義半 膩粉半 天南星炮壹

白附子枚

丹砂壹

麝香半

右九味搗研為末用水浸炊餅丸雞頭大荆芥薄荷湯化下三歲兒服一丸看兒大小加減

治小兒一百二十種驚風癇病潮發癩癧輒金丸方

白殭蠶炒大者壹兩為末

青黛

牛黃研各半兩

天麻為末壹分

金薄拾片別研

龍腦研

麝香研各壹分

丹砂光明者貳錢研水飛

膩粉壹錢

右九味同研勻細鍊蜜丸雞頭大別用青黛細末家為衣每服三歲一丸用金銀薄荷湯化下食後臨臥

服看兒大小加減

治小兒風熱發癇升麻飲方

升麻

寒水石碎各壹兩

蛇蛻皮伍寸細切微炒

龍膽

釣藤各壹兩到

蚱蟬炙去翅足參枚

鐵粉研

黃芩去黑心各參分

右八味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓放溫日三五服隨兒大小以意加減

治小兒風癇發作無度頸核瘰癧瘴毒乍寒乍熱欲成

骨蒸腸滑骨熱多變疔痢皮肉乾枯不思乳食身熱生

瘡喉閉腫痛悉主之沉香湯方

沉香剉 人參各半

木香剉

厚朴去麤皮 乾藍各分

小玄參生薑汁炙 知母焙 地榆剉

甘草炙剉各壹兩 釣藤皮壹兩 凝石水壹兩半

右一十二味擣為麤散一二歲兒以水半盞藥末半錢匕煎至三分去滓不限早晚日三服量兒大小以

意加減

治小兒風癩玄參飲方

小玄參剉 釣藤剉 甘草炙

升麻剉 山梔子剉 黃芩去黑心

犀角鎊微 麥門冬去心焙

右八味麤擣篩三四歲兒每服一錢匕水七分煎至四分去滓一日三四服隨兒大小以意加減

治小兒風癩掣攣身體汗出獨頭無汗便宜灸頂上旋毛中小炷勿令大三壯訖用木湯浴方

白朮五兩麤擣米泔浸一宿至明用慢火煎五七沸以適寒溫洗兒頭及身即愈一法用菖蒲五兩煎如

上法

治小兒六七歲發癩壯熱麻黃湯方

麻黃去節壹兩壹分 釣藤剉壹兩 杏仁去皮尖

赤芍藥

當歸剉炒

桂皮去麤

秦艽去苗土各參分

大黃蒸參度暴乾剉

石膏推碎各壹兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎去滓取六分

食後溫服

治小兒發熱時時戴眼口中沫出此是癩疾宜服釣藤

飲方

釣藤參分剉

蚱蟬壹枚去翅足炙

人參

黃芩去黑心

大黃剉炒各半兩

牛黃參豆大別研湯成下

右六味內五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞竹瀝

三合煎取五七分去滓入牛黃少許溫服若得微微

澹利一兩度即止

治小兒風癩涎潮發搐不省人事醒風煎方

白花蛇頭壹枚自開口者生用

乾蠍全者半兩

牛黃研半分

丹砂研壹分

龍腦研半分

麝香研錢半

右六味搗研為細末鍊蜜和為煎瓷合內收每服一
棗豆大薄荷溫水化破服之量兒大小加減服

治小兒慢驚風癩涎盛咽喉不利手足搐搦目睛直視

通聖餅方

天麻

使君子去皮

白僵蠶炒

白附子炮

天南星各壹分炮

乳香研

青黛

蠟梢炒

膩粉

水銀各壹錢

黑鉛半錢與水麝香研

龍腦研各半錢

無食子壹對

右一十四味搗研為末白麩糊和丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅子用薄荷湯化下食後臨睡服量

兒大小加減

治小兒風癩驚熱蛇蛻湯方

蛇蛻皮參寸炙

細辛去苗葉到

釣藤到

黃耆到

甘草炙各半兩

大黃蒸參度到焙壹兩

蚱蟬肆枚炙去翅頭足

右七味麩搗篩每服一錢七水八分煎至四分去滓入牛黃少許攪勻食後溫服

治小兒傷寒風癩小黑散方

烏頭

天南星

各壹枚大者煨赤入小瓶內濕紙覆口令火滅取割

之中心存白處如皂莢子大為度須煨數枚擇中度者可用

薄荷

玄參

各為末伍錢七

右四味搗羅為散每服一豆許蜜和葱白同研細白湯調下如筋脉緩急加乳香同葱白煎湯下

治小兒風癩身熱癰瘰強直反張透羅丸方

水銀用鍊淨者黑錫壹分結為沙子

粉霜研

乾蠍全者炒各壹分

天南星半分生用

膩粉壹錢

龍腦研

麝香各半錢研

右七味先杵天南星乾蠍細羅了同研藥入乳鉢細研入石腦油和丸如梧桐子大每服二丸溫薄荷水化下大段即加二丸小兒一歲已下每服一丸臨時相度虛實與喫

治小兒風癩發熱身軟時作時醒或先屈指如數乃發掣縮天南星丸方

天南星牛膽製者半兩天麻

人參

防風去叉到各壹分

乾蠍全者壹拾肆枚炒已上搗末

乳香研

龍腦研

牛黃研各半錢

丹砂研參錢

麝香研壹錢半

右一十味搗研令勻細鍊蜜和丸如雞頭大每服一丸荆芥薄荷湯化下食後臨臥量兒大小加減
治小兒風癩潮搐時發時省安魂鎮心退風除熱并一切驚風丹砂散方

丹砂研

白附子各貳錢

附子大者壹枚炮裂去皮臍

乾蠍全者去土炒

天南星炮去臍

半夏湯洗去滑

天麻各壹分

右七味搗羅爲散入丹砂再研勻二歲已下每服半
字四五歲已下一字六七歲半錢十二五歲一錢
一切驚熱風熱欬喉中壅隘蜜熟水調下一切風
不問急慢咬齒拗項翻眼氣麤手足掣縮冷茶清調
下或吐涎或微汗卽差有猛發一上者良久再進一
服疾定後更加牛黃少許和前藥用薄荷蜜熟水調
下日三服若要爲丸用薄荷薑汁蜜酒同煮麩糊爲
丸如菘豆大薄荷湯下五丸

小兒食癩

論曰小兒發癩因乳哺不節而成者食癩也其證口眼

相引目睛上擡手足掣縱背脊強直或頸項反折此由
藏府壅滯內有積熱或乳母飲噉五辛毒物恚怒無節
致煩毒之氣入於乳中因卽乳兒令氣血不調腸胃否
塞故壯熱多驚四肢抽掣是爲食癩之病
治小兒食癩及新生客忤中惡發熱乳哺不消面青目
下垂丁奚羸瘦脛交三歲不能行步麝香丸方

麝香研半兩

牛黃研壹兩

黃連去須

桂去麤皮各貳兩

雄黃研

烏賊魚骨去甲

丹砂研

附子炮裂去皮臍各壹兩巴豆陸拾枚炒去皮別研出油

盡

赤蜈蚣壹枚炙去足特生礬石壹兩

右一十一味除巴豆外各搗研爲末入巴豆膏相和
研勻鍊蜜和入臼搗熟安密器中兒生半月至一月
服如黍米大一丸百日至二百日服如麻子大二丸
一歲已上量力加減並用米飲下

治小兒食癩瘰癧及諸變蒸腹中宿痞飲食不節腹滿
溫壯朝夕發甚大小便不通脾胃氣弱牛黃丸方

牛黃研壹分

雀屎白兩炒半

芍藥參分

芎藭壹兩

黃耆細剉壹分

乾薑炮裂半兩

甘草炙參分

人參

大黃剉炒各壹兩

當歸焙切

黃芩去黑心各半兩

白麩炒參兩

巴豆

去心膜別研如膏紙裹壓去油壹分

右一十三味搗羅爲末與巴豆膏和令勻鍊蜜爲丸

一歲兒如黍米大二丸二三歲如菉豆大三丸並用

米飲下微利爲度更量兒大小加減

治小兒諸疾一歲已上三十六種無辜疳濕閃癖食癩

天行赤眼急黃一切病麝香丸方

麝香細研

牛黃細研各半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入研如膏

丹砂細研

芍藥

白茯苓去黑心各壹兩

眞珠

研如粉水飛過壹分

巴豆

去皮心微炒研如膏參分

牡蠣

熬別搗羅研如粉壹分

虎睛

貳枚微炙研

右一十一味除巴豆外各搗研為末入巴豆鍊蜜和搗三千杵入密器中貯候服取二丸如麻子大溫水下隨兒大小加減

治小兒食癩無辜閃癩雄黃丸方

天石雄黃研 丹砂研 牛黃研各壹分

小麝香研半 石膏兩半 麩人研半兩

甘遂切炒壹分 牡蠣熬半兩 巴豆去心皮醋煮研壹分

右九味除研外搗羅為末共和研勻鍊蜜丸油麻子大每服一九二丸米飲下以利為度更量兒大小加減

治小兒諸癩寒熱吐瀉不能乳哺龍膽湯方

龍膽入酒黃當歸切 大黃剉

黃芩去黑心 栝樓根炙 甘草炙

桂去麤皮 人參切 牡蠣熬

麻黃節去根 赤石脂研別 芍藥各壹兩

右一十二味麤搗篩二三歲兒每一錢匕水一盞棗一枚擘同煎至五分去滓分溫二服更量兒大小加減

治小兒食癩魍魎三十六種無辜五疳八痢驚風天癆

真珠丸方

真珠壹兩

牛黃研細

杏仁去皮尖

虎睛壹兩

丹砂研細

牡蠣熬研粉

甘遂壹兩

甘草半兩

芍藥分

白茯苓壹兩

巴豆去皮心

麝香壹分

白茯苓壹兩

麝香壹分

右一十二味除別研外搗羅為末一處研勻鍊蜜為

丸如麻子大每服一丸至兩丸米飲或桃人湯下取

下惡物如魚腦青色効更量兒大小加減

治小兒食癩及疳黃丹砂餅子方

丹砂壹兩

黃鷹調淨

白丁香各壹分

棘剛子貳拾伍枚

粉霜研

水銀沙子研各壹錢半

膩粉壹錢

乳香末研

犀角屑

天南星末

麝香研各半錢

蠟梢末

滑石末

盧會末各壹錢

金薄片壹片

銀薄片壹片

右一十六味搗研為末拌勻稀麩糊和丸如黃米大
捻作餅子丹砂為衣每服三餅薄荷湯化下更量兒

大小加減

小兒諸癩

論曰小兒病口眼相引目睛上搖手足掣縱背脊強直

頸項反折者癩病也十歲以上得之曰癩十歲以下得之曰癩癩謂邪氣乘間而作也或因衣厚汗出遇風則為風癩或因驚怖大啼則為驚癩或因乳食不節則為食癩因此三種變作諸癩發則手足掣縮慎勿執之執則令曲戾不隨也

治小兒諸癩吐痢寒熱芍藥湯方

芍藥

黃芩去黑心

大黃剉炒

當歸切

栝樓根

甘草炙

桂去麤皮

人參各二兩半

赤石脂搗研如粉

牡蠣搗研如粉

紫石英搗研如粉

麻黃去節各壹兩壹分

右一十二味麤搗篩再研令勻一二歲兒每服半錢匕水半盞入棗一枚擘煎至三分去滓溫服日三隨兒大小以意增減

治小兒諸癩掣瘈吐舌甘草湯方

甘草炙

釣藤

栝樓根

黃芩去黑心

獨活去蘆頭

桂去麤皮

芍藥

當歸切炒

石膏碎各半兩

蛇蛻陸寸炙黃

麻黃去節參分

右一十一味麤搗篩三五歲兒每服一錢匕水一盞煎至五分去滓熱服日三隨兒大小以意加減

治小兒諸癩乍差乍發蚱蟬丸方

蚱蟬多去翅足壹枚 石膏碎

芫胡去苗各壹兩 牛黃研 龍齒碎

梔子人 升麻 芍藥

沙參 鈞藤各參分 杏仁貳拾壹枚湯浸去皮尖雙

人麩炒 龍膽兩半 丹砂研壹兩半

右一十四味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大一歲

兒每服一丸溫水化破服日三更量大小以意加減

旋丸與服

治小兒一歲至十歲發癩成癩發動無時口吐白沫遺

失大小便丹砂丸方

丹砂研 天麻 露蜂房微炙

麻黃去節 黃芩去黑心 鈞藤各半兩

甘草炙 防葵炒 大黃炒

蚱蟬去頭足炙 龍齒研 山梔子人各壹兩

銀薄拾片細研 虎睛對研 羌活去蘆頭

芫胡去苗 白鮮皮 升麻

雷丸炒 沙參各參分 石膏研壹兩壹分

蛇蛻皮炙 麝香研 細辛去苗葉

牛黃研各壹分

石二十五味搗研為末鍊蜜為丸如菘豆大每服一
歲兒三丸二歲至三歲五丸四歲至五歲七丸六歲
至十歲十丸並用米飲下空心午間臨臥各一服
治小兒諸般癩疾口出白沫黃芩丸方

黃芩去黑心

梔子人

犀角鑄各壹分

麝香研壹錢

虎睛研壹隻

右五味搗羅為末研細鍊蜜和丸如菘豆大每服一
歲至二歲兒三丸三歲至五歲兒五丸並米飲下日
四服更量大小加減

治五六歲兒壯熱發癩五癩湯方

大黃剉炒

石膏研各壹兩

蚱蟬微炙參枚

芫胡去苗

升麻

梔子人

麻黃去節

黃芩

知母焙

釣藤

芍藥

杏人去皮尖雙入別研各半兩

蛇蛻參寸炙黃

露蜂房微炙壹分

右一十四味蠶擣篩一二歲兒每一錢七水半小盞
煎至三分入竹瀝半合更煎一兩沸去滓分溫三服
至夜服盡隨兒大小以意加減

治小兒六七歲發癩壯熱麻黃湯方

麻黃去節壹兩壹分

釣藤皮兩壹

杏人湯浸去皮尖雙入麩炒

芍藥

桂去麤皮

當歸焙切

秦艽

去苗土各參分

石膏

研壹兩半

右八味麤搗篩每一錢匕水一盞煎至五分去滓分

溫二服日四隨兒大小以意加減

治小兒發癩手足掣癢十指戰掉舌本腫強獨活湯方

獨活

去蘆頭

人參

各半兩

大黃

剉炒壹兩

麻黃

去節壹分

右四味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半小盞煎

至三分去滓溫服連夜三四服隨兒大小以意加減

治小兒諸癩石膏崇命湯方

石膏

研

黃芩

去黑心

芍藥

各壹分

桂

去麤皮

細辛

去苗葉

龍骨

研

當歸

焙切

乾薑

炮

大黃

剉炒

牡蠣

研煨

赤石脂

白石脂

各參分

甘草

炙壹兩

右一十三味麤搗篩一二歲兒每服半錢匕水半盞

入棗一枚擘同煎至三分去滓溫服至夜三四服隨

兒大小以意增減

治小兒諸癩當歸湯方

當歸

焙切

龍骨

研各半分

甘草

炙參分

大黃炒 芍藥 乾薑炮

小石膏碎 桂皮去麤 赤石脂

黃芩去黑心 細辛去苗葉

右一十一味麤搗篩五歲兒每一錢匕水一小盞入

棗二枚擘同煎至五分去滓分溫二服日三服後瀉

者加赤石脂一分若有熱驚者加黃芩去黑心 隨兒

大小以意加減

治小兒諸癩竹瀝湯方

竹瀝合 黃芩去黑心 防已

茵芋去麤 桑寄生 羚羊角鎊

大黃剉 甘草炙 白薇

麻黃節 白鮮皮各半

右一十一味除竹瀝外麤搗篩每一錢匕水一小盞

煎至五分去滓入竹瀝半合分溫三服至夜服盡量

兒大小以意加減

治未滿月及出月兒壯熱發癩苳胡湯方

苳胡去苗 升麻 黃芩去黑心

甘草炙 大黃剉 石膏碎

鈞藤壹分 蚱蟬去翅足 蛇蛻皮令黃色

右九味麤搗篩每服一錢匕水一小盞煎至半盞去

滓入竹瀝半合更煎一兩沸半月至一月兒斟酌與之稍大以意增加若連發不止加麻黃去節一分

治小兒五十日發癩諸藥無効蚘蟬湯方

蚘蟬去翅足 芍藥各參 鈞藤

細辛去苗 黃芩去黑 黃耆剉

甘草炙令赤 牛黃別 麝香別研

大黃剉炒令香 蛇蛻貳寸炙

右一十一味麤搗篩九味入牛黃麝香拌勻每半錢

匕水半盞煎至三分去滓分溫二服連夜五六服隨

兒大小以意加減

治癩癩欲發目暗癩癧惡聲嚼舌吐沫雌黃丸方

雌黃 鉛丹微炒各 麝香壹錢

右三味同研令勻用牛乳半升熬成膏丸如菉豆大

每服三丸溫水下日三如無牛乳羊乳亦得

治小兒膈上有痰發癩掣癧牛黃煎方

牛黃研半 人參兩 生犀末

蓬砂研 白茯苓去黑 薄荷

乳香研 甘草炙 井泉石研

烏金石研 生乾地黃焙 天麻各壹分

右一十二味搗研為末用蜜於銀器內熬成煎每服

息子大煎人參湯化下日三
治時發驚風變成癩疾吐涎散方

膩粉壹兩 豬牙皂莢末壹分

右二味細研令勻每服半錢生油一椀斟水半盞同
調勻分二服以吐為度

治小兒吐痢發癩病吐舌掣縮方

鈞藤 黃芩去黑心 甘草炙各兩

石膏碎 龍齒各壹兩 升麻參分

蚱蟬去翅足 炙壹枚

右七味麤搗篩每一錢匕以水七分入竹葉三片同

煎取四分去滓分溫三服至夜令盡七歲全劑三四
歲只半劑

治小兒五種癩牛癩即牛聲馬癩即馬嘶狗癩即狗吠
羊癩則羊鳴雞癩則雞鳴差而復作雄黃丸方

雄黃研 水銀各貳兩 鉛熬成汁與水銀結作沙于參兩

真珠末細研壹兩 丹砂研半兩

右五味同細研為末鍊蜜和丸如菉豆大每服四丸
金銀薄荷湯下日再服

治小兒五種癩手足動搖眼目反視口吐涎沫心神喜
驚身體壯熱牛黃散方

牛黃研

丹砂研

白欬

露蜂房微炒

杏人湯浸去皮尖雙人
麩炒黃各壹分

桂去麤皮
半兩

右六味搗研為散拌勻每服乳汁調下一字七日四

五服量兒大小加減

治小兒諸癩退後不能言排關散方

天南星炮

右一味搗為細散每服一字匕豮豬膽汁調下嚥入

喉中即能言量兒大小加減

大德重校聖濟總錄卷一第百七十一

