



# 傷寒

## 傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但  
 劑少異用藥必以平略陳於前矣然而驚風瘡豆亦嘗發有此  
 尤不可闕請發明證而條折之惡風惡寒者必限人藏身以  
 衣密蓋是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚  
 手擗足煩渴燥發熱氣逆是為裏證可略與疎利也至若頭  
 額必手足冷口中必氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當  
 以厚衣被其裏也與是三者汗下溫之法可以類推矣發汗用

加(黃芩)解肌用(香蘇散)加(乾葛)通利(四順湯)

或(利)人參(鹿茸)溫裏(理中湯)厥冷(甘草乾薑湯)尋常感

或(傷風發熱)人參(石散)或(麻防風圓)

者... 咳嗽則... 表裏俱熱... 加... 夾食則... 無汗自汗... 傷風傷暑... 活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

傷寒論治

生薑半兩切甘草... 杏仁... 湯

右判如... 每服伍錢水壹盞半煮至八分

香蘇散治時瘟疫傷寒

香附子... 蘇葉... 青橘皮... 甘草

右為麤末每服參錢水壹盞煎茶分去滓執服不拘時口含服解肌加乾葛前若作細末只服貳錢入鹽點服

升麻屑湯治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼

小兒明湯方見暑門... 甘露飲方見瀉類... 四順飲方見積

五苓散方見水飲門... 參蘇飲方見瘡疹門... 人參羌活散方見服

人參瀉肺湯方見咳嗽門... 紫雲膏方見食癩類

人參散毒散方見寒類

脫甲散治小兒傷寒熱頭目昏沉夾驚夾食寒熱煩燥口渴

無汗自汗夾積傷滯隔滿脹急日夜大熱及傷風傷暑驚癇客忤疳氣短熱並宜服之

半升  
知母 歸身 龍膽草  
白茯苓 人參  
川芎 歸身

右件為細末每服一大錢水一盞葱白連根二寸煎服有熱

加乾葛升麻煎茶

薄荷散 治熱極生風夾驚傷食痰涎壅盛

薄荷 半兩

羌活

全蝎 去毒

麻黃

甘草 半

僵蚕 炒

天竺黃

白附子

右為末薄荷湯調下一匙畧煎數沸加酒少許

香葛散 治小兒傷寒夾食夾驚四時瘧疾瘟疫

香附子 炒

紫蘇葉 各壹兩

陳皮 白

青皮 去穢炒

甘草 錢半

葛根 炒

右吹咀用生薑三片葱白二莖同煎米物時候服

津液虛羸少氣虛煩如傷寒未解不可服

石膏 貳兩

半夏 肆錢

人參

甘草 錢貳

麥門冬 陸錢

右劉散每服二錢水一盞青山藥生薑各四片粳米六七十

粒同煎啞加

白虎加人參湯 治小兒傷寒若吐若下後七八日不解熱結

裏表裏俱熱惡寒大渴大汗出煩渴不解脉洪大者

石膏 貳兩

知母 肆

甘草 肆錢

粳米 伍勺

人參 壹

右劉散每服三錢水煎米熟為度去滓温服

# 寒瘧

寒瘧證治

治小兒發瘧痰壅煩悶

桂心 烏梅肉 甘草 各半兩

右剉細每服壹錢井水小盞煎半候冷未發前與之

附方

青皮散

治小兒瘵瘵脉來弦數但熱不寒或熱多寒少膈滿下

草葉散

治小兒瘵疾寒多熱少或遍身浮腫痰癆瘵門

治

虛寒證治

虛虛寒

惟腎主虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不容補但

黃圓

與之 方見腎齊門

嗽冷者以 各壹分

方知專用 白米 各壹分 辣桂 炙

非州人陳米煎服

汗

虛汗證治

團參湯

治小兒虛汗盜汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸 各叁錢

右剉細用雄猪心壹箇切參片每服貳錢猪心壹片并

又撲汗方

黃連

母蠣粉

貝母 各半兩 米粉 壹升 未傳

附方

牡蠣散

治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗

牡蠣貳兩

黃芪

生地黃 各壹兩

右剉散每服貳錢加 小麥 一撮水一盞煎服

方 治睡中汗出

酸棗仁 人參

茯苓 各等

右末每服二錢用米飲調下

# 痰涎

痰涎證治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥

研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并天麻防風

擇焉

風痰證治

朱砂圓 鎮心壓驚驅風墜痰

直僵蚕 洗焙 大南星 炮製

後糊圓牙二天每服伍圓薄湯溫日

風痰全活危急

青礞石 搗碎 酸消 壹兩和入銀窩內硬炭火

右末每服壹錢七急風薄荷汁入蜜調下涎藥自大便出狀

如稠涕次服退熱截驚等劑慢風木香入少蜜煎湯調下

即服 蘇合香丸 烏等劑

青礞石 壹圓

圓白大半夏 湯浸柴次

圓白天南星 洗畧炮

右細末生薑汁煮飛麩糊圓麻子大每拾圓熟水下諸癇白

嗽 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

等分爲末米飲調下大抵小兒諸病非熱則痰

爲土上藥

辰砂膽星湯治小兒痰熱驚熱痰喘氣急風痰癱盛

辰砂 壹錢 牛膽南星 兩 琥珀 麝香 少許 青礞石 分

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九用姜湯不拘時化下

喘咳

杏仁膏治小兒久患咳嗽

杏仁 壹兩 去皮 伏苓 壹兩 紫苑 茸 皂角 去皮 弦核 各半兩

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

此湯治小兒喘嗽

貝母 蘇子 微炒 杏仁 皮 東安 去節 半夏 曲

在坐細每用壹錢薑叁片紫蘇叁葉并嫩梗唯

人參 壹分 枳實 製 桑白皮 炒 半夏 製

赤伏苓 五味子 細辛 淨 北梗

麻黃 去節 阿膠 炒 酥 甘草 炙 各半兩

右判散每壹錢薑叁片紫蘇叁葉水煎服凡治喘嗽不論肺實肺虛可干可温可下藥中須用阿膠便得安肺潤肺其性和平肺經藥

附方

治肺受風邪客熱咳嗽氣促喘悶痰壅鼻塞声重及解時行瘡疹痘毒咽痛煩渴

人參 半兩 柴胡 半兩 杏仁 湯炮 去 桔梗 炒 赤芍藥 荆芥 枳殼 去穢 桑白皮 炒

北五味

麻黃

各壹兩

旋復花

伍分

甘草

壹兩

右件咬咀每服貳錢水壹盞

薑一片葱二根

煎七分無時溫服或入薄荷同煎

補肺散治久患咳嗽肺虛氣促有痰惡心

阿膠

壹兩

半炒

白茯苓

伍分

馬兜鈴

去老

糯米各半

杏仁

貳拾壹位湯

甘草

肆錢

右咬咀每服貳錢水一盞煎七分無時溫服

神應散

治小兒一切虛嗽

嬰粟殼

去梗帶刺碎

杏仁

湯炮去皮

白朮

香通散

人參

去

麻黃

去

烏梅

桑白皮

去皮

甘草

壹兩

甘草

壹兩

# 脾胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐有食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用(厚朴)(枳實)等劑胃實用(北粳)(陳皮)等劑若夫胃中停寒則(乾薑)(良薑)(官桂)(丁香)又不可闕其在酌量用之小分劑與之夫是之為平胃

驚悸不食證治

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用(益智)者此也

益智仁

石菖蒲

白茯苓

蓮子肉

陳皮

縮砂仁

半夏麴

木香

厚朴

枳實

甘草

壹兩



劉細每服壹錢薑參片棗壹枚水壹盞煎不飢飽服

以不和吐瀉不止預防風証常服則調脾胃進飲

食

人參去芦

白木洗

白茯苓去皮

山藥去黑皮

乾薑

扁豆炒

南星制

甘草炙

藿香去老便

防風去芦

天麻各等分

右咬咀每服貳錢水一盞美二片美十包美五十粒搗碎煎

七分温服如瀉不止初香白豆同煎服

**温脾湯**

治脾胃不和腹脇虛脹不進乳食困倦無力

訶肉煨

人參半錢

木香

桔梗略炒

茯苓

藿香洗

陳皮

黃芪

甘草略

白木半兩

每服二錢美

**小兒**治小兒冷氣入胃嘔吐不已

乾山藥

藿香略

甘草略

橘皮去白

砂仁

白茯苓略

白木

官桂略

人參

木香

丁香

肉苳蓫

白苳蓫各伍

右為細末煉蜜丸如芡大米湯化下一歲一丸

**四君子湯**治小兒調理脾胃進乳食止泄瀉

人參

白木

茯苓

甘草略

石對散每服二錢美前加陳皮砂仁各六君子湯

**參苓白朮散**治小兒脾胃虛弱飲食不進或嘔吐泄瀉及大病

後調助脾胃此藥最好方見虛勞門

**人參白朮膏**治小兒脾胃虛弱肌膚羸瘦欲成疳證服之則

積肥肌

人參去芦

白木洗

茯苓去皮

山藥

連肉酪壹 山查柴錢 甘草炙 陳皮 去白

神麩炒 麥芽糲糖取 澤瀉路伍

右為細末煉圖為丸如龍眼大每服一九米飲化下

# 吐瀉

嘔吐證治

**消乳丹**治乳哺不化停滯中脘或作嘔惡

丁香 木香 青皮 生肉蕞  
三稜 蓬木等

右細末稀麩糊圓麻子大每服伍圓米飲下日貳服

**養胃散**快膈益脾止嘔進食

不香 丁香 藿香 陳皮  
縮砂 白豆蔻仁 各壹分 甘草 炙

右細末每服參字煎薑棗湯或熱調下或加因令

蒼朮 厚朴 丁香 赤芍 官桂 白芷

澤瀉 乾姜 官桂 滑石

半夏 青皮 檳榔 木香 貳錢

金錫路貳 柯子肉 枳殼 丁香

右為細末圖為丸如龍眼大每服一九米飲化下

# 腫脹

腫脹證治

**厚脛散**治小兒水氣腫滿

甘葛藤 炒 紫牽牛 取仁 桑白皮 炒  
雞心檳榔 川大黃 剉焙等分

右為末每半錢水半盞薑貳片蜜半匙煎湯調下或煎大宛

氣飲研（白）灌下

分氣飲治小兒腫脹作喘氣短而急

北梗 赤伏苓 陳皮 桑白皮炒

大腹皮 枳殼製 半夏麩 真蘇子微炒

紫蘇 甘草炙 草果仁壹錢

右剉每壹錢半水小盞薑叁片棗壹枚煎半服

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經夕風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉擊於下皆因不散加以水竇不行亦能發為此疾治法用（丸）

桃仁浸去皮熬微熟 辣桂 牽牛微炒

白痰藥炒香 皮 北大

末凍蜜（丸）

治小兒感暑夾食泄瀉煩渴

治瀉解熱並見人人瀉門

參苓白朮（丸）治小兒脾胃虛弱泄瀉

瀉痢證治

治疳痢或大便瀉

白沒石子燼 白豆蔻仁斷 訶子肉貳个 木香 黃連各壹錢

右末煨米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下

藍青搗汁每服半盞與之

治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間

下赤白痢腸內疴痛日夜頻併不飲乳食

黃連半錢 肉豆蔻貳丁 香半錢 木香 訶肉各半兩

石為末以（丸）丸如黍米大三歲兒服十九（丸）下

治小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重

胃風湯治小兒風冷所傷寒虛客于腸胃水穀不化泄瀉疝下  
腹脇虛滿腸鳴疝痛下如豆汁或下瘀血並見大人痢門

# 腹○痛

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也挾熱作痛者以面赤  
或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青  
見之冷甚而證變則面色黯黑唇口爪甲皆青矣熱證

京方加青皮及枳殼方見精熱門冷證

陳桂調經合白頭方見嗽門若乃邪正交爭冷熱不調

只艾湯方見氣門加青皮陳皮木香

小兒內傷風冷食積腹痛吐瀉惡惡

# 大八倍

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之府腎氣  
而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿  
謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用

## 雞腸散

雞腸燒

牡礪灰

白伏苓

真桑螵蛸微炒各半兩

辣桂

龍骨各半錢半

右麗末每服壹錢薑棗煎服

又方雞臍脰壹具雞腸燒存性

右為末每壹錢酒調下男用雞女用雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致硬清濁不分而

色白也又則成疳亦心膈伏熱兼而得之用伏苓散

**伏苓散**

京三稜 蓬莪木 縮砂仁 赤伏苓 各半兩

青皮 陳皮 滑石 甘草 各貳錢半

右末每服壹錢麥門冬壹分煎湯調下

又方 大甘草頭煎湯服

諸淋證治

**葵子散** 治小兒諸淋

葵子 車前子 木通 蘧麥

桑白皮 赤伏苓 山萆仁 甘草 微炙等分

右剉每壹錢井水小盞葱白貳寸煎柒分食前溫服

**赤散** 治小兒血淋

生乾地黄 木通 黃苓 甘草 各半

赤每服 井水入 仍以米

煎湯灌下或煎天

**藥**

毋蠟灰貳分 乾地龍壹分

右細末津唾調傅外腎熱者雞子清調傅

**毋蠟散** 治小兒外腎腫大空物通明

毋蠟粉研十分細先以津唾塗腫處次以毋蠟粉摻傅

又方 外腫研赤石唾調傅

附方

**溫脾散** 治小兒脾胃不和腹脇虛脹不欲乳食困倦無力增寒

壯熱並皆療之

訶內煨 人參 各半錢 甘草 貳錢 白朮

木香 茯苓 藿香洗 陳皮

黃耆 桔梗各半

右剉散每服三錢壹一大片壹一枚煎服

治小兒腫脹作喘氣短而急四肢浮腫

桔梗炒 赤茯苓 陳皮 桑白皮炙

大腸皮洗 枳殼炒 半夏包 甘草炙

真蘇子微炒 紫蘇各煎 草菓上 加木通

右劉散每服二錢水一盞三片一一枚煎服

南星腹皮散 主小兒腫疾欲瘥未瘥之間脾胃虛慢氣促痰喘

腹脹胸滿飲食減精神困小便不利面色痿黃

南星同前製 大腹皮淨洗 生薑皮 陳皮去片

青皮去白 桑白皮炒 甘草炙 扁豆炒各

右吹咀每服二錢水一盞二片煎七分無時服

青木香散 治小兒陰腫寬中快膈腹脇痛心下堅

黑豆炒 木香 補腎脂炒 薑

枳榔各肆錢 粟米飯包 再用濕紙包裏煨

細末滴酒為丸

方 凡下

生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草

右劉每壹錢水小盞煎柒分調髮灰食前服

大便不通證治

沒藥散 治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高起大便不通

沒藥 大黃 枳殼炒 北梗各式錢

木香 甘草炙各壹錢

右劉每壹錢薑貳片水煎服

脫肛證治

龍骨散 治小兒大腸虛肛門出

龍骨 訶子肉炒各式錢半 沒石子大者

嬰粟殼醃 赤石脂各貳錢

右末每服壹錢米飲調下

# 丹毒

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而徧體也此由乳母酒麪煎炙過度與夫烘衣與兒不候冷而即着多成此候或發於手足或發於頭面曾昔令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言纔有入腹入腎之證便不可救藥通用**敗毒散**方見寒類加**黃耳**外用**青黛****土朱**井水入蜜研傅

又方

北梗

天花粉

乾葛

川升麻

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

右剉散每壹錢薑貳片井水煎服餘見丹毒門

# 吐衄

吐衄證治

蒲黃散

治小兒吐血咯血

生蒲黃

油髮灰

等分

右研細每壹錢煖**生地黄汁**調下或米飲亦得

地黄汁方

治小兒吐血衄血

生地黄汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

生蘿苜

搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

附方

龍腦雞丸

治小兒膈吐血衄血咳嗽血

龍腦雞丸

治小膈熱吐血衄吐咳嗽血方見鼻門

# 雜證

顛陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不得平滿

顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆梁毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞞執氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量重輕兼與調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退瘥

解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎主髓腦為髓海不足所以頭顛開而不能合凡腦髓欠少如木

成癆人始

鴉一系 牡皮

未煉蜜圓桐子大每壹式

微炮為末米醋調傳於額

又方

華陰細辛 去苗土

辣桂去麤皮 乾薑

右等分為末乳汁調傳

口舌證治

月角瘡

髮灰細末猪脂和傳亦好

又方

治小兒口唇赤爛生瘡及治牙疳瘡

青黛 叁錢

枯凡貳錢

水片 少許

右為細末搽於患處即有蟲者加一箇共為末搽患處

重舌證治



重舌者心脾俱有執也心候於舌所主者血脾之絡脉出於舌  
卜若心脾有執則血氣俱盛附古根而重生壹物形如舌而短  
小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒齦者曰重齦皆當  
刺去其血也用**黃蒲黃**傳之或**鰾**傳之或**鱉**傳之或**鱉**傳之或**鱉**  
**浸**亦好

木舌證治

舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積執執氣上行  
故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至窒  
**調下**○又方**黃蜀葵**研細**黃**半之  
研點藥水○又方**川**貳分**紫**壹分**白**半分同研  
**錢****竹**井水調傳

滯頤證治

滯頤涎流出而漬於  
不能收約法當

木香

青皮

川白

白木

陳皮

右細末糕糊圓麻子大壹歲拾圓貳歲貳拾圓米湯灌

喉痺證治

疾痺腫方

蛇退燒存性為末

右每半錢乳汁調下或用**蜂房**燒存性為末每半錢乳汁調下

語遲證治

言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣  
心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也**昌蒲**主之

昌蒲

人參

石昌蒲

麥門冬

去心

遠志取肉薑製炒

川芎

常歸各貳錢

滴乳香

朱砂各壹錢

別研

右末煉蜜圓麻子大每服拾圓粳米飲下

夜啼證治

夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發燥寒盛作疼所以夜啼而不歇也

釣藤

伏神

伏苓

川芎

當歸

木香各壹錢甘草炙半錢

右末每服壹錢薑棗略煎服共或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澁之證

服蘇合香圓急以方術驅之

眼病證治

明目膜方

明目礬粉研細

蜜

大匙以綿線過

耳病證治

若腎之候小兒腎經氣實其執上衝於耳遂使稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留醞釀成熱亦令耳膿久不瘥變成聾耳

龍骨散

明礬

龍骨

各壹錢

黃丹

貳錢

胭脂

壹錢麝香少許

右細末先以綿杖撚去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加

月細耳瘡方

又方

蝦蟇燒灰存性擣為末和猪膏傅

龜背證治

智高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏月執煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

州大黃... 天門冬... 杏仁... 百合

不通 桑白皮 燻石骨 各半兩  
右末煉蜜圓綠豆大每伍圓食後臨卧熟水化下

龜背證治

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致偃僂背高如龜背矣然此多成癩疾間有灼艾收功  
第三椎骨下兩傍各壹寸半臑俞穴第柒椎骨下兩傍各壹寸半以小兒中指中節為壹寸艾柱如小麥大但叁伍壯而止

臍病證治

安濟散 治臍中汁出或赤腫

白石脂末焙出火氣傳之日叁度或油髮灰傳或

當歸末傳 煨灰傳亦好

鶴節證治

艾不足血氣不充故肌

腎

各貳錢修合服餌壹回叁歲以

行遲證治

骨上髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行  
仰亦肝腎俱虛得得之肝主筋筋弱而不能束也

又方

虎脛骨 酒炙 生乾地黄 酸棗仁 酒浸去皮炒香

白茯苓 辣桂 防風 當歸

川芎 牛膝 等分癩

右者煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或前采瓜湯下

加皮散 治小兒叁歲不能行

真玉加皮 續牛膝 酸木瓜乾 各半分

右爲末每服壹錢半以粥飲調以入好酒貳黑再調食前服  
日貳劑

癩疔證治

癩疔者陰核氣結腫大而吊痛也多因小兒啼怒不止傷動陰  
故陰氣下擊結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下  
小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水  
爲故水氣上乘於肺先喘急而後疔痛其狀有如李者亦有  
疔者亦有并腎腫大者亦有木硬者臍下痛楚皆不能忍用  
心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

方見水飲門

**木通**

入少鹽煎湯調下以利小便

微炒取仁  
去皮

悲證

腹痛引腰脊

木香

檳榔

三稜

蓬朮

青皮 去白

陳皮

川練肉

元花 各半兩

辣桂

牽牛

生取紅川巴豆肉

不去油

右細末飛麩糊圓麻子大每叁圓空心壹服午前壹服薑湯  
送下

瘡癬證治

**鱈魚** 治小兒白禿瘡

鱈魚 壹尾重叁兩者去腸肚以  
亂髮填滿濕紙裹燒存性

雄黃 二錢

右同末生麻油調傅先以藥水洗拭後用藥

桑榆白皮爲末醋調傅

練換枝皮燒猪膏調傅

蛇皮燒存性爲末猪膏調傅

鍊成松脂末并髮灰并丹填傳

白膠香半兩研末或貳錢研和猪脂調傳或

亦治大風即是脂脂鑄煉投冷水中為末

水調空心常服

治卒得癩瘡 赤爛牛糞燒灰研細傳

瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研雞子清調傳

燕窠土研細猪脂調傳

水銀壹分 胡粉貳分水研入雞冠血傳

小兒眉叢中生瘡名曰鍊銀癬

多集為細末麻油輕粉調傳

荆芥穗各貳兩 白各 貳片 參各

治小兒臟腑積熱口舌生瘡

連翹 甘草 黃芩 川大黃

朴硝 梔子 薄荷葉各等分

右剉碎每服伍錢或伍葉或少許煎至伍分食後服

大連翹或治小兒上焦壅熱口舌生瘡小便赤澁

連翹 瞿麥穗 滑石 牛旁子炒研

車前子 赤芍藥各壹兩 木通 山梔子炒

川當歸 防風各半兩 黃芩 荆芥穗各壹兩

柴胡去芦 甘草各兩 蟬蛻去足

右剉散每服伍錢水壹鍾煎至伍分食後服

通散治小兒小疳濕熱毒牙于留熱於膠膜故生陰瘡

木通去皮

蒲蓄去梗各五斤

大黃

赤茯苓去皮

甘草各二錢

瞿麥去梗

滑石末

山梔仁

車前子

黃芩各二錢

右剉碎每服伍錢水壹鍾煎十根煎伍葉煎至五分

前服

治小兒陰囊生瘡疼痛水出久不瘥

臍茶

五倍子各五錢

膩粉少許

先用葱椒湯洗然後用香油調貼

長生瘡疼痛

柳枝煎湯洗後

新刊仁齋直指小兒附遺

# 瘡

瘡疹方論

疹大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼

寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有

傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得

者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為竄眼禁牙驚搐如風之證

或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀瘡從口腹中出故扁或為煩燥

狂亂昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多

端卒未易辨方論所載以耳冷翕冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽

腎臟無盜耳與翕足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間

中或否不若視其耳後有紅脈亦纒為真於此可以稽驗矣

護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中

女表而已如欲解肌（藥言）可也其或小兒無實須燥執  
大便秘結則與（犀角地黃湯）人參敗毒散（葷或）葷草（葷草）多服亦  
能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出比熱不可  
過但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與  
為當虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權變借  
和而言亦如痲人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟妄汗則燥熱既  
開轉增瘡爛如苟妄下則正氣內脫變而歸腎身軀振寒而  
反熱眼合吐脹其瘡黑壞十無一生 舌黑者尤難療何者瘡隨  
證未發則五臟之證悉具已發則歸於

藏水疔

淡出如水小而色青

肺臟

其涕稠

烏青

瘡疹屬湯本無

之下後身

余知其脾強者士

代之瀉後溫脾則

各半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫

必已泄之腎水平此錢氏不刊之秘旨也

治之有方猶有幸而生者至於調衛之際乳母不

於小兒或嗜乳不時使之飢虛或衣被不週致傷司

有觸外邪有忤則亦水硬變壞而歸於腎

各即能調衛者以溫散湯劑釀乳蔭之謹護風寒使之

和適其於粥餌則勿令飽而氣貫飢而內虛斯得矣此尤在

家垂意焉

瘡疹備論

瘡疹之論秦漢以來其詳可得聞也其有昔人  
嬰孩湯散當先和節陰陽調治榮衛方利臟腑即熱  
重及張漁初虞世栖真子諸醫認贅為癩每日瘡疹  
利之以宣其毒又曰已出者不可疎利瘡出已  
或焉蓋嘗深索古書之意見其諄復寺重  
必以和陰陽調榮衛先之則知古人所謂  
而非勇决峻下者此也如曰已患之  
能調湯藥以和臟腑遂傳敗熱於其背  
小便不過調劑以和之而已如曰已出

夜熱以防熱毒攻眼  
似是非用  
正錢氏



有之汗下二說古人所深戒也調劑  
氣安表和中輕清消毒溫涼之劑二者  
皆木香輩涼如前胡  
身熱證似傷寒但未經瘡豆疑似未明且先與  
出則少與化毒湯出不快者加味四聖散  
犀角地黄湯小便赤澀者大連翹湯甘露飲  
便秘結內煩外熱者小柴胡湯或



喉痛者大如聖湯黃芩子湯喘滿氣壅者葶黃散

育者渴設枯梗湯二陳加枳殼湯煩渴者甘草乾薑湯小兒乳陷入者加味四聖散更以胡安酒薄傳

逆者不查理中湯甘草乾薑湯幼兒泄利樹皮木汁

其衣服併以厚綿蓋之若猶未也獨聖散

或不用酒則木香煎湯若其瘡主之然而瘡疹用藥固有權度大

自調所下黃黑則毒氣已減不大小二腑一或閉焉則腸胃

閉聲啞肌肉穢然生瘡已瘥而後

反而毒物以

法塞猶可扶亦強酒麩助虛

和少許以解之猶可措

閉耳目口鼻腫滿悉平大便取積之劑則臟氣暴脫熱又不除邪

血離爛破裂而死矣吁自詒伊阻如是其再發者特間有之瘡皮厚而色頑濁者發

面色精明者發於腑其候輕臟熱則為豆瘡腑熱重者瘡亦重熱輕者瘡亦輕平復以還消解餘

魚飲革常頂與之否則敗熱留

呵者再發或癢黑而不變酒更飼之以毒必

初眼翳之串瘡爛成片者黃牛黃散

末傳之瘡遍口中痛不能食者五福化毒

黃連取汁啖之為愈凡瘡欲成痂類以面脂

搽搨血出無害若乾硬已久必成癩痕如茶

人屬妄與食之則已脫之迹必為之黯慘

猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也

口所不可無或蒼朮降真用之亦不瘡曰

去泡而乾又七日則平復如舊

膏均平冷熱則瘡出為甚易若實實

調解之法無以喻

眼睛

其身上

治法

虛泄瀉二日外傷風冷三日

又因臟腑虛怯其證已逆初發以來

以致泄下凡此者其瘡不發

微黃如水泡之狀治之當用參苓白朮散

與止瀉然後以溫和之劑發之外傷風冷者或因

頭露面點點方萌遽為風冷所折或瘡出如珠妄

行快而風冷襲之凡此者輕則其狀如螫色紅而不

則陷如石巨脚色白而冰凝治之當溫血散寒邪用

氣散加川芎若惡寒畏人更加官桂茶蘇然後與發

內虛泄瀉或外傷風冷在再經日四月氣虧損由是而

令耳熱反執其瘡青紫變黑此則腎證曉然矣蓋腎  
是以其色黑其證逆治法先瀉膀胱之府而後急與瀉  
倉不黑則斷非腎證謹不可下請詳審之。瀉膀胱法

**大散**等分為末每服一錢棗湯調下以用  
及煎服若瀉下惡物急以**溫脾湯**劑繼之  
所傷亦令變壞可用醋炭**蘇合香圓**解之

論升麻膏根湯

**根湯**按和劑方瘡豆已發未

問小兒虛實冷熱自首至尾率

皮陷亦以

小兒氣  
寧不虧

發者方

心曠

用**升麻**哉若不辨明始恐世

牙大熱大毒或者相背變陷不

又有甚於

壓

治法則當解散寒邪片

兒服之鬱悶聲啞迨其發出稠膿

**小兒** **瘡** **疹** **惡** **證** **華** **為** **愈** **哉**

瘡疹惡證

屬陽春夏為順秋冬為逆冬月寒盛腎水得時

如瘡後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治。春

木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為

血逆。舌黑或鼻有黑氣並不治。瘡已出而謔語者

燥渴小便澀泄瀉不入食不治。瘡成餅搭黯慘

焦燥不治。兩眼閉而黑睛蒙昧無魂不治。面腫

頭面腫大瘡盡爪牙臭不可近  
膝並不治。瘡小黒而焦風攻頤頤頤項腫硬或旬日  
治

諸病但見两眼無精光黑暗  
轉目睫無睛  
之狀箇箇不治或神藏於內但外若昏困者  
眼中之  
不脫者猶可以活眼者五臟六腑  
神氣已  
瘡疹證治  
州眼藥

參蘇飲

明去苗 人參 去苦 也

斗 友 易 洗 米 次 薑 汁 製 炒

陳皮 甘草 炙

右咬咀每服肆錢

服不拘時

治小兒風熱

白茯苓 去皮 細

參 去 苗 炙 甘草 炙

服薑棗水小兒無薄帶

而服不拘時

升麻湯

方見瀉瀉類

治大人小兒瘡疹已發及

已發以此消毒

此草茸 半兩 川升麻

甘草 炙 各 貳 錢 半

煎散每服貳錢糯米伍拾粒同煎服

方見頭風門 加 散 未 治 小 兒 疹 豆 或 發 透

青暴吼是為風邪所傷用此主之疹豆證以耳冷  
以及耳後有紅縷驗之然須見心曾聞細點如粟起

如朱砂聖散 治瘡豆出不快及變陷者

紫草茸

木通

陳木香

黃耆微炒

川芎

甘草等分

右籠末煎壹錢不時服大便秘加**枳殼**少許大便如

**學**

紫草一兩

細百沸湯大碗沃之蓋定勿

大便發出亦輕

紫草一分

陳皮半分

右籠末新及水煎服

**紫草不食湯**

不快大便

紫草

木香

白木等分

甘草炒少許

右入糯米煎蓋**紫草**能利大便

**紫草木通湯**治瘡

山不快

紫草

人參

糯米等分

散煎貳錢溫服內虛大便

**快藥散**治瘡豆出不快

紫草

蟬殼

人參

木通一錢

甘草半錢

煎散煎貳錢溫服

治瘡疹最妙

瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

**地黃湯**治瘡出得大盛以此解之方見聲音門

治瘡疹壯熱小便不通

瞿麥

刺芥

木通

車前子

赤芍藥

蟬殼

柴胡

滑石

黃芩各半錢

山梔仁

黃芩各半錢

散母服壹錢加紫草煎溫服

方見眼目門治小兒疹

面兩目皆腫連日風搖奮身硬

紫草調服

方見積熱門

五苓散方見水

小柴胡湯

方見寒類

四順清涼飲方

鼠尾子湯

麻黃黃芩湯

甘草散

瘡豆熱渴

粉草微炙

右為末煎服

烏海湯

小黑豆

菘豆各一合烏海

右咬咀新汲水壹碗煎取清汁旋

木香理中

即和劑理中加木香甘草煎當湯方

獨聖散

方在前請安酒或用酒煎或用熱酒澆

山甲湯洗淨炒令焦黃

末每服半錢入麝少許楠木香

少許調下

一箇

陳皮

甘草各一分黑

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

甘露飲

五福化毒丹

方見和劑方

加味宣風散

治腎溢瘡且麥黑即宣風散

後以和胃藥加陳米與之良久糞黃瘡自微出又

得其身即得發起

治瘡豆巴發或為風冷所折榮衛不和

邊以致水硬並主之

半夏製 川芎 木通 桔梗 陳皮 草炒 紫蘇 等分 人參

右對散每錢薑棗煎服

不換金口氣散 方見寒類

黃栢膏 治初起以此防眼

黃栢 右為末麻油調為膏薄塗之

亦可若用 尤先謹

宜熱毒攻眼

豆皮散 治斑瘡入眼生翳

白菊花 新葷豆皮 真

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔

柿乾日兩枚

世濟散 斑瘡翳眼

桑螵蛸 壹分炙焦研

末入 少許每服壹錢米泔

昏翳風痒方

杏仁 叁伍柴槿水侵去皮尖

和津液吞五更端坐常服 杏仁潤肝

生鱈魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈

小兒方一二歲 此止

古之疾夾和以柳枝頰攪令如蜜每服三四次  
分肆服大小便利身體熱退即不成瘡

則不可服也

燕麻油摩其背脊中間亦驗

准藥服藥法

藥以銀盞約水半盞藥多

以銀盞下服藥未盡旋旋與之藥性

乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

宗小兒眼中神法

凡小兒病者皆由氣而太衝有味

甲未至黧黑者皆由氣而太衝有味

望而知之當先以日中神氣

原痘論

魏氏曰痘者豆也象其形而名

以見前人命名之義有在矣蓋痘

於淫火之後男女交媾無欲不行無

熾精行血就何莫而非火之所為且

臟腑皮毛筋骨之形夫形既成而火即

人可得而測耶毒中必發特俟其時

如金雜銅須藉火之煅煉斯其司

載使氣不盛則何能逐其毒

載之功不前又惡乎哉

稀稠乃受火有淺深其吉凶生

心天行時氣擊動而發者何也天地之沍氣與

而一橐籥相感而動如水流濕火就燥雲從龍風

而及人之真氣與客氣不容並立故也予嘗感其刻

痘疹



天之設非火之罪誠父母之責也明者鑒之

看耳後紅筋點歌

筋痘必輕

紫筋次不定惶惶

急首

克三五生

戒燒香烟避穢

之際有寺俗會用雜香柴燻

難以當之小兒焉能受也

戒之只可以醫微微燒之

則無之脾土也

失於禁戒輕則變逆

生人往來

穢氣相觸

犯房室

水房內多燻

對梳頭

對

乳食過節

食蜜

食紅柿

禁忌法

常和暖

節飲食

調理得宜

勿煎炒炙燻

勿對面荒語

僧道師巫入房

相見行淨蓋等

多故反被厭

戒之

勿用少等

水者故不淨者也

新磚三塊燒熱常用

小兒麻痘脉訣

五疳稍頭冷

驚來不可當

若逢

自冷

麻痘謚相傳

男

察形

成負者氣之形也天之象也

血

氣之制毒得其官矣附氣而成暈者血

氣從血會則暈必光明以見血之制毒得其

氣和血就並行祛毒斯其邪正自分痘可不治而自

者亂而順者逆內力不王將見毒肆攻剝瘁塌到陷

痘疹

痘疹

治者當察其肌表不使以毒入內  
不使員羣之形脫去雖力有援天下之溺者亦血  
驗色

行之精華也正則光而明衰則慘而  
天故痘毒之出於臟惟利乎

暗者氣血衰也氣位王

氣則毒不收氣非血則

可終始其功且夫色之

毒將解也者毒盡解也

而血乾也者氣血枯也如

變者死之兆也且毒出於五臟而

臟各主其色其

所謂變歸腎之說果何謂

治法但用辛熱解毒發洩之

呼痘果可以如此一例治之哉

惡治必固真氣以勝其毒斯為可

有顛沛之理歟

稀稠

淫火者毒受淺深痘之稀稠可見

勝其氣血雖不治其邪自解間有氣血

所治毒藥所傷者亦有可死之理焉

毒友勝火動生風鼓舞氣

不順榮衛為之不調

可得而療乎間有氣血勝於毒出

加大加連進數服防其陷搶

之為醫者不此之悟也噫

痘疹當分輕重治之

病深藥淺不能去病病淺藥深真受

痘疹

輕○外○裏○赤○者微重○外○裏○裏○大重○  
汗出不止煩燥熱渴驚悸腹脹大小便閉者困也○

者劇○又有風邪搏于皮膚熱不得泄瘡變  
名輕○內先蘊熱外被風邪瘀血則赤  
竅皆有瘡用藥之法輕者宜勻

非毒散則輕也重者利小便  
他謔言妄語宜硃砂參苓之

瀉宜防風寇活天麻全歌南星之類

腫大便秘宜枳殼散瀉通山支地等

水嗽鼻乾宜桑白皮馬兜鈴等

入者急用豬膏活血散○惟傷風

治痘三法

七之三

險者則可以治之治則轉色就

魏氏三法圖式

初出乃陰陽交會之際不得其一

血而治之凡圈內白者屬氣也圈

陷也圈外散血不附也圈內黑者

內外黑者氣瘡血俱衰也

附痘圖式

氣厚血少者生

一二日初出之

順○切出血點三兩點淡紅頰  
淡紅潤色得其正血得

形如蚕種○于天庭司空太明  
也逆者不治為氣滯血滯致毒

圖

險

圓暈成形勢也○雖稠而紅潤澤成箇者險之兆也  
乾紅少潤土其氣血未固憂重象未可加治矣

毒發陽位者死

後以保元

痘疹

陰得道而形圓

### 圓

順。

氣溢血附  
飽滿光潔

二三日根窠圓混氣之中滿也氣之中順者不治自愈為氣血得其道也



氣失血散  
枯死不榮

根窠無量氣離血散為逆逆者氣乘拔而犯內也

險。

頂陷不滿  
光潔有神

根窠雖員而頂其血也以保

血衣功而毒化

形圓而體天象

四五日觀炬執勢之形

### 形

順。

氣滿血榮  
鮮明光澤

治法之大要也其也順者自愈為

### 色

逆。

綿密如泡  
里裏皆紅

其形綿密如泡為氣血相離

### 圖

險。

根穿刺起  
色慘不明

其形根窠雖其氣弱血盛勢

色潤而現清華

如方經程

### 起

順。

氣會血附  
紅活鮮明

五六日氣盛血榮於內則愈為氣血豐厚毒受

### 發

逆。

氣皆血附  
乾而綿密

為氣弱血衰毒受

### 圖

險。

氣陷血榮  
色昏紅紫

弱不及歸附用位以全中和之道

根。

氣化聚行  
光潔飽滿

五六日氣盈血



聚毒不行  
神去色枯

為氣血相離不能

### 圖

險。

氣血少足  
光潤有神

為氣血少寒不

痘疹

成聚而收齊

宜新收而毒益

### 漿

順

○氣足血微七八日氣旺血附神全光潤愈為氣旺拘血什

○氣陷不滿○氣血乖離其毒色枯乾紫不能振作以制其毒

○其氣血少緩○氣弱血附光潤不枯氣血有礙不能

可以保全生命

血類天和而保命

### 漿

順

○氣壯血化八九日漿足氣毒始去身定矣如無他

○漿不足者氣血

### 漿

逆

○氣平少冲○漿不冲滿

○漿不冲滿

○漿不冲滿

### 漿

逆

○漿不冲滿

### 漿

逆

○漿不冲滿

### 漿

逆

○漿不冲滿

○漿不冲滿

### 漿

逆

○漿不冲滿

○漿不冲滿

### 漿

逆

○漿不冲滿

瘋疹

全而毒

之患故也

此書蓋感風寒而起

順  氣血無恙十四五六日  
痲落藏明。痲未易落

◎ 氣血兩虧之路迷之兆也  
天年盡矣 痲落潮熱唇紅目

後 ◎ 氣血功收 如陳皮 山查  
神化少全 香飲 去黃 合子

○ 氣血偏勝受傷圖

痘之初發陰陽交會不得其一則諸患

毒其至滅亡得其生者百有一

後為陷為泡為膿為疔為痒塌

治有因毒勝而 痊難於知識瘡

裡受傷之初又非氣血能勝其所勝而

圖式開陳于後尚冀治是者當加慎密

氣弱毒滯而成

# 頂陷圖

陽虛陰實

◎ 之氣 性 好下陷也

七日前後五陷者氣不  
不能成漿蓋氣不勝  
保元湯如厚桂類

血不榮加歸身  
有起勢者亦

該或血如死灰

血附流行而順道 證者生命不可保矣

死後成功

七日前後倒陷者

內外俱虛 附鮮明護衛

之象氣血 亦不挾毒內攻

勢離故前 湯加木肉

而復陷也 發泄毒劑致

用予保元湯

# 圖

痘疹

此書蓋感風寒而起

(陽)

外實內虛  
陽之象也  
故性外旺

七日前陽毒  
必虛毒受  
陽瘡陰毒  
為氣血俱  
俱弱毒與  
如枯轉潤紅

# 圖毒臃

功收禪補之後  
毒聚於已發之未發



七日後發瘡者  
也蓋氣血不能拘收  
馬血則載毒注四肢合  
也毒不成漿  
而出也若治  
之理如疔毒  
湯加詳詳湯主之為妙

# 圖毒疔

氣有全道之功

中實外虛  
陰之也  
故性犯內

毒無立身之地  
起風寒不測之端

九日後發疔者  
蓋氣位弱而血  
成其形如氣  
四肢或小或  
頭面腹背遍  
穿者急治治不  
亦助氣

臃形凶象也

七日  
陽二分  
能載毒藏  
是其驗也如此  
出之時或有  
痛謹防此  
縱毒而

天地有生之

**保元湯** 加減總要

夫痘泄玄中消息醫崇心上下

彌縫造化起萬命於迷

血內**白朮**和中實表宜用

之道體後一味扶一命之

內以壯神**豆蔻**非世利

歸能活動其血對證方加**白朮**能收斂

始議**白朮****茯苓**瀉止即止心煩熱

**皮**解濕痰**黃連**退虛熱毒凝滯而

通**山查**莫缺加之得當君子登

治於尺寸不可縱步於毫釐毒

劑屢試屢驗能收百中之功原吉原

之旨闡當世之幽生悟行思少整其年小

氏大成匪我能之實天假也

**保元湯**

人參 二錢

黃芪 三錢

右用水一鍾半**生薑**一片煎至五八

論曰

**保元湯**即東垣所製**普濟湯**見前

不越**人參****黃芪****白朮**而已然此藥大抵

能瀉火故虛火非此不去也三味之劑

**黃芪**為臣**白朮**為佐上下相濟治雖呈

妙數予嘗計其藥性之力

善究其痘之宜治必須此

不善惡之可否減削而

今用以治痘令其

劫而附氣血無恙斯一身之真元可以保

亂矣區區痘毒

出之

合煎

外護扶陽助



回生之功有轉危就

魚罪焉或元氣血與毒本同一途何專理

偏之故惟痘之一證與他證不同痘出陰分

能載毒使血一弱則何能有為而毒

不知氣者又所以領載其血也若

常法也又曰血弱不能載毒奈何曰毒

貨若無敗何以能負載耶可見血虛則

血虛非倉卒可補故付之無可奈何又不

壅其胎必落落則血去氣陷毒復

血虛之驗或曰

曰苓木雖益氣而性皆利燥淡泄通利

津液隨水而下其濕潤生息之氣不行

氣不降尚何有天澤以救其物哉由是

之藥毒氣為之不行毒遺皮肉間外

曰辛物也痘已出熱之極矣今更

曰是知雖辛而不知辛能發散且如

之處苟非此劑推動其毒而毒

氣充達周軀翊助之力而

元氣者何也辟之用兵惟求主將

糧草濟其武功若主將不能勝任則

糧草蟻聚如山將安施耶昔武侯未

敵國即已據營豈非尤可

川兵之要道也予愧淺識陋

敢僭立是書少濟窮

古方三日前後用

葛根 芍藥

故借改

途何專理

不同痘出陰分

能載毒使血一弱則何能有為而毒

不知氣者又所以領載其血也若

常法也又曰血弱不能載毒奈何曰毒

貨若無敗何以能負載耶可見血虛則

血虛非倉卒可補故付之無可奈何又不

壅其胎必落落則血去氣陷毒復

血虛之驗或曰

曰苓木雖益氣而性皆利燥淡泄通利

津液隨水而下其濕潤生息之氣不行

氣不降尚何有天澤以救其物哉由是

之藥毒氣為之不行毒遺皮肉間外

曰辛物也痘已出熱之極矣今更

曰是知雖辛而不知辛能發散且如

之處苟非此劑推動其毒而毒

氣充達周軀翊助之力而

元氣者何也辟之用兵惟求主將

糧草濟其武功若主將不能勝任則

糧草蟻聚如山將安施耶昔武侯未

敵國即已據營豈非尤可

川兵之要道也予愧淺識陋

敢僭立是書少濟窮

古方三日前後用

葛根 芍藥

葛根 芍藥 煎至

中解湯

升

葛根

川芎

鍾半三錢三片煎至

飲古方七日前用

黃

當歸

芍

右用水一鍾煎至伍分

鮮毒湯古方十四日前後用

荆芥

甘草

右用姜一片水一鍾半煎至

大連翹飲古方十四日後用

連翹

當歸

芍

防風

荆芥

木通

瞿麥

蟬蛻

梔子

黃芩

柴胡

甘草

右用水一鍾半姜一片煎至伍分

蘇飲見前十四日前後服

四君子湯古方不物日例

人參

白朮

右煎法同前

生脈散古方不物日例

人參

五味子

麥門

右煎湯當茶與服止煩渴

古方不物日例

右煎

參苓

人

同前

水瀉

米

茯苓

細

水一鍾煎至四分不物時

治痘瘡不收

白螺螄殼

不拘多少古醬上煎

右用去

凍紅取出存性為

為如

金華散專治痘證

黃丹

黃栢

大黃

輕粉

右為極細末瘡濕

生肌散專治疔蝕不

地骨皮

黃連炒

五倍子

黃栢

右為細末乾糝瘡上

已上諸品名方乃前人所製

以收圖治非常之効是以

開濟之能故用之於保元之前

平之能故用之於保元之後

木散四六湯有贊相之能故惟用之

多克濟之患但不能獨用

陰陽虧盈之變是故治痘用

出之後當塞走世之

盡補宜疎如此者不得

疊見諸書似不合

紫草膏

痘疹

紫草

全蝎

僵蚕

右為不用蜜壹兩酒半盞入

紫草煎

治瘡疽兼北藥治

瘡疽出不快如瘡初證似

之皆有主治不至敗事醫家常著

猪尾膏

冰片

硃砂 壹錢 牛黃

末用活者尾滴血為丸

木香散

木香

大腹皮

人參去

赤茯苓 去粗皮

青皮 去穢

前胡 去葉

丁香

甘草 各半錢

右每服水一大鍾生薑二片同煎空心

異功散

木香

當歸 各壹錢

官桂

白木 各壹

人參

丁香

陳皮

右每服水壹大鍾半

歲作三次服伍歲二次服一週兩歲

因痘瘡身體肢節上有音

不拘多少以生白

汁及出方取研

麥湯散 治水

地母

人參

痘疹



