北京大学古籍保护中心

醫燈續焰目錄

卷之十七

奇經八脉脉證第七十九

羌活勝濕湯 見第六十五　生鐵落飲

瀉青丸 見第四十九　丁香楝實丸 見第六十四

三因散聚湯　三因化氣湯

蘇子降氣湯 見第七十七　黑錫丹 見第七十

震靈丹　金匱桂枝龍骨牡蠣湯

四十五東垣柴胡升陽湯
和劑威喜丸　本事枳實散
東垣退熱湯　四七湯 見第十七
奇効拈痛丸　交加散
胃風湯　加味逍遥散 見第五十一
海藏愈風湯
十全大補湯 見第十六
反關脉第八十
真藏脉第八十一

卷之十八 補遺

嘈雜
三聖丸　越鞠丸 見第四十一
二陳湯 見第十六　丹溪導飲丸
烏梅圓 見第六十三　酒煮黃連丸 見五十五
呑酸吐酸
藿香安胃散 見第二十　加減二陳湯
三因鞠术丸

二陳加茱連神麯蒼术方

酒煮黃連丸 見第五十五

噎膈

生薑半夏湯

統旨香砂寬中湯

和劑五膈寬中散

和劑穀神嘉禾散

統旨補氣運脾湯

代抵當丸 見第二十

自汗

當歸補血丸

得効玉屏風散

保元湯

桂枝湯 見第十九

黃耆建中湯 見三十三

盜汗

當歸六黃湯

大建中湯

悸怔忡

導痰湯 見第四十一

溫膽湯 見第二十

茯苓甘艸湯

薑术湯

補中益氣湯 見三十九

四君子湯 見第一六

六君子湯 見第十六　小建中湯 見第二十二
黄耆建中湯 見二十二　四物湯 見第二十一
朱雀丸 見第五十一　當歸補血湯 見第十六
經驗定心丹　炙甘草湯 見第三十三
健忘
歸脾湯 見第五十八　讀書丸
朱雀丸 見第五十一　二參丸
開心散　壽星丸 見第五十
導痰湯 見第四十一　代抵當丸 見第二十
不寐
八珍湯 見第十六　歸脾湯 見第五十八
仲景酸棗仁湯　温膽湯 見第二十
六君子湯 見第十六　内經半夏湯
導痰湯 見第四十一
呃
二陳湯 見第十六　温膽湯 見第二十

導痰湯 見第四十一　和劑枳實半夏湯
麴蘖枳术丸 見第二十　法製陳皮
法製檳榔　六君子湯 見第十六
四君子湯 見第十六　橘皮竹茹湯
理中湯 見第十七　潔古柿錢散
金匱腎氣丸 見第十六　良方參附湯

面

升麻胃風湯　升麻順氣湯
犀角升麻湯　補胃湯
茯苓桂枝五味甘艸湯
七白散　洗面藥
面上五色瘡方　面上豆痕斑點靨方
面上粉刺方　斗門方
指爪破面方　又方
平胃散　白防子散
祛風白芷散

目

易簡補肝散　本事菊花散
瀉青丸 見第四十九　局方湯泡散
湯泡散　分珠散
清凉散　二黃散
照水丸　千金磁硃丸
煮肝散　洗眼方
菊睛丸　駐景丸
枸杞子酒　地芝丸
定志丸
耳
清神散　磁石湯
益腎散　犀角飲子
鼻
通氣湯　防風散
单南星散　萆撥餅

瓜蔕散　　金夷散
鼻衄不止方
口脣
瀉白湯　　黄檗散
五福化毒丹 見七十八　　氷檗丸
舌
薄荷煎　　黑參丸
薏苡仁湯　　舌血舌腫舌出方
齒
清胃湯 見第四十九　　香鹽散
謝傳笑去散　　白蒺藜散
青白散　　齒縫出血方
齒肉壅出
鬚髮
天寶单方　　巨勝丸
早蓮膏　　地黄膏

筆峰雜興方

六淫方

陰淫上下厥逆中外寒慄

附子理中湯 見第十七 四逆湯 見第二十二

陽淫狂譫煩渴血泄浸淫

白虎湯 見第四十三 犀角地黃湯

風淫肢廢毛落漆習痿痤

寶鑑醉仙散 通天再造散

雨淫腹滿腫脹腸鳴濡瀉

平胃散 見第四十七 五苓散 見第十七

晦淫百合狐惑熱中藏燥

百合知母湯 滑石代赭湯

百合雞子湯 百合地黃湯

甘草瀉心湯 苦參湯

雄黃薰法 赤小豆當歸散

金匱甘麥大棗湯

明淫恍惚動悸錯妄失神
金匱桂枝去芍藥加龍骨牡蠣救逆湯
東垣朱砂安神丸 見第十九

卷之十九

望診
藏府部分
五官
診病新久
面部圖
藏府色見面部圖
肢節色見面部圖
統論色
面
目
鼻
血脉
毛髮
形體
死證
五藏絶證
詐病
聲診
聲
息
問診

人品起居　病證
嗜欲苦樂
附辯舌

醫燈續焰卷十七

錢塘後學潘　楫碩甫註
同邑社盟王佑賢聖龔評
門人張芪蘭畹如
姪　世韶夔司校
世韙子咸

奇經八脉脉證第七十九

奇經八脉。其診又別。直上直下。浮則爲督。牢則爲衝。

緊則任脉。寸左右彈。陽蹻可決。尺左右彈。陰蹻可別。
關左右彈。帶脉當訣。尺外斜上。至寸陰維。尺內斜上。
至寸陽維。督脉爲病。脊强癲癇。任脉爲病。七疝瘕堅。
衝脉爲病。逆氣裏急。帶主帶下。臍痛精失。陽維寒熱。
目眩僵仆。陰維心痛。胸脇刺築。陽蹻爲病。陰緩陽急。
陰蹻爲病。陽緩陰急。癲癇癡瘂。寒熱恍惚。八脉脉證。
各有所屬。

經絡爲識病之要奇經乃

奇經八脉者。在十二經脉之外。無藏府與之配偶。

十二經總持九爲至要今人於正經尚自憒憒況奇經乎潘子此註按部縷分無不條貫真生人司命者所當共寶也

故曰奇。夫藏府之脉。寸關尺有定位。左寸心小腸右寸肺大腸左關肝膽右關脾胃左尺腎膀胱右尺命門三焦浮中沉有定體。難經以三菽六菽九菽十二菽按之至骨分肺心脾肝腎弦鈎毛石有定形。春弦肝木夏鈎心火秋毛肺金冬石腎水此則另爲一脉。形狀固異。而隧道亦殊。病證不同。而診治自別。蓋督任衝三脉。皆起於胞中。一源而三派。督行於背。總督諸陽。任行於腹。總任諸陰。衝則後行於背。前行於腹。上行於頭。下行於足。以至谿谷肌肉。無處不到。誠十二經內外上

下之要衝也。故靈樞順逆肥瘦篇曰。衝脉者。五藏六府之海也。五藏六府皆禀焉。二脉直行上下。發源最中。故見於脉。亦皆直上直下也。直上直下者。即三部俱長透之義。若直上下而浮。則氣張揚。陽象也。故屬督。若直上下而緊。則勢斂束。陰象也。故屬任。若直上下而牢。則體堅實。有餘之象也。故屬衝。陽蹻陰蹻者。皆起於足跟。人身之超越蹻捷者。亦莫過於足跟。故曰蹻。一則爲足太陽之別。循外

踝上行。入風池。合於太陽。故名陽蹻。一則爲足少陰之別。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脉。故名陰蹻。寸以候陽。寸左右彈者。言在寸左右。皆有彈石搏手之勢。是陽矯脉也。尺以候陰。尺左右彈者。言在尺左右。皆有彈石搏手之勢。是陰蹻脉也。二經之起。以踝之內外分陰陽者。外踝屬太陽。而內踝屬少陰也。二經之脉。以尺寸分陰陽者。以陽蹻入風池。合太陽至頭。故以寸候之。陰蹻合少陰而不至

維持得力全在交會處

頭。故以尺候之也。帶脉者。圍身一周。不上不下。如束帶然。故彈搏之脉。唯見於左右中關耳。陽維陰維者。維持一身。陽維維陽。起於諸陽之會。陰維維陰。起於諸陰之交。夫人身經脉繁密。二脉能於陰交陽會處。加一紮縛。舉綱齊目。而陰陽斯得維持之力矣。其見於脉。自尺至寸。皆刺斜而上。陰則自外入內。陽則自內出外。蓋其經亦皆自下而起。陽自外踝。出肩至腦。陰自內踝。入腹至喉故也。此八

八脉之病虛補當用藥實宜瀉施於砭射

經之脉狀。病則見。不病則不見。難經二十八難曰。人脉隆盛。入於八脉而不環周。故十二經亦不能拘之。不能拘之者。謂十二經。不能拘此八脉在環周之內。然而八脉之元元。已寓於十二經中矣。故平和不病。則不見也。其脉曰浮。曰牢。曰緊。曰左右彈。曰斜上。雖皆各因其陰陽道路呈象。而脉狀則俱似有邪而實者。本難云。畜則砭射。良有以哉。其病督脉脊強癲癇者。蓋督脉起於少腹。以下骨中

央。女子入繫庭孔之端。絡陰器。繞纍。繞臀。至少陰。與太陽少陰合。入股內。貫脊。屬腎。與太陽起目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。循肩膊內。夾脊。抵腰中。入循膂。絡腎。（自目內眥上額下循膂絡腎皆合太陽而並行者也）其男子循莖下至纍。與女子等。其少腹直上者。貫腑中央。上貫心。入喉。上頤。環唇。上繫兩目之下中央。其脉之別。名曰長強。俠脊上項。散上頭。下當肩胛。左右別走太陽。入貫臀。二十八難亦曰。督脉者。起於下極之俞。並於脊裏。上至風府。入屬於腦。由是觀之。則督脉與太陽合行者十九。故邪客則脊強。以其貫脊也。督與太陽皆主表。而督爲諸陽之總。太陽爲諸陽之長。又曰巨陽。風邪從類傷陽。表必先受。故留則爲癲癇疾也。癲癇時發時止。或筋脉牽引。或項背反張。雖云風傷督脉。亦太陽主筋故耳。（宜羌活勝濕湯生鐵落飲瀉青丸之類）任脉爲病。七疝瘕堅者。蓋任脉總諸陰之會。其脉起於胞中。循腹裏。爲經

諸疝之有風名者總不離厥陰氣耳

絡之海。其浮而外者。循腹裏。上行於咽喉。別而絡唇口。難經亦云。起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。七疝者。在巢氏則曰厥疝。癥疝。寒疝。氣疝。盤疝。附疝。狼疝。張子和非之。另立七名。曰寒疝。水疝。筋疝。血疝。氣疝。狐疝。癲疝。而諸經所載。如素問四時刺逆從論所云。狐疝風。肺風疝。脾風疝。心風疝。腎風疝。肝風疝。骨空論所云。衝疝。脉解篇所云。癲疝。玉機真藏論所云。疝瘕。少腹寃熱而痛。出白。一名曰蠱。靈樞邪氣藏府病形篇所云。小腸病者。小腹痛。腰脊控睪而痛。時窘之後。此亦疝類也。名雖多種。總不能出於七疝之外。蓋七疝之發。必在前陰少腹之間。任脉所經之地。雖屬他經。未有不以任爲原者。瘕者。假也。氣聚則堅。氣散則平。亦似疝之時作時止。發則亦在任脉界分。多屬血凝經滯。女子之病也。宜東垣丁香楝實丸三因散聚湯化氣湯之類。衝脉爲病。逆氣裏急者。衝之與任。皆起胞中。上循背

婦人衝任有病經不調者不受孕能精心此

裏。爲經絡之海。亦名血海。其浮而外者。亦循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。强半與任脉同。素問骨空論曰。衝脉者。起於氣衝。並足少陰之經。俠臍上行。至胸中而散。二十八難則曰。起於氣衝。並足陽明之經。俠臍上行。至胸中而散。痿論亦曰。衝脉者。經脉之海。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。二論所並。雖有少陰陽明之不同。要知自臍至胸。與陽明則並於前。與少陰則並於後也。故與陽明皆得稱爲五藏六府之海。其氣不順。血不和則胸腹之氣。循經壅逆而裏急矣。宜蘇子降氣湯黑錫丹震靈丹之類

帶下人所易忽然此疾不除亦難受孕故越人亦爲帶下醫于邯鄲也

帶脉爲病帶下臍痛精失者。以帶脉起於季脇。廻身如帶。藏府十二經絡。皆過於此。若飲食不節。勞慾縱傷。致令濕熱下流。邪火內鬱。外或風入胞宮。邪凝臍腹。帶脉不任。與邪俱陷。或赤或白。如涕如膿。或青黃雜色。或濁黑異形。溢漏不時。淋瀝不淨。其兼證則腰腹痠疼。足膝痠軟。頭目暈眩。經脉參差。甚或寒

雖索隱鈎玄而字字皆出實理

熱往來。容顏枯瘁。然而發源於衝任脾胃者多。以衝爲血海。任總諸陰。脾胃司水穀故耳。是以骨空論曰。任脉爲病。女子帶下瘕聚。又痿論曰。衝脉與陽明合於宗筋之會。而陽明爲之長。皆屬於帶脉。帶脉起於季脇章門。前則當臍上。故又或爲臍痛。靈樞經別篇曰。腎足少陰。當十四椎。出屬帶脉。蓋腎主藏精。帶固腰脊。虛則一不能藏。一不能固。而精有自失者矣。宜金匱桂枝龍骨牡蠣湯和劑威喜丸之類

陽維爲病。寒熱目眩僵仆者。以陽維維絡一身之陽。陽主衛。主氣。主表。病則不能維陽。是陽無護持。而衛氣亦因之不固。故在表則生寒熱。其脉氣所發。別於金門。在足太陽外踝下以陽交爲郄。足少陽外踝上與手足太陽及蹻脉。會於臑俞。手太陽肩後與手足少陽會於天髎。手少陽缺盆上又會於肩井。足少陽肩上其在頭也。與足少陽會於陽白。足少陽眉上上於本神。及臨泣。俱在足少陽眉上上至正營。足少陽目窓上及腦空。足少陽枕骨下下至風池。足少陽顳顬後與

管子曰四維不張國乃滅亡人身陰陽無維亦猶是也

督脉會於風府。督脉後髮際 啞門。督脉風府後 觀此。則知本脉之維於頭目手足。頸項肩背諸陽。無一不到。其脉不榮。則不能維。在頭目無維。則眩。在頸項肩背無維。則僵。在手足無維。則仆矣。宜東垣柴胡升陽湯東垣退熱湯之類 陰維爲病。心痛。胸腹刺築者。以陰維維絡一身之陰。陰主榮。主裏。不能維陰。則陰無約束。而榮氣因之不和。故在裏則心痛。又榮主血。血合心。故心痛也。其脉氣所發。陰維之郄。名曰築賓。足少陰內踝上 與足太陰會於腹哀。足太陰乳下 大橫。足太陰腹哀下 又與足太陰會於府舍。足太陰少腹下 期門。足厥陰乳下 與任脉會於天突。任脉喉下 廉泉。任脉舌本下 觀此。則知本脉之維於胸腹諸陰。亦無一不到。其脉不榮。則不能維。在胸脇失所維。則動築而刺痛矣。宜本事枳實散奇効拈痛丸四七湯之類 陽蹻爲病。陰緩陽急。陰蹻爲病。陽緩陰急。及癲癇痿痙寒熱恍惚者。蓋二蹻之脉。同發一源。難經二十八難曰。陽蹻脉起於跟中。陰蹻脉亦起於跟中。不唯

足之舉止矯捷蹻脉爲之

同起於跟。而又同終於目。靈樞脉度篇曰。蹻脉者。少陰之別。起於然骨之下。上內踝之上。直上循陰股。入陰。上循胸裏。入缺盆。上出人迎之前。入頄。屬目內眥。合於太陽陽蹻而上行。氣并相還。則爲濡目。濡潤榮養於目又曰。男子數其陽。女子數其陰。當數者爲經。不當數者爲絡。觀此。則知二蹻之脉。雖以男女分陰陽。而實則迭爲經絡。是一本也。故其爲病。亦不似前六脉。逐經分屬。本文以癲癇痿痱。寒熱

也惟此經有二脉又迭爲經絡亦大奇矣

先以陰陽總揭于前而後條析甚得詮註之妙

恍惚。總系二經之下。以二經均可病此。證雖云四。而病機可分爲八。陰陽緩急之義。自是顯然。夫人之身。背爲陽。腹爲陰。開爲陽。闔爲陰。外爲陽。內爲陰。熱爲陽。寒爲陰。癲則目閉俛首。陰急而陽緩也。癇則目直僵仆。陽急而陰緩也。大惑論所謂衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則

陰蹻滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉。脉度篇亦云。蹻之陰脉榮其藏。陽脉榮其府。又云。內漑五藏。外濡腠理。又陰出陽。則交於足太陽。陽入陰。則交於足少陰。雖一爲太陽之別。一爲少陰之別。而實則隨衛氣相終始者。故衛氣之行晝。卽可徵二蹻之虛盛。痿者。挛也。筋脉挛向裏拘。陰急而陽緩也。瘈者。縱也。筋脉縱從外弛。陽急而陰緩也。寒則氣收斂。從裏從陰。陰急而陽緩也。熱則氣散漫。從表

八種脉證洞若琉璃內外明徹自陽虞以來無人道

從陽。陽急而陰緩也。恍者。目前恍然。若有所見。謬刺論曰。邪客於足陽蹻之脉。令人目痛。從內眥始。且合太陽上行而并濡於目。病屬目而從外。陽蹻之病。陽急而陰緩也。惚者。胸中悾惚。若有所失。脉度篇曰。蹻脉者。以陰之別。起於然骨之後。循陰股入陰。上循胸裏。入缺盆。二十八難曰。陰蹻脉者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脉。病屬胸腹而從內。陰蹻之病。陰急而陽緩也。二脉一爲經。

破一字搨思落筆疑有神助

一爲絡。病在經。則經急絡緩。病在絡。則經緩絡急。總之皆可言經。皆可言絡。但以男女分陰陽之所屬。緩急證病邪之所在。而正文以諸證爲二經所共。義良深矣。宜胃風湯交加散海藏愈風湯加味逍遥散十全大補湯之類

附方

羌活勝濕湯 見第六十五

生鐵落飲 治肝木有餘或大怒諸火上炎上盛下虛發爲癲狂神氣不寧渴煩譫妄

生鐵四十斤。入火燒赤淵。砧上鍛之。有花出如蘭如蛾。紛紛墜地者。是鐵落。用水二斗。煮取一斗。入後藥。

石膏 三兩　龍齒 研　白茯苓

防風 去蘆各一兩半　玄參　蔡苑 各一兩

右爲粗散。入鐵汁中。煮取五升。去滓。入竹瀝一升和匀。温服二合。無時。日五服。

瀉青丸 見第四十九

東垣丁香楝實丸見第六十四

三因散聚湯 治九氣積聚。狀如癥瘕。隨氣上下。發作心腹絞痛。或刺腰脇。小腹脹脹。大小便不利。

半夏湯洗七次　檳榔　當歸各七錢五分

陳皮去白　杏仁去皮尖麸炒　桂心各二兩

茯苓　炙甘艸　附子炮去皮臍

川芎　枳殼去穰麸炒　厚朴薑製

吳茱萸湯浸各一兩

每服四錢。水一盞。薑三片。煎七分。食前溫服。大便不利。加大黃。

三因化氣湯 治息積。

砂仁　桂心　木香各二錢五分

甘艸　茴香炒　丁香皮

青皮　陳皮　乾薑

蓬朮炮各半兩　胡椒　沉香各一錢

右爲細末。每服二錢。薑蘇鹽湯調下。婦人醋湯下。

蘇子降氣湯 見第七十

黑錫丹 見第七十

震靈丹 紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹 治男子真元衰憊。五勞七傷。臍腹冷疼。肢體酸痛。上盛下虛。頭目眩暈。心神恍惚。血氣衰微。及中風癱瘓。手足不遂。筋骨拘攣。腰膝沉重。容枯肌瘦。目暗耳聾口苦舌乾。飲食無味。心腎不足。精滑夢遺。膀胱疝墜。小腹淋瀝。夜多盜汗。久瀉久痢。嘔吐不食八風五痺。一切沉寒痼冷。服之如神。及治婦人血氣不足。崩漏虛損。帶下。久冷胎藏無子。

禹餘糧 火煅醋淬不計遍數手撚得碎爲度

紫石英

赤石脂

丁頭代赭石 如禹餘糧炮製各四兩

已上四味。並作小塊。入坩鍋內。鹽泥固濟。候乾。用炭十觔。煅通紅。火盡爲度。入地埋。出火毒二

宿。

滴乳香另研　五靈脂去砂石篩　沒藥去砂石研各二兩

朱砂水飛過一兩

右八味。並爲細末。以糯米粉煮糊爲丸。如雞豆大。晒乾出光。每一丸。空心温酒。或冷水任下。常服鎮心神。駐顏色。温脾胃。理腰臍。除尸痓蠱毒。辟鬼魅邪厲。久服輕身。漸入仙道。忌猪羊血。恐減藥力。婦人醋湯下。孕婦不可服。

金匱桂枝龍骨牡蠣湯　金匱要畧云。夫失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩髮落。脉極虛芤遲。清穀亡血。失精。脉得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白微附子各三分名二加龍骨湯

桂枝　芍藥　生薑各三兩

甘草二兩　大棗十二枚　龍骨

牡蠣各三兩

右七味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

和劑威喜丸　治丈夫元陽虛憊。精氣不固。餘瀝常流。小便濁。夢寐頻泄。及婦人血海久冷。白帶白漏。白淫。下部常濕。小便如米泔。或無子息。

黃蠟四兩　白茯苓去皮四兩作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓爲末。熔黃蠟搜爲丸。如彈子大。空心細嚼。滿口生津。徐徐嚥服。以小便清爲度。忌米醋。尤忌使性氣。只吃糟醋。

東垣柴胡升陽湯　治陽虛下陷。發熱。

柴胡　升麻　葛根　獨活　羌活各半兩　防風二錢半　甘艸生二錢炙二錢　人參　白芍藥各半兩

右㕮咀。每服半兩。水三大盞。煎一盞。去滓稍熱服。忌冷物氷水月餘。

東垣退熱湯　治表中虛熱。或遇夜則甚。

黄耆一錢　柴胡七分　生甘艸
黄連酒製　黄芩　芍藥
地骨皮　生地黄　蒼术各五分
當歸身　升麻各三分
右㕮咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓食遠温服。

本事枳實散　治男子兩脇疼痛。
枳實一兩　白芍藥炒　雀腦芎
人參各半兩

右細末。薑棗湯調二錢。酒亦得。食前日三服。
奇効拈痛丸　治九種心痛。
五靈脂　蓬莪术煨　木香
當歸各等分
右爲末。煉蜜和丸如桐子大。每服二十丸。食前
用橘皮煎湯下。

四七湯見第十七
胃風湯

白芷一錢二分　升麻二錢　葛根
蒼朮　蔓荊子　當歸身各一錢
柴胡　藁本
羌活　黃蘗　草豆蔻
麻黃不去節各五分
水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。溫服。
交加散　治痰癖。或顫振。或產後不省人事。口吐
痰涎。

當歸　荊芥
右爲細末。每服二錢。水一盞。酒少許。煎七分。灌
下神効。
海藏愈風丹一名舉卿古拜散　治一切失血。筋脉緊惡。
產後及汗後搐搦。
荊芥爲細末
先以炒大豆黃卷。以酒沃之。去黃卷。取清汁調
前末三五錢。和滓服之。輕者一服。重者二服。三

服卽止。氣虛者忌服。童便調亦得。

加味逍遙散 見第五十一

十全大補湯 見第十六

反關脉第八十

平人無脉。移於外絡。兄位弟乘。陽谿列缺。

平人無脉者。非無脉也。謂寸口脉不應指。而反從尺傍過肺之列缺。大腸之陽谿。刺斜出於外絡。其三部定位。九候淺深。俱與平常應見於寸口者無異。若兄固有之位。弟竊而乘之。此反常異衆之脉。千百中僅一見也。

此種脉須詳審勿認爲脉脫而驚訝也

真藏脉第八十一

病脉既明。吉凶當別。經脉之外。又有真脉。肝絶之脉。循刀責責。心絶之脉。轉豆躁疾。脾則雀啄。如屋之漏。如水之流。如盃之覆。肺絶如絶如毛。無根蕭索。麻子動揺。浮波之合。腎脉將絶。至如省客。來如彈石。去如解索。命脉將絶。蝦遊魚翔。至如湧泉。絶在膀胱。真脉既形。

胃氣已無。參察色證。斷之以臆。

已上正文之論脉。首先源派。次及流行。次則左右男女定位。次則五藏陰陽合時。寒熱。則屬之遲數內外。則別之浮沉。以至虛實異形。正邪各狀。因脉知病。因病識脉。病則該於瘡瘍女幼。脉則窮於奇經反關。可謂明且詳矣。然而諸脉之外。更有所謂真脉者。大關生死。故又審別於卷末焉。夫人稟五行而生。則五行原吾身之固有。外與天地通。內與穀神合。是得以默運潛行而不顯然彰露。設五藏之元真敗絕。穀神不將。則五行之死形。各隨藏而見矣。在肝如循刀責責。强勁弦急按之切手所謂輭弱輕虛而滑。端直以長者。無有也。在心如轉豆躁疾。前曲後居柔滑全無所謂累累如連珠。如循環玕者。無有也。在脾如雀啄粒。堅銳連屬如屋之漏。許久一滴二脉作疎作數如水之流。去而不返如杯之覆。止而不揚所謂和柔相離。如雞踐地者。無有也。在肺如毛。無根蕭索。上則微茫下則斷絕麻子動搖。

以平脉形病脉使人反按自明非善於詮解者不能也

微散而亂浮波之合。浮促無根所謂厭厭聶聶。如落榆莢者。無有也。在腎至如省客。省問之客一至即去來如彈石。彈搏而來所藏盡出去如解索。解散而去欲藏無入所謂喘喘累累如鈎。按之而堅者。無有也。在命門右腎。與左腎同。但內涵相火。故其絕也。如蝦之游。如魚之翔。忽爾靜中一躍。火欲絕而忽焰之象也。在膀胱。至如湧泉。泛濫不收以其藏津液而爲州都之官。故絕形如此。蓋脉之和柔得體者。胃氣與之俱耳。胃氣者。即生生水穀之氣也。胃氣微少。亦成病。何況於無。無則生生之根本先絕。而五藏欲自持久。不可得矣。若能再察色證而以臆斷之。理當不爽。

醫燈續焰卷十七 終

醫燈續焰卷十八 補遺

錢塘後學潘　楫碩甫補

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人　陳潘杲中旋
　　馮子異西平　校

正文病類多矣。考之方書。尚缺多種。皆屬常見之疾。何可竟無方治。今補入。

嘈雜

嘈雜一證。有火。有痰。有飲。有虫。雖云多種。而源則不離乎脾胃。膏粱之人。每多患此。其發也。如饑之欲食。甚則煩沸雜亂。與吞酸。吐酸。乾嘔。胃痛等疾。皆爲噎膈反胃之漸。宜三聖丸越鞠丸之類挾痰者烏梅導飲丸挾虫者烏梅圓酒煮黃連丸之類者二陳加梔連挾飲者丹溪

附方

三聖丸 治嘈雜神効

白术四兩 橘紅一兩 黃連炒五錢

右爲細末。神麯糊丸。如菉豆大。每服七八十丸。食遠津唾下。薑湯亦得。

越鞠丸 見第四十一

二陳湯 見第十六

丹溪導飲丸 治水飲嘈雜

吳茱萸三錢 白茯苓一兩 黃連五錢

蒼术炒一兩 獨活七錢

右爲細末。神麯糊丸服。

烏梅圓見第六十三

酒煮黃連丸見第五十五

吞酸吐酸

吞酸與吐酸。大同小異。吞酸酸在胸胃。忽作忽止。蚘胃刺心。吐酸酸水酸物。隨吐而出。味如醯醋。蚘喉輭齒。是皆形寒胃冷。食鬱飲停。穀氣不分。中焦鬱會。正猶釀酒不發。過時而成酸味也。吞吐之所以異者。吞則胃中飲少。吐則胃中飲多耳。間有屬火者。乃熱不得散。屬木者。乃氣不得伸。火不散者發之。木不伸者達之。故統宜溫中散寒。令鬱滯開而病自愈矣。宜發明藿香安胃散加減二陳湯三因鞠术丸二陳加萊連神麯蒼术方

酒煮黃連丸

附方

藿香安胃散見第二十

加減二陳湯 治痰飲爲患。嘔吐。頭眩。心悸。或因食生冷。脾胃不和。吞酸吐酸等證。

丁香一兩　半夏　陳皮各五兩

茯苓三兩　甘草一兩半

右㕮咀。每服四錢。水煎。入生薑三片煎服。

三因麴术丸　治中脘宿食留飲。酸蝕心痛。口吐清水。

神麯炒三兩　蒼术泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半

右爲末。生薑汁別煮神麯糊爲丸。薑湯送下。

二陳加茱連神麯蒼术方

陳皮一錢　白茯苓一錢　蒼术炒一錢二分

黃連吳茱萸汁炒一煮炒一錢　神麯錢

水二鍾。生薑一片。煎八分服。

酒煮黃連丸　見第五十五

噎膈

噎者。食入不利。或推塞而下。或負痛而納。其病在喉。膈者。食雖入膈。或氣逆。或滿悶。或隱痛。或得噯少寬。或得吐反快。其病在膈。二疾多並見。噎者必

膈。膈者必噎也。卽翻胃之先驅。積鬱沉憂。氣結不散。久久成此。張雞峰方論曰。此病不在外。不在內。不屬冷。不屬熱。不是實。不是虛。所以藥難取効。多緣憂思恚怒。動氣傷神。氣積於內。動則諸證見。氣靜疾平。手捫之而不得疾之所在。目視之而不知色之所因。耳聽之而不知音之所發。故鍼灸藥石。皆不獲効。乃神意間病也。肯哉言乎。宜生薑半夏湯香砂寬中散穀神嘉禾散統肯補氣運脾湯代抵當丸之類選用

附方

生薑半夏湯 止嘔吐。開胃消食。

半夏 生薑 各三錢

右㕮咀水二盞煎七分服

統肯香砂寬中湯 治氣滯。胸痞噎塞。或胃寒作痛。

木香 臨服時磨水入藥三四匙 白术 炒 香附 各一錢五分 白豆蔻 去殼

陳皮

砂仁去殼　青皮　檳榔
半夏麯　白茯苓各一錢　厚朴薑製一錢二分
甘艸三分

水二鍾。薑三片。煎八分。入蜜一匙。食前服。

和劑五膈寬中散　治七情四氣。傷于脾胃。以致陰陽不和。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。并治一切冷氣。

白豆蔻去皮二兩　甘艸五兩　木香三兩
厚朴去皮薑汁炒一斤　縮砂仁去殼　丁香
青皮去白　陳皮去白各四兩　香附子炒去毛十六兩

右爲細末。每服二錢。薑三片。鹽少許。不拘時。沸湯點服。

和劑穀神嘉禾散　治脾胃不和。胸膈痞悶。氣逆生痰。不進飲食。或五噎五膈。

白茯苓去皮　縮砂仁去皮　薏苡仁炒
枇杷葉去毛薑汁炙香　人參去蘆各一兩　白朮炒二兩

桑白皮炒　檳榔炒　白豆蔻炒去皮
青皮去白　穀蘖炒　五味子炒各半兩
沉香　杜仲去皮薑汁酒塗炙　丁香
藿香　隨風子　石斛酒和炒
半夏薑汁搗和作餅炙黃色　大腹子炒
木香各七錢半　甘艸炙二兩　陳皮去白
神麯炒各二錢半
每服三錢。水一盞。薑三片。棗二枚。煎七分。不拘時溫服。五噎。入乾柿一枚。膈氣吐逆。入雞白三寸。棗五枚。

統旨補氣運脾湯　治中氣不運。噎塞。
人參二錢　白术三錢　橘紅
茯苓各一錢五分　黃耆蜜炙一錢　砂仁去皮八分
甘艸四分炙　有痰加半夏麯一錢
水二鍾。薑一片。棗一枚。煎八分。食遠服。

代抵當丸　治瘀血噎膈。食下疼痛。方見第二十

自汗

自汗者。不因勞動。不因天暑。不因熱飲食。時時汗自出。故曰自汗也。乃衛氣虛而不能固密。心液因之漏泄。宜當歸補血湯倍黃耆玉屏風散保元湯黃耆建中湯之類若表中風邪者。亦能令衛腠空疎。而汗時自出。此邪去則汗止。宜桂枝湯

附方

當歸補血湯 見第十六

得効玉屏風散 治自汗。

防風 黃耆各一兩 白术炒二兩

每服三錢。水二盞。薑三片。煎六分。不拘時溫服。

保元湯 治自汗無休止。

黃耆蜜炙三錢 人參二錢 甘艸炙一錢

水二盞。煎七分。溫服。

黃耆建中湯 見第三十三

桂枝湯 見第十九

解盜汗之因無剩語

盜汗

盜汗者。睡中偷出。多發於夜。如盜之乘人不覺而夜出也。屬陰虛。蓋人之衛氣。晝行於陽。出外。夜行于陰。入內。入內則內熱。內熱。則不足之陰受其蒸。入內。則表虛。表虛。則蒸泄之液無從固。於是陰失其守。陽失其衛。而汗淋漓于睡夢間者有矣。宜當歸六黃湯 大建中湯之類

附方

當歸六黃湯 治盜汗久不愈。面白黃。肌瘦。或夜熱骨蒸。飲食減少。四肢無力。足膝酸疼。發無虛夜。服此神効。

當歸 生地黃 熟地黃 黃蘗 黃芩 黃連各一錢 黃耆二錢

右作一服。水二鍾。煎一鍾。臨卧服。

大建中湯 治虛熱盜汗。百節酸疼。肢體倦怠。日

漸羸弱。口苦舌澁。心怔短氣。

綿黃耆炙　遠志燈心煮去心　當歸酒洗

澤瀉各二錢　白芍藥　龍骨煅

人參各一錢五分　炙甘艸一錢

右作一服。水二鍾。薑五片。煎一鍾。食前服。氣弱。

加炮附子二錢。腰痛筋急。加官桂去皮一錢

悸怔忡

準繩云。悸即怔忡。今歷觀病狀。則二證少有分別。

悸則心中微動。如恐如驚。怔忡則心胸振築。莫知其來。忽爾寧寂。莫知其去。甚則頭目眩暈。神氣若浮。蓋悸之重者也。大抵因痰積飲停。氣衝火擊所致。宜導痰湯溫膽湯茯苓甘草湯薑朮湯之類亦有中氣虛而忡悸者。宜補中益氣湯四君子湯六君子湯小建中湯黃耆建中湯之類亦有心經氣血不足。火不定。神不安而忡悸者。宜四物湯朱雀丸當歸補血湯經驗定心丹之類有心液過耗。汗多亾陽。脉代而忡悸者。宜炙甘草湯

附方

導痰湯 見第四十一

温膽湯 見第二十

茯苓甘艸湯 治心下停水忪悸。

白茯苓去皮 桂枝各三錢 生薑半兩

甘草二錢

水二鍾。煎一鍾。不拘時服。

薑朮湯 治停飲怔忡。

白薑生 白朮 茯苓

半夏麴各一錢 辣桂 甘草各五分

水一鍾。薑三片。紅棗一枚。煎六分。不拘時服。

補中益氣湯 見第三十九

四君子湯 見第十六

六君子湯 見第十六

小建中湯 見第六十九

黃耆建中湯 見第三十三

四物湯見第二十一

朱雀丸見第五十一

當歸補血湯見第十六

經驗定心丹楫自製

茯神去皮木一兩　遠志酒浸輭去心五錢　人參去蘆八錢

沉香黑重沉水者三錢不見火　龍骨煆七錢

懷生地洗去土一兩半　當歸身酒洗一兩　白芍藥酒炒八錢

丹參去蘆一兩　桂枝去骨三錢　甘草炙二錢

荷蕸出水而未開者焙乾一個

爲極細末。煉蜜爲丸如菉豆大。用上好水飛過朱砂爲衣。每服二錢。食遠白湯下。午後勿服。此方驗過多人矣。

炙甘草湯見第三十三

健忘

道過之言。行過之事。久不記憶曰忘。若當下卽不能記。索之胸臆。了不可得者。健忘也。乃心虛腎憊。

水火不交。精血之府空。榮衛之道澁。致令機關不利。靈巧不闕。高年衰朽者。多得之。宜歸脾湯讀書丸朱雀丸二參丸開心散之類亦有痰血癖積。礙其機關而成者。此又不以年高論也。宜壽星丸導痰湯代抵當丸選用

附方

歸脾湯 見第五十八

讀書丸

石菖蒲 兎絲子酒煮 遠志酒浸去心各一兩

地骨皮去骨洗淨二兩 生地黃 五味子

川芎各一兩

右爲末。薄糊丸桐子大。每服七八十丸。臨卧白湯下。

朱雀丸 見第五十一

二參丸 治健忘。養神定志。和血安神。外華腠理。

天門冬去皮 熟地黃酒蒸搗 丹參各一兩半

白茯苓去皮 麥門冬去心 甘草各一兩

遠志酒浸去心　人參去蘆各半兩

右爲細末。煉蜜和丸如桐子大。以朱砂研極細。水飛過半兩。爲衣。每服五十丸。加至百丸。空心煎愈風湯送下。愈風湯係潔古方其方三十三味皆風藥繁雜之甚故不錄今只以自湯送之

開心散　治好忘。

石菖蒲一兩　白茯苓去皮二兩　遠志去皮　人參去蘆各二錢半

右爲細末。每服一錢。食後米飲調下。

壽星丸　治痰滯經絡多忘。方見第五十八

導痰湯見第四十一

代抵當丸　治瘀血喜忘。方見第二十

不寐

難經四十六難曰。老人寤而不寐。少壯寐而不寤者。何也。然經言少壯者。血氣盛。肌肉滑。氣道通。榮衛之行。不失其常。故晝日精。夜不寤。老人血氣衰。

肌肉不滑。榮衛之道澁。故晝日不能精。夜不寐也。

故知老人不得寐也。宜八珍湯歸脾湯之類 虛勞虛煩不得眠者。宜仲景酸棗仁湯 膽虛驚悸不寐者。宜溫膽湯六君子湯之類 痰飲停中。煩惑不合目者。宜內經半夏湯導痰湯之類

八珍湯 見第十六

歸脾湯 見第五十八

仲景酸棗仁湯 治虛勞虛煩不得眠。

酸棗仁二升 甘草一兩 知母 茯苓 茯神各二兩 深師有生薑二兩

右五味。以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥煮三升。分溫三服。

溫膽湯 見第二十

六君子湯 見第十六

內經半夏湯 治陰陽之氣偏勝。不相和諧。陽不得入陰。故不瞑不寐。服此陰陽通。卧可立至。黃帝所謂決讀壅塞。經絡大通。陰陽和得者也。亦

半夏轉樞見之內經信不誣矣

治痰氣阻塞。陽不入陰。成上證。大抵轉動樞機。則陰陽自諧矣。其湯方。以流水千里以外者八升。揚之萬遍。取其清五升煮之。炊以葦薪火。沸。置秫米一升。秫米北人謂之黃米可以釀酒治半夏五合。徐炊。令竭爲一升半。去其滓。飲汁一小杯。日三。稍益。以知爲度。故其病新發者。覆杯則卧。汗出則已。久者。三飲而已也。

導痰湯 見第四十四

呃

呃。卽噦也。有火。有痰飲有寒。有虫有食。有胃虛。有腎虛。種種不同。但虛寒者。十九。然必細察得之久暴。聲之遠近。形之盛衰。及病之所由起。則施治自多効也。蓋潛行默運。無聲無臭者。中氣之常也。若有所激。氣卽爲火。易其常性。卒暴上衝。仍欲其潛行默運。無臭無聲。安可得乎。至若痰飲停中。礙其清道。陰寒迫裏。遏其陽升。或蛔卒動而氣阻。或食

暴入而氣壅。或胃氣虛於上而氣不舒。或腎氣虛於下而氣不續。皆能撓挫運機。行不順利。而呃呃之聲。有自來矣。故因於火者。其聲頻以促。兼面赤而脉數。宜二陳湯加山梔黃連之類因於痰飲者。其聲緩勻。兼吞酸面澤而脉滑。宜二陳湯溫膽湯導痰湯之類因於陰寒者。其聲短。而聲扼扼不揚。兼面色青白。惡寒而脉緊。宜二陳湯加乾薑丁桂之類因於虫者。其聲或作或止。或緩或促。兼面色不一。胃中或痛。或吐清水冷涎。或心中嘈雜。脉遲數大小不定。宜二陳湯去甘草加吳茱萸製黃連乾薑細辛之類因於食者。其聲濁而類嘔。兼噯逆酸腐。惡食。面黃脉緊滑。宜和劑枳實半夏湯麴蘖枳朮丸法製陳皮法製檳榔之類因胃氣虛寒者。其聲促而無力。或得食少止。面青白。畏寒。脉緩弱無力。宜六君子湯四君子湯橘皮竹茹湯理中湯絜古柿錢散之類因腎氣虛寒者。其聲遠而長。或作或止。半刻一聲。臍下或動築。面黑。腰疼。或足冷惡寒。脉沉微。宜金匱腎氣丸良方參附湯之類

附方

二陳湯見第十六

温膽湯見第二十

導痰湯見第四十一

和劑枳實半夏湯

枳實麩炒　半夏各等分　加麥蘖炒

每服七錢。水二盞。薑五片。煎八分。温服無時。

麴蘖枳术丸見第二十

法製陳皮　消食化氣。寬利胸膈。美進飲食。

苗香炒　丼艸炙各二兩　青鹽炒一兩

乾生薑　烏梅肉各半兩　白檀香二錢半

右六味爲末。外以陳皮半斤。湯浸去白。淨四兩。切作細條子。用水一大盞。煎藥末三兩。同陳皮條子一處。慢火煮。候陳皮極軟。搦乾。少時。用乾藥末拌勻。焙乾。每服不拘多少。細嚼。温薑湯下。無時。

法製檳榔　治酒食過度。胸膈膨滿。口吐清水。一切積聚。

雞心檳榔一兩切作小塊　硇砂取仁

白豆蔻取仁　丁香切作細條　粉草切作細塊各一兩

陳皮去白切作細條　生薑切作細條各半斤　鹽二兩

右用河水二碗。浸一宿。次日用慢火。砂鍋內煮乾。焙乾。入新瓶收。每服一撮。細嚼酒下。或爲細末。湯調服亦可。

六君子湯見第十六

四君子湯見第十六

橘皮竹茹湯　治胃虛寒。嘔逆。或呃。

陳皮二升　竹茹二升　大棗三十枚

生薑半斤　甘草五兩　人參一兩

以水一斗。煮取三升。溫服一升。日五服。

理中湯見第十七

潔古枾錢散　治胃虛寒呃逆。

柿錢　丁香　人參各等分

右爲細末。水煎。食後服。

金匱腎氣丸見第十六

良方參附湯。治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼痛。呃逆不食。或汗多發痙等證。

人參一兩　附子炮五錢

右薑棗水煎。徐徐服。去人參。加黃耆。名耆附湯。

面

夫手足六陽之脉。皆上至頭。而面爲諸陽之會。胃足陽明之脉。又起於鼻之交頞中。故面獨能耐寒也。設反惡寒。及面寒者。胃寒。惡熱。及面熱者。胃熱面寒者。面多青白。面熱者。面多赤。面黃而斑駁者。胃中虫積。面黃而已食如饑者。胃疸。面腫者。胃風面瘡者。胃火。膏粱積熱。以胃脉起於面。故面病多屬胃。亦有面瘡之屬脾肺風熱。面塵之屬肝膽燥

熱。面黯黯之屬風濕痰飲。又不獨一陽明胃也。宜後方選對證者。主治之。

附方

升麻胃風湯 治胃風面腫。或麻木。牙緊目瞤。

升麻二錢 白芷 當歸 葛根 蒼朮各一錢 甘艸一錢 柴胡 藁本 羌活 黃檗 草豆蔻各三分 麻黃不去節五分 蔓荊子二分 薑一片。棗一枚。水二盞。煎七分。食後服。

升麻順氣湯 治憂思。飲食失節。面色黧黑。心懸氣促。

升麻一錢半 乾葛 防風 白芷 黃耆 人參各一錢 白芍藥六分 甘艸 蒼朮各五分 水二盞。薑一片。大棗一枚。煎七分。食遠溫服。

犀角升麻湯　治陽明經絡受風熱。口唇。頰車髮鬢腫痛。及鼻額間。連頭面痛。口不可開。雖能言語。有妨飲食。亦治面熱。

犀角七錢半　川升麻半兩　防風

黃芩各三錢半　香白芷　白附子

川芎各二錢半　羌活三錢一字　生甘草一錢半

右㕮咀。都作一服。水五盞。煎至三盞半。去滓。分作三服一日一服訖。其證必滅。如藏府有些溏不妨。足陽明。胃經也。經云。腸胃爲市。又云。陽明多血多氣。胃之中。腥羶五味。無所不納。如市廛無所不有也。六經之中。血氣俱多。腐熟飲食之毒。聚於胃。故此方以犀角爲主。升麻佐之入胃經。餘藥皆滌除風熱。用之有効也。

補胃湯　治胃虛脛寒。面目浮腫。亦治面寒。

柏子仁　防風　細辛

桂心　陳皮各一錢　川芎

吳茱萸　人參各一錢半　甘草五分

水二鍾。煎七分。食遠溫服。

茯苓桂枝五味子甘艸湯。加大黃。治欬逆倚息不得卧。面熱如醉。此爲胃熱上衝。熏其面故耳。

七白散　治面黚面垢。

白斂　白朮　白牽牛

白附子　白芷　白芍藥

白殭蠶各等分

爲末。每用五錢。煎湯洗之

洗面藥　治面生黚黯。或生小瘡。或生痱瘙。粉刺。皮膚瘙痒。面垢。

皂角三斤　升麻八兩　楮實子五兩

菉豆　白茯　白芷

天花粉各一兩　甘松　砂仁

白丁香各五錢　三奈三錢

右爲末。糯米飯搗丸。如彈子大。量用洗面。

面上五色瘡方

用鹽湯綿浸塌瘡上。日五六度

面上豆痕或斑點靨方

用蜜佗僧細末。夜以人乳汁敷。

面上粉刺方

用不語唾塗之。或搗兎絲子汁塗。或以白礬末少許。酒調塗。不語唾。恐是平且未言語先者。

斗門方　治黑點令面色好

白殭蠶　黑牽牛　北細辛各等分

爲粗末。作澡豆。又去小兒胎穢。

指瓜破面方

用生薑自然汁。調輕粉敷破處。無瘢瑕

又方

橄欖汁敷之。無痕

平胃散

面瘡。水調平胃散塗之。

白附子散　治面上熱瘡似癬。或生赤黑斑點。

白附子　蜜佗僧　白茯苓

白芷　定粉等分

右爲末。先用蘿蔔煎湯洗面淨。後用羊乳調。至夜敷患處。次早洗去。効。

祛風白芷散　治面上風癬瘡。

白芷三錢　黃連　黃檗

黃丹各二錢　茯苓一錢五分　輕粉一錢

右爲細末。用油調搽癬瘡上。或加孩兒茶二錢麝香二分亦可。

目

靈樞大惑論曰。五藏六府之精氣。皆上注于目而爲之精。精之窠爲眼。窠者窩也。聚精成窩搏結之義骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡大小背赤絡其窠氣之精爲白眼。肌肉之精爲約束裹撷。上下眼胞爲目約裹筋骨血氣之精而與脉并爲系。衆精并脉以系于目上屬於腦後。

出于項中。又曰。瞳子黑眼法于陰。白眼赤脉法于陽。故陰陽合轉而精明也。觀是論。則後人診眼疾而分五輪八廓者。葢本乎此。其所云氣輪者。金精之騰結也。卽經所謂窠氣之精爲白眼。白眼屬肺。肺主氣。故曰氣輪。肺在行爲金。金至堅。故白珠獨堅實。風輪者。木精之騰結也。卽經所謂筋之精爲黑眼。黑眼屬肝。肝主筋。在行爲木而應風。故曰風輪。風性動。故黑精左右不定而色帶青也。血輪者。

道徹目中底裡真瞳子之通家也

火精之騰結也。卽經所謂血之精爲絡。絡屬心。心主血。故曰血輪。心在行爲火。火有君相二種。故岐分于兩角。無正輪也。肉輪者。土精之騰結也。卽經所謂肌肉之精爲約束裹擷。屬脾。脾主肌肉。故曰肉輪。脾在行爲土。土包萬物。該四藏。四藏皆爲裹束。故開則動而萬用。閉則靜而萬寂矣。水輪者。水精之騰結也。卽經所謂骨之精爲瞳子。瞳子屬腎。腎主骨。在行爲水。故曰水輪。水爲天一之精。故獨

得居中。內有大絡六。以通心肺脾。肝。腎。命門。中絡六。以通膽。胃。大小腸。三焦。膀胱。外有小細之絡。莫知其數。其絡向明視之了了可數即禽獸異類皆有此也皆血貫於腦。下連藏府。通暢血氣。往來以滋於目。故凡病目。則有形色經絡顯見。而可驗。內之何藏何府受病。外有二竅。以通其氣。內涵諸液。出而爲淚。更有神膏。神水。神光。真氣。真精。皆滋目之源液也。神膏者。目內包涵膏液。破則黑稠水出。由膽中滲潤精汁積成。

涵養瞳神。衰則有損。神水者。由三焦發源。先天真一之氣所化。在目之內。不可得見。觸物損破。則見黑膏。形如稠痰。在目之外者。即目上潤澤之水也。水衰。則有火勝燥暴之患。水竭。則有目輪大小之疾。耗澁。則有昏眇之危。虧者多。盈者少。神光者。目自視之精華也。心火發源。膽火用事。夫神之于人也。亦大矣。不獨一視爲然。即行走執捉。言笑聽聞。無神宰率。則塊然一形而已。真血者。職藏在肝。升

叙眼之生成處如秋水出峽

以滋目。指五藏六府經絡之血。非肌腠散漫之血。故曰真也。真氣者。以經絡滋養。必先氣呴而後血濡。即發生真一之元氣也。真精者。即先後二天。真元化汁。根於腎。施於膽。以及瞳仁之精也。凡此數者。一有所損。則目病矣。大槩目形圓而長。外有堅殼數重。中含清脆。內包神膏。膏外神水。水外皆血。血以滋水。水以滋膏。膏內一點黑瑩。即是腎膽所聚之精華也。唯此一點。空明淨徹。燭照無窮。是曰水輪。然必三者具而後靈明全。三即膽汁。腎精。心神也。五輪足而外應溥。五即氣風血肉水也。合之渾然。分之井然。水爲體。火爲用。氣爲運動。神爲維持。妙合陰陽。光同日月。午前小。午後大。隨天地之盈虧。男左勝。女右勝。別陰陽之稟賦。至若剛柔壽夭。詐直智愚。皆能以目驗知。神哉實乎。更有八廓。其說以八卦八方。內配藏府。分別經絡。似亦有理。前五輪說中。已悉其義。今不更贅。唯錄八廓之名。

以備考證。一曰傳送廓。應乾卦。位居西北。絡通大腸而屬肺。二曰津液廓。應坎卦。位居正北。絡通膀胱而屬腎。三曰會陰廓。應艮卦。位居東北。絡通上焦而配屬命門。四曰清淨廓。應震卦。位居正東。絡通膽而屬肝。五曰養化廓。應巽卦。位居東南。絡通中焦而配屬肝絡。六曰胞陽廓。應離卦。位居正南。絡通小腸而屬心。七曰水穀廓。應坤卦。位居西南。絡通胃而屬脾。八曰關泉廓。應兌卦。位居正西。絡通下焦而配屬腎絡。以六配八。餘二無配。重肝絡腎絡配之者。葢目根源於腎。專竅於肝。故較他藏爲獨勝焉。已上五輪八廓之生成配合也。知此。則知內傷者。內動藏氣。災及五輪。外感者。不從藏變。外邪先襲於絡。由絡及廓。由廓及輪。故內傷見證。不腫不痛。痛亦不甚。或視物漸覺不明。或遇晚卽爲矇瞀。俗名雞盲亦名雀目或羞明畏日。或不能久視。遠視。或澁不欲開。或眼胞收小。或倒睫拳毛。或青翳白

只此數節能胸中領畧眼科專門却步倍矣

膜。或白珠黃色。黑睛藍色。或瞳仁散大。或緊小。或歛側。或兩背脂糊。或弦爛。或淚流。或視物以一爲二。以紅爲白。以正爲斜以曲爲直。種種由漸而成者。屬內傷。藏也。陰也。外感見證。則發如風火。癢痛不堪。或中如砂石。或外見瘡瘍。或脂淚不時。或星障卒起。或向天日如針刺。或近燈燭如火烘。或兼鼻塞齒疼。或兼身熱頭痛。種種卒暴而來者。屬外感。府也。陽也。是故病府者易愈。病藏者難瘳。藏則視其何藏何因。府則視其何邪何絡而後調之。散之。補之。瀉之。溫涼升降。在圖機者。自爲斟酌也。選方

附方

簡易補肝散　治肝虛目睛疼。冷淚不止。筋脉痛。及羞明怕日。

夏枯草五錢　香附子一兩

右爲末。每服一錢。臘茶調下。服無時。

本事菊花散　治肝腎風毒氣上衝。眼痛。

甘菊花　牛蒡子炒各八兩　防風三兩

白蒺藜去刺一兩　甘草一兩五錢

右爲細末。每服二錢。熟水調下。食後臨卧。

瀉青丸　治眼暴發赤腫疼痛。方見第四十九

局方湯泡散　治肝經風熱上壅。眼目赤澁。睛疼

多淚。

赤芍藥　當歸　黃連各等分

右爲末。每二錢湯頓調。熱洗。日三五次。御藥院

方。加荆芥。

湯泡散　治肝經風熱攻眼。赤腫羞明。漸生醫膜。

杏仁　防風　黃連去鬚

赤芍藥　當歸尾各半兩　銅青二錢

薄荷葉三錢

右剉散。每用二錢。極沸湯泡。乘熱先熏後洗。冷

則再煖用。日兩三次。一方入白鹽少許。閉目沃

洗。鹽亦散血。

分珠散　治眼患血灌瞳神。惡血不散。

槐花　白芷　地黃

梔子　荊芥　甘艸

黃芩　龍膽草　赤芍藥

當歸各一兩

右水煎服。春加大黃瀉肝。夏加黃連瀉心。秋加桑白皮瀉肺

清涼散　氷瑕深翳。

蔓荊子　荊芥　苦竹葉

甘艸各半兩　梔子二錢半

右薄荷水煎服。

二黃散　治努肉攀睛

黃芩　大黃　防風

薄荷各等分

右水煎。入蜜少許。食後服。

照水丸　治翳神驗。

海螵蛸　蛤粉南康真者各五分　片腦半分

黃蠟五分

右末先熔蠟攪微冷。入末和爲丸。如麻子大。帶

匾些。臨卧納眼中翳膜上。次日照水自落。

千金磁硃丸　治神水寬大漸散。昏如霧露中行。

漸覩空中有黑花。漸覩物成二體。久則光不收。

及內障。神水淡綠色。淡白色者。

此方效過亦得理

磁石吸針者　辰砂　神麯

先以磁石置巨火中煆。醋淬七次。晒乾。另研極

細。二兩。辰砂另研極細。一兩。生神麯末三兩。與

前藥和勻。更以神麯末一兩。水和作餅。煮浮爲

度。搜入前藥。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十丸

加至三十丸。空心飯湯下。按此方磁石法水。入神麯專入脾胃乃道家黃婆媒合嬰姹之理或加沉香半兩升降水火尤佳　腎朱砂法火入心而

煮肝散　治內外障翳眼。

右用猪肝二兩。拶開。以夜明砂末二錢七。摻在肝內。麻繩縛定。用水一盞。煮令肝轉色白。取出爛嚼。用煮肝湯送下。食後服。

洗眼方　治內外障。翳膜赤脉昏澁。

右以桑條。於二三月間採嫩者。曝乾。淨器內燒過。令火自滅。成白灰。細研。每用三錢。入磁器。或銀石器中。以沸湯泡。打轉候澄。傾清者入於別器內。更澄。以新綿濾過。極清者。置重湯內令熱。開眼淋洗。逐日一次。但是諸眼疾皆効。

菊睛丸　治肝腎不足。眼昏。常見黑花多淚。

枸杞子三兩　蓯蓉酒浸炒　巴戟去心各一兩

甘菊花四兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服五十丸。温酒鹽湯食遠任下。余太宰方。加熟地黄二兩。

駐景丸　治肝腎虛。眼昏翳。

熟地黄　車前子各三兩　兎絲子酒煮五兩

爲末。煉蜜丸。桐子大。每服五十丸。食前白茯苓石菖蒲湯任下。又方加枸杞子一兩半。尤佳。

枸杞子酒　治肝虛當風眼淚。

右用枸杞子最肥者。二升。搗破。內絹袋。置罐中。以酒一斗浸訖。密封勿泄氣。候三七日。每日取飲之。勿醉。

地芝丸　治能遠視。不能近視。亦能治脉風成癘。

生地黃焙　天門冬去心各四兩　枳殼炒　甘菊花去蒂各二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服一百丸。茶清送下。

定志丸　治能近視。不能遠視。

遠志去苗心　菖蒲各二兩　人參　白茯苓去皮各一兩

爲細末。煉蜜丸。以朱砂爲衣。每服十丸。加至二十丸。食後米飲下。

耳

素問陰陽應象大論曰。腎主耳。在竅爲耳。靈樞脉度篇曰。腎氣通於耳。腎和。則耳能聞五音矣。五閱五使篇曰。耳者。腎之官也。金匱真言又曰。南方赤色。入通於心。開竅於耳。是耳一也。爲兩藏共開之竅。豈非心腎交通。水火相濟之義乎。若二藏不和。虛實寒熱。皆能上致耳疾。卽經絡之過於耳者。亦皆能作疾。如靈樞經脉篇曰小腸手太陽之脉。入耳中。其病耳聾。三焦手少陽之脉。從耳後。入耳中。出走耳前。其病耳聾渾渾焞焞。大腸手陽明之別脉。入耳。合宗脉。實則龋聾。口問篇曰。耳中鳴者。宗脉之所聚也。胃中空。則宗脉虛。虛則下溜而脉竭。故上虛而鳴。選方四首。

附方

清神散　治風氣壅上。頭目不清。耳常重聽。

殭蚕　菊花各一兩　荆芥

羌活　木通　川芎
香附　防風　菖蒲
甘草各二錢

爲末每三錢食後臨卧茶清下

磁石湯　治腎虛耳聾面黑饑不欲食腰脇背痛

磁石　五味子　杜仲
白术　白石英各二錢　黄耆
白茯苓各一錢

水煎服

益腎散　治腎虛耳聾

磁石　巴戟　沉香
菖蒲　川椒各一兩

爲末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨熟空心細嚼酒下

犀角飲子　治風熱上壅耳聾腫痛膿水流出

犀角　菖蒲　木通

玄參　赤芍藥　赤小豆

丹菊花各五分　丹艸二分半

薑煎溫服

鼻

素問金匱真言曰西方色白入通於肺開竅於鼻

陰陽應象大論曰肺主鼻在竅爲鼻脉度篇曰肺

氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣五藏別論曰五

氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻爲不利也氣厥

論曰膽移熱於腦則爲辛頞鼻淵經脉篇曰胃足

陽明之脉起於鼻之交頞中其病爲鼽衄大腸手

陽明其病亦爲鼽衄膀胱足太陽亦爲鼽衄又曰

脾熱者鼻先赤選方七首

附方

通氣湯　治鼻塞不聞香臭

羌活　獨活　蒼术　升麻　葛根各六分

防風

白芷　甘草　川椒各二分

冬月加麻黄二分薑棗葱白煎服

防風散　治鼻淵腦熱滲下濁流不止

防風五分　黄芩　人參

甘草　川芎　麥門冬各二分

爲末食後沸湯調服

单南星飲　治風邪入腦宿冷不消鼻内結物壅

塞腦氣遂流濁髓

南星爲細末每二錢用棗七枚甘艸少許同煎

食後服三四服其物自出涕自收外貼葷撥餅

葷撥餅

葷撥　香附　大蒜等分

搗作餅紗襯灸熱貼顖門上用熨斗火熨透其

涕自止

瓜礬散　治鼻痔肉化水自下

瓜蒂四錢　甘遂一錢　白礬枯

螺殼四錢　草烏尖各五分

爲末真麻油調尤如鼻孔大每日一次以藥入鼻內令着痔肉上

芷荑散　治鼻流濁涕

白芷一兩　辛夷五錢　蒼耳仁三錢半

薄荷五分

爲末每二錢葱茶清調服

鼻衄不止方

鮮生地搗汁飲之立止蘿蔔汁無灰酒和服陰煉人中白溫湯調服及單飲童便俱妙

口脣

金匱真言論曰中央黃色入通於脾開竅於口五藏生成論曰脾之合肉也其榮脣也六節藏象論曰脾胃之華在脣四白脉度篇曰脾氣通於口脾和則口能知穀味矣經脉篇曰大腸手陽明之脉挾口交人中其病爲口乾胃足陽明之脉挾口交

承漿其病口喎脣診（診卽瘡疹字通用）足少陽病爲口苦足太陰終者脣反衛氣失常篇曰脣青黃赤白黑者病在肌肉遲方四首

附方

瀉白湯 治大腸實熱便結臍痛口瘡

橘皮 竹茹 黃芩 山梔 黃蘗（各五分） 芒硝 茯苓（各一錢） 生地黃（三錢）

薑棗煎服

黃蘗散 治蜜脣

黃蘗（二兩） 五倍子 密陀僧（各二錢） 甘艸（二分）

爲末水調塗黃蘗上炙乾再塗藥盡爲度後將黃蘗切作薄片貼蜜脣上

五福化毒丹（見第七十八）

氷蘗丸 治口舌生瘡

黃檗　薄荷　硼砂各等分

氷片減半

爲末蜜丸彈子大每嚥化一丸

舌

陰陽應象大論曰心主舌在竅爲舌脉度篇曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣夫言出于心非舌不能發故云舌者心之苗其色赤其形尖而善動火之象也經脉篇曰脾足太陰之脉連舌本散舌下其病舌本强及舌本痛腎脉循喉嚨挾舌本其病口熱舌乾口問篇曰少陰脉至則嚙舌已上目耳鼻口舌爲藏之開竅固當見五藏之變病所謂五藏不和則七竅不通然而經絡病多藏氣病少若識別不真即有毫釐千里之謬唯諦審而治之則善矣選四方與第七十八小兒門參看

附方

薄荷煎　治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

薄荷二兩半　川芎二錢　甘草
砂仁各二錢半　片腦五分
各另爲末和勻蜜調成膏任意嚼嚥
黑參丸　治口舌生瘡久不愈
玄參　天門冬　麥門冬各等分
爲末蜜丸彈子大每一丸綿裹嚥化津液下
薏苡仁湯　治風熱在脾唇口瞤動或結核
薏苡仁　防己　赤小豆
甘艸等分
加生薑煎服
舌血舌腫舌出方
炒槐花細末摻之即止腫脹者蒲黃末摻之愈
熱病多舌出不能入者氷片搽之愈
齒
齒者骨之餘骨不外露齒質乃骨而外露故曰餘
如脣爲肉餘瓜爲筋餘髮爲血餘俱內藏者餘出

而外露也氣則不言餘以氣呼出可見耳腎主骨故齒屬腎言其本也胃足陽明之入上齒龈大腸手陽明之入下齒龈言其經也是故本病者多病齒骨經病者多病齒龈然有虛實風火虫蝕之不同在診之細爲分別則無不効選方七首

附方

清胃湯 見第四十九

香鹽散 治虫牙及腎虛宣露一切齒疾

香附三兩 青鹽五錢

謝傳笑去散 治牙疼。

乳香 沒藥 雄黃

胡椒 烏藥 兩頭尖各等分

爲末擦牙。初時甚痛。良久涎出便愈。

白蒺藜散 治風虛牙疼。齒龈搖動。

白蒺藜生搗去刺。篩末擦牙。或煎水入鹽一撿。帶熱時漱。

青白散 治一切牙疼。及漱水洗目尤妙。

青鹽二兩 白鹽四兩

用川椒四兩。煎汁拌炒二鹽。爲末擦之。

齒縫出血一名牙宣

唯以白鹽擦之妙。

齒肉壅出

鮮生地黃汁一碗。牙皂角數錠。火上炙熱。蘸汁。再炙再蘸盡汁。焙燥末之。傅上立消。

鬚髮

素問五藏生成論曰。腎之合骨也。其榮髮也。上古天真論曰。腎氣實。齒更髮長。是髮爲屬腎。又心主血。髮者血之餘。是髮又屬心髮生上指。象火。用心過度者。髮早白。皆心之驗也。巢氏云。膽之榮在鬚又靈樞曰。衝任二脉。不榮於口脣者。故鬚不生焉是鬚髮雖殊。總不外榮血之爲潤養也。選方五首

附方

天寶单方

治丈夫婦人。久患頭風眩悶。頭髮乾落。胸中痰壅。每發。即頭旋眼昏。不覺欲倒者。是其候也。先灸兩風池。各二七壯。并服此酒及散。永瘥。其法春末夏初。收白菊軟苗陰乾。搗末。空腹取一方寸匕。和無灰酒服之。日再服。漸加三方寸匕。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月合花收暴乾。切取三大斤。以生絹袋盛。貯三大斗酒中。經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。

巨勝丸 治風眩。能返白髮爲黑。

巨勝子 白茯苓 甘菊花 等分

煉蜜丸如桐子大。每服三錢。清晨白湯下。

旱蓮膏 黑鬚髮。益腎陰。

旱蓮草。用泉水煮汁熬膏。日服外。即以膏揩之。

地黃膏 久服烏鬚髮。

生地黃 三斤搗取汁 茜草 一斤水五大盆煎絞取汁滓再煎二三次取汁

合二汁。緩火煎如膏。以瓶盛之。每日空心。温酒服半匙。一月髭鬚如漆。

筆峰雜與方

用何首烏雌雄各半斤。分作四分。一分用當歸汁浸。一分生地黄汁浸。一分早蓮汁浸。一分人乳浸。三日取出。各暴乾。瓦焙。石臼搗末。蒸棗肉和丸梧子大。每服四十丸。空心百沸湯下。

附擬補内外因第九六淫方

陰淫。上下厥逆。中外寒慄。

附子理中湯 見第十七

四逆湯 見第二十二

陽淫。狂譫煩渴。血泄浸淫

白虎湯 見第四十三

犀角地黄湯 治小腸淋瀝。出血疼痛。及心血妄行吐血衄血等疾。食後臨卧服。

犀角 如無以升麻代之半兩 白芍藥 二錢

牡丹皮半兩　生地黃二錢

右剉作一服。水一盞。煎八分。空心服。

風淫。肢廢毛落。漆習瘮瘙

寶鑑醉仙散　治癘風遍身麻木。

胡麻子炒　牛蒡子炒　枸杞子

蔓荊子炒各一兩　白蒺藜　苦參

防風　瓜蔞根各五錢

右爲細末。每一兩四錢。入輕粉二錢。拌勻每服一錢。茶清調。晨午各一服。至五七日。於牙縫中出臭涎。令人如醉。或下膿血。病根乃去。仍量病之輕重。人之虛實用。病重者。須先以再造散下之。候元氣將復。再用此藥。忌一切炙煿厚味。止可食淡粥時菜諸蛇。以淡酒蒸熟食之。可以助藥力。

通天再造散　治大風惡疾。

鬱金半兩　大黃煨一兩　皂角刺黑大者炒一兩

白牽牛六兩半生半炒

爲末。每服五錢。日未出。面東。無灰酒調下。

雨淫。腹滿腫脹。腸鳴濡瀉。

平胃散見第四十七

五苓散見第十七

胃苓湯見第十七

晦淫。百合狐惑。熱中藏燥

金匱百合病論曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默默欲卧。不能卧。欲行不能行。飲食或有美時。或有不用。聞食臭。時如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脉微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。淅然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

百合知母湯　百合病。發汗後者。至此方。

百合七枚擘　知母三兩切

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母取一升去滓。後合和煎取一升五合。分溫再服。

滑石代赭湯　百合病。下後者。至此方。

百合七枚擘　滑石三兩碎綿裹　代赭石如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代赭取一升。去滓。後合重煎。取一升五合。分溫再服。

百合雞子湯　百合病。吐後者。至此方。

百合七枚擘　雞子黃一枚

右先水洗百合。漬一宿。當沫出。去其水。更以泉

水二升。煎取一升。去滓。內雞子黃攪勻。煎五分溫服。

百合地黃湯　百合病。不經吐下發汗。病形如初者。主此方

百合七枚擘　生地黃汁一升

右以水洗百合。浸一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。內地黃汁。煎取一升五合。分溫再服。中病勿更服。大便當如漆

狐惑之爲病狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不用飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。蝕於上部。則聲嗌。一作嗄

甘草瀉心湯主之。

甘草瀉心湯

甘草四兩　黃芩　人參　乾薑各三兩　黃連一兩　大棗十二枚　半夏半升

餌於下部。則咽乾。苦參湯主之。

餌於肛者。雄黃薰之。

雄黃

右一味爲末筒尾二片合之。燒向肛薰之

脉經云。病人或從呼吸。上餌其咽。或從下焦餌其肛陰。餌上爲惑。餌下爲狐。狐惑病者。猪苓散主之。

病者脉數無熱。微煩。默默但欲臥。汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眥黑。若能食者。膿已成也。赤小豆當歸散主之。

赤小豆當歸散

當歸　赤小豆三升浸令芽出曝乾

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

金匱甘麥大棗湯　治婦人喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。名曰藏躁。

甘草三兩　小麥一升　大棗十枚

右三味。以水六升。煮三升。温分三服。亦補脾氣明淫。恍惚動悸。錯妄失神。

金匱桂枝去芍藥。加龍骨牡蠣救逆湯。 治驚狂不安。陽氣散失。或因灸熨火邪而陽氣淳越。致成上證。

桂枝三兩去皮　甘草二兩炙　生薑三兩

牡蠣五兩熬　龍骨四兩　大棗十二枚

蜀漆三兩洗去腥

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆減二升。内諸藥煮取三升。去滓。温服一升。

東垣朱砂安神丸 見第十九

醫燈續焰卷十八 終

北京大学古籍保护中心