





44  
97



# 男女 秘 密 病 自 醫 法

醫學士 汪企鵠 校閱  
藥劑士 姚紀緒 著述



醫學實驗會出版  
上海東書局發行



## 凡例

- 一本書就男女習慣集常人所不肯就醫之病述其最簡單最效之療法故命名曰秘
- 密病自醫法
- 一本書係備普通人自療之用就病症之發見略說其原因凡精深之學說及治法須
- 借手醫生者概不列入
- 一本書處方悉取材於東西各專門家之記載故注重原文置原名於前附譯名於後
- 原文以拉丁名居多以其各國通用也間有取材於德文書籍者則用德文
- 一本書之處方各地大藥房均可照方配合
- 一本書中各處方之藥量悉用法國之瓦 *gramm* 量用小數法記之每瓦約我國二
- 分六厘
- 一本書中各處方之藥量悉爲壯年人而設小兒與老年人須酌量減少

男女秘室病自醫法 凡例




## 序

古有諱疾忌醫之說夫疾何所諱前醫何所忌哉推其說之由來或因疾之在秘密處耳我國風俗之習慣男子且然女子尤甚而按年以計夭折於冥冥之中者實不可以俚指數本會有鑒於此舉東西良方一一互參共酌實行經驗而後載諸於編其療治之關於秘密者無乎不備閱是書檢查卽是人自爲醫無所容其忌諱焉又何至有夭折之患哉爰識數語於簡首

民國八年十月朔日醫學實驗會會員王良知序

男女秘密病自醫法 序



MG  
R09)05

# 男女秘密病自醫法目錄

## 卷一 男子部

一	白濁自醫法	一
二	下疳自醫法	二
三	橫痃自醫法	三
四	梅毒自醫法	四
五	遺傳梅毒自醫法	五
六	白濁漏膿眼自醫法	六
七	龜頭淋自醫法	七
八	肛門淋自醫法	八
九	預防白濁法	九
十	預防梅毒法	九
十一	預防下疳法	一〇
十二	男子白濁診斷法	一一
十三	梅毒診斷法	一一

男女秘密病自醫法 目錄

十四	軟性下疳診斷法	一二
十五	陽萎自醫法	一二
十六	早泄自醫法	一四
十七	制止淫慾法	一五
十八	見色流精自醫法	一六
十九	酒後交合之害	一六
二十	經期中交合之害	一六
二十一	陰囊水腫自醫法	一七
二十二	睪丸不下自醫法	一七
二十三	包莖自醫法	一七
二十四	包皮上翻自醫法	一八
二十五	包皮紅腫自醫法	一九
二十六	陽物短小自醫法	一九
二十七	陽物強直自醫法	二〇
二十八	陰囊外傷自醫法	二一
二十九	陰囊象皮腫自醫法	二一



三十	手淫防止法	一二二
三十一	遺精自醫法	一二二
三十二	尿管狹小自醫法	一二四
三十三	房事中受寒自醫法	一二四
三十四	陰部贅肉自醫法	一二五
三十五	寢小便自醫法	一二五
三十六	角虱自醫法	一二六
卷二 女子部		
一	預防白濁法	一
二	預防梅毒法	一
三	預防下疳法	一
四	白濁診斷法	一一
五	梅毒診斷法	一一
六	軟性下疳診斷法	一一
七	白帶自醫法	一二
八	月經不調自醫法	一四

九	月經過多自醫法	一五
十	經水過少自醫法	一五
十一	經水白色自醫法	一五
十二	經水黑色自醫法	一五
十三	痛經自醫法	一六
十四	血奔自醫法	一六
十五	房事中子宮出血自醫法	一七
十六	子宮內翻自醫法	一八
十七	子宮癌自醫法	一九
十八	陰道癌自醫法	一九
十九	陰核癌自醫法	一九
二十	陰核肥大自醫法	二〇
二十一	陰門狼瘡自醫法	二一
二十二	陰門白癬自醫法	二一
二十三	陰門紅腫自醫法	二一
二十四	陰門奇痒自醫法	二二



二五	求妊法	一三
二六	避妊法	一三
二七	流產防止法	一四
二八	子宮下垂自醫法	一五
二九	會陰破裂自醫法	一六
三十	陰臭自醫法	一六
三一	陰戶乾燥自醫法	一七
三二	陰戶翻花自醫法	一七
三三	鎖陰自醫法	一七
三四	陰吹自醫法	一八
三五	陰部生毛法	一八
三六	異物誤入陰戶自醫法	一九
三七	陰戶疼痛自醫法	一九
三八	乳房痛自醫法	一九
三九	乳癰自醫法	二〇

男女秘密病自醫法 目錄

四十	乳癌自醫法	二一
四十一	放脚易大法	二一
四十二	放脚不使過大法	二二
四十三	處女鑑別法	二三
卷二 雜治部		
一	頭髮美麗法	一
二	頭髮拳縮自醫法	二
三	預防白髮法	三
四	預防脫髮法	三
五	瘦者增肥法	三
六	肥者減瘦法	三
七	長身法	四
八	防生皺襞法	五
九	不眠症自醫法	五
十	嗜眠自醫法	六
十一	顏面黃斑除去法	七

十二	面皰自醫法	八
十三	雀斑除去法	八
十四	黑痣除去法	九
十五	口臭自醫法	一〇
十六	齒痛自醫法	一〇
十七	睡中齒軋自醫法	一一
十八	夢話自醫法	一二
十九	齒牙潔白法	一二
二十	指爪潔白法	一三
二十一	油灰爪自醫法	一三
二十二	狐臭自醫法	一三
二十三	多屁自醫法	一四
二十四	汗斑自醫法	一五
二十五	手汗過多自醫法	一五
二十六	脚汗過多即脚癬自醫法	一六

二十七	爛脚自醫法	一七
二十八	手足生繭自醫法	一七
二十九	酒齶鼻自醫法	一八
三十	油汗自醫法	一九
三十一	鬚瘡自醫法	一九
三十二	鬚髯不生法	二一
三十三	小腸氣自醫法	二一
三十四	痔瘡自醫法	二二
三十五	內痔自醫法	二三
三十六	痔瘻自醫法	二三
三十七	頑癬自醫法	二四
三十八	疥癬自醫法	二四
三十九	疥瘡自醫法	二六
四十	癩風自醫法	二七
四十一	紅色陰癬自醫法	二八
四十二	癩瘰頭自醫法	二八

四十三	禿髮症自醫法……………	三〇
四十四	匍行疹自醫法……………	三一
四十五	腦漏自醫法……………	三三
四十六	雞眼自醫法……………	三四
四十七	赤眼自醫法……………	三四
四十八	眼生星翳自醫法……………	三五
四十九	眼腐不生法……………	三五
五十	流淚自醫法……………	三五
五十一	耳出膿自醫法……………	三六
五十二	眉毛濃黑法……………	三六
五十三	火傷自醫法……………	三七
五十四	少年白髮病自醫法……………	三八
五十五	圓形脫髮症自醫法……………	三九
五十六	凍瘡自醫法……………	四一
五十七	濕疹自醫法……………	四二
五十八	大麻風自醫法……………	四五

五十九	狼瘡自醫法……………	四六
六十	坐斑瘡自醫法……………	四七
六十一	瘋疹自醫法……………	四八
六十二	乾癬自醫法……………	四九
六十三	紅色糠秕疹自醫法……………	五一
六十四	苔癬自醫法……………	五一
六十五	天泡瘡自醫法……………	五二
六十六	皮膚紅斑自醫法……………	五三
六十七	硬皮病自醫法……………	五三
六十八	白癜風自醫法……………	五四
六十九	魚鱗癬自醫法……………	五四
七十	皮痒症自醫法……………	五五
七十一	皮膚白嫩法……………	五五
七十二	肛門裂傷自醫法……………	五六
七十三	脫肛自醫法……………	五七
七十四	便血自醫法……………	五七

七十五	血尿自醫法	五八
七十六	酒醉速醒法	五八
七十七	煙艸中毒自醫法	六〇
七十八	頭虱自醫法	六〇
七十九	頭痛自醫法	六一
八十	骨節酸痛自醫法	六一
八十一	胃痛立止法	六一
八十二	嘔吐立止法	六一
八十三	傷風自醫法	六一
八十四	頭暈自醫法	六二
八十五	暈船自醫法	六二
八十六	衄血自醫法	六三
八十七	失音自醫法	六四
八十八	呃逆自醫法	六四
八十九	黃疸病自醫法	六五
九十	萎黃病自醫法	六五

九十一 喘息自醫法……………六六

男女秘密病自醫法目錄終

男女  
秘密病自醫法 卷上

醫學士 汪企張 校閱  
藥劑士 姚昶緒 纂著



男子部

一 白濁自醫法

白濁由交媾而傳染。交媾後約經一星期至三星期。先覺龜頭癢而熱。後則泄尿時覺痛。不時漏出白色之膿液。且時有尿意。須及早醫治。若至六星期後。尙不治愈。不但終身無全治之望。且誘發種種危險之疾病。如尿道狹小、膀胱病、關節腫痛等。自醫之法。以內服爲便。可向藥房購下列諸方之藥服之。

Gonosan Capsul

古諾生丸

是爲治白濁之內服藥中最佳者。價甚賁。每三十粒一瓶。需一元六七角。每日服三次。每次服二粒。飯後用開水送下。外面之殼。係膠質所製。須一同服下。下記諸品。價順次低廉。効力亦順次減弱。服法與上同。

男女秘密病自醫法 男子部

Capsul. of Santali.

檀香油丸

Capsul. Gonosalvin.

古諾散爾文丸

Capsul. Balsam. Capivaie

古邦淮丸

此外再購下方之藥桿。每日朝夕二次。每次用一根。插入尿道中。能自熔。

Suppositoria protargol

坡洛他古尿道坐藥

下列諸條均須禁絕。若犯之藥物難奏效力。

(一) 禁交媾。 (二) 禁烟酒。 (三) 禁勞動。 (四) 禁葱蒜姜椒等刺戟性食物。

白濁之濃液。性甚毒。若誤入眼內。數日即失明。故小便及插入藥桿後。宜用酒精清洗其手。

## 二 下疳自醫法

下疳有軟性與硬性之別。均由交媾而傳染。交媾後經二三日。龜頭或包皮即生紅點。後漸漸增大而潰爛。有痛且出薄膿者。為軟性下疳。症較輕。治愈後無後患。自醫之法。每日數次。用五十倍硼酸 2% Bor. los 洗淨後。塗以下方之油藥。

Ung. Jodoform

20.0

沃度仿謨軟膏

110.0

用清潔之軟布包之。大約二三星期即愈。

交媾後。經三星期至六星期。始於龜頭或包皮。生硬塊。無痛無膿。亦不增大者為硬性下疳。症狀雖輕。實係梅毒最初之一現象。此硬塊消退後。隔數日或數星期。全身即發梅毒疹。故發生此硬塊時。一方塗以下方之油藥。使速消退。一方即請醫生注射六零六。免致全身發疹。難以隱匿。

Ung. Hydrargyri

10.0

水銀軟膏

110.0

### 三 橫痃自醫法

無論傳染白濁或軟性下疳或硬性下疳(即梅毒)後。均發生橫痃。惟白濁與軟性下疳之橫痃。痛甚劇。極易生膿。硬性下疳之橫痃。毫不覺痛。亦不生膿。能自消退。消退後。全身之梅毒疹發現矣。自醫之法。有痛者。初起時。即安靜。不可走動。塗以下方之藥水。或可望消退。

10% Ichthyol Alcohol

20.0

十倍伊天哇爾酒精

110.0

男女秘密病自醫法 男子部

三

既生膿而軟者。則無法消退。宜早請醫生開刀。既生膿者。開刀愈遲。治愈亦愈慢。無痛之橫痃。能自消退。無需塗藥。惟速請醫生注射六零六。以防全身發生梅毒疹。

#### 四 梅毒自醫法

梅毒大抵由交媾而傳染。傳染後。經三星期至六星期。先生硬性下疳。次生無痛橫痃。由交媾而傳染者。硬性下疳生於龜頭或包皮。由接吻而傳染者。硬性下疳生於口唇。餘可類推。硬性下疳與無痛橫痃消退後。隔數日至數星期。全身即發梅毒疹。若不醫治。或醫治失宜。病毒漸攻入內臟。而可致死。梅毒之療法。以六零六効力最大。但須請醫生注入血管內。方有効力。發賣之內服六零六。則非真六零六。係尋常之銻碘等類。効力極微。真六零六。祇可注射。不能內服。亦需注射三次以上。方不復發。除注射六零六外。可兼服下方之丸藥。

#### Pill Hydrargyri salicyli 撒汞丸

日服三次。每次服一粒。飯後用開水送下。服此丸藥時。牙肉往往浮腫。宜用下方之藥水。時時漱口。以預防之。且禁止吃烟。若仍浮腫。則停服此藥。



2% Kali chlorat los 500.0 五十倍鹽剝水 500.0

病毒已侵內臟者宜服下方之藥水以圖解毒。

Kali Jodat 2.0 沃度加里 11.0

Syrup. Auranti 10.0 橙皮糖漿 100.0

Aq. 100.0 熟水 100.0

上量分三次一日服完。

硬性下疳與無痛橫痃之處置法。上已述之。全身之梅毒疹。可塗以下方之油藥。

30% Kalomel Vaselen 20.0 十倍甘汞凡士林 110.0

### 五 遺傳梅毒自醫法

梅毒不但能染傳於人。更能遺傳於子女。即父母患梅毒後。未治痊前。所生之子女。自胎中感得梅毒毒質。產出後。不久亦發生梅毒。而自父母遺傳之梅毒。不生硬性下疳橫痃等初期症狀。即發全身疹子。或其毒已侵入內臟。不久即死。醫治之法。亦以請醫生注射六零六為最要。自醫之法。可內服下方之藥水。

Syrup. Ferri Jodati 1.0 沃度鐵糖漿 1.0

Aq. Com. 30.0 熱水 110.0

上為一日量。分三次服。每隔五小時服一次。此方為未滿歲小兒之用量。

皮膚發生之疹子膿疱等。可塗以下方之油藥。

Kalomel 1.0 甘汞 1.0

Vaseline 30.0 凡士林 110.0

上混和外塗用

六 白濁漏膿眼自醫法

白濁之膿液。如誤入眼內。能誘發極危險之眼病。白濁自醫法中已述及之矣。此種眼病。因其眼內長日流出膿液。故名白濁漏膿眼。若不及早醫治。能於數日中失明。自醫之法。用下方之藥水。時時洗眼。愈勤愈佳。

0.03% Sublimat los 500.0 三千倍昇汞水 500.0

上洗眼用。須用蒸溜水製。

洗眼之法。可向藥房中購洗眼杯。傾藥水於杯內。緊合眼上。乃仰面而將杯倒置。張眼則藥水自流入眼中。洗眼後。用細玻璃棒（藥房中有之專供塗眼藥用）取下方之油藥少許。塗入眼內。

Hydragryi oxyd. flav. 0.5 黃降汞 0.5

Weiss Vaselen 10.0 白凡士林 10.0

上混和點眼用。

### 七 龜頭淋自醫法

龜頭因白濁。梅毒。軟性下疳等而紅腫出膿者。名龜頭淋。有惡臭。易脫皮。觸之稍重。即出血。脫皮之處覺劇癢。陽物如舉。則緊張而痛。自醫之法。先用下方之藥水洗淨。

2% Bor. los 500.0 五十倍硼酸水 500.0

次撒布左方之藥粉。

Kalomel 5.0 甘汞 5.0

Amyl 5.0 澱粉 5.0

男女秘密病自醫法 男子部

上濕和撒布用。

上皮脫落者。則洗淨後。塗以下方之藥水。

5% Argem. Nitric. los.

5.0

二十倍硝酸銀水

五.〇

紅腫甚者。須靜臥。高墊陰部。紅腫部塗下方之油藥。

Ung. Hydrargyri

5.0

灰白軟膏

五.〇

### 八 肛門淋自醫法

白濁之膿液。如流入肛門。則肛門亦紅腫。而常流出膿汁。是名肛門淋。自醫之法。可內服下方之藥粉。

Salol

3.0

撒魯爾

三.〇

上分三包。一日量。每飯後服一包。

且每日用左方之藥水。灌入腸內數次。

2% Ichthyol los

20.0

五十倍伊天哇爾液

一〇〇.〇

藥水灌入腸內。藥房中有特別之器具。名灌腸器。狀與噴水筒相似。或購下方之藥棒。

插入肛門亦可。

Suppositoria Protagol 坡洛他古肛門坐藥

### 九 預防白濁法

白濁之症狀。雖較梅毒稍輕。而極難醫治斷根。終身受其累。且傳及妻妾。致難生育。而花界中之女子。無論階級之高下。殆無不染是症者。故男子如涉足花叢。不可不嚴為預防。其法用如意袋最妥。但若破碎。則全無効力。且減少興味。往往不願用之。現有一簡單之法。即射精後。速起床。小便。則所受之毒。悉為小便沖出。若稍緩須臾。則毒已入內。此法無効矣。小便後。更滴下方之藥水二三滴於尿管內。可安全無虞。

2% Protagol 1os

5.0

1% 坡洛他古液

五〇

此藥水可請藥房中裝入點眼瓶內。此瓶容易點滴也。

### 十 預防梅毒法

梅毒不但由交合而染傳。惟由交合而染傳者最多耳。與梅毒已蔓及口腔之人親嘴。梅毒即由口腔傳入。發生下疳於口唇。與梅毒已蔓及手掌之人握手。如手掌皮膚有

男女秘密病自醫法 男子部

九

小傷口亦即由此傳入（雖目不能睹之極小傷口亦能傳染此種小傷口我人常有之）又如浴室中用絲瓜筋擦背。若此絲瓜筋適擦過有皮膚梅毒之人亦能染傳。因擦背時皮膚常生小傷口。如用附有梅毒毒質之絲瓜筋。其染傳也必矣。故男子預防梅毒之法。洗浴時不宜擦背。與人親嘴或握手時。須細審其人之口腔口唇或手掌有無異狀。如稍有異狀。不問其是否梅毒。總以不與之親嘴或握手為妥。因他種疾病亦有能傳染者也。預防交合時之染傳。以用如意袋為最簡便。但如破碎。則無効力。此外簡便之法。交合畢後。速塗下方之油藥於陽物全部。數小時後洗去之。據西國之報告。此法之成績甚佳云。

Hydrargyr. praecipitat. alb. 1.0

白降汞

1.0

Vasselen

10.0

凡士林

10.0

上混和外塗用。

### 十一 預防下疳法

下疳有硬性軟性二種。下疳自醫法條下已詳述之矣。硬性下疳即梅毒之一症狀。預

防法與梅毒同。軟性下疳爲一部分之疾病。不蔓及全身。祇須於交合畢後。速用下方之藥水。洗滌陽物及陰部。已足收預防之効。

0.1% Sublimat los

100.0

千倍昇汞水

1000.0

## 十二 男子白濁診斷法

診斷男子有無白濁之法。最簡便者。驗其小便。男子有白濁者。其小便必溷濁。且有絲狀之物。混於其間。靜置少時。底下有沈澱。更有一法。以二指將陽物夾住。從根部壓向龜頭。患白濁者。有白色乳汁樣之物壓出。

## 十三 梅毒診斷法

梅毒最初之症狀。爲硬性下疳。稍隆起之硬塊也。無痛無膿。殆乾燥。色微紅或紫。由交合而傳染者。生於龜頭包皮。或包皮之內面。其生於龜頭或包皮外面者。甚易發見。生於包皮內面者。須翻轉其包皮。方能見之。由親嘴而傳染者。硬性下疳生於口唇。由他種情形而傳染者。各生硬性下疳於病毒侵入之處。此硬性下疳。經二三期後。能自消退。而橫痃發見矣。梅毒之橫痃。無痛不紅。易與白濁軟性下疳之橫痃區別。此橫痃

並不生膿而潰爛。經二三星期後亦自消退。此時頸之兩側及上膊之內側以指壓之。覺有腫脹之塊。再經一二星期。全身之紅疹見矣。此紅疹殆不高起。胸部兩臂內側及額之近髮處最多。頭髮亦漸脫落。此紅疹以後之變化甚多。或合併而蔓延。或變紫色。或變膿瘡。病勢更進。侵入內臟。皮膚之症狀。反漸減退。此時或失音。或兩眼久紅不退。或口不能張大。或手足運動不便。總之。病毒已入內臟。皮膚之症狀減退後。診斷雖不易。而染傳之力亦已減弱。在皮膚發疹時。染傳之力最強。發見亦最易。欲確斷所發之疹子。是否梅毒。可用灰白軟膏 Ung. Hydrargyri 少許。塗於發疹部。隔一日後。如疹子之色減退。則係梅毒無疑。

#### 十四 軟性下疳診斷法

軟性下疳多生於男子之龜頭或包皮。但亦有生於包皮內面。須翻轉之。方能發見。軟性下疳與梅毒之硬性下疳異。四周紅腫甚。中被黃色之膜。有少許之膿。觸之則痛。此病概由交合而染傳。故無生於他處者。又患軟性下疳者。必生有痛之橫痃。

#### 十五 陽萎自醫法



陽萎之原因。大概由於神經衰弱。或全無慾念。或雖有慾念。陰莖不勃起。不能營滿足之交合。普通人所謂陽萎。屬於後者居多。大概爲手淫及房事過度之結果。亦有因生殖器病。糖尿病。脊髓勞。慢性胃腸病。慢性腎臟病。貧血等而陽萎者。更有因多服嗎啡。樟腦。撒酸。溴劑。碘劑等藥。而致陽萎者。治療之法。視其原因而異。由於疾病者。須請醫生治愈其病。由於服藥者。須先停止服藥。如尙不愈。再加治療。茲惟述由於神經衰弱之陽萎症之療法如下。

治療此種湯萎症。以滋補身體及行適宜之運動爲第一要務。最須戒者爲服催淫藥（卽一時性壯陽藥）及勉強交合。否則陽萎之程度愈深。愈難治愈。此時宜暫戒色。念以養身。神。冷水浴有強壯身體與精神之効。可試行之。惟試行冷水浴。須從溫和之季始。逐日低減浴水之溫度。使漸成習慣。自無發生感冒之患。既成習慣後。卽冬雪嚴寒。亦行之裕如。且永不感冒矣。常服下方之藥片。大有効力。

Tablet Yohimbin

姚興瓶錠

日服三次。每次服一片。飯後服下。

男女秘密病自醫法 男子部

若用上方之藥（另有藥水）請醫生打針。効力更佳。惟久用後。方能奏効。若欲求一時之効。可服下方之藥粉。

Pulv. opii	0.1	阿片末	〇・1
Camphor	0.15	樟腦	〇・1五
Sacchar lact.	0.5	乳糖	〇・五

上爲一包。臨臥時服。

#### 十六 早泄自醫法

射精之遲早。各人不同。同是一人。亦因時而異。若何爲早泄（即疾病）若何爲非早泄（即非疾病）固不能立顯明之界限。簡單說明之。其區別如下。能隨吾人之意向。稍緩射精者。爲非早泄。反是者。即爲早泄。早泄之原因甚多。有由於神經衰弱者。爲手淫及房事過度之結果。有由於生殖器病（龜頭、尿道、精囊等之疾病）者。有由於中酒、烟、茶等之毒者。由於生殖器病者。須先請醫生治愈其病。茲惟述由於神經衰弱之早泄症之療法如下。早泄症中。以此種最多。由於中毒之早泄症。戒絕烟酒茶後。亦可由此

療法治之。蓋嗜烟酒茶者。神經必衰弱也。總之。凡患早泄病。不問其由於何種原因。烟酒茶及葱蒜芥等刺戟興奮性食品。均須禁絕。否則難奏治療之効。

治療神經衰弱之早泄症。以滋補身體。行適宜之運動。節止房事。爲最要。冷水浴及沿脊柱灌注冷水。均頗有効力。請醫生用下方之藥水打針。効力最佳。惟久用後。方能奏効。

Spermin

司配爾明

若欲圖一時之効力。可內服下方之藥粉。

Natrium bromat

0.5

臭那

〇·五

Monobromcamphor

0.15

臭素樟腦

〇·一五

Sacchar lact

0.5

乳糖

〇·五

下爲一包。臨臥時服。

十七 制止淫慾法

色慾過度。最傷身體。且久後必致陽萎早泄。難以生育。故色慾興奮者。宜節止之。勿使

男女秘密病自醫法 男子部

過度。其法多運動。淡飲食。多運動則夜間自易熟睡。飲食與色慾極有關係。魚肉等厚味之食物。有催淫之効。貝類、烟、酒、茶、葱蒜等。刺戟與奮性飲食。尤甚。欲節止色慾。素食爲良。南瓜、燕青更有止慾之効。佛教戒色。是以戒葷。冷水浴對於止淫之効力。亦甚佳。可一試之。若能專心一志於一種事業或學問。則色念自消。

十八 見色流精自醫法

見色流精。由房事過度或手淫所致。宜服下方之藥水。

Kalii bromat	1.5	臭剝	一·五
Syrup Aurenti	10.0	橙皮糖漿	一〇〇〇
Aq. Com.	90.0	熟水	九〇〇

上爲一日量。分三次服。每飯後服一次。

十九 酒後交合之害

酒後交合。不但有傷身體。此時如受胎。則因神經昏亂。所生子女。往往有神經病。

二十 經期中交合之害

女子之子宮在經期內。紅腫甚劇。如行房事。易起危險之大出血。又經水如流入男子尿管內。則發生與白濁相似之疾病。

### 二十一 陰囊水腫自醫法

舉丸受打擊。或感傳白濁。梅毒。結核等疾病時。陰囊腫大。往往大過小兒之頭。致難步行。或更糜爛而疼痛。已腫脹甚大者。須請醫生用器械抽出其中之水。而注入藥水。自醫之法。可用綿花浸濕下方之藥水。長日覆包陰囊。惟初起時或有効。且對於白濁。梅毒。結核等病。更須行根本治療法。

2% Plumb. Acet. 1os      500.0

五十倍鉛糖水      五〇〇〇〇

### 二十二 舉丸不下自醫法

舉丸當在陰囊之內。若固定在腹內。而不下降。則陰囊內空虛。宜於發身以前。時時以手輕摩腹部。可漸促舉丸之下降。

### 二十三 包莖自醫法

陰莖之包皮口狹小。包皮不能翻轉至龜頭之上者。名包莖。甚者尿道口全爲封閉。小

便時。竟點滴而出。包皮內常積留小便。致紅腫而痛。交合時。容易早泄。且射精之力不強。難以生育。或竟因痛致不能交合。此種人極易染傳白濁。下疳。梅毒等。自醫之法。時時用手指將包皮輕輕牽上。以圖翻轉。如其口過小者。非請醫生施手術不可。龜頭宜常用下方之藥水洗滌。以防糜爛。

2% Bor. los.

500.0

五十倍硼酸水

五〇〇〇

既糜爛者。洗滌後。更撒以下方之藥粉。

Pulv. Acid Boric

8.0

硼酸末

八〇

Zink oxyd

1.5

亞鉛花

一・五

Acid Tannic

0.5

單寧酸

〇・五

上混和撒布用。

二十四 包皮上翻自醫法

此症與包莖相反。包皮翻至龜頭之上。不能復原處之謂也。大概因包皮之口太小所致。往往紅腫疼痛。甚者皮破血流。自醫之法。腫脹不甚者。不難即整復之。腫脹甚者。須

靜臥。以綿花浸濕下方之藥水罨包之。俟腫脹稍退。而後整復。

2% Plumb. Acet. 10s. 500.0 五十倍鉛糖水 五〇〇.〇

### 二十五 包皮紅腫自醫法

患白濁梅毒軟性下疳等者。往往包皮紅腫甚劇。疼痛難耐。宜用下方之藥水洗淨後。

2% Bor. 10s 500.0 五十倍硼酸水 五〇〇.〇

再塗左方之油藥。

Extr. scopol. 0.1 莨菪膏 〇.1

Ichthyol 2.0 伊天哇爾 11.〇

Vaseline 10.0 凡士林 1〇.〇

上混和外塗用。

既糜爛不堪者。須請醫生割除之。

### 二十六 陽物短小自醫法

陽物短小。有先天後天二種。先天短小者。由發育不全所致。後天短小者。因發身時。濫

行手淫。或房事過度。致發育不能完全。自醫之法。先使陽物舉起。次以柔軟之布條。緊縛根部。經十餘分鐘後。除去之。每日試一次。時間可逐漸增長。久後自有奇効。或以絨布浸濕熱水。包於陽物。經十餘分後。除去之。另以乾絨布摩擦陽物約數分時。此法每日可行二三次。時間亦可逐漸增長。久後亦有奇効。

二十七 陽物強直自醫法

並不動情。而陽物常舉起。有劇痛。大抵因誤服劇烈之壯陽藥。或患白濁、脊髓癆等疾。病所致。自醫之法。當安靜精神。屏絕邪念。戒除烟酒。清淡食物。內服下方之藥水。

Kali bromat

3.0

臭剝

三〇〇

Syrup. Auranti

10.0

橙皮糖漿

一〇〇〇

Aq. cam

90.0

熱水

九〇〇〇

上為一日量。分三次服。每飯後服一次。

且塗下方之油藥於陽物全部。

Extr. scopol.

0.5

黃岩膏

〇・五



Ichthyol 5.0 伊天哇爾 5.0

Vaseline 5.0 凡士林 5.0

上混和外塗用。

二十八 陰囊外傷自醫法

陰囊極易受跌打等之外傷。因血管多。出血亦多。甚者辜丸亦受傷。疼痛異常。自醫之法。宜靜臥。高墊陰部。用綿花浸濕下方之藥水。鞞包陰囊。

2% Bor. los. 500.0 五十倍硼酸水 500.0

皮膚破碎而出血者。破碎處先撒下方之藥粉。

Dermatol 5.0 台麻託爾 5.0

二十九 陰囊象皮腫自醫法

陰囊皮膚。腫脹如象皮。故有是名。表皮凹凸不平。易生皸裂。自醫之法。以綿花浸濕下方之藥水。鞞包陰囊。

5% AcidSalicyl Alcohol 100.0 二十倍撒酸酒精 100.0

三十 手淫防止法

手淫之害甚大。能誘發種種生殖器病。或使陽萎。致難生育。其原因男女至春情發動期後。觀淫穢之小說圖畫。聽淫蕩之談話。或二人同床。或摩擦壓迫陰部所致。防止之法。第一去其原因。即青春之男女。禁觀淫穢之小說圖畫。家庭及學校中。禁談淫蕩之事。戒同床。日中不得置手於陰部。夜間被褥不宜過暖。晚上少飲茶水。朝上醒後即起。冷水浴及運動。亦有防止之効。蓋身體勞。則夜間睡自熟也。使青年子女。專心一志。於學問。自無暇顧。及他念。是為家長教師之職。內服下方之藥水。亦稍有効力。

Kali bromat

1.5

臭剝

1.5

Syrup. Auranti

10.0

橙皮糖漿

10.0

Ag. com

9.00

熱水

90.0

上為一日量。分三次服。每飯後服一次。

三十一 遺精自醫法

我人於睡夢中。陰莖勃起。漏出精液。謂之遺精。或夢交合而遺精者。特名夢精。大抵由

神經衰弱。精神不寧。或飲食刺戟性物。或患刺戟陰莖之疾病（如白濁）所致。醫治之法。以除去原因爲第一要務。卽神經衰弱。精神不寧者。宜服下方之藥水。

Kali bromat	2.0	臭剝	11.0
Syrup Auranti	10.0	橙皮糖漿	100.0
Aq. com.	90.0	熱水	900.0

上爲一日量。分三次服。飯後服下。

有遺精病者。宜戒絕烟酒及葱蒜海味等一切興奮性食物。晚膳不宜過飽。晚膳後不可飲茶。因過飽與多飲茶。睡後陰莖易勃起。致遺精也。睡時被褥不可過暖。下身尤然。過暖則陰莖易勃起而遺精。睡中置手於陰部亦然。每日用冷水洗浴或每朝以冷水洗滌陰部。則能強固閉鎖精液之筋肉。有預防遺精之効。因患白濁等生殖器病而遺精者。須先請醫生治愈原因之生殖器病。方可治愈遺精。房事過度手淫等。亦爲遺精之原因。因房事過度及手淫者。精關必不固。受些微之刺戟。卽容易勃起而遺精。患遺精者。常服下方之藥粉。有預防之効。

Monobromamphor

0.3

臭化樟腦

〇.三

Sacchar lact

1.0

乳糖

一.〇

上分三包。一日量。飯後服一包。

身體強壯之人。偶亦遺精。是因久不近女色。精液貯積既多。經些微之刺戟所致。此種人遺精後。身體並不覺疲。無需醫治。但每月若達二三次以上。即係疾病。須速醫治。

### 三十二 尿管狹小自醫法

男子患白濁後。如久不治。則尿管漸漸狹小。甚致小便點滴而出。受累異常。自醫之法。可向藥房中購橡皮導尿管粗細數根。浸於下方之消毒藥水中。

1% Iyso1 los

200.0

百倍里曹兒水

1100.0

先擇最細者。用時方從藥水中取出。塗以橄欖油 Olive。漸漸通入尿道中。以擴大之用。洗淨之。仍浸入藥水中。數日後。換用稍粗者。每日以通一二次為度。

### 三十三 房事中受寒自醫法

房事如覺受寒。可飲葡萄酒少許。多蓋棉被而臥。烈性之酒。則不相宜。

### 三十四 陰部贅肉自醫法

患白濁者。如怠於清潔。龜頭皮膚常受膿液之刺戟。則漸生贅肉。亦有生於包皮內面。或肛門附近者。其形式如楊梅。或似雞冠。或如天鵝絨。大小不一。覺灼熱奇癢。大者則痛。糜爛者更泄出膿液。而放惡臭。自醫之法。先撒下方之藥粉於贅肉上。

Resorcin (pulvis)

5.0

里曹兒醒粉

5.0

數日後。贅肉自脫落。乃改塗下方之油藥。

Ung. Acid Boric

10.0

硼酸軟膏

10.0

最妥之法。先撒藥粉兩日。次塗油藥兩日。乃再撒藥粉。若是不致傷及贅肉外之皮膚。

### 三十五 寢小便自醫法

寢小便之原因。或由神經麻痺。或因包莖。或因尿道口有疾病。或因腸中生蟻蟲。由於包莖尿道口病及蟻蟲諸原因者。須請醫生治愈其原因病。方能奏效。其大多數則由於神經麻痺。可內服下方之藥水。

Tinct. Vomica

1.0

蕃木鼈丁幾

1.0

男女秘密病自醫法 男子部

男女梅毒病自醫法 男子部

Tinct. Amara	2.0	苦味丁幾	11.0
Syrup. simple	10.0	單糖漿	10.0
Aq. Com	80.0	熱水	90.0

上為一日量。分三次服。每飯後服一回。

此外。晚上。不可飲液體。不可過勞。身體及精神。被褥不可過暖。冷水浴大有効力。

三十六 角虱自醫法

角虱亦概由交媾而傳染。初生於陰部。後漸蔓及腋窩鬚髯眉毛等處。頭髮部則不棲息。其形扁而色黃。常密着於皮膚。非精細審視。不能發見。惟生虱部常覺劇癢。有角虱者。軀幹兩側及胸部大腿。往往發生青斑。自醫之法。可用下方之藥水。每夕塗擦生虱部。大約三日後。即殺滅無遺。

0.2% Sublimat Alkohol	80.0	五百倍昇汞酒精	110.0
-----------------------	------	---------	-------

男女梅毒病自醫法卷上終

男女  
秘密病自醫法 卷中

醫學士 汪企張 校閱  
藥劑士 姚昶緒 纂著

女子部

一 預防白濁法

交合時用如意袋。不但能預防男子從女子染傳白濁。亦能預防女子從男子染傳白濁。若破碎。則亦無効。此外簡便之法。交合畢後。速小便。且用下方之藥水。洗滌陰戶內外。

1% Irysol los

1000.0

百倍里曹兒水

1000.0

若用白帶自醫法中所記之器械。將藥水噴入陰戶之內。則効力更確實。

二 預防梅毒法

梅毒傳染之徑路。既如男子預防梅毒法中所述矣。故女子與人親嘴或握手。亦須細審其人之口腔。口唇及手掌有無異狀。預防由交合之染傳。交合畢後。先如預防白濁

男女秘密病自醫法 女子部

一

法。以藥水（方在女子預防白濁法中）洗滌陰戶內外。次用男子預防梅毒法中之油藥塗於陰戶外面。經數小時後。洗去之。

### 三 預防下疳法

女子預防下疳之法。與預防梅毒法同。

### 四 白濁診斷法

女子有無白濁。不能以小便診斷之。蓋女子陰部有二口。上為尿道口。泄尿用者也。下為陰戶口。生育用者也。女子染傳白濁。概自陰戶傳入。不及尿道。故小便不生變化。有蔓及尿道者。然甚少也。女子患白濁者。小便雖不變化。而必有白帶。然女子有白帶者。並非皆患白濁也。患他種生殖器病者。亦有白帶。而女子患白濁者。腰部及下腹。常有酸痛。故女子多白帶而腰及下腹常酸痛者。大概有白濁。如欲得確實之診斷。須請教醫生。

### 五 梅毒診斷法

女子梅毒之症狀。與男子梅毒同。惟其硬性下疳。生於大小陰唇（即陰戶兩旁皮膚



之皺襞大陰唇在外生陰毛較大小陰唇在內無陰毛色紫較小耳。其生於大陰唇者甚易發見。生於小陰唇者。非審視不可。或以手按壓之。亦覺有硬塊。又有生於陰戶內者。可插入手指。四面按壓以診斷之。此外之診斷法。與男子同。

#### 六 軟性下疳診斷法

女子軟性下疳之診斷法。與男子同。惟生於小陰唇或陰戶內者。非審視或以手指按壓不可。雖無硬塊。而按壓時必痛。

#### 七 白帶自醫法

白帶之原因甚多。其大半則由於傳染白濁。由於白濁者。須用下方之藥水洗滌子宮。

1% Iycol Ios.

500.0

百倍里曹兒水

五〇〇〇〇

此藥水每次用量甚多。自製稍廉。其法向藥房中購里曹兒一瓶。每里曹兒一錢稀釋以十兩之溫水即成。洗滌時須溫藥水。故製就後即用為宜。洗滌法向藥房中購橡皮灌腸器一具。以無嘴之一端。浸入藥水中。(藥水預置於面盆內)將橡皮球壓放不已。則藥水自有嘴之一端噴出。俟藥水稍噴出後。將嘴插入陰戶。再壓放皮球。則藥水噴

入子宮。而收洗滌之効。此洗滌法須每日行一次。數月後。方可奏効。非由於白濁之白帶。可用下方之藥水。洗滌子宮。

5% Nat. bicarb. sol      500.0      二十倍重曹水      五〇〇.〇

洗滌法與上同。此藥水用量亦多。以自製爲便。其法向藥房中購重曹一瓶。每重曹一兩。溶於二十兩之溫水中即成。此種白帶更須內服下方之藥粉。

Zymia      1.0      錢明      1.〇

Calcium Hypophosphor.      3.0      次亞磷酸石灰      11.〇

Sacchar. lact      1.0      乳糖      1.〇

上分三包。一日量。每飯後服一包。

### 八 月經不調自醫法

月經不調之原因甚多。均屬於女科範圍。如欲根本治愈。須求專門女科醫生診治。內服下方之丸藥。亦有通經之効。惟非根本治法耳。日服六丸。分三次。每飯後隔二小時服二丸。服此丸藥期中。須忌茶。否則失其効力。此外更須多運動。及滋補身體。

Pill. Aloes et Ferri 蘆薈鐵丸

九 月經過多自醫法

月經過多者。月經之量過多。或經期過久。身體中一時失去多量之血液。致陷於貧血。其原因甚多。欲根本治愈。須請專門女科醫生診治。救急之法。第一須靜臥。不可多動。飲食宜清淡。忌葱蒜等刺戟性物。下腹部常以浸濕冷水之布包之。

十 經水過少自醫法

經水過少。因血虛所致。宜服下方之丸藥。

Pill. Ferri et Aloes 蘆薈鐵丸

日服六粒。分三次。每飯前一小時服二粒。服此丸藥期內。禁止飲茶。否則失其効力。

十一 經水白色自醫法

經水之色。淡而不紅。亦因血虛之故。可用治經水過少之法醫之。

十二 經水黑色自醫法

男女秘密病自醫法 女子部

經水帶黑。大概因子宮內生外症。宜速醫生醫治。自醫之法。可用下方之藥水。洗滌子宮。洗滌法見白帶自醫法。

1% Iysol los

500.0

百倍里曹兒水

500.0

### 十三 痛經自醫法

痛經亦屬女科範圍。如欲根本治愈。須請專門女科醫生診治。惟處女痛經。嫁後往往自愈。經痛時。內服下方之藥水。有止痛之効。

Ext. Hydrastis fluid

3.0

流動希特拉司膏

3.0

Syrup Auranti

10.0

橙皮糖漿

100.0

Aq. Com.

90.0

熱水

900.0

上藥爲一日量。分三次服。飯後服下。

病人宜靜臥。且以浸濕溫水之布。罨包其下腹部。冷後換去。

### 十四 血奔自醫法

一時從陰戶出血多量者。俗名血奔。除施月經過多自醫法中所記之方法外。更須服

下方之藥水。以圖暫時止血。一方速請醫生診治。

Adrenalin Chlorid (0.1%)	1.0	千倍鹽化阿特列那林	1.0
Gelatin Alb.	10.0	白阿膠	10.0
Syrup Auranti	10.0	橙皮糖漿	10.0
Chloformium	0.8	食鹽	0.8
Aq. Com	100.0	熱水	100.0

上爲一日量。分六次服。每隔二小時服一次。血止後。宜速滋補身體。

更以精製棉花(藥房中有之)球浸濕下方之藥水。塞入陰戶內。但須縛以線。線之一端。垂於陰戶外。以便取出棉花球。

0.1% Adrenalin chlorid los. 10.0      千倍鹽化阿特列那林液      10.0

### 十五 房事中子宮出血自醫法

處女出血。由處女膜破裂所致。無足介意。若並非處女。而房事中出血。或因產後相隔未久。或由於生殖器疾病。能誘起大出血。致危及生命。不可輕視。由於生殖器病者。止

血後。尙須請醫生診治。一時之救急法。速以浸濕冷水之布。包下腹部。且以五十倍明礬水（卽以明礬一錢溶於水五兩中者）洗滌陰戶。如尙不止。向藥房中購精製棉花少許。浸濕下方之藥水。塞入陰戶內。一方速請醫生。病人宜靜臥。不可稍動。

Liquor Ferri sesquedlorat 1.0 過鹽化鐵液 一.〇

Aq. dest 19.0 蒸溜水 一九.〇

上混和外用。

未經清洗之手及此外一切之物。決不可入陰戶之內。如塞入棉花球等。手指必須入陰戶時。須先用肥皂水洗淨。再以酒精清拭之。

### 十六 子宮內翻自醫法

子宮內翻者。子宮底下降。翻出陰戶之外也。惟產婦有之。宜先用下方之藥水。清洗兩手。

2% Acid carbol. sol. 500.0 五十倍石炭酸水 五〇〇.〇

再取精製紗布（藥房中有之）一塊。浸濕上方之藥水。被覆翻出之部。輕輕用手送入

之。送入後。須靜臥數日。不可稍動。

### 十七 子宮癆自醫法

女子較男子多癆腫。如乳癆胃癆等。而子宮或亦生癆腫。其原因或由他部之癆腫轉移而來。或由房事過度所致。多生於三十歲以上四十歲以下之婦人。患此病者。白帶如肉汁。有惡臭。經水減少。房事後。往往出血。不時覺痛。此症非請醫生施手術。不能斷根。自醫之法。惟減輕苦痛耳。即內服下方之藥粉。

Morph. Mur.

0.03

鹽莫

0.011

Sacchar. lact

1.0

乳糖

1.00

上分三包。痛時服一包。然一日祇可服三包。不可多服。

### 十八 陰道癆自醫法

此症之原因及療法。均與子宮癆同。

### 十九 陰核癆自醫法

發生之原因。與子宮癆同。宜及早請醫生割除。自醫之法。不過稍減苦痛。不能斷根。其

法每日洗淨後。塗以下方之油藥。

10% Ichthyol Vaseline 30.0 一〇%伊天哇爾凡士林 300.0

既潰爛者。則撒下方之藥粉。

Jodoform 10.0 沃度仿謨 100.0

Pulv. Acid Boric 10.0 硼酸末 100.0

上混和撒布用。

二十 陰核肥大自醫法

普通女子之陰核。不過大如豆。然房事過度者。或濫用手淫者。則陰核漸漸肥大。致淫慾非常旺盛。無意中衣褲等偶觸陰核。即動淫興。宜屏絕慾念。時時用冷水洗滌之。或包以浸濕冷水之布。更內服下方之藥水。

Kali bromat 1.5 臭剝 1.5

Syrup. Auranti 10.0 橙皮糖漿 100.0

Ap. Com 90.0 熱水 900.0



上爲一日量。分三次服。每飯後服一次。

### 二十一 陰門狼瘡自醫法

是因陰門之皮膚內侵入一種微生物所致。大小陰唇陰核俱潰爛。甚則波及臀部大腿。久之生有光澤之癩痕。宜及早請醫生割除患部。自醫之法。可塗以下方之油藥。

Ung. Jodoform

20.0

沃度仿謨軟膏

110.0

### 二十二 陰門白癬自醫法

陰門之皮膚變白色。乾枯不潤。奇癢不止。搔之上皮爲細屑而脫落。甚者蔓及兩股。自醫之法。用綠肥皂 *Sapo. kalli* 洗淨後。塗以橄欖油 *Ol. Olive*。再以絨布摩擦之。奏效甚速。

### 二十三 陰門紅腫自醫法

陰門紅腫與男子之龜頭淋相當。因受白濁白帶下疳梅毒子宮癌等膿液之刺戟而來。亦有因外傷。手淫。房事過度等而起者。先覺灼熱而癢。小便及行動時則痛。甚者糜爛而出膿。有惡臭。周圍結痂而癢。自醫之法。用溫水洗淨後。以浸濕下方藥水之棉花

包之。

2% Plumb Acet los 500.0 五十倍鉛糖水五 〇〇〇

糜爛部宜強下方之藥粉。

Iodoform 5.0 沃度仿謨 五〇〇

Pulv. Acid Boric 5.0 硼酸粉 五〇〇

上混和撒布用。

#### 二十四 陰門奇癢自醫法

陰門癢癢之原因。概由於白帶、經血、小便等之刺戟。或子宮、尿道、膀胱等之疾病。往往致色慾過度。身體蒙非常之損害。甚者奇癢難耐。其原因於疾病者。須請醫生施治。暫時之止癢法。可用下方之藥水。洗滌陰戶內外。

1% Acid Tannic los 500.0 百倍單寧酸水 五〇〇〇

此藥水可自製。向藥房中購單寧酸一瓶。秤取五錢。溶於溫水五十兩中即成。洗滌後。更以紗布浸濕下方之藥水。罨包於外陰部。

2% Acid carbol. sol.

500.0

五十倍石炭酸水

五〇〇〇〇

由於經血小便等刺戟之陰門癢癢即可由上法治愈。

## 二十五 求妊法

妊娠者。由男子精蟲與女子卵子會合而成。男子精蟲。雖凡交合時。必有射出。而女子卵子。非子宮內隨時皆有。女子卵子。生於卵巢。每月成熟一回。卵子成熟時。從卵巢排送於子宮。同時子宮因充血而出血。卽月經是也。故月經爲女子卵子成熟之表示。而卵子至子宮後。如四五日內。不與精蟲相遇。則失其生活力。而排出子宮外。由是觀之。可知受胎。必在月經後四五日之內。過此四五日。卽不能受胎矣。間有非在經期後而受胎者。是係卵子既排出於子宮。月經尙未至。適在此時受胎。於是月經卽停止也。月經不調者。及有白帶者。均難受胎。月經不調。原因在生殖器病。有生殖器病者。勢難受胎。白帶之液。有酸性反應。精蟲遇之。往往死滅。故亦不易受胎。有此等疾病者。須根本治愈之。方有妊娠之希望。

## 二十六 避妊法

男女秘密病自療法 女子部

妊娠之理。既如求妊法中所述矣。故避妊之法。第一經期後一星期中。禁止交合。而下記諸法。亦頗有避妊之効。

(一)用如意袋。但如破碎。則仍無効。

(二)房事前。用下方之藥水。洗滌陰戶。

2% Acid Tannic los 500.0

五十倍單寧酸水 五〇〇.〇

此藥水可自製。即向藥房中購單寧酸一瓶。秤取一兩。溶於五十兩之溫水中。即成。

(三)房事後。即用下方之藥水。洗滌子宮。

2% Chinin mur. los 500.0

五十倍金雞那霜液 五〇〇.〇

此藥水亦可自製。即向藥房中購鹽酸金雞那霜一瓶。秤取一兩。溶於五十兩之溫水中。即成。此洗滌法須用特別器具。方法詳白帶自醫法。前條之洗滌法。如能照此施行。則効力更確。

## 二十七 流產防止法

妊娠後未滿二十八星期而產出小兒者。名流產。其原因或由母體有病。或由子宮受

刺戟而收縮。或由母體勞動過度。而母體之疾病中。以梅毒最易流產。故母患梅毒者。須速醫。生施治。否則不但容易流產。卽不流產。將來產出之小兒。遺傳梅毒。難期長成。此外傷寒等發熱傳染病。亦易致流產。妊娠中務須注意衛生。預防一切傳染病。身體宜清潔。精神宜安靜。食品用易消化者。忌硬固及刺戟性食物。多吸新鮮空氣。避勞動。多走及提荷重物。滿四五個月後。禁絕房事。卽未滿四五個月以前。房事亦宜減少。且安靜以行之。

## 二十八 子宮下垂自醫法

妊婦努責過甚。或產後起牀太早。子宮往往下垂。甚者露出陰戶之外。妊婦必至小產。或更糜爛。懷孕未滿四個月者。與脫出極少者。尙不難整復。其法先靜臥。不可稍動。高墊臀部。清洗兩手。再用下方之消毒藥水。精洗手指及陰部後。

2% Acid carbol los.

500.0.

五十倍石炭酸水

五〇〇〇〇

插入手指於陰戶內。輕輕整復之。整復後。尙須靜臥數日。以後禁止交媾與努責。大便閉結時。宜服輕瀉藥如蓖麻子油等。以通之。防再下垂。脫出多者。非請教醫生不可。

### 二十九 會陰破裂自醫法

女子陰戶與肛門之間。名會陰。生產時極易破裂。遇強姦或跌撲時。亦往往破裂。破裂多者。須請醫生施縫合手術。破裂少者。可自醫之。其法。須靜臥不可少動。撒下方之藥粉於破裂處。緊並兩腿。覆以精製綿花。(藥房中有之)再以布包之。

Dermatol

10.0

台爾麻託爾

10.0

每小便後。必用下方之藥水洗淨。再撒藥粉。

2% Bor. los

500.0

五十倍硼酸水

500.0

結合後。尚須靜臥數日。以後禁止房事及劇烈之運動數月。否則癢痕未固。仍易裂開。

### 三十 陰臭自醫法

男女陰部之惡臭。均由不潔所致。宜每日洗滌。臭即漸減。如用下方之藥水洗滌。効力更佳。

2% Alun los

500.0

五十倍明礬水

500.0

此藥水可自製。取明礬二錢。溶於溫水十兩中即成。

若惡臭之原因。由於子宮內膜炎。子宮癌等疾病者。須請醫生治愈其病。臭方能除。

### 三十一 陰戶乾燥自醫法

交媾時陰戶分泌一種液體。以使滑澤。所謂淫津是也。而身體衰弱者。有神經病者。患慢性白濁者。則交媾時淫津減少。或竟全無。不但無興味。反覺苦痛。醫治之法。以滋補身體爲最要。患慢性白濁者。及早治愈之。常服魚肝油。稍有效力。

### 三十二 陰戶翻花自醫法

陰戶翻花者。陰戶翻出陰門之外也。多發於產後。與子宮下垂可以大小區別之。下垂之子宮大。翻出之陰戶小。如久不納入。往往糜爛。此時宜靜臥。不可稍動。洗淨兩手。再以下方之藥水。精洗手指及翻出之陰戶後。以手指輕輕納入之。覆精製棉花（藥房中有之）於陰戶口。以布緊包之。

2% Acid carbonic los.

500.0

五十倍石炭酸水

五〇〇.〇

納入後。須再靜臥數日。以後尙須禁止房事及劇烈之運動數月。否則復翻出。

### 三十三 鎖陰自醫法

男女秘密病自醫法 女子部

鎖陰者。因陰戶周圍之筋。知覺過敏。稍受刺戟。即痙攣而收縮。致不能交合。惟處女有之。並非無陰戶。或陰戶不通也。自醫之法。可購下方之藥桿。插入陰戶。俟藥桿熔後。而交媾。數次後不必再用藥桿。

*Suppositoria morph. mur.* 鹽莫陰戶坐藥

### 三十四 陰吹自醫法

我人之腸中。有大腸菌棲息其間。發生氣體。滿則排出而發聲。是為放屁。若此菌侵入陰戶。則亦發生氣體。向外排出時。亦發聲響。是名陰吹。概發於睡後翻身時。自醫之法。以棉花團浸濕僵里設林 *Chrysein*。納入陰戶。則陰戶中之大腸菌。日漸死滅。陰吹之病亦除。

### 三十五 陰部生毛法

陰部無毛。東方諸國。以為不祥。若常塗下方之藥水。必可漸漸叢生。

*Rosoroin* 1.5 里曹爾醒 1.5

*Aoid Tannic* 1.5 單寧酸 1.5



Glycerin 3.0 儻里設林 11.0

Ol Balsam 100.0 拔爾撒謨油 100.0

Alkohol 150.0 酒精 150.0

上混和外塗用。

### 三十六 異物誤入陰戶自醫法

幼女誤以豆類玩具等塞入陰戶。或婦人因手淫以蘿蔔、芋頭、人造陽物等插入陰戶。如入深處。不能取出時。可用五十倍石炭酸水。2% Acid carbol sol. 清洗。鏟子。入陰戶內取出之。若再不能取出。則須請教醫生。

### 三十七 陰戶疼痛自醫法

陰戶內疼痛。非由房事過度。即因陰戶內生外症。自醫之法。可購下方之藥球。插入陰戶。

Suppositoria Scopol 黃荖子宮坐藥

### 三十八 乳房痛自醫法

男女秘密病自醫法 女子部

乳汁過多。往往脹痛。患生殖器病之婦人。亦常作痛。但並不紅腫。故非外症。自醫之法。可用浸濕溫水之絨布包之。劇痛者。塗以下方之油藥。

*Ext scopol* 1.0 黃蓉膏 1.0

*Tchthyol* 10.0 伊天哇爾 10.0

*Vasselin* 20.0 凡士林 110.0

上混和外塗用。

三十九 乳癰自醫法

是因微生物侵入乳房所致。先生硬塊。痛甚。後漸紅腫。再進則化膿而反軟矣。全身發熱。初起時。即宜塗下方之油藥。

*Ung. Hydrargyri* 10.0 灰白軟膏 100.0

且吸出乳汁。不使膨脹。更以帶提縛乳房於肩上。或可消散。不致化膿。如不能授乳。而乳汁仍多。宜服下方之瀉藥。且用清淡之食物。

*Ol Ricini* 20.0 蓖麻子油 110.0

上量一次服完。

既化膿者宜速請醫生開刀。若待自潰。反難收口。

#### 四十 乳癌自醫法

乳癌多生於三十五歲以後之婦人。初於乳房內部生小核。漸次增大。痛亦增加。乳房表面生磊磊之塊。後更延及腋窩部。若不及早醫治。漸漸衰弱而死。根治之法。須請醫生割除。自醫之法。不過減輕苦痛。即用下方之藥水洗淨後。

0.5% Kalii permanganic. los. 500.0      一二倍過錳酸鉀水 五〇〇〇〇

塗以下方之油藥。

Jod	1.0	沃度	1.0
Kalu Jodati	10.0	沃剝	1〇〇〇
Vasselin	100.0	凡士林	1〇〇〇〇

上混和外塗用。

#### 四十一 放腳易大法

男女秘密病自醫法 女子部

女子纏足不適衛生。既為社會所公認。未纏者果可不蒙其害。既纏者不可不放大之。世有足雖放而仍不增大者。是因未得其法也。若每日用生薑汁水或芥子汁水洗足。則自可逐漸增大。但不可過濃。否則皮膚紅腫而起泡。多走亦易增大。若內服下方之藥水。則効力更佳。

Tinct Digitalis	1.0	毛地黃丁幾	1.0
Rot wein	10.0	赤葡萄酒	10.0
Syrup simple	10.0	單糖漿	10.0
Aq. Com.	80.0	熱水	80.0

上為一日量。分三次服。每飯後服一次。

#### 四十二 放脚不使過大法

放脚者往往不增長而非常加肥。致式樣極不美觀。是宜於放脚時。注意鞋襪之式樣。以預防之。已達適當之肥度。即停用放脚法中所開各藥。改用下方之藥水洗足。

1% Acid Tannic los      500.0      百倍單寧酸水      500.0

此藥水用量甚多。以自製爲廉。其法向藥房中購單寧酸一瓶。秤其一兩。溶於溫水百兩中卽成。

#### 四十三 處女鑑別法

鑑別是否處女。以處女膜之有無最確實。處女膜者。封閉陰戶口之膜也。處女時封閉陰戶口之半。旣出嫁者。則破碎。惟留其痕跡。處女膜未破者。固可確斷其爲處女。而旣破者。不可卽斷定其爲非處女。因曾經劇烈之跌撲或運動者。處女膜亦往往破碎也。除處女膜外。鑑別處女之法。可以皮膚及乳房爲標準。處女之皮膚甚緊。非處女則鬆。處女之乳房堅硬。非處女則弛軟。大抵如此。然難定顯明之界限。



男女秘密病自醫法 卷下

醫學士 汪企張 校閱  
藥劑士 姚昶緒 纂著

雜治部

一 頭髮美麗法

頭髮非特能保護人身最要之腦。且爲修飾上必要之物。而婦女尤甚。蓋頭髮乃美人之章標。如果有優美之頭髮。卽面貌稍醜。亦無甚妨礙。

欲使頭髮美麗。當先注意頭髮之衛生。與生頭髮處皮膚之衛生。所謂皮膚之衛生者。不外早夕依規則之方法洗滌之也。此外身體之衛生。亦當特別注意。卽多食滋養品。常爲適宜之運動。精神不使過勞。夜間早眠。此外若新鮮之空氣。溫和之日光。亦爲健康身體所不可缺者。

髮當日日梳之。櫛不可過硬。亦不可過柔。且必須時置熱湯（放入礪砂 Borax 少許更佳）中洗之。

頭髮每月至少須洗滌三次。婦人塗油於頭髮上。易生污垢。若久不洗滌。則髮與髮相結。終至難于梳通。洗髮時。並當洗滌頭皮。用硼砂水洗滌更佳。取安息香酸 Acid Benzoic 少許。和入綠肥皂 Sapo Hyalin 再和適量之酒精。塗於絨布上。用以擦髮。擦畢用溫水洗之。頭髮非常美麗。

洗髮後。當用乾手巾揉之。再用冷水洗之。塗酒精少許於頭皮上。用冷水洗頭。能刺戟頭皮。使血液流通。補助髮之發育。惟不可用極冷之水。每一星期。在日光中摩擦頭皮二次。亦能使毛髮發育佳良。

將頭髮緊結一處。衛生上大有損害。致頭髮或拔或斷。甚至釀成外症。故以寬鬆爲宜。又不可用烈性之香油。及粗惡之香水。當用佳良之椿油。及良質之髮油。惡劣之油類。能損傷毛髮。萬不可用。苟能謹守上記之衛生法。雖粗惡之毛髮。亦能漸漸美麗。

## 二 頭髮拳縮自醫法

頭髮拳縮。多屬先天性。亦有因營養神經障害而起者。或因有微生物附於毛根而發。若垢面蓬髮之人。頭髮自然捲縮。此乃例外者。自醫之法。可塗以下方之油藥。即取呀



羅仿謨 Chloroform 六兩。加入椿油五斤中。用旺火溶解之。俟其冷後。濾過之。加入適當之香料即成。

### 三 預防白髮法

髮之斑白。由人之衰老或勞苦悲戚過度所致。若能舒泰心境。滋補身體。頭髮自不易斑白。

### 四 預防脫髮法

脫髮原因於衰老及病後產後等。欲防脫髮。宜滋補身體。預防疾病。減少生產。如發生疾病。宜及早醫治。產後注意調養。

### 五 瘦者增肥法

人之肥瘦。全視心境與營養。若能減除一切欲望。則心境自泰。更多食脂肪。無有不漸增肥者。

### 六 肥者減瘦法

人太肥胖。往往有損美觀。若能素食。則肥者自漸清秀。葷食中魚類與牛乳雞卵等尚

可稍食。肉類能使人增肥。宜忌之。勞心力。有肥者減瘦之効。

### 七 長身法

東方人普通之體格。男子身長五尺。體重一千三百九十兩。女子身長四尺八寸。體重一千二百八十兩。爲平均之標準。然我國以前偉大之人頗多。現漸減少者。其原因一由於居坐之時太多。二由於久不强鍊身體。近來有美人明第司氏者。發明長身法。能使脊柱高出六寸。蓋人之脊髓骨。共有二十四個。各骨之間。有軟骨。故能屈伸自在。但各軟骨。不絕受上方之壓迫。漸失其彈力而收縮。終至脊骨彎曲如弓形。故早起時。脊較夜間高出幾分。此因夜間身體平臥。軟骨復原也。由此觀之。若能平正姿勢。不使身體前屈。必能延長若干。

美國大醫家司普林迦氏。發明用電氣延長身體之法。其法通電流於膝之軟骨。使軟骨之動作敏活。以助其長成。氏曾實行此方法。而收極大之效果。云。又法國大醫家司普藥西愛氏。亦發明一種長身法。用大麥、燕麥、小麥、裸麥、乾甘蔗、砂糖、六種。混和一處。每日取二匙。用水六合煎之。約煎三小時。用毛篩濾之。再加水成三合服之。則能使小

兒迅速發育。脊柱伸長。現在德國皇太子。常行此法。太子年十七歲。第二皇子年十六歲。均已身長五尺五寸云。

### 八 防生皺襞法

皮膚生皺襞。由缺少脂肪之故。多合油類。可以預防。

### 九 不眠症自醫法

夜不安眠。則日無精神。幾不能應酬任事。其原因大概由於神經衰弱。精神不寧。故醫治之法。以涵養精神爲最要。神經衰弱者。宜常服下方之藥水。

Kalij bromat

2.0

臭剝

11.0

Syrup. Auranti

10.0

橙皮糖漿

100.0

Aq. Com.

80.0

熱水

900.0

上爲一日量。分三次服。飯後服下。

冷水浴有強壯神經之効。可一試之。但須由漸而來。逐漸低減浴水之溫度。庶幾不致有感冒等患。既成習慣後。則雖冬雪嚴寒。亦不感冒矣。晚上忌飽食。因飽食後。精神興

奮。難以安眠。大便秘結者。腦筋充血。亦難安眠。故便秘者。宜每晨服下方之緩和通便藥。如尚不通便。可每晨服二包。

Sal. Carolin fact

20.0

人工加落林鹽

110.0

上爲一包。每晨服一包。沖開水服下。

煙酒能興奮精神。切須戒絕。每晚睡前不可過用心思。亦不可觀有興味之書籍戲劇及賭博高談等。宜散步於室外。若既數日不得安眠。精神困頓。急需圖一夕之安眠者。可服下方之藥粉。

Veronal

0.5

匯羅那兒

0.5

Sacchar lact

0.5

乳糖

0.5

上爲一包。臨睡服。

### 十 嗜眠自醫法

嗜眠者無論如何睡眠。終不滿足。精神疲倦。常思睡眠。致不能應酬任事。其原因大概由腦中少血所致。醫治之法。以滋補身體。常行適宜之運動爲最要。更觀有興味之書

籍聽有興味之談話。以興發其精神。常服下方之補血強壯藥。久後自有効力。

Chinin Ferri citric 0.3 枸橼酸鐵金雞那 〇・三

Calcium hypophosphor 1.0 次亞磷酸石灰 一・〇

Sacchar. lact 1.0 乳糖 一・〇

上分三包。一日量。飯後隔一小時服下。服此藥粉期中。須忌茶。否則失其効力。

### 十一 顏面黃斑除去法

顏面生黃斑之原因。或由於婦人之妊娠及生殖器病。或由於多受日光之射照。或中藥物之毒。或因顏面常受硬物之摩擦。須先探其原因而除去之。否則治愈後仍復發。自醫之法。可購下記二種油藥。

(甲) Sublimat 0.15 昇汞 〇・一五

Lanolin 3.0 拉諾林 三・〇

Vaseline 30.0 凡士林 三〇・〇

上混和塗布用。

(N) 10% Bor Vaseline

30.0

十倍硼酸凡士林

二〇.〇

先每日一二回塗甲種之油藥。俟皮膚發熱將剝脫時。改塗乙種之油藥。皮膚復原後。再塗甲種之油藥。如此交換。至生斑之皮膚自然脫落而止。

十一 面皰自醫法

既生之面皰。可用兩拇指之爪甲。從兩側壓之。則皰心壓出。能自消失。但仍續發不已。宜用下方之油藥。每日塗擦面部以預防之。

Sulfur milk

硫黃乳

Aether sulfuric

硫酸以脫

Kali carbonic

炭酸鉀

各一〇.〇

Glycerin

aa10.0

偲里設林

上混和塗布用。

十二 雀斑除去法

雀斑大而數少者。亦可用點痣法除去之。若斑細而數多者。可時時塗下方之藥水於

生斑部。

1% Sublimat lös. 50.0 百倍昇汞水 五〇〇

但此法收効甚緩。若欲速効。可每日塗布下方之藥水二三回。

Kali hydroxyd 1.0 苛性鉀 一〇〇

Tinct. Benzo. 3.0 安息香丁幾 三〇〇

Alkohol dilut 100.0 稀酒精 一〇〇〇

上混和塗布用。

十四 黑痣除去法

點痣之法甚多。或易侵及深部與四周之皮膚。致生大癩痕。或須請教醫生。普通人不能自用。下記之法。係日本緒方醫學博士所發明。爲點痣法中最安全而易行者。且殆不遺留癩痕。其法以洗淨之糯米數粒。浸於下方之藥水中。

10% Kali hydroxyd lös. 1.0 十倍苛性鉀液 一〇〇

經六七小時後。米粒膨脹。而變透明。乃傾去藥水。將米粒研成糊狀。用針尖取其少許。

點於痣之中央。但須留意。不可塗及痣外之皮膚。歷二三小時後。洗去之。視痣之大小及色之濃淡。約點三次至五次後。必可全失。末一次所點之藥。不可洗去。宜聽其自脫。初留淡紅色之癍痕。後漸消滅。此法之點痣藥。新鮮者方有效力。陳舊者不可用。

### 十五 口臭自醫法

口臭之原因。或由胃腸病。或由口中發熱。口中發熱之原因。或由多吃烟。或由多食葱蒜等刺戟性物。或由內服含水銀質之藥物。除去原因。爲治療之上策。蓋原因不除。雖日日施治。終難斷根。自醫之法。可購下方之藥水。時時嗽口。但不可嚥下。

2% Kali chlorat lss.      500.0      1% 鹽剝水      五〇〇.〇

Öl menthol      1 grth.      薄荷油      一滴

上混和嗽口用。

### 十六 齒痛自醫法

齒痛之原因。大概由於蟲蛀。故平日清潔齒牙。可以預防齒痛。最好每飯後。刷牙一次。牙粉須用極細者。有粗粒者。能傷齒牙。不宜用。發見蛀洞時。宜速請牙醫生填補。否則



愈蛀愈大。即發齒痛。痛時可用棉花浸濕下方之藥水。塞於痛處。

Kreosot

3.0

結麗阿曹篤

三.〇

Ol menthol

1 gtt.

薄荷油

一 滴

Aq. dest.

7.0

蒸溜水

七.〇

上混和外用。

若一時不及購上方之藥水。則置樟腦少許於痛處亦可。若齒痛甚劇。上兩方均無效。則購下方之藥水。以棉花浸濕。塞於痛處。必定有效。惟有效之時間甚短。每隔十分鐘。須換藥一次。此方之藥性頗劇。祇可於齒痛極烈時。偶一用之。不可多用。

2% Cocain mur. lös.

5.0

五十倍鹽酸古加因液

五.〇

齒痛愈後。仍須速請牙科醫生填補。或將蛀齒拔去。另裝假齒。以絕後患。

### 十七 睡中齒軋自醫法

齒軋之原因。多由於精神不寧。故欲治齒軋。當以安靜精神為第一要務。且禁止房事過度。飲酒。吸煙。飽食等。冷水浴亦有強健身神。治療齒軋之效。如尚不治。每夕睡前可

服下方之藥水。

Kali brokat	2.0	臭剝	1.0
Syrup Auranti	10.0	橙皮糖漿	10.0
Aq.	100.0	熟水	100.0

上量分三次服。每夕睡前服一次。

十八 夢話自醫法

夢話之原因。亦由於精神不寧。療法與齒軋同。

十九 齒牙潔白法

齒牙汚黑。雖非疾病。而易招人厭惡於交際上頗受影響。每日用精良之牙粉刷牙。雖可使之清潔。而黑者自黑。仍不能純白。此時可購下方之藥水。用棉花浸濕。洗擦齒牙。則數日後必可純白。

Acid Hydrochlor dilut	10.0	稀鹽酸	10.0
Aq.	10.0	水	10.0

上混和擦齒用。

二十 指爪潔白法

每日用棉花浸濕下方之藥水。揩拭指爪。則自潔白。

Acid Hydrochloric dilut 10.0

稀鹽酸

10.0

二十一 油灰爪自醫法

油灰爪不可用刀扞。否則愈增愈厚。常塗下方之藥水。自軟而易剪。且不易增厚。

5% Acid Boric Glycerin 10.0

十倍硼酸僵里設林

10.0

二十二 狐臭自醫法

有狐臭者。體質多不良。宜服滋補品。強壯其體質。使治愈後。不致復發。自醫之法。每日用下記甲方之藥水。洗滌腋窩。拭乾後。用乙方之粉藥。塗擦腋窩。

(甲) 0.1% Kali permanganic. 100.0

千倍過錳酸鉀液

100.0

上洗滌用。

(乙) Acid Salicyl.

5.0

撒酸

5.0

男女秘密病自醫法 雜治部

一三

男女秘密病自醫法 雜治部

一四

Zink oxyd

5.0

亞鉛華

5.0

Amyl

10.0

澱粉

10.0

上混和塗擦用。

此外更須內服下方之丸藥。

Pill. kreosot

結麗阿曹篤丸

日服三次。每飯後服二粒。

二十三 多屁自醫法

是因腸中醱酵異常。發生氣體所致。常服下方之丸藥。則特別之醱酵漸止。氣體自不發生。

Pill. kreosot

結麗阿曹篤丸

日服三次。每次服二粒。飯後服下。

大便閉結者。更須服下方之藥水以通利之。

Mag. sulf.

15.0

硫酸

15.0

Pinct amara	1.0	苦味丁幾	1.0
Syrup. simple	20.0	單糖漿	20.0
Aq. Com.	80.0	熟水	80.0

上爲一日量。分三次服。每飯前一點鐘服一次。

二十四 汗斑自醫法

祇有斑而無水疱者。可用下方之藥肥皂。每日洗擦。

Sapo. kalli	50.0	綠肥皂	50.0
Naphthol	2.0	那夫託爾	2.0
Glycerin	1.0	偲里設林	1.0

上混和塗擦用。

發汗過多更生水疱者。可併用下方之藥水。洗滌患部。

2% Plumb Acet. sol.	100.0	五十倍醋酸鉛水	100.0
---------------------	-------	---------	-------

二十五 手汗過多自醫法

男女秘密病自醫法 雜治部

手汗過多者。不但作事非常不便。且與人行握手禮時。易招人之厭惡。自醫之法。可用下方之藥水。每日塗擦數次。

Acid Tannic. 1.0 單寧酸 1.0

Alcohol 200.0 酒精 1100.0

Oil Rose 2gtt. 薔薇油 二滴

上混和塗擦用。

二十六 腳汗過多即腳癬自醫法

腳汗過多者。足趾間必癢甚。俗所謂腳癬者是也。決不可以爪搔爬。蓋搔破後。即腐爛也。宜每日洗淨後。撒以下方之藥粉。腳汗極多者。須每日洗滌撒藥數次。則汗自少而不癢矣。

Acid Salicyl 1.5 撒酸 1.5

Amyl 5.0 澱粉 5.0

Talc 43.5 滑石 43.5

四三.五

上混和撒布用。

### 二十七 爛腳自醫法

有脚癬者搔破後。則腐爛而成爛腳。此時不宜再用常水洗滌。須用下方之藥水。

2% Bor los                      200.0                      五十倍硼酸水                      1100.0

既洗淨後。撒以下方之藥粉。且夾清潔之紗布（藥房中有之）於趾間。

Iodoform                      5.0                      沃度仿謨                      5.0

Pulv. Acid Bor.                      5.0                      硼酸末                      5.0

上混和撒布用。

### 二十八 手足生繭自醫法

胼胝因皮膚常受硬物之壓迫而發生。實天然抵抗壓迫之妙機也。但生長過厚。則作事不便。且受壓迫時。較無胼胝處痛更甚。不可不除去之。除去後。如仍受壓迫。則仍發生。除去之法。以切除為最簡單。而自己切除。不能斷其根。切後仍漸增厚。須請醫生施術。方能斷根。自醫之法。可用下方之藥水。每日塗布數次。久後漸漸化軟而脫落。

Acid Salicyl 1.0

撒酸

1.0

Colodium 9.0

古羅地和

九.0

上混和塗布用。

### 二十九 酒齧鼻自醫法

酒齧鼻之原因。大抵為多飲酒類。然亦有素不飲酒之人而患酒齧鼻者。其原因或為胃腸有病。或為常受嚴寒。女子有生殖器病者。亦往往發酒齧鼻。更有自父母傳遺者。初發時。惟飲食精神感動。或遇寒冷溫熱時。鼻部潮紅。過後即消失。後則小血管擴張。後不復收縮。常稍帶紅色。更進則發生多數鮮紅色之丘疹。甚者發生膿疱。而放惡臭。皮膚肥大。而生鼻瘤。病人自己惟覺癢而熱。發生膿疱者。則更覺疼痛。醫治之法。第一須除去其原因。由於飲酒者。戒絕酒類。由於胃腸病。或生殖器病者。速請醫生治療之。自醫之法。每日用下方之油藥塗布數次。

5% Ichthyol olive 30.0

二十倍伊天哇爾橄欖油 二〇.〇

此外更內服下方之藥水。



Talcum 10.0 伊天哇爾 10.0

Aq. dest 20.0 蒸溜水 110.0

上混和。每日朝夕二次。服十滴至十五滴。可用開水沖服。

膿疱中之膿液。須排去之。紅腫甚者。須請醫生用消毒之針。穿刺腫脹部。生鼻瘤者。請醫生切除之。

### 三十 油汗自醫法

有油汗者。身上常不清潔。衣服極易污穢。且有惡臭。面部更油光滿面。頗不雅觀。自醫之法。可用綠肥皂 Sapo Ralu 洗浴後。撒下方之藥粉於發汗最多之部。

Acid Salicyl 1.0 撒曹 1.0

Amyl 20.0 澱粉 110.0

Talk 30.0 滑石 110.0

上混和撒布用。

### 三十一 鬚瘡自醫法

男女秘密病自醫法 雜治部

先於鬚根部生赤色硬固之小丘疹。後變膿疱。膿疱乾涸。則結痂皮。拔去患部之鬚。流出膿液少許。毛根被玻璃狀之厚鞘。若不於發病之初。速即治愈。則變為慢性。極難全治。髮髻亦漸脫落。自醫之法。初發者。先剪短鬚髻。而後以紗布浸濕五十倍硼酸水。  
% Bor los. 包於患部。乾後再浸濕。或塗以下方之油藥。但膿疱中之膿液。須排去之。

5% Acid Salicyl Salb      20.0      二十倍撒酸軟膏      110.0

上塗布鬚髻部。

症狀既稍減。不再發生膿疱時。可改用下方之油藥。

Acid Tannic.	5.0	單寧酸	5.0
Sulfur milk	10.0	硫黃乳	10.0
Zink oxyd	17.5	亞鉛花	17.5
Amyl	17.5	澱粉	17.5
Vaseline	50.0	凡士林	50.0

上混和塗布用。

本病極易復發。故治愈後。鬚髯部須常清潔乾燥。宜時時用稀酒精洗滌之。夏季常發汗時。更宜撒布滑石粉。

### 三十二 鬚髯不生法

鬚髯或以爲美觀。特留成種種式樣。或則厭惡之。日日剃除。若用下法。鬚髯自脫落。且施行數次後。殆不再生。其法以下方之藥。塗於鬚髯部。半小時後。即自脫落。

Calcium sulf.	20.0	硫化石灰	100.0
Ung. Glycerin	10.0	佩里設林軟膏	100.0
Amyl	10.0	澱粉	100.0

上混和塗布用。

### 三十三 小腸氣自醫法

小腸氣因腹內之筋寬弛。腸之一部墜下也。根治之法。須請醫生施手術。平時忌勞動。勞動後。易復發。發作時。宜靜臥。以棉花浸濕下方之藥水。覆包之。

2% Plumb Acetic. Ios      500.0      五十倍鉛糖水      5000.0

男女秘密病自醫法 雜治部

且內服下方之藥粉。使通利大便。墜下之腸。自易回復。

Mag. sulf. 20.0 硫苦 110.0

上沖開水。一次服完。

回復後。即向藥房中購小腸氣帶。壓置發作之處。此帶宜常用。平時之大便。亦須留意。如閉結。易發作。宜即服蓖麻子油一湯匙以通之。

三十四 痔瘡自醫法

痔瘡欲斷根。須請醫生施手術。若圖一時之輕快。則外痔可塗以下方之油藥。

Icthyol 10.0 伊天哇爾 100.0

Vasselen 10.0 凡士林 100.0

上混和塗布用。

出血多者。則用下方之油藥。

Iodoform 3.0 沃度仿謨 20.0

Acid Tannic. 6.0 單寧酸 60.0

Vasselen

30.0

凡士林

110.0

上混和塗布用。

### 三十五 內痔自醫法

內痔購下方之藥桿。插入肛門之內。

Suppositoria Ichthyol

伊天哇爾肛門坐藥

出血多者。改用下方之藥桿。

Suppositoria Acid Tannic.

單寧酸肛門坐藥

### 三十六 痔瘻自醫法

肛門周圍生成之瘻管。名痔瘻。穿通者。名全痔瘻。不穿通者。名不全痔瘻。不全痔瘻更有生於肛門外與肛門內之別。欲根治。須請醫生施手術。自醫之法。只可減輕苦痛。全痔瘻與肛門外之不全痔瘻。可塗下方之油藥。

10% Ung. Jodoform

10.0

十倍沃度仿讓軟膏

100.0

生於肛門內之不全痔瘻。可插入內痔自醫法中之藥桿。

男女秘瘡病自醫法 雜治部

二三

三十七 頑癬自醫法

頑癬與疥癬異。因寄生一種細菌而發。無傳染性。概生於陰部、大腿內側與陰囊接觸之處、腋窩、乳房下面與胸廓接觸之處等。先生赤色高起之小斑。漸次增大為圓板狀。癢甚。周緣生丘疹、水疱或痂皮。蔓延極緩。而無自愈者。往往達數年數十年不治。欲治愈之。須有長久之耐性。不可間斷。藥物中以下方之藥水最佳。

Sublimat	1.0	昇汞	1.0
Acid Carbol.	2.0	石炭酸	1.0
Acid Salicyl	5.0	撒酸	5.0
Alcohol	100.0	酒精	100.0

上混和塗布用。

上皮肥厚甚者。須先塗醋酸 Acid Acetic。使上皮剝離。俟生新皮後。乃塗布上方之藥水。方能奏效。

三十八 疥癬自醫法

疥癬因皮膚中寄生疥癬蟲而發生。皮膚白而非薄之人。能從皮膚上透見之。大概由同衾而傳染。我國人以爲疥癬能排泄濕氣。不可醫治。實謬說也。症狀以劇癢與發疹爲其特徵。夜間就褥後。癢更劇。因疥癬蟲得褥中之溫度。運動更活潑也。概發生於指側、腕、肘屈面、肘、腋周圍、腋窩、陰囊、陽物、大腿內側、臀部、膝、臍、臍部、婦人乳房等處。發生後。宜及早醫治。否則蔓延甚速。且誘發濕疹、大水疱、癩腫等。雖不致死。受累無窮矣。自醫之法。先洗浴。清潔皮膚。而後塗擦下方之油藥於全身（但除去頭部及顏面）

Beta-naphthol	15.0	倍他那夫託爾	15.0
Sapo-Kali	50.0	綠肥皂	50.0
Creta praeparata	10.0	白堊	10.0
Adeps. Sulfus	100.0	豬油	100.0

上混和塗擦用。

以後再塗擦此油藥於癢處約二三日。俟癢感消失後。再洗浴。換去全身之衣服。換下之衣服。洗滌後。放置二星期。方可用。一家有數人同患疥癬者。須同時醫治。否則互相

傳染終無全治之日。

顏面及頭髮部之疥癬。可用下方之藥水以治之。

Beta-Naphthol	10.0	倍他那夫託爾	100.0
Acid. Salicyl	5.0	撒酸	5.0
Alkohol	100.0	酒精	100.0

上混和塗擦用。

三十九 疥瘡自醫法

疥瘡極易傳染。先於四肢之屈側、頸項、軀幹兩傍等發生濕疹。癢甚。後漸蔓及全身。重者更生膿疱。且發寒熱。自醫之法。每日用石炭酸肥皂洗浴後。塗以下方之油藥。

Sulfur sublimat	10.0	昇華硫黃	100.0
Zink oxyd	10.0	亞鉛花	100.0
Pix liquida	10.0	木他兒	100.0
Adeps suillus	30.0	豬油	300.0



上混和塗擦用。

除上法外宜更服下方之鮮毒丸藥。

Pill Asia

100.0

亞細亞丸

百粒

每日服三丸。每次服一丸。飯後用開水送下。連服一月後宜停止二星期。依上法每日醫治不輟。大約二三星期至遲一月必可全愈。

四十 癩風自醫法

本病因皮膚中寄生一種小植物而發生。概發於壯年。不傳染於人。已患過者。治愈後。常常復發。專發於胸、腹、頸、臂之內面、腋窩、乳房與胸相觸之處。陰囊與大腿相觸之處。等。生於顏面者甚少。手足則絕對不生。初生黃褐色或暗褐色小豆樣大之斑點。漸漸增大。患部常覺微癢。以爪搔之。上皮剝脫。若不醫治。無自退者。自醫法可購下方之肥皂劑。每日朝夕塗擦二回。數日後。上皮脫落而愈。

Sapo. Kalii

100.0

綠肥皂

100.0

Acid. Salicyl.

3.0

撒酸

11.0

男女秘密病自醫法 雜治部

#### 四十一 紅色陰癬自醫法

本病專發於壯年。概生於大腿內側與陰囊相觸之處。症狀患部生淡紅色或暗褐色平滑圓形之小斑。與健康皮膚有顯明之界限。發汗時覺癢。蔓延極緩。以爪搔之。則上皮剝脫。自醫之法。與癩風同。

#### 四十二 癩癧頭自醫法

本病因頭皮中寄生一種寄生菌而發生。有傳染性。不但人類間互相傳染。更能從人傳染於家畜。從家畜傳染於人。有乾性與濕性之別。乾性者。初於髮根周圍之皮下。生黃色之小點。漸漸增大。至一二星期後。大如小豆。變成黃色臍窩狀之圓板。中央貫通毛髮。鄰接之圓板。從漸漸增大而互相融合。終蔓及全頭。有一種劇臭。與鼠臭相似。歷久不治者。上皮脫皮。堆積黃白色石灰狀之厚層。患部之頭髮。失光澤。如覆灰塵。易斷易脫。頭髮脫落後。永不再生。自醫乾性癩癧頭之法。先塗下方之油劑。使圓板軟化。

1% Beta-naphthol Olive 20 0

百倍那夫託爾橄欖油 110.0

次除去圓板。以綠肥皂 Sapo kalin 洗滌之。而後逐一輕拔頭髮。拔去易脫者。留其健

全者。再以綠肥皂洗滌之。俟頭皮乾後。塗以下方之酒精劑。殺滅寄生菌。

Acid carbol. 30 石炭酸 11.0

Glycerin. aa. 50.0 偪里設林

Alkohol 酒精 各五〇〇

每日依上法施治。二三月後。如頭髮無變化。可停止治療。逐日細察其頭髮部。若仍有黃色斑點發生。再施上記之療法數星期。

濕性癩癧頭。先於頭髮部生小水疱。癢甚。後漸變為膿疱。向周圍蔓極速。患部之頭髮。雖亦易脫落。而不若乾性之甚。愈後。年幼者尚能復生。惟較稀少耳。自醫濕性癩癧頭之法。每日數回用綠肥皂洗淨後。塗以下方之油藥。洗滌塗藥愈勤。治愈愈速。膿疱中之膿汁。須於洗滌時。破其皮而排去之。

Pithyrol 披天勞爾 10.0 1〇〇〇

Vasselin 凡士林 10.0 1〇〇〇

上混和塗布用。

男女秘密病自醫法 雜治部

上方之油藥。効力雖佳。而臭甚。如厭惡臭。可改用下方之油藥。効力亦佳。惟價甚貴耳。

Trignol

10.0

里爾諾爾

100.0

Vasselin

10.0

凡士林

100.0

上混和塗布用。

#### 四十三 禿髮症自醫法

禿髮症有得自先天者。有發於後天者。先天性禿髮症中。有全身無毛。連汗毛亦無者。有祇限於頭髮之一部者。全身無毛者中。亦有數月或一二年後。漸生毛髮者。亦有終生不生者。後天性禿髮症。概發於患梅毒。精神病。萎黃病。傷寒。紅痧。天然痘。白癬。及頭髮部外症之後。初見頭皮上有糠糝狀之落屑。後頭髮即日脫落。致漸次稀少。而成禿頂。亦有並無糖糝狀之落屑。而頭髮即脫落者。先天性禿髮症。無法可治。後天性者。第一須注意於原因。由患梅毒而脫髮者。梅毒治愈後。不再脫髮。由他病而脫髮者。治愈原因病後。佳良其營養。脫髮亦止。既脫之髮。欲使之再生。頗不容易。故患禿髮症者。以預防未脫之髮為最上策。預防之法。每日用綠肥皂 *Sapo. Kali* 精洗頭髮。用肥皂

洗後。先灌注微溫水。次灌冷水。乃以手巾拭乾頭髮。隔一二小時後。塗以橄欖油。或用浸濕淡鹽湯之絨布摩擦頭髮。亦有預防之効。頭髮既脫之部。可時用酒精或生薑擦之。以圖再生。若用下方之藥水。則効力較著。

Tinct. Benzoi.

2.0

安息香丁幾

1.00

Acid Salicyl

1.0

撒酸

1.00

Cognac

200.0

勃蘭地酒

1100.00

上混和塗擦用。

#### 四十四 匍行疹自醫法

本病多發於潮濕之候。著濕衣服後。亦往往發生本病。有傳染性。一人發生後。常傳染全家。症狀分有界限性與廣汎性二種。療法亦各不同。茲分述如下。

(一)有界限者。先於皮膚之一部。生一個或數個赤色稍高起之小斑。漸次增大。一二日後。狀若圓盤。中央如鱗屑。周圍有赤色之輪。疹向周圍蔓延時。中央之鱗屑。漸消失而復為尋常之皮膚。或帶微赤。周緣之症狀反劇。數個之輪環相融合。達手掌大以

上。中央復原之皮膚。間有復發疹者。如是反覆不已。致生成數個輪環。重者更發生小水疱或小膿疱。此水疱與膿疱。或為輪狀。惟生於周緣。或散亂而蔓及患部之全體。

(二)廣汎性者 先於各部之皮膚。發生紅色圓形之疹。蔓延甚速。數日後。既及全身。又數日。疹子漸漸退色。脫皮而消失。患部惟稍留黃色。或中央消退。而周緣蔓延。變成輪狀。

以上二種患部之皮膚。均常覺癢。自醫之法。有界限者。每日用石炭酸肥皂(藥房中有之)洗滌後。貼以下方之膏藥。

Emplast. Acid. Salicyl (10%) 30.0      百倍撒酸硬膏      二〇〇〇

廣汎性者。每日用石炭酸肥皂洗滌全身。而洗浴前一小時。塗擦下方之藥肥皂。洗浴時洗去之。

Acid. Salicyl.      5.0      撒酸      五〇〇

Pix liquida      25.0      木他兒      一五〇〇

Sapo kalii      150.0      綠肥皂      一五〇〇〇

上混和塗擦用。

洗浴後。更塗擦下方之油藥。若逐日行之無間。約十日即愈。

Sulfur	10.0	硫黃	100.0
Ol Bergamot	2.0	倍加麻脫油	11.0
Adeps. Sullus	200.0	豬油	1100.0

上混和塗擦用。

四十五 腦漏自醫法

吾人俗名之腦漏。實非腦漏。不過鼻中發熱而紅腫。致鼻涕增多。或鼻內潰爛。流出極臭之膿液耳。腦爲人生之主宰。腦而漏。尙有生理乎。其原因或由感冒。或有異物誤入鼻內。或由梅毒。癆瘵。痧子。痘子等疾病。漏出惡臭之膿液者。及原因於梅毒癆瘵者。須請醫生治療。輕者可自醫。其法先以棉花浸濕下方之藥水。塗布鼻內。且拭去鼻涕。

2% Cocain. mur. sol.      5.0      五十倍鹽酸古加因液      5.0

次再以棉花浸濕下方之藥水。塗布鼻內。

男女秘密病自醫法 雜治部

1% Protargol los.

5.0

百倍坡洛他古液

五.〇

每日依上法施治二次無間。大約一星期後即可全愈。

#### 四十六 雞眼自醫法

雞眼發生之原因與胼胝同。醫治之法亦與胼胝同。如用切除法。雞眼體嵌入皮膚中之尖端亦須摘出。方不再生。

#### 四十七 赤眼自醫法

赤眼之種類甚多。或有傳染性。或不能傳染。然其傳染之途。不若常人所謂由相視而傳染。實由於手巾。手指等。手指常與他物接觸。決不可擦眼。手巾非自備清潔者。亦不可擦眼。遊戲場。戲館。茶坊。酒肆之手巾。更無論矣。赤眼之重者。須速請醫生診治。遲則恐有失明之虞。輕者可自醫之。其法每日數次以精製棉花（藥房中有之）浸濕下方之藥水。清洗眼內。

2% Bor. los.

200.0

五十倍硼酸水

1 100.0

上洗眼用。



次滴下方之藥水一二滴於眼內。

0.3% Zink Sulf. los.      5.0      〇.二% 硫酸亞鉛水      五.〇

上裝入點眼瓶中點眼用。

眼淚多而疼痛劇者。可以精製棉花浸濕上方之硼酸水。罨包於眼外。乾後再浸濕之。

**四十八** 眼生星翳自醫法

用下方之藥水。每日點入眼內二次。此藥水可囑藥房中裝點眼瓶內。則易點滴。

Kalii Jodati      0.8      沃剝      〇.八

Nat. Carbonat      0.3      炭酸曹達      〇.二

Aq. Dest      16.0      蒸溜水      一六.〇

**四十九** 眼腐不生法

每日用精製棉花(藥房中有之)浸濕五十倍硼酸水 2% Bor. los. 洗眼數次。則眼腐不生。目光非常清明。

**五十** 流淚自醫法

男女秘密病自醫法 雜治部

眼中流淚。可用下方之藥水。每日點眼二次。

0.3% Zinc Sulf. los.

5.0

二百倍硫酸亞鉛水

5.0

五十一 耳出膿自醫法

耳出膿亦有多種。如失聰者。病在耳之深部。須請醫生診治。聽覺不減失者。病在耳之外部。可自醫其法。以棉花浸濕下方之藥水。清洗耳內。

2% Bor. los.

300.0

五十倍硼酸水

1100.0

次用噴筒。噴入下方之藥粉。

Iodoform

5.0

沃度仿謨

5.0

Pulv. Acid Bor.

5.0

硼酸末

5.0

上混和外用。

五十二 眉毛濃黑法

眉毛稀少。人無威勢。若用下方之藥水。日塗眉毛部。一二次。自漸濃黑。

Tinct. Cantharis

1.0

乾他利司丁幾

1.0

Alkohol 10.0 酒精 100.0

上混和塗布用。

### 五十三 火傷自醫法

火傷之輕重分三等。最輕者祇紅腫。稍重者生水疱。最重者生焦痂。火傷之面積。如達全身三分之一。則必致死。醫治之法。視輕重而不同。祇紅腫者。塗以橄欖油 *Olive* 或偈里設林 *Glycerin* 後。再以浸濕下方藥水之紗布包之。

2% Plumb Acetic los. 200.0 五十倍鉛糠水 100.0

生水疱者。先以針穿破之。排出其液。次以五十倍硼酸水 2% Bor los. 洗之。乃撒布下方之藥粉。用清潔之紗布包之。

Bismuth subnitric 10.0 次硝酸蒼鉛 100.0

生焦痂者。亦先用硼酸水洗淨後。塗以下方之油藥。再以清潔之紗布包之。

Bismuth Subnitric 9.0 次硝酸蒼鉛 90.0

Acid Boric 4.0 硼酸 40.0

Ianolin

70.0

拉諾林

七〇〇

Öl Olive

20.0

橄欖油

二〇〇

上混和塗布用。

五十四 少年白髮病自醫法

吾人之髮。至近五十歲而漸斑白。乃天然之生理。並非疾病。若四十歲以下之壯年人。而毛髮斑白。則係一種疾病。其原因由於毛髮中之色素減少。其所以減少之故。則概由悲傷、憂愁、勞苦等精神作用。亦有自父母遺傳者。既白之髮。無使之復黑之法。故預防於未白前。最為上策。預防之法維何。即快樂其精神。佳良其營養耳。既白者。可用染料染成黑色。染髮劑中。以下方之油藥最佳。

Argen. Nitric

1.0

硝酸銀

一〇〇

Ammonia Carbonat

1.5

炭酸安母尼亞

一・五

Vasselin

30.0

凡士林

三〇〇

上混和塗髮用。

### 五十五 圓形脫髮症自醫法

本病之脫髮。與普通之禿髮症異。脫髮之部。常爲圓形。與未脫部有顯明之界限。既脫髮之皮膚。平滑而光亮。毫無鱗屑。漸次向周圍蔓延。而終不變其圓形。或初生數個圓形之禿髮部。後互相併合。而成一個大圓形。七八個月後。全頭之髮脫盡矣。甚者眉毛、睫毛、鬚髯、腋毛、陰毛及全身之汗毛。悉行脫落。或半途停止蔓延。而禿髮部先生無色之細毛。次細毛脫落。發生平常之毛髮。但欲復舊觀。須歷數月或數年之久。亦有新發生之毛髮再脫落者。其原因或云寄生生物。或云營養不良。余意二者皆有關係。療治之法。可備下列四方之藥。逐日順次使用一通。病勢既衰退後。則每隔一日或二三日施治一通。

(一)用下方之藥水。塗擦禿髮部。次用微溫水洗滌。再灌注冷水。而後以手巾拭乾之。

Alkohol	150.0	酒精	150.0
Olive	120.0	橄欖油	120.0

2% Kali, Hydroxyd Lov 140.0 二%苛性鉀液 一四〇〇

(一)以棉花球浸濕下方之藥水塗擦脫髮部二三分時。

Sublimat 0.5 昇汞 〇・五

Glycerin 50.0 偃里設林 五〇〇

Alkohol 50.0 酒精 五〇〇

Aq. dest. 200.0 蒸溜水 二〇〇〇

(二)以棉花球浸濕下方之酒精劑塗擦脫髮部至乾燥而止。

Beta-naphthol 0.3 培他那夫託爾 〇・三

Alkohol anhydred 200.0 純酒精 二〇〇〇

(四)塗布下方之油藥於脫髮部。

Acid Salicyl 1.0 撒酸 一〇

Tinct. Benzo. 2.0 安息香丁幾 二〇

Ol Olive 50.0 橄欖油 五〇〇

五十六 凍瘡自醫法

將入冬季宜即用下方之藥水。時時塗擦素生凍瘡之部。以預防之。

Kalii hydroxyd	0.5	苛性鉀	〇・五
Alkohol	20.0	酒精	一〇〇・〇
Glycerin	20.0	僵里設林	一〇〇・〇
Aq.	60.0	水	六〇〇・〇

上混和塗擦用。

既發現紅腫者宜改用下方之藥水。每日搽擦數次。

Tinct Opil	2.0	阿片丁幾	一一・〇
Acid carbol	0.5	石炭酸	〇・五
Camphor	5.0	樟腦	五・〇
Alkohol	50.0	酒精	五〇〇・〇

上混和塗擦用。

已潰爛者。須改用下方之油藥。

Kreosot Carbonic.	8.0	炭酸結麗阿曹篤	三〇〇
Camphor	5.0	樟腦	五〇〇
Balsam Peru	10.0	秘魯拔爾撒謨	一〇〇〇
Lanolin	10.0	拉諾林	一〇〇〇
Vaseline	30.0	凡士林	三〇〇〇

上混和塗布用。

生凍瘡部。除照上法醫治外。仍須溫暖。不可再受嚴寒。

### 五十七 濕疹自醫法

濕疹之原因甚多。或因受藥物、濕熱、潮濕、硬物等之刺戟。或因內臟有疾病。凡發生皮膚病時。殆皆附生濕疹。其發生之初。皮膚祇紅腫。次生丘疹。次變水疱。更變膿疱。治愈時。結痂而脫落。初發時。皮膚緊張而覺痛。是名急性濕疹。若久不治。則疼痛消失。紅腫亦減。而發癢。是名慢性濕疹。醫治之法。紅腫及丘疹期。須嚴避衣服之摩擦及壓迫。



以浸濕下方藥水之紗布包之。

2% Plumb Acetic Ios. 200.0 五十倍鉛糖水 1200.0

癢甚者先塗下記甲方之藥水。次撒乙方之藥粉。再以紗布包之。

(甲) Acid Carboli 3.0 石炭酸 3.0

Glycerin 30.0 偪里設林 300.0

Alkohol 300.0 酒精 300.0

上混和塗布用。

(乙) Zink oxyd 10.0 亞鉛華 100.0

Amyl 10.0 澱粉 100.0

上混和撒布用。

既生水疱或膿疱者。可塗下方之油藥。

Acid Boric 5.0 硼酸 5.0

Zink Oxyd 25.0 亞鉛華 125.0

男女秘密病自醫法 雜治部 四三

Amyl	25.0	澱粉	二五〇〇
Vasselin	50.0	凡士林	五〇〇〇

上混和塗布用。

既結痂者。須先塗橄欖油 *Olive*。將痂皮揭去。次塗上方之油藥。既在脫痂者。可塗以下方之藥水。不日即愈。

Amyl	10.0	澱粉	一〇〇〇
Glycerin	40.0	儼里設林	四〇〇〇

上混和塗布用。

如歷久不治。變成慢性者。須塗下方之油藥。

Pix liquida	10.0	木他兒	一〇〇〇
Sulfur	10.0	硫黃	一〇〇〇
Zink Oxyd	10.0	亞鉛華	一〇〇〇
Adeps Sulfus	30.0	豬油	三〇〇〇

上混和塗布用。

如尙不愈。可改用下方之油藥。總之慢性濕疹。極難治愈。須耐心治療之。

Pithyrol

30.0

披天羅兒

110.0

Vaselin

30.0

凡士林

110.0

上混和塗布用。

### 五十八 大麻風自醫法

大麻風流行於廣東等熱帶地方。他省亦間一有之。能傳染於人。傳染後。先不思飲食。消化不良。疲勞貪眠。發熱多汗。時時頭暈。或更現鼻紅。此等前驅症重者。將來所發大麻風之症狀亦重。數日後。皮膚發現紅斑。此紅斑或漸退色。或變爲結節。全身磊磊。面部結節多者。狀與獅子相似。其病毒漸侵入內部之神經。則全身或身體中之一部麻木矣。本病無特效之藥。極難治愈。惟勤治不怠。可阻止其增劇。自醫之法。可內服下方之丸藥。

Capsul Natri. Gynocardio

(.3)

大風子油酸鈉膠囊(每個含量〇.三)

男女秘密病自醫法 雜治部

上每次服一丸。日服三次。食後服下。

發生紅斑及結節之部。可塗以下方之油藥。

Takthyl

30.0

伊天哇爾

110.0

Vasselin

30.0

凡士林

110.0

上混和塗布用。

結節潰爛者。用硼酸水 For 10s. 洗淨後。撒以下方之藥粉。

Jodoform

10.0

沃度仿謨

100.0

Pulv. Acid Boric

10.0

硼酸末

100.0

上混和撒布用。

### 五十九 狼瘡自醫法

狼瘡概生於面部。先生褐色之斑點。觸之覺皮膚內有小硬塊。後漸增大而隆起。上面之皮膚。緊張而光亮。色帶赤。再增大則隣接者互相併合。而腫大如象皮。周圍再生新疹。數日後。疹之數達於極點。後乃漸漸退化。或吸收而脫皮。留凹陷之癍痕。或軟化而

潰爛。極難治愈矣。本病治愈後。往往復發。發生本病後。及早請醫生將患部切除。最為上策。蔓延已廣。即難切除。無全治之望。患本病者。體質必不良。宜內服魚肝油等滋補之品。自醫之法。塗下方之藥水於患部（未潰爛）可稍阻病勢之進行。

Tinct Jodi

10.0

沃度丁幾

100.0

Alkohol

10.0

酒精

100.0

上混和塗布用。

已潰爛者。宜改塗下方之油藥。

Ung. Jodo'orm

20.0

沃度仿謨軟膏

110.0

六十 坐斑瘡自醫法

坐斑瘡由多坐所致。治愈後。宜多運動。否則復發。且患坐斑瘡者。體質必不良。宜服魚肝油等滋補品。自醫之法。可塗以下方之油藥。

1% Bor Vasselin

20.0

十倍硼酸凡士林

110.0

如生膿泡。上方之油藥不易治愈者。可改用下方之油藥。

<b>Beta-Naphthol</b>	5.0	培他那夫託爾	5.0
<b>Sulfur</b>	25.0	硫黃	二五.〇
<b>Sapo kalli</b>	12.5	綠肥皂	一一.五
<b>Vasselin</b>	12.5	凡士林	一一.五

上混和塗布用。每日塗布一次。塗布十五分至三十分時後。用軟布拭去之。撒以下方之藥粉。用此藥期中。患部不可洗滌。

<b>Zink oxyd</b>	10.0	亞鉛華	一〇.〇
<b>Amyl</b>	10.0	澱粉	一〇.〇

上混和撒布用。

**六十一 瘋疹自醫法**

一部之皮膚先潮紅。癢甚。次脫落皮膚之細層。漸次蔓延。遂及全身。後則皮膚生皸裂。稍動即痛。歷久不治者。爪甲漸漸不平而脆弱。頭髮失其光澤。而易脫落。往往漸漸衰弱而死。故患本病者。須速滋補其身體。且內服下方之去瘋丸藥。

Pill Asia 亞細亞丸

日服三次。第一星期。日服三丸。每次服一丸。第二星期。日服四丸。晚上服二丸。第三星期。日服五丸。朝晚各服二丸。第四星期。日服六丸。分三次服。連服四星期後。停服二星期。再照前法。先日服三丸。後漸增多。服四星期後。再停二星期。外治之法。每日用綠肥皂 Sapo Kalii 洗浴後。塗以下方之油藥。

5% Urog. Acid Salicyl 20.0 110倍撒酸軟膏 110.0

六十二 乾癬自醫法

乾癬不但能傳染。更能遺傳於子孫。初發時。惟現紅色或褐色之疹子。癢甚。數日後。疹子之表面。生白色之皮屑。極易剝離。剝離後。皮膚面現細小之出血點。疹子之大小。多少無一定。或竟蔓延及全身。發生新疹時。骨節覺酸痛。疹子蔓延及全身者。骨節之內側。皮膚生皸裂。稍動即痛。癢甚者。夜不能眠。或更發熱。不思飲食。治療如得其宜。治愈亦速。自醫之法。可內服下方之藥水。

Aq. Fowleri 1.0 霍列兒水 1.0

男女秘密病自醫法 雜治部

Kalii Jodat	2.0	沃劍	1.0
Syrup Aurant	10.0	橙皮糖漿	1.0
Aq. Com.	90.0	熟水	9.0

上爲一日量分三次服。

外治法。發病之第一期。每日洗浴後。塗以下方之油藥。

5% Ung. Acid Salicyl	20.0	二十倍撒酸軟膏	1.0
----------------------	------	---------	-----

一星期後。除頭部外。可塗下方之油藥。

Chrysarobin	0.5	克列撒洛瓶	0.5
Vasselin	100.0	凡士林	100.0

上混和塗布用。

頭部可塗下方之油藥。

Hdruryri Praecipitat alb.	1.5	白降汞	1.5
Bismutha subnitri	3.0	次硝蒼	3.0



Ung. Simple 25.0 單軟膏 115.0

上混和塗布用。

六十三 紅色糖糝疹自醫法

本症以皮膚生紅色有皮屑脫落之小斑為特徵。微有癢感。漸次蔓延。約四星期後。蔓延及全身。自醫之法。可塗以下方之油藥。

5% Ung. Gallie 30.0 11 倍沒食子酸軟膏 110.0

六十四 苔癬自醫法

皮膚生紅色之疹子。或平坦。或稍隆起。有癢感。概生於骶之陰面及軀幹兩側。蔓延甚速。不加醫治。無自愈者。歷久不治者。身體漸漸衰弱。自醫之法。可內服治瘋疹之亞細亞丸。服法見瘋疹自醫法。以外生癬部可塗以下方之油藥。

Sublimat 0.2 昇汞 0.11

Acid Carboli 4.0 石炭酸 4.0

Ung. Zinkoxyd 100.0 亞鉛華軟膏 100.0

男女秘密病自醫法 雜治部

上混和塗布用。

六十五 天疱瘡自醫法

發生天疱瘡前。先發寒冷發熱惡心嘔吐等前驅症。次皮膚生紅斑。後變水疱。癢甚。水疱之形狀大小無一定。殆徧及全身。口腔咽頭或亦發現。致難飲食。如醫治得當。治愈甚速。自醫之法。水疱中之液。宜穿刺排去之。撒以下方之藥粉。

Zinkoxyd

10.0

亞鉛華

10.0

Amyl

10.0

澱粉

10.0

上混和撒布用。

既結痂或表皮脫落後。宜改塗下方之油藥。

Ung. Zink

20.0

亞鉛華軟膏

110.0

發熱者。更內服下方之藥粉。

Antipyrin

8.0

安知必林

11.0

上分三包。一日分服。每飯後服一包。

六十六 皮膚紅斑自醫法

手背脚背、下腿、臂膊內側等處。往往忽然發生紅斑。或平。或稍隆起。或乾燥。或稍出水。覺癢且熱。壓之或摩擦之則覺痛。重者全身發熱。不思飲食。病人宜靜臥。不可多動。患部可以浸濕下方藥水之紗布包之。

2% Plumb Acet. 五十倍鉛糖水 1100.0

此外更內服下方之藥粉。

Aspyrin 3.0 阿司匹靈 3.0

上分三包。一日分服。每飯後服一包。

六十七 硬皮病自醫法

硬皮病者。皮膚失其彈力。撮之不皺。不能移動。觸之硬如板。該部之皮膚。變淡紅色或褐色。有白白之小點。概發顏面頸部、胸與背之上半、及手腕等處。自醫之法。可內服下方之丸藥。

pill Ferris Chinin 規鐵丸

上每日服六粒分三次。每飯後一小時服一粒。服此丸藥期中。忌飲茶。否則失其效力。

此外更服魚肝油。強壯其身體。每日洗浴。且塗下方之油藥於患部。

Icthyol

10.0

伊天哇爾

100.0

Ung. Hydrargyri

10.0

水銀軟膏

100.0

上混和外塗用。

六十八 白癩風自醫法

本病有得自先天者。有發於後天者。其原因由皮膚缺乏色素所致。自醫之法。可將芥子粉和水。塗於患部。然效力甚微。

六十九 魚鱗癬自醫法

本病能遺傳於子孫。皮膚肥厚如魚鱗。故有是名。自醫之法。每夕塗下方之油藥。翌朝用肥皂洗去之。

Acid Salicyl

5.0

撒酸

5.0

Sulfur	10.0	硫黃	100.0
Sapo kalin	50.0	綠肥皂	500.0
Adeps suillus	200.0	豬油	1100.0

上混和外塗用。

七十 皮膚症自醫法

皮膚並無異狀。祇有癢感者。可塗以下方之藥水。

Acid Carboli	1.0	石炭酸	1.0
Glycerin	10.0	偈里設林	100.0
Alkohol	90.0	酒精	900.0

上混和外塗用。

七十一 皮膚白嫩法

吾人之皮膚。用良質之肥皂多洗滌。洗後塗以良質之油類。且少受日光寒暑之刺戟。不為勞苦之工作。則自易白嫩。

雪花膏即塗擦皮膚最適之油類也。市上販賣者品質良惡不一。且價甚貴。常用者照下方自製為宜。

Mag. Carbonat	65.0	碳酸鎂	六五〇
Pulv. Acid Boric	5.0	硼酸末	五〇
Glycerin	20.0	個里設林	一二〇〇
Weissvaselin	5.0	白凡士林	五〇
Ol. Rose	1.0	薔薇油	一〇

將上記各品混和可也。

七十二 肛門裂傷自醫法

因硬便等而肛門生裂傷者。可購下方之藥桿。插入肛門。

Suppositoria Jodoform

沃度仿謨肛門坐藥

更服下方之藥粉。使大便柔軟。不致再生裂傷。

Sulfur sublimat

2.0

昇華硫黃

一一〇

Kalium bitartaric 2.0 精製酒石 11.0

上分三包。一日量。每飯後一小時服一包。

七十三 脫肛自醫法

既脫出者。塗以油類。襯絨布或綿花納入之。且內服下方之藥水。

Tinct Vomie 1.0 番木鱈丁幾 1.0

Syrup. Aurant. 10.0 橙皮糖漿 10.0

Aq. Com. 90.0 熟水 90.0

上為一日量。分三次服。飯前服下。

更有一土法。屢試之甚驗。其法取生雞蛋。錐一小孔於壳。由是納入米粒大之明礬二粒。煨熟之而食。每日食一個。連服十四個後。必可見效。見效後。再服上方之藥水。二二月。可不致復發。

七十四 便血自醫法

大便中之血液。或出自胃腸。或出自肛門。其出自肛門者。即因肛門裂傷而起。可用肛

門裂傷之醫法治之。出自胃腸者。須內服下方之藥粉。

Bismutha subnitric 3.0 次硝酸蒼鉛

Pulv. Opii 0.1 阿片末 〇・一

上分三包。每飯後服一包。一日服完。可連服數日。

七十五 血尿自醫法

小便中之血液。概出自膀胱。自醫之法。可內服下方之藥水。

Nat. Salicyl 2.0 撒曹 一・〇

Tinct. Opii 0.5 阿片丁幾 〇・五

Tinct. scopol 1.0 莨菪丁幾 一・〇

Syrup. simple 10.0 單糖漿 一〇・〇

Aq. Corn. 90.0 熟水 九〇・〇

上爲一日量。分三次服。飯後服下。

七十六 酒醉速醒法



飲酒之害。能傷腦與心臟。有酒癖者。易發中風與心臟病。中風係不活之症。心臟病亦難治愈。故酒之一物。實有損無益。但酒既為應酬之品。吾人勢難戒絕。若偶而泥醉。則惹禍傷身。為害更大。宜速設法解醒之。其法使安臥。飲以濃茶。且服下方之藥水。

Acid citric	2.0	枸橼酸	11.0
Sodium bicarb	5.0	重曹	5.0
Syrup Auranti	50.0	糖漿	50.0
Aq. Com.	450.0	熱水	450.0

上混和。可隨意服。如服完一瓶尙未醒。可再服一瓶。

此外更宜以濕冷手巾。覆於心窩部及額上。以防傷腦與心臟。用上記之方法。尙不能速醒。可更服下方之藥粉。

Ext. Tonic.	0.04	香木龜膏	0.04
Caffein	0.5	咖啡因	0.5
Sacchar. lact	1.5	乳糖	1.5

上分三包。每隔三小時服一包。

七十七 煙草中毒自醫法

多吃紙煙雪茄。亦能中毒。即俗所謂煙醉是也。此時嘔吐。冷汗。頭痛。流涎。呼吸促迫。顏面蒼白。疲憊昏朦。甚者更下痢失神而虛脫。此時宜多飲濃茶。且與以下方之藥粉。

Caffein

0.5

咖啡因

〇.五

Antipyrin

1.5

安知必林

一.五

Acid Citric

0.3

枸橼酸

〇.三

Sacchar lact

1.0

乳糖

一.〇

上混和分三包。每隔三小時服一包。

七十八 頭虱自醫法

症狀以頭髮部生濕疹劇癢為特徵。劇癢因虱嚙頭皮或步行於頭皮而發。濕疹由虱之咬傷或癢時以爪搔頭皮而生。往往蔓延及顏面頭部。重者眼臉浮腫。醫法以殺滅頭虱及虱卵為目的。所遺之濕疹。可依濕疹之醫法治之。殺滅頭虱。可用下方之油藥塗

於全頭以布包之。經一日後。去其布。用肥皂水洗去油藥。以梳浸濕溫醋。梳去頭髮上附著之死虱及卵。

Ung. Hydrargyri

水銀軟膏

aa. 15.0

各一五〇

Vaseline

凡士林

上混和塗布用。

七十九 頭痛自醫法

各種頭痛。服下方之藥粉最效。

Migrenin

密爾列寧

1.5

一・五

上分三包。每隔三小時服一包。痛止即停服。

八十 骨節酸痛自醫法

骨節酸痛服下方之藥粉最效。

Salipyrin

撒里匹林

2.0

二・〇

上分三包。一日量。每飯後服一包。

男女秘密病自醫法 雜治部

八十一 胃痛立止法

胃痛者服下方之藥粉可以立止。

Codain phosphor

0.1

磷古

〇・一

Nat. bicarb

3.0

重曹

三・〇

上分三包。每隔五小時服一包。

八十二 嘔吐立止法

普通之嘔吐(除霍亂等)服下方之藥粉可以立止。

Nat. bicarb

3.0

重曹

三・〇

Menthol

0.1

薄荷腦

〇・一

上分三包。每隔五小時服一包。

八十三 傷風自醫法

傷風服下方之藥粉最效。

Aspyrin

1.0

阿司匹靈

一・〇

上爲一包。一次服完。服藥後。宜多蓋棉被而臥。

#### 八十四 頭暈自醫法

頭暈時。宜安靜。不可稍動。且服葡萄酒少許。能立止。是因衰弱所致。須食滋補品。

#### 八十五 暈船自醫法

暈船者。可服下方之藥粉。

Caffein

0.6

咖啡因

〇・六

Menhol

0.05

薄荷腦

〇・〇五

上分三包。每隔五小時服一包。

#### 八十六 衄血自醫法

鼻孔出血名衄血。此時宜高枕而靜臥。不可少動。額上罨冷濕手巾。以精製綿花（藥房中有之）浸濕下方之藥水。塞入鼻內。能立止。

Liquor. Ferri sesquichlorat. 1.0

過鹽化鐵液

1.〇

Aq. dest. 20.0

蒸溜水

110.〇

上混和外用。

常有衄血者。大便必須通利。如閉結。即發作。宜速服。菟藤子油等輕瀉藥以預防之。又女子月經無故停止時。亦易發衄血。宜服通經藥以預防之。

八十七 失音自醫法

我人發音之清濁高下。職在聲帶。聲帶在喉頭之內。若感冒而咳嗽。則聲帶受刺戟而紅腫。致聲音低濁。即失音是也。故預防感冒。即預防失音。既失音者。內服下方之藥粉。可望速愈。

Pulv. Catechu

1.5

阿仙藥末

1.5

Pulv. Licquriti

1.0

甘草末

1.0

Menthol

0.03

薄荷腦

0.03

上分三包。一日量。飯後服一包。

八十八 呃逆自醫法

呃逆時可用下方之藥水。塗於心窩部。

八十九 黃疸病自醫法

膽汁不入腸中而入血液則生黃疸。故患黃疸者。皮膚呈金黃色。眼白亦黃。大便之黃色反減。小便之色深黃。口中覺苦。消化不良。若不及早醫治。漸漸衰弱而死。自醫之法。可服下方之藥粉。

Nat. bicarb	1.0	重曹	1.0
Nat. sulf.	1.0	硫酸曹達	1.0
Nat. Salicyl.	1.0	撒曹	1.0

上混和為一包。朝晚各服一包。

九十 萎黃病自醫法

萎黃病一名白血病。因血中之赤血球少而白血球多也。患之者。面似浮腫。顏色白而帶黃。身體非常衰弱。醫治之法。以滋補身體為最要。常服之藥下方亦佳。

Chinin Ferri citric 0.6 枸橼酸鐵規尼涅 0.6

男女秘密病自醫法 雜治篇

男女秘密病自醫法 雜治部

Calcium hypophosphor 2.0 次亞磷灰石灰 二〇〇

上混和分三包。一日量。每飯後一小時服一包。

九十一 喘息自醫法

治喘息。下方最良。

Heroin mur. 0.01 鹽酸海魯因 〇〇一

Camphor 0.3 樟腦 〇〇三

Acid Benzoic 0.5 安息香酸 〇〇五

Sacchar. lact. 1.0 乳糖 一〇〇

上混和分三包。一日量。每飯後服一包。

男女秘密病自醫法卷下終





3

7.05