

大德重校聖濟總錄卷第七

十七

泄痢門

氣痢

休息痢

蠱痢

久痢

聖濟

氣痢

論曰氣痢者由冷氣停於腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脇虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名為氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補脾氣則痢當自愈

論曰氣痢者由冷氣停於腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脇虛滿腸鳴腹痛便痢赤白名為氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補脾氣則痢當自愈

赤石脂分參

乾薑炮參

厚朴去麩皮生薑汁炙壹兩

龍骨參

黃連去須壹兩

白茯苓去黑皮參分

無食子

貳枚炒令煙出當歸切焙參分

黃蘗去粗皮參分

不右八味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調下日晚

再服胃與大便虛不消補虛安無夢寐令人苦食

治氣痢胃與大腸虛不能制晝夜無度漸令人黃瘦食
不為肌肉困重無力眼目多澀十年不愈縮沙蜜丸方

縮沙蜜去皮壹兩

肉豆蔻去殼半兩

黃連去須貳兩

當歸切

赤石脂

陳橘皮去白宿暴乾

各壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十
丸空心溫漿水下日晚再服老人及妊娠人並可服
治久氣痢不止或差或劇黃連丸方

黃連去須壹兩

當歸切

烏梅肉微炒

訶梨勒炮去核各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十
丸空心用薑製過厚朴煎湯下日晚再服

治氣痢久不止木香丸方

木香壹兩

訶梨勒炮去核貳兩

右二味搗羅為末用粥飲和丸如梧桐子大每服二
十丸空心溫漿水下日午再服

治氣痢久不差桃人丸方

桃人去皮尖雙人炒命安息香半兩別入

木香兩訶梨勒炮去核壹兩

右四味將木香訶梨勒搗羅為末與二味研了藥相

和重細研入少許米飲爲丸如梧桐子大每服三十丸空心用煖漿水下日晚再服

治積年冷痢日三五行脹悶腸鳴食不消化面黃漸瘦

厚朴丸方

厚朴去蘆皮生薑汁炙令紫

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙

白茯苓去黑皮

無薤微炒

阿膠炙令

熟艾微炒

胡粉炒

黃石脂赤石脂烏梅去核

當歸切

蜀椒去目并閉口炒出汗各壹兩

右一十三味除膠艾二味外搗羅爲末先以米醋一

升半於無風處煮艾亦減約八分絞去艾次下阿膠候消盡乘熱入藥末和勻杵千百下併手丸如梧桐子大暴乾每服空心用溫漿水下五十九日在再服治氣痢年深不差陳橘皮丸方

陳橘皮酒浸去白

白茯苓去黑皮

陟釐微炒

麥蘗炒熟

白石脂壹兩

赤石脂分

無食子參攷燒 龍骨壹兩

酸石榴皮壹兩

右九味搗羅爲末用麩糊和丸梧桐子大每服二十五丸空心以溫漿水下日午再服

治冷勞氣痢久不差豬肝丸方

豬肝片壹斤以醋壹升煎醋令盡去筋膜切作柳葉

大蒜煮令熟去殼研貳兩烏梅肉炒乾壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙令紫貳兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

黃連去須炒貳兩當歸切焙壹兩

右一十味除豬肝蒜外搗羅為末將豬肝與蒜細研

如麩糊入藥末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服

二十九空心用熱麩湯下日午再服

治氣止瀉痢霍亂厚朴散方

厚朴去麤皮生薑汁炙令紫參兩干姜人血甘草炮

米白芷三三六乾薑炮赤茯苓甘草香子

木陳橘皮去白焙吳茱萸湯洗焙乾白朮湯洗焙乾

右七味搗羅為散每服二錢匕凡氣不和鹽湯調下

霍亂吐瀉煎木瓜紫蘇湯調下泄瀉米飲調下赤白

痢甘豆湯調下並食前服

治氣痢泄瀉心腹疼痛木香散方

木香三三蘇合香剉桂皮去麤皮

沒藥各壹分胡椒各壹分肉豆蔻人壹枚

當歸切焙壹分龍骨兩赤石脂兩

乾薑炮壹分

附子炮裂去皮臍壹分

甘草炙壹分

蜜陀僧壹分

附林各壹分

肉豆蔻八壹分

右六十三味搗羅為散每服一錢七米飲調下食前

治諸積瀉痢及暴氣瀉紅蠟丸方

雲丹砂

研細木心粉霜

硫黃

各壹分

巴豆

去皮取半兩不破者盡用

洗去油拭乾

右四味同研如膏鎔黃蠟一兩半劑勻旋丸黍米大

米飲下二三丸暴瀉水下赤痢甘草湯下白痢乾薑

湯下赤白甘寧乾薑湯下婦人血氣紅花酒下

治氣瀉不止木香丸方

木香

丁香

縮沙人

子大粒

肉豆蔻

去殼各壹兩

訶梨勒皮

藿香葉

赤石脂

各半兩

右七味搗羅為末用麵糊和丸梧桐子大空心食前

米飲下十五丸末以薑肉味水調服于大瀉後二十

治冷勞氣痢腹脇疼痛水穀不消神驗丸方

陳麴

吳茱萸

浸焙乾各壹兩

黃連

去煩

木香

蕪荑

各壹分

右四味搗羅為末薑汁和丸梧桐子大每服十五丸

溫米飲下食前

治諸氣痢不止木香丸方

木香

肉豆蔻人

精沙人

赤石脂各半

右四味搗羅為末以聚肉和丸梧桐子大每服二十

丸溫米飲下食前服

治氣痢腹痛睡卧不安香艾丸方

艾葉炒

陳橘皮湯浸去白

右二味搗羅為末酒煮爛飯和丸如梧桐子大每服

二十九丸空心鹽湯下

治氣痢腹內虛鳴日久不差龍骨散方

龍骨

黃連去

黃蘗去

乾薑炮

阿膠炙

人參

厚朴去蟲皮生薑汁炙各貳兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空腹痛飲下日再

治脾毒氣痢下血如鶩鴨肝腹痛不止地榆湯方

地榆

訶梨勒皮各壹兩甘草炙

當歸切焙各半兩

栝葉

茜根

芍藥

赤茯苓去黑皮各參分

右八味細剉每服三錢匕水一盞煎取六分去滓溫

服食前

又方

胡黃連末用雞子白調作餅子炙令黃研為末入樗皮汁和再作餅用蜜塗炙令黃

右一味不拘多少搗羅為散米飲調下二錢匕

治氣痢瘦弱諸瘵不損老蒼朮丸方

蒼朮

厚朴去麩皮生薑汁炙黃連去須

當歸焙

訶梨勒皮炒乾薑炮各壹兩半

吳茱萸湯洗炒乾

艾葉炒參

龍骨

附子炮裂去皮臍各貳兩

右一十味搗羅為末米飲和衆手丸如梧桐子大每

服三十九食前生薑湯下日再

治氣痢不差疲劣變成冷勞痢烏梅丸方

烏梅肉炒壹兩

豬肝壹大葉以醋煮令爛研如糊

草豆蔻去皮

厚朴去麩皮生薑汁炙各壹兩

甘草炙分

肉豆蔻去殼

當歸切

乾薑炮

草撥

訶梨勒皮炒各

桂去麩皮

右一十一味搗羅十味為末用豬肝煎和丸如梧桐

子大每服二十九米飲下陳麴湯亦得

治氣痢腹脇虛滿腸鳴腹痛便下赤白地榆飲方

地榆

樗皮

當歸炒切

黃連炒

陳橘皮湯浸虫

枳殼去炒

桔梗

桂去

大腹去皮

甘草炙剉各

右一十味盛搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓空心服

治氣痢腹脹腹中虛鳴木香縮沙散方

木香貳兩

縮沙人壹兩

枳殼去炒

訶梨勒皮各半

右四味搗羅爲細散每服一錢匕空心以陳米飲調

下良久以食壓之

治脾胃虛冷兼腸間泄瀉變成氣痢葶撥丸方

葶撥

檳榔剉壹兩 乾薑

附子炮裂去皮臍

訶梨勒皮

蕪荑人各貳兩

白朮

黃連去須各

阿魏參兩以水拌合煎

五錢

枳殼去炒

右一十味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十

九空腹生薑湯下日再漸加至四十九

治氣痢并休息痢人參湯方

人參

陳橘皮湯浸去 黃連去須

効

休息痢

論曰腸中宿挾痼滯每遇飲食不節停飲不消即乍差乍發故取名為休息痢治瘵當加之以治飲消削陳寒痼積之劑則愈

治休息痢阿膠湯方

阿膠炙令燥

黃連去須炒

龍骨各壹兩

艾葉微炒半兩

倉米貳合炒

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心溫服日午再服

治休息氣痢久不差肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼

訶梨勒煨去核

烏梅肉炒各壹兩

黃連壹兩半炒

白礬熬令枯半兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心用粥飲下或煎白梅生薑湯下亦得更加丸

數服

治休息痢不能食及羸瘦麥藥丸方

大麥蘖炒

附子炮裂去皮

陳麴炒

人參

烏梅肉炒

白茯苓已上各壹兩

右七味搗羅細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煮棗粥飲下不計時候

治休息痢諸藥無効黃丹散方

黃丹

參兩炒

棗肉

參拾枚搗為壹塊用麩緊裹大火燒令赤後冷取出

枳殼

半兩麩炒黃連須微炒

右四味搗羅為末每服一錢空心粥飲調下忌油膩

冷物

治休息痢立効栝樓散方

栝樓

壹枚出却

白礬

壹兩

去

白石英

壹兩

去

各

右二味入栝樓中濕紙裹燒赤為度後冷搗細杵為

散每服一錢七食前粥飲調下

治休息痢日夜頻併白茯苓丸方

白茯苓

兩

黃連

兩

去

黃蘗

壹兩

去

羚羊角

各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心

以米飲下三十九日午再服

治休息痢縮沙丸方

縮沙

去皮壹兩

肉豆蔻

去殼半兩

羊肝

去筋膜半兩

具細切

半

右三味拌和令勻用麩和作餅子裹又以濕紙三重

裹於煆灰火內煨令香熟去焦麩紙研細為丸如梧

桐子大每服三十九空心用米飲下日再服

治休息痢及赤白痢附子丸方附子兩枚去皮雞子兩枚去白滑石三兩

附子兩枚去皮雞子兩枚去白

右二味先將附子搗羅為末以雞子白和為丸如梧

桐子大一時傾入沸湯內煮數沸漉出分作兩服米

飲下空心日午各一服

治休息痢黃連湯方

黃連去須 龍骨各半 艾葉壹握

阿膠炙令燥 白芍各六分

右四味細剉三味以水三盞先煎黃連等三味至一

盞半去滓次下阿膠再煎至一盞分為三服空心

服如人行十里再一服每服藥後濃煎乾艾葉湯飲

之亦佳

治休息痢玉液丹方

白礬兩 硫黃 消石各半

右三味於乳鉢內相和研作末却入砂瓶子內以炭

火鑄成汁取出候冷更研令細用麩糊為丸如菘豆

大每服十九空心米飲下兼治腸風痔漏諸疾米

治休息痢紫金散方

定粉 鉛丹 大棗

恩錄之十七

芎藭子壹兩 訶梨勒壹兩 炮去核

右五味相和搗成一團以麩重裹於火中燒令煙盡

取出去灰土令淨搗羅為散每服三錢匕空心米飲

調下日晚再服

治休息痢脾胃氣虛冷大腸轉泄或發或止飲食減少

四肢無力沒石子散方

沒石子兩半 肉豆蔻兩半 桂心兩半

訶梨勒壹兩 厚朴壹兩半 去麩皮塗

龍骨兩壹 麝香壹分 細研藥送煎艾葉湯

右七味搗羅為末每服一錢匕粥飲半盞調下食前

服之

治休息痢發歇不定經久不差硫黃丸方

硫黃兩壹 砒黃兩壹 何首烏壹兩

白礬兩壹

右四味相和研令勻入菟瓶子申五月五日取不食

井水和六一泥固濟封頭候乾安瓶子向火中燒令

通赤候冷取藥細研以麩糊和丸如菉豆大患近者

黃連湯下久老橘皮湯下一丸

治休息痢久不差四霜丸方

巴豆霜半錢 百草霜貳錢 粉霜壹錢

砒霜半錢

乳香末貳錢

右五味再研細合勻用黃蠟半兩鎔汁和為丸如棗

豆大每服一丸新汲水下食前服

治一切休息痢日夜不止四體倦怠黃芩丸方

黃芩去黑心

砒霜煨研

烏梅肉乾炒

黃藥剉各壹分

右四味搗研為末鍊蜜和丸如棗豆大每服五丸冷

水下

治冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃及

治冷滑下痢不禁虛羸縮沙丸方

縮沙蜜去皮

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

厚朴去麩皮生薑汁炙

陳橘皮湯浸去白焙

肉豆蔻去殼各半兩

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸米飲下食前服

治下痢乍差乍發病名休息丹粉丸方

丹砂研半兩

粉霜參

膩粉

鉛丹各肆錢

白礬灰參

消石研

砒霜研各貳錢伏火者

右七味再同研勻用水浸炊餅心為丸如豌豆大每服三丸冷麩湯下看虛實加減

治多年休息痢疾四神丸方

當歸切焙半兩

烏梅去核

黃連去須微炒壹兩

龍骨兩

右四味搗羅為細末以薤白細研和丸如梧桐子大每日空心以溫漿水下十五丸至二十丸

治休息痢當歸丸方

當歸炒

黃連去須

烏梅去核焙各壹兩

右三味搗羅為細末以生蒜汁和眾手丸如梧桐子大焙乾每服三十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸
治休息痢金石散方

石灰

鉛丹

各壹兩

糯米

壹合

炒黑

右三味將前一味慢火炒一炊久入糯米同研令細每服三錢七空心陳米飲調下十日八日食餅

治蠱痢

治蠱痢者由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脈漸至藏府毒氣挾熱與血相搏客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

論曰凡下痢膿血間雜瘀黑有片如雞鳴肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脈漸至藏府毒氣挾熱與血相搏客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

治蠱痢下血如雞鳴肝片腹痛煩悶地榆湯方

地榆

犀角

黃連

栢葉微

黃藥去麤皮

當歸剉微

黃芩去黑心

生乾地黄焙

赤地利各半兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服不拘時候

治蠱痢下血如雞肝疼痛桔梗散方文選蠱人醫祖漸

桔梗去蘆頭

犀角鎊等分

右二味搗羅為散酒服一錢匕日三不能自服者即

灌之藥下心中當煩須臾自靜七日乃止可食豬脾

以補養之一

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不差方文選

牛膝鹽

石一味切椎碎以醇酒一升漬一宿平旦空心服之

再服愈

治時歲蠱毒下痢黃連散方

黃連去須

白礬燒令

乾薑

附子炮裂去皮

右四味搗羅為細散每服一錢半匕溫酒調下空心

日午服

治蠱痢下血如雞肝腹中疼痛難忍茜根飲方

茜根

升麻

犀角鎊

桔梗去蘆頭 黃芩去黑心 黃蘗去蘆皮

地榆各壹斤 白蘘荷各壹斤

右八味搗為麤散每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓空心日午服

治藏府傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘大便下血

瘀黑有片或五痔腫痛久下膿血者蝟皮丸方

蝟皮各壹斤 官歸剉 續斷

黃耆 連翹 槐實炒

乾薑炮 附子炮裂去皮臍 白礬飛各

生乾地黄伍

右二十味同搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

五十丸空心食前米飲下

治歲時蠱痢黃蘗丸方

黃蘗去蘆皮 黃連去須各

右二味搗羅為末飯飲為丸如梧桐子大每服三十

丸空心米飲下日午再服並同煎至八分去滓空心

治蠱毒痢如鵝鴨肝腹痛不可忍黃芩湯方

黃芩去黑心 黃連去須各 山慈去蘆

右二味細剉以水二盞煎取一盞去滓空心日晚乘

熱服冷即凝

治蠱毒痢下血片臍下疔刺痛升麻湯方

升麻以水地榆一匙茜根空心日報乘

黃芩去黑心各犀角兩錢山梔子去殼或柴枚分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生地黃一

分切薤白三莖切豉三七粒同煎至八分去滓空心

溫服日晚再服未消增減或破酥酥干大毒頭三十

治中蠱下痢日數十行方

巴豆拾粒枚去皮

藜蘆去蘆頭

芫青去翅足炒附子炮裂去皮臍白礬各半兩

右五味搗羅為末和勻以綿裹藥吹去豆許內下部

中日三

久痢

論曰久痢不差則穀氣日耗腸胃損傷濕氣散溢肌肉

浮腫以胃虛故也蟲因虛動上蝕於膈則嘔逆煩

悶下蝕腸中則肛門瘡爛久而不差變成疰蠱或下赤

汁水血相半腥不可近是謂五藏俱損而五液雜下此

為難治

治久痢經年不差雲母散方

日雲母粉 白茯苓去黑皮 附子炮裂去皮臍各參分

赤石脂各半兩 龍骨各半兩

右五味搗羅為細散每服一錢匕溫酒或米飲調服
日三夜一

治痢積年不差厚朴湯方

厚朴去麩皮生薑汁炙 乾薑炮

酸石榴皮炒

阿膠少 黃連去須

艾葉炒各兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治久痢不止地榆丸方

地榆兩

龍骨

赤石脂

無食子炮

熟艾微炒各半兩

黃蘗去蘗皮參分

橡實殼炒半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸米飲下不拘時

治積年痢困篤腸極滑醫所難療乾薑湯方

乾薑炮 黃蘗去蘗皮炒 阿膠炒 茯苓炙

十酸石榴皮炒各兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治下痢數年不止桂附丸方

桂皮去蘗

附子炮裂去

黃連去須

黃蘗去麩皮

陳麴炒

乾薑炮

麥蘗炒各兩

吳茱萸湯洗焙炒乾

蜀椒去目及閉口者炒出汗

烏梅肉炒各壹兩半

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三

十九米飲下

治久痢不止脾胃虛弱食飲不消化腹鳴疴痛茯苓丸

方野平麻因黃芩味苦甘平藥性論云

白茯苓去黑皮陳麴炒壹兩

赤石脂各壹兩

黃連去須附子炮裂去皮臍半兩人參半兩思二十

黃蘗去麩皮乾薑炮

當歸切

龍骨各參甘草各半

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九米飲下不拘時

治久痢蜜陀僧丸方

蜜陀僧各壹兩白礬

陽起石各壹兩

伏火砒各壹兩伏龍肝

赤石脂各半兩

右六味搗令細入瓶子中鹽泥固濟以文火養三日

後煨令通赤候冷重研極細水浸蒸餅和丸如梧桐

子大每服三丸煨生薑湯下空心日午夜卧服

治久下痢赤白不止吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾薑炮黃連去須

訶梨勒皮白礬灰各半日干交搗服

右五味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

中丸粟米飲下食前服中藥固腎良文大養三日

治久痢金星鱗散方大論 亦可服各半

金星鱗類 白礬 鉛丹各半

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前

治腸虛久痢天仙散方類

天仙子各鉛丹各風味或用大論服

大棗參拾枚去核參味同搗作餅子炭火燒過赤入地坑出火毒為末

代訶梨勒皮量赤石脂半兩燒去入陳下豆共

右五味為細散和合勻每服三錢匕米飲調下食前

服一和豆二小珠用黃藥半兩煎熟煎

治腸滑久痢神效無比黑神散方

醋石榴壹枚劈破炭火蒸燒令煙盡急取出不令作灰用瓷瓶蓋壺宿出火毒

右一味搗為散每服用醋石榴一瓣以水一盞煎湯

調下二錢匕久瀉亦治大散味干大煎十次煎

治一切赤白痢久不差乾薑散方 代乾薑

乾薑壹兩剉白皮薑汁炙伍度膏兩

右二味搗羅為散每服二錢匕空心食前溫米飲調

下

治久患滑泄下痢龍骨丸方

艾香兩
前十五頁

龍骨

壹兩燒醋
淬銖伍度

白礬灰

兩

鉛丹

炒黑
壹分

右三味搗羅為末麩糊為丸梧桐子大每服十九服

茶清下不拘時服

用酒或酢
一盞以水一盞煎

治諸般痢多年不差日夜百十行不止抵聖丸方

丹砂

兩
交珠硫磺

砂

兩

右二味以巴豆二七粒和殼用黃蠟半兩煎候黑煙

起良久取出巴豆就內揀取二七粒好者去殼先將

丹砂碾砂於乳鉢內同研令細後方入剥了巴豆共

研令勻用煎者蠟一小塊更同熬令勻作一劑如有

患者旋丸如黍米大先用艾湯下三丸取出積聚滿

轉一兩行並不搜攪疼痛後以冷水空心下三丸即

差

治泄痢久不止方

生薑

切

沙糖

各壹
分

右三味以三重濕紙裹煨五更初都作一服以臘茶

嚼下

治久痢不止沉困怠墮訶梨勒散方

訶梨勒

炮取
皮

木香

黃連

去
須

地榆各半

吳茱萸湯浸焙炒青分

右五味搗羅為散每服三錢匕沸湯調下食前服

治久痢不差將變疝臘虛積丸方

硫黃

朱銀貳味同結沙子

巴豆去皮心不去油與沙子同

研各壹兩

礞石搗碎細研

硃砂研各半兩

右五味再同研勻以好醋和令得所先作一地坑如茶盞大深四指淨火煨通赤去灰火用醋紙襯攤藥在內碗蓋土焙一宿取出候乾麩糊為丸如小豆大每服二丸或三丸生薑棗湯下治久痢不止或赤或白煨薑莧方

大馬齒莧

細切搗生薑貳兩

右二味和勻用濕紙裹煨熟不拘多少細嚼米飲嚥

下

治新久瀉痢龍骨湯方

龍骨

桑根白皮

赤石脂

天雄炮裂去

厚朴去麩皮生薑汁炙

麻黃去節根各壹兩半

白芷

黃連去須

地榆

桂去麩

當歸切焙

木香

白朮

訶梨勒皮

煨各壹兩黃芩半兩

肉豆蔻

去麩

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑
一棗大切煎至六分去滓溫服

蘇艾

黃蘗

木香

白芷

黃蘗

附子

天麻

單休

蘇艾

附子

桑枝白朮

赤石脂

許厚八味

下

一利味日用然其妻煎服不許食少麻曾米食藥

大德重校聖濟總錄卷第七十七

大德重校聖濟總錄卷第七十八

泄痢門

下痢裏急後重 痢兼渴

痢兼腫 痢後脫肛

疝腫

濕腫

張暹

蘇羅

陳兼賦

陳好保

可解異錄

斷脈四

大醫重對選新羅雜錄卷十人

下痢裏急後重

醫方類聚卷之七

論曰下痢裏急後重者有痼聚也經所謂大痼泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛是矣法當和冷而祛蘊滯則脾胃和平飲食腐化其膿而自消大腸自固也治裏急後重下赤白痢及下部疔痛當歸散方

當歸切

黃連去須

赤白一乾薑

地黃十兩

黃藥

皮壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕濃煎烏梅汁調下空心食前日二服若腹中疔痛加當歸下赤加黃連下

白加乾薑

治後重下痢赤白滯下腹內結痛當歸黃連湯方

當歸切焙黃連去須妙赤茯苓去分

地榆兩犀角屑分黃芩兩草薢兩

厚朴去蘊皮生薑汁炙壹兩

右七味廩擔篩每服五錢匕水一盞半入生薑一聚

大拍碎同煎至入八分去滓空心溫服日再

治大病後重下赤白痢腹中疔痛石鍾乳湯方自固出

石鍾乳別研不黃連壹兩防風去心合而

附子炮裂去黃蘗去蘊皮當歸切蘇合香末

不乾薑炮壹兩蜀椒去目并閉口者炒出汗半兩

右八味除鍾乳外剉如麻豆再同和勻每服四錢匕

水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前日三服

治冷熱不和下痢赤白臍腹作痛裏急後重聖功散方

乾薑炮五倍子各壹兩訶梨勒煨去半兩

甘草炙

右四味搗羅為細散每服二錢匕食前米飲調下

治腸虛冷熱不和赤白下痢裏急後重訶梨勒湯方

訶梨勒煨去草豆蔻炒去皮延胡索各半兩

乾薑炮壹兩

右四味廩擔篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服

治後重下膿血如聖散方

奧橘 各壹 葶藶 各壹

右二味同搗碎妙令煙出放冷搗羅為細末每服二

錢至三錢匕茶清調下

治藏氣不調裏急後重勻氣湯方

蒼朮 米泔浸壹指 去皮切暴乾

厚朴 去蘊皮生薑 汁炙各肆兩

甘草 生剉 乾薑 生剉

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服夏末秋初最宜服

治熱痢下重者白頭翁湯方

白頭翁 剉 粟米黃蘗 去蘊

黃連 去

秦皮 剉 天粟米 洗淨 碎 乾 大 香 艸

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服日二

治冷痢裏急後重當歸丸方

當歸 切 焙 九 胡椒 炒 壹

黃連 須

厚朴 去蘊皮生薑 汁炙各貳兩

阿膠 炙 爛 壹 兩 別 為 末

乾薑 炮 壹 兩 半

右六味除阿膠搗羅為末用好醋調阿膠為膏和劑

丸如梧桐子太每服十五丸食前橘皮湯下加至二

十九

治腹痛虛滑裏急後重心胸痞悶逆滿或傷冷暴瀉手

足厥冷脉息沉伏訶梨勒丸方

訶梨勒炮去核 肉豆蔻去鹽

白礬熬令汁

木香半兩 龍骨貳兩

烏頭炮裂去

縮沙人各壹兩

右七味搗羅為末粟米粥和為丸如梧桐子大每服

二十九食前粟米飲下

治瘕寒下痢臍腹撮痛腸鳴脹滿裏急後重不思飲食

日漸羸瘦勝金丸方

黃連土須伍兩

龍骨貳兩

草豆蔻皮

赤芍藥

當歸切

乾薑炮

地榆各壹兩 橡實各參

乾桑葉空心食前

木香各貳兩

赤石脂

代赭各肆兩

右一十二味搗羅為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子

大每服二十九至三十九煎艾醋湯下空心食前服

治洞泄飧泄裏急後重薑桂散方

乾薑炮參

甘草壹兩 剉薑味用沙糖

桂去鹽皮

水化開同炒乾

右三味搗羅為散每服二錢匕白湯調下兼治腹痛

止虛渴

治膿血雜痢後重疼痛日久不差通神丸方

大浸藥

五靈脂 乳香

巴豆霜

右四味各研細再同研勻滴水丸如黃米大每服七

丸煎生木瓜湯下小兒三九隨歲數加減空心食前

服

治下痢赤白日久不差裏急後重取冷積玉粉丸方

白濁白丁香

直者研粉霜

硫黃

膩粉

硃砂

乳香

右六味再同研勻用生薑自然汁煮蠶肉研和作劑

每服旋丸如豌豆大臨臥煎生薑棗湯下七丸未動

次夜服十九老少以意加減

治下痢赤白裏急後重大腸虛滑丹砂丸方

丹砂

草烏頭末

乳香

巴豆

大者去皮
心研染故

右四味再同研令勻細用醋煮麩糊和丸如梧桐子

大每服一丸冷乳香湯下不拘時候

治下痢腹脹裏急後重木瓜飲方

乾木瓜焙

白芷

厚朴去蘊皮生

白朮炒

木香合壹兩

桂去麩皮

黃連去須

當歸炙

縮砂蜜去皮

龍骨

訶梨勒皮雙各壹兩半

陳橘皮去白焙

杏人去皮尖雙入炒拾伍枚

赤石脂兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓溫服

痢兼渴

論曰痢不差則腸胃虛弱津液減耗不能上潤於咽嗝

故口舌焦乾而內煩使人引飲飲多則濕氣淫溢肌肉

虛浮而痢亦不差也

治下痢冷熱相衝臍府氣不和順本來下虛津液耗少

口乾咽燥常思飲水人初不許飲水毒氣更增煩躁轉

甚宜急與湯飲救之不得令至過度止渴栝樓根湯方

栝樓根剉

甘草炙

白茯苓去黑皮

各半兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半麥門冬一分

去心棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時溫服

治久痢食即嘔吐煩渴不可忍烏梅湯方

烏梅肉炒半兩

黃連去須炒

白茯苓去黑皮

黃芩

去黑心

龍骨

各半

訶梨勒

各半

白入厚朴

去黑皮生薑

不可忍

阿膠

各半

各半

右八味麻搗篩每服五錢七漿水一盞生薑三片同

煎至七分去滓空心溫服日午再服半麥門冬一合

治痢後渴不止石膏方

各半

麥門冬

各半

栝樓根

各半

各半

各半

各半

各半

葛宜石膏

別

就

之

麥

門

冬

各

半

各

半

各

半

各

半

口乾茯神

桂

思

為

水

知

母

准

精

為

水

黃

連

各

半

右九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

効空心米飲下晚食前再服或作散冷熱水調服錢七

屢亦得

為

不

日

報

再

思

屢

亦

得

亦

得

亦

得

亦

得

治泄痢藏府虛燥煩渴不止黃芩湯方

黃芩

各半

各半

各半

石膏

各半

各半

各半

各半

茯苓

各半

各半

各半

各半

各半

各半

白茯苓

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

栝樓根

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

淡竹葉

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

右一十味麻搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞

去滓空心溫服未止再服小兒量大小服之

治泄痢上膈虛熱煩渴引飲口瘡不下食困劣人參湯

方

人參

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

各半

人參

白茯苓去黑皮

木香

麥門冬去心

葛根剉

口瘡不前胡去盡

人參湯浸去

去梔子人

黃耆剉

陳橘皮湯浸去

訶梨勒

半夏洗

甘草炙

生薑

右一十二味搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三

片陳米一合同煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治下痢煩渴黃連丸方

女萎

黃連

去須炒

當歸切焙

烏梅肉

炒半

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心米飲下日晚再服痢甚者銼蠟為丸服

治熱痢黃膿發瀉四肢煩悶黃連丸方兼服炒小豆

黃連

去須炒

黃芩去黑心

黃蘗去皮

芍藥去皮

益日熱艾葉炒

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十

左空心飯飲下日晚再服

治痢兼渴麥門冬湯方

麥門冬

去心

烏梅碎

炒

右二味用水二盞煎取一盞去滓分溫二服空心晚

食前服

治吐痢後大渴飲水不止陳米湯方

陳廩米

水淘淨

右一味用水二盞煎至一盞去滓空心溫服晚食前

再煎服

治痢後渴糯米汁方

糯米

右一味以水二盞半同研絞取汁空心頓服之

治痢兼腫

論曰下痢身體浮腫者久痢所致也痢久則胃氣弱而腸虛胃者土也所以化水穀而充肌肉若胃土氣衰不能勝濕則水氣妄行流溢皮膚故痢而兼腫也得小便

利者乃愈

治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲變通身浮腫脉沉細小

數澤漆湯方

澤漆炒

吳茱萸湯洗

赤茯苓去黑皮

白朮

桔梗炒

當歸切

犀角鎊

青木香炙

海藻洗去

芍藥

大黃炒

右一十一味剉如麻豆每服以水二盞煎藥五錢匕

取八分去滓溫服下後消息五六日可與女麴散

治利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消女麴

散方

女麴貳兩

乾薑貳兩

細辛去盡

椒目微炒

附子炮裂去皮臍

桂去盡皮

右六味搗羅爲散酒服一錢匕不知加至三錢匕日

三若婦人產後虛滿服此大良

治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血澤漆湯方

澤漆葉微炒

桑根白皮色剉

郁李人湯浸去皮尖

人參各壹兩

杏人湯浸去皮尖及雙人者炒

香

白米剉

陳橘皮湯浸去白焙乾各壹兩

存七味搗篩每服五錢匕水三盞入生薑三片煎取八分去滓溫服後半時辰再服取下黃水數升或

小便利爲度

治下痢後脾胃虛弱不能制輸水氣致身腫脹滿桑白

皮湯方

桑根白皮炙令黃

赤茯苓去濕

郁李人湯浸去皮尖

陳橘皮湯浸去白

海藻洗去鹹炙

赤小豆炒半

右六味搗篩每服五錢匕用水一盞半煎取八分

去滓溫服日三

治痢後偏身浮腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 白朮剉微炒 防己今煎取八分

黃芩去黑皮 射干 澤瀉各參兩

桑根白皮炙黃白 澤漆葉切微炒

右八味廔搗篩每用五錢匕先以水三盞煮大豆一

合取二盞法滓內藥煎取一盞分為二服未差頻服

合兩料治下痢體腫香菽散方

治下痢體腫香菽散方

大豆炒熟捷去黑皮用壹合 香菽半合

右一味搗羅為散用粥清調一錢匕服日三三三煎

治虛勞下痢心胸壅悶喘促四肢腫滿細辛飲方去

細辛去苗 防己剉碎 桂去皮

當歸切炒各壹兩 枳殼去核炒 白朮剉碎

赤茯苓去黑皮 赤芍藥各參兩 黃耆剉壹兩

右九味廔搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑三片

煎至七分去滓溫服不拘時用木香當飲

治痢後四肢浮腫喘息促急坐卧不安小便不利防己

湯方十一味廔搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑

防己 豬苓去黑皮 桑根白皮剉碎

赤茯苓去黑皮 海蛤炙 陳橘皮湯浸去白爛

檳榔 藥性論云紫蘇用並 木通 劉各藥生

木香 白木 各藥生 藥材白文

石一十一味 蠶絲 每服三錢匕 以水一盞 入生薑

片煎至七分 去滓 溫服 不拘時 食心腹不除 或日

治下痢後虛損 臍下痛 四肢浮腫 木香湯方

木香 藥性論云 五加皮 劉以木桑根白皮 三

檳榔 劉去毒 桃人 湯浸去皮尖 松節 劉貳

郁李 人湯去皮尖 陳橘皮 湯浸去白

薏苡人 藥性論云 陳橘皮 湯浸去白

右丸味 蠶絲 每服三錢匕 以水一盞 煎至六分 去

滓 不拘時候 稍熱服

治痢後四肢浮腫 麻大湯方

干大麻人 商陸 防風 又去

附子 炮裂去 陳橘皮 湯浸去白 防已 各壹 日

右六味 劉如麻豆 每服五錢匕 以水一盞 半入赤小

豆一百粒 同煎至八分 去滓 食前服

治痢後脫肛

論曰 下痢脫肛者 因大腸虛弱 冷氣壅滯 至闔不能便

極力於下 肛門脫出 故謂之脫肛 溫其藏則愈 古方有

坐湯溫熨之 療皆良法也

治肛門不收裏急後重磁石散方

磁石火煨醋洗

壹兩

磁石火煨醋洗

壹兩

蝟皮壹枚炙

右三味搗羅為末每服二錢匕米飲調下慎舉重及

急衣帶斷房室周年乃佳

治痢後脫肛蝟牛散方

蝟牛參柴枚燒

磁石火煨醋洗

壹兩

碎水一匙

牛人赤小

右三味重合研如粉每服二錢七空心米飲調下日

午再服

治痢後脫肛芫荽散方

芫荽子砂黃

龍頭貳枚

鐵精半兩

大分

大分

大分

石三味搗羅為末每服二錢七空心米飲調下日晚
再服仍將藥末少許裏肛上炙故麻履底接入口即不

出

治瀉痢日久脫肛疼痛黑聖散方

天蜘蛛

壹枚用

輒子葉兩重

裏以線繫

定合于內燒令黑色勿太過

右一味細研入黃丹少許研勻每先用白礬葱椒煎

湯洗浴拭乾後將藥摻在軟帛子上將手掌接托上

肛頭即不下

治冷熱不和下部痛裏急後重虛滑或結澀腸頭脫出

確砂丸方

硝砂飛壺

硫黃研

白礬研各

已上三味同研勻用萊蕪一枚重五兩者割開留元蓋子剝作坑子填上件末在內將瓦蓋用竹簽定以麩劑十五兩裹了開地坑子一枚方一尺鋪馬糞厚三寸安麩毬在上更以馬糞蓋之上發火燒候麵黑卽止去麩將萊蕪藥爛搗如膏更入後藥

肉豆蔻法

葫蘆巴各半

訶梨勒皮

附子炮裂去

補骨脂炒各

檀香子炒

右六味搗羅爲末通前藥膏同搗滴少好酒和納令勻丸如梧桐子大每服十五至二十丸空心食前

溫米飲下四日服過令人不暗舉強背虛不痛淋

治洞泄肛門脫出豬肝散方人手髮煎淋口熱求

豬肝壹斤切慢

黃連去

阿膠炒

艾葉炒

烏蘆各壹

烏梅取肉貳

艾葉半兩

右六味搗羅爲散每服五錢匕溫酒調下白米飲亦可食前日再服

治肛門脫出壁土散方

故屋東壁上土伍

皂莢參挺各長

右二味搗羅土爲細末傅肛頭取皂莢水暖更互敷入則止

治脫肛不收蒲黃傳方

右用蒲黃一珠以豬脂和傅肛上手按抑令入廿三

三愈

治積冷下痢脫肛枳實熨方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄子蜜塗炙令煖熨
之冷更易之肛縮入卽止

疔蠱

論曰疔有五種久變爲蠱蠱一曰白疔令人皮膚乾燥
而無潤澤之氣二曰赤疔令人毛髮焦枯三曰蟻疔令
人腰脊強重四曰疔蠱令人下部舉急背強不能俯仰

五曰黑疔患者必死令人五藏俱損或下瘀血此蓋腸
胃虛弱嗜甘味過度致脾氣緩弱穀氣衰微榮衛虛損
腸間諸蟲因虛而動蟲蝕於上則手足煩疼心中懊懣
嘿嘿不欲飲食腰脊無力食不知味精神恍惚夜夢顛
倒喉咽生瘡齒斷黯黑損膿膿血俱出胃氣逆則變嘔
噦下蝕腸胃便痢膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開
漸至危殆

治久患疔痢不差兀子礬散方

兀子礬燒研

黃連法須各

白礬燒研

龍骨研

雲母粉研各壹

桂去蟲

麝香研各半兩 無食子燒米

右八味搗研為散空心生薑汁調下三錢匕日再服

疝積年疝痢羸瘦面色萎黃方

黃連去 艾各壹

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內硫黃味

更煮三五沸絞去滓又內蜜更煮三五沸分三服

疝疝久不差羸瘦欲死方

新出羊糞壹升

右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之日午唯

食煮飯極重者不過三服差

治久痢赤白疝濕諸疾五皮湯方

槐皮 桃皮 楊柳白皮

柳皮 藥皮各以患人手把外截壹握

右五味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心溫服未

止再服

治久痢變疝下痢生惡瘡惡寒壯熱白湯方

桃白皮 槐白皮 苦參

熟艾三月三日者伍合 太棗拾枚

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽一棗許

大攪令勻取二升灌下部餘分三服因煎煎一煎

治久痢成疳灌洗方大藥

檮根白皮豐握搗絞取汁參合取時勿令見風日大麻油煎如

酢泔合瓜取椒肆兩去合口豉合

右五味以水五升先取椒豉煎絞取汁二升和檮汁

麻油泔澆等三味分為兩分用一分灌下部隔一日

更取餘者復灌其藥溫用唯得食煮飯蒸白爛煮蔓

菁芥等五六十日外以鹿脯下飯白

治丈夫婦人小兒久痢成疳百方不差方

丁香研麝香研黃連生

付有三味搗研為散每以一錢匕取竹筒吹入下部小
令兒量度減之不過三四止蓋

治疳痢不止方土

苦參 甘草 雄黃生

右三味搗羅為細末先以水五升煮葱白五寸破一

合蜀椒三十粒至三升入藥末三撮於汁中候冷熱

得所先飲少許豉泔食一口飯乃側臥徐徐灌下部

訖多時卧不出為佳犬急乃出之於淨地嘗有疳濕

蟲如白馬尾頭黑是其効也若重者肛大難差當取

桃枝綿裹頭浸前件藥汁適寒溫烙之近脊點烙一

上三十度乃差

治久痢成疝便下白色食不為肌膚石榴花方差當用

石榴皮榴山橡實八出附子地裂去皮點

無食子身厚朴去濕皮生乾薑兩半地各取兩

右五味罽羅為末米飲和衆手丸如梧桐子大每服

三十丸食前生薑湯下日再立代煎悉白而七效

濕羅 甘草 乾薑

論曰凡下痢不止或時氣之餘為水濕所乘客於腸胃
令九蟲皆動侵蝕府藏故為濕羅之病所謂羅者蟲動
於厓而難知故也謂其蟲因濕而動故名濕羅其證上

則蝕脣日下則蝕肛門上脣生瘡是蟲蝕五藏令人心

煩懊懷下脣生瘡是蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛

氣逆則變為嘔噦甚即府藏被傷齒上下斷皆生瘡齒

色黯黑是其候也下痢出瘀血者不可治一盡半頭

治濕羅痢不止蕪荑丸方

蕪荑人微 吳棗黃湯洗 乾薑炮各

枳殼去炒 黃連去參分

右五味罽羅為末煮漿水飯和丸如梧桐子大每服

二十九空心日午米飲下

治濕羅痢蕪荑黃連丸方

蕪荑人

微炒 半兩

黃連

去須炒 壹兩

右二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸
空心食前煖米飲下加至七丸

治疳蠱蝕下部苦參湯方

苦參

青荊子

各壹兩

甘草

炙 兩

熊膽

研各 半兩

右四味除熊膽外麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎
至八分去滓入膽半分攪和空心頓服日午再煎服
之

治濕蠱疳蝕下部參連湯方

苦參

壹兩

黃連

去須炒 貳兩

阿膠

炙令燥 壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去
滓空心溫服日晚再服

治疳濕蠱蝕口齒及下部青荊子散方

青荊子

苦參

甘草

生剉各 壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕食前煖生地黃汁調

下

治痢濕蠱下部瘡爛黃連湯方

黃連

去須 肆兩

熟艾

炒 貳兩

苦參

槐白皮

各壹兩

右四味細判如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至八分去滓溫服重者不過三劑

治疔腫蝕人下部通見五藏痢下膿血舉體不安偏身疼痛面無顏色手足虛腫苦參散方

苦參

礬石熬令汁盡

青箱子各半兩

藜蘆壹分

右四味搗羅爲散每用二錢匕置竹筒中吹下部日

三二度小兒只一錢匕

治疔腫下部上攻移熱殺蟲豬膽煎方

豬膽壹枚

米醋伍合

右二味煎醋令百沸入膽汁更三五沸滿口飲之蟲死卽差

治疔腫無間所在皆治之方

右取死蝦蟇燒灰研末以油和塗瘡上

治疔蝕人諸處但是赤血痢久不差用之卽差方

蝦蟇

壹枚五月五日採燒灰研

金銀土鍋

人屎灰一方云髮灰各伍兩

麝香研壹分

銀朱小豆許錯

右五味搗研爲末每用少許傅瘡上卽差痢者吹下部

治疳蠹蝕下部生瘡膿血雜下身面有浮氣雄黃散方

雄黃研

青箱子各一

苦參各

礬石熬令

雌黃研

菖蘆

鐵衣各壹

麝香研半

右八味搗研為散每和酸棗大以竹管送內下部中
日一小兒以大豆許此方能救死

治疳濕蠹下赤黑血肛門蟲蝕赤爛日夜疼痛熏黃散

方

雄黃研

丹砂研

食鹽研

青黛研

丁香

礬石熬令

鐵衣

梔子人

麝香研各

丁香良荖子去細辛去蒲精土瓜根

乾薑炮

甜葶紙上

菖蒲

蝦蟆燒灰炒蜀椒法及閉內中日出

故靴底燒天靈蓋各

右一十九味搗研為散每用一錢匕以綿裹內下部

中日再易有瘡即傳其上

治疳濕蠹洗熨下部丁香散方

丁香分

麝香研壹

犀角燒

甘草銹

鈎各

合本三丸

右四味搗研為散以鹽椒各三合豉二合水三升都煎至一升去滓乘熱用綿蘸洗熨下部冷即再煖用治疔濕腫殺蟲青葙子散方

中葯葙子

雄黃研

硫黃研

無黃人

雷片各半

苦參去心

狼牙各分

藜蘆去蘆頭

右八味搗研為散以綿裹一錢七內下部中日再易

之

治下部疔濕瘡經年不差丁香散方

丁香

青黛研

黃連須合

大熱木香研

石灰研

蛇膽各半

麝香細研

右七味搗研為散每用半錢匕傅瘡上日三兩易

大德重校聖濟總錄卷第七十八

此卷載各症

本方取諸醫家論症明辨論方合宜者上日三劑服

澤香煎

大德重校聖濟總錄卷第七十九

水病門

水腫

十水

涌水

風水

石水

大腹水腫

水腫統論

卷之三

水腫

論曰內經謂腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類上下溢於皮膚而爲胛腫胛腫者聚水而生病也其狀目裹上微腫若新臥起然頸脉微動時作欬嗽股冷膚腫口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得臥臥則驚而欬甚則小便黃澁以手按腫處隨手而起如裹水之狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者可治微細者難醫水病有不可治者五脣黑傷肝一也缺盆平傷心二也臍出傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之氣內稽五陽之氣不

得宜通如是則水道不利飲濕攻脾散於肌肉而為水腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾腎氣虛不能制水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時作欬嗽不得安臥小便黃澁以手按腫處隨手而起是也

治水病不限年月深淺洪腫大喘幾不能慶日防已飲

方

防已

天戟

木香

赤茯苓

海蛤

犀角

白朮

白朮

白朮

防風

木通

桑根

紫蘇

陳橘皮

牽牛子

葶藶

郁李人

白僵

大黃

桑根

白朮

右十九味到如麻豆大每服二錢匕水一盞半煎至一盞去滓入麝香少許再煎一沸平旦空心服如人行五里再服不可冷服若久病腸胃虛弱平第二服

即或利若腸胃實者約至數服亦須轉下惡濁黃水

或青黑惡物出三五升此氣化為之也瀉若不甚困

更服如覺力乏卽以漿水粥止之

治水氣服前藥差後服此補氣丸方

防已再洗不可摩用 薏苡仁炒 葶藶炒 桑根白皮炒

牽牛子炒 赤茯苓去黑 陳橘皮去白 木香炒

海蛤末 苧麻葉 苧麻葉 生乾地黄焙

大黃剉 木通剉 桑根白皮剉

陳橘皮去白 大戟炒 防風去

郁李人去皮 木香炒 澤漆炒

右一十七味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服空

心米飲下十丸若覺氣壅加至十五丸如覺通則減

三九至五九大小便不通卽服三十九丸此不獨療水

氣但是氣疾皆治之

服前防已飲差百日內更服五靈湯方

葶藶隔紙炒 木通剉 赤茯苓去黑

防已 陳橘皮去白 木香炒

右五味搗搗每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓

飲之覺熱卽勿服

治水腫牽牛湯方

牽牛子 檳榔剉 木香炒

赤茯苓去黑 陳橘皮去白 木香炒

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓
溫服此藥不獨療水病凡肺氣脚氣黃豚氣上榮心
胸不可忍皆治之

治一切水氣四肢腫滿妙香湯方

懷香子

炒

烏藥

生用

高良薑

湯浸

去辛

青橘皮

去白各壹兩

右四味同麤搗篩每服二錢匕酒半盞煎數沸去滓

稍熱服

治水氣腫滿炮腎散方

巴戟天

去心炒黑

甘遂

炒黃各壹分

檳榔

壹枚炮

碎

木香

至寸許

香薷

紙止炒

大麥蘖

芫花

曬乾

陳橘皮

各半兩

膩粉

壹錢

沉香

澤瀉

各壹

右十一味搗羅爲散每服二錢匕用豬腰子一隻

以竹刀子割開去筋膜作三片搽藥末在內用濕紙

裹慢火煨令香熟先煮葱白三莖令熟細切將葱與

粟米同煮粥一椀先食粥一半乃食腰子藥後再食

粥令盡臨臥服如至五更大便并小便下赤黃惡物

乃驗

治水氣腫滿奪命丸方

大戟炒

甘遂炒各

苦葶藶半兩

澤瀉半

石四味搗羅為末煮棗肉和九梧桐子大若四肢腫

者名為順水溫漿水下三九星月上墮服至天曉利

下惡物若四肢瘦腹腫者名為逆水煎苦葫蘆子陳

麴湯下三九小便頻快是効三日後服補藥礬石九

治水病補藥礬石九方

白礬兩

雄黃兩

丹砂研各

右三味搗羅為末粟米飯和丸菴豆大丹砂為衣每

服五丸至七丸食前生薑湯下日二服

治水氣腫滿傾榔散方

傾榔鼠奴

郁李人去皮

芫花炒

甘遂炒

續隨子

木通制各

海蛤錢

陳橘皮去白

商陸各

右九味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下臨臥服至

五更取下惡物為驗

治水腫久不差大戟九方

大戟炒

陳橘皮去白 巴豆去皮

用大

右三味搗羅為末用大麥麩糊丸如梧桐子大每服

三九生薑湯下空心日晚服

治水腫腹滿二氣湯方

牽牛子半兩 用 甘遂壹錢 微炒

右二味廩搗篩分作二服每服水一盞煎至五分放

溫細呷不計時

治水腫大黃湯方

大黃剉碎 兩 桂去 皮 甘草炙

人參 細辛安苗 葉 各 兩 桑根白皮剉 兩

右六味廩搗篩每服用水三盞藥五錢匕入棗二枚

擘破同煎至九分去滓入白飭一匙頭更煎一沸溫

服日三利小便三五升即差大黃照米泔下十

治水腫及支滿澀飲芫花湯方

芫花炒 黃 大黃剉 碎 甘遂微

甘草炙 大戟去 皮 微 炒

右五味廩搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同

煎至九分下芒消半錢匕更煎一沸去滓溫服以利

為度

治水氣面目浮腫因虛勞脚氣所致鼈甲湯方

鼈甲去 裙 襖 兩 人參 此胡去 毒

當歸切 枳殼去 核 兩 甘草炙

桃人米牧湯浸白橫柳煨乾甘草煎

右八味麤搗篩先用小便二盞浸藥三錢匕經半日

煎取七分去滓溫服以差為度婦人病狀同者加牛

膝半兩

治水腫利小便郁李人丸方黃芩一兩去半盞煎以味

郁李人湯浸去皮尖海藻洗去

程各半兩微炒參分大黃剉碎草薤紙上炒令紫

石韋生毛微炙松蘿參黃連去須木通剉

右九味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十

五九日三稍增以知為度

治水腫麝香丸方

麝香研半芫花鈔黃甘遂微炒去

右三味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大強壯人酒下

十五丸老弱人十九

治水腫利小便商陸丸方

商陸微炙壹芒消研壹甘遂微炒

大黃剉碎芫花微炒各

麝香研肆豬苓去黑皮

右八味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下五

丸

九日三服以微利為度華佗方酒客虛熱當風飲冷
腹冷脹滿加麝香猪苓各一兩

治水腫眠卧不得防已丸方

防已

海蛤研各壹兩

葶藶壹升

杏仁陸拾枚湯浸去皮尖炒別搗

甘遂微炒壹分

右五味先將葶藶杏仁一處拌和後以三味搗羅為末再研勻入棗肉和丸梧桐子大每服米飲下二十丸漸加至二十五丸以微利為度其疾不過五六日即差

治水腫久不差葶藶丸方

葶藶去苗

葶藶炒紫壹分

大戟微炒 葶藶照米

蜀椒去目及閉口者炒出汗

澤瀉微炒

巴豆去皮心裝赤小豆

澤瀉各半

甘遂微炒 牽牛子炒熟壹分

連翹微炒

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下一丸加至二丸服後小便多白色即住

治水腫桑白皮丸方

桑根白皮

取上有白者北陰下根白皮剉炙黃貳兩

郁李人湯去皮炒 商陸微乾

葶藶越上炒

牽牛子炒

巴豆清水煮壹日去皮心膜出油盡各壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服茶湯下十
五丸利三五行見効即止

治水腫檳榔丸方

檳榔微煨 附子炮裂去皮臍 吳茱萸水浸暴乾炒

厚朴去麤皮塗薑汁炙 乾薑炮 防己炒

甘草炙各兩 葶藶紙上炒 杏仁浸去皮尖

椒目微炒 赤茯苓去黑皮 黃耆炒

麻黃去節炒 桂皮去麤皮 栝樓皮去

白朮剉微炒 海藻洗去鹹汁各壹兩半

右一十七味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲

下十九日三稍增至十五丸未知加至二十五丸得

大小便利為驗此方兼療老小虛腫大病後客腫作

治水氣腫滿服商陸豆方

生商陸切如麻豆 赤小豆與商陸等分 鯽魚參枚去腸存鱗

右三味將二味實魚腹中以綿縛之水三升緩煮豆

爛去魚只取二味空腹食之以魚汁送下甚者過二

日再為之不過三劑

治水氣逐氣散方

白商陸去麤皮薄切暴乾

右一味搗羅為散用黃頰魚三枚大蒜三瓣豉豆一
合水一升同煮以豆爛為度先食豆飲汁送下又以
汁調下藥散二錢匕水氣內消

腫水

論曰干水之病腫從脚起上氣而欬名為白水其根在
肺腫從面目起名為青水其根在肝腫從腹起名為黃
水其根在脾腫從脚跌起名為黑水其根在腎腫從心
起名為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛
乍去乍來其根在大腸腫從頭面起至足名為垂水其
根在膽腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在勝

膀胱從四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹起名
為裏水其根在少腸凡此十水生於臟府各從其根究
其所本則肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺
皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤於內氣耗於
外形不可與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺
肺氣孤危腎為水害子不救母故陰精損於內陽氣減
於外三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之之
法備見於內經故曰平治權衡去菟陳莖微動四極温
衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽
已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

也

治水腫十水丸方

椒目微炒治

大戟炒治

甘遂炒治

玄參治黑

葶藶炒治

芫花炒治

赤小豆治

桑根白皮石水

桑根白皮石水

澤瀉治風

巴豆去心皮膜

右一十味等分隨病始所在增其所主藥二分巴豆

四分去心皮壓去油搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大

每服三九米飲下以水下為度未下即三服既下當

節飲但得食乾物耳

又十水丸方

大戟炒治

葶藶炒治

甘遂炒治

藜蘆治白

連翹去梗治

芫花炒令焦

澤漆藥治

桑根白皮石水

巴豆去皮心研出

赤小豆治氣

右一十味等分隨證所主倍之搗羅為細末鍊蜜丸

如小豆大每服三九至五九米飲下日三人弱者以

意節之

治十種水病百方不愈面目四肢俱腫氣息喘急寢臥不得小便漸澀腹脹氣悶水不入口垂命欲死者舊名

葶藶散賜名神助散方

椒目微炒

豬苓皮去黑

澤瀉各等

牽牛炒令香

苦葶藶紙上炒

右五味搗羅為散每服三錢匕以葱白三莖漿水一盞煎取半盞入清酒半盞攪勻稍熱調下空心服良久即熟煮漿水葱白粥二盞更入清酒一盞攪勻面東熱喫令盡至午後小便或大便通利喘定腫減隔日再服百日消盡

治十種水氣檳榔丸方

檳榔炮剉

大戟剉炒

牽牛子炒

滑石碎 葶藶 海蛤 米粟米 瞿麥 穗 薑 附 艾 葉

旋復花

甘遂炒各

右八味搗羅為末用輒飯和丸如菜豆大每服七丸

至十九煎商陸湯下若作散每服一錢匕亦煎商陸湯調下如躁米飲調下如取利動繼服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶炒

杏仁不去皮

右二味搗研為細末麩糊和丸如小豆大每服十五

丸煎杏仁湯下

治十種水病三消丸方

朴消色青白者芒消色青

消石色青白燒之有金色者各

壹兩同上犀角鎔

椒目微鎔各壹兩搗羅爲末合

參消重研令勻

葶藶紙上

葇荍子炒各

杏仁去皮尖雙入炒貳兩以上全味別搗末更與諸藥合搗千杵

右八味用大棗十一枚煮熟去皮核炒令水脉泣盡

和爲劑或鞭卽添少許熟蜜杵千下爲丸如小豆大

每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十九以利爲

度不宜食飽衝冒霜寒并單衣受風冷雖夏中亦宜

就溫禁食鹹味難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近

生產房室等事惟得喫粳米粟米蔥薤生薑橘皮禁

鹽一年永不發動

葇荍子炒各壹兩

治十種水病大海藻湯方

海藻洗去

堯花炒

豬苓去

連翹

澤漆炒

郁李人去皮尖

陳橘皮

桑根白皮炒

白茯苓炒

菓本土去

昆布洗去

大戟炒

防己

葶藶

朴消

甘遂

杏仁去皮尖雙入

葇荍子

檳榔煨

右一十八味廔搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一

康大拍碎同煎至八分去滓空腹溫服日三以利為

度

治寸種水氣偏身洪腫氣喘小便赤澀檳榔湯方

檳榔

牽牛子

葶藶

桑根白皮

赤小豆

精茶

郁李人

防己

精茶

右八味屬搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍

碎同煎至一盞去滓空心溫服日三以利為度

治寸種水氣防己檳榔丸方

防己

郁李人

開葶藶

右四味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服十丸

至五未先空心用後方葶藶湯

葶藶湯方

葶藶子

桑根白皮

百合

右三味屬搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分下煎

藥日三以小便利為度若鼓氣微結加甘遂一兩

怡中承大黃丸方

大黃

甘遂

芫花

椒目

葶藶炒各

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服一匙空

留心桑根白皮湯下日再漸增以知為度

治赤種水氣木香湯方更甚效陳橘皮湯浸去白木至六分下煎

木香湯浸去陳橘皮湯浸去白木至六分下煎

桑根白皮炒

各半兩

木通炒

葶藶六味搗羅別用牽牛子二兩於鐵鉢內以紙襯

手攪乘熱搗羅為末每服以前藥末三錢匕同牽牛

末一錢半匕水一盞半煎至八分去滓五更溫服平

明時喫熱生薑茶粥次用蕪荑桑根白皮各一分煮

白羯羊肉半斤爛熟與喫

治十種水氣神妙湯方

藜香子炒

烏藥

青橘皮湯浸去

高良薑各壹

右四味麤搗篩每服五錢匕用童子小便半盞酒一

盞同煎至一盞去滓稍熱服不拘時

治十水定喘急防已丸方

防已

陳橘皮

湯浸去

大戟炒

苦葶藶紙上炒

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服二

十九溫熱水下不拘時

治十種水氣腹脹比聖餅子方

大戟

甘遂各壹兩

右二味生搗羅為細末每服一錢匕以大麥麩一兩新水和作餅子燒熟每五更徐徐爛嚼茶下移時小便多是効未退再服

治十種水氣四石丸方

滑石

井泉石研

白石英研

寒水石研

硃砂研細水和作餅子用濕麩肆兩裹藥餅燒紫色去麩各貳錢

白丁香半兩

續隨子人錢

右七味搗研為末麩糊丸如梧桐子大每服五丸生薑湯下第一日三服第二日四服第三日五服以利為度利已用次藥補之

取下水氣補藥木香丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙各壹錢

蓬莖茂貳錢

右三味同為末麩糊丸如菡豆大每服十丸白湯下

治十種水氣靈寶丸方

滑石

好白者貳兩

膩粉壹兩

右二味先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜

濃汁成膏和左如菉豆大每服七丸五更空心温米
飲下日只一服服至五七日覺臍腹撮痛小便多爲
効忌鹽一百日覺効便服補脾胃藥

治十種水氣大通三焦此方神仙經中所載天台山金
壇石室中鑄紀但令人忌口無不差者再蘇丸方

大戟炒

曾遂炒

春大麥麩炒

巴豆

去心膜麩
炒出油盡葶藶炒

桂去
皮

大黃

剉炒各
半兩

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十九空心
茶下以利爲度

治氣水心下痞緊喘息氣急大腸秘澀龍甲飲方

鱉甲

去裙襖
醋炙

訶梨勒皮煨

椰子人研

赤茯苓

去黑皮各
壹兩半

桑根白皮剉

吳茱萸

湯洗焙乾
炒各壹兩

檳榔剉碎

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去
滓食前温服如人行五里再服

治氣水頭面俱腫四肢無力小便澹海蛤丸方

海蛤

研壹
兩半

消石研貳
兩

葶藶

微炒研
兩半

杏仁

湯去皮尖雙
炒黃研壹兩

右四味搗羅爲細末棗肉和丸如梧桐子大每服十

九食前煎木通湯下日二服

治氣水四肢不和面目浮腫小便滯氣急促檳榔飲方

檳榔剉伍枚

桑根白皮剉

陳橘皮湯去白焙

防己

郁李人研各壹兩半

吳茱萸湯洗焙乾炒半兩

木通剉貳兩

右七味廬搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服如人行五里再服

治氣水面目浮腫胸滿短氣小便不利桑白皮飲方

桑根白皮剉

赤芍藥

郁李人研

百合各壹兩半

米通剉貳兩

大腹伍枚

右六味廬搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

涌水

論曰內經言肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水然也夫腎爲肺之子而主水大腸爲肺之府而爲傳道之官肺受寒邪宜傳於腎腎受寒邪則其水閉鬱而不流且無所歸故客於大腸而不下夫水性流下今乃客於大腸不得宣通宜其證涌溢如囊裏漿也

治涌水腹中動搖作水聲兼痰飲腹胸脹滿旋復花丸

方

旋復花

桂去麩皮

枳實去麩炒

人參各壹兩

乾薑炮

芍藥

白朮各壹兩

赤茯苓去黑皮

狼毒

烏頭炮裂去皮

礞石各貳兩

細辛去苗葉

大黃剉

黃芩去黑心

葶藶隔紙炒

厚朴去麩皮

吳茱萸湯浸洗炒

羌活酒浸半日炒焦

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

甘遂炒參分

右二十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸酒下日二不知稍加丸數以知為度

治涌水腹滿大黃附子丸方

大黃剉

旋復花

附子炮裂去皮

赤茯苓去麩皮

椒目炒

檉皮去粗皮

羌活剉

狼毒剉

乾薑炮

芍藥

枳實炒

細辛去苗葉各貳兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三先熟水下漸增之早晚食前臨卧各一服

治涌水腹滿不堅疾行則濯濯有聲葶藶丸方

葶藶隔紙炒

澤瀉各壹兩

豬苓去黑皮

椒目

桑根白皮

杏仁去皮尖雙炒

治涌水檳榔丸方

檳榔煨 牽牛子炒 赤小豆炒

郁李人湯浸去 桑根白皮剉 肉豆蔻去

杏仁去皮尖雙人 各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服十九以溫

水下日再

治涌水海蛤湯方

海蛤煨 木葉 菟絲 藜蘆 小遠志去 各正

大戟各壹兩 赤香子 防己各半

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞半煎至八分熱

服若取下惡水即白粥補之禁鹽一百二十日兼

不得服芫花甘遂藥

治涌水諸般水腫商陸丸方

商陸切焙 陳橘皮湯浸去自

木香兩 赤小豆麩

右四味搗羅為末以新汲水和丸如棗豆大每服二

十九橘皮湯下

治涌水心下如數升油囊舉舉作聲日不欲食但欲飲

水久病則成瘕菟麻單方

菟麻子去皮貳

右一味熟研以水解得三合清且頓服盡日中當吐
下青黃如葵汁病不盡即三日更增十枚服如上法
以病盡為度五日內只喫白糜粥

治涌水小便澀臥即喘息豬苓飲方

豬苓

去黑皮

桑根白皮

切

防已 豆大

百合

郁李仁

各壹兩

麩麥

木通

剉

與

白

右七味廬掃篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服如人行五里再服

治涌水腸鳴腹大通草飲方

木通

剉

桑根白皮

剉

石葦

去

赤茯苓

去黑皮

防已

澤瀉

大腹

炮

右七味廬掃篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服如人行五里再服

治涌水腹滿小便難葶藶丸方

葶藶子

炒壹兩

消石

剉

杏仁

湯去皮尖

壹兩

右三味搗羅為細末聚肉和丸如梧桐子大食前水

通湯下十九日二服

風水

論曰內經言腎者牡藏也腎主水故人勇而勞甚則腎汗出腎汗既出復感於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為附腫本之於腎名曰風水其脉自浮其外證骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之狀頸脉動時欬者是也金匱方云脉浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏身體洪腫汗出乃愈惡風者為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗二者之證不可不察

治風水偏身腫骨節疼痛惡風脚弱汗出不仁麻黃石膏湯方

麻黃

去根節陸兩

石膏

剉兩

甘草

炙兩

白朮

剉兩

附子

炮裂去皮臍壹枚

黃芩

兩

右五味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑一棗大拍碎大棗二枚擘破同煎置一盞法辟溫服日三服訖覆令汗出愈

治風水頭重面腫蒼朮飲方

蒼朮

米泔浸切暴乾

杏仁

去尖

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

各壹兩半

商陸根

臍兩

連皮大腹

肆

嫩楮枝

切

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一

去滓食前溫服日三

治風水身體面目盡浮腫腰背連引髀股滿不能食麻

黃湯方

麻黃去根節

桂去粗皮

甘草

附子炮裂去皮

右四味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑一

棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服日三

治風水舉身腫滿短氣欲絕大豆湯方二盞入生薑一

杏仁湯浸去皮尖

黃耆剉

防風又

白朮剉各

防已

麻黃節

赤茯苓去黑皮

甘草炙各

右八味廬搗篩每服五錢匕先用水三盞煮大豆一

合取熟去豆入酒一合與藥同煎至一盞去滓溫服

日三當下小便愈

治風水面腫骨痛惡風欬喘防已飲方

防已

赤茯苓去黑皮

桑根白皮

羌活去蘆頭

蒼朮米泔浸

郁李人剉

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一

盞去滓溫服不拘時候日三

治風水脉浮浮爲在表其人或頭面汗出表無他病但

腰已下腫防已湯方

防已

白木劉各

甘草多壹

黃耆劉貳兩半

右四味廔搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎棗二枚擘同煎至七分去滓溫服如喘加麻黃

留二兩去根節身重胃中不和加桂二兩去蠶皮心下

久寒加細辛二兩去苗葉服訖厚衣覆取汗則愈

治風水惡風舉身悉腫脉浮不渴自汗而無大熱越婢

湯方入棗

麻黃去根節

甘草多壹

石膏碎貳

白朮兩

右四味廔搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎棗二枚擘同煎至一盞去滓溫服日再如惡風

加附子一枚欬嗽肺脹加半夏一兩

治風水徧身腫橘皮湯方

陳橘皮湯皮去白

楮白皮多劉壹

桑根白皮劉貳兩

紫蘇子炒貳

右四味廔搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大

拍破同煎至一盞去滓溫服日三

石水

論曰腫從內起堅塊四肢遊腫名爲石水其根在膀胱蓋腎主水與膀胱合膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣今腎虛則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能化氣而隱滯不通水液停結於臍腹間故其證胸腹鼓滿按之如石脇下脹痛其脉沉遲身體發熱四肢頭面皆腫也

治膀胱石水四肢瘦桑白皮湯方

桑根白皮切參兩射干

赤茯苓去黑皮

黃芩去心

白朮各貳兩

澤漆剉

防已

澤瀉各壹兩

右入味麤搗篩每服以水三盞煮大豆一撮至一盞半去豆下藥末三錢匕煎至七分去滓溫服日二夜

治石水四肢細瘦腹獨腫大狀如懷娠心中妨滿食即氣急楮皮湯方

楮白皮剉

桑根白皮剉

防已剉各壹兩半

澤漆莖葉射干

白朮

赤茯苓去黑皮大豆炒

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞酒一盞煎至一盞去滓溫服日三夜一

治石水四肢細瘦腹獨腫大海蛤丸方

海蛤研參

葶藶研參 桑根白皮切各

赤茯苓去黑皮

芎藭湯浸去 陳橘皮湯浸去白

防己剉參

白木湯浸去

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服二十九漸加至三十九米飲下早晚各一服

治石水四肢細瘦腹腫心中妨滿食即喘急桑根白皮

湯方

桑根白皮剉

澤漆剉各 防己剉各

射干

白木湯浸去 楮白皮剉各

射干剉各

白木湯浸去 楮白皮剉各

右七味搗羅每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

溫服日三夜一

治石水龍甲丸方

龍甲去裙爛

吳茱萸湯浸去

訶梨勒皮剉

青橘皮湯浸去 京三稜炮各

牽牛子炒壹

右六味搗羅爲末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九生薑橘皮湯下微利爲度

治石水四肢瘦腹腫杏仁丸方

杏仁湯浸去皮尖雙入炒苦瓠取膜微炒

右二味搗羅為末煮麵糊和丸如小豆大每服十九

米飲下日三服水出為度

治石水葶蘆丸方

葶蘆隔紙炒

桃人湯浸去皮尖雙入炒各貳兩

右二味搗羅為末麩糊和丸如小豆大每服十九米

飲下日三夜一小便利為度

大腹水腫

論曰內經言水病下為臍腫大腹又曰上下溢於皮膚故為臍腫其證腹大四肢小陰下濕手足逆冷腰痛上

氣欬嗽煩疼是也蓋三焦閉塞水道不通流溢皮膚榮衛否澀內連腹膜則至陰內動脹急如鼓得病之本多因大病之後或積虛勞損或新熟食畢入水自漬及浴故令水氣不散理宜然也

治大腹水腫口苦乾燥此腸間有水防已丸方

防已

椒目

葶蘆炒令紫色

大黃剉醋拌炒乾各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十九米飲下日三服稍稍增之口中有津則止勿服渴者加

芒消半兩

治大腹水腫氣息不通證候危篤者牛黃丸方

牛黃研半兩 昆布洗去鹹炙乾 海藻洗去鹹炙乾

牽牛子炒 桂去麩皮 椒目炒

葶藶炒令紫色

右七味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十五丸

米飲下日再服稍加之以小便利為度正觀十九年

漢陽王患水疾醫所不藥服此藥五六日差

治水氣大腹腫麝香丸方

麝香壹錢 甘遂炒 芫花醋炒各半兩

人參壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服二十九

米飲下

治大腹水腫利小便水銀丸方

水銀水煮壹日壹夜研壹兩

椒目各壹升

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大每服十九米

飲下日再服

治水氣腹大腫甘草丸方

甘草炙

防已

葶藶炒令紫色

右三味搗羅為末用酒熬為丸如小豆大每服二十

丸至三十九米飲下

治大腹水腫利小便蘇合香丸方

蘇合香 水銀水者壹復白飲為未各

右三味合研令勻鍊蜜為丸如小豆大每服十九米

飲下日三

治大腹水腫利小便葶藶散方

葶藶炒令紫 杏仁貳拾枚湯浸

右二味搗令極爛分為十服每服用米飲調下日二

服

治大腹水腫利小便蓖麻飲方

蓖麻子貳拾枚成

右一味細研以水半盞調勻一服令盡至日中當吐

下水汁若水不盡三日後更服三十枚猶未盡者更

作差後節飲及減食食糜粥以養之

治大腹水腫利小便葶藶酒方

葶藶壹

右一味用酒五升浸三宿每服半盞日二服小便利

為度

治久患大腹病其狀四肢細腹大有小勞苦則足脛腫

滿食則氣急此病服利藥下極不差宜用此酒以散除

風濕利小水丹參酒方

丹參

鬼箭羽各壹兩半

秦艽去苗土壹兩

知母冬月不用各壹兩

豬苓去黑皮參分

白朮壹兩半

海藻洗去鹹各參分

赤茯苓去黑皮壹兩

桂皮去麩

獨活去蘆頭各參分

右一十味以酒九升浸五日急須者置熱灰上一日便可就每服一盞飲酒少者隨意減之日三服

大德重校聖濟總錄卷第七十九