





二如亭群芳譜



棉譜小序

禹貢島夷卉服厥篚織貝蔡氏謂棉之精好者爲吉貝徐子先吉貝一疏載棉之利最詳興美利前民用仁人之言夫今棉之利遍宇內且功力視苧葛甚省績苧葛日以錢計紡綿四日而得一觔信其利遠出麻枲上也今北土廣樹蕘而昧於織南土精織紅而寡於蓆若以北之棉

學松之織利當更倍顧棉則方舟而鬻諸南布  
則方舟而鬻諸北此子先所爲寘也予故撮其  
旨要俾務本者得覽焉作棉譜

濟南王象晉蓋臣甫題



二如亭群芳譜棉部卷全

濟南 王象晉蓋臣甫 纂輯

松江 陳繼儒仲醇甫

虞山 毛鳳苞子晉甫 同較

寧波 姚元台子雲甫

男王與胤

孫王士祿

誼亥

濟南

棉譜

一名吉貝春月以子種稽似木葉綠似牡丹

而小花黃如秋葵而葉單幹不貴高長枝最  
喜繁茂結實三稜青皮尖頂纍纍如桃北人  
呼爲花桃熟則桃裂而絨現其絨如鴉毳較  
諸絲纘雖不無少遜然而用以絮衣甚輕暖  
子如珠可以打油油之滓可以糞地秸甚堅  
堪燒葉堪飼牛其爲利益甚溥種花之地以  
白沙土爲上兩和土次之喜高亢惡下濕拾  
花畢卽剗去秸遍地上糞隨深耕之令陽和

之氣掩入土內有力耕三遍隨撈平不致風  
乾如秋耕二遍正月地氣透或時雨過再耕  
一遍大約糞多則先糞而後耕糞少則隨種  
而用糞此其槩也須用熟糞麻餅亦佳南方  
煥一種可活數歲中土須歲歲種之其類甚  
多江花出楚絨二十而得五性強緊北花出  
畿輔山東柔細中紡織絨二十而得四浙花  
出餘姚中紡織絨二十而得七更有數種曰

黃蒂穰帶有黃色如粟米大曰青核核青細于他種曰黑核核純黑色曰寬大衣核白而穰浮此四種二十而得九黃蒂稍強緊餘皆柔細中紡織又一種紫花浮細而核大絨二十而得四時布製衣甚朴雅士紳多尚之又有深青色者亦奇種其傳不廣擇種須用青核等爲佳或曰恐土脈不宜不思木棉始出南海諸國今何以遍中土也

○擇種

農桑通訣云花種初收者未實近霜者不生惟中間收者爲上老農云棉種必

冬月碾取經日曬燥冬月生意歛藏晒曝不傷萌芽春間生意苗發不宜大晒總之陳者

秕者油者濕蒸者經火焙者皆不堪作種將

種時用水浥濕過半刻淘出其不堪者皆浮

出水面而堅實不損者必沉取而種之苗必

茂又一法浸用雪水能旱鰻魚汁浸過不蛀

下種種不宜蚤恐春霜傷苗又不宜晚恐秋

霜傷桃大約在清明穀雨間此時霜止

也種法有三漫撒者用種多更難耘耨耕者

易鋤而用種亦多惟穴種者用種頗少但多

費人工法將耕過熟地仍用犁耕過就于溝

內隔一尺作一穴澆水一二碗俟水入地下

種四五粒熟糞一碗覆土一二寸用脚踏實

大約一人持種二人携糞若漫撒及耧耩者

須用石砘砘實若虛浮

耘苗

鋤棉者一去草

則芽不能出亦易萎

穢二令

浮土附

苗根則根入地深三令土虛浮根苗得遠行

功須極細密鋤必七遍以上又當在夏至前

諺曰鋤花要趕黃梅信鋤頭落地長三十大

抵苗宜稀鋤宜密此要訣也初項兩葉止刻

去草宜密留以備傷再鋤宜稍密三鋤則定

苗顆一穴止留粗旺者一株斷不可兩株並

留並則直起而無旁枝桃少苗長後有幹粗

葉大衆中特壯異者名曰雄花大而不結實

然又不可無間留一二株多則去之地中不

可種別物恐分地力又不宜密種如肥田密

種卽青酬不實又易生虫稀種則能肥肥則

實繁而多收亢倉子曰立苗有行故速長強

弱不相害故速大正其行通其宁疏爲冷風

則有收而多功又云樹肥無使扶疎樹穠不

欲專生而獨居夫苗其弱也欲孤其長也欲相與俱其熟也欲相與扶扶疎且不可況逼

迫耶若數寸一株長枝布葉株百餘

苗

子畝二三百斤豈不力省而利倍哉

打心

高

七八寸打去衝天心令四旁生枝旁枝半尺

以上亦打去心勿令交枝相揉如此則花多

實密葉葉不空大約打心當在伏中三伏各

打一次不宜雨暗恐壅灌而多空條最宜晴

明庶旺相而生旁枝如有未長

大者又當隨時打去不必例拘

拾花

桃花待桃

開絨露爲熟旋熟旋摘攤放箔上日曝夜露

待子粒既乾方可收貯則絨不浥而子不腐

紡績花既曝乾碾去種子彈使熟細便可紡

線農桑通訣所載紡車容三繩若倣其

製而效之尤易爲力或曰北地風高細紡不

易今肅寧之布幾同松之中品聞其鄉多穿

地窖深數尺作屋其上簷高地二尺許作窓以通日光人居其中就濕地紡績便得緊細與南土無異若陰雨蒸濕不妨移就平地而南人寓都下者多朝夕就露下紡日中陰雨亦紡則安在北地織布布之名不一曰城曰風高不便細紡也織布文緝曰烏鱗曰屈昫曰白氈白縷曰貝布斑布總之皆棉布也海南所織上出細字雜花名吉貝布松布之巧者有折枝團鳳摹局字樣等製而一切捍彈紡織綜綫擎花法皆始于黃媪其布之麗密他方莫並焉南中用糊先將棉羅入絃車成紅次入糊盆度過竹木作架兩端用繩急維竹帚痛刷候乾上機謂之刷紗南布之佳者皆刷紗也北地則風塵易起若依肅寧作窖冒以修廊循簷作窓令可開闔以避就風日於中經刷織紅遇輕陰無風纖塵不起不妨

移之平地成布  
當不減吳下矣

○附錄斑枝花

樹大可合抱高四五丈葉黃花紅如山茶而光極厚一名木棉

出南方俗譌作攀枝花

木綿

一名瓊枝其

高數丈樹類梧桐葉類桃而稍大花色深紅

類山茶

春夏花開滿樹望之爛然如綴錦花

謝結子

大如酒杯絮吐於口茸茸如細毳舊

云海南蠻人織爲布名曰吉貝今第以充絅

裨取其軟而溫未有治以爲布者淳梧間亦

多有之但土人未嘗採取隨風

飄墜而已

張氏譜錄

○典故

元至元間馬八兒國入貢二十二年遣使至其國求奇寶得吉貝衣十襲吉貝

樹名其華成時如鵝毳抽其緒紡之以作布亦染成五色織爲班布解歸吾松以棉

布衣被天下而綿花之來莫詳其始相傳謂種出西番元時始入中國按通鑑梁武帝送木棉皂帳史炤釋文云木棉江南多有之以春二三月下種旣生須一月三薅至秋主黃花結實及熟時其皮四裂其中綻出如棉土人以鐵鋤碾去其核取如綿者以竹爲小弓長尺四五寸許牽弦以彈綿令其勻細卷爲筒就車紡之自然抽緒如繅絲狀織以爲布按史炤所言卽今之綿花無疑矣但今制彈綿之弓以木爲之長六尺餘則與古稍異耳謂起自元時非也第史炤以此解木棉亦未爲當木棉出交廣其樹盈抱其實如酒盃其口有綿可作布見張勃吳錄卽今之斑枝花楊用修辯之是矣

張七選

○麗藻詩七言

蜀客南行過碧溪木棉花發錦江西山橋日晚人來少時見猩

猩樹上

啼張籍

二如亭群芳譜棉部卷全終


二如亭群芳譜



藥譜小序

語云爲人臣不可不知醫爲人子不可不知醫  
昔范文正願爲良醫而陸忠宣罷相日惟閉門  
集古方書豈非以醫也者死生之繫人鬼之關  
哉每見世之俗醫且不知有本草無問難經素  
問矣間取諸藥形性及所療治而著之冊卽不  
敢妄擬二公或亦二公之遺意也作藥譜

濟南王象晉盡臣甫題



韓信小序

二時亭詩集

二如亭群芳譜

藥部首簡

本草綱目序

夏良心

夏公名良  
心廣德人  
副都御史

賈子有言古之聖人不居朝廷必居醫卜之間  
醫可賤簡爲哉本草一書固醫家之耰鋤弓矢  
也名不覈則悞取性不明則悞施經不辨則悞  
入悞者在幾微之間而人之死生壽夭係焉可  
無慎乎吾觀本草一書而有感天下之生物何

其獨厚於人也既百穀以養其生又有百草  
以治其疾夫使蟲里者有生而無疾也則滋以  
百穀足矣惟其不免於寒暑陰陽之侵故必良  
藥補之毒藥攻之而後得以祛其所害而終其  
天年嗚呼此治道也治生者去其所以害吾生  
者而已矣治民者去其所以害吾民者而已矣  
今天下號稱治平無事然而病在脉理者已數  
形見四民之業窘而重以燠滯之不時所在有

啼號聲則元氣索采權之使十道四出而鴟張虎視者且徧埏窩則邪氣盛當其時欲如醫者按其表裏標本而治之何者宜補何者宜攻其用以補者將爲旉木乎抑芒與文無乎用以攻者將爲黃芒乎抑革與鳥喙乎取其散於山澤者以調舌臟腑必何如而後可以無悞是必有精於其理者若跡之滌和之視長桑君之方太倉公之診而後能挽斯世於仁壽耳

又

董其昌

吾聞五帝之書謂之三墳三墳言大道也道莫人於易近取諸身則爲素問遠取諸物則爲本草蓋說卦所謂於木爲堅多心科上稿者卽本草之鼻祖也且夫藥不過五行五行之變爲五色爲五味爲五氣爲五性爲五用而五者之變不可勝窮聖人以卦氣爲五行之情故曰一日嘗七十毒者此物此志也神膏敷瘡靈丸療疾

非常之事聖人不貴一毒妄攻五兵莫慘傷生  
之事聖人慎之慎之必自身始聖人亦人耳如  
以其腹爲嘗蹈必死之域爲神愚莫甚焉豈足  
信哉知禹之言神也以九疇治水則知農之言  
神也以八象嘗藥審矣秦燔六經惟易附於醫  
卜以不廢故曰執之皆術不執皆道謂本草爲  
神農氏之易可也厥初藥分三品以三百六十  
五種應周天之數自漢以後代有增益爲圖爲

註爲音義事類者凡數十家至近日蘄州李君悉加結集又以經史稗官之書廣引曲証凡四十卷命曰本草綱目可謂勤且博矣張文潛明道雜志云蘄州龐安時隨症絜方輒有神驗乃知醫統故在楚楚又著於蘄神農之佐卽桐君雷公所著書已湮滅不傳而龐安時惟傷寒一論傳於世今讀李君綱目而古今之醫有所統萃焉余故衍三墳之旨而推本於易敢曰爲神

農之言也哉

論藥

李時珍

天造地化而草木生焉剛交於柔而成根荄柔  
交於剛而成枝榦葉萼屬陽莖實屬陰得氣之  
粹者爲良得氣之戾者爲毒故有五行焉曰金  
木水火土有五氣焉曰香臭臊腥膻有五色焉  
曰有青赤黃白黑有五味焉曰酸苦甘辛鹹有  
五性焉曰寒熱溫涼平有五用焉曰升降浮沉

中神農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋諸名賢良醫參酌而增損之第三品雖存淄澑交混諸條重出涇渭不分苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而寄千萬世之死生耶於是翦繁複繩繆遺析族類振綱分目凡得可供醫藥者共若干種列之於編

又

張鴻恩

藥者醫用也良醫之用藥也簡而其儲藥也備

孫察使

吳長洲人

張公名爵

故莞華一撮半夏數丸已足取效而摻其囊則  
牛膝馬勃鼠肝蟲臂無不有也何也儲與用異  
也此書之作固儲道也天之愛人甚矣人之生  
齒日煩物之化育亦盛人之情識日廣病之變  
態亦多物之生也若有待人之用也若有期則  
取之惡得不博平者不可爲毒溫者不可爲寒  
辛者不可爲苦而平毒溫寒辛苦之中微者不  
可爲甚重者不可爲輕也一物而根株異宜一

形而補泄殊性而至於名與實淆如荀書之悞  
讀呂覽之悞註蹲鴟悞稱苦彌悞索者不可勝  
數也則辨之又惡得不詳乎故物雖有名用實  
未著若蘇敷蛇蠍不錄可也其它草根樹皮跂  
行喙息以至土苴芻狗之類秉命雖微效用則  
大既有明驗可厭其多哉況漆葉青麪會益樊  
阿之壽柔湯火齊並愈齊臣之疾昔之名者今  
已非今之實者可終弃耶竇讀東陽記有虎毛

療心疾之徵叔微書有獺爪治肺虫之目道元  
述解毒之草名曰牧靡邵公著救饑之糧稱爲  
石穀諸如此類吾猶恨其弗該而惡可以米鹽  
槩之哉故得其精者可以保身可以全生可以  
養親可以濟世庶幾神農氏之風乎而達者觀  
之則可以窮萬物之蹟可以識造化之妙而見  
天地之心則多識固其餘矣

本草源流

李時珍


昔炎皇辨百穀嘗百草而分別氣味之良毒軒  
轅師岐伯尊伯高而剖析經絡之本標遂有神  
農本草三卷藝文錄爲醫家一經及漢末而李  
當之始加校修至梁末而陶弘景益以註釋古  
藥三百六十五種以應重卦唐高宗命司空李  
勣重修長史蘇恭表請復定增藥一百一十四  
種宋太祖命醫官劉翰詳校宋仁宗再詔補註  
增藥一百種召醫唐慎微合爲証類修補衆本

草五百種自是人皆指爲全書醫則目爲奧典  
夷考其間玼瑕不少有當析而混者如歲蕤女  
萎二物而併入一條有當併而析者如南星虎  
掌一物而分爲二種生姜薯蕷菜也而列草品  
檳榔龍眼果也而列木部入穀生民之天也不  
能明辨其種類三菘日用之蔬也罔克的別其  
名稱黑豆赤菽大小同條硝石芒硝水火混注  
以蘭花爲蘭草卷丹爲百合此寇氏衍義之舛

謬謂黃精卽鉤吻旋花卽山姜乃陶氏別錄之  
差譌歐漿若膽草茱重出掌氏之不審天花桔  
樓兩處圖形蘇氏之欠明五倍子精虫窠也而  
認為木實大蘋草田字草也而指爲浮萍似茲  
之類不可枚陳畧摘一二以見錯誤若不分別  
品類何以印定羣疑

卷一百一十五

二如亭群芳譜利部目錄



第二冊

棉譜小序

棉譜

棉花 附班枝花

群芳譜棉譜目錄

卷一

二如亭群芳譜利部目錄

第三冊

藥譜小序

藥譜首簡

本草綱目序

夏良心

又

董思白

論藥

李時珍

又

張鵠思

本草源流

李時珍

藥譜一

共十四種

附錄九種

桂

附水木樨

甘草

艾

黃蓍

人參

附沙參

玄參

紫參

齊荅

丹參

地黃

术  
附蒼术

檀香  
附降真香  
望水檀

當歸

川芎

五加

地榆

黃精

牛膝

二如亭群芳譜藥部卷之一

濟南 王象晉盡臣甫 纂輯

松江 陳繼儒仲醇甫

虞山 毛鳳苞子晉甫 全較

寧波 姚元台子雲甫

濟南 男王與胤  
孫士浪曾孫啟深 詮次

藥譜一

一名梗 一名木穉葉對生 豐厚而硬凌寒不

凋枝條甚繁木無直體皮堪入藥脂多半卷

使故名桂能侵害他

者爲壯桂葉似枇杷薄而卷者爲菌桂葉似

木故名櫟紋理如犀

柿皮赤厚味辛烈者爲肉桂若官桂乃上等

供官之桂也出賓宜韶欽諸州者佳花甚香

遠白者名銀桂黃者名金桂能著子紅者名

丹桂有秋花春花四季花逐月花者花四出

丹桂葉邊如鋸齒而

或重臺徑二三分瓣小而圓花時移裁高阜

半日半陰處臘雪高擁於根則來年不當自

敘粗

發忌人糞宜猪糞冬月以擣猪湯澆一次妙  
又麻糬久浸候水清澆亦佳蚕沙壅根澆以  
清水來年愈盛北方地寒九月十月間將樹  
以土培根高尺許外苦蓋周密嚴塗以泥半  
腰向南畱一小牖暖日開之以透太陽之氣  
寒則塞之春分後去其塞清明後去其苦無  
有不活又有巖桂似蘭桂而稍異葉如鋸齒  
如枇杷葉而粗澀者有無鋸齒如梔子葉而

光潔者叢生巖嶺間皮厚不辣不堪入藥花可入茶酒浸鹽蜜作香茶及面藥澤髮之類台州天竺寺者生子如蓮實或二或三離離下垂天竺僧稱爲月桂其花時常不絕枝頭葉底依稀數點亦異種也

○挿接接宜冬青又春月攀枝着地土壓之五月生根逾年截斷含蓋移栽木樺接石

橘花必紅

如患腎損取芝麻梗

種樹書

妨患

懸樹間能殺諸虫

○製用桂花點茶香先一室菊英次之入茶爲清供之最有甘菊種更宜茶二花相爲

先後可備四時之用

桂漿殆今之桂花釀

酒法魏有頻斯國人來朝壺中有漿如脂乃

桂漿也飲之壽千歲

談苑記

江南李後主

患清暑閣前草生徐錯令以桂屑布磚縫中

宿草盡死又以桂作釘釘樹立斃呂氏春秋

云桂枝之下無雜木蓋桂性辛螫故也

花

開時擇枝繁處帶花刪下連葉陰乾收貯來  
年伏中將葉泡湯服溫腹去暑

便民圖書

○附錄水木樨

一名指田枝軟葉細五六月開

荀香亦絕似二月內分種與甘州枸杞配植  
兩盆頗稱清賞搗葉如繒染指紅過鳳仙

○療治

治足躉筋急桂末白酒和塗之日一上

中風口渴面目相引偏僻頰急舌不

可轉桂心酒煮取汁布蘸糊病止左渴糊右  
右渴糊左常用大效 中風失音桂著舌下

薰汗又桂末三錢水二盞服取汗喉痺不語  
同偏正頭風天陰風雨卽發桂心末一兩

酒調塗額上頂上暑月解毒肉桂去粗皮

不見火菝芩去皮等分爲末煉蜜丸龍眼大

每新汲水化服一丸九種心痛桂心末二

錢半酒一盞半煎半盞飲立效又桂末酒服

方寸七須六七次心腹脹痛氣短欲絕桂

二兩水一升二合煮八合頓服中惡心痛同

寒疝心痛四肢逆冷全不飲食桂心末一

錢熱酒調下效產後惡血冲心氣痛欲絕

桂心末狗膽汁九枚子大每熱酒服一丸

產後瘕痛桂末酒服方寸七效血崩桂心

三兩砂鍋內煅存性爲末空心飲服一二錢

死胎不下桂末二錢待痛急時童子小便

溫熱調下亦治產難橫生加麝香少許酒下

反腰血痛桂末和苦酒塗之乾再上吐

血下而桂心爲末水服方寸七此陰乘陽之  
症也不可服涼藥南陽趙宣德暴吐而服二  
次而止其甥亦以二服而安 小兒久痢赤  
白用桂去皮以薑汁炙紫黃連以茱萸炒過  
等分爲末紫蘇木瓜煎湯服 小兒遺尿桂  
末雄雞肝等分擣丸小豆大溫水調下日二  
服 嬰兒臍腫多因傷濕桂心炙熱熨之日  
四五次 外腎偏腫桂末水調方寸七塗之  
食果腹脹不拘老少用桂末飯和丸綠豆  
大吞五六丸白湯下未消再服 打撲傷損  
淤血澀悶身體疼痛辣桂末二錢酒服 乳  
癰腫痛桂心甘草各三分烏頭一分炮爲末  
和苦酒塗之紙覆在膿化爲水神效 諸蛇  
傷毒桂心苦蔞等分爲末 筒密塞遇毒蛇  
傷卽傅之塞不密則不中 欲絕或出自白沫身體冷急煎

口根毒氣

新汲水

一二升

莞花毒並煮桂汁服

中

風逆冷吐清水宛轉啼呼桂一兩水一升半

煎半升冷服消暑桂漿官桂末一大兩白蜜

一升先以水二斗煎取一斗待冷入新磁瓶

中後下桂蜜攪二三百遍先以油單一重覆

上加紙六重以繩札嚴每日去紙一重七日

開之其氣味美飲以小杯能解煩渴益氣消  
疾神效無比再加梅醬一大兩似更佳

陰

痺寒痛皮膚不仁用醇酒二十斤蜀椒一斤

乾薑一斤桂心一斤咬咀瀆酒中用綿絮一

斤細白布四丈并納酒中置馬矢瘞中封塗

勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復瀆以盡

其汗每瀆必足其日乃出乾之并用滓與絮

複布爲復巾長六七尺爲六七巾每用一巾

生桑炭火炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入

至病所寒則復炙巾以熨之三十遍而止汗

出以巾擦身亦三十遍起步內  
室勿見風每刺必熨如是病已

○典故

花多五出惟桂花四出潘笠江謂土之

月中之木居西方四乃西方金之生數故四  
出而金色且開於秋云

月中有桂樹

五

月桂高五丈下有人常斫之樹瘠隨合

其人姓吳名剛西河人學仙有過謫令伐樹

酉陽雜俎

范蠡好服桂飲水賣藥蘭陵於

北祁得仙

洪武間史家有本樞忽變紅色

其色尤異因接一本獻之朝

高

皇帝製詩以賜曰月宮移向日宮裁引得輕紅

入面來好向烟霞承雨露丹心一點爲君開

文曰秋入幽巖桂影圓香心粟粟照林丹應

隨王母瑤池宴染得朝霞下廣寒自是四方

爭傳其本有左翁者坐桂樹下以玉盃盛

甘露與吳猛服之

**廬山記**

漢武帝凌波殿

以桂爲桂風來香

武帝謂東方朔孔顏

之道德何勝方朔曰

顏淵如桂馨一山孔子

如春風至則萬物生

**霸林雜事鈔**

太山北

有桂樹七十株

天神青腰玉女三千人守之

其實赤如橘人食之一年仙官迎之常有九

色飛鳳寶光珠雀鳴集於北

**天地運度經**

漢武帝使董謁乘琅霞之輦以昇壽靈壇上

至三更西王母駕玄鸞之輿至壇之四面列

種軟條青桂

風至桂枝自拂階上游座

淮南王安好道感八公共登山而賦有大小桂

山因以自號

**淮南子**

晉郗生對策第一武

帝問之對曰臣今爲天下第一猶桂林一枝

阜塗之山有桂木八樹在賁隅東八

桂陽郡有桂嶺

樹成林言其大也

**四海經**

桂陽郡有桂嶺

開花徧樹林嶺盡香

**史記**

石桂英似桂

禹

樹而實石生岩穴中 有遠飛雞夕則還依人曉則絕飛四海嘗銜桂實歸于南土本草圖經江東諸處每至四五月後嘗于衢路拾得桂子大如狸豆破之辛香故老相傳是月中落也北方獨無者非月路也又張君房爲錢塘令夜宿月輪山寺僧報曰桂子下塔遽起望之紛如烟露回旋成穗散墜如牽牛子黃白相間咀之無味則桂子之落往往有之但人不識耳

黃山谷以吾

無隱乎爾之義黃詮釋再三晦堂不答時暑退涼生秋香滿院晦堂因問曰聞木樨香乎黃曰聞晦堂曰吾無隱乎爾

昔有僧自天

竺鷺山飛來八月十五夜嘗有桂子落自樂天詩云仙花桂子落紛紛

東坡詩注

桂子

之說起自唐時後宋慈雲式公月桂詩序云天聖丁卯秋八月十五夜月有濃華雲無纖

述天降靈實其繁如雨其大如豆其圓如珠  
其色白者黃者黑者殼如芡實味辛識者曰  
此月中桂子好事者播種林下一種卽活

垂拱四年三月雨桂子於台州旬餘乃止

五

志 竇禹鈞有五子俱登科馮道贈之詩

曰靈椿一枝老丹桂五枝芳

詩集

無瑕嘗

着素裳折桂明年開花潔白如玉女伴折取

簪髻號無瑕玉花

田路花史

木樨吾地爲

盛天香無比然須種早黃毬子二種不惟早  
黃七月中開毬子花密爲勝卽香亦馥郁異  
常丹桂香減矣以色稍存之餘皆弗植又有  
一種四季開花而結實者此真桂也閩中最  
多常以春中盛開吾地亦間有之宜植以備

一種

田

敬美

花之四季開者蘭桂而外有

月桂長春菊月桂閩種爲佳

前

南越傳

尉陀獻桂蠹一器師古曰此蟲食桂味辛蜜

花之四季開者蘭桂而外有

前

南越傳

潰食之今潯志物產載此  
問之士人無知者

張七灋

○麗藻散語

桂棹兮蘭柂桂酒兮椒漿

奠桂枝兮延佇

沛吾乘兮桂舟援北斗兮酌桂漿

俱楚詞

麗桂樹之冬榮

遠遊

朱桂黝儻于南北

靈

光殿賦

桂樹列兮紛敷吐花紫兮布條實

孤

飲蘭若之朝露兮擣桂木以爲空

桂蠹不知所淹晉兮蓼虫不知死乎葵葉

桂芳香而正堅故君子依之

益文選

文樹

叢生兮山之幽偃蹇連聳兮枝相繚山氣龍  
從兮石崖峩崿谷嶄岩兮水層波湧狹群嘯

兮虎豹嘴攀援桂枝兮聊淹留王孫遊兮不  
歸春草生兮萋萋歲暮兮不自聊聽姑鳴兮

啾啾坱兮輒山曲陟心淹留同憮忽兮沕愴  
兮慄虎豹穴叢薄深林兮人上慄嶺岑磅礴

穠音擬

畧音韻

畧音增

確五委切

賴音頗

麌音均

麌音加

澣音徒

麌音均

澣音加

## 五言

仙籍桂香浮  
風生桂枝沉約

桂子秋皎潔  
吾將守桂叢

賞月  
青

## 近秋桂

俱杜甫  
桂隱遙月  
折桂早年知

李太白  
有喜晉  
青

## 攀桂

俱前人  
無勞問轉蓬

不采芳桂枝  
反接惡木

研却月中桂

## 清光應

更多去  
轉蓬行地遠

攀桂仰天高

月中桂

禮闈曾擢桂憲府舊乘驥故園松桂發華

里共清輝俱杜江都

瓊葉潤不凋珠英璨

如織李德裕

桂熟常收子蘭生不作畦王

建

弟子已攀桂先生猶卧雲方

相思

在何處桂樹青雲端空白

蟾宮分與種人

世散清香白

芳意不可傳丹心徒自

渥獺子廸

桂樹生南海芳香隔楚山今朝

天上見疑是月中攀蘆僵

堂中又有八樹繁

華無四時不識風霜苦安知零落期泡雲

不是人間種移從月裏來廣寒香一點吹得

滿山開揚誠齋

團團桂叢孤枝葉寒更娟

託根廷宇間自有幽人致何必問嫦娥青雲

借餘地曾文昭

有客賞芳叢移根在幽谷

爲懷山中趣愛此岩下綠曉露秋暉浮清陰

藥闌曲更待繁華白邀君弄芳馥歐文忠

未植蟾宮裏寧移玉殿幽枝生無限月花滿

自然秋俠客條爲馬仙人葉作舟願君期道

術攀折可淹留

李橋

山中綠玉樹瀟洒向

秋深小閣芬爲度書帷氣欲侵披懷清露曉

遇賞夕嵐陰珍重王孫意天涯淚溝襟

宋文

亭亭岩下桂歲晚獨芬芳葉密千層綠

花開萬點黃天香生淨想雲影護仙粧誰識

王孫意空吟招隱章

西墅絕喧囂秋梧葉

亂飄獨憐青桂樹金粟綴柔條泛酒香偏細

入詩景更饒小山風可仰招隱此逍遙

方九

巖壑同棲處風霜獨秀時暗飄靈隱粟

高擢廣寒枝露氣侵衣袂天香撲酒卮桂叢

吾自密不負小山期

用瑞泉

西嶺千年桂

陰森入翠微瓊枝雲外綠金粟雨中肥影落

浮杯酒香飄襲客衣當年和露折曾向廣寒

歸

用瑞泉

世人種桃李多在金章門攀折

爭捷徑及此春風暄一朝天霜下榮華難久

存安知南山桂綠葉垂芳根青陰亦可託何

惜植君園

卷六

鶯嶺鬱嵒堯龍宮鎖寂

寥樓觀滄海日門對浙江潮桂子月中落天  
香雲外飄捫蘿登塔遠剗木取泉遙霜薄花

更發水輕葉互凋夙齡尚遐興披對滌煩囂  
待入天台路看余渡石橋

詠賓主

憶在山

中時丹桂花歲蕤紅泉浸瑤草日久生華滋

箬屋開地爐翠墻挂藤衣看經竹窓邊白猿

三兩枝東峯有老人眼碧頭骨奇種薤煮白

石旨趣如嬰兒月上來打門月落方始歸授

我微妙訣恬淡無所爲別來六七年只恐白

日飛

釋責

画工吝幽香斑斑被花木氤

氤寒岩桂高韻蓋群馥無人盡日芳守志何

幽獨士介耻求知女貞慙自鬻淒涼楚山秋

榔枝吐金粟淺水映輕明微颺發含蓄樓端

靜忽聞馬上遙相逐踟蹰爲延佇但見林巒

綠餅釀誰折贈清芬闕室廬久處不自知乍

至稱馥郁客悲芬歲暮夢遙寒溪曲長吟小

山詞古意恐

七言

聯翩桂花墜秋月

空賈

難復劉屏山

七言

嚴霜五月擢桂枝

李太白

兎寒蟾涼桂香白

空山隱

清露香浮黃

玉枝陳簡齋

山雲

漠漠桂花濕

東坡

花高攀第一枝

月中

有客曾分種世上無

花敢鬪香

寧子蒼

憶昔風露飄寒粟自領

兒童拾薄金

楊誠齋

桂折一枝先許我楊

穿百葉盡驚人

白樂天

巡簷索共梅花笑

冷盡疏枝半不禁

田子美

天將秋氣蒸寒

馥月借金波滴

小黃

鴻雪凝酥點嫩黃

薇清露染衣裳

西風掃盡狂蜂蝶

獨伴天邊

桂子香

韓子蒼

彈壓西風擅衆芳十分秋

色爲伊忙

一枝淡

野書窓下人與花心各自

香

宋澈真

雨過西風作晚涼連雲老翠入

新黃清風一日來天闕世上龍涎不敢香鄧

志去

衆芳搖落九秋期橫出天香第一枝

莫似寒梅太孤絕更敎遙夜笛中吹

宋文公

學仙深愧似吳郎賴有吾廬兩字蒼疑是

廣寒宮裏種一秋三度送天香

丹霄休嘆

路難通學取燕山種桂叢異日天香滿庭院

吾廬常似廣寒宮

周邦彥

誰遣秋風開

此花天香來自玉皇家簪金裳浥蕡微露知

是仙人萼綠華

周邦彥

多應仙國山邊種

豈是姮娥月裏香願爲兒孫積陰德東堂常

占一時芳宋貞之

周邦彥

金風飄處識天香清影

分明載魄光莫向高枝輕易折須知紅是狀

元郎張鎔盤

月缺霜濃細蕊乾此花元屬

桂堂仙鷺峯子落驚前夜蟾窟枝空記昔年

破戒高僧冷耿介練裙溪女鬪清妍顧公採

擷納幽佩莫遣遺芳老澗邊東坡塵世何

曾識桂林花仙夜入廣寒深移將天上衆香  
國寄在稍頭一粟金露下風高月當戶夢同  
酒醒客聞砧詩情惱得渾無那不爲龍涎與

水沉

**楊誠齋**

翠圍侍女擁紅幢霞臉調朱

笑額黃共醉東君

千日酒更翻西母九霞觴

人間天上高低影月下風前自在香輸與廣

寒宮裏客年年綠鬢賞秋光

**楊濟翁**

招隱

曾緣桂樹畱追歡仍愛小山幽尊前露氣浮

青漢雲裏天香散碧秋老榦已分蟾窟種良宵堪續免園遊靈椿晚歲能相傍花底何妨

醉白頭

**周繇泉**

長堤曲水蓼初紅画舫清

謳引醉翁月色平臨松頂上雲光微起竹林

中香飄桂殿分清露影落銀河淡晚風願假

飛鳬鼓神翼與君同躋廣寒宮

**潘允哲**

玉

階桂影秋綽約天空爲捲浮雲幕娟娟醉眠

水晶殿老蟬不守餘花落蒼苔忽生霜月裔

仙芬淒冷真珠萼娟娟石畔爲誰妍香霧着人清入膜夜深醉月寒相就茶蘂却作傷心

瘦弄雲仙女淡綺衣烟裙不着鴛鴦繡眼中寒香誰同惜冷吟徑召梅花鬼小蠻爲洗玻

瓈盆晚來秋甕

詞小山叢桂最有畱人意拂

蒲桃碧毛澤民詞葉扳花無限思雨濕濃香

滿袂○別來過了秋光翠簾昨夜新霜多少

月宮顏色嬌娥與借微芳

黃衫相倚翠葆層層底入月江南風日美弄

影山腰水尾○楚人未識孤妍離騷遺恨千

年無住庵中新事一枝喚起幽禪

少年痛飲憶向吳江醒明月團圓高樹影十

里薔薇水冷○大都一點宮黃人間直恁芬

芬怕是秋天風露染教世界都香

香蔌蔌小山叢桂烘溫玉酒愁花暗沈腰如束○煩君剩與陽春曲爲君細拂羅衾馥羅

衾裯一春幽夢與君相續

趙少翁秦樓月

暗淡輕黃體性柔情疎迹遠只香晉何須淺

碧深紅色自是花中第一流○梅定妬菊應

羞詩書閑處冠中秋騷人可煞無情思何事

當年不見收

李易安賜楊大

月窟盤根雲

岩分種絕知不是塵凡琉璃剪葉金粟綴花

繁黃菊周旋避舍友蘭蕙羞殺山礬清香遠

秋風十里鼻觀已先參○酒闌聽我語平生

半世江北江南經行處無窮綠水青山常被

此花相惱思共老結屋中間不知爾薌林底

事遊戲到人寰

向伯恭滿庭芳

天高氣肅

正月色分明秋容新沐桂子初收

三十六宮

都足不辭散落人間去怕群花自嫌嫌俗向

他秋晚喚回春意幾曾幽獨○是天上餘香

臘馥恠一樹香風十里相續坐對花傍但見

色浮金粟芙蓉只解添愁思況東籬淒涼黃

菊入時太淺背時太遠愛尋高躅  
也無梅竹新標格也無紅杏妖嬈色一味惱  
人香群花不敢當○情知天上種飄落深岩  
洞不管月宮寒將花比並看

岩桂秋風南埭路牆外行人十里香隨步  
此是薌林遊戲處誰知不向根塵住○今日  
對花非浪語憶昨明光早荷君王顧生怕青  
蠅輕點污思鱸何似思花去

玉宇涼生清禁曉丹色照晴空珊瑚敲  
碎小玲瓏人間無此種來自廣寒宮○雕玉  
闌干深院靜嫣然凝笑西風曲屏須占一枝  
紅且圖欹醉枕香到夢䰟中

甘草

一名國老一名靈通一名美草一名蜜草

一名蜜甘一名落草生陝西河東州郡青州

間亦有之春生青苗高三四尺枝葉悉如槐葉端微尖而糙濬似有白毛七月開紫花冬結實作角子熟時角拆子扁如小豆極堅根長者三四尺粗細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根採得去蘆頭及赤皮陰乾用以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪用味甘平無毒最爲衆藥之主治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥故有

國老之號生用瀉火熱熟用散表寒其性能  
緩能急而又協和諸藥使之不爭惟中滿嘔  
吐嗜酒者忌用昔有中烏頭巴豆毒者甘草  
入腹卽定加大豆其驗奇嶺南解蠱毒凡飲  
食先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽  
吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮  
二升日三服常帶數寸隨身備用若含甘草  
食物而不吐是無毒者也

○頭

生用能行足厥陰陽明二經汙濁生用

之血消癰疽腫痛之毒宜入吐藥稍治胸

中積熱去莖中痛加酒

煮玄胡索苦棟子尤佳

○灸法

長流水蘸濕灸透爲熟刮去赤皮或用漿水有云用酒及酥灸者非也

○療治

傷寒心悸肺結代者甘草二兩水三升煮一多半服七合日一服

傷寒咽痛甘

草二兩蜜炙水二升煮一升半服五合日二服

肺熱喉痛有痰甘草炒二兩桔梗米泔

浸一夜一兩每服五錢水一鍾半入阿膠半

片煎服

肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬

者肺冷也溫之甘草炙四兩乾姜炮二兩水

三升煮一升五合分服

肺痿久嗽涕唾多

骨節煩悶寒熱甘草三兩炙搗爲末每日取

小便三合調甘草末二錢服

小兒熱嗽甘

草二兩猪膽汁浸五宿灸研末蜜丸綠豆大  
食後薄荷湯下十九 小兒初生未可便與

硃砂蜜只以甘草一指節長灸碎以水三合  
煮取一合以綿點兒口 中約一塊當吐出

胸中惡汁此後待兒飢渴更與之令兒知慧

無病出痘稀少 初生便閉甘草枳殼煨各

一錢水半盞煎服 小兒撮口噤生甘草二

錢半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳

汁點兒口中 嬰兒目澀或腫羞明或出血

名慢肝風用甘草一截猪膽汁灸爲末每用

米泔調少許灌之 小兒遺尿大甘草頭煎

湯夜夜服 小兒尿血甘草一兩二錢水六

合煎二合一歲兒一日服盡 小兒羸瘦甘

草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆大每溫水下五

丸日二 大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小

便煮三四沸頓服之良 赤白痢甘草一尺

劈破以淡漿水蘸灸水一升半煎取八合服  
之立效又方甘草一兩灸肉豆蔻七箇煨剉

水三升煎一升分服

舌腫塞口

不治殺人

甘草煎濃湯熱漱頻吐

太陰口瘡

甘草二

寸白礬一粟大同嚼薦汁

發背癰疽李北

海言神授奇秘甘草三大兩生搗篩末大麥

麵九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如  
餅狀方圓大于瘡一分熟傅腫上以紬片及

故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出  
未成者腫便內消仍當喫黃芪粥爲妙

又

方甘草一大兩水炙搗碎水一大升浸之器

上橫一小刀子露一宿平明以物攬令沫出

去沫服之但是瘡腫發背皆效

諸般癰疽

甘草三兩微炙切酒一斗浸瓶中黑鉛一片

溶成汁投酒取出如此九度令病者飲酒至

醉寢後卽愈

一切癰疽諸瘡預眼能消腫

逐毒使毒不內攻功効不可具述用大橫文  
粉草二片槌碎河水浸一宿擣取濃汁再以  
密絹過銀石器內慢火熬成膏以磁罐收之  
每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者  
亦解微利無妨 癰疽秘塞生甘草二錢半  
井水煎服能疏導下惡物 乳癰初起炙甘  
草二錢新水煎服仍令人嘔之 些小癰癧  
發熱時卽用粉草節晒乾爲末熱酒服一二  
錢連進數服痛熱皆止 痘瘡煩渴粉甘草  
灸苦蘿根等分水煎服甘草能通血脉發瘡  
瘍也 陰下懸癰生于穀道前後初發如松  
子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿  
卽破破則難愈用橫生甘草一兩四寸截斷  
以溪澗長流水一盃河水井水不用以文武  
火慢慢蘸水灸之日早至午令水盡爲度劈  
開視之中心水潤乃止細剉用無灰好酒二

小盆煎至一盆溫服次日再服可保無虞二十日方得消盡興化守康朝瘡已破衆醫拱手服此兩劑卽合口草末頻頻塗之神妙日洗三五度代指腫痛甘草煎湯潰之

陰下溼癩甘草煎湯

坐馬癱大粉草四兩擘開將河水九次炙乾以不枯爲妙後將河水約十椀煎至二椀服之卽愈凍瘡發裂甘草煎湯洗次以黃連

黃蘖黃芩末入輕粉麻油調傅湯火瘡甘草煎蜜塗

蟲毒藥毒甘草節以真麻油浸之年久愈妙每用嚼嚥或水煎服神妙

小兒中蠱欲死甘草半兩水一盞煎五分服當

吐出牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升或

煎酒服取吐或下如渴忌飲水飲卽死

飲饌中毒急煎甘草薺汎湯入口便活水草同

若毒甘草煮汁服卽解胎動下血甘草同

苧麻根搗汁碗許加砂

仁末三錢服之即安

艾一名醫草一名水臺一名黃草一名艾蒿處

處有之宋時以湯陰複道者爲佳近代湯陰

者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來

惟以蘄州者爲勝謂之蘄艾相傳蘄州白家

山產艾置寸板上灸之氣徹于背他山艾徹

五湯陰艾僅三分以故世皆重之此草宿根

二月生苗成叢莖白色直上高四五尺葉四

葛茹葉光  
菜中有水

而圓  
誤食令人  
狂亂若中  
風或作吐

狂亂若中

削水令圓

舉向日以  
影可得火

熟艾承其

故名水臺

布狀如蒿分五尖極上復有小尖面青背白  
有茸而柔厚苦而辛生則溫熟則熱七八月  
葉間出穗如車前穗細花結實纍纍盈枝中  
有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取  
曝乾收葉以灸百病凡用艾陳久者良治令  
細軟謂之熟艾若生艾灸火傷人肌脉故孟  
子曰七年之病求三年之艾五月五日採艾

爲人懸之戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油

引火點灸滋潤灸瘡不痛又可代蓍草作燭

心

○製用揀取淨葉揚去塵屑石臼內木杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿爲度用火焙燥則灸火得力入丸散將熟艾用醋煮乾搗成餅烘乾再搗爲末用容齋隨筆云搗艾難着力若入白茯苓三五片同硃卽時可成細末亦一異也春月採嫩艾可作

菜食或和麵作餛飩吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣及止冷痢 積三年後燒津液

下流成鉛錫張茂先云曾試之有驗

附聞雀欲奪燕巢銜艾其中燕輒去

○療治癰疽頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升水一十煮一升頓服取汗 妊娠風寒壯熱

赤斑變爲黑斑，渴血艾葉如雞子大酒三升煮二升半分二服。妊娠風寒卒中不省人

事狀如中風，熟艾三兩米醋炒極熱以絹包熨臍下良久卽甦。中風口喎以葦筒長五

寸一頭刺入耳內四面以麪密封不透風一

頭以艾灸七壯患右灸左患左灸右。中風

口噤熟艾灸承漿一穴，頰車二穴各五壯。

中風掣痛不仁不隨並以乾艾揉團納耳，覩中並下塞諸口獨留一目以痛處著覩目而燒艾薰之一時卽知。古繡口噤生艾搗傳

之乾艾浸溼亦可。咽喉腫痛嫩艾搗汁細嚥之又方用青艾和莖葉一握同醋搗爛傳

于喉上，冬月取乾艾亦得。癲癇諸風，熟艾於陰囊下敷道正門當中間隨年歲灸之。

鬼擊中惡卒然著人如刀刺狀，胸脇腹內刺痛不可按或卽吐血鼻中出血下血一名鬼

排熟艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服  
小兒齋風撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛

定效或隔蒜灸之喉口中有艾氣立愈 狐惑蠭慝病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其上而下部生虫食其肛爛見五臟便死燒艾於管中熏下部令烟入或少加雄黃更妙罌中燒烟亦可 頭風久痛斬艾揉爲丸時時嗅之以黃水出爲度 頭風面瘡痒出黃水

艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日二上 心腹惡氣艾葉搗汁飲 脾胃冷痛白艾末沸湯服二錢 就蟲心痛如刺

口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香蒲一片乃飲一升當下蟲出 霽亂吐下不止以艾一把水二升煎一升頓服 老少白痢陳北艾四

兩乾薑炮三兩爲末醋煮倉米和丸梧子大  
每服七十丸空心米飲下竒効諸痢久下

艾葉陳皮等分煎湯服亦可爲末酒煮爛飯  
和丸鹽湯下二三十丸暴泄不止陳艾一

把生姜一塊水煎熱服

糞後下血艾葉生

姜煎濃汁服三合

野雞痔先以槐柳湯洗

艾灸七壯效郎中王及病痔大如胡瓜貫于  
腸頭其熱如火忽僵卧無計有主郵者告以  
上法灸三五壯忽覺熱氣入腸中因大轉瀉  
血穢併出瀉後疾如失婦人漏下或半產

後下血不絕或姪娠下血並宜膠艾湯阿膠  
二兩艾葉三兩芍藥甘草各二兩當歸地黃  
各三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮三升  
納膠令消盡每溫酒一升日三服姪娠胎

動或腰痛或捨心或下血不止或倒產或子  
死腹中艾葉一雞子大酒四升煮二升分二

胎

二升分溫服

婦人崩中不止熟艾雞子大

阿膠炒爲末半兩乾姜一錢水五盞先煮艾

薑至二盞半傾出入膠烊化分三服一日服

盡產後瀉血不止乾艾葉半兩炙熟老生

薑半兩濃煎湯一服立效產後腹痛欲死

因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪脐上以

絹覆住熨斗熨之待口 中文氣出痛自止

忽然吐血一二口或心悶或內崩熟艾三團

水五升煮二升服一方燒灰水服二錢

血不止艾灰吹之亦可以艾葉煎服 盡汗

不<sup>止</sup>熟艾二錢白茯神三錢烏梅三箇水一

鍾煎入分臨卧溫服

火眼腫痛以艾燒烟起盞覆之候烟盡盞上刮燥下以溫水調化

洗眼卽瘥入黃連尤佳 面上廯黯艾灰桑

灰各三升以水淋汁再淋至三遍以五色布

納于中同煎令可丸時每以少許傅之自爛脫甚妙婦人面瘡名粉花瘡以定粉五錢菜子油調泥盆內用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取出調搽永無瘢痕亦易生肉身面疣日艾火灸三壯卽除  
鸞掌

風蘚艾真者四五兩水四五盃煮五六滾入大口瓶內縛以麻布二層將手心放上熏冷再熱如神  
小兒疳瘡艾葉一兩水一升煮

取四合服小兒爛瘡艾葉燒灰傅之良

癰瘡口冷不合熟艾燒烟熏之白癩風乾

艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之卽瘥

疔瘡腫毒艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛

乃點藥三遍其根自拔用治三十餘人神効

發背初起未成及諸熱腫以溼紙揭上先乾處是頭着艾灸之不論壯數痛者灸至不

痛不痛者灸至痛乃止其毒卽散不散亦免  
內攻神方也 瘰疽不合瘡口冷滯以北艾

煎湯洗後白膠香熏之 咽喉骨鰓生艾蒿

數升水酒共一斗煮四升細綑飲之當下

誤吞銅錢艾蒿一把水五升煎一升頓服便  
下 諸蟲蛇傷艾灸數壯甚良 風蟲牙痛

化蠟少許攤紙上鋪艾以筋卷成筒燒烟隨  
左右熏鼻令烟滿口呵氣卽疼止腫消斬季

謙病此月

餘試卽愈

○典故 宗則文常以五月五日未雞鳴時採艾

見似人處擾而取灸輒驗

荆楚歲時記

○麗藻詩五言

艾葉成人後晒花

結子初

蜀葵 一名黃葵 一名菱草 一名蜀脂 一名百本

黃爲百葵

一名獨根一名戴椹一名戴繖葉扶疎作羊

之長故名  
今俗作芪

齒狀似槐葉而微尖小又似蒺藜而微澗大

青白色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸

許獨莖或作叢生枝幹去地二三寸根長二

三尺以緊實如箭筈者良甘微溫無毒隴西

者溫補白水者冷補赤色者作膏消癰腫其

皮折之如綿出綿上故名綿黃者有白水者

赤水者木者功用並同而赤水木者少劣又

陝西同州

綿土山西  
沁州曰水

有以首蓿根假作者黃耆之功有五補諸虛

不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱

四也排膿止痛活血生血內托陰疽爲瘡家

聖藥五也治氣虛盜汗自汗及膚痛是皮表

之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺

脈不至補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外

三焦之藥也苗嫩時亦可焯淘作茹食收其

子十月種如種菜法

土黃芪能

令人瘦黃

芪柔韌皮

微黃褐色

肉白能令

人肥宜辦

首蓿根臣文

○製用 凡使勿用木耆草形相似但葉短根橫  
綿耆則否須去頭上皺皮搗扁蜜水塗  
灸數次以

透爲度

○療治 小便不通棉黃耆二錢水二盞煎一盞

溫服

小兒減半

酒疽心下懊痛足脛

滿小便

黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入

水所致黃耆二兩木蘭一兩爲末酒服方寸

七日三

氣虛白濁黃耆益炒半兩茯苓一

兩爲末每服一錢白湯下

男子婦人諸虛

不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴

而後發瘡癧或先癰疽而後發渴並宜常服

此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之

疾綿黃耆箭筈者去蘆六兩一半生焙一半

以鹽水潤溼飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩

一半生用一半炙黃爲末每服二錢白湯點

服早午各一服亦可煎服 老人悶寒綿黃耆陳皮去白各半兩爲末每服三錢大麻子

一合研爛以水濾漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不

冷不熱常服無秘塞之患其効如神 腸風

瀉血黃耆黃連等分爲末麵糊丸綠豆大每

服三十九水飲下 血沙淋痛不可忍黃

耆人參等分爲末以大蘿蔔一箇切一指厚

大四五片蜜二兩淹炙令盡不令焦點湯食

無時盞湯下 吐血不止黃耆二錢半紫背

浮萍五錢爲末每服一錢姜蜜水下 咳嗽

膿血咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃

耆四兩甘草一兩爲末每湯點服二錢 肺

癰得吐黃耆二兩爲末每服二錢水一中盞

煎至六分 服日三 甲疽瘡膿生足趾甲

邊赤肉突 時常舉發者黃耆二兩薑茹一

雨醋浸一宿以猪脂五合微火上煎取二合  
絞去滓以封瘡口上日二其內自消胎動  
腹痛下黃汁黃耆川芎窮各一兩糯米一合  
水一升煎半升分服 陰汗溼痒綿黃耆酒  
炒爲末以熟猪心點喫妙 痒疽內固黃耆  
人參各一兩爲末入真龍腦一錢用生藕汁  
和丸綠豆大每服二十九溫水下日日服  
諸虛自汗夜卧卽甚久則枯瘦黃芪麻黃根  
各一兩牡礪米泔浸洗煅過爲散每服五錢  
水二盞小麥百粒煎服 虛汗無度麻黃根  
黃芪等分爲末飛麪和作丸梧子大每用浮  
麥湯下百丸以止爲度 產後虛汗黃芪當  
歸各一兩 黃根三  
兩每服一兩煎湯下

○典故

陳柳太后病風不能言脉沉口噤許胤  
宗曰旣不能下藥宜易氣蒸之藥人奏

襄周時可瘧乃造防風貢酒湯數角置床下氣如烟霧其夕便得語蓋防風能製黃耆黃

耆得防風其功愈大乃相畏而相使也 李

杲治小兒胃虛成慢驚者云用益黃理中之

藥必損人命當於心經中以甘溫補土之本

更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金

旺火衰風木自平因立黃耆湯瀉火補金益

土爲神治之法灸黃耆二錢人參一錢炙草

白芍各五分水一

大鍾煎半溫服

## 人參

一名人浸一名血參一名黃參一名神草

一名地精一名土精一名人街一名鬼蓋一

名海腴一名皺面還丹參類有五以五色配

五臟人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄  
參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心  
曰赤參其苦參則右腎命門之藥也參以上  
黨爲佳今不復采邇來所用皆遼參高麗參  
大抵人參春生苗多於深山背陰根漆樹下  
潤溼處初生小者三四寸許一極五葉四五  
年後兩極五葉未有花莖十年後生三極年  
深者生四極各五葉中心生一莖俗名百尺

杵三四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋

後結子七八枚如大豆生青熟紅自落泰山  
出者葉幹青根白江淮出者形味皆如桔梗  
欲試上黨參使二人急走三五里一舍參一  
空口其舍參者不喘乃真也遼參連皮者黃  
潤纖長色如防風去皮者堅白如粉秋冬采  
者堅實春夏采者虛軟高麗參類雞腿者力  
大僞者皆以沙參薺蒼桔梗造作亂之沙參

體虛無心而味淡齊蒼體虛無心桔梗體堅  
有心而味苦人參體實有心而味甘微帶苦  
自有餘味俗名金井玉闌干者是也性無毒  
調中開胃補五臟安精神定冤鬼止驚悸通  
血脉主五勞七傷男婦一切虛損痰弱虛促  
短氣止渴生津及胎前產後諸病其有年足  
面目似人形者更神結而假僞者尤多

○種植子熟時收取於十月下種一如種菜法若春初生苗時移根種之亦可活

○收藏人參易蛀見風日尤易蛀惟納新器中  
蜜封可經年不壞又盛過麻油磁器泡  
淨烘乾入華陰細辛相間收之可

久又用淋過龜灰晒乾罐收亦可

○附錄沙參

一名羊乳 一名羊婆奶 一名虎鬚  
一名苦心 一名文希 一名識美色

白味淡種宜沙地二月生苗葉如初生小葵  
葉而圓扁不光莖高一二尺葉尖長如枸杞  
葉而小有細齒秋月葉間開小紫花如鈴五  
出白蓋亦有白花者結實如冬青實中有細  
子霜後苗枯根生沙地者長尺餘大一虎口  
黃土地者短而小根莖皆有白汁八九月採  
者白而實春採者微黃而虛味苦微寒無毒  
人參專補脾胃元氣因而益肺與腎內傷元  
氣者宜之沙參專補肺氣因而益脾與腎金  
受火剋者宜之一補陽而生陰一補陰而制

陽玄參

一名鹿腸一名馥草一名玄臺一名重臺一名正馬一名逐馬一名鬼藏

一名野芝麻宿根二月生苗葉似芝麻對生  
又如槐柳而尖長有鉅齒細莖青紫色七月  
開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖  
方大紫赤色有細毛有節若竹者高五六尺  
一根五七枚微有腥氣地蚕喜食之故其中  
空味苦微寒無毒治胸中氤氳之氣無根之  
火大凡腎水受傷真陽失守孤陽無根發爲  
火病宜壯水以制火故玄參與地黃同功其  
消瘰癧解癰毒亦以散火之故

紫參

一名馬行一名衆戎一名

五鳥花苗長一二尺莖青而細葉青似槐亦  
有似羊蹄者五月開白花絕似葱花亦有紫  
紅似水薑者根淡紫黑如地黃肉紅白肉淺  
皮深三月採根火炙用味苦寒無毒治諸血

病及寒熱瘧痢

丹參

一名山參 一名木羊乳 一名奔馬  
癰腫積塊之屬

丹參

一名山參 一名木羊乳 一名奔馬  
癰腫積塊之屬

草二月生苗高尺許莖方有稜青色一枝五葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花紅

紫似蘇花成穗中有細子根大者如指長尺

餘一苗數根皮丹而肉紫味苦微寒無毒破

宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下破

癰除瘕排膿止痛婦人明理論云四物湯治

婦人諸病調婦人經脉皆可

通用一味丹參散與之同功

○辨訛齊荳

一名杏參 一名杏葉沙參 一名芪

荳

一名甜桔梗 一名白麪根 一名

隱忍苗高一二尺莖青白葉似杏葉小而微

尖背白邊有叉牙杪間開五瓣白盤子花根

如野葫蘆蓄頗肥皮色灰黝中間白毛亦有

開碧花者嫩苗燥蒸水淘可油鹽拌食根換

水煮亦可食又可蜜煎味甘寒無毒解百藥  
毒殺蠱毒壓丹石發動署毒箭治蛇咬辟沙  
蟲短狐毒寒而利肺甘而解毒藥中  
良品也語云薺莞亂人參故詳著之

○製用

正旦未明佩紫赤囊中盛人參木香如  
豆樣時時嚼吞日出乃止號迎年佩

○療治

人參膏用人參十兩細切活水二十盞  
浸透入銀石器內桑柴火緩煎取十盞

濾汁再以水十盞煎取五盞與前汁合煎成  
膏瓶收隨病作湯使多慾之人腎氣衰憊嗽

嗽不止生姜橘皮煎湯化服

癰疽潰後氣

血俱虛嘔逆不食變證不一者以參者歸术  
等分煎膏服妙

胸痺心中痞堅畱氣結胸

胸滿脇下逆氣搶心

人參术乾姜甘草各三

兩水入升煮三升每服一升日三隨證加減

此方自晉宋以後至唐名醫治心腹病者用

之皆有竒効陶隱居百一方云霍亂餘藥或難求而治中方四順湯厚朴湯不可暫缺常

須預合自隨王方慶云數方不惟霍亂可醫諸病皆療四順湯用甘草人參乾姜附子炮

各二兩水六升煎二升半分四服

四君子

湯治脾胃氣虛不思飲食諸氣虛者以此爲

主人參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草五分姜三片棗一枚水二鍾煎一鍾食前溫服隨証加減

開胃化痰不思飲食不拘大

人小兒人參焙二兩半夏姜汁浸焙五錢爲

末飛羅麪作糊丸綠豆大食後姜湯下三五

十九日三加陳橘皮五錢

胃寒氣滿不能

傳化易飢不能食人參末二錢生附子末半錢生姜二錢水七合煎二合雞子清一枚打

轉空心服

脾胃虛弱不思飲食生姜半斤

取汁白蜜十兩人參末四兩銀鍋煎成膏每

米飲調服一匙

胃虛惡心或嘔吐有痰人

參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盞姜汁三

匙食遠溫服以知爲度老人尤宜

胃寒嘔

惡不能腐熟水穀食卽嘔吐人參丁香藿香

各二錢半橘皮五錢生姜三片水二盞煎一

盞溫服反胃嘔吐飲食入口卽吐困弱無

力垂死者人參三大兩拍破水一大升煮取

四合熱服再人參汁入粟米雞子白薤白煮

粥與酸李直方司勲於漢南患此兩月餘諸

方不瘥服此方當時便定後十餘日遂入京

此藥真難可與儕也食入卽吐人參一兩

半夏一兩五錢生姜十片水一斗以杓揚二

百四十遍取三升入白蜜三合煮一升半分

服霍亂嘔惡人參二兩水一盞半煎汁一

盞入雞子一枚仍再煎溫服一加丁香

霍亂煩悶人參五錢桂心半錢大二盞半煎汁一

霍亂吐瀉煩燥不止參二兩橘皮三兩生

姜一兩水六升煮三升分三服 妊娠吐水

酸心腹痛不能飲食人參乾姜炮等分爲末

生地黃汁和丸梧子大每服五十丸米湯下

陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭暈人參五錢

熟附子一兩分作四帖每帖以生姜十片流

水二盞煎一盞食遠溫服 喘急欲絕人參

末湯服方寸七日五六服効 產後發喘乃

血入肺竅危症也蘇木二兩水二盞煮汁一

盞調參末一兩服神効 產後血暈人參一

兩紫蘇半兩童便酒水三合煎服 產後不

語人參石菖蒲石蓮肉等分每五錢水煎服

產後諸虛發熱自汗人參當歸等分爲末

猪腰子一箇去膜切小片以水三升糯米半

合葱白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八

分食前溫服 產後秘塞出血多以人參麻

子仁枳殼炒爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲下 橫生倒產人參乳香末各一

錢丹砂五分研勻雞子白一枚入生姜自然

汁三匙攬勺冷服母子俱安神效 開心益

智人參末一兩鍊成犢猪肥肪十兩淳酒和

勺每服一盃日再服服至百日耳目聰明骨

髓充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病

怔忡自汗心氣不足也人參當歸各半兩

犢猪腰子二箇水二盞煮至一盞半取腰子

細切參歸同煎至八分空心喫暖予以汁送

下其滓焙乾爲末山藥末糊丸綠豆大每服

五十丸食遠棗湯下兩服卽愈一加乳香二

錢 凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則

吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不時

行則滯謂之結氣人參一兩橘皮去白皮四

兩爲末煉蜜丸梧子大每米飲下五六十

房後困倦人參七錢陳皮一錢水一盞半

煎八分食前溫服日再服千金不傳

虛勞

發熱上黨人參銀州柴胡各三錢大棗一枚  
生姜三兩水一鍾半煎七分食遠溫服日再

服以愈爲度

肺熱聲啞人參二兩訶子一

兩爲末噙嚥

肺虛久嗽人參末二兩鹿角

膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱

少許入銚子煎一二沸傾入盞內遇嗽時溫

呷三五口甚妙

止嗽化痰人參末一兩明

礬二兩以醋二升熬礬成膏入參末煉蜜

和收每以豌豆大一丸放舌下嗽止痰消

小兒喘嗽發熱自汗吐紅氣虛無力人參天

花粉等分每服半錢蜜水調下以瘥爲度

嗽喘上氣喘急嗽而吐而脈無力者人參末

每服三錢雞子清調之五更初服便睡去枕

仰卧只一眼愈年深者再服咯血者服盡一

兩甚好一方以烏雞子水磨千遍自然化作  
水調藥尤妙忌醋酸腥醬鮓醉飽將息乃  
佳 欽嗽吐血人參黃耆飛羅麪各一兩百  
合五錢爲末水丸梧子大每服五十丸食前  
茅根湯下一方人參乳香辰砂等分爲末烏  
梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服

虛勞吐血甚者先以十香散止之其人必  
困倦法當補陽生陰獨參湯主之好人參一  
兩肥棗五枚水二鍾煎一鍾服熟睡一覺卽  
減五六繼服調理藥 吐血下血因七情所  
感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出血如涌泉  
須臾不救用人參焙側柏葉蒸焙荆芥穗燒  
存性各五錢爲末用二錢入飛羅麪二錢以  
新汲水調如稀糊服少頃再啜一服立止

衄血不止人參柳枝寒食採者等分爲末每  
服一錢東流水服

齒縫出血人參赤茯苓麥門冬各二錢水一  
鐘煎七分食前溫服日再蘇東坡得此自謂

神奇累試累驗陰虛尿血及沙石淋人參

培黃耆鹽水炙等分爲末用紅皮大蘿蔔

一

枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸炙令

乾再炙勿令焦以蜜盡爲度每用一片蘸藥

食蘸湯送下以瘥爲度消渴引飲人參爲

末雞子清調服一錢日三四服一方用人參

苦蔞根等分生研爲末煉蜜丸梧子大每服

百丸食前麥冬湯下日二服忌酒麪炙婢

一方人參一兩粉草二兩雄豬膽汁浸炙腦

子半錢爲末蜜丸芡子大每嚼一丸冷水下

一方人參一兩葛粉二兩爲末發時以持猪

湯一升入藥三錢蜜三兩慢火蒸至三合狀

如黑餳以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三

服取效虛瘧發熱人參二錢二分雄黃五

君士  
卷一  
三十一  
錢爲末端午日用粽尖搗丸梧子大發日侵  
辰井花水吞下七丸發前再服忌諸般熱物  
立効一方加神麪等分冷痢厥逆六脉沉  
細人參大附子各一兩半每服半兩生姜十  
片丁香十五粒粳米一撮水二盞煎七分空  
心溫服下痢噤口人參蓮肉各三錢以井  
華水二盞煎一盞細細呷之或加姜汁炒黃  
連三錢老人虛痢不止不能飲食上黨人  
參一兩鹿角去皮炒研五錢爲末每服方寸  
匕米湯調下日三傷寒壞證凡傷寒時疫  
不問陰陽老幼妊娠誤服藥餌困重垂死脉  
沈伏不省人事七日以後皆可服之百不失  
一此名奪命散人參一兩水二鍾緊火煎一  
鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脉復  
立瘥蘇鞞光侍郎用此救數十人傷寒厥

逆身有敵熱頭涼大承元日效

燥也人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星  
末二錢熱服立甦

夾陰傷寒慾事後感寒

邪陽衰陰盛六脉沉伏小腸絞痛四肢逆冷

嘔吐清水不假此藥無以回陽人參乾姜炮

各一兩生附子一枚破作八片水四升半煎

一升頓服脉出身溫卽愈

筋骨風痛人參

四兩酒浸三日晒乾土茯苓一斤山慈姑一

兩爲末煉蜜丸梧子大每服百丸食前湯

下小兒風癩癰癓人參蛤粉辰砂等爲

末假猪心血和丸綠豆大每服五十丸銀

湯下一日二服神効

小兒驚後瞳人不正

者人參阿膠糯米炒成珠各一錢大一盞煎

七分溫服日再服効

小兒癰風人參冬瓜

仁各半兩南星一兩漿水煮過爲末每用一

錢水半盞煎三分溫服

狗咬風傷腫痛人

參置桑柴炭上燒存性以盆覆定少頃爲末

摻之瘥

蜈蚣咬及蜂薑蟄傷嚼人參傳之

三焦積熱玄參黃連大黃各一兩爲末煉蜜

腸破

腸出急以油抹入煎人參枸杞汁淋

之內喫羊腎粥十餘日愈

肺熱欬嗽沙參

半兩水煎服

卒得疝氣小腹及陰中相引

痛如絞白汗出欲死者沙參搗篩爲末酒服

方寸匕立瘥

婦人白帶多因七情內傷或

下元虛冷所致沙參爲末每服二錢米飲調

下諸毒鼠瘻玄參浸清酒日日飲之

年久瘰癧生玄參搗傅日日易之

赤脉貫瞳

玄參爲末以米泔煮肝日日蘸食

發狂咽

痛玄參升麻甘草各半兩水三盞煎一盞半

溫服

急喉痺風不拘大人小兒玄參鼠粘

子半生半炒各一兩爲末新水服一盞立瘥

鼻中生瘡玄參末塗或以水浸軟塞之

三焦積熱玄參黃連大黃各一兩爲末煉蜜

先桐子大每服五十五

上口步一、

米大 小腸疝氣黑參咬咀炒爲丸每服一

錢空心酒服出汗卽效 燒香治勞玄參一

斤甘松六兩爲末和勻入瓶中封固煮一伏時破瓶取出搗入煉蜜一斤別以瓶盛理地

中窖五日取出燒之常令聞香疾自愈亦可

熏衣 玄參忌犯銀器餌之噎喉喪目 經

脈不調或前或後或多或少產前胎不安產

後惡血不下兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參洗淨切碎爲末每服二錢溫酒調下

落胎下血丹參十一兩酒五升煮三升溫服

一升一日三服亦可水煮 寒疝小腹陰中

相引痛白汗出欲死丹參一兩爲末每服二

錢熱酒調下 小兒身熱汗出拘急固中風

起丹參半兩鼠屎炒三十枚爲末每服二錢

漿水下 驚癟發熱丹參雷丸各半兩猪膏

二兩同煎七上七下瀘去滓盛之摩兒身日

三次 婦人乳癰丹參白芷芍藥各一兩咬

咀以醋淹一夜猪脂半斤微火煎成膏去滓

傅之 热油火灼丹參入兩剉以水微調取

羊脂二斤煎三上三下塗之 丹參治風軟

脚可及奔馬曾用實有効 治痢紫參半斤

水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三

服 吐血不止紫參入參阿膠炒等分爲末

烏梅湯服一錢一方去人參加甘草以糯米

湯服 酒刺紫參丹參人參沙參各一兩爲

末胡桃仁杵和丸桐子大每服三十丸茶下

強中之病莖堅硬不交精液自出消渴之

後卽發癰疽皆繇恣意色慾抑或餌金石所

致宜此以制腎熟川猪腎一具薜荔石膏各

三兩入參茯苓磁石知母葛根黃芩桔梗根

甘草各二兩黑大豆一升水一斗半先煮猪

腎大豆取汁一斗去滓下藥再煎三十八三

服

齊荳丸齊荳大豆茯神磁石苦蕘根熟

地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沉

香各半兩爲末以猪肚治淨煮爛杵和丸梧

子大每服七十丸空心鹽湯下丁瘡腫毒

生莽茺根搗汁服一合以滓傅之不過二服

面上肝膚齊荳肉桂各一兩爲末每服方

寸七醉癢服之日一服又減癩癩鈎吻葉

與芹葉相似誤食之殺人惟以齊荳八兩水

六升煮取三升每服五合日五服

解五石毒齊荳生搗汁多服立効

○典故則搖光星散而爲人參人君廢山瀆之利

則搖光不明人參不生

下有人參上有紫氣

隋文帝時

上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去

宅一里許見人參枝葉易常掘之入地五尺

得人參一株如人四肢畢備呼聲遂絕廣五

行記

浦江鄭某五月患痢又犯房室忽昏

暈不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰如

拽鋸小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之症

也急煎人參膏仍與炙氣海十八壯右手能

動口微動遂與膏服一盞半夜服三盞能動

盡三斤方能言索粥盡五斤痢止至十斤全

安若作風治則誤矣一人背疽用內托藥

已多膿出乍嘔發熱六脉沉數有力此潰瘍

所忌也與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一

十六斤竹伐百餘竿而安後旬餘受大驚瘡

起有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋急作

參膏以芎歸橘皮湯入竹瀝姜汁飲之盡三

斤而瘡潰調理乃安一人形實好飲熟酒

忽病目盲而脉濶此熱酒傷胃汚血死其中

而然以蘇木煎湯調人參末服數日而愈

一婦嗜酉酒生一直承案行醫

酒炒大黃等分爲末姜湯服一錢得睡汗出而愈一小兒七八歲聞雷卽昏倒不知人事

此氣怯也

人參當歸麥門冬各二兩五味子

五錢水一斗煎汁五升再以水五升煎滓取

汁二升合煎成膏每服三匙白湯化下服盡

人卧則縮

一斤後聞雷自若有人卧則覺身外有身

一樣但不語此由肝虛邪襲竈不歸舍名曰

離竈用人參龍齒赤芍芩各一錢水一盞煎

半盞調飛過朱砂末一錢睡時服一

夜一服三夜後真者氣爽假者卽化

地髓一名芊一名芑一名牛膝子一

平音戶  
芭音起

莖有細短白毛葉布地深青色似小芥葉而  
名婆婆姊處處有之河南懷慶者佳二月生

厚不又子上有皺文毛濶不光高者尺餘低者三四寸摘其傍葉作菜甚益人開小筒子花似油麻花但有斑點紅紫色亦有黃者實作房如蓮翹子如小麥褐色根黃如胡蘿蔔粗細長短不一根入土卽生宜肥地虛則根大而多汁正九月採根生地曝乾熟地蒸晒忌銅鐵器令人腎消髮白男損營女損衛薑汁浸則不泥膈又宜酒製鮮用則寒初出  
上合乾

汗浸則不泥膈又宜酒製鮮用則寒

用則涼卽今生地 生地生血熟地養血生者以水

浸之沉者爲地黃半沉者爲人黃浮者爲天  
黃入藥沉者佳半沉者次浮者不堪

○種植宜沙軟地先於十二月耕熟至正月細耙三四遍然後作溝澗二尺兩溝作一畦澗四尺其畦微高而平硬甚不受水三月初種苗未生時得水卽爛畦中又撥作溝深三寸取地黃切長二寸種於溝內以熟糞土蓋厚三寸許每一畝用根五十斤蓋土訖卽取經冬爛草覆之候芽稍出以火燒其草令燒去其苗再生葉肥茂根益壯自春至秋凡五六耘不得鋤一年後滿畦宿根採訖還生八月堪採根若不採其根太盛春二月宜出

之若秋採訖至春不復更種其生者猶得四年但採訖比至明年耨耘而已神隱云參驗古法此爲最良按本草二八月採赫未窮物性也不如冬月採妙又蒸晒相宜也欲食其葉但露散後摘取有葉勿損中心正葉秋收其花可充冬用

○製用 挖出洗淨肥大沉水者簡出將簡下瘦肥地令透用砂鍋柳甌蒸令氣透眼乾再浸再蒸如此九次蓋地黃性泥得砂仁之香竄和五臟冲和之氣歸宿

丹田故無泥膈之患

○療治 固齒烏鬚生津其功極妙地黃五斤柳木甌內以土蓋上蒸熟晒乾如此三次擣爲小餅每噙嚥一枚欬嗽吐血勞瘦骨蒸日晚寒熱煮白粥臨熟入生地黃十三合

攢空心食 吐而敷漱煎地黃末酒服一

錢日三 肺損吐血或舌上有孔血出生地

黃八兩取汁童便五合同煎煎入鹿角膠炒  
研一兩分三服 初生便血小兒初生七八

日大小便而出乃熱傳心肺不可服涼藥只  
以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之

小便尿血吐血及耳鼻出血生地黃汁半

升生姜汁半合蜜一合和服 小便血淋生

地黃汁車前葉汁各三合煎服 疗腫乳癰

地黃搗敷之熱卽易神效 一切癰疽及打

撲傷損破疼痛者生地黃杵如泥攤在上繆

木香末于中又攤地黃泥一重貼之不過五

度卽內消 打撲損傷骨碎及筋傷爛用生

地黃熬膏裹之以竹簡夾急縛勿令轉動一

日一夜可十易之則瘥 昔許元公墮馬右

臂曰脫左右急捲入臼中昏迷不知痛苦急

召田錄事視之曰尚可救乃以上藥封腫處  
中夜方甦達旦痛處已白日日換貼其瘀腫  
移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈損  
傷打撲瘀血在腹者用生地黃汁三升酒一  
升半煮二升半分三服物傷睛突輕者臉  
胞腫痛重者目晴突出但目系未斷者卽納  
入急搗生地黃綿裹傅之仍避風以膏藥護  
其四邊睡起目赤血熱也卧則血歸於肝  
故熱用生地黃汁浸粳米半升晒乾三浸三  
晒每夜以米煮粥食一盞數日卽愈  
赤目生地黃薄切溫水浸貼牙疳宣露膿  
血口氣生地黃一斤鹽二合搗和圍以麪包  
煨令烟斷去麪入麝一分研勺日夜貼之  
牙齒挺長常咋生地黃極妙耳中常鳴生  
地黃截塞耳中日數易煨熟尤妙鬚髮黃  
赤生地黃一斤生姜半斤各洗研自然十宿

渣用不蛀皂角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡爲度同渣入罐內泥同煅存性爲末用鐵器盛末三錢湯煎調停二日臨卧刷鬚髮上卽黑竹木入肉生地嚼爛罨之獵犬咬傷地黃搗汁飯餅塗之百度愈

○典故韓子治用地黃苗喂五十歲老馬生三百駒又一百三十歲乃死抱朴子雉被

鷹傷銜地黃葉點

之卽愈

甲子  
野禽散

木有兩種白术抱蘿也一名天蘇一名山姜一名山連一名馬薊吳越之葉稍大而有毛根如指大狀如鼓槌亦有大如拳者彼人剖開

曝乾謂之削术亦曰片术白而肥者浙术瘦而黄者幕阜山术浙术刀勝味苦而甘性溫厚氣薄除溼益燥溫中補氣強脾胃生津液止胃中及肌膚熱解四肢困倦佐黃芩安胎清熱在氣主氣在血主血有汗則止無汗則發蒼术山薊也一名山精一名仙术一名赤术處處山中有之苗高二三尺其葉抱莖而生葉似棠梨其脚下葉有三五皆有鋸齒小

刺根如老薑蒼黑色肉白有油膏以茅山嵩  
山者爲佳吐甘而辛烈性溫而燥除溼發汗

健脾安胃治溼痰畱飲驅災沴邪氣消痃癖

氣塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣瘧疾總之三

术所治大略相近除溼解鬱發汗驅邪蒼术

爲要補中焦益胎元除脾胃消溼痰益脾白

术爲良

○種植取其根栽之一年卽稠嫩  
苗可爲茹作飲甚甘香

○製用

白朮以米泔浸一宿入藥一法東壁土  
炒用

蒼术性燥須糯米泔浸洗再換

泔浸二日浸去油去粗皮切片焙

乾用亦有脂麻同炒以制其燥者

○療治

枳术丸消痞強胃久服令人食自不停  
白术一兩黃壁土炒過去土枳實麩炒

去麩一兩爲末荷葉包飯燒熟搗和丸梧子

大每服五十丸白湯下氣滯加橘皮一兩有

火加黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾

姜五錢木香三錢有食加神麴麥蘖各五錢

枳术湯心下堅大如盤邊如旋盃水飲所

作寒氣不足則手足厥逆腹滿脅鳴相逐陽

氣不通卽水冷陰氣不通卽骨疼陽前通則

惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行  
大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名

曰氣分宜此三之白朮一兩枳實七箇水五

升煮三升分三服胸中軟卽散 白术膏服

食滋補土久泄廁上好白术十斤切片入瓦  
鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入  
器內以渣再煎如此三次乃取前後汁同熬  
成膏入器中一夜傾去上面清水收之每服  
三二匙蜜湯調下 參术膏治一切脾胃虛  
損益元氣白术一斤人參四兩切片以流水  
十五盃浸一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏  
入煉蜜收之每以白湯點服 胸膈煩悶白  
术末水服方寸匕 心下有水白术三兩澤  
瀉五兩水三升煎一升半分三服 五飲酒  
癖一畱飲水停心下二癖飲水在兩脇下三  
痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲  
水在腸間皆由飲食胃寒或飲茶過多致此  
倍术丸用白术一兩乾姜炮桂心各半斤爲  
末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸 四肢

腫滿白术三兩㕮咀每服半兩水一盞半大

棗三枚煎九分溫服日三四服不拘時 中

風口噤不知人事白术四兩酒三升煮一升 頓服

產後中寒遍身冷直口噤不識人白术一兩澤瀉一兩生姜五錢水一升煎服

頭忽眩暈經夕不瘥四體漸羸飲食無味好

食黃土用术三斤麴三斤搗篩酒和丸梧子

大每飲服二十丸日三服忌菴菜桃李青魚

溼氣痛白术切片煎汁熬膏白湯點服

中溼骨痛术一兩酒三盞煎一盞頓服不飲

酒以水煎之 婦人肌熱血虛白术白茯苓

白芍藥各一兩甘草半兩爲散姜煎服 小

兒蒸熟脾虛羸瘦不能飲食方同上 風瘡

癰瘍疹白术爲末酒服方十七日二 面多點

鷄雀卵色苦酒潰术日日拭之極效 下自汗

不止白术末飲服方寸七日二

白术四兩切片以一兩同牡礮炒一兩同石  
斛炒一兩同麥麸揀术爲末每服三錢食遠

粟米湯下日三老少虛汗白术五錢小麥  
一撮水煮乾去麥爲末用黃耆湯下一錢

產後嘔逆別無他疾者白术一兩二錢生姜  
一兩五錢酒水各二升煎一月分三服脾

虛脹滿脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是  
爲脹滿用白术二兩橘皮四兩爲末酒糊丸  
梧子大每食前木香湯下三十丸脾虛洩

瀉白术五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨  
爲末米飲丸梧子大每米飲下五十丸日二  
久瀉滑腸白术炒炭各一兩糯米炒二

兩爲末棗肉伴食或丸服之老少滑瀉白

术半斤黃土炒山藥四兩炒爲末飯丸量人

大小米湯服或加入參三錢老人常瀉白  
术二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼术五錢泔浸

炒茯苓一兩爲末米糊丸梧子大每米湯下

七八十九 小兒久瀉脾虛米穀不化不進

飲食用白术炒二錢半夏麵二錢半丁香

半錢爲末姜汁麪糊丸黍米六每米飲隨大

小服之 腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃積

年不瘥者白术一斤黃上炒研末乾地黃半

斤飯上蒸熟搗和乾則入少酒丸梧子大每

服十五丸米飲下日三服 孕婦來胎白术

枳殼炒等分爲末燒飯丸梧子大入月一

日每食前溫水下三十丸胎瘦則易產 牙

齒日長漸至難食名髓溢病白术煎湯漱效

服术法烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳目除

風氣潤肌膚久服令人輕健蒼术不計多少

米泔水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切

片曝乾慢火炒黃細搗爲末每一斤用蒸過  
白茯苓末半斤煉蜜丸梧子大空心臥時熱

水下十五丸別用术末二兩甘草末一兩拌  
和作湯點之吞丸尤妙忌桃李雀蛤及三白  
諸益 蒼朮膏除風溼健脾胃變白駐顏補  
虛損大效新蒼朮刮去皮薄切米泔浸二日  
一日一換取出井華水浸過二十春秋五日  
夏三日冬七日漉出以生絹袋盛之放在一  
半原水中揉洗津液出紐乾將渣又擣爛袋  
盛于一半原水中揉至汁盡爲度將汁入大  
砂鍋中慢火熬成膏每一斤入白蜜四兩熬  
二炷香膏一斤入水澄白茯苓末半斤攪匀  
瓶收每服三匙侵早臨卧各一溫酒送下忌  
醋及酸物桃李雀蛤菘菜雞魚等物 治脾  
經溼氣少食足腫無力傷食酒色過度勞逸  
有傷骨熱用鮮蒼朮二十斤浸刮去粗皮晒  
切以米泔浸一宿取出同溪水一石大砂鍋  
慢火煎半乾去渣再入石楠葉三斤刷去紅

衣楮實子一斤川當歸半斤甘草四兩切同  
煎黃色濾去滓再煎如稀粥入白蜜三斤熬  
成膏每服三五錢空心好酒調服 蒼朮丸  
清上實下兼治內外障眼茅山蒼朮先刮淨  
一斤分作四分用酒醋糲泔童尿各浸三日  
一日一換取出洗搗晒焙以黑脂麻同炒香  
共爲末酒煮麯糊丸梧子大每空心白湯下  
五十九 八製蒼朮丸疎風順氣養腎治腰  
脚溼氣痺痛蒼朮一斤洗刮淨分作四分用  
酒醋米泔水各浸三日晒乾又分作四分  
用川椒紅茴香補骨脂黑牽牛各一兩同炒  
香揀去不用只取朮研末醋糊丸梧子大每  
服五十丸空心鹽酒下五十歲後加沉香末  
一兩 蒼朮散治風溼常服壯筋骨明目蒼  
朮一斤粟米泔浸過竹刀刮去皮半斤無灰  
酒浸半斤童便浸春五夏三秋七冬十日取

出淨地上掘一坑炭火煅赤去炭將浸藥酒  
傾入坑內却放水在中以瓦器蓋定泥封一  
宿取出爲末每服一錢空心溫酒或鹽湯下  
六製蒼术散治下元虛損偏墜莖痛茅山  
蒼术淨刮六斤分六分一斤倉米疳一桑椹  
汁一酒俱浸二日炒一斤青鹽半斤一小茴  
香四兩一大茴香四兩俱炒黃去茴鹽取末  
爲末每服三錢空心溫酒下 固真丹燥溼  
養脾助胃固真茅山蒼术刮淨一斤分四分  
一分青鹽一兩炒一分川椒一兩炒一分川  
楝子一兩炒一分小茴香破故紙各一兩炒  
並楝木研末酒煮麪糊丸梧子大每空心米  
飲下五十丸 平補固真丹治元臟久虛遺  
精白濁婦人赤白帶下崩漏金州蒼术刮淨  
一斤分作四分一分川椒一兩炒一分破故  
紙一兩炒一分茴香食鹽各一兩炒一分川

揀肉一兩炒取淨末爲末入白茯苓末二兩  
酒洗當歸末二兩酒煮麴糊丸梧子大每空  
心鹽酒下五十丸 固元丹治元臟久虛遺  
精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶  
下血崩便血等疾以小便頻數爲效好蒼术  
刮淨一斤分作四分小茴香食鹽各一兩同  
炒一分川椒補骨脂各一兩同炒一分川烏  
頭川揀子肉各一兩同炒一分醇醋老酒各  
半斤同煮乾焙連同炒藥通爲末用酒煮糊  
丸梧子大每服五十丸男以溫酒女以醋湯  
空心下 少陽丹芩术米泔浸半日刮皮晒  
乾爲末一斤地骨皮溫水洗淨去心晒研一  
斤熟桑椹二十斤入瓮盆搊爛絹袋壓汁和  
末如糊傾入盤內日晒夜露采日精月華待  
乾研末煉蜜丸赤小豆大每服二十丸無灰  
酒下日三服一年白髮返黑三年而如童子

交感丹補虛損固精氣真髮鬚令人  
有子茅山蒼术刮淨一斤分作四分酒醋水  
泔鹽湯各浸七日晒研川椒紅小茴香各四  
兩炒研陳米糊丸梧子大每服四十九空心  
溫酒下 交加丸升水降火除百病蒼术刮  
淨一斤分作四分一分米泔浸炒一分鹽水  
浸炒一分川椒炒一分破故紙炒黃蘖皮刮  
淨一斤分作四分一分酒炒一分童尿浸炒  
一分小茴香炒一分生用棗去核藥只取肉  
蘖爲末煉蜜丸梧子大每服六十九空心鹽  
湯下 次離丸滋陰降火開胃進食強筋骨  
去溼熱白蒼术刮淨一斤分作四分一分川  
椒一兩炒一分破故紙一兩炒一分五味子  
一兩炒一分川芎窮一兩炒只取肉研末川  
蘖皮四斤分作四分一斤酥炙一斤人乳炙  
一斤童尿炙一斤米泔炙各十二次研末和

勻煉蜜丸梧子大每服三十丸早酒年茶晚白湯下不老丹補脾益腎服之七十亦無白髮茅山蒼朮刮淨米泔浸軟切片四斤一片酒浸焙一斤醋浸焙一斤鹽四兩炒一斤椒四兩炒赤白何首烏各二斤米泔浸竹刀刮切黑豆紅棗各五升同蒸至豆爛曝乾地骨皮去骨一斤各取淨末以桑椹汁和成劑鋪盆內汁高三指日晒夜露取日月精華待乾以石臼搗末煉蜜丸梧子大每空心酒服一百丸靈芝丸治脾腎氣虛添補精髓通利耳目蒼朮一斤米泔水浸春夏五日秋冬七日逐日換水竹刀刮皮切晒石臼爲末棗肉蒸和丸梧子大每服三五十丸棗湯空心服補脾滋腎生精強骨真仙方也蒼朮去皮五斤爲末米泔水漂澄取底用脂麻二升半去殼研爛絹袋盛候共查登葉半歲克

服三錢米湯或酒空心調服 面黃食少

婦面無血色食少嗜卧 蒼术一斤熟地黃半

斤乾姜炮各一兩春秋七錢夏五錢爲末糊

丸梧子大每溫水下五十丸 小兒癩疾蒼

术四兩爲末羊肝一具竹刀批開撒术末線

縛入砂鍋煮熟搗作丸散 食生米男子婦

人因食生熟留滯腸胃遂至生重久則好食

生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食

以害其生用蒼术米泔水浸一夜剉焙爲末

蒸餅丸梧子大每服五十丸食前米飲下日

三服用之有驗 腹中虛冷不能飲食食輒

不消羸弱生病术二斤炒一斤炒爲末蜜丸

梧子大每服三十丸米湯下日三服大冷加

乾姜三兩腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二

兩 脾溼水瀉注下困弱無力水穀不化腹

痛甚者蒼术二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡

桂二錢每一兩水盞半煎一盞溫服脉弦頭  
微痛去芍藥加防風二兩 暑月暴瀉壯脾  
溫胃用神麴炒蒼朮米泔浸一夜焙等分爲  
末糊丸梧子大每服三五十丸米飲下 飲  
瀉久痢蒼朮二兩川椒一兩爲末醋糊丸梧  
子大每服二十丸食前溫水下惡痢久者加  
桂 脾溼下血蒼朮二兩地榆一兩分作二  
服水二盞煎一盞食前溫服久痢虛滑以此  
桃花丸 腸風下血蒼朮不拘多少以皂角  
接濃汁浸一宿煮乾焙研爲末麵糊丸如梧  
子大每服五十丸空心米飲下日三 溼氣  
身痛蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點  
服 補虛明目健骨和血蒼朮泔浸四兩熟  
地黃焙二兩爲末酒糊丸梧子大每溫酒下

三五十丸日三 青盲雀目蒼朮四兩泔浸  
一夜切焙研末每三錢猪肝三兩批開參藥

狂內扎定入粟米一合水一盞砂鍋煮熟熏

眼臨卧食肝飲汁不拘大人小兒皆治

又

方不計時月久近用蒼术二兩泔浸焙搗爲  
末每服一錢以好羊子肝一斤竹刀切破摻

藥狂內麻扎以粟米泔煮熟待冷食之以愈  
爲度眼目昏濛蒼术泔浸七日去皮切焙

木賊各二兩爲末每服一錢茶酒任下

嬰

見目濁不開或出面蒼米二錢入豬膽中扎

煮將藥氣熏眼後更嚼取汁與服妙

風牙

腫痛若未鹽水浸過燒存性研末揩牙去風

熱臍重怖病腹中如鐵石臍中水出旋變

作虫行遶身嘔痒難忍撥掃不盡用蒼术濃

煎湯浴之仍以蒼术末入麝香少許水調服

辟一切惡氣蒼术同猪蹄燒烟能除邪祟

消災沴歲旦及病瘦人家往往燒之飲辟

蒼术一斤去皮切片爲末麻油半兩水二錢

研濾汁大棗五十枚煮去皮核搗和丸桐子大每日空心溫服五十丸漸至一二百丸忌桃李雀肉三月疾除常服胸膈寬利飲啖如常許叔微因少年夜坐寫文左向伏几中夜飲酒數盃又向左卧飲食多墜左邊後飲食止從左下心中嘈雜脅痛食減十數日必嘔酸水數升暑月左邊無汗積三十年後製此方服之而愈

○典故

南陽文氏漢末逃難壺山中飢困欲死有人教之食术遂不飢數十年乃還鄉

里顏色更少氣力轉勝

劉注

陳子皇得

餌术要方其妻得瘧病服之自愈

神仙傳

越民高氏妻病恍惚譖語于夫之鬼憑之其家燒蒼木鬼遠求去

劉注

江西一士爲

女妖所染其鬼將別曰君爲陰氣所侵必當暴泄但多服平胃散爲良中有蒼木能去邪

也

○麗藻山精必欲長生常服序吾察草木之精速益

神農藥經

序

於已者並不及木之

多驗也可以長生久視遠而更靈山林隱

逸得服术者五岳比肩

外經六府內充山

綠葉抽條紫花標色百邪

外經六府內充山

精見書華神在錄木華火謝盡采擷之勞啓

旦移中窮淋瀝之劑

味重金漿芳踰玉液

修製有勞神慮足使坐致延生

復原圖

檀香一名旃檀一名直檀出廣州雲南及占城

真臘諸國今嶺南諸地亦皆有之樹葉皆似

荔枝皮青色而滑澤有三種黃檀皮實白檀

色黃

皮潔紫檀皮腐其木並堅重清香而白檀黃色白紫檀色紫

檀尤盛宜以紙封固則不洩氣紫檀新者色

紅舊者色紫有鱗爪文白檀辛溫氣分之藥

故能理胃氣調肺脾利膈紫檀鹹寒氣分

之藥故能和營氣消腫毒治金瘡中土所產

之檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細

而膩體重而堅與梓榆相似亦檀香之類但

不香則地氣使然也

○種植臘月分木

○附錄降真香

一名紫藤香 一名雞骨杏生南海及大秦國今兩廣雲南皆有

不甚佳舶上來名番降紫而潤者良  
焚之氣勁而遠可以降神故名降真

望水檀

其樹春如枯夏方萌梅雨過方舒

葉葉既開則水定以之候水極準

○療治

心腹痛腎氣痛霍亂白檀二錢煎服

腰腎痛白檀磨水塗患處

面生黑子

每夜以漿水洗拭令赤磨汁塗之甚良 白

檀塗身能除一切熱惱 惡毒風毒紫檀磨

塗之 金瘡止血止痛紫檀刮末敷 一切

卒腫醋磨紫檀敷之 痘疥檀木根皮磨塗

之殺虫 檀木皮榆皮爲粉食可斷穀救荒

金瘡止血生肌降真五倍子銅花等分爲

末敷之 癰疽惡毒降真末楓香等分爲末  
熏之去惡氣甚妙 燒降真辟天行時氣宅  
舍怪異 小兒帶降

真辟邪惡不正之氣

○典故 周密被海寇刀傷血出不止筋如斷骨  
如折軍士李高掩以紫金散止痛定

明日結痂如鐵遂愈且無瘢痕扣其方用紫  
藤香流瓦刮下研末卽降真之最佳者曾救

萬人

甚效

當歸 一名文無 一名乾歸 一名山蘡 一名白蘡

春生苗葉綠有三稜七八月開花似蒔蘿淺

紫色根黑黃以肉厚不枯者爲勝今秦蜀諸

處多栽蒔貨賣其頭圓尾多色紫氣香肥潤  
者秦產也名馬尾歸最勝他處者頭大尾多  
色白堅枯名饑頭歸止宜入發散藥氣味苦  
溫無毒和血補血破惡血養新血凡血病宜  
用之治妊娠產後惡血上衝倉卒取效氣血  
昏亂者服之卽定能使血氣各有所歸當歸  
之名疑取諸此婦人之要藥也頭止血而上  
行身養血而中守尾破血而下流全活血而

不走則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用此一定之理也惡溼麵箇茄

畏菖蒲海藻生薑制雄黃

○製用去蘆頭水洗去土酒浸一宿日乾或火乾切片如收藏晒乾乘熱紙封甕不蛀

血虛發熱肌膚燥熱困渴引飲目赤面

○療治紅晝夜不息其脉洪大而虛重按全無

力此血虛之候也得于飢困勞役證象白虎

但脉不長實爲異耳誤服白虎湯卽死宜此

主之當歸身酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作

一服水二鍾煎一鍾空心溫服日再服失

血眩暈凡傷胎或產後崩中金瘡拔牙一切

去而過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸三

錢三分芎芻一錢七分每用五錢水七分酒  
三分煎七分熱服日再砌而不正當歸焙  
研末每服一錢米飲下小便出血當歸四  
兩剉酒三升煮一升頓服頭痛欲裂當歸  
二兩酒一升煮取六合飲日再內虛目暗  
補氣養血當歸生晒六兩附子火炮一兩爲  
末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下心  
下痛刺當歸爲末酒服方寸手臂疼痛  
當歸三兩切酒浸三日溫飲之飲盡別以三  
兩再浸以瘥爲度瘧瘧不正當歸一兩水  
煎飲日一久痢不止當歸二兩吳茱萸一  
兩同炒香去黃爲末蜜丸桐子大每服三十  
丸米飲下大便不通當歸白芷等分爲末  
每服三錢米湯下婦人百病諸虛不足當  
歸四兩地黃一兩爲末蜜丸梧子大每食前  
米飲下十五丸月經逆行從口鼻出先以

京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢  
水一鍾半煎八分溫服經卽通室女經閉  
當歸尾沒藥各一錢爲末紅花浸酒面北飲  
下一日一服婦人血氣臍下氣脹月經不  
利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆燒  
存性二錢爲末煉蜜丸梧子大每服十五丸  
溫酒下墮胎下血不止當歸焰一兩葱白  
一握每服五錢酒一盞半煎八分溫服妊  
娠胎動或子死腹中血下疼痛口禁欲死服  
此探之不損則痛止已損便立下此乃徐王  
神驗方也當歸二兩芎茅一兩爲粗末每服  
三錢水一盞煎令欲乾投酒一盞再煎一沸  
溫服或灌之如人行五里再服不過三五服  
便效產難胎死橫生倒生用當歸三兩芎  
茅一兩爲末先以大黑豆炒焦入流水一盞  
童便一盞煎至一盞分爲二服未效再服

倒產子死不出當歸末酒服方寸七

產後

血脹腹痛引脅當歸

末酒服方寸七

產後

每服三錢水一盞煎

八分入鹽酢少許熱服

產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水

二盞煎一盞分爲二服末效再服

產後自

汗壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪

合芍藥酒炒各二錢生姜五片水一盞半煎

七分溫服

產後中風不省人事口吐涎沫

手足癲癇當歸荆芥穗等分爲末每服二錢

水一盞酒少許童屎少許煎七分灌之下咽

卽有生意神效

小兒胎寒好啼晝夜不止

因此成瘡當歸末

一小豆大以乳汁灌之日

夜三四度

小兒臍濕不早治成臍風或腫

赤或出水用當歸末傳之

一方人麝香少許

用胡粉等分試之最驗若愈後因屎入腹作

再傳卽愈

湯火傷瘡歎赤潰爛用此生肌

拔熱止痛當歸黃藥各一兩麻油四兩以油煎當歸焦去滓納藥攪成膏出火毒攤貼之

白黃色杜舌繙恍惚若語亂者死

當歸白术二兩水煎人生半盞和服

**川芎**一名芎藭一名香果一名山鞠第一名蕪

藭清明後宿根生苗分而橫埋之宜鬆肥土  
節節生根澆宜退牲水葉香似芹而微細窄  
有叉又似胡荽葉而微壯叢生細莖七八月  
間開碎白花如蛇床子花根下始結芎藭瘦

黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀爲雀

腦最有力九月十月採者佳三四月虛惡不堪用凡用以塊大內中色白不油嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可爲末煎湯沐浴耳味辛溫無毒治中風入腦頭痛寒癲除腦中冷痛面上遊風止瀉痢燥溼行氣開鬱令人用此最多頭面風不可缺須以他藥佐之不可單服令人暴亡戒之葉可作茶飯

○療治生犀丸宋真宗賜高相國去痰清目進飲食川芎十兩繁小者粟米泔浸二日

換初片子日乾爲末作兩料每料入麝腦各  
一分生犀角半兩重湯煮蜜和丸小彈大茶  
酒嚼下一丸隔痰加牛黃一分水飛鐵粉一  
分頭目昏加細辛一分目眼嚼斜加炮天南  
星一分氣虛頭痛真川芎爲末臘茶調服

二錢甚捷曾有婦人產後頭痛一服卽愈

氣厥頭痛婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎  
窮天台烏藥等分爲末每服二錢葱茶調下

一方加白术水煎服 風熱頭痛川芎窮一

錢茶葉三錢水一鍾煎五分食前熱服

風化痰川芎洗切晒乾爲末煉蜜丸如小彈

子大不拘時嚼一丸茶清下 偏頭風痛京

芎細切浸酒日飲之 風熱上衝頭目暉眩

或胸中不利川芎榧子各一兩爲末每服三

錢用茶清調下胸中不利用水煎服

頭風

旋帛及偏正頭痛多汗惡風胸膈寒飲川芎

窮一斤天麻四兩爲末練蜜丸如彈子大每嚼一丸茶清下失血眩暈方見當歸下

一切心痛大芳一箇爲末燒酒服之一箇住一年兩箇住二年經閉驗胎經水三箇月

不行驗胎法川芎生爲末空心煎艾湯服一匙腹內微動者是不動者非也損動胎氣

因跌撲舉重損胎不安或子死腹中者芎窮

爲末酒服方寸七須臾一二服立出崩中

下血晝夜不止芎窮一兩清酒一大盞煎取

五分徐徐進聖惠加生地黃汁二合同煎

酒癖脅脹時復嘔吐腹有水聲川芎窮三稜炮各一兩爲末每服二錢葱白湯下小兒

腦熱好閉目或太陽痛或目赤腫川芎窮薄荷朴硝各二錢爲末以少許吹鼻中齒敗

口臭水煎芳窮含之牙齒疼痛大川芎窮

一箇入舊糟內藏一月取焙入細辛同研末

指牙人諸瘡腫痛撫芎煅研入輕粉麻油調塗

產後兩乳忽長細小如腸垂過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將芎窮當歸各一斤用半斤剉散于瓦石器內用水濃煎不拘多少頓服仍以一斤半剉塊于病人卓下燒烟將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以草麻子一粒貼其頂心風痰芎窮爲末竈和丸夜服齒根出血含之瘥

五加

一名文章草一名金玉香草一名金盤

名五花一名追風一名豺漆一名豺節使江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉皆青作叢

苗莖俱有利類薔薇長者至丈餘葉五出脊

氣似橄欖春時結實如豆粒而扁色青得霜

乃紫黑根類地骨皮輕脆芬香一云生南方

用陰

者微白而柔納大類桑白皮生北方者微黑

而硬入藥用南方者苗可作茹皮浸酒久服

輕身耐老明目下氣補中益精堅筋強志意

黑鬚髮令人有子或只爲散代茶餌之亦驗

○種植

探掘肥地每二尺埋一根令沒舊痕甚易活苗生從一頭剪訖鋤土壅之五月

採葉十月採根

皆取皮陰乾

○製用 造酒方用 五加皮洗淨去骨莖葉亦可  
以水煎汁和麴釀米酒成時時飲

可煮酒飲加速志爲使更良一方加木瓜煮

酒服談野翁試驗方云神仙煮酒法用五加

皮地榆刮去粗皮各一斤袋盛入無灰好酒

二十大蟬封固安大鍋內文武火煮蟬上安  
米一合米熟爲度取出入水中三日出火毒  
渣晒乾爲末每服五十九藥酒送下臨臥再

服能去風溼壯筋骨順氣化痰添精補髓久

服延年益壽功難盡述王綸醫云風病飲酒

能生痰火惟五加皮一味浸酒日飲數盃最

有益諸浸酒藥惟五加與酒相合且味美

又方洗淨晒乾爲末每空心  
酒服三錢一月後去宿疾

○療治 虧勞不足五加皮枸杞根白皮各一斗

一斗用三斗拌飯如常釀酒法待熟任飲

男婦腳氣骨節皮膚腫溼疼痛服此進飲食

健氣力不忘事用五加皮四兩酒浸遠志去

心四兩酒浸並春秋三日夏二日冬四日日

晒爲末以浸酒爲糊九梧子大每服四五

丸溫酒下如藥酒壞別用酒爲糊

小兒三

歲不能行者用此便走五加皮五錢牛膝木

瓜各二錢半爲末每服五分米飲入酒二三

點調服

婦人

而虛憊悴困倦喘滿虛煩翕

翕少氣發熱多汗口乾舌涩不思飲食名血

風勞油煎散用五加皮牡丹皮赤芍藥當歸

各一兩爲末每用一錢水一盞青錢

文蘸油入藥煎七分溫服常服能使婦人肥胖

五勞七傷五月五日采五加莖七月七日采

葉九月九日取根其治末每酒服方寸七日

三服久服去勞目眩息膚五加皮不開水

聲者搗末一升和酒二升浸七日一日服二

次禁醋二七日遍身行瘡是毒出不出以生

熟湯浴之取瘡愈服石毒發或熟禁向冷

地臥五加皮二兩水四升煮二升半發時便

服火竈丹毒從兩脚起如火燒五加根葉

燒灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

○典故

魯定公母服五加酒以致不死戶解而  
去

張子聲楊建始王叔才于世彥等

皆服此酒而房室不絕得壽三百年有子  
二十人世人服而延年者甚衆

○麗藻散語

寧得

一把五加不願黃金滿車綽

本草綱目

五加者天上五車之星精也

青精入莖有東方之液白氣入節有西方之  
津赤氣入華有南方之光玄精入根有北方  
之胎黃烟入皮有戌巳之靈五神鎮主轉相  
育成餌之者真仙服之者反嬰童人王詩

**地榆**一名玉豉一名玉札一名酸赭蘄州呼爲

酸聚平原川澩皆有之宿根三月內生苗初  
生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似  
榆葉而稍狹細長似鉛齒狀青色七月開花  
如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根味苦微  
寒無毒消酒止渴補腦明目止膿並除惡肉  
療金瘡此草露而不濡太陽氣盛也鑠金爛  
石炙其根作飲若茗取其汁釀酒治風痺

○療治

男女吐血地榆三兩米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合

婦人漏下

赤白不止令人黃瘦方同上

血痢不止地

榆晒研每服二錢摻在羊血上炙熟食之以

稔頭煎湯送下一方以地榆煮汁飲每服三

合赤白下痢骨立者地榆一斤水三升煮

一升半去滓再煎如稠鴆絞瀘空腹三合日

冉久病腸風痛痒不止地榆五錢蒼朮一

兩水二鍾煎一鍾空心服日一 下血不止

二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮

一升頓服若不斷以水漬屋塵飲一小盃投

之結陰下血腹痛不已地榆四兩炙甘草

三兩每服五錢水一盞入縮砂四七枚煎一

盞半分二服小兒疳痢地榆煮汁熬如飴

糖與服便已毒蛇螫人新地榆根搗汁飲

兼以膿瘍虎犬咬傷地榆煮汁飲并爲末

傳之亦可爲末白湯服日三忌酒 代指腫

痛地榆煮汁潰之半日愈 小兒溼瘡地榆

煮濃汁日洗二次 小兒面瘡焮赤腫痛地

榆入兩水一斗煎五升溫洗之 煮白石法

七月七日取地榆根不拘多少陰乾百日燒

爲灰復取生者與灰合搗萬下灰三分生末

一分合之若石子二三斗以水浸過三寸以

藥入水攪之煮至石爛可食乃已 葉作飲

代茶處

解熱

○典故

尹公度曰寧得一片地榆不用明月寶珠

西域真人曰何以得長壽食石用

玉豉 地榆與五加

煮食之可成神仙

黃耆

一名黃芝 一名玉芝草 一名戊巳芝 一名

兔竹一名鹿竹一名龍銜一名雞格一名米

鋪一名重樓一名野生薑一名救窮草一名

仙人餘糧南北皆有嵩山茅山者佳根苗花

實皆可食三月生苗高一二尺葉如竹而短

兩兩相對嫩苗采爲茹名筆管菜甚美莖梗

柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花如

小豆花結子白如黍米粒根如嫩生薑而黃

把地者大如拳濶地僅如拇指純得土之冲

亦有無子者

葉不對名  
偏精功勞  
葉有鉤名  
鉤吻殺人

氣而秉乎季春之令味甘平無毒補中益氣

除風溼安五臟久服輕身延年不飢

○種植

二月間劈根長二寸稀種膏腴地一年後極稠子亦可種冬取其根

○製用

凡採得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切晒乾

可作果實

根一石細切水二石五斗煮去

苦味濾入絹袋壓汁澄之再煎如膏以炒黑

豆黃爲末作餅約二寸大可供客

黃精細

切一石用水二石五斗自旦煮至夕候冷以

手接碎布袋榨取汁煎之渣晒乾爲末同入

金中煎熬爲丸如雞子大每服一丸日三服

絕糧除百病身輕不老渴則飲水

黃精根

莖不限多少細剉陰乾搗末每日水調多少

任服一年內變老爲少久久成地仙

同桑

槿漆葉何首烏茅山朮作丸飴可變白久之

殺三虫能使足溫而不寒 同朮久服可輕

身陟險不飢 同地黃天門冬釀酒河東風

益

而

○療治

補肝明日黃精二斤蔓菁子一升九蒸九晒爲末每空心米飲下二錢延年益

壽

營氣不清久而成癩鼻壞色敗黃精根

去皮淨洗

二斤曝納粟米飯中蒸至米熟時

時食之

精氣虛黃精枸杞子等分搗作餅

日乾爲末

煉蜜丸梧子大每湯下五十九

○典故

臨川一婢逃入深山見野草可愛取根

食之久之不飢夜息大樹下聞草中動

以爲虎上樹避之及曉下地身鄉然凌空若

飛鳥人捕之不獲後食酒餌遂不能去

顧

況紀秦時建阿房宮采木者側食黃精天蒜  
不覺竦身飛上就山下人家裁詩云酒盡君  
莫酤壺傾我當發城市多囂塵還山弄明月  
今平樂志所載繁山木客事蓋附會此說余  
昔在昭州常詢之陶偉西明府云少時聞  
父老言曾有人見之今久不聞矣

張七澤

○麗藻詩五言

三春勦黃精一食生羽毛

杜甫

北風起寒文弱藻舒翠縷明

澗客衣淨細蕩林影趣何當牢下流餘潤  
通藥圃三春溼黃精一食生毛羽

前人

七

言

掃除白髮黃精在君長鎌長鋤白木柄

歌

我生依子以爲命

黃精無苗山雪盛短衣數挽不掩脰此時與  
子空歸來男呻女吟四壁靜嗚呼二歌令歌  
始放問卑爲我

色惆悵

前人

牛膝

一名牛脰 一名百倍 一名山覓菜 一名對

節菜 江淮閩越關中皆有以懷慶爲真以人

栽蒔者爲良其苗方莖粗節葉皆對生頗似

覓葉而長且尖秋月開花作穗結子狀如

小鼠負重有濤毛皆貼莖倒生九月采根貨

賣者多用水泡去皮裹紮曝乾白直可貴但

其汁既去入藥力減終不如留皮者力大氣

味苦酸平無毒主治寒溼痿痺四肢拘攣

痛不可屈伸補中續絕益精利陰填骨髓除  
腰脊痛治久瘧寒熱五淋尿血下痢癰腫惡  
瘡折傷喉痺口瘡齒痛產中痛下死胎亦能  
墮胎孕婦忌用病人虛羸者加而用之名牛  
膝者言其滋補如牛之多力也

○修治

凡使去蘆頭以酒浸洗微煑下行則生用滋補則焙用或酒燉蒸用

○種植

秋收子至春種肥地深平土鬆易長耙土平方下種水糞澆剪苗食如剪韭法

旱則鋤耘荒則澆

水秋中亦可種

○療治

勞瘧積久不止者長牛膝水六升煮二升分三服

一日一服未發

前一服臨發一服

消渴不止

下元虛損牛

膝五兩爲末生地黃汁五升

之日曝夜浸

汁盡爲度蜜丸梧子大每空心溫酒下三十

丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

卒

暴癥疾腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤

以酒一斗漬之密封于灰火中溫令味出每

服五合至一升隨量飲 痘下腸蠱凡痢下

應先白後赤若先赤後白爲腸蠱牛膝二兩

搗碎以酒一升漬經一宿每飲一兩盃日三

服 婦人血塊土牛膝根洗切焙搗爲末酒

煎溫服極効福州人草用之 女人月經淋

閉月信不來連脣疼痛及產後血氣不調

腹中結瘕癥不散諸病牛膝酒浸一宿焙乾

涂炒令烟盡各口一兩爲末生地黃汁一升入

石器內慢火蒸至可丸。丸桐子大每服二丸。  
空心水飲下。婦人陰痛牛膝五兩酒三升

煮取一升半去滓分三服。生胎欲去牛膝  
一握搗以無灰酒一盞煎七分空心服仍以

獨根土牛膝塗麝香挿入牝戶中。胞衣不

出牛膝八兩芥子一合水九升煎三升分三

服。產後尿血川牛膝水煎頻服。喉痺乳

蛾新鮮牛膝根一握艾葉七片搗和人乳取  
汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出卽愈無艾  
亦可一方牛膝搗汁和陳醋灌之。口舌瘡

爛牛膝浸酒含漱亦可煎飲。牙齒疼痛牛

膝研末含漱亦可燒灰。折傷閃肭杜牛膝

搗罨之。金瘡作痛生牛膝搗敷立止。卒

得惡瘡人不識者牛膝根搗傳之。癰疽已

潰用牛膝根畧刮去皮插入瘡口。中留半寸

在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗傳其上。

牛膝能去惡血草溫涼止痛

隨乾隨換有

十全之功 風癰癧疹及瘡癰

牛膝末酒服

方寸七日三 骨疽癩病方同

上

氣溼痺

痛腰膝痛用牛膝葉三斤切以

米三合於豉

汁中煮粥和鹽醬空腹食之

老瘧不斷牛

膝莖葉一把切以酒三升漬眼

令微有酒氣

不卽斷更作不過三劑止

濕毒寒熱冬間

有溪毒中人似射工但無物初病惡寒發熱

煩惱骨節強痛不急治生虫入臟殺人用雄牛膝紫色節大者一把以酒水各一盃同搗

絞汁溫飲日三服 眼生珠管

牛膝并葉搗汁日點三四次

○典故老人久苦淋疾百藥不效偶見臨江集

要方中用牛膝者服之而愈

因

葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如  
蒟蒻久而有變如鼠形但無是百治不効一

醫煎牛膝根濃汁日飲五服名地髓湯雖未  
卽愈而面色漸淡久乃復舊後十年病又發  
服之又瘥因檢本草見肘後方治小便不利  
莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今再  
拈出表其神功 小便淋痛或尿血或沙石  
脹痛用川牛膝一兩水二盞煎一盞溫服一  
婦患此十年服之得效土牛  
膝亦可或入麝香乳香尤良

三如亭群芳譜藥部卷之一