

救偏瑣言卷之三

起脹證治準

痘之根透則爲起囊。綻則爲脹。起居先而脹繼之者也。痘初放點其粒如菽。遞及五朝前後。表裏得以無邪。痘瘡不至偏陷。縱赤而出。根透囊綻。菽而至於如痘。是謂起脹。毒其盡行於肌表矣。以毒達於外。痘故得以起脹也。其象眼封鼻塞氣。尊血附項。白根紅白而呂肥。紅而能淡光。壯如珠。身體溫和。神清氣爽。飲食二便如常。是起脹之順者也。不須服藥。

起脹時若表邪未盡。至毒不能盡行肌表。向來癰疀爛結。



或鼻流清涕。或面赤多淚。或面青聲重。或翕翕發熱。或
澌澌惡寒。或毫竅直豎。至此猶未霍然。痘必未能起。脹
仍必疏肌達表。而兼升發。古人言一見紅點。便忌升麻。
乾葛不可拘也。

起脹時若有宿食未消。致毒阻塞于內。向來胸膈不寬。按
之眉愁口中。喫腐酸臭。轉矢氣極臭。至此猶未跳脫。痘
必應至不至。仍以寬中化食而兼升發。古人言治癰症
一寸。痘子落後一丈。不可訓也。

起脹時表裏無邪。雖無阻礙。氣虛血弱。痘雖起脹。而少光
壯。淡白而不蒼老。眼不甚封。鼻不甚塞。腳雖不塌。項不

能綻體靜溫和者。稍稍解毒中。卽當漸補氣血。溫中保脾。如保元湯。加芩。歸。木香。姜。蠶白。芷。山查。量用解毒二味。以豫防瘡後泄瀉倒陷之患。

起脹時。有氣血虛劇。不惟溫而且冷。不但靜而且倦。不惟白而更嫩。不但不老。而且皺薄。項陷而兼脚癟。重語聲輕。眼不能封。鼻不能塞。淹淹不振。而不起脹者。卽當大劑保元湯。加芎。歸。鹿茸。以峻補氣血。或丁香桂附。以振作元陽。參芪太重。必須濟以山查。以此味能行參芪之滯。不減參芪之力。此用藥相濟之法。不可不知。桂附量視緩急。參芪鹿茸。遲則殆無及矣。此偏於不及者。大怒

刺傷證言 卷三
治法也。

起脹時至若毒火猛烈更有伏火伏毒鬱于皮毛痛如膚
熱衣衾難動期雖起脹竟累日壅遏者有毒參陽位而
目癲腫而痘不腫者有毒滯于項根起而囊不鬆者有
身之內通塞不均衡突處則重項甚則湧泡遏鬱處或
平或陷甚至連顆囊亦板實者亦有窠粒周圍貼抱一
圈狀如珠殼者有毒擁皮肉痘雖粗大板而平者此等
裏毒在于氣分不拘痘色紅與白紫與黯必用蕩滌之
劑佐以青皮赤芍荆芥牛蒡木通蟬蛻用山楂兩許
煎湯代水以治之重以乘蟲透發庶氣不爲毒銅氣得

以暢達而痘起脹矣。古人言氣不可虧，不可法也。

起脹時有諸痘未漿，并有未及放白數點先已黃熟者，有半爲熱毒燔灼半爲伏毒錮閉。一則鋪紅肆溢，一則痘若水珠者，有通身或紫黯或紫艷或嫩紅或攀紅或晦色，或間硃砂癭點，或紫背浮萍，或失血空竅者。此等熱毒在於血分，不拘痘之日期亦必以蕩滌爲主，佐以桃仁、赤芍、紫草、地丁、丹皮、荆芥、木通、猪尾膏、地龍以散其凝結之毒，庶血不爲毒瘀，得以通達而痘自起脹矣。古人言補血之功難須當養于平素之說不可泥也。

假令毒火發見于外，熱如火熾，煩渴不已，口熱如爐，不拘

在氣在血。均以石膏芩連犀角。或四聖散。金汁等類。以制其陽。先烈火。庶氣血兩不受炙。痘其得以起脹而榮潤矣。古人言。疹多清涼。痘要溫。不得以此痘待也。

起脹時。有根起而囊少脹。起脹而或少克。竟而色或少潤。潤而熱有未和。是毒火未得宣暢。概以疏透清解。觸無事于蕩滌。亦不必過以寒涼。尤不宜妄用辛熱。亦不當便用溫補。但以連翹牛蒡。生地丹皮。紅花山楂。甘草。荆芥穗之類。稍以白芷。姜蠶桑蟲。占米以催漿。輔以火雖不熾。清之則熱得以和平。色得以滋潤。行漿而聚得以洋溢。毒雖不盛。鮮之則囊得以鬆泛。毒得以消化。漿至收。

結而不爲餘毒。纏擾清解之法常規原以此期。痘至五六日大都起脹。起脹則毒在外。毒既在外而清之解之。則毒無寒凝之慮。痘方起脹。則漿未及行。而裏未虛。乘未虛而清之解之。則痘無內虛倒陷之患。而孰知過與不及不可以常理論也歟。

攻毒總訣

問痘如何有用攻。伏毒伏火。豈堪容。毒火鬆透。稠無害。毒火深藏。稀亦凶。細究神情。暨見症。察形驗色。皎如星上。焦衝突。如泉湧。舌刺唇焦。與炙同。下迫小腸。洩是血。大腸逼迫苦難禁。拂鬚皮毛痛似剝。啼號不已。虛中宮。胸堂壅。

過躁如嗔日夜無眠擾不寧痰一因之迷上竅氣雄煩悶
呻無聲靜不靜兮躁不躁愁容可掬畏人親骨節煩疼僵
似杖筋抽脈惕狀如驚偏體炎炎駭熱深更呀四體荷
如水通身汗湧令人畏尤怪身焦首似蒸毒湧肌肉周身
板掀睡如吹痘却平擁突如桃名疙瘩痘瘡未見毒丸行
痘未脹時而預腫額顴未起眼先封赤眼胞下遼紅絲
倒豎眸毛人未知偏軀晦滯如蒙垢口舌無皮穢氣噴爾
頰焮紅無點粒發始牙爭舌不寧報點歪斜黑陷硬一齊
湧出細如針紫背浮萍斑似蚤犯一稀稠總不論貫珠
攢簇又堪嗟蟹瓜遊蠶瓢土沙燕蟻二窩并鳥跡疊錢鼠

跡及螺疔。雁行珠殼。梵皮類。履底環珠。總象形。其在部位亦多名。覆金蒙頭。兩截分鎖項。纏腰雙鎖口。託腮攢背。與攢胸。披肩囊腹。咽關屬。抱鬚蒙毗。及鎖唇。鱗坐囊毬。暨抱膝。隨地逢之。莫覩輕。色有紫艷。有深紅。紫滯乾紅。又不同。紫類雞冠花。是艷深。其無異絳桃紅。滯色猶如花木筆。乾如紙色。有礬紅。若比青蓮滯更惡。淑皮乾色。惡無倫。有項平平苦焰炮。有項如煤類火燒。有項陷下根紅腫。有項尖圓色紫焦。痘色頗佳多惡症。痘稀色白見確標。飛漿透見黃如蠟。發泡看來似孽桃。有白有紫有色黑。或粗或細毒咸梟。那般痘色那般形。見痘神情總毒伏。毒伏

于內血受瘀。毒伏于內氣受鉛。毒輕本受氣血制。慘彼氣血亦歸毒。是痘生成必內潰。除却蕩滌無生路。縱使不能一一蘇。舍此千中無一復。前人列子不治條。後人糊模傍矩。蘡亦有識者謂實病。懊歎嬰兒是天命。天假千慮之一得。殺身惡毒容稍滅。惡毒驅兮氣血暢。氣血融通痘自放。氣領血載功自全。頂白根紅。自光壯。即使貫珠堆聚。類亦得鬆擡。無敢抗。氣煦血化漿自成。不藉參芪保元神。肢癰落膿無侵蝕。胃自開。強脾自實。此痘不拘兒厚薄。不拘未癰先病弱。不拘眼下便已瀉。不因眼下便閉結。不拘成漿宜保脾。不拘痘後須調理。尋常之法治尋常。不可將來抵。

惡酌梟毒不驅是縱虎驅之不盡防竊發若使反以補爲良可歎適以賚盜糧有慮見虛且傍穩坐視匍匐將入井從來有病則病受始終細細宜詳究犯此尤當及早圖更須絕項方駐足但憑漿後胃日強夜卧日高猶未足落痂體快與身涼咲口歡容無稍楚方是梟毒盡無餘纔得修文偃却武

申明鼻効

痘瘡鼻効與雜症鼻効不同雜症不過迫于肺經浮遊之火清之立解縱有爲積熱所致勢亦猖獗者有之要無內潰之慘痘乃先天毒火不効則已効則烈毒內亂五臟沸

騰致血妄行空竅。點點皆毒血也。非等閒邪火可例。勢必瀉滌而佐以涼解。庶可治其虛餒。不則毒血內瘀。毒瘀于內。其有不潰者乎。內至于潰。其有得生者乎。若僅以犀角地黃之劑。而希止之。是猶揚湯點沸。非鍋底抽薪之法也。是症甚多。以下附毒之驗。總難筆記。各附其一。以證其概。

附一治驗

余一孫女。四歲戊子暮春。一晚大熱如炮。躁亂不寧。不逾時而衄。衄注血紫成條。有意亂心慌之象。是夜卽以涼血攻毒飲。減紅花紫草。加石膏。依參地丁。連投三劑。次日午刻見痘。不紅不紫。如鴨色。褪皮。瘡囊不起。第二

朝衄止。熱亦減半。叫喊不已。躁亂如初。暫減石膏。用大桑茇同猪尾膏盞許。和于藥內。日服二大劑。服及七朝。漸起漸紅。大便日去七八次。九朝漿行。漸入佳境。藥餌遂撤。十朝晚身復大熱。叫喊仍不絕口。滿面搔破。猶幸鮮血淋漓。急用胭脂調入化毒丹貼之。前方重以大黃五錢。生地石膏俱兩餘三劑後。十三朝始定。收結而痂尚燥。寢食僅得其半。以忍冬鮮毒湯減紅花加大黃生地。十六朝收功。

申明舌刺咽乾

舌胎如刺。咽乾如炙。傷寒雜症見之。亦陽盛陰虧之象。然

扶陰抑陽。其厄可解。痘瘡若見。總以烈毒肆虐。非僅燉炙而已也。輕則乾憔。重則焦黑。亦必潰而後已。總係咽喉之毒。所以咽啞水滯。並爲逆症。舌刺如煤者不治。欲解其圍。非蕩滌不可。即使攻之。亦必早圖。乃克有濟。不當目之於泛常也。

附一治驗

徽州程季老。一公郎二歲。丙戌殘冬。一日大熱煩渴。口
熱如爐。舌胎卽芒刺而黑。則其咽乾可知。見點于肌肉
之間。隱隱若麻。乾紅晦滯。彷彿乎逆。幸在初朝。以清涼
攻毒飲。加蜜炙麻黃二分。以隆冬也。減犀角二劑。細碎

者悉退。顆粒分明。又二劑色亦稍轉。四朝淚流如膽汁。
唇漸堆結如煤。謂之鐵嘴。大便晝夜約去十餘次。一方
服至六朝起脹。八朝行漿。胃氣未開。神情未快。十二朝
鐵嘴鬆褪。寢食漸安。首尾一方收結成痂。以忍冬鮮毒
湯。至十六朝收功。

申明溺血

痘瘡失血。列于不治。總以烈毒內攻也。况出自小腸乎。故
五淋唯血尤重。痘瘡犯此可知。涼血清毒。固是症之首務。
而無斬關之劑。以驅逐之。縱極清極涼。僅足以緩其流。難
以澄其源也。

附一治驗

七里溫廣心兄大公郎八歲出痘于乙酉仲冬。值久瘡後。精神疲敝。飲食不思。痘卒溺血如膏。胸膈閉悶。唇黑如煤。舌胎如刺。兩頰不分界地。天庭明朗。身上稠密。乾紅。腹更有紫背浮萍斑點。如是毒火。身反不熱。內鬱故也。以涼血攻毒。飲大黃爲君。加桃仁每劑和大桑蟲日服二大劑。五朝未見轉機。前方倍大黃五錢。生地兩許。七朝兩頰癓透。紅活成顆。身體大熱。餘痘亦俱紅潤。腹漸漸淡。前方減葛根。蟬蛻。紫草。紅花。桑蛀。知黃連石膏。每服調牛黃化毒丹一錢。日進二服。十朝漿足。腹癰悉

退胃氣頓開。十二朝唇殼褪脫。舌竟紅活。頭面堆砂收結。身上氣足血收。寤寐俱安。前方減大黃。黃連。石膏。桃仁。加金銀花。貝母。攻伐之劑止一劑不及。便不思食。神情仍復不快。痘即停止。予駭其故。豈攻之太過。而真元不繼耶。抑功力未足。而毒火竊發也。猛省其故。失檢其溺。取視。猶然使內邪淨盡。小腸何猶乃爾也。悉如前法。連進二劑。諸象速轉捷於影響。服及十八朝。而溺始淡黃其色。以忍冬解毒湯。始得收功。

申明大腸逼迫

大腸爲傳送之官。通利易。結實難。故大便之實與瀉。中氣

之虛實因之所以古人治痘用末香異攻散以豫防其滑
渴而孰知梟毒深藏之痘不爲氣領不爲血載表裏壅塞
發洩無門因有傳送之隙可乘毒其騰湧于此矣膠旣毒
湧下注逼迫自欲解而仍不得解誠能因勢而利導之俾
毒得以宣暢則氣血融通而痘其發皇矣

附一治驗

孺山鍾晉叔兄七歲一公卽甲戌出痘未見點時腰腹
倏爾疼痛至欲解更甚及解逼迫異常急不能待而卒
不能解因難塞而努力因努力而愈難塞不惟不得解
努力之極氣反上湧而面顏俱變俄頃而惡象復然此

毒深藏于脾腎也。以必勝湯去生地。連投二劑。身體壯
熱見點稠密不鬆。乾紅色滯痘與皮肉。按之俱板。氣壅
煩悶。身無安放。前方服及四朝。大便見毒垢。如漆如膠。
紫黯其色。前方加黃連石膏生地服。及七朝頭面掀腫
如毬。周身四體脹滿如吹。有如氣鼓。目之可駭。所幸痘
亦得張。十二朝漿行。十四朝漿斂。悉以一方主之。大黃
用及勦盡。大便日止一次。口內成瘡。目睛起瞼。身熱未
知。以撥雲散合忍冬解毒湯調牛黃珍珠。服至十七朝。
所進僅止稀糊。所存惟有皮骨。與參湯數匙。口卽乾膩。
嗣後弗藥。惟以牛黃珠末。日服二分。佐以吹藥。瘡與瞼

漸愈飲食漸進月餘後肌肉生長精神康復次年患一
悶癥不及進藥而斃惜哉

申明拂鬚皮毛

痘未分布而毒先湧發如癰者名爲疣瘡塊痘未及乎肌
肉而毒之鋒穎先射乎皮毛謂之穎毒稍一櫻之痛如膚
剥者是也此不早圖任其肆虐七八朝必至燥痒外剥而
斃毒之最惡者也

附一治驗

復初黃憲副八公郎癸酉孟春一日身體燥熱肉瞶筋
惕兩目昏沉痘之象也愁容萬狀稍動其衣被痛楚等

于剥膚是穎毒鬱于皮膚也。卽用必勝湯減桃仁。加桔梗。用大黃四錢。連進二劑。痛不稍減。照前方大黃六錢。又二劑。透出一身紫滯。乾紅綿密無縫。痛始減半。大熱如火。前方加黃連石膏。減葛根服二劑。顆粒分明。六朝克肥。九朝漿勢沛然。因痘象可觀。藥卽解弛。次日燥痒難禁。頭面搔破。血流滿面。猶幸急以藥胭脂貼之。悉如前方。外以牛黃二分。珠末四分。勻分三服。調于藥內。日進三頭汁。次日復灌。十二朝堆沙漸收。腐爛作臭。胃氣日開。神情日爽。十六朝收功。用大黃勑餘。牛黃二錢。申明帝號不已。

啼哭嬰兒之常態。至于不已，非煩熱所致。卽痛之使然而可慮矣。聲必急驟，面必愁容。與常態自是不同。即使煩熱痛楚，其因別症。如蛔結食積，瘡瘍癰毒等病，亦無專于痘癤者。惟痘瘡犯此，中藏伏毒而內擾。擾則攻，攻則潰。所以叫喊不已者，不治非不可救藥也。正不知有此治法耳。

附一治驗

余戊子一孫壬辰初夏一晚大熱如焰。叫喊不已。如蛔在灰，次早大小便俱血。解後稍緩。俄頃復然。急以必勝湯加石膏連投二劑。日晡卽見痘窠粒不鬆。痘色紫黯。大解皆紫黑。成片成條。散者或少流。叫喊愈甚。照前方重

以大黃生地石膏晝夜三大劑。每劑和猪尾膏一大盞，并大桑蠶服及七朝色漸紅潤，囊漸鬆透，終是叫喊不已。前方減乾葛蟬蛻九朝放白。十一朝行漿。諸症減半。大便日去七八次。藥餌稍緩，仍復猖獗，更加燥痒，痘項穿破若圈，喊不絕口。悉如前日進三大劑。十四朝得有霽色。十六朝叫喊復作，愁楚萬狀。便出紫黑血片，如蟄皮散瘀血，有一糞杓，卽安睡，醒餘便思食，身熱始和。大便頓愈，溺猶血水。廿六朝夜半驟然躁亂，舌起一疔。以牛黃分半珠末三分，蜜湯調服，以忍冬解毒湯，加大黃錢許，用地丁煎湯服及廿八朝。舌疔卽褪。月餘始得安。

痘約用大黃三十兩石膏生地俱二觔半

申明胸堂壅遏日夜無眠

胸堂乃上焦心肺之地最輕清而邪不易犯者然六淫惟火上炎而易及于心則以火濟火而神自不寧于於肺則金被火爍而燥自不覺况此火更出于毒病不止于燔灼輕則內擾眉宇不舒重則內攻如魚失水日夜無眠所必至矣輕者導赤可解重者必需攻逐不則養虎貽患是症施于未見使痘可以成顆施于已見細碎可以退去凡猖獗之症在三日後內已受攻無及矣

附一治驗

一凌姓之兒僅週歲身體壯熱疎亂不寧如蚓在灰痘未見而兩目昏眊是痘象知其毒壅上焦之故也卽以涼血攻毒飲去生地紅花加山梔地丁一劑而神卽安日晡見痘如麻再二劑而細碎者潛消朗朗分珠其祖父稱謝不已照方用生地紅花并大桑蟲日進二服以一方服至十二朝順叙收功此僅躁亂一項更得治于未痘故朝頭無其風波

申明瘀迷上竅昏眊無聲

心之氣出于肺而爲聲其竅若管籥焉竅爲瘀迷瘀因氣閉氣因毒滯毒氣瀰漫瘀迷心竅蓋心爲神明之官迷則

神自不清閉則聲自不出矣。詳其痘瘡皮肉壅腫紫滯焮紅壯熱氣粗者方合是症。

附一治驗

孺山鍾去疑兄年及二旬餘一日府試歸見痘暑沉不語有疑其爲虛者有云其爲勞者五日矣。窠粒不鬆盤暈厥赤兩頰通紅不分界地且氣粗壯熱之極此熱毒上湧清氣阻塞心竅爲痰所迷虛勞何與焉以涼血攻毒飲減紅花蟬蛇加貝母地丁日投二劑七朝界地漸分痘漸鬆泛神情猶然昏憊前方減葛根加石膏黃連八朝始省人事方知已之出痘九朝而漿沛然十二朝

收結遂弗藥而愈。俱以一方終始其功。

申明靜躁無定愁容可掬

凡靜則病退。躁則病進。至于似乎靜而卒不容安似若躁而若爲所禁。滿面愁容。凡所遇而憎惡焉。較之狂躁者更重。甚至有天柱傾倒。刻不能支者矣。痘瘡犯此。無論熱如炮烙。紫艷深紅。見其熱毒內擾。卽身體溫和。痘色黯滯者。尤見其熱毒固閉。而故身無安放也。與氣虛困倦。自是霄壤。

附一治驗

一賀氏子四歲。出痘于仲春。滿目愁容。天柱不舉。神情

躁而若倦。身不甚熱。痘點隱躍于皮膚。按之板實。板則非不振矣。且多遊蠶。不拘其數。其色乾滯。而多白黯。點則非真白矣。且有椒色。問乎其中。溺血如膏。口穢若腐。則此天柱不舉。愁容厭倦。全是毒火內擾。而故情緒難支。以必勝湯減桃仁、紅花稍加蜜炙麻黃一二分。和桑蟲一大枚。日投二劑。服及四朝。身漸熱。色漸紅。瘡粒亦漸起。時常乾嘔哈舌。前方加黃連四劑。毒火湧發。驟熱如焚盤。若塗硃。天柱頓起。外加石膏減乾葛麻黃。自七朝以至十朝。放白成漿。大便日去五六次。皆毒垢。愁容不轉。壯熱未和。飲食不進。十四朝堆結發臭。飲食得進。

諸症平康。惟溺血未止。十八朝仍復壯熱泛葩。口內成
疳。一方貫至念朝外。始得全愈。

申明骨節煩疼。腰如被杖。

痘瘡包孕。在于腎臟。腰者腎之候也。骨亦屬腎。此地若痛。
是于發動之處。便卽肆虐。烏能歷日期待。朝數而施功于
次第也。縱有良法。苦不及施。猶之迅雷不及掩耳。所以腰
如被杖者爲不治。惟于痘未見點。萌芽甫動。得以卽挫其
鋒。庶可挽回于萬一。若一見點。本膜便壞。惟有待斃而已。
若清溪章繼美之痘。是一驗也。

又附一症

同袍李季老一幼弟卒然腰痛以及兩脇兩肩骨節皆
疼愁楚不堪次日卽報點于左腰如豆大而色黯滯又
有數點似痘非痘隱躍于皮膚而多晦色按之板實以
必勝湯四劑後窠粒稍起而終不鬆晦色稍退而未紅
潤續出者可以數紀只是痛楚呻吟晝夜不息寢食俱
廢以一方服及八朝畧鬆泛而得半漿服過十二朝病
楚方息稍能寢食將就收結而愈是症幸痘稀疎故得
成功而且易若一稠密便如意繼美之歷盡艱難險阻
矣醫症之可畏也如是夫

申明筋抽脉惕

筋抽脈惕者。狀若驚也。筋屬肝。毒在于肝。不得尋竅而出。筋脉受其衝激。以故抽惕如驚。而實非驚。有發于未痘之先。景象凶暴。見痘即止。此痘發于心。世俗所謂驚痘者是也。然亦非驚。此則未發已發。不時抽惕。惟懷抱者知之。傍觀者不覺。此毒不驅。肝臟受攻。肝爲血海。血海擾害。難于載毒。紅暈不著。難以成癧。囊不克溢。首尾類多咬牙。終必潰而後已。是症輕者。疏達活血。稍與攻毒。重者。重與攻毒。告於活血疏達。若以驚視誤人。多矣。

附一治驗

嚴璞菴老先生一孫。歲未滿週。一日壯熱昏沉。筋脉抽

惕以清肌透毒湯。加木通青皮一劑。次日卽見痘頭額如麻。身上隱躍。以必勝湯減桃仁赤芍。生地加當歸三劑。後細碎者漸退。隱躍者漸透。雖見顆粒。却密而不鬆滯。而不紅。胸背多遊蠶珠殼。抽惕如故。減葛根。加丹皮。每劑和大桑蟲一枚。日服三劑。至七日。項白根紅。惟遊蠶珠殼未鬆。服及十朝。通身脹滿。糞勢沛然。獨抽惕未已。壯熱未和。而多愁楚。大便自見點。晝夜十餘次。皆毒垢。幸乳食如常。一方貫至十六朝。諸症平康。戲之方笑。以忽冬解毒湯。急朝外發出紅癥如霞。調理收功。

申明偏體炎癰

痘瘡非熱不發。非熱不脹。非熱不成癧。非熱不結痂。是元陽制化其毒。終始其功。故首尾不可無熱。然熱宜和。體宜潤。乃若如火炎炎。徧體乾灼。肆虐臟腑。蝕真氣。爍真陰。是痘瘡焦紫之媒。不論已出未出。按之若此。堵便是窮兇極惡之症。不可以泛常之熱而忽之。

附一治驗

臧比玉兄一大公郎。四歲。一日徧體燔灼。面頰通紅。氣壅昏憊。以必勝湯減桃仁。紅花。加石膏三劑。後見痘如麻。又二劑。細碎者悉退。顆粒分明。但鋪紅若錦。熱不稍減。神思復然重。以大黃五錢。生地石膏各一兩。日投二

劑至五朝減蟬蛻加犀角八朝漿足大便日出四五次
神思始清十二朝稍思飲食有收結意盤暉猶然微赤
十四朝仍復泛葩轉側愁楚口內生瘡一方服至十八
朝諸症霍然方以忍冬解毒湯收功

申明四肢獨冷

四肢屬脾惟宜和暖固不宜熱尤不宜冷冷而皮薄色淡
身涼而手足更冷者此脾臟虛寒元陽幾脫之象冷而乾
紅色帶通身火熱而手足獨冷者此裂毒壅遏于脾邪陽
莫透火鬱則寒之象冷之極正熱之極也較之炮熾者而
更重矣在他症則發之而火自散此係裂毒深藏非攻不

透失治而脾必潰爛矣

附一治驗

驥村嚴青宇七歲一受壯熱如火四肢冰冷下部直過環跳躁亂如失水之魚無瞬息寧靜兩頰一片通紅不見點粒胸背乾紅晦滯皮壅肉板主人以爲必斃置之若棄矣然痘在初見毒無定位以必勝湯大黃五錢連投二劑四肢稍溫卽加黃連石膏每劑和大桑蠶一枚又四劑伏火通透兩頰紅中泛點四體頓熱一方貫至九朝偏體克肥粲然可觀主人喟然嘆曰前者兒女輩斃于痘者十數人凶象皆未及此是痘得痊徃者不堪

回想矣。必竟首尾一以攻毒涼血鬆肌十二朝漿黃。如蠅漸收漸結十八朝。諸症霍然。癥落收功。嗣後口腹生瘧。兩目腫赤多淚。以擦雲散去木賊。加牛蒡玄參天花全愈。約用大黃二十餘兩。石膏生地各二觔。大桑蟲四十餘枚。

申明通身汗湧

陽虛則自汗。汗多則亡陽。而有虛脫之患。孰知痘瘡有陽極而汗湧洩者也。人身水火不容偏勝。水勝則火熄。火勝則水沸。烈火燔灼。五液沸騰。液有出于毛竅者爲汗。此五液之一也。火擾于內。而汗自洩。是汗之爲火。逼可知有汗。

出如淋者火之極也其症通身爛赤燔熱氣粗躁亂是其
驗之火盛卽毒盛故氣虛而毒盛者有之未有血熱而毒
輕者也火毒相併血遇必瘀血至于瘀而內有不潰者乎
其攻自不容緩

附一治驗

乙未吾郡張太尊一公子歲未滿週一日身熱如火汙
如雨下左眉稜掀腫如桃愁楚不寧而有痘象乘痘未
見毒無定位時卽以必勝湯減桃仁紅花葛根地龍加
石膏丹皮羌活連投兩小劑外以牛黃半分珠末一分
調入化毒丹三匙密湯調送分爲兩服次日見痘頭額

細碎如針頭悉如前服。又次日細碎者俱退去矣。而汗亦收。顆粒分明。第膚赤如霞。熱仍火熾。愁楚復然。惟喜乳食能進。一方服之六日。頭目良。工。減。蟬。金。八。月。庚。子。

飽滿。熱勢不減。眉宇未開。九朝迅速收癥。耳聧便起。一毒如雞卵。照原方用桃仁紅花十二朝出膿。背上腰胯隨起四毒。通如前劑。并化毒丹至十六朝。亦俱成膿。平復相繼。又起大大小小十數餘瘡。更多惡色。青紫如傷目之可畏。以金銀花赤芍地丁貝母羌活牛蒡當歸玄參甘菊甘草。仍合化毒丹。服至廿四朝。而始收功。是痘熱法。名爲火裏苗。毒先于痘。名疙瘩塊。令不早圖痘甚。

焦紫內潰矣

申明頭汗如蒸

頭汗如蒸者。通身焦燥如炙。惟頭面汗若籠蒸也。緣烈毒湧于肌表。壅塞氣道。而致表實。然五液却沸于內。滲泄無門。以故身燥如炙。火性炎上。兼之不密。旁達縱尤。上竄汗之所以上湧若蒸也。頭爲諸陽之首。輕清最上之位。邪陽不易犯者。又一身之樞紐。痘瘡吉凶之準。邪陽更不宜犯者。而汗若此。五內可知。前人所以謂毒參陽位者死。是汗居其一也。猶有許頭面而不得洩者。面反青黯。兩目彷徨。悶亂喘急。此又立刻待斃者矣。

附一治驗

白菴陳老先生三歲一發。一日驟熱如爐。燥渴如烟。惟
以額汗如雨。可至晚自見黑于太陽兩夾少杼皮紅而
黯滯。連成一片。不見點粒。通身稠密。乾紅口渴煩燥。徹
夜無眠。第幸在初朝。毒火雖熾。尚可撲滅。以大黃生地
黃連紫草地下。佐以木通荆芥丹皮牛蒡山楂青皮赤
芍。日服三頭。次日汗出而熱減半。前方減黃連加蟬
蛻。并大桑蟲服。及四朝。兩頰紅中泛痘。色漸光澤。神情
未舒。胃氣閉塞。前方每劑調牛黃半分。日投二劑。七朝
項白根紅。神情半爽。身復壯熟。仍用黃連減蟬蛻桑蟲。

守此一方成漿結膿。至十六朝邪毒退聽。正氣康復。膿
痕尚燥。幾及一月。復發血瘋瘻。以忍冬解毒湯加生地
黃連赤芍減紅花。又一月而全愈。

申明毒湧掀腫

痘有毒盛鬱透于外者。內地卽腫。必因痘腫而腫囊必縱。
突色必紅潤。若邪廓則平。痘色則滯。肌肉掀腫如吹。按之
板實此一身領毒之氣悉爲毒錮。一任毒衝塞于身。所
謂難癰。肉腫痘不腫者是也。此毒不驅。七日必至內攻而

斃。

附一治驗

復菴慎老先生一長公。字其章者。九歲時。痘烈熱如焚。紫滯乾紅。窠囊平板。無一隙地。通身掀腫。如吹四肺。強直如鐫。仰臥而不能轉側。猶如捆綁。痛楚非常。叫喊不已。此臭毒烈火。表裏俱狂。以大黃八錢。石膏兩錢。生地兩半。黃連三錢。佐以清喉。鬆肌透表。活血更以猪尾膏。調入盞餘。日接二劑。六朝勢不稍緩。時值炎天。畏熱如爐。以藤席鋪地。以安之。猶云背下如火。外取三七草。搗自然汁。用殘紙以拭之。仍以前方服過。八朝景色如故。計無所施。將塘雞矢。醬色而有尖頭者。和六一散爲細丸。又用六一散和冰片。二釐研匀。爲衣。燈心湯送服。逾

時身振體戰。臭汗如漿。霧時湧出大黑螺疔。於肩背四肢十五六處。烈熱頓和。痘卽肥紅光澤。方得屈伸轉側。終是愁楚未開。水米不粘。尚屬可畏。其疔卽以銀針挑破。用臘脂膏貼之。仍以原方首尾一轍而得成漿。收結癰落收功。二十朝外口復生疽。尻骨又生癰毒。一僧治之而愈。

申明疣瘡塊

痘瘡輕淺者。萌芽發動。氣領血載。從容散布。不但顆粒分明。界地亦不連。其色若重而急者。朕兆一萌。毒鋒如射。或上竄。或旁湧。任其毒之所至。擁突如桃。形如癰毒。是謂疣

瘡塊痘未及見。毒先湧發。驗其身熱如炮。神情躁亂。哈舌不已。叫喊不止。更合之兩目昏眊。肉瞤筋惕。是其症也。若以尋常癰毒視之。則誤矣。

附一治驗

朱嘉直兄。一公郎。一日熾熱煩躁。愁容萬狀。脣後先起兩毒如桃。不知其爲痘之疣瘡塊也。嗣卽見痘稠密乾絃。僅不細碎。然窠粒不鬆。以必勝湯加佐參。自二朝服至七朝。大便日出四五次。色漸肥紅。囊漸鬆泛。神情頗安。大有行漿之勢。第壯熱未和。一老嫗譖曰。痘子惟恐脾胃不實。反用大黃宣泄。令痘根俱泄出矣。相公當自

有主意果惑于其言。遂中止兩日。漿亦中止。神情復躁。
熾熱更甚。頻頻乾嘔。頭面破傷幾半。口穢若腐。唇口焦
裂。傍徨之極。復邀余視。余諭之曰。中氣果洩。無論別症。
有不頭溫足冷者乎。何以其熱更熾耶。急以前方加黃
連減蟬蛻。其破傷處以藥胭脂貼之。至十一朝。破傷復
灌。通身漿亦復行。兩疣瘡併成一失。疔黑硬成塊。亦以
胭脂膏貼之。越三日。其疔腐爛。膿漿旁溢。軟絰拭乾。重
貼十六朝。漸爾收結。胃氣漸開。諸症漸得平復。其疔至
廿朝外收瘻。首尾以一方成之。口內生瘡。終以清熱解
毒收功。

申明預封預腫

痘至五日期起脹光壯。面因痘脹而腫。眼因面腫而閉。此勢之必然者也。痘若平而不起板而不鬆。惟皮肉掀腫。目胞擁合。此祟毒騰湧。不受氣領。不爲血載。惟毒縱橫。是亦毒參陽位之一症也。前人所以謂面目預腫者。不治及早攻之。容或可救。

附一治驗

一友許君。幼時見痘細如針砂。頭面掀腫。未及兩朝。而眼卽矇閉。熱如炮熾。愁楚之聲不絕。以必勝湯加黃連石膏連投三劑。卽大解七八次。而細碎者悉行退去。兩

目仍開。熱亦減半。痘雖成顆。尚頂陷不鬆。乾紅未潤。前方減黃連石膏。服及七朝。囊髮色潤。眼封鼻塞。八朝有放白。行漿之勢。未得沛然。大便約去二十餘度。始如膠漆。繼若清水。乃尊疑其虛滑不禁。果爾。痘變灰白矣。尚嫌伏毒。鬆而未暢。故下利。清水暢則矢必黃結矣。仍以前方。服及十朝。漿足。胃氣漸開。十二朝。神情開爽。大便頓實。收結而愈。後左小股發一餘毒。以忍冬解毒湯。收功。

申明紅絲達目倒豎瞭毛

紅絲達目者。有血絲達于瞭毛之下也。瞭毛倒豎者。眼瞭

七根根如針簇也此伏毒衝擊于脾之使然各臟凡有伏
毒卽是惡症至於脾最惡矣僅在兩腎之上却是心肺肝
部之下毒愈下而透愈難脾受衝擊所屬之地自失其常
所以眸毛倒堅血絲遶目畔也較之腹痛唇腫等症殆有
甚焉者矣是屬毒參陽位之一症也

附一治驗

箬溪高翊老一公郎痘頗勺朗明潤粗壯道中一友目
之爲順授以平和升發之劑主人以夜不成寐身體壯
熱爲慮不知更有血絲遶于目胞之下。眸毛倒堅如鉛
可慮更甚若壯熱不寐又其次矣喜僅在三朝之內猶

可攻遂用大黃三錢佐以赤芍紅花地龍大桑蛀餘不免鬆肌透發之類服至五朝血絲漸淡而眼合壯熱稍和十朝聚足肥濃攻發似乎可已。第兩太陽未賑毒根猶未盡徹神情未爽恐虧一簣大黃與桑蛀服過十三朝方得如意而回。

申明痘如蒙垢口穢噴人

瘡如蒙垢色近千灰灰而囊薄色白者此氣血不足虛之極也。灰而黯滯囊老板實此氣血爲邪毒壅滯不能煥發其黑色愈黯者其毒愈深若兼之于口中穢氣令人難返此毒固盛而烈火尤內燄者也不可據其似而失其真也。

附一治驗

一宋姓者。三歲一子。痘頗磊落綻突。而根無盤量。其色則晦滯灰黯。宛若爲塵垢所蒙。體不甚熱。口中穢氣滿幄。躁亂不寧。此係熱毒過鬱于內。故見症乃爾。身體則不熱也。是病在血。而不在于氣。以大黃紅花紫草赤芍丹皮地丁荆芥山楂牛蒡自三朝服至六朝。色漸紅活。亦漸安。八朝頓熱如火。穢氣減半。頂白根紅。減紫草紅花赤芍加生地黃連九朝漿成迅速。寢食漸復。以忍冬解毒湯調治。收功。

申明發始咬牙

齧牙有血虛。有熱毒。大都漿後者屬血虛。漿前者屬熱毒。
然漿後而猶因熱毒者有之。未有發始而血虛者也。往往
有痘方二三日而便齧牙者。有見點而卽犯此者。更有痘
未及見。一發熱而相戛作聲者。無論痘未及見。就在放標
透點時。血初定位。縱血虛之人。血亦何自而虛。致齒失其
養耶。明是毒火肆虐。不必參合形色。內症自是燎然。

附一治驗

一張氏之室年十九歲忽然壯熱如焰。喉間刺痛。不能
嚥津。咬牙不巳。神情躁亂。次日卽見痘如針砂。色似胭
脂。道中一望而去者不一矣。其症雖惡。以其尚在初朝。

毒無定位。以大黃石膏各五錢。生地七錢。餘佐以荆芥
地丁。丹皮。赤芍。乾葛。竹參。牛蒡。木通。甘桔。用蘆筍兩許。
煎湯代水。日投三劑。次日三朝。頭面卽顆粒分明。前方
更用桑蠅一大枚。五朝色轉肥紅。七朝放白。九朝漿勢
沛然。咬牙方止。熱猶火熾。僅咽稀粥碗許。猶苦難吞。十
朝頭面堆積。愁楚未舒。十二朝血收氣足。回膿結屬。發
臭難近。飲食大進。諸症悉愈。首尾以一方成之。

申明發始衷舌

舌者心之苗。心寧則舌寧。心擾則舌亂。心固象離屬火。雖
若易動。然下交于腎。得坎水相濟而成。其爲火者。故爲君

火當寂無所觸。其何弗寧者。惟是邪陽烈毒。衝突其經。以
火濟火。二火相併。其苗自不能寧。痘瘡自內達表。非火不
透。痘之順者。其熱溫和。客火不熾。於心何犯。即使險者。因
逐毒而壯熱者有之。熱因逐毒而壯。猶爲發揚鬆透之火。
於內亦不擾。擾則險而逆矣。烈毒內炎。燔及少陰。非躁亂
無聲。卽呼喊不已。非躁熱如烟。卽汗出如油。痘隱隱于肌
肉之間。非紫艷。或攀紅。症難悉舉。類多如此。弄舌其能免
乎。是症燔熱者攻而涼解。隱伏者攻而散達。斯得之矣。

附一治驗

金友張兄一公郎。二週癸巳季冬。忽一晚身熱躁亂。咬

牙弄舌。痘象迭呈。以清肌透毒湯。加大黃牛蒡青皮等
值初寒。佐以炒黑麻黃羌活二劑後。皇毒騰湧。躁亂更
甚。兩目傍徨。啼號乾嘔。筋抽脈惕。大便傾瀉如注。此熱
毒內亂。下注大腸。不容傳送。而故湧泄也。乘痘未見勢
難猖獗。毒未內攻。因勢而利導之。是攝萬象于兩儀。開
竅在此。前方減羌活麻黃。加丹皮地丁。木通三劑後。瀉
卽止。諸症未降。以衝突之勢稍緩。不至奔騰下注耳。所
謂大黃能止瀉。信不誣也。見標數點于左額。細如針頭。
當喉十餘點。犯鼠跡咽關。照前方倍加大黃。昏眩參每
劑和豬尾膏盞許。大桑蠶一枚。日服二劑。次日三朝。去

庭清楚。但是不鬆地角細密。卽以胭脂膏貼之。右額不
成點。身幸分珠。其間遊蠶珠殼者。不計其數。悉如前方。
至五朝。弄舌止。右額方見點。口內脫皮。乳不能吮食之。
以熟紅棗不變而出。大便復去五六次。以全體惡毒湧
發。火性奔騰。不暇分消。而故直出。是謂邪熱不殺穀。前
方減葛根加白芷。七朝痘漸肥紅。八朝右額及遊蠶珠
殼俱起脹。大便去黑垢甚多。如膠如漆。日進米糊二三
碗。兩太陽未能起脹。以毒根未盡透也。日服大柔蟲四
枚。猪尾膏盞許。前方減蟬蛻。加山甲生地。十朝通身漿
足。次日漸漸收結。大便復止。寢食俱安。聲音不亮。間或

咬牙。前方。渢山甲。大黃及半。加金銀花。甘菊外。以牛黃半分。日服兩次。十四朝。諸邪退聽。調理收功。是症始終以攻毒疏透爲主。補拓收斂。毫不與焉。卽寒涼之味。亦不相及。以熱毒深藏。隱伏也。痘本凶暴無倫。朝頭無甚風波。末路得無餘症。皆得早圖之力也歟。

申明。兩頰通紅痘無一點。

兩頰係一身痘瘡之主。氣血領載之會。先於此地透發。後及其餘。見氣得其暢。故衝毒而先後不紊。得於此地分根。不連其色。見血得其和。故載毒而盤暈圓淨。若一片通紅。是血被火灼而旁溢。毒不受載矣。不見點粒。是氣被火灼。

而遏鬪。毒無所領矣。氣血俱爲陷害。僅以涼血升透。成何濟耶。

附一治驗

蔡文清兄五歲一愛。忽一晚躁亂如涸轍之魚。旣卽昏憤。面如土色。兩目失神。若立刻可斃者。以大黃羌活青皮紅花蟬蛻菖薑炒黑。麻黃荆芥穗木通山楂連投三劑。次日神情稍醒。兩頰通紅。身上見痘數點。照前方減麻黃蔓蠶加丹皮地丁赤芍和猪尾膏半盞。三朝身體壯熱。人卽醒豁。兩顧隱隱見點。如針砂。額下稠密。近于托腮。卽用胭脂膏封之。身間珠殼甚多。喜磊落成顆。但

嫌乾紅少潤。前方去羌活加黃連生地。每劑和入一大桑蟲四朝顧卽清楚。五朝色轉紅活。鼻塞眼封。七朝珠殼起項。食薄粥一茶甌。大便日去三四次。尤朝頭面堆結。身上漿滿。壯熱未和。腹痛異常。愁楚不能轉側。倍以大黃臨服調入化毒丹。二三匙。十二朝痛漸緩。漸得轉側飲食。大進。以忍冬解毒湯調治回好。

申明湧出如針

痘瘡形成于氣。毒受氣制者。出必漸次。雖密亦分珠圓綻。以毒軟鬆而氣得以拘領也。毒若雄猛則氣不能領。一任毒之奔騰。所以湧出而不得漸次。氣更不能拘。一任毒之

縱橫所以細碎而不成顆粒。痘之蛇皮蠶殼皆由于此。
痘雖在七朝本無治法。惟于放點之初見其攢簇不成顆
粒者速卽攻之。令洶湧之勢大挫其鋒。遏鬱之氣得伸其
令庶乎密者可以轉稀疎。細者可以轉磊落。此真稀痘之
秘訣也。但當治之以早。是痘令一越宿。毒卽有定位。三日
內攻已成牢不可破矣。儘有一見點而攻不退者必至蛇
皮蠶殼亡之其命也歟。

附一治驗

錢黎老二公郎忽身熱如焰。次日痘卽一齊湧出。細若
針頭。自頭至足。渾無隙地。色滯乾紅。時時乾嘔。徹夜無

眠。以大黃爲君。佐以青皮。山楂。荆芥。地丁。蟬蛻。赤芍。紅花。紫草。黃連。木通。臨服和猪尾膏一盞。連投三劑。第二日兩頰卽成顆粒。但界地未分。至三朝通身亦分珠磊落。第壯熱未和。乾嘔稍稀。前方加生地五朝。肥紅光澤。熱勢減半。前方去蟬蛻。黃連加甘草八朝。放白成漿。稍思飲食。去紅花。紫草。猪尾膏。加連翹九朝。復壯熱大渴時。或咬牙。仍加黃連。重以生地石膏十二朝。諸症漸退。寢食漸安。方以忍冬解毒湯調治收功。約用猪尾血二碗餘。

氣得其暢。包血成圓而鬆透。並得其和。附氣成暉而紅活。
人此自平陷歪邪。乾紅滯色甚。則其黑硬矣。以見梟毒縱
橫。氣血瘀滯。可知散見且凶。況報痘乎。希冀挽回。豈徒事
升發之謂歟。

附一治驗

閔全木兄一公郎報痘于脊。黑陷歪斜。按之板硬。餘痘
隱躍于皮肉間。點粒甚細。色滯乾紅。躁亂不寐。體不甚
熱。速將母痘挑破。以胭脂膏貼之。用必勝湯減生地。服
四劑後。報痘圈卽鬆白。盤即紅潤。中心尚黑。餘痘透發
成顆。未能光壯。照方用生地減桃仁乾葛加姜黃。每劑

和大桑蠶一枚五六枚起綻如珠主痘成漿如爛頭瘡
神情未快飲食未進尤朝漿足飽滿寢食得半十二朝
收結俱得霍然方用解毒養榮調理收功

申明紫背浮萍

痘之色血之色也血和紅而能潤血熱其紅若絳矣熱劇
則紫紫黯則血瘀矣至如紫背浮萍較之紫黯不更甚乎。
緣爲血被火炙熗失其榮致色乃爾更受逼迫血失其位。
致見此痘古人棄之不問若在初見其血瘀而未死及時
破潰瘀毒得活其痘漸淡漸退儘有可活者僅以活血之
劑而希治之必至槁木而已。

附一治驗

閔明生兄四歲一愛痘頗稀疎。顆粒細結。俗呼爲石痘者是也。兩頰界地不清。周身乾紅晦滯。至胸腹間徧滿此痘。眉愁腹痛。寢食不安。身不甚熱。以必勝湯撤。生地加紫草。每劑和猪尾膏半盞。日服二劑。至五朝痘色漸淡。兩頰漸清。前方減葛根蟬蛻。用生地當歸。九朝其痘悉退。漿甚充滿。腹痛頓止。照方減桃仁。紅花。并猪尾膏。次日收結甚速。身體反熱。十一朝根盤復泛。兩頰痘內累疊重出二痘。但神情爽朗。不爲槁杌。仍用大黃蟬蛻。赤芍。金銀花。荆芥。當歸。牛蒡。地丁。山楂。服至十五朝。半

卷三
榮半麌糊摸收結嗣以忍冬解毒湯全愈。

申明。蚕癩。

蚕癩者。有點不灰顆。有粒無盤暈。似乎蚕疤。名爲蚕癩。點子雖同。但蚕疤鬆而散。此則數而結。其色紫。其點細。較若紫背浮萍。其勢畧緩。亦以血爲毒癩。外見此癩。內瘻不破。必然內潰。是亦不治之症也。

附一治驗。

庚辰臧比王兄。三歲一女郎。一晚徹夜躁亂。兩眼矇矓。次日發出一身蚕癩。按其體膚頭溫足冷。神情昏憊。是毒伏藏于內。血受其殃。凝結成癩。外呈此象。幸在發始。

庶可破滌。此瘀一活。不惟毒透。并火亦鬆。以必勝湯。生地換歸尾。用大黃五錢。桃仁三錢。服過六劑。痘不見退。痘不見起。更佐猪尾膏。蓋許。并大桑蟲。和入劑內。以助之。服過十一二劑。痘漸淡漸退。而痘方見點。三朝卽齊痘。可數紀。蚤痘悉退。無餘。神情終不開爽。乳食點滴不進。前方減葛根。蟬蛻服至八朝。痘將收結。景況依然。大便日去十數次。如藥水。終是藥力未克。守前方服。及十二朝。痘瘡悉褪。胃口只是不開。若謂胃氣受傷。何以痘能透發。以至落瘡。若謂瘡落無恙。豈有絕殼得生者乎。熟思其故。是病本惡餘邪。自未能淨。力主前方。直至十

六朝胃氣頓開。神情始快。大便卽止。以三歲小孩。大黃約用觔許。而得收功。以見有病。病受如此。

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀。得勻朗散布。雖多何害。若連串貫珠。有形相似而雜乎其間者。若堆聚攢簇。有象可名。而間乎其內者。有一于此。空地雖多。亦何取焉。須知。臭毒深藏。氣血銅閉。毒無領載。痘不得透。故多隙地。內却受其殃。其貫珠攢簇者。臭毒衝突。氣血不能駕馭。一任毒之縱橫凝結成條者。外見連串貫珠。團結成塊者。外見堆聚攢簇。誠中形外信不誣也。是毒頑而不鬆。伏而不透。猶賊之巨魁也。此毒不

治諸痘皆爲抗拒。治不以攻。治之何益。巨魁授首。前途不
戰。有倒戈之勢。然世於貫珠者。習矣。不察而多忽于攢簇。
者歸咎于命。而棄絕焉。興言及此。亦慘甚矣。庶狀其圖象。
或得觸目經心。詳其治法。或得挽回萬一。未必無小補云。

遊蚕

是痘貫珠成條。其形如蚕。故

燕窩

是痘攢簇纍纍。象似燕窩。而

名遊蚕。有稀密。有長短。身上

者。不治急攻之。務令鬆攢如

所見無多者。重身。上短而稀。

者。不治急攻之。務令鬆攢如

多者。重重則必攻。令鬆透如

化毒丹。用綿紙攤貼。更佐以

一赤豆莢其毒方起

猪尾膏大桑蟲

蠭錢 是痘圓圓攢簇絕不成點錢

許之大故名之也。僅見二三。

老毒多見者重重則必攻刃

以藥胭脂膏封貼更和猪尾

膏大桑蟲子劑內透之令毒

如蒸餅其毒方透

鼠跡

是痘或四五粒或六七點相

簇如鼠跡故以是名無多者

輕見于周身者重重則必攻

令相併成泡其毒方鬆劑內

調入化毒丹并猪尾膏

雁行

雁行者狀似遊蚕但曲而甚

長以其排行而若雁字也單

見者刃重不一者更重矣攻

之鬆若遊蚕而毒化矣

瓢沙

瓢沙者其痘扁潤歪斜無頂

無盤有細點如沙攢簇子囊

宛似瓢沙而名之也可以數

紀者輕偏及者重重則必攻

務令高擡如葵實殼其毒終

化而成漿

珠殼

珠殼者。其痘有頂而平。四圍烏跡。

鳥跡者。連串三條頭簇腳開。

其痘若鳥之跡也。單見者輕。

貼附一細圈。宛如珠殼。無多。

者輕。及于周身者重。重者必。

攻。務令圓滿綻突。其毒乃透。

五六處者重重者必攻。亦如。

遊蚕鬆透爲準。

蟹爪

蟹爪者。貫珠連串粒細一粒。

尖稍有隱黑絲如髮竟與

蟹爪無異。無幾者輕。繁多者

重。重者必攻。其形統脹成條。

而毒盡洩矣。

蛇皮

叢簇成片。散漫無拘。形似蛇

皮而名之也。見此不治或見

點之初燈下照之隱隱簇簇。

細密姦倫。將形未形之際。即

便攻之。佐以猪尾膏破之不

使其成瘍可有爲。

履底

履底者形似蛇皮不若蛇皮散漫耳隨處皆凶其形得小

更得早圖庶可有爲速以猪尾膏和入攻毒劑內并大桑蟲透之急以藥胭脂膏封貼

令得膿水淋漓方能慶生

螺疔

每頭大根尖頂黑形若螺肉深入于肉裡有大小有深淺按其四圍板硬治法見子

餘毒若放點時而卽見者最惡先以挑鬆卽將應服之藥

大人含于口中。吮其數次隨用

蟻窩

蟻窩者較疊錢而更大也另

別其名者其形大其毒亦更重也卽屈指無多毒已不淺

攻之自不容已佐以大桑蟲

猪尾膏外亦以藥胭脂貼之

得鬆泛平檯方可成膿

紫背

瘡之形似萍其色似萍之背紫而帶黯有大有小目之有

點手按無形無幾便重繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡而退去方可回生必

須早圖

環珠

是痘連串環遶故以是名有

臂因鐲阻痘卽如鐲而遠者

有項以圈繫痘卽如圈而聚

者于臂稍輕于項則重因阻

猶重無因更重不特項臂爲

然頭身亦有之凡見宜攻

遊蚕治驗

吾宗連漪四歲一愛身熱如火神情昏憤兩頰通紅鼻
衄成流身上隱隱數黑色滯乾紅以必勝湯減紅花地
龍加佐參二劑後紅中泛點細碎如麻周身稠密如鏽
而多遊蚕珠殼亦間乎其間前方服至三朝兩頰界地

未清却成顆粒滯色畧轉每劑和大桑蟲一枚六朝滯
變爲紅色猶如絳唇口腫裂前方減蟬蛻葛根加黃連
石膏七朝放白珠殼泛項九朝遊蚕統脹成條時或咬
牙腹痛熱猶火熾十二朝頭收斂而瘡燥身漿滿而
盤暈猶赤神情尙困而未舒以一方貫及十六朝發臭
異常二十朝諸症頓愈寢食得安而收全功後左眼赤
痛多淚以搽雲散治之得痊

嬉窩治驗

張又卓兄一小公郎方一歲一日壯熱如焰徧體如霞
痘不甚密色滯而平有嬉窩見于手背神情愁楚不時

呴哭是腹痛使然。以消癰快毒湯加大黃臨服和桑蠶一枚。日服一劑。手背以胭脂封貼。六朝震色清愁。眉散手背鬆浮泛白。七朝氣尊血附。俱放白成漿。熱勢減半去大黃蟬蛇黃連。加連翹佐參。日服一劑。十二朝回好。

疊錢治驗

一錢瓦子四歲痘在五朝。答裂掀腫。體熱如火。頭面稠無隙地。身上疎朗板實。攀紅四肢胸脇。疊錢者不一而足。躁亂不寧。以涼血攻毒飲。加山楂地丁。減犀角。和大桑蠶一枚。日服二大劑。更以金汁日服盞餘。外用胭脂膏封貼。至八朝。鬆泛如蒸餅。十朝通身漿足。十二朝發

臭收結十四朝身熱始和寢食俱安方易忍冬解毒湯
收功

珠蔻治驗

韓尺龍兄一公郎六歲乙未仲夏一日忽體熱如爐頭
面通紅神情昏曠見痘稠無餘地僅不細碎盤若塗珠
內有珠蔻幾半以涼血攻毒飲倍生地大黃去紅花紫
草加孩參地下四朝加黃連每劑和大桑蟲一枚五朝
神情清爽七朝珠蔻皆透減蟬蛻葛根桑蟲九朝漿足
十朝紅暈漸淡飲食漸進頭面收結十二朝壯熱方和
遂去大黃減生地及半十六朝回足如此血熱不致帶

火瘡癰爬肌拆肉大黃生地荆芥之力不淺也後以忍
冬解毒湯調治落痂未久腠理未固餘毒亦未能盡淨
見風太早忽爾脊暈急以疏風消毒飲而愈

鼠跡蘿沙治驗

吾宗謂如一子一日身熱如火汗出如油神情困苦難
支似痘非痘數點隱隱于頭面色滯乾紅痘本是而若
非且熱如火汗如油非惡痘不爾以清熱透肌湯未用
生地加大黃二劑後次日頭面細碎如麻身上見點處
若集隱伏處若無此氣爲毒滯而通塞不均也又二劑
頭面顆粒分明色亦覺潤汗即頓收偏體湧出內間鼠

跡。糞沙難以數紀。囊窠不懸。色近于白。此血爲毒鬱而未著。非血虛白也。不則有一體兩局者乎。前劑每服和大桑蠶一枚。五朝棄脚漸鬆。囊頂未起。色轉深紅。神情得定。熱不稍減。前方重以生地。加黃連石膏至九朝。頂綻。食稀粥碗許。十一朝鼠跡與糞沙俱得統服如泡。而漿仍濃。十四朝盤量始淡。頑面收結。十六朝身得溫和。胃氣日強。方易忍冬解毒。調治至二十朝。收功弗藥。

鴈行治驗

有一段氏子三歲見痘三朝。兩顴細如蚕種。背多鴈行。更有糞沙。間乎其間。赤紅其色。呻吟不已。熾熱如焚。以

清涼攻毒飲。和桑蟲一枚。日服二劑。四朝顴卽成翳。
朝色卽紅活。八朝怪象俱統。張放白。十朝漿足。猶然愁
楚。不能進食。一方服及十四朝。眉宇方舒。得進飲食。身
體溫和。一朝霍然。收屬落迦而愈。

蛇皮治驗

一女年及十四歲。倏爾身熱如火。神卽昏憤。兩眼如畏
刀鋸。徧體如霞。痘未及見。死期若將至矣。卽以大黃石
膏一兩生地七錢。佐以荆芥赤芍青皮葛根木通牛蒡
甘草三頭。次日午後見痘。細似泥沙。色似礬珠。通身
無一隙地。前方又服四劑。卽成點粒。却稠密如鋪。方叫

腹痛。畧知人事。大渴不已。揭衣棄被。前方加黃連犀角。生地兩半。并大桑蟲服至九朝。始得紅潤。周身起脹。十一朝。貫漿連成一片。如松皮。不能轉測。大便日去四五次。水米不沾。十四朝。發臭滿室。頭將收結。唇黑如煤。身若寒戰。熱仍如火。一方貫至十六朝。頓恩飲食。夜卧得半。熱渴稍減。二十朝外。痂成一片。如蛻一般。得脫此難。方易忍冬解毒湯。月餘全愈。約用大黃觔半。生地石膏二觔。餘是痘得治于未見之前。更得首尾一徹。庶得挽回。若令見點。其勢便成牢不可破矣。

蟹爪治驗

中介閔老先生三公郎方半週痘出稠密如鋪色滯乾紅窠粒平板內多蟹爪身體壯熱脉惕筋抽時在二朝以鬆肌透毒散加大黃七分和入桑蠶錢許一枚日服二頭壯次日粒數即磊落四朝紅潤八朝鬆泛九朝行漿遂減大黃十朝安睡乳食如故大便如常收回而愈

燕窩治驗

徐明涵一孫身熱如火燥炙如燭兩頰通紅頭面胸腹肩背四體痘密無容針之地頂陷囊實乾紅紫滯叢簇象燕窩者在于大股大便日去三四次始事者以斷無生理而勇退矣余取其囊厚色考雖密成願可冀者此

耳以大劑必勝湯用大黃五錢生地兩許加石膏兩錢
每服和一大桑蠶口進二劑服及六朝頭面起脹眼封
鼻塞八朝胸背鬆透色轉紅活頭面成漿十朝燕窩統
脹如蒸餅身漿亦足第熟猶火熾愁楚未舒自滯至脛
猶紫滯不鬆至十四朝腐爛作臭漿及足脰邪毒盡發
于外腹食頓復方易忍至解毒湯成痂落膿至十八朝
取功弗藥用大黃一觔生地石膏二十餘兩痘後大便
但嫌燥結

烏跡治驗

吳大雍兄二公子郎八歲患痘，頗朗有烏跡其形于

肩背。兼多珠殼。囊窩通身。平實乾紅色。滯烈熱如炮愁。
容可掬。云胸膈煩悶難堪。以涼血攻毒飲重。以大黃加
石膏。地丁山查四劑後。胸膈漸寬。滯色漸活。第紅艷若
絳。前方加黃連并大桑蠅。每服和入一枚。又六劑頭面
通身起脹。鼻塞眼封。惟鳥跡與珠殼未鬆。毒根猶未透
也。更倍以大黃地丁加山甲。至八朝珠殼者圓綻如珠。
鳥跡者統脹成條。九朝膿漿充滿。飲食大進。大便不過
三四次。終是燔熱不減。紅暈熾赤。前方減山甲蟬蛻紅
花。倍以石膏生地。服及十朝。熱漸減。赤暈漸淡。頭漿斂
而身漿偏減。石膏大黃十二朝收瘡過半。險變順矣。是

林下子言
卷三
晚徹夜不寐氣粗頓悶腹脹如鼓變出意外若以爲伏
毒未盡而囊無不綻漿無不滿若以爲餘毒歸內而血
收已盡。瘀厚而肥決之于脈氣口洪滑有力知其飲食
停滯究之果然以寬中透毒湯減陳皮加萊菔子大腹
皮外用山楂二兩麥芽一兩煎湯代水服二頭汗腹即
轉動隨解而寬嗣以忍冬解毒湯調治收功

頭面遊卒治驗

同袍鍾徵老九歲一公郎見痘一朝體不甚熱囊窠不
鬆不實痘色不潤不乾痘頗疎朗似乎險中之順及神
情則愁楚異常云胸膈鬱悶目睛昏定身無安放此伏

火伏毒之兇象也。以必勝湯去桃仁生地連投二劑。次日額上發起寸許血絲兩條。一橫一直。如反手丁字。此非尋常血絲路也。貫珠而未能透耳。更以猪尾膏每服和入盞許。又二劑。至晚漸粗如線。繼而更粗如芥。仍以前方和大桑蟲。每服一個。五朝方透點子血條。密摺二十餘顆。遊蚕最惡者也。身體大熱。紅暉如硃。胸膈稍舒。原用生地減紅花葛根蟬蛻加黃連石膏。大便日去五六次。飲食未思。至九朝諸痘峻頂。放白成漿。其遊蚕亦統脹成漿。纔撤猪尾膏。寢食得半。熱勢未減。前方服及十二朝。胃氣大開。夜卧甚熟。體漸溫和。漸次收結。而且

嘻笑自若矣。前方減大黃石膏黃連加金銀花貝母次日忽然昏暈。神色俱變。按脈無影。變出意外。然以如是收局。自非隱毒攻心。尤非真元虛脫。須知遊蚕既見于頭面而第見血絲。越三日而後見點。此毒決而又深。故前局乃爾結局亦自宜有此變。餘毒驟湧。一時難以發洩。是胃悶之使然。猶傷寒胃汗之象也。仍以發始前方連授二大劑。發出如芥。如麻血疹一身。卽時開爽而安。又以消斑快毒湯二劑。嗣以秦凱和解飲調理全愈。喜主人明理。始末信從。不則未必不致虧于一簣也。

履底治驗

有馮其姓者江右一遊客也年踰不惑。一日壯熱煩渴
目紅腹痛冲冲欲嘔。疑以感寒烹茱萸湯一碗下咽俄
頃煩渴若甚吐出血水碗許內有血絲。邀余診視其太
陽有二三點是痘顆粒不鬆乾紅色滯。余曰兄痘矣此
翁愕然曰痘果未曾今在客館奈何。余以無恙慰之連
投消癥化毒湯用大黃三錢二劑後湧出一身細者半
粗者半紅艷如硃稠密如鋪熟更如炮倍以大黃又加
石膏并生地俱兩許臨服和猪尾膏半茶匙日投二劑
次日三朝痘卽疎朗細碎者不知從何去矣。色亦可觀。
煩渴減半而熱仍熾有履底者三寸長寸餘濶見于兩

小股。按之板實而痛。以胭脂封貼。前方配大桑蟲。每一
服一枚。六朝眼封鼻塞。八朝行舉。履底鬆擡。前方減蟬
蛻桑蟲。加牛膝。十二朝忽思粉食。以糯米水圓食之。其
神情爽朗。自上而下。次第收結。履底成釤。減大黃石膏。
加金銀花。貞母十四朝。兩小股腐爛作臭。廿餘朝全愈。
環珠治驗

一兒三歲。忽身熱如炮。膚紅若錦。煩躁啼號。次日痘卽
湧出。稠無隙地。兩頰如泥砂。乾紅滯色。臂上鐫痕痘如
繫珠。子密密環達。又有錢許大者。一在于肩。一在于
脾。窠粒板實。界地連環紫滯。以必勝湯減蟬蛻地龍加

黃連止服二劑。次日頭面周身卽疎朗成顆色俱明潤。
痘若改換。惟四處環珠形色如故。症亦未減。以一方服
及十二朝。痘得次第應手。症亦逐日平復。以忍冬解毒
湯調治收功。

其下圖像

指貫珠攢聚或見于頭面或見于周身部位者也。

兩截金覆



是痘盤聚于巔頂。如釜之覆。名曰覆釜。是毒參陽位之一症也。其餘疎朗明潤者。以鬆肌通聖散。和猪尾膏化毒丹治之外。用胭脂膏搽貼。更稠密火熱者。必加大黃。令膿水腐爛。其毒方化。是痘上與下。綿密如鋪。中段絕無一點。梟毒擁于上下。氣血阻于中宮。以致上下隔截。痘之最惡者也。首尾一以攻毒爲主。佐以猪尾膏地龍。令氣血疏達。要截處得散散透點。方可挽回。

蒙

頭

腰
纏



是痘。遼頭貫項。有似兜帽。故名。蒙頭。毒衆陽位之首惡也。餘更稠密。火熱者不治。治則必攻。與覆盆同法。必早圖可挽。有獨聚于天庭者。亦是蒙頭。餘若疎朗明潤。體不熾熱者。不必用大黃。腰者。腎之候也。連串環繞于此。緣毒伏于腎。而有此象。貫珠之最惡者也。餘卽疎朗。不得視以爲美。治必以攻。得此疎擡。統成一團。如豇豆。未方不爲害。不則痘。縱可觀。九朝忽破而變黑。變焦。

托腮鎖口



領下亦腎經所屬。痘瘡發成一片。是爲托腮。清氣爲其所阻。頭面必不能起身。更可知痰湧氣喘。可立而待。從來不治。若見點之初。毒勢未成。以治蒙頭之法治之。亦可救援一二。速宜封貼雙鎖口者。兩口角左右一粒。較旁痘獨大。板實而無盤者是也。此毒擁于肺。而有此象。口乃肺之竅。飲食接送之門。可令毒藏此地乎。治法輕重。與覆釜一轍。有連串遠于上下脣畔。亦是。

鎖項攢背



項係水穀之路。呼吸出入之門。
痘瘡連串環繞于此。是毒鎖咽喉與托腮無異。咽啞水滯。皆由此致。俱屬不救。但得放點之初。即以清金攻毒飲。并猪尾膏。杜患于將萌。容有可起。

毒發于背。便關生死。況痘攢簇隨地皆凶。而可令此地犯及乎。攢而得鬆者。以鬆肌透毒散合化毒丹。猪尾膏治之外。以胭脂膏貼攢。而更板壯熱如火者必攻。須得腐爛方可慶生。

囊

腹

擗

胸



腹近五內猶之同室與他處不同一有變症毒卽入裏捷予反掌但此地空隙而未得爲吉者矣未有此聚如囊而得無恙者也治法攢背同

胸與腹俱逼近臟腑攢胸猶之囊腹調劑之法亦與攢背同

咽關抱膝



咽關當喉攢簇而犯疊錢者也。若嬉窩則尤重矣。咽與項皆水穀之路。呼吸出入之門。其害與鎖項無異。鎖項之害。病在環繞咽關之害。病在攢簇。治法與鎖項同。更以胭脂膏貼。

兩膝攢簇如餅。毒聚于此。聚不能達足脰。而致虧于一籌。餘地無疵。更無內証。止以鬆肌透毒散加牛膝。合化毒丹治之。并用胭脂膏貼。更多惡象。內証者必攻。

蒙 骂



鎖 唇



唇者。脾之華。脾臟安和。痘不相及。更得溫潤。不則。攢聚于此。有黃熱如蠟。有嘴突如雷。有黑硬燥裂而血逆。皆毒攻于脾。象見于唇。如無他症。瀉黃散合猪尾膏治之。更壯熱如炮者必攻。

痘攢簇于耳後高骨。是謂蒙骯。亦醫經伏毒之一徵也。頭面餘處皆稀止。此犯忌。以鬆肌透毒散。加玄參。合化毒丹。猪尾膏治之外。用貼法。更稠密而炮熱者必攻。

披肩抱鬚



披肩者。如其肩而兜聚也。較之于背稍輕。然臟腑真氣所聚之處。卽鼠跡蘚沙。尚屬可畏。而況攢布成片乎。此毒不鬆。真氣銬閉。上下阻塞。治與攢背同法。

鬚接太陽。梟毒起伏。于此取驗。
痘症若重。鬚極稀疎。必此地掀
腫如蓮瓣。以及正面腫脹如毬。
毒根方透。不則此地不脹。卽通
身光壯。毒根猶伏。厥後終敗。可
令犯忌于此乎。治法與蒙鼈同。

鱗坐球囊



鱗坐者。其醫攢集如鱗也。穴屬環跳。部位又至陰之地。故發漿。不過環跳者不治。平而乾滯者。鬆肌通聖散。加牛膝。板而紫滯。且熾熱者。涼膈攻毒散。減豆根。亦加牛膝。俱合化毒丹。并貼法。痘得陰陽和暢。雖密無咎。陽癧乃下焦陰陽交會之所。故陰上先敗者吉。取其下焦和暢也。于此若囊毒壅交會可知。上下相因。下壅則上閉。治以散結湯。化毒丹。熾熱者加大黃石膏。

覆釜治驗

歐餘方老先生三歲一公郎痘頗疎朗。却色滯乾紅。有平有陷。顆粒不鬆。至顳頂盤集。覆釜其形。是毒參陽位之一症也。以鬆肌透毒散和大桑蟲。雖見起發。不能光壯。早欲用猪尾膏化毒丹鬆之。因與一不韻者同事。阻及七日。期滯而更燥。陷而漸板。愁容可掬。不容復緩。前方減羌防。加荆芥。當歸。臨服和猪尾膏。并化毒丹。連投二服。外用胭脂膏搽貼。身節壯熟。頭面扳腫。通身光壯。却徹夜無眠。以毒火潛伏。日久藥與。塵戰。以故不寧。藥得其勝。氣血暢達。故得煥發。不韻者。不諳是理。第見擾。

亂歸咎于生猪血而致變。料不能起。勇退而去。舉家悲泣。孰知猪尾膏最能透伏毒之深藏。毒血內瘀。非此不活。更有化毒丹。潛消默奪而共濟之。毒根自不容藏。次日卽安睡。九朝漿行。壯熱如燔。前方減白芷。蟬蛻蜂房。加黃連。生地。十一二朝漸漸收癰。猪尾膏遂撤。巔頂燥痒之極。仍不能寐。以荆芥穗。金銀花。茵陳。大黃。地丁。甘草煎湯止浴其頂。拭乾復以胭脂膏貼而痒卽止。仍復貫漿堆結甚厚。餘熱未和。痘癰亦燥。前方倍加生地。臨服調牛黃半分。珠末一分。日進二服。至十五朝日漸回和。口內生瘡。以忍冬解毒湯外用消瘡散。又數日全愈。

蒙頭治驗

孝廉王乃老一公郎未及三歲體薄而兼病後及見痘蒙頭鎖項攢胸攢背兩顴細碎滿脹班點皆紫背浮萍痘色晦滯宛似蒙垢痘犯不治不一而足所希冀萬一者惟在初見毒未有定位耳以必勝湯臨服和猪尾膏盞許外復以牛黃半分珠末一分總勻在內日服二劑次日色即有紅意兩顴便成顆粒四朝胸背覺磊落鬆綻惟頭與項布而不清却亦鬆泛腹癰漸淡漸退六朝浮萍悉退前方減葛根桃仁八朝漸漸放白但寢食俱艱肩宇愁蹙九朝漿行未能克溢時或乾嘔身熱驟熾

聲音半啞。以毒火湧洩也。以涼膈攻毒飲。十朝頭面夾紙鬆擡。有膿漿滲漏。身漿俱足。十二朝收痂少潤。寢食僅半。眉宇未舒。十六朝燥痂復泛。口內生瘡。以消瘀解毒散。日吹三四次。二十朝外。方得全愈。是痘始以必勝。繼以涼膈。佐以猪尾膏。化毒丹。總以攻毒導瘀。而保元拓裏。腐談從不講及。痘得保全。而卒無虧于本體。見有病。病受如此。

兩截治驗

予一孫歲未滿週。仲冬一日。忽然發搐。口眼歪斜。周身肉瞶筋惕。兩眼彷徨。以清肝透毒散。加羌活。臨服調入

牛黃丸七分灌下逾時神醒身卽壯熱次日便見痘頭
面細密如麻上自肩至乳下自臍至足稠無隙地但得
成顆中段絕無一點此兩截痘也日夜叫喊不已急以
必勝湯減桃仁加當歸桂以猪尾膏日進二頭服四劑
後大便去毒垢甚多頭面便成顆粒身上漸得粗壯大
便日頻晝夜約去三十餘次繼之清水若溺夜卽安睡
遂減大黃至晚仍復叫喊痘卽奄駢不得已而復用晚
又安睡次日漿勢沛然乳食大進食之以糯米細圓甚
喜十朝頭面堆結甚厚但欠肥潤神情大快第身熱未
和不免以大熱一退虛寒繼至爲虞大黃不敢復用停

及一日。燥痒難禁。滿面搔破。熱血成流。又喊不絕口。與食則拒。要其所以然者。以痘犯兩叢。壅塞固閉之毒餘氛未殄。害仍竊發。不得以輕鬆者概論也。方主前方。第減葛根。紅花。蟬蛻。加石膏。伍參黃連。是方服過十六劑。始得全愈。胃口甚強。痘後精神頗旺。

攢背治驗

雉城臧以用兄。顧渚老先生之孫也。幼時出痘。犯攢背頭面稠密。如鋪肩背以上。紅深如絳。以下紫若胭脂。身體燔熱。神情昏憤。以必勝湯。用生地兩許。減紅花。加石膏黃連。自三朝服及七朝。大便日去四五次。通身色轉

紅潤。背得鬆浮。減葛根。至十朝頭面漿足。背得腐爛作
臭。餘亦成漿。唇黑如煤。熱猶火熾。一方服至十四朝全
愈。時有同事日以脾胃爲慮。余曲諭之。得不拒有成。

鱗坐治驗

一邪姓者。六歲一兒痘。及五朝全不起發。日夜躁亂。如
蚓在灰。舉家涕泣。以爲必斃。痘頗疎朗。按之不鬆。根窠
紫滯。頂陷而黑。至環跳處。贊聚如掌。犯鱗坐形。伏毒深
藏。抗拒諸痘。始事者。但知疏肌透發。而不諳其故。毋惑
乎。蜴達無由。日奄滯而至猖獗也。急以窮源透毒散。和
猪尾膏。連投二劑。更以大桑蠅酒漿調服。二枚外以胭

脂膏貼次日便覺鬆泛。又二劑。七朝痘節峻頂成癥。神即安爽。但環跳處鬆而未腫。服及十朝漿湧。連紙鬆擡如蒸餅。嗣以忍冬解毒湯。十二朝收結成功。

經腰治驗

一徐氏女。四歲痘期兩日。甚勻朗稀疎。却陷而不鬆紫。而乾潰。身熱如焰。兩腰貫珠。環達而犯此症。是毒伏于腎。貫珠之最惡者也。已期尚淺。餘痘尚疎。猶可挽回。恐此翁不明。是理辭之弗任。不期此翁止此一女。豫爲痘計。屬意已專。以子弗任。大慟哀憇。情甚悲切。以必勝湯加牛膝黃連石膏。稍用炒黑麻黃以行之。并和猪黑膏。

連投二頭汗。腰痛難忍。繼之于汗而欲解。解後而痛卽止。便云爽快。次日三朝。凡服藥後。景況亦復如此。至八朝而痛不作矣。然其所以然者。伏毒之症。犯幾朝敗者。日期未至。毒雖暴烈。猶未作難。以其尚伏也。故爾得安。時師不諳。而多忽殆。至發難時。毒已潰而無及矣。見于機先者攻之。而不容其伏毒。又盛而未肯遽降。藥毒塵戰。自不能寧。至于藥力戰勝。而貼然矣。何痛之有。嗣後放白成漿。腰間纏毒。繞脹如連殼豆。豆漿亦滿圍。但熾熱未和。飲食未半。前方減蟬蛻桃仁。葛根紅花麻黃。服及十二朝。口漸回和。收結全愈。

卷二
托腮治驗

吾宗叔澹五歲一愛烈熱如爐不及一日而痘卽見于地角領下細如針頭而色近白托腮之象未成托腮之穎已露正面周身所見俱不成粒色多攀紅徹夜躁亂將來攢簇惡象皆可有者痘鄰于逆所冀者惟在初見以必勝湯減桃仁加石膏倍參日服三大劑頭汁卽用胭脂膏封貼次日正面與身卽成顆粒却無隙地是方和大柔蟲每服一箇五朝神情得安七朝圓綻肥紅地角領下隔紙鬆綻亦得纍纍前方減蟬蠅乾暮十朝漿甚克滿惟壯熱未和盤暈嫩紅飲食不進大便目解五

六次皆毒垢。十一朝正面堆沙。漸次收結。以及周身。于三朝胃氣頓開。痘癰尚燥。紅暈未得全收。服至十六朝諸象回春。始終以一方成之。縱以忍冬解毒湯加生地二十朝全愈。弗藥。約用大黃三十餘兩。石膏二觔。

囊毬治驗

一李氏子三歲見痘兩朝色似胭脂。頂陷不髮。火熱如焰。煩渴不已。至陽毬攢簇宛若荔枝。痘內求瑜。惟磊落耳。以消斑快毒湯加大黃石膏桃仁地丁山荳。服及五朝得鬆。六朝紅活。猶然絳色。前方減桃仁。蟬蛻九朝漿足。紅暈未淡。熾熱復然。時生地已幾十餘兩。黃連三兩。

餘矣。至十二朝，熱得稍緩。紅暈畧淡，寢食亦以之而稍安。前方減石膏。十四朝，先收者疮赤而多浮皮，後結者焦痂而紅暈猶附體。膚燥熱如初。夫因餘毒之先導也。不越二日，神卽昏迷，從頭至足，手空地及疮內，重出一身似痘，非痘不成顆粒。脚地粗糙，色如塵垢，無一隙地。上則抱鼻，而更層繫以叉入中。下復囊括，以及小便紫腫，痛楚非常。仍不能寐。稀粥與之，則瞞；不與，則不思。而痘復始矣。較前局更惡。此名謂棲杌痘。棲杌乃惡獸，其性反覆，痘與相類，故以是名。此痘古來有之，第罕見耳。以窮源透毒散減山甲歸尾，加桔梗、牛蒡、生地黃、連金。

銀花青橘葉臨服調牛黃化毒丹錢許四劑後色漸紅
而猶滯囊漸壯而猶平服及五朝仍眼封鼻塞七日行
漿通身漸漸堆沙收結痂成一片十餘日而褪及過半
頭面黑硬堅牢反不能落其鼻聳抱如螺拂及則痛人
中亦燥裂逆血其小便龜頭于中段腫處頂出陽毬老
靨抓肉爬肌眉宇不舒餘熱不解前方重加生地兩錢
黃連二錢以金銀花湯煎藥服及月餘而熱始和瘡始
癒以熟猪油調入官粉決其頭面而得褪改形換相非
初褪時面目矣嗣後寢食俱安調理收功人中與陽毬
俱陰陽交會之地惡毒上下開鎖痘故如此若不開闢

于前亦烏覩其後局若此也

抱鬚治驗

嚴君安兄一小愛歲末滿週痘鄰于逆先見于兩鬢攢簇如麻繼而頭面通身徧及無餘色近于白而窠粒卒不鬆體不甚熱而神情卒躁亂似虛似實之間然虛者僞而實者真也兼于脉惕筋抽不時乾嘔兩目預腫而預合種種皆伏毒之象而况抱鬚其形伏毒已先昭于前乎一不韻者認爲氣虛痘反有隱意勢甚猖獗急以涼血攻毒飲以當歸易生地減赤芍加山楂地丁甘桔和桑蠅一枚日服二劑四朝頭面有鬆意根窠稍有紅

暉眼腫減半閉而復開生機在此七朝身體壯熟頭面
起脹頂白根紅眼封鼻塞有行漿之勢大便日去六七
次身尚復然餘症未減前方減蟬蛻葛根原用生地加
黃連服至十二朝身得鬆透寢食得半下部痘瘡板實
皮肉擁腫如火前藥加牛膝羌活更以牛黃化毒丹日
以五分佐之并大桑蟲至十八朝身漿始沛并及足胫
二十餘朝上褪下結前症日愈惟眉宇未舒眼開有暉
口內生疳頭角與小股起一大毒如拳以忍冬解毒湯
加羚羊角羌活赤芍地丁胡桃口內吹以消疳散至月
餘全愈約大黃四十餘劑桑蟲大小約有六十

申明惡色并治法

痘之色。血之見乎外也。血和則紅淡而潤。紅深如絳則血熱之篩。昭然熱若燭而不透。則火篩不發。而紅日乾乾而至于色類椒皮。榮失其榮。而血幾于死矣。是紅之最惡者也。熱劇則血瘀而色紫。紫而艷。雖瘀而猶可活。紫至于滯。則血被毒囚而內攻幾成矣。是紫之不堪者此也。黯滯青蓮可無擬治法矣。是紅是紫。皆熱毒肆虐在所必攻。然攻有不同。當分隱見。其隱與見之分。總以身之熱與不熱辨之。身熾熱者。熱毒燔灼。其血沸騰。攻宜與涼血清火並行。大忌辛燥。卽當歸在所宜禁。以血中之辛藥也。體不熟。

者。熱毒固閉。血如膠漆。攻宜與導瘀活血共濟。大忌寒涼。卽生地亦所宜禁。以血中之涼劑也。然辛燥尤不可擅總令血得其和。歸于紅潤。斯爲良法。

附紫滯治驗

張武老一繼愛三歲。一日熱如炮熾。次早卽見痘一齊湧出。稠無隙地。通身紫滯。神情躁亂。大渴不止。凡毒火燔灼于放標時者。是痘爲火裏苗。若不清其源。而但以疏肌透表爲發勢。必至焦黑而內潰矣。急以消癰快毒湯。加大黃石膏桃仁服。及大朝色轉紅活。顆粒亦鬆熾。熱未減。至八朝晨刻。放白。乍刺而漿卽肥濃。以見血熱。

之痘患火不清一清而轉移之象勃然矣寢食猶未能復外以牛黃一分珠末二分以佐前方至十二朝發臭熾熱頓和寢食俱安漸收漸結痂似松皮嗣後又發血癩瘡終不外涼血解毒之劑調治而愈

附絳紅治驗

顧玄仲兄韻翁老先生之公郎也六歲時出痘頗匀朗粗綻却紅艷如絳燥炙如火腹內時痛神情頻躁徹夜不寐此火炮于外而內又毒伏也以清涼攻毒飲減紅花加赤芍服至五朝痛止肌潤得睡前方加甘草至七朝絳色漸淡頂白而肥八朝漿即肥濃大便日解五六

次熱亦減半。飲食漸想。前方去大黃石膏犀角加連翹
佐參十朝頭面先收。瘑燥而白。根底猶附線紅。至晚身
復壯熱。睡不甚安。是後來餘毒之漸也。復用石膏倍加
生地外以牛黃一分。珠末倍之。和于劑內。日進二服。至
十六朝俱得平復。後用忍冬解毒湯調治。收功。

附碧紅治驗

雉城臧玉老。八歲一孫。身熱如炙。口渴煩躁。痘甚稠密。
而色礬紅。三日期矣。始事者第以升發爲透。乾而幾點。
躁亂愈甚。身無安放。以必勝湯用大黃三錢加石膏黃
連。日服二大劑。五朝頭面紅潤。身尚未轉。七朝面部放

自行漿通身乾而得潤神情半爽八朝成漿而迅速黃熟矣漿近板黃凡血熱之痘烈火一透漿無漸次惟嫌太驟漿無不滿惟慮板黃板黃者火褐倒巒之象也倍大黃五錢石膏生地兩餘三劑後漿色潤澤大便日去五六次飲食稍思熾熱未減其外祖王氏至見此藥劑大以爲怪停及一日是晚躁亂如初次日炮熱更熾身戰如寒漿殆變而躁實矣悉如前方連投二劑振戰卽定再劑而漿色復潤紅暈亦漸收漸淡服及十四朝膚皰將熄寢食漸安遂弗藥聽其自回厥後通身泛庖環跳處起兩癰如拳痛楚非常以忍冬解毒湯加羌活赤

芍服及十餘劑而愈

附椒皮治驗

小蒲黃元澄兄一公郎今之長公也。稟賦甚薄時方二歲。出痘于癸酉春。體不見熱。徹夜擾亂。叫不絕聲。口膩如脂。痘無容針之地。晦色者如蒙垢。乾紅者似椒皮。顆粒不鬆。此毒伏于內體故不熱。叫喊擾亂以氣血受錮神故不著。晦色椒紅。表裏雙關。痘鄰于逆者也。法當攻其伏。不使毒橫于內。制其毒使氣血發煌于外。庶得挽回于萬一。若以稟薄爲慮。縱毒肆虐。是不知務者矣。以鬆肌通聖散加大黃減羨。活白芷以其燥也。臨服和猪

尾膏半盞。服及三朝。如水交石。大便日去六七次。眼卽
瞼閉。唇口腫硬。亦毒參陽位之一症也。前方佐以大桑
蟲。每劑一枚。服及六朝。身體頓熱。唇黑如煤。痘色變紅
而却燥。仍以前方加生地黃。連減蜂房赤芍。至八朝。滯
色悉退。放白而不能肥。煩叫依然。面腫若有退意。是伏
毒未能淨盡。而氣血一時不能克達故也。權宜之際。減
大黃青皮用參七分。芪一錢。而暫克之。和入大桑蟲一
枚。二劑後痘卽肥泛。面卽光榮。眼縫推脂。熱却如火。凡
熱毒之症。乍虛乍乏。與虛寒之症不同。一喚卽醒。醒當
卽止。今熱如火。雄烈仍在。以消癥化毒湯減蜂房赤芍。

日投二劑外以牛黃一分珠末二分以佐之服及十朝
漿滿十二朝黑嘴鬆褪神情始安乳食大進痘痂終燥
身熱未和服及十六朝發臭臂與膝生兩毒減生地加
當歸金銀花貝母甘朝外俱得平復收功

附紫艷治驗

有一朱姓之子三歲痘在五朝熱如火熨痘色紫艷若
花內雞冠唇裂逆血亦紫躁亂如蝴蝶在灰厥父母涕泣
以爲必無幸矣然猶可冀者面目掀腫雖紫能肥速以
必勝湯重以大黃五錢生地兩許加石膏亦如其數減
紅花蟬蛻服及七朝紫變爲紅繼卽放白成漿次日便

老更喜烈熱漸解前方去葛根桃仁紅花加玄參重劑減半又四劑回好

申明四毒項

痘貴綻而紅活平平若焰炮者其頂若熒而平其色若熟而腐白也痘貴氣尊而血陷下陷根腫者頂若茱萸而脚不鬆也一平一陷均氣爲毒滯一旁上壅而不得榮于囊殼一毒下鬱而不得透于頂尖治法皆所當攻其熾熱者重攻而寒之熱不甚者輕瀉而鬆透之如煤頭火燒者其色焦黑似乎火憤者然囊頂尖圓者本是妙境而色焦紫形亦何足取也斯二者均血被火灼血劇則變也大都不

治得無他症而顆粒磊落者容或可治熾熱者攻而寒之更導其瘀熱不甚者攻而導之兼達其閉

附項平腐色治驗

洞抱陳宗老止宜老先生長公也出痘于幼時。顆粒亦朗其項平平若爲火熨者然其色白如宿腐盤暈厥亦心煩壯熱以滌邪救苦湯去澤瀉加地丁生地丹皮日服二劑大便日解二三次次日三朝佐以大桑蠶每日二枚前方服及六朝項漸起而根漸活宗老岳翁舉其族中一同道至以項平而自認爲氣虛拘古法而傍日期直用保元湯陳老先生明理信任弗貳前方服及十

朝減滑石紅花桑蠅服至十二朝亦得次第奏効十四朝收痂燥硬身熱未和根底尚階線紅此熱毒未盡將來餘毒之象也倍用生地兩錢外加石膏亦如其數并金銀花玄參貝母十六朝餘毒聚于頸項腫痛非常強直不能俛仰周身泛癰寢食俱廢又加地龍五條一方服及廿四朝始得脫然全愈

附項如燎治驗

王偉之兄紹賓老先生之孫也。一公郎三歲痘密如鋪郭殼紫紅其頂黑如煤儼若火淬者大都居半身無安放體不甚熱以毒伏于內也以必勝湯每服和猪脂膏。

半盞服及三朝更和大桑蟲以佐之七朝頂與鄂殼俱
轉紅活滅桃仁乾葛蟬蛻加當歸八朝身體壯熱有放
白成漿之熟飲食大進神情開爽見景象進長恃爲無
恐而藥即懈弛次日仍復躁亂燥痒難禁兩額搔破痘
色變而紫滯晦之無及速以臙脂膏貼其破傷之處前
方加黃連重以大桑蟲一枚和于劑內連投二服諸症
減半兩頰膿水滲溢痘色復轉繼而成漿結痂神情寢
食俱安以一方貫之十六朝而得收功

附頂陷根腫治驗

有一陳氏子五歲見痘于隆冬頂陷且深時雖嚴寒却

煩渴躁亂。唇裂逆血。項雖深陷。囊實根腫。而色乾赤。此氣血爲熱毒壅遏。不得申其領載之權。以故陷而不起。非寒凝不透。尤非氣虛不峻也。一始事者。不諳其理。徒以升發爲事。累日不起。至六朝。驟然作痒。手舞足蹈。竭定痒之法。而莫禁。痘色更晦。頻頻乾嘔。此翁計無所施。謝絕去矣。據曠未成而痒沸。症固危篤。猶幸兩顴擦而未破。更憐其未得對病之劑。而竟棄之。覺爲不忍。先以胭脂膏貼其兩顴。以必勝湯減桃仁地龍加黃連錢許。蜜炒麻黃二分。臨服和大桑蟲一枚。日服三頭汁。大便去三四次。俱如膠漆。伏毒一鬆。頭面卽脹。而痒遂定。上

身亦起。又二劑色轉紅活而渴愈甚。體熱更熾。是毒火
發見之象也。下身猶然板滯。減麻黃加石膏。歸好橘。非
此不藥。每服必五六紀。至十朝。頭面漿足。下部亦鬆減。
葛根。十二朝。頭漿斂而身漿徧。飲食得進。神情未開。前
方減蟬蛻桑蟲。十六朝。諸症脫然。痂落過半。始易忍冬
解毒湯。調治未及兩日。身復炮熱。眉宇復愁。肩發一毒。
周身泛瘡。復加黃連赤芍。外又以牛黃化毒丹。日服錢
許。至廿四朝全愈。

附項與色不侔治驗

朱石公兄五歲。一孫痘初見點火。熱如爐悶。亂喘急昏。

暈如迷。遺尿目閉。正面一片磬紅。隱隱細如針刺者。目之有點。按之無粒。身土數點。而色焦紫。勢甚危篤。所異惟在初見。以清涼攻毒飲重。以大黃滅犀角。丸地下。桃仁。蟬蛻二劑後。額卽透發成粒。通身俱透點或顆而且圓綻。惟色紫滯。神情半開。又二劑。額卽光澤。身猶未轉。外佐以大桑蟲四朝。紫漸變紅而未潤。服及七朝。頭面成漿。周身放白。胃氣未開。前方減桃仁。紅花。蟬蛻九朝思食。而壯熱未減。盤暈燉紅重。以生地兩許。防其成火褐也。服及十二朝。諸症貼然。漸收漸褪。後易忍。冬解毒湯而愈。

申明痘佳症惡

痘之吉凶世多還以痘準。如窠粒圓綻盤量肥紅更兼疎朗人人目之爲順何虞其有覆敗之患哉不知痘象雖佳症或凶暴若以痘美而致忽焉繼必痘隨症變秀而不實矣然症與痘俱由內而發何以痘既若此症又若彼耶蓋痘出于險者毒恒有隱見不同發見處則氣血暢達領載其毒痘故得以光壯隱伏處則氣血鋗閉毒無駕馭橫症所以旁出卽以痘觀之稀疎處可以數紀稠密處無以容針衝突處至于重頂陷伏處過期不透卽以症言之體熱如烙者肢冷如水傾鴟如注者喉爾閉塞毋惑乎痘無可

虞而有可畏之症矣。痘不必多，美難勝惡。犯一痘忌大局隨之順不嘉多逆嫌一點此之謂也。

附一治驗

陳錫甫兄七歲一公郎痘見三朝。匀朗粗綻色甚肥紅而少淡痘象佳身却熾熱愁容可掬。徹夜不寐。云胸膈悶而不快。假令傷食而然。痘其不能煥發矣。今紅而且深。緣毒火湧盛氣血須載有及與不及所不及者毒在於內而故有此症。以滌邪救苦湯減紅花澤瀉加地丁。四劑後大便去三四次。胸膈便爽。睡卧亦安。熱亦減半。因痘可覩。攻不敢過。前方減大黃三劑。至七朝前態

復然痘覺停滯。求其故而未得。忽喉間冲冲欲吐。俄頃略出濃痰于乃尊之手。痰熱如沸。以見攻之未可已也。前方倍以大黃二劑。通身放白成漿。諸邪復退。惟熱未和。一方服及十二朝全愈。是痘因形色而忽其症。至變紫變黑而斃者。不可勝紀矣。

申明痘白雄標

痘若稀疎。其毒似輕。淡白則痘似不足。至于標痘或紫或焦。或盤暈焮赤。中心黑陷。按之板實。是謂雄標。係一身痘瘡之主。主痘若此。則其稀者。諸痘爲梟。毒抗拒也。致伏于內。故若稀。非毒輕也。白者。血爲毒鬱。不得外著。故白。非不

足也急宜刺之。吮出其毒。用胭脂膏封貼。視其神情。內症輕者以活血透毒。重則必攻。令毒根一鬆。通身透發而白。變爲紅矣。

附一治驗

凌長康兄一孫。二歲。身不見熱。驀然左顧。一報痘。脚地扁濶。色赤而乾。中心黑陷。按之板實。身有三四點。似痘非痘。俱淡白色。已三日矣。寢食如常。神情如故。所以然者。以痘之所中。有淺深淺者。其毒鬱其出易。形圓而色潤。深則反是矣。機雖萌動。全體尚伏于包孕之地。而未發。故若未痘者然。及所報之點。却如此形色。若不杜患。

于將來任其自至。有越六七日或八九日。有十數日外。湧出如麻。非紫黯。卽椒紅。而不可救藥矣。有所謂等伴痘者。卽此是也。令將銀針挑破。胭脂膏貼之。以必勝湯減桃仁生地服。及五劑。日以大桑蟲一枚。而身始熱。大便連去三次。通身透發。痘得疎朗。奪其勢于未成也。窠囊尙不鬆瀉。又四劑圓綻光澤。標痘根擡頂腐。神情愁楚。以全驅毒湧。未得成熟也。前方減葛根。蟬蛻服。及十

二朝收功

申明飛舉

痘期十四日。自放點。以至落痂。猶十二卦之陰陽消長也。

當初出一點紅。血初定位。純陰坤卦之象。陰極陽生。漸而復復而臨。臨而泰。三陽透于頂尖之上。陽交于陰。氣會乎血。痘故紅而變白。五朝大壯。六朝夬。七朝乾。六陽呈象。血受氣化。而至純陽。痘故白變爲黃。所謂七漿八足。足則爲膿。成膿而色自黃。是痘之應至而至。陰陽自然之理也。若未及三朝。諸痘未能放白。數點驟然黃熟。緣爲烈毒所衝。故爾漿成迅速。是謂飛漿。止一二點。熟不甚熾者。以針挑之。用胭脂膏封貼。但與涼血清解。自放白成漿矣。如其迭見不已。熱如炮烙者。必攻。僅與清火涼血。終必焦紫。不能救援者也。

附一治驗

洪崖王老先生。一孫三歲。漢章兄之公郎也。痘紅如絳。熱熾如火。徹夜不寐。急以涼膈攻毒飲。用生地三錢。大黃錢許。日投二劑。三朝大解。僅二次。劑輕不能駕馭。頭面起二點飛漿。老黃如蠟。紅艷漸滯。前方用大黃三錢。生地七錢。石膏兩許。連投二劑。挑破飛漿點。以胭脂膏。是晚得卧。熱亦稍和。重劑減十分之三。五朝又起飛漿。十數點。景色復然。仍以重劑。服至七朝。放白。八朝成粧。寢食俱安。惟熱未減。十朝漿老。頭面有斂意。紅暈未淡。十二朝足小股起一癰。如桃。夜復不寐。以胭脂膏敷其。

四圍。剩出其頂。一方至十六。朝出膿。諸症平復。口生痘。疖。佐以消疳解毒散吹之。方易忍。冬解毒湯。調治全愈。

由明泡湧

痘瘡氣盛。則泡。氣盛者。毒氣盛也。毒氣雄猛。反成渴鬱。渴鬱之極。內有衝突。以物極則反也。渴鬱處。頂平頂陷。窠粒不癥。連肉亦有板實者。衝突處。毒鋒如射。藉其鋒者。囊隨毒起。泡之有自來矣。所起乃郛殼浮皮。不爲氣領。而囊故飄薄。不受血載。而根故無暈。氣血關鎖之極者。色白而囊空。氣得浮動者。內涵清水。血得浮動者。水若醃魚。血內瘀者。其色紫。血幾于死者。其色黑。宛若一孽桃之形。有粗有

細酷肖其色。有白有紫有黑。而有若醃魚水色也。總爲毒氣衝突之使然。症屬不治。但于放點之時。窠粒不鬆根無盤助者。知其泡所必至。卽以驅毒鬆肌杜于未萌。斯爲良法。有膿成之後。過期不斂。膿化爲水。數粒相併。而若泡者。以針挑破自乾。不爲泡論。

附一治驗

一施氏女十三歲痘患。血熱氣滯。窠粒不鬆。紅盤肆溢。徧體如霞。以貧窘不事醫藥。八朝湧泡幾三分之一。餘俱平板。九朝泡俱破傷。其浮皮有如麥殼破傷之色。乾亦有如膚剝火熱如炮。痛楚非常。衣衾難動。症在垂斃。

厥父母哀號悲切。余憐其坐視以貧而就死地。未免希
援于望外。以生地兩半。石膏一兩。大黃三錢。與衆藥同
煎三錢。臨起投下。餘佐以荆芥穗。地丁。赤芍。山楂。青皮。
木通。投下二劑。連解六七次。破傷處俱有膿水濕潤平
板者。畧覺鬆浮。又二劑。通身毒化成漿。頓思飲食。再劑
而熱減半。漸漸收結。發瘡發癰。以忍冬解毒湯全愈。