

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



I. *Plumaria*

II. *Pass*

223 pp + 13 pla

60 pp



[Faint, illegible handwriting]



[Faint, illegible handwriting]

Index morbor. p̄ prior.
 ordine alphabetico.

n^a Numerus romanus, Cuiusmodi, Latinus vero, historia
 morborum paginam designat.

fol. Culaco

morb. historie

177...	alvi contractio	pag. 41.
173...	alvi profluvium	33.
clxxix	ani decidentia	45.
clxxviii	achores	60.
cciii	aphta	117.
clxxviii	Colicæ dolor.	23.
clxxviii	Crusta lactea	60.
cxcii	Convulsio	43.
cxviii	Calculus vesicæ urinaria	102.
clxxi	dentitio difficilis	31.
clxxix	decidentia ani	45.
<p>Et a superveniunt infanti post exitum e sinu materno</p>		
cxv	epilepsia	91.
clxxviii	favus	60.
clxx	hernia	48.
clx	hypochondriorum inflatio	78.
cxci	hydrocephalus	106.

Index mbor. pnesor.

mbo. curao

mbo. historia

clv.....	Incommoda graviditatis	pag. - 1.
clxxxi.....	Inflammas umbilici	53.
clxxxii.....	Intestigo	58.
clxxxvii.....	Lumbria	69.
ccxviii.....	morbilli	140.
ccxxi.....	macies	146.
ccxcii.....	motus convulsivi	63.
clix.....	Periculi partus	4.
clxxxvi.....	ptyriasis	67.
ccci.....	Rachitis	113.
clxv.....	Singultus	19.
ccxcvii.....	Strabismus	99.
clxxviii.....	Formina ventris	25.
clxxxv.....	tinea	64.
cciii.....	tonillarum inflammas	117.
ccxxiii.....	tumores thumori	146.
clxv.....	Vomitus	19.
clxxxi.....	Umbilici proidentia et inflammas	53.
ccxc.....	Ventris et hypochondriov. inflas	78.
ccxcviii.....	Urinae incontinentia	102.

Index mbor. pueror.

mbor. curas.

mbor. historia

cciii....	Vesicula gingivar. ² - - - - -	pag - 117.
ccv....	Variola - - - - -	124.
ccxxi....	Variola lymphatica - - - - -	144.
clxxviii....	Ventris tormina - - - - -	25.
cxc....	Ventris inflatio - - - - -	75.
clxxv....	Vomitus - - - - -	19.
clxxxi....	Vomitus proidentia - - - - -	33.
cxcviii....	Vesica urinaria Calculus . - - - -	102.

Finis



Handwritten title at the top of the page, possibly a date or chapter heading.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is mostly illegible due to fading and blurring.

A line of text, possibly a signature or a specific heading, located in the middle of the page.

A vertical signature or name written in cursive, positioned in the lower half of the page.

A line of text at the bottom of the page, possibly a date or a concluding remark.

1

Tractatus pathologicus
De
morbis Infantium

Nullibi parit mibi tyrannis et imperium:
alibet eni atas lenusq; ois communi involuit
affectuum et morum conditio, inq; raum —
nates pariter adoriunt. Si. —

Caput i^{um}
De incommodis graviditatis.

Coniugalis amoris penas utriusq; perolvunt,
vixq; post legitimos amplexus, seminali aure
ptacula in inguinem confluxerunt, ut solemne, —
libra laboriunt, quales st multas coloris viridi
facies, in pallentes, fusum, viridem, aliasq;
nubeculas, prothas appetitus, v. ejusd, deparas;
nausea, vomitus, Colicis Dolores, tormina intestini?
mox succedunt lapitis gravitas praecordiorum
constictio, ophthalmia, as Saliquia, Dolores —
Inguinum, tenum, Inflammatio mammarum,

Corporum membrorum, impotentia ad motum
hemorrhoides, suppuris, tandem oia p[er]ib[us] ingravescunt
ultrinis gestatione typis symptomata, neq[ue] ulla
paranda quis, nisi scilicet facta: interdu[m] 6. 7.
mense sponte transsunt accidentia.

Cause

Duplicem tunc causam ad humerata gravidam?
determinanda symptomata, comparata judicamus:
impeditur semper spiritus ventris effluxum,
atq[ue] insolitam molam fetus, secundinarum,
in p[ar]te admodum similes. vix excretionem, quorum
agendi modum aperit h[ab]ebit symptomata h[ab]itatio.
1.° Dicitur menstruum suppressio, & solent
quasi (Carnis consentientibus) gravidam habet
signum, ita h[ab]itatio fluidor[um] massa, ut p[er]
vasculis oib[us] p[ro]p[ri]e[m] modum redundaverint, itq[ue]
habita tamen p[ro]p[ri]e ad maj. v[er]o mix, p[er] la
derivacionem, ex viciniori communicatione immediata,
lymphatica et Conservacione oriunda, insolito modo
turgescant distendant, unde Stagnatio, tarditas Quor[um]
in variis partibus, neq[ue] ventris, et Cordis p[ro]p[ri]e
appetit[us]

appetit, nausea, vomitus, et tormina intestinali¹³
Cum ab eadem Causa impediatur solitus liquororum
effluxus, Secretio pituita gastrica intestinalis, et
juvant et efficiunt digestionem.

2^o maj. tr. futura sit repletio uterinorum et
mammariorum vasculorum, et contra Sensibilior
inflatio mammarum, et gravius earum pondus, ob
junctum horumque organorum Compositum, quo
reflectentes unda, versis utraque, sita uberior
et facilius Diffundunt.

3^o tandem ob molem et intumescenciam
ab illi sequuntur Symplicia fluida, quae augent
Cohesionem molecularum Componentium, et maj.
opposita resistunt systemati arteriarum quae quae
Difficilius Exsistunt et tractu arteriarum
in venas, sicq. accumulatae et Congestae in
auriculis et Sinibus, unde Syncope, et
animi Defectio, et frequentis Ingravitate
Declarata.

4^o et ita ad eam insolita vasculorum turgescencia
atq. Coniungi Cum tenacitate Liquidorum, quae
nulla organa magis v. minus h. propria ramor.
tenacitate, et uberiori in eadem appulsa sunt

^A
patiatis. hinc modo caput, juxta dca pulmones
gravatis et opprimunt, atq; determinant, &
Capitis gravitas, Cephalalgia, & spiritus contentio
orthorea &c. —

3.^o hae cae' hinc homata h' suppressis
Catamenis, et inundante cruore uterino —
oriunda fore, si uadua videntur hydraulicae Sagg
fluidorum lusus, et communis exientia qua
Comptat' brevi cessaturus malorum fontem,
dum desit, de corat' infans, insumenda
humoris uterini redundantis Comptat' —

6.^o alia vo' supervenit e' solent, a potius ex se
Acti fctis, moli et Compressio'ni aquarum
tribuenda est, etiam in maj. extendi requit —
molem, quis vasa hemorrhoidalia jmo' l'trami
mesenterici inferiores Comprimant' et angust
ant, unde' variis in vasculis anis, tenemus, —
aliaq; dicitur suppressio ex Subsequentia. —

7.^o angustatis et Compressio' ductibus hypogastricis
hemorrhoidalibus, mesentericis, atq; necessario
mole' squinis juxta l'ta vasa et l'ta inferioribus
reductis, qua' retardat' ejusdem l'tusis p' radios
ad l'ta tendentes, simulq; tota p'comit' —

3

Lymphaticorum proles, cujus pressio momentanea
sequit' temporis, graviditas, et usum, sedum, coarctandamq;
intumescentia.

8.º Termina ventris, anxietate, ut in aeternis
et similia incommoda in dies inveniunt, ob-
vulsio rem fibris et veis, vasculis, quibus et
Lymphaticis, illatum distensionis turgescit
et Compressionis Stimulum: hoc aem amemorato
fonte repetenda fore Symptomata ad eo verum
e, ut nullis sedentis et Compressantis remediis,
levitiamq; et vias, quo magis partus erget tyestes,
renovare solent.

Diagnosis

Incautis Leporis imponit graviditas, ipsiq;
Frequentis adscribunt mala a Diversis et
opportuna agnosunt Causas, dum paritas
alia inveniunt et si solius Conceptionis
et duabus adeoq; nequaquam proceps inveniuntur
e judicium in stabilienda graviditate, quippe
unum v alterum Symptoma rem Comporre
requirit, et ea simul Colligenda fit, ut suppressio
mens tuor. in flatu mammar. nausea, vomitus

6
Depressas appetitus diutius continuata, et
presertim clausis orificiis uteri, & Dubium
cludit; tunc vero & incommodis graviditatis
novum pondus adiacet, imo et graviditas
functiora et gravata, reducenda est ad uterum
et hanc nam, prioris sepius fortuita fit ut
Lapsus h' alto, perussio valida uterinæ regionis,
altior et insperata formido, vehementior ac
hæcæventia et impetus, verbo infestioria
machinam commovere, et efficaciter invectura
solerit; interna vero pendente a vitio quodam residente
in contextu uteri, & ramis diffundentibus, ut
Laxitate, solutione, schisso de. Phlogosi advent
itia in visceribus vicinis, ut intestinis, hepate,
Laxe, vesicâ, aliisq; partibus; oriunda ex emmen
agogis fortioribus, et male applicatis, opiatibus
actionibus, quodamve stimulo peculiari jz
intervenit. Sapienter.

Prognosis

Varia instituentur s' graviditatis præiudicia,
pro Diversis circumstantiis, ut natura uteri

Conformatae, robore vasulor. uterinor. r. rita
et mole infantis, v. multiplicato numero: -
mulari, tpeamento, discrasia sanguinis, ac langu-
uillitate, hereditaria labe, mali, in praesidio
tuboris continuati, et inesaentibus, citra a o-
nisi inerte et fortuito, quasi vaticinari et
medicus, saepius em. in praxi accessit observ-
ante pregnantis, et toto gestacione proce. discolata
fuerunt mali v. naali et insepata fetus -
exclusioe penitus fuganti, dum alia. p. illud bene
se habentibus tpeis, ad ultimas deis redacta fuerunt
angustias: in genere tpe. pronuntiantur et, eo -
periculatorem fore eventum graviditatis, quo -
instat in principio, et continuante in decursu
graviora mala, ut vomitus continuus qui -
nullam sinit demorari, tussis inopportuna,
tenesmus, pregnantium, morbus periculosus v.
si etiam tormina posteriorum, aut fluxus
diartheicus, qui ex repetita actioe musculor.
epigastricor. et violento nisu diaphragmatis,
et rerum diutius motu tant, haemorrhagia uteri,
avulsio placenta qua pleno rivo manat -
arteriosus Cruor, et praesentem v. soluin abortus,

verum etiam et mortis periculum Coniicit.
 Capere vobis minus reformidanda et, 2. septem
 1: 35. v. 9. mens e remittente, ut (P. G.) huius
 accidit. — eius Curas, pag. 158. - 155

Caput 2^{um}
 De periculo partus.

fructu graviditatis incommoda, variis
 factis eventibus, diversaq. subit discrimina
 mater in partu, ut in potestatem virium ad
 pellendum fetus paraveratur, viam
 inexplicabilem, defectum aquarum, transtrum
 Lactantium, v. precipitem lacrimas Lactum
 siccitatem et angustiam, uteri vaginæ callos,
 adnatos in vicinia, v. aliam partem organo
 Conformationem, sicut et in bacillo non un
 infantis, foras o sat valide impetentis, —
 utum in dabitur quo sufficienti etiam robore
 se expedire requirit, in venis funiculi
 umbilicalis, acceleratorem placentæ avulsioem
 Calcitratum, interpositivum ad interiora se extendit,
 et qd. saepe misera mater chasæ proli, victima
 occumbit. hoc aem tractatum nullatenus —

representantia commemorare Longius foret, adeoq;
duplii illius simp^l homali qd partum naalem
v Difficili Comitatu, j^o is t^o se j^o urat, exaco ni
rempe' Lochior. et febrⁱ Laeli. qd exeat ad
tum, vascula rupta Squinea fundant j^o utro
Coacervatum; i^o primum et Copiosum, deinde
dilutum et periculosum, tandem pallidum et
paucum Lochiorum nomine, evasiant
quoad Copiam Duratam pro Diversa Constitutione
purgeat, et Lactantis: etenim exortio illa
interdum ad 8. 10. 12. et 15. dies extendit, modo
3^o v 6^o remittit, aut Supprimat, pro Diversis
Circumstantiis qd^oq; pleno alveo manat, ininterrupto
effundit: verumtamen maximi momenti habenda
v memorata Scetis, ut ailes et valetudo
pergruere, affluxu oblitino, q^otitate, Copia et
intervallo dependant, totaq; adhaereat therapia
norma, fervendo Contigendo, v intendendo
Lochiorum affluxu, quem triplicis potissimum
noe, alio q^oq; per e modo processurum opinamur:
i^o insolita Copia et q^otitate, 2^o t^orove Effluxu
vii' Continuato, 3^o tandem interpestitiva
Suppressione

Causæ

plurimis de causis interduci potest, et soliorum
 evacuatio, Dissolutio nimia totius massæ
 quænis fervore et exandescentiâ, v. retenti
 in utero Lætanis: hæc denique a quacumq; —
 Causâ procatartica prodierit, perinde augere
 repletioem vasorum uterinorum, et ipsæ et maj;
 fluidi mole distenta, nequaquam coarctari, atq;
 Constringi poterunt, ut fluxus minuatur, v.
 momentum Cruoris ad vasa uterina appellenti
 adeo intendant, ut eorundem retractioem
 vincant, siq; persistet evacuatio, rursus patet Causa
 Dissolutio, v. vasificatio reduenda fore ad
 exalefacientia interna v. externa, sive p.
 decursum graviditatis, sive partus Labore
 abrupta fuerint, ad affectus ac, quibus
 nimis commoventes ad varias species febrium,
 inflammationum, Phlogoses, et similia, et o. solida
 maj. fluxus determinabunt, verum etiam
 ultra solitos terminos extendent. Demum —
 suppressante Lochia, iisdem fere memoratis
 Causis

Caus Diversimode agentibus, adhuc ut ex appositione causi
 frigidiori, humos uterinos subito Condensanti, sedund
 antica pravor. humor. in iis viis, que sunt in
 Suppeditati, ita inspissant ea Liquida, ut
 Solam invariis Igneis, verum etiam et in
 Lymphaticis, prorsusq; in Secretoriis et excretoriis
 subsistant, grumis squamis supentibus, et
 emissaria organi occludentibus, Compressio
 adventitia v. artificiosa situm Circumjacentium
 Cuius affluenti, effusum Colubente. —

Quod attinet ad hunc Catum a Communiori
 Experiencia, duplici v. triplici pot. partem die,
 querebas ex improvise Corripit honore Rigore,
 qd; succedunt Calor, febricula, signaq; incipientis
 inflammationis, et fluxus lactis nominati,
 et sollicitas tenet, nisi eridem foret ipsius Cui,
 etiam interdum optate passu procedere
 videtur, qd; q; graviores etiam laboribus, quos
 viciulis Lactis concitat turbas. Denique
 parate sensibilitate ignis tenet altu;

Exanti Anit insidit, stagnat, Coagulat
 humoris Lactei in mammae Dolore inflammet
 orio, suppurat, ulcero, v. inoperata methastasi,
 in eam peculiaria organa, aut squamis oracum,
 equo dein p. rarias pte. diffunditur. —

Dum puer e' naali sede Tetu. batus fuit, et
 quadamtenus proprio nisu vasa constringunt et
 restitunt, utrima vasa, humores qui prius liberati,
 orificio p' oem uteri Contextum ad nutritivam et
 inalementum fetus Difundebatur, jam decrevit
 et immunita vasor' uterinor'. Diametro, in
 masam generalem, et p' portione Data h' theoria,
 lymphomatis... et p' portione venis' mammaria
 Copiosis reflexis et, q' uberior' squinis et ruci
 Lymphaticis q'itate tendunt et implent, liq, maj,
 Columnis squinis, et p' Subclarias vertebrales -
 arterias impulsis, affert' resistea, unde Dilatao maj,
 Caraliculor' lacteor'. Deviatio succi lymphatici,
 et permixtio cum reliquis humoribus, fortior retra
 ctio. Solidorum in h' traneum quasi fluitum, et
 Contes horror, inaleoentia, itaq, provia inspira
 ois lymphomata, majis aut minus Lusaturu,
 p' q'itate, Copia Lactis permixti, Constitutio
 Lactentis, actione visuum attenuantium, et
 aperta simulorum e' q' h' humor' effundi et ad
 nutritivam fetus.

Curas pag. 179.

3

Capitulum
De iis quae supervenire solent
in infantibus immediate post
exitum e sinu materno

Quemquam jam relinquere ad amplectendum
et fovendum matrem; qui fletibus et continuo —
placitu misericordiam movet, et auxiliallamat,
rimam ac jam caput strabat: etenim in aucto —
Lumine, illapso fluidi aeris per naras tracheam,
actionem musculorum, qui plene conquiescunt, imple
sionibus, et injuriis externis. Diversa circulatione,
et potissimum mechanica, et papaveruli stimulo —
perclusus et inritatus, plures ex dato ad humerum
vitam aditu et pro obiecto malis, ut nausea,
vomitus, convulsio, singultus, sternutatio,
pervigilio, febris, et aliis terrore machinam aeris
oppruquantibus: haec aem, nisi ad fuerit peculiare
quodam in propositum, deducenda et mechanice
latitante in venticulo et intestinis, seu in maad
tenaciori quadamtenis flavescente, et magis —
adhuc nigricante, a parietibus intestinorum impacta
fistula per gravitatis decursum seruet, atq. ad eos profert
inimam e infanti; dum aeris appulsus miscela —
alterantis elementa, et molecula mucosa, pituitosa,
et glaviora mala, et pestem ipsam per reos nati

ingere et.

Hinc fieri succedit resor. affectuum illic ab igna
 nutritione oriunda. sicut em ex debilitate ventriculi,
 atonia fibrar. v. deturioni naâ indole lactis, alimen-
 tum illud diffilicet, v. indebito modo Consequati, -
 verius e' Congingit in massam gravem, asiosam
 aut varios avamos parietib; ventriculi, fistula
 intestinalis, pertinacius adherentes, & fieri efforata
 vomitus continuos acidum & Dolentes, v. putredinem
 quâdam spiritantes, tormina, flatus, Dolores, disenteriam,
 dejectiones virides, nigricantes, sub. Type Diarrhoea
 determinant, & sequis Consequenti insultus epilep-
 tici, Convulsiones, v. motus Convulsivi, uno verbo -
 totius machinae turbam, quâ diutius in statu tolerare
 nonuit. hinc fit ut ois adhibendus labor et cura ad
 quendam nati valitudinem, in hâ illendis segmentis,
 glutinosi, Carosis, qd; esophagus, stomachus, et -
 Intestina replenti, sicut et oligendis nutritiis, ac
 exacte convenientib;, & sequentib; expendamus -
 aruulis.

1^o Diversa e' pro Diversâ regione natos reanti
 ex duos tractandi methodus, et unius gallic, hispani
 et itali funiculo umbilicali prius file ligatâ,
 et prope umbilicum desecto, sicut ap. boit idem -
 in utero Contractis, ablutis, tandem proles -

13
accipiant lentis Calidis et fervent, ut cum ab aëre
ambientis frigore lenare possint, Dein clauso quodam
tempore quo vomitus solet regere matrem illam viscidam
meconium dictam, exhibetis infanti paululum
mellis narborensis, interdum cochlear vini, qd, parvulis
mamme infanti offerunt, ut vob germani, cataris,
angli, aliiq, septentrionalium plagarum jnesia, alio
modo se gerunt: quippe statim ab exclusione profundius
resurgunt infantem in aquam frigidam, ad
robotandam ut ayunt machinam, eorq, per frigidis
laboribus, et injuriis externis aptiores efficiendos, ita
ut si vividus in aquis agitatus, robustior, et altioris
aëre fore omnino, si e contra praesto jaccant, neq, —
motus edant sensibiles, ignavos et imbellis pronunt
ient: Deind e' facto periculo, liquoris Cujuscumq, spiritus
vini cochleari unum exhibent, quo resfoillati vitibus,
jncunabulis, sive fasciarum apparatus, quâ cautela
vulgo aëre gibbosi, vari, v' alius vitiosis confirmacib
deturpatis observant, ut in meridionalibus curvis —
contingit.

2^oposito qd infans meconium nequaquam
rejecit, sive ex labore utero contracta, seu visceribus
contractis fuerint intus, v' transitu. Cum illud
valeat graviora mala jam recensita producere, —
jdurie ois novanda e' opera ad illud h'ndellendum,

17

provisis inimicam, mammae in superius nutritis, -
o ampliores, neq. depresso nimis lacte, et o
pinguedine turquant papilla rotunda et coloris
rosaei religanti, nisi nutritis lubrica fuerit, in
quo lam areola et papilla, sunt ad fusum
Colorem accedunt, independentes etiam a continuata
diutius lactae. Compobato te vulgari, praesentia
pueparas et nutritis memorati operanti, et
Conformacis Tule mammarum, nutrienda et
multiplicanda prole ce aptiores, deinde ad ca
corpulosis attendendo, o minimus et enim
erit plusa movet et Licitat in lactae p
totum vita decursum duratura, hinc prole -
varis Contaminatae affectibus, ut lue rosaria,
iropulosa, rabie, Canceris, schirris, obstructioib, &c.
e inquinata mata infanti victima, simul -
Cum nutritioe subministrat. imo ita a iuxta
vulgatam opinionem lactis Cum Constitucione
futura infantis afflicta, atq. Consensus, ut
illud tpm iam malor? Labem operati vulgus, -
o Licit ex toto resum o proficiat, in hanc -
sentimus diversa nutritiois vitia, ut prodiv
itatem ad praecundiam, potentiores et irritos d
venere stimulos, ebrietatem alibis impressionem,
Santidie imaginem, magnas mutacoi et altacoi

Lacti allaturas. qui vni pnt imaginari affectis:
 exarriori itaq, parentis nutriti, et an mania,
 nephritide, Delirio, melancholico, v quādam floriditā
 Labitentati fuerint, et si in ipsis defuerint, et
 aliunde nutriti junior bonis moribz imbuta, menti
 vnum fluxum v patiens, et alia id genus superius
 allata et memorata habeat, Concedenda e recens
 natio.

si pūm Spectemus v min attentioris neser-
 nā et iudoles lactis: siquidem v pauis res-
 deprehendit nutriti, quas forma venustas, vividus
 fauici color et epus rucis plenum, ad perfectam
 lactationem paratior, Constituent, et ta interis
 neq, tenuis obvis Corruptior malis, lacq, —
 pessimo iudoli fundunt: illud tē Bonum iudica-
 bit medius, si albicans, Dulce, et modice sit consistet,
 ita ut ne crassius, nec tenuius sit, insuper ad-
 felicioris electio em, lac inieciendum in oculum,
 v si iucundius ad natam titillet membranam,
 erit bonum, si contra acris ab eo vellit, malum.
 v guttulum affundendum super unguem: si prole-
 nis dilabati, tenuius et aquosum nimis, Crassius
 vō si nimis adherat. et ex simplici proportioe et
 multatioe Lactis in manu, pnt ac examine
 nutriti, Lactis manū, sed felicitas determinans,
 noue et nix auxiliis, Caliditas, asperioria, et
 peior —

pejor consistat, & velandam appropinque dignosci
 potest: tandem re ipsa Defecit in Electione
 optimi Lactis, Consulendum novitati, aut veteri
 aetati Lactis, si in titulo peccaverit. Cum nimis aquosum
 & fluidum sit, in infantem nutritum requirit, sepiusq;
 Diarhoeam movet, si vero Crassius extiterit, Aerio-
 aessit, Crudum inspumat, vasculaq; obstruit.

Caput quon

De vomitu & singultu

Solemnius et frequentior est in pueris quam in adultis
 utriusq; affectus, sive enim pro voracitate majori quam
 parte Lactis copiam hauriat, seu illud variis modis
 in debiliore ventriculo alterati et Corrupti, alimen-
 tum rejicere, & singultu Corripit Solent. is tamen morbus
 si nulla functionum Larvae disrupta, accesserit, nequaquam
 habendus deterior, cum sola aetate et robore Rhomachi
 dignitate, versus nempe Quarta & Decimum mensem,
 sed hic agitur de vomitu aut Singultu in sanctis
 molestantibus, et a causa peculiari dependentibus,
 definit quoque praeternaturalis, et violenta horum est in
 ventriculo Continentis, per superiora Rejectis, cum
 variis adunatis Symptomatibus.

Differentia

pretendat mibi Discrimina e t'pore residuo, nisi
rejectionis, Color et varietate Excretorum, sicut et
vitio fugaci ventriculi, v' t'ua in ipso residente.

@ causa

Caam proximam vomitus et Linguulis redun-
dantem v' Censemus, q' subitaneam ventriculi
distentionem, violentamq, orificii praesertim superi-
oris irritacionem, a Copia nimia Lactis, v' stimulo
oriundam, q' b' v' solim fibre gastricae, ad incommu-
motum prestant, v' etiam vasa splanchnica, diaphrag-
ma, et muscoli abdominales q' consensum
habent, ea quippe' Data et anatome j'ntu memo-
ratas p'tes simphatia, ut una gravius afflicta requat,
quis et altera molestat, quippe' siq, Lactent es-
maj, alimonia q'titate, q' ut a Stomacho
ferri possit assumserint, v' ingestum Lac novam
q'titate peccaverit, ut tenacitate, acrimonia,
aliqua, p'inde' distentis, summe et violentior
ventriculi q' contenta actio laborientis, et
Contenta p' superiora rejicienda st, si irritus evaserit
vomendi Conatus, et alieno magis laboraverint

vasa phrenica quae gastrica, singultus, declarabit.
 Est et communio res tunc vomitur aut singultum
 in infantibus producentes, verum et alia accedunt &
 officina illarum iuventute solent, quaeq; ad internam
 et externam reducimus. —

Causa externa desumenda est, ex jactu, Corussioe,
 Capitis, agitatione insolita Lunabulor. attentioni et
 deflexo obtutu, verum ignem aut solem, stimulo —
 externo, ut assiculis involutis circa lintea, et tenellae
 ubi Deflexis; Haec etenim impensius liquidum nervum
 commovendo, et violentius fibras nervos succutiendo,
 partes reflexas in ventriculum determinant, ab —
 accelerata Circulatio, erigunt et tendunt fibrae nervos
 ventriculi, et ad hypensionem contentorum adigunt.

Internae vero nominanda est, a in contentu fibrarum
 ventriculi delitescere possunt; ut schismus, callus, obstru-
 ctio pilori, aliaque, deservimus lactis verum intestinalis
 fistulam obstitentia, et, variis in quibus observantur, —
 vobis e quibus Lac succedunt et Depluunt in illud
 viscus, et frequentiora sunt, ut psora indola succi
 gastrici, tenacitas nimia v. Aeris nimia hujusce —
 humoris, a propria vi insufficienti ad rejectionem —
 ventriculum oppugnare valent, v. ingestum Lac —
 alterando Corrupto, memoratum effectum
 potentius adhuc Determinant. —

Symptomata.

1^o violenta fiesi nequit Crisis Concusio, et intendi musculor. fere' omni actio, quia accelerato liquor. Circuitus, ouq, vasa tum inguifera tum lymphatica, impensius turgescant, et distendant: unde' Calor Et rubor qui ex vomitu solent declarari, quippe in pueris et ipanti sputo sanguineo, v' haemorrhagia nasium cum leuori de caud fenella, imò cilli machine vascula, diluenti et turgenti.

2^o Viciis perseverare nequit propterea illa exaero, quia h' Continuata Concusioe atq, dissendio spirituosorum liquor. gremium, desiccanti et Consumanti visis, unde' fatigatio, imò cillitas, imò et ac' deliquium, v' urgent in vomitu continuato pueror.?

3^o Indis Contabescit g' sams, et macie Consumit, ob impeditam reparatoem fundum, quorum magna pars p' superiora effundit, al' tesa v' — Indebito Conecta modo, quini suppeditati. ventriculis em' irritatus, aut sic inge. tum se fere' nequit, v' male' preparatur ad fistulam intestinalen detrudat

4^o Data' mag. actioe diahragmaticis et musculor. abdominalium, magis premuente et urgente visera, abdominalia praesertim Intestina pendula, et p' Carv' abdominis fluitantia; v' mag' visis exaero

23

dent in molem oppositam & pte annulorum, qui
si vincant, brevis procedunt varia genera hemicarum,
frequentius in recens natis contingentium, ob laxitatem
pctum solidarum. —

3^o Tandem is adjunguntis anxietate Continua, —
vigilia atq; febriles motus, haud Dubie deducenda
stimulo acriori, et Continuatâ irritatâ qd; fibra
nervos violentius quatitunt, et liquida ea in calidiora
motum Concitanti. —

Diagnosiv.

Latis innotescit morbus, quia nullas supplicias ferunt
signa Diagnostica, & a qto dependant aut foveant
Caus, Difficiliv' Erui pl: interea statuendum e
ingerere Communiosem vomitus originem ee
referendam ut jam dictum, ad nimiam Lactis —
Copiam, & ejusdem depravationem, siquidem alie variis
occurrunt in praxi medicâ Caus. adeoq; statim —
Laminanda naa Lactis ad in statu legit, et prævidenda
rejectione, si nun nullâ qualitate præcaverit, nulloq;
Contaminato vitio hæreat, sola atonia ventriculi
& nimia ingenti qtitas judicanti, dura vò Coagulationem
Lac, Cuius maius flavis aut viscidioribus aliminetis,
detriorum humoris indolem, et praves succos in

 Prognosis.

Pro diversis Circumstantiis aut Symptomatibus
 variat in pueris vomitus ventriculi. Et tamen darsi
 contigit, nullamq; aut Sensibilem - Saltem functionem
 Lesionem adjunctam habeat, Levis iudicandus e,
 sed vob' dum saepius recurrit, vigiliae et motus -
 febrilis instant, maior Comitatus: porro nullius
 quoad momenti habendus e ille vomitus in quo
 nec sic altero riviuit, neq; violentis in fan-
 tentatis Concussioib; dum summam pro salute
 praestet formidinem, rejectio alimentis coagulatis in
 grumos, v' mixtis cum mavis fatentibus biliosis,
 acidumq; corruptura spirantibus, e major admi-
 nandus periculum, si nigricantia Urinam,
 demum variandus e ventus pro Durat' et
 Constitutione infantis, qui tamen ultra' sua v'
 vicinum mensam extendit, simulq; cum febrili
 puerili specie Coniungit, sinistra haec ominata.

Caput 2^{um}
De torminibus ventris
Sive
Colico dolore

Non minus frequentis patitur fistula intestinalis
ac ventriculus, Sepiesq; Sactantes et quasi Colico
dolore tentantis intestinali, qui gravius etiam movet
atq; accendit: siquidem ex abdominali tumore,
flatibus, p ventris Erumpent ibi, et distensio e nimia
villor[?] mezentis uor[?] instat Dolor acerbior, qui ejaculatus
et Lacrimas licet, et infantes ad eas reducit angustias,
ut motibus, inoletis, agitatis, mammam aversentibus, pabul
umq; recusent: Dolor ille citius aut tardius movetur
o solus evadit, mod^o Conjungitur cum alio flexu, et
excessu mearum Liquidar[?] et flatentium, qd^oq;
alvus claudit, et nutus v Capites ventris edunt, —
hic uero Sensus Levamini motu ille Definendus e,
visti et moleste uo Sensus, a tensioe nimia v
intestinali, v villor[?] Contextura efformamur oriunda:

Differentia.

Plures sibi videntur Differentias Colicis, Dolos
intestinalis. Resumendas a naa, Causa, Sedes,
Doloris ipsius intensioe, quoniam Simplicitatem, sicut

et Stimulo latente in vasis intestinali. si tunc
 spectamus, Colica dividetur in humoralis et flatulosa
 an, id debetur humori bilis acrioribus et effusatis, nec
 Lactis v. liquidis ad intestina confluentibus processit, dum
 quae species, tribuenda est flatibus Copiosius habitatis, v.
 nimium satisfactis. si 2^{um} alia esse potest fixa v. vaga,
 periodica v. accidentalis, altera levis aut gravior,
 tenuiora aut crassa intestina afficiens, denique idiopathicam,
 Symphticam, mobilem aut constantem statuimus, -
 prout raris aut raris patientibus intestina, et a stimulo
 pertinacius adherescente, v. raris patientibus -
 procedere potest. -

Cause

Et videntur probata in quibusdam, Dolores, praesertim
 affligit sistema nervosum, et mutationem quorundam funic
 ulis nervis nervis illatum in: ad id, Causa proxima
 Dolores Colici defundimus in violentam distensionem
 intestini, et quorundam vasorum illud peroptantium,
 a Licet e multiglicis fonte proditura sit, in ora reduc
 it ad menses et flatibus contenta in intestinis, et ad
 Constitutionem nimiam fistula.

mae tamen praesertimalem illum esse, vasa
 intestinalium statum, si ita augeatur mole et
 actinomia, ut in fistulam agitur pro voluta moventi,
 et Congeruntur in duobus, ambulant et distendant
 nimis.

nimis pariter, & in Descensu potentius insident, et
 vellicent fibras nervas, neq; utraq; modo ad nimiam
 tensionem, & Solorem determinat usq;anti intestina: -
 hinc exuperans Lactis ingesti Copia, grava in Childum
 Convenio, & Coagulae raptim; in partibus, crassiora
 vero et copiosiora cibi, in juveni foetus horrei et immaturi,
 intestina alimentor? a sumptio, frequentiora struant
 mibi Curabula in q;um in oib; ingesta nequaquam, -
 sufficienti ten? in ventriculo et intestinis, preparari
 et elaborari queant, proindeq; augetur mole contentor?
 & locum; nam muleto, & Diametrum et Capacitatem
 fistulae expando, vascula componentia ulterius
 premitt violenta distrahit, et ad tensionem qua uberior
 e et fortius liquidi nervi flexus et reflexus, promovet,
 premit.

Non Diopari procer modo memoratas Laben
 accerunt flata, in fistula Coervati, & nimium -
 Spanis, procluso ante ignis aditu, molecule aerea, -
 rarefactionis, & intensionis elatas, temultu fragit
 ata, fortius in partibus, impingunt, dilatant ultra
 modum, brevinq; totum distensionis momentum tollunt,
 vascula nerva, & Laborem et Status fibris Cerebri
 rapidius Communicant: hoc aen; Catuum Congestio
 debet rarefientia maxima Confluentura ad intestina
 sua Succu gastrici et biliosi humoris facile expandent
 eum, alimentis viscidis et crassioribus, Lacti putrescenti,
 licet et obstaculis solitum motu descensum prohibent ib; -

et in fistula intestini diutius quae pars a Cavitate, expan-
dunt, rarefit, et fibrasum tenuem intendit.

Denique Capacitas intestini minuitur, et contra
Constitutio fistulae determinari potest immediate v. mediata
cum continget, si adit peculiaris stimulus agens in eadem
Stamina rerum, ut vermes, tarsi in quibusdam int. et in ple-
nitionis et acioris materiae cumulus, v. quod piam h. t. aneur-
ysm, ut aspicula, et virilia:

Quum vero Declarabit, ex affectu vividius ingens, -
rervorata, ista, discepta phlogistica rerum, vermes, presentia
Caluli, in ultiori Cavitate Derivata humorum soluta, -
ob anni praecedentiam, ipsius adhaerentiam, et an an-
probent acida et frigida, epulantes diutius continuati,
Desensus epiploonis intestini, ad inguina scriptum, v.
intemperata applicatio aromaticorum calidorum supra
regionem umbilicalem, ad fugandam vermium prolem, ut
vulgo sunt muliculae, et ad eum finem variis oleis -
virginibus, umbilicum frungunt. -

Symphomata

1^o villi rerum intestinales, purgi et diuorino de-
junctari nequeunt, quibus variis exurgit Dolor, modis-
tenuis, gravativus, inter dum Continuus aut intermittens,
cuius gradus et persistitas hinc respondeo aut
tensionis vasculorum. presentia Stimuli, v. flatuum
reterentium dilatationi.

2^o prohibito Desensus materiae, v. proclino flatibus

eruptis edita, quædam viscerum membranae os
et musculi abdominales, unde tumor et ventris —

elivato, magis aut minus veniens pro causa distendente

3^o protosnaaliti distendi nequeunt vascula, —
mesenterica, et squifera, resvea lymphatica, quis —
solitis p eadempriepedite liquoris cursu, pro indeq;
notio de amderivete ad gastricos emulgentes ramos —
hepaticos, hinc nausea, vomitus, urina suppressio, v
suppurationis dextis Dolos, qui sequit ja Colicâ delatante.

4^o nulli reveri assiduo fatigati stimulo, a tono disicua
vnt, et minuti alio solido: ja Liquida jam torpente,
et uberis Cumulata, qb magis ac magis impediti, quinis
affluxus, hinc; instat debilitas, pulsus, pallor faciei, —
sudor. &c.

3^o si intestina validius agere possent, ja Contenta, rident,
ezelles v manâ Congestam v flatus Coâservatos; quo
actiois momento, portis p rior. Humor: p p feriora
detradete, v stupitus p abdomes diragabunt. —

6^o tandem Continuatâ aliquâ ut torminib; hinc —
Commoveti totum pueror um Corp, atq; anxietate, vigilia,
epulas delatante, d sequit ja ronicid em, Convulsioes,
aut Convulsivos motus, febrem acutam, v affectus —
oporeos determinant, ob irrolitanz liquidi reveri, et
juines ag itaoem, Copiosius et inordinato motu ad Caput
aliqua viscera ruente.

Diagnosis

per uelora iudicatis & a vermibus pendat, sequitur q³ -
in vehementiora fortissima, dyenteriam & ebriam lentam
degenerat. Demum Colicis doloris pediculum, pro -
dejectionibus, si fatentes virides, aut nigricantes
suerint, pessimi et omnis, et ulteriores humores
putrefactionem committunt, seu uo' d'um flava,
nullum & atidum & prius odoris, esse nuntio

Capitulum 6^{um}
De difficili Dentitione

plures quoque in successu sequuntur morbi, amica
fortuna materni linis ualitudine, u' lactatione,
therauro & fugere potest infantes, d' oib' manet dentitionis
incommodum, neq; unquam sua obliuiscunt instrumenta
propter necessaria ad auersionem proli: licet uen
opus medietatis et moliat, tamen propter accidentia &
symptomata varia adiuncta, prodit nob' titulo -
mibi grauioris, e' Dentitio simplex, d' Difficilis: etenim
dum ab oculatis omnib' punyunt et pasorant
gingiua, autus dolor, uigilia, inflammationes
gingiuarum, alui fluxus, Convulsiones aut motus
Convulsiu, ualent ex utero, & pueros breuiter e medio
tollunt.

atent per in aluedis, et gingiuis tequunt
infantum dante dum in duem edunt, q' q' q'
stama sit plerq; Cur Dentib' eminentib' in auras
prodire, sic refert Oualvius rouscus de puellan

cum duobus incisivis vidisse, sic Ludov. magn. seu XIV.
gallia regem, duobus dentibus instructum Lucem vidisse,
et multa de aliis. & varia illa exempla: produunt
tamen circa unum sum, & quatuor menses dentes, et
quodammodo incisivis quos aliquo temporis intervallo sequuntur
Canini dicti, tandem molares, ne subitanea gingivarum
obtusio et multiplicato morbo, acerbis patiens et
fatigatus infans: interea magnam partem in gingivis
sentiunt pruritus, interdum postea Dolores, utque omni
Calore, Copiosius emittitur Saliva, alvi profluvium
Declaratum, insunt vigilae, Soporibusque, Convulsionibus aut
motus Convulsivi Existantes

Differentia

Varis statibus sunt Difficilis Dentitionis gradus,
raae nimirum, et quantitate Dentium Prurientibus,
et vehementia simplicium, dum plura, et semper
nascuntur dentes, et firmiorem gingivae texturam obtinent,
datis gravibus dentitione, cuius et Contraria, remittit
videntia; si parvitas Continuis placent, et inquieti-
sint; Infantibus mammae aversis, aliique, jactantibus
memoratis eventibus, acutior evadit morbus, quam si
ea Defecerint: tandem assignatis aliterum dentitionis,
genus circa unum aut quatuor annos, dum tempore
dentes lactei dicti decidunt, aliique, Duriores, firmioresque,
succeedunt, & cum jam proceperit gingivarum duritiam,
et potestatis sedis Somnium, id tunc Dolore conturbat;

Causa

Caam proxima a difficili dentitione proceduntur
 Symptomatum, septimer e' hinc applicato febrim,
 nervis gingivarum, eas protomodum rurgente et
 distrahente, Cujus raeo sequentia laboriosa est, 1^o
 imminere vult. oblatu fibrar. et vasulor. gingivar.
 compositionem, quin status ille communiter i. febris
 Cetero, atq; immovato deimpervio molsta qua
 vividius aut levius afficitur pro liquidi nervi-
 momento, tenore fibrar. et Cventura Curandem
 Succursio re, juxta statutu ad Cum Jura
 Commensuram, unde acutior v. remissior Solus, qui
 v. maj. v. min., Pleurum rivulos, Continuos v.
 Intermissos planctus Cedit.

2^o positis semel vehementiori fluidi nervi-
 volentia, et intensiori fibrar. qua haec residente
 In Imperio, tumultuanti spiritus, qui inordinato
 motu huius et illud Copias mittunt, unde perpetua
 fibrarum representatio v. vigilias, v. fortius quorum
 artuum motus, qui Convulsiva aut motus Convulsivos
 determinat, prout Inequali rivulo, v. Constanti
 fluxu derivantur.

3^o solviti modo alius, interdum adtingit, e'
 maj. v. min. succursio nervosa proli, sicut et
 Congestio pravorum liquorum, dum ex Calor
 intensiori urget, vascula caevicantur, neq; adest

maxima cumulus, supposita alvina hætes, seu
 v' si fluida copiosius ad intestina derivent, et ma-
 ra resiant et expandant, varium adest profluvium
 pro gradu q'titatis, Conni loci, et Corruptioe maas;
 reliqua symptomata ad huc evadunt, ut febris
 prothæo appetitûs, inflammatio oris et gingivarum
 ex eâdem theoria facile deducuntur.

Diagnosis

independentis a Loquela et sermonis infantum
 auxilio judicari et Dentitio, ut si urgent solitum
 eruptiois t'pus, v' digitis lapidibus odiantibus gingivæ; si
 in rugis papillam foricis matris attingi percipiat,
 aut ipsa amet gingivæ albicet, tandem et agmine
 imphro a tumore nullam retentionem aut internar-
 caam judicant.

Prognosis.

Parentes de Chumâ prole, nisi factâ eruptioe
 dentium tranquillitate et saudio indulgent: heptem
 plures ab eâ attingunt; id t'z gravius periculum
 statuendum est, quo difficultas et longiori t'pore
 exurgunt, v' graviora instant sympt'omata, ut
 febris, Convulsio, deliria, suffocatio v' perniciosa,
 diarrhæa, t'peramentum in rugis diversum, varia
 matris constitutio, et Lactis conditio, sunt et
 diversa spectata, dentitionis eventum maturæ oblat.
 quippe

quippe hyeme quae astate facilius vomuntur
et promptius atque facilius promovetur ruptis, pro
inquinatis sicuti et constituto aluntur. curiae pag. 171

Caput 7^{um} De alvi profluvio

Amiluro malum infantibus e alvi profluvio in,
ad statum solo potissimum de idem incommo-
molestus esse videtur, in decursu vascula fistula
intestinalis ita emungit, ut debilitas summa,
visum prostrat, paltor, malis, aliisq; hinc penduntia
supervenerint symptomata, illud non desinendum
e suspicio alvi fluxus in quo maca liquidiora et
coloris albi sine tormi nibs laevantur. —

Differentia

1. Numerosa et in infantibus alvi profluvio —
diversimoda: ea potissimum de sumenda et ex malis
laevatis, et effectus: 1^o rae maca laevata plures admittunt
alvi fluxus, et datur ex mucosorum, argilorum,
serorum, flavorum, viridum, biliorum, rubrorum, cholorum,
et oia. bla macarum laevatione patent.

2^o rae effectus; alius dicitur Criticus, qui puerum
a plurius impendentibus malis Liberali, ut in
affectu proprio Difficili Sentitione Si alter vo-
luntarius, qui cum febre putrida, variolis,

aliisq, horum effectuum species, cum intensiori
 gradu symptomatum jungit. tandem reliqua alii
 profluvii fluxus spes, ut ventis, in venas, —
 Simplicis & Compositi, facili mente Detegunt.

Cause

Cum in oi alvi profluvii spes, a in intestinis
 continent, & ea citatis moveri debeant, atq,
 ex illis & solitam viam frequentius sociant. Caam
 immediatam mo' profundius in aductum
 atq, precipitem fistule intestinalis motum quo
 maas contenta totiusq, ejusdem fluxus facilius
 evaporare possit, Celasinq, ad anam perducit; si vo'
 hujuse facilius Descendit Caam ulterius, proquati
 Dupliciter Tribuendam. Sati jure mo' de pronuntiamus.
 1.º vixit fibras intestinalium et simul diluti
 vibi maas, qd, neci in ductu intestinali nullo
 interposito obice, solo pondere et fluiditatis motu,
 & amphitactis intestinalis voluunt, ad in diarthra
 Chiloni, Stenosi, Laxi, totisq, un' videt.

2.º posteriori stimulo et maj. jactate in fistula
 agentibus, quorum vaoc frequentibus et vividius
 Coarctant fibras contentasq, maas eadem portioe
 versus anam exprimunt. hoc aen jam assignatur
 vitium a multiplici fonte rursus Deducendum
 & p' sum temp' e terro Laticæ fibras Intestinales

37

redundante, si et animi nutritio a alijs in partem
debilem Constitutionem obtineat v. aliunde alimentis
aquis, viscidisq. vesicatis. Sic quidem nascitur
quo tunc abest ut vegetiora fierent ope reparatio
ventriculis et intestinis, ut ingesta. Debita conquis
possint, quia totius efficacius laboris facti illius
Serris redundante, qua tota fluidorum mole nimis
diluit, ea humor horrendos? Cola delosante,
indeq. magis ac magis debilitate tota in belli
machinula. postea in Communionem vo' deducet
originem a nimia q. tate, v. prava Constitutione
Lactis in q. tate raris Calidiorq. extiterit, q. ta'
potentius fibras intestinales irritat, ut eunde' fortius
et frequentius contrahant, qua fortiori Contractio
Citius expellunt ma' contenta, qd etiam e
intelligendum de q. tate Lactis, praesertim si in
Solidiores Cibus simul ingerat, tunc em mala
preparata et subacta in stomacho alimenta ad
Fistulas in testinalem crassiora revertunt, dein
in pravae succos mutanda, q. b. ita' irritante fibris
intestinales, et Cephalis debeat supervenire Lictis,
et pro diversa molecularum Constituentium dispo'e
exurgere varia profluvia? Discrimina huiusmodi
eundem tiam effectum prestare pnt vigilia, difficulte
ventitio, varieg. oculi, cum q. Consensum reror?

Labes ad fibras fistulæ intestinalis facilius tendunt,
atq; fortius intractat, atq; succutiant, ut quæ
Cæcior hæc ulsio mæcum contentar. in intestinis.

Symphomata

In ventris profluvio frequentior adest Diætesis —
mæcum fluidior, & solim ob laxatum fibrar.
intestinalium tonum, & decensus mæcum relucta
ndi propterea inq;ares N, venim etiam ob Copiosiores
& erosum mucum & vasculi intestinalis dimisum,
qui contentas mæas quasi in fluxum redigit, hæc
aem diætesis in Stercoroso serore Lymphatico flexu,
nullum productura e Dolorem, ex gâtis antibus et
Laxatis fibris, magis tæm sensibilem inflavo
viridi Brilio, Læcum mæcum acium, & —
tractum intestinale potentius stimulant; 2^o
diversus e Color et odor eorum & Humoris, varia
Indole, Consistentia, atq; fluiditas, dependente a
varia Crasi liquidor. fundentium mucum intestinale,
mag, & min; relaxatæ Ductuum atq; dimisili —
Concoctio modo, mæas effluvas suppeditante.
3^o Fluxus seroris læpius in hydrogen leuophlegm
atiam degenerat, ob dimisum fluidum aqueum —
in præteritæ liquidor. vasculor. laxitate et obstructioe
viscosi qd, fit tædo gradu humoris lymphatici motu.
4^o profluvium viride Briliosum læpius terminati,

39

inflammatae aut diptentia ex ulterio ri fibrae d'aver.
distensio, et maj, squinis p' ramos mezentericos —
Circulanti fervore, et stimulo, materun Conitatis. —
3^o atrophica et maais mbur jam invetentum
Consequenti, o' solum h' continuo p'is mucilaginoso
Cruoris dependio, quo vascula ... et vis astringenti,
verum et impedito transfluxu chili p'nt quiness,
qui o' male preparati, aut statim laxitate intestinali
ad inferiora pellitur. —

Diagnosis

Cognita facile cetera sola frequentiori dejectione —
manifestata alvi profluvium: o' multi p'nter est
diversas ejus, o' p'nter probe aequi, id aem obtinet —
et detegit Status symptomatum et inspectio —
ejusdem seu excretionem. —

1^o symptomatis novitate an Criticus sit fluxus, dum —
peragitur Cum Levamine p'nter, et adest adun
velocitas et affinitas Cum mto quo jam laborat, ut
dejectio a difficili affectu soporoso, o' symptomatico,
si Cum Conitatu p'nter excretio, malum p'ntendat,
et Deterior fiat Status, p'nter. —

2^o inspectioe Gravitate p'nter patet fluxus p'nter:
p'nter copioso em molliores, et fatentes observant —
dejectionis, p'nter copioso Liquidiores, et lymphaticae —
apparent, p'nter bilioso Desunt p'nter mto, a tunc

40
Flava visidens hancumti. Casus a q̄b, sobolēdit
affectus facile dicitur et medicus, h̄plorato lacte
nutricis, Cognit is libis q̄b vesit, parvenā ignis
Constitutio, Tandem an solus v̄ Cum alio Conjun
gati mō, ut difficili dentificō, acurato simplici
atum hancumti Certior h̄rit.

Prognosis.

Cuilibet alio profluvio speciei sua Convenit
Prognosis et peculiaris hancumti. Dicitur h̄ventum:
observari oem stercorum plurimam salutare ee, neq.
difficile curatu, modo t̄n dicitur v̄ h̄re veret. tunc en
v̄ Casus periculo, praestem si excreti fuerint vermes
dejectione graviter fectant, prodesnanti visa, et
appetitus, et auerato febrilis turba: at v̄o si
Solitos limites exierit, nequāq̄m suppimentum v̄
Cum retentum, frequentia Convulsiones afflunt
Sopororum jutalisse Constet, Contra v̄o serosum +
persistence durat, et iensim et hinc hancumti Consumptis
vires, Leucophlegmatica et hydrope terminat.
pessimum habendum e biliorum, in quo
dejectione virides, Flavae et aciores Deprehendunt,
Simul Cum ventris jutumescencia et febrili
organo, a v̄o violentiorem. Stimulum jutā
jutantē fistula jutestinalis fibra, ut exinde

41

in dysenteriam, inflammationem viscerum, et
Suppurationem degens; unde manus et atrophica
terrellum in partem consumunt, deniq; si crista
talcant & nigra fuerint & leuior adest suspicio
Fistulam intestinalem fistula gangliosa proxim
iores. — Casus pag. 173.

Capitulum De alii obstructione

Sepe accidit ut alvus & solat & Eborior et Cypri
ior in infantibus lacte nutriti, ob victum succiduum,
et laxitatem intestinorum tardior uentis et pigra
erant & Constipatio alvi nominata, rectis defien
tenda. Alia imminutio alvina non & cum Cur
varius adiunctis Symptomatiis. —

Cause

Causam proximam adducemus ex imminuta
actione fistulae intestinalis, qua faeces alvinae
sufficienti nisu per Baclum intestinale nequaquam
impelli possunt, deficit autem & imminuit Fibrae
intestinalium motus, Duplici potissimum ratione,
i. nativa & Congenita Saepe villor. qui in parte ob

Laxitatem debilitatem aut Compressionem, simulam
 applicatum & sentient, hinc alimenta acida, & frigida,
 deurbibus in locis humidioribus, Lac aquosum nimisq;
 serosum, quibus diathesim, et contra humorem
 bilionum pancreaticum, dilutionem vapidamq; detrahi
 nobunt, pro casu remota habenda sunt. si vitia maxime
 a fistulam intestinalem provolvunt, si em nam
 sua crassiores et viscidiores hntent, retineantur —
 deinde partibus intestinalibus adherant, et mucos
 quoddam tenaciori & crassa fistulam intestinale
 obducant, propter quod difficilius per rursus et giro
 intestinales moveri possunt, ob coesionem moleculem
 accidit insuper ut nullum inferat irritatis sensum
 febris renens, que velle musculares ad contractionem
 sollicitari queant, proindeq; minime actio intestino
 in contenta: hinc Lac coagulatum & nimis
 viscidum, alimenta ejusdem generis, qd, viscido melle,
 & semina sicca nimis intestinalibus, alana opposita
 priori casu, alvi Constipationem natale, prebere solent.

Symptomata

1^o alvus adstringi, et contra hinc contenta in
 intestinis moveri nequeunt, quia mole qtuata
 partibus distendant, et distractio idem febris renens
 inferat, unde Dolor, Compressio partium vicinarum,
 & soporem et quietem necessario interrumpent et
 anxietates

anxietates advocabunt.

2^o Comprehis semel intestinis et partibus Cliquia centis, a mole et quantitate fecum, retardatis necis Liquidor[?] vites in abdomine unde ventris intumescuntia, a modo Conjugitis Cum Calore, siti, vigiliis, et febre, interdum ab eisdem separata, prout Contigat[?] fovei a maiori rarefactis et intestina exsiccantibus, et a laxitate et inertia fibrar[?] intestinalium. —

3^o feces siciores et indurata in transitu graviter afficiunt, saepiusq; vascula minima Dilataant, — usque ad ari in pedis termina, sicut et fluxus quarundam guttularum Squinis, et dejectionem Conitanti.

4^o Tandem si affectus perseveraverit, macies et atrophia declarantur, et solum ob vitiatam chylorum varium etiam ob impeditum hanc fluxum chylis Concreatis, et inertia fibrar[?] muscularium intestinali[?] Motuque eis illata, dependentia ab impedito fluidor[?] pura morantur Cliquia. —

Diagnosis

Numeratum alio vitium per se manifestum, et relata nutricia in famulantur evidenter patet. Cui vero detegi sunt simplicitatem et Lactis Exploratione, si etenim ventris tumidus

aleat, infans, nri, anxietatib; et vigiliis, p̄m̄t̄,
 timulq; faeces multum indurata & crassanti, p̄diciū
 Saluum adstringi. Siccitate s̄t̄it̄e intestinalis, et
 Stimulo applicato: Sculis v̄o' Dm̄ nullus erogat
 Calor in tumefacto abdomine, p̄s̄ habitus n̄d̄o -
 II Superiora emittit, et exeret̄a p̄anum viscida
 et argilla adprehendunt, p̄dubitantur m̄s̄et
 signum, alvum constipatam eē, ex tenacitate
 m̄arum in intestinis Contentarum. —

prognosis

Clarius contingit ut infante: q̄b; alvus adstricta,
 faniores diutius vivant, tutiusq; p̄s̄ e alvum
 laxiorem q̄m̄ sup̄p̄on̄ eē. et̄n̄ alvi adstrictio
 siccitate intestinalor; et stimulo lateri tergendot
 cum lominia s̄t̄im̄, vigiliis, p̄s̄ adjuncta h̄b̄et
 herniam. Soporius Determinet, et in graviores -
 Athalesq; m̄b̄os degenerare p̄oit, majus portendit
 periculum eā e a laxitate & crassum, timulq;
 Tenacitate matrem originem ducit. De minus si
 notabilior succorum copia cum sanguine confusā
 atq; et ad sup̄rema mat, tunc Soporos et
 delirium & crassi p̄ueros jugulant, cum jan

45

impedito Liquore p^r inferioralescitur, major
q^uitas ad tuncum ascendente derivetur, unde
Gravi inflammante meningos, & opprimitur
Substantia Cerebri. Curtas pag 177.

Caput 9^{um}
De ani Decidentia.

Maā est in pte debili et infirma deprehenditur
in infantibus, Leviorq^{ue}, Conatus ipsis nocivi
esse solent, Saepius etenim contingit ut post
alivi depositioem sive frequentiores, sive raras,
anus proidat, seu q^u idem e, veli q^u d^u raras
extra anum remaneat: tumida admodum, seu
absq^{ue}, inflammatoe, & dicitur q^u hunc locum
reposita, rarius et levisimū hēdit, & sedente
egrediendi non tenovato, Donec tandem continuatā
Longius hujusmodi pte exiit, vix sedem suam
necesse relegere pot.

Cause

Caā proximan ani proidentia tribuimus
Laxitati villor? Compositum membranulā
veluti, et Relaxatiōi Fibrar? Carnearum p^rinctarū
ea quippe e vasulor? Laxior Compages, ut v

46 nimia sereni humoris quantitate, ad quendam partem
depluentis, & violentiori visum, habitus tenuis
deperdant Conceptacula, et difficiliter ob candiditatem
caeram restitui possunt. illa autem habet juveniles motibus
et fibris Carnis Sphincteris, his etiam ita laxatis
Compages laeti, & minuit actio Sphincteris, ut
impulsi et descensus maerum nullatenus obstant.
et tunc visus, proindeque, anus quasi prope deat.
hinc ea ea de fluidorum ad intestina fluentium
augere quantitate, ut Cachectica Constitutio, nativa
Laxitas glandularum intestinalium, decubitus
in locis humidioribus, alimenta ejusdem generis,
sive nimis equorum, & ex alia parte faeces nimis
induratae, mole majores et coarctatae, sicut etiam
Confusio aut morantes, & Sphincteris vim
et frequentius inferentes, pro Causis remotioribus
habenda sunt.

Simplex homata

1.º Saxari simul, stagnante, fluidis
in faucibus nequeant membrana intestini recti,
quae passim illa impensius turgescat et distendat,
unde simul prolapsa, tumida, notabiliorum
tumorem efformat, quae si ad hanc pervenerit -

47
molem ut angustentur vasa sanguifera, et tumores
retardate liquor? Circumtus, dolor, livor, dalaabunt.

2^o pan illa ex stata nuch. d'ino ta, Congluentib
et torpentib liquid in distenta, sicut et externa,
papa injurias, nequaquam restitui, aut si reponati,
Consistere nequit, ob ultiorum vasulorum omni
dilataoem superantem Capacitatem ani, v
jestiam Sphincteris, debilius, deparitari. et tenuit
atem ani, restituentis.

3^o peneverante tumefactio vasor d'umpuncto
membrana Coisantes, effundunt Liquida, fit
Suppuratio, a jtuus retenta, febrem lacteas
marasmodum producit v Sinus, Callus, et jnterdu
gangrenam determinat, ob Suppeditatas Cruoris
pticular pusulentas, facit amq, ptium vicina?
rosionem.

Diagnosis

Cuius providentia, vasium ipsius eventum
determinare solet, quoniam jugendo, periculo -
vacet, nisi tumor jnlusu, exoritur, v alius
pusillio. Ludois gravius tractet, aut ad jrestam
morem Et Suppuratorem vergat. Ita nimio -
egerendi Conata pendeat, faciliorem dato maturius

auctilio Curacem suscipit, quæ si a laxitate
 vasculor^{um} simulq, cum alio fluxu conjugati.
 Demum quo^{modo} anus extra naturalem sedem diutius
 remansit, eo alterato, et difficilius rejiciantur aut
 retineri potest. — Curacæ pag. 179

Caput X^{um} De herniâ

Debilitas est à dominiis claustra solentq,
 prostat peritoneum cum musculis epigasticis ad
 sustentandam partem contentorum mollem et
 impetum, et idcirco facile rictis obrepulis,
 refugium mutant, exprolabunt, et inde naturali
 motu apposite vitas sensibilibus emittit et inuenit
 in infantibus et solent ex molliori vasculorum
 compage, et potissimum ex aucto momento
 viscerum fluctantiam, et contra ad turrim
 clamores, violenta suspiria, fletus, vomitatus
 et inordinatos motus, facilius Delatâ, et
 Leniori Stimulo commota efficiuntur nituntur
 ut per Continentes actionem superent, et recessu
 mechanicâ e sede naturali Delabuntur. Hinc parvi
 magis et obnoxii herniæ et definit et tumet

oriendus a prolapsu intestini v. epiploentis aut
utriusq, simul p annulos abdominales. 49

Differentia

Multiplicis ratione differunt Hernie, et Solent
dividi in completam et incompletam: in species
datis dum intestinum aut epiploon in Scrotum
descendunt. 2^a vo' species designato humore in
inguire: porro si intestinum solum delabatur,
Intorsile, si epiploon, epizoclele, & utrumq, —
simul entero-epizoclele nominato. Tandem his —
vario et præcipue herniarum differentis, alius addi
pnt a hujus loci ost et ad tumores Scroti —
pertinent, si nempe scrotum a flatu intumescat,
herniam flatulentam, si ab aqua aquosam
appellant, a dem' communis accidit in inguine
dum rursus peritoneo solum, humor aquosus in
abdominis cavo pect' hujusmodi, profluit in
scrotum et in tumorem attollit. —

Causa

Si vincti visus situm Continentium, et Superanti
 repagulo, Coni e Contenta in patentem Lorum
 clabi, adeoq; Caam proximam hemic refundimus
 in protinaalem Laxitatem v. ruptioem situm
 Continentium, et praesertim pectori, quorum
 rae intestina et omentum in iugina v. scrotum
 descendunt, prior Ca Commune a hemic lobis,
 etiam membranam dilacerari aut rumpi pot,
 quasi impossibile videti, nisi Casu violento,
 vulnere v. iugenti Conatu e fibras Contexentis
 Confestim scindant, et a mutuo Contactu separent
 e qdem variis Contingere solent dum Laxitas
 modo determinari pt, v. aucto nisu et
 momento h. Hc Continentium, prior modis
 tribuendus e praesertim in infantibus, vultuosis
 nimis, gestulatis, Continuis, tussi quibus retent
 ion iactantibus indinatis, difficili et graviori
 saum Dejectioni, v. ita aucta Contractioe
 nimia et violentiori musculorum abdominalium
 et Diaphragmatis) actio visarum fluctantium,
 et praesertim intestinosar, et validius qm par
 impingant in membranas crescentes, sonum
 ac sine sonu h. homin vigeant, et ritionem
 ultra modum extendat, unde prolapsus hemic
 qu e

qui cōtra dispari modo laboris gr. visis, ob equitatem
Sicilicet, ponderis, gravioris, elevatōem, p̄missa cōm
laborum, vomitur, vō' violentos motus, qui muscul
arem visum p̄tendere, v̄ liquidos? Cū vultu cōm
Summō p̄te accelerare valent. —

1) Prostatior vō' modus Dependit ex laxitate villorū?
Componentium p̄te Continentis, qualis observatio p̄
p̄uicis Constitutio Humidioris aquea Latorem —
Copiosius suppeditante, quo imbuta semel fibrilla
tunc Decidunt et nullam Resistentiam opponere
valent alimentis, Serosioris, & dulcior ejusdem generis
Subministrant, et reliquam suam massam exurgente
aqueo Latere p̄ficiunt. ut oleis, gelatinosis, aliisq;
Laxitate p̄uicis, Lactis, pariter nimis —
aqueo, Deubitu p̄te in humidis, p̄temporaria
calore, et p̄modico v̄ducatior? refrigerant,
et oia hanc natales probare poterunt, p̄tūm
minuēt actis et vis villorum membranas Cohærentes
Componentium, Sic Debilitata, et p̄p̄ensius —
alata, nullatenus obstitent.

Symptomata

1^o adest p̄te in d̄v̄is p̄tib, ut p̄n̄guis, seroto,
etiam modo magis, modo minus notabile, —

52
veniens aut Laxior, facile ē agrius fluxum pro
variā tēde prolapsū, et nōā plura ē de lapsu
fuerunt. etenim si substituerit intestinum ē epiplōis
inlongius annulorum abdominalium tumor
apparet in inguine, si ulterius vō transfluxerit,
deprehendit in seroto cuius insuper Determinata
mollitas, ex lapsu epiplōis, maior vō resistentiā
ex intestini Descensu dependit.

2^o nullus adq, dolor, interdū vō gravior
intat pro vivo tranquillo gradu et immobilitate
Liquidorum. Circuitus dūm etenim Cavitas
intestini facibus pretafluentibus repleta, neq,
ulterius impelli pot, brevi preta modum
distenduntur parietes, Comprimuntur vasa sanguifera
Supprimuntur liquidorū effluxus, quorum vāde
pars inflammata, et dolorosissima, simulq,
passionem iliacam Conitit.

3^o prolapsu. Semel pta facili negotio in
pristinum statum restituntur sādē ppositio
et facilitate, ut pote cum tumor nulli, impedire
obice impulsioe artificiali, v tractioni pta
internarum facilius cedat: pariterq, ob multatū
denusū situm, et patentem viam. Statim nō, salū

possit

4^o si triangulatio intestini v. omenti ad lumbricorum
 pervenerit ut nulli viri potest medicamentis, aut
 dexteritate manibus, brevi pars gangrenata et -
 phaculo cum motu commutanda promptius -
 Comprimi, cum exinde suppurato. Equis prae
 illos mesenterica infarctio circuitus, qui dicitur
 Comprimi, Labamq; vicinis partibus et intestinis
 Communicat. -

Diagnosis

ipse quidem tumor serotus, sive hernia se nota
 e; hoc vero Diligenter Considerandum, an tumor
 sit intestinum rursus in serotum prolapsus, an vero
 ex aliquo humore eo fluente, ad facilius dignoscitur
 Inspectione tumoris: etenim hernia tumorem
 Constituit qui in seroto o circumscripto, et ad
 annulos abdominales in quibus venis extendit,
 e contra vero tumor aquosus seu hydrocele -
 terminatus seroto, et praeterea accensa candela, -
 diaphanus deprehenditur. rursus inquirendum an
 omentum delapsum fuerit quod datur mollior et -
 inaequalitate tumoris, et defectu murmuris dicitur
 Comprimi, et intestinum; tunc enim tumor e -

34 durus, elasticus, aequalis, factusque, Compressioa munda
Statum praecipit. deinde de Cognoscat entero-
epiploicem seu omentum in intestina simul
delapsa fuisse, ex signorum jam deservitorum
unione: tandem maxime cavendum ab errore
indignanda hernia incompleta, sive Umbonocle
apoplegma, ateni umbonocle cito truncat, ut
plurimum sine previo ullo Dolore dante
tumorem efficit cuti Concoloris, et annulorum
foramen replentem: ex adverso phlegmon paulatim
invenit et protuberans cum Dolore calore et rubore,
glandulas inguinarum ut plurimum occupat: Dum
Umbonocle in foramine musculorum abdominalium
haeret.

Prognosis

Enterocle in infantibus facilius curatur quam in
adultis, cum peritoneum adhuc mollius sit, et
facilius uniri possit. nonnulli quidem herniam
aquosam duntaxat esse enterocle statuunt, et in
infantibus id salutare: testatur enim experientia
facile discentibus adhibitis herniam aquosam
curari, imo saepe aetate, progrossum a simplicibus
humoribus sponte evanescere: e contra vero o-

resicula valet intestini prolapsus in infantibus, ⁵³ —
Sicut faciliorem medellam suscipiat quae in adultis:
etenim si faeces ad partem prolapsam proveniant, ibique
exsiccanti et induranti, usque diuina futura
inflammatione et paronisi iliaca, a breviori tempore
spatio infantem e medio tollit, Demum si intestinum
prolapsum virtute sponte permanserit, adeo sit
intimior ipsius testis adhesio ut amplius in pristinum
statum restitui non possit. — Curae pag 180

Caput XI^{um}
De umbilici prominentia
et ipsius inflammatione

Connatum est malum hernie umbilici praesentis,
liquorem per illa in infantibus ad tumorem
attollit, interdum inflammato umbilico d-
inflammatio solet potissimum succedere umbilici-
abscissioni dum enim ex Dolosa si Ligatura non recte
peracta fuerit, in impressionibus aëris externi
quibus eo derivato atque tumultuat, brevi
inflammationem Determinare potest. —

Causa

Duplici tamen ratione prominetur et umbilicus, in
indebita ipsius praesensione, quae dum ligatur, —

56
- maj. qm pars o relicta portico, superius in
altum attollit, atq; protuberat, & laxitate aut
dilataoe nimia peritonei, cujus raso ed Loui, -
umbilicus nimium distendit, flatu et humoru
aquosi sese insimulant, et tumorem produunt, qui
si ex inflammatoe v exulseraoe umbilici
dependeat, simulq; adit prolapsu infantino.
malum ipse exumphalus, et umphucle
appellati. extrorsum aen urget peritoneum
aucta vi musculoꝝ epigastriarum et diaaphrag-
matis, v a ex laxatoe prius contextu, ab
aquoso humore etiam contentarum in eis,
imbecillius qm pars e relictata. hinc pro Cae
remotis umbilici prominentia, habenda et molestia,
et continuata nimis infantina tussis perenni
fletus aut clamor, motus inordinati qui Comm
uniores et qm juvenis. Licet plures alii qm adultis
obseranda, hic locum ferre possint.

Symptomata hujus affectus adco levioris
existimanda sunt momenti, ut peculiarem narrationem
requam necesse, aliam si affectus simplex
fuerit, qd si cum prolapsu infantino v umbilici
exulseraoe complicato, vicia haec, hernia aut
inflammatoe aliarum partium sibi vindicat -

symptomata, ad eam, ad diagnosis venimus. —

Diagnosis.

Dat et evidentiū umbilici tumor, et solū modo —
 distinguendus ē ab inflammatione, & Quistione, reborum,
 Calorem et pulsum qui nunquam in simplicia —
 Prominentia umbilici Deprecandanti praeterea —
 Inflammatio umbilici promptius terminata, prominentia
 vō diutius persistat.

Cae vō Detegenda et ex progressu ut is ē —
 Consequenti, etiam si umbilicus vō recte praecisus
 fuerit, facile ex mole et quantitate apparet, si vō
 aratum sit peritonaeum, tumor nec in clamore
 fletu inmensum majus sumit; Contra vō —
 rupto peritoneo sepe vagari et dum in fletu inopinā
 jactat, vix percipitur, qui major erudit, dum fletu
 clamat, aut agitate.

Prognosis

Si umbilicus longior quā natus ē relicto fuerit,
 imperitia obstetricis, malum in medicabile censendum
 ē, ad triplus molestia quā periculi; cum Arbit
 at vō si post partum jam consolidatus extendatur,
 nimis prominat impensius, et exulceratus, eō —
 gravius judicandum malum; vō Difficiliora suscipit

curatorem, quo magis inveteratum; et non nisi in
 foris superetis annis, ex prolapsu et inflammatione
 intestinorum, Uterumque ad aliam deum et inducere.

Caput XIIIum De intertrigine

Si Cuticula Coxis, Cruris, perine, v. Confinis ania
 vera Cutic separaret et quasi abradata, Dato
 malum illud intertrigo nominatum, a frequente
 macilentos infantes, variis obor, aggredit, Cujus
 notabilia Symptomata pendent a Rubore insigni
 memoratasur a Tumore cum dolore, fere Continuis
 anxietatibus, et vigiliis.

Causa

Quantum proximam intertriginis profunditas in
 abrasione squamularum Cuticularum Componentium,
 simulque irritacionem factam in mollioribus
 Cutis fibrillis, a gravibus quae pars a Cruris
 ambientibus, prementibus v. extensi acis inusur
 Lacertis, Dolorem Calorem et ruborem in se
 determinant.

pluribus aem acis, 1^o Lintamentis, quibus involvunt
 infantes, a si rudibus in plias implicata v.
 Tordibus

...oribus, & probe expurgata reponant, tacito ²⁹ morum
exterioribus Dilatasant fibrillas et ad vivum usq;
perseverant ... 20 Distentioni morâ alvinarum
Secum et urinae, & ex natâ suâ aciores, et majores
in Deum deq; armonia gradum, ita gravius
Constringant, et Contextum solvant, tenebrosa quippe
vascula, neq; motu & aëre ulla ratione inducata,
actione molecularum rigidiorum Continuo impotentium,
vix obistere valent, hinc fit ut infantes qui
Sopius muntant, & Sinteramenta mutant, vix
intestiginem patiunt, tandem prava memoria
Humoribus praesentibus Coniunctis indole, aciori
et Calido Lacte, & alimentis ejusdem generis ab-
usu infans. —

Simptomata

1^o rubor et calor ipsi in parte affectâ observant, ob
Copiosissimum effluxum quibus ad superficiem
ulcuscula, qui ex morâ quadam tenâ incaluit,
et accendit.

2^o Tolorum costis dextera, & solum ex abscissis
Cuticula fibrillis, verum etiam & tensione
Subjacentium, & ex stimulo & indusis Continuo

60 irritant, alij, sicut ius quatuor.

2^o conservare nequit initio in febrem rebus,
quia tumultuosius agitatur fluidum retentum,
cuncta sunt iterum deserventia, et contra aucta et
immixta humorum circuitus, unde anxietas
vigilia, et febris hinc modo d'ignoscedentia.

3^o tandem nomen et Concomitatio declarantur,
et indicantur praeterea dicitur et Symptoma nutritio
et Dolore, motu febrili, et anxietate nodulorum.

Diagnosis

Impetum virus, et dicitur Sitis intensus, evidenter
indicat, dum tunc patet ex Symptomate, et febrili,
Sintus, acrimonia viscerum, et Lactis.

Prognosis

Intersticio facilius remedia etiam Leviora vinci
sunt, nisi forcat a Causa interna, et Longius
contendat, et durat. a Sitis cum macie et febre
sunt conjugata, et dicitur nullum unquam immineat
periculum, sed in aetate judicanda est, quae dicitur
inter extitit, et Symptomata magis servient.

Curtas
pag 142

Capitulum XIII.

De Crusta Lactea achoribus
et favo

Licit quædam interesse, et Lincimen, jntis — 57
Augustan Lactariæ aceros, ad comp. uia nno
actacis p̄dicit, masi a lican. sit, et o'olum-
faciem, d et universam utim aggredia, dum
aceros m̄estim sanet obsident et Liven un hnt
Colorem, verum tamen daron affinitate atq; eden
putacis loco m̄dictos et setos conjungemus, atq;
Definimus ulera, seu tuocula ulerosa in arite
rotionum. d et interdum in plerique sine, p̄
f̄t solamena apparent, e' o'is. anisus humas p̄ctus
h̄tat, et afflit, cum p̄vntu maximo, et aciori
carrendi cupiditate.

Cause

Cræm proximam ulcusculorum p̄ducimus e-
aciori Lymphæ in vasis Cutaneis Accumulatâ, eorumd.
Contractum scissim rodente, ræo Cujus Liquidum
Acidum et Lymphiaticum effundit, Congravati, et
p̄sternit ad Constituentum humorem aciosum
e' memoratis ulcusculis profluentem: Lympha t̄m
abem illam contrahit, d in sinu matris, v̄
Dependentia a lactis vitio ad a matris v̄ nutrice
surp̄ditate: si etenim matris gestacis tyosa, v̄
ante graviditatem sus quâdam spiritibus, non salutis
contaminata, aut p̄natan habeat aciosam, quinz
Constitutivem, e' idem e' Avens inflicendam t̄nede
p̄diti humorem matris, e' i'p̄ta et quasi p̄m

marets, donec in partibus praecipue, & auctis,
 mali visibus sui juris facta, non o'romptis, more
 tardius exussitetur, et in motum agatur, o' minor
 exsurgat. hae impuritates illae condicere valet, quippe
 cum solo isto praesidio forvantis ea in partibus liquida,
 si accesserit ad an' in ipso notabilis laeas &
 tenacitas acrimonia imperfecta deperat, vitia
 illa in partem cui supeditante horum redundat,
 non a, qui semel inquinatus, non notitiam
 humoribus & coarctationibus existenterit in partibus.

Symptomata

1.º molestior eriget pruritus, et deorsum
 in parte continua irritante, ob presentiam
 moleculari rigidior. Symptoma acris et coarctae
 affectus in fibris vicinas, atq; fortiores
 sollicitat d'icacem, qm ad levandam, irritante pro
 t'ose multiplici sp'untionis lennem componem
 capiti fuerunt.

2.º ulcuscula memorata latius distendunt,
 et varias ptes obent de partibus, et not' d'icacem pro
 nitio q' d'icacem acris lunde, simulq; p'ced' raris
 et, anici & lud' d'icacem vasa continuo redunt
 in idemq; raris, et succedentibus p'ior raris
 communicant.

3.º interdum inflammanti et tendenti vicina
 ptes, o' lo'um ob irritacem qm determinat ex d'icacem

vasculis, et humorem acriorem inspissatum
 sunt in vasis, qui constantibus fluxibus magis
 rubeo densatis, et intimis conjungitis, et
 determinandam eam consuetudinem mutam, magis
 aut minus duram, sicam et venientem pro-
 diversâ q̄titate humoris effusi coagulationis et
 assimonia gradu.

2^o Latis variâ humoris fluxu et corruptis indole,
 sicut et in eis stagnantis q̄titate et nâe, diverse
 compaginate exsunt moleculâ constituentes, et contra
 variâ superficiâ, maior aut minor æquitas, aut
 profundior, rictuum et serobâcularum concursus
 in partibus sic aggregatis, unde color vividus, siccus
 aut viscosus: in fustis aut in lanis profusente.

3^o augentur in dies visera, et in partibus vicinas
 s'erpunt, ita ut caput facis ab eis obsidantur,
 ob auclam morâ liquidorû assimoniam, a
 vasculis in vascula, et effusis sanies pituita
 progerminat.

4^o Decidunt capite, vixq̄, ullo in loco affecto
 nascente pice, seu exinde inquiriti humo-
 nutrienda lome destinatis, pmo et irridante
 canie acioni obulbore radice, q̄s implantantur. si
 tunc intus valet sit, et post fricticam morâ inquirat
 per et adhuc pilos veniatum in, ut pote cum o de
 deceptum fuit locum. Dominium v̄ o p̄o duntaxat
 contaminata Syngcha nutritia.

Diagnosis

Saliquos, insonnis et, ollicitudinē car. et obisio.
 et dānus admodum e affectu his e tpe ibi e pate
 proatib, et communior pueris, qui neq, etiam nobilitate
 parat. —

peduuli aem ut terent ocs et animalia una minima
 quadam tenus plana, nisi humoris in sensu —
 et atusenti, e in lutiis us afflicte desistant, et
 potissimum in tpe capillos soligunt nisi cum in nodum
 et copiosius den multat uant, si uo curabula
 prosequant, dentes is prodeunt e qbt, postea sunt
 peduuli, et suadet ex resia, cum nisi dentes sectie
 a tepis itret, frequentia distahant, magna
 exinde peduulorū multitudine exeresiat, et exclusio
 eimel peduulis proia capilli hōventia hōpitum
 amplius si dicitis compingant, ut ante in uisioem
 nullatenus dant. —

CAUSA

Caam proxima in amuimus ex distandiori
 humor. tpe factio, et humida infantium
 tpe, e ovarum hūmorsis garent, praesentem
 in lapite ubi copiosius e halituum dimissio, et
 tatio e animalium. recessus, e in capillitio
 qd in hylia morant, et accrescunt ea aem —
 a uulata ad sensu aem peduulorum desiderari ex eo
 uincit ad a uio aduulorum than pinto, cui omitt
 aut regellat et agminatione praesentem atq. morituo
 noscere medicis soleant, cum in utroq, cum v

70 atq; ignis, incredibile videtur, talia & tanta mala a
 suis Lumbriis, tubercula. Commerciorum et enim unum
 monstrat Cardialiam, hincogen, vomitum, singultum,
 tormina intestinorum. Capitis, Dolorem, & obres arterias,
 anginas, Convulsiones & tonnum, Decidias, soporem,
 ab oculis. Cunnulo posidentibus imo et observatur
 e Lumbriis aliquid intestina et ventriculum pervadit
 et h. umbilicum atq; inguina foras eruptire. Et ut acci
 e Urgentia in Thomacho adu. toro. hinc adire qdop,
 vermes oboleant, verumta in illi. producit, vomitum,
 quosdam obno. ia e potissimum tenaxior etas; o. tr. ob
 juipientis, vita. Daurus ipsi equaliter fasset et
 quinq; fama sit in ipso linu. matris. Lumbriis in
 infantibus gonitis fuisse, et ab editis paulo post
 exister, in fovea pueri varrii typis, iam juventis
 adolescentia, que nempe Lactis et nutrientoris
 ommissione. omi Coctorum humorum Copiam
 cumulare solent, in fensima aalium prole abundant,
 etenim qd mirum e) In eo Lactis nutrientis, et
 vesunt in fants, conquinque, refunt vermes, neq; in
 machina. ois Lactiferae fonticulis provocata unquam
 reliterunt —

Differentia

Tres admittunt Lumbrios. Pars, alii en
 frequentior et notissimi, et brevis, Lumbriis
 terrestris, tenuis, plerumq; te Longioris, — ist

71
farina, gemulis et nodis quodam distineti, alii
parvi vermiculi Diati, vermiculi qui & Carco et
vermibus vocantur huius, priores in ventriculo et
intestinis tenuibus delibant, posteriores & fluidis
minoribus coagmentati videntur, ultim. tandem in
intestino recto tabulant. —

CAUSA

reptilium ova cum alimentis et aere formae Cerevis
glia, ad ridum intestinalalem delata. simul cum
solandiori Salte, calore et humiditate, pro sua
generatione vermicum tuent: a nullas haud dubie —
mouebant controversias si attendamus 1^o ad
Seminia calcule. 2^o ad satentia ingesta, ut Triticea,
Lodcum, Farra, fructus. 2^o ad humiditas infantium
intra ventum quod certum ori relaxat, et per ovo
conclusas amicae teperatione ad motum et accessionem
enim dixerit; Causa vero remotior, petenda est —
ex natura quantitate alimentorum assumptorum, et voracitate
qua ingeruntur: raris namque, si ca. Concoctu
pisciculis putredine viciniora h. t. v. et fructus
Pulvis & Saccharo condita vermicum genes in
multiplicare solent; si vero raris habet copia —
ingeritur. Cum debilius pueror. Stomachus, mai.
qu. rar. & copia assumpta probe conqueere &
et attenuare oportet, quibus evidenter fore cumicando,

92
Incol Detentio, qui in clario omni. Faciunt —
promovebant sine qui alimentis aperante in gante,
In aliis obsidens vermibus, tanquam si ad huc
superans foret alimentis. Coxia, o dentur et
reptilium, qui et imperium, si voraciores fuerint
muri, cum alimenta quasi salivo actione et dentur
moribus, intacta delatant ad ventriculum, a ad-
humore gastrico et viscosi motu refluente, o —
vivis et attenuant, unde in re coctio —
Cambria, et succorum prava qualitate, cum molis,
a stuent ad igna curio, et vitam aduente —
impartient. —

Symptomata

Quae quasi morbum non concurrunt Symptomata, —
et motat leviter, et communioris et gravioris —
invisibile, adeoque, si ad huc Cardiacis vomitus, et
uncos, sine causa manifesta, induentia, ob subitaneum
morbum, et irritationem florum, et casum ventriculi
a motum ipsius adaugent, et excretionem in superiora
solicitant, aut si tantum fuerit, ut sero Cardiaci graviter —
in Consonum trahant, et hunc liquidum, in Cardiacis
intervenire valent.

Ad imitatis atq, Levitatis, in intermedium vultu —
gastricus, non omni, tota obduri afflicti et obside
re, pro, imponi quatuor, et hunc,

73

Inordinate motu facti fluidum reseruum, atq; tuncat
effluxus humoris quincii et sympathici p Carotios
mularum vertebralis ramos, unice Convulsio, motus
Convulsivi operant deorsum, prout Inequalitas, -
aut equali modo Comprimunt Substā Corticāis, et
moleculari tractu, v torrent aut exagitant fluida in
Cerebri Contenta. —

2^o rarium pruritu, dentium ita ore testante, atq; -
humana ore deiciunt ex utraque succussione oris
reseruar. 2^a prout vividius afficit villos membranā
pituitariam, utramq; maxillam, aut interiora oris
Componentes, unum aut alterum Symptoma
Determinat.

3^o ventis adeo Distenditis ut pulsatus, tum rari
more reuert, atq; distensis aliunde' stetatis colore
maxime, suppressione alvi, et terminibus gravioribus,
ut notē Cum caeco dūlia q̄tetas a maam exclusioni -
ei accessioni lunariovum praequit ultimum injunctis
et vasculatū rariis, jostatinor. p̄mat vasa
mezenterica, imbecat Cursum fluidor. p ramos -
solobescente, solitamq; actionem fibranum Carreacum
ad dejectionem praepecciat.

4^o interdum Contraria accidunt, ut sine motu
v notabili timulo laxato alvi, Copiosius effluunt
mao, vigerdaq; j̄mit diarrhoea Nervosa, prout aut
dūlia, ob ultra vorem succor. turgescencia, prout
maximam villos intestinalium aut ad ventitiam

Deest solitus alimentorum appetitus, si nempe rappiditate
enteloneit augeat Digestiva, et ruga ventriculi v
tunica interior pateat et obducatur mās viscidis —
Atoniis impactis, & fibras seruas immovias —
actioni et secretioni nimis Deliquescentis efficiat.

3^o mās contabescunt in Dies, et facinoros
infantes lapius pronuntiant famina, Cum
Lactanti vermium prole et a succorum q̄tita —
Consumati, et lugentes pravis mās inquinata,
reparandis machine dispendis, prorsus impa
vidat.

Demum Lactantis non plus Cūa assumpserint,
Lumbriis o tentantē, Dum ab lactati us frequentis
patent q̄d non repetendum ē ex Defectu ovarum
numquam Deliquescentium in Lacte matris, ut pote
Cum jam repetiti Cūla oib; pro hē Destructa,
antēq̄ ad mammas p̄venerint: v̄ si chiles in
quādamtenis Contaminet, v̄ in emula mammaria,
nequaquam potit̄ fluere p̄t.

Diagnosis

Vermes. epūs latent in interiori, antēq̄ v̄ p̄
superiora. v̄ p̄ inferiora p̄venerint, respiciam
cor̄ sequentib; p̄ptomatē, in Divina Corvudē
v̄ p̄es varia quoq; sibi vindicat p̄ptomata v̄

f

acidioria: testes qui frequentiores st, et graviora
 possunt, Declarantur moru et vellicatioe p
 abdomine, stidore dentium prostrum in somno,
 rariu pruritu, quos ppteru infantes, Digits —
 immisiss cepim calpunt, facie squalida, et malis
 interdum subentib, nausea frequentior, et ediq,
 luctente vomitu, insatiabilis appetitu distensione
 venter, cum albo suppressa v plurimum laxata.
 Salitib acidis ex ovalumpentib, urinis albicantib,
 et incoctis, extenuatae eporis hie' caa manifesta,
 sudore frigido, Convulsioe Sympotimicorepente
 ingruentib, oca vermium presentiam indicant,
 qe magis competunt Longis et tectib, qm Cuilibet
 alteri speciei.

qui aen Late Lumbis Laborant Continuo,
 ciborum atq; pitu diverant, et nisi offerant, —
 latrator ventriculi et moru abdominis —
 experiunt, ita ut aliqdo ignoze i oripiant. si
 vo' reliqua termina pectemus, mitiora st. ~~in~~
 ignavios e etenim Lumbicae, Latu, intestinis —
 adhaerent, nae faula' De Loco in Locum movati,
 certissimum vo' ignum pitu excrementi,
 quicula adan Cucurbitae seminis, similia —
 luppeditantib. —

Tandem ascarides sedem elidunt in recto in quo

97

vehementiorem sollicitant pruritum, et assiduam
ad egerendum invitationem. restituta sicut uterque
vultu, et sacramenta et valetis iumentorum, et
etentem spargunt odorem. Frequenter tunc laborant
infantis, rarius vò adulti. Latus Lumbricus nunquam
in infantibus fuit observatus: Demum ascariis notis
etatem pubertatis quæ adolescentia op. pugnant.

Prognosis

Licet vermes graviores Sæpius præferant symptota
et quæ maxima infantium præter ab infensio seminis
molestanti aut jugulanti, verum tamen plures observati
pueros qui incredibilem vermium copiam abry,
ullo modo vò malis præsentis excurrunt, Lunex
nauci excretis, gravissimum vò dicam lethale
laboriunt affectu, prout maa putrida atq;
Corrupta cui aaliun debetis geratio, qui non
inquinarit, aut indurabili intestino subsistit.
hinc sit quod ad plura attendendum sit ad detorm
enandum vermium exitum in genere, et Lumbrici,
resimii, defiores, vò et majores, minoribus. multi
rubri, pauci albi incipientibus acutis morbis: si lumbrici
tunc vivi deiciantur, restitentes morbi judicant, -
inclinantibus ætem mortui, resimii et omnis. si pariter
Frequens urgat puellorum arthritas, et frigidior

Invasente Epizooticis, motus sequenti Aë-
ritus pra.

Quod attinet ad Satus umbriem, motus o-
mnes, sponte interdum exigit, & fere huius Conserescit
nisi quae iam accesserit ut prorsus vultus, motus
insoliti, & aliarum Causarum Concursus, ubi omnino
Hydrope et alioquin ab hoc verme Consumptis
experientia docuit.

Tandem ascarides nullum instantaneum
notandum periculum, & praeter stimulum
molestem, et importunam exoritur Cupiditatem
ulera ani, et abcessus, fistulas in medica bilis
Sapientia determinant. — — Curio pag. 147

Capitulum xvii^{um}

De ventris et hypochondriorum
inflatione.

Dum Lactis solim fonticulis saturatis praesentibus
memoratae intumescunt rursus patientes, &
semel ad aëritatem, frequentius ventris sub costis
intumescent, et inflantur hypochondria; o statim
ingruunt lymphomata, in quibus eandem statim
servare Visum, rursus clauso quodam typha,
in diebus tumet abdomen ubique, Dolore, Linguam

appetitus, levit gausi color, proster nunti ⁷⁹
poder at Crura intumescent, puel contubescut,
intardum mollior e et Compressio Capae abdominis
tumor, modo Jusu, et veniens, proster in
ingruentibus, d. p. adjuungit in Decursu febris
—cula Cum haerbasib, Citis.

Cause

Causam immediatam deducimus h. induraco plis
alleguinis, et obstructio vasculor. megaricor. —
suum vase Liquida stagnant Et Congesunt in
vasis mesentericis, hepaticis, splenicis, gastricis: —
quippe Jato obstaculo in glandulis Troglobatis —
mesentericis, Lympha p. appellen, via resocia —
magis ac magis tarde gradit, et impedito Curu —
densat, obies multiplicat, atq, in vasis vasaquli
Derivati in Collateralia vasa, a p. p. adjuungit ad
acceptum nova molis momentum, surgent, —
distendunt, oscuriq, Compressioem Ductib, squifris,
venosis proster in Jasant, ab utaq, liquor in
propris vasis p. atq, modum Cumulat. memoratum
aem Lympha ritium Contrahit Solidior. et
fluctuorum Labe, vasuia em Contaminant
ad fovendam obstructioem si inertia h. d. h. sint, et

40 ignavo motu insurgunt in jam torpentem
humorem, aut si praefataam sicca vasa, ala
diametrum tenuioram, v. alveum ampliorum
aliquid affluens offerunt. qd vasa impaviam, aut
in ipsis huc et Lympha demorant. fluida vō
obstacula in variis Determinant, h. Coagulatione,
Crassitie, et molecularum Cohesione peccaverint,
ita. ut p totum Funiculum, atq, meandros ductuum
libere transgredi nequeant. hinc alimenta viscida
et tenacia, intestiva Comedens a sumptio,
Lumbitis in locis humidioribus, piperatorum et
acrium frequentior usus hinc Casus motu habende
At.

Symptomata

Tumor adest in a Homine ob Lentorem & Crudorē
a vascula mesaraica h. intestino. Obalescentia
lens in h. hinc Sensus Dilatando molles-
centiam imperiosius augent, a tē Compressionem
patientis, ex Laxiori venarum et Lymphaticarū
Lusculorū Compage.

2o Dolor et Calor adjuvanti, prout semel
impedito Cruoris et Lympha Circulatio, p vasa
in fascicula humorosior moram trahente, quadantibus
expandante, et rarefiante, qui motus

communiatu. mai et flatib. in int. t. in — 41
atitantib., ad int. aereorum adorem intendendum
o primum congest, neq. in inflammatione ad huc ducit
dilatata, qui p. liquida p. atuer. substantiam lentius
provolvata, paulatim in ignis congerunt, & sepius
prodit in fine m. ex costructis notabiliorib.
ramis maximam Quoni, effluen. p. tem. invidendum
3o Sensibilior e in utroq. hypochondrio tumor et
renitentia, tum ibi. subjacent reperi et dicit
viscera insignia, o laxiora comp. ege. co. h. s. e. n. i. a.
vini d. o. q. Quoni irrigata, magis ac magis obtundunt.

4o n. r. emaciato et f. ab. o. s. e. n. t. a. Consumit,
o solum ob rariora alimentorum ingestorum
et immunito f. am. i. s. t. i. n. u. l. o. Copiam, verum
etiam ob luppeditata crassiora ch. i. l. i. m. o. l. e. u. l. a. s.
o nullatenus Digestiva Lymp. h. a. elaborant, et
reparandi humori impares evadunt.

5o facies pallida et Duolos observato h. —
impedita generosa globulosum purpureorum
dependentis a Depurata hamatosi. Cujus rari
rappide et effete moleculis p. vascula capillaria
et h. t. e. n. a. Circulanti ut provolvunt.

6o pedum intumescantia et Collectivam aquar.
in cavitate abdomini, et ut reperi, ex reperi
subortis in vasculor. o. m. n. e. r. a. n. t. i. o. r. u. m. h. e. p. a. t. i. c. u. m.

at splenicorum prole, et summam Curori et
Lymphæ ex inferioribus, redantibus resistantiam
offendendo, stagnationem humorum Lymphaticæ, dilatationem
ostificiorum, et solutionem produunt. —

Diagnosis

Cognoscitur hæc affectio, quod ventriculus et hypochondria
sunt dura, inflata, et præstant angustiam sicut
ostificæ superioris Complanationem quasi Cardiacam
naturam: ad hæc accedunt quod Difficile trahant
et præditum, vix præsternant, pallida sit facies,
et lætæstus quodvis habitus, cum ventris
intumescencia vix pedum notabili tumore, Quæ
vix prædicant eam a præteresse, et victus tenacior
vix humidior, Sæbes mibi prætereri, facta, intermitt
entia, et similia, et solida et fluida eo modo —
Contaminare valent quo requisitis ad produenda,
vixesum abdominalium obstructionem. —

Prognosis

inibus iste periculosis, lætæ opinione vulgari
judicandus, et fore præter in affectum immediabilem
degenerat, potissimum si mali radices in proprio
vix excinduntur: etenim quæ maxima pars quærorum?
qui chronico morbo lætæstunt, obstructionibus
mezentericis

merentiori hinc, in hac parte indurati; tentant,
 a Deo ea accedunt Symptomata. In rorem a Febre
 facilius suscipit Gestationem modo recta dieta raro accedunt.

liberi Divitum o tam frequentia quam rusticorum
 et pauperum nunc modo obnoxia est, ob Diversam
 alimentorum naturam, & in angustâ domo tenacia et
 crassiora suppeditanti quibus, Deum apud notabiles,
 cibi optimi succo Concedenti. tandem si malum co
 processerit, quò infans Febre lenta et emaciatione,
 Consumptus fuerit cum ascite, et abdominis tumore;
 (univocalis viscerum atonia, præcipue, viscerum
 imbecillitas, iam præge' Defunctus Clement —

Caput XVIII^{um}

De Convulsione et motu Convulsivo.

Convulsio et motus Convulsivi quibus, in fanle,
 frequentia tentant, tunc paucissimi affectus, d
 Symptoma verminus Latentium aut Cujusdam
 Stimuli nullatenus habenda est, verumtamen
 cum faciliorem parate Debeant Criticum ad
 notitiam epilepsie tibi gravioris et Communiori,
 tenesâ et alio, iudem paulo fusiis immorabimur,
 ut nil spectati emolumenti nobis Detrahatur.

Convulsio tæm nihil aliud est quam constantis et
 permanentis Contractio musculorum. Dum contra

motus Convulsivi Tendunt eandem Contractioem
 & inordinatis motibus agitantur. in 1^o Casu videntur
 spēs, tenduntur impansus fasciculi Carnei musculorum
 eandemq; spēs Conservant Soci Differentiam: in 2^o
 vō' seu motibus Convulsivis, membra in oem sensum
 quatuntur et agitantur, et contra o equalen Directionis
 tenorem Conservant fibrae Carnea.

Differentia

Varia Notiones et utriusq; mō. Distingua
 Desumenda hunc nomen p̄tium affectuum, et
 Sede Convulsiois et motuum Convulsivorum,
 et Libe variā v̄ variā o affectum Convulsat,
 Demum h̄ complicatio motuum qui p̄nt adungi
 hinc varia quae nomina p̄dita fuerit variis
 Speciebus Convulsioem, et univernali, p̄ticulari,
 et similibus, hinc etiam pro Sede Convulsiois,
 ea vocatū sicut Sardonicus, dincus, Arabi, mus, &c.
 hanc Complicatiois alia dicitur Convulsio simplex,
 altera vō' Composita, prout simpliciter affectus
 nervorum, aut vitio fluidi nervi Determinat,
 v̄ insequitur hanc hanc, febrium, putridarum,
 malignarum, decursum phrenitidis et mania,
 et aliorum affectuum Cerebri. —

Causa

Nullum diuersimodè assignabant veteres, intèr
 Convulsiones et motus Convulsivos, ad eorū, Causam
 proximam equalem statuabant, verūm aliter -
 sentientes, iudicamus Longè Diuersam eruendam
 esse, quippe Cum Convulsio spēs Dependeat a
 majori et perseverante influxu Lymphæ
 versus fibras musculares, v. adela-casæ et
 paralyti musculorū antagonistarum; Dum motus
 Convulsivus necessariò Libuendi sit inæquali
 derivatōi et quasi alternatæ immixtioni in eisdem
 fibris, quarum rase Diuerso et inæquali momento
 rituntur et Contrahuntur. —

Spior Causa Convulsivis apertius Demonstratæ in
 naturali Hereditio musculorū ad ullatenis peragitur requit,
 nisi a remorato influxu fibrarū carnearū replentæ,
 unde si major extiterit, neq; interrupto Cum -
 moveante spiritus unda, Constantem futuram
 esse musculorum actioem Cōm e; interea Sicut
 o uberiori fluxant spiritus ad partem muscularem,
 si ponatur paralyti obductio notabili, in
 correspondente musculo, equalis subortus erit
 affectus - etenim Cum plerūq; humana machina;
 sibi invicem Contrahantur, quidam Superalo -

nisi, alia vitia erant.

posterior vero referenda ad motus Convulsivos, patet,
 & solim ex casu, producentibus motus Convulsivos,
 verum etiam h. modo quo se habent muscula.

Causa aera & potest aiam praebere Convulsioni
 & motibus Convulsivis, deducenda s. h. Compressione
 equali & inaequali tuborum nervorum, praesertim
 in originem. hinc vulnera Capitis, peractantia, Concussio
 violenta Cerebri; & tormina Dolorifica abdominis,
 Colica ventriculi; renum inflammatio vesicae &
 alia acuta, tuborum in visceribus, tendinosis junctura,
 quibus praesertim in aera. Punctura sistema nervorum, et
 accelerati fluxus liquidi nervi, aut juvenilibus
 solita ejusdem Derivas, tunc Causa remota habenda
 s. illa in infantibus, frequentiores, natae, Ducunt
 ex praeviis Succis in ventriculo Congestis, qui
 massa fluidorum suppeditati, solitum Cursum,
 praesertim in tenuiorum vasculorum Cerebri meandris
 retardant: unde modo equalis, ad Convulsivam,
 modo inordinata ad motus Convulsivos determinati
 in nimio: modo oculis, Labia & alia p. voluntatis
 Subjecta afficiunt, pro ut in Diversis Cerebri
 tractibus haeret et stagnat Cruor; & a nervibus
 delinquentibus in ventriculo et junctura, qui Continuo

87

motu fibrarum gastricarum v intestinalium
violenter succussio, in iis Conceptaculo accersit,
v Lac acesas et Corruptas, v bitaneus multies
tremor, v intensior iracundia impletus, oculi —
dentium, v Colici Dolores violenti, Convulsiones aut
motus Convulsivos in infantibus Solent Detrimere.

Impthomata

1^o adest pti Convulsae Continua Rigiditas, ob pressam
affluxum liquidi reserui, musculares fibras tendentes,
oriundum e' Compressione Cerebri Substantiae medullaris,
v Columnas Spirituosas e Conceptaculo pti exprimit,
et ad origines reserorum pti Convulsis Protrahentia
Continua' urget: haec aut rigiditas, universalis vel
particularis ptiem Superiorum v Inferiorum,
determinabitur prout plures v pauciores origines
reserorum Cerebri, v medulla spinalis afficiantur.

2^o contrarium quasi supervenit in motibus
Convulsivis, passiq, motib, inordinatis agitati,
Cum supponatur Inaequalis v Interposita meningum
Pressio, Substantiae Cerebri, a modo' maj. modo' minorem
Spirituum affluxum promovet.

3^o aboleto v imminuto Functionum aliarum
Lascitiam, si Compressio attingat quoddam Cerebri —

Fractus, cum exinde v. ex toto v. partim prestantis
 f. fibrae medullares, representandis idcirco, eliciendo
 iudicio Destinate; Libera aem remaneant eadem
 Functioes, Dum illo Cerebro, Libera' ipiantis
 spiritus in Emporio, et fibras in debito Constituta
 tono, quatiunt, oblaq; afficiat in medulla spinalis
 & Disiunctam opem Corobrio prebet, & efficacius
 ptes musculares ipsi subiectas subefactat.

4.^o Longius v. brevius protra hunc Convulsioes
 aut motus Convulsioes, prodivant' caa' Compens
 ioem Concipante, v. vario in faretu vasulorum,
 qui modo' Conjungit' cum affusioe liquidorum,
 interdum e' obli' supervenit' orgasmo & quibus rursus
 ad Cerebrum, et ad oq; productis a compressione
 fugaci et instabili.

3.^o perseverantibus Convulsioe aut motibus Convul
 sion, et Data' caa' efficacius agente in subitanea
 Cerebri, in p'p'us ruit affectus, et vitalia Concept
 acula Dein afficiunt, ob notabiliorum p'p'osionem
 in vasulis meningis et Corticalibus, & tandem
 attingit vasa Cerebelli propriientia hinc Cu
 Cordis, et regioni pulmonatis, unde' imminutio
 motus Cordis, et difficilio respiratio: et vob' Dum
 affecti sola medulla spinalis, actioni vacant

82
pulmones et Cor, & pte infirma Confabescunt et
macie Consumunt, ob deceptam solitam Copiam
improbe nutritie, Sanguis motu impulsus, vel
nullatenus subministrata, ex affectu insubordinato.

Diagnosi

Convulsio et motus Convulsivi facile conueniunt,
quod videlicet pars preter voluntatem contrahatur, et
rigida maneat, ut ad mentis arbitrium flexi non possit,
et in motibus Convulsivis, pars variè Concussatur
et agitata. Dignitur Spasmus seu Convulsio a
paralyti, quod membrum Convulsivum a sine Labore
maximo, v. etiam dolore extendi potest, preterea in
Convulsione mbr et tendine, rigidi ad tactum
resipiunt, in paralyti vero Laxi et inertes: licet
acm Convulsivus motus Demorem quodammodo
refratur, ab eo dicantur, quod in ultimo. Hæc Conuenit
voluntarius motus, et in unam. Hinc vix differunt
resagati.

Causa vero quæ plures extiterint, reducende sunt ad ea
a præcense, v. insultum concomitanti, ut progressa
vermium hæretio, vulnus in Capite, Lapsum
violenti, hæmorrhagia, tormina intestinorum,
irritatio mediæ minuræ et similia a primariis
medico Laborem iudicare possunt. —

prognosis

Convulsio et motus Convulsivi in genera
 particulariorum statuendi sunt, interea affecti quiescit
 promptius Convalescunt: cum etenim tenuior machina
 in Leviori Squamis et Lymphæ serres tumultu
 Concutiatur et Labefactata, facilius quoque, redit
 tranquillitas, et destituitur ordo Circulatio: verum
 quò motus, in Convulsione et motibus Convulsivis
 vehementior et Disturbatior est, et plura, vicinasque
 Cerebro partes occupat, et gravissima in se est impositio
 mala, ut vitium Motuorum, incoercum, Difficilem
 spirituum, aliisque partibus vitalibus omnibus. facilius
 insuper Curabitur Convulsio, si Cerebrum per Consensum
 trahatur, ut actio Stimuli Cerebrum verminum de-
 quasi variolæ servi Laborant et afficiant: et tunc
 liquet ileum veneri, medicamenti actiois procer,
 sicut et Decursum febrilem malignarum. periodum
 ultimam variolarum et suppurationis Cujusdam in leone,
 velut inmedicabili judicanda est, et nisi salutem
 ariam Vigorem ex templo quasi accesserit, de infantibus
 istis Conclamatum. at vero idem sentendum
 de proprio variolarum et febris putida, quo ex tunc
 erumpunt variolæ et Separati quis o eliminandi
 proprii

pari suu, apparatus febris, rubeae, aut Dentis³¹
eodem quoq; misasit mōis, et cerebrum v. medulla
spinalis Libera. Curatio pag. 192

Caput XIX.
De Epilepsia.

adultos etate, novectiores, imo et Senio Confectos —
onunquā doctis, et sequentibus Corripit, quos quasi
affectus imbellis victimas alij et, unde' puerili mōis
p̄ter a o' aut doctis nominata: sive' a tenis plura in
Fenestris annis ad Lunabula mōi Concurrant, ut
revertaria Lippōs, tillat et Soreto in prole, Fortior
ca' Senioris Dentium aut vermicum oculis, sistematē
nososi Concessio, seu demum Soreto ramulorum
Corticulū et meningum Compago, aut habitans
aut simphatici parvos q̄b, in fente' hūili' resellunt,
Communione angam ruiue mōi praebent. Ceterum
aut in Senā etate prodierunt q̄n. si tenel' effugit
puer. o' ubi raro admodum in Senem patit in vltib'
epileptis eodem aem q̄oq; Denti in pueris sicut et
in adultis mōi ingruentis, Praeq; et haec praesentim
a adian' spātent q̄pam attingimus, eq; rediunt
ad stidorem Dentium et membrorum Homosom hie'
Cā manifesta, ad nosum pruritum et fluctuam, —
Somnia Turbulenta, oculorum Caliginem, sociis —

Tunc ea ratio in proximo, Læsis functionum adliæ,
 aliq; inde suboritur effectus judicant vasulorum
 Cornicalium infunctionem. Fluidi nervi inordinatam
 derivacionem, et Concitatum tumultum, adeoq; pro
 ead; proximâ et Continenti asquimus, inæqualem
 Tubulorum Cerebri Compressionem, ræoe Cujus
 distenduntur imperniis vasula arteriosa et venosa,
 siq; tenuis motus et tonus fibrarum medullarum
 suffocantur, atq; simul spiritus uberior et inordinati
 Exprimuntur origines nervorum subaccensum data
 Compressione vasulorum Cornicalium. hoc æm Cerebri
 hæmorrhagia, duplex primario Causa ad credendam
 videtur, vitio nempe vasor? Cerebri Constituentium
 utrumq; Cerebri substantiam aut Labi fluidor? pa
 ramos Cerebri vertebrales præinfluentium -
 1. vasula affiuntur eo modo quo Requiritur ad
 determinandum Insultum epilepticum, si præternaturam
 Laxa, debilis Contractantur, aut ex adverso exsiccata
 nimis, minuant solitam Diametrum: si pariter -
 inæqualitè acuta, varios angulos præformales, et
 diversa obstacula Quovis affluxum in præsentia
 afferant, aut Damnum Causa adventitia, ut Depressio

Craniis, effusio e liquidior? supra quemdam Cosetis
 tractum, premati violentius eorum, Contusio, et
 impediatis actis in Iguinea appellentem. hinc serena
 hydrocephali Colluvies, siccitas nimia atq; tensio vasulor?
 arrosivata, varices, vulsura, jets, capitis, Contusio
 Commotio magna. Cerebri et Cerebelli, turbam epilepticam
 novora solent: his spem oib; Iguis qui ad Cerebrum
 tuit, inaequalitas in vasa Collateralia Derivata,
 inordinatis osillacoib; vicina praemit Iguinea lymphatica
 et varicea, siq; ea parant ad induratum suppimentem
 exortium motu, et tenuis, cum Concursio violenta
 quasumdam ptum: haec aem 14 mali Labes et origo,
 Constantem quasi Determinant epilepsiam, neq;
 e lupari aut nisi naa vinct, atatis prodigis, et
 inveniendi Commodo, vasa aruata hndendo, n nimis
 extensa et recta inflectando, prout exigit naali
 fluidorum p meandros Cerebri Curvis, ita ut jam
 elapso anno 20: aut 30: aut 40: Tps insanabilis
 judiandus, it affectus, neq; ullatenus Considerandus
 specifice e passis Comendanti.

2.° Liquida Contaminante Coagulae: qtitate et
 rarsentia: Dum em platinam impis anto,
 egrii inde provolvunt p Cerebri substantiam: in 1.
 subsistunt, et tubos medullares Compiment, ad
 paritatis explethoria et organo Iguinis Contingit,
 liquidam sive major Copia in vasulis hndaverit, seu

95

impensius rursus fiat, perinde major dilatatione momentum
 parietis vasorum. In festo quo copiosiores liquidorum
 copiam convalescentia, sequitur quoque, ea impellent et
 urgeant, siq. haemostasia epileptica determinata, —
 sine Coagulatione Lactis, Coluvies pravosum Scurorum,
 subitaneus timor, exarctia immodica, spectri artificiosa
 seu naturalis effigies, stupendum acribus nativitas, —
 frequentior in infantibus natibus huic modo praesent.
 hoc aere 2^o spes mali fugax ea solet cum ex
 mutabili fluidorum errore dependeat, verum continuata
 aut renovata Labe, vitium solidis imprimis, quo
 mbris fovetur et hauritur, atq. dein vinci requirit, cum
 vascula aerevismatica, aut variosa huc sint, et
 naturales fluxus squinis intercipiunt, si v
 levitatis in qualitatibus innatis peccaverint. —

Symptomata

- 1^o abolenti v imminuente sensus oes in epilepsia,
 o solum ex eo qd compressa medullari substantia
 Cerebri, solitus fibrarum visus impedito, verum
 etiam a p compressione a stagnante errore
 inductam, exprimitis copiosis serum, Sarcant
 Stamina serosa, neq. ad suscipiendas impressiones
 ulla tenet compressa st.
- 2^o variis cerebri tractibus liquidis stagnantibus —

Inguigitari et Comprimi sequunt, quin Inequalitas quoq; praesenti nervorum origine, fluidumq; nervorum inordinatis fluctibus usquati, et exprimitis, in Diversam nervorum prolem, variis prospicientiam musculi, unda Inequalis quorundam musculorum Contractio, cujus momentum h' gradu potest Quibus Comprimenti, et Lympham nervorum pellentis, estimandum e.

3^o tumultuantibus, in sensorio Communi spiritibus, nulloq; undarum ordine in Contactacula utiuntur Compulsis, variis quoq; et alternata subsequente membrorum agitatione, hinc illa motuum diversitas, in epilepsia, quos demonibus, incantamentis, aut jris-Celestibus, ignavam vulgus, adscribere solet.

4^o Spuma Copiosa hervit, ob varios mandibula inferioris motus, quos salivales glandula squisita tergida humorem pleno et repetito alveo effundunt, quocum aeri violenta e thorace exillitur, multasarian confundit, unda spuma e bullulis aëris simul cum viscido liquore permixtis et conparatis tribuenda

5^o Lingua frequentis Demordet, et interdum scindit, in fistula, ob motus Convulsivos tum Linguae, tum maxilla inferioris, si etiam fiat ut Lingua e p motus Convulsivos adigit et extendit supra dentes, eodem tempore similiter motum maxilla inferioris superioris allidat, tunc haec simultaneam

97

dentium actioem lingua patiens, quæ dilatare et
scindi poterit.

6^o irregulari fori requit musculorum in viciis
Contractis, quæ immutatis quævis Curis, & vasa
pneumonica, adeq., vesiculae pulmonales compressant,
quæ nempe, contentum in vicinia utere o' p'nt, usq.
difficili progressu aeri p' tubos bronchiales, qui anhelorum
et respiracionum determinant Spiritum.

7^o tandem Tumoris p'neurae requit infarctus
Cerebri, quæ ita crescat Congestio Siquis or'at ad Cerebellum
ipsum pervenit, & o' spirituum Conceptacula, & Concom
itam p'nt epilepsiam tam in adultis tam in juniorib.,
Sæpius satis hæcita atq., digeste fuerunt in historia
nostra m'otum Capitis.

Diagnosis

abolitio sensus ois et motus voluntaris Cum r'ium
Concomitantia satis indicant epilepsiam perfectam. —
imperfecta v' notis ex leviorib. Convulsioib. aut
motib. Convulsivis, atq., sola imminutio Functionum
alium. Disq'nto ab apoplexia, ex eo q'd in illa nulla
est Convulsio v' motus Convulsivus, a Causa ex Comate,
agn' illis, agi punctis membra retrahit et loquitur,
a Catalepsi p' ritum quem p' o' Caus' Ext'ernis accipiunt
et Conservant agri. Hereditaria epilepsia notis ex-
p'riam presentem habet, aut suspicatis tum p'vol-

Observi post partum ea Corripiti et perseverat, adventitia
 vero dum post natiuitatem iuuatere solet, et quendam
 Causam manifestam arguit. Signa vero Causarum immmediate
 mbum producentium Patii patent, an motus aseris mato
 variis, tuberculis v Schirro Conicetis. Cae vero procattha
 tice, ex egi v adstantium velatu, victis raeo, piritisq,
 at pathernatis. Deuereudo it. in infantibus oem epilepsia
 oriunda a vermibus nuntati ex stidora dentium, terminis
 Inpstinov? frictioa narium, facie pallida et decolora, et
 stupore quodam Cerebri. —

Prognosis

affectus iste periculosus, et Longior, statuendus a
 tate et epilepsia a plus v minus periculi Coniunctione
 hty et Difficultate Curatione Suscipit. Neque curia
 rarissima e, v ut vera Sataant nescim Curati, —
 camq, etas v medici solertia nullatenus attingunt,
 dum contra adventitia et raeo, facile e medicis vincat.
 periculosior ea e in genere in qua functiones ois abdeat,
 Convulsio vehementior, Diuturnior e, atq, excrementa
 sponte fluant, minus oem periculi hty, v Observatio
 Insequente gravissimi, et in qua eger Liberius —
 spiat. Insuper adulti ob jam Determinatum Cerebri
 vitium oem Curatione sperare deperere Dnt, dum nescim
 deperandum e De epilepsia a infantibus aut
 iunioribus obidet, hoc etenim solis nae viris, sola
 mutaoe etatis, fugato gravore, et quodam alio —
vehementi

vehementi pathemate feliciter discutitis, cum hinc
Corrigi possit vitium solidorum, et Diametro Curvata
v. j. obliqua varie restitui, sunt, Line epilepsiam usq. ad
ultimos proserenti. Linita, sanabilem statim usq. ultra
quos nulla manet medole fiducia. si in infante mox
post partum epilepsia corrigiatur, involuere nec qu
curvari pnt. Tandem si foemina utero gaudente fortis
invadat epilepsia magnum periculum minatur, jamq. a paucis
mensib. nobilem nationem hinc vidimus insultu
epilepsia tyosa graviditatis, qui bovem in apoplexiam
Fatalem degeneravit. — Curas 193

Capit. XX^{um} De Strabismo

Interdum motibus Convulsivis v. Convulsivis & epilepsiam
Comitanti succedit Strabismus, seu distortio oculorum, &
v. solum visum quadambien. Sed et, verum etiam et
Luminum venustatem Defecit. qd. q. vitiosa oculorum
Conformatio, nativum malum Determinant. Strabismus
imperfectus matris v. matris Contractio, dum in infante
pneumonia Capite Suci aut Cardale acussa adverso, v. ad latera
posito decumbunt atq. ita oculos Continuo Suci obvertunt
quo cum in infante Colliminant. Distorsionem hanc oculor.
efficiunt in hoc vitioso oculi situ, pupilla longius
obtus v. recte, & obliqua opponitur, neq. ipso in medio oculi
apparet, & ad eo Declinat, ita ut in uno oculi, pte. plus
albi appareat qm in alio, et amborum unus, aspectu ce
nequeat, ita ut qui mbo hoc laborant cum obta vultu —

intus starent et desiderant, oculos intorquent, torvumq;
exhibent aspectum ut pupilla rectis visis objecta
dirigat. —

Differentia

jam statuta fuerunt ubi, quibus a discrimina, quippe
datis Congenitas v. adventitia, autbatum Cuiusdam
affectus superveniet, et et adunt jusque 4.^m strabismi —
differetia, nunc em visis nava, aliqde visis tyora
intusum visum, qd oq, deorim pupilla declinat, et
oculo, contorquet. —

Causa

Causa proximam strabismi Confundimus, q. mutatam
pupilla directionem, et majorem quorundam musculorum
contractionem, quae antagonista vincunt, atq; Dein solent
influxum dislocationem promoventem duplicare nequeunt. riac
aem oculor? perverna directio, plurimum Causa adscribenda e,
ut Convulsio nimium Contractis aut resolutis musculis,
ad unum lateris morantibus, a epileptis, laxitate fibrar?
Carnear? aut paralyti dependent, proseria si nōm post
nativitatem invaserit, v. vicio materni sinit, et dum matre
utero genens morbidos, v. maculata aalia oculor, Convulsio
aspicit, atq; verum fulgentium, gladiorum nempe, ignis, v.
fulguris intutu obstupescit, rapsiq; vivida afficit, v. demum
pernoso vitii humoris chrySTALLINI, cum ei pupilla recte
opponit, et ad lateris alterutrum, v. visum v. deorim —
declinat, q. a i. ortu accidit q. s. et Convulsione
aliqua detorto visu contemplantur. —

Strabismus

1.º adest Distortio oculor. v. v. etiam aut alteram partem inclinantium, ob variam Convulsioem laxitatem aut paralysem Trochlearum, adductoris et abductoris Superioris et inferioris, oculorum motibus insensientium. —

2.º obta ẽ sine tortuoso appetu Corni sunt, cum in naturali situ radii luminis nequaquam per foramen pupillae transant, et necessario requirunt Conversionem oculi ad Congregatos radios, obta imaginem debite representant.

3.º Dato statu strabismi, supposito oculo in eã partem versus quã ex determinato visio inclinatur, obta quiescentia et mota in latera opposita delata, Confusam visionem movent, et varios fulgorem excitant, ob impedimentum accessum penicillorum luminis, qui statim ab ingressu indobitam patientiam refractionem, tumultuosius quoque, feriunt retinam. —

Diagnosis

Strabismus se pateat insistentibus, neque signis quibus Cognoscatur operari, Causa vero Difficultas oculi parte visionis tractandi, id patefacit. si etenim geminatum objectum appareat, iudicium ẽ affectionum musculorum, Contra vero Causam in chrySTALLINO suspicamus, dum res in ad planum retinae et pupillam respicit Difformitas, unde oculi ita inter se veniunt, ut aequalis in utroque, fiat representatio et percipiunt. si vero ex mala Conuetudine, et defectu oculor. oborta Contraxerit fuerit strabismus, adstantes ẽ insensibilis, simulante, delatantur.

Prognosis

Arabismus, Cujus in materno serui, constituta fuerit
Curabilia, et contra prava organo. Confirmatio
dependet, nullâ arte superari potest, neque pariter qui alta, et
consuetudine aut Convulsione et paralyti nervorum presulis
propicientium radices agit, Dum contra rursus, malum
facile tolli potest. — — — Cura pag. 197.

Caput XXI^{um}

De calculo vesicæ urinariae
et urinae incontinentia.

in hunc articulum Consulto præmittimus, ut
pote cum sat fuerit, in Diacata nostro morum infirmi
ventris, generatio Calculi, symptomata, Cura conuoluta
fuerint. adeoque, urinae incontinentiam quasi præis —
familiarem uricæ prætractabimus. In fante tam dum in
Cunis jacet, præ Dederis et turpitudinis incuti, urinam
in involuta et fascias Libesicæ et Continuo emittunt,
et ita Lucice Diproni interdum assuescunt, et postea
adultiores etiam in somno, solium in Lecto profundunt.
It et in supralis qui o solùm vapore formi, et et omni
tyrōe urinam reddunt incuti. sic Defini morum incontinentiam
illud urinae profluvium guttatim et supra videntis aliam
Hillam

Differentia

Sevioris momenti habenda et urinae incontinentia
densissima, alia etenim late rursus, alia in veterata,
una accidentalis, alia habitualis, tumidam admodum replet a
Caâ externâ et adventitiâ, tum admodum, ab interni, solobis cit. —

Cause

Centrum ex physiologia Sphincterem vesicæ a naturâ
 determinatum fuisse ut usina Continuo Excretis, in
 vesicam Delapsa, nisi rivulo ex Cavitate o Diffundatur,
 et in eâ p̄ tempus incarnasata et Contracta Soret; donè voluntatis
 arbitrio, et mole et acrimonia humoris Contracti ad
 ejectionem sollicitaverit, ita. ut si quocumq; modo afficiatur
 Sphincter, quidam innumeris seu metuo adventuram
 mutationem necessum sit. Contractio autem Sphincteris validior,
 nequaquam curari potest, siquidem tenet tyoni, ex impedimento
 ad efluxum, Cumulatis humor Excrementitius, etq; Contu
 gculganda veniet Sphincteris præternaturali Laxitas, qui
 est præter fibrarum nullam accidenti ad Collum vesicæ
 liquido molem possendo, involuntarium usina profluvium
 patitur.

hæc autem Sphincteris Laxitas a multiplici causa
 comprobari potest, ut ratio inversa Constituti musci, debili
 cum fibris in eâ a tate Contracta, et absentia doloris et
 Caloris, aliorumq; accidentium spasmus et rigiditatem
 inducentium multiplici Causarum Concursu invadatur, et
 ad internas et externas facilius reducitur. externas autem
 manifestant iterum in regione hypogastrii, violenta
 injectione catheteris in vesicam, ad diluendum, et
 fortiter quæ parva fibras Sphincteris pertractando, -
 solitum tonum et actionem imminuunt, in præter
 naturalis, Tambitur in Suis humidioribus, et alimentis
 dilutiora, et immmediate vasculor. cum textum Laxant,

104 Spasmodicum ignis, gestas et languidos spiritus,
tendendis et digerendis villis motricibus provisis impatis,
Suppeditant.

Interne o longioris proveniens narrationem, siquidem
et numerosioris et curata difficilioris judicando H, ut
Calculus vesicae, progruens ejusdem inflammationis, progruens
in labi, constitutus aqueosior, provia organorum
omnium relaxatio, et inertia ad motum et in posito —
Calculo vesicae o inflammatione, continua agritate
et mole calculi irritante et stimulante fibre nerveae,
uberius advocatis liquidi acres influxus, et ultra —
modum ad tendunt villi motricis, ut demum —
resolvant tonus, robur et actio, et liquida urgant —
part, idem dicendum e de stasi inflammationis in
qua, accumulante humores, et vascula sphincteris
componentia ita distendunt, ut crassem acceptum —
impellant, et contra contractionis nisum haere resqueant,
o disimili provisis rao parali organorum laxitas, vid
ex laxitate in alimenti, aqueosioris ostium duxerit,
urina pro ut inertiam producat, quippe huc fluentes
laxata vasa gestus contrahunt, et humores appellentes,
coarctare o part. —

Symptomata

Qualitatem et Alia voluntatis actus urinae sternit,
et laxata fibrae sphincteris quorum rao appetit
Collum vesicae, et nulla objecta mole sensum diffundit

Lofium, quia portio ex materia in vesicam immittit.

2^o req, ut nullus Dolus urget, et si ptes a progressa —
Inflammatione intra diu dependeat, cum fibra ab indurata
et mole liquor. jam defatigata, impressione transcurti
urina vix recipiant, nisi ad eum armonia gradum —
pervenit, quo gravius afficiunt, tuncq; supervenit levior
discuria.

3^o vix sensibili et manifesta e in pueris q^o diu urina
Incontinentia, dum contra quasi Continua e noctem
ob temp^o maj. tensionem nervor. dum qui a cerebro et
medulla spinali proficiscenti, vigentem et Continuatam
Ignem Calente et spiritibus agitatis, ut vo' soporis —
dulcedine Lasanti magis ea vascula, et in partem
redunt, suppressit fluidi nervi influxu, unde
fibris muscularis, et contra sphincteris vesicae —
resolutioe naturali tentantur. —

Diagnosis

Incertum e an urinae Incontinentia ateli v^o mto ist
distinguenda; at vo' jam adultiora facti infante, spali
vesicundia tituli, si urinam hanc in Lectum amittant,
Dixiam Latere vitium Injicari pot: si vo' ea contigit
q^o Calculo blivdente in vesica, v^o progressa —
Sphincteris Inflammatione, propriis signis —
Et Relatis morbis paucioribus qm facile
reprehendit. —

prognosis.

Si pravâ Conuetudine Contracta fuerit ac Labor
 et nocte tunc manibus, tectis, plerumq; fronte, et
 etate progredi corrigite, cum jam quasi adultioris
 pudore et exprobratione moti, ne jacta dormiendus ad
 tale Committant magis sint solliciti: verum si vitio
 cupiam visum supervenerit vicia incontinentia, et
 conjugata cum affectibus soporis, et aliorum muscul
 orum resolutione, vix superari potest: dormiam si ab-
 ingestivo vegetinis fœris aqua potu foveat mibus,
 Faciliorem amotâ illâ Conuetudine Curasem suscipit,
 et si etate virili Continuo Labor pariter usq; ad
 Senem, generaverantem determinat. — Curio pag. 194.

Caput XLII^{um}

De hydrocephalo

aliquo' bonis humos in Infantium Capite, ita
 copia colligit, ut illud in tumorem attollat
 qui affectus, græcis hydrocephalus, Latinis —
 vero hydrox Capiti appellatur, quem idcirco —
 defensionem Censem aqua tum collectio em jacta
 ptes incephalum Constituentis.

Differentia

Differentia

Differentia hydrocephali, deducenda est, 1^o a natura
 etum a diluvio aquae inundante, hinc ipsius divisio
 in generalis et particularis; prout adan Helm encephali
 Loca molestantia gravant, et Caput de ipsa dicit.

2^o a sede Collectarum aquarum? et a Causa hydrocephalus -
 dicitur extensus, dum alia extensa soloboluit, et Cœcitant
 aqua jnta Cerebrum, musculos, etc. periventriculum, et jnta
 cranium et meninges, et jnta membranas et Casuum,
 jnta dies consumit. 3^o Facie modi; Cum jnta Caput
 independentis ab ulla alia Causa occupant, altera cum
 lymphaticis, excretionis solita suppressio, jnta
 usina, tuadesa solit. tandem hereditarius, Congenitus,
 adventitius usurpato hydrocephalus, prout a
 parentum - Tabi transmittit in utero iprogerat,
 et in Luere ditor pauliani Causa actioa jnguit.

Cause

Causa proxima hydrocephali. Deducenda
 fore contendimus, ex potentioribus tunicarum vasis,
 et eandem ruptioe et humores lymphatico-serosi
 sensim ac sine sensu guttulis continuis et pleniori
 rivulo, jnta et extra Cavitates Crani in Santum
 affundit, plerumque tunc et cumq; vasa rupta et

ultra modum dilatari potest, nisi prius quædam, molis
 et impetus liquidæ contentæ, robur et actionem tuborum
 supelaverint, et tunc aucto liquidorum momento, vel
 retardato eorumdem motu vires majoris resistentiæ gæstante,
 soliti per Canales velocitate liquida procolis nequeunt, et
 diuturniora moram in his Tubis Acquati, quibus tunicas
 præsertim duri distendi necessum est, et diuinitate ræce
 obstructis debilitatis vasis Sympathicis, a densatis liquidis
 præfulgenti moleculis, et præstare quocumque modo ipsi
 illata fuerit, ita ut Circulanti Lymphæ via detragetur,
 magis, necessario vires præsertim vasorum exeret sermo —
 Lymphaticus humor, et a vasis ut — potest debilitatis —
 sustineri non poterunt, utiq; tenax membrana in infantibus
 solida Componentis et sumptis, et ora eorumdem
 interstitia aduenit, eo quo pariter modo ad fluxum
 humoris sero-lymphaticæ, ut facili quilibet experiri
 potest, notabiliori vena animali injecta Ligatura, porro —
 eorumque tuborum robur imminuetur, et Daugwe fluidum
 Circulantium actionem poterunt, ita ut ipsorum vires —
 ipsa vasorum resistentiæ habitent, inter cæca remota
 Hydrocephali — recommendat. si in partibus obstetricæ
 Acquis præculta et temeraria compressio, imò et præculta
 uterum indubiter præstanti vita, que quadambatenus —
 Curam Liquidorum ad Superiora sine diffundentiam inhibeat,
 uterum ipse ad hydropticam saltem vergens et ipsa
 tentatis, leucophlegmatica matris distans, ipsius —
 præsertimque pituitosæ, vehementiora et pathemata.

trahunt, unde nisi aquarum distendentium resistis -
reluctantur.

4.^o Impulsio et propensio ad somnum dolensante tunc ob-
rapidam et effatam fluidi reserui qui seruiti nam, &
minus futura & villosum motricium tensio, tunc etiam ob
Compressio in illatam nervorum originis, unde minus -
reserui fluxus spiritibus evadant.

5.^o Interdum super veniunt Convulsio aut motus -
Convulsio dum semper aqua collecta, equali nisa -
Convulsio substantiam Comprimunt quo fit ut pte ad an
continuo & interpolatum Lympham nervam, uberiori
Copiam accipiant.

6.^o adjungit macis, manuum pedumq; intercessentia,
a debilitate vasor. omnia debilibus fluida prope lationem &
tenacitate cohesiva liquidum a tardigrado Censu, tunc
secta, varios Congestionis gradus Concipiunt, varias pte
gravant, et etiam ipsarum intermentis, & reparatio parum
idonea evadunt. -

7.^o tandem stupor em, impropterea ad motum, sensum
lebetudinem, a laxate viderum tono aquosioribus, et agris
circulanti fluidis rartus deducit. -

Diagnosis

solo visu facilius dignoscit hoc malum anam
atem capitis pte gravente humore seruo. ex signis
dicendum &, si etiam exta Cranium, ut collectis
aquarum, tumor fit evidenter obvis, molli deprehendit;

giudem ubiq; coloris, et ita plerumq; pellucidus ut
 positâ et adverso Candela, v. ad radios solis Capite
 Collocato, aquae facillimè Conspici possunt; dein v. tactus
 cedit j. t. umq; assurgit, et Compressus aquae fluctuantis
 motum habet: cum aem j. t. a Cranium et perieranium
 aqua Continetur, tumor Junior Comprehenditur, figurâ ut
 jam supra. relata signa eodem fere modo se hnt,
 nisi de j. t. a perieranii distensionem, aliquis doloris sensus
 supervenit, verum si j. t. a Cranium et cerebri membrana,
 v. j. t. a meninges et cerebrum, diluvium aquaeum dilatat,
 tumor ad tactum mollis e, nisi valida fuerit compressio,
 tunc em impulsus cedit, a j. t. a Cranium ob-
 saturas maximè dilatatas mollis e, Dolor j. t. a
 paulo' vividius sentitur, solum Caput observatur tumidius,
 fons h. t. a projecta, j. t. a oculi vident j. t. a,
 frequentius Lacrimantis, hebetantis, sopora afficiunt;
 si ex adverso aliqua tum' pars encephali obstructa, oriuntur
 Convulsiones, aut motus Convulsivi, tandem casus a quibus
 Sobolescit affectus, medicus h. t. a et narratæ additantium,
 j. t. a concomitantium, et locum e presentia, ut
 si cetera, Contusio, alia diversi generis malum determinaverint.

Prognosis

iugeres hydrocephalus periculo & lenis e, imo et malum
 inevitabile Censeri dicitur, praesertim si p[er] interiora Cerebri et
 ipsius substantiam late penetraverint aqua, tunc v[el] Urtigo
 v[el] apoplexiâ accedentibus, non in p[ro]xime, cum levia
 medicamina parum juvent ad exhaurendum diffusum
 aqueum Saticum, Postea v[el] atas tenera agris hanc ptulit.
 at v[el] si h[ab]itiora Cerebri t[er]m[en] obsideant, et Diluvio
 immunes sint Cerebri amphisactis, levius imminet discuria,
 & t[er]m[en] difficili negotio discutiantur aqua Collecta, nisi in
 peculiaris p[ar]te exterioris redundaverint. peritâ d[um] malum
 a lat[er]e ext[er]nâ, v[el] excretionis solite evacuationis suppressâ
 sololesit, facilius tollit, q[uam] d[um] impingit a lat[er]e int[er]nâ
 j[er]o Cerebri Saba factante. Demum qui fortuito
 ingruit v[el] adventitius extiterit hydrocephalus, faciliorem
 suscipit medelam, at v[el] d[um] a parentibus transmittitur, v[el]
 in utero generatur, cum Curatoris spem solet adire.

Cura pag 199.

Caput XXIII^{um}.

De Rachitide

Rachitidem novum n[ost]rum pronuntiamus, qui statim
 defeniri p[ot]t irregularem p[ar]tem solidarum p[ar]tium et figurâ
 Cum Curvatura et prominencia Extrematum ossium,
 et qui planius descriptio innollet de hoc u[er]o mutato
 p[ar]tem figura et p[ro]portio, Caput grande et notabiliter
 observati, d[um] alia p[ar]tes musculosas, graciles et extenuatas s[un]t;

omnino quoad maximam partem incurrant, et circa articulos, prominent, spina variè inflatilis, unde varia pectoris compressio et angustia, tumet abdomes, & macie Consumpti reliquum corpus, Cutis ubique facerit, et debilior e articulo rum omnium Compages hitha ad, uagite ad motum impotentia, ut quæ nisi sedentes Luceat, aut pedibus insistere p̄ certum tempus allatendis possint, hic affectus tenacioribus etiam annis solet ludare, et quasi infantilibus ætati propriis Considerari, vulgo a Septuplici post partum aut Civitatis mense, eadem prodiit sui iudicia, et nunquam adultos aggrediti. —

CAUSA

Varia in medicina adducta fuerunt opiniones ad determinandam causam et explicandum modum quo rachitis generatur, et glisiori, major, et complexior, qui irregularem partem et ossium conformacionem et Curvaturam Succo nutritio d̄ alterum laterem partem ossium inæqualitatis insinuat, v̄ exiitaci musculorū inæquali vi trahentibus tribuenda opinanti, & e in nutritioe simplici omnium, et contra in præter natura abolvunt, diversam in nãa, in rachitica adstantes — iudicant viam. etiam certum e partes Cujus, cumq; generis exteterint, o exceptis ossibus, a febris in origine mollioribus Compaginante, uerum, juvenes esse et ostendi,

solo a propulso liquidiori presentem, ptes Lymphatica quies
 ad hoc opus mirum in modum comparatae, & sive vasa
 explicando ut plures censent, seu judicatae vasis —
 gelatinosi et Concreti ut glacet alius, accessivam atque
 nutritivam provide Determinat. si igitur Lymphæ nutritia ad
 ppter oēs vasulorum minimorum, et Contā fibrarum
 ossearum recessus Continuis motib; succedit, prasin Contaminati
 qualitatib; ut quavis Durissimis et exquisitissimis Concretis,
 patet evidenter immutandam fore memorati humoris —
 distributionem, adeiq; fibras osseas inaequalit; extendendas, —
 laxiores potissimum et minus resistentes, & extremitatib;
 omnis accumbent, unde Caerā immediatam rariorem
 repetimus ex Lymphæ nutritia visidiori, inaequalit;
 fibras osseas resistentes, et irregulares Contā excretionis
 modum Determinante: talis enim Lymphæ Duriora —
 multiplicem Caerum Concursu agnovit, ut Luis —
 Syphilitica, scorbutica, aut scorbutica, & lymphaticam
 Cruoris ptem affect, sive ex parentis v nutritivae Contraxerit:
 & aliunde et alii Conitari Lymphæ tenacitas, atque
 Coagulatio Caeris expansionis Communis, ut alimentis aut
 Lacte visidiorib; aere frigidiori et subtiliori, & balneis, pota
 nimis refrigerantib; et Quā Continuali, Constitutione —
 ruppida et effeta, & oia Sapendo vasulorum Contextura
 impediendo permeabilitatem et obtinuendo vasa inaequal;
 fluidior? oim distributione natale, praebere poterunt —

Lymphomata

minima fluxus suppressati, aut saltem imminuat.
 4.^o proavis contaminata qualitate, supponi o pot
 Sympla, quia in vasculis proavis haerent, tumulet eaq,
 diuina modo infariat, unde obstructions hepatis et
 Lienis, chyli mesenterii, in flatu ventris, interuentu
 Decur aliq, ex eodem oriunda proavis o in fine mori
 figuratis oblat. —

3.^o demum observato tr quietis dum universa
 rachiticorum machina in regis ruit, atq, quavis pte
 debilitante, solidum vigere capiti exariturum, imo acriori
 pro lateris instructo et ingenio, atq, idearum vivacitate
 pro carnis roptor ex notabiliori capitis mole, et amplius
 pbris medullaribus, spatium concedendo, equilibria
 quoq, et regulari illarum subultu, liberius permittit,
 unde rachiticis idca, vividius perisipit, accepto —
 promptius comparat terq, cerebro dicatas actiones —
 acius exaquat. —

Diagnosis.

Ex relatis jam signis, facile iudicabit rachitis, —
 notissimum ex nimia capitis mole, angustato pectore,
 et nodosis ossium & timentatib, licet tu o ca in oi —
 rachitide intervenarint, o tu eam inu. ventis oia,
 ut tibia, femur &c. atq, notabilior d'p'chendit in
 articulis mollior: a qua o' cae tavia ortum Ducat, —
 attendendum e ad habem qua parentos inquinari pat,
 ut Contagio syphilitico, scrophuloso, sed proavis, et —

peculiaribus Cuiuslibet modo lignis Satagi ꝑt. —

Prognosis

Discutienda Leporis sponte rachitis, Lymph, mater, anasarca,
 Tum puri adolent, et atq; vegetior his, et si Gingivae
 Cum his versata, seropulchra aut roriditudo, Difficilis
 Supposita, praesertim si ab hoc d'fario muase malum —
 Dimanaverit: pessimi etiam ꝑe' omnis exquirit rachitis
 ꝑ quae notabilioris, roris allollunt omnem extremitate,
 Cum pectoris angustate et acuminato, ventris inflato,
 Inappetentia, q̄, si supervaserint debilita, summo,
 Febris lenta et marasmus, et etiam aritas, aut hydroꝑ,
 Cujuspiam aliterq; Capitali, nullis remediis vincit ꝑt.

1780
19. 201

Capitulum xxivum

De apthiis, vesiculis gingivarum
et inflammatione tonsillarum.

Varia interdum terminis praemittit ꝑt. Continuasq;
 quosdam emittit, quos Latini mater aut nutritrix debere
 noverit, donec frequentiori fictive Labiorum et Convulsione,
 oris et linguae, aspera, vesiculae gingivarum et inflammatione
 tonsillarum churpienti, et breviter sequentibus agnoscent,
 tenere nihil aliud et om̄ raris, superficialia ulcuscula,
 et ꝑ palatum, gingivas, Letera interna genarum, —
 fauces, tonsillas, uvulam aliasq; internas oris ꝑt. longunt,
 et diffundunt, Licet motu istum familiariter ce

gentis borealis, et palidiora loca habitantibus, —
 Communior ut authorum fides. verum tamen frequenter
 fore calidioribus, ut Syria, aegyptu haec ulcera, nemo
 diffidat, cum ista epidemia quoque, Labis existimetur, et
 antiqua, teste aristo Capadocae, aegyptiaca et syriaca
 ulcera appellata fuerint: haec autem saepius juvenis et
 senes infestant, cum vario invasionis modo, diversis
 Clavell symptomatibus, et dissimili crusta a se invicem
 differentias constituent. —

Differentiae

Quoq; solitariae quasi insurgunt ulcera, in lingua aut
 Labiorum angulis &c. nulla bruta Loui Constantia,
 interitum numero et malignitate fortiora, variis in
 partibus Coicocantibus, quoque tegunt et obsident. diuinae mox
 tenuis et lenis annis apparent, unde juveniles
 iuvenculae, leviores aut malignae, molles insistant,
 et duriora adultorum Crusta occupantes nominari solent
 Crustula. —

2^o admodum caliditate ignea accensioem tentantes, prope
 modum rubra, Calente inflammata Dependunt,
 et profundius a seclat pter evadunt, alia vero tunc
 juveniles, pressu nullum adjectum Colorem hnt, neq;
 illas inducunt angustas et nulla crusta alba, flava, —
 Splendentes et tardius seu diffundentes, alba crusta
 tenacioribus tenuis atq; duris stergant, unde inflammatoria,
 Ichivosa, Cancerosa procedunt. —

3.° Demum cum vehementi dolore, et acuta aut continua
 febre conjunguntur, & si quidem in earent symptomatibus,
 ad an Sarcinam et frustulationem decidunt, omnia illius
 restulant et renascuntur, priores adhuc densiores, et
 numerosiores, plura ex locis affectis quasi designatis
 Limitibus subsistunt, dum alia latera serpunt, ac
 vicina deperunt, unde varia ulcusulorum
 Specie, diversa nae, et dissimili eventus. —

Causae

Demum in ultimis emissis, visum liqueorem
 salivorum et mucorum fundentibus, caetero in proximam
 in solutione vasulorum. ² oriundam a tenacitate, acimonia
 humoris secreti, texture glandularum dileccantis, et
 exulcerantis, si etenim ponantur ab eis, in emissariis organum
 secretorium et excretorium constituentibus, Dentriobitacula
 visivasi solita, humoris excreandi, et aliunde tenax et
 viscidus Lyngha pro cohaerente molecularum in vesiculis
 remotis, longis e De, tendenda fore ultra modum vasa,
 Fibres necesse ab invicem disjungendas, uno verbo
 Dissolvendum eandem nexum, dum ex alia pte
 Liquidum solitis motibus nequaquam conquiescat, ab it
 in Coagulum, putrescit, Comurpiti, et ulcus determinat
 hoc tem tum in solidis, tum in fluidis variis datus
 inducitur vitium: apta te quadam patienti differet
 habito respectu ad tubum et invasionis modum: sic in
 quavis Lac matricis, moleculi aciosiles saturatus, et p

120
orbem Circulationis ad os, p[er] delatum, varias p[ro]p[ter]
dispos[ition]e[m] vasulor[um], Laxitate[m] sicut v[el] obstructio[n]e[m] p[er] os
afficit, adeoq[ue] jam h[ec] p[ro]vid[et] in f[er]is Labe contaminata
Fistula salivali, mag[is] q[uam] os visa aperit, Lympha
vitata: sic parit[ur] h[ec] qu[od]dam peculiari Infectione,
ut scorbutica, scorbutica aut venerea, memorata
ulcuscula facili[us] producit, cum neminem d[omi]n[us]
Designatione[m] utrumq[ue], Contagium, Coagulandi fluidi,
et solvendi p[er] sua solidas unitati, maxime p[ro]p[ter] sua
ca[us]as tunc d[omi]n[us] q[uod] ex p[ar]te p[ar]te Lactis Constitutio[n]e
a nutrice sup[er]ditati, innumeris ut, parit[ur] Continget
alimenti[um] acriorib[us] piperatis, cum eodem forme modo
chylis ex eis generatis assidu[us] fundat Crassiores et coctas
moleculas, quibus Compagor solvents, et exsiccat, —
quarum vase tota arida evadit viserosa, et soliditate
potius d[omi]n[us] q[uam] forat: hoc t[ame]n Casu rarior e[st] q[uam]
infantib[us], quippe cum hujusmodi alimenta, nullatenus
Coequant, et Solantur, Liquidiorum motus, consumens
actio[n]em facili[us] arceat, at v[er]o frequentior observata in
Adultiorib[us], qui aromatis magis dediti q[uam] alimentis sunt
et sale conditis, p[ro] navigatione incommode luctantur, aut
Fornium palatiora et maritima loca habitant, —
Fahugineam satureginem h[ab]ent, q[ui] in die s[er]vent et
intendunt, et nimis venis usu, v[el] alii exercitio, —
Spirituosa, quos p[er] exhaustio[n]e[m] hinc nautae p[ro]
Botavia, anglia, aliisq[ue] septentrionalib[us] d[omi]n[us], frequentius
ap[er]tis tentant, tandem declarant h[oc] ulcuscula in

121

Febrib, putridis, malignis, et zotechialibus, cum ad en-
Cua a talibus Constat affectum, stagnas nempe et putrefacti
Liquidor. Cavitate vasulor. absorbentium, videntur iam,
aut vasinartium claudat, supponet motum et oscillat, -
Lympha surta nam et indolem mittit, oeq; ad justam
massam, vasor. solutionem, et exulescentiam requisita,
accusat. -

Symptomata

1^o notabilior supponi sequit obstructio in vasculis -
Salivalibus, internam oris Cavitatem priganibus, atq; -
vitiosa lympha p. calivulantis quantitate, indola, et
motu, quin vasa successive dilatarent, effundat liquidum,
in membranarum Capulis et Cellulis, ad jam spissius et
Coagulatione successive magis indurata suppressa vasorum
actione et Contactu aeri ambientis, unde Crusta a principio
spissata declarata.

2^o o. inens atq; sopitus manet fluxus humor, licet
Crassioribus moleculis Compositis, etenim adacta -
vicinor. vasulor. oscillat, interno pro obicibus, et -
resistentiam partium adjacentium Calore, Effluvis Compositis
liquidum, diversimode alterat, et in thura adigit motum,
ut vaselactioe abitate o. rosioe Diffringat repagula,
viamq; ibi pandat p. oscula jam dilatata aut lacata,
unde stillidium humoris raris; purulenti visid; aut
dilutionis. -

3^o variis h. deprehendit Constanti aspectum Color, -

Cum diversa qualitate, liquidi lymphatici effusi, atque
moleculi purpurei commixti, magis, v. minus fixati
fibillant. & solvuntur et densantur, et respectiva quies
humoris stagnantis et putrescentis, mutat contextum,
Cohesionem, superficiem partium solidarum et fluidarum.
Luminosos radios variè refringentium. —

4^o dum Crusta totam superficiem partium descriptarum
tegit, tollit seipam, & solva ob pressuram raris illatam ex
humoribus viscositatibus prohibentibus, verum etiam h
induratis vasculis et fluidis, massam crusta constituentibus,
salivam copiosam hætenovè impedit.

h^o at vò Crusta decidens, aut decidens, asios et vividior
et sensus, et copiosus gaudet humorum diversi generis, et
varie tenacitati, cum hinc hætenovè palati fibilla
raris, faciliùs incurrenti, atq; vascula lymphatica et
glandulosa, jam aperta remota obice, nulliq; objecta Crusta
mole liberius effundant, unde saliva, et saliva
glandulosa effluxus. —

6^o illa eam Crusta horrore renascenti, et repullulant
juncta eadem magis atq; densior, regenerantur, ob immalam
organo secretorio labem et excretorio, & vitium aliter
influxum in humoribus, qui, ex mora inspissatoe, magis
adhuc acrimonie gradum, atq; putredinis violentiora
Comitatus lymphatica contrahunt. —

7^o tandem si Crusta ulcero, compacta, et latius
diffusa evasit, in partem seipam erodit, aut nigro
placere humorum circuitu, unde destructis palati
involvisi, et partium vicinarum, & etiam gangrena v
phacela

Phacelus.

Diagnosis

aphtharum historia et locus, eandem nam et
 cognitionem induunt, cum sit. 1. a ulcunulorū prodractis
 color rubicundus p̄tis affecta, mox vasculorū squisiorū
 pallidus vō sicut albescent, lymphaticorū et salivallium
 tubulorum numerum notat: Ternū dūm quasi commixtus
 et flavus appareret, memorate ductum progenis et devaticae
 simul suscipienda e. deterior et maligna, sanis affluere
 et promptiori vicinas p̄tium erroneo dignoscunt, at vō
 a tumorem corruptum o fundunt, aut exuta facilius
 tollit, aut decidit, vivens satumēto p̄cipis. —

Cognata est aphthi, vō fere eandem cum aphthi —
 vesiculae in gingivis in infantium interdū pullulant,
 eandemq; originem, sicut et curandi methodum —
 agnoscunt. Sed p̄cipit inflammatioem tonsillarum,
 et obidet geminae glandulae, utrinque ad radicem linguae
 paulo supra pharyngem posita, a latinis tonsilla, vulgo
 a figura amigdala dicunt, notis reducenda e ad anginam
 quae ad vobum peculiarera, o solum in infantibus, vobum
 etiam in adultis. Haec acciunt et reliqua p̄tium —
 inflammationem, designant, rubore, calore, et dolore p̄tis —
 affecta, cum deglutitionis ac respiratiois difficultate, atq; —
 eandem vices patit, desinit em in suppurationem, ulcus, —
 ichyrum vō gangrenam:

Prognosis

f.

o multum refrigeranda et apta recentis, prosertim in
 mollioribus infantum oporibus, et facile remediis cedunt,
 at o radice, egrotant altioris, ut quod putredinis o asinosa
 gradum Consequuta agrius, sanantur, et pueris mollitie o
 suppurata Consumunt, adeo Lactantibus nullum quasi
 remedium, atq; ab o gargariamento, o externo remedio —
 pertinacis Deterricant: o aem idem o pa adultis, periculum
 qui clamant auxilium, et vim medicaminum Libentius
 possunt, quo praece nequies et fatidat pustula, o
 deteriorum humorum Crasis denotant, et Contes major —
 possunt periculum, ad remittit, dum albescente
 superficialia et, atq; vicina o deperunt. tandem si
 supervenerit Febris, acuta, malignis, aut pestilentialibus
 mortem brevi subsequuntur nullatenus Dubito, —
 Praesertim si major sit Concreta numerus in ore, lingua,
 et aliunde. Summe urgeat vivum in bacillitis. —

Cutas
 pag 203

Caput xxv. um

De Variolis

Communis dicitur, atq; verosimiliter defendi et variol
 osum Contagium, orientalis aures, ut indiam arabiam,
 i.º invenisse, aut saltem ab arabibus suis se designatam,
 mox nationum Commercio in Europam migrasse, uti
 solitis quasi depositum Linitis, crudeliora, adhuc —
 itaq; et in inevitabilem ad o perniciem jam dudum —
 inest, ut vastata provincia, depopulata uice,
 misere otomotorum solitudines, prope inus Suctus,

compa tristes exurias, horrendosq; sanitatis affectus
 quotannis sese nunciarent: hinc humanum genus —
 innumeras laesuras vulneris, nam in dies imbecillior
 foret, et infensa declinase costagia, aut saltem oppugnare
 acris grembens, inestitiam variolarum excoxitavit, a mollioribus
 infantum quibus, laxiori Compagi solent: atq; moderate
 tepentibus fluidis communicale, succorumq; violentiam mali
 quodamtenus remitteret et coesaret Cujus variam originem,
 Nihilominus, eventum statuunt atq; determinant subor:
 tanto enim sonat murmur in gallia et finitimis locis, —
 valido, et inhumano viro anglo, esta et gestu manu —
 metuendum Contagium in proles innotem infundere, eo solam
 Comiliis quo innotum malum praecavisse fuit, dum angli-
 gnavian et in finitatem gallie vicinia exprobat, qd pauli
 exideliis et pro grege thalatae presor reformidaverunt, preluet
 abili et certo. Dultiori etate periculo servandi: na videtur
 vacua momenta, atq; nativ et pertinacis preconcepta
 heret opinioni; certum tamen ex historia monumentis, in domo
 inveniendi variolarum invaluisse apud Circanis feminas de
 quibus, 9^o etiam aut Circanis post partum mensa innotere
 Oraculis a sura, variolarum innotuerunt, inmittendo tunc partu
 Leviora peris in matre perulente a pustula variolarum
 vivananti a balneo humo? Calore adfecta et aucta
 rapidius in Circanis innotuit, et solitum
 variolarum tumultum Exhibet, qui promptus sic et
 sine periculo Complimiti: hoc tamen stupendam consuetudinem
 innotere materibus a mat, simulq; peculiaris ois innotita
 repulis utilitatis: Circania tamen mulieres, pro a flagarum

Celsi inelentia aut vitygalium mole oppressa, eximia
 et elegant, sed puellas in aulam tulerunt, et per se
 primum mittunt, quasq; in fluxu et refluxu
 amatoivum lenocivorum seivis inuitamentis et volupt
 usis auentibus Liberalius usq; ad florem puellatatis prius
 educarunt, ut Corda jam obtorta varietate saturata,
 facilius vincat, atq; promptius Depresse possent, a
 pelliciarum nurseris et arbor, ad satietatem usq; jam
 dudum satigerant, et res contra' ipse et vota interdum
 prodebat, amplissimaq; fortuna muasa adveno variolar.
 statu subito' discedebant, et natus jugulando aut deturgando
 choram et auram inextera erigebat, hinc naturam ignis
 varolas attentius observandi Desiderium, quo Orvini
 Compositum habere simul aut Orvini in vita
 Contagium illud exhalari, eiq; sensibilita' inclinari, quod
 facilius p' spiracula Cutis diffundi poest, ita ut artefacto
 jam memorato, insertivem variolarum tentare et experiri
 in mentem obvenit. rosp' voti et ultra' ipse successit,
 faciliusq; adeo, perseverabat fortuna, ut vicini et potissimum
 turca, eam methodum doceri perialitati fuerint, et deinde
 regni georgii primi Curis nobilissima matrona vvor thes,
 Cujus exarum tunc tyoris Constantinopoli legatem abisset,
 in angliam dimanavit &c.

Variolar. prodromus antecedentia,
 Concomitantia, subsequencia, et g'ralis
 morbi historia

Quidquid in Contrariis a posterius est nulli, quod duplex
 in variolis status observandus est, prius Conspicitur incubationem
 seu Contagii ebullitionem, 2.^o pustulorum eruptioem elevacionem
 et incrementum comprehendit, 3.^o eandem suppressionem,
 4.^o tandem exsiccationem, seu ubi desecmentum et finem
 Complectitur, a cura diversa periodo, variis signis et dissimili
 Symptomatum agmine praedicit, peculiarium totiusq. diffusa
 naturam haurient, in 1.^a periodo levis neq. Continua in
 Infantibus declarata anxietas, mox cum rigore quodam et
 exacerbatione verit, caput dolet, Horror et calor lesemutus
 accipiunt, splendentur et lacrimosi sunt oculi, calor et
 pulsus praecedunt, urgent nausea et vomitus, stupor,
 somnolentia, obscurum delirium Convulsiones aut motus
 Convulsivi in prope quoque sunt, tumis adiungit, difficilius
 trahitur spiritus, Febrisq. cum immensi et numerosa cohorte
 gravium invadit: cum illud stadium ad 2. 3. 4. die vulgi
 extendit, quomodo in Complevis praedantibus, et frequentibus in
 adultis, Contagii incubationem 7 aut 8 die potissimum
 anno provinciali elapso observaverim, ita ut variolarum
 gladium nequaquam suspicantes, dissimili correptos nos, ut
 febre Continua et maligna o. semel opinati fuerimus.

Hinc se statim, dum ad notata puncta parvis, rubris, postea
 mortis pulvis, faciem, mox manus brachia dorsum thoracem
 et pectus infernas haerentibus, ubi germinantibus, simpli
 emata mitescunt, pustulae valde rubescentes augentur, et hinc
 quoad magnitudinem et numerum; cutis magis tenditur
 inflammata, et pruriginem determinat, saltem si variola
 de specie benigna non sit, verum si confluentem

spicem referant, intendant tibi Rosaria suffocati in peripheria
 Quis Circulo liquidos et Cortis ad interiora depellente, sine
 anxietate, magis, intolerabilis et strangulat aires dolat, diuresis
 mollior, disenteria, mictus Cruentis, Hemoptica, depressio et
 Coëctio palpebrarum, tumor abdominis, Dors, manuum et pedum,
 et si Complicante Cuius Febre maligna, exantemata livida
 Jussim a pustuli efflorescent, variola a nimis protensa in
 unum Confluent fado castel quatuor, tristemp, eventum
 intuenti.

Post toleratum Decursum Quis Status 3^{us} suppurationis,
 quâ semel incepta, acribit, atq; determinat magis, obviam,
 pustulari albidicem, flavidicem, Conversionem in apostomata
 parva, fastigiata, albicantia in apice, Circulo Dubro in Dorsi
 Bineta, 4^o aut 5^o diebus Duratura est, elapsis, tandem sumptis,
 et exorant manam pustulentam acriorem, genus nervosum
 et membranaceum stimulantem, novis Tragedias exsultantem
 de dorsi ad exteriora Depaguli, in venas absorpta, atq; inde
 manam fluidos commixta, viros effectus producit, ut alis,
 vomitus, disenterias, hepatidem, apostomata, atroces
 abscessus, juncturarum tumores, Labium ptyosin, et Consuor
 fitem, si Livius effluxerit, punitum Continuum,
 fatorem, anxietatem, ardorem Cutis solim ex cepit.

Tandem hoc Stadium erigit pustularum exsiccat, et
 magis adhuc flavescunt, nigrescunt, et in diversas coloris
 nucleas transcunt, antequam abierint in squamulas, et
 agrum Lutum in sta parvitate, de idua sine ulla molestia,
 in pruriginoso humore, exortit Cui summo agni levamine, et
 Cui Cutis, repugnans rubore et tenuitate.

Nulli dca

Nulli idem praesidi constituti sunt inter valles limites ad
 Italiae variolas? praesertim cum v. Stardi percurrunt ma-
 tyora pro varietate temperamentis, Constitutionis epidemicae,
 regionis, aetatis, Caeli differentiae, Complicatae Cum febris,
 putridis et malignis, pro genere et iuxta Communione
 observata, Naturae licet, variolas benignas spatio 6. to 8. to x
 diem suppurae, 6. vo aut 4. spatio exsiccat, et feliciter —
 terminari, at vo gravium et malignar. suppurae tardius
 erumpit et extendit ad 14. et interdum 20. diem, tumq;
 altiora loca relinquere solent, ut pro perpetuum relapsu
 agrotantium Cutis, et facis; oculi solito tempore restituantur.

Definitio et Differentia
 Variolarum

Variola definenda est tumor, exiguis, phlegmonosi,
 in ambitu rubri, dolentes, pruriginosi, qui praesertim pro
 facis, thorace vulgo apparent, atq; paulatim subelevantur
 donec ad suppurationem pervenerint, quorum varia notanda
 et discrimina, et in dividenda pro regularis et anomala
 vernalis et autumnalis, discretas et cohaerentes, et —
 confluentes, depressas et fastigiatas, phlegmonosas, —
 erysipelatosas, albescentes, lymphaticas, aquosas, rubicundas,
 et eas thumathingamus differentias, et variolarum — agnitioni,
 praesagendis eventibus, et institienda therapia, facem omnium
 prolativa est, adeoq; discrimina et ca. et pustulas ab invicem
 discriminatas et sejunctas, cohaerentes vo, et contiguas, nullasq;
 distinctas, spaciolis sint, dum confluentes nunc erysipelati
 viti, nunc sub molliorum forma erumpentes, —

unum quempiam tumorem efformare vident, atq; suppurant,
magis ad invicem implicata, se hnt, instar vesiculae, totum
vultus, aut peripheriam faciei contingenti. tandem pustulae
intendunt, desic, mox pauciores efflorescunt, si numerosiores,
minime, si pauciores, magis fastigiatae despicuntur.

Causa

Non unico fonti tribuenda e Causa mali hujusce —
Contagioni, & duplex, principaliter, seminum nempe Connatione
nobis quo semel ja vita degenerari & ignis, et actio communis
Causae, & quidem regionis incolae simul affectae potest, prior —
Completa ex variolis eruptis ja sinu materno, & statim —
post exclusionem, posterior vero evincta ex modo quo —
ingruit affectus, generatur, et Divagata e regione in regionem
atq; deis repullulat.posito aem seminis nobis Connato,
Sopitum illud manere et ja materia fluida. ut sequitur ja
Contagio virginitatis seraphuloso observato, Donec Connatum
Causam hanc tanquam, his jure factum hinc suscipit, et
velata turbas movet, Causa ille rediens ad aera —
alimenta et tpestatu, a novis, extranei, miasmatis hinc
jificiendis, aut illum intestivo Calore et exardescencia
alterando, moleculas Contagii variolosi pte, & longius —
etiam subdolari nobis minime Connatum fuerit, verum
ta ex effectu analogia et similitudine variolam cum aliis
modis Contagium illud stimuli inflammatorii vires geras
promuntiamus, i: densantis et Coagulantis liquidam
Deis

solida vellentes, velocitatem Cruoris in ea vascula
 intendenti, et universonam quasi deviam globulorum
 per porosum in Lymphatica vara produentis. si etiam
 attendamus ad ea quae antecedunt et subsequenti variolas,
 quae reprehendamus impeditam in vitiis circulationem, mot
 ferventem et precipitem, tandem solutionem varorum. Cutane
 crum, effluxum ptes rubrae lymphaticae quinis, verbo
 suppurationem, atq, hinc pendente, ut ex simphoatum
 explicite patebit. Contagium autem variolorum in aere
 rediit ex aere et alimentis, quatenus fluidum
 immediate agens, in naves, tracheam arteriam, oesophagum,
 bronchia, pulmones, crum circulantem permiscet, atq,
 crassioribus impregnatum moleculis copitum dicescit -
 seminum, dividit comminuit, separat et in orbem
 circulatorium ita impellit, ut massa fluidorum probe
 extraneum, et solucam coagulant, verum etiam in
 finibus arteriarum et Lymphaticis subsistat, quo signosis
 momento generalem Phlegmonem seu inflammationem
 determinat, et tunc in lateribus, et adhuc in ipsius
 equalitatis prodit atq, diffundit: et similibi prorsus modo
 alimenta detriminae qualitatib, quinis subta, eundem
 effectum produent, in quibus Congestioe pravor? Inco?
 in illi vis et chilo acriori et Congruato, exaltatationem
 tandem concipit magis et brevi Consumm. init
 Cum semine, et otras extrinat ignis moleculari -

hinc alimenta, aëris autum rale, v. verum tpm, tpm
 Communiores cae Contagium moventes et agitantur et
 Considerande.

Symphthoata

1^o invadit horrigitacis Sensus, e' tum ultro conuom
 meta ostiendus, quo tunc eadem distensionis vis
 membranosis filamentis in fortis, tum ipsius equalis -
 distributio p' Capillamenta inuertitur, atq; retardatur: hinc
 aem exiunt rari, tunc incalescentia et Calor, et eo
 distentata et in fastida vasa, quasi in mutis vasis illi
 signum, fortius exobriusq; micare incipiunt, quorum
 reactio Liquidior? fluxum accelerabit, et proinde magis
 exagitata, promptioris, Cum p' orbem Circulatiōem acta,
 vortuosum motum, illum quem reminare solent a Centro
 ad peripheriam faulci, Conspiciant, p' tibiq; Communuabunt.

2^o tumida et agitate quibus uide, p' vasa Crotis -
 rapidi p' rem requeant quin insolitam maj. dilatationem
 urgant, quasi solidiorum nisum superauint, in ipsis -
 stagnabunt et Congerenti, unde varia p' tium gravitas
 Lassitudo, stupor praesertim prolapsa, Cum ibi et debilitatem
 mollioris infantum visceris magis inuit Cuius momentum:
 si ad Certos fines peruenit, oriuntur illico delirium,
 Convulsiones, motus Convulsivi, pro diverso gradu Congestiois
 quibus derivandi.

3^o Quibus et ampliatibus albuosa stagnante Languore -
 Latoris, pari p' portione disillent et Compimenti p' tibus ca-
 nervosa vascula, sine violentus labit Sympho rarus refluxus,

versus cerebrum, et contra dolos acrios item in capite, o solent
ob debilitatem multiplicisq; varum laceris meandros, qd
liquida? momento levius obstitit, varum etiam hinc impedito
guinis tractu p alios ptes, qui ex vitiis repugnanti p tuncum
accidentem, susculosq; exinde enatos uberiori determinatur, qz
diveris encephali tractib; modo in perivario, modo in
meningib; haeret et accumulati, unde est tuncus et internus dolus
presentis solus.

1º tuncis aen superiorib; simul cruce turbidib; p pntio nata
ined et in propaginis congestio, qua distendente vasa
artiosa nervi p internam et externam oculi ptes
disseminati, pvenantq; folliculi membranacei glandula
innominata, unde modo rubri, et lammei, pvenienti, oculi,
modo p ptes et alternati lacrimarum rivè.

2º si fluida a p pntiam impissata aut seriosa, nimis
longiora trahant motam in tubis pneumonici, solitum
areolatis vasicularum spatium, fortiusq; distrahent fibrilla
nervae, hinc respiratio laborosa volensq; pruptioe variolae
sapius observati.

6º pari et eadem rati stagnante humore in canalib; gastrici,
Compimenti vasa secretoria et excretoria, o p pntiam
stimulabunt, hinc visceris fibrae nervae, sicq; modo laborati
nausea vomitus, Cardialgia, sibi fastidium, eaq; ex labora
et molestia ventriculi pendente audentia.

7º fluida lentius in variolis iniquitate supponi nequeunt,
quis depurationem, et p tuncum hinc tuncum hinc tuncum
medicatis, et molestia nata, o cum facilius p spiracula
cutis absolvatur, nullo modo p vasa cutanea humoris contra
inab; repulsi; adde qd squis in celluloso peripharia interna
contextu, ob meandros et minus vasculor. existant, facilius

subsistat, ibiq; tumore determinat qui ab humore de novo
conveniens, quasi oculi nictu subascendit. —

8^o vasculi aem Cutanei, semel prolati, atq; tumultuante
Crura tergidis, impetum ei et antris liquidi Intus sustinet
o protasunt, unde solutio tubulorum et effusio sequitur a
Coniungito Cum Rubore pustularum, praesertim in amota
Cum ibi vasa libera, ab humore effuso magis plasmantur.

9^o liquida aem extra vasa o dem duntius remanere o
pnt, quis naa alperet et Corrupta, atq; Cum fibrillis
obscatis et emacris Comixta, simulq; vasculo? vicinor?
ossitate, et Calo rectius Conguata matenti, et abeant in
liquidum visidum, tenax, glutinosa, albicant: hinc primus
Suppuratōis apparatus, et acioni pruritu, imo et albidis —
pustularum, Cum suppuratōis opus, mag. plus attritionem —
exigat, et Cutis pustularum eodem ac humor contentis Colere
de fundenda ut.

X^o per secul efformatum et magi, in die acionem motā
Contractens, viam et effluxum tentabit, et Continū rōtō aditum
vires extēiora parabit, unde univossus q̄ quōis habitus
nos prurulentus ex infinitis salens plib, quo passis et lampina
robundus quasi Coorte amito tenaciori p̄ficiēti.

Xi^o interea prurulentis, Postq; Continū divisōe, nullos,
Suppeditate Comiectu Exarientis, solaq; arida supente, erit
Cutis, Cujus fibrula exsiccata, Pludiq; reporentib; distulata,
dardent non. quammular? e in contextu Cutaneo nualipa et
lōnervatē.

Xii^o Substrata tubulor? Cutanes? p̄rogenis, extēnas
Cutem p̄dēnsa Constituentium, Colorem rubicundum refaret,
atq; vividiori gaudebit sensu, ob soliat iōm tēsum s̄ ibilitatē

progeniantium, & localis, appellente Quosatafante,
atq; citius impressioib; et Contactu aëris exteri indurata fuerunt.

13^o hec ita solent proced. ut in varioli, & maligni, verum-
diversa et metuenda symptomata succedunt maligni v. primum
moris: atrox pustula variolosa e. prius hateri ab eruptione inuasa,
et horum fuliginea representavim, ex toto depravata, et in
hateri variolosa? maligna? ob impedita depurationem, inhibitionem,
appulsus & transi humoris, vascula cutanea e nullatenus
infecto Quos turgent.

14^o hateri humor ad interiora hepulis et Costatis ad
viscera vasa, horum molestas et obicit, unde dolerium, motus
convulsivi, Talem et impossibili respiratio, singultus, diarrhoea
maxima visium prostrata, aliq; stragem Cogitatio ad offens et
indomito Contagio masses fluidos un. demante, et luvum vasa
omnibus procedente, prout copiosius v. parvis ad viscera
eadem devivata & exardat.

15^o in variolis licet ad interiora v. repellato praestitute -
nimia Contagio variolosa, et numero ptium intravasa. horum?
atrox ut in transennam asperamur, equalis e ubiq; depravata,
et pustulari circumfluentium in intravasa cutanea: sapient
accidit et humidit et mole hateri et luvum fluxus sibi intravagant,
et in foveis cutaneis ita subsistant, ut ex inde vitalium fluidi -
Cursum, impetum, devivacem, Incessum, in collateralia ramitua,
in costoria et exortoria vascula suppressant, uno verbo -
circumplexas suffocant, unde varic exanthemata, illitena,
papula nigricante, furunculi gangrenosi, sudamina, verbo -
totali et vasa cutis rois, thacito, phacelo, & rapidius ad
interiora turgent et communicant.

16^o verum si in variolis depravata obitanti, non vitiis exarsit

et generalis Coagulatione superet, nullatenus in puris
 deperire in indolens mutare poterit, ut pote ab iis facta
 fluida: massa procedentis, quae aeris, Corrosivum ubi dicitur,
 in ois pte diffundit, et magis, et indubie Centries relinquit,
 hinc suppurat, variisq; visibilibus pte, ut in oculis, quibus
 variis, et faciem lumine detur habuit, visum, et mentem
 auferent, aut aurum, aut ruditer deperminat, et
 si interanea confluerint, mollem, terram, spumam
 lentum, phlegma, rheumatismos insuperabiles, febrim
 hanc, maram, et peluet ab item consumptione accersent. —

17^o tandem rite succedentibus variolarum stadiis, et absoluta
 deperatone, nova quasi, et melior accedit constitutio, et ita —
 corroborante et firmante infante, ut exussu pullulanti in
 itali jugo, maculam, dein pustulatum et viriditatem
 habuerint, tum contra mto pfectissimi, ventente, dilutius
 adhuc et ad dambit vasis magis aptum tpea mentem,
 Epone, ob rite mutatam superficiem mollem, et strictiorum
 molecularum equinis coherentem, in priori casu determinatam.
 irregularem vero ptem integram divisionem, et repetitam
 jugosa Labii ptem, et in 2^o casu nondum destructa fuit.

Diagnosis.

Stadia variolarum peculiaribus signis a jam notatis —
 et dignanda, et h^o ad ingruentia attendendum praesentem
 et inde in tum impendentem pullulantem, in
 exterioribus, aut in complicatione solent medicos
 vaticinari, non, in pte, et iam expectationi, sapienter deludent.
 eruptiva aem varicolas suspicant et vomito, capitis, dolor,

hore et calore se mutuo exigentibus, tepiditate et subulta
membrorum, oculorum splendore, aut gestibus et lacrymarum luminibus,
hæc etiam duo posteriora / symptomata sæpe præ eruptione
relaxantia, posse alia adiungenda, ut Cæta Cognitio præstantis v
adulti qui variolæ sequatur defunctus e, et illa tunc quodam grassanti;
e oâ minus præcæta vadunt Cutis rubore, et puncturis: domia
Cutis adhuc tumens, æquis p ambitu rubis, undiq; efflores
centibus qui successivè arisunt, et p pustulas notabiles abeunt.

3. Hæc variolarum, suppuratio nempe, pidiati, pmerenti
Caloris, Febri et anxietatum, ab ordine pustularum, dicitur
remissione symptomatum, et effluxione prævalente.
ultimum v' p'is crustarum alidarum et nigricantium
exsiccatione, fragmentis residuis, et novâ Cutis efflorescentiâ, satis
evinctis: an v' depressa v' festigata, discrete aut confluentes
sunt variolæ, ex sola inspectioe pustularum patet, dum v' o'
recurrunt aut complerant cum Febre malignâ, Sciciliis
doteq; exantematæ a ignis p' totum decursum concomitant.

Tandem distinguunt variolæ a millis, sicut p' eruptione, utriusq;
modi æquivoca fuerint signa, ex tumore senioris Crescentibus, et
elevatis in variolis, donec ad suppuracionem pervenerint, at v' s'
mobili sicut vult, pustula sunt plana, contigua, magis superfi
ciana, et vividiori rubore persista: præcipue Communis variolæ
quasi gradatim et successivè disseminanti p' cyosis habitum, dum
mobili promptius disseminanti, rapidiusq; peripheriam Lætanam
coegissent, variolæ etiam Scicili dignosce a variolæ lymphaticæ,
gallicæ La verole volante peculiaribus signis, hæc ultimam
p'cem Comitantibus et p' decursum referendis.

Crognosis

plurimamque includit variolarum eventus, nec se eruptione aut
 decursu quodam certi statuendum; quippe mori subitanei, adeo
 obiecti mutationis, ut plures quos brevi sanando, fausto
 variolarum eruptione judicares, tunc quibusdam tunc in progressu
 actione, simulque ad intervalla mori succubentia, aut humoris
 variolosi refluxu, de repente suffocatis et intereant, dum
 alii totum desuperati, et praecipiti damnati funere, felicitate
 emergunt et convalescunt, hinc affectus, eo magis refudendus,
 quo in diutius implicati cruciatis, et invidiosam praese sunt
 species, a sagacioribus etiam proponit. tunc sine temeritate
 argo visum ut variolarum successu, iuxta tempora divinita
 tem, et symptomatum catervas atque, spiritibus. Cuiuslibet enim
 variolarum stadio atque, accidentium agnitione, sua competet prognosi,
 a Licet fortuna quaevis aut involuto casu mutari possit, interea
 sequentem normam vulgo tenent.

1.^o si sita ab eruptione et exultatione contagii o graviora praesent
 symptomata, a deo intendente summoque progressu, quae
 remittant et mitescant, benigno aut saluti eventum mutari
 pot variolae, contra vero si variolae eruptentes, crudeliter progressu
 symptomatum agnos, ut vomit, motus convulsivi, pulsus
 intermissio, Lymphomia, vomitus, periculosior sane statuenda est
 prognosi: quod si ea progressu quadamtenus v maxime pte
 discutiant, maxima spes affulget, et plurimum brevi tempore
 sperandum, tunc eruptio nullum a gravem agro profusus,
 periculosus, et letalis, ut plurimum variolae constituit, accidente
 atque exiccationis tempore, et periculi jam judicatis, symptoma
 perseverantia perniciosa omnia, quod in bronchum convertitis, dum
 remittunt, d sapienter febri remanet, a latente tunc bene,
 atque brevi saluberrimum judicant, hinc suppurationes interna
 et marasmus

et marasmus q̄t̄ ip̄e occumbit egrotans, putredine etiam
 contingit ut visus exsiccat̄, puntularum t̄p̄us, febris gravissima
 et delirios q̄m̄ p̄ toto m̄bi decus in ingruat, cum subito et
 abdomine putrescentiā, putore calore, flatid̄is alii digestiōib̄
 et perulantis, in quo tam̄ malum fore ip̄a insuperabile
 iudicandum, atq; p̄t̄a ingentem infantum numerum quos ex
 officio v̄ fiducia parentum iuvare v̄m̄, paucissimos de variola
 impressae pulchros Convalescentes, restitutos observari.

2^o rursū ad plura alia attendenda ē ip̄e variolarem
 rursū, etenim dū variola subito deprimanti, infecti Cursum
 v̄ affectus, atq; prohibita Curis, dep̄t̄e, Alburn pulmone, aut
 Intussaca abdominis brevi opprimunt, promptiq; in eis
 metathasis inflammatoria et gangrenosa declarant̄. at v̄d
 v̄ illa infecta non maras fastigiatis et succive Genentib̄,
 quā etenim p̄portio elevanti puntula, eadem remittuntur
 simplicitate, scilicetq; infecti Curis expulsiō promovet̄.

3^o rursū variolae mutat easundem prognosim et eventum:
 Constanti em̄ dep̄t̄ent̄, observat̄a discretas variola, minui,
 habere p̄t̄enti, Aluor̄entib̄ et confluentib̄, Acce, p̄ ultimā
 sp̄e m̄bi int̄asa et externa p̄t̄e ex toto obideant̄, et d̄ifficili
 extiterit dep̄t̄e. junq; simplice, variola leviori iudicanda, it̄, iis
 in v̄bi exant̄ demata ad, unq̄nt̄e, atq; Centrum potendunt exitum
 r̄ent et cum febrib̄ putridis, malignis Complicat̄a.

4^o mutati m̄bi periculum rursū t̄p̄tati, et Constitutiōe aīis,
 v̄ etenim vere et autumnno gravant̄, v̄ t̄tam movent formidō
 em̄, q̄m̄ si t̄ruire frigidiori ingruant, ob p̄d̄icam r̄emp̄e, et m̄bi,
 h̄ac ultimā anni periodo, fluidor̄ Coagulat̄em, atq; vasor̄ Cutaneor̄
 obstructiōem, et et p̄t̄a variola adeo d̄renigae et mitioris, cū
 rursū etiam v̄ edunt stragem, dū alia malignae et effeas atq;
 nullibi parant, et naturam progeniem dep̄t̄ent̄, ad vari
 aīis Constitutiōe dependet.

h^o tandem variat eventus atq; successus variolae^o evanescunt,
pro diversa aetate, hinc adulti plerumque tantis hinc in periculis
solum ob firmiorem Cutis texturam, veluti etiam intensius
liquidos^o seriores, quo rapidius expanduntur, et hinc varia
promptius ruunt et cumulantur organa: raro aemulatio obicit
senilis aetas, et qui tamel contrahunt, et fati et variolae defungi
sunt. — Cutis pag. 205.

Caput xxvi un.

De morbillis

majorem presentis atq; futuri discriminis metum injiciant
morbilli, si eadem serent utiq; morbi natura et aequali decursu:
quippe e^o raro graviora adhuc declarantur in symptomatica, et
violentius machina hinc morbilli p^oterbatur, et ota subito typhus,
subito quoq; vesicat et comprimunt, adeoq; serere morborum
intervallum, et pari quo graviores pariter evadunt.

morbillor^o prodromus, antecedentia,
subsequentia et generalis morbi historia.

propinquantem seram quemlibet, aetatem indifferenter
aggradiunt morbilli sicut variolae, isdemq; seris signis denuntian-
tibus quippe calor et h^otor sermutuo exquisito antecedunt
Caput intensius dolet, agri et inquieti, ardore in faucibus, et
liti premuntur. Laesuras involuntarie profundunt, et nausea
atq; vomitu tentant. mox succedit calor notabilior, rubor quolibet
momenti interdictus, laboriosa et difficilis respiratio, junctis delirium,
universumq; oporis habitum quasi punctura percutiunt, et tota
Cutis calor subit, et veluti inflammata, e qua serere pulchritudo
et aggradiuntur tumores infra notandi: is tunc eruptis, symptomatica
mitescere sercipiunt, nisi complicatio morborum accesserit, numquam
emittunt, et intra h. o b. diurnum spatium terminantur. —

Differentia et morborum definitio.

morborum definiendi et tumores exigui, erysipelatosi, pluri
atq; contigui, nunquam suppurantes, quorum eruptionem fere
ipso febris comitatur: admodum curandi: statim putrescunt, mixta,
tunc in variolis morbi quo diffunduntur per Epithelium habitus, et
complicacionem cum aliis affectibus.

1.^o interdum inveniuntur et locuti morantur, per unum aut
alterum dem, uno et per plures, adq; febrilem tertiam, et signa
jam memorata propriis junguntur.

2.^o species discreti et tumores illi, neq; universam cutem
obducunt, interdum ad se contigui, ut unum veluti tumores
erysipelatosi efformant, et febris scarlatina ipse amulantur.

3.^o epidemice grassantur et venenatis, putridi, et epichialibus,
suppuratis, aut soli aut simpliciter procedunt, unde virgules,
compositi, benigni, maligni, dubii aut periculosi nominantur.

CAUSA

Causam antecedentem et consequentem, pariter et in morbis
sicut et in variolis, pronuntiamus, eorum discrimine ut
molecula contagii morborum, Lymphaticam Lincoris partem
potiusquam rubram aggrediuntur, indeq; magis, affectu vasculorum
Lymphaticorum quoniam liquorum numerus cuius ratione liquorum in
Lymphaticis lacubus magis labitur, et superficialioribus
tunc tumores determinant, ut ex theoria phlegmonis et
erysipelatosi evincitur, tunc autem vomitiores, seu a contagio
in actum reducent, eadem pariter respiciunt, alimenta
nempe aequali modo sicut in variolis, in massam fluidioribus
agunt, et locuta lacubus Lincoris penetrant.

Symptomata

Duo tunc s' hinc allingimus symptomata, se' semel exposita
in variolis ita esse videant, et dem' in m'illi peculiariter h. -

1^o pustulae m'illor. Et magis sup'ficiariae, neq. unquam sicut
variolar' attollunt, ob tenuitatem et exiguitatem vasculor'
Lymphaticor'. Lentorem fluidi contenti, minorem expansionem
debilem impulsum atq. motum p'te Lymphaticae. - -

2^o venuntia symptomata d'iq. magis veniunt in m'illis, et
maj. calor, siccatas, ariditas et febris reprofunduntur, ex eo q'd
numerosiori lymphaticor' vasculor' prole generalis et impeditur
magis ut in oib' variis liquoror' limitibus ob compressionem
ex infarctis Lymphaticor'. Iguitas illata, quo utriusq. humor
effluxum simul prohibet et infantum universalem excitat. -

3^o demum cum i' variis magis notabiliter p'ferantur -
venae lymphaticae, et humor contentus, nulla arte ad suppressandam
perducitur quae, nisi un' o' e' si intacto vasculor' liquoror'.
Contenti, m'illi nullam depurationem excitaverint, addi q'd otia
et p'ncipio m'illor' promptius transcurrunt ob congesta,
Lymphaticae p'te portio dissipata, neq. ullam disruptionem
excitat, ut ad suppressionem absolutam requirit. -

Diagnosis

manet p'p'nd' dubium, in m'illis aut variolis eruptivis,
pariatq. symptomata utrumq. affectum ut jam p'ncipio
antecedunt, q'm' et s'p'ius d' declarantur ne' m'illo, ne'
variolas respiciunt, t' tunc Congestionem pravor' sicuti in p'te
vici, aut febris putrida et maligna: t' o' levior morbo
e' lupicio si instantibus illis signis, et m'illis aliunde p'parantibus,
exortas v'edstante m'bum neq'q' se passivo asservant.
dem' aem' brumpunt m'illis, quatenus adhuc Congendi p'te tunc

varioli, & Orari diuinitis Dubiorum, etiam, si mobili Cuturis et
tumores sunt plures, superficiales, at uo in varioli, tumores
magis et Quumscriptis, quolibet momento incidunt, donec ad
Suppuratorem perveniant tandem Eruptis, jam mobilis, et protervane
eodem Symptomatum vigore, quod in hanc laenam delibentem,
& Complicatorem alteris affectis tunc rationabaris.

Prognosis.

Sicut mobili degeneratione Quoris moliantis, fluida, et
expurgantur, verumta o solatur ipi existimandi et;
Orari, vult et evarescit emolumentum, graviori Labo
in in stib. Ltaenis et putari, determinant; interdum et
tam vehementer, et tumultu ex sua et mole Contagii, aut
Consensu alteris lae, et Complicatorem Cum febris putrida et
maligna, ut etiam visata interna, in organa Ltaena, ex lymphis
et Igure abeili Congesti, opprimant, quorum visum non
reinde supere o pt. in generata variat mobilis periculum
pro Catarva et Continuae Symptomatum, varia etate agrotant,
et Complicatorem morum.

1. co mitiores et mobili, qui facilius assumpunt, et leviori
Symptomatis stant, at uo periculosi et Ippis letali si
urgeant Delirium, et sopor, aut motus Convulsi, Reliquum
Frequentat recurret, cum pallore faciei et extremorum
refrigatio, pulsus, sit et obili et intermittere, invita
mobili eruptio.

2. minime posticulum in infantibus, augeo uo in adultis,
o solum et difficilior eruptioem, verum etiam ob molem
Crassior equinis, a pertinacis Latentia Contagii Epitula
intu retinent.

3. mobili Simplicis fore nullum portendunt periculum,
at uo accedente febris putrida et maligna, eo rariore.

evadunt, quo m̄tus graviores Saevum trahit, et degenerat —
 fluidi v̄t efficietis obicit. — — Curat̄, pag. 214

Caput xxvii^{um}

De variolis Lymphaticis,
 Gallica

La verole volante

Sim Jemel abijt atq, dicesit periculum variolar[?] et m̄ illor[?]
 278
 aperit apparatu variolar[?] Lymphaticar[?] v̄tq, matam —
 amol, aut nutricia sollicitudo, agitur eas in p̄de Contracti: —
 tum in p̄t̄ horum m̄ alitum Lymphomata p̄t̄ dicit
 dixerunt, ut variolas Lymphaticas m̄sum peculiariter o appellat[?]
 q̄mvis t̄ pustularum tumores, subitaneum p̄sentantur i^o —
 intuitu major periculum d̄m̄tent p̄p̄ragina, vidant̄. —

Variolar[?] Lymphaticar[?] prodromus,
 antecedentia Concomitantia subsequentia,

Et historia.

Fortiora nemq̄m p̄t̄ meditati et tentat̄ n̄a ad d̄volutioem
 variolar[?] Lymphaticar[?] p̄llit̄q, ext̄m̄m horis n̄a —
 tumultu, st̄m̄ ad̄o Cit̄e ōvadunt, ut calorosa lozum, et
 an̄icitate, o nullas ret̄minant, quin agi in d̄cto decun̄ere.
 Cogant̄, ad̄o, abq, p̄prio ullo signo d̄clarante, p̄t̄ d̄m̄ v̄t
 febrili exardescant̄, o p̄gax, et exigua, p̄t̄tra appetit̄,
 et p̄t̄m̄is v̄t capitis, dolor illa, antecedunt p̄t̄tula t̄ magna
 discret̄, et ōm̄i variis suppurat̄o affundunt: genui num̄ t̄.
 anno 1795, suppurat̄o L̄mplum p̄ n̄a civitate observari, —
 p̄o m̄p̄t̄m̄, p̄t̄m̄eunt 2̄ d̄o 4^o die exsiccant̄, et effusur̄m̄
 ebor, p̄t̄q, debilitati v̄t obducunt, nigricantes, a nulla sui —
 relinquit vestigia. — —

Definitio et Differentia

Variola Spuria d̄ficienda est tumores d̄voluti, notabiles,

albicantes, et vase Lymphatici, quasi hydat idem formam
referentes, qui ad subnum partium inter non perveniunt,
et quæ aut quæ die exsicant, leviori momenti patienti
diffidentias, etiam in simplicibus et Compositis, benignis aut
quadantenus gravibus, nullis in mitigatione stigmatibus, impositis,
vividantibus, demum sapienter antecedunt variolas legitime, et in
evanescente pariarum humpunt, et aliqd' oris in recessu
recurrunt. —

Causa

Causa similis, et idem Contagiosa in quibus acie legitime
variola, et danguimus, eo tamen discernere ut in priori Casu
minus Crasis, et levius unitis constat moleculis providas, bases
aut in massam fluidor. quorum Lymphaticam hanc partem attingit
hinc imposita divisa humpunt. —

Symptomata

- 1^o facile humpunt pustula variola? Lymphaticas? ob
debilitatem vasculor. et Lymphaticos, et in leviori appulsa
Lympha Contagio densata, dilatata et intumescent. —
- 2^o nulla fere turba hinc in eruptione, et eo ad in solim
tuo motu pro volutate Lymphaticus humor, ad eam ad exardescantiam
febrilem inertiari sequat, verum etiam Lymphatici rami subura
et hanc manifestum, debilius emergunt ut fluidum contentum
ad motum illum Calorem et expeditur qualis ad Calorem et ardorem
discedat, et examinare possit.
- 3^o positis semel lentos fluidi Circulanti, et Debilitate vasculor.
illud Convellescitur, et solim discedit prodivini inflammationis,
verum etiam hinc jam inflammatione cito evanescent, Cursu
in partem et Continuari possit a suggestis Continuo, et in majorem
partem a fortate liquidi moleculis, et jam semel offensa, in finibus
Lymphaticis, Calore et omillas capitiu vicinas? aëris Contactu et
in nato ex in furore a Coagulo, et offitibus urgeant in Collapsa rami,

aut insensibilis, rivo q^o p^o viscule Cutis Attestat. —

q^o albicant em Colorem referunt, et notabiliora, deprehendunt,
q^o in quolibet t^o variolae? legitimae? ob naturam humoris —
Lymphaticis qui Cumulatis, sicut et minorum vasulorum, potestiam
appulsi facillime ceduntur. —

Diagnosis

Ex jam tradita definitione et relatis signis, Sufficienter pot
variola Lymphatica etiam magnitudine et albedine —
pustularum: jam v^o Complicatas cum febris putridis et
malignis, medicus facile detegat Et symptomatibus, a cum ignis
Conjunctis, in se simplicis emergant, nulla fere procedunt, aut
statim ab eruptione mitescunt et discedunt. —

Prognosis

periculum nullum statuitur in variola Lymphatica, a simplicis
aut benigna dicitur; at v^o in epidemica gravantibus, ut aliam
affectui Complicatis, Dexam, intervenit discrimen, et q^o gravis
quo iuretur, affectus deterior, et gravissimi, et q^o simplicitate
interdum variola Lymphatica antecedunt legitimas, aut ipsis —
superveniunt, ut in pluribus, infantibus anno pro sine elapso
observavimus, quorum magna pars utroq^o. modo, p^ontia bene
typis correpta fuit. —

Cutae pag. 22

Caput xxviii. ^{non.}

De macie

puer facile in maciem incidunt, a juvenum squinis, Empagis,
adeo robles a ut facile idem pot, et pro parte tenentatem,
ingentem humoris dissipacione pati. Deo vel d^o q^o, p^onti molem
et soliditatem, diffiilius, potest, p^onti dissipati, in equine, h^o vicia,
totius ep^ori emaciationem producit. —

Salsuginosus

Saluginosus fit sicut, si dicitur quo in fano nutriti, —
 Calidum et saluum fit, et facile maciem producit, cum
 maxima salina q̄tas. Contrario s̄guis sup̄editate parit̄ si
 quies ab lactatib, libis salis, piscatib, et exsicantib, utat, ut si
 vinum nimis apotet, macie dabitur. Fit quoq, hic affectus,
 p̄p̄ta et homachi vitium, dum cibos? Coctis, nulla fame in eo
 fit, quoniam eam quā p̄vor? Continuo chili ad ventu eget, ut
 quos eorum accensura pot̄, Lasa digestioe cibos, minima hujus
 humoris q̄tas, s̄guis sup̄editate, q̄o nulle acceto, imo sic
 reparat sufficiens fit: Consumit q̄o Brachamum s̄guis, et
 Sympha aridissima acquiescit, nec p̄ta nutritiā nec reparat̄ p̄t.

Hic adhuc amabilius post m̄os, gravis s̄ncos, Brachamum
 s̄guis absumens, ejusq, Compagom plurimum solventes, sic
 variolos, ventositas, febres diuersas post se maciem esse relinquent,
 ad his eam s̄are macie producit, accit̄ t̄a et ad alios cas, sicut
 sup̄editate, exultate, et viscerum inueteratā obstructioe. —

Quod si macie Constitutio s̄guis, saluginosam supponit,
 et eam eam producent humoris, saluginosos affectus, s̄guis igit
 p̄vor? macie laborantibus ad nutritioem idoneis, et erit nec
 deperditionem partium s̄garare poterit, hinc macies et emaciat̄
 totus q̄tis; et cum s̄guis Brachamiam qualitatem amiserit,
 vase vis infigere et succedere poterit, unde varos? ariditas, et
 excoagatio s̄guis. —

Dum quoniam maj. fit deperditio q̄m reparat̄, minima
 Cont̄ Labit̄ humorum molis, macies adhuc copia pinguedinis
 adit igit tota p̄tia Conuorsum Consumptio, et totum q̄m
 omib, t̄em et ante Conuorsum videl̄bit, hinc undiq̄q, om̄a —
 eminebunt, et parit̄ ubiq, p̄elli erit.

De s̄guis sup̄editate humoris Constitutio saluginosia, —
 q̄d q̄ s̄guis derivat̄, saluginosum esse pot̄. igit usina
 a s̄guis sacante salua erit, et ad p̄ritatē aptissima, unde

ex coarctabit, aliamq; pte vicinas nisi seorsum removeatur. ca-
 etiam a ex ano fluent, & hujus acrimonia immunita,
 cum ppteritiam a massa humor. derivanti, debite anni psumq;
 vicinas ex coarctat, si exata aliquando removeatur, ad raeo-
 interna vis lavitas deficiet aphtis, puer quoq; testiculari-
 vigil, anxius erit, tandem febris hanc quinis constituta
 quit, ut facile cuilibet attendenti patet: tandemq; quinis
 Drabamo consumpto, mala reperiri exposita ingravescent. —

Diagnosis

pse et sola pueri imbecillitate maie cognoscit, eiq; caa
 difficilis e, quare hae nutriae explorandum, & ab ipsis —
 minis hantib; scire an mris jam fuerit constituta, an
 penuriam ciborum passus fuerit, an diu laboraverit —
 inappetentia, & tandem an lactis Lasa corrigata, a-
 alio Lotioni, et fectis Lactorum, et ventris intumescentia
 declarabit.

Prognosis

maie haec et a caa externa oriunda, raro periculosa
 e, facile tollit, inveterata vero gravis e et periculosa, et
 difficile sanata, praesertim si a caa interna et abditata —
 producat; maie, & mrem acutum, et quinis compagem
 solventem squit, maxime periculosa iudicatur, et si diata —
 Convenienti instituta, et remedia s; parata exhibita, & si
 vigeat appetitus, et vira resoullenti, tunc maie periculosa e.

Cura
 pag. 221.

Caput XXIX.

De tumoribus thumoris

Struma seu serozphllo sic dicunt, & frequenter serozphllo
 v; suis in collo sunt: haec tunc p; ii, alioquin paster.

Ita utrumque seu serophulae tumore, Colli glandulas
 precipue afflictae, at illar. jugumque aliasq. circa aculo
 osium collocatas, sic in cubito manu digiti, genu, pedibq.
 frequentr appaerunt, parim fr ubiq, sunt in sterno, brachiis,
 crurib, his tumores ppie minus, Cati Concoloras, leuiter indur
 escunt, et sibi natiu emulant, paulatin succrescendo
 molliem acquirunt, Sevis et profundus fit dolor, praesertim
 dum tanguntur et congruunt, His tumor subovo proficit, et
 suppuratio succedit. Sedq, dolor et mollietas abiq, vubosallesant,
 tumori intus suppurat, Carumq, cito subjectis affert, primum
 signa suppuratiois ostia appaerunt, hinc ora suppurato maia
 purulenta, viscida, albicans, pallida aut flava sine calore
 exaruit, et ideo hi tumores ad atholoma, aut statoma et
 melicidiam et immunito ob contentam maam a nonnulli
 referunt.

Primum Sedq, tumore, nluer aliqd in diuina et fib:
 dum ad suppuratioem adducunt, age et mare' febre lentâ vivuntq,
 prostratae Corrigiti, facie pallore defedati, peneverante
 suppuratioe, marasmus accidit.

Quod in glandular. textura molli et Laxa admodum, atq,
 vasis lymphaticis, aliisq. secretioni humor. inservientib, nulla
 mori reflexis et contortis constant, ex eo quoq, oportet ut
 motu humorum glandulas subeuntium, facile in eis sitati,
 nisi humoris maximam fluiditatem obtineant: igitur caa
 et humorum bit visciditas et acrimonia Lymphae et p. intiman
 glandularum substantiam volute, atq, paulatim in his humor et
 accumulata, tumorem parit indolentem qui inuen, n. temporis
 longioris, immutentem, dolet subet, suppurat quoniam natiu
 Lymphae ad glandulam obstruitor continuo accidit, aegrot
 continuo ex hac sentia, novumq, dilatari quodum tumore
 acquirit, qui fit ut maj. vasis quibusvis complexio fiat, magis
 etiam humor. in eis sitati, unde vasa. disruptio, qua

Sicut humorosa effundunt, et suppuratio incipit. De vna
 parte humorosa visciditate fit ut suppuratio absq; motu
 tumululoso et precipiti fiat, et ideo cum motu suppuratio
 efficiens lenis et parata sit, vis sui iudicia suppuratio patet
 quoniam tu humor offert, aciditatis et acrimonie particeps e;
 per jam genitum et supra ora offerunt, ea rodit et exulcorat,
 si hinc qm plurimos in vicina ubi sunt, si glandula circa
 Carnes, et ab oculis remota fuerit: si minor sit Lingua vitiosa,
 una aut altera tunc glandula afflicta, si major, plura simul
 in dnois atq; tumebunt ac viti, aliq; pars vitiosa
 hoc Lingua, hinc taktis cum stomachi complicati, et ut
 plurimum via pinguis, ut sternum, mai stomachi tumet,
 et exulcorat: hinc facili patet tunc tunc tumore, stomachi manus,
 pectus, afficiant, sternum cum hoc tunc pluribus oculis simul
 articulis constant, idq; ut maximam glandularum numerum,
 humorosa viscidum articulum motu insensitum, eructan
 tum, ex eo quoq; satis patet. Sed stomachi hinc patet tunc tunc
 afficiant, nec glandula inter laterales tetrahexdus parcat,
 quoniam eadem e omni glandularum textura, idemq;
 Lingua ad ora patet appellente vitiosa, ideo glandula interna
 sunt et externa humorosa fieri pat, vniq; hepatis et Lien, tumida
 et obstruunt, hypochondria efficiunt tumentia, ut et pulmones
 et mesenterium. —

De vna cum in mesenterio glandula passim occurrant et
 mai stomachi replata et tumida, venas et intestinis videtur
 comprimant et squini motu in ipsis retardant, quo calor
 augetur, acris in ipsis contenti claritas et Dilatao crescit,
 unde guttatur. dilatatio, tuncq; abdominis in tumentia.

At sicuti glandula hepatis, mai sero, plurius obstru
 suppuratio, ita et facili in tumentia, cum illi sit calor
 humor. presentia, motu magis contentis: hinc a

glandulis ruppatis aliqua pars etata, a vasis squisioris —
 et Linguaeque orbi rumpit. qd humorum maris pura
 inquinata, facta est p[ro]p[ri]a a[n]nua. Contactat, quod salia ipsius
 magis exaltata, ultra rorem aerioniam Lingua Consumitibus
 unde febris lenta cum macore, vidua prostrata et facie
 pallida fit, ab huiusmodi, moramur adiungit, cum per
 partem genitum suppurationem atque viscerum producat.

Constitutioem quini serophulosa producit lac quo infante
 alunt salis Celidiv q. p[ro]p[ri]a malam vidua rutiis rorum v
 vehementiora ai pathemata, ab lac magnopere alterati, quoniam
 aem rhomachus lactantia debili e, ne lactis vitium corrigat p[ro]p[ri]a
 id e[st] roris qui a lacte iam vitios confectis ejudem jodoly et ai
 partem, unde universa humor? massa vitiditate et saliditate
 Contrahit quo fit ut chelus dem quini miseto, parapi hoc
 Laudabili humorum magis v[er]o minus proficito.

Quoniam v[er]o quini lactantia s[er]vatis multum, eosusq,
 vitia r[ati]o humida, hinc roris lactantia v[er]o fluiditate
 et aerioniam contrahit, lacusq, serophulosa in ipsi ne minima
 q[ui]dem sui iudicia probate pl, hinc puri gradie lacte apurto,
 Remedi v[er]o stummasum inquinanti, et ai p[ro]p[ri]a rami videnti, roris
 aer cordis puris, mutata vidua roro et atate, quini minus aequum
 evadit, salisq, et s[er]vatis antea humor? massa impregnata, mas.
 adipsiurto moler, et roris sulphurum replente, fluiditate
 Lingua j[er]minant, hinc tumore glandular? nascunt. verum
 Evanescente salina mole, magis tollit humorum fluiditas, unde
 vitiditate magis exiosa Lingua evadit. stumo puris adhuc acidenti,
 et si m[er]ito impregnate, quoniam lacus v[er]o a seminali humorum
 Constatuioem mutat, quini motum intariorum fluiditate j[er]minant,
 et eo fit ut lac in mamma post conceptionem secretum, nimis
 visidum et acidum sit, eaq, r[ati]o ad stummas generandi ex[er]tionem.
 hinc m[er]ito, etiam nascit v[er]o pars lacte plurimum nutritiva
 nutrita, hoc v[er]o Lactis Diversitas, puri (quoniam inquinat, lac
 lac j[er]vatis roris id habeat, qd in humorum Laudabile, converti p[ro]p[ri]a

Tumorem Stomaci per Contiguam Communicantem, et a parentibus in
 Filios transfundunt, factis enim parentum cum infantibus Communicatis
 propter hoc facta sunt, quia humores parentum se per os unum factis
 transfusi sunt, idem, visum inferunt, ad ipsi a massa humorum
 augetur. vomica adhuc dicitur parentum aut nutrices male
 curata aut adhaerens, Stomachum puris Communicantem, siq; ob
 parentum peccata, misere affligunt, a dicitur vomica, seraphulosa
 afflicta, moline, ut in causa effectus vivit.

Diagnosis

Tumore Stomaci o colura, a sede dignosci potest, cum Colli glandula
 et in vicina articulum collocata turgere et inflari dicitur, abiq;
 in tumore a dicitur parentum de modo affligunt: tumore tumorem
 effluunt in ipso cuti concolorem et induritam, ochini ream
 amulentem, paulatim et dente succum tumore, tumq; dolere, et gravi
 ta nisi vomiti, aut dicitur dactilo: vultus et calidus adjuvante, dicitur
 hoc statu praesentat, plerumq; ante sint indicia suppurationis, et ut
 delirium tumore molliore et fluctuante in eo proptul dactilo: hinc
 tumore frigidi, tumore vulgo dicitur, et ab humore frigido, et late ad
 suppurationem venientem dicitur dactilo: tumore suppurato, oratio man
 virida, paulatim et ferme abiq; factis dactilo: vultus, et fluctuans
 adeo difficile sanatur, ut tumore per plura annos suppurare valeat propter
 remedia, a vitio sanguinis constitutio dactilo: factis dactilo: consumpto
 ferme sanguinis dactilo: dicitur dactilo: dactilo: dactilo: dactilo: dactilo: dactilo:
 tumore suppurato, et adiacenti communicat, a casu per cursum continuo
 suggestit a quo a vitio sanguinis dactilo: dactilo: dactilo: dactilo: dactilo:
 ex se late parentum medius assequit, tum etiam si plures puri ejusd.
 dactilo: laborant his tumore.


Prognosis

Tumore difficile, et ob id aetatis mutata sanatur, non remediis
 et plerumq; superant, nisi humorum massa hoc seraphulosa
 vultus inquinata unum aut alterum tumorem effluunt, tunc antea suggestit
 cat, tumore, suppurat, tentanda remedia a aliquot diebus succedere, verum si
 xlvos, affligunt facta diversa, praesentem pade, manum, nil ultra moliri
 oportet, a vitio sanguinis constitutio dactilo: dactilo: dactilo: dactilo: dactilo:

etenim resolutiva et logica de omnibus humoribus et humoris opponunt,
 suppurationem accelerant, visusq; ibi Latens Spiritus Rursus
 tandem exaltant, aeris efficiunt, tametsi tumor ad suppurationem
 pervenerit, ossaq; fuerint Cavæ Defecta; de Curacoe o desperand;
 modo si febris o adit, humoruq; appetitus, visusq; ratis —
 Constant, mutacoe etatis mta Curati, ut lege' sapient' fuit
 observatum; verum si suppuratio copiosa sit, et plures
 tumores in diversis partibus simul suppurent, ossiumq;
 Cavæ maxima sit, cum impotenti ad motum; omnium
 affectionum intumescentia, febris lenta accesserit cum
 insigni marcesce, maximâ visum prostracoe maximè
 mortem timendi loco: Tamen de salute agri actum e,
 si humor serosus humilis, in his genit' suppuret, ad via
 nulla patet, si qm per foras produci possit. curacoe pag 228

Hujusce Tractatus

Finis.



[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Cap. 1^o pag. 8.

Curationes,
morborum puerorum
et 1^o De
incommodis graviditatis.

Sicut multi in graviditate in pueris recente superantur
sunt obici, & tunc ea indiscriminata tentanda sunt
remedia, & prudenti administranda sunt, quippe non
minimus lues fetus habet calamitatis, et
ruinam precipitare potest. hinc delicatior est thesapia
morborum gravidarum praesentium, viamque medicaminibus
levioribus praesentanda est, quae circa lues a
veneris competere potest casibus, quibus nullum sit
abortus periculum. Proximus.

1^o si in gestationis temporibus, nausea vomitusque, diversae
sunt program, nequaquam cohibenda est evacuationis,
opiatum adstringentibus, & interdenda emetica et
catastricis, proinde ut ayunt pravorum suorum?
Contentos? in 1^o vis; hoc etenim ut jam monuimus
pendent a mutata indole succi gastrici, irritatio
fibrae nervosae? Compositum ventriculorum, adeoque
committenda est solis nae viribus, aut ad summum
puranda ibuentibus et defluentibus a vomitibus angustis
et conatus minuire possunt, nisi ulterius protraheret
affectus, in quo casu 1^o homachia cum levioribus
purgantibus et praesentanda.

℞. Rh. Cortus ʒ. ss. Syr. de chicor. Compos.
ʒi. Cap. ʒ. ss. —

L.

Si memorato remedio o. Sedat vomitus, feceratis prius
 p̄ aliquot dies infusione melissa cum succo mentha, v̄ e
 chocolata matutinis horis, et aliud e' ex e'nanato perina
 p̄ndolis mace, ad sequentes purgationes accede.

℞. mis. obol. Cct̄. ℞i. Summit. abynth. l. et
 Centaur. min. @. ꝑi. Coq. ꝑ. l. q. a. f. —
 dein dissolv. mann. Calabr. ℞ii. Colat
 express. add. ℥ss. de chicor. Compos. ℞i. —

Si vero aem conjunguntur tormina intestinali. diarrhea v̄
 tenesmus, prescribendus e' vespertinis ℥ss. papaver.
 alb. v̄ Duobus amaro. Injunctum e' animum et
 Succedat ista opiatra sub sequenti formula. —

℞. Conserv. Kinnorod. abynth. min. et
 ror. @. ℞i. l. oval. rub. ꝑpi et oculor.
 cancor. fluviat. @. ℞i. s. add. ℥ss. de
 abynth. q. l. ad Conficiend. opiat. de
 qua' cap. p̄gnans mane et lro' ℞i.
 addend. Doct. Isotina laud opiat. q. ss.

2^o Dum insistant graviores Cephalalgia, rubor, suffusio,
 intolerabili gravitas, sine' motu secunda e' vena ꝑ
 torachis, e' p̄t etiam de p̄t ad Liberandas p̄tes —
 Superiores, Symp̄t redundante oppressas. Illud aem
 auxilium frequentius fugat, aut summo p̄e' imminuit
 graviditatis incommoda, si p̄terea' accessit Complicatio
 Cujuspiam m̄bi, ut Feb̄is putrida, maligna, pleuritidis
 aut peripneumonice, nulla habenda e' graviditatis ratio,
 et peragenda e' cumq, m̄bus deciduat, cum satien

fetum perire, alia matre, quae utrumque, Cetera occurrere
 morti, tr. Sapiens accidit et thum abest ut Cephalica sentio,
 et emetica abortum praevenit, et immaturam fetum, promov
 eant huiusmodi, quin etiam afferendo Caesari, et -
 Liberando matrem, Favent efficacius fetui incolumitati
 ut quotidie exprimitur.

13.º Frequenti teris delarato 1.º graviditatis periodo,
 Si illa e' reflexa humoris uterini ad tubos, pneumonico
 et traqueali, pendat, huiusmodi, hereditaria, et
 natali, fabrica pulmonum, natale, dedit, et statim
 soli nae delinquit potest, et Cujus, duras sequentia huius
 remedia, vana em. Felicitatis sciat ad liberando -
 pulmones et praecavendum infarctum, et si dnt huius
 Juscula sequentia.

℞. pulli junior. Cujus ventos depleat hor.
 mundat. Cochlear. ii. loy. ꝑ. Rev. i. 4. die
 ad. fol. huius. et Borrug. C. m. p. Bulliat
 ꝑ. hor. ¼. Colat huiusmodi Cap. age ꝑ. 9. die

Imo si quis priam aderet solutionem varo? pneumonico?
 metus, atq. suppurationis suspicio, addenda. Sicut, jura celo
 praescripto vane et testudines, ut magis adhuc demulceret
 liquidos. acrimonia, interim resperit hor. et et negligenda
 narcotica et soporos Conciliando. Labentem tam restituant,
 ut vana refrigerant, cum foliis Capillo. vena. -
 papav. thead. Borrug. hordeo mundat. aliisq. huius -
 generis, sicut et Lacticia vana ad. d. obtinuerint -
 mulierulo, et Laborem et acritates. Simptum sublevare

die conjugales, ita ut versus h^{unc} aut dum mens em
 haemorrhagiam uteri nullâ datâ cautâ præparatâ, & o
 solùm spem cæm proli auferebat, verum et eam et in
 evidens vita Discrimen Coniiceret, diversa petiverat medicor?
 oracula, variisq; una fuerat judicis medicaminis ad -
 servandum fætum, quis tã melior ovarisset conditio, dum
 me ad visendum episcopum defunctum vocatum Consultit.
 Itatim ab eâ similitates hinc ad quinque menses pro
 victu & pathematis incandescentiâ, & præsertim jam totis
 mortuæ proli anxietates de quâ Conquereretur determin
 arent aut foverent, qd responsum fuit nullam h
 propositis leviora ansam mibi unquam dedisse, quò cæcâ
 interinas cæm examinari, et polissimâ copiam sang?
 membris & ita ex helata egrotantis mibi visa e, ut,
 statim unicam abortûs Continui cæm judicaverim; in -
 hunc finem repudiatis opiatis et pillulis adstringentib;
 & ipsi multoties sine lacrimis prescriptâ fuerant, propterea
 quolibet mense v, s, inbractis & totum graviditatis -
 tpus, & juvenis parentum clamoribus, celebrata fuit, -
 tanq; felici præbuit hitum, ut proli Brevis se habentis,
 lenioribus etiam quærensî dolor mata evaserit. -

pag 4^{ta} 12

Cap. 2^o

Curatio

De periculis partûs

ad felicitatē Lachior. immoderata evasitior succurrendus,

perpendenda et casus in partu natales, sicut, et cum variis
 Caputibus coarctata fuerint, diuersam quoque esse agendam
 exigere videntur, verum tamen cum facilius reduci possint ad
 repositum in uterum, et ad vitium fluidorum. duplici hoc
 titulo, praeter naturales ab hinc ortuos motus, sequentibus
 auxiliis componemus, et 1.º quoniam propter quosdam hanc
 Quorsu videntur in fundo uteri a portione quadam placenta
 secundinarum, quomo sanguineo impulto, interna remedia
 vix seorsum attingere possunt, etenim sola arte et manu
 chirurgi et obstetricis, promptius eduenda, quippe nulla
 speranda salus, nisi prius sublatis sint obicibus, qui si tunc molis
 extiterint, et praesentibus obstetricis, in utero ad aliquot
 dies conclusi, praesperam se videntur conueniunt periculum,
 et inuitis omnibus fove remediis, flumina sanguinea putrescentia
 simul cum adfunditur, interea lura sola nra adq;
 sufficit, ad expellenda illa et hanc Quorsu, praesertim si
 iureto. medias statim et prescribere v, s, jnbraechio, bria
 aut et jndie, et solim ad hemorrhagiam minuendam, vovim
 etiam ad praecavendam phlogosin uteri, qd praesentis,
 consulendum visibus praesentis, si languentes et extinctae
 fuerint, refrigeranda potius lenioribus Catarrhacis. —

℞. aq. flor. Cord. Zii. in ab. Sissocha Cordus.
 alth. et hyacinth. @ Zi. aq. li. nammom.

℞j. A. proo statim sumend.

Efficiam tamen auxiliium resumendum et h. dlystetis —
 diuersa familia, et quadam tamen irritantibus, qui stimularo
 uterinas fibras, eas ad violentiores Contractioes, et Contra

avulsione et hystericis, delirantibus, hystericis, incontinentibus
 pruritus variis dibentibus, desepgentibus, balsamicis, —
 acris, sicut pariter applicatio calidior et aromaticos?
 Supra regionem uteri, et pro tunc nervos? genus, et —
 Fibras motibus commovendo, majores motus determinent,
 qd. diata o. vitacula abripi possint. —

2o Cum foret intensior lochior? effluxus, annotata —
 Labelluidor, ut fervore dissolutioe et simili, magis
 adhuc qm. ja priori tunc persistendum e. v. s. —
 Confluxendo deis ad hordicata, gelatinas, emulsioes levis,
 opiatas adstringentes et hypnoticas.

℞. sem. frug. mund. ꝑ. Contund. ja mortari.
 marm. tenui affundens. Decoct. liquirit. deis
 Colet. et Colat. ad. ℥. ℥. papav. alb. ꝑ. ꝑ. ꝑ.
 emulsio sursum. ves. pest. hor. —

Quod si o adhuc compositio humor motus, et augeantur
 rivuli squinai, squinai julep. parandis e. —

℞. decoct. consolid. maj. et aq. ros. @. ꝑ. ℥. ℥. ℥.
 de ros. sicis ꝑ. ꝑ. succ. depurat. urtic. ꝑ. ꝑ. —
 Laud. liquid. gutt. xx. ꝑ. julep. qui facile
 potest mutari ja opiatam o. idem scopo —
 satis facientem.

℞. Conserv. simplis. maj. ꝑ. squin. dracon. et
 Torr. sigillat. @. ꝑ. ℥. ℥. ℥. de ros. sic. ꝑ. ꝑ.
 ꝑ. opiat. sursum. sero et mane ad ꝑ. ꝑ.
 ad. dos. bot. laud. opiat. gr. i. —

his paratis, jmo et ꝑ. aliquot dieb. continuatis,

debellanda e' Causa & diutana reseractione humoris Constat,
quo' Lisa' si adsint induria praeor. Siccior' ut nausea, lingua
amaritudo, et siccitas, pondus in ventriculo, aliaq' hujus
modi, proponendum e' ad quem Cathartico-emeticum: —

℞. Decoct. Sol. chior. ℥v. Lolo. mans. Calabi.

℥ij. add. hyppocacuan. ℞. Cap. v. —

℞. Sol. Senn. ℥ij. j. sunt. S. Indes et tamarind
pinguis ℥xii. deis. add. flor. malv. et violar.

℞. ℥ij. pot. sufficienter j. fus. solv. mans.

Calabi. ℥ij. et ℞. S. pro mo. 2. Ser. i. ℞. ad.

fortior stibiat. solub. gr. iv. —

Hic succederent juxta dea frigida Ampullis et —
plantis adstringentib, ut plantago, Osmunda pastoris, equiset.
Consolid. Oristort. urtica. imo et perseverante affectu varia
Lacticiis, cum Succi variis repuratis, & quibus probe —
dilueat & tunc aequant. —

3.º Si in ex adverso jutat suppuratio lochior. diversa
procedendum e' methode, nisi i a phlogosi utri, & viuar.
Itum inflammatae dependet, jz quo Casu cadon e' supur.
procuramus adhibenda forent auxilia, & potius laxitate
et torpore fluidi Circulanti, & jn p'istat'o generali —
mana Sguinis, ad sequentia Recurrendum. —

℞. aq. artemis. et matricar. @. ℥ij. jz ab.

Disolv. thesaur. veter. Confect. altham @ ℥i.

add. syr. tumilag. ℥i. ℞. S. statia rursus.

Tribu aut q.º oleis a potius Cardiacis hoiu, secundum
venalaz hena, ad augetur fluxus Cruoris p' ramos —
epigastricos, et spermaticos, et jntendendam derivat'oem
fluidi

fluidi quasi o felicitas successiva, ob praeiuriam coagulationem
complicata noni. Quae febre putrida aut maligna, equum
proo paranda e.

℞. fol. orient. ℥iij. Summit. abynth. ex lentan.
mix. @. p̄is Cap. urit. jz. aq. f. s. q. jz. colut.
et hypocr. ℥xii. dissolv. man. Calabr. ℥iij. ℥.
℥. proo proo 2. Doz. i. & add. tartar. stibiat. solub.
gr. v. si agra instrumenti delicatioris n̄is -
ly. globos. gutt. xxi. ℥. proo. —

dein n̄ attendendum ad Quabaos Febis, a putredine Cerebr
et pulmonis imitanti, jz. at. circumstantis responde
n̄ i, a talo jmo et potio simpliū purgans, et extracti n̄empe
Dosi tart. stibiat. n̄ ly. emetic. Dose peritus Convalescit. —

Et tandem ad spectat ad Therapiam Febis Lactae,
Idis nec visib. Committenda e, haec em dicitur solet qua
proprietate resorante Lactis Fontes, et funditis profluvium
humoris quo proles excludit letetiae crescit et nutriti: vorum
Cum sapient illa Consubium jreat Cum prava Constitutione
Lactantis, et aliunde mater Febris Quentis jz humanioris,
nutritivum proli ob mammae revascularisatione, diversa
Fontanda vint ad Coirrendas ex humore Lactei reflexa jz
quibus Lacum nasiturus herbar, adeoq, Fatia victu tenui
jzmparandus e, dein gossipio olei Camomill. blhat n̄
melilot. n̄ Lintis Calidis, et acervatim jzmporitis Coirrenda
mamma ut p̄scaevante p̄dutas, affusus n̄rius —
humore Lactei, et mag. ignis pass p̄ spicula
vaso. diffilavit: interim parenti p̄tze ana levitai —
aperientes et Diuretica. —

ad, ante aam dixerit cum squinis rivulis reddiderit
 opinarenti: obstetrix tu jntromissa manu in utero, —
 sentiebat suppositis placentae portioem, & medebilitate
 purgata, et metu lileali syncope, quæpiam moliri
 aut tentare o audebat: vocatur sum instantasæ hujus
 periculi circumstantis, et perperisio miserimo egrotantis
 Mater, quem plane desperatum, Continua etiam p —
 Levius intervallum hæmorrhagiâ judicari, quæ ius imperari
 obstetrix ut iura sine formidine auferret extremum lpus,
 quod tremula manu perag it, & eventus vices addidit, quippe
 remisso statim Cuoris uesticulo, et restituta proe —
 Cardiacâ animo, brevi post brevi a habuit purgata. —

Cap. 4^o pag. 19.

Curtas

De vomitu et singultu

Ut efficacius mederi liceat singultui aut vomitui, —
 quibus attendendum e præsertim, ad Cyprian Lactis o
 ingeisti quotidie ab infante, ad notam humoris qui
 rejicitur, deniq, ad statum ventriculi, e ota o leviora
 in hæc apijâ mutationem afferre dnt, utinam si a voracitate
 etura in eis originem ducat, portioem quâdam alimenti —
 Substractâ, et nullo adhibito remedio discurrit, varum
 si a pessima Lactis indole, aut maij prævis cum
 ipso commixtis simulq, debilitate ventriculi dependeat,
 sequentia administrandas t remedia.
 pr omittenda e statim v, s, si calor et febrilis motus

Cum vomitus declasent, ad praecavendam nimiam
 fenellor. vasculor. turgesc. iana, aut rupturam à jz
 repetitis concussivis contingere possent, aliter aers
 suppressenda à illa evacuat, et prescribenda à
 sequens julagium. —

℞. aq. ros. ℞i. Coral. sub. ꝑꝑi. et oculor.
 Canvor. fluviat. @. ℞ij. Confut. de
 hyacinth. ℞i aq. nazh. cochlear. s. fl.
 julag. cui addid. cent. lyl. papor. alb
 ad ℞ij. aut ℞i. si vigilia aut calor
 intensior urgent. —

Dein vò eliminanda et mäs contenta, seu longēta jz
 ventriculo à emetico leviori, à Cathartico si jncursi —
 pōit debilita ventricul. et laxitas fibrar. prescribiti —
 hypericum. sub sequenti formula —

℞. hypericum. gr. v. Confut. de hyacinth.
 ℞i. solve jz jus. ul. aut viā. rubr. cochlear. ii.

Si vò adara appareant ventris termina, et jz —
 Calorelt ite jnemat, relicto emetico paranda quera jz
 purgans.

℞. fol. orient. et flor. persicor. @. ꝑ. ii.
 summitat. absynth. mäs. ꝑ. i. loq. levit.
 jntiq. aq. f. jnulat. ℞ii. Dissolv. man.
 Calabr. ℞j. s. de Chlor. Compos. ℞i.
 fl. jz val.

℞. rh. crassiuscul. bit. ℞i. à ℞j. loq. jz
 aq. font. ℞ii. Dein Dissolv. man.
 ℞j. loq. Lactar. —

quod non nunc subministrare potest, ad brevem in emolumentum
prohiberi solet. —

Cap. 6. pag. 26.

Curae

Terminum ventris scilicet Doloris

Si iusistendum e opere plurimo Colici Doloris, ut
prolevari intensior intestinum? tensus, mitigat spiculis,
et arveant, symptomata ad hunc pendencia: vorum auxilia
a seorsum attingunt, tunc administrari requirent, quos
evidentibus patet ex signis jam dictis Colicae species, adeoq;
Dyglia tot. saniorum therapiam, Comprehendenda iuvat. —

1^o cum aflatibus, viscidisq; humoribus paritibus Stitula
intestinalis ortum habet termina; nullumq; immutat foebis
aut inflammationis periculum, quem statim iusistendum e
exema

℞. fol. pariet. m. ℞. sem. anis. et faniul.
℞. p. ii. flor. Camemel. p. i. Coq. in a. f. s. q.
in Colat. et oppression. ℞. v. d. vi. Dissolv. —
Catholic. ℞. β. vitul. ovi dimidiam pten
f. Clysto. —

Eodem tyora forvati abdomen Lintheis Calidis, v iungat
ol. aneth. et Camemel. simul cum decoct. pariet. et malv.
et parietis vesperitinis hor. juliaz. iquens. —

℞. aq. naph. ℞i. Confact. de hyacinth. ℞i.
lyr. papav. alb. ℞ii. Coq. vel —
℞. Masur. fricat. ℞i. solv. in vin. rubr. —
Cochlear i. Cap. —

Crastina via si quidam tunc recurdat Dolor, repetendum e
clysto et fotes ubi etiam in die succedat ex iusistis Confact.

de hyacinth. ꝑi. Cum Coral. rubr. gr. xv et thillo lactis, ^v
aq. naph. Cochlear. i. deinde vō eliminanda ē Caa rubr.
Cathartico sequenti. —

ꝑ. rh. Contus. ꝑi. fol. lenn. flor. persicor. et len.
anis. @. ꝑi. Coq. in aq. f. i. q. julolat. ꝑiii. —
dissolv. manā. ꝑi. v. ꝑvi.

alterā a purgatione die, impuranda ē gressio hinc inde, et rhei. dii
indie sursum, et ꝑ hinc. Continuant. ē si placet sthocum
o roboraret, prescribit ꝑt hinc. de abigath. ꝑi. Cum rh. pulve.
gr. v. v. vi. ꝑ. duylia die ante lactis haustura, si lactam
fuerit, v. ante paratellam, si solidioribus libis vesicati. —

Similibi processu modo se gerendum ē in alterā Colica Trac:
Siquitā statim se dimittat ꝑas locanda ē vena, nisi etas
tenuior, v. reliquis phlebotomia obvia eam interpellant. —
misso am quare parati squens elytra.

ꝑ. Cucurbit. infructul. sect. m. i. len. lin. ꝑ. i. —
Coq. in aq. f. i. q. subꝑi. Coct. ad. flor. malv. et
violar. @. ꝑ. ii. julolat. dissolv. mell. violac.
ꝑi. ol. amigd. dulc. sine igne ꝑ. i. ꝑi. ꝑ. v. ꝑii.
ꝑ. elytra. vel. —

ꝑ. Sacot. omas. ꝑvi. solv. vitell. ovi. vel.
ꝑ. Lact. vacc. lapid. q. i. et paritā injiciat.

hora somni paritā exhibendus ꝑjulger. —

ꝑ. aq. plantag. ꝑi. ꝑ. ol. amigd. dulc. sine igne
ꝑ. cochlear. i. gr. papav. alb. ꝑii. his ita
paratis aut continuatis ꝑ 2. aut 3. die, —
si dolor mitigatus fuerit purgatio sequens —
celebranda ē. —

℞. mann. Calabr. ℥j. solv. in infus. flor. malv.
et violav. ℥ij. add. syr. de chicor. Compos. ℥i.

ff. pco.

Continuandum ē ipsa narcoticum vesperis hor. donec
Lactans Convalescit, imb et sequens pulv exhibendus ꝑ

fiduum.

℞. Coral. rubr. ꝑꝑ. et oculor. Cancor. fluviat

℥i. gr. xv. miscela in syr. de chicor.

Composit. ℥ij. in Cam. thillo Lactis.

mirum sane ē q̄tum Coral. prosit in hoc affectu et in
probris imis alii infantum. —

Observao

junior in eam pharmazopola hujusce civitatis, t̄ia
nativitate precehato ventris torminibz, ut die et nocte
in ejulatu Continuo transigeret, et ab oibz ꝑ Concessa quiete
relinquisset nutritio, siq. nullo argenti pretio, ꝑ etiam
auri recuperant ad prebendas mammaz, plura susibundo
quasi Lactanti exhibita fuerant, quin ullum marxet imb
decrementum; parente ꝑ recuperant narcotiaz, imb q̄ multa
presentia et Comibz ē in hāce teniori etate Lactantum,
aliaq. Odere multa tentata fuerant sine ullo successu remedia,
dum ꝑ materis rivos incedem, vocatus sum ad indicanda
si eadem forent in hocce modo auxiliā: explorato Lacte,
et examinata nutritio, sicut et auditis ꝑ operata brant, —
huari ut t̄i in die ante Lactis haustum exhiberent
Coral. rubr. pulverat. gr. vi. ꝑ viii. ꝑ oleis aliquot
Lactis, jaetoz et flebz, in Lactis, adeo efficacis —
remulose, ut nullo dein facto remedio probe se habuit

Curao

Curatio
De difficili dentitione

plura ad fugienda symptomata difficili dentium eruptionis, & statim graviora minuitur videnti, catartica et vomitoria praescribere solent, & tunc abest ut motus minuant, quos etiam intendunt, et fata puriori accelerant. et tamen ois ille tumultus a Recurrende violenta febris. nervorum, et Commoed - liquidos ovis Dependet, adeo ut ois in eo vanari et Curator sepius, ut mitiget stimuli Causa, et praevaleat febris et infarctus viscerum ab ea omni, in hunc finem statim hoc explorandum quo vesicis in fians, atq; mutanda rectrix, si o designatas qualitates obtinent, & saltem illi praescribenda e Dieta humectans, et refrigerans, deinde vero ad Casum mali, emolliente, et fricanda Sapiis gingiva, mucilagibus, pyllii aut Cydonior. pulpa radice althaeae, melle narbonensi, cerebro leporino, aliisq; similibus, imo si inflammatio gingivae adit, et Calor et Duror intensiores urgeant, Succo rosmari Lactuca, illinenda est gingiva. Sapiis explorando operi nate, eruptionem molientis, & si eruptio deciderit, et succor auxilio, pigra sit et tardior, impetanda e in his gingiva ope unguis, & Cultri, factaq; Lemel operaco ea fere ovis remittente symptomata; interea o so necessaria alia medicamina ad succurrendum urgentioribus Symptomatis, adeoq; statim mittendus e Ignis, o solvia ad minuendam infumescentiam gingivarum, verum

etiam ad procreandum Squinis organum: insuper
 insiciendi et clysteres, ne intestina irritentur.

℞. fol. malv. et viduar. @. m. s. flor. malv.
 et sem. lin. @. p. ii. Coq. jz aq. s. i. q.
 jz lo. lat. et express. dissolv. mel. nat. brz.
 ℞i. ol. amigd. dule. ℞i. ff. Clyster.

Despectum hoin parviti squens julapium.

℞. aq. endiv. et portul. @. ℞i. s. add. Coral.
 sub. ℞. Si. succ. linon. nat. us. aq. ut.
 aq. naph. @. ℞s. partenti rulp. jz 2.
 dn. i^o add. syr. papav. alb. ℞i. s. v ℞ii.

Verum si adit suspicio pravor. succor. Latitantium
 in ventriculo, squens purgatio supra addenda a.

℞. fol. lenn. ℞s. flor. passior. et len.
 Contra @. p. ii. Coq. levit. jz aq. s. i. q.
 duig. dissolv. mann. Calabi. ℞vi. Syr. de
 chior. Compos. it. ℞i. s. p. 000 - -

Itaq. Catharticum nequaquam sufficit ad eliminandas
 Saburam & Lepus Translata ad Corolmas, soporem v
 motus convulsivos determinat, aq. jaterdium indicat ventris
 inflato, vermibus Panum eloseti, aut origillois exoribus,
 de quo Casu addenda sicut p. 000 purgati jam supra -
 prescripta, ℞iii v ℞iv. vin. emet. v syr. globul. gutt. vi.
 v vii. v tandem taster. Nisiat. singulis gr. ii. v iii jz aq. f.
 his paratis, si debilitatis ventriculo, etiam suspicio -
 moveat, prescribi et syr. de chior. Compos. Cum Theo

ad ℞i. Lunendus ℞. ℞. i. Infusio Her. Her. Dis aut ℞¹⁷⁰
Iradelunenda ad ℞i. ℞. continuanda p. ℞. aut 4^o ℞. —

Exp. 7^o pag 24.

Curae
alvi profluvii

Superiores alvi profluvii Therapiam proponunt —
multa, varia, remedia & specifica, sibi et ipsi —
propria praedant, qui forte continuus error sedem ipsi
detrahit: etenim alibi et per se, oppositis pharmacis —
tractanda e; hinc prosa Solvitis purgantibus, roborantibus,
astringentibus, et determinandi materiae ut per sudores, ut
per urinam, dum biliosa alvismatae lenientibus, usu —
refrigerantium, pacatiorum impetibus et irritatione per narcotica
praudentis lenitas, denique, inductione materiae purgantium,
lenioribus purgantibus. at vero si alvi fluxus steroreus, difficultatis
ventitiosus, affectus leporoso superveniat, solis naturae viribus e
Committendum, ut pote cum ut pote cum ut plurimum
criticum et salutarem observatis nisi materia vitiosa jam retenta
ja vis usa fuerit, in quo casu humectantia et purgantia —
proscribenda forent ad praecavendum infasatum Cerebri,
pulmonum, aliorumque, tendit. vis enim, qui hinc —
Suppletur i. succedere solet. itaque, si alvi profluvium
firmum statuerit, statim inclinandum a purgatione, et ita
et institui, ut exinde superflua lenitate, forte diminuat,
et stomachus corroborari possit.

℞. sem. mund. ℞. ℞. th. Cortus. ℞i. humilit.
alv. th. m. v. p. i. j. solat et express. dis. solv.
man. calabr. ℞i. ff. pro —

dein, thomathicus et levisi purgantibus inis tentura, Doce
penitibus desiccat mber, utq, adeo proscribeti maad p
aliquot dies. lxx. de chior. Compo ad ℥j. cum th. pulv.
℥i. v. lxx. de abryoth. p. ℥i. ut major adhuc ventriculo
roba Concliet. —

plurimaq, accidit, qd his tentati evanescat affectus,
interdum ta solua modo imminuat, in quo Composita
ut supra posse purgante, Confugiendum ad sequentem
pulverem. —

℥i. Coral rubr. ppp. et oculor. Cancor. Pluviat
℥i. ℥i. misce Cum lxx. de chior Compo ℥j.
v. Cum Thillo Lactis.

his ita potatis, ad nobi redituru praevalendum, infantem
utatis pro potu ordinario in fuso a rthi proscritum si alvi
proflusio obnoxiu extiterit, et ipsius facie sit subturnida,
decolor, Languetq, appetita.

Dissimili prorsus modo agendum e, si medicio Congelua
fuerit, Colore flavo, viridi, excretorum, Calore, Sale,
in antea bilioso proflusio tentari, etenim tunc exam
inata nutrice et Lacte ipsius, infantem vata abendum e, si
exeritibus defatigati, frangati ai mathematis, v ad pignu,
Reidinisio impetibus obtemporet, v saltim tpeanda e
Gummosis hordei, orisa aliisq, et nutrienda latis Oronis
Succi, vitando imprimis fructus horreo, qui ita parum
recte in ventriculo nutricei subiguati, ut deis igitur Lac
pavi moleculi inquinatum, infanti abominandum
evasit, ea aem sic instituta indagine, igitur missio e
Celeberranda, imo et tpeanda pro viris agra, et singulativa

Levitae, deis asten intestinalior? elyptaris tyandis e. —

- ℞. fucus. mar. et hord. integr. @. m. ss. sem. lin.
- ℞. ss. liquidit. var. et contur. ℞. ss. Coq. in aq.
- ℞. q. in Colat. et express. ℞. Dissolv. melarviclac.
- ℞. ol. lilior. ℞. ss. ℞. elypta statim injiciend. vel.

℞. decoct. omasor. ℞. vii. Dissolv. vitell. ovi.

Interea abdomen cum decocto plantar. emollientium fovendum e, ut sic efficacis prominenti allegosi occurrat, et hord. romni quos julepino exhibeat.

℞. aq. Lactuc. et postulac. @. ℞. Coral. rubr.

℞. ss. Lys. papav. alb. ℞. iii. Cap. —

Si o remittat elin fluxus, et passor asit adhae Febri, — itera mittenda a igni, et ignis elypta injicienda. —

℞. Lact. vacuic. et Decoct. hord. @. ℞. iii.

Dissolv. ov. vitell. ol. amigd. Dule. sive igne

℞. ℞. ii. ℞. Olyma. —

Horabit quoq; julepium cum narcotico, jmo et augenda ignis ℞. ii, si antea hunc o Consiliaerit. —

℞. aq. Lactuc. et plantag. @. ℞. ol. amigd.

ulc. Cochleari. Lys. papav. alb. ℞. ii. —

℞. iii. —

Cum haec peragunt, Semel aut bidie jndie exhibendus e jntant Coral. rubr. ℞. ss. ℞. p. porsum tectum prava molecular, ja i^o vis contentus et nidulantes ita retundit, ut exinde ad stimularum minus comparere evasiant. —

postea jntitenda e proo purgans, ut ubi fames — penitus obtuncet. — —

℞. ʒi. Balsiv. Comp. et man. Calab. ℞.
 ℥ss. Dissolv. ʒa. aq. Chicor. ℥iii. ad. rh. —
 pulv. ʒi. Cap. —

Celebrata sic purgase si adit suppresio Cochochilia adherenti
 ventriculo, et in intestinis nullus restitutus reparandus locus,
 quin prius expulsa fuerit, adeoq; proscribi potest Hyppocacua.
 ad gr. iiii. v. iv. ad Remedium gravis vomitus, si pariat, ita
 ta ventriculi globus auget, ut peritus alvi profluvium —
 emanat, tandem per Lacte o vesit ut supra. Jam
 propositis ʒa. Laxum Intesti ingruit lenta Febri, ingruunt
 et quoq; marcor et atrophia, unica superat mæcla, Lac-
 nimium nubescit, si mammas respuat, Lac. Capillum
 vaccinum, soluta cura Decet. horo. eductatum, Cujus usui
 pertinacissima alvi profluvia frequentis Curiosa observant
 practici. —

Observatio

Puella nobilior originis, Quae ante tunc suppressa fuerat
 nutritio lactea, brevi post invidit ʒa. alvi profluvium quasi
 Continuum, ad inaequantat pallor, atrophia, tamq; molestia
 famis Larina, ut alimonta Lujusumq; generis appetit —
 flagiterat o avidis devorata, diarrheam promovabant,
 nullamq; reparacionem Suppeditas agrotant, sicut adstrin-
 gentia et sthomaehica Surticis et laxa Continuat, nullam
 blattum aut mibi Lavames attulere, breviorq; actum
 fuisse de tenella puella nisi finito alvi profluvio reavisa
 novam nutritioem, d Constantia recusavit ʒa. sano, ita ut

177

ejus loco Lac villura exhibitum fuit, et o blum
diarrheam, vultu etiam fæces Lentas et fæces
Caninas effete curavit. —

Cap. 8.º pag. 41.

Curatio
alvi adstrictiois

est Collimare et Curatio alvi suppressa precipue super,
ut tollantur Lac et alvi suppressio et, simulq; laxati alvi,
ad quæ fæces, si mata aut nutritrix eis us fuerit, ut
Cydonis fæcis et virilidis et alvum adstringere pot,
ab eis importarum abstineat, Contrarius potius versat,
nempe murtet Lac, aut si Calidum aciumq; sit, refriger
antib; humectantib; nutritrix temperet, Deis attendendum e ad
Causam foverens et quæntibus rebellanda e. —

℞. Lact. et horv. et Lact. Capr. @. ℥iij. ol. amig.

℞. ℥i. ℞. elytra. vel.

℞. butyr. insuls. s. q. ol. ov. et amig. ℞. ℥.

℞. medull. vitul. ℥iij. ℞. resina. —

deputo elytra, et exhibitio horodio v Lact. pro atate infantis;
foveatit abdomen Lact. v decocto plantar. emollientium,
ut malv. parietar. doranc. usin. et succedit julap. versat.
hor. —

℞. aq. Lactuc. et jadis. violar. @. ℥i. s. s. q.

popar. alb. ℥iij. Cap. vel si sit infans, —

minutè paulisper Dom. hysu: —

hec p aliquot die; repetenda st, et si alvus o Lactis, v soda
intestinar. o sufficienti eliminata, elytraib; jam prescriptis
addi st medull. Carr. ℞. s. et corundem; usanda efficaciter —

Naris Suppositoris Confectis ex Laudano, Sapore, melle radice
malv. Orutyræ, & alibi.

℞. Roscor. musis ℥ss. adipis ℥i. ff. suppositor.

Demulna ad probæ et radicibus restituenda Caam hujus alvi
Constipationis, purgatio mitior celebrabit. —

℞. pulv. Cass. ℥ss. flor. malv. et violar. @. ℥ii.

Cog. levit. ℥ss. q. aq. f. deis. solv. manna. Calabi.

℥vi. vel

℞. manna. ℥i. solv. in decoct. chicor. deis. add. ℥v.

de chicor. Compos. & flor. persicor. ℥i. ff. pro.

his ita præparatis, & panibus deservenda et exornata, coty, et
narcotica, donec alvus Commodius deponat et ad rura-
alvi adstrictio debet man. tenacibus et pertinacibus impatis,
abregeat refrigerantibus et narcoticior. usu, insistendum
& frigidantibus et purgantibus. —

℞. Decoct. malv. et praxitar. @. ℥iii. len.

lia. et Panegret. @. ℥ii. post sufficient.

Cochion. dissolv. cathed. ℥ss. ff. lyp. re. —

℞. no aut altero Elapso Die, quæ præscripta pro.

℞. rh. Contus. ℥i. dem. in aqua. ℥ss. q. aq. f.

sol. lena. ℥ss. flor. persicor. et summit.

absynth. @. ℥iii. post sufficientem in aqua. —

Colet. et in Calat. dissolv. manna. Calabi ℥i. ff. pro.

Celebrata purgatio exhibenda & in fianti Sicatun amonum,
procurata cum Cortice perur. cæro et theo, sed si sufficienti
alvus non aperiat, et cæra movens obstructionis, hujus in
hepate, mesenterio, Reie, ex exercetis argillois albi caribis
Cuz quædam intumescencia ventris, pædura et facies —
De colore

decolore, quæ pulvis impandus v. —

℞. Soc. mast. apocient. gr. v. rh. pulv. gr. x —
Cinnamom. gr. vi. jalap. & dragrid gr. iii. ff. pulv.
Continuand. ꝑ̄ .7. v̄ 8. dies. —

℞. peractis puer ipsum persgabit, et deus ipsi ex his ebis ꝑ̄ o
ordinario potu, jaluio thei et Linat. Perri —

Cap. 9^o pag. 44.

Cura

De ani Decidentia

tota cura venata in ani repositioe, et reposito partu —
sico, utentio e consistit: ad eiq; pars prolapsa deoitis vino
terpido, Lacte, decocto malou, ol. lilior. fovenda e, pro diverso
tumefactionis v̄ inflammationis gradu, imo si hoc e sufficiens,
Salua ex iisd; h̄bis parata, puer insidat, dein leviter tractat
digitis, et paulatim in anum depellat, quo peracto accedenda
to medicamenta adstringentia, ℞. in nui part, Sasia v̄ gossipii
beneficio impoenda ano.

℞. ros. rubr. Calaurt. maci, Cypressi, et tost.
granat. @. ꝑ̄ viii. sem. Phw. mastic. @.

℞. loq. in aq. fabror. v̄ vin. rubri, et spongia
hoc decocto madida, repis anum fovant. —

absoluta fomentate, pulvis squens impogate. —

℞. ros. rubr. et Calaurt. @. ꝑ̄ .ss. Phw. —
mastic. et myrrh. @. Si ff. pulv. mediante
gossipio impoendus. —

insup̄a se ꝑ̄an tenel reposita elabati, in Sentes Curatis
inactis jacent, et si tenacioris etatis fuerint, Crusa Sasia —
Colligenda st; interdu so accidit ut pro suppurationis extensioe
gangrenosa v̄ p̄ncali motu, pars sequat. pot. reponi, ja

quo Casu amputanda e pars prolapsa et deis convenientis
 sananda remediis, ut solent esse amputatae haemorrhoidae.

Demum si intus ab exurgente aqueo humore 1080 levi
 vegetat, praescriptis leni et resolventibus et assiccantibus exteri,
 intus etiam tenent aq; calid, cum adumine rubeo et aqua
 Mellilucana, Confugiendum e ad Stomachica et assiccantia.

℞. Syr. de abrynth. ℥i. Rhei pulver. gr. f. —
 Cinnamon. et milleped. pulver. gr. v. misc. Cap.

Ut uti insuper infans propter ordinario infirmitate Cinnamom.
 et Limat. Ferr. in nod. Mellis. ad finem imponenda alvici,
 Sumat proceri sequentes —

℞. misobol. Citria. Conten. et rorantie. @. ℥i.
 Sem. Conto. et anis. @. p. i. Coq. in aq. font.
 ℥ii. indolat. Dissolv. mann. Calabr. ℥i. ℞. pro.

Cap. 2^o pag. 45.

Curae
 petri

ia sic eadē cura ut intestinum exponat, et hinc
 reperitur retinere. ista copia facile attingemus
 si praesentia, rava, et placida habitant intestina, tunc
 cum respirato aq; et Quibus elevatis, tunc levitas
 tractandus, et lenis vniis superiora Comprimendus,
 vniis: surgat intestinum flatibus vniis, ad
 Cognoscitur ex tumore resistente, rugitu intestini. ^{2^o}
 doloris, et alvi suppressione, usque parva et discutienda, ut
 Semen anisi, Foeniculi Cucumis, folia Sauri pulgii,
 q; mitigas adjuvantur pro doloris intanto, ut eleva
 rosaceum, Camomelinum, amigd. Dulc. Nihil vniis,

in portione intestini contenta repositio obstant, tumor —
oleo rosaceo stillandus, et imponendum Cataplasma
emolliens, paratum cum Radicibus altheae, lilior. fol.
malv. Cum ol. et h. utiq. p. mistis, ut jade' tumor —
facilius tractari possit. —

Ubi aem' intestinum jam depositum fuit, Cavendum e-
ne' iterum exeat, quia in re maxime momenti, et facie,
Subligacula, et speciatim ad hoc opus in infantibus parari
solent, ita ut tam pto' tarde aut nimis um' conspicui requireant.
haec aem' Conficiuntur cum Calibe, si atatis sit —
proventionis infans, et cum Dublitate Corio, et simpliciter et
molliori linteor' apparatus, cum pulviniari ab omni
annulis respondentis. equidem naturam in dia rigorem,
ad se' efficacius jurant, ut in junioribus aetate radiata, tunc,
presentia in quiete detineri possit, et coivari clamor,
pluribus, Catariq; juvenis nisi, qui pto' repositam
venio impellunt. —

Fandem Competit alvum Clysteris, Subrigere et emoll
ira, atq; identidem praeos succos leviori Cathartico elimin
are, de' man' Intestina surgant, et emel' indutata, nova
Cunabula nato probare solent, sicut et emplastrum pro
ruptura Ligatura apponere, qd' minus in modum Supra
p'ta, exsiccant, et prolapsum contenta' praecavet. —

Cap. xi. pag. 55 Curtas

Umbilici proventria et inflammatio

Phlogosia huius affectus exigit rotivum in a —
Laxitati p'itoni, et Consolidatio, posito ad rupturam

fuerit successisse part: adq; amoti semel Cas ad
 fibras extendere, emollic, et purita ad nisura et
 actioem Contentorum jntendat part, ut Ordealca, Libi
 flatulenti, Lac minor aquosus, Sletus, ejulatus et
 clamor, ad sequentia deveniendura e.

℞. sem. Cumini. Feniculi. Ordealca. Lous. et
 Sasin. lupinor. ꝑꝑ. (a. p. t. s. equalis, ꝑ. Cum
 vii. subst. Cataplasma.

Umbilicus fasciâ detricati, vel amplius distendi —
 post: deinde vò cum positorena rupta e cadere
 Competat ac jntendat latus; Postea positorena
 commendat in suenti exumphalo rupta natorena, et
 rotulas eloris Confectas, eaq; occupatio obruit, et dicitur
 ibi retinenda. —

Jandem si urgeat inflammatio, v exulceratio umbilici,
 fovendus e rosaceo deo, in quo Casus et Sota Confecta e,
 v applicand. sequens Cataplasma. —

℞. malv. et borani. urini Sasin. hord. et
 Sasin. gros. 1. q. Coq. ad part. ilagrem,
 deind add. ol. amygd. dulc. q. 1. ad Cataplas.
 Conficiend. —

Quod si supputatio aequatq; Colicibus post, unguentum
 e Casus. Lgtarg. Therbent. et ol. jasmir. basamin paratur,
 Felicia obtinet effectus in datis Circumstas. —

cap. xiii^o pag. 64. Curtio
intertriginis

Idem hinc parandum incumbit, ut Lac optima —

indole Soligati, et demoveat actio Cutem
 abradentium, qm ob res sapies et mutanda —
 Lincamenta infantum, nisi usina madcant Et
 sordida sint, aq. malv. ros. rubi. et fufu. simul. —
 Cataracta in Lenienda pars oleo Communi, et aqua simul
 agitati; semina nostra solent Conspicere Loure
 affectum lerusâ, v. tertia preparata, v. unguento de
 Lythargiro, aut nagnompholigo, verum si in jris
 penetraverit dolor et irritatio, imo pte affecta fundanti
 profundius et exuberantis, tunc psum aqua Ocellilucan.
 pbe' ablutis parabit, quem unguentum. —

℞. Balsam. auci ℥iii, ol. hyperici et ovi.

℞. ℥i. ovi. vitell. ii. ff. unguent. —

Et si res a Cataracta, nullum presentis effectus, una
 remedium aqua Ocellilucanâ qm sapies, in die fovenda
 Et pte affecta, o neglectis ta remedia intervenit aut
 diata humectante, et levioris cathartici ad depurandum
 humorem Crasim. —

Cap. xliii. pag. 60. Cura

De virtute lactis achoris et favi.

Collicitos nequaquam teneat homines affectum thargia,
 in fave' ipis, orte committenti et, presentem dim fave
 o defforant, et oculos nequaquam cadunt, et si malum
 latis, res gots aut impasata jntis retro pulsio, glaucoma
 urgeant lymphomata, o indormiendum a Cura, et statim
 ex aminandum si... peculiaris vitio contaminato, v. aliter
 diata Conveniens ipsi preparanda, si usauerit v. ut atus
 alimentis pravor succos generantibus, deis v. audendum v

ad varia alterata et Degenerata, ut juscul. cum fol. chicor.
 mastice aquat. Storrag et chesbol. in tibi gr. aliquot v. h. —
 insident, qd, finit's eye sequenti modo purgati. —

℞. Decoct. chicor. ℥iij v. ii. in tibi, proice sol.
 lenn. ℥i. summat. abynth. et lentau. —
 min. @. p. i. Colet, et in Colat. Disolv. mann.
 Calabr. ℥i.

Clapsis aliquot dieb, imperandum e ethyops miserale
 ad gr. ʒ. v. ʒ. luronid. ℥i. in haptomota, ad absolvendam
 Cruoris degenerationem; vorum in affectu, protractato, et metus
 adit se putredo in ignis sub Crusta foras, et errat
 Caro in Canium, Fozia promptus aduocant l'ub-
 sequenti formula.

℞. Lythargis. ol. ros. nudit. ℥i. Gum. et
 tutia preparat. @. ℥i. p. myrh. et sulphur.
 @. ℥i. misc. in mortar. vin affundend. ol.
 ros. v. olivar. q. sum. latis.

Deis inungati puen affete, caput etiam abluendum e
 Decoct. malv. hord. abynth. et len. panicul. grec. lignin.
 et fabar. e ut efficacius agant pnt incoqui in vin. rubr.

℞. D. q; sufficit Leo rudiis althea facta cum vinâ —
 infantis, ut solent parare nostra mulier, domum si ab
 ulcibus deperentibus Lesum in Canium, Crusta i? —
 emolliend a malv. et violar. indutry. v. doctâ, v. simplici
 aturgid, et ubi Canium apparer vspandum e mel rosat.
 Cum thillo peditu vini, et insupâ commiscendum cum
 pulvere radice aritolechia, et balzamo peruians v —
 thestantia.

Varia sunt medicamina in his usibus, & pro diversis temporibus
vires quoque, modo procedenda sunt: sic in principio ad
detrahendam crustam, detergentia fortiora simul cum
resolventibus usque paranda, postea et humectantibus opus est, ad vascula
Cutanea laxanda, dein vero Conglutinantibus et balsamicis
utendum, quibus indicata satisfacere potest, si puritas eadem
victibus facere quales in nobis et crustam lacteam parimus,
ad quentia properemus. Statim oculum in Bethsalol, Butyro
in pinguedine porinum illinita, ut carbis impudentis, ad
partem emollienda, et parandum saniem exitum, in 4.º Juci
sumas. Caulis, axilligat. et denis. @. Zi.ß. axungia-
provis. ol. rhutae. @. s. q. Case. q. s. ff. unguentum molle
postea infans purgabit Cathartico communi cum Senna
rheo et mann. et prescribente / quentia detergentia. —

℞. flor. sulphur. Zi. Staphis agrae, et rad. borrea.

@. Zi. aut aurini Zi. theobent. seret Zi.ß.

pingued. s. q. ff. liniment.

quod si Crusta sicca nimis detrahi adhuc oportet, dicitur
naturae cum axungia provis. partes Cataplasmatibus —
Capiti imponenda per 24. hor. quibus Continuatione,
variis quibus malum sanabit.

Crusta oblata, pili cum radicibus emolliendi, cum manilla
magis ipsi adherent, quod fit in oculis, in pilosis, his —
medicamentis Capillos tollentibus, vulgo tractantur pilsolo,
pice navali inducto, quae Capiti, in loco quae tinea
occupat et obidens imponunt, et aliquot diebus ibi detinentur,

donec clauso sufficiente tporis, violentiâ avellendus, & —
 His ita peractis, semina plures affanno asperso, & ol. de
 Hyssopogr. & roghoz. & succo Leporum fruant caput ad
 rubedinem usq; ut vitiosi humores, aliter latentos —
 evocent, et ad exteriora trahant: tandem ad abstergendam
 horum ulcerum Consolidacionem Felicitâ impediunt, alia
 ustum vitridum et arintholochia rotunda sub formâ
 pulvisis quo ptes affuta impelgenti, & Cataglasmati
 additi, pie navali et Odutyro qd ptes affatis imponit:
 imò et omulli utuntur an enico, cui pigmento & implenti
 angula solâ; & ta Cantolar liquat, cum timendi locus sit
 revereberata effluvia & rosebrusa migraverint neq; —
 Insupis negligenda snt varia jaterna remedia, & quidem
 diluta & emulsa, atq; Contaminatum ipsius portio em p
 varia junciacula amandare possint, qualia snt junciacula cum
 pullis gallinacis, fustane calicato & flor. martiilibi:
 ethyopi mirabile, & mercurius dulcis. Interenda Odis snt
 heptomadâ, opiata sthromachica et absorbentes, Lactiinia
 varia, pro diversa Constitutioa liquidior: statu jstantis,
 etate progressu rabi, et virtus nitate ulcerum. —

Cap. xv. pag. 67.

Cutis

ethyriasis

Cutis tota snt aversio pediculari malo subterad adultior,
 Consistit, ut qm odorâ victis tunc hypergeti, vestimenta
 crebrius mutenti, et frequentius sit tporis sro, quâ inveni
 Cutaneus pedicular generatos forcent em, ab hinc, atq; —
 abstergere possint: & snt jstantis Compatit multum viata
 Conveniens

Conueniens, et in primis Lebra pectinato capitis, qd
admiscenda Calidiora et aspicua, ad humidiores tenacioris -
etatis spem debellandam: dum do' pectus geniti et, et
indies propagant, prae misis statim uniuersalibus, et
purgatioe et iurculi precedentibus, Q specifica varia

- Confluendum, qd in p'io mitiora, in x do' fortiora.
- Si propagati spem calidiora prole, prescribenda et
- adcoq; loon, Linimenta, et varii pulueres parari solt:
- ℞ aristoloch. rotund. pinn. et cupress. ℞
- part. equalis, loq; pro loco capitis qua
- peracta ff. liniment. liquem. -
- ℞ puluer. staphisagr. ℥iiss. Casin. lupin. ℥ss
- agar. alb. ℥iiss. sulphur. vivi ℥ii. sellis...
- ℥ss. -
- ℞ staphis agr. absynth. ℞. ℥ss. sulphur. viv. ℥ii. et
- Cum ol. lauri ff. unguent.

qdq; usuzhanti fortiora medicamina, ut elleborus albus,
unguentum neapolitanum et arsenicum ad rasiuitus -
checanda caloula, qd p'ian spem in administratioe horum
remediorum urget periculum, atq; tenendi locus e' re'
intensior oriatis saluato, saltem in p'stantibus leuioib; v'
grauiore alia ab usu hellebori et arsenici exstante turba,
et ex huiusmodi disuimino p'ueri conuiscunt. -

Cap. xvi: pag 69. *Curtio*
Delumbriis

ad generalen hujusce mbi Therapian Competunt

Platin antientica dictata vermes enoua, preparata
variamerualia, & adimplendas res indiuas, mieduse
Dnt purga rhomathica ut iam inchoata talia exornant,
noua, aresati progenis.

piorem seipum attingunt, absynth. abrotan. Ledus. marm.
fel terra, iord. lamen Cont. Corallia. & lumbis restuendis
presentaneum tpa Comendati remediun, imo et Cicerum
Sbrasi iam in puluorem reductam in orientalis ausis, -
publici ventum lamen: parisi antonium o leuoris &
efficacia, posteriorem vo' obtinent purga alibet, ut theu
diagid. julag. lann. & presatim mearum, ahyops minerala,
aq. neuualis: Semim adandanti dexedia, ut rhomathica
diversimur generati ouerunt, qualia et Theriac. decoct.
Centaur. min. lann. absynth. alois. Cum Croco et myrthâ:
Cortex peruianus quo nullus protestantior: huc aem ou' tt -
rigorenda sequenti ordine. -

℞ aq. Card. Doered. ℥iij. Sem. Cont. in pulu.
tenuissim. redact. p. ii. Confect. de absynth. &
altherm ℥ss. sal. absynth. et pulu. vipar. @.
℥ss. Succ. limon. ℥i. aq. nazh. ℥ss. ff. pro pro
2. do. partitio vjus, exhibend. -

Enemata deis varia injicienda ℞, & parari possunt Cum
Decoct. plantar. emollient. additis ol. olivar. & melle, & uinis
passulis et siabus, quo parato Clebranda & liquens purga.

℞. lann. mund. ℥i. rh. Contur. ℥ss. Summit.
absynth. et Centaur. min. @. p. i. Sem. Cont.
p. ii. Coq. in aq. ff. i. q. & Doct. Chicor. deis
Disol. mans. Culabr. ℥j. -

muliercula juniperi parant elytrata, pingues et dulciora,
q̄s, alluciant, et quasi ludificanti vermes, verum in
psectis, Lumbriis, o Competunt vacuata si motus fuerint,
atq̄q, Confugiendum ad Oculum squittum si reglitis pot̄
infans, v̄ ad pulverem sub sequenti forma si junior fuerit.

℞. aquil. glib. gr. x. diapsid. gr. w. Cap. Cusa
panatell. Cochlear. aut d̄dol. ff. Cusa. gr. de
abynth. sum end. alterius dieb, in h̄p̄ domo
q̄s elapsis, purgatis, iusticia celebrabit, et sequens
infans. aut Decot. —

℞. Min. h̄ia. in alkool redact. ℥iii. ℥. Contus. ℥i.
sem. Cont. gr. ii. summit. abynth. et Centaur.
min. @. gr. i. in fund. gr. hor. i. in aq. Serpentis
℥viii. Invet̄ ad usum.

o Improbanda e aqua vesiculari, o parati cum acuis
in xodulo suspensio, Quia aliquot haustus in die q̄ aliquot
hepdomodas h̄net infans, siq, sollicita vermium generatio
prearet, q̄ si febris supervenerit, aliaq, jam relata
sunt homata, cum vermibus latentibus in venticulo et
intestinis conjungenti, promissa v̄, s, d̄ parasi manu
ad eumendum fluidor. organo, et impediendum graviozem
metasthazis ad cerebrum pulmones, v̄ q̄libet aliud notabilis
viscus, ad Cathartico-emetico preparandura foret, Cuscã
Cautico ut maritenti q̄s decocta variis amara, et
respartens h̄ois, aut in decurso h̄uicatiois inulopia variis
eundem scopum attingentia prescribanti. —

Demum peculiaris quasi pro Divonã tyce vermium
instruit medicaminum faviago; sic ad tacez, excucando,
abynthium, ad Lato, filix, v̄ nucis juglanda, largius —

℞ rad. borac. et chior. @ ℥ss. Coq. p. hor. i. j.
 juscul. cum pull. junior. aut frustul. Cera.
 vitul. parato sub fr. Coctio. p. d. fol. —
 chior. ch. fol. et Capill. venet. @. p. i. Bull. p.
 quadrant. Colet. et add. tart. calibeat. solub. gr. viii
 n. x. Cap. p. g. iis —

Sapiens aem audit ut pro sanitate repugnata et clamoribus
 continuis, jusculis partibus probare liceat, in quo casu
 leniendo et per modum minima saccharos? et hyssop.
 et similia, quae per paratos cum rad. borac. et
 sparg. emul. campan. et gentian. Amatur. ferr. et theo
 et oia simul Cocta cum Sacchar. deus clarificantis ovi
 album. et syr. componunt Cuius dosis e ab ℥i. ad ℥ii. v
 p. facilius peragitur —

℞ syr. abrynth. ℥i. rh. pulvis et tartar.
 calibeat. solub. gr. xii. Cap. 3 6. Dies. —

Concessa post usum iunior. aut yr. leniori quiete, prescribend.
 et sequens pulvis ℞. Croc. mast. et rh. pulvis @. ℥ss. Cinnam.
 gr. vi. sal. abrynth. et diagrid. @. gr. v. ff. —
 pulv. pro usu Dor. et Continuandu p
 7. Dies, successive, et alternis. —

his ita peractis si obstructio non remanet, facit ut equalitate
 pallida et doctol, pararetur insuper abdomini intumescens,
 aut ea remanet, paranda et fortiora hydragoga. —

℞ fol. san. ℥i. sal. abrynth. ℥ss. Coq. i. j.
 decoct. polipod. quese. ℥iii. add. syr. de rhama.
 Cathart. ℥iii. et diagrid. aut selap. gr. viii. —
 pulvis de tibi. et exhiberi p. hupdomadans alternis —

dieb; et renovari etiam creata in pulvis aperies ad
debellandam causam foventem mitem, aliter nullas spes
operanda, et potissimum insistendum e sequenti eligenda.

℞. ferri. subiginos. crustul. ℥i. Contus. et in not.

suspens. ℥ss. Cinnamom. græcis. et in cod.

modul. suspens. ℥i. in fund. frigid. in aq. f. ℥ij.

℞. ptizax. pro potu ordinario. —

hoc ultimum remedium adeo officax e partes sua, ut
plures solo hujusce subsidio insantes, ventris intumescentia
jam dudum laborantes, et quasi desperatos sanaverint. —

— Tandem repeti in praxi observari quod puri ad Labe
Contaminati, febris Lentam, marasimum, et Fluxionem
exiccationem (si abdomen exepatis) simul intumescant
quasi Caninam experienti, in quo lam praxi, in levis
stomachicis, ut ℞. de chicor. aut Babyrinth. ad ℥i. Cum
℥i. pulvis. gr. xii. in Conson. enull. Campen. Kinorro. —
Cum ℥i. tract. ℥i. ad Lactis inia tunc ad decem anchoram
Confugiendum, imo et si passim junior fuerit, novaq;
mammas huggare o recuset, nactis Orana Constituta
Concedenda e. — —

cap. xviii. pag. 43.

Curatio

Delonulio et motio Convulsio

Varia Convulsio aut motuum Convulsio. —
Diversum Curatio, solum, indicant, et penitus
fieri Convulsio a sanguine ramos Cardiacos et vas abalis —
propterea replente, vivam saxe exigit Theriacem
ca qua abundam suspicant e praxi, sicut Curatio —

molem in pueris, jmo' paucioris e tractandi methodo
ad rebellandam Convulsionem a pueris a vasa vob' Capiti,
depressione Crani, affusio a liquidis supra meninge, aut
Substantiam Cerebri, q potius respicit Disturbum
Capiti, adeoq' Casum tunc Cas Communioris Convulsionem
et motuum Convulsivorum jz jz infantib' proponemus. -

haec aen solet suboriri jz pueris Contra ad Lac vesum -
Corruptura, cruditata, tarum viar' jz jzini suggestas, aut
vermes jz intestinis latitantes, jz quo Lam statim -
prescripta q, s, revulsiva, statim parabit' squens Erema.

℞. Croct. fol. malv. violar. et panet. ℞. x. -
Dissolv. Cathol. ℞. i. ℞. vi. vel natron. cocti. i.

reposito de pte et exiisito studio quodam tpe re, placiditate
pro prog. squens

℞. fol. Senn. ℞. i. s. sal. veget. ℞. i. summit.
abynth. mix. ℞. ii. Coq. in vit. jz eq. s. ℞. vi. -
jz Colat. Dissolv. man. Calabr. ℞. i. ad tart.
Bibiat. q. iii. s. hys. globat. gutt. x. -

Verum si plene extinctum fuit Cerebri Excitium, atq'
jnguesat metru suffocato, vim ematicum jz parandum
fiset ad ℞. i. s. ℞. s. Cujus efficacia tpe vanda fiset ad -
refocillandas vira, fosa sequenti. -

℞. aq. scabior. et portul. q. ℞. i. Dissolv. thiaz.
vetas. et Conbat. albam. q. ℞. s. pulv. vira.
q. x. eq. nazh. Cochlear. i. q. s. ad miscenti
puls. Contra vira.

Si in eo renovanda f' et una aut altera clapsa die toto
prog. jam superius relata, qd' per actis Conjugienduz ead'
sequenti Thomachica. -

Curas
De epilepsia.

Si peculiarem unquam causam attentius ad felicem therapiam
desideraverit nōm, tunc tēnē exigit epilepsia, cum parum
Cognitio viam ad ea parat, ad quā, si emittendum opus ē, ceat
causam indagandam: plures aem, prosto ce pnt ad epilepsiam
Constitutam. tūm in adultis tūm in pueris, Proversum cum
causam prostrata de junioribus annis invadere solet tractandam
Insuperamus, idcirco therapiam memoratam etati accommodatam
proponemus, duo aem paraganda esse ferunt, paroxysmi —
nimium tūm et extra paroxysmum: in 1^o Casu, statim —
arrestanda ē hamorrhagia cerebri v. s. revulsiva, aut statim
Convulsioe nimia et motu Convulsivis derivatoria, aut
evacuatoria simplici, deinde v^o tollenda causa v. frequentes in
pueris soboles, et c. Lacte putrescenti et corrupto, v. gravis
Vulvis fluidorum molen Insuper, ut ibi sequenti remedium.
apparatu.

℞. vin. emet. ℥iii. v. ℥iiii. Cap. cum cochlear.
juv. cul. add. stillam Confect. de hyacinth.

vel

℞. aq. naph. Coch. ii. v. iii. solv. test. stibiat.
gr. iv. Confect. albes. ℥ss. Cap. statim.

Invenabit actio emeticis aqua tepida largius exotata, v. sic
illud vomitum aut catharsim v. moveat paranda v. itaque
fod.

℞. sol. orient. ℥ss. loq. levit. In aq. font. ℥v.
v. in. solv. man. ℥ss. divid. In 2. pot.
i^o add. test. stibiat. gr. ii. et unā aut
alterā supra horā, alterā sub nocte —

hæc aem sufficientem ex acutione vulgo promovent, quæri
adhuc rita si huc essent, crema cum cathartico pro ore, et
et iura viri si infusio e terra. Injici potest, dum vobis ad an-
duo concedenda quis, et si voras exeret fuerint, juristend.
reutis araris et antimentis, o hunc supra pponimus,
renovata adhuc in fine mibi purgare simplicii cum senia
rh. et manna. —

Interdum accidit ut jam finito paroxismo, just et
novus qui medium sollicitum tenet, et a via aberrare
quædam tenet iudicat; et o permitat ea peragere, quippe
capit' repetenda, aut tertio alterum tentanda, et ad
immixtum discutendum periculum, ut nunc epilepsia
antecedat exitum variolar' et miltillor' in quo casu jam
permixtis a statuimus, sudorifica et volatilia præscribenda
et subsequenti formula. —

℞. aq. radior. ℥ij. loh. Conbat. altharm. Si. pulv.
viper. gr. ℥ij. Cap. —

Statim imo iusta iacula si nulla calor, et soluta
fluidor' coagulatio appareant indicia pulv. viper. ad gr. vi.
exhibenda.

Hic aem auxiliis tendit ad revocem humor' massa, et
quæ pportione erumpunt pustula et elevato, eadem periti
disputis nubis epilepsia et cerebrum liberato: et tunc aem
paroxisimus, abagatis ois remediis, et anda et opera, ut
novus præcursato, et avellat Cæa o ipsam fovet aut
auelet. hæc sola obtinet iusta Conueniens, fuga paroris et
as mathematum; ois quippe par' iustant, iugherio, metis et
formidinis locum in hunc, nbum iudicant, adeo ut —

plures sine ullo remedio, sanari regimie, et temperantia. Hic
Curatorum felicissime. imo si motus ex iam relictis causis solvatur,
medicamina potius motum laxarent quam solvant, sine periculo
causa est medicis in tractanda epilepsia juveni. neq. eis prescribenda
opiate aut pulvere epileptici, a jam adultis Concedere, alibi -
Quadamur. —

Cap. xx. pag. 99.

Cura
Atabismi

Cognita semel causa qua stabis mus, et procedere, id dirigendus
e Curae, scopus, ut minuatur, et auferatur, solitaq. actio musculor.
oculos moventium restituantur, adeo ut si primo aut mo ab
Convulsivis motus solvatur, eadem prescribenda remedia a
jam retulimus dum de epilepsia. ca te cautiva ut magis -
juvinturque in juvenilibus et aperiuntibus, et cum. Icipius malum
illud ex proda Consuetudine et juvenitudo nutriti, invasorit,
eam prosetim therapiam prosequer.

Statim aem nulli alio promissis remedii, (exce aliquo
Lappo facis educati, ac foramea oculi appositum ipa' visorati,
ut in fary in ptem oppositam, in qm et pupilla et oculi -
pulsat nam visunt oculos, dirigere cogati, et ut Comenius
exquati ex Laminâ ferrea v. argentâ Canales junta in fundo ib
ubi foramenti, et foraminib. illis in lappo assumant, ut pcam
aspectu visigi possit, in Luvana in ptem oppositam exponenda
e, ut in fary, primo in utraque lam Congruent, in Contrarium
oculos deflectat; quipp e solense e juveni versis fulgorem, aut
obta vicia afficientia, axu optice ipa' dirigere, hove aem
memorato auxilio Icipius accidit ut o solim musculi oculo,
moventu, alipâ visoranti, natum etiam humores aquei, et

Christallinas et vitreas, varias vitæ differentias Consequi-
point.

Cap. xxi. pag. 102.

Curas

De Calculo venice utinaria
et Urina Incontinentia.

accommodanda e Theropis a etati pstantis, in qto nascitur,
et tati mbum producentib: sicut et nim puer a lactata,
et q piam vitium in nutrie arguit, tota in mutao lactis
et etatis ipa e reponenda, Cura et pua Conuetudine
Voboluit affectus, exhortand et minis suis fonda, imo et
flagellu contendens in fens, atq; aduendus ut quodis hosa
recondiscat, et vo' si pue nequa in mulieri noit, et
adit nativa v adventitia v hinetis laxitas qm attentio et
pudoi miderat, et, Sugate longiore somno ad quiete euendum.

℞. rh. Contus. ℥i. v ℥ss. flor. persicor. summit.
abynth. et Cortand. @ ppi. Coq. in aq. f. ℥iiss.

℞. Colat. dissolv. mann. Calabr. ℥i. f. 200-

Clypsa una aut altera die prescribenda e ℥ss. de abynth.
ad ℥i. qpi potuit etiam Commisui Cura ℥ss. recet. miscol.
vtriu. et de si laxitatem v hinetis. et Corta vtriu. —
incontinentiam nullatenus minuant, renovanda e purges
et Confugiendum ad pulvere v quatuor.

℞. Croc. mast. apasent. et alb. pulv. @

gr. vi. v viii. Cinnamon. et sal abynth.

@. gr. vi. f. pulv. pro una Doi Continuand.

℞. s. v g. Dis. pnt exigit mbi pstrinaia

et suad et aquo in fanti Constitutio. —

Optile e etiam Inungere regionem vesice, ol. thut. lau.

put etiam reponi Cunctis fluxurilis ad efficiendū interdum
Lumor[?] massari, et promovendam p̄sensibilem transpirationem
qd si Inham[?] vi modo veniat medicamenta Liquida ad solida
confluant.

- ℞. alyss[?] nival. gr. vi. jalap. pulv. gr. v. Cap.
Cum thillo Conserv. ros, & ja paratell. vel
℞. jalap. et diagi. @. gr. iv. pulv. milleped. et
Cinnamom. @. gr. iv. Cap. alternis dieb[?] p̄
Zherodmodan, & ad Regiū suedit. —
℞. pulv. de gutt. gr. xii. th. pulv. gr. x. Cap.

haec sunt et ea medicamenta interna. & in proprio loco con-
sultari solent, si elegari phyzanam pro potu ordinario, &
Conficte cum theo et Limaturā fieri, quā libenter infans
infans utunt, & sequant negligenda et externa o-
immediatelaun[?] Lurdam discurrunt, atq; resolvunt. —

- ℞. pulv. abryath. et lamear. @. ℥ii. ff.
ad lyem unguentum cum Rosior[?] portive
Losa. —

Cataplasmata alba imponi pot, ut Aatum debetor.
emplast. cum Harore Columb et Capr. & Sacot. salu.
et rhut. quo extensiores Capitis p̄tes junigi pot. haec
ta nunq̄ promptiora atq; tutiora successu obtine
sola: Cantaris, vesicatoris Cetacis, & ja veris p̄tib[?] Ep̄is
Celebrari pot, & maj. effectua promovent, quo Lorum
Laticum magis immediate resolvant pot, haec t̄m diutius
Continuanda atq; fovend[?] ant, donec jam assumpti, aquis
et Lymphaticis moleculis, mutacōe atatis et visum
roboranti ea vascula, et liquida magis exsiccant. —

Curas De rachitide

rachitis soli vulgi' não virib; committenda e, p̄terq; solida
accesione adeo firmata, virq; major ita prop̄imiti fluidis,
ut obice in vasculis, et prava in humorib; qualitate -
deleant; id sapius quoq; opitulandum Diata-ministeris et
quorundam medicaminum largiã, quorum deflatu, nova
contusio vires consequatõ nobis, et irrupabilis foret, quo
civã statim præscribenda e Diata Communis cum Libis -
Ovis laci, et facilius in ventriculo dissolvendi, Dein vò -
restituenda tonus ventriculi et lymphæ vitium præstatim
Corrigendum sequentib; remediis. -

℞. Lenx. mund. ℥i. ℞. Contus. ℥ss. Coq. in -
duoct. chicor. ℥iv. Dein dissolv. man. calabr.
℥i. ℞. rachicor. Compos. ℥. s. q̄. proo. -

Celebratã purgacõ præscribenda est bis aut tẽ, in
hepdomadã pillula sequentis. -

℞. ethyop. miseral gr. xii. v. aquil. alb. fã -
sublimat. gr. f. cum thillo consolv. v. -
chicor. f. pillul. 2. aut 3. vel. -

pur Capiat cum eschlesi granatella, interea Tibenda
et incedenda e humor? manã, jussulis levitã aperientib;
jam sapius in tractu repetitis, q̄s succedenda sũt vel
opiato ejusdem generis, seu cum em hepum attingentis,
v peculiaritẽ stomacho accommodato, prout visera
abdominis aut ventriculus magis patiuntur.

℞. Croc. mart. ap. r. h. pulv. @. gr. viii. ethyop.
mixt. Sino igne parat. et Cinnamom. @. gr.
vi. jalap. gr. iv. ff. pulv. pro 1^a doz. sup a bil.
juscul. fol. chior. altwat. v. unum aut alterum
Cyathum profusa. the. —

Pulvis iste jz opiatum mutabitur cum s. q. 147. de abynth.
aut de chior. Compos. prout jz fanti magis aridebit. —

Quod si ventriculus plurimū Labefactatus videatur,
et alimenta probe concoque non potest, liquens exhibebit
opiatum.

℞. Conserv. enul. Campan. abynth. et —
Rizorod. @. ℥iii Coral. rub. ppi et oulov.
Canerov. fluviat. @. ℥i. ff. ethyop. mixt.
antichetic. pot. @. ℥i. ff. Cum s. q. 147.
de abynth. ff. opiat. ad usum supra laudat.

his eo ordine paratis, prescribendum ē Lac vaccinae
Cum decocto sal. persill. ebulliatum, et continuandum
7^o 10. die: imō si ventriculus sic incommode tolerare potest,
exhibendum ē rachiticis pro alimentis, d' gradaria et
Successivā assumptione, ita ut matutinis horis, Lactis —
vaccin. v. offan, v. Aremoen oriza Cum eo paratum,
vesperinis horis deia elapso iterum quodam breviori —
intervallo, hora prandii novis Lactis haustus exhibet,
et trahendo alimentor. usum, quā pportio augetur —
Lactis Caprae, donec agrotans solā illā nutritiva deficiat v
reparet.

Cap. xxiv. pag. 117.

Cura

De aphitis, vesiculis gingivar.
et inflammatione tonsillarum.

Indicationes Curatorie statim exigunt adstringentia in typis
ad Cavendum progressum pustular.^o mox ab interitum ulcusulor.^o
Detegentibus, levioribus, scaroticis, exsiccantibus, etiam adjuvenda
interne remedia fluidiora et praesertim Lymphaticum —
Corrigentia, verum Longe diversa statuenda est Therapia
sive in infantibus, tum in adultis, cumque hic potissimum
agatur in pueris, in sum convenientem proponemus: statim
in Lactantibus Corrigendum est vitium Lactis, ad Sabugiosora
fluidiora. Diathesi ansam praebet variis refrigerantibus —
aut Silvestribus, aut mutanda nutrix, si rotula et pessima
T. Inhibitu nutritivum in infantibus supponatur, deinde vero attendend.
est ad naturam pustular.^o dum patet naturam rubentem, moderata
adstringentia usurpanda sunt, ut syr. de ros. sicis, de
portulaca, de Sucus granat. acetos. Citr. Collectiones
variae cum Sucus fumar. nostrae. aquat. in Decoct. herb.
Cum mal. rosae. et aq. chesefol. in rosari. plantag. Galanit.
Santal. in etiam vero acerbis cum melle. Contra vero si
diversa nigrescentes aut flava extiterint, fortioribus —
disjunctis, insistendum, ut Decoctis variis aristoteli.
vinopurpure. angelic. flor. Camosae. melilot. anet. et
Sanguisac. Sucus menth. in ros. nostrat. et in rosari. sunt
Cum Decoct. fol. myrticet vino rubr. adjunctis etiam
levioribus, adstringentibus et mundantibus, ut syr. myrtico
aut melle rosae. tandem urgente malo Confugiendum est

ad spiritum sulphuris, sul amoniacale, aliaq; rariora
 Scaptoia, & nulli fieri infantis, saltim diu alimentis -
 solidis & vesanti, hoc unice medicamento sua apparatus
 perferte nequeant, et in huius praecessitate inis tendunt
 & desumunt ex refrigerantibus, edulcorantibus, et lympho-
 vitium corrigentibus, Commendabat antiquitas, imo et in
 annulis vetularum commemorat, adhuc nullum esse
 efficium remedium, praesertim in aphis, quae sua
 malignis et epidemias, quae ramulam vivam ad nova
 ori quae, & suggendo malignitatem attrahat, quae sanitate
 et mortua alie apponunt, atq; ita sum alie donec virus
 esse plane extinctum fuerit, & utrum sedum illud -
 remedium unquam successerit, merito dubitamus, atq; e
 sanior praesi exulare iubemus. —

Remedia aera interna et processiva ordine, ut
 statim appellati saburra ventriculi et intestina wa
 Leviori et vulgato Cathartico; dein eo praeservanti inuolu-
 quentia.

℞. Spiritus Cass. vitul. v. null. junior. centesat
 Coq. ꝑ hor. i. ꝑ. in l. q. aq. ꝑ. dea add. Sol.
 chior. nastur. aquat. chesol. et fumar. ꝑ.
 ꝑ. ꝑ. bull. ꝑ hor. i. Colet. et exprimat. et
 solv. flor. mart. q. v. Coq. ꝑ. g. die. —

finitis, inuolvi praeservandum & Lac asininum et utiat.
 Cum ℞. i. i. i. fumar. aut nastur. aquat. et Continuat. —
 ꝑ plures dies, imo augendo ignis Copiam, donec pro diu alimentis
 ipsi exhiberi possit, interdum imponendo ovis aut tel. in
 huiusmodi, pillulas Confectas cum ethyoz. misc. v. qd
 satius et sumat age ꝑ. g. die. gutt. albescent. v. elixirum —

dicti generalisariette, intermixta negliguntur topica —
remedia, illincanti fauces aut interna vis, Curivas, melle
nuxboxensi, roseo, anisotito, et pulvere flor. lamemel.
et melilot.

Cap. xxv. pag. 124 Curae
Variolar.

Universalem medicinam a sibi affectuum. Synthetis
succurrere, simulq; expectinimum practicum, quae usam
ubiq; aberrantem queat reducere, exigit sane Variolar.
Curae, sicut etenim ita felici sorte processerit interdum
variolar. eruptis ut infantis per vias et platis —
obambulantes, moem spernant, et ab eo fortunacius
emergant, interea ta gravioris Complacent variolae
procellis, tam infelici jactante luentis, et indito oi
Subitio et Cura, necne in salutis fiducia Sapientis
ocumbant et extinguantur infantis: neq; juvat, neq;
aut a Divinas pro variis Regionis Commemorare Curandi
methodo, et Sapientis insigni agrotantum Detrimeto —
usurpant, plures enim tam sperant in
Cardiacis, volatilibus, alexipharmacis qua vim Contagii
variolori repellant, et ipsius Deservationem promovere
queant, dum alii volatilibus spiritibus allegantes, sola
clamant et impendunt refrigerata, qua inflammationis
periculum et aversionem placare et Locus in point: T-
utriq; adacto therapia limite decedunt, neq; ulli v
altero Confidendum pharmaco, qd em adiq; vitant
diz in uno Cam profugavit; in altero funes accelerat.
nec varianda Curatio, e solum pro Divinis rati faciendi —

judicibus, verum etiam pro dissimili variolarum periodo,
 quae fusius in sequentibus persequemus, subdita debet, febrium
 nactura effectum evadendo ad occurrendum Symptomatibus
 toto morbi Decursu subvitiis. id variolis praesentibus & ingruentibus
 viota tenuior agrotanti praescribitur, Simulq; Cubiculo-
 moderatius clauso detineati, atq; pluribus tegumentis o coarctati,
 Praecipue tempore aestate, Hyemali vero praesentibus
 et in hoc antiqua methodum Damascenus, & Cubiculum
 tegumentis et Calentibus prunis ita accendebant, ut plures
 mortifera Cautioe agrotantes o cubiliis exirent. et nimis
 aucto impetu pro Calore, Cuius motu, orgasmo, et itaq;
 volatilibus et ferocibus exsiccatis, ex toto impetu depulsi,
 fluidaq; ad interna viscera ruant, quae furestem metastasin
 excitant solent, & ex alia parte in tunc nimia frigida Damascenus
 ad intempere Cautioe Constructioe et majori fluidorum densitate,
 ageretas Contagii variolosi molecule retineat, et in
 hospitio furestem coarctat, adeoq; aeri frigidiori et Calidiori
 inveniendum, et ad eum pro industria reducendum et tenorem,
 ut tempore aere evasit: ad et insuper o minori momenti
 praesentibus, et albis in vulgus dimittant, Conservatio reme-
 dium Lincaminum, ad et adiecti et elocinet Invenit-
 ad horum et rursus pondere ad instantes et praevalentes totis,
 et ferocibus Cautioe exsiccatis, nullatenus inveniunt.
 Licet resistentiam illam Conservatorem, vario et tamen in magis
 ut divinis ulla de summi, In partibus Cautioe et periculo febrium
 putridarum et malignarum iudicare et pro amore
 Cautioe summi, quorum tamen Lincaminum mutatio, luto affertur.
 et agrotanti insensientium nunquam satis Commendari potest.
 his ita ad tunc variolarum apparatus dispositis, statim o
 attendendum ad modum quo ingruit et Declatibus effectibus, si
 et nimis febri sit intonit, et Calore maximo, Cautioe sicutate.

Stipiti, oculi Secunda e vena. ~~quod~~ obstruuntur multitudine
Contra memoratam auriculam seu tubiculum pleno ore cavata,
jmo repetenda in malleolo, si Salivum d' affectu soporosi, aut
Convulsioe imminere atq; jam prodierit, quo praesto injicienda
e Communis Clyster, et Oravi post paranda liquem, pro purgati.

℞. Sol. orient. ℥i. Summit. abynth. et pulv. -
Conti. verm. @. ꝑi. Coq. levit. in aq. fort. ℥iv. -
Diss. in solv. mucra. Calabr. ℥i. Cap. -

efficacia aem pro purgati, dum adest suppuris cathartici,
juxta vias. Puranda e gr. iii. tart. stibiat. v. gutt. vi. Syr. globat.
Imo Salivum accidit, ut e Saliv. Pharmaceutum infantib; pig
ddis atq; successive exhibere o liceat, in quo Camu reposita
et q. aut h. gr. tart. stibiat. solub. in aqua simpli, in pur
nequaquam recipit, et affutim epotat, jndet. pravi huius eruptio
obstantes sollicita eliminant: intesa' depuratum meditat,
naa, Cui forte nae succursu, levissib; Cardiacis et redolentib;.

℞. aq. Card. Bened. et portulac. @. ℥iii. Confut.
de nyacanth. ℥i. pulv. vingar. ℥i. antimon -
diaphoret. si. aq. naph. coctura. ii. ℞. pro
Cochlearum sumenda. -

Communio tu usit e praescribere e una aut gemina
nec p' in die exhibere Corbut. alkern. ℥i. Cum aq. naph. -
e habior. splent. e pulv. vingar. in cochlear. juncul. ad gr.
vii. x. ℥ii. pro variis etate atq; remissione Caloris, e Continuanda
At donec varioligenitis reparant, qd; tunc typis jntadum
Incedit Calor vehemantior, tussis, agriphonia, aliq; hujusce
generis, qd; refrigerantib; ut ptizana, Asmo rib; hord. et
Limonib; hypnotici, seu narcotici: e praeputa p'alephar
maca clamat, et dipem supentis, Liovalius Conedit ad -
Surgentes Contagis vivas, e Sapit jntole abilem Calorem et
atalen Brandocentiaer Licitat. -

at vō si imminente variola. angustia, pulsus vō inaequalis, pro-
 portio remittenti, vira admodum haerens, ac reliquum superius
 remittet, aliq̄, urgeant angustia, cum facies pallida, et extrema?
 refrigeratio, a silentio, signis missioa caustis abstrahendum, et
 ad laetitia tur dum vō cum emeticis et purgantib; commissa
 preparanda.

℞. aq. rabios. et Card. Orend. ℞. ℞i. in q̄b; dissolv.
 alchem. et hyacinth. ℞. ℞i. pulv. nigra. ℞. ℞. lxx. de
 turis ℞. ℞. ℞i. Cap. partita ℞i. in otium -
 addenda sunt gutta aliquot Lili. paracelsi. si
 ego ad extrema tendat ut.

Cholera prope consistit in paulisper vira, et vira quadrantenis -
 Cruoris Coagula, expurganda et mae Liquida Demant, prope
 sequenti.

℞. Sol. Senn. ℞. ℞. Sal. veget. ℞i. Coq. levit. in aq.
 font. ℞vi. in Colat. Dissolv. mann. Calabr. ℞ii.
 ff. pro pro. 2. ℞i. add. i. tart. Stibiat. solub. q̄.
 iv. v. -

quod si prope agrotans in ultimo venarum discrimine, et ac
 reliquis, extrema refrigeratio, simulq; ventricul. anxietate,
 quoniam paranda foret pro.

℞. aq. Drugglor. et rabios. ℞. ℞. in q̄b; Dissolv.
 Confect. alchem. et hyacinth. ℞. ℞i. v. ℞. ad.
 vix. emet. ℞. ℞. ℞vi. pro varia aetate et
 mae violentia. -

In vitis prope remittit, si in inflammatione vō demissis, -
 Convulsio, paraverent, et nondum variola superest, et
 portio postula Loco, purpurata, exantemata varia, licet
 Summum imminuat gasulium, vō tū omnia de restanda,
 vō Longius elabi. si nas intra vallon ad ultima tentanda,
 quapropter vō prope purgantem suvat praescribere, vō hanc
 ad ultimum pro avos. Succor. Cumulua eliminandum, procut-

pluvia emotis et Cathartici actis, tenaces et pingues ^{maas}
 effusius aut levius ^q superora v. inferiora dimovit. Dein vo-
 'Vols. Confidendum Cassiaci, & si nullum necesse non molienti, et
 evaporationem v. promovant, Condamatum e De agrotante -

2^o Dum Tur. praeterit varolar. Stadium, et jutat suppurati-
 onem, si varola rupta in die, inveniatur, et non venittant -
 Symptomatica, soli nae Commendandum opus, ea t. cautela ut
 aqua v. plenius abata, neq. ulla interveniat, interpositiva aeri -
 frigidiori expositis, v. suppurata turbis tuto Comittantur, verum
 si febri perseveret aut intendat, anxietatis, vigilia et molitioni
 viti praemati aqua, ad sequentia praeparandum. -

℞. orig. laute Cochlear. i. v. ii. Bull. p. hor. $\frac{1}{2}$ in aq. f.
 l. q. Cap. pro potu ordinario. -

Secundo indicati quoniam Clyster. -

℞. Decoct. Commun. Clyster. refriger. et laxant. to. p. ol.
 olivar. cochlear. i. mel. rosbor. ℞i. p. ℞. Clyster ad
 laxanda Intestinalia et dotta fistula intestinali -
 Levius agroganda.

versus viti aem horis, & viti julap. v. emulsi sing. ℞. -

℞. aq. lactuc. et violar. @. ℞i. p. ℞. Capill. ven.
 et papav. alb. @. ℞iii. aq. naph. cochl. i. Dotta
 aem narcotici augetur, imo et laudica. -

Prescribitur, v. gravioni Dosi. -

℞. q. s. len. may. mund. ℞ii. Contund. in mortar.
 marmor. in affundend aq. font. v. p. t. z. and
 Supra praescript. Dein Colet. ad. 1. p. de naph.
 ℞. p. Cap.

haec aem nadiamina tota, v. totum. vasa requant -
 meliastarim, v. viti immixtentem, aut Fluoris, estur. -

Sufficienti Compressura, & alytis natâ et iudole, v' alia Casâ
 ex candentibus ferente proarsa it, q' quo cum vena
 Secunda j' talo, invito suppuratione p' aludio, imo' et parua
 p'oo purgans qualem supra' p'p'rimis, q'pâ diluentib' et
 refrigerantib' insistendo, v' et alia topiâ in hunc variolâ.
 Hæc diversa superveniunt symptota: quippe eruptis varioli
 cum fallaci simpthodis remissionis, tumore subito Depressant,
 et quasi evanescent, franguntis vira, pulsu Debili et languen
 Depressentis, facies pallet, urget Delirium obscuro, v' affectu
 Poporoso, Convulsio aut motus Convulsivi, aliq' instantanea
 defationis pericula: Cum t' em ex p'avis laccis j'olgentem -
 Coagulantiâ, h'ca v'â Depressant, p'ocipitâ p'iam p'oc'loniâ
 indurati evanescit superata, viciu' s'cum evanuit, h'ad morâ
 utentur Cathartico Emetico. -

℞. Sem. mund. ℥ii. sem. Corde ℥i. summit abynth
 et Centaur. min. @. ℥i. Coq. in aq. font ℥viii. -
 j'colat. Et ex p'oris. di. r' h. mann. Calabr. ℥iii.
 ℞. p'oo p'oo 2. Dor. i' t' add. vix emat. ℥vi. Coq.
 Hæc in Tam et facto sufficienti Intervallo alteram
 sumat nisi t'ax' voto & darent in priori Catartico,
 emetici actiâ. -

attendendum q'p' ad atalen Et viciu' agrotanti, in j'ra
 Adulto, Doris purgatiâ et emetici augenda foret, celebrati
 s'cum purgatiâ, si pustula o' invenerint, et Simphtoda
 ingravescant, Cum iudicium sit p'avas manâ, fluidor'
 massam albiâ p'actiâre, quas attingere aequaq' p'nt
 purgatiâ et emetici, ois iudicium t'p'o s'enda fiducia in p'otione
 Cardiacâ et Sudorificâ.

℞. aq. rabior. et naph. @. ℥ii. Coz fact. alteram. -

ʒi.ʒ. sal. vupae. ʒi. antimon. diaphor. ʒi. liliū parvū.
gutt. lxx. Cap. alternis vicibz. —

ʒi si nullam hinc fortis Cardiacā tō, moveret secundentiam,
atq; vitalem Calorem o redintegraret, impendente ʒtali minā
oleo lili parvū. Cum Cochleū. viz. utendum foret, quo digeratur
agrotantes, et mortis imago involuta o semel exsuscitate nobis
Contigit —

Jandemut nihil jntactum obelinquamus. Quia vix p̄ hōatā
et eventus, Quia Hæsem variolar. Concomitantia, Disenteriam,
aut Diurthiam biliviam, lymphaticam persequenti o Lapiū —
caemorate p̄cedunt t̄pore, eiq; magis reformidanda, quo —
nulla foras Cudelliorabitā sint sympthōata, atq; p̄v̄t̄
vix medicaminū d̄p̄senti, et solū t̄m̄ medici d̄lutanti; —
Intersā glora anno proficē elapso hinc v̄m̄ d̄m̄
urgēt Disenteria Cum Calore maximo et abdominis t̄nsiōe,
o t̄m̄ Lapiū Conjungunt̄, Cum d̄p̄t̄m̄ o Colicā p̄ssio.
modō Competuat labor d̄luentia utaq; p̄t̄. Venor. or̄gē,
exultatōe Coctoz Cum Lys. negar. alb. junctā. Jnt̄ ad d̄m̄ t̄ —
ur̄p̄anda d̄s̄l̄v̄a l̄d̄iaca cum narcolū, ʒ p̄sionidoi
d̄s̄l̄v̄i. —

ʒo. Coctut. alham. aut hyacinth. ʒʒi. Laud. liquid.
gutt. V. Cap. statim; dein d̄n̄o ret̄ ʒʒi. aut t̄s̄ —
ʒi. t̄e Laud. liquid. ad eandem d̄s̄m̄ jnt̄a —
ʒaudis. jnt̄a vall. Cum aq. naph. Cochleū i. addad.
Hill. ol. amygd. Dale. t̄ Lys. de n̄g n̄ph. aut Capill.
v̄m̄. —

hæc ʒ 2. ʒ B. ʒc̄ Continuada ʒt, et ad juvandum Corundem
effectum, jnt̄um simplex Hic. Hic. ʒ̄ intersalle adam
d̄s̄l̄v̄abit, aut d̄s̄m̄ d̄s̄m̄. u. ʒi. t̄ ʒʒi. v̄p̄t̄m̄
n̄o in un̄o d̄m̄. Jnt̄a veniente aēn̄ alvi p̄oflusio cum

℞. flor. malv. et viol. a. q. p. i. gl. i. r. r. r. ℞i. -
j. d. u. d. l. e. r. i. j. a. q. j. a. v. e. n. t. h. o. r. i. ℞i. i. c. o. l. e. t. l. t.
x. p. i. m. a. d. d. i. y. s. v. i. o. l. a. r. ℞i. i. f. l. o. i. d. v. e. l.

℞. mucilag. pyll. et Cydon. Cum aq. ros. extract. ℞i. i. a. d. d.
i. y. s. f. l. o. r. p. e. d. c. a. t. ℞i. f. -

3^o ut plerumque effundunt suppurant, rivi pte, pini tumida
stapin detumesunt, pustula b. r. i. i. i. n. d. u. r. a. n. t. i. s. , et crustis
nigricantibus odori incipiunt, atq; remissis lymphaticis, -
modo benigna fuerint variole, redit somnus, appetitus, et ad
o. s. f. u. n. c. t. i. o. n. e. s. a. l. i. a. s. i. t. a. s. , si exapain molestiam puritatem quo -
continuo fatigante agis, videri si nunc proiora et repleta
viniis extiterint suppurationis Conestantula, succedere solent
fator insignis, vigiliae, anxietate febris atq; portioe maia
pusulenta, si serum venis extiora o. i. n. v. e. n. i. e. n. t. a. a. d. i. t. u. m. ,
j. a. t. i. s. r. e. p. u. b. a. , c. o. r. i. o. n. i. s. a. d. f. a. u. c. e. s. , t. r. a. c. h. e. a. m. , p. u. l. m. o. s. e. s. , -
i. n. t. e. s. t. i. n. a. , h. e. p. a. t. , v. i. t. e. t. i. l. l. a. b. i. l. i. t. e. , u. n. d. e. p. t. y. c. o. s. , n. u. r. i. a.
i. p. t. e. s. i. c. t. u. s. m. u. l. t. i. p. l. e. s. , d. i. s. e. n. t. e. r. i. a. , v. a. r. i. i. t. u. m. o. r. e. s. , e. t. u. l. c. e. r. a.
P. u. b. e. r. t. a. i. n. d. i. v. e. r. i. s. p. t. i. b. i. s. e. t. d. e. i. n. b. r. e. v. i. c. o. n. j. u. n. g. u. n. t. u. r.
C. u. m. f. e. b. r. i. s. h. e. c. t. i. c. a. e. t. m. e. n. s. m. o. , a. q. , s. o. l. i. s. L. a. c. t. i. c. i. n. i. i. s. f. e. l. i. c. i. t. a.
r. e. b. e. l. l. a. n. t. p. a. t. , a. d. c. o. q. , p. r. a. s. c. r. i. p. t. o. t. e. r. r. i. o. r. i. p. u. r. g. a. n. t. e. i. n. b. i. s. q. u. e. n. t. i. s.
f. o. r. m. u. l. i. s. -

℞. pulv. Cass. ℞i. v. ℞. f. mann. Calabr. ℞iv. solv.
i. n. a. q. L. i. c. i. o. r. ℞i. v. f. p. o. o. - v. e. l.

℞. r. i. b. C. o. n. t. u. s. ℞. f. C. o. q. i. n. d. e. c. o. t. h. i. c. o. r. ℞iv. solv.
m. a. n. n. ℞i. f. p. o. o. v. e. l.

℞. m. a. n. n. C. a. l. a. b. r. ℞. f. S. o. l. v. i. n. a. q. f. o. n. t. ℞iv. a. d. d.
f. y. r. d. a. h. i. c. o. r. C. o. m. p. o. s. ℞i.

Celebrata purgatio, propeandum e ad Lactiania, e

gradatim h^{ab}enda s^ut, in p^{ro}prio despumata et ebullita,
 cum aquis p^{ro}hib^{itis} decocti hordei, plantarum geracientium,
 aut succi sumari. deim solum s^uas j^us et p^{ro} o^{mn}i alimento
 concedendum: si nulla ventriculo molestia accesserit: q^uod si —
 exulceratis intestinis, dejectioes sint purulenta, et graviores,
 Atipata torminibus, enemata varia paranda s^ut cum decocto

q^uo. Decoct. hor. et lact. vacu^o. @. p^{ro}ts aequales,
 ovi. vitell. ℞. ii. — vel —

℞. Decoct. omaso^{rum}. s^u Capill. verat. q. s. vel

℞. mucilag. pyll. et Cydonior^{um}. in aq. ros. extract.

℞. i. add. ol. amig^o. dulc. ℞. iii. s^u ℞. iii. vel.

℞. Decoct. hor. et Sanicula^{rum}. p^{ro}ts aequales, sal
 habeant. verat. ℞. ii. et j^us icat^{um} Clyster. —

Suppurato s^uo Rectus s^uo h^{ab}ente, nihil ultra molendum
 ut jam notum fuit, s^uo simplicitate alteris diebus alvus —
 laxanda Clystere Communis, cum aq. font. et ol. simplici
 parato.

4^o adventante pustularum erictione, atq; Crustis —
 qualeslibet die decedentibus, sicut o^{mn}ia absoluta p^{ro}visis, et p^{ro}
 voto successura videantur, sapius a Pallaci substituta lenitate
 Spee in horrorem impellimus, et plura adhuc sup^{er}ant
 p^{ro}caevenda, sive t^{em}poraliorum et frigidiorum causam —
 p^{ro}mativius spirant agrotantes, sive ventriculum jam
 indiam fractum et debilitatum, copioso et intempestivo —
 opprimant cibo, nova ingruunt, neq; minus reformidanda,
 a graviora adhuc minitanti, quippe insensibili Cohibita
 transpiratio, et pravi succi in t^{er}tiis vis et ignis cumulati,
 excoranda suppressit, et plura in Sarcitis, in oculis, auribus,

aliqua, extensiois, p[ar]tib[us] detaminat, d[um] ex aliâ p[ar]te p[er]vase
maâ, f[er]vorem et humultum febrium Continuarum putridarum
et malignar[um] accedunt, adeoq[ue] his Cautè vitatis, purgandis ege-
squenti Cathartico. —

℞. Senn. mund. ℥i. Flor. p[er]sicor. et Corianor[um] ʒi. i.

Coq. levit. in aq. font. et p[re]colat. visch. mann. —

℞i. v. ℞ii. pro diversâ etate, add. ʒs. de chior.

Compos. ℞i. ff. ʒo. vel.

℞. rh. Contus. ℥i. ff. Coq. in aq. font. ℞iv. v. ʒ.

dein solv. mann. Calabr. ℞i. ff. v. ir. Coq. —

Quo parato, tuto' paratur e ventriculo ad Albo, Bronchi-
tucci, unaq[ue] superant in variolis Conditio, Cicatricum semp[er]
difformitas, q[ua]m sedulo vitare, tum antiqui, et nostris t[em]porib[us]
pro singulari et vultu amore, atq[ue] in Conservanda venustate
et p[ro]p[ri]e p[re]sertim in p[ro]p[ri]e Curare. Licet t[ame]n diversa ad eund[em]
finem atq[ue] metam tentata methodi: etenim Solenne est
in vetustâ et nobiliori progenie, pustulas acu aurâ perforasse,
statim atq[ue] supp[ur]atio inieperat, eo Consilio, ut per nequaquam
moram Habere, profundos Cicatrices relinquere o[mn]i p[ro]est, —
verum novam Cautivam evidenter Comp[er]avit experientia,
Solamq[ue] operam et attentionem ad perimam, quæ nam —
p[re]cautionem, et fugandum nimium Cardiacor[um] et sudorigior[um]
usum, et frequentâ m[en]sam purulentam accedunt, et —
ariorum nimis efficiunt, Licet finitâ et fere Consumptâ —
Supp[ur]atioe obosa et Odalgamica varia interdum exp[er]iendâ,
ad Lubrificandam Stannâ l[ati]m, et minuendâ Cicatricum
aricas, insuper et Cisti Cars in q[ui]b[us] Sanandâ, et aparicandâ,
pustulas salivâ imp[er]iamus, d[um] semp[er] ea Cautivâ adco,

Sibi, ad Coentes, tenaciori crusta' obducami, et effluam
 ma' pululentae doregant, ejusdemq; varis inferiora altit' con
 dirigit. — —

Observatio prima

Innumera sibi prodigia luteo variolae exempla, et p' 17
 annor. spatium popularis m'bi devastatio miki ostulit, —
 Commemorare poen, et duo t'um Belgicus a fortunata
 magis vicia prius desipit, adultum 30. anno natum,
 athleticis exercitiis, et roboris quasi incredibili, qui anno
 1730 venis sine autumnis, et jam incipientem odruinam,
 variolis tunc temporis grassantibus conceptis fuit, acrius etiam
 in praesidio m'bi laserat, atq; fervorem summum et febrem
 ardentem hegerat variolae? eruptis diebus innotis 1731, in
 Borussia et tale, commutata fuerant in delirium p'ce
 phrenitiam, ad ita agrotantem legitabat ut ab distantis
 vinci o' p'ot, atq; ha' a m'bi invasione die, ruptis p' otia
 distantium vireulis dictis in urbem dignu' duxerat, et nudato
 opere viam fluminis vicini tenens, in aquas iam frigore
 conserentes, tamen de Conjectis a q'd, feliciori sorte, t'ua
 multitudinis subsequente, tum rursus in postu venantibus
 liberatus e, et statim Laqueis vinctus, ad hospitium ductus e,
 attenta erat spectaculo tota t'ua Civitas, cumq; jam —
 viventem, periculo fluctuans et variolae? demutato: statim
 thalamis calefactis sine ullo ansu lum notabili depressione
 postulari? et quasi nigricante t'oris habitu compositus fuit,
 mox ipsi obhibita pro Cardiacae, qua' o' solum vire, eius citata
 fuerunt, verum etiam ad sanioram mentem redit p' t'um
 t'us: vesperinis in horis dum cum inveni, adam obsuri
 delirii imminebant reliquia, quod circa Julagium parandum —

imperavi, cum aquis stillaticis Oronginis et Cardui ²¹⁹
Benedicti, Flys. papav. alb. ʒ. vi. et Coct. de hyacinth. —
ʒi. hoc p̄ unum aut alterum diem continuato, p̄ excrete
continuata fuisse, donec plene Convictus, exorbatio et —
anxietatib; agitantis, pravo succo, adesse ʒ. iʒ viis, et in
Sanguinem Confluentes, proscrispi pot̄em Cathartico emeticis,
Attur Suvamen attulit, ut variolis ad solitum terminum
Peliuita p̄ducat, proba' egi Convaluit: 7 Triplici adhuc
nense alimentis, et libet saturatus, iudic' ʒ. gravissimam
febrem malignam a fata terminavit. —

Observao 2a

anno proximo elapso in decem, variis variolis grassantib; nob.
22. N. subitanea febre correptus fuit, cum ardore maximo
Mentis: 2 et intolerabili Capitis dolore: statim vocatus, passim
v. ʒ. Inobruachio, et cum variolis nondum lubere saturatus,
imperavi post v. ʒ. parata fuit pro Cathartico-emetica, et
magnam copiam maus. ʒ. Superior et Inferior eliminavit:
res partim cum horis lum splendorem summum in luminib;
observarem, et ea quasi Inglurescent lymphomata, v. ʒ.
in tale, et Emulsiorem hora somni imperavi, simulq; variolas
impudenta nurcavi, 7 medid nocte simul erupere,
mitigata fuisse tunc typho et lymphomata, atq; egi usq;
ad suppurati typh, melius se habere visis, verum accio —
an nob; violentia, 7 quodam Commisso in vitu Errore, —
inopinantia correptus fuit Phrenitida, a mentem ita e'
solio deturbavit, ut violentas vili in terra manus continuo
tentaret, eed. ut Saqueis hae' nova fuerit vincendum: v. ʒ,

ad succurrendum infarctum Cerebri, illud praecipue, & tunc
 quoniam habitum obstruat nuncius pustularum ut unus aut alter
 cuiusque, plures sectiones exeat, tandem quasi papovibilem
 pervenit. in his angustis phlegmam cum emulsionibus paratam
 et continuo huc et illuc rotandam jussu, & Delisum et ardorem
 Compercutit, atq; deis ptoem purgantem Rogiam, cum vinu-
 emet. ℞. in 1^o cyatho agrotanti exhibis, & stupendum prostitit
 effectum, atq; agrotantem & solam immixti phlegmatis, periculo,
 varum et infarctis variolarum viab. p totum decusum liberavit

Cap. 271. pag. 140.

Curatio
millorum

eadem ad Curandos millos sicut et variolas viam practica
 communis notant, similemque, nam viani nunc apperitum
 proponunt, interea quondam mutacione suscipit Haerapija, et
 diluentia atq; refrigerantia, magis in hoc qm in priori affectu
 immixta jurata, adeiq; iam statuti nobi prolatio ex lapsa relatis
 viginis, vena una aut altera vice in drachis aut in tale secunda
 & pro impudenti et acuto Cerebri infarctu dissimulata, paranda
 deis phlegma Cuss fol. papav. rhead. et flor. malv. et linguii

Decocto orizae, deis injiciendum laena sub sequenti formula. —

℞. Decoct. flor. malv. et pariet. ℥. ss. v. ℥. i. ob. Commua.

℞. ii. v. mel. narboxen. ℞. ss. —

Desperitum acm horis, proseribendum in lapium prolixo caloris,
 et siccitatis, aut febrili acm gradu

℞. aq. lactue. et papav. rhead. @. ℞. ii. lxx. papav. alb.

℞. ss. aq. nazh. Cohl. ii. vel.

℞. 4. sem. frigis. mund. ℞. iii. v. ℞. ss. Contund. in mortario
 mai. mov. Nix affundend. aq. font. q. s. Colat. adia. lxx.

De nymphæa

mobili, pro vario carbohilis latitantis signo, aut visum gradum, renovandam cathartica, & proes cathartica, imò si ultima vigent angustia, vixum bratsura cum spiritibus, ut supra inveni in Theriaca variolarum. tunc unum remedium parandum foret, & vulgò illam methodum sequuntur nobis illi, nisi complicata fuerit cum febris putrida et maligna: acumq; ta processerint, Caveat se frigidiori aëri aut vento exponat agrotans: hinc etiam Cathartici, cathartici, granis res, tussis importuna, aliq; huius generis bobis curat et soventi.

Observatio

Virgo huiusmodi curata a non dicitur 20. ann. attingat, ægiam a longo tempore tunc molestâ et quasi continuâ premebatur, diememnis in unum dicitur. Febris autem cum calore maximo, et viuitate intensionis præsertim pectoris, concepta fuit, bari junctâ fuerat tolerabili capitis dolore, luminum splendore, et ex auctore febrili motu, ac in Congestione, vultus chirurgus, qui venam statim in brachio secuit, atq; mēsurâ virgineâ suturam et febrim continuam ratur, pro omni cathartica altaria die — Remedia præscripsit, purgata aera alvum quadamtenim — movit, & solent o habuit exitum, quippe instantia horâ hâ non mediocrâ ea, in vasa lymphatica, tanq; notabilior pectoris angustia suborta fuerat, ut præcludendum brachii spiritibus virgo clamasset; agras in hinc hinc instantis in vici, et perperis oculos. Fulgore, sicut et univerno cutis rubore, sordidus, mobilis tunc tempore præstantibus in memoriam ad vocatis, dubitari tunc illam impendens, et statim virginitatem an virgo jam mobilis parva fuisset, de q; instantis et ipsamet iuxta placet brat novam phlebotomiam statim impetari, et vasa h. hor. amulsi em cum Syr. rapar. alb. & officinæ ser anax attulit; et enim —

221

Crustina die violentis sensit ortophrea cum dolore gravatissimo,
 et gutturli ventum deprehensum fuit, et cum maj. ardore cutis,
 et quasi in semibili protulari? to ee, to simul juxta signis, —
 motus boni post alteram v. s. illis celebrandam, adaptivo —
 pronuntiar, o spu seballit, et ante ligaturam factam, mobili in
ptib variis modis, interim vigebat adhuc aequaliter symptoma
 et rejecto elytase, repetenda repartitionis horis v. s. juni, qui
lucensit, horis bonis emulsi cur lyy. pap. ar. alb. in 1^o dos. et 1^o v.
de myng. in 2^a die quente altera matutinis horis, agta melius le-
hore visa e, si et protula o invenissent, aut numeriosiores sequa
notate, et versis mediam deserta, in rebellentibus idea, novae
supervenirent a ocra salutis per se emerant, atq. egrum voti
et aditanti, luculentis, ad celestia auxilia determinarunt, et cur
presentia ingebat lumina mentis proclis, cum tussi hica, —
prescripi v. s. in talo, et thru lucosum obtinuit, ut mobili
matia ad posteriora confluentis, ea visosa et presentia pulso
illius liberata fuissent, nihil referendum gestura et je de cursum
mbi, et divinis semel mobili, et critis hesis evanuit, ad ut —
virgo duplici simul modo, quorum unus oib simul remediis —
obstitit, supra nota consuluit —

Cap. xxvii. pag. 194

Curae

variolar. lymphaticar. gallie,
 a verolle volante

q^d Curacione putat, soli nra committenda e, et si q^d meliendum
 videatur, ex his et dicta et de variolis cautis dixerat. —

Cap. xxviii. pag. 196

Curae

De macie

q^d dicitur, quosdam macie ut plurimum a saluginosa et prava
 vitiis rari, et thomasti vitio, reparacione impediante, produnt,

dividit duplicem eam curandi methodum proponemus: igitur si
 Tyris et in humorum acrimoniam contraxerint, propter saluberrimam
 constitutionem, tyrosam, inanisam, humectam, oportet humores, si
 age fuerit lactem, lac eligere dulcem et humidum, nutritum dictum
 Porten Lunetantem et vel rigescentem trahit, iusculi pullo r.
 refrigerant. iuscul. Carn. Crum. oris et hor. utat, si vero puer
 sit ablatatus, vesicis affis, pariatell. Crum. iuscul. Carn. si
 Somno, desit syr. papav. alb. Conciliabit, dosi convenienti, —
 postea iuscula pullo r. aliquot dies sic perscribenti. —

ꝛ. pull. junior. exentat. repleat. hor. mund. m. i. Coq. post
 desumamora ꝛ hor. i. in aq. f. i. q. d. via ad. Sol. Cornag.
 agrimon. et purp. in. @. m. f. Coq. ꝛ hor. ꝛ. Colat et exprim.
 Cap.

ꝛ. q. An. Rij. mund. ꝛ iii. amygd. dulc. excoctat. per. iii.
 Contund. in mortar. marmor. Bis attendend. iuscul.
 perscript. adhuc fervent. Colat. et exprim. Cap. —

assumptis iusculis ꝛ q. v. h. die, puer sic purgabit. —

ꝛ. rh. Contus. et tart. solub. @. ꝛ i. sem. lin. ꝛ i. Coq. in aq.
 f. i. q. lub. fix. Coctione add. sol. malv. sol. orient. @. ꝛ i.
 in Colat. et exprim. ꝛ iii. Dissolv. man. balabr. ꝛ. —
 ff. pro humendulum regimine. —

post purgationem age lunct ꝛ d. die mane ad alveum domesticum,
 et ab extr. Odalrei in lecto collocabit, ubi iuscul. pull. ut supra
 refrigerat. lunct si humor desierit syr. papav. alb. schid ebite: —

Finis usu Odalreor. puer ita solum purgabit et diebus lacte Caprin.
 aut vacca. elutyrat. et ut ego utote ꝛ pensosa et ultra. si maior
 maxima fuerit, paulatim augetur Lactis, desit, donec lacte thum
 vesicis, serium al Lac acorem in ꝛ vis contrahat, local. ante
 instum lactis ad gr. xii. schid e oportet: si maior, ad debili
 et homacho, lib. o. Coque et dolente procedat, nisi instituit, ut in
 i^o casus et puer statim sic purgabit. —

℞. Senna mund. et rh. Contus. @ ℥i. ℞. Senna. Contus.
 et I. unmitr. abynth. min. @ ℥ii. Coq. in aq. ℞. i. q.
 in Colet. et express. ℥iii. Dissolv. man. Calabi. et
 ℞. de chiron. Compos. @ ℥ii. ℞. Senna. Coq.

Quidam purgandi, ager sumet ℞. ℞. mané jejuno ventrisaq.
 ℞. de chiron. Compos. ℥i. ℞. de abynth. ℥i. rh. Contus. ℥i. —
 aq. chiron. Coch. i. v. ii. quo facto iterum purgabitur, et si labora
 Copiosior in thorocho Latet, addant tart. stib. gr. iii. oleum
 de una a purgandis quibus exhibebit pulv.

℞. Limat. fort. rubiginos gr. viii. et ocul. Cam. fluvios
 et Corall. rub. ꝑꝑ. et pulverat. @ gr. x. sal.
 abynth. gr. vi. ℞. pulv. ad usum. —

Sumat hunc pulv. em. mané jejuno Thomae, jejuna
 refrigerans exhibendo alteris diebus, pulv. addeant Diagrid.
 gr. vi. et de una hujus, remediis notis, equinis omni latendat
 usum ℞. ℞. ℞. jejuna pulv. refriger. p. altera ℞. ℞.
 pulverem, dein ℞. ℞. sumat iterum jejuna et sic vicibus —
 alteris pulverem nonis sumet mané jejuno ventrisaq., —
 ℞. de chiron. Compos. Ann. ℞. de abynth. et rh. pulv. ut
 supra's qd. ita paratis si inappetentia sit, pueri huius inferiora
 pro potestate. —

Capitulum pag. 194. De Cura

De tumoribus thumoris

vix remedia saluanda in thumoris prosumt tenente potius
 etatis et temperamentis mutatae quae remedia? vi, nec ideo —
 negligenda demedia, et ne vitiosa sanguinis constitutio mala
 graviora affert, imo radiatis autem, ut m. b. incipiens
 et mitis adhuc, idcirco si viscus sit tumor in collo, aut alio —

p[ro]p[ri]o, a retro, fundine, v[er]o, i[n] q[ui]bus, sensibilib[us], remotis, cum
 auferri oportet, ne humor ibi depositus, a quibus, morbi
 ultionis & altates, moran[te] humorum magis inquirat,
 verum si plura simul tumores nascenti, aut tumor manum
 in Civitate, una utulus sit, topica igni admove[re], misine
 proficuum e[st] si tr[an]s aliqua admove[re] aut a p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]o
 ad tumores depellendum, ea, resolventia mitia sint, ut
 emplastrum de macilagine, cum emplastro de vigo cum
 mercurio quadruplicato, Diabotus una, emplastro de Civitate, de
 Sulphore, alia resolventia fortiora caut[er] et admove[re] d[eb]et
 ne lac, v[er]o, h[um]iditas, in tumore latens, et veluti topica in
 actum deducta, gravior h[ab]eat et tumor suppuratus d[eb]et
 accidit, ut i[n]tra signa suppurationis apparent, illud e[st] op[er]andum,
 et via m[en]s extrahenda & s[er]vanda, ne igne d[ir]ectis h[ab]eat moran[te],
 omnia vicina d[er]ivat, aut h[um]iditas in lacrimis efficiat, tunc dato
 puri ut amplexu h[ab]eat, ulcus detegere oportet, donec n[on]
 visib[ile], i[n]guis constitutio emendata licet i[n] p[ro]p[ri]o soluta
 contingat si cario fuerit, patientia op[er]andum, donec par
 omnia cariosa accidit, quo facto, vulnus paulatim i[n] malis,
 unguento suppurativo, Oraxumo assis mundificativo de-
 ap[er]to, si Labia dura et Callosa h[ab]eat, Oraxumum Calceatum,
 in virida imponat, et si sinus fuerit ob p[ro]p[ri]um situm o
 facile ap[er]iendi, injunctio vulneraria ab absynthio, mord. lentan.
 m[en]s aristoloch. aliisq[ue], similis, detergant. verum ne gravis
 utus fiat, ut tumore litici curant, vitium i[n]guis
 r[ati]o[n]is i[n]tonis corrigendum, et i[n] p[ro]p[ri]o distans convergentia
 prescribere, i[n]tra qu[od] p[ro]p[ri]o l[es]a[n]t, p[er] Consistit, quoniam
 aut i[n]guis melioris indolis efficiat, Diata v[er]o pleneo[rum] est,

℞ pulv. @ ℥i. ethyop. mixe sal. abynth. et jalap. ℥ii.
Cinnamon. gummi ammoniac. et diagrid. @ ℥ss. radiganti ca-
ja pulv. et cum ʒ. q. syr. flor. passior. ꝑ opiota, ad ℥iii.
Sumendo supra bibendo juscul. pull. junior. fol. nasture.
aquat alteratam, et dāns dulc. ut mos ē. —

Nē ad usū opiate singulis diebus assumpta, motus ymnus
ni mis intendat, ꝑ hō. assumet, et uno die quiescet. et
iterū ꝑ hō. — Capite finito opiota usū puer repugabit,
et cōis ꝑ x. dieb. mass' leni lactis vaccini, ovi albumine
clarificatū, et Saubar. Candid. s. q. dulcorat haustum sumet,
Cui succ. chesol. deguat. ℥j. additū quo assumpto juscula.
Causi Pleuriticis Convenire poterunt sic. —

℞ pull. junior. exentrat Cuius ventra replētū
lior. mund. ℥ss. q. som. frigid. mar. mundat.
℥ii. amigd. dulc. exentia. par. ʒ. Coq. et depurata
Itaq. fervent. ʒ. q. ꝑ hor. radiam. ad. dāns —
Causor Pleuriticis Itaq. fervent. extrahat. et ꝑ
mostrar. marmor. Contus. par. iiii. Sol. borrag.
Cuscor. et chesol. @ ℥. s. d. null. ꝑ hor. ʒ.
Colat. et exprim. Cap. egr. —


ap. usptis Causor. Pleuriticis jusculis ꝑ hō. notatum, et
iteratū ꝑ o. e. purgante, ptyzana ludorū, variabit. sic. —


℞. sals. par. ii. j. nēis. ℥i. s. lign. sanet. minut. lect. et
laxaf. Contus. @ ℥i. Cui inaq. font. ℥. xii. usq.
ad 4^o ptis communt Col. et exprim. —

Sumet quilibet die huius decet haustus iiii. mane, unus,
alterum post mandium, et 5^{us} hora somni. continua bit
ꝑ mensē et ultra, et dōis ꝑ hō. domada sumet ante ꝑ
haustum

humum styrae, aquil. alb. & ohy. op. mix. gr. x. purgao instituti
 in medio et fine, data huiusmodi instituti, ut mag. & procul
 fiat (guinis reparas. his oib. supra prescriptis eo ordine factas, -
 patienti spectare oportet, si irrita fuerint, ut etatis et generis
 mutas, i guinis vitium corrigat, et tumores sanent, quod pte
 purgationem tunc interdum prescribere: Longiori em remediis
 usu, nris hic etiq, ingravescit, qui et se mitis et et penitus
 evarescit, mutata humor. Constituta. verum si suppurat
 ita ut per magnopere i guinem inquirat, et fadem lentam
 ad marasum tendentem pariat, tunc dicitur asininum
 presertim Corfost, cui othomachus pueri, paulatim assuefacto,
 mag. doris fore poterit, cuius paulatim ejus quoq, doris -
 angelite, doris huc fuit vestum, ut dactis pro omni
 cibo variat. nec alius a modis doris huiusmodi (guinis reparas;
 marasum et mortem precaverit. -

Curaeum
 Finis





Index Capitum
libror.^o Quoror.^o

Cap. i ^{um} de Incommodis graviditatis	pag. 49.
Cap. 2 ^{um} de periculis partu	58.
Cap. 3 ^{um} de iis q̄ supervenire solent infantib ^{us} immediatē post exitum ē sinu materno	13.
Cap. 4 ^{um} de vomitu et Singultu	19.
Cap. 5 ^{um} de torminib ^{us} ventris seu colico dolore	23.
Cap. 6 ^{um} de difficili dentitione	31.
Cap. 7 ^{um} de alvi profusio	33.
Cap. 8 ^{um} de alvi adtentione	41.
Cap. 9 ^{um} de ani deidentia	45.
Cap. x ^{um} de hernia	48.
Cap. xi ^{um} de umbilici proidentia et inflammāe	53.
Cap. xii ^{um} de intestigine	54.
Cap. xiii ^{um} de Crusta lactea, aschorib ^{us} et fāvo	60.
Cap. xiv. de tinea	64.
Cap. xv. de ptyriasi	67.
Cap. xvi. de Lumbricis	69.
Cap. xvii. de ventris et hypochondrii inflāe	74.
Cap. xviii. de Convulsioe et motib ^{us} convulsivis	83.
Cap. xix. de epilepsia	91.
Cap. xx. de Stabismo	99.
Cap. xxi. de Calculo vesicae urinae, et urinae incontinentia	102.

Index Capitum
morb^o puerorum.

Cap. xxii. de hydrocephalo.	pag. 106.
Cap. xxiii. de tachitide	113.
Cap. xxiv. de aphthis, vesiculis gingivar ^o et inflammatione tonsillarum.	117.
Cap. xxv. de Variolis	124.
Cap. xxvi. de morbillis	140.
Cap. xxvii. de variolis lymphatici, gallicae <u>La verolle volante</u>	144.
Caput. xxviii de macie	146.
Cap. xxix. de tumoribus tumoris.	148.

finis



Index Curationum
morbor[?] pueror[?]

Cursus de incommodis graviditatis - - - - -	pag. 155.
Cur. de periculis partus - - - - -	159.
Cur. de vomitu et singultu - - - - -	163.
Cur. de torminibus ventris, seu Colica dolore. - - - - -	168.
Cur. de difficili dentitione - - - - -	171.
Cur. de alvi profluvio - - - - -	173.
Cur. de alvi adstrictione - - - - -	177.
Cur. de ani decidentia - - - - -	179.
Cur. de hernia - - - - -	180.
Cur. de umbilici proidentia et inflammatione... - - - - -	181.
Cur. de interstirgine - - - - -	182.
Cur. de crusta Lactea achoris et favo - - - - -	183.
Cur. de tinea - - - - -	183.
Cur. de ptyriazi - - - - -	186.
Cur. de Lumbricis - - - - -	187.
Cur. de ventris et hypochondrior. inflatione - - - - -	190.
Cur. de Convulsione et motibus Convulsivis - - - - -	192.
Cur. de epilepsia. - - - - -	193.
Cur. de strabismo - - - - -	197.
Cur. de calculo vesicae urinariae et urinae incontinentia. - - - - -	198.

index curacionum
morborum puerorum

Cur. de hydrocephalo	pag. 197.
Cur. de rachitide	201.
Cur. de aphthis, vesiculis gingivar. et inflammatione	
..... tonsillarum	203.
Cur. de variolis	205.
Cur. de morbillis	218.
Cur. de variolis lymphaticis (<u>la vesicelle volante</u>)	221.
Cur. de macie	idem.
Cur. de tumoribus strumosis	228.

Finis

[A large, decorative flourish or signature mark consisting of several loops and curves.]

*Index observatorum
morbor. pueror.*

Observatio unica de Incommodis graviditatis pag. 134.	
observ. de periculis partu - - - - -	164.
observ. de torminib. ventris seu colico dolore - - -	168.
observ. de alvi profluvio - - - - -	176.
observ. 1 ^a de variolis - - - - -	216.
..... 2 ^a de jidem - - - - -	217.
observ. de morbillis - - - - -	220.

*observatorum
finis*



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

DISSERTATIO

DE

FERRI USU ET ABUSU

IN MEDICINA.

CUJUS VERITATEM, DEO DUCE
& Anspice Dei-parâ, in Augustissimo Monspelienſi
Apollinis Fano propugnabit ab horâ octavâ ad meri-
diem, die mentis Junii anni 1736. PETRUS
P O N S Ægidienſis Diœceſis Nemaufenſis, Artium
Liberalium Magiſter, jam dudum Medicinæ Alumnus,
& Univerſitatis Conſiliarius.

PRÆSIDE

ILLUSTRISSIMO VIRO D. D. ANTONIO MAGNOL
Regis Conſiliario & Medico, nec non in almâ Monſ-
pelienſium Medicorum Academiâ Profefſore Regio
digniſſimo, ac in Senefcalli, & Præſidiali Curiâ Comite
Honorario.

Pro primâ Apollinari Laureâ conſequendâ.



MONSPELII,

Apud FRANCISCUM ROCHARD, Regis ac Univerſi-
tatis Typographum unicum.

M. DCC. XXXVI.



R. R. D. D.
PROFESSORES REGII.

Illustriſſimus D. D. Franciſcus Chicoyneau , *Cancellarius & Judex* , Regi à Secretioribus Conſiliis Archiatrorum Comes.

DISPUTATURI.

- R. D. Franciſcus Chicoyneau , *Cancellarius & Judex* .
Patris Coadjutor.
R. D. Joannes Bezac , *Decanus.*
R. D. Petrus Rideux.
R. D. Henricus Haguenot.
R. D. Jacobus Lazermes , R. D. Bezac , *Coadjutor.*
R. D. Gerardus Fitzgerald.
R. D. Euſtachius Marcot , *Regis Medicus perpetuò Ordinarius.*
R. D. Antonius Fizes.
R. D. Franciſcus Sauvages de la Croix , R. D. Marcot
Coadjutor.

DOCTORES ORDINARII.

- M. Nicolaus Fournier.
M. Petrus Guifard.
M. Claudius Chaptal.
M. Carolus Serane.
M. Petrus Magnol.
M. Antonius Laufel.
M. Jacobus Cros.

MILLUSTRISSIMO

VIRO

D. D. EUSTACHIO

MARCO T.

REGIS CONSILIARIO

ET MEDICO PERPETUO ORDINARIO.

UNIVERSITATIS MONSPELIENSIS

PROFESSORI REGIO

MERITISSIMO

PRACTICO EXPERTISSIMO

FELICISSIMO.

REGIÆ SCIENTIARUM

ACADEMIÆ SOCIO.

PATRONO SUO

ET

COGNATO.

REGIS CONSILIARIO

ET ACADEMIÆ SOCIARIO

Laborum primitias

UNIVERSITATIS MONASTRIENSIS

D. D. D.

PROFESSORI REGIO

MERITISSIMO

PRAGMATICO EXPERIMENTISSIMO

FELICISSIMO.

PETRUS PONS

Ægidienfis,



DISSERTATIO

DE FERRI USU ET ABUSU

IN MEDICINĀ.



ACTURUS de Ferri, ac eorum, quæ
 ex illo parari solent, remediorum usu
 & abusu; quænam sit huiusce metalli,
 atque ex eo præparatorum natura, &
 indoles, prius inquirere, operæ præstium
 duxi; hinc enim verus eorum agendi modus clariùs
 innotescet, quibus-ve proficere, aut nocere poterint,
 faciliùs iudicabitur, quippe quæ præter bonos, quos
 in corpore usus præstant, illa plura quoque mala
 perpetrare, ii per sepe experiuntur, qui hisce medi-
 caminibus inconsultò uti solent: verum ut quæ de
 illis dicturi sumus, clariùs pateant, quædam de me-
 tallis in genere præmittere iuvat; itaque hanc Dissertationem
 quinque Paragraphis comprehendemus, quorum primus erit de metallis in genere. Secundus
 de Ferri naturâ & medicamentorum, quæ ex illo pa-
 rantur. Tertius de eorum virtutibus & agendi modo,
 Quartus de illorum usu legitimo. Quintus de eorum-
 dem abusu.

PARAGRAPHUS I.

De Metallis in genere.

I.

Metalla numero sex, corpora ponderosissima sunt, compacta, igne fluentia, ductilia, atque maleabilia: quorum duo, aurum nempe & argentum perfecta; ferrum verò cuprum stannum, & plumbum imperfecta dicuntur.

II.

Metalla ex terrâ *vitrescibili*, atque substantiâ inflammabili omnia componuntur; quippe destructis metallis, nihil præter terram remanet in vitrum faciliè convertendam, cui substantiâ inflammabili de novo additâ, metallum reviviscit, seu quæ metalli proprietates deperdiderat, terra, easdem exinde iterum recipit. (a) Quæque de metallis imperfectis, ut pote tractabilioribus imprimis intelligenda sunt.

III.

Substantia inflammabilis, quam illust. *Stalhb Phlogiston* vocat, eadem in omnibus metallis est, ex eodem enim plantarum oleo, aut eadem animalium pinguedine, nam sulphur minerale minus aptum est, cum terrâ convenienti metalla omnia generantur, destructaque reviviscunt. Substantia hæc metallis pro-

(a) Memoires de l'Academie Royale des Sciences an. 1702. 1709. & *alibi*.

ducendis , destructisque regenerandis ex eo præcisè non infervit , quia inflammabilis est ; tantum enim abest , ut radii luminis , qui omnium corporum caloris , ac inflammabilitatis principium & causa sunt , metallorum partes essentielles fuerint ; quin contra iis speculi ustorii ope collectis destruuntur , atque terra , quæ remanet , in vitrum abit.

I V.

Cùm substantia inflammabilis ex terrâ peculiari pingui & particulis igneis , à quibus ejus inflammabilitas dependet , essentialiter composita sit , parte igneâ ad metalla efformanda atque regeneranda nullatenus aptâ , metalla ex terrâ pingui , quam *Becherus* in *Physicâ* subterraneâ secundam terram vocat , pondus , malleabilitatem , ductilitatem , tandem formam habere consequens est.

V.

Terra , alterum metallorum principium , *vitriſcibilis* est , pro variis metallis diversa : ex quâ aurum componitur in vitrum abit auro levius. Argentum mediante antimonio , uti aurum in vitrum mutatur. Ferrum parte oleosâ exutum massa *regulina* est frangibilis , ac friabilis antimonio , colore haud absimilis. Terra cupri rubra est , friabilis , quæ pulverata à cinnabari antimonii parùm differre videtur. In flammis terra cristallina est , difficilè fusibilis , quæ in crystallos acicularum instar acutas & aculeis asperas mutatur. Plumbo destructo , substantia *foliata* aut *talcosa* , talci ad instar remanet mollis tactui lævis , pellucida , variisque coloribus distincta , quæque in vitrum abit per laminas , sicuti venetarum talcum dispositum

læve colore flavo-viridi , & variis in punctis subru-
bro. (a)

V I.

Quoniam substantia inflammabilis in omnibus metallis ejusdem indolis fuerit ; metalla nisi per terram inter se essentialiter differre , consequens est ; quibus ab invicem distinguendis , substantiæ inflammabilis cum diversâ terrâ , mixtio non parum infervit ; quippe cum pro variâ metallorum terrâ , substantia inflammabilis variè permiscenda atque connec-tenda sit , diversâ composita ex eorum mixtione efformanda fore , nemo non videt.

V I I.

Verùm cum Clariss. *Stalhb* omnium Chymicorum facilè principe „ dissimulare nullo modo debemus „ quod specificatio aliqua planè peculiaris adhuc „ subsit , quæ ita accuratè , & luculeuter exprimi non „ potest , quæ nempe generalem illam *vitrisibilem* „ substantiam ita determinat , ut accedente *Phlogisto* „ hæc maximè species metalli , non verò altera enas- „ catur , cui rei , ut satisfaciamus , agnoscamus sanè , „ & confitemur liberè , quod altior quædam diver- „ sitas , & intimior aliqua *mixteria* differentia inter „ terras hæc intercedat , quæ in terrâ quidem *mar-* „ *tiali* (mediante *Phlogisto* in ferrum perficiendâ) co- „ lorem ruffum , effectum stypticum , fusionem vi- „ tream bruno - nigram producat in terrâ *venereâ* „ (quæ cum *Phlogisto* in cuprum concrefcit) colorem „ è flavo-brunum effectum plus minus septicum , fu- „ sionem hyacinthino-viridescentem. In terra *Satur-* „ *nia* colorem pallido-flavescentem , saporem cum

(a) Memoire de l'Acad. *ibid.*

salibus dulcescentem, fusionem flavo-gramineam, aut à diaphano-rubellam inferat. Unde concludit ille in rebus medicis, quàm chymicis, non minùs versatus, omnes quicumque de ipso loqui instituunt, vix aliter, quam per somnium & tamquam phantasma quoddam sensus eludens agnoscere. Ita *Clar. Stalh in obs. Chymico-physico-medico. cur. mens. Septembr. cap. 6.*

V I I I.

Plura cum metallis saltem imperfectis, corpora extranea permixta sunt; ex illis quædam cum eorundem terrâ ita naturaliter connectuntur ut ad peculiarem horum naturam multum conferre videantur, illa enim pro variis terris diversa sunt. Vide *Clariff. Stalh ibid. cap. 5.* Utrum corpora illa ad metallorum saltem imperfectorum genesis inserviant, hâc inquirere locus non est: quidquid sit, ab iis metalla illa præcipuas suas vires habere eò verisimiliùs videtur quòd iis libera, aurum nempe & argentum, ad medicinam fortassè minimè apta sunt, ea verò quæ illis magis abundant, quale est imprimis ferrum ad varios è corpore morbos depellendos plurimùm valeant.

I X.

Dixi metalla perfecta ad medicinam fortassè inepta fore, aurum enim non fulminat, nisi quia aquâ regali in partes tenuissimas erosum est, argenti crysalli, & ipse lapis infernalis à nitro hujusce metalli partibus integrantibus adhærescenti suas vires deducunt; unde patet, quæ de auri & argenti tincturis jactitant *Alkymista*, non ab ipsis metallis sed ab adjunctis corporibus pendere, ac proinde non valde mirum futurum esse, sopitas partium solidarum oscillationes illis excusitari, atque humorum lentè progredientium mo-

tum intendi ; tincturæ illæ menstruis salinis vel corrosivis, aut aliis substantiis acribus , vel volatilibus plus vel minus turgent.

X.

Hæc est vera metallorum compositio , de illâ tamen illustr. *Boerhaave* aliter sentire videtur. *Recentiores* , inquit ille, (a) *suis innixi experimentis, ubique & in analysi & compositione metallorum loquuntur de terrâ, eâque quidem vitrificibili, quæ stabilem daret metallis basim : Verumtamen puto non respondere terram, quam ita de metallis educi statuunt, verâ, nec nomen terræ sensu acurato mereri, enim verò elaboravi ipse (Boerhaave) quam plurimum hac in re, neque talem ibi terram detexi habentis . . . ubinam quæso, pergit ille, terram in iis deprehendi ? an in calcibus horum ? sane omnes hæc verâ metalla manent, licet verò insipida calx, tenuis, inodora, aliquando & tritui parens sit ; tamen igne, appositu pulverum, quos reducentes vocant, aliisvè artificii pristinam formam recipiunt : Qui ergò calces pro elementalibus accepisset, terrâ, ille eodem jure levibus hisce artibus terram posset in metalla, quoties vellet, convertere ; quin etiam metalla, ita calcinata per ignis efficaciam, aut per corporum quorundam admixtorum virtutem in genuinum vitrum mutantur, quod de simplici, sincerâque terrâ dici vix posse, quisque peritus facile scit.*

X I.

Ideò ergo clari *Boerhaave* metalla ex terra non componi existimat , quia , ait ille , metallorum calces vera metalla manent ; Itaque si Metallorum calces, naturam nullatenus retinere probatum fuerit , eas non metalla , sed veram terram fore , ex quâ metalla componuntur , evidens erit : atqui in quas (a) *Element. Chim. T. I. de terra.*

metalla ope speculi ustorii reducuntur, calces, nullas, quæ componebant, metallorum virtutes retinent. Metallorum, quibus ab omnibus aliis corporibus distinguuntur, pondus malleabilitas, ac ductilitas sunt at verò calces illæ, neque quæ componebant, metallorum pondus habent, neque malleabiles, neque ductiles sunt, ac proinde metalla non manent.

XII.

Præterea num ex qua cum lini oleo fit ferrum, argila terra est? non quidem in igne fixa, sed fluxilis; nam pace tanti viri, quam de terra definitionem tradit, minus legitima videtur; præter illam, quæ in igne fixa est, quæ ideo *calcaria* vocatur; datur & altera, quæ in igne fluit, atque *vitricibilis* dicitur, quia in vitrum abit, & ex quâ metalla componuntur.

XIII.

Nec dicat clarif. *Boerhaave* metallorum calces terram non fore, quia igne, appositu pulverum reducentium, aliisque artificiis pristinam formam recipiunt, nam mecum clar. *Boerhaave* supponat velim ex terrâ & aliâ substantiâ metalla omnia componi atque ex illis unâ dissipatâ, nihil præter terram remanere, an diceret quod ex destructo metallo remanet, terram non esse, quia ei de novo additâ alterâ quam deperdiderat, substantiâ, in metallum primum reducitur? non certè. Ergò etiam si metallorum calces plantarum oleo aut animalium pinguedine, pulveribus reducentibus aliisque artificiis primam recipiant formam, inde terram non fore malè concluderetur.

XIV.

Sed quid in illis stabiliendis diutiùs immoramur?

num *Helmontius* ferrum construxit ? num illud *Becherus* ex limo & oleo lini effinxit ? num clarif. *Stalb* in præparando spiritu vitrioli idem contigit ? num *Joan. Auguft. Hermann* fimilia expertus eft, cum spiritum falis ex alumine & fale *Ludovici* methodo pararet ? num hac tandem pluries facta leguntur in actis Regiæ Scientiarum Academiæ Parifienfis ; fed hæc de metallis in genere fufficiant.

P A R A G R A P H U S I I.

*De Natura Ferri & Medicaminum
quæ ex illo parantur.*

I

Ferrum rariusque multò chalybs è terræ visceribus extrahuntur. Quæ è ferri fodinis eruuntur, nisi repetitis calcinationibus ac fusionibus, corporibus extraneis sejunctis atque substantiâ inflammabili additâ in ferrum non abeunt, hinc terra propria unâ cum substantiâ illâ oleosâ vel pingui simul unitâ, ferrum plus vel minus purum efformat.

Ex iis patet quæ cum è ferri fodinâ extractis magnete ad fodinarum bonitatem, imò & earum naturam detegendam, tentantur experimenta, parum tuta ac per hæc inutilia esse.

I I.

Terra ex qua ferrum componitur styptica est, cum ea distillata sal acidum fundat, ipsa quoque ferri Scobis si per aliquot tempus in aqua ebullierit ; deinceps filtretur,

filtratur, lentoque igne factâ evaporatione, cryſtalli habentur vitriolicæ. Tandem per quoddam tempus aquæ immerſum ei ſaporem vitriolicum conciliat. Ferrum ergò præter terram & ſubſtantiam inflammabilem, ſalia acida vitriolica continet ex ſubſtantia inflammabili fortasſe, ſed ex terra quo ad majorem partem prodeuntia. Terra hæc non modo in omni lutoſo & argilaceo fundo diſfuſa eſt, ſed etiam plerarumque frugiferarum glebarum maximam partem conſtituit. Unde rationem habes, quare in omnibus ferè regionibus ferrum facile paratur; quare in animalium ac plantarum cineribus quam pluries reperitur; exuſtis enim hiſce corporibus, eorum ſubſtantia pinguis vel oleoſa, ſi quæ in illis cineribus fuerit, terræ propriæ unitur quæque in moleculas ferreas abit, ſi non viſu, magnetæ certè detegendas.

I I I.

Ferri pars inflammabilis ab aliorum metallorum ſubſtantia oleoſa vel pingui ad ſummum quantitate differt; quare verò in ferro quàm in aliis metallis copioſior fuerit; fortasſe, quia in ferri fodinis hæc ſubſtantia magis abundat, ac in huiusce metalli compoſitionem majori quantitate inſumitur, atque terræ illi faciliùs adhæreſcit: quidquid ſit; ex iis facile intelliges, quare ferri ſcobs ad candelæ flammam accenditur; cur ferrum, quò ſubſtantia illa magis abundat, eò faciliùs & fortiùs incaleſcit. Hinc etiam calybs cum æquali ſulphuris quantitate, aquâ additâ, ut inde mixtura leviter humeſcat, ferro faciliùs & multò magis incaleſcit, & paulò poſt æſtuat, unde terræ motûs cauſæ & theoria deducuntur.

I V.

Ex quibus ferrum componitur ſubſtantia ita inter

se cohærent; ut in partes integrantes hoc metallum non solum dividi possit, sed etiam ejus substantiis componentibus ab invicem facillè sejunctis, totum destruat.

V.

Ferrum ergo metallum est omnium imperfectissimum, quod ex terrâ propriâ, acidis vitriolicis plus vel minus refertâ cum magnâ substantiæ inflammabilis quantitate componitur.

V I.

Chalybs ferrum perfectius est, à quo non essentialiter, sed accidentaliter differt. 1^o. " Color, qui in ferro
 „ pallidior, in chalybe verò saturatior & ad nigrum
 „ vergens est. 2^o. Ferrum laxius, flaccidum, facillè flexile & veluti molle est, chalybs autem densior, durior, renitens, & resiliens ab inflexione. Insuper
 „ ferrum valdè citò fragile, & paucis flexuris reciprocis ruptile est, chalybs tenacior & tractabilior.
 „ 3^o. Denique ferrum diffractum crassiusculis veluti granis aut *foliaceâ* texturâ in crassitie sui cohærescere videatur; chalybs verò tenuiter admodum, & teneris ejusmodi *foliolis* coagmentatus appareat. Ita clarif. *Stalb* in obser. ch. phys. med. cur. mens. Jan. cap. 2. Sed hæc sufficiant de ferri ipsiusque chalybis naturâ, jam de iis quæ ex ferro parantur medicaminibus.

V I I.

Nec ferri crocos, nec ejus squamas, quas ferri *batituras* vocant, nec *stomama* seu scorias vitreas neque ulla ex ferro residua aqua fortis, etiam concentratissima attingit quidem amplius, ut docente clarif. *Stalb* (a) experti sumus. Ita etiam nec eosdem cro-

(a) Ibid. cap. 1.

cos, nec martis flores, nec ejus sal, nec alia ex illo præparata magnes ullatenus attrahit, quæque experimenta magnete, egimus, quem Princeps Senatûs Mospeliensis Illustrissimus BON pro sua Humanitate commodabat, quibus rerum Physicarum vir ille semper amantissimus interfuisse non dedignatus est. Cùm autem aqua fortis *martialia*, parùm aut nullatenus attingat, atque magnes ea non attrahat, inde ferri, *batituras*, *stomama*, crocos, & alia ex illo parata ferrum non esse, consequens est, ac proinde fusionibus, dissolutionibus & humefactione simplici, hocce metallum destructum fuisse.

VIII.

Quid ergo est, quæret aliquis, quod ex ferro remanet? an terra, an substantia inflammabilis? quænam est ejus natura & indoles? terram superesse extra dubium est, quippe si substantia inflammabilis ipsi detur iterùm, quod tibi facilè succedet, si crocum, aut scorias, aut squamas cùm carbonibus contusis per aliquod tempus igni torrueris, quod enim ex illis exurgit novum compositum, magnes attrahit seu destructum illud metallum regeneratur.

Verùm terra hæc acidis vitriolicis spoliata non est: Perinde, inquit clarif. Bohnius (a) ac ex croco cum corrosivo extrinseco facto per aquæ affusionem, digestionem, ac crystallisationem aliquid vitrioli evocatur: ita ex illo qui cum aqua insipida paratur, idem expectandum, modo hujus quantitas notabilis, aquæ infundatur. Sic enim infusum hoc filtratum non tantum vitriolicum planè saporem linguæ imprimet; sed ad pelliculam evaporatum crystallas vitriolicas exhibebit, exilioris quidem quantitatis, evanescentibus

(a) Dissert. Med. de medicament. Chym. & Galen. præpollent. dubiâ.

forſan & expulſis ſub evaporatione ſibi intertextis volatilibus vitrioli hujus moleculas, quæque nos ipſe pluries experti ſumus, quod poſterius vel hoc innuit, dum limatura martis v. g. in crypta ſubterranea humectata, ſi poſt aliquot ſeptimanas ex retortâ diſtilletur tantum liquoris aquei vitriolum redolentis & cum decocto gallarum nigricantis fundat.

Ex dictis colliges ferri *crocos* terram fore acidis vitriolicis plus vel minùs reſertam. Jam ſi quæras, quo mechanismo illa vitrioli ſpecies effermetur? Sal acidum, quod juxtâ eundem *Bobnium* ſal conſtitutivum ſeu integrale martis eſt, per aquam ſolutum, vel ab igne in fluorem redactum, in ferrum agens ejus terream & inflammabilem ſubſtantias ſejungit, quodque, deſtructo metallo, ſui juris magis factum unâ cum terrâ *crocum* & vitriolum conſtituit.

Quid ergo de ſubſtantiâ inflammabili actum eſt? partim avolvit, unde *crocus* martis aperiens, quàm ferri ſcobs minorem flammam concipit, *crocus* verò astringens & ipſo ferro & *croco* aperiendi multò minùs accenditur. Tandem quod ex ſubſtantiâ illa inflammabili reſtitat, à parte terrea ita ſejunctum fuit, ut unum, idemque corpus, ſeu ferrum non efformet amplius.

PARAGRAPHUS III.

De ferri & ex eo preparatorum virtutibus, ac agendi modo.

I.

Ferrum æque ac ex illo parata medicamina, vaſa obſtructa reſerant, aperta claudunt, ſuppreſſas

evacuaciones restitunt , nimias sistunt , laxatas partes firmant , roborantque ; tandem , ubique partium , eorum operâ , restituto humorum circuitu , corpus morbis pertinacibus liberatur , atque sanitate potitur. Unde tot tantæque proprietates ? quo mechanismo effectus æque diversos hæc medicamenta præstant ? an quia partibus astringentibus , ac resolventibus simul componuntur , quibus , prout indicatum fuerit , solida astringuntur , atque humores resolvuntur ? Verùm quo genio ubi humoribus effluxuris vaforum exitus impediendus , aut partes laxatæ firmandæ sunt , partibus resolventibus penitè otiosis , astringentes duntaxat suas vires exerunt : quave ratione resolvendo tantummodo agunt , quoties humores incidendi , aut vasa referanda futura sunt ? num hæc ut pote planè opposita facillè destruerentur ; seu ab incidentibus divisâ , astringentibus plus vel minus concreverent , vel jam concreta ab incidentibus dissolverentur.

I I.

Alii dicent ferrum , atque *martialia* , si pauca excipias , ex naturâ suâ incidentia sunt ; ideo autem astringunt , quia humores , aut salia quibus partium solidarum , aut fluidarum cohæsiō plus vel minus soluta est , suis partibus terreis absorbent ; unde non nisi pro datâ occasione astringentia sunt.

I I I.

Ferrum & ex illo parata medicamenta partes terreas continere , humoribus ferrosioribus , ipsisque salibus acidis absorbendis aptissimas , jam probatum fuit : at illas insufficientes fore , vel leviter attendenti patebit ; ideo humores solvuntur , seu ex quibus componuntur globuli levius inter se cohærent ,

vel quia debilitatâ vaforum vi *systolicâ* minus pre-
muntur, vel quia ab interpositis aliis partibus fluidio-
ribus ab invicem sejunguntur, sejunctique manent :
ergo ut primam consistentiam recuperent ; si à vasis
debilitatis resolutio dependeat ; vasa hæc prius fir-
manda, roborandaque sunt, quod profectò *martia-*
libus absorbendo non obtinebitur. Ita etiam si ab exu-
berantibus partibus ferosioribus humores resoluti
fuerint, non minus imparia erunt : Et quidem quæ-
nam, amabo, ferri, aut medicamentorum martia-
lium dragmas aliquot, uncias si velis, inter & tantam
humorum ferosiorum quantitatem proportio ? parva
certè, ne dicam, ulla est.

I V.

Quo ergò mechanismo ferrum totâ substantiâ ex-
hibitum, aut ex illo varia parata medicamenta in-
teriùs assumpta vasa obstructa aperiunt, aperta clau-
dunt, laxatas partes firmant, aliosque oppositos in-
ter se producent effectus ? varia ex ferro parata me-
dicamenta ferrum non sunt, substantia inflammabi-
lis à terrâ sejuncta aut in auras avolavit, aut adhuc
cum terrâ, prout metallum illud variè tractatum
fuit, majori vel minori quantitate admixta manet,
quin tamen unum idemque corpus efforment, uti
probavimus ff. præcedenti, ferrum quoque ipsum
ubi interiùs assumptum est, totum destruitur, uti
infra dicturi sumus : ergo non ferri partes metallicæ
hos varios effectus præstant, sed quæ ex illo pars
terrea vitriolica superstes est, quibus etiam inflamma-
bilis, si quæ superfuerit, aliquatenùs concurrat.

V

Et quidem ferri pars terrea ore assumpta & inges-

ta ut pote vitriolica ventriculi atque intestinorum fibras pungit, irritat, stimulat, atque eis sic aliquoties adhærescit, ut in cadaveribus *martis croci* assumpti, infixi reperti fuerint (a) quæque ut sese ab iis quibus molestantur, corporibus, liberent, illæmet fibræ coarctatæ tenduntur, tensæque magis varios, validioresque motus agunt: Insuper martialium partes vitriolicæ hisce fibris infixæ veluti alia fulmenta eorundem motus sustentant, firmant, adaugentque, unde debilitata solida primam tensionem recuperant, atque validioribus, quas edunt, contractionibus, quibus eorum textus laxabatur, humores exprimuntur, & ab aliis, quibus iterum debilitari possent, tutæ sunt. Quæ de ventriculi & intestinorum fibris diximus, de vasis ad quæ *martialia* pertingunt, intelligenda sunt.

VI.

Ipsos etiam humores *martialia* afficiunt, ipsis permixta primæ consistentiæ eis conciliandæ inserviunt. Jam si quæras, quo mechanismo, illæ *martialium* partes humores fluidiores densant? fortasse, quia horumce humorum globulos suo pondere gravant, unde ad invicem aproximati plus vel minus uniuntur, unitique manent: fortasse, quia eis humoribus interpositæ partes illæ vitriolicæ, per suas peculiare superficies & figuras, eos ligant, efficiuntque, ut eorum globuli strictius inter se cohærentes corpus firmius efforment. Quidquid sit, id enim scire, parum ad medicinæ praxim confert. Verum inde firmatis nimium laxis corporis partibus solidis, inminutâ vasorum diametro, atque humoribus multò minus fluidis, earundem partium robor adaugetur, humoribus naturalis densitas iursum datur, sistuntur ex-

(a) Panarolus Pentecost. 5. Obs. 32.

cretiones nimiae, atque juxta naturalis corporis oeconomiae leges absolvuntur.

VII.

Martialia ut pote quae partibus vitriolicis plus vel minus referta partes laxatas firmare, humores solutos densare, nimias excretiones imminuere facile certè intelligitur; verùm contrarios persèpè effectus præstant, humoribus quoque crassioribus primam fluiditatem conciliant, ac præpeditas excretiones revocant, an ne hæc ab eadem causâ, scilicet terrâ *martiali* produci potuerint?

VIII.

Ita equidem, sed ut hæc faciliùs intelligantur imprimis notetis, velim, humores fluiditatem deperdere. 1o. Si eorum partes fluidiores & aquosiores dissipatae fuerint. 2o. Si ob validiorem vasorum contractionem compactæ densentur. 3o. Si vasorum textu laxato, debilitatisque eorum viribus, humores in iis torpescant; inde veluti sibi relictis eorum globuli subsidendo in corpus plus vel minus durum concreverunt. Ferrum & ex illo præparata, nisi in tertio casu convenire probabimus ff. sequenti, seu ubi à vasorum laxitate humorum crassities dependet: & quidem hinc medicamentis, debiles firmatae partes ad motum expeditiores fiunt, earumque contractionibus, qui in eis torpescabant, humores valide premuntur, propellunturque, atque eorum globulis minùs inter se cohererentibus, ad fluendum aptiores sunt, recuperatâque primâ fluiditate ad vasa usque secretoria appellant, in illis eò faciliùs secernendi, quòd iidem humores à subsequenter validè propulsi, atque vasa secretoria, firmiora facta, his humoribus recipiendis, excernendisque aptiora sint; & ut paucis dicam, ideò medicamenta *martialia* fluidiores humores densant

denfant, eos in vasis retinent atque secretiones nimias sistunt, quia vasa laxata firmant, & aperta constringunt; crassiores verò, si fuerint, dissolvunt, vasa referant, ac præpeditas secretiones restitunt, quia eorundem vasorum motum intendunt, aut ea ità disponunt, ut magis tensa validiores motus agere queant.

IX.

Quid ad salia vitriolica confugimus? num feri scobs etiam tenuissima metalli naturam retinet, quâ variis illis effectibus producendis aptissima est? & quidem ferri partes tenuissimæ in ventriculi & intestinorum fibras impingentes eas irritando tendunt, laxatasque firmant, ac astringunt; tandem humoribus permixtæ eos suâ mole & pondere solvunt, ac vasa in quibus torpescebant, succutiendo, si quæ sint, obstructions tollunt, atque eorundem vasorum motus excitant & adaugent.

X.

Varia ex ferro parata medicamina hujus metalli naturam non retinere, seu ferrum non esse, jam probatum fuit *ff* præced. quæ ergo obijciuntur, de ferro puro & totâ, uti loquuntur, substantiâ, interiùs assumpto dumtaxat accipienda sunt: Verùm præterquam quod ferri scobs salia vitriolica continet, astringendo aptissima; ex quibus hoc metallum componitur, partes ita facillè ab invicem sejungi possunt, ut vel levi datâ causâ destruat: itaque eodem planè modo, quo ferrum aere humido, aut affulâ aquâ in crocos mutatur ab illo totùm diversos; sic etiam in ore, ventriculi imprimis & intestinorum cavo tum ab assumptis liquidis, tum qui ex illarumce partium facie internâ indefinenter stillant, serosis humoribus maximè

alteratur ac penitus destruitur, & eò facilius, quòd aquei illi humores utpotè qui rarefacti textui ferri subeundo aptiores sint; res ita se habere, seu ferrum in ipsis primisviis destrui, eò verisimilius videtur, quòd eodè, ac *croci*, ferri scobs effectus præstet; præterea ad quantamcumque tenuitatem ferrum limâ reducatur insensibilibus vasorum lacteorum ostiolis subeundis impar fore, nemo haud scit, esto, ex ferro partes integrantes non nullæ in primis viis non destruantur; nonnè illæ utpote summùm graves ad anum usque decident, unà cum fœcibus excernendæ? aut si ad vasa sanguinea ac lymphatica perveniant, num ibi in sero calido veluti innatantes penitus dissolutæ totam naturam faciliè deperdiderint? denique ex ferri usu maximè si per aliquod tempus exhibeatur, alvus quam sæpe supprimitur, an ex solis & repetitis à ferri particulis, intestinis illatis commotionibus, hanc astrictionem repetes? eas illi inducendæ insufficientes futuras esse, vel leviter attendenti patebit.

X I.

Varios, quos in corpore *martialia* medicamenta præstant usus, ex eorum terra vitriolica pendere jam probatum fuit: verumtamen ferri pars inflammabilis, ipsaque terra absorbendo suum symbolum conferunt. 1o. Substantia inflammabilis, ut pote quæ particulis igneis plus vel minus referta, humorum quibus cum permiscetur calorem & motum adauget, unde vasa magis distenta validiores contractiones edunt, quibus humores fluidiores densantur, & concreti solvuntur; verùm quia minimam, saltem quædam, ex *marie* parata; medicamenta hujusce substantiæ inflammabilis quantitatem continent; idè ad varios, quos *martialia* producunt effectus, parum conferre existimamus: Ita quoque & terra ferrosiores humores absorbet, sed

tam minimâ quantitate, ut exinde qui ab exuberantibus partibus ferosis fluidiores sunt, primam confidentiam ex toto recuperare, impossibile videatur. Insuper, num hæc *martialium* absorbendi vis inutilis est, forte noxia ubi humores crassi & jam indurati sunt? nec dicant salia acida, quibus humores coagulatos supponunt, terrâ *martiali* absorberi; eam quidem salibus in sinu suo recipiendis, prout plus vel minus porosa est, aptissimam censemus; sed quæ de acidis humores nostros coagulantibus passim dicebantur, ut pote quæ incerta, aut falsa obsoluere.

Ferrum, uti ex eo parata non internas partes tantum ore assumpta astringunt, roborantque; externas quoque extrinsecus admota firmant, atque tum feri, tum sanguinis excretiones sistunt, tandem deficcativa, styptica & vulneraria tutissima sunt, tot tantisque experimentis comprobata, ut ulteriori probatione non indigeant.

X I I.

Omnibus ex ferro paratis medicamentis eadem astringendi vis non inest, plura etiam ex illis pro variis permixtis corporibus, multò plures alias qualitates habent, necessariò inter se distinguendas, ut eorum debite selectus fiat. 10. *Crocus martis*, quem aperientem vocant, illo minùs astringit, qui igne paratus fuit, cujus astrictio eò major erit, quò ferrum igne magis tostum fuerit, unde vitrioli martis calx alba, cinereâ magis astringit, rubra verò ferè caustica est, quò vero violentiore, magisque diuturno agitur igne, eò hæc posteriora in eo plus augentur, ut tandem causticus ferè evadat pulvis, (a) 20. Sal, vel vi-

(a) Clar. Boerhaave Operat. Chemic. part. 3. Proceff. CLXIV.

trium martis, *croci* magis astringens est. Acidis enim vitriolicis magis turget. 3o. Ferrum spiritibus acidis vel in aceto, aut alio liquore acido solutum, nam omnibus acidis facillè solvitur, ob admixta illa acida valdè astringet. 4o. Quod in vino solutum fuit, præter vim ejus stypticam ejusdem vini partibus sulphureis & volatilibus humorum rarefcentiam inducit. 5o. Crystalli tartari *chalybeati* vel *martiales*, vel tartarum *martiale*, præter astringendi vim, alvum quoque solvunt, aliasque promovent excretiones pro evacuantium naturâ, quæ cum illis, aut aliis ex ferro paratis mixta exhibentur. 6o. *Mars Diaphoreticus* vel flores salis ammoniaci *martiales* non humorum motum tantummodò adaugent, unde sudor persæpè subsequitur; verum etiam mediantibus salis ammoniaci partibus volatilibus quas continent, partes *martiales*, ad ultimos vasorum mæandros faciliùs adeuntes illa laxata vasa tendunt, eorumque oscillationes exsuscitant, augentque. Plura alia ex ferro parantur, quæ cum in usu minùs sint, aut ab aliis parùm diversâ; ideò iis superfedemus.

PARAGRAPHUS IV.

De Ferri & Medicamentorum martialium usu legitimo.

I.

Morbo non medeberis, nisi ejus causas priùs removeas; aut sic immutes, ut corpus naturâ vel arte se se ab illis liberet: causæ illæ, etsi eosdem similesque effectus persæpè inferant, ejusdem, quan-

doque naturæ non sunt ; variis proinde medicamentis alterandæ , imò & eliminandæ. Itaque ad cuiusdam affectûs curam se accingens , à quâ causâ antecedenti morbus oriatur , imprimis attendat , velim. Quoad verò externas causas , eas citò longèque removendas fore , nemo non scit. : causarum autem proximarum cognitio Medicorum ratiociniis , quàm ægrorum solamini multò magis infervit ; hæ enim sub sensus non cadunt , & ut plurimum incognitæ sunt.

I I.

Medicamenta *martialia* humoribus fluidioribus consistentiam , crassioribus fluiditatem dare , vasa obstructa referare , aperta claudere , partes debiles firmare experientia quotidiana docet : verùm quia naturalis humorum fluiditas , à variis causis prætermodum adaugeri , vel imminui potest , atque variis per sæpè qualitatibus infecti iidem humores vasa obturant , aut per ea copiosius effunduntur ; sicuti vasorum elater à variis causis planè oppositis quandoque debilitatur ; itaque ut ex *martialibus* medicamentis ægotantes omnia optata emolumenta percipiant , de iis sigillatim , sed breviter differendum duxi , ut cuinam ex illis oppugnandæ medicamina hæc magis idonea sint , rectius intelligatur , ea enim nec obstructis vasis referandis , nec evacuationibus sistendis , nec partibus firmandis , æquè conveniunt.

I I I.

Primò. Humorum naturalis fluiditas à debitâ vasorum , in quibus continentur , pressione , primùm dependet , hinc ex quibus componuntur globuli debite , sed non strictius inter se uniti , datâ causâ , vel sibi ipsis relictis ab invicem plùs vel minùs facile

fecedunt ; in eo enim fluiditatis natura sita est. Præterea cum ex humorum partibus aliæ aliis facilius coherentes, in corpus plûs, vel minûs densum abirent, nisi interpositis aliis fluidioribus earum contactus præpediretur ; ita quoque pars serosa necessaria est, undè suam habeant serventque fluiditatem. Ergo humores naturalem fluiditatem deperdunt, seu densiores fiunt, si adaucta vasorum vi *systolica* uti in morbis inflammatoriis videre est, nimium premantur ; vel prætermodum fluidiores, si eorundem vasorum elater debilitatus fuerit ; sicut in chlorosi, & in febre malignâ quandoque observatur. Denique eorum fluiditas præter naturam adaugetur, si partes serosæ exuberent, vel iis deficientibus, densantur, inspissanturque.

I V.

Quæres nûm humores à causâ externâ interiùs assumptâ vel intrâ corpus genitâ fluidiores fieri possint ; sic sentiunt omnes ferè *Pathologi* & imprimis Chimici : salia falsa, aiunt illi, ut pote quæ ad fermentescendum inepta suis partibus solidis, scabrisque superficiebus quibuscum permiscentur, humores scindunt, carpunt, divellunt atque fluidiores efficiunt ; idem dicunt de venenis. Salia falsa humoribus solvendis apta futura esse non ambigimus, verùm quia hisce salibus humores rarò turgent, præterea ni in ipsis vasis efformentur, quod maximè incertum est, sub eâdem quâ assumpta fuere, formâ usque ad vasa sanguinea difficilè perveniunt. Insuper nûm illa salia humoribus permixta, in quibus includuntur, vasa pungunt, ac irritando tendunt, eorumque oscillationes adaugent, quibus proindè humores magis atque magis densantur.

Quoad verò venena cum omnia acria atque corrosiva fuerint, ut ex rigore, convulsionibus, motibus

convulsivis & id genus aliis symptomatibus inferre licet, humoribus solvendis minus idonea sunt.

V.

Humores à quâcumque causâ fluidiores facti è suis vasis saltem quæ iis insunt tenuiora, fluidioraque facillè effluunt; unde alvi fluxus colliquativus, urinæ vel sudoris copiosior excretio; hinc etiam sanguinis per nares, alvum, urethram, vulvam &c. effusio: verùm cave, ne in iis decipiaris; nam humoribus præter naturam non fluidis, imò & densioribus; illæmet evacuationes persæpè accidunt. Præpedito in aliquâ corporis parte, vel in viciniis humorum circuitu, qui appellunt, ad vasa liberiora eò majori quantitate, & impetu feruntur, quòd in aliis iter magis præclusum est; unde si quæ sint adhuc patula excretoria, facillè effunduntur, aut sanguinea, vel lymphatica vasa dirumpunt. Quare autem effusi humores, ut plurimum fluidiores fuerint, vel ex vasorum excretoriorum imminutâ diametro, vel ex disruptorum exiguitate repetendum est. Tandem, quod in humoribus stagnantibus tenuius est, exprimitur.

V I.

Martialia ergo medicamenta præscripturus à quânam ex illis causis nimia humorum fluiditas, vel adaucta eorum excretio dependeat diligenter attendat. 10. Si ab imminutâ vasorum pressione: verùm cum partium solidarum vires deficient, vel quia partibus volatilibus humores depauperantur, unde lymphæ nerveæ minori quantitate à cerebro influente partium solidarum tensio subsidit, earumque contractiones languescunt: vires etiam deficient, si exuberantibus in corpore humoribus serosioribus

partium solidarum textus laxetur. Itaque si primùm, cum ferrum, nec ex illo parata medicamenta iis non constant partibus, quibus vires refici possint, tunc *martialia* inutilia fore vel leviter attendenti patebit.

Si secundùm, seu si ferrosiores humores solidorum debilitatis causæ fuerint, modò non maximè exuberent, iis enim penitùs exhauriendis *martialia* insufficientia sunt, ad medicamenta hæc tanquam ad sacram anchoram confugas, illis enim partium textus firmiori factò earumque adauctà vi *lystaltica* vasa referantur, & humores ex intimo partium textu expressi ad vasa excretoria faciliùs multò pertingunt. Tandem humorum globuli undiquè validiùs pressi magis inter se cohærent, atque prima humoribus densitas certè conciliabitur.

V I I.

Secundò Si ab exuberantibus ferosis humoribus adaucta fluiditas dependeat, cum iisdem humoribus absumendis laxatisque vasis firmandis *martialia* sint imparia; ideò priùsqvam hæc medicamina exhibeantur, evacuantibus, prout indicatum fuerit, si non ex toto, saltem quòdam partem hi humores è corpore eliminentur, aut ut utriusque indicationi satisfactorus sis, cum evacuantibus *martialia* simul mixta primùm exhibe, curam deinceps *martialibus* simplicibus totam absoluturus. Ita quoque cum humoribus ferosis maxima fluiditas inducta fuerit, atque solidorum textus multùm debilitatus, *martialium* vires admixtis astringentibus validioribus intendas; nam præterquam quod humores magis adunant, solidis etiam, atque laxatis vasis excretoriis firmatis, humores ad secretoria faciliùs multò appellunt, & ex illis copiosiùs effunduntur.

V I I I.

Ipsis evacuationibus nimis sistendis *martialia* quæque inferviunt, verùm cave ne aberres, plures enim sunt, ut jam inuimus, harumce excretionum causæ; ideò autem illius vel alterius humoris excretio adaugetur, atque ipse sanguis è suis vasis exilit, aut in aliena fertur, quia humorum motus vel in vicinis vel in ipsius partis affectæ vasis sistitur, aut summè imminuitur, vitiatur autem ille motus, tùm ob eorumdem vasorum infarctum, tùm constrictionem, tùm ariditatem. 10. Vasa sanguine vel lymphâ obturantur: Si primùm, sanguinis ad ductam quantitatem repetitis venæ sectionibus in brachio, vel in talo, prout indicatum fuerit imminuatur, & ejus rarefcentia appositis remediis diætæque tenui & refrigerante compefcatur. Tandem si ipse sanguis jam concretus, & in iisdem vasis sic impactus, ut eorum repetitæ pressioni cedere non valeat, sanguinis resolutentia in usum adhibe: Dixi sanguinis resolutentia, hæc enim à lympham incidentibus plurimùm differunt: tunc ergò *martialia* inutilia sunt, atque noxia. Si secundùm, seu si à lymphâ infarctus dependeat, illa incidenda est, uti infra dicemus.

20. si excretio nimis vasorum constrictione inducta fuerit, *martialia* tunc noxia futura esse, vel leviter attendenti patebit; indè enim quæ fiebat humorum excretio adaugenda est, vel omnes sistendæ sunt, si ipsa vasa quæ patula erant validè constringantur. Tandem ipsa vasa dilacerantur, atque sanguis vel serum effunditur, aliaque non minùs infensa mala subsequutura sunt. Ergo si ad ducta humorum excretio ab *spasmo* veniat; martialium locus non est ea tunc proderunt, quæ partes convulsas laxare poterint, sed hæc hujus loci non sunt.

30. Nec etiam minus *martialia* nocerent, si par-

tium textus aridus & siccus fuerit ; quippe vel affectarum partium vasa cum humoribus , quos continent , simul arefcunt , vel humoribus plus vel minus vacua exsiccata sunt. Quomodo induratis humoribus prima fluiditas *martialibus* restituenda sit , infra dicemus ; quoad vasa arida & sicca , ni diluentibus & emollientibus prius remollita fuerint , ea humoribus recipiendis transmittendisque imparia fore , neminem in rebus *physiologicis* vel leviter versatum fugit , ac proinde ex ferro parata medicamenta tum nullatenus conveniunt.

I X.

Ergo excretionibus nimis sistendis *martialia* parum vel nullatenus inserviunt ? falleris certè ; nam 1^o. si ab exuberantibus humoribus serosis excretio dependeat , aut foveatur , uti supra diximus , multum conferunt. 2^o. Si propter vasorum excretoriorum laxitatem fiat , *martialia* ut potè salibus vitriolicis plus vel minus referta ad eadem vasa astringenda , atque firmanda apposita sunt. 3^o. Ità quoque conducunt , si à præpedito vel in viciniis vel in ipsius partis vasis laxatis humorum circuitu vel secretionem læsa , excretio adaucta sit ; undè rationem habes cur immodicus catameniorum vel hæmorrhoidum fluxus , aut aliæ excretiones nimis *martialibus* atque aperientibus medicamentis quandoque sistantur. 4^o. Tandem à quâcumque causâ excretio adaucta dependeat , pro dato tempore profunt , sed de iis fufius in sequentibus.

X.

Ex dictis sequitur , *martialia* in prætermodum adauctâ humorum fluiditate , aut excretionibus ni-

miis tutò præscribenda futura esse dumtaxat. *Primo* quotiescumque præternaturalis fluiditas à debilitatâ partium solidarum vi *syftalticâ* dependet. *Secundo* vel ab humoribus serosis exuberantibus. *Tertio* cum excretiones ob laxatum partium tonum copiosiores sunt. *Quarto* ad solidas partes firmandas, modò vires earum nec oppressæ, nec ab exhaustis humoribus debiles fuerint. Undè patet, martialia in omnibus corporis affectibus ab iis causis pendentibus fore summè proficua.

X I.

Secundo Quemadmodum humorum fluiditas præter naturam adaugeri; sic quoque iidem humores variis causis densari queunt. *Primo* Si eorum pars serosior & aquosior deficiat. *Secundo* Si in quibus continentur, vasis validiùs premantur. *Tertio* Si laxato partium *extu*, veluti sibi ipsis relicti humorum globuli ad invicem subcidentes plus vel minùs strictè cohæreant. In primâ densitatis specie *martialia* medicamenta maximè noxia fore, quis non videt? certè quidem diluentibus solùm hæc deperdita fluiditas recuperari potest. Nec minora parerent incommoda, si à vasorum pressione densitas suboriretur, quæ laxantia sunt, dumtaxat proficua futura esse, experientia docet.

X II.

Ergò nisi humorum densitas à tertiâ causâ inducta fuerit, *martialia* tutò exhibere poteris; modò etiam partis, in quâ illi humores stagnant, natura & variæ ejus affectiones non contraindicent; quippè humorum hærentiam, quam etiam induratio subsecuta est, vel inflammatio aliquoties præcessit, vel

ei supervenit, & ulcus quandoque partem affectam depalcitur; quantum autem *martialia* tunc nocerent, nemo non videt. Tandem ne in re aliunde summè difficilè, atque ne maximo ægrotantium damno decipiari, ad humorum etiam stagnantium, vel extravasatorum duritiei gradum diligenter quoque attende: *martialibus* vasa firmata magisque tena validius contrahuntur, quorum motibus, si indurati humores non cedant, ipsa vasa, geminatis ictibus solvuntur, aut in iis maximè constrictis, humorum circuitus plus vel minus præpeditur; undè partis affectæ dolor, inflammatio, ulcus, gangræna. Preterea in partibus vicinis humorum motus quoque vitiat, lymphæ vel sanguis è suis vasis erumpunt, aut feruntur in aliena.

XIII.

Ergò si cujus curam susceperis, affectus ab induratis humoribus dependeat, aut foveatur, *martialia* priùs non exhibeas, quàm eosdem remollieris; quippe emolliti ac minùs compacti vasorum oscillationibus faciliùs cedunt, atque propulsi vel in vasa continua fluunt, aut per patula excretoria effunduntur. Quæ de humoribus in aliquâ corpòris parte induratis, seu de scirrho lienis, hepatis &c. diximus: ea etiam de humorum in cæteris corpòris vasis spissitudine accipienda sunt.

XIV.

Verùm si nihil contraindicet; seu si humores nec nimis indurati, nec vasa arida, nec maximè tena fuerint, à *martialibus* curam tutò susceperis; sic experientia docet, ut & ratione confirmari posset. Nam hisce medicamentis vasa firmata ac validius se se con-

trahentia eisdem humores premunt, atque ad vasa capillaria usque propellunt, ubi eò magis, uti docet Physiologia, solvuntur, quò illam et vasa minora fuerint.

X V.

Deniquè cum æquè sanguine, atque lymphâ viscera maximè lien, imo & omnes corporis partes infarciri possint, seu humores omnes in vasis vel extrà vasa plus vel minùs densati indiscriminatim hære ac stagnare, quibus *martialia* non æque conveniunt, idèò quisnam ex illis torpescit, maximè distinguendum est. Qui à sanguine est, non *martialibus*, quæ tunc summe nocentia forent; sed propriis incidentibus infarctum tollere opus est quâ autem methodo à lymphâ producto infarctui mederi oporteat, jam diximus.

X V I.

Ex dictis colliges. *Primo*, *Martialia* non convenire, cum à dissipatis humorum partibus serosioribus, vel nimia vasorum pressione densitas dependet. *Secundo*, nec ubi partes solidæ nimium tensæ, aut aridæ fuerint. *Tertio*, Ea dumtaxat proficua fore, si propter laxatum partium textum humores torpescant, modò nihil contraindicet: Contraindicant autem humorum durties maxima, partis affectæ natura, ejus sensibilitas adaucta, inflammatio, ulcus &c. *Quarto*, Ut hæc medicamenta tutò exhiberi possint, humores indurati priùs emolliantur, atque vasa laxata sint. *Quinto*, Nec sanguinis densitati, nec infarctui à sanguine, sed à lymphâ inducto, ferrum & ex eo parata prodesse; undè rationem habes, quare vasa obstructa referant, scirrhus tollunt, suppressas

evacuaciones restitunt, humoribus deperditam fluiditatem conciliant, atque eorum operá humorum motus, ex quibus vita & sanitas dependent, juxta naturalis œconomix leges absolvuntur.

XVII.

Ad quid tot & tantæ distinctiones? an ne suppresso catameniorum fluxui, & aliis excretionibus restituendis, *martialibus* aptiora remedia inventa sunt? nulla sanè præstantiora modò indicata fuerint; verùm semper non indicantur. Catameniorum fluxus & aliæ humorum secretiones ac excretiones, uti jam expositum fuit, vel propter vasorum secretoriorum & eorum quoque, ex quibus pars affecta componitur, spasmm, aut ariditatem imminuuntur, & ex toto aliquoties præpediuntur; quandoque propter lympham summè induratam. An iis ritè priùs non distinctis à culpá abfuturus eris? vel minimè, *martialibus* vasa rigida magis coustringentur, sicca penitè arefcent. Item si à sanguine vitium oriatur, partis affectæ sensum intendes, inflammatio superveniet in ulcus insanabile citò mutatura. Taceo varia alia, quæ exindè mala subsequi solent, quæque heu nimium? experimentis comprobata sunt, sed de iis fusiùs ff. sequenti.

XVIII.

Quibus inter morborum causas debellandis, aut alterandis *martialia* medicamenta conveniunt, definitum est: quæ ex illis pro dato affectu magis proficua fuerint, & quomodo iisdem uti oportet, superest inquirendum; in illis etiam multum peccatur. Ex ferro parata medicamenta alia aliis plus vel minus astringunt, atque pro eorum, quæ cum illis

admixta exhibentur, naturâ, plures alias qualitates habent, Medico dignoscendas; sed de iis jam egimus ff. præcedenti. Quænam inter illa diversis corporis affectibus sanandis aptiora sint, breviter inquiramus. Itaque 1^o. ubi partium textus maximè laxatus est, atque humores vaforum ictibus faciliùs cedere possunt, ea exhibenda sunt, quæ magis astringunt; qualia sunt *crocus martis* astringens, *vitriolum martis*, tincturæ, & ferrum in aceto, aliisque liquoribus aut spiritibus acidis solutum. 2^o. Si minùs astringendi indicatio fuerit, *crocus martis* aperiens, ferrum limâ in scobem tenuissimam redactum, imprimis in usu sint. 3^o. Ferrum in vino solutum partibus vini sulphureo-volatilibus, quas secum permixtas habet, humorum rarefcentiam intendit, sopitos spiritus exsuscitat, atque eorum secretionem promovet; ideò tunc feliciter præscribitur; si unâ cum partium laxitate vires exolutæ fuerint. 4^o. Si alvum ducendi intentio sit, atque minùs astringere oporteat, *crystalli tartari chalybeati*, & *tartarum martiale* solubile præ aliis concinnentur. 5^o. Si sudoris promovendi necessitas fuerit, aut læsa perspiratio promovenda, atque intimi partium contextûs vasa firmanda, referendaque sint, flores salis ammoniaci *martiales* has indicationes tutò adimplent. Verùm cave, ne iis humorum motus atque corporis calor maximè intendantur, ut hæc avertam, in magnâ aquæ quantitate solutos hos flores exhibere soleo.

X I X.

Quæres an ferrum ipsius croco aperiendi præponendum sit? sanè quidem, modò in scobem tenuissimam fuerit redactum, & ubi minùs astringendum est. 1^o. In scobem tenuissimam reducendum est; alioquin nec in ventriculo, nec in intestinis debite solutum, & ut pote summùm grave citò per anum ex-

cerneretur. 20. *Croco* antepōnatur, si minùs astringendi intentio fuerit. *Martialium* vim astrictorim à salibus vitriolicis, quibus plus vel minùs abundant, pendere probatum fuit; ea autem salia eò majores vires exerunt, quò à substantia inflammabili magis sunt expedita; at quia ferrum, uti probat ejus major inflammabilitas, substantià illà inflammabili *croco* magis turget, ejus acida minùs libera, minori etiam vi agunt: contrà verò in *croco*, ubi sui juris magis facta multò magis astringunt. Ex quibus patet chalybem ferro etiam minùs astringere; quia majorem substantiæ inflammabilis quantitatem continet, fortè, quia illa salia ob strictiorem chalybis compagem, quàm in ferro, minùs ad agendum expedita sunt. Quibus adde ferri, sed imprimis chalybis scobem ut pote *croco* graviorem è ventriculo & intestinis citiùs multò decidere. Ergò quotiescumque minùs astringendum futurum erit, ferri, & chalybis scobem *croco* tutiùs exhibebis. Insuper scobis usu, non mala solùm effugies, quæ ex ferri paratis persæpè inferri solent, sed eò tutiùs ages, quòd veluti per gradus egeris.

X X.

Ita quoque pro varià indicatione, cum aliis medicamentis ferri varia præparata exhibentur. 10. Si non astringendi tantùm, sed etiam demulcendi & nutriendi indicatio fuerit, ut in inveteratis alvi fluxibus, aut aliis evacuationibus immodicis, unà cum lacte, vel sero lactis vel jusculis ex juniori pullo galinaceo paratis *Martialia* feliciter dantur. 20. Vel cum resolventibus, uti cichorio silvestri, fumariâ, nasturtio aquatico, apio palustri, chærefolio, asellis, aquillâ albâ, æthiope minerali &c. Si humores, incendiendi sunt & per vias urinarias excernendi. 30. Vel cum cardiacis, si vires verè debiles refocillandæ. 40. Vel

Vel eum ipsis narcoticis, ut quæ astringendo produ-
cunt, aut adaugent, mala avertantur. 5^o. Vel
cum catharticis, ut exuberantes pravi humores per
anum eliminentur. 6^o. Tandem cum remediis appro-
priatis, prout indicatum fuerit.

XXI.

Quomodò, seu quâ formâ & dosi *martialia* exhi-
benda sint, inquirendum superest. Unâ cum aliis
medicamentis pro datâ indicatione præscribenda fore
jam dictum fuit; tunc ergo sub eâdem formâ, quâ
illa remedia dantur, etiam concinnanda. Quæ si so-
la in usu sint, ea vel in aquâ ad ptisanæ formam,
vel in vino soluta, vel in jusculo convenienti, vel
in decocti appropriati cyatho uno, aut altero, vel in
offæ primo cochleari, vel manè superhauriendo, aut
lac, aut ferum lactis, aut jusculum, aut apozema. Vel
ferrum candens in lacte, vel lactis fero extinguitur.

XXII.

Quoad dosim. A minori semper exordiaris, ut ad
majorem tutò progredi possis, plures à magnâ dosi
malè se habere observatum fuit, qui à minori sanati
sunt; Ideò ne aberres, & morbum & ægrotantium
temperiem, ipsiusque partis affectæ indolem priùs
confule. Verùm si parvâ dosi exhibeantur, quod sem-
per tutius erit, iis per longum tempus uti necessum
est; unde patet quare aquæ minerales vitriolicæ, quas
martiales aut ferrugineas vocant, etsi ferrum purum
non contineant, illæ enim aquæ à terrâ propriâ ferri
acidis vitriolicis plus vel minùs turgidâ suas virtutes
habent, unde inquam, tot tamque gravibus affecti-
bus sanandis ipso ferro, atque ex eo paratis multò
magis sunt accomodatæ; quin tamen credas, omni-

bus morbis debellandis aptas futuras esse, uti illis, qui de aquis tractant dicere solemne est; quippe si illis fides adhibenda foret, nullos ex corporis affectibus insanabiles diceres: at aquæ minerales, uti alia medicamenta, nisi pro datâ indicatione profunt.

X X I I I.

Qui in vasis humores stagnant, maximè si concreti fuerint, circulationi plus vel minùs inhabiles sunt: veluti totidem corpora humoribus extranea haberi possunt; quæque proinde, si *martialium* ope fluiditatem adeptæ, ad alia vasa cursum rursùs dirigant, humorum quantitatem adaugent, eosque, pro suis qualitatibus variè inquinant; unde mala prioribus pejora quàm sæpe oriunda: ut ergò tot tantaquæ, quæ exinde imminant, incommoda avertantur; ni soluti humores per ejusdem partis vasa excretoria foras erumpant, è corpore variis additis evacuantibus eliminantur. Dixi variis additis evacuantibus; nam, cum juxta divini Senis Consilium eò tendere oporteat, quò natura vergit; vergit autem; seu superfluos illos humores vel ad renes, vel ad alvum, vel ad cutim &c. propellit è vasis egerendos: Itaque diuretica, vel cathartica, vel diaphoretica, aut sudorifica, vel alia evacuantia prout indicatum fuerit, *martialibus* utentibus identidem exhibeas, & quoties visum fuerit, iteranda.

Sic etiam humorum hærentium excretionem promovebis; si iisdem humoribus jam solutis, vasa per appositæ remedia ad excernendum prorites. Sed hæc hujus loci non sunt. Verumtamen cum nonnullis ne sentias, velim, *martialia* assumpturos evacuantibus semper prædisponendos futuros esse; nam ferosi humores exuberant, vel in vasis veluti infixi plus vel minùs concreti sunt. Si primùm, non unâ vice, sed pluries, etiam cum martialibus evacuantia convenien-

tia exhibeantur. Si secundum, expecta, dum iidem humores *martialium* operâ ad fluendum apti sint; alioquin nulla, vel irrita, fortè noxia evacuatio tub-secutura est.

PARAGRAPHUS V.

De abusu Ferri.

I.

IN erroribus, qui in ferri & *martialium* usu, committuntur, enumerandis, multum non immorabimur, eò enim frequentiores atque majores sunt, 1^o. quòd hæc medicamenta præ omnium manibus sint. 2^o. Quòd morbi, aut eorum causæ, quibus debellandis conveniunt, haud facillè distinguantur. 3^o. Quòd, quæ perpatrant, damna difficillè refarciri possint.

II.

Ille morbis tutò debellandis aptus est, qui cognitâ priùs corporis oeconomîâ, morborum, quibus in vitæ decursu corpus humanum objicitur, genium, seu quibusve signis se primùm monstrant, quomodo intenduntur, ac remittuntur, atque terminari solent, à Magistris peritioribus, Auctorum selectiorum lectione ac propriâ experienciâ didicerit; ita & causarum cognitio non minùs necessària est, medicinam facturo: quantopere ergo, qui nullis Medicinæ principiis imbuti, nec morborum historiam novere, nec audire, illi ferrum & ex hoc metallo præparata exhibentes decipiuntur, aliosque decipiunt, & eò fre-

quentiùs, quòd eadem illa medicamina ad omnes permixtè morbos adhibeant. Adeò frequens est *martialium* usus, ut illa, Medicinam universalem crederes.

I I I.

Quantæ difficultatis fuerit, & morbos, ac eorum causas, quibus oppugnandis *martialia* conveniunt, dignoscere, facile patebit ex nostræ Dissertationis lectione: ergo quot & quantæ ab iis culpæ committuntur, qui nullâ morbi, causarum, ægrorum temperiei, aliarumque circumstantiarum habitâ ratione hæc medicamenta, alioquin optima, exhibent: & sanè cum hæc sit *martialium* natura & indoles; ut partium solidarum astringendo vires intendant; nam uti experientiâ constat, illa noxia futura sunt, ubi partes illæ nimium tensæ, aut aridæ, vel humores partium serosarum jacturâ, vel validiori vasorum pressione indurati fuerint? uti etiam, si quâcumque aliâ causâ summè concreti vasorum ictibus cedere non valeant.

I V.

10. Partes spasmo detentæ *martialium* acidis vi-triolicis valdè instimulatæ magis atque magis tenduntur: atque convulsæ rigescunt; unde ad se se contrahendum ineptæ, propellendos humores retinent, ac pressione densant. Insuper humorum colis etiam constrictis, secretiones suppressæ manent, ac quæ adhuc vigeant, ex toto sistuntur; unde febris accenditur, facies rubet, totum corpus æstuat, disruptis vasis, sanguis impetu exilit, aut aliò divergentes humores in vicinas cavitates irruunt, ibique collectis, hydrops supervenit, vel corporis habitus cachecticus fit, si serum in vasis intra textum cellu-

larem repentibus, vel in ipsis cellulis stagnet.

V.

20. Nec minora subsequenter incommoda, si aridis partibus solidis, medicamenta martialia exhibeas; partes illæ, quibus remolliendæ erant, humoribus jam destitutæ, vitriolicis acidis magis exsiccata arefcunt. Unde earum motus languescit magis, atque humorum fluxu inhibito, excretiones intercipiuntur, vasorum infarctus adaugetur, humores magis indurfcunt; unde hydrops, febris lenta & alia infensiffima mala superveniunt.

VI.

30. Vasorum ictibus eò minus humores pariunt, quò magis indurati sunt; hinc maximè errant illi; qui iisdem humoribus necdum remollitis, martialibus utuntur: sanè uti ff. præced. dictum fuit, Medicamina hæc vel humores inordinatè solvunt, vel in eisdem humores, irritis resiliunt ictibus, quibus vasa vicina validè commota varios motus edunt, ac convelluntur, in illis & in remotioribus humorum motus intenditur, rubra cum albâ sanguinis pars in arterias lymphaticas irruit; ibique stagnante, Inflammatio accenditur, quam ulcera insanabilia, subsequuntur, vel humorum induratio nullis diluentibus emollienda; insuper plura alia mala subsequi, aut concomitari solent; scilicet, febris in lentam terminanda, partis affectæ dolor, scirrhus facilè mutatur in cancrum, hydrope aut marasmo vita cum morte commutatur.

VII.

Si ergò plurimùm errant, qui martialibus utuntur in omnibus affectibus spasmodicis, passione hysterica, affectione hypochondriacâ & quocumque alio corporis affectu convulsivo, sicuti in partium ariditate, hæmoptysi, saltem ratione morbi; nam ad horum-ce affectuum causas nonnullas alterandas, immutandasque, quandoque aptissima fore nos felix usus persæpe docuit: verum cave, dum causas arcere niteris, ne qui ex illis dependent, morbos exasperes; ideo tutiùs ages, si variis illis indicationibus simul satisfeceris.

VIII.

Inde etiam vides, quàm noxia fuerint hæc eadem medicamenta in cancro afflictis, vel internis ulceribus laborantibus. Ipsa intemperies sicca & calida martialia aut respuit, aut si illa exhibendi indicatio fuerit, nisi summâ cum prudentiâ ea adhibeas, facîle certè lædes.

Ex dictis quoque rationem habes, quare jam sensibilem nimis ventriculum invertunt, intestina doloribus torquentur, bilis acrior excernitur, alvus astringitur, totum corpus flavescit, aut exanthematibus figurâ, magnitudine, colore, ipsoque dolore diversis aliquoties infectum est, vel macie absumitur &c. Taceo varios, qui circa dosim errores committuntur. Sed quid plura, eo enim in martialibus præscribendis frequentiùs peccatur, *quod difficillimum sit*, ipso attestante Illustr. Stalh (a) practico felicissimo, *martialia ita administrare, ut ille, etiam regulis perspicuis, circumscriptis, erroribus & ambagibus eventibus, nullus*

(a) Ars sanand. cum Expectat. c. IV.

aditus pateat, aut locus relinquatur: qualis autem circumspectio, discretio, & peritia, ab illis numquam sperari, nedum expectari potest, qui toti in hoc remedii genere obhærentes, neque morborum genium agnoscunt, neque adhibendi aliquam methodum comprehendunt.

IX.

In martialibus facilè erratur, difficiliùsque multò, quæ inferunt, damna refarciuntur. Etenim hisce medicamentis nimium constrictæ aut summum aridæ corporis partes, difficillimè laxantur & emolliuntur, ex illis, quos accersunt, morbi quàm plurimi, aut remediis exasperantur, aut omnem persæpè medicinam respuunt: quem latet ulcera, caneros, febrem lentam & hecticam, hydropem &c. quæ ex illorum abusu oriuntur, insanabilia futura esse.

X.

Ne ergò circa martialium usum aberres, tibi nunquam excidat, *martialia* astringendo præcipuas suas vires exerere, eaque dumtaxat convenire, cum partes laxatæ firmandæ sunt; quæque proinde jam nimis tensas, rigidiores efficiunt, earum intendunt motus, atque aridas magis exsiccant. Nam uti suo loco probatum fuit, martialia, acidis vitriolicis plus vel minùs turgent, ferri autem partes integrantes ostiolis vasorum lacteorum subeundis impares sunt, atque ex hoc metallo parata ferri naturam exuere, ipsique *croci* modò ritè parati fuerint, terra sunt acidis vitriolicis plus vel minùs referta: quod si uti sæpè contingit, quia Pharmacopolarum aut incitiâ, aut incuriâ non concinnè elaborati sunt, quasdam partes verè metallicas retineant, interiùs assumpti, aut ex toto destruuntur, aut per anum partes illæ metallicæ excernendæ sunt. *Exustum ferrum*, *squamas*

ferri, seu batituram benè perustam, & omnis martis crocæ-
tum præcedentibus solutionibus, & subjunctâ uestione,
paratos, non magis tangit aut commouet Magnes, quàm
paleas & stramen. Ita Illust. Stalh. (a)


Quantacumque gravia fuerint, quæ ex intempe-
tivo martialium usu, mala subsequi possint, ex iis
optata commoda ægrotantes percipient, modò mor-
bis, eorumque causis ritè distinctis, habitoque priùs
temperierum, aliarumque circumstantiarum respectu,
exhibeantur: totidem remedia tonica sunt, quæ la-
xatas partes firmando, humoribus fluidioribus con-
sistentiam; crassis, spissis & nimium consistentibus
fluiditatem conciliant; unde languentium humorum
motus in integrum restituitur, functiones debitè
exercentur, atque sanitas restituitur.

(a) Obser. Ch. Phys. Med. cur. mens. Septemb. C. 5. &
Experim. Obser. & Animad. N. XVIII.



ERRATA.

P Ag. 8. lin. 6. hac. leg. hæc. lin. 20. visceribus extrahuntur.
leg. visceribus efformata extrahuntur. l. 25. unità. leg. unita.
p. 11. l. 2. ullatenus attrahit. leg. ullatenus, vel parùm attrahit.
l. 12. metallum destructum. leg. metallum plus vel minus
destructum. p. 24. l. 10. textus. leg. textu. p. 25. l. 34. pote-
runt leg. potuerint p. 27. l. 20. subcidentes. leg. subsidentes. p. 20.
l. 12. præterea leg. præterea. p. 30. l. 21. coustringentur. leg. const-
ringentur p. 32. l. 2. astrictorim leg. astrictoriam.



Le Recueil périodique d'observations de
Médecine chirurgie pharmacie &c. par M.
Vandermonde Docteur Regent de la Faculté de
Médecine après imprimé chez Androit che-
viment rue St. Severin a deux cent cinquante la
1^{re} fois les observations qui ont été directement
rapport aux maladies, & Vandermonde les physiologi-
pathologie, hyg. & sémiol.

La 2^{de} partie ou traité des découvertes
anatomiques et de tout ce qui concerne la
chirurgie naturelle et instrumentale.

La 3^{de} partie renferme l'histoire naturelle
de chimie et de pharmacie.

Cette œuvre est composée de thèses, mémoires, leçons
après Montpellier et autres célèbres écoles de France,
des lettres manuscrites et pièces fugitives qui traitent
directement ou indirectement de la médecine chirurgie et
pharmacie.

Paris par la commission 747. pl. 12. vol.
et 6782 par Paris.

21137

△△△

