


産科指南

乾



20 25 30 35 40 45

門十武8
號卷
996
1

上總大牧周西著

產科指南

井田研究
印譜圖刻

距今六十九年 明治廿二年

閑柳堂藏



產科指南序

九十五山田氏圖書之記

荀蘭陵曰青取之於藍而青於
藍冰冰為之而寒於水誠守此
言也上總大牧周西繼賀川氏
之技脩產科之術而其精過之
其術曰姪姪三十日而決之令

孕婦易產是鑿空之說也雖則醫中之一術以此救人不亦寡矣屬集其經驗者而錄之名曰產科指南唯不載其所為者此術可口受而不可筆記也嗚呼都下好此技者宜少矣哉而無

得之者以成于陋巷之士者所謂十室之忠信周匝其人矣哉乃略捨其意以識卷端如不詳則友人丹波君序中盡之矣文政丙戌初夏

官醫 宮崎彝立元撫

卷之六

序

東原長橋貫佐書

贊

贊

序
上德大牧翁周西世爲里正卑歲憐鄉無良醫而以產難斃遂有志救活求師不得因取賀川氏父子秀潛恩玩索爲廢寢食方有理會乃嘗試之胎之歪斜者上冲者橫者遂去已死不下者盡莫不隨手奏功於是一鄉賴其全濟四方傳聞乞活者日以益

角而翁之術日以加精齊患陰證率出新意万不失一蓋姑至廿載者矣曩日嘗錄次所得著產科指南二卷持來示予披袞讀之其文雅野間務賀川氏之所未及博切詳悉為達生捷徑尤足以見其志興術矣翁既沒女弟子森崎保祐深慨師說之就泯遂捐賞財梓予以貫師遺命屢促予

序保祐能繼翁學以其技巧于都下而今復刊此書以貽後世貞立志之碣非尋常丈夫可企及此豈可不嘉尚乎哉抑予有感焉凡手術療疾者其乃否人之易辨用心淺深尤從而是如用藥施治者其精粗人之難辨用心深浅亦有未易遽窺者故作此而苟且以冀僥倖呼嗚呼此道也哉使

世之修内科者咸如翁之於產科以
祐女精則庶幾矣其溫之弊矣既序
冊書併以及此云

文政丙戌臘月吉東都丹波元堅
蓬庭撰于存誠藥室

産科指南自序

僕ヤ上總之鄙邑ニ生レ况ヤ不中不才ニメ固ヨリ
菽麥ヲ辨セストイヘニ僻地ノ婦人產難ノ爲ニ命
ヲ殞ス者アルヲ見テ慨然トメ痛惜スルコアリ昔
シ賀川氏ナル者アリ此科ニ委ク其術ヲ以テ都下
ニ鳴ル僕嘗テ其所著ノ產論ヲ事實ニ親ク試ルニ
隣里近鄉ニ胎孕ノ者アレハ富トナク貧キトナク
其腹ヲ按シ其孕ヲ探ラサルハナシ其數舉テ計ヘ
カラス始テ賀川氏ノ所說顯然トシテ指下ニ明白
ナルコヲ覺フ或曰ク夫頭ヲ天ニシ足ヲ地ニスル

ノ人ニシテ焉ソ倒ニ孕ノ理アランヤト嗚呼此事
ヤ數百歳ノ疑城ニメ此ヨリ破リ難キハナシ通邑
大都ノ人スラ猶且然リ矧ヤ寒郊ノ愚夫ニ於テ
ヤ是ニ於テ僕憤然トメ志ヲ勵シ更ニ産論ヲ取テ
讀コト數百遍又孕婦ヲ試ル事數百人愈益賀川氏
ノ世ヲ誣スメ實ニ此道ノ達識ナル丁々知ル手術
ノ如キハ産論翼ニ至テ審ナリ又解體新書ヲ覽ル
ニ諳厄利亞國孕婦ノ說アリ卽賀川氏ノ說ト暗ニ
符合ス僕又密ニ胎孕ノ化理ヲ按スルニ夫孕婦ノ
形タルヤ横骨ヨリ鳩尾ニ及マテ是ヲ天圓ニ比ス

中ニ渾然タル豚脾ヲ孕ム而メ陰戸ノ外ヲ天トシ
陽トシ陰戸ノ内ヲ地トシ陰トス然ハ孕胎頭ヲ天
明ニ向テ足ヲ地陰ニ着ク丁是正位ニアラスメ何
ソヤ世ノ人則正ヲ捨テ逆ヲ取リ一盲衆旨ヲ牽ク
トハ是ナリ故ニ万物皆倒ニ位スル丁ヲ知ラス此
科ヲ業トル者ハ知ラスンバ有ヘカラス又世俗
ノ言ニ胎子腹内ニ轉復スルノ說アリ若シ孕胎腹
内ニ轉復セハ母ノ藏腑豈傷ラサルヘケンヤ妄言
ト謂ツヘシ貴賤トナク貧富トナク孕婦タル者自
身整胎ノ法ヲ得テ其身ヲ保護セハ千百人ニ一人

モ難産ナシ且此法婦人各自ラ行ヒ安シ假令明日
難産ヲ作ス者モ今日此法ヲ行バ忽チ難ヲ轉ノ安
ニ就シムベシ此事賀川氏叮囑ニ是ヲ教ヘ示スト
イヘキ衆人是ヲ見サルカ抑見テ用ルト能ハサル
力僕又和シテ以テヨレヲ天下ニ擴充セハ豈賀川
氏ノ忠臣ニ非スヤ此深ク志ス所ナリ

文政癸未夏四月

上總 大牧周西撰

産科指南上目録

姪娠胎體說	姪娠日數
姪娠候法說	胎受養說
乳汁說	姪娠忌法
姪娠次第說	逆孕說
死胎并治方	男女說
臨產腰痛說	水血漏下
姪娠腫滿	陰門腫說
驗胎轉動并治術	整胎術
攀胎說	臍帶說

產科指南

卷之二

流產崩漏分別

難產說

鎮帶說

產椅說

產後保養

產後腹狀說

護產門術

救初生虛兒說

小兒頂後有禿說

小兒腰青痕說

囊胎說

背面倒首論

半產說

忌房事說

兒啼母腹中說

母死活兒術

圓生鈎胞術

經驗方二十六首

目錄畢

產科指南卷上

上總周准郡

大牧周西著

門人南總

森寄女佑

同校

妊娠胎位說

凡婦人ノ腹妊娠ノ位スル所ハ膀胱ノ後廣腸ノ前
ノ間ニ子宮トイフ胎ヲ孕ム囊アリテヤハリ上ニ
口ナク下ハ陰戸ニ續テロアリ常ニハ縮リ細ク中
ニ月水ヲ蓄ヘ胎アル時ハソノ育長ニ隨ヒ自ラ廣
マルナリ此中ニ又胞膜トイヘル囊アリ胎ソノ中

ニ身ヲ潛テ倒ニ居ル其胞膜ハ子宮ノ裏ニ固著シ
テ裏ト表ノ如シ又胞膜ハ胞衣ノ厚肉ノ四邊ヨリ
薄膜ヲ引伸シ胎ヲ終ヒ全ク囊ノ狀ノ如シ大便ハ
膈膜ノ中胃大腸直腸ヲ通リ肛門ニ出ツ大腸ハ小
腹右邊ニアリ小便ハ膀胱ニ出ツ膀胱ハ左小腹ノ
下ニアリテ上ニロナク下細キ管ノ如ク陰門ノ上
邊ニ通續スル小囊ナリ

右子宮直腸膀胱三ツノ狀ハ圖メ下ノ卷ニ見ス
凡婦人ノ左腹ヲ血室トナシ右腹ハ委食ノ腑位ス
ル所ナレハ空虛ノ時アリ故ニ胎微ク右邊ヘヨリ

ヤスシ又血塊ノ類ハ大槻左邊ニアリ

妊娠日數說

凡婦人ノ胎ヲ受ル事八月水終リテ後十日ノ間ニアリ此ヲ過レハ後ノ月水動イテ孕カタシ其免時ノ期大畧日數ハ初テ孕者ハ凡三百日ヲ經テ產ス度ニ產スル者ハ二百七十五日ヲ過レハ追ニ產スヘシ

妊娠候法說

凡孕者三十日ヲ過テ惡阻ヲ病ハ後ノ月水ニナラヌ故ナリヤハリ常ノ食物ヲ反吐シ酸物菓實ナト

ノ通り安キ物ヲ好ハ子宮胃ノ口ニ至ル迄經塞ル故ナリ故ニ餘ノ病ナキ者ハ害ナク脉狀モ宜ク只脉力アルノミ

凡孕者三月後ハ漸々諸脉ニカアリテ指頭ノ脉ヲ見シ又面部胸ノ經脉益青ク太ク又乳房ノ肉肥乳根ノ回リ紫黒ノ色ヲ發ス又指ヲ以摘ハ淡乳汁ヲ漏スヘシ然レ疋血塊腹脹ノ者ニ姪娠メ狀ニ似タルアリテヤハリ同様アリ是月水ヲ閑ル故ナリ審ニスヘシ假令四五月月水見サル者常ノ多少ヲ問ヘシ常ニ多シト云者ハ姪娠ナリ又常ニ少シト云

者ハ法ヲ以テ腹ヲ按テ見ルヘシ古人姪娠ノ然否ヲ診スルニ脉狀ヲ以テ名ツクル丁多シ然レ疋其事滋洋トシテ風ヲ捕ヘ影ヲ係グカ如クメ知難シ姪娠ノ然否ハ腹ヲ按メ見ルヨリ要ナルハナシ凡姪娠ノ脉三月後指頭ニ發レ疋姪娠ニ定リシ事ニ非ス婦人ノ中ニ夏六七月大暑ノ節不姪者モ指頭ニ脉動ヲ發スルアルアリ按ニ客陽受ル故乎又酒ニ醉ノ者ニ然ルアリ一槩ニ論スヘカラス凡婦人ヲメ先帶ヲ解テ常ノ枕ニ仰臥セシメ醫者左邊ニ座メ手ヲ以テ腹ヲ撫和シ両足ヲ屈シ腹ヲ

和ラケ三月前ハ横骨ノ中ヘ指頭ヲ以テ推シ肛門ノ邊ヘ内ヨリ突張ルヤ否ト問ヘシ子宮ノ口邊肛門ノ邊ヘ應アルハ究テ妊娠ナリ又指ニヨリ附ヲ考ヘシ是ナリ然シ大小便下ニ催シアルヤ否ヲ考ヘシ空虚ノ時ハ疑ナシ又瘀血塊横骨中ニ有ルヤ否ヲ考ヘシ

凡婦人常ニ惡血ノ固著シテ滯ル者大概横骨ヨリ上小腹ノ邊ニアル者多シ横骨ノ中ヨリ下子宮ノ口邊ニ固著シテアル者稀ナリ此証ハ半產ノ者ニアルコアリ然ルニ此所ニ若血塊アル者解テ下ラ

又中ハ孕事ナシ子宮ノ口邊ハヤハリ胚胎ノ初メ宿ル所ナレハ此ニサヽハリアレハ孕ムコナシ凡腹ヲ推テ見ルニ一物指ニ礙ツク物アレニ其潤ヒナク狀或尖リ或ハ長ク或ハ角張リ龜ニメ革カ岩ニ當ルカ如クメ手ニ應スル者ハ血塊ニメ胎孕ニ非ス狀玉ノ如クメ潤ヒアル者ハ妊娠ナリ候法圖ニメ下ノ卷ニアリ

胎受養說

凡胎ノ子宮ニアルヤ其養ヲ臍ヨリ受ク先其母ノ血ヲ胞衣ニ受ク其血浸漬メ其臍帶ノ血脉ニ傳ヘ

漸々是ヲ肝ニオクリ肝ヨリ心ニ傳へ心ヨリシテ一身ヲ周流スル者大人ト異ナルコナシ其血一身ヲ周流シ而復臍帶ノ動脈ヨリ胞衣ニ坂シ其母ノ血ト相和スルコ環ノ端ナキカ如シ

片倉元周曰凡莖中三孔有テ相通ス一ハ以テ氣ヲ輸シ一ハ以テ血ヲ注キ一ハ以テ氣血ヲ反ス者也是又人ニ咽ト喉ト有テ氣道穀道各異ナル者ノ如キ乎

乳汁說

凡婦人ノ心經ト胞中ト表裏タリ上乳汁トナリ下

經水トナル予按スルニ胎腹ニ有テ經水ヲ以テ專ラ養ヨ受ク故ニ胞中ニ下リテ上乳汁ナシ産後ハ專ラ上乳汁トナル故ニ凡ニ三年經水止テ不通ナルハ是自然ナルヘシ

妊娠忌法

凡妊娠ノ者沐浴ヲ忌ムヘシ孕者内實スレハ邪ニ感スルコ少シ特沐浴スルヨリメ外邪ヲ得ルコ多シ蓋沐浴スレハ腠理闊テ風冷襲ヤスケレハナリ尚九月ヨリ更ニ忌ヘシ産後病ヲ發スルコヲ恐ルレハナリ産後ハ假令健婦ト云ニ二十日忌ムヘシ

若シ不快ノ者ハ限ナシ然ラザレハ身體腫ルカ又
ハ寒熱自汙盜汙氣息喘咳危キ証ヲ發スヘシ
儲身穢レシハ熱湯ニ綿ヲ浸シ絞リ拭サリ清クスヘシ
凡孕者寐ニ足ヲ屈シ腹帶ヲキビシク束ルヲ古來
ヨリ吉ト言傳ヘシハ大ナル謬ナリ上腹ヲ束留メ
下足ヲ屈シ寐レハ胎ヲ推タヨシ悶ヲナサシメ胎
モ絆ニシ或ハ横様ニスレハ難產ヲ求ル惡事ナリ
此故ニ腹帶ハ輕ク程ヨクシ寐ルニ両足ヲ常ノ如
ク伸シテ宜シ

凡孕者古來ヨリ俗ニ川魚ヲ忌ム予數十人試ルニ

害ナシ已ニ外臺秘要ヲ視ルニ姪娠數く胎ヲ傷ル
者ノ治方ニ鯉魚ノ大ナルヲ用タルヲ數方アリ忌
ムコナシ予其害アル物ヲ驗ルニ先白芥子并ニ萬
葉并寶生大根オロシノ醋製魚ハ鮭鱈鯛イシナ
ギ黒鯛イルカスナメリ貝ハイタラ貝等ナリ

姪娠次第說

凡姪娠初月ヲ胚渾ト云大サ小鳥ノ卵ノ如クメ子
宮ノ口邊ニアリ胎ノ狀ヲ得テ日々月々育長シ漸
漸上ヘ上ルヘシ然シニ三月ノ中ハ横骨ノ中ニア
リ四月ハ横骨ノ上半見ハル五月ハ小腹ニ至ル六

月横骨ヲ離レ臍下ニ近クシ七月月中旬臍下ニ上リ止テ支ヨリ上下四方へ肥長ス臨月ニ及ハ胎ノ尻上院ノ邊ニ見ハレ下ハ頂横骨ノ中ニ入ル此眞ノ順孕ノ本位トス面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ手足ヲ屈シ居ル其狀物ニ譬ヘハ地ニ伏テ居ル蛙ヲ倒ニ見ルカ如ク身ヲ潛テ居ルナリ圖ニメ下ノ卷ニアリ

逆孕說

凡逆孕ノ狀ハ頂ヲ上ニン尻ヲ下ニシ手足ヲ屈メ居ル六月以前ハ胎ノ順逆見分チカタシ七月後見分ツヘシ八九月臨月ニ及ヘハ頂ヲ母ノ胸ノ下或

右或左脇腹へ斜ニテラシ肩背ヲ中院ノ邊ニ見ハシ尻ヲ小腹ノ下ニ置足ヲ屈シ踵ヲ横骨ノ中ヘ垂テ居ル此故ニ時ニ子宮ノ口邊ヲ踵ヲ以テ突張ル様アリ因テ按腹シ整胎ノ術ヲ盡スト雖庄其手ヲ放ハ又頂ヲ脇ヘテテメ居ル此逆孕ノ狀ナリ百中ニ僅ニ一二アルノミ又順孕ノ者モ七八月頃ハ頂ヲ横骨ノ上ニ見ハシ或ハ手ヲ伸シ横骨ノ中ヘ垂レ擣テ以テ子宮ノ口邊ヲ突張ルコアリ審ニ見分夕ヘシ

死胎說并治方

凡胎腹中ニ死スト云ヘニ胞膜サケヌ中ハ常ノ如クシテ産ナシ或ハ忽チサケテ即時ニ産ニ向アリ又死胎久シク腹ニアリテモ胞膜サケヌ中ハ七八十日百日ニ及ヘニ産ナシ胞胎爛レシ者毋重キ物ヲ持カ或走テ身ヲ動カス丁劇シキカ或ハ顛仆スレハ膜サケテ忽チ産ニ趣クアリ予カ知ル所ノ者經終テ三百日過キ十一ヶ月ニメ死胎ヲ産タルアリ此胞膜サケ又故ナリ

凡孕毎ニ胎不長者宿病有ニヨル者調養ヲ失カ故ニ不長ナリ或ハ其人ニヨリ臟氣弱虛冷者胎不長

ナリ証ニ隨ヒ施治スヘシ又孕毎ニ三四月或ハ七八月或ハ臨月死胎ヲ産スルアリ予嘗テ數十人ヲ療スルニ十人ノ内八九人ハ功ヲ得タリ因テ其經驗方ヲ左ニ記ス然レニ方ノ前後ノアヤトリ遇不及ヲ知リ治ヲ施スヘシ假令應スル藥トイヘニ補劑ハ時々泥ムコアリ此ヲ知リテ間々平和ノ劑或ハ鬱氣ヲ開ク剣ヲ與ヘ氣ヲ快クシ又前方ヘ復ル事ヲ知ラサレハ功ヲ成難シト知ルヘシ又八九月臨月ニ死胎ニ趣ク者ハ活胎ノ治療安シ六七月頃死胎ニ趣ク者其次ナリ孕毎四月以前胎墮スル者

ハ治シ易カラス各問テ其クセヲ知テ死胎ニ成ザ
ル前ヨリ出産ニ趣ク迄藥ヲ休ムトナクシテ療ズ
ベシソノ宿病アル者ハ宜ク其証ニ隨フヘシ如シ
臟氣弱虛冷スル者ハ治方左ノ如シ

安胎湯 膠艾四物湯 腎氣丸加阿膠 第一和劑
湯加阿膠 八物湯加阿膠半夏 桂枝芍藥湯加阿
膠半夏 真武湯加阿膠半夏 小建中湯加阿膠半
夏 四君子湯加阿膠元氣 六君子湯加阿膠 热
證輕者逍遙散或加山梔子 腹熱不止時ニ大便秘
者瀉心湯兼用如潮熱者宜大柴胡湯 脏氣弱及死

胎者補劑加阿膠半夏經驗予カ用馴タル方也姪姪
嘔吐アル者虎翼飲伏龍肝汁ヲ以テ煎服メ効アリ
平和劑沈香天麻湯加阿膠 紫蘋和氣飲加阿膠附
子半夏 正氣天香湯加當歸沈香 右三方附子ノ
加減多少ハ證ニ臨テ量ルヘル大棗右方ヲ用ヒテ
功ヲ得タリ又外臺秘要方ニ倣テ鯉魚ヲ製メ兼用
メ効アリ若シ他証アル者ハ証ニ隨ヒ方ヲ施スヘ
シ其証アル者ハ假令大黃芒硝トイヘ止恐ルトナ
シ内經曰有故無損亦無損ト是ナリ

凡死胎日數ヲ經テ探ルニ胎ノ體手ニ應スルコ木

石ノ如ク潤ヒナク母ノ腹肉モ先ニ張テ見ヘテモ
數遍撫探リ後忽チ瘦テ胎ト腸胃ト界アルニ似タ
リ胎斜ニ居ルアリ或ハ下腹へ落テ居ルアリ此ヲ
推探ルニ肘カ膝頭或ハ踵ニ當テ其手ヲ放テハ起
テ張リ動クカ如シ其動ヲ見テ活胎ト思フヘカラ
ス何レモ其母ニ問ヒ動クト咎ルニヤハリ活動ニ
非ズ母ノ身ノ起居シ或ハ横様ニ寐テ身ヲ轉スル
故ニ胎ノ四肢伸ヒ或ハ屈シ或ハ母ノ呼吸ニ隨テ
動クアルヘシ姪婦多クハ淺俗ナリ其辭証トスヘ
カラズ又水腫腹滿ノ者若死胎トイヘニ胞衣母ノ

體ニ著所離レヌ中ハ子ノ身モ其位ニアリテ未タ
下タ腹へ落チヌモアリ死胎必下タ腹へ落ルト云
者ニモ非ラス考フヘシ

凡死胎ノ者ハ腰重ク腹ニシマリナシ若久クメ胎
ノ身齶爛スレハ腹中鳴ヘシ然ル者ハ乳汁絞リ出
セハ濁膿汁出ソ又唇上下灰白ニ色ヲ變ス亦舌上
モ色常ナラス又產ノ時漿水臭氣アルヘシ然ニ水
多ク下ル者初ハ臭氣ナクメ水下リ歇テ後臭氣ア
ルヘシ又臭氣ニ厚薄アリ時ニ臨テ考ヘシ
凡產ニ臨テ努力ヲ發スレニ俄ニ止肛門ヘモ敢テ

推ノナキハ死胎ナリ是ハ胎ノ體横骨ト交骨ニ當
リ止リ死胎故ニ下ニ進ムコナキ故ナリ然シ死胎
トイヘ圧頂直ニ産門ニ向ヒ母ニ勢ヒ有テ努力發
スル者ハ産安キトアリ一槩ニスヘカラス尤死胎
ト見定メ進三難キ者ハ回生ノ術ヲ施シ母ノ苦痛
ヲ安スヘシ

凡臨產胎ノ頂ニ先タツテ臍帶ノ出ルニ死胎ト活
胎ノ二種アリ其出ル臍帶ヲ指ニツマンテ試ニ帶
中ニ脉動ナキ者ハ死胎ニ決ス是ハ母ノ血胞衣ニ
ウツシ胎ノ臍ヘ徃來スル脉動ナリ此故ニ活胎ハ

脉動アリテ死胎ハ絶テ脉動ナシ

男女說

凡胎腹ニアリテ男女共ニ面ヲ母ノ脊ノ裏ニ向テ
倒ニ居ル故ニ産科二名アル人トイヘ圧見分カタ
シ此故ニ兒皆伏テ出ル然シ女子ハ産門ヲ出地ニ
落ルニ及シテ身ヲ反シテ仰クヘシ

臨產腰痛說

産科叢蒙曰臨產ノ時腰痛甚キハ此胞衣腰ノ裏ニ
著ク處離レントシテ痛ト余力按ト異ナリ蓋シ滿
月ニ至レハ胞衣最早漸々ニ離レ胎毛隨テ下リ時

ヲ得テ陳瘀腰痛スル様ナリ此兒ノ體陷リ腰ノ裏ニサ、ハル故ナルヘシ獨リ胞衣ノ離ル、一條ノ痛ニアラス又胞衣ノ形ヲ見ルニ蓋シ臨產ノ前ニ離レシ様アリ譬へハ痘瘡熟シ結痂メ放タル形ノ如シ然ハ臨產ノ時俄ニ離ル、ニモ非ゞ又半產墮胎ノ胞衣ハ時ナク俄ニ離ル故ニ不熟ノ痘シイテ痂ヲ放シタル様アリ見分クヘシ

凡死胎產ニ胞衣先ニ出ツルアリ胎後獨リ出トイヘ凡マハリ腰痛甚キハ何グヤ是ヲ以テ明ムヘシ

水血漏下

凡孕婦一ツノ疾アルカ又ハ顛臥シテ腹ヲ動カシ胎悶ヘ水漿下リ或ハ血下ル者ハ前ニ謂ル胎ハ胞膜一囊ノ如ク全ク包ミ子宮ノ裏ニ固著メ裏ト表ノ如シ其中ニ全ク實メ居レハ邪モ水氣モ容易ニ入ルヘカラス然ルヲ物ノ爲ニ障リ有テ動シ悶ヲナサシム故ニ胞膜子宮ニ全ク着ク所表裏本位ニソムキ不和ニナリ其間ヨリ膀胱ノ餘水ヲ漏シ出ス或ハ血漏レ出ルアリ血ハ胞膜ノ外ニアリ又水ヲ漏スコニ種アリ一種ハ膀胱ノ餘水ナリ治シ易シ一種ハ胞膜中ニ僅アル真ノ漿水膜破レテ出ル

者ハ治術モ方モナク半産スヘシ此故ニ水血下ルトイヘ凡胞膜傷レヌ者ハ治シ愈スヘシ胎斜ニ轉スル者ハ按腹整胎ノ術ヲ盡スト肝要ナリ治方ハ安胎湯 膜艾四物湯加半夏ニ宜シ若シ風邪熱アル者ハ逍遙散加山梔子半夏阿膠ニ宜シ其餘ハ証ニ隨フヘキナリ

妊娠腫滿

元妊娠腫滿六種アリ 一者轉胞水腫小便不利ノ者又同症ニ陰門両邊大ニ腫ル者アリ治方同シ小便ヲ利スヘシ腎氣圓ニ宜シ 一者胸ヨリ上面部

肩脊両肘大ニ腫胸以下腫ナキ者多ク治シ難シ產後必ス死ス予治方ナシ 一者面部四肢常ノ如ク腫ナク或瘦セ獨リ腹滿メ裏水ノ症アリ鼓脹ニ非スメ子宮ノ中へ水氣已ニ流レ入ラント欲スル者アリ早ク小便ヲ利メ治セサレハ水氣胞膜中へ入テ死胎トナルヘシ腹ヲ探ルニ内充滿メ胎ノ順逆モ見分ケ難シ又整胎ノ術モ功ナシ治方腎氣圓ニ宜シ腹熱アル者ハ猪苓湯ニ宜シ 一者面部四肢瘦テ腹脹滿メ腹ヲ按ニ内脹滿甚シク妊娠ノ否モ分リ難ク若真ノ鼓脹滿ハ治シ難ク產後必ス死ス

予治方ナシ 一者此証ニ似テ面部胸背両肘瘦腹部両脚腫滿ニメ腹ヲ按ニ堅ク鼓脹ノ如ク指入ラス胎ノ否モ分タス水腫ノ証アリ腎氣圓或ハ禹水湯ニ宜シ 一者轉胞水腫ノ症ニ似テ呼吸短促喘咳大小便秘澁シ或ハ氣急或ハ手足麻痺シ或ハ脚膝弛緩スル者ハ脚氣腫ナリ產前後ニアルアリ忽カセニ爲ヘカラス越婢加蒼朮茯苓ニ宜シ身冷ル者加附子若シ心下和シ難キ者加木瓜枳榔吳茱萸ニ宜シ又胸滿痞氣急衝心セント欲スル者ハ大枳榔湯ニ宜シ惡証ノ者ハ心下痞シ嘔吐或ハ渴甚ク

或ハ數々咳嗽大小便秘澁ス此証大抵大枳榔湯ヲ用ヒテ効アリ熱症者ハ加大黃芒硝犀角ニ宜シ又心下痞氣急大小便澁者甚ハ平水丸兼用ヒテ大ニ効アリ

陰門腫說

凡産前後陰門腫ル者三種アリ一種ハ水腫陰門両邊大ニ腫レフクヘノ如ク皮肉ノ色白精ニメ光アリ腎氣圓若クハ臨產ニ近ク治ヲ急ク者ハ三稜針ノ尖一分計ヲ陰戸両邊ノ所ヲ數處突破レハ水氣ヲ漏スコ兩ノ如シ即日ニ消ス 一種ハ陰門両邊

赤ク腫ル証アリ此証針ヲ忌ム針スレハ血出テ痛ニ堪ヘカタシ龍翔飲ニ宜シ 一種ハ陰門両邊濕氣アル虛弱ノ肉ヲ子婆手莞ク探リ或ハ兒ノ頭出ル時拒サ、ハリ急ニ腫レ痛ムアリ産後蒼木薄荷ノ煎汁ニ綿ヲ浸シ上ケテ絞リ陰門腫タル所ヲ蓋ヒ薰メ宜シ濕熱アル者ハ加黃柏煎メ宜シ若シ陰戸甚ク痒者ハ藥氣ノアル生々乳ノ燒滓ヲ水ニ浸シ上水ヲ綿ニシメシ痒所へ著テ宜シ微シクヒリヒリ痛ミアルハ効アリ痛ナキハ藥氣ナキユエニ効ナシ

驗胎轉動并治術

凡姪娠ノ者月ノ中ニ物ノ爲ニ碍ヘラレ胎轉動メ悶ヘ本位ヲ背ハ前文ニ謂ル胞膜子宮ノ裏ニ全ク著所不和ニナル故ニ腹部急痛ス甚キ者ハ諸食吐逆メ滯食ノ如モアリ或ハ胎ノ三轉メ敢テ痛ヲ覺ヘサル者モアリ然ル者ハ何レ腹部和シ難キカ或ハ腰伸ザルカ或ハ寐テ右カ左カ一方寐苦キ者アリ腹ヲ按テ痛ム所ヲ不和ノ所ト知ルヘシ先婦人ヲ仰卧セシメテ醫者左邊ニ坐メ両ノ手指頭ヲ以テ左右ノ竇門或ハ上脇腹ノ邊又横骨ノ左右ノ

邊稍力ヲ強ク推シ痛アルヤ否ヲ問ヘシ痛アル所
ハ胎轉動メ本位ニ背キシ所ナリ治術ハ痛所ヲ目
的ニ定メヤハリ其所ヲ指頭ヲキヒシク推トキハ
キラクト痛ヘシ若シコラヘカヌル痛様アラハマ
スク緊ク推テヤハリ徐カニ手ヲ引緩ルメ又緊ク
推スコ數回スレハ漸々和合シ全ク愈ニ隨ヒ痛更
ニ止ムヘシ此皆本位ニ復ルナリ輕者ハ一日二三
度施ノ愈ル重者ハ二三日施メ愈ストイフコナシ
又胎本位ニ轉シ此ヲ試ミ推テ痛ヲ覺ヘサル者ア
リ胎ヲ探リ其狀ヲ見分ケ整胎ノ術ヲ施スヘシ極

云愈ヘズト云トナシ蓋シ試ムルニ見ヘヌ所ヲ推
テ知リ又見ヘヌ所ヲ推テ全ク愈ヤスハ予ガ發明
スル所ノ奇術ナリ輕ンスヘカラズ凡テ諸術ノ終
ニハ翼ノ第六ノ術ヲ盡スヘシ

整胎術

凡整胎ノ術ヲ施サント欲セバ前ニ謂ル胎轉動ス
ルヤ否ヲ知リ其術ヲ施シ整胎スヘシ
凡整胎ノ術假令七八月後ハ兒ノ躰大ニメ此ヲ探
ルニ本位ニ背ハ或ハ斜ニ居ナリ或ハ死胎探ハ益
横様ニナルアリ甚シキ者ハ順逆分チナク輪ノ如

ク手ニ應スルアリ又死胎トイヘ凡胎直ニ居ルア
リ活胎モ死胎モ整胎ノ術ハ胎ノ躰ヲ直ニ作スニ
至リテ其術同シ

凡術ノ傳若胎ノ頭右小腹へ寄リシハ尻ハ必ス上
左腹ニアリ醫先ツ右小腹へ倚ル處ノ頭へ両手ノ
指頭ヲアテ任脉ノ下へ推倚セ左手ノ指頭ヲ以テ
其マヽ留メ左腹ノ尻腰アルヘキ所へ右手ノ大指
ノ頭ヲアテ緊ク推胎ノ躰直ニシ毋ノ任脉ト胎ノ
督脉ト重子相合スル様ニスベシ是ヲ本位トス本
位ニ復ラヌ中ハ何遍モ此術ヲ施スベシ此術子玄

子先生ノ發明セル萬代不朽ノ名術ナリ而メ後終
リニ翼ノ第六ノ手術ヲ施シ整和メ置クベシ此ハ
子啓ノ良術ナリ若胎ノ躰カタムクノ左右ノタガ
ヒアラハ其様ニ隨ヒテ術ヲ前ニ倣テ施スヘシ假
令如何様ナル轉動歪斜攣急ノ痛アルトイヘ凡前
ニ謂ル胎轉動治術ト此整胎ノ術トヲ施セバ全ク
治セスト謂丁ナシ第六ノ手術ハ下ノ卷按腹ノ條
下ニ載タリ

攣胎說

凡攣胎ノ腹狀六ヶ月以前ハ見分ケカタシ七月後

ハ漸々前へ突出シ九月臨月ニ及テ其形チ甕ノ如シ一胎ハ母ノ脊ノ邊ニ著一胎ハ前腹ニ居ル且平孕ニモ腹大ナル者アリトイヘ庄其形格別異ナリ又双順胎アリ又雙逆胎アリ又一順一逆孕アリ是ヲ探ルニ手ニ應スル丁各異ナリ又異物孕ノ解シ難キアリ考フヘシ

凡攣胎各ニニメ胞ニツアルアリ又共ニ一胞ノ者アリトイヘ庄各膜ヲ構テアリ圖ニメ下ノ卷ニ見

ハス

凡攣胎雙男子アリ又雙女子アリ又一男一女アリ

又胎ノ身ノ大サ孖共ニ大小ナク同キアリ又一子ハ健ニ大ニメ一子ハ小弱ナルアリ其初生ノ前後ト大小強弱ト両胎一胞ノ者臍帶ノ根本胞ニ著所トヨ糺シ見ル丁化理ノ本ヲ知ルノ要ナリ

凡予カ知ル所ノ孖數產ノ中先ニ生ル、兒多ハ狀大ニメ次ニ生ル、兒多ハ小ナリ又一ツハ正兒一ツハ異物孕ノ者凡三度ユレヲ見ル皆先ニ異物出テ次ニ正兒生ル、ヲ見ル其兒小弱ニメ日中ニ死ヌ母無事ナルモアリ產シ終テ死シタルモアリ

凡胞衣兩胎一胞ノ者ハ形必大ニメ臍帶兩條胞ニ

著ク所其狀三種アリテ定リナシ圖メ下ノ卷ニ記ス

凡攣胎兄弟ヲ名ル事古人ノ說同シカラス其說ヲ
予カ定ル所ハ先胎孕ノ化理ノ次第ヲ悟テ分娩ノ
前後ヲ厭ハス両胎均ク健ニ強者ナル時ハ先ニ出
ルヲ兄ト名ク又両胎共ニ疲弱竝テ大小強弱ナク
均者モヤハリ先ニ出ルヲ兄ト名ク又大小強弱ア
ルハ躰大ニメ健力ニ強者ヲ出産ノ前後ヲ不厭兄
ト名ケテ可ナラン

凡古人ノ說孖先ニ出ルヲ兄ト名ルアリ又其後ノ

世ノ說先ニ出ルヲ弟ト名ルアリ予孖孕ノ數產ヲ
見ルニ凡先ニ孕メル胎腹ニ有リテハ母ノ背ノ邊
ニ著居テ後ニ孕ノ胎ハ前腹ニ有リテ重リ居ル様
アリ按ルニ脊ノ邊ハ先胎ノ居ルヘキ本位ニメヤ
ハリ產門ニ近シ前腹ハ客孕ノ假坐ニメ產門ニ遠
シ故ニ後ニ出ルナリ然レバ胎ノ躰大小強弱ナル
ト又雙順雙逆產又一逆一順產ノ者出ルニ次第不
同アルアリ此故ニ出ル時ノ前後ヲ窮テ名ツケ難
シ化理ノ次第ヲ考テ前文ニ倣テ名クヘシ
又明ノ李空同ノ說ニ孖先ニ出ルヲ弟ト名ケ後ニ

出ルヲ兄ト名ク予其意ヲ按スルニ假令ハ穴ノ中ニ玉ヲニツニ度ニ納レテ又此ヲ出ス次第ノ理ヲ取りテ謬ルニ當ルヤハリ推察ニメ化理ト本位ト二暗シト謂ヘキナリ

巢氏病源論ニ曰陽施シ陰化シ精氣餘アリ故ニ孖ヲ生ト予按スルニ此說ハ交接一度ニメ孿胎品胎品胎孕ニ限ル予ハ信セス凡一胞ニメ孖ヲ孕者ハ蓋シ斯モアランカ胞一ツトイヘニ子膜ハ必各構テアリ案スルニ元來ニツノモノニメ自然ニ肉愈著ノ様アリ又孖一胎大ニメ一胎ハ六七月ノ様ニ

メ小弱ナル者アリ必交接一度ニメ孖ヲ生ト云ヘカラス然レハ品胎品胎ヲ生スル者ハ此モ交接一度ノ精氣ノ餘リト謂ツヘキヤ解シ難キ事ナリ只後人ノ名論ヲ俟ツノミ

臍帶說

凡臍帶ハ胞衣ノ裏ニ著テ胎ノ前腹ニ束子蟠リテ胞衣トノ間ニアリ產ノ時後ニ出ル者ナリ世俗ニモ是ヲ後產トモ又跡產^{アザガタ}也イフ然ルニ臨產努力ヲ發シ胞膜胎ノ頂ノ邊サケテ水漿走リ下リ臍帶若シ胎ノ頂ニ先タチ出ル者アリ此ニ二種アリ一種

ハ前々ヨリ死胎ニナリ胞母ノ腰ノ裏ニ著所何レ
カ毒ニ當テ離テ養ヲ受ケ又故ニ胎死ス胞モ亦虛
ク下ニ落下リ臍帶モ伸下リ頂未タ横骨中ニ入ラ
又其間ヨリ子宮ノ口邊へ落着テアル故ニ頂ニ戴
キ水漿ト共ニ下リ出ル者アリ又胞衣モ共ニ出ル
者アリ又一種ハ胞胎本位ニアリテ無事トイヘ庄
母若シ顛卧ナドメ身ヲ轉動シ臍帶其本位ヲ解下
リテ頂ニ戴キツシテ後ニ頂横骨ノ中ヘイリ下リ
拒ム故ニ臍帶本位ニ復ラスメアル故ニ先タチ出
ル者アリ死胎活胎ヲ悟ラント欲セハ其帶ヲ指ニ

摘ンテ試ムベシ活胎ハ莖中ニ脉動アリ死胎ハ莖
中ニ脉動ナシ此母ノ血胞衣ニウツシ莖中徃來シ
テ胎ヲ養フ脉動ナルヘシ故ニ胞母ノ腰ノ裏ヲ離
レ養ヲ受ケヌ者ハ胎死メ脉動絶スヘシ

流產崩漏分別

凡月水二三月止テ卒ニ下血スル者アリ流產ト崩
漏ト見分ケヲスヘシ何レノ証ニモ腰痛腹痛アル
ヘシ或ハ痛ナク血下ル者アリ先ニ水下リ次ニ血
下ル者ハ半產ノ目的ナリ然シ其下リ物ヲ見分ツ
ヘシ胎八月水終テ凡三十五日ヲ過ル者ハ最早五

体ヲ設テ小巣巢中ノ子ニ似タリ十指狀ヲナシ肌肉精淨ニメ更カニ空キガ如シ此故ニ下血メ穢ヲ拭サル時綿衣ニ當テ潰レ安クシテ見失フコアリ然ル者ハ其下リ物ヲ見分ツヘシ紫黒血ノ中ニ鮮カナル血ト薄黄色ノ物ト白精ノ物交ヘテ有ルハ肌肉潰レテ斯ノ如クナリ半産ノ目的ナリ其餘ハ此ニ倣テ見分ツヘシ經終リテ凡七十五日後ハ胎ノ狀實ノ明カニ分ツヘシ崩漏ノ血ハ紫黒ノ二色ニ限ルヘシ

難產說

凡難產ヲナス者ハ第一鎮帶ヲ緊ク束テ胎ニ碍リ且寐ルニ身ヲ改テ両足ヲ屈シ胎ニ碍リ動カシ悶ヲ成テ或ハ斜ニシ或ハ推倒シ又重物ヲ持チ往來シ或ハ交接ノ時腹ヲ重ク逆ニ推シ腸胃ト共ニ動シ胎ニ悶ヲ成サシム尤モ忌ヘキナリ又程ヲ過ル者ハ腹中ニ死スルカ又ハ推倒シ横產杯ノ大難產ヲナスモノナリ慎ムヘシ

鎮帶說

凡鎮帶ヲ用ユルコハ萬物自然ニマカス時ハ此ニ及ヘカラサレ凡然シ予數百人ノ孕婦ノ意ヲ問ヒ

又其好ム所ノ有様ヲ考ルニ産前後ニ氣ヲ輔ケテ能カラシム然ラハ敢テ捨ヘカラス輕ク程ヨクスヘシ但緊シキヲ忌ムヘシ胎ヲ推シ倒シ難産ヲ求ルモノナリ産後モ同シ

產椅說

凡東都ニ產籠京都ニ產椅ト稱メ三方四方闊キテ箱ノ如キ物ノ中ニ身ヲ躊^シクマラシメ居ラシムルハ害ヲ求テ功ナシ其害ノ八条ハ產論ニ委シ然ニ古昔ヨリ世ノ人漸々習トナリシ事ナレハ害アルト謂フコト知ラス予ハ子玄子先生ノ說ヲ信シ產

婦ヲ見ル毎ニ勧メテ產後必ス身ヲ卧セシメテ數百人試ルニ害ナク宜ク產婦モ亦各々大ニヨロコヒ忽チ健カニ本復スル者多シ按スルニ凡テ苦行ノ者寐テ血氣ヲ安スルニハ身卧セシムルニ勝ルモノナシ是レ自然ナリ

產後保養

凡產後坐草ヲ去テ蓐ニ身ヲ著シムルニ必ス身ヲ立テ歩行スヘカラス膝頭ヲ地ニ著ケ靜カニ著シムヘシ枕ヲ常ヨリ少シ小高クシ先ニ右ヲ地ニ著ケ卧シメ兩足ノ伸ヘ屈メノコハ婦ノ意ニ任セテ

宜シキナリ只身ヲ反リテ卧ヲ忌ムヘシ假令健婦トイヘ凡兩三日身ヲ直ニ立ツ事ナカレ血室ヲ動スレハ氣逆メ血暈ヲ發スル基トナルヘシ故ニ身ヲ卧テ安シスルヲ宜トス産籠産椅ノ類ニ身ヲ蟠マラセテ居ラシムレハ倦テ身ヲ動シ氣血ヲ動シ惡証ヲ發ス此故ニ予カ郷ニ用ル産所ニ物ヲ積テ産婦ヲ寄著シメ躊マラシムルヲ凡十一日夜スルモノハ其苦ムノ産籠ニ同シ皆忌ムヘシ

凡産後身ヲ起シテ躊マリ居テ血暈ヲ發ル者アレハ予ハ必ス勸メテ身ヲ卧シムルハ輕キ者ハ藥セ

スシテ立地ニ愈ニ又重者トイヘ凡服藥セ又前二忽千半ハ愈ル程ノ功アル者多シ
産後腹狀說

凡産後一兩日ノ中ニ腹ヲ探見ルニ一物大塊アル者アリ胎ノ有様ニ似タリ數人試ルニ瘀血ノ三二非ス腹中ノ寒熱ニ因テ子宮努テシボマス鼓脹ノ如ク中ニ物充滿メアル様ニ手ニ應スル者アリ僅ノ瘀血モ十倍ニ滿メアル様ニ見ユルヲアリ其治方腹冷ノ者ハ折衝飲加附子或ハ木柾湯加附子ナド宜シ熱証者大黃牡丹皮湯ニテ宜シ瘀血下リ子

宮縮マリ本位ニ復シ消スルガ如ク愈又一種横骨ノ上邊ニ當テ大椀ノ程ノ狀丸キ一塊アルニアリ疑テ一槻ニ孖或ハ異物塊ト謬ル可ラス是ハ子宮東テ瘀血ヲ包ムニアリ謬テ手ヲ以テ推シ下へカラス若シ胎ノ類ニメ出ヘキ物ハ止事ナク努力アルヘシ子宮ノ口邊ヲ探テ見分クヘシ

讓產門術

凡臨產已ニ胎ノ頂出ル時陰門ト肛門ノ界肉糸ノ如ク細クメ危シ此ヲ傷ルハ子婆ノ謬ナリ胎ノ頂肛門ヲ突張ルヲ待テ醫尾手ノ掌ヲ以テ肛門ヲ推

留メ片手ヲ以テ母ノ身ヲ抱金肩ヲ以テ前腹ニ當テ已ニ兒ノ頭門外へ出兒ノ両肩交骨ニ拒澁ル者ハ兒ノ頸ヲ摑努力ト共ニ引出スヘシ肛門ニ當ル掌ハ兒出ルマテ去ルヘカラス然ヌレハ陰門傷ルルコナシ

姑ニ救初生虛兒說

凡難產初生ノ兒坐草ノ上ニ於テ身弱ニトメ啼クコナキハ命危シ如此モノハ急ニ頂ト胸腹或ハ脊ノ邊ヲ數遍撫テ勢ヲツケヘシシカノ虛里ノ動ヲ診フニ米粒程ノ動氣アル者ハ必ス活ク動氣絶テ

ナキモノハ死ス

小兒頂後有癰說

凡小兒頂ノ後ニ横様ニハゲシ文アリ此ハ母ノ腹ニアリテ頂横骨ノ中ニ入り拒テ嚙シアトナリ此故ニ胎ノ頭上腹ニ位シ頂横骨ノ中ニ入ラヌ者ハ拒ム丁ナク嚙レ又故ニハゲノ文薄シ又逆孕ノ兒ハハゲ薄シ或ハナシ横骨中ニ入ラヌ者子宮ニ緩ルク當ルノミ

小兒腰青痕說

或曰小兒ノ腰脊ノ邊ニ青タ班文アリ漸ニ三年ニ

メ消ス如何トナレハ是死血ノ痕ナリ胎ニアリテ倒ニ居ル八月後ハ尻腰ヲ鳩尾ノ下ニ置ク故ニ飲食熱物ノ氣ヲ受ル丁數百度因テ其邊死血トナルヘシ然レ由熱物胃中ニ納リテハ外ヘ其氣受ル所ナシ又才モヘラク遙孕ノ者ハ頂ヲ脇肋ノ下ノ邊或ハ右或ハ左ヘテラシ肩背ヲヤハリ中脘ノ邊ニ置クトイヘ由熱物ノ通ル邊ヲ少ク除テ居故ニ其氣ヲ受ルニ遠シ故ニ死血ノ痕僅ニ肩背ニアルアリ或ハナシ然シコレハ予ガ未タ知ラヌコナリ

囊胎說

囊胎ハ別ニ名アル事ヲ聞カス諸産ノ胎皆胞膜ニ全ク包マレテ居ル其胞膜傷レスメ其儘出ルヲ去ナリ予滿月ノ囊胎産又七月ノ囊胎産ヲ見ルニ胞衣ヲ前腹ニ蓋テ其間ニ臍帶ヲ束ワダカマリ有テ圖ノ如ク身ヲ潛メテ居ル又諸産アル毎ニ胞膜ヲヒロゲ整テ見ルニ頂ヲ以テ膜ヲ突破リ出シ穴ハ胞肉ノ近所ニアリ圖ニメ下ノ卷ニ見ス是ヲ察スルニ胞肉ノ所ハ胎ノ尻ト頭トヲ蓋フヘキ様ナシ囊胎ノ様ト合スル時ハ考ルニ胞衣母ノ腰ノ裏ニ著テ養ノ血ヲ受ルニ疑ナシ逆孕此ニ反スルノミ

産論ノ說胞衣胎ノ尻上ヲ蓋テ母ノ鳩尾ノ下ニ有リト此一条ハ有識ト雖匪謬レルカ

又産論翼ヲ視ルニ囊胎ノ狀謬アリ先生異物ヲ見謬レルカ又胞衣胎ノ尻ニ有テ表裏ノ謬アリ是ハ筆者謬ルカ

凡胞膜出ルニ腹ニ於テ裏反リテ出ル者多シ是ハ先ニ兒出ル時臍帶ヲ引テ出レハナリ又胞自ラ安ク出ル者ハ表裏反ラス其マヽ出ルモアリ定リナシ圖ニシテ下ノ卷ニアリ

背面倒首論

產論曰腹中ノ胎大抵五月ノ後大サ瓜ノ如ク必ス
背面ノ首ヲ倒ニス其頂横骨ノ上際ニ當テ居リ臨
月ニ至テ此ヲ按テ其體貌ヲ別テ而盡スコト得ヘ
シト此一条ハ古今未發ノ確論ニメ賀川氏ノ此科
ニ於ケル實ニ我邦及唐土ノ諸名醫ト雖云未聞
及又丁ヲ發明スル名家ナリ然ルニ解體新書ヲ覽
ルニ其言ニ產論ノ胎腹中ニ有テ始ヨリ首ヲ倒ニ
メ居ルト謂ル說ヲ妄言ナリト大ニ笑ヘリ然凡其
書ニ又曰後長州譯官橋林氏所藏ノ諳厄利亞國ノ
產科ノ書ニ元ヨリ倒首ニ定ム其言子玄子ノ說ト

暗ニ符合スル故ニ彼笑タルノ大謬ナリシ事ヲ知
ルトアリ予又按スルニ學バスメ疑者ハ俗ナリ先
此道ヲ學ヒ試ント欲セバ初心ノ者ハ九月臨月ニ
及テ姪婦ヲ帶ヲ解シメ仰卧セシメ兩足ヲ屈セシ
メ小腹ノ下横骨ノ上ノ際^キヲ醫右ノ手ノ指ヲ聳テ
任脉ヲマタガリ腹中ヲ深ク推シ擗ム様ニメ動力
シ見レバ順孕ノ者ハ胎頂丸ク堅ク指ニ應スルコ
明カナリ逆孕ハコレニ反ス只試シテ疑者大俗
ノ癖言ナリ又姪婦自身ニ腹中ヲ探リ否ヲ悟ント
欲スル者八九月後ニ及ヒ我身ヲ前ニイヘル様ニ

仰卧シ左右ノ手ノ中指ノ頭ヲ小腹ノ下左右へ當
テ横骨ノ上ノ際任脉ノ下ヲ深ク推動カシ見レハ
兒ノ頭明カニ見ヘルナリ而シテ整胎ノ術モ自身
ニナルコナリ其術ト謂ルモノハ此書ニ有ル術ニ
メ但他人ノ術ト異ナルノ三術ノ意味ハ同ジ予ガ
里ニ姪婦アレハ此ヲ曉スニ得ル者多シ此後世ノ
俗婦人自身安難ヲ知ルノ大ナル益ナリ然ルニ一
兩人愚ナル女アリテ數度サトセ凡其得ルコナク
疑テ居ル予モ亦如何セント按シ術コ替テ其女ニ
サトス其法姪婦自身ノ指ニ本陰戸ノ中へ入サシ

メ子宮ノ口邊ヲ探ラシムルニ九月後ハ兒ノ頭堅
タ丸タ指頭ニヨリツク其様已ニ生レ出ント欲ス
ル時ノ様ニ似タリ其女是ヲ探得テ大ニ驚キ倒ニ
居ルト謂ルコノ始テ知ルナリ又逆孕ハ横骨ノ中
子宮ノ口邊ヘ兩足ノ踵ノ尖ヲ垂レテ居ルヘシ凡
ツ整胎ノ術ニ及テハ先腹狀ヲ探リ胎ノ否ヲ知リ
術ヲ盡シ胎ノ督脉ト母ノ任脉トメ重子相合テ
常ニ相離レヌ様ニ致シ其位ニ安シズル時ハ胞胎
俱ニ堅固ニメ臨産ノ時横礙ノ難產ナシ此術ハ子
亥子先生ノ名術ニメ恐クハ萬代不朽ノ大法ナリ

半産說

凡半産スル者ニ必ス故アリテ死胎ニナリ半産スルアリ又一ノ病ヲ發テ其妻ニ傷ラレ死胎トナリテ半産スルアリ又身ヲ顛卧スルカ或ハ打撲ノ類ニテ胎轉動シ胞膜傷レテ半産スルアリ或ハ好テ墮胎ノ坐藥ヲ用ヒテ半産スルアリ顛卧打撲坐藥ノ三種急ニ傷ルハ半産ハ是ヲ本産ニ比スルニ殊ニ危シ恐ルヘシ慎ムヘシ按スルニ本産ハ時刻十分熟シテ催シ胞衣腰脹八髎ノ邊ニ著所自然天理ニテ離レ胞ニ移ス經水モ亦自然ト止テ變シテ上

リ乳汁トナルヘシ故ニ胞膜離ルトイヘ血氣ノ巡リ靜ニメ兒モ亦下へ進ニ安ク故ニ陣疼自ラ下ニ達シ努力ヲナス丁臨產ノ本位ナリ然ルニ半産ハ未タ熟セヌヨ強テ傷リ胞衣ヲ放ツ故ニ母ヨリ移ス經水獨リ專ラ流出受ル所ナク氣血ヲ散亂ス此真ノ敗血ニシテ若シ上衝スレハ血暈シ氣急シ或ハ鬱冒シ或ハ角弓反張メ諸惡証ヲ發ス十二ナカラ危シ譬ハ過テ痘ヲ敗テ膿ヲ漏スガ如シ慎ムヘシ慎ムヘシ

忌房事說

凡産前多房ノ者ハ産後尋勞ヲ病ヘシ此妊娠中ノ大ナル戒トス又産後房事ヲ忌ム丁健婦トイヘ庄オヨワ三月忌ムヘシ卒ニ崩漏ノ疾ヲ患ル丁アリ

兒啼母腹中說

予カ本科ノ師木更津遠山玄門君ノ妻其母ハ予カ隣家ヨリ嫁ス妊娠十二月ニメ母ノ腹内ニ於テ啼聲アリ藥治ナク自止ム同月下旬安産メ母子俱ニ恙ナシ其人今年六十四歳予聞テヨレヲ疑フ然ルニ又予カ知ル所ノ農家ノ妻姪テ十月然ル者ヲ見ル其聲呼吸ノ音ナシ但發音ノミ是亦藥治ナク自

止ナリ予甚其理ヲ疑フ然ルニ醫官多紀櫟蔭先生ノ醫賸ニ其說アリ因テ始テ是ヲ明メ得タリ今其文ヲ左ニ出ス

醫賸曰玉芝堂談薈云雞跖集王疊逸母孕時腹中啼聲宋孝武大明中張暢妾懷孕而干腹中啼聲聞于外又後廢帝元徽中車莞徐垣妻懷孕亦然曠園雜志云康熙三十八年柏某分巡江西有胥役吳敬婦懷八月腹中忽呱々作聲一時喧傳杭州有柴北溟善醫客柏署柏因囑徃視見婦極委頓而腹中作聲不止舉家驚恐柴坐定審視良久顧座間有象棋一盒隨手散傾

於地令人掖婦逐一拾起納奩中逾時拾至三十三枚而聲止按虞氏正傳云臍帶上疣瘡乃兒口中含者因姪婦登高取物脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰向地拾物使兒復得含入口中卽止柴乃用此術耳不足爲奇予昔聞先慈言予亦在先慈腹中作聲者數次

周西按前文曠園襍志ト虞氏正傳ノ二說予ハコレヲ信セス胎腹中ニ啼聲アリト雖凡自ラ止ムヘシ按姪婦虛冷者腹熱者或痘熱疹熱ノ毒ニ中リ悶ヘテナストイヘテ啼聲ヲキカズ然ルニ萬一啼聲アルハ奇ナリ故ニ治方ナシト雖凡止ム

トアラレ恐ヘキニ足ラス

母死活兒術

臨產未タ兒出ヌニ母急ニ惡証ヲ發メ忽チ死シ兒腹中ニ動テ命アルハ急ニ一生ノ術ヲ以テ出シ兒ヲ活スヘシ假令母子俱ニ死スト雖凡此術ヲ以テ施セハ出產有ヘシ尤モ書記ス凡初心ノ者ニ得難シ故ニ熟術ノ者ニ口傳スルノミ

回生鉤胞術

子玄氏先生回生鉤胞ノ術ハ究テ神奥ニノ筆墨ノ及フ所ニ非ストテ口授ニ傳ヘ來リシトアリ故ニ

予モ亦門人ニ先ツ他ノ諸術ヲ教へ熟シ得セシメテ後ニ初テ其術ヲ傳ルナリ

凡回生ノ術ハ神奥ニメ未熟ノ及フ所ニ非ス然ト雖凡回生ノ術ハ横癱産ニメ頂産門ニ趣カザル者ハ術ヲ以テ皆逆産ノ狀ニ作テ出ス術ナリ因テ他術熟タル者深ク参考スヘシ予ハ師授ナクシテ只産論ヲ熟讀スル丁數百遍ニメ潭思專精ニメ屢試テ得タルモノナリ

経験方

大三十六首

臨産ノ者ニ古來ヨリ催生ト稱スル方アリト雖吾カ門ニ催生ト定タル方ナシ只臨産ハ虛實冷熱ヲ察メ証ニ隨ヒ方ヲ處スヘシ應スル時ハ安産ス若シ餘証ノアル者ハ其証ニ隨テ方ヲ施スヘシ又臨產ノ者ニ一向催生ノ爲ト思ヒ故ナク牡丹皮桃仁大黃芒硝等ノ破血ノ劑ヲ投スル者アリ忌ムヘシ強テ用ユレハ氣血ヲ動カシ後ニ寒熱汗渴ヲ發ル者アリ然レ凡産後ニハ破血ノ劑良トスヘシ凡臨產元氣常ノ如クニメ只身冷ル者ハ桂枝加芍

藥附子湯只氣弱者ハ四君子湯或ハ附子ヲ加フ餘
ハ証ニ隨フヘシ

桂枝加附子湯

桂枝兩 附子一枚 芍藥兩 甘艸兩 生薑兩 大棗二十枚

右水煎服 婕娠寒涼ニ中リテ胎悶腹痛スル
者ニ宜シ 腹痛輕者アリ又重者痛々ヘ難キ
アリ此方ニ宜シトス 又臨產身冷ル者宜シ

小建中湯 或加附子

桂枝兩 甘艸一兩 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑

兩三 膠鈴一升

右水煎服 產前後寒涼ニ中リテ腹痛拘急ス
ル者ニ宜シ 又臟弱ク孕毎ニ死胎ニ及フ者
腹冷者加阿膠附子ニ宜シ

安胎湯

白朮 茯苓 黃芪 甘艸 當歸

川芎 芍藥 生芍

半夏 地榆

阿膠各等

阿膠八 櫟様ト稱

右姜水煎服 胎倦惡食或ハ胎動腹痛或ハ下
血發熱者ヲ治ス又加縮砂モ可ナリ或ハ顛卧

在卦指掌 卷之三

三十五

メ胎動下血或ハ水下ルト雖妊娠子膜不破者又
毎孕胎死腹中者胎ヲ養ヒ活ス

加味腎氣圓

地黃一
麥 茯苓五
分 牛膝八
分 桂枝一
錢 澤瀉一
錢
車前子五
分 山藥五
分 牡丹皮三
分 山茱萸三
分
附子八
分 右水煎服

治妊娠轉胞腫滿小便不利身冷者

猪苓湯

猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石各等
分

右水煎服 或加車前子

治小便不利腫滿身熱者木若シ先ニ身冷腫滿
小便不利メ腎氣圓ノ應スル症ト雖妊娠風邪ニ
中リテ身熱スル者ハ腎氣圓應セガルキハ宜
シク此方ヲ服スヘシ

膠艾四物湯

當歸 生芍各三
錢 芍藥二
錢 川芎一
錢 艾葉三
分
阿膠三
錢 右水煎服 治每孕二三月必墮胎者
腹冷者加附子又外邪身熱或ハ寒熱汗出者逍
遙散加山梔子阿膠邪解テ後宜服前方 按ス
ルニ阿膠ニ數品アリ硯様豆
茶又玉樣豆
茶ハ上品ナリ

櫛様ハ次ナリ和製ノ炒テ豆粒ノ如キ者ハ効ナシ

第一和劑湯

白术 黃芩 茯苓 各一當歸 乾薑 川芎
茯苓 桂枝各五分 右水煎服 但胎墮スル症ニ
ハ加阿膠大半夏中 産前後氣血虛寒熱自汗
盜汗者ヲ治ス 又每孕ニ死胎ヲ産スル者此
湯ヲ用ルキハ活スヘシ

真武湯

茯苓 茯苓 生姜 白术各三分 附子二分

右水煎服 産前後大便下利腹冷者ニ宜シ如
シ不止者如神丸ヲ兼用メ有効 又每孕胎死
メ墮ル者ハ加阿膠半夏

八珍湯

人參 白术 當歸 茯苓 川芎 生乾地黃
芍藥各等分 甘艸少 右水煎服
治妊娠氣血不足又產後怔忡氣血虛驚恐者
又每孕死胎墮者早ク本方ニ加阿膠半夏ヲ用
テ活スヘシ腹冷者ハ更ニ加附子

沈香天麻湯

沈香 益智 川烏頭各二 天麻 防風

半夏 附子各三 姜活五 甘艸少 當歸

薑蠶各一 獨活四 右水煎服

此方產前產後凡ニワノ人ニ隨ヒ用テアヤド
ル方ナリ平生痼証アル者臨產ニ催生ニ督ヘ
用ヒテ効アリ產後ノ肥立モ甚ヨロシ其他經
驗スルトヨロ左ノ如シ

氣鬱メ眩暉頭痛背強リ心胸動氣アリ心下痞
レ或痛三身乍寒乍熱或ハ自汗盜汗或ハ欠數
々毎夜夢驚或ハ毎夜不眠或ハ手足指麻痺或

ハ乳房堅痛乳汁不通或ハ月水不順或ハ崩漏
不止或ハ身冷者白帶下或ハ大人小兒雀目小
兒夜啼不止身冷者或ハ瘦弱者又產後眼目如
常日夜暗者等皆宜シ又產後不語者ニ宜シ又
癪甚者角弓反張シ左脇下へ鉄棒ノ如キモノ
見レ動シ人事ヲ不知呼吸如絶更ニ聲ナキハ
診脉ノ量ルヘシ又頭痛甚者又肩背強リ甚シ
ク難堪者亦宜シ

紫蘿和氣飲

當歸 川芎 白芍酒製人參 紫蘿 陳皮

大腹皮 甘艸 右生姜水煎

子懸者心胃脹痛ナリ兼胎氣不和心腹脹滿疼
痛及胎前諸疾此方ニ依テ加減スヘシ

腹痛加木香香附 咳嗽加桑白枳殼 腹熱加
黃芩 嘔吐加砂仁半夏 傷食加山楂子香附

麥芽 氣惱加烏藥香附 身冷寒汗加桂枝

腹虛冷者加附子

此方胎腹不和ノ者ニ宜シ若シ寒邪腹ニ入テ
痛冷者久ク小建中湯或ハ桂枝加附子湯等ノ
温補ノ劑ヲ服メ藥反テ膈ニ泥ム者此湯ヲ以

テ氣ヲ和スレハ則痛自止ム

四君子湯

人參 白朮 茯苓各二 甘艸

右姜棗水煎

脾胃元氣虛弱飲食少思又飲食難化作酸屬虛
火者ニ宜シ又每孕死胎ト成リ藏氣虛弱者ニ
用ニ此方活胎ニハ加附子阿膠半夏又加半夏
陳皮爲六君子湯用ニ或ハ加炮姜附子用ニ

正氣天香湯

香附子六 烏藥一錢陳皮 紫蘋 乾姜各六
半

甘艸少 右水煎熱服又加沈香大腹皮當飯尤
有効

婦人一切諸氣作痛或ハ上湊心胸或ハ攻築脇
肋メ腹中結塊發渴刺痛月水因之不調或八肢
暉嘔吐往來寒熱無問產前產後一切ノ氣滯皆
治ス

按スルニ姪娠鬱氣心腹不和而痛者ニ宜シ

虎翼飲

半夏八
錢 茯苓四
錢 青皮一
錢 生姜半
錢

伏龍肝汁煎服

姪娠惡阻心下滿メ嘔吐者ニ宜シ或加丁香藿
香或加附子

乾姜人參半夏丸

乾姜 人參直根各一兩 半夏二
兩 生地黃步

右爲丸或水煎服或加附子

治姪娠嘔吐不止者

蕷連湯 治子癟

人參直根一錢 黃連五
錢

右水二合煎一合服

熊參湯 治子癟

熊膽上品五分 直根人參二錢

右先以水二合煎直根人參至一合去滓內熊膽

攬化頓服

禹水湯

赤小豆炒五錢 沈香四錢 木通二錢 木瓜二錢 潭鴟

二錢

冬葵子一錢

商陸

猪苓

杜仲各二錢

甘

艸少少 右水煎

治水腫及脚氣小便不利諸藥無効者心下不滿他ノ急証ナキ者宜服

龍翔飲

麻黃 大棗 蒼朮各一錢 石膏三錢 甘艸一分

生姜一錢 右水煎服

煩燥口渴浮躁有熱而大便秘泄或四肢麻痺者二宜之 又妊娠陰門兩邊赤腫者八針ヲ忌ム此方ニ宜シ

洞當飲

柴胡 黃芩 黃連 茯苓 半夏 生姜 青皮各五分 甘艸一錢 茵藥一錢

右水煎服

吐血衄血卒胸痛者是盛怒而其氣暴逆メ得ル

所ナリ龍騰飲兼用メ宜シ

一婦人姪娠微寒、熱血齧肉ヨリ逆出メ不止丁
三日此湯ヲ以テ龍騰飲ヲ兼用メ速ニ愈ユ

龍騰飲

川芎 黃芩 黃連各一
大黃五分

右熱湯擺出メ用ユ一方黃柏一錢アリ
吐血衄血ノ者ニ洞當飲ト兼用ス

外臺秘要方

鯉魚二斤 糜米一升

右如法作臍少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月

中頓三過作効安穩無忌

療姪娠數々傷胎者

予按鯉魚能利蓄水故可令服之

千金方

丹參十二兩以好酒五升煮取三升分三服

治姪娠胎蔭下血不止方

丹參舶來ノ物ヲ用ユヘシ和產疑ハシキ物
ナリ

又方 治姪娠數臨胎方亦治姪娠數月經尚來者
赤小豆爲末好酒服方寸匕日二度

又方

生地黃汁和代赭石末服方寸匕
外臺甘遂散

療妊娠子淋大小便並不利氣急服猪苓散不差
者甘遂散下之

甘遂

二兩

右擣以白密二合和服如豆


朱明丸

蕎麥一兩 大黃三兩

右爲末糊丸每服一錢白湯送下

任辰復滿大便燥者二宜之

5年2月



產科指南卷上畢

產科指南

卷之上畢

四三

又方

又生地黃汁和代赭石末服方寸匕

外臺甘遂散

療妊娠子淋大小便並不利氣急服猪苓散不差者甘遂散下之

甘遂二兩

右擣以白密二合和服如豆

朱明丸

蕎麥一兩 大黃三兩

右爲末糊丸每服一錢白湯送下

妊娠腹滿大便燥者二宜之

