

SIMIARUM

ET

VESPERTILIONUM BRASILIENSIIUM

SPECIES NOVAE,

OU

HISTOIRE NATURELLE

DES ESPÈCES NOUVELLES

DE SINGES ET DE CHAUVES-SOURIS

OBSERVÉES ET RECUEILLIES PENDANT LE VOYAGE DANS L'INTÉRIEUR DU BRÉSIL

EXÉCUTÉ PAR ORDRE

DE S. M. LE ROI DE BAVIÈRE

DANS LES ANNÉES 1817, 1818, 1819, 1820,

PUBLIÉE

PAR JEAN DE SPIX,

CHEVALIER DE L'ORDRE CIVIL DE LA COURONNE DE BAVIÈRE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MUNICH, CONSERVATEUR DU MUSÉE ZOOLOGIQUE ET ANATOMIQUE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES CURIEUX DE LA NATURE, DES SOCIÉTÉS DES SCIENCES D'EDIMBOURG, DE MOSCOU, DE MARBOURG, DE BONN, DE FRANCFORT.



MONACHII

TYPIS FRANCISCI SERAPHICI HÜBSCHMANNI.

MDCCCXXIII.

S I M I A E

B R A S I L I E N S E S.

I N D E X
O P E R I S.

T A B L E
D E S
A R T I C L E S C O N T E N U S
D A N S C E T O U V R A G E.

S I M I A E B R A S I L I E N S E S.

Praefatio tractat de numero simiarum hucusque cognitarum,
de cognitione specierum singularium successive acquisita,
de viris de illis detegendis ac describendis meritis,
de notis characteristicis generalibus simiarum Asiae et Africae indigenarum et cum illis Americae comparatarum.
Pag. I. — VIII.

Systema simiarum Americae Pag. 1.

Familia I. TRICHIURI.

Character essentialis et generalis.

Genus 1. CEBUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Cebus Macrocephalus (Prego Brasiliensibus.)
Pag. 5 Tab. I.
" 2. " libidinosus (Saá). Pag. 5 T. II.
" 3. " xanthocephalus (Macaco, Mico.)
Pag. 6 T. III.
" 4. " unicolor Pag. 7 T. IV.
" 5. " gracilis (Cairara) Pag. 8 T. V.
" 6. " cucullatus Pag. 9 T. VI.

Genus 2. BRACHYURUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Brachyurus Israelita Pag. 11 T. VII.
" 2. " Ouakary (Ouakary) Pag. 12 T. VIII.

Genus 3. PITHECIA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Pithecia hirsuta (Parauaçú) Pag. 14 T. IX.
" 2. " inusta (Paraná) Pag. 15 T. X.
" 3. " capillamentosa Pag. 16 T. XI.

Genus 4. CALLITHRIX.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Callithrix personata Pag. 18 T. XII.
" 2. " amicta Pag. 19 T. XIII.
" 3. " cinerascens Pag. 20 T. XIV.
" 4. " Nigrifrons Pag. 21 T. XV.
" 5. " Chigot (Chico) Pag. 22 T. XVI.
" 6. " cuprea (Oyapuçá) Pag. 25 T. XVII.

Genus 5. NYCTIPITHECUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Nyctipithecus felinus (Yúá) Pag. 24 T. XVIII.
" 2. " vociferans (Cará) Pag. 25 T. XIX.

Genus 6. MIDAS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Midas Fuscicollis Pag. 27 T. XX.
" 2. " Nigricollis Pag. 28 T. XXI.
" 3. " Mystax Pag. 29 T. XXII.

LES SINGES DU BRÉSIL.

La préface traite des différentes espèces de Singes successivement découvertes,
des savans qui se sont occupés de leur histoire;
des mœurs et des caractères des singes d'Amérique comparés avec ceux de l'ancien continent . . . Page I—V.
Le Système des singes de l'Amérique en général, et du Brésil en particulier Page 1

PREMIÈRE FAMILLE.

Character général et particulier.

Genre 1. SAPAJOU.

Character général et particulier.

- Espèce 1. Le Sapajou à grosse tête Page 4 Planché I.
" 2. " lascif (Saá) P. 5 " II.
" 3. " à tête fauve P. 7 " III.
" 4. " à seule couleur P. 8 " IV.
" 5. " maigre (Cairara) P. 9 " V.
" 6. " à Capuchon P. 10 " VI.

Genre 2. COURTE-QUEUE.

Character général et particulier.

- Espèces 1. Le Courte-Queue Juif P. 11 Pl. VII.
" 2. " " " Ouakary P. 13 " VIII.

Genre 3. SAKY (Parauá.)

Character général et particulier.

- Espèce 1. Le Saky-Ours P. 15 Pl. IX.
" 2. " " brûlé P. 16 " X.
" 3. " " à Perruque P. 17 " XI.

Genre 4. SAGOIN.

Character général et particulier.

- Espèce 1. Le Sagoin à tête et mains P. 19 Pl. XII.
noires
" 2. " " à collier blanc P. 20 " XIII.
" 3. " " à couleur de souris P. 21 " XIV.
" 4. " " à front noir P. 22 " XV.
" 5. " " Chigo (Chico) P. 23 " XVI.
" 6. " " cuivré (Oyapuçá) P. 24 " XVII.

Genre 5. NYCTIPITHÈQUE.

Character général et particulier.

- Espèce 1. Le Nyctipithèque à face de chat P. 24 Pl. XVIII.
" 2. " " Babillard brun P. 25 " XIX.

Genre 6. TAMARIN. (São hó)

Character général et particulier.

- Espèce 1. Le Tamarin à tête et hausse-col bruns P. 28 Pl. XX.
" 2. " " à hausse-col et pattes noirs
et à jambes châtaines " 29 " XXI.
" 3. " Moustache " 29 " XXII.

- Species 4. Midas Oedipus (Varietas) P. 50 T. XXIII.
 „ 5. „ bicolor . . . „ 50 „ XXIV. F. 1.

Genus 7. IACCHUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Iacchus Pygmaeus . . P. 52 T. XXIV. F. 2.
 „ 2. „ Albicollis . . . „ 53 „ XXV.
 „ 3. „ penicillatus (Sãohy) „ 54 „ XXVI.

Familia II. GYMNURI.

Character essentialis et generalis.

Genus 8. ATELES.

Genus 9. BRACHYTELES.

Character essentialis et generalis

- Species 1. Brachyteles Macrotarsus
 (Miriki) . . P. 56 T. XXVII.

Genus 10. GASTRIMARGUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Gastrimargus olivaceus (Ba-
 rigudo) . . P. 59 T. XXVIII.
 „ 2. „ infumatus . . „ 41 „ XXIX.

Genus 11. MYCETES.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Mycetes fuscus (Mono) . P. 43 T. XXX.
 „ 2. „ stramineus (Ara-
 bato) . . . „ 45 „ XXXI.
 „ 3. „ barbatus (Bugiu,
 Barbado) . . „ 46 „ XXXII.
 „ 4. „ discolor (Gua- et XXXIII.
 riba) . . . P. 48 T. XXXIV.

- Espèce 4. Le Tamarin Pinche . . P. 50 Pl. XXIII.
 „ 5. „ „ à moitié blanc . „ 51 „ XXIV. F. 1.

Genre 7. OUISTITI.

Caractère général et particulier.

- Espèces 1. L'Ouistiti mignon . . P. 52 Pl. XXIV. F. 2.
 „ 2. „ „ à pinceaux et haus-
 se-col blancs . „ 55 „ XXV.
 „ 3. „ Pinceau . . . „ 55 „ XXVI.

SECONDE FAMILLE.

Caractère général et particulier.

Genre 8. ATÈLE. (Coatà).

Genre 9. COURT-POUCE. (Miriki).

Caractère général et particulier.

- Espèce 1. Le Court-pouce à long bras . P. 57 Pl. XXVII.

Genre 10. VENTRU. (Barigudo).

Caractère général et particulier.

- Espèce 1. Le Ventru olivâtre . . . P. 40 Pl. XXVIII.
 „ 2. „ „ à couleur de martre „ 42 „ XXIX.

Genre 11. ALOUATE.

Caractère général et particulier.

- Espèce 1. L'Alouate brun . . . P. 44 Pl. XXX.
 „ 2. „ „ à couleur de paille P. 46 Pl. XXXI.
 „ 3. „ „ à grosse barbe, le mâle
 et la femelle avec
 son jeune sur le dos „ 48 „ XXXII.
 „ 4. „ varié . . . „ 49 „ XXXIII.

Vespertiliones brasilienses.

(Morçegos brasiliensibus.)

Praefatio ac Systema pag. 53 — 55.

Familia I. ANISTIOPHORI.

Character essentialis et generalis.

Genus 1. NOCTILIO.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Noctilio rufus . . P. 57 T. XXXV. F. 1.
 „ 2. „ Albiventer „ 58 „ „ F. 2, 3.

Genus 2. MOLOSSUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Molossus ursinus . P. 59 T. XXXV. F. 4.
 „ 2. „ „ nasutus . „ 60 „ „ „ 7.
 „ 3. „ „ fumarius . „ 60 „ „ „ 5, 6.

Genus 3. THYROPTERA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Thyroptera bicolor . P. 61 T. XXXVI. F. 9.

Genus 4. PROBOSCIDEA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Proboscidea saxatilis P. 62 T. XXXV. F. 8.
 „ 2. „ „ rivalis . „ 62.

Genus 5. VESPERTILIO.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Vespertilio brasiliensis. P. 63 XXXVI. F. 8.

Familia II. ISTIOPHORI.

Character essentialis et generalis.

Genus 6. VAMPYRUS.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Vampyrus cirrhosus P. 64 T. XXXVI. F. 3.
 „ 2. „ „ Bidens „ 65 „ „ „ 5.
 „ 3. „ „ soricinus „ 65 „ „ „ 2, 6.

Genus 7. PHYLLOSTOMA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Phyllostoma plani-
 rostre . . P. 66 T. XXXVI. F. 1.

Genus 8. GLOSSOPHAGA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Glossophaga amplexi-
 caudata . . P. 67 T. XXXVI. F. 4.

Genus 9. DIPHYLLA.

Character essentialis et generalis.

- Species 1. Diphylla ecaudata . P. 68 T. XXXVI. F. 7.

PRÆFATIO.

Simiarum genus structura corporis et facultate quadam rationi analoga hominibus perquam affine, prae reliquis regni animalis civibus naturae scrutatorum solertiam maxime semper exercuit, qui, quotquot illarum species essent, noscere, suisque museis inferre ut possent, summa contentione allaborarunt. Quorum quidem votis studiisque ea in re nihil faustius successit, quam Europaeorum ad alias orbis terrarum regiones accedentium industria, qua factum est, ut, quo majores in perscrutanda istarum regionum indole progressus fierent, eo major simiarum nondum cognitarum numerus detectus sit et speciei species addita. Nulla vero pars terrae varietate simiarum adeo praececellit, quam quae orbis novi appellatione audit, America, cujus in plagis quae habitant simiae, illas, quae in Asia et Africa reperiuntur, species quadraginta quatuor, easque structura minus dispares, non solum generum et specierum diversitate, verum etiam numero duplo majore superant. Cum in hoc opere id solum mihi agendum proposuerim, ut simias Americae, vel potius Brasiliae incolas, oculis sistam, si, quas orbis antiquus nutrit, simias prolixius recensere, harumque ab illis discrimina altius rimare praetermiserim, peccasse haud videbor. Quare missis istis, ab ipsa re, quam tractandam suscepi, exordior.

Quemadmodum in antiquo, ita et in novo orbe, zona torrida eique proxime adjacentes regiones ut a simiis inhabitentur, naturae quadam lege definitum esse videtur. Marcgravius ex Hollandia in Brasiliam missus, ibique in provincia Pernambuco dicta per sex annos moratus, praeter plantas caeteraque a se visa animalia, simiarum etiam in istis locis degentium primus meminit, sex illarum species, extremis licet lineis, describens¹⁾. Ex his quidem quatuor Lichtensteinius²⁾: simiam Apellam, capucinam, sciuream,

1) *Historia naturalis Brasiliae Lugd. Batav. et Amstelodami 1648. Fol. pag. 226 — 27.*

2) *Abhandlungen der königl. Academie der Wissenschaften in Berlin aus den Jahren 1814 — 1815. S. 240.*

Jacchum non incongrue indicat, reliquas tamen duas — nigram pedibus fuscis, et alteram toto corpore nigram — Guaribas a Marcgravio dictas, non mycetem Seniculum et Belzebul, sed potius Mycetem rufimanum et nigrum vel barbatum m. rectius dixeris. Aevo deinde subsequente, quae in America detectae sunt, simiarum numerus adeo increvit, ut, simiam mortam, Syrichtam, trepidam, utpote fabulosas, si excipias, Linneus¹⁾ et Buffonius²⁾ jam tredecim earum species diversas: Paniscum, Seniculum, Belzebul, Apellam, Fatuellum, capucinam, sciuream, Pitheciam, Jacchum, Oedipum, argentatam, Rosaliam, Midam, enumerarent.

Quaecunque vero ad nostram usque aetatem de simiarum familia pervenerunt notiones, eas omnes in suos usus vertens Audebertus³⁾ splendidissimum opus perfecit, in quo, praeter simias in antiquo orbe viventes, has tredecim species, quarum modo mentio facta est, una cum quatuor varietatibus descripsit et depinxit, ordinem ac systema Buffonii secutus. Potissimas autem sibi partes vindicant sagaces curae virorum, qui nostro tempore novis simiarum speciebus tum detegendis, tum detectis in meliorem ordinem redigendis operam navarunt. Comes ab Hoffmannsegg cum pro ea, qua in historiam naturae fertur, animi propensione ac studio plane singulari, Sieberum, animalium plantarumque colligendarum causa, in Brasiliae provinciam Pará nominatam ablegasset, effecit, ut speciebus jam cognitis tres adderentur incognitae⁴⁾, simiae scilicet torquata, Molochus, Satanas, quarum posterior in libro ab Humboldtio edito⁵⁾, simia Molochus autem in commentariis Academiae Monacensis depictae conspiciuntur⁶⁾. Humboldtius, cuius labores novi orbis cognitionem, praesertim si coeli, soli, montiumque indolem ac plantas spectes, mirum quantum promoverunt, undecim novas simiarum species detexit, quibus quidem nomina indita sunt: s. leonina, Lagothrix, flavicauda, albifrons, hypoleuca, Chuva, lugens, Chiropotes, melanocephala, trivirgata, ursina⁷⁾, quarum e numero trium posteriorum tantum imagines tabulis incisae reperiuntur. Geoffraeus tum iis, quae exenteratae in Museo Parisiensi praesto erant, simiarum formis, tum aliis quae ab Azara reliquisque autoribus memoratae et descriptae sunt, inter se comparatis, quatuordecim adhuc novas species discernit hisce nominibus illas designans⁸⁾: s. variegatae, cirrhiferae, personatae, canae, amictae, Monachi, penicillatae, auritae,

1) *Systema naturae*. Editio 13^{ma} Lipsiae 8^o p. 37 — 41.

2) *Histoire naturelle* Paris 1767. 4^o Tome 5^{me} p. 1 — 127.

3) *Histoire naturelle des Singes et des Makis*. Paris. an. 8^{me} Fol.

4) *Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin* 1807. S. 97.

5) *Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée*. Paris 1815. Livr. 9^{me} pl. 27.

6) *Denkschriften der königl. Akademie der Wissenschaften zu München*. 1815. S. 350. Tafel 17.

7) *Recueil etc.* 9^{me} Livr.

8) *Annales du Museum d'Histoire naturelle*. Paris 1812. 4^o T. 19^{me} pag. 104 — 122.

*humeraliferae, labiatae, Chamek, arachnoidis, Guaribae. Princeps de Neuwied in descriptione itineris per Brasiliam facti quatuor novarum ejusdem familiae hisce nominibus mentionem facit: s. hypoxanthos, robusta, xanthosternos, chrysomelas*¹⁾. Denique Kuhl, qui simiam novam (*seniculum nigrum*) a me jam alio loco descriptam²⁾ *rufimanam* appellans, visis perspectisque pluribus, quas in Europa adire licuit, simiarum collectionibus, sex solummodo earum species invenit tanquam novas novis nominibus dignoscendas scilicet: *s. Geoffroei, lunata, infulata, melanochir, rufibarba, ochrocephala*³⁾.

Quas quidem omnes, si in unum colligas, intelliges, simiarum, quae novae in America reperiuntur, species triplo plures illis esse, quas Audebertus in suo de simiis opere, splendidiore quidem quam accuratiore, descriptas depictasque exhibuit. Quod autem maxime dolendum est, in museis sicca simiarum novarum exemplaria pauca, pauciores vero adhuc illarum imagines pictas prostare, plurimas solummodo ex descriptionibus nosci, quae tamen, cum individua in museis adhuc disiderentur, iis propriis investigandis discernendisque parum conferant. Quare a vero deflectere non videntur, qui quasdam illarum species, e. g. *Callitrichem amictam, torquatam, lugentem, Jacchum penicillatum, leucocephalum*, et generis *Cebi* nonnullas nil nisi varietates esse autumant. Ita Geoffroeus mycetem quendam fuscini nomine tanquam novam speciem inducit, *Guaribam Marcgravii* appellans, quae tamen posterior colore nigro penitus distincta, nomine *nigrae vel rufimanae* a me jam alias descripta est et depicta. Humboldtius simiam, cui aures deesse putat, *Aotum* vocans, ad peculiare genus refert, maculis frontis albis *Nyctipitheco felino m.* simile praeter caetera autem et in hoc, quod *Nyctipithecus felinus* aures habeat et caudam breviorum, diversum. Pari modo, quas Humboldtius sub genere et specie „*Lagothrix*“ enumerat, simiae quadam similitudine ad *Gastrimargum m.* accedunt, quamvis posterior larynge tuberoso careat, pilis crispis non vestitus sit, et magnitudinis ac colore ab illis discrepet. Causam praeterea magis ancipitem reddit sententia Kuhlii affirmantis: „*s. hypoxantham (Brachytelem macrotarsum m.) nomine Lagothrichis cani praeditum in Museo Parisiensi asservari*⁴⁾. Simia porro brevi cauda conspicua, quam Humboldtius inter simias pilis villosis insignitas (*Pithecia melanocephala*) collocat, cum simiis sub nomine „*Brachyurus*“ a me descriptis nulla re, nisi brevi cauda convenit. Quae quidem dubia rei conditio, nec non quod simiarum multae, novae ejusmodi nominibus nuncupatae collectionibus publicis desint, aut earum fidae imagines in lucem non prodierint, praecipue ratio fuisse videtur, quod

1) Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 I. II. B. 4^o Frankfurt a. M. 1820.

2) Denkschriften der königlichen Akademie zu München 1813. 4^o S. 353. Taf. XVIII.

3, 4) Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Frankf. a. M. 1820. 4^o S. 25 — 52. p. 25.

naturae scrutatorum nonnulli, praesertim Cuvier in editione libri sui postrema¹⁾, novas hasce species et genus illud novum „Lagothrix“ vel silentio prorsus omittant, vel varietates suspectas esse pronuntient. Supersedeo equidem hic loci de omnibus illis speciebus, quae post librum Audeberti typis divulgatum, tanquam novae promulgatae sunt, prolixius iudicium ferre; rem autem nec ingratam nec scientiae inutilem me peracturum arbitror, si omnes in itinere per Brasiliam uno cum socio laborum meorum amantissimo Doctore Martio peracto observatas simiarum species, quae nullibi depictae nec, quatuor forsitan exceptis, ad hunc usque diem descriptae sunt, orbi litterario spectandas praebeam. Exhibentur vero triginta quatuor hic simiarum species, quantum fieri potuit, accuratissime delineatae ac depictae, omnesque ac singulae a me in ipsis, quas habitant, plagis observatae et collectae, quarum archetypa (quod magni sane momenti est ac utilitatis) in museo Brasiliensi Monachii asservantur cum ipsis imaginibus ectypis comparanda.

Quo largior vero specierum copia sensim sensinque contigit, eo plures innotuerunt, quibus simiae singulae a se invicem differrent, characteres eoque manifestior illarum affinitas et qui eas intercedit, nexus apparuit. Nota equidem praeter caeteras quam maxime conspicua, qua simiae Americanae, tum a se invicem, tum ab illis, quae orbem antiquum incolunt, discernuntur, cauda est vel longior vel brevior, prehensilis aut non prehensilis. Sic Buffonius, tum omne simiarum genus vel ex cauda penitus deficiente, vel longiore vel brevior, cujus naturae scrutatores fere omnes in discernendis illis ordinandisque rationem habere solent, dignosci jubet, tum Americanas in specie in duas classes dispescit; quibus cauda prehensilis est et ad res scilicet capessendas amplectendasque inserviens, Sapajou, quibus vero cauda prehensilis non est, Sagoin, Saky, denominat. Cui quidem assertioni Erxleben nihil addidit novi, praeterquam quod nomina gallica in latina vel graeca („Cebus et Callithrix“) verterit. Eundem Buffonii ordinem et Audebert et Latreille amplexi sunt, Mycetem tantum generi peculiari adnumerantes. Collatis itaque singulis, ubicunque sors oblit, simiarum ex America prolatarum dispersis descriptionibus, id consecuti sunt hucusque naturae scrutatores, ut cuiusvis speciei, quis sit character, qua in re simiae Americanae a simiis in reliquis mundi partibus repertis dissentiant, quibusve notis hae illis opponendae sint, facilius exponere possent. Eorum equidem oculos haud potuit effugere, simias Americanas dissepimento narium crassiore et naribus ad latera apertis a simiis orbis antiqui incolis, quibus nimirum dissepimentum narium angustum ac tenue aperturaeque nasales haud laterales sed oblongae et antrorsum positae sunt, discrepare, licet tamen Brachyteles et dissepimento nasali et narium forma simiis orbis antiqui affinior esse

¹⁾ G. Cuvier le Règne animal. Paris 1817. T. I. pag. 113 — 114.

v

videatur. Verum etiam dentium numero simiae Americanae ab Asiaticis et Africanis distinguuntur. Hae nempe nunquam plures quam quinque, Americanae vero semper sex dentes molares in utroque latere habent, Jaccho et Mida solum exceptis, quae simiarum antiqui orbis adinstar quinque dentibus molaribus utrinque instructae sunt. Porro quemadmodum in mundo novo nulla exstat simia cauda omnino carens, ut in orbe antiquo genus „Orang“, homini structura tam affine, ita econtra in orbe antiquo nulla, cuius manus in quatuor digitos excurrat, quod tamen in genere „Ateles“ Americae indigeno contigit. Idem accidit in simiis (Mycetes vel Stentor) quae larynge vesiculoso insignes, solius Americae sylvas mugitu suo implent. Alia adhuc discrimina aliae corporis partes praebent. Ita inter simias orbis antiqui conspiciuntur plurimae sacculis buccalibus et natibus calvis praeditae, quibus, quas America alit, simiae ad unam fere omnes carent. Brachyteles solus et quodammodo Ateles et Mycetes tyliis plus minusve nudis orbis antiqui simiis accedunt.

Quodsi vero comparationis viam ulterius prosequi velis, et ipsi characteres aliam diversitatem offerunt intuentibus. Sic simiae Americanae non adeo feroces sunt, facilius mitigandae, vivaciores, sagaciores, corpore graciliores, minores, cauda plerumque prehensili agiliores, cranio osseo, pithecis antiqui orbis solis exceptis, tenuiore, largiore et convexiore excellentes, facie totoque capite canibus magis dissimiles, orbitis reclinatis et magis approximatis instructae, magis quadrumanae quam quadrupedes, plantis pedum haud raro incedentes, supra arbores scandentes, sibilantes, cachinnantes aut mugientes, minus voraces minusve carnivorae, libentius fructibus, foliis, insectis vescentes, foetore illo ferali minus graves ac molestae.

Antiqui orbis econtra simiae, si pithecos (Orang), omnium simiarum nobilissimas, excipias, sunt plerumque dolosae, difficilius mitigandae, ferae, violentae, minus vivaces, parum sagaces, phlegmaticae, corpore admodum robustae, cranio osseo crassiore, orbitis plerumque distantibus, compressioribus, antrorsum versis, capite facieque magis oblongis, canibus similes, minus versatiles, quadrupedes magis quam quadrumanae, voce rauciori cani latranti similiores, voracissimae, viva plerumque animalia necantes, foetore ferali, nauseam creante molestae. Quae omnia si accuratius perpendas, facile concedes, nisi orbis antiquus pithecos (Orang) nutriret, simiis Americanis utpote nobilioribus prae caeteris omnino principatum deberi; isti enim vero simiarum familiae, dubii caeteroquin ortus ac conditionis, praerogativa recte vindicatur, simiarum ducem esse et antesignanum. Quanquam autem nihil, quod ordinis ac concinnitatis ratio postulat, deesse videatur, si simiarum orbis antiqui, qui intercedant, gradus ac varietates a Pithecis ad Cercopithecus, Papiones et Lemures perspicias, non incongrue tamen dixeris,

naturam id efficere voluisse, ut simiae Americanae inter extremos fines, quos pithecorum familia ex una parte, et ex altera cercopithecorum, papionum lemurumque familia in horum animalium systemate occupant, quasi medias partes tenerent.

Galli anatomiae comparativae studio elocti, animalium species ac genera non ex arbitrio aut systemate quodam artificiali, sed ex affinitate naturali deducenda esse, etiam simiarum genera secundum eandem legem, eodemque indicio ordinare sunt aggressi. Quem ad finem consequendum nulla inventio maiora illis praestare commoda potuit, quam Camperi celeberrimi de angulo faciali nova sententia, ad cuius normam pulchritudo tum hominum tum animalium eorumque affinitas cum homine lege quadam naturali dimentiendae sunt. Haud immerito itaque Cuvierus affirmat: „On observe dans les diverses races d'hommes la même série de rapports, que dans les diverses espèces d'animaux, entre la saillie du crâne et le degré d'intelligence, ou de cette sensibilité exquise, de cette mobilité dans les organes, qui fait peut être la principale base des différences qui existe d'homme à homme. Chacun sait que Camper a remarqué le premier, que c'est une légère inflexion de la ligne, qui termine ces proportions, qui produit ce beau sublime que nous admirons dans les ouvrages des Grecs.“¹⁾ Hac itaque Camperi mensura faciali usi Cuvierus et Geoffroeus hominem $90^{\circ} - 70^{\circ}$, pithecos et callitriches 60° , cercopithecus 50° , papiones et mycetes 50° gradibus gaudere definierunt. Istos equidem angulos Cuvierus in libro anatomiae comparatae²⁾, in opere denique postea edito³⁾ ita emendavit, ut pithecis 65° , simiis Americanis (Sapajous et Ouistitis) et cercopithecis 60° , papionibus 50° gradus tribueret. Qui autem Cuvierum subsecuti sunt autores e. g. Lacépède, Audebert, Latreille, Illiger, Humboldt idem systema plus minusve mutatum libris suis inseruerunt.

Rem propius consideranti patet, singulas hasce assertiones in determinando cuiusvis individui angulo faciali non solum inter se non convenire nec certa stabilique lege fulcitas esse, verum etiam illas ipsi naturae, uti infra luculentius demonstrabitur, repugnare. Puncta nempe, a quibus lineae angulusque facialis Camperi ab aure usque ad dentes incisivos superiores medios et ab his usque ad partem frontis quam maxime protuberantem nasique basi proximam describuntur, ex locis, quae situ et dignitate haud excellent et hae ex causa varietati mirum quantum obnoxia sunt, non descendunt; quo fit, ut huius anguli usus et applicatio generalis esse non possit.

1) Mémoire sur les Orangs Outangs. Journ. de phys. T. 5. p. I. p. 135.

2) T. 2. p. 8.

3) Le Règne animal distribué d'après son Organisation. Par. 1817. T. I. p. 101 — 116.

Norma enim anguli Camperiuni, ut fieri solet, adhibita sequeretur, hominem, in quo frons circa sinus frontales, cum fossis maxillaribus et organo olfactus intime conjunctos, in capite protuberat, ingenio et pulchritudine excellere, cum tamen homines eiusmodi forma efficti, inferiorem imo infimum humanitatis locum occupent, et in his fronte superiore utpote nobiliori recedente, inferior ejusdem minus nobilis pars nasalis ac orbitalis prosiliat. Eodem prorsus modo in simia Jaccho et Mida angulus facialis Camperi ita eminent, ut reliquis simiis licet illis perfectioribus, quin ipsi fere homini praeponendae forent. Idem quoque de Bradypode, praesertim de omnibus animalium embryonum et juvenilium capitibus affirmandum est. Plura adhuc recenseri possent exempla, quae anguli Camperiani usum dubium reddunt; sed naturae scrutatores hisce in studiis versati, tum multas in applicando hoc angulo difficultates tum opinionum diversitates ac falsas, quae inde oriuntur, conclusiones ipsimet perspexerunt. Quibus ex causis plurimi eorum ad evitandos hos scopulos, angulum Camperianum aut quoad loca applicationis immutandum, aut illius plane nullam deinceps habendam esse rationem existimarunt.

Geoffroeus¹⁾ et Humboldtius in recentioribus, quos uterque de simiis edit, commentariis, anguli quidem Camperiani mentionem faciunt, ordinem tamen simiarum redigentes, eundem haud amplius respiciunt, solum Buffonii vestigiis insistentes. Nomina generum novorum „Cebus, Callithrix“ ab Erxlebenio mutuantes, aliisque nova imponentes, „Ateles, Lagothrix, Aotus“, simias Americanas serie subsequente collocarunt, quas Geoffroeus hisce nominibus designavit: S. Americanae vel Platyrrhini: Heliopithecii—cauda prehensili calva vel non calva (Ateles, Lagothrix, Stentor, Cebus); Geopithecii (Callithrix, Aotus, Pithecia); Arctopithecii (Jacchus, Midas). Hunc vero ordinem accuratius perlustranti non nulla minus consona obveniunt. In hac nimirum serie simiae Americanae perfectissimae e. g. Cebus cum imperfectioribus uti Stentore, nec non aliae simiae diversae cum diversis unam eandemque familiam constituunt, quin imo imperfectiores (Ateles) agmen ducunt, et ipsa distinctio Geopithecorum etiam diversas ad hanc familiam non pertinentes species complectitur.

Quaecunque in observationibus hucusque factis vera reperiuntur, libenti animo amplectens, quae vero falsa, praetermittens, et id, quod variis a me institutis tentaminibus optimum esse judico, secutus, in describendis hisce novis simiis specierum ordinem in quibusdam immuto, notas externas, artificiales et sensibus magis obvias, quibus facilius distingui possunt, tanquam notas imprimis characteristicas propono, ipsum vero ordinem ac seriem tum ex

1) *Annal. d. Mus. Tom. 19.*

affinitate naturali, tum ex notis artificialibus simul sumtis, nec non ex diversitate mensurae anguli facialis Camperiani determino; loquor autem de ea solum methodo Camperiana, quam Cephalogenesis demonstrat, in melius, ut mihi videtur, mutata.

Quo quidem in opere frons, altitudine protuberans tanquam punctum superius positionis ad describendum angulum facialem assumitur; si autem punctum positionis, in angulo Camperiano adhiberi solitum seruare velis, saltem monendum est, ut altera linea recta a spina frontis supranasali ad altiorem vel eminentiorem frontis vel verticis locum ducta mensurae defectum suppleas. Dubia vero omnino evitabis, si capitis vertici vel frontis vel potius, massa ossea tam mutabili sublata, cerebri ipsius inclusi culmini lineam cum horizonte parallelam imponas; tunc enim altera linea e puncto, quo spina frontalis cum osse nasali conjungitur, ducta et priori perpendiculariter insistens mensura est ac norma, ex qua non solum hominum inter se, verum etiam omnium animalium frontis vel cerebri altitudo, illique annexus ordo ac dignitas naturalis nosci dijudicarique possunt.

Ut varietas et series simiarum pro ea, quam ad incolas Americae indigenos habent, ratione melius innotescant, consultius visum est, praeter plurimas simiarum hic descriptarum formas, et cranium viri Indiani e tribu Cama Caëns orti super eadem basi horizontali ut reliqua simiarum capita positum, eademque mensura emensum accurate depingi, adscriptis, quantum fieri potuit, simiarum nominibus, quibus vel Lusitani in America viventes, vel qui ab illis originem trahunt, Brasiliiani, aut Indiani indigeni, singulas earum species nuncupant.

Cunctas animalium imagines, quae triginta octo tabulis exhibentur, Michael Schmidt, Bojo-Monacensis, delineavit, delineatas Professor Mitterer lapide, F. Weishaupt vivis coloribus expressit. Imaginum archetypa, ut supra jam monuimus, Monachii in museo Brasiliano asservantur.

1) Cephalogenesis sive capitis ossei structura, formatio et significatio per omnes animalium classes, familias, genera ac aetates digesta, legesque simul psychologiae, cranioscopiae ac physiognomiae inde derivatae. Monachii 1815. Fol.

SIMIAE AMERICANAE SIVE PLATYRRHINES.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Simiae caudatae, sacculis buccalibus nullis; natibus tectis; naribus depressis; dissepimento narium crassiore; aperturis nasalibus lateraliter patulis; dentibus molaribus utrinque supra infraque in plerisque sex; cauda apicem versus in nonnullis prehensili, subtus calva vel tota pilosa; digitis manus quinque, rarius quatuor; voce cachinnante, sibilante aut mugiente.

DESCRPTIO.

Animal quadrumanum, scandens, diurnum vel nocturnum, monogamum, singulis annis puerperum, pullorum matris dorso vel abdomini haud raro adhaerentium amantissimum, gregarium, Mycete phlegmatico excepto, agile, docile, sagax, sibilans, ululans vel mugiens, natibus calvis sacculisque buccalibus destitutum, facile cicurandum, insectis, fructibus et foliis in sylvis victitans, mansuefactum carne cocta et assata vel oryza etc. nutriendum. — Corpus mediocre; cranium grande, oblongum; frons, Mycete excepto, elata; planum musculi temporalis semicirculare verticem capitis nequaquam attingens; facies haud prolata; fossae orbitales oblique vergentes; nasus brevis apice depressus; nares laterales, septo crasso disjunctae; maxilla inferior postice haud vel vix elevata; dentes incisivi supra infraque quatuor vel recti vel extrorsum versi, canini supra infraque mediocres duo, incisivis contigui vel ab illis distantes, molares supra et infra in utroque latere quinque vel sex; mammae duae pectorales vel subaxillares; cauda vel non prehensilis pilosa, vel prehensilis apice subtus calva aut pilosa; quatuor extremitates vel subaequales, vel anteriores elongatae; palma pentadactyla vel tetradactyla; unques, excepto illo pollicis pedis frequenter lamnari, tegulares aut falculares; larynx regularis vel in quibusdam vesiculoso-protuberans.

I. TRICHURI

cauda apice subtus pilosa.

Cauda volubili

Genus I. Cebus.

Cauda non volubili

abbreviata.

Gen. II. Brachyurus.

villosa.

Gen. III. Pithecia.

comosa, subtenui.

Gen. IV. Callithrix.

laxa, subtenui.

Gen. V. Nyctipithecus.

gracili, elongata, non annulata.

Gen. VI. Midas.

gracili, elongata, annulata.

Gen. VII. Jacchus.

II. GYMNURI

cauda apice subtus calva prehensili.

Tetradactylus, longimanus, larynge subtuberoso.

Genus VIII. Ateles.

Subpentadactylus, longimanus, larynge non tuberoso.

Gen. IX. Brachyteles.

Pentadactylus, sublongimanus, larynge non tuberoso.

Gen. X. Gastrimargus.

Pentadactylus, stentor, larynge maxime tuberoso.

Gen. XI. Mycetes.

Familia I. TRICHURI.

Genus 1. *Cebus*, *Eraxleben*, *Geoffroy*, *Humboldt*.
Sapajou, *Buffon*, *Lacépède*, *Audebert*, *Cuvier*.
Callithrix, *Illiger*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Cauda volubili, apice intorta.

Descriptio. Simia diurna, libidinosa, blandiens, raro solis plantis pedis, frequenter palmis plantisque incedens vel arbores scandens, caudam plerumque apice intortam gestans, illaque res amplectens et capite inverso e ramis dependens; corpus robustius, pilis densis recumbentibus vestitum, subtus subpilosum; caput grande, ellipticum; cranium osseum tenue, tumidum, oblongum; frons valde elevata; foramen occipitale magis deorsum vergens; facies angusta, cranio multo brevior, subminuta, obtusa, subnuda vel lanuginosa, versicolor, inter oculos angustata; orbitae praegrandes paululum extrorsum versae, cranio fere inclusae; dentes incisivi in utraque maxilla 4, in linea subrecta positi, apice obtusiores, superiores a caninis intervallo remoti, medii plani, exteriores triquetri, inferiores caninis contigui; canini in utraque maxilla 2, validiores, exserti; dentes maxillares in utraque maxilla 12, quorum anteriores bicuspidati, reliqui quadricuspidati, obtusiores; auriculae conspicuae, subellipticae, lanuginosae vel subpilosae; 4 extremitates haud longae, subaequales, subvalidae, pentadactylae; digiti manus nec non plantae pedis subbreves; pollex manus breviusculus, subremotus, pollex pedis reliquis digitis brevior, retractus, oppositus; ungues tegulares, convexi, apice obtusi; unguis pollicis pedis planior; cauda crassa, corpore vix longior, volubilis, tota pilosa; penis maris gracilis, retractilis, cylindricus, apice in membranam, oris buccinae ad instar dilatatus; clitoris pene maris vix brevior, incurva, peniformis, apice glandiformis; angulus facialis Camperi $59^{\circ} - 60^{\circ}$, cerebralis $87^{\circ} - 90^{\circ}$, altitudo frontis $4\frac{3}{4}'' - 7\frac{3}{4}''$.

Species 1. *Cebus macrocephalus*. Tab. I.

Capite praerobusto; orbitis acute angulatis; osse frontali in medio suberistato; temporibus antice nudis; facie obtusa, subquadrangula; dentibus caninis crassis.

DESCRIPTIO: Longitudo trunci dorsalis ab	palmae - - - - -	3''
occipite usque ad radicem caudae $1' 2\frac{1}{3}''$	femoris - - - - -	6''
capitis ab ore usque ad occiput $4\frac{3}{4}''$	tibiae - - - - -	$5\frac{1}{2}''$
faciei ab ore usque ad supercilia 2''	plantae - - - - -	$5\frac{3}{4}''$
humeri - - - - -	caudae - - - - -	$1' 5\frac{3}{4}''$
ulnae - - - - -		
$4\frac{3}{4}''$		(Mensura Parisiensis.)

Corpus robustum; truncus dorsalis, humerus, cauda ad radicem nec non femur extus fusca; frons media, vertex, occiput, nucha, spina dorsi, cauda, quatuor extremitates antice, femur intus et supra nigricantia; facies nudiuscula subatra, extus a gula ad verticem usque fascia nigricante cineta; tempora antice nuda, postice uti et latera frontis rufo-albicantia; genae, labia, mentum pilis rarioribus albicantibus vel fusco-atris obsita; auriculae patulae, nudiusculae, ovatae; dentes canini crassi, exserti, incisivi in linea recta positi, inferiores caninis contigui, superiores intervallo remoti, intermedii superiores planiores, exteriores triquetri; gula obscure fusca; pectus ochraceo-fuscum; abdomen fusco-subpilosum; pili corporis breviores, in dorso ad radicem ferruginei, versus apicem fuscescentes ultra $\frac{1}{2}$ " longi, in capite et cauda recumbentes, colli lateralis et brachii extus retrorsum ascendentes, gulae antrorsum vergentes; cauda longitudine trunci dorsalis. Quatuor extremitates crassae, subaequales; digiti manus breviores, pedis longiores; ungues flavido-nigricantes, subcurvi, apice obtusiores, pollicares pedis planiores; altitudo frontis $7\frac{3}{4}$ ".

Habitat in sylvis lacus Catua dicti flumini Solimöens adjacentis. Foemina a mare fere non differt.

I. LE SAPAJOU À GROSSE TÊTE.

Le sapajou à grosse tête ressemble par sa couleur, et même par les proportions des parties du corps à ceux, aux quels Linné et Buffon ont donné le nom d'Apella et Fatuellus, mais il s'en distingue par la double grosseur du corps, et par la configuration de la tête qui a une crête frontale, presque comme une Guenon d'Afrique. En général il y a parmi les auteurs une grande différence d'opinions en ce que regarde les deux singes ci dessus nommés. Mr. de Humboldt est le premier qui ait jugé qu'ils ne forment pas deux espèces distinctes. J'ai ici devant mes yeux beaucoup d'originaux de l'une et de l'autre espèce, et je dois avouer que je ne trouve presque aucune différence entre le Sajou et le Sapajou cornu, exceptés les deux forts pinceaux de poils qui s'élèvent sur les côtés du front de ce dernier. Quoique plusieurs individus de Sapajou cornu portent ce même caractère, je ne crois pas pourtant que ce soit une particularité constante, mais plutôt une petite variation naturelle de ce même Sapajou cornu, et que ces sortes de pinceaux de poils sont déjà usés chez le Sajou plus âgé.

Le Macrocéphale est presque de la même couleur que le Sapajou brun et cornu. Il a le tronc, l'humérus et l'intérieur des cuisses d'un rouge brun, la tête, l'occiput, l'avant-bras, l'intérieur des pieds, la queue, les avant-pieds et le long du milieu du dos noirs. Une bande noirâtre se prolonge en forme de favori depuis les tempes en devant des oreilles jusqu'en bas des joues, et dans le Macrocéphale cette même bande plus large s'étend jusqu'au dessous du menton. Le reste des joues, l'avant-front et les parties antérieures des tempes sont d'un roux blanchâtre, du reste la gorge et la poitrine jusqu'au bas-ventre sont de la même couleur que l'humérus. — Le Macrocéphale ne diffère de ces espèces de singes que par la plus grande grosseur de son corps et de sa tête, marquée aussi de crêtes au dessus des yeux, et d'une autre au milieu du front. Il a les yeux beaucoup plus grands, les dents canines très fortes, les tempes presque nues ainsi que les oreilles qui sont très visibles. La face est d'un roux foncé et d'un blanc velouté sur les joues, les lèvres et le menton. Tous les poils sont roux à leur racine et bruns foncés à leur extrémité. Les Portugais qui habitent solitairement la rivière de Solimöens appellent Prêgo tous les singes de cette espèce, tels que le Sapajou brun ou cornu et le Macrocéphale, d'après la conformation de l'organe sexuel du mâle.

Species 2. *Cebus libidinosus*. Tab. II.

Barbatulus, vertice et occipite brunneo-nigris; genis mentoque barbatus; hisce, dorso temporibus et corpore subtus flavo-rufis; humero et femore rufescentibus; brachiis dilute fusciscentibus; fronte, facie intus et circum nec non digitis manus flavo-albicantibus; cauda supra brunneo-nigricante, subtus flavo-rufa.

Longitudo	trunci	1' 5 $\frac{3}{4}$ "	ulnae	4 $\frac{1}{4}$ "
	capitis	5 $\frac{1}{3}$ "	palmae	2 $\frac{1}{3}$ "
	faciei	1 $\frac{1}{4}$ "	femoris	4 $\frac{1}{4}$ "
	caudae	1' 3 $\frac{3}{4}$ "	tibiae	5"
	humeri	4 $\frac{1}{2}$ "	plantae	4"

Descriptio. Corpus subrobustum; caput crassum, subrotundatum; quatuor extremitates subaequales; cauda corpore brevior; pili dorsi $3\frac{3}{4}$ " longi, ad radicem cinerascens, ad apicem pallide rufi, nuchae et verticis brunnei, occipitis nigri, in medio frontis nigri, versus tempora flavo-albicantes, cranii retrovergentes, faciem a temporibus usque ad jugulum mystacis ad instar involventes, ochracei, suberecti, caudae supra brunneo-nigricantes, infra brunneo-rufescentes, dorsi, humeri, femoris extus rufi, intus et in reliquis extremitatibus nigro-brunnei, digitorum manus albicantes, hirsuti, gulae, pectoris et abdominis anterioris pallide flavo-rufi; facies atro-incarnata, nudiuscula; malae et labia albicantia, lanuginosa; dentes canini fortes, exserti; incisivi superiores a caninis remoti, praecipue medii inferioribus longiores; auriculae subconspicuae, subpilosae; ungues brunneo-nigri, mediocres, apice obtusi, subincurvi, pollicaris in planta largior, longiusculus, apice rotundatus; angulus facialis et cerebri 62° ; altitudo frontis $7\frac{1}{2}$ ".

Habitat ad flumen Carinainha, fluvio S^t Francisci laterale.

II. LE SAPAJOU LASCIF.

C'est la lascivité qui rend ce singe remarquable. Il aime à faire continuellement des grimaces, en regardant certaine partie de son corps. Nous l'avons rencontré dans les forêts basses de Carinainha, rivière latérale de Rio S^t Francisco. Il ressemble un peu au Sapajou Apella ou Fatuellus, mais il s'en distingue par la couleur entièrement ferrugineuse de son corps, et principalement par la barbe, qui entoure en cercle toute la face, et qui se prolonge des tempes presque jusqu'au dessous du menton. Il a sur le sommet de la tête une calotte brune-noire; les pieds, excepté les cuisses et l'humerus, sont ainsi que le dessous de la queue, le dos, la gorge, la poitrine et la barbe d'un roux ferrugineux. Le devant de la gorge est d'un brun-roux foncé, les joues, le menton et les doigts des mains sont d'un roux plus clair. Le bas-ventre est presque nud, et le tour des parties sexuelles à peine couvert de quelques poils bruns, la face brunaître et un peu veloutée, le front très haut. Les oreilles sont bien visibles, presque nues par derrière, et garnies sur le devant de quelques poils, les dents laïvaires pointues, et les ongles noirâtres. Sa taille est médiocre, et la queue un peu plus courte que son corps.

Ce singe attaché par une petite chaîne de fer sur un mulet de charge, nous a accompagné dans le voyage de la rivière de S^t Francisco jusqu'à la capitale de Bahia. Il étoit

toujours aussi intelligent et aussi vif que malicieux. Pendant la route, un de nos garçons chargé du soin de pousser les mulets de charge se moquoit continuellement de lui. Le macaque au commencement se fâchoit, et s'élançoit vers le moqueur; mais se sentant prisonnier, il ne répondit plus à la suite que par des grimaces, et à la fin même par détourner les yeux pour ne plus voir les vexations de son ennemi. Arrivés un soir à la couchée, le singe parvint à se détacher de sa chaîne, et avant de s'enfuir il sauta à l'improviste sur ce garçon qui, étant occupé à d'autres choses, ne faisait pas attention au singe, et fut mordu cruellement. De ce fait on pourroit bien conclure, que les singes conservent un esprit de vengeance, qu'ils tiennent caché même très long tems. Cependant ayant eu le bonheur de le rattrapper, il ne fut puni que de quelques coups; mais plus tard étant parvenu, en allongeant son corps d'une manière inconcevable, à s'emparer de l'ouvrage précieux (le *Système de la Nature de Linné*) et l'ayant mis en morceaux, il fut puni de mort.

Species 3. *Cebus xanthocephalus*. Tab. III.

Imberbis, mento, genis nec non fronte albo-griseis; vertice, occipite, nucha, humero intus et lumbis ochraceo-flavis; dorso medio brunneo-nigro; malis ab auriculis mentum versus nigro-fasciatis; cauda et quatuor extremitatibus nigerrimis; jugulo pectoreque ferrugineis.

Descriptio.	Longitudo	trunci	1' 6"	palmae	3"
		capitis	3½"	femoris	5"
		faciei	1¾"	tibiae	5"
		humeri	5"	plantae	4"
		ulnae	4"	caudae	1' ¼"

Corpus subrobustum, colore variegatum; cauda crassa, corpore brevior; quatuor extremitates longitudine mediocri, subaequales; pili trunci 1" longi recumbentes, subrigidi, ad radicem nigricantes, ad apicem in medio dorsi nigri, in nucha, vertice, occipite et humero intus ochraceo-flavi, pilis ferrugineis nigrisque immixtis, in femore extus et supra caudae radicem ferruginei, ad latera caudae mediae fuscescentes, in quatuor extremitatibus et in reliqua cauda nigerrimi, in jugulo et pectore ferruginei, in mento, genis, malis griseo-argentei, in fronte griseo-fusci, in medio verticis ochraceo-flavi, a mento usque ad auriculas nigri, antrorsum versi, fasciae nigrae ad instar faciem ambientes; facies subincarnata, circa oculos nudiuscula, reliqua fuscescente-lanuginosa; labia alba vibrissis albis intermixtis; auriculae fuscae, subpilosae, antice et postice fascicularibus albo-nigricantibus pilis munitae; abdomen nudiusculum, rufum; regio pubis nigro-subpilosa; femora intus pilis nigris rarioribus obsita; regio circa anum nigro-pilosa; dentes canini mediocres, subaequales; incisivi superiores, praesertim medii planiores, laterales subtriquetri a caninis remoti, inferiores longiores, contigui, suberecti; pollex pedis brevior, retractus, oppositus; ungues brunneo-nigri, subcompressi, subcurvi, ad apicem obtusiores; unguis pollicis pedis planior, apice angulato-acuminatus; angulus facialis Camperi 59°, cerebralis 57°, altitudo frontis 7".

Habitat in sylvis provinciarum Rio de Janeiro et S. Pauli; foemina est, quam descripsimus.

III. LE SAPAJOU À TÊTE FAUVE.

Ce singe nommé chez les habitans *Saa* ou généralement *Macaco* appartient au genre des *Sapajous*. Quand il marche à quatre pieds, ou quand il grimpe sur les arbres, il porte toujours la queue entortillée. Lorsqu'il saute d'une branche d'arbre à l'autre, il se serve du bout de sa queue comme d'une main. Quand il veut s'allonger, il embrasse les troncs avec la queue, et en s'y accrochant il s'amuse quelque fois à se balancer en tenant la tête renversée. Il est d'une taille de médiocre grandeur, et se distingue par sa couleur fauve ou jaune rougissante au sommet de la tête, à l'occiput, à la nuque, à l'humérus, au dos des reins et aux flancs. Le reste du corps, excepté la gorge et la poitrine qui sont plutôt ferrugineuses que fauves, est tout noir. Une bande noire se prolonge de l'avant des oreilles sur la partie postérieure des joues jusqu'au dessous du menton. Les poils du front et des joues antérieures sont blanchâtres, la face est presque nue et rougeâtre; les yeux sont bruns, les oreilles presque entièrement couvertes de poils, concentrés en diverses parties en espèces de petits faisceaux. Autour des lèvres et sur le menton se trouvent des petits poils blancs. Les avant-bras, le milieu du dos, les pieds postérieurs, et la queue sont tout noirs, et on ne remarque des taches jaunes, qu'au côté extérieur des cuisses, et à la racine de la queue. Le bas-ventre et les côtés intérieurs des cuisses sont presque nus, et ne portent que très peu des poils noirs. Les plantes des pieds et les ongles sont noirs, les dents laniaires d'une proéminence médiocre. Cette espèce de *Sapajou* ressemble par la poitrine ferrugineuse à celle, à laquelle le Prince de Neuwied donne le nom de *Xanthosternon*; mais elle en diffère aussi par la tête et la nuque qui ne sont point noirs. On trouve ces *Sapajous* dans les forêts de Rio de Janeiro, d'où ils sortent en grandes troupes pour visiter les plantations de maïs, d'orangers, et d'autres fruits.

4. *Cebus unicolor*. Tab. IV.

Imberbis capite grandi; corpore flavo-brunneo; vertice et cauda obscurioribus; auriculis brevioribus; pilis rigidioribus; dentibus caninis validioribus.

Longitudo	corporis	1' 7 $\frac{1}{4}$ "	ulnae	5 $\frac{1}{2}$ "
	capitis	4 $\frac{1}{2}$ "	palmae	5 $\frac{1}{3}$ "
	faciei	1 $\frac{1}{2}$ "	femoris	5 $\frac{1}{3}$ "
	caudae	1' 1 $\frac{1}{2}$ "	tibiae	7"
	humeri	4 $\frac{1}{2}$ "	plantae	4 $\frac{1}{2}$ "

Descriptio. Corpus robustum; caput crassum; cauda corpore brevior apice brunnea; pili corporis rigidiores, dorsi 3 $\frac{1}{4}$ " longi, unicolores, flavo-brunnei, in vertice et nuca obscuriores; in quatuor pedibus aurantio-relucentes, in pede posteriore magis brunnei, versus superficiem extremam albicantes, in cauda ad radicem ferruginei, in reliqua nigro-brunnei et ad apicem albo-annulati, in fronte et temporibus pallidiores, retrovergentes, in malis fulvi, extrorsum versi; linea in medio frontis brunnea; facies fusca, lanuginosa, ad labia et mentum subpilosa, fulva; regio supra oculos subpilosa; dentes laniarii robusti, incisivi superiores a caninibus remoti, exteriores triquetri, medii sublargi, inferiores approximati, contigui, obtusiores; auriculae breves et quasi truncatae, rotundae, subpilosae; gula, pectus et abdomen subpilosa; ungues tegulares, incurvi, flavicantes, pollicaris in planta planior.

Habitat in sylvis juxta lacum in flumen Solimöens defluentem.

IV. LE SAPAJOU D'UNE SEULE COULEUR.

Ce Sapajou a quelque ressemblance avec le Sapajou Maigre; mais sa grosse tête, ses poils roides, courts et gris-variés aux quatre extrémités et à la queue, comme chez le renard, et enfin une plus grande grosseur de corps le distinguent de l'autre. Sa grosse tête paroit lui donner une autre ressemblance avec le Sapajou *Macrocephalus*, du quel il diffère cependant par la forme de la tête arrondie et aplatie sur le front, par la face raccourcie, par les oreilles comme tronquées et principalement par la couleur toute contraire à celle de l'autre. Son corps est assez robuste, sa tête grosse et ronde, tandis que sa face est plus raccourcie, la couleur de son corps uniformément clair-brune, le long du milieu du dos et principalement sur le sommet de la tête un peu plus foncée, aux quatre extrémités et vers la queue très peu variée du gris. Les oreilles presque courtes et en arrière toutes nues portent en avant quelques petits bouquets de poils. Sa face est noirâtre un peu veloutée, les yeux sont brun-clairs, les dents laniaires assez longues, les ongles fauves, un peu courbes et en rétrécissant du bout. La queue grosse a presque la longueur du corps. C'est le mâle que je viens de décrire, et que j'ai trouvé dans les forêts du Teffé, rivière latérale de Solimöens, près du village d'Egá.

5. *Cebus gracilis*. Tab. V.

Corpore gracili, supra brunneo-fulvo, subtus albicante; gula subbarbata; vertice et occipite brunneo-nigris; auriculis patentibus; capite oblongo; corpore pilis mollioribus vestito; dentibus caninis brevioribus.

Longitudo	trunci	1' 4"	ulnae	4 $\frac{1}{3}$ "
	capitis	3"	palmae	2 $\frac{1}{2}$ "
	faciei	1"	femoris	4 $\frac{1}{4}$ "
	caudae	1' 6 $\frac{1}{4}$ "	tibiae	5 $\frac{1}{2}$ "
	humeri	4"	plantae	4 $\frac{1}{3}$ "

Descriptio. Corpus attenuatum; pedes quatuor graciles, praecipue posteriores longiores; caput oblongum, postice valde dilatatum; facies incarnata, abbreviata nec non supra oculos nudiuscula; orbitae prosilientes; pili trunci molles, 1" longi, ad radicem albicantes, versus apicem rufo-brunnei, caudae eiusdem coloris, apicem versus pallidiores, pedum posteriorum extus fusciores, intus aequae ac in pedibus anterioribus flavo-albicantes, gulae, pectoris et abdominis anterioris albicantes, occipitis nigro-brunnei, capitis anterioris flavo-albicantes, frontis in medio lineam nigricantem subconspicuum exhibentes, in malis albo-lanuginosi, dorsi et capitis omnes retrorsum versi; auriculae nudiusculae, patulae; labia et mentum vibrissis albidis rarioribus obsita; abdomen inferius nudiusculum; digiti breviores, subaequales; pollex manus brevior, remotior, pollex plantae longiusculus, oppositus; ungues incarnato-albicantes, sublongi, subcurvati, apice obtusiusculi, pollicaris plantae pedis largior, apice subrotundatus. Foemina colore pallidiore, capillitio magis nigro.

Habitat in sylvis Teffé rami lateralis fluyii Solimöens.

V. LE SAPAJOU MAIGRE ET ALLONGÉ.

Les Indiens en parcourant les forêts de la grande rivière des Amazones, et en observant toutes les différences parmi les singes de leurs environs, parlent de ce singe comme d'une espèce

particulière, et lui donnent le nom de *Cairara*. C'est un des plus vifs, des plus gais et amusants Sapajous qui se trouvent au Brésil. Il a le corps et toutes les extrémités très maigres et presque plus allongées que les autres Sapajous. D'après sa taille on le croiroit être fait pour un mouvement continuel, au quel il s'exerce sans cesse en sautant d'un endroit à l'autre. Sa couleur est presque uniforme, fauve-brune en dessus, et blanchissante au dessous du corps. La femelle porte sur le sommet de la tête et à l'occiput une calotte presque noire; le mâle la porte brune; tous les deux ont une ligne brune dans le milieu du front, qui se prolonge jusqu'à la calotte. Le dos est aussi d'une couleur plus foncée vers le milieu, mais le devant de la tête, les extrémités antérieures et le bout de la queue sont d'un fauve plus clair. La gorge, la poitrine et les quatre pieds en dedans sont d'un jaune blanchissant. Les oreilles sont bien visibles, presque nues et oblongues, le bas-ventre et la face, excepté le menton et les lèvres qui sont veloutées et blanches, presque toutes nues. Le visage est d'une couleur de chair changeante et très vive. Les ongles sont fauves, courbés et obtus au bout. La plante des pieds est aussi de la même couleur de chair. La queue surpasse le corps en longueur. — Le *Cairara* habite en famille les forêts de la rivière des Amazones, ou plutôt de Solimöens, de la ville de Rio Negro vers le Pérou, et se nourrit comme tous les autres Sapajous principalement de fruits et d'insectes.

Species 6. *Cebus cucullatus*. Tab. VI.

Capite fuscescente; facie capillamento densissimo porrecto circumcincta; dorso medio et femore extus nigro-ferrugineis; lumbis, abdomine inferiore et femore intus ferrugineis; jugulo, lateribus colli, humeris, pectore et abdomine anteriore ochraceo-albicantibus; quatuor extremitatibus et cauda nigricantibus.

Longitudo trunci	1' 5 $\frac{1}{4}$ "	ulnae	3 $\frac{3}{4}$ "
capitis	3 $\frac{3}{4}$ "	palmae	2 $\frac{1}{5}$ "
faciei	1 $\frac{1}{3}$ "	femoris	5 $\frac{1}{3}$ "
caudae	1' 7"	tibiae	5"
humeri	4 $\frac{3}{4}$ "	plantae	4 $\frac{1}{4}$ "

Descriptio. Corpus robustius, supra et subtus confertim pilosum; facies incarnata, nudiuscula, involuero prominente circumcincta; digiti coccineo-incarnati, villosi; pili trunci anterioris 1 $\frac{1}{3}$ " longi, ad radicem nigri, ad medium rufi, ad apicem nigro-alboque variegati, trunci posterioris ad apicem rufi, in extremitatibus ad radicem nigri, ad apicem fusci, in capite ad radicem albicantes, in fronte, malis et mento ad radicem albicantes, ad apicem aterrimi, autorsum versi et in cucillum 1 $\frac{1}{2}$ " longum, prominentem, faciem circum involventem confluentes, in jugulo, pectore et humero omnino albicantes, in abdomine et femore intus et cauda subtus ad radicem aurantio-ferruginei, in reliqua cauda nigricantes; jugulum, pectus et abdomen quam maxime pilosa; labia albo-lanuginosa; auriculae maiusculae, subpilosae, flavicanti-albae; septum narium largum; ungues breviores, subcurvi, brunnei, pollicares pedum planiores.

Habitat in sylvis Provinciae S^t Pauli et Guyanae. Foemina est, quam descripsi.

VI. LE SAPAJOU À CAPUCHON.

Parmi tous les singes il n'y en a aucun qui soit aussi distinctement marqué par la nature que le Sapajou dit à capuchon. Tous les poils de la partie antérieure de sa tête se dirigent en avant, forment des espèces de rayons concentrés, et entourent comme d'un capuchon proëminent toute la face, presque jusqu' au dessous du menton. Cet animal est passablement robuste, d'un poil touffu et épais. Les quatre pieds et la queue sont presque noires, les dos entre les scapules, la tête et le capuchon brunâtres, les flancs, le bas-ventre et les cuisses en dedans ferrugineux, l'humérus, la gorge et la poitrine d'un roux-blanc. Les poils du dos sont noirs à leur racine, roux vers le milieu et noirs-fauves au bout ceux des quatre pieds au contraire noirs à leur origine et fauves au bout, excepté cependant ceux des doigts des mains qui sont gris. Les poils de la tête et du capuchon sont roux-blancs à leur naissance, et bruns-noirs vers la fin. Ceux du dessous du corps sont tous blancs ou roux. La face ainsi que les doigts des pieds sont d'un velouté et de la couleur de chair. Les lèvres et le menton portent une courte moustache blanche. Le capuchon consiste en poils qui partent du front, des joues et du menton, qui avancent et qui ombragent toute la face. Les oreilles quoique grandes, sont sur le devant presque toutes couvertes de poils. Les ongles sont petits et bruns; la queue poilue, forte et d'un gris-noir est presque aussi longue que le corps. Les yeux sont d'un brun clair. J'ai trouvé ce singe dans les forêts de S^t Paul. Le Musée général de Munich possède encore un autre individu de cette espèce, bien mieux conservé qui est probablement originaire de la Guiane et qui étoit chez un maître de Ménagerie. Ces individus sont tous deux femelles; ils ont la même taille, la même couleur, mais dans l'un le capuchon est encore dans un meilleur état.

Familia 1. TRICHURI.

Genus 2. Brachyurus.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Cauda non volubili, abbreviata.

Descriptio. Simia subrobusta, diurna, gregaria, vociferans; cauda abbreviata, tota pilosa, non volubilis; tylia tecta; caput maiusculum, subelevatum; dentes canini supra infraque 2 crassiores, exserti, incisivi supra infraque 4, praecipue superiores a caninis valde remoti, in linea subrecta positi, ad extus oblique porrecti, medii planiores, exteriores minores subtriquetri, inferiores longissimi, approximati, tenuiores, exteriores interioribus paululum planiores ac fere uti in lepore oblique ascendentes; molares supra infraque in utroque latere 6, breves; maxilla inferior postice admodum elevata; quatuor pedes aequales; testiculi praegraves; penis glandifer, glans oblonga, cirrhis plurimis hispida; corpus caeteroquin Cebo simile.

Species 1. Brachyurus Israelita. Tab. VII.

Barbatulus; barba densa, subcrispa, nigra, ab auribus usque ad mentum decurrente; capite, cauda nec non quatuor pedibus nigris; dorso fulvo; abdomine subpiloso, nigricante; cauda corpore tertia parte brevior.

Longitudo trunci a fronte usque ad radicem caudae	1' 6"	ulnae	4 $\frac{1}{2}$ "
capitis	4"	palmae	3 $\frac{3}{4}$ "
faciei	2"	femoris	5 $\frac{1}{2}$ "
caudae	1' 1 $\frac{1}{2}$ "	tibiae	6 $\frac{1}{2}$ "
humeri	4 $\frac{1}{2}$ "	plantae	4 $\frac{1}{4}$ "

Descriptio. Corpus subrobustum; caput maiusculum, oblonge rotundatum; pili corporis, exceptis barba et cauda, breviores, subdensi, in dorso integre-ferruginei, decumbentes, in capite quasi tonsi, ad radicem aequae ac in cauda brunneo-ferruginei, ad apicem nigri, in quatuor pedibus plus minusve brunneo-nigricantes, ad manus maris plantasque fuscis, e vertice undique divergentes, auriculas nudas vix emarginatas e vertice obtegentes, in collo usque ad aures nudiusculo et in abdomine subpiloso nigri, in testiculis crassissimis, nudis, incarnatis supra ad radicem conferti, nigri, in barba a margine maxillae inferioris usque ad gulam confertim aequae ac in cauda brevioribus defluentes, longiores, nigri; facies oblongiuscula, subnuda, nigra, ad buccas, labia, mentum, praecipue frontem vibrissis longioribus nigris, ad tempora pilis minutis nigris rariusculis obsita; oculi septo narium interposito crassiore remoti; quatuor pedes subaequales; ungues subbreves, subcurvi, subangustati, in pollicibus manus pedisque planiores; tylia nuda; quatuor pedes maris magis rufi, foeminae magis nigricantes; angulus facialis et cerebralis 50°, altitudo frontis 7 $\frac{1}{2}$ ".

Habitat ad Rio-Negro.

I. LE COURTE-QUEUE JUIF.

On a toujours cru jusqu'à présent, que les singes sans queue ou à queue courte étoient originaires de l'ancien continent. Cependant nous avons trouvé au Brésil deux espèces de singes, qui ont la queue très courte. La première a la queue un peu plus longue que celle

que nous allons de décrire tout de suite et elle en diffère en ce, qu'elle a une forte barbe, des poils courts et crépus sur la tête, plus longs et de couleurs variées sur le reste du corps. Toute sa tête ainsi que sa nuque sont noires. Sa barbe qui est grande et épaisse, se prolonge depuis le dessous des oreilles jusqu'au bas du menton. La chevelure est noire, presque toute crépue et à partir du sommet de la tête se dirige comme des rayons, vers le derrière et les côtés de la tête, de manière qu'elle couvre à moitié les oreilles qui sont nues, noires, médiocrement longues; le reste se trouve à peine couvert de quelques poils noirs et renversés. Le sommet de la tête paroît alors couvert comme d'une calotte de prêtre. Les poils du dos sont très épais, peu longs, d'un roux jaunâtre, ceux des côtés d'un fauve plus foncé. Les quatre extrémités sont d'un brun noir, si l'on en excepte cependant les mains et le bout des pieds qui sont roux. La queue qui est presque de la longueur du corps, est très touffue, mince à son origine, plus large et presque comme coupée à son extrémité. Les poils sont roux-bruns à leur racine, et noirs au bout. Quelques petits poils noirs couvrent en partie les joues, les lèvres et le menton ainsi que le reste de la face qui est entièrement noire. Les yeux sont d'un brun foncé et éloignés l'un de l'autre par la grande largeur du nez. La gorge porte peu de poils bruns, mais la poitrine et le bas-ventre sont totalement nus. Les quatre extrémités sont passablement courtes et de même longueur, les doigts courts, les ongles noirs et presque pointus. Cependant l'ongle de chaque grand doigt des mains et des pieds n'est plus large que ceux des autres, et l'un est parfaitement égal à l'autre. Au reste ce qui dans ce singe étonne le plus l'observateur, c'est la grosseur enorme des testicules du mâle, qui ne sont couverts de quelques poils noirs, que vers leur naissance et à la surface.

La direction et la forme des dents incisives n'est pas moins remarquable, en ce qu'elles sont extrêmement éloignées des dents canines, et quelles avancent en avant comme chez les rongeurs. Les supérieures sont aplaties et pas si longues que les inférieures qui sont presque effilées. Les lanaires sont fortes et très aigues. On trouve ce singe vers le Pérou dans les forêts de Japura rivière laterale de Solimöens.

Species 2. *Brachyurus Ouakary*. Tab. VIII.

Imberbis; cauda brevissima femoribusque ferrugineis; capite et quatuor extremitatibus nigerrimis; dorso brunneo-flavescente; pilis ab occipite antrorsum vergentibus, in fronte distichis.

Longitudo trunci	1' 7 $\frac{1}{4}$ "	ulnae	4 $\frac{3}{4}$ "
capitis	3 $\frac{3}{4}$ "	palmae	4"
faciei	2"	femoris	6 $\frac{3}{4}$ "
caudae	5 $\frac{3}{4}$ "	tibiae	5 $\frac{3}{4}$ "
humeri	6 $\frac{1}{4}$ "	plantae	5"

Descriptio. Corpus subrobustum; extremitates paulo longiores quam in specie praecedente; caput ovatum; cranium oblongum, subelevatum; facies nigra, nudiuscula, vibrissis nigris longioribus obsita; regio supra oculos, praecipue inter pilos frontis distichos intermedia nuda; auriculae nudaе, exsertae, ab oculis remotissimae, magis retrorsum positae; regio ante aures nuda, circa tempora nudiuscula; dentes incisivi magis porrecti et medii superiores longiores illis speciei praecedentis; pili dorsi longiores, flavo-ferruginei, versus caudam vero ferruginei, decumbentes, capitis nigerrimi, relucentes, in nucha undique divergentes, ad malas et buccas

nigri, longiores, versus gulam vergentes, in barbam vero non confluentes, in pede anteriore usque ad manus nigri, in humero et latere ulnae exteriori extrorsum versi, in femore usque ad medium tibiae rufi, extrorsum longe decumbentes, in reliqua tibia et planta pedis nigri, in cauda brevissima, apice truncata, obtusa rufi, longiores, retrorsum et deorsum dependentes, in collo versus aures rariores, in pectore fusco-nigricantes, in abdomine nudiusculo rufescentes; regio circa anum et ad radicem caudae nuda; testiculi subcrassi, nigri, supra rufo-pilosi; penis glans cirrhis plurimis hispida; unguis longiores quam in praecedente specie, subarcuati, ad latera subcompressi, in pollice manus pedisque sublargi.

Habitat in sylvis fluminibus Solimöens et Iça interjectis. Animal juvenile eodem colore ac adultum est cauda modo magis nigrescente.

II. LE COURTE - QUEUE OUKARY.

L'espèce de singe, à la quelle le nom Ouakary est appliqué par les habitans, est la seconde à courte queue, que nous ayons trouvé au Brésil vers le Pérou dans les forêts sur les bords d'Iça, rivière latérale à celle de l'Amazone. Les singes de cette espèce vivent toujours en troupes, principalement dans les forêts qui longent la rivière. Pendant la journée ils remplissent les bois de cris perçants et bisarres. Ce singe d'une taille médiocre se signale par la queue très courte presque coupée et en même temps par les dents incisives très longues et dirigées comme celles des lapins, c'est à dire, proéminentes et fort avancées. Sa tête, ses pieds, le cou et la poitrine sont noirs, les cuisses, la queue et le bas-ventre roux d'écureuil, le front sauve. Les poils du devant de la tête sont dirigés en avant, vers le front et le dessous du menton; ces mêmes poils se séparent sur le front en deux parties. Ceux du dos et des cuisses sont bruns et longs, ceux de la queue pendent en bas. La face est noire et presque nue jusqu' au milieu du front, malgré quelques poils roides et noirs, qui sont semés çà et là sur le visage. Les oreilles petites et noires sont presque tout couvertes des poils du sommet de la tête. Tous les poils de la tête se croisent sur le milieu de la nuque. La lèvre supérieure est très large, le nez très court, et les yeux sont bruns, les testicules extrêmement gros, les ongles noirs, minces et courbés, et celui du gros doigt est même un peu large. Il est distingué de l'espèce précédente par l'absence de la barbe.

Familia I. TRICHURI.

Genus 3. *Pithecia*, *Jlliger*, *Geoffroy*, *Humboldt*.
Saki, *Buffon*, *Audebert*, *Cuvier*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Cauda non volubili, villosa.

Descriptio. Simia gregaria, vociferans, praecipue ante solis ortum et post eius occasum in sylvis humidis obambulans. Corpus villosissimum; caput modo, manus plantaeque pilis admodum brevibus obsitae; facies subpilosa, porrecta; frons subdepressa, declivis orbitaeque paululum supinae; dissepimentum narium latissimum; auriculae breviores, nudaе; dentes incisivi supra infraque 4, a caninis remoti, inferiores longiores, approximati, proclivi, superiores breviores, convergentes, intermedii subproclivi, planiusculi, exteriores minores, triquetri, magis retropositi; canini supra infraque 2 validiores, subaequales, exserti, superiores retrovergentes; molares supra infraque 12; pedes anteriores posterioribus breviores; ungues apice acutiusculi, prosilientes; unguis pollicis manus pedisque planiores.

Species 1. *Pithecia hirsuta*. Tab. IX.

Corpore villosissimo, nigro; pilis longissimis, nigris, ad apicem plus minusve undulatis, excepto latere tibiae interno albicantibus aut rufescentibus, capitis brevioribus, brunneo-nigris vel nigro-brunneis, infumatis, subcrispis, ad gulam in barbam disticham mediocrem confluentibus; manibus plantisque flavo-atis.

Longitudo trunci	1' 5 $\frac{3}{4}$ "	ulnae	5 $\frac{3}{4}$ "
capitis	3 $\frac{1}{2}$ "	palmae	5"
faciei	1 $\frac{1}{2}$ "	femoris	6"
caudae	1' 6 $\frac{1}{3}$ "	tibiae	5 $\frac{3}{4}$ "
humeri	4"	plantae	4 $\frac{1}{2}$ "

Descriptio. Corpus attenuatum, supra villosissimum; cauda corpore vix longior; pili trunci et caudae subrigidi, 3 pollices longi, nigerrimi, versus apicem antrorsum curvati, albo-rufescentes, ad latera dorsi defluentes, in femore et brachio magis extrorsum, in tibia deorsum versi, in nucha decussati, retrorsum supra occiput, auriculas, humerum ac collum defluentes, in capite brevissimi, subrasi, ad radicem nigri, ad apicem fuliginosi, a vertice in frontem, a malis antrorsum et in gulam confertim vergentes, in fronte non bipartiti, in manibus plantisque brevissimi, pallide fuliginosi, in pectore longiores nigro-rufescentes, in abdomine, praecipue in latere humeri et femoris interno rariore, nigri; collum subtus nudiusculum; facies abbreviata, subnigra, supra oculos, in naso mentoque nudiuscula, in genis mystace brevi setaceo, sordide albicante, e cantho oculi interno usque ad angulum oris decurrente et dein retroverso, nec non in labiis vibrissis albidis obsita; auriculae oblongae nudaе; dentes incisivi inferiores superioribus longiores, tenuiores; tylia, regio ani et versus caudae radicem ac femur intus subcalva; pedes anteriores posterioribus breviores; digiti graciles praecipue pedis elongati, pollex manus pedisque brevis, a reliquis remotus; ungues breviores, convexi, compressi, pollicis pedis nec non manus planiores; angulus facialis 47°, cerebralis 44°; altitudo frontis 6".

Habitat in sylvis fluminis Solimöensis et Negro interjacentibus. Juvenis eodem colore et structura adulti, pilis modo frontis longioribus, manus pedisque albicantibus differt.

I. LE SAKY - OURS.

Les habitans appellent *Paraoud* tous les singes enveloppés dans une chevelure très touffue. Ces singes remarquables par leur fourrure semblable à celle des ours, sortent le matin et le soir des forêts, et toujours rassemblés en grandes troupes font retentir l'air de leurs cris perçans. Ils sont très alertes et attentifs, et le chasseur les attrape avec bien de la peine. Au moindre bruit ils s'enfuient avec grande agilité et se retirent dans l'intérieur des forêts, aux frontières des quelles ils ont soin de se tenir. Cependant, une fois apprivoisés et élevés domestiquement, ils sont très attachés à leurs maîtres, ils s'approchent de lui toutes les fois qu'ils le voyent manger, et s'y réfugient même lorsqu'ils sont effrayés. Nous avons rencontré ces singes avant *Tabatinga* sur les bords de la rivière *Touantin* et *Japura*, bras latéraux de *Solimöens*, d'ou nous en avons rapporté un jeune, que nous avons conservé, jusqu'à ce qu'un catharre et une tumeur aux glandules de la gorge le firent mourir.

Ces singes ont les poils du corps et de la queue très touffus et même frisés. L'espèce que nous allons d'écrire et à laquelle les Indiens donnent le nom du grand *Paraoud* (*Paraouaçu*) pour la distinguer d'une autre plus petite, est totalement noire; elle a les poils longs d'environ trois pouces, crépus et touffus vers le bout, blanchâtres et même comme brûlés aux derniers points en différents endroits. Les pieds et les mains diffèrent du corps en ce qu'ils sont raux et rasés, tandis que des poils longs flottent de haut en bas; ceux de l'avant pied ne sont pas ondulés et tombent droit en bas. Le devant de la tête est aussi comme rasé n'ayant que de très petits poils noirs, un peu raux vers le bout. Les poils longs et ondulés du col et de l'occiput tombent sur le devant de la tête et forment une espèce de capuchon qui en même tems couvre les oreilles; celles-ci sont courtes et environnées de parties nues. La figure est un peu allongée, maigre et noirâtre. Les ouvertures nasales sont séparées par un intervalle très large. L'avant front est couvert de poils blancs et roides, et de semblables poils se dirigent en forme de moustache depuis l'angle intérieur des yeux jusqu'à l'angle de la bouche en traversant par dessus la joue. De plus, une espèce de barbe en poils courts et gris tombe dans la même direction que ceux de l'avant tête, jusque sur les bords de la mâchoire inférieure. La gorge et ses alentours sont presque nus. Les dents incisives sont semblables à celles du singe à courte queue, mais très longues, très éloignées des canines et fortement inclinées en avant. Les dents canines sont moindres que celles de l'espèce précédente. La poitrine est pelue et noire, le bas-ventre presque nud, et les flancs seulement sont garnis de poils extrêmement longs et flottans. La queue est très touffue et presque plus longue que le corps. Les doigts des pieds et des mains sont minces, les ongles noirâtres, courbés, étroits et extrêmement minces du bout, il faut cependant excepter les ongles du grand doigt des pieds qui sont plats et oblongs. Les jeunes singes de cette espèce sont de la même couleur que les grands, si ce n'est que les poils de la tête ne sont pas encore rasés, mais bien longs. J'ai trouvé ce singe sur les bords d'un bras latéral à la rivière *Solimöens*, près de *Tabatinga*, ou il aime fort à manger des insectes et de certains fruits nommés *Inca*; on l'entend de très loin le soir et le matin, car à ces époques du jour il se plaît à faire un bruit sourd et semblable à un babil.

Species 2. *Pithecia inusta*. Tab. X.

Imberbis, villosa; capite, manibus plantisque ochraceis, subrahis; reliquo corpore villosissimo, nigro; collo subtus ferrugineo; pectore et abdomine nigris.

Longitudo	trunci	1' 4"	ulnae	5 $\frac{1}{2}$ "
	capitis	3"	palmae	2 $\frac{3}{4}$ "
	faciei	1 $\frac{1}{4}$ "	femoris	4 $\frac{1}{2}$ "
	caudae	1' 7"	tibiae	6"
	humeri	5 $\frac{3}{4}$ "	plantae	4"

Descriptio. Corpus et caput minus robusta quam in specie praecedente; pili trunci, pedum et caudae 2 $\frac{1}{2}$ " longi, nigerrimi, ad radicem brunnei, ad apicem ferruginei, haud raro aliis minoribus apice albis mixti, ad latera dorsi, supra collum, humerum longiores, fluctuantes, in brachio et tibia subbreves, deorsum incumbentes, in abdomine et pectore rariores, in collo subtus brunneo-rufescentes, in capite, manu plantaque pedis minuti, pallide ochracei, a vertice in frontem antrorsum, a malis usque ad gulam confertim defluentes. Facies et mentum atra, ochraceo-lanuginosa; auriculae nudae, pilis longioribus ab occipite decumbentibus obtectae; ungues et dentes ut in specie antecedente.

II. LE SAKI BRÛLÉ.

Le Saki brûlé, qui est tout aussi noir que le précédent, lui ressemble beaucoup et n' en diffère que par la taille d'un tiers plus petite, et par la tête entièrement de couleur ferrugineuse. Il n'a pas aussi le crane allongé, mais plus court et saillant; la face est plus oblongue et presque pointue. Les yeux ne sont pas si grands, et plus écartés, les dents laniaires moins fortes, les poils du corps très longs, irrégulièrement flottants, comme frisés et en quelques endroits tachetés de roux à leurs points; sa gorge, sa poitrine, son bas-ventre sont tout nus. Les joues, la partie inférieure des yeux, la barbe, les mains et les pieds sont de la couleur d'ocre. On pourrait le nommer Ochrocéphale; mais comme il y a déjà une autre espèce de singes ainsi dénommée, nous l'avons appelé Brûlé à cause des taches presque de feu, ou pour mieux dire rouilleuses au bout de son poil.

Il se trouve aux forêts de Tonantín, petite rivière de Solimöens près de Tabatinga.

Species 3. Pithecia capillamentosa. Tab. XI.

Subbarbata; fronte et facie atris, subrasis; vertice, dorso et cauda capillosis, nigro-brunneis; collo, pectore et abdomine lanatis, fulvis; manibus plantisque pedis nigris, subrasis.

Longitudo	trunci	9"	ulnae	2 $\frac{1}{2}$ "
	capitis	2 $\frac{3}{4}$ "	palmae	2"
	faciei	$\frac{3}{4}$ "	femoris	2 $\frac{1}{2}$ "
	caudae	10 $\frac{3}{4}$ "	tibiae	4"
	humeri	5"	plantae	5 $\frac{3}{4}$ "

Descriptio. Corpus parvum, villosissimum; cauda villosissima, corpore vix longior; pili dorsi, occipitis et caudae 3" longi, decumbentes, brunneo-nigri, rigidi, in capite et humero apice rufescenti-albicantes, in vertice undique in dorsum humerumque longe radiantes et frontem usque ad medium capillamenti adinstar obtegentes, in fronte, temporibus et malis breviores, albicanti-cinerascentes, antrorsum vergentes, a malis versus gulam

in barbam disticham, mediocrem confluentes, supra oculos ad apicem frontis retroversi, in brachio et tibia subbreves, nigricantes, in manibus pedibusque omnino nigri, in pectore et abdomine lanati, fulvi; facies atra, obtusa, circa nasum nudiuscula, in labiis et mento vibrissis albicantibus, nigris immixtis, in genis mystace sordide albicante obsita; auriculae rotundae, nudaе, capillamento capitis obtectae; gula nudiuscula; dentes incisivi superiores medii plani, breviores, admodum prominuli, exteriores minores retropositi, inferiores approximati, longiores, vix proclivi, canini mediocres, aequales; pollex pedis sublongus, oppositus, manus brevior, unguis paululum conuexi, prosilientes, apice acuti, pollicis, praecipue manus planiores.

III. LE SAKI À PERRUQUE.

Le Saki à perruque est la moitié plus petit que le Saki brûlé; on le distingue de toute autre espèce par la triple coëffure qui couvre sa tête. Celle de derrière est formée de poils brun-noirs qui en se croisant sur le sommet de la tête et en retombant de tous les côtés couvrent les oreilles et une partie du front en imitant la forme d'une perruque. La seconde se compose de poils très courts tirants sur le front et dirigés en avant; elle s'étend sur le milieu du front et forme en se prolongeant sur les joues et vers le menton une barbe grisâtre et touffue qui pend aux deux côtés du menton. La troisième est la plus petite et occupe le bout du front; c'est un mélange de petits poils grisâtres et de poils noirs et roids dirigés en arrière. Son poil en général est très touffu et enveloppe tout le corps. Une bande de poils gris-blancs se prolonge depuis l'angle intérieur des yeux jusqu'à l'angle de la bouche. Les poils du dos et des cuisses sont extrêmement longs, presque roids, brun-noirs et à la fin un peu roux. Ceux de la queue de la même longueur sont roux à la racine et ensuite brun-noirs. Ceux des avant-pieds sont un peu plus courts, noirs et au bout de la couleur de rouille. Ceux des mains et des pattes sont entièrement noirs et très courts. Sa gorge est presque nue, la poitrine et le bas-ventre velus et de couleur fauve. Les oreilles cachées par les poils de la tête sont petites et nues. Les lèvres et le menton tirant un peu sur le blanc; la face est couverte de poils roids et presque blancs; le nez est noir, les dents canines sont égales, les incisives supérieures moyennes sont aplaties et proéminentes, les ongles noirs, étroites et pointus, ceux du pouce de la main et du pied plus larges.

Familia I. TRICHURI.

Genus 4. *Callithrix*, *Eraxleben*, *Geoffroy*, *Humboldt*, *Illiger*.
Sagoïn, *Buffon*, *Audebert*.
Simia, *Linné*, *Schreber*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Simia diurna, cauda non volubili, comosa, subtenui.

Descriptio. *Simia* Cebos inter et Jacchos intermedia; corpus supra et subtus subvillosum, medioere vel subgracile; caput medioere, subovatum, supra depressiusculum; nasus subgibbus; aures subpatulae; dentes canini supra et infra 2 mediocres, vix exserti, ab incisivis vix remoti; incisivi superiores medii recti aut subobliqui, exterioribus magis planiusculi, exteriores breves subtriquetri, retropositi, inferiores superioribus longiores, approximati, oppositi, semieirculares, vel paululum proclivi, caninis contigui; molares supra infraque 12, posteriores in superficie excavati; cauda subcrassa, comosa, non prehensilis, corpore laud brevior; digiti subgraciles; pollex manus brevis, pollex pedis breviusculus, oppositus; ungues subareuati, breviores, subtegulares, subconvexi, apice acuti; unguis pollicis planiusculus.

Species 1. *Callithrix personata*. Tab. XII.

Subbarbata; capite, manibus pedibusque nigerrimis; occipite et nucha ochraceo-ferrugineis; cauda castaneo-rufa; trunco et quatuor pedibus subfuliginoso-fulvis; abdomine subpiloso; auriculis breviusculis, subtectis, truncato-marginatis.

Longitudo	trunci	1' 3"	ulnae	2 $\frac{3}{4}$ "
	capitis	5"	palmae	2"
	faciei	1 $\frac{1}{3}$ "	femoris	4"
	caudae	1' 5 $\frac{1}{2}$ "	tibiae	4 $\frac{3}{4}$ "
	humeri	5 $\frac{1}{2}$ "	plantae	5 $\frac{3}{4}$ "

Descriptio. Corpus medioere, dense comosum; pili dorsi, quatuor pedum et occipitis 2 $\frac{1}{2}$ " longi, ad radicem fuliginosi, ad apicem fulvo-brunnei vel fulvo-fuliginosi, ferrugineis minoribus interdum mixti, decumbentes, in pede anteriore, tibia antee, pectore, occipite et nucha versus apicem rufescentes, breviusculi, in capite nigerrimi, breviores, subrecti, subrigidi, a malis ad gulam in barbam medioerem, lateralem, in medio gulae disticham confluentes, in manibus pedibusque nigerrimi, in pedibus posterioribus longiusculi, cinereo-brunnei, in pedibus anterioribus rufescentes, in cauda corpore longiore breviores castaneo-rufi, subrecumbentes, in abdomine villosa fusco-brunnei, pallidiores; facies supra oculos, ad nasum et genas nudiuscula, ad labia setis albicantibus et vibrissis nigris obsita; auriculae breviusculae, ad marginem nigro-villosae, extra pilos vix conspicuae; pedes posteriores anterioribus admodum longiores; digiti breviusculi, pollices pedum, praecipue manuum breves; ungues subminuti, subconvexi, in pollice pedum paululum planiores.

Habitat in provincia Rio de Janeiro.

I. LE SAGOIN A TÊTE ET MAINS NOIRES.

Eraxleben est le premier qui ait appliqué les noms de *Cebus* et de *Callithrix* aux singes d'Amérique. Comme il joint pourtant des singes tout différents, M. Geoffroy et M. Humboldt ont adopté non seulement ces deux genres, mais encore en ont créé de nouveaux. Malgré ce changement, que les naturalistes doivent regarder comme très juste, le *Saimiri* paraît appartenir au genre *Cebus* à cause de la hauteur de sa tête et de toute la conformation de son corps. Les *Callithrix* n'ont ni la force ni la grandeur des *Cebus*. Leur tête est aplatie, la face plus allongée, le pelage beaucoup plus touffu et les pieds antérieurs sont plus courts. Les dents incisives de la mâchoire supérieure avancent un peu, et sont de médiocre grandeur; les canines sont petites et égales, et enfin la mâchoire plus élevée de derrière. En général tous les caractères placent les *Callithrix* entre les genres *Cebus* et l'*Ouistiti*, mais ils se rapprochent aussi, à cause de la position des dents, aux *Sakis*, dont ils diffèrent pourtant sous bien des rapports, entre autres par le poil du corps et principalement de la queue, qui est moins touffue que chez les *Sakis*, par la face grêle, par le nez moins gros, aquilin et plus nud, et par la petitesse des dents canines. Du reste la légèreté leur est commune avec l'*Ouistiti*. Le *Sagoïn* à tête et mains noires est caractérisé par la couleur entièrement noire de la tête, des mains et des pattes, tandis que la queue est d'un rouge châtain; son pelage est très touffu, brun foncé à la racine et brun clair à la surface du dos, et jaune roux en arrière de l'occiput, en plus à toute la nuque, ainsi que sur les côtés extérieurs des bras et du devant des jambes. Les pieds et les mains jusqu'aux avant bras sont entièrement noirs. La face est aussi de couleur noire, grêle et parsemée de poils blancs, principalement sur les lèvres et le menton. Les poils noirs entourent la tête jusqu'au menton, d'où ils tombent de chaque côté, et pendent en bas. Les doigts et les mains sont petits; le pouce est très raccourci, ainsi que les ongles qui finissent en points, ceux du grand doigt des pieds postérieurs sont un peu aplatis. La queue, qui est toute rouge, est de la longueur du corps. La présente description est celle d'un mâle que j'ai trouvé dans les forêts qui avoisinent la capitale de Rio de Janeiro.

Species 2. *Callithrix amicta*. Geoffroy. Tab. XIII.

Imberbis; dorso nigro-castaneo; fronte, cauda et quatuor pedibus nigricantibus; manibus aurantiis; jugulo albo.

Longitudo	trunci	1' 3½"	ulnae	3½"
	capitis	3"	palmae	2½"
	faciei	1"	femoris	4½"
	caudae	1' 7½"	tibiae	4½"
	humeri	3"	plantae	4"

Descriptio. Corpus mediocre, subcomosum; cauda corpore longior; pili dorsi 1½" longi ad radicem fuliginoso-fusci, lanuginosi, in medio et apice rufo-castanei nigroque variegati, capitis breviores, rufo-castanei, retrorsum versi, occipitis suberecti, frontis, temporum, malarum aequae ac extremitatum nigri, caudae sublongi, brunneo-nigri, decumbentes, manus breves, pallide aurantii, inter digitos pedum posteriorum rariores, aurantii, juguli et pectoris collaris albi adinstar usque ad aures excurrentes; facies nec non regio supra oculos nudiuscula, incarnata; genae, malae, labia et mentum albo-lanuginosa, vibrissis nigris rarioribus instructa; auriculae ovatae, ad marginem brunneo-pilosae; abdomen subpilosum, brunneo-nigrum; digiti et ungues uti in specie praecedente, excepto manus pollice longiusculo; angulus facialis 55°; cerebralis 45°; altitudo frontis 3½"

Foemina corpore quidem et cauda brevior eodem tamen colore ac mas, exceptis fronte usque ad verticem nigra, dorso et femore magis brunneis et collari albo angustiore.

Habitat in sylvis Olivençae pagi flumini Solimöens adjacentis.

II. LE SAGOIN À COLLIER BLANC.

Messieurs Humboldt, Geoffroy et Hoffmannsegg ont fait conôître trois espèces de Sagoins, (*Callithrix torquata*, *lugens*, *amicta*) qui ont à peu près les mêmes caractères. Cependant M. Kuhl paraît avoir raison lorsqu'il prétend, qu'il n'en existe qu'une seule espèce. Puisqu'il n'y a pas encore un dessein de Sagoin à Collier blanc (*Callithrix amicta*, Geoffr. Humbt.), j'ai cru utile à dessiner l'individu, que je vais décrire. Celui-ci a l'occiput, le tronc de couleur marron foncé, et les quatre pieds ainsi que la queue d'un noir luisant ou même d'un brun très foncé, l'avant front, les tempes, le tour de la face jusqu'à la gorge de couleur grisâtre tirant sur le noir. Le milieu de la gorge, le dessous du cou et le commencement de la poitrine forment un collier blanc. Les mains sont d'un jaune d'orange, les pieds noirs parsemés de quelques poils jaunes mêlés. Le bas-ventre a aussi quelques poils bruns foncés; les oreilles sont larges, très visibles et garnies de poils noirs. Le dessus des yeux, le reste de la face sont nus mais d'une teinte rougeâtre, les joues, les lèvres et le menton d'un blanc lanugineux. Ces singes ont le nez aquilin et les narines peu éloignées l'une de l'autre. Les poils des pattes sont longs et roides, ceux qui sont sur le dos, ont plus de deux pouces de longueur; les ongles sont pointus, petits et à moitié saillans. Cette espèce de singes vivant dans la domesticité est timide et retirée; lorsqu'elle s'éloigne beaucoup de sa patrie, elle devient mélancolique, ne mange plus ni viande, ni riz cuit, et meure quelquefois en très peu de temps. La femelle et les jeunes ont la queue moins noire, et le dos au lieu d'être roux, est plus varié et tire plus sur le brun. Ces singes habitent les forêts de la rivière Solimöens près du Pérou.

Species 3. *Callithrix cinerascens*. Tab. XIV.

Imberbis; corpore graciliori, subeomoso; malis subbarbatis; dorso et occipite brunneo nigroque variegatis; cauda nigricante; fronte, quatuor pedibus, corpore subtus nigro-cinerascentibus; facie subminuta.

Longitudo trunci	1' 5"	ulnae	4"
capitis	2 $\frac{1}{3}$ "	palmae	2"
faciei	$\frac{5}{4}$ "	femoris	3 $\frac{3}{4}$ "
caudae	1' 6"	tibiae	4 $\frac{1}{2}$ "
humeri	2 $\frac{3}{4}$ "	plantae	3 $\frac{1}{2}$ "

Descriptio. Pili dorsi et occipitis 1 $\frac{1}{4}$ " longi, ad radicem fuliginosi, versus apicem nigro ferrugineoque variegati, capitis breviores, cinerascens, retrorsum versi, corporis subtus subpilosi ad radicem et apicem albicantes, in medio nigro-annulati, quatuor extremitatum ad radicem brunnei, in medio nigro-annulati, ad apicem albicantes, manuum pedumque breviores, cinereo-nigricantes, caudae pallide brunnei ad radicem, in medio interdum albicantes, versus apicem nigri; facies minuta nec non supra oculos nudiuscula, pilis erectioribus nigro-cinereis in malis subbarbatis vestita, in genis albo-cinereo subpilosa pilis minoribus retrovergentibus; labia

albo lanuginosa, vibrissis nigris interstincta; auriculae breviusculae, basin versus emarginatae, ad marginem pilosae; ungues nigro-fusci, breviores, ad apicem subacuti; dentes primores superiores intermedii lati, subrotundati, subdistantes a lateralibus minoribus et tenuioribus, inferiores attenuati, longiores, approximati.

III. LE SAGOIN À COULEUR DE SOURIS.

Ce singe a presque la taille du Saimiri. Son occiput et le dos sont d'un gris rougisant, l'avant front, les quatre pieds et le dessous du corps d'un gris de souris et la queue noirâtre. La tête est très allongée, la face aiguë, brunâtre, nue sur les sourcils et sur le nez, et du reste revêtu de petits poils cendrés, entremêlés de quelques poils roides noirs; des poils plus longs cendrés rayonnent autour l'extérieur de la face presque jusqu'à la gorge; les poils du corps ne sont pas si longs comme chez les autres espèces de ce genre. Les oreilles sont un peu tronquées, nues en dedans et très pelues en dehors. Les mains et les pattes portent la même couleur que le reste des pieds; les dents et les ongles ont presque la même forme que ceux de la précédente espèce. J'ai trouvé ce singe dans les forêts de la rivière Putomai ou Iça aux frontières du Pérou.

Species 4. Callithrix nigrifrons. Tab. XV.

Imberbis; corpore comoso, griseo-fuscescente; fronte et manibus nigris; metatarso ferrugineo; digitis nigris; vertice et occipite flavicanti-albis; cauda rufa, apice albicante; femoribus rufescentibus; auriculis longioribus, subpatulis; gutture pallidiore; abdomine pilosiore; pollice manus subelongato.

Longitudo trunci	1' 2''	ulnae	5''
capitis	2½''	palmae	2''
faciei	¾''	femoris	5''
caudae	1' 5½''	tibiae	4¾''
humeri	3¼''	plantae	5½''

Descriptio. Corpus mediocre, supra et subtus villosissimum; pili corporis 2'' longi, recumbentes, griseo-brunnei, ad radicem brunneo-nigri, ad medium fuscescentes, ad apicem nigricante brunneoque annulati, caudae longiusculi, rufi, versus eius apicem albicantes, femoris rufescentes, pedum anteriorum griseo-rufescentes, in metatarso rufi, in manibus et digitis pedum nigerrimi, in occipite et vertice molles, longiusculi, sordide albicantes, in fronte nigri, retrorsum versi, circa malas comosi, nigricantes, in collo subtus, in pectore et abdomine conferti, pallide rufescentes; nasus nudiusculus; facies atra, albo-lanuginosa vibrissis nigris intermixtis; regio supra oculos pilis vestita; tempora et malae villosissima; auriculae longiusculae, ad marginem nigro-pilosae, ad basin truncatae; ungues nigri, breviores quam in specie praecedente.

Habitat in provincia Minas Geraes ad flumen das Ouças sylvas maritimas inter et Campos agrestes intermedium. Foemina statura maris, fronte vero minus nigra, vertice minus albo, occipite nec non malis et brachio cinerascens, caudae apice magis albicante, metatarso laud rufo.

IV. LE SAGOIN À FRONT NOIR.

Ce Sagoïn a quelque ressemblance avec celui que nous nommons Sagoïn à tête et mains noires, mais le mâle et la femelle, que j'ai heureusement rapportés, ont tous deux les mêmes caractères, qui les distinguent du précédent, c'est à dire, ils ont seulement le front noir et l'occiput jaune clair; ainsi il n'y a pas plus de doute, qu'ils soient deux espèces séparées. Il existent pourtant encore d'autres différences qui séparent ces deux espèces l'une de l'autre, par exemple, les poils du singe précédent sont d'une seule couleur, et ceux de celui-ci dont il est question, sont variés de roux, noir et blanc; le dernier n'a pas la tache rouge à la nuque et les mains et les pattes pas tout noires, mais tachetées de roux au milieu. La queue du Sagoïn à tête et mains noires est d'un roux pâle, et celle de l'autre d'un roux luisant, semblable à celle d'Écureuil, et tachetée vers le bout d'un blanc gris et sale. Le tour des joues antérieures du premier est totalement noir, celui-ci au contraire a sur cette même partie des poils gris-bruns, très courts. Le mâle diffère de la femelle en ce que celle-ci est plus grosse, que la tache noire de son front est plus restreinte, que celle qui réside sur la partie postérieure de la tête et qui est blanche chez le mâle, est plus pâle, et que les poils qui entourent la face sont gris chez la femelle, tandis que le mâle les a plus noirs.

Species 5. Callithrix Gigot. Tab. XVI.

Corporis mediocri, villosi, brunneo-cinerascenti; cauda rufescenti-brunnea; manibus, praesertim pedibus villosis, nigris; auriculis nec non malis pilosis, nigris; mento et gula imberbibus.

Longitudo	trunci	1' 5"	ulnae	3"
	capitis	3"	palmae	2½"
	faciei	2"	femoris	4"
	caudae	1' 8"	tibiae	5"
	humeri	3"	plantae	5¾"

Descriptio. Corpus robustius et magis villosum quam speciei praecedentis; pili corporis 2½" longi, ad radicem brunneo-nigri, in medio sordide fuscescenti-fasciati, versus apicem sordide albo nigroque annulati, capitis pilis dorsi breviores, longiores vero illis speciei praecedentis, ad radicem nigri, ad apicem albo-rufescentes, supra oculos usque ad radicem nasi nigri, retrovergentes, caudae ad radicem ferruginei, versus apicem pallide ferrugineo nigroque maculati, abdominis nigro-cinerascentis lanuginosi, manuum pedumque villosi, nigerrimi; facies subcrassa, atra, nigro subpilosa; labia albo-pilosa; malae cinereo nigroque barbatae; regio supra oculos et ad radicem nasi uti et in labiis vibrissis nigris rarioribus obsita; digiti nigro-villosi, illi manuum subaequales; pollex pedis a reliquis digitis remotus; ungues nigri, subincurvi, ad apicem acuti, prominuli, pollicares planiusculi.

V. LE SAGOIN CHIGO.

Ce singe est d'une taille plus robuste que le précédent, et est ainsi nommé par les habitans d'Ilheos près de Bahie ou il se trouve dans les forêts du côté de mer. Les mains, les pattes, les oreilles et le tour de la face sont noires. La queue est très touffue et en dessus d'une couleur roux pâle. Le reste du corps est d'un gris cendré, tirant quelques fois sur le rouge.

Les poils du tronc sont très longs, noirâtres à leur racine et du reste d'un brun rougeâtre, mêlé et annelé de noir et de jaune-roux. Tous les poils du corps sont couchés en arrière. La face est d'un brun foncé au bout du front, et sur les joues sont quelques poils noirs et roides; les lèvres et le menton sont couvertes de petits poils blancs. La gorge n'est presque pelue mais plutôt lanugineuse, et les poils de la queue sont tous ferrugineux.

Species 6. *Callithrix cuprea*. Tab. XVII.

Imberbis, dorso fusco subgriseo; capite rufescente; malis, gula, pectore, abdomine et quatuor pedibus cupreis; cauda ad radicem rufescenti-grisea, reliqua fusco-vel nigro-candicante.

Longitudo	trunci	1' 2 $\frac{3}{4}$ "	ulnae	3"
	capitis	2 $\frac{3}{4}$ "	palmae	2 $\frac{3}{4}$ "
	faciei	1 $\frac{1}{2}$ "	femoris	3 $\frac{3}{4}$ "
	caudae	1' 7"	tibiae	3 $\frac{3}{4}$ "
	humeri	5"	plantae	5 $\frac{1}{2}$ "

Descriptio. Corpus subgracile, subcomosum; pili dorsi nec non lateris externi femoris, humeri et caudae supra ad radicem fuliginosi, ad apicem nigro albicante annulati, 4 $\frac{1}{2}$ " longi, in vertice breviores, rufescentes vel fulvo-rufescentes, in malis, lateribus colli, pectore, abdomine, cauda subtus ad radicem, quatuor extremitatibus cuprei, in cauda longiore, graciliore ad tertiam partem fusco-grisei finem versus albicantes, in capite et extremitatibus decumbentes, in malis retrorsum et deorsum versi; facies atra, abbreviata, nudiuscula; labia albo-lanuginosa, vibrissis singulis nigris obsita; auriculae submarginatae, patulae, subpilosae; dentes uti in caeteris huius generis; digiti et ungues fuscescentes; angulus facialis 47°, cerebrialis 32°; altitudo frontis 3."

Habitat in sylvis Solimöens, imperio Peruviano confinibus.

VI. LE SAGOIN-CUIVRE.

Le Sagoin-Cuivre, nommé chez les peuples qui habitent les bords de la rivière Solimöens au Pérou, *Yapusa*, est d'un gris brunâtre en dessus, et tout couleur de cuivre en dessous et aux pieds. La tête est garnie de poils roux et courts, le milieu de la face et les sourcils sont presque nus. Le visage est entouré depuis le dehors des tempes jusqu' au bas des joues de poils également couleur de cuivre, et dirigés en avant. Les lèvres et le menton sont garnis de quelques petits poils, noirs, longs et roides. Les oreilles sont nues en arrière, proëminentes, et couvertes simplement sur le devant de quelques poils roux. Généralement tous les poils sont couchés en arrière, ceux du dos, de l'humerus et des cuisses passablement longs, noirs, et en même tems entremêlés de roux et de noir. La queue, qui est d'un gris-rougeâtre, devient vers l'extrémité, de plus en plus pâle et blanche. Les yeux sont bruns.

Familia I. TRICHURI.

Genus 5. *Nyctipithecus*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Simia nocturna cauda non volubili, laxa, subtenui.

Descriptio. *Simia pentadactyla, noctu tantum ambulans, vultu gestuque felina; oculi ignei, lucem perhorrescentes; cauda non volubilis, corpore longior; corpus supra et subtus dense villosa-lanuginosum; facies minutissima; orbitae praegrandes; malae proeminentes; vertex subdepressus, planior; maxilla inferior aequae ac in Mycete postice elevata; aures exsertae, subpatulae, pilosae; dentes canini superiores et inferiores in utraque maxilla 2, mediocres, aequales, incisivi supra infraque 4, superiores medii planiusculi, parum prominuli, exteriores triquetri, minores, magis retracti, inferiores approximati, in semicirculo juxta se positi, apice subdilati, molares utriusque maxillae 12 subcuspidati; pedes posteriores anterioribus longiores; ungues breves, compressi, subprosiliens, apice subaeuminati, pollicaris pedis vix planior.*

Species 1. *Nyctipithecus Felinus* Tab. XVIII.

Subbarbata, mystace ad latera malae disticho; corpore toto villosa-lanuginoso, supra olivaceo-cinereo, subtus pallide ochraceo; cauda corpore multo longiore, supra radicem cinerascens, subtus et versus latera usque ad medium rufescente, reliqua nigra; fascia nigra utrinque e malis verticem versus elongata, alia nigra frontis intermedia cum lateralibus confluenta; maculis duabus supra oculos albicantibus.

Longitudo	trunci	1' 1½"	ulnae	5"
	capitis	2⅓"	palmae	1½"
	faciei	¾"	femoris	4"
	caudae	1' 2"	tibiae	5½"
	humeri	3"	plantae	5"

Descriptio. *Corpus gracile, supra et extus cinerascens, infra et intus ochraceo-pilosum; vultus et gestus felis; oculi grandes, ignei, noctu tantum inservientes; facies subtilissima, minima, versus malas prosiliens, circa oculos et nasum atra, nudiuscula, infra oculos, in labiis mentoque albo-lanuginosa, vibrissis longioribus nigris et albis intermixtis; supra oculos aut ad latera frontis utrinque macula albicans, larga, triangula; alia macula alba minor ad malas intus; tempora et genae mystace abbreviato griseoque faciem involvente, antrorsum verso ac subdependente dense pilosa; pili dorsi ac quatuor pedum breves, ½" longi, molles, conferti, in capite et dorso recumbentes, circa faciem antrorsum, in humero extus et femore extrorsum, in reliquis pedibus deorsum vergentes, ad basin nigri, ad apicem fulvi, nigro alboque variegati, aspectu exteriori griseo-olivacei, in medio dorsi vero magis nigricantes vel obscuriores, in cauda ad radicem infra uti in trunco subtus et in pedibus intus ferruginei, ad latera caudae mediae plane ferruginei, supra et infra apice nigri, versus caudae finem fere toti nigri, mystacis gulam versus albicantes, subtus in gula, versus latera colli, in pectore, abdomine, femore et humero intus lanuginoso-ochracei, in brachio et tibia intus et extus concolores; auriculae emarginatae, subpatulae, extus magis quam intus pilosae;*

dentes incisivi inferiores paulo longiores quam in specie subsequenti, canini aequales; digiti breviores, graciles; pollex plantae brevior reliquis, oppositus; unguis breviores, attenuati, apice acuti, pollicaris pedis planiusculus, reliquis brevior; altitudo frontis 2."

I. LE SINGE DE NUIT À FACE DE CHAT.

Buffon est le premier qui parle d'un singe de nuit, qui lui fut envoyé de Cayenne et qui est cependant disparu de la collection d'histoire naturelle de Paris. Avant lui Gumilla a fait mention d'un animal nocturne Cuscusi de la grosseur d'un chat et sans queue, qui selon la description n'est autre chose qu'un paresseux. C'est M^r de Humboldt qui nous a donné la première notion sûre. Ce célèbre voyageur donne la description et le portrait d'un singe de nuit qu'il appelle Aotus attendu qu'il est sans oreilles. Notre Nyctipithèque à face de Chat ressemble à celui de M^r de Humboldt par les taches blanches au dessus des yeux et un peu par la couleur du corps cendrée en dessus et fauve en dessous, mais il en diffère en ce que les oreilles sont bien visibles, par les ongles qui sont aigus, par la couleur du nez qui n'a pas la ligne blanche, et en ce que la queue n'est pas la moitié plus longue que le corps. Notre Nyctipithèque a la face d'un chat, le visage très maigre, les pommettes au contraire très proéminentes, la bouche grande, les yeux très grands et rouges. La face, le dessous des yeux, les lèvres et le menton sont d'un blanc velouté. Le front porte au dessus des yeux deux taches triangulaires d'un fauve-blanc; des joues et du haut de la tête tombent des poils noirs, qui en se dirigeant en arrière forment trois bandes, et vont se réunir sur le sommet de la tête, dont l'extérieur a commencer des tempes et des joues, est entouré à dehors d'une espèce de favori gris, tourné en avant, qui vient finir sur les côtés du menton. Les oreilles sont très visibles, oblongues, nues et veloutées seulement aux bords. Le poil du dessus du corps est très serré, cendré foncé superficiellement, roux et noir à la racine; le dessous du corps et la partie inférieure des cuisses et de l'humerus sont tout poilus et d'une couleur tirant sur le roux; la queue est un peu plus longue que le corps et presque toute noire si ce n'est qu'à son origine elle est d'un roux grisâtre en dessus, et ferrugineuse en dessous. Tous les poils ont une teinte rouge à la racine. Les doigts sont petits, tous les ongles sans exception noirs, très aigus, saillants. Les dents incisives supérieures et moyennes sont plus larges et plus saillantes que les extérieures, les inférieures courtes, presque égales et non écartés des canines, les supérieures sont un peu saillantes. Nous avons trouvé ce singe dans les environs de la capitale de Para et le conservâmes long-temps dans notre menagerie où il mangeoit du riz.

Species 2. Nyctipithecus Vociferans. Tab. XIX.

Imberbis; corpore toto villosa-lanuginosa; capite rufescenti-brunneo; striis tenuibus e malis versus occiput ascendentes, nigro-brunneis; macula ad frontis apicem nigricante, brevi, haud confluenti; alia utrinque supra oculum flavicante; cauda corpore vix longiore, ad radicem usque ad partem tertiam ferruginea; digitis palmarum plantaeque pedis longioribus.

Longitudo trunci	1' 2"	ulnae	2"
capitis	5"	palmarum	2½"
faciei	"	femoris	4"
caudae	1' ¾"	tibiae	3½"
humeri	5"	plantae	3"

Descriptio. Corpus gracile quam praecedentis speciei paulo minus, totum brunneum; caput subrotundum; facies circa oculos et nasum fusca, nuda, reliqua pilosa; genae, labia et tota maxilla inferior albo-pilosa; maculae utrinque supra oculos flavicantes, acute triangulae; alia macula flavo-brunnea extus circa oculos semicircularis; macula brunneo-nigra ad apicem frontis; taenia fusca, fere filiformis utrinque extus ad frontem, retrorsum excurrens; pili corporis molliores, conferti, in dorso, ad latera colli et in pedibus ad radicem atri, versus apicem fulvo nigroque variegati, aspectu exteriori brunneo relucentes, in medio dorsi haud obscuriores, in digitis abbreviati, a caudae initio toti ferruginei, in medio et apice extremo nigricantes, colli, pectoris et abdominis lanuginosi, subochracei, conferti, in capite dorso et cauda decumbentes, in pedibus deorsum vergentes; auriculae exsertae, vix subpatulae, extus et intus pilosae; dentes incisivi superiores medii plani, inferiores paulo minores quam in praecedenti specie, canini inferiores minores; unguis paulo crassiores in quam specie praecedenti, manus apice obtusiores, unguis pollicis pedis planior, brevior; cauda corpore vix longior.

Habitat gregarius in sylvis Tabatinga, in limite imperii brasiliiani versus Peru.

II. LE BABILLARD BRUN.

*Le Babillard brun nocturne ne se distingue du précédent que par sa couleur brune et par sa taille un peu plus petite. Il a la même coutume de dormir le jour et de se promener dans la nuit, ou il se fait entendre par le bruit babillard qu'il fait en société des autres singes de son espèce. Quoique nocturne et très difficile à chasser, les habitans et particulièrement les Indiens ont déjà l'adresse de le trouver pendant le jour et de le connoître à sa manière de se coucher entre les branches d'arbres. Une fois decouvert il ne s'en fuit pas loin, comme la lumière fait mal à ses yeux tous rouges. Les habitans l'appellent Carai. Ils parlent aussi d'un autre singe nocturne appelé Xupara, dont j'ai reçu un morceau de peau qui me paraît être de la *Mustela barbara*. Il a deux taches blanches sur le front et une autre un peu plus pâle au dessous des yeux; les rubans noirs du front sont au contraire dans cette espèce brune, en dessus des yeux plus minces, et éfilés et beaucoup plus allongés vers la partie postérieure de la tête; le ruban moyenne ne forme dans celle-ci qu'une petite tache brune; la barbe des joues n'est pas si forte que chez l'autre; tout le poil chez celui-ci est en dessus et en dessous du corps presque de la même couleur brune, et un peu plus pâle sous le ventre. Les oreilles sont presque vetues et elles ne sont pas si longues que dans l'autre; la queue n'est pas si longue, et de la racine presque jusqu'à la moitié elle est rouge, le reste noir. Les doigts grêles portent des poils presque rasés, les ongles sont minces, pointus et saillants. Ces deux singes ressemblent beaucoup au premier coup d'oeil aux Chauve-souris et aux Tarsiers qui se trouvent à Madagascar; car ils ont la taille grêle, la face et les ongles comme les chats, ils sont très timides, retirés, très propres et ils font tout avec une espèce de délicatesse. Probablement on trouvera encore d'autres espèces de ces singes, qui semblent remplacer en Amérique les singes si merveilleux de Madagascar. Il habite les forêts de Solimöens près du Tabatinga et Mainas.*

Familia I. TRICHURI.

Genus 6. *Midas*, *Geoffroy, Humboldt.*

Sagoïn, Buffon, Audebert.

Hapale, Illiger.

Simia Midas, Linné, Schreber.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Cauda non volubili, gracili, elongata, non annulata.

Descriptio. Simia diurna, agilis, saltatoria. Corpus exiguum, gracile, supra et subtus sericeo-pilosum, sciureo simile; caput oblongum, ad latera subcompressum; cranium depressum, planiusculum; facies gracilis, brevissima, recta, apice subobtusa; aures patulae, emarginatae; dentes canini supra infraque 2, breves, tenues, aequales, subexserti, incisivi supra infraque 4, superiores a caninis remoti, medii planiusculi, antrorsum subobliqui, inferiores contigui, breviusculi, approximati, versus apicem planiores, antrorsum subobliqui, molares supra infraque 10, subcuspidati; maxilla inferior postice non elevata, apice subobtusa; quatuor pedum digiti uti in *Iaccho* graciles, breves, pollex plantae pedis minutus, valde retropositus; ungues falculares, curvi, prosilientes, postice largi, apice acuti, unguis pollicis plantae pedis tegularis, longiuseculus, planiuseculus; cauda corpore longior, non volubilis, annulis alternis non insignis, tenuis.

Species 1. *Midas fuscicollis.* Tab. XX.

Capite, collo, pectore, abdomine et quatuor pedibus brunneo-rufescentibus; dorso posteriore fulvo nigroque fasciato sive variegato; cauda nigra.

Longitudo	trunci	11"	ulnae	1 $\frac{3}{4}$ "
	capitis	2"	palmae	2"
	faciei	1"	femoris	3"
	caudae	1 $\frac{3}{4}$ "	tibiae	3"
	humeri	2 $\frac{1}{4}$ "	plantae	2 $\frac{1}{4}$ "

Descriptio. Corpus gracile, sciureum, supra et subtus aequè sericeo-pilosum; caput ferrugineo variegatum; collum rufescens, vel nigro-rufescens; pili corporis a radice usque ad medium nigri, versus apicem, in capite, abdomine, pedibus posterioribus intus, subtus ad caudae radicem rufescentes, in collo, pectore et pedibus anterioribus rufo nigroque annulati, in dorso posteriore apice flavo fulvoque maculati nigroque terminati, in dorso $\frac{3}{4}$ " longi aequè ac in capite et cauda recumbentes, in manibus pedibusque breves, rufescentes pilisque nigris intermixti, in cauda breviores, nigerrimi, apressi; facies, praecipue circa labia et mentum, albo-lanuginosa, vibrissis nigris rarioribus variegata; auriculae patulae, emarginatae, subpilosae, atrae, minores quam in praecedente specie; cauda gracilis corpore multo longior; ungues falculares, rufo-nigri, valde arcuati, longi et prosilientes, ad latera compressi, versus apicem attenuati, acuminati, pollicaris pedis tegularis, minutus, subplanus; angulus facialis 42;" altitudo frontis 2 $\frac{1}{3}$." Vitam degit prope pagum St. Pauli sive Olivença in sylvis flumina Solimöens inter et Iça intermediis.

I. LE TAMARIN À TÊTE ET HAUSSE-COL BRUNS.

Les Brésiliens appellent tous les petits singes, qui ressemblent à Écureuil, Sauby, et les distinguent selon leurs différentes couleurs. Les auteurs français leur ont donné les noms de Tamarins et d'Ouistitis. Tous ces singes sont à peu près aussi petits les uns que les autres; ils ont le corps couvert en dessus et en dessous d'un poil soyeux, veluisant, concentré et déprimé; la queue est grêle, peu touffue, plus longue que le corps, la face très grêle, presque toute droite. Les oreilles larges et proëminentes ressemblent un peu à celles des chauves-souris; ses dents molaires sont au nombre de cinq de chaque côté des mâchoires, les canines peu fortes, égales et un peu tournées en arrière, les incisives supérieures moyennes plates et un peu tournées en avant; les deux branches de la mâchoire inférieure sont plus rapprochées et ne s'élargissent pas autant en arrière. Les ongles sont très grêles, très aigus, courbés et saillants, comme chez les chats, le grand doigt du pied est tout petit, reculé et couvert d'un petit ongle un peu applati. Les singes qui n'ont pas la queue annelée, portent le nom de Tamarin, les autres celui d'Ouistiti. Le Tamarin à tête et hausse-col bruns est déjà signalé par le même caractère. Sa tête est brun-rouge parsemée de poils noirs, la couleur des 4 pieds et le dessous de son corps sont d'un roux brun, plus ou moins foncé. Le dos postérieur est alternativement tacheté ou bandelé de fauve et de noir, et rouge à sa base. Le mâle diffère de la femelle en ce que son hausse-col et les pattes sont d'un brun plus foncé et les pattes postérieures tirent sur le noir, tandis que les jambes sont d'un roux plus vif. On les distingue d'après leur queue qui est annelée ou non.

Species 2. Midas nigricollis. Tab. XXI.

Corpore medio anteriore supra et subtus, manibus plantisque nigris; trunco dorsi posteriore nigro castaneoque maculato; pedibus posterioribus caudaeque radice castaneis; labiis mentoque albo-pilosis.

Longitudo trunci	9"	ulnae	2" 2'''
capitis	2 $\frac{1}{4}$ "	palmae	1" 4'''
faciei	1"	femoris	3"
caudae	1' 3" 2'''	tibiae	2 $\frac{1}{4}$ "
humeri	2"	plantae	2 $\frac{1}{4}$ "

Descriptio. Corpus speciei praecedenti et subsequenti simile ac intermedium, ab utrisque vero femore tibique castaneis, ungue tegulari pollicis longiore et angustiore, a priore manibus plantisque nigris, dentibus incisivis superioribus mediis planioribus, pilis dorsi in radice nigris, in capite et collo ad radicem fuscis, auriculis minus pilosis, mystace labiorum vix conspicuo diversum. Mas, foemina et juvenis non differunt. Angulus facialis 59°, cerebrialis 41 $\frac{1}{2}$ °; altitudo frontis 2 $\frac{1}{2}$ '''

Habitat prope ripam septentrionalem fluminis Solimöens in sylvis ab Indiis Tocunas inhabitatis et pago Olivença confinibus

II. LE TAMARIN À HAUSSE-COL ET PATTES NOIRES, ET À JAMBES CHÂTAINES.

Toutes ces sortes de singes se ressemblent, mais les Indiens distinguent avec raison le présent du précédent et du suivant comme des espèces particulières. J'ai plusieurs individus de la présente

espèce tant mâles que femelles, tous sans exception, malgré les différents âges portent en dehors des jambes le même caractère, c'est à dire, ils ont cette partie couverte d'un poil roux-châtain, tandis que la moitié antérieure du corps est toute noire; la queue et les pattes sont d'un noir très luisant. Ils ont aussi les dents incisives supérieures plus larges, les ongles plus gros, celui du grand doigt du pied un peu plus effilé, et les oreilles plus tronquées au bord que le précédent.

Species 3. Midas mystax. Tab. XXII.

Capite, collo, pedibus anterioribus, plantis pedum, corpore subtus et cauda nigris; dorso posteriore, femore et tibia aurco-rufescentibus; labiis nasoque apice albis; labio superiore mystace longo albo ornato.

Longitudo trunci	10 $\frac{5}{8}$ "	ulnae	2 $\frac{1}{2}$ "
capitis	2"	palmae	1 $\frac{3}{4}$ "
faciei	$\frac{1}{2}$ "	femoris	2"
caudae	1' 4 $\frac{1}{3}$ "	tibiae	2 $\frac{1}{2}$ "
humeri	2"	plantae	2 $\frac{1}{2}$ "

Descriptio. Corpus quam in praecedenti specie nec non Nigri- et Ruficolli maius; cauda tota nigra, media parte longior, quam corpus, pili dorsi molles, relucentes, $\frac{1}{3}$ " longi, ad radicem albicantes, ad medium nigri, ad apicem, praecipue dorsi posterioris, femoris et tibiae extus aurco-rufescentes, capitis, pedum anteriorum, femoris et tibiae intus, praesertim plantarum breviores, toti nigri, colli, pectoris, abdominis ad radicem sordide albi, versus superficiem toti nigri, caudae supra ad originem rufi, reliqua parte breviores, nigerrimi, labii superioris et inferioris aequae ac circa genitalia, praecipue ad latera labii superioris longiores, mystacei, nares versus breviores, albi, ad medium juguli et menti nigri; facies atra, circa oculos nigro-lanuginosa, in medio nasi nigro-pilosa; dentes incisivi superiores medii subplani, apice antrorsum subobliqui, inferiores contigui, approximati, canini exserti; auriculae patulae, emarginatae, nigro-pilosae; ungues brunneo-nigricantes, compressi, arcuati, apice subacuti, unguis pollicis pedis tegularis, brevis, planiusculus, subrotundus. Angulus facialis 58 $\frac{1}{2}$ °, cerebralis 45°; altitudo frontis 3." Mas et foemina statura, colore et mystacis longitudine non discrepant.

Habitat in sylvis flumina inter Solimöens et Iça.

III. LE TAMARIN À MOUSTACHE.

Les Tamarins précédents portent tous des poils blancs et roides aux lèvres et au menton, mais non pas si longs et si semblables à une moustache que celui-ci. Le bout de son nez est pareillement tacheté de blanc. La moitié antérieure de son corps, les quatre pattes, le dessous du corps sont tous noirs, ainsi que la queue, si on en excepte la racine qui est d'un brun rougeâtre. Tout le poil du dos est blanc à sa racine, ce qui le fait distinguer des autres espèces précédentes. Sur les parties sexuelles se trouve aussi une espèce de pinceau de poils blancs. Les ongles sont courbés, gros et aigus au bout; l'ongle du doigt des pieds postérieurs est passablement large. Le mâle ne diffère pas de la femelle. Toutes ces trois espèces se trouvent près d'Ollivenza dans le voisinage d'une petite rivière noire (Parana bijuna), dans le pays des Tocunas moyen entre le Solimöens et l'Iça.

Species 4. Midas Oedipus. (Varietas.) Tab. XXIII.

Dorso, humero femoreque extus fulvo nigroque maculatis; capite posteriore, nucha, cauda ad initium castaneis; corpore subtus, quatuor pedibus capiteque anteriore albissimis; reliqua cauda nigerrima; ungue pollicari pedis falculari, ab illis cacterorum digitorum haud diverso.

Longitudo trunci	11 $\frac{1}{4}$ "	ulnae	3 $\frac{3}{4}$ "
capitis	1 $\frac{3}{4}$ "	palmae	1" 11"
faciei	$\frac{1}{2}$ "	femoris	2" 9"
caudae	1' 3 $\frac{1}{2}$ "	tibiae	2 $\frac{1}{4}$ "
humeri	2 $\frac{1}{4}$ "	plantae	2 $\frac{1}{4}$ "

Descriptio. Corpus gracile, statura speciei antecedentis; pili omnes sericei, decumbentes, dorsi, humeri, femorisque extus sublongi, nigro fulvoque fasciati, ad basin nigri, ad superficiem fulvo nigroque annulati, occipitis medii, nuchae caudaeque initii rufo-castanei, humeri ad marginem anticum, femoris ad marginem posticum aequae castanei, in medio frontis, in vertice, humero, femore intus, in quatuor pedibus, exceptis humero et femore extus, in corpore toto subtus albissimi, dorsalibus breviores; caput ad latera verticis, ad tempora, frontis apicem, aequae ac facies tota atra, albo-lanuginosa; auriculae obtusius emarginatae, nigro subpilosae; cauda ab initio parte vix quarta castanea, reliqua tota nigra; ungues digitorum, pollicares quoque manus pedisque aequales, falculares, crassi, acuminati, compressi, nigro-fusci.

Habitat, ut opinor, in provincia Guiana.

IV. L'OUISTITI PINCHE.

M. de Humboldt en décrivant ce singe sous le nom du Titi de Carthagène dit de lui et avec raison, qu' on a de la peine à le reconnoître dans les mauvais portraits et figures qui en ont été données jusqu' à présent, d'après des individus mal empaillés (Recueil d'Observations de Zoologie pag. 338). En regard que l'individu, que j'ai sous les yeux, n'a aucun rapport avec les dessins publiés jusqu' ici, je ne crois pas mal à propos de le faire représenter ici. Le Pinche a le milieu du front et le dessous du corps couvert de poils blancs, plus ou moins courts. L'occiput et la nuque sont ainsi que la queue à la quatrième partie dès sa racine d'un roux châtain, le dos, l'humerus et le femur noirs, tachetés de fauve. Le poil du dos est, dès sa racine jusqu' à la moitié, noir, puis fauve, et noir à son extrémité. Celui qui couvre sa queue est rouge à la racine, et du reste tout noir. Le sommet de la tête, les tempes, les oreilles sont nues, et les dernières obtusément trouquées; toute la face, le bout du front et la gorge sont noirs, mêlés d'un blanc presque lanugineux; la region de l'anus et des parties sexuelles sont nues; quelques poils roides et noirs couvrent le dessus des yeux et les lèvres; tous les ongles sont très recourbés et saillants, même celui du grand doigt des pieds postérieurs. C'est une femelle que je viens de décrire. Ces singes habitent vraisemblablement dans la Guiane.

Species 5. Midas bicolor. Tab. XXIV. Fig. I.

Capite, nucha, collo, pectore et pedibus anterioribus albis; trunco et pedibus posterioribus extus brunneis, intus rufescentibus; cauda et abdomine ferrugineis.

Longitudo trunci	7"	ulnae	3 $\frac{1}{4}$ "
capitis	1 $\frac{1}{2}$ "	palmae	1"
faciei	5"	femoris	1 $\frac{1}{2}$ "
caudae	9"	tibiae	1 $\frac{1}{2}$ "
humeri	1 $\frac{1}{2}$ "	plantae	1 $\frac{3}{4}$ "

Descriptio. Corpus gracillimum; cauda rufa, corpore longior; pili capitis, colli, pectoris et pedum anteriorum integre albi, humeri et brachii ad marginem posticum nonnihil rufescentes, dorsi posterioris ad radicem nigri, in medio ferrugineo nigroque annulati, versus apicem cinerascens-brunnei, ad caudae radicem ferruginei, abdominis et pedum posteriorum intus ferruginei, digitorum plantae pedis cinerascens-ferruginei; facies nigricans, ad latera albo-subpilosa; auriculae patulae, emarginatae, vix pilosae; oculi rubicundi; digiti gracillimi; ungues compressi, falciformes, breviores, brunnei, pollicaris pedis longiusculus, haud planus.

Reperitur in campis sylvestribus prope pagum Rio Negro.

V. LE TAMARIN À MOITIÉ BLANC.

L'Ouistiti Mico, que M^r de la Condamine a apporté du Para et que M^r de Buffon a publié, ressemble un peu au nôtre, mais il en diffère en ce que le Mico est tout blanc, et que le nôtre ne l'est pas qu'à moitié. La tête, la nuque, l'avant dos, les pieds antérieurs et le dessous de l'avant corps sont blancs de neige, la moitié postérieure du corps brun-grise, la queue et le dedans des pieds postérieurs rouges. Les poils du dos et de la queue sont noirs à leur racine, brun-mêlés au milieu, et roux au bout. Cette espèce de singes a la face et la gorge noires et mêlées de blanc lanugineux; les ongles sont minces et courts. Au premier coup d'oeil on croiroit voir le furet au quel il ressemble par sa taille, quoique du reste il en diffère beaucoup. Il se trouve près du village de Rio Negro.

Familia I. TRICHURI.

Genus 7. *Iacchus*. *Geoffroy, Humboldt.*

Sagoïn, Buffon, Audebert, Cuvier.

Hapale, Illiger.

Simia, Linné, Schreber.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Cauda non volubili, gracili, elongata, annulata.

Descriptio. *Simia* diurna, agilis, saltatoria; corpus exiguum, gracile, supra et subtus sericeo-pilosum, sciureo haud dissimile; caput subovatum, ad latera subcompressum; cranium depressum, planiusculum, elongatum; facies tenuis, brevissima, recta, apice acuta; vultus subnudus; visus antrorsum vergens; aures patulae, emarginatae; cauda non volubilis, tenuis, corpore longior, apice non calva, annulis alternis numerosis distincta; dentes canini supra infraque 2, tenues, subaequales, mediocres, incisivi supra infraque 4, superiores arcuatim positi, approximati, breviores, intermedii planiusculi, subprominentes, inferiores magis elongati, approximati, caninis contigui, elliptice positi; molares supra infraque 10 recti, tricuspidati pedes posteriores anterioribus longiores; digiti palmae plantaeque graciles, longiores; pollex pedis valde remotus, brevissimus, suboppositus; ungues compressi, longi, tenues, falculares, pollicares pedum minuti, planiusculi.

Species 1. *Iacchus pygmaeus*. Tab. XXIV. Fig. II.

Corpore pusillo, supra fulvo cinereoque variegato, subtus rufescente; capite brunneo-variegato; pilis capitis, praecipue ante aures longioribus, retroversis, auriculas obtegentibus; cauda corpore longiore, ad radicem fulva, reliqua nigro fulvoque annulata.

Longitudo trunci	5½"	ulnae	1"
capitis	1½"	palmae	½"
faciei	4"	femoris	1"
caudae	6"	tibiae	1"
humeri	¾"	plantae	1½"

Descriptio. Corpus gracillimum; pili capitis, dorsi et quatuor extremitatum ad radicem nigri, in medio fulvi, versus apicem nigro alboque variegati, 7''' longi, in capite versus auriculas longiores easque obtegentes, in cauda nigro, fulvo alboque variegati annulis vix conspicuis, in manibus pedibusque brevissimi, rufi; facies atra, circa oculos et nasum nudiuscula; dentes canini superiores medii prominentes, exterioribus vix largiores; auriculae minutae, fulvo-subpilosae, ad medium acuminatae; ungues minimi, albicantes, falciformes, pollicaris pedis planiusculus, minutissimus vix conspicuus.

Habitat in pago munito, limitropho *Tabatinga* ad ripas fluvii *Solimöens*.

I. *L'OUISTITI MIGNON*.

Les Ouistitis différent des *Tamarins* par la queue qui n'est pas uniforme, mais annelée de fauve ou de blanc; c'est la petitesse qui distingue encore *l'Ouistiti Mignon* de tous les singes;

car jusqu'ici on ne connoît pas un plus petit que celui-ci; son poil est presque semblable à celui de l'Ouistiti vulgaire; il est en dessus d'un fauve-brun, le bas du dos et la queue sont noirs et annelés de fauve. Le dedans et le dessous des pieds postérieurs est brun, les pattes sont ferrugineuses et les poils du devant des oreilles bien longs et retombants par dessus des oreilles mêmes; tous les poils sont à moitié noirs à leur racine, fauves à leur milieu, et noirs au bout; les dents incisives, principalement les inférieures, sont bien longues et éfilées, les ongles jaunes, très petits et raccourcis; le doigt du grand pied postérieur est par sa petitesse presque invisible; la face est extrêmement grêle et, ainsi que le menton, nue et colorée de chair. Ce singe, quoique petit, est extrêmement méchant et ne se laisse pas approcher sans mordre. Je l'ai reçu vivant des forêts de Tabatinga, mais il vécut peu de semaines et mourut de mélancolie.

Species 2. *Iacchus albicollis.* Tab. XXV.

Penicillis auricularum, occipite, nucha et collo albicantibus; capite anteriore brunneo, pilis albis intermixtis.

Longitudo	trunci	10''	ulnae	2''
	capitis	2½''	palmae	1½''
	faciei	9'''	femoris	2¾''
	caudae	11''	tibiae	2½''
	humeri	5''	plantae	½'' 2'''

Descriptio. Corpus subgracile; cauda corpore vix longior; dorsum medium nigro fulvoque variegatum, posterius annulis transversis nigro-albis striatum; nucha flavido-albicans; quatuor pedes et corpus subtus cinerascens; collum albicans; macula alba triangularis in apice frontis; penicillus ante auriculas albus, erectus; labia mentumque albo-lanuginosa; cauda albo nigroque annulata, annulis 17, apice albicans; tempora et malae albicantes; pili dorsi, caudae et pedum ad radicem nigri, in medio fulvi, in apice nigro alboque fasciati, $\frac{3}{4}$ '' longi, in nucha ad radicem brunnei, ad apicem flavido-albicans, in temporibus et collo cinerascens-albicans, in pedibus et cauda albo-cinerascens, pectoris et abdominis ad radicem nigri, ad apicem albicans, capitis, excepta macula in frontis apice alba, brunnei, albis intermixtis; auriculae nigro-subpilosae; facies atra, vibrissis nigris rarioribus obsita; dentes incisivi inferiores elongati, medii porrecti, superiores breviores, medii sublargi; dentes canini aequales, superiores exserti, longiores quam illi in Iaccho vulgari et penicillato; ungues brunnei, falciformes, pollicaris pedis brevis, planiusculus, subrotundus.

Habitat in sylvis prope urbem Bahia.

II. LOUISTITI À PINCEAUX ET HAUSSE-COL BLANCS.

Je n'ai trouvé dans tout le Brésil que deux espèces de ces petits singes à queue annelée que les habitants nomment particulièrement Sauhy, savoir, celui qui a des pinceaux de poils blancs devant et derrière les oreilles, et celui dans lequel ces mêmes pinceaux sont noirs. Ces deux espèces sont bien différentes, et ne se trouvent que dans des Provinces distantes; je n'ai jamais vu l'Ouistiti à pinceaux blancs dans les Provinces de Rio de Janeiro ou de Minas Geraes, mais

ce fut à Bahie que je l'ai chassé la première fois. Il vit toujours en troupes et aime visiter même les jardins près de la ville. Peut-être toutes les diverses espèces, que fait Mr. Geoffroy (*Iacchus auritus*, *leucocephalus*, *humeralifer*, et même celle qu'il nomme *Ouistiti à hausse-col blanc*), ne sont que des variétés de l'*Ouistiti vulgaire*, qui est pourtant mal représenté avec des pattes blanches chez Audebert. L'*Ouistiti vulgaire* diffère cependant du nôtre en ce que le premier a la tête brun-noire, le notre au contraire l'occiput, la nuque et le tour du cou entièrement d'un blanc moins sale. J'ai les deux espèces bien empaillées devant les yeux et je ne trouve point d'autre distinction que celle déjà citée. Le poil du dessus du corps est noir à sa base, fauve-roux au milieu, noir et blanc vers le bout; le dessus de l'avant dos est de couleur mêlée de fauve et de noir, les reins ensuite sont circulairement nuancés, puis se forment successivement des anneaux fauves, noirs et blancs qui deviennent sur la queue alternativement blancs et noirs; le dessous du corps et l'extérieur des quatre pieds sont plus ou moins gris cendré, et les poils des doigts un peu ferrugineux. Le haut du front porte une tache blanche triangulaire; le dessus de la tête est d'un brun varié avec des poils blancs. Je n'ai pas trouvé une différence de couleur entre le mâle et la femelle empaillés; la nuque, les pinceaux, dont l'un est placé devant l'oreille, et l'autre derrière elle, ainsi que les poils des joues, sont entièrement blancs; le hausse-col du cou est blanchâtre; les lèvres et le menton sont bordés de poils blancs, roides et courts; la gorge est peu poilue. Il se trouve à Bahie.

Species 3. *Iacchus penicillatus*. Tab. XXVI.

Corpore cinereo; dorso posteriori et cauda albo nigroque fasciatis; capite nigro-brunneo; nucha, collo pectoreque nigricantibus; penicillis ante et pone aures nigris; macula alba in apice frontis; manibus pedibusque brunneis.

Longitudo	trunci	10''	ulnae	2''
	capitis	2''	palmae	1''
	faciei	$\frac{1}{2}$ ''	femoris	2''
	caudae	11''	tibiae	$2\frac{1}{2}$ ''
	humeri	$1\frac{3}{4}$ ''	plantae	2''

Descriptio. Corpus statura et habitu speciei praecedenti simile; penicillus auriculae anticus niger, longus, transversus, posticus aequè niger, brevis, decumbens; vertex brunneus; frons, occiput, collum et pectus pallio nigro quasi induta; frons in medio apicis macula triangulari alba notata; labia et septum narium albo-lanuginosa; malae pilosae, albicantes; dorsum anterius et pedes anteriores nec non abdomen albo-cinerascentes, posterius albo nigroque fasciatum; cauda nigra, albo annulata; annuli caudae 20; regio circa genitalia nigra; pili corporis decumbentes, dorsi et quatuor pedum $\frac{3}{4}$ '' longi, ad radicem nigri, in medio ferruginei, versus apicem nigro alboque annulati, capitis, manus pedisque breviores; oculi aureo-flavi; pili manus pedisque in mare brunneo-nigri, in foemina brunnei, in juvene caput, truncus et femora intus pallide flava vel fulva, manus pedesque cinereo-brunnei, nucha jugulumque nigricantia, penicilli auriculares breviores, nigricantes.

Habitat in sylvis provinciae Minas Geraes minus altis, Catinga nonminatis; vicinat insectis, fructibus Guyave, Coiete etc.

III. L'OUISTITI PINCEAU.

Ce singe est un des plus communs au Brésil, principalement dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes; quoiqu'il ne soit pas rare, il n'est pas encore figuré; c'est la raison pourquoi j'ai cru nécessaire de donner ici le dessein exact de cette espèce. Elle a par devant un pinceau de poils longs noirs, et derrière les oreilles un autre pinceau, formé de poils de la même couleur mais moins longs. Ces singes portent au haut du front une tache blanche triangulaire; le dessus de la tête a des poils bruns noirs qui autour du cou sont presque tous noirs; les joues ont un brun clair, les lèvres et le menton de poils blancs, roides, courts, et mêlés d'autres, qui sont noirs. Le dos est, principalement vers la queue, annelé de noir et de blanc; les anneaux de la queue sont éloignés entre eux les uns des autres; les quatre pieds sont cendrés en dehors, et d'une couleur plus fauve-brune en dedans. Les pattes du mâle sont plus foncées que celles de la femelle, quoique chez l'un et chez l'autre elles soient brunâtres; tout le poil est noir à sa racine, roux fauve ensuite, et grisâtre vers son extrémité; celui de la tête et du cou est noir chez les adultes, et la tache triangulaire du front brune dans les jeunes. Les yeux sont d'un fauve doré. Il se trouve toujours en troupes, et la femelle ne porte pas le jeune attaché à son ventre ou à son dos, comme cela font les singes à queue nue.

Familia II. GYMNURI.

Genus 9. Brachyteles.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Subpentadactylus, longimanus, larynge non tuberoso.

Descriptio. Corpus robustum, grande, sublanuginosum; quatuor pedes, praesertim anteriores, elongati; cauda prehensilis, subtus apicem versus ad tertiam partem calva, corpore haud brevior; facies subprominula, quadrangula, ad radicem nasi concava; cranium tuberosum, rotundum; nares oblongae, antrorsum versae, septo tenui separatae; gula non protuberans; maxilla inferior postice subelevata; musculus temporalis verticem capitis non attingens; palmae plantaeque praelongae; digiti breviores; pollex manus muticus, vix conspicuus, a reliquis digitis remotissimus, postice collocatus; mammae pectorales circum nuda; penis glandiformis; clytoris brevis, crassa, ovata, vix prominula, pilis tecta; dentes omnes obtusi, canini in utraque maxilla 2, mediocres, vix exserti, superiores paululum crassiores, incisivi in utraque maxilla 4, in linea subrecta positi, non prominuli, breves, aequales, approximati, superiores a caninis paululum remoti, molares utriusque lateris 6, quorum anterior unicuspidatus, reliqui in superficie undulati.

Species 1. Brachyteles macrotarsus. Tab. XXVII.

Miriki, Mono, *Brasiliensibus*.

Ateles Hypoxanthus, *Neuwied*.

Lagothrix, *Humboldt, Geoffroy*.

Imberbis; corpore robusto, lanuginoso-piloso, cinerascens-fulvo; cauda flavo-vel brunneo-ferruginea; caudae radice femoreque postice rufis; auriculis obtusis, nigricanti-pilosis; palmis, praecipue plantis pedis praegrandibus; digitis ferrugineo-pilosis.

Longitudo trunci	1' 11"	ulnae	6 $\frac{3}{4}$ "
capitis	4"	palmae	5"
faciei	1 $\frac{2}{3}$ "	femoris	8 $\frac{1}{3}$ "
caudae	2' 2"	tibiae	5 $\frac{3}{4}$ "
partis calvae	10"	plantae	6 $\frac{3}{4}$ "
humeri	8 $\frac{3}{4}$ "		

Descriptio. Corpus robustum, dense pilosum, pallide flavo-cinereum, subtus dense lanuginosum; pedes, praesertim anteriores, palmae et plantae pedum valde elongatae; cauda rufescenti-cinerea, corpore longior, subtus ad tertiam partem apicem versus calva; pili dorsi et pedum $\frac{1}{3}$ " longi, molles, conferti, ad radicem atrii, versus apicem flavescenti-brunnei vel nigro-fusei, in capite breviores in fronte et in femore postice rufi, in

reliqua cauda uti et in reliquo pede posteriore extus flavo-vel brunneo-ferruginei, in digitis ferruginei, in brachio anteriore retrovergentes, in mento, gula, pectore et abdomine lanuginosi, pallide ochracei; facies incarnato-cinereascens, ovata, circa oculos et nasum nudiuscula, in malis, buccis et mento pilosa, in labiis et ad radicem frontis vibrissis nigris obsita; nares longiusculae, antrorsum versae, septo tenui separatae; capitis vertex planus; auriculae porrectae, rotundatae, ad radicem emarginatae; dentes breves, obtusiusculi, infra colore nigro tincti, canini mediocres, obtusiores, incisivi breves, paralleli, approximati, inferiores contigui; maxilla inferior postice elatior; planta pedis nuda, elongata; mammae adutorum pectorales dilatatae, circum nuda; digiti breves, robusti, subaequales; pollex pedis postice remotus, distans; pollex manus verruciformis, remotissimus, vix conspicuus, exunguiculatus; ungues validi, lateraliter compressi, nigri, subarcuati, apice obtusi, pollicaris pedis posterioris brevis, planus; regio circa anum et partem femoris posticam nuda; clytoris pilis rufescenti-nigris tecta, obtusa, vix protuberans.

Habitat in sylvis plus minusve maritimis Provinciarum St. Pauli, Rio de Janeiro, Espirito Santo et Bahiae.

I. LE COURT-POUCE À LONGS BRAS.

M^r. le Prince de Neuwied étoit le premier, qui a apporté en Europe cette espèce de singes. Plusieurs collections, qui la possèdent, la doivent à la bonté de cet illustre amateur de l'histoire naturelle. M^r. Kuhl affirme, que ce singe est placé au Musée de Paris sous le nom de *Lagothrix* de M^r. de Humboldt et Geoffroy (*Beiträge zur Zoologie* S. 25). Nous l'avons trouvé dans les forêts maritimes des Provinces de St. Paul, de Rio de Janeiro et de Bahie, ou les habitans lui donnent le nom *Miriki*. En le rencontrant la première fois nous étions frappés de sa figure, croyant au premier coup d'oeil que ce n'est pas un singe du Brésil, mais plutôt de l'ancien continent. En vérité, le cloison du nez moins gros, les ouvertures nasales tournées en avant et la nudité du derrière des cuisses sont des caractères qui ne se trouvent qu'aux singes de l'ancien monde. M^r. le Prince de Neuwied l'a placé sous la dénomination *Ateles hypoxanthos* dans le genre *Ateles*, duquel il s'approche tant par la longueur des bras, tant par la queue calleuse en bas vers son extrémité. Cependant comme le dernier genre porte le nom d'après l'absence totale du pouce, et le notre au contraire, ainsi que l'*Ateles Chamek*, en est pourvu, nous avons créé le nouveau genre *Brachyteles* ou *Court-Pouce*.

Notre espèce a les bras et aussi les tarsez extrêmement longs, les premiers proportionnellement grêles, mais le corps bien gros. Le pouce de la main n'est qu'un rudiment très petit et très retiré des autres doigts. M^r. de Neuwied et M^r. Kuhl ne disent pas, si le pouce est pourvu de l'ongle ou non; l'auteur du dernier tome de l'*Encyclopédie* (*Desmarest Mammalogie* pag. 72) avoue pourtant que le pouce est pourvu d'un ongle. Notre Musée Brésilien possède trois individus, et tous les trois sont dépourvus d'ongle. Le pelage au dessus de son corps est court, un peu épais, d'un brun clair, plus roux de feu à la racine, au derrière des cuisses et des jambes du pied postérieur, et sur les doigts de la main et à la queue. Les poils de la tête sont un peu foncés, mais plus clairs en dehors et autour de la face. Le visage est oblong, nu, de la couleur de chair, mêlée du cendré, très concave au bout du front, et porte sur les lèvres, principalement sur le bout du front et aux sourcils de poils longs noirs, roides; le crane est bien large et vouté; les oreilles sont bien visibles, tronquées au bord, pelues, d'un brun foncé au bas et de derrière, les mâchoires inférieures à l'angle posté-

rieur médiocrement montantes. On compte dans chaque mâchoire douze dents molaires, dont la surface est ondulée; les canines sont obtuses, égales et ne pas prononcées, les incisives courtes, obtuses, placées presque parallèles; toutes les dents sont noires à leur base. Les parties femelles portent un faisceau de poils brun-noirs. Tout le dessous du corps, excepté le tour des mamelles nues et la queue forte, nue presque à moitié au bout du bas, est pelu, ou plutôt laineux et d'un brun très clair. Les doigts sont de médiocre grandeur, les ongles forts, triangulaires, un peu courbés, noirs et presque obtus au bout, celui du pouce des pieds postérieurs raccourci, mais très aplati comme chez les singes de l'ancien continent. Ce gros singe se tient aux forêts maritimes des Provinces de St. Paul jusqu' à Bahie. Ils vont toujours en troupes et font retentir l'air pendant toute la journée de leur voix claquante; après avoir observé le chasseur, ils grimpent toute de suite au sommet des plus hautes arbres, et sautent très vite et tout silencieux d'une branche à l'autre.

Familia II. GYMNURI.

Genus 10. *Gastrimargus*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Pentadactylus, sublongimanus, larynge non tuberoso.

Descriptio. Simia imberbis, gulosissima; corpus robustum, supra et infra pilis brevioribus, mollibus, subtus in medio pectore longioribus dense vestitum; ventriculus quam maxime protuberans; collum retractum; cauda crassa, corpore longior; caput grande; cranium largum, rotundatum, in fronte depressiusculum; facies atra, cranio duplo brevior; nasus concavus, abbreviatus; dentes canini in utraque maxilla 2, validi, retrovergentes, inferiores superioribus minus fortes, incisivi utriusque maxillae 4, aequales, paralleli, fere cylindrici, approximati, contigui, molares in utraque maxilla 12, quorum tres anteriores uni-vel bi-cuspidati, reliqui quadricuspidati; maxilla inferior, uti in praecedente specie, postice parum ascendens; auriculae obtusae; gula et os hyoideum nequaquam tumida; pedes anteriores non nihil elongati, posterioribus sublongiores; tylia tecta; testiculi haud exigui; penis retractilis; clytoris, uti in specie antecedente, brevis, obtusa, vix prominens.

Species 1. *Gastrimargus olivaceus*. Tab. XXVIII.

Olivaceus, pilis trunci, caudae et quatuor pedum murinis, olivaceo-virescentibus vel canis, brevissimis, densissimis, in capite, pectore, manibus, plantis, nec non cauda supra brunneo-nigricantibus; facie extus cum capite pilis concoloribus circumcincta.

Longitudo	trunci	1' 7 $\frac{1}{2}$ "	ulnae	6 $\frac{3}{4}$ "
	capitis	4"	palmae	4"
	faciei	2"	femoris	8"
	caudae	2' 4"	tibiae	7 $\frac{3}{4}$ "
	partis calvae	8 $\frac{1}{2}$ "	plantae	6 $\frac{1}{4}$ "
	humeri	7 $\frac{1}{2}$ "		

Descriptio. Corpus robustum, crassum; cauda crassa, corpore longior, apicem versus ad tertiam partem subtus calva; quatuor pedes subelongati; pili trunci corporis velutini, ad radicem grisei, ad apicem olivaceo-albicantes, in medio fasciis duabus nigris annulati, in capite, ad latera caudae, in manibus plantisque pedum, in abdomine et circa genitalia, exceptis gula et pectore, brunneis, in trunco nigro-brunnei, in dorso, fronte et malis recurrentes, in nucha et capite antrorsum, in brachio externo extrorsum vergentes, praecipue in capite brevissimi, densissimi, sub abdomine, ad lumbos dorsi, ad latera femoris humerique interiora, nec non in cauda subtus longiores; facies nigra, obtusa et quasi quadrangularis, lanuginosa, cranium crasso et longiore multo minor, ad buccas, mentum et labium inferius pilis brevissimis

et vibrissis nigris obsita, supra et circa oculos nudiuscula, ad radicem narium impressa, orbitis et malis protuberantibus; nasus inter oculos admodum impressus; oculi mediocres, brunnei; dentes canini subfortes, superiores ab incisivis paululum remoti, longiores, retroversi, incisivi inferiores cylindrici, approximati, subbreves, aequales, superiores approximati, semicirculares, subobtusius, medii planiores; auriculae brunneo-pilosae, obtusae, quasi truncatae, extus vix conspicuae; pollex pedis a reliquis remotus, pollex manus brevior, approximatus; ungues nigri, ad latera compressi, subadunci nec non triquetri, pollicares pedum plani et rotundati; membrum virile validum, apice membranoso-dilatatum ac disciforme; collum abbreviatum, crassiusculum. Foemina, pullus et juvenis eodem colore et caractere ac mas adultus, exceptis capite, manibus plantisque pedum nigro-brunneis; angulus facialis 40°, cerebralis 35°, altitudo frontis 4".

Habitat gregatim in sylvis prope pagum Cameta ad flumen Tocantin et ad ripas fluminis Solimöens a pago Villa Nova usque ad principium imperii Peruviani.

I. LE GOURMAND VENTRU À COULEUR D'OLIVE.

Les habitans des bords de la rivière des Amazones vers le Pérou distinguent deux espèces de singes de ce genre. Ils les nomment à cause de leur gros ventre et de leur gourmandise *Pausus* (*Barigudos*). Ces singes appartiennent, selon leur queue nue en bas vers son extrémité, à la seconde famille (aux sagoins à queue calleuse), et se distinguent du genre d'*Ateles* par l'existence du pouce, par les pieds antérieurs qui ne sont pas si allongés, du genre d'*Alouate* par l'absence totale du renflement de la gorge et de l'os hyoïde, du celui de *Brachyteles* par le pouce du grand pied antérieur onguiculé et par les bras beaucoup moins longs. Tous ces différents caractères les constituent comme appartenants à un genre particulier, appelé par moi *Gastrimargus*. J'ai douté long tems, si le genre nouveau, fait par Mr. de Humboldt (*Lagothrix*) n'étoit pas celui de ces deux singes; mais à raison que sa description, d'ailleurs très courte et incomplète, attribue à ce singe des caractères contraires p. e. de poils longs etc., et que Mr. Kuhl ait publié, que notre *Court-Pouce à long bras* est nommé au musée de Paris *Lagothrix Humboldtii* (*Beyträge zur Zoologie* S. 25), je me sentis convaincu et obligé à créer pour ces deux espèces un genre particulier et différent du *Lagothrix*; je l'ai ainsi appelé selon la dénomination, que lui donnent les Brésiliens, *Gourmand ventru* ou *Barigudo*. Celui-ci, qui a la couleur d'olive, ressemble un peu par le poil noir, court, épais, presque crépu de sa tête, par la face presque noire, et frappante par les dents très blanches, par son nez plat, court et enfoncé à la base, à un Nègre. Son poil est extrêmement court, très épais, moëlleux, gris-olivâtre en dessus du corps, et brun-noir ou noir en dessous; le poil qui est sur la tête, sur les quatre pattes, aux côtés internes des quatre pieds et au dessous de la queue, est tout noir; ce du dos est d'un blanc sale à la racine et annelé d'un blanc-fauve-gris et noir vers le bout. La queue qui est plus longue que le corps, très forte et très pelue, n'a point de nud qu'au bout et en bas à peu près le quart de sa longueur. Les poils du dessous du corps sont noirs, mais ceux, qui couvrent la poitrine, sont plus longs que les autres, et s'étendent sur les testicules et presque jusqu' à l'anüs. La face est carrée, les parties du dessus et le long des yeux sont nues, les lèvres garnies de quelques poils noirs et roides, qui sont lanugineux, courts et bruns sur le menton et les joues. Le devant des oreilles et le derrière des joues portent les mêmes poils que la tête, mais tournés en arrière et ayant presque la forme d'une calotte noire qui couvre toute la tête. Les oreilles sont extrêmement courtes, presque tronquées, et portent des poils bruns. Les dents incisives sont rangées presque carrément; les canines sont fortes, les pieds antérieurs

un peu allongés, les ongles noirs, ou gris, longs, presque triangulaires et peu courbés, celui du grand doigt des pieds postérieurs est plat.

Ces singes parviennent à une grosseur très forte, se tiennent en troupes sur les plus hautes arbres dans les contrées de la grande rivière Solimöens, et se font découvrir par leur cri qui ressemble à un claquement. Une fois apprivoisés, ils deviennent très familiers, ils s'approchent ordinairement de la table, ou l'on dine, s'assayent sur leur cuisses, en attendant avec beaucoup de patience qu'on leur donne des viandes cuites, ou des oranges, qu'ils aiment beaucoup, et qui cependant leur causent des diarrhées, à la suite desquelles ils meurent souvent. Nous en avons eu un vivant qui nous a accompagné, même pendant notre voyage sur mer, jusqu'aux îles Azores, où il est mort de froid. Quand il vouloit nous flatter, il balançoit un peu sa tête, bourdonnoit un peu, et sautoit sur nos épaules, principalement sur celles de nos deux Indiens sauvages, lesquels il aimoit embrasser fortement en approchant sa tête de la leur. C'est vers le mois de novembre qu'on trouve ces singes, ainsi que tous à queue calleuse, qui habitent les bords du fleuve Solimöens, avec leurs petits nouvellement nés, et qu'ils portent sur le dos ou sous le ventre. La femelle et les petits se distinguent du mâle par l'espèce de calotte et par les pattes, qui chez ce dernier sont beaucoup plus noires.

Species 2. *Gastrimargus infumatus*. Tab. XXIX.

Capite, trunco, humero, femore et cauda brunneo-fuscis vel umbracis; tibiis, manibus plantisque nigricantibus; pilis pectoris superioris castaneis, inferioris nigris, longioribus, nigricantibus; facie ovata longiore; oculis praegrandibus.

Longitudo trunci	1'9 $\frac{3}{4}$ "	ulnae	6"
capitis	4 $\frac{1}{3}$ "	palmae	4 $\frac{1}{2}$ "
faciei	1 $\frac{2}{3}$ "	femoris	6 $\frac{3}{4}$ "
caudae	2' $\frac{1}{4}$ "	tibiae	5 $\frac{1}{4}$ "
caudae partis calvae	6"	plantae	5 $\frac{3}{4}$ "
humeri	6"		

Descriptio. Corpus robustum, paulo minus crassum quam in specie praecedente; pili trunci, capitis, humeri, femoris omnes aequae ac in *Mustela Martae* brunneo-fusci, brachii, tibiae nec non caudae nigro cinereoque annulati, manus plantaeque pedis nigricantes, pectoris rufescentes, abdominis nigerrimi, longiores, reliqui corporis subbreves, subdensi, molliores, ad malas quasi subtonsi, capitis et trunci retro-, brachii extrorsum vergentes; facies atra, lanuginosa, praecipue ad labia et supra oculos vibrissis nigris instructa; auriculae extrorsum pilosae, rotundatae, subconspicuae, dentes uti in specie praecedente, exceptis caninis superioribus ab incisivis vix remotis; collum sublongum, minus crassum; quatuor pedes, praesertim anteriores, uti in praecedente specie, longiores; digitus magis fissi et graciles quam in *Gastrimargo cano*; pollex pedis remotus, ungue planiore tectus; unguis nigri, ad latera compressi, subarcuati; clytoris ovata, obtusior. Foemina colore equidem brunneo magis vero albicante.

Habitat in sylvis flumen Iça adumbrantibus.

II. LE GOURMAND VENTRU À COULEUR DE MARTRE.

Les Indiens de la rivière d'Iça me parloient d'une espèce de Gourmand, toute différente de l'ordinaire, qui ne se trouve que dans les forêts voisines de cette rivière. En leur donnant pour cadeaux des aiguilles, des petits miroirs, des couteaux de fer, ils m'en apportèrent une assez grande quantité. Quoique ce singe ressemble beaucoup au précédent, il en diffère par son ventre et par son corps moins gros, par sa couleur de martre, par les faisceaux de poils longs et noirs, qui sont au milieu de la poitrine et quelquesfois au ventre, et par le cou moins gros et court. Il a la face moins carrée, les dents canines, principalement les inférieurs moins longues. La tête et tout le corps sont d'un brun foncé, les bras, les avant pieds, les pattes, la queue et les faisceaux de la poitrine d'un brun foncé ou même noir; tous les poils du corps sont tournés en arrière, ceux qui sont sur le dos sont bruns à leur racine, et très noirs à leur extrémité; la coëffure de la tête est presque la même que chez l'autre. La face est noire et garnie aux lèvres et au menton de quelques poils également noirs; le dessous du ventre est presque nud, ainsi que le tour de l'anus et la base de la queue, qui sont environnés seulement de quelques poils noirs. Les oreilles sont également petites et trouquées; la queue qui est très poilue, surpasse de beaucoup la longueur du corps. Tous les ongles sont noirs, triangulaires et plus courts que dans l'espèce précédente; celui du grand doigt des mains n'est pas comprimé; le pouce des pieds est plat. Il y a des femelles qui ont le dos et la tête d'un brun plus clair ou tirant sur le grisâtre.

Familia II. GYMNURI.

Genus 11. *Mycetes*. *Jlliger*. *Cebus*. *Eraxleben*.

Alouate. *Lacépède*, *Buffon*, *Audebert*.

Stentor. *Geoffroy*. *Simia*. *Linné*, *Schreber*.

Guariba, *Mono*, *Bugio*. *Brasiliensibus*.

CHARACTER ESSENTIALIS.

Pentadactylus, larynge quam maxime tuberoso.

Descriptio. Animal gymnurum, pentadactylum, non longimanum, gregarium, phlegmaticum, praecipue foliis victitans, ante solis ortum et post occasum frequenter unisono mugiens, foemina pullum unicum dorso vel abdomini inhaerentem secum gestans; corpus robustum, magis quadrupes quam quadrumanum, subtus nudiusculum; caput depressum; facies porrecta, valde obliqua vel fere horizontalis; maxilla inferior postice maxime elevata; dissepimentum narium haud crassum; oculi sursum vergentes; collum crassum; larynx osseus vesiculoso-protuberans; quatuor pedes pentadactyli, mediocres, subaequales; dentes canini utriusque maxillae 2, crassi, paulo recurvi, incisivi supra infraque 4, subparalleli, approximati, praecipue superiores, molares supra infraque 12, quorum tres priores unicuspidati, reliqui quadricuspidati; ungues tegulares, crassiusculi, subprosilientes, arcuati, excepto pollicari pedis largiore, non prominente; cauda corpori plerumque aequalis.

Species 1. *Mycetes fuscus*. Tab. XXX.

Pilis trunci corporis castaneo-fuscis, radice brunneis, apice rufescenti aureoque relucens; quatuor pedibus, barba crassa et cauda brunneo-nigricantibus; jugulo, pectore et abdomine pilosis.

Longitudo trunci	13 $\frac{3}{4}$ "	ulnae	6 $\frac{1}{3}$ "
capitis	4 $\frac{1}{3}$ "	palmae	5 $\frac{1}{3}$ "
faciei	2 $\frac{3}{4}$ "	femoris	4 $\frac{3}{4}$ "
caudae	1' 6 $\frac{3}{4}$ "	tibiae	5 $\frac{3}{4}$ "
ejusdem partis calvae	3 $\frac{1}{2}$ "	plantae	5"
humeri	6 $\frac{1}{2}$ "		

Descriptio. Corpus subrobustum, eo *Mycetis Seniculi* minus, supra pilis subspissis, sublongis vestitum, infra nudiusculum, in medio modo pilosum, in dorso castaneo-fuscum vel castaneo-brunneo variegatum; quatuor extremitates nec non cauda brunneo-nigricantes; barba gularis spissa, mediocris, cohaerens, castaneo-fusca, ab orbitis extus supra malas gulam versus decurrens; pectus castaneo-pilosum, subjubatum; mammae nudiusculae; cauda corpore

vix brevior, subtus ad apicem quarta solummodo parte calva; collum subdistinctum, ad latera pilosum; caput mediocre, in fronte subelevatum; facies atra, circa oculos, nasum, labia et mentum nudiuscula, vix pilis rufis minutis et vibrissis raris obsita, a regione zygomatica et malari usque ad gulam confertim pilosa; nares oblongae, laterales; auriculae nudiusculae, parum conspicuae; pedes anteriores posterioribus nonnihil longiores, ad humerum intus subpilosi, nigro-fusci; digiti haud longi, nigricanti-pilosi; pollex manus brevior, non oppositus, pollex plantae pedis brevior, oppositus; ungues subcurvi, fusci, pollicaris plantae pedis tegularis, sublongus, caeteris vix planior; scrotum fusco-pilosum; regio circa anum nuda; pili dorsi radice brunnei, in medio nigro-annulati, apice castanei, aureo relucens, $\frac{1}{2}$ " longi, brachii, tibiae, palmae plantaeque nigricanti-brunnei, capitis breviores, in occipite verticillati, in vertice antrorsum, in fronte retrorsum versi, e temporibus, malis, buccis retrorsum et deorsum, in gula antrorsum in barbam confertam 2" longam confluentes, castaneo-fusci; angulus facialis 32°, cerebri 36°; altitudo frontis 4".

Mono Brasiliensibus audit, in sylvis campestribus montis Araasojava prope fabricam ferri Ypanemae inventus.

I. LE HURLEUR BRUN.

Les Hurleurs, propres au nouveau continent, se distinguent de tous les autres singes par la gorge très renflée, par l'os hyoïde tuberculeux, par la voix effroyable et semblable au grognement produit par une troupe de sangliers. Quoique monogames ils sont néanmoins toujours en troupes de 15 — 20, et remplissent au coucher et avant le lever du soleil l'air de leur hurlement, qui se fait entendre à très grande distance. L'ouverture de leur concert épouvantable se fait par un seul singe, mais bientôt le précheur est accompagné de l'hurlement unison des autres. Ces singes ne sont pas vifs, mais lourds, paresseux, stupides, et se nourrissent principalement de feuilles. Attrapés par le chasseur dans leurs retraites inaccessibles entre l'épais feuillage des très arbres hauts, entourés de rochers ou de rivières, ils ne s'enfuient pas loin ou avec la vitesse ordinaire des autres singes, mais ils se retirent assez lentement en grognant pitoyablement et en grimpant plus haut vers les sommets des arbres. Les femelles portent leurs petits accrochés sur le dos ou sous le ventre. Comme ils sont très gros et très gras, ils sont recherchés par les colonistes et les Indiens, qui les mangent même avec les poil, après les avoir flambé et roti un peu au feu. Leur hurlement les fait découvrir aisément, et la lenteur avec laquelle ils s'enfuient, expose ordinairement toute la troupe à la mort. Les espèces de ces singes, quoique déjà connues depuis la découverte de l'Amérique, ne furent pourtant jamais bien distinguées, mais toujours confondues les unes avec les autres. Marcgrave fut le premier qui en ait décrit deux espèces, savoir le Hurleur roux et le Hurleur noir avec des pattes rouges. C'est le dernier qui est devenu l'objet de toutes les erreurs qu'il y avoit jusqu'à présent dans cette famille. Buffon croit l'Ouarine une variété de l'Alouate ordinaire; Latreille a fait peindre la même espèce rouge deux fois, comme des espèces sont séparées; Linné et Schreber enfin les ont séparé du Paniscus, et décrit comme deux espèces distinctes sous les noms Seniculus et Belzebub; Mr. Geoffroy regarde l'Ouarin de Buffon comme synonyme au Guariba de Marcgrave, et lui donne le nom de Guariba ou de Mycetes fuscus. Ce célèbre Naturaliste s'est pourtant trompé en faisant une description du Guariba toute contraire à celle de Marcgrave. Marcgrave en parlant d'un Hurleur noir avec des pattes rouges, n'a sans doute déterminé aucun autre que celui, que j'ai fait dessiner sous le nom de Seniculus niger (Denkschriften der Akademie. München 1815 S. 355), nommé plus tard par Mr. Kuhl Seniculus rufimanus (Beiträge zur Zoologie

Seite 31). Celui, que j'ai fait dessiner ici sous le nom de *Hurler brun foncé*, n'est pas le *Guariba* de *Marcgrave* et de *Mr. Geoffroy*, mais il paroît au contraire être l'*Ouarine* de *Buffon*. Quelques voyageurs ont parlé encore de hurleurs autrement colorés. Entre autres *Gumilla* parle d'un *Arabata*, *Azara* d'un *Caraya*; *Mrs. Humboldt* et *Geoffroy* ont séparé ces deux derniers comme des espèces distinctes sous les dénominations *Mycetes stramineus* et *niger*, auxquels ont été adjoints par *Mr. Humboldt* l'*Alouate Ourson* et *Chora*, (*Mycetes ursinus*, et *flavicaudatus*) et maintenant par moi l'*Alouate à couleur variée*. Ainsi au lieu de deux nous en avons sept espèces d'*Alouates*, desquelles on ne possède jusqu'à présent de figures que celle de l'*Alouate rouge*, faite par *Mr. Audubert*, celle de l'*Ourson* publiée par *Mr. Humboldt* et celle à *maines rouges*, publiée par moi. (*Denkschriften der Akademie* 1815) En voulant à présent lever toutes les doutes et compléter la famille des *Alouates*, j'ai fait dessiner ici les autres espèces non figurées. L'*Alouate brun* se distingue par la couleur brunâtre, tirante au dos et à la barbe sur le brun marron doré. La couleur du pelage des quatre pieds, de la queue, des flancs et du dessous du corps est mêlée de noir et de brun doré et luisant aux pointes, excepté les quatre pattes, principalement les postérieures, qui sont plutôt noires; le dos et la tête tirent plus sur le marron luisant ou doré que les autres parties; la queue est toute rouge au bas de sa racine; les testicules sont noirs; les poils du dos, et encore plus ceux de la barbe sont les plus longs, ceux du sommet de la tête les plus courts et de même que ceux de la barbe tournés en avant, pendant que ceux de la partie antérieure du front sont couchés en arrière, ainsi que ceux du dos et de la queue. Les poils des quatre pieds tombent en bas. Le dedans de l'humerus est moins pelu que le dedans des cuisses. Ce singe est d'une taille médiocre et moyenne entre l'*Alouate varié* et le noir; sa barbe est très épaisse; elle commence aux joues et occupe toute la gorge, mais elle est plus courte que celle de l'*Alouate barbu*, et mêlée de noir et de brun marron luisant. La face et l'autour des yeux sont nus, âtres, les lèvres parsemées de poils roides et noirs. La poitrine et le bas ventre sont peu pelus, excepté leur milieu. Les doigts sont courts, les ongles noirs, peu courts, et celui du pouce du pied postérieur est allongé et un peu plus large que les autres doigts.

J'ai trouvé ce singe dans la Province de *St. Paul*, principalement dans les forêts basses de la montagne d'*Araasojava* près d'*Ypanéma*.

Species 2. *Mycetes stramineus*. Tab. XXXI.

Corpore elongato, supra dense piloso, subtus nudo, rubicundo; pilis sericeis, brevioribus, spissis, flavo-stramineis sive pallide aurantiis, aureo relucens; barba castaneo-rufescente.

Longitudo trunci	1' 9"	ulnae	4½"
capitis	5"	palmae	5½"
faciei	2½"	femoris	6"
caudae	1' 10½"	tibiae	6"
partis calvae	9"	plantae	3½"
humeri	5½"		

Descriptio. Corpus elongatum, subrobustum, supra confertim pilosum, stramineo vel aureo-relucens, ad latera colli et ad humerum intus pilosum, rufo-flavicans, circa anum

rufo-pilosum; caput oblongum; facies oblonga, incarnata, extus ad malas, mentum et gulam barbata; auriculae nudiusculae, incarnatae; quatuor extremitates fere aequales, subelongatae; digiti sublongi, aurantio-pilosi, pollex reliquis manus multo brevior, non oppositus, pollex plantae subbrevis, oppositus; unguis curvi, brunnei, pollicaris pedis posterioris regularis, planiusculus, elongatus, apice subacuminatus; cauda crassa, corporis fere longitudine, subtus ad tertiam partem versus apicem calva; pili trunci toti straminei, sericei, vix 1'' longi, subrecumbentes, cranii breviores, antrorsum versi, frontis erecti, rufescentes, occipitis verticillati, femoris extus et brachii extrorsum versi, e temporibus, malis, genis mentoque in barbam confertam 2'' longam, triangulariter dependentem confluentes, rufo-castanei, quatuor extremitatum nec non radices caudae subrufescentes. Mas est quem descripsi.

Habitat in sylvis flumina Rio Negro et Solimöens interjacentibus.

II. L'ALOUATE ARABATE.

J'ai laissé le nom que Mr. Humboldt à donné à ce singe, quoique dans mon individu les poils tous jaunes de paille n'ont pas la racine brune. Il a le corps très allongé, couvert en dessus de poils courts, épais, tous de couleur de paille ou d'orange clair, tout nu en dessous; la queue est presque de la longueur du corps et en bas nue jusqu'à la quatrième partie vers le bout. Les poils sont épais, pas roides, d'une couleur dorée et très luisante, plus clairs sur le dos que sur la queue et aux quatre pieds qui sont presque égaux et de couleur plus foncée. La face est couleur de chair, nue au milieu et environnée en dehors d'une barbe épaisse, brune châtain, longue de deux pouces, qui commence aux tempes et aux joues et se prolonge jusqu'au menton et à la gorge, ou elle dépende en s'appointissant. Les poils du trouc et de la queue sont tournés en arrière, ceux de la tête couchés en avant, même jusqu'au dessus des yeux, ou ils s'erigent un peu. La queue est grosse, d'une couleur plus foncée ou rougeâtre, principalement à son commencement. Les oreilles assez courtes sont nues et rougeâtres ainsi que le dessous du corps, les ongles sont un peu courts et d'un brun clair; celui du grand doigt du pied postérieur n'est pas saillant, mais un peu large, long, et pointu au bout. Ce singe ne se trouve que dans les forêts entre le Rio Negro et le Solimöens vers le Pérou.

Species 3. Mycetes barbatus. Tab. XXXII et XXXIII.

Corpore praerobusto, in juvene flavo-fulvo, in mare nigerrimo; barba crassiore, longiore, spissa, faciem mentumque totum involvente, in mare magis cohaerente, majore, in foemina brevior, bifida; lunula pilorum frontali magna, triangulari, erecta; cauda ad dimidium subtus calva; digitis maris nigro-alboque villosis.

Dimensio Maris.	Longitudo trunci	2' 3''	ulnae	5 $\frac{1}{3}$ ''
	capitis	5 $\frac{1}{2}$ ''	palmae	3 $\frac{1}{3}$ ''
	faciei	3''	femoris	5 $\frac{1}{4}$ ''
	caudae	1' 7''	tibiae	5 $\frac{1}{2}$ ''
	partis calvae	10 $\frac{1}{2}$ ''	plantae	4 $\frac{3}{4}$ ''
	humcri	6 $\frac{1}{2}$ ''		

Dimensio foeminae.	Longitudo trunci	1' 4''	ulnae	5''
	capitis	4 1/2''	palmae	3''
	faciei	2''	femoris	4'' 3'''
	caudae	1' 1/2''	tibiae	5 1/2''
	partis calvae	9''	plantae	4 1/2''
	humeri	4 1/2''		

Descriptio. Mas. Corpus robustum, praegraude, supra dense pilosum, subtus subpilosum, in medio pectoris jubatum; mammae nudiusculae, protuberantes; scrotum mediocre, rufescenti-pilosum; quatuor extremitates haud elongatae, intus nudiusculae; caput oblongum, crassum, robustum; collum robustum, a capite vix distinctum; facies et mentum atra, lanuginosa, supra oculos subpilosa, in labiis vibrissis nigris munita, lateraliter mystace ac barba spissa, longa, caprina, versus gulam plus minusve disticha involuta; nasus ad radicem subimpressus; nares antrorsum apertae; auriculae nudiusculae, oblongae, conspicuae; cauda corpore paululum minor, subtus versus extremitatem ad mediam fere partem calva; palma planta brevior; digiti medioeres, cinerascenti-villosi; pollex plantae oppositus; ungues nigri, subcurvi, ille plantae pedis laminaris; pili corporis conferti, nigerrimi, ad radicem subfusci, dorsi 1'' longi, submolles, nigro nec non brunneo relucens, occipitis verticillati, digitorum manus pedisque grisei nigris immixtis, in medio pectoris et in abdomine jubati, illi scroti ferrugineo flavescens; angulus facialis 32°, cerebralis 38°; altitudo frontis 3'''.

Foemina. Corpus minus robustum, supra cinereo vel nigricanti flavescens, subtus flavescenti albicans; mammae, humerus intus, nates, facies, malae, labia et mentum nudiuscula; barba malaris ad mentum spatio interposito divisa, mediocris, pallide ochracea; pili frontis illis verticis et occipitis oppositi, ad formam lunulae triangularis erecti, retroversi, lineam verticalem longitudinalem et transversam nigricantem exhibentes; pili dorsi medii nec non caudae supra ad radicem fusci vel nigricantes, reliqui corporis albo flavicantes, vel albicantes. Juvenis foeminae colore similis, lunula vero et barba vixdum conspicuis.

Mycetes barbatus Myceti nigro Geoffroyei et Desmarest colore maris et foeminae diverso simillimus, differt autem ab illo longitudine corporis maiore, pilis haud nigro-brunneis, crispis, erectis, in abdomine obscure rufis, sed nigerrimis, rectis, decumbentibus, in abdomine nigris, barba maris haud mediocri, imo vero praegrandi, crassa, corpore foeminae subtus haud nudiusculo sed capillato, auriculis haud brevibus, sed extus bene conspicuis.

Habitat in sylvis humilibus, vulgo Catinga dictis, Provinciae interioris Bahiae.

III. L'ALOUATE NOIR À GROSSE BARBE.

M. Azara est le premier qui parle d'un singe Caraya, dont le mâle est noir, et la femelle fauve. Mr. Geoffroy et Mr. Desmarest l'appellent Stentor niger, et en donnent la description sans le figurer. Notre espèce en diffère néanmoins en ce, que sa couleur n'est pas brunâtre, sa queue pas brune au bout, mais toute noire, la barbe du mâle pas médiocre, mais très grosse, les oreilles pas petites, mais proëminentes, et les poils pas étroits, mais couchés. J'ai ici sous les yeux sept individus de cette espèce, tant mâles que femelles et jeunes, de manière, que je me trouve en état d'en donner la figure et une description

bien exacte. Ce singe, nommé chez les Brésiliens *Bugiu*, est très gros, très pelu en dessus du corps, et presque nu au côté intérieur de l'humerus, des cuisses et en dessous du corps, excepté la poitrine rouge qui porte au milieu une crête de poils noirs, laquelle se trouve tant chez le mâle que chez la femelle. Les poils du tronc, des quatre pieds, de la queue et de la barbe sont chez le mâle d'un noir luisant, ceux de la nuque et du dessus de la tête tirent un peu sur le brun, ceux des testicules sur le roux, et ceux des doigts sur le blanc gris; ils sont couchés sur le dos et la queue, tournés en avant sur le sommet de la tête, au front courts, droits et tournés en arrière, flottants le long des flancs, principalement des tempes et des joues jusqu'à la gorge, pour y former une barbe grosse, réunie, pendante et à peine partagée sous le menton. Toute la face est en dehors entourée de cette grosse barbe, mais elle est en avant, en bas des yeux, au menton et aux lèvres nue, parsemée de poils noirs, roides, courts et entremêlés de poils plus longs. Les oreilles bien distinctes sont rondes et un peu pelues en arrière. La queue est presque de la longueur du corps, grosse, presque sa quatrième partie calleuse en bas, et s'amincit vers l'extrémité. Les ongles pas courts sont noirs, un peu courbés, celui du pouce du pied postérieur est aplati. La voix ressemble, pour ainsi dire, à celle de nos grenouilles. La femelle a les mêmes caractères, excepté qu'elle a le corps moins gros, le dos et quelquefois le dessus de la queue noirâtre, le reste du corps d'un fauve blanc, la barbe moins grosse, pas longue, fendue à la gorge et d'un fauve blanc ou fauve roux; la lunule du front est chez elle plus large, distinguée aux côtés et au milieu du front par des lignes brun-noires, la queue moins grosse et en bas calleuse presque du milieu jusqu'au bout. Les jeunes ont les mêmes caractères que les femelles, excepté que la couleur noire devient avec l'âge plus prononcée. J'ai trouvé ces singes dans l'intérieur de *Minas Geraes* et de *Bahie*, dans les forêts basses, que les habitants appellent *Catinga*. Ils vivent très retirés et toujours en grande société. Ayant une fois entendu leur hurlement épouvantable, semblable à celui d'une troupe de grenouilles, j'ai trouvé facilement l'endroit, d'où s'est répandu par tout ce concert unison, et où je vis toujours une assemblée de vingt singes, qui hurlèrent de différents arbres. En m'en rapprochant un peu plus, ces singes, au lieu de s'enfuir tout de suite, comme les autres en ont l'habitude, grimperent bien lentement sur le sommet des arbres, et chacune des femelles portoit un jeune sur le dos, un autre un peu plus âgé, suivoit tout lentement derrière. Après en avoir tiré quelques uns, les autres continuoient à hurler très tristement et chacun prit la retraite, qui lui convenoit. Pendant cette action j'ai eu occasion de remarquer, qu'une femelle blessée continuoit à porter son petit sur son dos, jusqu'à ce, qu'épuisée par la perte de tout son sang, elle employa en mourant ses dernières forces à lancer son nourrisson sur des rameaux voisins, et expira en tombant de l'arbre, trait qui confirme une espèce de reflexion chez ces animaux.

Species 4. *Mycetes discolor*. Tab. XXXIV.

Facies bubalina; manibus, pedibus caudaque apice ferrugineis; dorso castaneo nigroque variegato; barba, lambis, reliqua cauda et quatuor pedibus nigerrimis; pilis mollioribus, subrecluentibus.

Longitudo	trunci	1'8"	ulnae	9½"
	capitis	5"	palmae	4"
	faciei	2"	femoris	6"
	caudae	2"	tibiae	6"
	partis calvae	11¾"	plantae	5"3"
	humeri	5½"		

Descriptio. Corpus robustum, supra pilis rufis vel nigris haud confertis vestitum, subtus ad collum, pectus, abdomen et circa nates nudiusculum; caput et collum crassa; facies

nuda, atra, abbreviata, obtusa, quadrangularis, inter oculos valde impressa, praecipue ad labia et mentum vibrissis nigris brevioribus et longioribus obsita, barba mediocri, nigra, versus gulam confluenta munita; frons depressa; aperturæ nasales rotundiores; quatuor extremitates haud longae, subrobustae, anteriores intus, posteriores ad femur intus nudiusculae; auriculæ exiguae, nudiusculae; cauda longitudine corporis, versus apicem tenuior et subtus ad dimidiam partem calva; digiti, exceptis pollicibus palmae plantaeque, subaequales, rufo-pilosi; pollex pedis sublongus, oppositus; pili dorsi ad radicem fusci, versus apicem rufescentes, $1\frac{1}{3}$ '' longi, decumbentes, aureo relucentes, ad latera dorsi nigerrimi, longiores, nigro-rufescentes, antrorsum vergentes, in fronte retroversi, in mystace et barba gulari toti nigri, in quatuor extremitatibus nigerrimi, in humero et tibia defluentes, in brachio retro-, in femore extrorsum versi, in palmis plantisque integre rufi, relucentes, in cauda usque ad dimidiam nigricantes, breviores, versus apicem rufescentes; dentes nigricantes, canini validi, incisivi superiores subarcuati, inferiores paralleli; corpus subtus rufescens, nudiusculum, in medio pectoris pilis rarioribus nigris obsitum; scrotum subcrassum, nudiusculum; ungues crassi, breviores, nigri, apice obtusi, subrecurvi, pollicaris pedis nonnihil planior, reliquis minus prosiliens.

Habitat in sylvis ripariis fluminis Amazonae nec non Tocantins prope urbem Para.

IV. L'ALOUATE VARIÉ.

Cet Alouate ressemble un peu à l'Alouate brun, duquel il diffère cependant par la grossièreté de son corps, par le pelage moins épais, mais plus long, par la callosité de sa queue à moitié plus longue, par la couleur rouge des quatre pattes et de l'extrémité de sa queue, par la barbe moins épaisse et d'un noir luisant, par le dessous du corps presque nu, et par les doigts plus longs. Il a encore de la ressemblance avec l'Alouate noir ou plutôt avec celui à pattes rouges, dont il se distingue pourtant tant par la grandeur du corps, que par le tronc rougeâtre au milieu et noir luisant aux côtés, tandis que celui-ci à pattes rouges est partout d'un noir très luisant. Son tronc est couvert de poils fins, tout rouges, noirs à la racine et châtain à la surface, qui flottent tout noirs et longs aux flancs. Les quatre pieds sont presque entièrement d'un noir luisant, excepté les quatre pattes et les doigts très allongés, qui sont garnis de poils courts et roux; la queue pas épaisse est noire, presque à moitié calleuse en bas et rougissante au bout. Les poils du sommet de la tête, un peu plus courts, tombent en avant, ceux de l'avant-front en arrière, les poils des avant-bras extérieurs sont tournés en arrière. Le dessous du corps est nu ou parsemé de poils noirs très rares. L'intérieur des bras et des cuisses, les testicules, l'entour de l'anus et la base de la queue sont également nus. Le cou est très gros, la face presque carrée, noirâtre et parsemée de poils roides, noirs sur le menton, les lèvres et autour des yeux; les oreilles sont petites, mais bien visibles, nues, le nez très imprimé à la racine; la barbe toute noire commence aux tempes et aux joues, et s'attache en se pointissant au derrière du menton, d'où elle pend en bas. Les ongles sont noirs et courbés. J'ai trouvé un mâle de cette espèce de singes dans les forêts situées près du fort de Curupà aux bords de la rivière des Amazones.

V E S P E R T I L I O N E S

BRASILIANSES.

Vespertiones, quorum corporis structura plane singularis ad caetera animalia affinitatem admodum dubiam reddit, primo avibus, deinde mammalia cum avibus conjungentes muribus, postremo a Linnaeo lemurebus adscribebantur, in ordine mammalium loco a simiis secundo positi. Duae quidem illorum species jam longo abhinc tempore in Europa notae fuerunt, quibus mox nova quaedam accessio facta est, novis illis speciebus extra Europam viventibus, quarum cognitionem, Sebae, Eduardi, Forskohlii, Pallasii meritis aut itineribus debemus. His postea Daubenton alias quinque species Europaeas aliasque exteras addidit, Azara quindecim in Paraguaia observavit, auxeruntque eas novissimis temporibus Bechstein, Leisler et Kuhl novas istis species Europaeas apponentes. Idem effecit Raffinesque Schmaltz, qui vespertiones tum Europae tum Americae septentrionali proprios novo hujus Familiae genere „Atalophia“ locupletavit novisque insuper speciebus, quae vero hucusque satis congrue definitae non sunt. Geoffroyeus de St. Hilaire multis vespertilionibus ab expeditione Aegyptiaca secum allatis et huic animalium familiae indagandae praecipue incumbens, partim copia exemplarium, quae in Museo Parisiensi asservantur, adjutus, partim varias ac dispersas descriptiones, quae in itinerum commentariis inveniuntur, in suos usus vertens, summo studio id consecutus est, ut species vespertilionum hucusque notas, quas Brissonius in duo, Vespertilionis scilicet et Pteropi, quibus Linnaeus tertium postea Noctilionis adjecit, genera diviserat, Gmelinus econtra viginti duas distinguens in novem subdivisiones dispescuerat, ad quindecim genera reducere certisque characteribus disponere posset.

In itinere, quod per Brasiliam a vigesimo quarto latitudinis gradu usque ad Aequatorem una cum viro amicissimo Dr. Martio peregi, conquirendorum animalium occasionem opportunam naclus, etiam vespertiones non paucos collegi, mecumque in patriam reportavi. Numero quinquaginta novem

sunt, partim siccati partim in spiritu vini conservati. Quae ad species jam notas referri debent, exemplaria nonnulla uti *Phyllostoma ciliatum*, *elongatum*, *hastatum*, *Noctilionem unicolorem*, ab aliis auctoribus, praesertim a Geoffroyeo, accurate jam descripta ac depicta, *Noctilionemque dorsatū* ab Azara descriptum, *Noctilioni vero unicolori* Geoffr. haud dissimilem omisi, sola *Glossophaga amplexicaudata*, cuius imago in dissertatione Geoffroyeana minus accurate facta deprehenditur, et *Noctilione soricino Pallasii*, neque ecaudato neque *Glossophagis* secundum Geoffroyeum adnumerando, etiam in hoc volumen, quod caeteroquiu nil nisi ignotas species continet, receptis. Generibus vespertilionum naturae scrutatorum pene omnium calculo jam probatis quatuor adhucdum nova genera socianda putavi, *Proboscideam* scilicet, cuius species generibus notis adnumerari non possunt, *Thyropteram*, insignem patella pollicis pedum anteriorum annexa, *Diphyllam*, cristis duabus nasalibus, cauda et membrana interfemorali deficiente singularem, et *Vampyrum caudae absentia* a *Phyllostomis* distinctum. Quod ad *Phyllostoma* duobus dentibus incisivis et auribus grandibus praeditum (*bidens nob.*) attinet, forsitan et hoc a caeteris habitu diversum, non immerito sub novo quodam genere comprehendendum fuisset, quia vero unicum est, id praetermittendum esse arbitrabor.

Caeterum vespertiones in Brasilia aequae ac in reliquis terrarum partibus degentes justo minus noscimus, quam ut monographiam perfectam exhibere, aut hoc respectu ipsas terrarum partes inter se comparare possimus. Ex generibus jam cognitis non nisi *Phyllostoma*, *Glossophaga*, *Noctilio*, *Molossus* et aliquot *Vespertilionis* species in Brasilia reperiuntur; caetera vero genera alias terrarum partes incolunt. Sicuti reliqui vespertiones, ita et Brasilienses nocturni, vivipari, pilosi, mammiferi, mammis modo pectoralibus et pene libere pendente instructi, anteriores quatuor digitos, excepto solummodo pollice, utpote qui, aequae ac digiti pedis posterioris omnes, unguiculatus est, prolongatos habent, quos omnes membrana volatilis, quae nil nisi membranae digitorum et corporis communis quaedam continuatio est, colligit et conjungit. Geoffroyeus equidem asserit, genus vespertilionum Brasiliense, *Phyllostoma* dictum, articulo novo, quarto scilicet, quem in digito medio cernere licet, a caeteris vespertilionibus differre; particulam autem hanc cartilagineam, quamvis exiguam, non solum in omnibus digitis vespertilionum eiusdem generis, sed etiam in omnibus vespertilionibus nos deprehendisse fatemur. Si *Megaderma Aegypti* et *Rhinolophum Europae* excipias, vespertiones Brasilienses ab aliis eo discerni possunt, quod plures eiusdem familiae, v. g. generis *Glossophagae*, *Vampyri*, *Phyllostomatis*, *Diphyllae* gaudeant crista membranacea, naribus imposita, vel ore verrucoso vel lingua setis hispida et ultra modum prolonganda, quibus quasi acrior redditur tactus gustusque sensus ac vegetior.

Maximam vero vespertiones Brasilienses ab aliis dignoscendi causam praebet gravis ille hominibus animalibusque impetus, quo feruntur in sanguinem, quem avidissime exsugere solent. Haud raro quin ino quotidie nobis accidit, ut matutino adhuc tempore in jumentis sarcinae portandae destinatis modo e regione circa anum, modo e femore, abdomine ac collo sanguinem, velut si venae instrumentis insectae fuissent, large profluentem conspiceremus, quo eiusmodi animalia non modicam virium defectionem experiuntur. Ipsis adeo hominibus non parcunt, praecipue infra unguis et nasum sanguinem extrahentes. Ut nobis rem proprius intuentibus visum est, vulnera dentibus insligunt, sanguinem ore trahunt, atque dum ebibunt, vulnere affectis quasi lenimentum aliquod ac refrigerium ut praebeant, leniter alas movent. Vespertiones Brasilienses in solo currere, nos quoque animadvertimus, id autem non quid praecipui, sed illis cum aliis huiusce familiae commune esse arbitramur. Plurimos gregatim invenimus vel recubantes per diem in lectis domuum aut in arboribus cavis, vel e scopulis ac arboribus juxta fluvios ac in sylvis pendentes, noctu solummodo circumvagos, odore urinoso molestos. Quotquot autem in itinere Brasiliensi colligere nobis concessum fuit vespertilionum genera ac species, quas sub generali appellatione „Andira et Andiraçu,“ Piso memorat, et coloni Brasiliani Morçegos vocant, eas omnes in classes ac ordines subsequentes redigere consultum putavimus.

Familia I. ANISTIOPHORI.

Naso non perfoliato

porrecto; labio superiore leporino; cauda vix exserta, membrana interfemorali pedibusque perbrevis:

Genus I. Noctilio.

subporrecto, obtuso; auriculis obtusis, supra fere confluentibus; cauda longissima, membranam interfemoralem exsuperante:

Genus II. Molossus.

pollice manus infra patella armato:

Genus III. Thyroptera.

prolongato, acuminato:

Genus IV. Proboscidea.

subporrecto, subacuto; cauda longissima membranam interfemoralem non nihil exsuperante; dentibus incisivis inferioribus 6, superioribus 4, lobatis:

Genus V. Vespertilio.

Familia II. ISTIOPHORI.

Naso perfoliato

unifoliato

ore verrucoso, obtuso; labio superiore et inferiore integro; cauda nulla:

Genus VI. Vampyrus.

ore verrucoso, obtuso; labio superiore et inferiore integro; cauda brevi:

Genus VII. Phyllostoma.

ore non verrucoso; labio inferiore subfisso; lingua elongata, setis hispida:

Genus VIII. Glossophaga.

bifoliato; cauda et membrana interfemorali nullis:

Genus IX. Diphylla.

Familia I. ANISTIOPHORI.

Genus I. Noctilio.

Naso non perfoliato, porrecto; labio superiore leporino; cauda vix exserta, membrana interfemorali perbrevis.

Descriptio. Corpus robustum; caput crassum, apice subobtusum; nasus non perfoliatus, porrectus; labium superius leporinum, angulatum; aures angustae, ensiformes, apice acuminatae; tragus lanceolatus, liber, ad latus exterum serratus, apice bidentatus; dentes incisivi superiores quatuor, a caninis remoti, medii acutiores, apice divergentes, laterales postpositi, vix conspicui, inferiores in senibus duo, in juvenibus quatuor, contigui, medii planiores, apice fissi; canini supra infraque duo, fortes, prominentes, subrecurvi, superiores inferioribus longiores; molares utrinque supra infraque octo, priores unicuspidati, reliqui quadricuspidati, in superficie excavati; oculi laterales, oblongi, ab ore ac auriculis aequae distantes; collum crassum, retractum; cauda 1'' longa, membrana interfemorali involuta, in eius medio supra vix apice exserta, articulis septem; pedes posteriores longi; tibia femore longior; pollex pedis anterioris robustior, unguiculatus; membrana volatilis extus secundum tibiam excavato-decurrentis, cum interfemorali infra non confluens; membrana interfemoralis et caudalis extensa, talo adnexa, apice plus minusve triangulariter excurrens; calcaneus magnus, digitis pedis longior, ascendens, in medio deorsum deflexus; testiculi intus reconditi; penis apice glandiformis, liber; infra penem fossae vesiculosae duae; clitoris concava, dimidio brevior quam penis, apice acuminata.

Species 1. Noctilio rufus. Tab. XXXV. Fig. I.

Trunco corporis supra et subtus toto rufo-piloso; quatuor pedibus, auriculisque nudis, rufescentibus.

Descriptio. Truncus robustus, unicolor, rufo-pilosus; caput crassum, apice subobtusum; auriculae ensiformes, inter se large distantes; tragus auricula plus quam dimidio brevior; oculi oblongi, subminuti, ab auriculis magis quam a rostri apice remoti; oris rictus semicircularis, ad apicem amplus, ad latera brevis; labium superius antice in medio dilatate fissum, leporinum, ad latera convexo-angulatum; nasus ater, prosiliens; nares tubuliformes, anticae, distantes; thorax inter scapulas largus; collum retractum; extremitas posterior radio brachii longior; pollex manus crassus, unguiculatus, articulis tribus; unguis pollicis subcurvus, flavicans; planta pedis sublonga; digiti pedis omnes unguiculati; ungues aequales, compressi, adunci, rufi; membrana alaris atra, nuda, versus humeros solummodo subpilosa, ad genua usque profunde excavato-decurrentis; membrana interfemoralis 2'' longa, apice obtuse triangularis, plantas pedis non excedens.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae initium 4'', capitis 1'' 4''', caudae involutae 3½'', liberae ½'', humeri 1'', radii 3'' 1''', pollicis 6''', indicis 2'' 10''', digiti medii 6'', minimi 3¾'', femoris 1'' 1''', tibiae 1½'', plantae 1'' 2''', calcanei 1'', mem-

branae interfemorales $2'' 2'''$, auricularum $6' f_2'''$, tragi $1' f_2'''$; latitudo occipitis $1''$, auricularum $5'''$, inter scapulas $2' f_4''$, alarum extensarum $1' 9'''$, membranae interfemorales ultra $4''$.

Dormitat diu gregatim in arboribus excavatis odore urinoso praemolestus. Mas et foemina aeque rufi.

Species 2. Noctilio Albiventer. Tab. XXXV. Fig. II. et III.

Corpore supra fusco-brunneo, subtus albicante; linea in medio dorsi longitudinali albicante.

Descriptio. Truncus minus robustus, subtus albicans, versus lumbos rufescens, supra brunneo-fuscus; linea in medio dorso albicans, longitudinalis, a scapulis usque ad caudae fere radicem prolongata; caput et collum longiuscula; pili trunci lanuginosi, supra ad radicem albicantes, ad superficiem brunneo-fusci; membrana alaris nuda, atra, fere usque ad tarsum excavato-decurrens; membrana interfemorales nuda, apice elongata, acuminata, plantas longitudine excedens; extremitas posterior brevis; tibia radio brachii multo brevior; pollex manus minus crassus; ungues pedis posterioris subbreves, cinereo-albicantes.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae initium $3' f_2''$, capitis $1'' 1'''$, caudae involutae $5'''$, liberae $1' f_4'''$, humeri $1''$, radii $2' f_4'''$, pollicis $1' f_2''$, digiti indicis $2' f_2''$, medii $4' f_4''$, minimi $2' f_2''$, femoris $1''$, tibiae $10'''$, plantae $6''$, calcanei $3' f_4''$, membranae interfemorales $2'' 1'''$, auricularum $7'''$, tragi $1'''$; latitudo occipitis $3' f_4''$, auricularum $4'''$, inter scapulas $1'' 4'''$, alarum extensarum $1' 2'' 1'''$, membranae interfemorales $1' 3' f_4''$.

Vitam degit solitariam sub tectis domuum prope flumen St. Francis ci. Differt a Noctilione dorsato, in dorso aequae albo-lineato et secundum Azaram in Paraguya habitante, corpore minore, rostro acutiore, membrana interfemorali maxime elongata, coloreque totius corporis diverso,

Genus 2. Molossus.

Naso non perfoliato, subporrecto, obtuso; auriculis obtusis, in fronte fere confluentibus; trago extero, brevi, rotundo, subdistincto; cauda longissima, membranam interfemoralem exsuperante.

Descriptio. Corpus mediocre; truncus supra infraque et versus radicem brachii pilosus; caput a collo subdistinctum, apice uti in cane Molosso obtusum; auriculae breves, quasi truncatae, in apice frontis fere confluentes, pilosae et infra versus angulum oris decurrentes; tragus brevis, exterus, rotundatus; nasus crassus, apice obtusus, prominulus; nares triangulares, anticae, late distantes; rictus oris semicircularis, medioeris; labia crassa, integra; oculi laterales, rictui oris paralleli; lingua et palatum verrucosa; dentes incisivi supra infraque duo, caninis contigui, superiores maiores, pyramidales, apice convergentes, inferiores brevissimi, caninis antepositi, apice incisi; canini supra infraque duo, subvalidi, inferiores superioribus minores, recti, ad basin

marginati et intus dentis incisivi ad instar tuberculati; molares utrinque supra infraque quatuor, priores uni-, reliqui quadricuspidati, acuti; alae angustiores, ad digiti medii apicem tenuissimae; pollex manus tenuis, undique fere membrana alari denudatus; pedes posteriores, praecipue plantae breves; calcaneus descendens; membrana alaris secundum tibiam usque ad tarsum large decurrens, tarsum involvens, et in membranam interfemoralem transiens; membrana interfemorale brevis, caudam plus dimidio involvens, calcaneo annexa et versus caudam liberam oblique decurrens; cauda articulis 9 — 10, longissima, plus quam dimidia, membrana tecta, reliqua libera, extra pedes prominens.

Species 1. *Molossus ursinus*. Tab. XXXV. Fig IV.

Totus niger; corpore et rostro robustissimis; auriculis in apice frontis invicem conniventibus.

Descriptio. Corpus robustum, supra et infra truncum, nec non membranam interfemoralem et versus lumbos pilis nigerrimis vestitum; caput a collo subdistinctum, subcrassum, apice praecobtusum; nasus crassus, obtusus, supra labia prominens; nares triangulares, anticae, distantes; oris rictus amplus, subsemicircularis, ad angulum posticum et oculis parallelum auriculas attingens; labia crassa, pilis confertis, brevibus, hispidis munita; oculi subminuti, ab auribus et nasi apice aequae distantes; auriculae subrotundatae, supra subemarginatae, subsexangulae, usque ad apicem frontis connivendo excurrentes, infra fere usque ad angulum oris prolongatae; tragus exterus, minutus, subrotundus; dentes incisivi supra et infra duo, caninis contigui, superiores sublargi, apice conniventes, caninis paralleli, inferiores minuti, caninis paralleli, coarctati, apice bilobati; canini validi, superiores maiores, subrecurvi, inferiores recti, ad basin coronati et intus dentis incisivi ad instar tuberculati; lingua brunneo-verrucosa; collum breve; thorax largiusculus; membrana alaris angusta, inter pollicem et radium fere, inter pollicem et indicem omnino deficiens, lata, secundum tibiam large decurrens, metatarsum involvens et membranae interfemorali sive caudali unita; membrana interfemorale subangusta, caudam tertia parte liberam et digitos pedis longe exsuperantem involvens, calcaneo descendenti brevi caudaeque obtuse-triangulariter affixa; pollex manus subcrassus eiusdemque unguis brevis; digitus medius reliquis multo longior, articulo ultimo adpresso, apice brevi, incurvo; tibia radio duplo fere minor; planta pedis brevis; digiti pilis hirsuti; ungues subbreves, subincurvi; cauda longa, membranam interfemoralem tertia parte exsuperans, libera.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $3\frac{1}{2}''$, capitis $1\frac{1}{4}''$, caudae involutae $1\frac{1}{4}''$, liberae $9''$, humeri $1\frac{1}{2}'''$, radii $2''$, pollicis $2''$, digiti indicis $2''$, medii $1\frac{1}{2}''$ $1'''$, minimi $3\frac{3}{4}''$, femoris $11'''$, tibiae $9\frac{1}{4}'''$, plantae $4\frac{1}{2}'''$, calcanei $\frac{1}{2}'''$, membranae interfemorale $1\frac{1}{4}''$, auricularum $6''$, tragi $1\frac{1}{4}'''$, latitudo occipitis medii ultra $\frac{3}{4}''$, auricularum $6\frac{3}{4}'''$, inter scapulas $1\frac{1}{2}''$, alarum extensarum $1' 5\frac{1}{2}''$, membranae interfemorale $2''$.

Reperitur in suburbiis Provinciae Para.

Species 2. *Molossus nasutus*. Tab. XXXV. Fig. VII.

Naso prolongato; auriculis supra frontem magis distantibus; trunco supra brunneo-nigro, infra brunneo; cauda dimidia fere libera; dentibus incisivis superioribus mediis apice subdivergentibus.

Descriptio. Corpus robustius, supra brunneo-nigrum, subtus fusco-brunneum; caput breve; nasus supra labia obtuso-prolongatus, pilis rigidis, rufescentibus, confertis antice munitus; auriculae usque ad angulum oris vergentes, breves, obtusae, supra frontem $3'''$ distantes; dentes incisivi superiores mediis apice subdivergentes; oris rictus oblongus; pollex manus brevis, ungue breviusculo instructus; pedes posteriores breves; planta brevissima, pilis hirsuta; membrana alaris et interfemorales brunneo-cinerascentes, prior usque ad dimidiam tibiam extus decurrens, altera brevis, usque ad tarsum et dein usque ad dimidiam fere caudam angulato-excurrens; cauda longitudine dorsi, ad dimidium fere libera, prolongata, reliqua membrana interfemorali involuta, articulis decem.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae initium $3\frac{1}{2}''$, capitis $1''$, caudae involutae $1'' 2'''$, liberae $1''$, humeri $1''$, radii $1'' 10'''$, pollicis $1'''$, digiti indicis $1'' 10'''$, medi $3\frac{1}{2}''$, minimi $1\frac{3}{4}''$, femoris $\frac{3}{4}''$, tibiae $\frac{3}{4}''$, plantae $3'''$, calcanei $\frac{3}{4}''$, membranae interfemorales ultra $1''$, auricularum $\frac{1}{2}''$, tragi ultra $1'''$; **latitudo** occipitis $\frac{3}{4}''$, auricularum $5\frac{1}{2}'''$, inter scapulas $1\frac{1}{2}''$, alarum extensarum $1'$, membranae interfemorales $2''$.

Reperitur sub tectis domuum prope flumen St. Francisci.

Species 3. *Molossus fumarius*. Tab. XXXV. Fig. V. et VI.

Corpore submediocri, nigro-fusco; facie, auriculis alisque nigerrimis.

Descriptio. Corpus minus quam in praecedente specie, supra et subtus nigro-fuscum; facies minuta, nudiuscula; nasus supra pilosus; labia ad marginem pilosa; auriculae nudiusculae, nigrae, obtuso-abbreviatae, supra frontem approximatae, oculos fere obtegentes; oris rictus longiusculus; dentes incisivi superiores apice subdivergentes; pili brunnei, ad radicem albo-cinerascentes, in superficie nigro-fusci; alae nigricantes, angustae, tenues; digitus medius valde elongatus, apice filiformis, recurvus; membrana alaris usque ad medium tibiae introrsum prolongata, interfemorales talo annexa, dein secundum caudam, excepto eius apice libero incurvo, decurrens; cauda longa, membrana involuta, articulis 10, quorum ultimi liberi; pollex manus eiusque unguis brevis; planta pedis minuta, pilis rufis hirsuta; femur et tibia ad genua membrana alari libera, prominens; radius brachii concavus; talus in medio incurvus, dein descendens.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae initium $2'' 3'''$, capitis $3'''$, caudae involutae $1'' 3'''$, liberae $10'''$, humeri $1''$, radii $1'' 10'''$, pollicis $1\frac{1}{3}'''$, digiti medi $2\frac{1}{4}''$, indicis $3'' 5'''$, minimi $1\frac{1}{2}''$, femoris $\frac{3}{4}''$, tibiae $\frac{3}{4}''$, plantae $4'''$, calcanei $4'''$, membranae interfemorales $1\frac{1}{3}'''$, auricularum $4'''$, tragi $1\frac{1}{4}''$; **latitudo** capitis medi $\frac{1}{2}''$, auricularum $4\frac{1}{2}'''$, inter scapulas $1''$, alarum extensarum $1' 4'''$, membranae interfemorales $1\frac{1}{2}''$.

Habitat numerosus diu sub tectis domuum fumo spisso repletarum, prope ripam fluminis Itapicurú.

Genus 3. Thyroptera.

Naso non perfoliato; pollice manus infra patella subconcaua armato.

Descriptio. Corpus gracile, minutum; radius brachii concavus; pollex manus tenuis, infra patella vel disco armatus; cauda longa, maxima parte membrana interfemorali involuta, parte tertia equidem ad extus libere pendens; membrana alaris angustissima, secundum tibiam usque ad tarsum decurrens; membrana interfemorali plantas pedum vix exsuperans, apice subtriangularis; calcaneus horizontalis, subbrevis; digiti pedis posterioris omnes tenues, adpressi, unguiculati; planta pedis minuta.

Species 1. Thyroptera tricolor. Tab. XXXVI. Fig. IX.

Corpore supra brunneo-fusco, subtus albissimo; alis pedibusque nigerrimis.

Longitudo trunci a nucha usque ad caudae initium $1\frac{1}{4}''$, caudae involutae ultra $\frac{3}{4}''$, liberae $3\frac{1}{2}''$, humeri $\frac{3}{4}''$, radii $1''\frac{3}{4}''$, pollicis $1\frac{1}{4}''$, digiti indicis $1''\frac{3}{4}''$, medii ultra $1\frac{1}{2}''$, minimi $1''$, femoris $7''$, tibiae $\frac{3}{4}''$, plantae $2''$, calcanei $2''$, membranae interfemorali $8''$; latitudo inter scapulas $9''$, alarum extensarum $9''\frac{4}{4}''$, membranae interfemorali $1\frac{1}{4}''$.

Insidet diu arbustis ad littora fluminis Amazonum.

Genus 4. Proboscidea.

Naso non perfoliato, prolongato, acuminato propendente.

Descriptio. Corpus minimum, supra depressum; caput elongatum, nares versus acuminatum; auriculae mediocres, lanceolatae, apice acutae, oris angulum non attingentes; tragus integer, lanceolatus, alter exterior uti in Molosso rotundus; oculi auriculis propiores; nasus proboscideus, supra labia longe propendens, apice subsulcatus; nares oblongae, anticae; os minutum, angulatum; labium superius infra nasum tenue, marginatum, labium inferius supra mentum bituberculatum, subsulcatum; mentum membranoso-vel valvuloso-sinuatatum; dentes iucisivi superiores quatuor, minimi, a caninis remoti, omnes distantes et divergentes, medii spatio largo separati, inferiores sex, vix majores, lobati, semicirculariter positi; canini supra infraque duo, tenues, superiores ad basin intus unidentulati; molares supra infraque quinque, prior minutus, unicuspidatus, reliqui multicuspidati, acuti, exfoliati; lingua subverrucosa, aeque ac palatum transversim striata; membrana volatilis angusta, apice digitorum longior, tenuior, plicata, usque ad tarsum large decurrens; membrana interfemorali pedibus brevior, caudam usque dimidium longitudinis involvens, extus emarginata; calcaneus tenuis, longus, primo horizontalis, dein curvo-descendens; pollex manus subbrevis, tenuis; digiti gracillimi, adpressi; cauda membrana interfemorali longior, ad dimidium involuta, reliqua libere exserta.

Species 1. *Proboscidea saxatilis*. Tab. XXXV. Fig. VIII.

Corpore supra brunneo-cinereoque variegato, subtus murino-cinerascente; alis pedibusque brunneo-fuscis.

Descriptio. Corpus minutum; caput acuminatum, retractum; nasus acuminatus, proboscideus, subdependens; auriculae parvae, lanceolatae, extus subserratae, adpressae, supra caput prominulae; membrana interfemorale plicata, plantis, nec non cauda brevior, margine posteriore subhorizontali; planta compressa, minuta; digiti pedis posterioris nigro-unguiculati; calcaneus longus, extus subconcauus, apice versus medium uterque approximatus, furcillate prominens.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem 2'', capitis $6\frac{1}{4}$ ''', caudae involutae $5\frac{1}{2}$ ''', liberae 2''', humeri 1'' $3\frac{1}{4}$ ''', radii ultra 1 $\frac{3}{4}$ ''', pollicis ultra 1''', digiti indicis 2'', medii 1 $\frac{3}{4}$ ''', minimi 2 $\frac{1}{2}$ ''', femoris $\frac{1}{2}$ ''', tibiae 1 $\frac{1}{2}$ ''', plantae 2 $\frac{1}{4}$ ''', calcanei 5''', membranae interfemorale 1 $\frac{3}{4}$ ''', auricularum 5 $\frac{1}{2}$ ''', tragi $3\frac{1}{4}$ '''; latitudo occipitis $\frac{1}{2}$ ''', auricularum 2 $\frac{1}{2}$ ''', inter scapulas $3\frac{1}{4}$ ''', alarum extensarum 9'' 2''', membranae interfemorale 1 $\frac{3}{4}$ ''.

Reperitur gregatim in locis rupestribus juxta fluvium St. Francisci.

Species 2. *Proboscidea rivalis*.

Proboscidea rivalis in hoc opere non delineata differt corpore minore, supra fusco-brunneo, subtus pallide brunneo, alis supra caput longe prominentibus.

Reperitur gregatim ex arbustis prope flumen Amazonum dependens.

Genus 5. *Vespertilio*.

Naso non perfoliato, subporrecto, subacuto; cauda longissima, membranam interfemoralem vix exsuperante; dentibus incisivis inferioribus sex, triserratis; incisivis superioribus quatuor, bidenticulatis, spatio intermedio largo distantibus.

Descriptio. Corpus subparvum; rostrum acutum; nasus subporrectus, subacutus; nares rotundae, sublaterales, distantes; auriculae mediocres, patulae, sublanceolatae, versus angulum oris decurrentes; tragus auriculis partibus duabus brevior, integer, oblongus, apice largiusculus; rictus oris oblongus, recedens; lingua brevis, subverrucosa; oculi auribus propiores; dentes incisivi superiores quatuor, apice bidenticulati, medii spatio largo distantes, inferiores sex, apice trilobati, canini supra infraque duo aequales, prominuli; molares supra infraque sex, priores tres unicuspidati, reliqui exfoliati, acuminati, anteriores duo minimi; membrana alaris, praecipue versus apicem digitorum angustior, inter digitum minimum et tibiam minus excavata, usque ad metatarsum pedis posterioris procurrentis; membrana interfemorale obtuse concava sive angulate obtusa, larga, pedes exsuperans, caudam longam, excepto eius apice, fere totam involvens; calcaneus tenuis, descendens, sublongus; pollex manus tenuis, parvus, unguiculatus; cauda articulis novem.

Species 1. *Vespertilio brasiliensis*. Tab. XXXVI. Fig. VIII.

Corpore supra et subtus nigro; alis hyalinis.

Descriptio. Corpus exiguum; caput oblongum; rostrum prominulum, apice subobtusum, auriculae longiusculae, lanceolatae, versus basin sublargaе, revolutae, versus angulum oris non excurrentes; tragus integer, lanceolatus, auricularum fere longitudine; nares anticae, revolutae, ad latera, uti et versus mentum verrucis tubuliformibus munitae; truncus corporis supra et subtus niger; membrana alaris et interfemoralis pellucidae, prior usque ad pollicem pedis large decurrens, posterior usque ad calcaneum breviusculum et secundum caudam maiorem decurrens; cauda pede posteriore longior, apice vix exserto ac libero.

Longitudo trunci a rostri apice usque ad caudae initium $1\frac{1}{2}''$, capitis $\frac{1}{2}''$, caudae involutae $2''$, liberae $1''$, humeri $1''$, radii ultra $1\frac{3}{4}''$, pollicis $\frac{3}{4}''$, digiti indicis $1\frac{1}{2}''$, medii $2''$, minimi $2''$, femoris $\frac{1}{2}''$, tibiae $\frac{1}{2}''$, plantae $2\frac{1}{2}''$, calcanei $3\frac{1}{2}''$, membranae interfemorales $1\frac{1}{2}''$, auricularum ultra $\frac{1}{2}''$, tragi ultra $2''$; latitudo occipitis $\frac{1}{4}''$, auricularum $4''$, inter scapulas $\frac{3}{4}''$, alarum extensarum $10''$, membranae interfemorales $1\frac{1}{2}''$.

Familia II. ISTIOPHORI.

Genus 6. *Vampyrus*.

Naso unifoliato; ore subobtusum, apice mentum versus verrucosum; labio superiore et inferiore integris, ad intus vix cirrhosis; membrana interfemorali largiore et longiore quam cauda, margine externo subhorizontali; cauda brevi, involuta, apice vix libere prominente.

Descriptio. Animal sanguisugum; corpus frequenter robustum; caput crassum, oblongum, a collo distinctum; rostrum subobtusum; vexillum naso impositum, longum, acuminatum, infra aut a labio vix distinctum ac connatum, aut libere pendens; latera narium elevate tuberculata; nares approximatae, anticae; aures grandes, patulae, acuminatae, ab oris angulo, ab oculis et inter se distantes, ad basin sublobatae vel subtuberculatae; tragus lanceolatus, extus et infra denticulatus; oculi grandiores, inter aures et nares intermedii, ad angulum oris non verticales; oris rictus oblongiusculus; labia ad marginem subintegra, cirrhis vix munita, inferius supra mentum tuberculis cirrhisque munitum, intus versus angulum oris sacculo buccali valvulosum; lingua supra verrucosa, apice vix acuminata; dentes incisivi superiores quatuor, caninis contigui, inter se comiventes, quorum laterales minuti, vix conspicui, medii longiusculi, plani, conici, inferiores quatuor, superioribus minores, paralleli, aequales, caninis contigui, excepto *Vampyro Bidente*, cui inferiores solummodo duo, longi, largiores; dentes canini supra infraque duo, fortes, subaequales, subrecurvi; molares utrinque supra et infra quatuor, quorum anteriores uni-, reliqui tricuspidati; pollex manus longior, crassiusculus; phalanx postremus ac cartilago digiti medii longiores quam in caeteris huius familiae; membrana volatilis ad lumbos dorso adnata, usque ad talum large descendens; calcaneus subbrevis; membrana interfemorale calcaneo angulate affixa, margine exteriori subhorizontali; cauda membrana interfemorali triplo brevior, connata, supra apice vix libero prominens.

Species 1. *Vampyrus cirrhosus*. Tab. XXXVI. Fig. III.

Capite oblongiore; labiis, vexillo nasali inferiori et laterali, praecipue mento cirrhosis.

Descriptio. Corpus robustius, pallide castaneo-pilosum; alae nigricantes, nudaе; caput oblongiusculum, apice subattematum; auriculae perpatulae, altae, acuminatae, intus nudiusculae, fronti ad latera adnatae, versus basin intus unituberculatae; tragus longior, infra et extus bidentatus; vexillum nasale superius conicum, antice vix canaliculatum, ad marginem crenulatum, inferius ad latera libere pendens, fimbriatum, antice cum labio connatum; labia ad mentum cirrhosissima; cauda tota connata; unguis pollicis et digitorum pedis posterioris rufo-flavicantes.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $3''10'''$, capitis $1'f_2''$, partis caudae involutae $\frac{3}{4}''$, liberae $\frac{1}{3}'''$, humeri $1'f_2''$, radii $2'f_4''$, pollicis $2'''$, digiti indicis $2''$, medii $3''$, minimi $4''$, femoris $1''$, tibiae $1''$, plantae $5'''$, calcanei $5'''$, membranae interfemorales ultra $1'f_4''$, auricularum $5'''$, tragi $3''$; latitudo occipitis $1''$, auricularum $2'f_2'''$, inter scapulas $1''$, alarum extensarum $1'3''$, membranae interfemorales $2'f_4''$.

Species 2. *Vampyrus Bidens*. Tab. XXXVI. Fig. V.

Rostro acuto; dentibus incisivis inferioribus duobus, longis; auriculis praepalulis; trunco subtus murino, supra nigro-fusco piloso; alis nudis, nigris; caudae apice supra extus prominente; calcaneis longioribus, ad marginem concavis, apice furcae ad instar approximatis.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $5''$, capitis ultra $1''$, partis caudae involutae $5'''$, liberae $\frac{1}{4}'''$, humeri ultra $1''$, radii $2''$, pollicis $4'''$, digiti indicis ultra $2''$, medii $4'f_4''$, minimi $2'f_4''$, femoris $\frac{3}{4}''$, tibiae $1''$, plantae $8'f_2'''$, calcanei ultra $1''$, membranae interfemorales $1''$, auricularum $9'''$, tragi $1'f_2'''$; latitudo occipitis $10'''$, auricularum $7'''$, inter scapulas $1'f_4''$, alarum extensarum $1''2'''$, membranae interfemorales ultra $1'f_2''$.

Habitat sub tectis domiciliorum prope fluvium St. Francisci.

Species 3. *Vampyrus soricinus*. Tab. XXXVI. Fig. II. VI.

Corpore minus robusto; dentibus incisivis apice subdivergentibus; vexillo nasali integro, inferiore antice a labio non distincto; labiis integris, non verrucosis; mento verrucoso.

Descriptio. Corpus minus robustum, supra murino-variegatum, subtus cano-fuscum; pili dorsi ad radicem albo-canescens, apice rufescentes; caput subgracile, acutiusculum; auriculae subbreves, extus versus apicem subconcavae; tragus tenuis, extus infra tridentatus; dentes canini supra infraque duo, subgraciles, incisivi superiores laterales vix conspicui, medii crassiores, acuti, ad apicem divergentes, inferiores medii lateralibus maiores, planiores, subserrati; molares utrinque supra quatuor, infra quinque, posteriores tricuspидati, apice obtusiusculi; pollex manus tenuis, longiusculus; unguis pollicis manus flavicans, minor; index manus a digito medio magis distans; alae nudiusculae, nigrae, usque ad finem tibiae fere horizontaliter descendentes; membrana interfemorales abbreviata, extrorsum subconcava; calcaneus brevis, ascendens; caudae membrana interfemorales duplo brevior, connata, apice vix prominens.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $5''$, capitis ultra $3'''$, partis caudae involutae $2'''$, liberae $\frac{1}{6}'''$, humeri $1''$, radii $1'f_4''$, pollicis $2'f_4'''$, digiti indicis $2''$, medii $2'f_4''$, minimi $3'f_4''$, femoris $1''$, tibiae $\frac{1}{3}''$, plantae $5'''$, calcanei $2'''$, membranae interfemorales $\frac{1}{2}''$, auricularum $7'''$, tragi $1'f_4'''$; latitudo occipitis $\frac{3}{4}''$, auricularum $4'f_2'''$, inter scapulas $1'f_2''$, alarum extensarum $1'1''$, membranae interfemorales $1''2'''$.

Vivit sub tectis domuum in urbe Rio de Janeiro et ad fluvium St. Francisci.

G e n u s 7. P h y l l o s t o m a.

Naso unifoliato; ore verrucoso, obtuso, semicirculari; labio superiore et inferiore integris, introrsum maxime cirrhosis, extus supra mentum tuberculosis; cauda omnino nulla.

Descriptio. Animal sanguisugum; corpus robustius; caput crassum, suboblongum, apice obtusum; vexillum nasale superius longius, inferius antice vel distinctum ac liberum, vel subdistinctum; rictus oris semicircularis; labia in margine exteriori verrucosa, ad intus cirrhosa; lunula supra mentum tuberculosa; auriculae breviores quam in genere praecedente; dentes incisivi supra infraque quatuor, superiores inaequales, laterales subminuti, conniventes, medii planiusculi, apice bidentati, subdistantes, inferiores paralleli, aequales, caninis contigui, molarium anteriores unicuspidati, secundus grandior; pedes posteriores minores quam in genere praecedente; membrana interfemoralis brevior, sub angulo subacuto excavata; cauda nulla; reliqui characteres uti in genere Vampyri.

Species 1. Phyllostoma planirostre. Tab. XXXVI. Fig. I.

Capite crasso, supra depresso; naso ad latera tuberculose verrucoso; vexillo nasali inferiore antice libere pendente; labiis ad marginem crenulatis; mento minus alto, planiore.

Descriptio. Corpus robustius, supra et infra canescenti-pilosum; alae nigrae, nuda; vexillum nasale nudum, superius triangulare, versus acumen lateraliter subexcavatum, inferius lateraliter et antice libere pendens, margine integro; latera nasi utrinque verrucis sex longitudinalibus tuberculosa; tubercula supra mentum quatuordecim, minora, sublongitudinaliter posita, media planiora; labia ad marginem crenulata, introrsum cirrhosa; auriculae mediocres, infra ad basin neque tuberculatae neque lobatae; tragus mediocris, extrorsum infra tridentatus; ungues rufescentes.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $3\frac{3}{4}''$, capitis $1''\ 4'''$, caudae 0, humeri $1\frac{1}{2}''$, radii $2\frac{1}{2}''$, pollicis $3\frac{1}{4}''$, digiti indicis $2\frac{3}{4}''$, medii $3''$, minimi $4\frac{1}{4}''$, femoris $1''$, tibiae $1''$, plantae $5\frac{1}{4}''$, calcanei $2\frac{1}{2}'''$, membranae interfemoralis $1''$, auricularum $8'''$, tragi $1\frac{1}{4}''$; latitudo occipitis $\frac{3}{4}''$, inter scapulas $1\frac{1}{4}''$, alarum extensarum $1''\ 3'''$, membranae interfemoralis $2\frac{3}{4}''$.

Habitat in suburbiis Bahiae.

G e n u s 8. G l o s s o p h a g a.

Capite et rostro gracilibus, apicem versus acuminatis; vexillo nasali superiore brevi, integro, inferiore antice connato; lingua setis hispida, maxime prolonganda; labio inferiore usque ad mentum fisso, longitudinaliter crenulato; trago lanceolato, extus non denticulato; cauda minuta, apice vix exserto.

Descriptio. Animal sanguisugum; corpus parvum, gracile; caput oblongum, gracile, in vertice elevatum; vexillum nasale superius breve, triangulare, integrum, inferius an-

antice cum labio connatum, lateraliter verrucis irregulariter positis cinctum; oris rictus oblongus, acute angulatus; labium superius verrucis hinc inde munitum, inferius in medio usque ad mentum fissum, ad latera longitudinaliter cirrhis obsitum; aures breves, apice subobtusae, ab oculis et angulo oris distantes; tragus lanceolatus non serratus; nares anticae approximatae; dentes incisivi supra infraque quatuor, caninis contigui, quorum laterales minuti, medii plani, approximati, apice largi, inferiores tuberculosi, breves; canini supra infraque duo, longiusculi, graciles; molares supra infraque utrinque sex, quorum tres anteriores unicuspidati, reliqui quadricuspidati, breves, apice acuti; lingua retractilis, apice acutiuscula, mirum quantum prolonganda, frequenter in exemplis spiritu vini reservatis longitudine fere capitis pro-pendens, supra setis aureo nitentibus retroversis hispida; oculi minuti, rotundiores, angulo oris verticaliter impositi; pedes posteriores graciles, radio brachii breviores, omnes unguiculati; pollex manus tenuis, sublongus, unguiculo brevi; membrana alaris usque ad talum excavato-excurrens; membrana interfemorale abbreviata, extus subexcavata, magis lata quam longa, planta nec non tibia minor; calcaneus brevis, subascendens; cauda brevissima articulis quatuor, membrana interfemorale dimidio brevior, involuta, apice vix exserto.

Species 1. *Glossophaga amplexicaudata* Tab. XXXVI. Fig. IV.

Corpore supra brunneo, subtus rufo-brunneo; membrana alari et interfemorale nigris; pilis in mare rufescente-brunneis, in foemina nigricanti-brunneis.

Descriptio. Pili corporis ad radicem pallide cani, apicem versus in dorso brunnei, in abdomine rufo-brunnei; facies quasi tota brunneo-pilosa, acutiuscula; vexillum nasale unicum, superius breve, triangulare, integrum, medium ad latera narium subtuberosum; labia verrucis hinc inde obsita, inferius usque ad mentum fissum, lateraliter utrinque membrana longitudinali, sublibera et subcirrhosa ornatum; rictus oris oblongus, acute angulatus; auriculae breviores, obtusiores, fronti haud adnatae, antice nuda; tragus lanceolatus, haud longus, extrorsum infra excavatus; pollex manus gracilis, sublongatus, cum radio brachii et digito indice membrana mediante conjunctus, deflexus; unguis pollicaris minutus, aequae, ac unguis digitorum pedis posterioris omnes maiusculi, flavicans; membrana alaris nigricans, versus apicem digitorum manus inflexa, usque ad finem tibiae excavato-excurrens; pedes posteriores breves, aequae ac anteriores nudi; caput tibiae superius extus libere prominens; planta pedis angustata, subbrevis; calcaneus brevis, subascendens; membrana interfemorale magis larga quam longa, extus obtuse excavata, plantas non attingens; cauda perbrevis, involuta, supra in medio membranae interfemorale tuberculo extremo prominens; mas differt a foemina, quae nigricanti-brunneo colorata est, corpore magis rufescenti-brunneo.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae originem $2\frac{1}{4}''$, capitis $1''$, partis caudae involutae $3'''$, liberae $\frac{1}{4}'''$, humeri $1''$, radii $1\frac{1}{2}''$, pollicis ultra $1'''$, digiti indicis $1\frac{1}{4}''$, medii $2''$, minimi $2\frac{1}{2}'''$ femoris $\frac{1}{2}''$, tibiae $\frac{1}{2}''$, plantae $4'''$, calcanei $1'''$, membranae interfemorale ultra $\frac{3}{4}''$, auricularum $4'''$, tragi $1'''$; latitudo occipitis medii ultra $\frac{1}{2}''$, inter scapulas $9'''$, auricularum $3'''$, alarum extensarum $9\frac{1}{2}''$, membranae interfemorale $1\frac{1}{4}''$.

Habitat, sanguisuga crudelissima, in domibus urbis Rio de Janeiro et fere totius Brasiliae.

G e n u s 9. **D i p h y l l a.**

Naso bifoliato; cauda et membrana interfemorali nullis.

Descriptio. Corpus mediocre; caput breve, apice subobtusum; auriculae oblongo-rotundatae, perbreves, quasi truncatae, basin versus omnino deficientes; tragus lanceolatus, integer, haud reconditus; vexilla duo supra nasum juxta se posita, quasi truncata, ad latera non prolongata, perbrevia, praecipue posterius; dentes canini supra infraque duo, vix exserti; incisivi supra infraque quatuor, superiores medii lateralibus postpositi, maiores, apice sexdentati, semicirculariter collocati, largi, caninis contigui; molares supra infraque octo, breves, apice crenulati, inferiores a caninis distantes; lingua subverrucosa, apice nonnihil lata et obtusa; labia non verrucosa, fere uti in Molosso pilosa; membrana alaris angustata, lumbis adnata, versus apicem digitorum valde elongata, tenuis, recurva, versus tibiae basin excavato-decurrentis; pollex manus solummodo unguiculatus, cum radio et digito indice membrana vix ulla conjunctus; pedes posteriores radium brachii fere aequantes, membrana interfemorali deficiente omnino liberi; planta pedis longior; digiti pedis posterioris omnes unguiculati; calcaneus extus vix conspicuus; cauda nulla.

Species 1. Diphylla ecaudata. Tab. XXXVI. Fig VII.

Corpore villosa - pilosa; dorso fusco - brunneo; capite et abdomine subtus brunneo-canescens; alis nigricantibus, nudiusculis; facie versus aures villosa - pilosa, nudiuscula; cauda et membrana interfemorali nullis; calcaneo extus vix conspicuo.

Longitudo trunci a nasi apice usque ad caudae initium 3'', capitis $\frac{3}{4}$ '', humeri $\frac{3}{4}$ '', radii $1\frac{3}{4}$ '', pollicis 5'', digiti indicis $1''\frac{4}{4}$ '', medii $2\frac{3}{4}$ '', minimi $2''\frac{1}{4}$ '', femoris $\frac{3}{4}$ '', tibiae 7'', plantae 8'', auricularum 3'', tragi $\frac{3}{4}$ ''; latitudo occipitis ultra $\frac{1}{2}$ '', auricularum $4\frac{1}{4}$ '', inter scapulas $1\frac{1}{2}$ '', alarum extensarum $10\frac{1}{4}$ ''.

EXPLICATIO CAPITUM OSSEORUM.

Tabula XXXVII.

Caput osseum viri Indi Americani nondum senilis, e tribu Camacaens, prope pagum Ilheos in Provincia Bahiae indigeni.

Mensurae huiusce capitis ossei cum mensuris capitum osseorum hominum ejusdem fere aetatis, Europaei nempe et quidem viri e Tyroli in Cephalogenesi jam delineati, Bengalensis, Aethiopsis ex Angola comparatae.

	Fig. I.			Fig. II.	
	a. Camacaens e Brasilia.	b. Europaeus e Tyroli.	c. Asianus e Bengala.	d. Aethiops ex Angola.	e. Cebus libidinosus.
ANGULUS FACIALIS et CEREBRALIS formatus linea a limbo meatus auditorii inferiore ad limbum alveoli dentis incisivi superioris medii ducta, (Tab. 38. Fig. 9. a. b.) et altera linea a margine alveoli dentis incisivi sup. med. vel usque ad suturam frontali-nasalem (Fig. 9. i. k.) vel usque ad tuber frontis sive sinuum frontalem (Fig. 9. g. h.) vel usque ad glabellam frontis prominentem (i. k.)	68°	70°	70°	70°	54°
	70°	74°	80°	73½°	57°
	63½°	65°	67°	70½°	52°
ALTITUDO CAPITIS totius enim maxilla inferiore plano horizontali impositi, ab horizonte usque ad verticem ab apice processus mastoidei usque ad verticem;	6"	6"	5" 10½"	5" 11"	2" 5"
	5" 6"	5" 2½"	5" 0½"	5" 8"	1" 3½"
FRONTIS ab apice frontis vel a sutura frontali-nasali usque ad verticem (Tab. 38. Fig. 9. f. g.) a superficie externa corporis ossis sphenoidae usque ad verticem	1" 6½"	1" 11½"	1" 8"	1" 6"	9"
	4" 2¼"	4" 5"	4" 4½"	4"	1" 5"
SYNCIPITIS sive ossium BREGMATIS a sutura mastoidea ab apice ossis occipitis superioris a superficie externa ossis basilaris usque ad cacumen syncipitis	4" 2¼" 3" 8½"	4" 2" 3" 1"	4" 7¼" 3" 10½"	4" 4" 3" 5"	1" 5" 1" 1"
	4" 1½"	4" 7"	5" 1"	4" 11"	1" 8"
OCCIPITIS a linea et crista occipitali inferiore, sive a plano horizontali usque ad apicem ossis occipitis superioris a limbo inferiore foraminis occipitalis magni usque ad apicem ossis occipitalis superioris	1" 9"	2" 3½"	1" 3"	1" 10½"	5¼"
	1" 6"	1" 5½"	1" 3½"	1" 4"	5"

	Fig. I.				Fig. II.
	a. Canacaens e Brasilia.	b. Europaeus e Tyroli.	c. Asianus e Bengala.	d. Aethiops ex Angola.	e. Cebus libidinosus.
LONGITUDO CAPITIS a tubere occipitis usque ad mentum	7" 10 ^{'''}	7" 4 ¹ / ₂ ^{'''}	6" 10 ^{'''}	8" 6 ^{'''}	5" 2 ^{'''}
CRANI					
maxima a tubere occipitis usque ad apicem frontis	6" 10 ^{'''}	6" 6 ¹ / ₂ ^{'''}	6" 1 ^{'''}	6" 9 ^{'''}	2" 6 ¹ / ₄ ^{'''}
FRONTIS					
ab apice usque ad unionem suturae coronalis et sagittalis	4" 1 ^{'''}	4" 1 ^{'''}	3" 11 ¹ / ₂ ^{'''}	4" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	2" 2 ^{'''}
SYNCIPITIS					
secundum suturam sagittalem longitudinalem usque ad apicem ossis occipitis superioris	4" 1 ³ / ₄ ^{'''}	4" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	4" 1 ¹ / ₃ ^{'''}	4" 3 ^{'''}	11 ^{'''}
OCCIPITIS					
a margine foraminis occipitalis magni superiore usque ad unionem suturae longitudinalis aut sagittalis	3" 4 ¹ / ₄ ^{'''}	3" 4 ^{'''}	3" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	3" 7 ^{'''}	10 ^{'''}
FACIEI a mento usque ad suturam frontali-nasalem,					
	4" 6 ³ / ₄ ^{'''}	4" 4 ^{'''}	3" 11 ^{'''}	6" 1 ¹ / ₄ ^{'''}	1" 10 ^{'''}
PARTIS FACIALIS INFERIAE a mento usque ad spinam cristae maxillari-nasalis, cartilagineum nasalem recipientem					
	2" 6 ³ / ₄ ^{'''}	2" 4 ¹ / ₂ ^{'''}	2" 2 ^{'''}	4" 5 ¹ / ₂ ^{'''}	9 ¹ / ₂ ^{'''}
PARTIS FACIALIS SUPERIORIS ab eadem spina maxillari-nasali usque ad suturam frontali-nasalem					
	2" 9 ^{'''}	2"	1" 10 ^{'''}	2" 7 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 1 ^{'''}
OSSIS INCISIVI a limbo alveoli medii usque ad spinam maxillari-nasalem					
	3 ^{'''}	5 ¹ / ₂ ^{'''}	7 ^{'''}	10 ^{'''}	4 ^{'''}
APERTURAE NASALIS a spina maxillari-nasali usque ad apicem vel spinam ossis nasalis					
	1" 4 ^{'''}	1" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	4 ^{'''}
OSSIS NASALIS a spina nasali usque ad radicem sive suturam frontali-nasalem					
	10 ^{'''}	1" 2 ^{'''}	8 ^{'''}	8 ¹ / ₄ ^{'''}	5 ¹ / ₂ ^{'''}
MENTI ab apice usque ad limbum alveoli dentis incisivi inferioris					
	1" 2 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	11 ³ / ₄ ^{'''}	1" 1 ¹ / ₂ ^{'''}	9 ^{'''}
MANDIBAE INTERIORIS ab angulo postico usque ad apicem processus coronoidei					
	2" 5 ¹ / ₄ ^{'''}	2" 5 ¹ / ₂ ^{'''}	2" 1 ¹ / ₄ ^{'''}	2" 6 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 5 ^{'''}
FORAMINIS OCCIPITALIS MAGNI					
a margine inferiore usque ad superiorem	1" 5 ^{'''}	1" 5 ^{'''}	1" 5 ¹ / ₄ ^{'''}	1" 5 ^{'''}	5 ^{'''}
DISTANTIAE					
a margine externo ossis palatini sive a spina ossis palatini usque ad initium foraminis occipitalis magni	1" 7 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 10 ^{'''}	1" 8 ¹ / ₄ ^{'''}	1" 3 ^{'''}	1" 1 ^{'''}
ORBITAE					
a margine inferiore usque ad superiorem	1" 4 ^{'''}	1" 5 ^{'''}	1" 4 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 11 ^{'''}	1"
profunditatis orbitae a margine externo usque ad foramen opticum.	1" 3 ¹ / ₂ ^{'''}	1" 10 ^{'''}	1" 10 ^{'''}	2" 1 ^{'''}	1"

	Fig. I.		Fig. II.		
	a. Camacaens ex America.	b. Europaeus e Tyrol.	c. Asianus e Bengala.	d. Aethiops ex Angola.	e. Cebus libidinosus.
LATITUDO FRONTRIS minima postice inter utrasque apophyses zygomatico-frontales	3" 5 $\frac{1}{2}$ "	3" 6"	3" 6 $\frac{1}{2}$ "	3" 8 $\frac{1}{2}$ "	(maxima) 1" 4 $\frac{1}{2}$ " (minima in simia) 1" 3 $\frac{1}{2}$ "
maxima	4" 3 $\frac{1}{2}$ "	4" 5"	4" 5"	4" 2 $\frac{1}{4}$ "	
SYNCIPITIS					
minima inter utraque tubera parietalia	4" 2"	4" 9 $\frac{1}{2}$ "	5" 3"	4" 6"	1" 9"
maxima infra et inter tubera parietalia	5" 1 $\frac{1}{2}$ "	5" 1"	5" 7"	4" 9"	1" 10"
inter media utriusque ossis squamosi	4" 11"	5"	5" 4 $\frac{1}{2}$ "	4" 4 $\frac{3}{4}$ "	1" 9"
OCCIPIETIS					
inter suturas lambdoideo-mastoideas	5" 10 $\frac{1}{2}$ "	4" 4"	4" 3"	4" 2"	1" 3 $\frac{1}{4}$ "
inter utriusque processus mastoideos	4" 8 $\frac{3}{4}$ "	4" 10"	5"	4" 6"	1" 6"
FORAMINIS MAGNI OCCIPITIS maxima	1" 1 $\frac{1}{2}$ "	1" 2 $\frac{1}{4}$ "	1" 1"	1"	5 $\frac{1}{2}$ "
FACIES					
inter utraque ossa zygomatica	4" 9"	4" 8"	4" 5"	4" 7"	1" 8"
ORBITARUM					
simul sumtarum a margine interno ossis zygomatici ad marginem alterius lateris	5" 10"	2" 4"	3" 5"	3" 9"	1" 6"
diagonalis orbitae singulae	1" 7 $\frac{1}{2}$ "	1" 5 $\frac{1}{4}$ "	1" 5"	1" 7"	9"
horizontalis	1" 6"	3" 6"	1" 3 $\frac{1}{2}$ "	1" 6"	8 $\frac{1}{4}$ "
MAXILLARUM SUPERIORUM					
inter utramque regionem buccalem	2" 4"	2" 2"	2" 4"	2" 4 $\frac{1}{2}$ "	1" 2"
inter lineas plani semicircularis sive a loco insertionis superioris muscoli temporalis usque ad verticem sive suturam longitudinalem vel sagittalem	1" 9 $\frac{1}{2}$ "	2" 8"	1" 11"	2" 7"	5 $\frac{1}{2}$ "
ALAE SPHAENOIDEAE MAJORS horizontalis maxima	1" 2 $\frac{1}{4}$ "	10 $\frac{3}{4}$ "	7 $\frac{1}{2}$ "	11 $\frac{1}{4}$ "	4"
MEATUS AUDITORIUM UTRIVSQUE					
inter se distantis		3" 9 $\frac{3}{4}$ "	4" 2 $\frac{1}{2}$ "	3" 9 $\frac{1}{2}$ "	1" 3"

	Fig. III.	F. IV.	F. V.	F. VI.	F. VII.
ALTIITUDO CAPITIS TOTIUS	2" 2"	1" 6 $\frac{3}{4}$ "	2" 9 $\frac{1}{2}$ "	2" 8"	2" 5 $\frac{1}{4}$ "
MAXILLAE INFERIORIS ab angulo postico usque ad apicem processus coronoidei	10 $\frac{1}{2}$ "	8 $\frac{1}{4}$ "	1" 8"	1" 6"	1" 4 $\frac{1}{2}$ "
LONGITUDO CAPITIS TOTIUS					
a limbo alveoli dentis incisivi superioris usque ad protuberantiam occipitalem	3" 5"	2" 5 $\frac{1}{4}$ "	3" 6"	3" 1 $\frac{1}{2}$ "	2" 5"
CRANII					
ab apice frontis usque ad protuberantiam occipitis	2" 10"	1" 10 $\frac{1}{2}$ "	2" 9 $\frac{1}{2}$ "	2" 4"	1" 11"
FORAMINIS OCCIPITALIS					
MAGNI	5 $\frac{1}{4}$ "	5 $\frac{1}{4}$ "	5"	4"	5 $\frac{1}{2}$ "
LATITUDO FRONTRIS					
OSSIUM PARIETALIUM } maxima	1" 7"	1"	1" 5 $\frac{1}{2}$ "	1" 3"	1" 1 $\frac{1}{2}$ "
OSCIPIETIS	2"	1" 2 $\frac{1}{2}$ "	1" 11 $\frac{1}{2}$ "	1" 7"	1" 5 $\frac{1}{2}$ "
OSCIPIETIS	1" 5 $\frac{1}{2}$ "	11"	1" 6"	1" 1 $\frac{1}{2}$ "	10 $\frac{3}{4}$ "
FORAMINIS OCCIPITALIS					
MAGNI	6"	5 $\frac{1}{2}$ "	5 $\frac{1}{2}$ "	4 $\frac{1}{2}$ "	5 $\frac{3}{4}$ "

Tabula XXXVIII.

	Fig. I.	F. II.	F. III.	F. IV.	F. V.	F. VI.	F. VII.	F. VIII.	F. IX.
	Callithrix Nigrifrons.	Callithrix amicta.	Callithrix cuprea.	Midas Mystax.	Ateles Panisens.	Brachyteles Macrotaurus.	Gastrimargus olivaceus.	Mycetes fuscus.	Mycetes barbatus.
ALTITUDO CAPITIS TOTIUS	2" 4"	2" 6"	2" 1½"	1" 4½"	3" 8"	3" 6"	3" 8½"	3" 6"	4" 6"
MAXILLAE INFERIORIS a plano horizontali usque ad apicem processus coronoidei	1" 3½"	1" 4"	1" 1"	9"	8"	1" 10"	2"	2"	3"
LONGITUDO CAPITIS TOTIUS	2" 7¼"	2" 8¼"	2" 3¾"	1" 11½"	4" 4½"	4" 1½"	4" 2"	3" 10½"	4" 7"
CRANII	2" 1½"	2" 2"	1" 11"	1" 8"	3" 3½"	2" 10½"	2" 11"	2" 7"	2" 11"
FORAMINIS OCCIPITALIS MAGNI	5"	6"	5"	4½"	6"	7"	8"	5½"	5"
LATITUDO FRONTIS	1" 2½"	1" 4½"	1" 2"	10"	1" 10½"	1" 9¼"	1" 3"	1" 3"	1" 5¼"
OSSIUM PARIETALIIUM	1" 5¾"	1" 4½"	1" 5"	1" 1"	2" 2"	2" 3"	2" 2¾"	1" 9½"	1" 11½"
maxima	1" 1"	10½"	4½"	10"	1" 9½"	1" 8"	1" 7½"	1" 3½"	1" 5"
OCCIPITIS	4½"	4½"	4½"	3"	6½"	6"	6¼"	5"	6"
FORAMINIS OCCIPITALIS MAGNI									

E r r a t a.

Pag. VI. Linea 35	non descen- dunt	lege: descendent	Page 7	Ligne 3	serve lisez: sert	Page 26	Ligne 12	moyenne lisez: moyen
16	17 nigro-lanuginosa	nigra, lanuginosa	10	5 noires	noirs	35	10 mouit	mourut
26	12 in quam	quam in	17	16 poilue	pelue	37	8 Le cloisson	La cloisson
28	6 Indis	Indis	—	8 roils	roiles	38	7 triangulaires	triangulaires
45	15 paulo	parum	22	18 étroites	etroits	40	6 du celui	de celui
47	16 ille plantae pedis	ille pollicis pedis	—	4 il existent	il existe	44	20 ce du	celui d
49	16 Amazonae	Amazonum	25	8 tout noires	toutes noires	—	22 sont separée	séparées
55	9 proprius	propius	—	1 veloutés, poilus	veloutees, pelus	47	6 étroits	droits



CEBUS macrocephalus. . *Less*

Der großköpfige Nacktschwanz. . Müllers

Tab. I.

Leipzig, bey Carl Neuberger 1793



CEBUS libidinosus. Sw.

Der geile Nickerbockwey. Manubou

Tab. II.

Cayenne Rio d'Amaz.



CEBUS xanthocephalus. *Fern.*

Der gelbköpfige Weichschwanz, Weichhen.

Tab. III.



CEBUS unicolor. *Lin.*

Der einfärliche Wickelschwanz, Manchen.

Tab. IV.

20 1790



CEBUS gracilis. . *Mac.*

Der schlanke Wickelschwanz. . Männchen.

Tab. V.



CEBUS cucullatus. *Wern.*

Der Kapuzaffe. Weibchen.

Tab. VI.



BRACHYTELES Israelita. . *Mus.*

Der bärtige . Korbzschwanz . Männchen.

Tab. VII.



BRACHYTELES Ouakary. *Nas*

Der unbärtige Kurzschwanz. Männchen

Tab. VIII



PTHECLA hirsuta. . *Mac*

Der gelbe Bärenaffe. . *München*

Tab. IX.



PITHECIA inusta.. *Alas*

Der ungesungte Bärenaffe. Männchen.

Tab. X.



PITHECIA capillaentosa *Tem.*
(Der Pinaken, Bärenaffe Weibchen)

Tab. XI.



CALLITRIS personata. . *Lin.*

Der schwarzgesichtige Springaffe. Manichos

Tab. XII.



CALLITRICHUS amicta . . Mus.

Der weißhalsige Springaffe. Männchen.

Tab. XIII.



CALLITHRIX cinerascens. . *Nov.*

Der aschfarbige Springaffe . Mannchen

Tab. XIV.



CALICEBES nigricans. . .
M.

Das schwarzstirnige Springaffe. Männchen

Tab. XV.



CALLITRICHUS Gigot. . *Mac*

Der Gigot Springaffe . Macaque

Tab. XVI.



CALLOPITRUX cuprea.

Das kupferfarbige Springaffe-Makaken

Tab. XVII.





NYCTIPITHECUS felinus. *Tem.*

Der Nütze, Nachtsaffe, Wabchen.

Tab. XVIII.



NYCTIPITHECUS vociferans. *Tem.*

Der larmende u. Nachtaffe. Weibchen

Tab. XLX.



MIDAS fuscicollis. . *Mac.*

Der braunhalsige Eichlermuffe. . Männchen.

Tab. XX.



MUDAS nigricollis. . . Mac.

Der schwarzhalsige Eichhörnchen . . . Marmoset

Tab. XXI.



MIDAS *mystax*. *♀* *form.*

Der Schnurbart-Eichhörnaffe Weibchen.

Tab. XXII.



MIDAS Oedipus. *Variet. Form.*

Der Oedipus Eichhornaffe. Abst. Weibchen.

Tab. XXIII.



Fig. 1

MIDAS bicolor.

Der zweifarbige Eichhörnchen.

Fig. 2

MIDAS pygmaeus. . .

Der Zwerg Eichhörnchen. . .



MACACUS albicollis. . Mus.

Der weißhalsige Pinselaffe. Miuschen.

Tab. XXV.



LACATUS penicillatus. . *Nov.*

Der schwarz Einschlaffe. . München

Tab. XXVI.



BRACHYTELES macrotarsus. ♀ *tem*

Der langschwanzige Haizdaum. Weibchen

Tab. XXVII.



GASTRIMARGUS olivaceus . . Lin.

Der olivenfarbige Dickbauch, Menschen.

Tab. XXVIII.



GASTRIMAROUS influmatus. *Fresh.*

Der mardeffestige Seckbrauch. Weibchen

Tab. XXIX.



MACACUS fuscus . Mus.

Der braune Brüllaffe . Wainchen.

Tab. XXX.



MYCETERUS stramineus

Des. Schlegelii - Brullé, 1842

PLATE XXXI



MYCETES barbatus. • *Nov.*

Der großbärtige Brillaffe. Männchen.

Tab. XXXII.



MYCETES barbatus. *Fern.*

Der großbürtige Brillaffe. Weibchen.

Tab. XXXIII.





MYCETES discolor. . *Mac*

Der roth-und schwarzgefärbte Brüllaffe. Männchen

Tab. XXXIV.

de Schmel delto canes



M. Schmidt del.




Tab. XXXVI.

H. Schmitt del.




1.



2.




3.




4.



5.



6.



7.



Tab XXXVIII .

