





雪潭居醫約

三衢徐世蔭較正

三山陳

澈編輯

瘧門

瘧之為病。其症多端。其治亦不同。經曰夏傷於暑。秋必瘧。瘧其證大都多熱多寒。或寒多熱少。或熱多寒少。或單熱不寒。或單寒不熱。或先寒後熱。或先熱後寒。或有汗無汗。或汗少汗多。或自汗盜汗。或頭痛骨痛。或大渴引飲。口苦舌乾。或嘔吐不思食。或煩躁不得眠。或大便燥結。或瀉利。或連日發。或間日發。或三日發。或發於陽。或發於陰。此皆中氣不足。脾胃虛弱。暑邪乘虛客之而作。雖隨經隨證。按



藥解散。必先清暑益氣。調理脾胃為主。有食痰者。兼豁痰  
逐飲。感瘴癘者。兼消瘴癘。汗多者。固表。無汗者。解表。泄利  
者。升發。兼利小便。便燥者。兼益陰潤燥。病有陰陽。藥分氣  
血。證有緩急。治宜先後。人有虛實。法異攻補。久而不解。必  
屬於虛。氣虛者。補氣。血虛者。補血。兩虛者。氣血兼補。非大  
補真氣。大健脾胃。不得瘳也。然瘳亦分六經。學者宜詳辨  
之。毋使施治之誤。

足太陽經屬膀胱。其證腰痛頭痛。脊強頭重。寒從背起。先  
寒後熱。熇熇暍暍然。熱止汗出。難已。或遍身骨痛。小便短  
赤。宜增補羌活湯。

足陽明經屬胃。其證發熱頭痛。鼻乾口燥。渴欲引飲。目眴  
眴不得眠。甚則煩亂。畏火光。人聲木聲。宜服竹葉石膏湯。

足少陽經屬胆。其證往來寒熱。口苦耳聾。胸脇痛。或嘔。宜  
服小柴胡湯。

足厥陰經屬肝。其證先寒後熱。色蒼々然。善太息。甚者狀  
如欲死。或頭疼而渴。宜先服三黃石膏湯。加柴胡鱉甲橘  
皮。以祛暑邪。後用當歸養榮湯。和調肝血。

足太陰經屬脾。其證先寒後熱。或寒多。若脾瘡。必寒從中  
起。善嘔。嘔已乃衰。然後發熱。熱過汗出乃已。熱甚者。或渴。  
否則不渴。喜火。宜服桂枝湯。建中湯。病人虛甚。用參姜湯。



足少陰經屬腎。其證寒熱俱甚。腰痛脊強。口渴咽乾。寒從下起。小便短赤。宜先服人參白虎湯。加桂枝以祛暑邪。後用蠶甲滋陰湯以補其陰。

### 諸瘧約治

一瘧病多挾痰。有熱痰者。須用貝母為君。自二錢至五錢。竹瀝竹茹。括樓根。桔紅。白茯苓佐之。甚者加石膏。如寒痰發瘧。寒多不渴。用半夏。白朮。橘皮為君。多加生姜皮佐之。一瘧病多挾風。有風者必用何首烏為君。白朮。橘紅為臣。葛根。姜皮。羌活佐之。頭不痛。除羌活。一暑邪盛。解散不早。陷人於裏。則變為滯下。急投苓連芍

藥車前。紅麴。甘草。佐以葛根。升麻。柴胡。以表裏分消之。脾胃薄弱者。加人參。扁豆。蓮肉。大劑與之。以愈為度。滯下若愈。瘧亦隨止。即不止。其熱必輕。仍隨經隨證以治之。不煩多藥而自止也。

一瘧疾多熱久不解者。其人必本陰虛。法當益陰除熱。非驚甲牛膝不能除也。多寒而久不解者。其人必本陽虛。非人參白朮黃芪不能除。

一瘧有山嵐瘴氣。停留飲而發者。古方類用常山。砒霜等吐之。今人誤執其方。見瘧輒用。不知二藥有大毒。損人真血氣。犯之多致危殆。慎之慎之。



一凡瘡方來。正發不可服藥。當在於未發兩時之先。否則藥病交爭。轉為深害。當戒之。

一瘡後。飲食少進。四肢無力。面色痿黃。身體虛弱。以四君子湯。合二陳湯。加黃連。姜汁炒。枳實。麩炒。生姜煎服。

一凡瘡後。大汗出者。乃榮血不足之候。以人參養榮湯主之。

諸瘡約脈

瘡脉自弦。弦數者多熱。宜解散之。弦遲者多寒。宜溫理之。弦緊邪在下。宜下。浮大邪在上。宜吐。弦短者傷食。弦滑者多痰。虛微無力。皆虛瘡脉也。宜調補之。其脉若

代散則死矣

諸瘡約方

增補羌活湯 治太陽經瘡

羌活 一錢 廣陳皮 一錢 黃芩 一錢 前胡 一錢 猪苓 一錢

知母 一錢 炙甘草 五分 右水二鍾煎一鍾不拘服

若口渴者。即兼陽明。宜加石膏。麥門冬。倍知母。渴而汗少。或無汗。并加葛根。因虛而無汗。或汗少者。加入人參一錢。麥門冬一錢。五分。姜皮一錢。露一宿。發日五更溫服。因虛汗多者。加黃芪一錢。五分。桂枝五分。汗止即去桂枝。不可多服。若病人素有熱者。勿用桂枝。以芍藥五味

雜症彙考諸瘡



子代之

竹葉石膏湯 治陽明經瘡

石膏五錢 知母二錢 竹葉片二十 麥門冬三錢

米一撮 水二鍾 煎一鍾 不拘服 若無汗少者加乾

葛一錢五分 虛而作勞者加人參 痰多加貝母 橘紅

小柴胡湯 治少陽經瘡

柴胡三錢 黃芩二錢 半夏一錢五分 人參二錢 甘草一錢

右水二鍾 煎一鍾 不拘服 若渴去半夏 加石膏 麥門

冬 肺家有熱 去人參 加知母 倍麥冬 有痰不渴者 本方

加貝母二錢 白朮茯苓各一錢五分 姜皮一錢 病人陰

虛而有熱者 雖嘔吐忌用半夏 生姜誤投則損人津液

令人聲啞 宜用竹茹 橘皮 麥門冬 茯苓 烏梅以代之

按以上三方 乃治三陽經客邪之劑 其証多熱多渴亦易

解散 宜大劑急逐去之 毋使遲留 則病易愈 繼以理脾開

胃大補真氣 茂不瘳矣

理脾健胃湯 治瘡邪已盡 脾胃虛弱 或嘔惡泄瀉 不思

飲食

陳皮一錢 白朮五分 茯苓一錢 山查一錢 麥牙一錢

藿香六分 白扁豆一錢 芍藥一錢 人參一錢 白朮一錢

水二鍾 煎一鍾 不拘服 有肺火者 去人參 白朮 加麥

雜症彙考諸瘡

六卷四



門冬石斛各一錢二分。停食者必惡食。加山查。傷肉食者。加黃連枳實各八分。傷穀麩食者。加麥牙穀牙菜。服子如此藥。食消即已。多服則損真氣也。

散邪湯

治秋感風寒頭痛發熱無汗不因暑得者

川芎

八分

白芷

八分

麻黃

一錢

細辛

八分

防風

七分

荆芥

七分

紫蘇

八分

羌活

一錢

甘草

二分

右判一劑。生姜三片。葱白三根。水二鍾煎。一鍾露一宿。次早溫服。有痰加二陳。有濕加蒼朮。夾食加山查。麥牙不二飲。治一切新久寒熱瘧疾。一劑截住神効。

常山

檳榔要一雌一雄。若重二錢。細切製煉。加知母

貝母

各一錢

每四錢酒一鍾

煎至八分

不可過熱

則不

效

露一宿

臨發日五更

溫服勿令婦人煎藥

露薑養胃湯

治久瘧三五日一發者及感寒發瘧

蒼朮

一錢

厚朴

八分

陳皮

五分

草菓

五分

人參

五分

茯苓

八分

藿香

五分

半夏

八分

甘草

三分

右判一劑。棗二枚。烏梅一箇。煎先以生姜四兩水二鍾煎。一鍾搗汁。露一宿。次早合入煎。藥服忌生冷油膩。清補湯

白貝母

去心

二錢

人參

一錢

水二碗。煎八分。臨發日五更空心服。未全愈再服三劑。



即獲全功矣

桂枝羌活湯 治瘧病處暑前後頭痛項強脉浮惡風有汗

汗

桂枝 一錢 羌活 一錢 防風 一錢 甘草 一錢

水二鍾煎一鍾温服

桂枝石膏湯 治瘧無他症隔日發或先寒後熱或寒少

熱多宜服

桂枝 一錢 石膏 一錢 知母 一錢 黃芩 二錢

水二鍾姜三片棗一枚煎一鍾温服

芍藥桂枝湯 治瘧寒熱大作不論先後或太陽陽明合

病發時大戰者謂之大爭寒熱陽盛陰虛之證

桂枝 八分 黃芪 一錢 知母 一錢 芍藥 一錢 石膏 一錢

水二鍾煎一鍾不時温服

人參養胃湯 治脾胃虛瘧嘔吐泄瀉

人參 一錢 茯苓 一錢 橘紅 八分 甘草 五分 草果仁 七分

藿香 半夏 各八分

水二鍾姜三片烏梅半箇煎一鍾不時温服脉弱無力

或寒多者加乾姜附子如脉洪有力熱多者加黃芩黃

連柴胡

六君子湯治虛瘧 見痰 補中益氣湯治勞倦發瘧 見脾



當歸常山飲治久瘡不愈服二劑即止

當歸二錢 常山二錢 甘草一分 陳皮五分 烏豆四十九粒炒

此方無論血虛氣虛皆宜服但熱多寒少脉洪大勿服

水酒各一鍾煎一鍾瘡前服

驚甲丸 治瘡毋神効

青皮 去白一錢 桃仁 去皮炒二兩 神麴 炒一兩 麥牙 炒一兩

三稜 醋浸炒 驚甲 醋炙二兩 蓮木 醋炒一兩 紅花 酒炒一兩 海粉 一兩

香附 醋炒一兩 蒼朮 姜炒一兩 茯苓 一兩 半夏 姜炒一兩

右為末米糊為丸如梧子大每服五七十丸白滾湯下

小兒瘡疾痞塊減半或二三十丸米飲下

寒熱

經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒

寒熱往來此乃陰陽相勝也故寒氣并於陰則發寒陽氣

并於陽則發熱寸口脉微為陽不足陰氣上溢陽中則惡

寒尺脉弱為陰不足陽氣下陷陰中則發熱陽不足則先

寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭

也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒

陰陽相勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍

熱也少陽胆者肝之府界乎太陽之明之間半表半裏之

分陰陽之氣易於相乘故寒熱多主肝胆經症以小柴胡



湯加減調之。若祇見寒熱。起居如常。久而不愈。及大病後。元氣未復。悉屬陰虛生熱。陽虛生寒。宜用八珍湯補之。甚者十全大補湯。有食積為病。亦令人寒熱。用枳實丸消之。若兼嘔吐泄瀉。用六君子湯。厥冷飲熱。人參理中丸。作渴不止。七味白朮散。食積既消。而寒熱尚作者。肝邪乘脾。所勝侮所不勝也。用異功散。加柴胡山梔。凡寒熱症。多類似瘧。若以瘧治。則害不旋踵。后學當慎之。

附東垣治寒熱法

足太陽膀胱之經。乃熱因寒用。蓋膀胱本寒。老陽經也。太陽為標。有陽之名。無陽之實。謂其將變陰也。其脉緊而數。

按之不鼓而空虛。是外見虛陽。而內有真寒也。故仲景以姜附湯。久々熱煎。不溫服而寒服之。亦是寒治也。姜附氣味俱陽。加之久々熱煎。取重陽之熱。瀉純陰之寒。是治其本也。不溫服而寒服。此以假寒治太陽標之假熱也。故為真假相對之治法。因藥處治者。當知其脉之空虛。則是內伏陰寒之氣。外顯熱症。大渴引飲。目赤口乾。面赤身熱。四肢熱如火者。此浮陽將絕于外。而內則為寒所拒也。手少陰心之經。乃寒因熱用。且少陰之經真陰。其心病根本。是真火也。故曰少陰經標。陰本熱。是內則心陽為本。外則真陰為標。其脉沉細。按之洪大。緊甚而盛者。心火在內。則緊



而洪大。真陰為標。則得脉之沉細。寒水之體也。故仲景以大承氣湯。酒製大黃。煎成熱服之。以除標寒。用大黃芒硝。辛苦大寒之氣味。以瀉本熱。以此用藥。可以為萬世法矣。

寒熱治方

仲景曰。病人身大熱。反欲得近衣者。熱在皮膚。寒在內腑也。活人云。外熱內寒者。先與桂枝湯治寒。次與小柴胡湯治熱。桂枝湯 小柴胡湯 俱見傷寒

仲景曰。病人身大寒。反不欲近衣者。寒在皮膚。熱在骨髓也。活人云。先與人參白虎湯治熱。次與桂枝麻黃各半湯以解其外。

麻黃各半湯

桂枝 二分 芍藥 八分 麻黃 六分 甘草 五分 杏仁 七粒去皮尖  
生姜 三片 棗 二枚

水煎溫服

人參白虎湯加減

人參 一錢 石膏 二錢 知母 一錢 粳米 一撮 甘草 六分

麥冬 一錢 柴胡 六分

水二鍾煎一鍾溫服

脉經云。熱病陽附于陰者。腰以下至足大熱。腰以上至頭皆寒。乃陰氣下爭也。此上寒下熱。當先理上焦之寒。而後



瀉下焦之熱。治法俱載針灸。脈經云。陰附陽者。腰以上至頭皆熱。腰以下至足皆寒。乃陰氣上溢也。仲景曰。膈上有熱。丹田有寒。宜用附子瀉心湯。引導陽氣下行。而陰邪自去矣。

附子瀉心湯

黃連 二錢 黃芩 一錢 大黃 二錢 附子 一錢 甘草 一錢

桔梗 一錢 連翹 一錢

水二鍾煎一鍾溫服

續寒熱治方

加減補陰湯 治陰虛內熱勞役不節房勞過度五心發

熱頭眩困倦或煩躁咳血

生地 一錢五分 白芍 一錢五分 當歸 一錢五分 川芎 一錢 黃柏 一錢

知母 一錢 甘草 六分 丹皮 八分 茯苓 八分 麥門 一錢

水二鍾煎一鍾溫服

加減補陽湯 治陽虛外寒精神困倦頭眩背痛汗出惡

風氣短喘促泄瀉清水

白朮 一錢五分 茯苓 一錢 人參 一錢 甘草 六分 陳皮 五分

附子 八分 熟肉桂 五分 黃芪 一錢

水二鍾姜三片煎一鍾溫服

加減八珍湯 見中風 十全大補 異功散 補中益氣湯



參苓白朮散 俱見內傷 六君子湯 見痰飲消痞丸 見痞門  
人參理中丸 治脾胃虛弱四肢厥冷喜飲熱湯時常嘔

吐精神困倦或下寒下熱宜服

人參 一錢 白朮 二兩 乾姜 一兩 甘草 一兩 棗仁 五錢 炒

山藥 二兩 厚朴 一兩 姜 一兩 蒼朮 一兩 水浸炒 米

右為末神糊煮糊為丸每服四五十九食前白滾湯送

下虛極汗出加黃芪蜜炙一兩倍人參一兩

參麥飲 治發熱煩渴 見傷暑

升陽開鬱湯 治鬱火不得通達下寒下熱類似瘡疔宜

服或火邪內鬱五心煩熱亦皆治之

升麻 一錢 乾葛 一錢 香附 八分 撫芎 八分 黃連 一錢

蒼朮 一錢 甘草 五分 柴胡 五分

水二鐘煎一鐘溫服

發熱

發熱一証有心肝脾肺腎五藏之異有表裏陰陽之別夾

痰夾風夾濕食積種不同當詳察之治始不悞五藏之

發熱各有時候可驗也心熱者心主血脉微按至皮膚之

下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按

之則全不熱是熱在血脉也日中太甚乃心之熱也其疔

心煩心痛掌中熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂丸安

雜症彙考 發熱



神丸。清涼散之類。治之。肝熱者。按之肌肉之下。至骨之上。乃肝之熱。寅卯時尤甚者。其脉弦。其病四肢滿悶。便難轉筋。多怒多驚。四肢困熱。筋痿不能起於床。瀉青丸。柴胡飲之類。治之。兩手脉弦者。或寅申發者。皆肝熱也。俱宜用之。脾熱者。輕手捫之不熱。重按之筋骨又不熱。不輕不重。在輕手重手之間。此熱在肌肉。遇夜尤甚。其症必怠惰嗜卧。四肢不收。無氣以動。以瀉黃散。調胃承氣湯。治實熱用之。人參黃芪散。補中益胃湯。治中虛有熱者用之。肺熱者。輕手乃得微。按全無。瞥然見於皮毛上。為肺主皮毛故也。日西尤甚。乃皮毛之熱也。其症必見喘欬。洒淅寒熱。輕者

瀉白散。重者涼膈散。白虎湯。及地黃地骨散之類。主之。腎熱者。輕按之不熱。重按之至骨。其熱蒸手如火如灸。其人骨蒸然。如虫蝕其骨。困熱不任。亦不能起於牀。滋腎丸。六味地黃丸。主之。此言五藏之熱。各有時候。然其虛實。仍當辨之。實則面赤氣粗。口燥唇腫。發渴飲冷。大小便難。或掀衣露體。狂躁暴叫。伸體而卧。睡不露睛。手足指熱。宜用寒涼表散。虛則面色青白。神情恍惚。口氣噓冷。語言短澁。喜熱惡寒。或泄瀉汗出。乍涼乍溫。佛鬱驚惕。屈體而卧。睡不露睛。手足指冷。宜用調補溫補。壯熱者。身體大熱。甚則發狂似癩。溫熱者。肢體微熱。之不已。則發筋惕肉慄。陰



虛則內熱。陽虛則外熱。表熱則熱在皮毛。血脈之間。手背  
熱。手心。和是也。裏熱則熱在藏府筋骨之間。手心。手背  
和是也。熱在半表半裏者。則熱在肌肉之間。手背。手心。俱  
微熱是也。有發熱惡風寒者。是元氣不克於表。乃表之虛  
熱也。治當以補中益氣主之。有發熱不惡風寒者。邪客於  
表。乃表之實熱也。治宜用小柴胡。合麻黃湯主之。有發熱  
喜飲熱湯者。津液不足。乃裏之虛熱也。治宜真武湯主之。  
發熱喜飲冰水者。內火消燦。乃裏之實熱也。治宜承氣湯  
主之。熱而脈洪大。或滑或數。按之鼓指者。此熱盛拒陰。其  
形症雖有似寒之狀。而非真寒也。治宜小柴胡。大柴胡湯。

主之。熱而脈浮大。或數或急。按之不鼓指者。此寒盛格陽。  
其形症雖有壯熱之狀。而非真熱也。治宜人參理中湯主  
之。有發熱煩躁。無汗。目痛。大渴者。乃血虛發躁也。當補其  
血。有發熱惡食。熱時自汗。欲近衣被者。乃氣虛作熱也。當  
補其氣。有身熱汗出。脈緩有力者。風之為熱也。治宜疎風  
有熱而身重。四肢痺痛。近似黃疸。脈沉而濡者。濕之為熱  
也。治宜除濕。有發熱或時惡寒。脈浮。脘痞。類似瘧症者。痰  
之為熱也。治宜理痰。有發熱頭重。惡食喜嘔。寸口脈有力  
者。食之為熱也。治宜消積。繇此言之。治熱似不可不慎也。  
往。見發熱之症。有誤認為傷寒外感。卒用表藥。表之不



去復用寒藥。設若元氣不甚虛者。尚能受之。如元氣虛者。豈不立斃哉。又有知發熱起於內傷多而外感少。然其用藥而不知氣血之分。或氣虛而補血。或血虛而補氣。不自究用藥之不投。而反咎其病之不可救療。良可嘆也。故外感之與內傷。寒病之與熱病。氣虛之與血虛。如水火之相反。治之稍誤。則輕病必重。病必危矣。可不慎與。

約方

清熱散火湯 治男婦四肢發熱肌表間熱如火烙此內

陰血虛外感風邪血氣俱鬱之病鬱者宜發之也

防風一錢五分 甘草一錢 乾葛一錢 羌活一錢 升麻八分

柴胡八分 人參七分 橘紅六分 梔子一錢

水二鍾姜一片煎一鍾溫服

清心蓮子飲 治發熱口渴小便短赤夜安靜晝發熱此

熱在氣分也宜此湯主之

黃芩一錢 柴胡八分 茯苓一錢 麥門冬八分 人參一錢

甘草六分 黃芪一錢 地骨皮八分

水二鍾姜一片煎一鍾溫服

清火養血湯 治煩躁口乾發熱血虛發熱晝則安靜夜

則發熱此熱在血分也宜此湯主之

當歸一錢 黃連一錢 白芍一錢 生地黃一錢五分 甘草八分



丹皮一錢 川芎八分 黃芩一錢 麥門冬一錢

水二鍾煎一鍾溫服

四順清涼飲 治風熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切壅

滯壯熱或瀉

赤芍藥 當歸 甘草 大黃 各等分

每服三錢水煎溫服

承氣湯 大柴胡湯 治裏實熱 小柴胡湯 治表裏寒熱不

解 麻黃湯 治表實熱 俱見傷寒

補中益氣湯 治表虛熱 見傷寒 人參附子理中湯 治裏虛

熱理中湯 治積寒作熱 俱見中寒

升火湯 治五心煩熱是火鬱于地中四肢土也心火下

陷在脾土之中故宜升發火鬱

升麻一錢 葛根八分 防風八分 柴胡根七分 炙草五分

白芍八分 玄參八分

右水二鍾入蓮鬚葱白二寸煎一鍾溫服

加減瀉白散 治肺熱

桑白皮一錢 白茯苓一錢 地骨皮一錢 甘草五分

黃芩八分 桔梗五分 白芍藥一錢

右水二鍾煎一鍾不時溫服肺熱有痰喘急加貝母天

花粉各一錢



柴胡飲子治一切肌膚蒸熱 益氣清火湯治氣虛鬱火  
汗出發熱 滋陰清火湯治骨蒸潮熱 補陰丸加  
減地黃丸俱見火門

蒼連丸 治濕痰發熱胸膈嘈雜

蒼朮 去粗皮炒 黃連 酒炒 香附 炒

黃芩 酒炒 半夏麴 炒

右為細末水跌為丸每服二錢五分大便不通加熟大  
黃一兩氣喘加枳殼一兩食積生痰發熱加山查神麴  
冬一兩

附五蒸勞熱治方

五蒸主治

肺蒸鼻乾主烏梅天冬麥冬紫苑大腸蒸右鼻孔乾痛主  
大黃芒硝皮蒸舌白吐血主石膏桑白皮膚蒸昏昧嗜卧  
主丹皮氣蒸鼻乾喘促遍身氣熱主人參黃芩山梔心蒸  
舌乾主黃連生地小腸下唇焦主赤苓生地木通血蒸髮  
焦主生地當歸桂心童便脉蒸唾白浪語脉絡溢脉緩急  
不調主當歸生地脾蒸唇焦主白芍木瓜苦參胃蒸舌下  
痛主石膏粳米大黃芒硝乾葛肉蒸食無味而嘔煩燥不  
安主白芍肝蒸眼黑主川芎當歸前胡膽蒸眼白失色主  
柴胡括萎筋蒸甲焦主當歸川芎三焦蒸下熱下寒主石



膏竹葉。腎蒸兩耳焦。主生地石膏知母寒水石。膀胱蒸右耳焦。主澤瀉茯苓滑石。腦蒸頭眩熱悶。主生地防風羌活。髓蒸髓枯骨中熱。主生地當歸天門冬。骨蒸齒黑腰痛足逆冷。痺虫食臟。主鱉甲地骨皮丹皮生地當歸。醫蒸肢細跌腫腑臟皆熱。主石膏黃柏。胞蒸小便赤黃。主澤瀉茯苓生地沉香滑石。凡此諸症。皆火病後。食肥甘油膩房事飲酒犯之而成。久蒸不除。變成痺病。死期近耳。

五蒸約方

補天丸

治陰虛骨蒸發熱形躰羸瘦

龜板

酥炙 一兩五錢

黃柏

酒炒 一兩五錢

牛膝

洗 二兩

乾姜

炒 二錢

陳皮

去白 五錢

各藥共研細末。外用紫荷車一箇洗淨。用布絞乾焙至極乾。研末。合前藥酒煮米糊為丸。每服七八十丸。百滾湯送下。

防風當歸飲子

治煩熱皮膚乾焦小便紅赤大便結

柴胡一錢 黃芩一錢 人參八分 甘草五分 白芍一錢

當歸一錢 大黃一錢 防風六分 滑石三分

水二鐘 姜一片 煎一鍾 食前溫服

五蒸湯 治五臟蒸熱

天門冬一錢 生地黃一錢 白芍藥八分 知母 鹽水炒八



木通五分 甘草四分 前胡六分 麥門冬一錢 山梔八分  
水二鐘煎一鐘 食前溫服

補陰湯 治臟中虛榮血熱脉按之不足舉之有餘陽亢

陰衰之症 茯苓八分 知母一錢 石膏一錢 地骨皮八分 人參八分

柴胡六分 生地一錢 水二鐘 生姜二片 煎一鐘 溫服

金花丸 治心肺肝三經發熱 知柏四物湯 治血虛

骨蒸見風熱 柴胡飲子 治肝經蒸熱 滋腎丸 治

腎經蒸熱 加減地黃丸 治肝腎蒸熱 見火門瓊玉

膏 治虛勞發熱 見燥門

地骨皮枳殼散 治骨蒸壯熱 肌肉消瘦 力困多汗

地骨皮一錢 秦艽八分 柴胡六分 枳殼六分 知母一錢

當歸六分 鼈甲醋煨一錢 水二鐘 煎一鐘 食前服

秦艽鼈甲丸 治骨蒸壯熱 肌肉消瘦 舌紅頰赤 目倦盜

汗 柴胡一兩 地骨皮一兩 秦艽五錢 當歸八分 知母六分

鼈甲醋煨一兩 生地黃兩 酒炒一兩 白芍藥八錢 白茯苓五錢

黃連錢炒五 麥門冬一兩

雜症彙考五蒸

雜症彙考五蒸

雜症彙考五蒸

雜症彙考五蒸

雜症彙考五蒸



右為末煉蜜為丸每服六七十丸食前白滾湯送下  
入參地骨皮湯 治元氣虛弱骨蒸潮熱四肢困倦心煩  
汗出少氣

人參一錢地骨皮八分生地一錢黃連六分茯苓五分  
甘草五分麥門冬一錢棗仁八分白芍藥八分

右水二鐘竹葉二片米一撮煎一鐘不拘服

犀角地黃湯 治心火蒸肺汗出發熱

犀角一錢生地一分錢五丹皮八分木通六分赤芍六分

甘草五分梔子八分

水二鐘煎一鐘食前服

痢門

滯下俗呼痢疾。其證腹痛。便膿血。或赤或白。或赤白相雜。或下純血。或下紫黑血塊。或如豆汁。或如魚凍。或如屋漏水。或下純黃積。類多裏急後重。數登圜而不得便。小便短赤不利。或發熱。或口渴。甚則嘔惡不思食。此皆暑濕之邪。與飲食積滯。膠固腸胃而作。必先祛暑滲濕。安胃為主。傷氣分。則調氣益氣。傷血分。則和血補血。挾瘀血。則行血。藥雖因證而設。治皆以補養胃氣為急。故其證以噤口痢為最重。胃氣一絕。則不可治矣。經曰安穀則昌。絕穀則亡。俗治多藉口迎而奪之之說。輕用大黃朴硝。及誤用巴豆牽



牛。以致洞泄腸開而斃。又有妄投訶子粟殼亞芙蓉肉豆  
蔻收澀之劑。以致便閉腹脹。或濕熱上攻。肢節腫脹拘攣。  
痛不可忍。難以救療。慎之慎之。  
按古今治痢者。皆曰熱則清之。寒則溫之。初起熱盛則下。  
有表症則汗之。小便赤澀則分利之。此舉世信用。若規矩  
準繩之不可易。予細思此五法。惟清熱無忌。而餘者皆犯  
大忌。必不可用也。夫痢之為病。繇濕熱蘊積。膠滯腸胃之  
間。清邪熱。導滯氣。行滯血。則其病可以速除。若不問虛實。  
即用參朮等溫補。則熱愈盛。氣愈滯。久之正氣虛。邪氣熾。  
至於不可救療者。乃輒投溫補之禍也。痢因邪熱膠滯腸

胃而成。與溝渠壅塞相似。惟磨刮疏通。是其良法。若即以  
大承氣湯下之。譬如以清水蕩壅塞之渠。而壅塞不去。徒  
傷胃氣。損耗真陰而已。正氣一損。邪氣必盛。強壯者猶可。  
怯弱者必危矣。痢有發寒發熱。頭痛目眩者。此雖似外感。  
仍內熱毒薰蒸。自內達外。實非表邪為病也。若妄發其汗。  
則表虛於外。邪熾於內。鮮不斃矣。抑利小便者。治水泄之  
良法也。以之治痢。則無痢。因邪熱膠滯。津液枯澀所致。若  
用五苓等劑。分利其水。則津液愈枯。滯澀愈甚。遂至纏綿  
不已。則分利之為害。可勝道哉。予素畏此症險惡。凡立一  
方。用一藥。必求肖病而施。毋敢犯此四忌。及已邇關中。親



患此症。愈加忝寃。今試驗益精。頗堪自信。故備錄之。敢與同志者。共登斯世於仁壽之域可也。

一凡痢宜行氣和血。開鬱散結。瀉脾胃之濕熱。消藏府之積滯。經云熱積氣滯而為痢。其初起可行而竭之。或木香導氣湯之類。以推其邪。以澈其毒。皆良法也。痢下已久者。不可妄下。以其胃虛故也。宜調中理氣湯。加味香連丸之類。擇便用之。

一滯下非元氣壯實。多噉能食之人。慎勿輕用大黃巴豆牽牛等下藥。

一噤口痢。胃中熱甚。大虛大熱故也。用人參二錢。黃連姜

汁炒一錢。濃煎汁。終日細細呷之。如吐宜再呷。但一呷下咽便開。又宜封臍。引熱下行。用田螺肉搗碎。罨臍中。入麝香少許。

一痢凡後重逼迫而得。不便者為有物而然。今虛坐努責而不得大便。知其血虛也。故用當歸為君。生血藥佐之。

一胎前滯下。宜用黃芩黃連白芍。灸甘草。橘紅赤麴。枳壳。蓮肉。畧用升麻。未滿七月。勿用滑石。

一產後滯下。積滯雖多。腹痛其治。不可用大黃等藥。行之致傷胃氣。遂不可救。但用人參白芍。當歸紅麴。升麻。益母草。滑石末。足矣。若惡露未盡。兼用乳香沒藥炒。砂仁。久之。



自愈血虛可加阿膠

一凡下痢純紅者如塵腐色者如屋漏水者大孔開如竹筒者唇如朱紅者俱死證也如魚腦髓者身熱脉大者俱半生半死

諸痢約脉

下利之脉宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急身凉脉細者生身熱脉大者死此乃大槩言之又當審其胃氣如有胃氣則脉雖大不妨又不可以一途而論也

諸痢約方

立效散 治赤白痢疾膿血相兼裏急後重疼痛一服立止

淨黃連

四兩酒洗吳茱萸二兩同炒去茱萸不用陳枳壳二兩麩炒

右為末每服三錢空心黃酒送下泄瀉米湯下噤口痢

陳倉米湯下

調中理氣湯

白朮一錢 陳皮七分 白芍一錢 木香四分 茯苓二錢

甘草五分 神麴八分 苡仁一錢 山查八分 如紅痢白芍

不煨再加黃連錢半 條芩錢半 紅甚者倍芩連白痢只

依本方

加味香連丸

黃連去毛炒 木香 二錢 白芍 一兩 白豆蔻 一錢五分

准症景方諸痢



秘方加乳香沒藥各一錢

右為細末用烏梅二兩滾水泡去核搗和為丸如梧桐子大每服三十九丸白乾姜湯送下血痢甘草湯赤痢乾姜甘草湯泄瀉乾姜湯送下

錢氏豆蔻香連丸 治泄瀉不問寒熱赤白陰陽不調腹

脹攻痛極有神效

黃連 三錢炒肉豆蔻

木香 各一錢

右為細末粟米飯丸米粒大每服米飲下十九至二十九日日夜各四服食前

仲景下痢膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯

白芍 二錢 當歸 五錢

大黃

黃芩

各二錢五分

黃連

木香

檳榔 各一錢

右為細末每服三錢水盞鍾煎七分去渣溫

服如未止再服下後重即止

陳麴丸 治腹中冷痛磨積止痢

陳麴

一兩五錢炒

乾姜 炮

官桂

白朮

當歸

厚朴

人參

甘草

各五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大

每服三五十九丸酒送下或淡醋湯亦可食前一日三服

發時不拘增數

槐花丸 治血痢久不止腹中不痛亦不裏急後重者

青皮


槐花

荆芥穗

各等分

右為末水煎空心溫服





原件短缺

P25



救命延年丸 治丈夫女人一切重痢

黃連 乾姜 當歸 阿膠 右為末另用米醋煮阿

膠令消盡後將藥搜醋丸如桐子大每服三十九米飲下

又方 茱萸 黃連 阿膠 白芍 等分同炒黃

右為末麩糊為丸如桐子大每服三十九陳米飲送下

小兒十九丸陳無擇無阿膠名戊巳丸

黃連丸 治赤白痢

吳茱萸 黃連 右用好酒同浸三日各自為末各自

為丸白痢茱萸丸赤痢黃連丸甘草湯下赤白煎服

白朮黃芩湯 服前藥後痢已除宜以此和之

白朮 一兩 黃芩 七錢 甘草 水煎溫服

附黃湯 本草 治痢冷在脾胃間頓年腹痛泄瀉休作無時

服諸熱藥不效宜先取去然後調治毋畏藥以養病也

厚朴 乾姜 甘草 桂心 附子 生各五錢

大黃 生細切水一盞 浸半日煎汁用

水二升半煎八合後下大黃汁再煎六合分三次溫服

白朮散 治痢久服芩連藥過多致脾氣寒冷滑瀉不止

飲食不進者

白朮 木香 附子 人參 各等分

右細末每服二錢水一鍾生姜三片棗一枚煎六分服



行滯湯 治傷生冷菓物胸膈飽脹腹痛痢下

枳殼一分 一錢 五檳榔 一錢 赤茯苓 一錢 山查一分 一錢 五

砂仁 七分 蒼朮 一錢 厚朴 八分 甘草 五分

右水二鍾 姜一片 煎一鍾 溫服

導氣湯 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥 一錢 當歸 一錢 大黃 八分 黃芩 一錢 黃連 一錢

木香 三分 檳榔 八分

右水二鍾 煎一鍾 溫服

朴黃丸 大枳殼丸見內傷 三黃丸 參連散見人門

調中養胃湯 治痢久脾胃虛弱裏急後重

扁豆 一錢 茯苓 八分 當歸 八分 木香 三分 甘草 五分

枳殼 八分 人參 六分 黃連 八分 白芍 一錢

右水二鍾 煎一鍾 食前服

梅連丸 治腸胃熱積久痢不止當酸以收之若以燥之

黃連去芦一兩 烏梅拌蜜頓飯上蒸熟取肉一兩

右二藥共搗為丸如菜豆大每服二錢百沸湯送下

黃連阿膠丸 治脾胃氣冷熱不調下痢赤白狀如魚腦

裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連三兩 去兩 茯苓去皮二兩 阿膠三兩

右各為末水調阿膠和眾藥為丸如桐子大每服二十



凡温米飲湯下

參連湯 治胃虛積熱飲食不進下痢不止

人參一錢 黃連一分 錢五

右水一鍾半煎八分不時服小便不通加茯苓一錢

五味異功散 治痢後泄瀉飲食不進見內傷

六君子湯 治痢後有痰不思飲食見痰飲

補中益氣湯 治痢後虛弱不思飲食見內傷

養陰調血湯 治熱邪傷血裏急後重坐努責而不得大

便者血虛也

當歸一錢 白芍二錢 生地一錢 桃仁八分 茯苓一錢

甘草八分 木香三分 枳殼六分 黃連八分

右水二鍾煎一鍾不時服

加減六味地黃丸 治痢久陰虛四肢煩熱肌肉消瘦見火

參苓白朮散 四君子湯 治久痢脾虛不思飲食見內傷

加減黃芩芍藥湯 治肺氣結熱下利膿血小便短瀝

黃芩二錢 芍藥二錢 甘草一錢 枳殼五分 赤苓一錢

木通八分 青皮五分

右水二鍾煎一鍾食前服

莫連丸 治寒熱不和赤白痢疾

吳茱萸 治寒熱不和赤白痢疾 味去辛 川黃連 去芦 甘草梢 五錢



右用好酒將前藥浸三日晒乾共研細末烏梅肉為丸每服二錢五分白滾湯食前送下

地榆阿膠湯 治痢久陰虛大便純下血水者宜服

阿膠 蒲黃炒 二錢 地榆 酒洗 一錢 甘草 炙 一錢 白芍藥 炒 一錢

香附 炒黑 八分 熟地黃 二錢 陳皮 三分 黃連 酒炒 一錢五分

卷柏 酒洗 五分

右水二鍾煎一鍾不拘服

歸黃丸 治積血腸胃腹痛下痢者宜服

歸尾 六錢 大黃 五錢 枳壳 六錢 赤芍 三錢 桃仁 四錢

右為末煉蜜為丸每服三十丸白滾湯送下

### 泄瀉

泄瀉一證。雖從風濕熱論之。亦有冷熱虛寔之分。內傷外感之異。不可不辨。夫脾胃虛寒。或外感風寒。內傷生冷。水穀不化。下利澄清而冷。此冷瀉也。藏中蘊熱。積鬱不通。大便黃赤而臭。此熱瀉也。有始病即熱者。邪氣勝而為實也。終變為寒者。真氣奪而為虛也。虛當溫補。實當清利。瀉屬於濕者。瀉水而腹不痛是也。瀉屬於熱者。瀉水如熱湯。腹痛是也。瀉屬於痰者。或瀉或不瀉。腹痛絲。是也。瀉屬於積者。腹痛甚。瀉後即減是也。經云。春傷於風。夏為飧泄。此風之為瀉也。有瀉久而反熱者。此元氣虛弱。內屬寒而外



假熱也。治瀉無他法。虛則補之。寒則溫之。實則行之。熱則涼之。風則散之。濕則燥之。下陷則提之。滑則瀋之。亦有脾虛而積滯者。補脾行積是也。脾虛夾熱者。補脾清熱是也。脾虛夾痰者。補脾豁痰是也。肺與大腸為表裏。有肺氣上結。大腸空虛而發瀉者。當降其肺氣。夫肺氣即天氣也。天氣降則地道寔。故瀉自止也。治瀉之要。孰有過此哉。

約脉

凡泄瀉之脉俱沈。其傷於風則脉浮。傷於寒則脉緊。傷於暑則脉微。傷於濕則脉緩。有積則脉弦。有痰則脉滑。脉沈弱微緩者生。絃急浮大者死。

約方

加減理中湯

治脾胃虛冷水穀不化瀉利清水吐腹疼

痛脚手厥逆脉沈少氣

白朮錢炒一乾薑炮八分人參一錢灸草五分茯苓八分

陳皮六分白菴仁八分熟附子五分

右水二鍾姜一片煎一鍾不時服渣再煎

加減清胃飲 治脾胃積熱中脘悶痛口乾身熱瀉利稠

粘脉沈而數小便短赤

白朮錢炒一黃連錢炒一茯苓八分車前子八分陳皮八分

黃芩錢炒八扁豆錢炒一厚朴錢炒五甘草三分



右水二鍾煎一鍾加姜一片燈心十四條不拘服  
健脾除濕湯 治脾胃積濕四肢浮腫胞腹飽滿瀉利不

思飲食喘急咳嗽

蒼朮炒一錢 白朮炒八分 赤苓八分 防風七分 澤瀉八分

桔梗六分 陳皮七分 半夏一錢 猪苓七分

右水二鍾姜三片煎一鍾不拘服

建中升麻湯 治脾氣下陷不思飲食瀉利不止精神困

倦

黃芪生用一錢 人參八分 炙甘草五分 陳皮去白七分 茯苓八分

升麻一錢 白朮炒六分

右水二鍾姜一片煎一鍾食前服

防風益黃湯 治脾胃風胞腹脹滿腸鳴飧泄胠浮汗

出惡風發熱

白朮炒八分 防風八分 陳皮七分 藿香八分 茯苓一錢

羌活八分 厚朴炒八分 白芍一錢 桂枝四分

右水二鍾姜一片煎一鍾不拘服

降氣湯 治肺氣結實大腸空虛泄瀉不止

杏仁炒一錢 桔梗八分 枳殼炒一錢 甘草炙八分 蘇梗七分

茯苓八分 葡萄子八分 白朮三分

右水二鍾生薑一片煎一鍾不拘服



加減胃苓湯 治冷熱不和致傷脾胃腹痛泄瀉小便不

利水穀不化

蒼朮一錢厚朴八分陳皮八分炙甘草四分

砂仁炒五分白朮炒一錢茯苓八分肉桂三分

木香三分澤瀉炒七分

右水二鍾姜一片煎一鍾不拘服食積加神糶山查各

八分積痰加半夏枳殼各八分氣虛加人參八分積熱

炒黃連一錢積寒加黑姜八分

五味異功散 治脾虛泄瀉見內傷六君子湯 治脾虛

痰飲時常作瀉見痰飲補中益氣湯 治勞倦泄瀉見

內傷歸脾飲如治心火不能生脾土精神困怠時常泄

瀉見內傷八味丸 治腎虛泄瀉見火門四君子湯

參苓白朮散 治氣虛脾泄久瀉不食俱見脾胃

白朮芍藥湯 治脾濕水瀉體重腹滿困弱不食水穀不

化此方和中除濕和水凡瀉之要藥也

白朮 芍藥各三錢炙草二錢

右水二鍾煎一鍾不拘服此方和丸亦可

加減紫苓湯 治寒熱往來口乾泄瀉此係外感暑熱內

傷生冷宜分表裏治之也

紫胡八分黃芩六分人參五分甘草四分半夏六分



白朮五分 茯苓八分 猪苓 澤瀉各五分 肉桂二分  
 防風四分 厚朴四分 藿香五分

右水二鍾 姜一片 煎一鍾 不時服

瑞連丸 治元氣虛弱久瀉不止 胃氣不和 飲食不進

淮山藥微炒二兩 蓮子去皮心二兩 白茯苓一兩 人參一兩

益智炒去殼一兩 芡實二兩 橘紅一兩 砂仁六錢 木香二錢

白芍酒炒一兩 炙草五錢

右為末 用猪肚一箇 洗淨 將藥末入猪肚內 用線縫密 蒸爛 搗千餘下 使藥與肚勻 和為度 每服百丸 空心米飲送下

霍亂

霍亂者。上吐下瀉。揮霍變亂是也。或內傷生冷。或外感風寒。致陰陽不分。升降失宜。故心腹忽然作痛。嘔吐下利。並至也。發熱惡寒。頭痛者。外感風寒。治當溫散。五積散。藿香正氣之類是也。發熱無寒。口渴頭眩者。外傷暑熱。治當清解。五味香薷飲。清暑益氣湯之類是也。有先吐而後瀉者。此胃病及脾。治當調和胃氣。而泄瀉自止矣。有先瀉而後吐者。此脾病傳胃。治當溫理脾氣。而嘔吐自止矣。有先腹痛而後吐瀉者。是內傷食積。外感風邪。治當行積滯。散風邪。是也。有先吐瀉而後腹痛者。是元氣空虛。積寒驟發。治



當補元氣。溫脾胃是也。有心腹齊痛。霍亂轉筋。四肢將厥者。此寒氣直中太陰經。亟用灸臍法。使陽氣回渡。繼用附子理中湯之類。遲則難救矣。霍亂亦有內傷外感。表裏寒熱之分。治不可忽也。

約脉

霍亂之脉。其病發之甚驟。其脉見之亦異。凡結脉促脉代脉滑脉。皆霍亂之脉也。若見微細。按之欲絕者。元氣已脫。乃不治之脉也。故霍亂脉洪滑而大則易治。沉瀉而細則難治耳。

約方

加減正氣散

治感四時不正之氣。或瘟疫瘴氣所中。忽

然肚腹疼痛。上吐下瀉。或飲食停滯。復冒風寒。胃膈痞悶。發為寒熱吐瀉。皆宜服之。

- 紫蘇 一錢
- 陳皮 六分
- 半夏 六分
- 蒼朮 八分
- 厚朴 八分
- 藿香 八分
- 茯苓 五分
- 桔梗 四分
- 白芷 六分
- 甘草 三分
- 赤茯苓 一錢

水二鐘。姜二片。煎一鐘。不拘溫服。卒中寒邪。腹痛四肢厥逆。加熟附子。乾姜各八分。嘔甚。加砂仁。丁香各五分。瀉甚。加白朮。黑姜各八分。腹痛飽脹。心下痞滿。加枳實。山查。神糶各六分。吐瀉發熱。口乾。加炒黃連。白芍藥各



八分。暑天濕熱相搏。霍亂轉筋。加香薷黃連各八分。  
藿苓湯 治中暑熱。忽發吐瀉。身熱口乾。或腹痛熱病。皆  
宜服此。

香薷七分 乾葛七分 黃連八分 白朮五分 茯苓八分  
猪苓五分 澤瀉七分 甘草四分 麥門八分

右水二鐘 姜二片 煎一鐘 不時服 身體發熱 耳聾 嘔苦  
水乃少陽膽經有熱 加黃芩 柴胡 各七分

鹽姜湯 治霍亂心腹卒痛。六脉沉微。欲吐不吐。非寒非  
熱。欲瀉不瀉。

食鹽一兩 生姜五錢 二藥同炒焦色 每服八錢 用童便

二盞煎一盞 不時溫服立止

竹茹門冬湯

治霍亂已愈 復煩熱 多渴 小便不利 乾嘔

竹茹六分 茯苓八分 麥門冬一錢 人參七分 甘草四分

橘紅五分 烏梅一枚 半夏糊八分

水二鐘 生姜三片 煎一鐘 不拘溫服

藿香冲和飲 治外感風寒 內傷飲食 發為吐瀉 身體發  
熱

防風八分 川芎七分 羌活六分 紫蘇七分 山查五分  
麥牙五分 厚朴八分 砂仁五分 陳皮五分 香附六分  
炙甘草四分



右水二鐘生姜二片煎一鐘不時溫服

香砂和胃散 治脾胃虛冷上吐下瀉脈沉微無力

白朮八分人參八分茯苓一錢砂仁七分木香用四分磨

陳皮六分黑姜六分炙甘草四分

水二鐘煨薑三片煎一鐘不時溫服此方凡脾胃虛寒作瀉作嘔無論新舊虛實皆宜服

木瓜附子湯 治中寒手足厥冷霍亂吐瀉轉筋脈沉欲

絕腹痛唇青直中傷寒皆宜服

木瓜錢炒一藿香八分附子錢製一乾姜七分茯苓八分

陳皮六分甘草灸五分白朮炒八分

右水二鐘生姜二片煎一鐘不拘溫服

附子理中湯 四逆湯 治中寒霍亂方見寒門

分理四苓湯 治霍亂吐瀉腹中熱痛小便不利發熱口

渴筋膚急痛似火焮灸

乾葛八分柴胡七分茯苓八分猪苓六分白朮七分

澤瀉六分甘草四分白芍藥八分

水二鐘姜一片燈心十四條煎一鐘不時服

黃連香薷飲 益元散 治傷暑熱腹痛泄瀉嘔吐發熱

口渴 香砂平胃散 治夏月傷生冷菓物俱見暑門

經驗醫按



戊寅芝山寺施醫。一人忽發吐瀉。呼吸將絕。心悶不語。目畏日光。有診其脉沉伏。按之不起。認為中寒症。與附子理中湯一劑。病勢愈加。余至診視。見其脉雖沉伏。而肝腎微數。以其脾虛不能生肺金。而肺金不能生腎水。而腎水不能生肝木。乃四藏不能相生為病也。用補中益氣湯。六味地黃丸。連服十劑。遂愈。夫補中益氣。補益脾肺。地黃丸。滋補肝腎也。

一人盛暑吐瀉。米穀不化。或時熱渴。脉數。有用黃連香薷飲。益元散之類。治之。遂腹脹作痛。手足厥冷。召余診視。見其脾脉虛數。肝脉弦急。謂病人曰。此乃脾氣虛。而伏陰在

內。當溫補脾氣。不宜用寒涼。遂與五味異功散。加木香砂仁。服二劑。而痛止。脉緩。五劑而全愈。此中氣不守。積虛生寒。故當補理脾氣。凡夏月吐瀉。手足溫熱。發渴引飲者。皆屬陽症。治宜清涼。手足微冷。作渴飲熱者。俱屬陰症。治宜溫補。于此不辨。即傾人性命于反掌耳。

### 嘔吐

夫嘔吐之症有三。氣積寒是也。皆從三焦論之。上焦在胃口。上通天氣。主納而不出。中焦在胃脘。上通天氣。下通地氣。主腐熟水穀。下焦在臍下。下通地氣。主出而不納。是故上焦吐者。皆從於氣。乃天之陽也。其脉浮而洪。其症食



而暴吐。渴欲飲水。大便燥結。氣上衝胸。膈中發痛。治當降氣和中。用藿香枳殼橘紅芍艸之類是也。中焦吐者。皆從於積滯。積有陰有陽。食與氣相假聚而為痛。其脈浮而弦。其症或先吐而後痛。或先痛而後吐。治當去積調氣。用檳榔木香。山查神糶砂仁之類是也。下焦吐者。皆從於寒水。乃地之道也。其脈沉而遲。其症朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利。大便閉而不通。治當溫散寒氣。用乾姜熟附子。丁香之類是也。此三焦受病。更有為飲食所傷。痰飲阻隔。暑氣所干。寒邪暴中。或有積滯。胃口火氣上衝。皆能令人嘔吐。雖所感不同。治法亦異。然總屬於胃。而胃者水穀之海。主納五穀。榮養百骸。故胃氣和則嘔吐不作。或有客邪所犯。本經受傷。則嘔吐之病作矣。治當辨其陰陽寒熱。藥宜對症。不可亂也。

### 約脈

嘔吐之脈。寒則緊與遲。熱則洪與滑。食積則右寸浮大。風寒則左寸浮急。脈滑而弱則易已。脈微瀉不起則難治。身熱脈微。手足厥冷。脈沉或絕。皆不治之症也。

### 約方

薑米飲 治脾胃虛弱寒氣客入嘔吐眩悸

半夏糶 二錢 桔紅 一錢 生薑 五片 茯苓 一錢 粳米 一撮



水三鍾煎鍾半不時溫服

和中湯 治胃氣不和飲食不下嘔吐不止或心下痞滿

皆宜服

陳皮一去錢半夏錢五分汁炒一分甘草四分茯苓一錢藿香一錢

黃連八分汁炒扁豆錢炒二厚朴六分汁炒人參八分

水二鍾生薑二片煎一鍾不時服嘔吐甚加伏龍肝一

塊同煎

藿香枇杷散 治脾虛多渴嘔逆不止

藿香一錢橘紅八分半夏一錢麥門冬一錢竹茹五分

甘草八分枇杷葉去毛蜜炒一錢生薑二片

水二鍾煎一鍾溫服

半夏竹茹湯 治胃中濕熱嘔吐不止或飲酒過度嘔逆

或胃火上衝熱痰作嘔俱宜服

半夏一錢汁炒青竹茹一分乾葛五分白茯苓一錢

人參五分甘草四分

水二鍾姜二片棗一枚煎一鍾不時服熱甚加炒黃連

白芍藥各一錢

黃連湯 專治胃火嘔逆不止

黃連二錢生用人參一錢橘紅五分白芍五分麥門冬二錢

白茯苓一錢



水二鍾煎一鍾不時溫服火甚加知母石膏各一錢  
異功散 四君子湯 治脾胃虛弱不進飲食時常嘔吐

面皮黃瘦精神困倦 方見脾胃

柿蒂去噦湯 治傷寒下早心煩嘔噦

柿蒂五錢 茯苓一錢 竹茹七分 甘草四分 陳皮一錢

生姜三片

右水二鍾煎一鍾不拘溫服

透隔湯 治脾胃不和積滯不消噎塞不通脇肋刺痛嘔

逆痰涎飲食不下

檳榔一錢 枳殼 白豆蔻各八分 陳皮 半夏各一錢

大黃一錢 甘草四分 木香三錢 青皮八分

水二鍾姜二片煎一鍾不時溫服大便燥結不通加芒

硝八分 桃仁五粒

獨參湯 治胃虛嘔吐脈細不食

人參二錢 生姜三片

右水二鍾煎一鍾不時溫服或虛極加白朮一錢五分

茯苓一錢 粳米一撮

丁香吳萸湯 治脾胃積寒嘔逆不止

丁香五分 吳萸一錢 人參八分 茯苓六分 艸豆蔻八分

半夏一錢 蒼朮八分 乾姜五分 甘草



右水二鍾生姜一片煎一鍾不時溫服

惡心

生姜半夏湯 治病人胸中似喘不喘似噦不噦徹心中憤々然無奈者用此湯治之丹溪治惡心皆用生姜隨症佐使他藥以惡心多屬痰熱虛生姜性溫能補味辛能散火豁痰故也

半夏八兩用礬水浸煮去沫 生姜一斤取汁炒

每服四錢水二鍾煎一鍾入蜜三茶匙熱服不止再服

茯苓湯 治胃氣虛弱積痰惡心

白茯苓一錢 陳皮八分 麥牙錢炒一 白朮錢炒一 神糶錢炒一

甘草五分 半夏八分

水二鍾 生姜五片 煎八分 不時溫服

吐酸吞酸

吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成凡積聚既久濕中生熱凡從木化故治吐酸當用辛涼而治吞酸當用辛溫者謂積鬱不得通達復為風寒外束內熱外寒而酸味伏在肺胃之間咯不得上噦不得下或酸味吞下刺心服辛溫等劑而愈者是肌表得溫腠理開發津液得行鬱滯遂散故吞酸吐酸雖同一症而其治各有可異也



咽醋丸 治酸氣上攻或吐酸吞酸皆宜服

吳茱萸 去梗泡去味五錢 陳皮 去白三錢 黃芩 酒炒五錢 蒼朮 炒七錢

黃連 陳壁土炒一兩

右為細末神糶糊為丸如梧桐子大每服二錢百滾湯送下或壯人服至五錢亦可

姜連二陳湯 治脾胃濕熱嘔吐酸水飲食不下

黃連 錢炒一錢 乾姜 炒八分 半夏 一錢 陳皮 七分 茯苓 一錢

甘草 四分 桔梗 五分

水二鍾生姜一片煎八分不時溫服

參萸丸 治胃虛積濕痰飲作酸服利水開痰清火等藥

不效此藥甚宜

人參 八分 茯苓 一錢 吳茱萸 七分 陳皮 八分 黃連 錢炒一

甘草 五分 丁香 三分

水二鍾姜三片煎一鍾不時服

藿香安胃散 治內有積鬱外冒風寒酸氣刺心吞吐不

得發熱頭痛或時冷痺

藿香 一錢 半夏 一錢 陳皮 八分 厚朴 一錢 蒼朮 八分

甘草 五分 桔梗 六分

水二鍾姜三片煎一鍾不時溫服或氣喘頭痛外感重

加紫蘘川芎各一錢



嘔吐清水

茯苓飲 治心胃中有停痰宿水時吐酸水氣滿不能食  
茯苓一錢 人參一錢 白朮一錢 五陳皮五分 枳實七分  
生姜三片  
水二鍾煎一鍾不時溫服渣再煎

嘔沫

半夏乾姜散 治乾嘔吐逆吐涎沫胃寒所致

半夏 乾姜 各等分

右二味杵為細末 生姜三片 皂角五錢 水不拘多少煎  
數百滾不時溫服

吐虫

烏梅丸 治吐虫或傷寒後臍寒吐蛇一切虫疰皆宜服

烏梅十兩 細辛一兩 附子炮去皮尖 蜀椒炒去汗

黃栢 桂枝各一兩 乾姜炮二兩 黃連酒炒四兩 當歸一兩

人參九錢

右九味共為細末以苦酒浸烏梅一宿去核蒸熟杵成  
泥和前藥納臼中加煉蜜不拘多寡杵二千餘下每服  
十九或二十九一日用三次俱食前白滾湯送下

膈氣

參連湯 治嘔吐飲食不進或胃中虛熱惡心宜服  
方見痢門



夫膈氣一症。乃陰陽拒格。不相榮運。以致真陰日衰。孤陽日亢。凡犯此者。皆因酒色傷精。勞倦傷神。或風寒外侵。七情內傷。積漸而至。非比氣冷氣滯。卒冒風寒。可用辛香燥熱等藥治之也。若不求其受病之原。槩認翻胃噎噦嘈雜諸症。為寒遽用燥熱尅伐之藥。投之則不獨不能去疾。而反耗其津液矣。夫胃中津液不行。其所進飲食。必停滯而不化也。飲食不化。必積為痰。飲而痰飲。一生或朝食暮吐。或暮食朝吐。翻胃之症作矣。或痰在喉間。或胃脘枯槁。噎之不下。吐之不出。噎膈之症成矣。或結痞作痛。或吞酸嘈雜。其病雖不同。而叩其原。摠不離虧其真陰所致。故治膈氣諸症。皆當養血生精。清痰降火。潤燥補脾。開鬱和胃。不使其陰陽否絕。變為乖羸。離敗是為良工也。蓋丹溪云。翻胃噎膈。其病大約有四。或血虛氣虛。或有熱有痰。血虛者當以四物湯養血。氣虛者當以四君子補氣。有痰者當以二陳湯竹瀝治痰。有熱者當以芩連童便清熱。此治膈氣不易之法也。後學當于此參究之可矣。

約治

一老年犯此者。臟腑陰氣盡脫。孤陽浮露於外。內津液枯稿。多致不治。即治亦不過和養血氣。其降氣清痰清火等劑。用之愈速其斃也。



一嘔逆大便不通胸中覺有熱氣熏蒸嘈雜悶痛此乃好用煎炒厚味積成膈熱或性急易怒相火上炎津液熬為濁痰以致此症淺用黃連枳殼之類降之深用熟大黃丸通之此急則治其標也積熱稍除仍用養血如四物湯童便牛乳之類滋補其真陰可也

一七情鬱結漸致氣噎吃逆之症宜用六鬱湯越鞠丸之類開達之若仍用補血等藥則愈滯其氣也

一翻胃噎膈噦逆嘈雜等症原主於氣而氣病初起宜用馨香辛涼氣藥開達其滯氣為緊若遽用滋補血藥則必滯塞其氣夫血氣不相離之物氣通則血自得運行氣閉

則血隨之而滯血氣既滯則陰陽自然隔絕故膈氣之症而有先後血氣之別苟不知先後不分血氣偏用辛香燥之劑或用寒涼滯塞之藥皆不善其治者也

約脉

膈氣之脉浮緩者易治沉瀼者難治脉數無力者血虛脉緩無力者氣虛脉滑而數者有痰脉數而洪者有熱脉弦而結者有鬱脉瀼而沉者血氣枯竭三難曰脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚為溢為外關內格此陰乘之脉也關以淺者



陰之動也。脉當見一寸。而沉過者。法曰太過。減者法曰不及。遂入尺為覆。為內關外格。此陽乘之脉也。故仲景宗之。曰在尺為關。在寸為格。關則不得小便。格則吐逆是也。

約方

大小承氣湯治胃中積熱。脉實便結。朝食暮吐者。見傷寒。厚朴丸治翻胃吐逆。飲食噎塞。氣上衝心。腹中諸疾。皆

宜服其藥味與古方加減不同

- 厚朴 二兩 姜汁炒
- 蜀椒 一兩 去目微炒
- 紫苑 兩 去土
- 苗 一錢
- 吳萸 湯泡
- 芎藭 一兩 桔梗 一兩 茯苓 一兩 紫苑 兩 去土
- 胡 兩 去苗 炒 一
- 官桂 兩
- 皂角 一兩 去皮炙
- 乾姜 兩 泡
- 人參 一兩
- 黃連 兩 酒炒
- 二錢

右為細末入巴豆霜五錢研勻煉蜜為丸如黑豆大每

服三九漸次加至五七九以利為度生薑湯送下

十膈散 專治十般膈氣冷膈風膈氣膈伏膈熱膈悲膈

水膈食膈喜膈或因憂驚氣滯不散或因喜怒食積不化或冷熱不調飲食不節漸至心胃噎塞此皆膈氣之病源也

人參 一兩 茯苓 五錢 官桂 八錢 甘草 六錢 神曲 炒 一兩

麥芽 炒 八錢 白朮 炒 一兩 陳皮 去白 枳殼 炒 一兩 乾姜 炮 一兩

三稜 煨 一兩 訶黎 煨 一兩 厚朴 姜炒 檳榔 各 五錢 木香 三錢

右為細末每服一錢淡鹽湯調下脾胃不和胃腹脹滿



用水一鍾生姜五片棗二枚加鹽少許煎七分和渣空心熱服

大黃湯 治冷涎留胃其症每發時先流冷涎然後吐食此積熱在胃因勞而發若不早治危在旦夕也

大黃一兩用生薑自然汁半茶鍾煮大黃乾微火焙為末每服二錢陳米一撮葱白二根水一大鍾煎至七分

調大黃末服此方胃間積熱作脹作痛或嘔或噯雜或發噎病淺者五服即愈深者十服除根

人參利膈丸 治胃中不利痰嗽喘滿併脾胃壅滯大便秘結此方乃推陳致新膈氣中之聖藥也

木香七錢 檳榔一兩 人參當歸各一兩 甘草六錢

藿香枳實各一兩 大黃酒煨一兩 厚朴姜炒一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三五十九食後米飲送下

香砂和胃丸 治胃氣積滯飽悶嘔逆方見藿亂 利痰丸

治積痰發噎 六君子湯 治胃虛夾痰發噎方俱見痰

五噎膈氣丸 治憂勞思慮致傷脾胃胃膈不快煩悶吐

逆諸症 遠志四錢 麥門冬去心五錢 人參四錢 半夏一兩 桂心三錢

桔梗六錢 細辛二錢 枳殼五錢 乾姜二錢 五



右為末煉蜜為丸每服三四十丸淡姜湯食後臨卧時送下

消痞丸治痰積痞膈心胃脹悶方見痞門

吳茱萸丸治寒在膈上咽膈不通此乃陰氣溢上陽氣

不能升發以致咽膈不通治當升清降濁

吳茱萸二錢 草豆蔻一錢 陳皮 人參 黃芪

升麻各八木香 青皮各二柴胡 澤瀉各四

甘草六分 麥芽一錢 當歸六分

右為末荷葉煮糊為丸如綠豆大每服三十九白滾湯

不拘時送下此藥服後不宜多食湯水

藿香安胃散治胃氣不和嘔酸發噦見嘔吐 滾痰丸治氣

結生痰停滯胃膈脹悶作痛變為噎噦見痰飲

### 噦症

夫噦者俗呼為吃逆是也即氣上逆也氣自臍下直衝上

出于口而有聲此症雖屬于火而有虛實不同虛火發噦

法當補虛實火發噦法當降火內經曰諸逆衝上皆屬于

火東垣云火與元氣不兩立火即元氣之賊此正言其虛

實也人之陰氣以胃為養若胃土傷損則肝木侮之木乃

土之賊也陰氣被火所乘不得內守而火相挾直衝清道

而上發為噎噦之聲蓋噦症多發在吐利后此繇胃氣虛



膈上熱。言胃虛者。即陰虛也。病後見此。是為危症。即經所謂壞府者。似此症也。

噦方

陳皮竹茹湯 治胃中虛膈上熱發噦逆者神效

陳皮五錢 竹茹五錢 甘草七錢 人參三錢 大棗二枚

生姜三片

水二鍾煎一鍾不時服氣逆甚加枳殼五分木香一分同煎大便不通脉實者去人參加桃仁七粒大黃一錢枳殼八分便通即止

丁香柿蒂散 治胃中虛寒發噦

丁香一錢 柿蒂五分 青皮八分 陳皮一錢 人參八分

水二鍾煎八分去渣不時溫服如脉不甚虛氣逆胃脹去人參如脚手厥逆脉沉微不起者加熟附子一錢乾姜八分

經驗醫按

乙丑歲有知友。病嘔吐。每夜食物。至天明原物吐出。不見消化。數醫用溫胃之劑。罔效。召余診脉。隱在肌肉之下。且微而弱。想前醫所用之藥。與病原不相遠。是日反覆思之。未決。次日復為診視。見脉沉遲而瀼。謂其父曰。嘔症雖屬氣積寒三種。然必從三焦論之。上焦嘔者。溢於氣。中焦嘔



者從於積。下焦嘔者從於寒。今脈沉且遲。暮食朝吐。小便利。大便秘結。此乃下焦嘔也。法當通其秘。溫其寒。先用透膈湯通大便。次用丁香吳萸湯散積寒。繼用和中湯調之。服至一月。而飲食如常。即經所謂寒淫所勝。平以辛溫是也。其見溫劑罔效。遂用寒涼。以致不效者。自當一省。戊寅芝山寺施醫。一人腹中伏有氣塊。此塊翻動。即覺氣壅腹痛。嘈雜嘔吐。或時嘔飲食。或時嘔黑水。診其脈浮弦細弱。有醫作痰治者。作脾血虛治者。又有作熱治者。又有作寒治者。俱不中病。余以人參三錢。麥芽一錢。陳皮藿香各五分。黃連六分。吳萸三分。每日一劑。服一旬餘。諸症漸

退。繼用參苓白朮散。服至半年而安。此症是脾氣大虛。失其運健。吐飲食者脾虛也。吐黑水者因脾土虛不能制水也。故水邪乘虛侮之。即經曰以不勝侮其所勝是也。夫前醫作痰治。必用二陳。二陳乃剛劑也。脾虛則不能生血。加以剛劑。則脾血愈虛矣。作血虛治。必用四物。四物乃柔劑也。脾虛則氣滯。加以柔劑。則脾氣愈滯矣。其作熱治者。必用芩連。脾氣既虛。正畏水泛其土。安能復受苦寒助水之劑。其作寒治者。必用丁香姜桂。蓋辛香之品。皆傷肺氣。肺金乃脾土之子。經云虛則補其母。實則瀉其子。今脾已虛。豈可復瀉其子。故用藥貴其對症。如不對症。不獨無益。且



愈損元氣耳。

一村夫因食芋梗羹。嚙納間。忽發噎一聲。遂致延年不退。百藥不効。一日與叔伯爭口。怒氣壅胸。津唾亦嚙不下。衆擬不治。至寺中求治。余記王中陽有一案。頗與此症相合。先用升麻柴胡各一錢。人參三分。水一鍾。煎六分。與服。隨以礬湯探吐之。果吐宿痰一升。但噎未止。繼用白朮一錢。白芍二錢。青皮一錢。木香陳皮各七分。研末投入清米粥內。計煮一滾。令病者大口啜之。一吸而盡。連服三日。漸能飲食。此乃肝氣過鬱。素有痰在喉口。因飲芋羹而噎。先用吐法。乃升舉其肝氣。后用藥入粥內。是安平其胃氣。即所謂木鬱則達之。氣逆則平之。意也。

一友家頗殷厚。喜用煎炒。善發怒。時覺胸膈微痛。所進飲食。自覺屈曲而下。形色日見羸瘦。或時聞腥氣上衝。即發噎吐食。右脉寸關俱見沉瀆。左脉和平。一醫用二陳丁香豆蔻等溫胃理痰。胃膈遂悶澁作痛。一醫用四物芩連等清火養血。胸中飽脹作嘔。到寺求診。余見其脉沉瀆中有力。擬其胸中必有瘀血。用生韭汁和童便。令病人時飲細呷之。服至五日。見有一物在胸膈上下。欲吐不吐。後用鹽湯探吐之。初吐痰血一盞。次日再吐黑血二碗。立愈。此乃瘀血致病。即所謂血滯于氣是也。



一友病後發噦。日輕夜重。人事昏憤。數醫用丁香柿蒂。二陳竹茹等劑。罔效。以為不治。余見右手關脉沉遲帶結。謂其病者曰。此病在血不在氣。治當行血方效。用四物湯。加桃仁紅花。因其大便結燥。于前藥中。少加大黃朴硝。急火煎服。二日而噦止。繼用四君子湯。加歸芍而痊。此非氣滯發噦。乃積瘀發噦也。

### 腹痛

東垣曰。心胃痛及腹中諸痛。皆因勞役過甚。飲食失節。中氣不足。寒邪乘虛而入。故卒然而作大痛。經言得炁則止。炁者熱也。以熱治寒。治之正者也。然痛之一症。有虛有實。有寒有熱。有死血積痰。種之不同。若綿綿痛。而無減增者。有寒也。時痛時止者。熱也。每痛有處。不行移者。死血也。痛甚欲大便利。後痛減者。食積也。痛而小便不利者。濕痰也。痛無定所。或上或下者。虫也。經云。腹痛按之不痛。為虛。按之痛者。為實。似不可驟認為寒。一例用熱藥治也。

### 約脉

關脉弦。中焦作痛。尺脉弦。下焦作痛。亦有脉不弦而作痛者。假若緊為寒。數為熱。滑為積。濡為濕。又云。脉細而遲者。生。大而急者。死。此言其大槩。然有腹痛而脉大不死者。往往有之。豈可執一論哉。



約方

草豆蔻丸 治脾胃虛弱心腹疼痛或咽膈不通肢體沉

重或吐涎沫腸鳴泄瀉併感冒風寒皆可治也

草豆蔻一錢炒搗碎吳茱萸湯泡陳皮去白人參八分

青皮六分桃仁七分去皮尖白姜蚕一錢當歸身酒洗焙

益智仁八分甘草六分半夏製七分麥芽炒五分黃芪八分

神曲炒五分澤瀉二分姜黃四分柴胡炒五分

右研末內桃仁另研如泥合薄米糊為丸如梧桐子大

每服三五十九白滾湯送下

神聖復氣湯 治腹痛連腰背胸膈俱痛口中流涎目中

流淚或痰嗽耳鳴兩足無力有脚作痛氣少發喘此乃

寒水來復火土之仇也

乾姜泡三人參五分半夏製七分柴胡炒一錢藁本酒洗八分

升麻七分防風五分羌活一錢甘草六分當歸酒洗七分

桃仁去皮尖陳皮三分黃芪生用一錢

水二鍾姜二片煎一鍾不時服

溫胃湯 治傷生冷併寒涼藥致脾胃虛寒心腹疼痛

白豆蔻三分砂仁二分陳皮七分乾姜四分厚朴三分

人參五分甘草二分澤瀉三分官桂一分

水一鍾半煎七分不時溫服



高良姜湯 治心腹絞痛兩脇支滿不可忍

高良姜 三錢 厚朴 一錢炒 當歸 八錢炒 桂心 一錢炒 陳皮 五錢去白

水二鍾煎一鍾不拘溫服以痛止為度

桂木湯 治積寒腹痛或寒濕所侵身體沉重胃腕連腹

痞滿時上作痛

桂枝 五分 草薤仁 六分 蒼朮 二錢 陳皮 一錢 白茯苓 八分

紅曲 六分炒 半夏 七分 澤瀉 一錢 諸苓 各五分 甘草 二分炙

水二鍾煎一鍾去渣食前熱服

香砂理中丸 姜砂六君子湯治脾胃虛弱積寒作痛或

嘔吐泄瀉皆可治也方見中寒

厚朴三物湯 治腹痛秘結肚腹脹滿按之愈痛者宜服

厚朴 二錢 大黃 三錢 枳實 一錢

右三味研末用水二鍾煎數十滾食前服如大便不通

加桃仁一錢五分去皮尖研泥將前藥湯調服以大便

通為度

小建中湯 附子理中湯 四逆湯治脾胃虛寒或外寒

直中三陰經卒發腹痛方俱見中寒 沉香降氣丸

四磨湯治脾氣滯瀆痞悶作痛方見氣門

甘草芍藥湯 治腹痛吐酸夫酸者屬木甘者屬已甲已

化土乃仲景治腹痛之妙方也



芍藥三錢 甘草五分 錢

水二鍾煎一鍾不時溫服海葢云白芍收而赤芍散謂  
辛苦緩急食酸以收之白芍是也脾欲緩急食甘以緩  
之甘草是也

升麻除濕湯 治濕痰停滯于脾胃間作痛至陽氣不得  
上升形色痿黃飲食少進肢體沉重

升麻一錢 陳皮八分 半夏一錢 柴胡六分 蒼朮一分 錢五  
防風五分 香附八分 紫蘓八分 甘草二分

消痰飲 治痰血停滯心腹其疼痛不可忍者立効  
右水二鍾生姜二片煎一鍾不時溫服

當歸尾一錢 赤芍藥五分 錢 紅花五分 蘇木一錢

玄胡索炒 生地黃一分 錢 五 甘草一分  
右水酒各一鍾煎八分不拘服如大便不通加大黃芒  
硝各一錢

心痛

俗所謂心痛即胃腕痛是也其痛雖有九種而得病之繇  
非因飲食積滯外感寒邪即因七情拂鬱惱怒所觸而起  
其新病者非積則寒宜消導積滯溫散寒邪其舊病者非  
鬱則痰宜開通鬱氣清降痰火故王節齋曰凡治心腹疼  
痛若是新病須問曾服何飲食因何傷感有無積滯便與



和平消導之藥。若日數已久。服過辛溫燥熱之藥。嘔吐不  
 納。胃膈飽悶。口舌乾燥。大小便不通。或原有舊病。因有所  
 感而發。二者之病。內俱有鬱熱。俱用開鬱行氣。降火潤燥  
 之藥。如川芎香附。炒山梔黃連姜汁之類。其甚者。再加硝  
 黃下之。又云痛久而不止者。兼有伏火。須於溫散藥內。加  
 苦寒鹹寒之藥。分而治之。此為溫治其標。而寒治其本也。  
 治痛之法。于新久標本中求之。似可謂盡善矣。然其痛必  
 有所因。或身受寒邪。口食寒物。法當溫之。或素有鬱火。因  
 感熱氣。法當清之。或有頑痰。死血作痛者。法當行消之。或  
 有氣壅。虫動作痛者。法當降伏之。更有太陰觸犯心君。併  
 汚血冲心。其痛時手足遂青過節者。此真心痛也。朝發暮  
 死。又非藥物所能治者也。若執一論。不察其痛之所因。而  
 臨治寧無眩惑乎哉。

約脉

凡脉弦細沉伏。俱屬痛症。若脉堅實。而大便不通者。此寔  
 痛也。宜下之。若脉空虚。而手足厥冷者。此虛痛也。宜溫之。  
 脉動面青唇紅帶紫。其痛時作時止者。是虫痛也。宜治其  
 虫。痛脉沉細而遲者。易治。浮大而長者。難治。

約方

正氣木香散

治胃氣不和停滯作痛



蒼朮一分 陳皮八分 枳殼一錢 木香六分 甘草三分  
青皮八分 茯苓一錢 藿香六分

水二鍾 生姜三片 煎一鍾 不時溫服

木香丸 治氣不得升降 積滯胃膈 間刺痛 或痞悶吐酸

嘔吐泄瀉諸症

木香一兩 厚朴一兩 丁香五錢 陳皮去白六分 乾姜泡五錢

砂仁五錢 甘草灸三錢 草豆蔻炒一兩

右為末 水滴為丸 每服三十九丸 淡姜湯送下

桂枝薑枳湯 治感冒風寒 併口食生冷 停流中焦 胃氣

閉塞大發疼痛

桂枝一錢 乾姜泡一錢 陳皮八分 川芎八分 桔梗五分

砂仁八分 紫蘇一錢 枳殼一錢 甘草灸三錢

水二鍾 姜三片 煎一鍾 不拘溫服

溫胃湯 治過飲冰水 胃冷作痛 草豆蔻丸 治傷生冷菓

菜等物 胃脘發痛方俱見腹痛 麻黃桂枝湯 治外感風邪

心脾發痛 嘔吐不食方見風寒 朴黃丸 治胃脘痛 胃膈

痞滿大便不通方見痢門

化虫丸 治一切虫痛 神效

乾漆五錢 炒 梔仁四十九粒 雄黃二錢 五巴豆霜一錢

當歸尾五錢 烏梅肉三錢



右為末麪糊為丸如綠豆大每服十二丸用苦練根皮煎湯送下

玄胡索散 治死血流滯胃脘作痛併女人產後瘀血未

盡停在心脾發痛諸症

玄胡索 醋炒一兩 川芎 兩炒一 紅花 錢炒五 桃仁 去皮尖四

紅麪 錢炒五 官桂 錢炒五 赤芍藥 兩酒炒一

右為細末每服二錢溫酒送下若不能用酒艾湯送下

尤妙

枝子湯 治胃有伏火膈有稠痰或惡心嘔吐舌燥咽乾

痛時自覺烘然熱者宜服

枝子仁 炒黑一分 枳殼 錢炒一 黃連 酒炒八 小川芎 分炒八

香附 錢醋炒一 乾姜 炒黑五 陳皮 去白六 甘草 二分

水二鍾姜一片煎一鍾不拘溫服一方用山梔仁一味

炒黑研末每服二三匙淡姜湯調下又名倉卒散

桂靈散 治卒心痛

良姜 兩麪炒一 厚朴 姜汁炒 五靈脂 明淨者醋炒一兩

右為細末每服一錢淡醋湯調下其痛立止

經驗醫按

戊寅歲芝山寺施醫。一人心腹忽痛。脉沉似絕。手足厥冷。

面青嘔逆。諸醫皆認為寒。用溫胃湯豆蔻丸不効。求余診

准定藥考心腹痛



視見其面青唇紅。痛無定心。遂與化虫丸二十粒。其痛立痊。繼與六君子湯加烏梅而愈。

一村婦心腹疼痛。吐出清涎如雞蛋清狀。其痛稍止。吐止又痛。諸藥不能入咽。余診其脉堅實而弦。按之且長。先用乾姜五分。炒黃連一錢。研末與之細呷。其嘔方定。繼用朴黃丸。滾痰丸。下頑痰數升而愈。此是氣結生痰。頑痰痛也。顧兵尊向有胃脘痛疾。一日因惱怒。舊病忽發。衆醫亦有作氣滯治者。亦有作鬱火治者。其痛愈甚。召余診視。見其胃脉亢。遂與玄胡索散三錢。用老酒送下。其痛立止。此因怒血壅胃脘。乃瘀血痛也。

一婦人素有心脾痛疾。痛時四肢厥冷。每用辛香桂附之類。隨服隨止。一日前病復作。遂用前藥。服之不效。改用豆蔻木香檳榔等丸。計百餘粒。大便通後。其痛稍可。不一時痛來愈甚。加下墜拘急。口燥乾嘔。召余診視。見脉數有力。知其服香燥藥太過。先與單桅子仁湯一服。口燥漸止。而下墜亦減。繼用黃連解毒湯而安。

### 頭痛

金匱真言論云。東風生於春。病在肝。俞在頸項。故春氣者病在頭。又諸陽會於頭面。如足太陽膀胱之脉。起於目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。病衝頭痛。又足少陽



胆之脉起於目銳眦。上抵頭角。病則頭角額痛。夫風從上受之。風寒傷上。邪從外入。客於經絡。令人振寒。頭痛身重。惡寒。治在風池。風府。調其陰陽。不足則補。有餘則瀉。汗之則愈。此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴。九竅不利者。腸胃之所生。乃氣虛頭痛也。心煩頭痛者。病在耳中。過在手巨陽少陰。乃濕熱頭痛也。如氣上不下。頭痛癩疾者。下虛上實也。過在足少陰巨陽。甚則入腎。寒濕頭痛也。如頭半寒痛者。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。此偏頭痛也。有真頭痛者。甚則腦盡痛。手足寒至節。死不治。有厥逆頭痛者。所犯大寒。內至骨髓。者以腦為主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者。總其大躰而言之也。高顛之上。惟風可到。故味之薄者。陰中之陽。乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛。惡風脉浮緊。川芎羌活獨活麻黃之類為主。少陽經頭痛。脉弦細。往來寒熱。柴胡為主。陽明頭痛。自汗發熱。惡寒脉浮緩。長實者。升麻葛根石膏白芷為主。太陰頭痛。必有痰躰重。則腹痛為痰癖。其脉沉緩。蒼朮半夏南星為主。少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。而足寒氣逆為寒厥。其脉沉細。麻黃附子細辛為主。厥陰頭項痛。或吐痰沫厥冷。其脉浮緩。吳茱萸湯主之。血虛頭痛。當歸川芎為主。氣虛頭痛。人參黃芪為主。氣血俱虛頭



痛。調中益氣湯。少加川芎。蔓荊子。細辛。其効如神。白朮。半  
夏天麻湯。治痰厥頭痛藥也。青空膏。乃風濕熱頭痛藥也。  
羌活附子湯。治厥陰頭痛藥也。如濕氣在頭者。以苦吐之。  
不可執方而治。先師嘗病頭痛。發時兩頰青黃。暈眩目不  
欲開。懶言身躰沉重。兀上欲吐。潔古曰。此厥陰太陰合病。  
名曰風痰。以局方玉壺丸治之。更灸俠谿穴。即愈。是知方  
者躰也。法者用也。徒執躰而不知用者。弊躰用不失。可謂  
上工矣。

### 約脉

凡診頭痛之脉。俱在兩寸口候之。脉浮洪。或數為風熱。脉

弦緊。或緩為風寒。脉弦細而濇為氣虛。脉弦數而大為血  
虛。脉浮滑為風痰。弦滑為痰厥。脉浮濇為濕熱。沉堅為寒  
濕。又云脉浮洪。弦急。緊滑。皆屬於陽。則易治也。沉濇短細  
堅實。皆屬於陰。則難治也。

### 約方

大清空膏 治偏正頭痛。年深不愈者。善療風濕熱。頭上  
壅損。目反。腦痛不止。

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 炒 防風 去蘆 羌活 各一兩

灸草 錢一兩五 細挺子 黃芩 半兩 酒製 皮挫 炒

右為細末。每服二錢七分。投入盞內。用茶少許。湯調如



膏。抹在口內。少用白滾湯送下。臨卧時服。如苦頭痛。每服加細辛一分。如太陰脉緩。有痰名曰痰厥頭痛。減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢。如偏正頭痛。服之不愈。減羌活防風川芎一半。加柴胡一倍。如發熱惡熱而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯。加好吳白芷。上清瀉火湯。

昔有人年少時氣弱。嘗於氣海三里灸之。節次約五七十社。至年老添熱厥頭痛。雖冬天大寒。猶喜寒風。其頭痛則愈。微來暖處。或見烟火。其痛復作。五七年不愈。皆灸之過也。凡火邪上攻頭面。宜服此湯。

川芎

荆芥穗

各二分

黃連

酒炒

地黃

生

藁本

甘草

各五錢

蔓荊子

當歸

蒼朮

各三分

升麻

七分

黃蘗

酒炒

炙甘草

黃芪

各一錢

防風

七分

黃芩

知母

各一兩半

銀柴胡

五錢

羌活

三錢

細辛

許

紅花

各少

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二鍾。煎至一鍾。去粗稍熱食後服。

羌活清空膏 治頭痛風熱

蔓荊子一錢 黃連三錢 羌活 防風 甘草 各錢

黃芩 兩

右為末。每服一錢。用茶調如膏。白沸湯下。食後臨卧服。



川芎神効散 治頭目不清利。風熱夾火上攻。

川芎 三分 生甘草 羌活 防風 藁本

升麻 各一錢 炙甘草 地黃 生各二錢 柴胡 七分 黃連 炒

黃芩 各四分 錢五分

右為細末。每服一錢或二三錢。食後茶清調下。忌酒濕

麵。

半夏白朮天麻湯

范天駭之內。有脾胃症。時顯煩燥。胸中不利。大便不通。而又為寒氣拂鬱。悶亂大作。火不伸故也。疑其有熱。服疎風丸。大便秘行。其病不減。恐其藥少。再服七八十丸。大

便復見。兩行元証。不瘳。增以嘔吐。飲食不進。痰唾稠粘。

湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。語言無力。

精神顛倒。目不欲開。如在風霧中。頭苦痛如裂。身重如

山。四肢厥冷。不得安卧。余料前証是胃氣已損。復下兩

次。則重虛其胃。故痰厥頭痛並作。與此藥治之。

黃蘗 二分 乾薑 三分 澤瀉 天麻 白茯苓

黃芪 人參 蒼朮 各五分 半夏 湯泡 麥蘗 麴

橘皮 各一錢 神麴 炒 白朮 各一錢

右咬咀。每服三錢。水二大盞。煎至一盞。去粗食前熱服。

一服而愈。此頭痛苦甚。謂之足太陰痰厥頭痛。非半夏



不能療。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。黃芪甘温。瀉火補元氣。實表虛。止自汗。人參甘温。瀉火補中益氣。二朮俱苦甘温。除濕補中益氣。澤瀉茯苓利小便。藟濕。橘皮苦温。益氣調中升陽。神麴消食。蕩胃中滯氣。大麥。麴寬中助胃氣。乾薑辛熱。以滌中寒。黃蘗大苦寒。酒洗。以療冬天少火。在泉發燥也。

碧雲散 治頭痛

細辛

鬱金

芒硝

各一錢

川芎

三錢

蔓荊子

三錢

石膏

一錢

青黛

五分

薄荷

二錢

紅豆

一箇

右為細末。口噀水。鼻內啗之。

又川芎丸

治頭風痛

川芎

炒

白芷

八錢

細辛

五錢

黃芩

酒炒

大黃

酒煮

熟

石膏

煨

羌活

八錢

甘草

三錢

右為末

煉蜜和丸

每服一錢

五分

食遠

白滾湯

送下

順氣和中湯

治中氣不和。痰氣上逆。頭痛頭眩。胸膈脹

滿氣急。

烏藥

一錢

枳殼

炒

半夏

泡

陳皮

去白

黃連

酒炒

一錢

藿香

八分

茯苓

六分

甘草

三分

右剉一劑

水二鍾煎

一鍾

食遠服

白附子散

治膈中有痰。因感風邪。頭重眩痛。或痛時昏



迷。不省人事。

白附子 三錢 胆南星 二錢 橘紅 一錢 薄荷 三錢

香白芷 二錢 北細辛 二錢

右為細末每服一錢。淡薑湯食後送下

補中益氣湯。治飲食勞倦。致傷血氣。頭痛。見內半夏細辛

湯。治痰飲頭痛。見瘡防風通聖散。治風熱頭痛。見風

茯苓湯。治脾經積濕生熱。濕熱上攻頭痛。

茯苓 二錢 防已 一錢 半夏 八分 防風 一錢 川芎 錢炒

桔梗 六分 陳皮 二分 甘草 三分

右剉一劑。水二鍾薑一片。煎一鍾不時服。

喉痺

夫喉痺之症。多因素有痰涎。或痰因火動而發。或痰因風激而發。夫風飛騰火燔灼。俱能動痰上壅。致天氣不通。地道閉塞。治療之法。當先治其標。後治其本。治標者。吐其熱痰。清其火邪。散其風寒是也。治本者。清其天道。益其中氣。補其陰血是也。若不審緩急。驟用寒涼峻治之劑。非徒無益。而且有害矣。

約脉

喉主氣。兩寸脉浮。而溢上魚際者生。兩寸沉微而伏者死。此症大端是火衝逆。脉至洪滑數急。俱屬本病。吉脉也。



約方

碧雪散 治咽喉閉塞。一時不能言語。痰涎壅盛。

灯心灰 二錢 硼砂 一錢

右研細末。用鵝翎管吹入喉中。立効。

如聖碧玉丸 治心肺積熱。上攻咽喉。腫痛閉塞。水漿不

下。或生口瘡。並宜服之。

青黛 盆硝 蒲黃 甘草 各製

右同研勻。用沙糖為丸。每兩作五十丸。每服一丸。嚥化。

或用白湯徐徐送下。立効。

神効散 治急喉風

白礬 梛 僵蠶 皂角末 硼砂 枯

各等分。為細末。將少許吹入喉中。痰出即瘥。

桔梗湯 治咽喉疼痛。如有物脹悶。

桔梗 炒五錢 半夏 湯泡七次 切人參 去芦 甘草 炙各一錢 五分

右剉一劑。水二鍾煎。一鍾不時溫服。

訶子湯 治咽喉疼痛。聲音啞塞。

訶子 煨三錢 薄荷 五分 甘草 二錢 桔梗 五分 玄參 二錢

僵蚕 一錢 升麻 八分 牛蒡子 一錢

右作二服。每服水二鍾煎。一鍾不時溫服。

潤喉散 治氣鬱夜熱。咽乾硬塞。



桔梗 二錢五分 粉草 一錢 紫河車 三錢 香附米 二錢五分 梔子 炒

百藥煎 各一分 錢

右為細末。每服不拘多寡。傅口內。嚥下。

上清連翹散 治熱毒上攻。咽喉腫痛。煩渴。大便自利。虛

熱不寧

連翹 去子 山梔子 炒 甘草 生 防風 各二錢 薄荷 五分

黃連 酒炒 牛蒡子 炒 錢五分

右剉作二服。每服水鍾半煎八分。食後溫服。

利膈湯 治脾肺虛熱。上壅咽喉腫痛

荆芥穗 桔梗 各八分 牛蒡子 炒 防風 五分 人參 二

生甘草 分 玄參 五分 紫蘇葉 三分

右水二鍾煎一鍾。不時溫服。治風熱上壅。咽喉腫痛。或喉内生瘡。

增減如聖湯 治風熱上壅。咽喉腫痛。或喉内生瘡。

地黃 生 玄參 升麻 桔梗 各八分 黃芩 酒炒

犀角 各一錢 木通 去皮 甘草 生 各八分

右水二鍾薑一片煎一鍾。食後溫服。發聲散 治喉痛。聲音不清。

訶子 三錢 木通 三錢 桔梗 二錢 甘草 二錢 生地黃 三錢

各製半生熟。分為二劑。每服水二鍾煎一鍾。不時徐徐

嚥服。



開關散 治喉痺不堪

揚梅樹皮向東者。晒乾去粗皮為末。加麝香少許。吹入

鼻中。噴嚏即開。亦有用皂角者俱效。

小續命湯。治風邪卒中。喉痺危症。和肝清肺湯。治腦怒

傷肝。肝火上衝喉痺。方俱見茯苓半夏湯。治濕痰壅塞

喉痺。方見痰飲

接喉痺一症。古方言風熱者。言熱痰者。言脾肺積熱壅塞

者。言肝腎相火衝逆者。謂此症皆屬於熱。然亦有卒冒風

寒而痺者。又當分別。熱痺則腫塞不通。寒痺則緊縮而硬。

寒當辛溫以達散之。熱當辛涼以清降之。可緊用寒涼乎。

經驗醫按

戊寅芝山寺施醫。一人患喉痺。漿水不入。津唾亦嚥不下。

危急無策。至寺求治。余語之曰。此係熱痰壅於咽喉之間。

凡散不能吞下。須用吐法。先吐其痰。次清其火。可也。遂用

枯礬湯。以鵝毛探之。吐頑痰數碗。喉間覺嚙唾無碍。繼與

清上連翹散三劑而安。此痰因火動。乃因忿怒失常。肝火

衝逆之症也。治宜清火吐痰。

本寺一僧。自幼無病。為喜食煎炒。時有喉痛之疾。忽一日

喉腫似蛾。痰涎壅上。語言不出。漿水不入。急在旦夕。自擬

為熱。用涼膈散。上清丸不効。漸至咽喉緊閉。呼吸不通。至



局求余診視。見其兩寸脉俱浮滑帶緊。語之曰。此寒包熱之症也。不可用寒涼。改用小續命湯。連進二劑。其痺立開。此熱痰因風冲激而發。治宜去風豁痰。一婦人常覺喉中有物。哽哽不能上下。自以為氣鬱痰滯。每發痛時。即進香砂湯一服。遂通。一日痛極。併香砂湯亦不能下咽。至寺求治。余仍用香砂湯強飲。以手探吐之。吐出結痰。如魚膠。天門冬之狀者六七枚。其痛即止。此痰因氣鬱凝結喉中。陰陽失次。氣苞痰聚所致也。

### 耳門

夫耳者。以竅言之。腎水也。以聲言之。肺金也。以經言之。手

足少陽之脉會於其中也。耳雖屬金水二藏。而各經亦能客入為病也。更有左右之分。虛實之別。豈可一槩論哉。耳之為病。因忿怒不節。動其肝胆之火。或多恐而耳聾者。肝虛也。多怒而耳聾者。肝實也。因色慾過度。動其膀胱之火。或面黑精脫而耳聾者。腎虛也。面黑發熱而耳聾者。相火也。因嗜酒厚味。動其脾胃之火。面黃發熱而耳聾者。脾虛也。面黃痰壅而耳聾者。胃實也。少氣嗌乾而耳聾者。肺虛也。面赤狂燥而耳聾者。心火也。心火上炎。宜犀角丸解之。肺病主氣。宜清氣湯平之。脾病多濕。宜豁痰湯導之。胃病多實。宜大柴胡下之。腎病多虛。宜腎氣丸補之。相火多燥。



宜地黃丸潤之。肝病多鬱。宜火鬱湯開之。膽病多熱。宜解熱飲清之。大都熱則清之。風則散之。寒則溫之。痰則開之。虛則補之。實則瀉之。似不可不審虛實。而分經以施治也。

約脉

耳病之脉。非止二尺脉斷之。左關脉弦數。屬肝胆火。風熱為病也。右關脉浮滑。屬胃火。熱痰為病也。肺脉浮而空大者。氣虛為病也。心脉洪大而虛數者。火邪為病也。尺脉浮洪。或大或數。皆真陰虛而相火甚也。微瀯或沉或細。皆元陽虛而陰氣溢也。

約方

檳榔神芎丸

治濕痰上壅。而耳聾者。

大黃

黃芩

各二兩

牽牛

滑石

各三兩

檳榔

四兩

各製為末。水滴為丸。每服二十丸。白湯食遠送下。

復元通氣散

治元氣虛弱。兩耳虛鳴。

山藥

炒三兩

白茯苓

二兩

橘紅

一兩

人參

五錢

貝母

二兩

甘草

各八錢

香附子

各二兩

桔梗

各二兩

各製為末。每服二錢。食遠百沸湯送下。

清痰養血湯

治血虛痰甚耳聾者。

半夏麴

一錢

茯苓

八分

天花粉

一錢

當歸

八分

川芎

白芍藥

各六分

天麻

各五分

胆南星

各五分

甘草

三分



右水二鍾煎一鍾不時溫服

羚羊清肝湯 治肝經風熱心火上衝而耳聾者。

羚羊角 一磨粉 錢一 白芍 生用 八分 柴胡 炒 錢一 茯苓 八分 麥門冬

薏苡仁 錢各一 桔紅 甘草 錢各四 薄荷 五分

右水二鍾煎一鍾不時溫服

犀角地黄丸 治相火上炎真陰虛竭耳聾者。

犀角屑 洗淨 白菊花 各一 前胡 去蘆 枳殼 炒 去穢 各

生地黄 兩 炒 二 麥門冬 去心 兩 木通 去粗皮 石菖蒲 各五錢

赤芍藥 兩 炒 一 牡丹皮 一兩 牛膝 八錢 甘草 八錢

右劉各製為末煉蜜和丸每服三錢百沸湯空心送下

黃芪丸 治中氣虛兩耳蟬鳴

黃芪 蜜炙 錢一 白蒺藜 炒 錢八 當歸 酒洗 錢各五 黃栢 酒炒 錢

芍藥 酒炒 石棗肉 各一 附子 童便製 錢四

各製為末煉蜜為丸每服四十九白滾湯送下

龍腦膏 治卒耳聾

細辛 去葉 蒲黃 各一分 麴末 炒 杏仁 去皮尖 龍腦 研

甘草 各一分

右搗研勻合綿裹棗核大塞耳中一日一易。

柴胡耳鳴湯 治汚血耳聾耳中聒聒而鳴者最効。

柴胡 三錢 連翹 四錢 甘草 錢一 蜜 去足 水 輕 炒 另 研



當歸一分 人參一錢 麝香一分

右除蠶虫水蛭麝香另研。外用酒水煎熟去渣方下已

上三味。再煎一二滾熱服。

解熱飲子 治氣虛熱壅。兩耳聾閉。及外腫痛。流膿水。肝

胆血熱。

犀角屑 赤芍藥 木通 菖蒲 玄參 各一兩 五錢

赤小豆兩 甘菊花兩 甘草錢四

右剉每服四錢水二鍾薑三片煎八分溫服

菖蒲開竅湯 治耳塞不通

石菖蒲錢 遠志八分 防風五分 甘菊花八分 木通五分

炙甘草三分 茯神一錢

右水二鍾煎一鍾不時溫服

補中益氣湯。治中氣虛弱。兩耳蟬鳴。見內傷火鬱湯。治肝

火鬱滯。耳聾多恐。見氣門。大柴胡湯。治胃熱痰上壅耳

聾。見傷寒。加減地黃丸。治相火上炎。兩耳雷鳴。見火門

如聖豁痰湯 治痰火鬱胞。兩耳不能聽者。

黑梔子一錢 大黃酒煮八分 白芍藥生用 貝母 枳殼各一

天花粉八分 黃芩酒炒一錢 白茯苓八分 甘草二分

右水二鍾煎一鍾不時溫服

鼻塞



夫鼻塞不聞香臭。本經受病雖多。繇心脾二經傳入亦不少。夫陽氣宗氣皆胃中生發之氣也。其名雖異。其理則一。有因飢飽失時。勞役不節。致損脾胃。生發之氣既弱。其營運之氣自不能上升。故邪塞孔竅。而鼻即不聞香臭也。其治又宜養胃氣為本。心主五臭。肺主諸氣。或因衛氣失守。火邪內伏。肺便受之。不能為用。故亦不聞香臭也。蓋以竅言之。肺也。以用言之。心也。世俗皆以鼻塞為寒。緊用辛溫等藥。致動心火。傷損肺氣。殊不知肺經多有伏火。夫火鬱極甚。反喜熱而惡寒。症雖似外感。實非外感也。若純用辛熱。則不知通變者矣。或一時偶感風寒。而致鼻塞聲重。時流清涕。此風寒為病。當以溫散之。若時塞時通。內覺蘊熱。此肺熱為病。宜以清解之。清解非純用寒涼。乃使心肺之氣得以交通。脾肺之氣不致間阻。而鼻塞自利。則香臭可以立聞也。

約脉

左寸脉浮緩。或浮緊。為傷風鼻塞。右寸脉浮滑。或洪數。為肺熱鼻塞。鼻衄鼻血。酒齶鼻淵。皆浮洪而數也。

約方

鹿澤通氣湯 治寒邪客肺。鼻不聞香臭。

羌活 防風 乾葛 各八分 麻黃 五分 蒼朮 去粗皮 錢半



升麻 白芷 各一分 川椒 甘草 各七分

右水二鍾 薑三片 棗一枚 葱白三寸 煎一鍾 食遠服

溫肺湯 治肺寒 目多眵淚

升麻 黃芪 各一錢五分 葛根 羌活 各一錢五分 甘草 分

防風 一錢 麻黃 去節一分 丁香 一分

右剉水二鍾 葱白二根 煎一鍾 食遠溫服

調衛補血湯 治血氣俱虛 不思飲食 四肢倦困 行步不

進 膝冷 脚痛 鼻塞不聞香臭 眼黑頭痛 呵欠噴嚏

蒼朮 三分 升麻 四分 生地黃 五分 白朮 三分 黃柏 炒二分

當歸 柴胡 牡丹皮 各三分 甘草 桔梗 各三分

白朮 一分 陳皮 一分 桃仁 去皮尖

右水二鍾 煎一鍾 食遠服

菖蒲散 治鼻內窒塞不通 不得喘息

菖蒲 皂角 各等分

右為末 每用一錢 綿裹塞鼻中 仰卧少時 即愈

華澄茄丸 治鼻塞不通

華澄茄 五分 薄荷葉 三錢 荊芥穗 一錢五分

右為細末 煉蜜和丸 如櫻桃大 每服一九 噙化

防風湯 治胆移熱于腦 則卒顛鼻淵 濁涕不止 如湧泉

不藏 久而不已 必成衄血之症 用此方主之



防風一錢 黃芩一錢 人參各一錢 甘草一分 川芎炒七分

麥冬去心一錢

右剉水二鍾煎一鍾不時服

蒼耳散 治鼻淵流濁涕不止。

辛夷仁 五錢 蒼耳子炒二分 香白芷 一兩 薄荷葉 五分

右為末每服二錢葱茶湯食遠調服

辛夷散 治鼻內壅塞涕出不止。或氣息不通。或不聞香

臭。

辛夷仁 五錢 細辛去土 藁本去芦 升麻 各四錢 川芎

香白芷 各三錢 木通去節 防風 各三錢 甘草 二分

右為末每服二錢食後茶湯調服

羊肺散 治肺虛鼻塞。生瘰肉。不聞香臭。

羊肺 一具 白朮 四兩 茯苓 木通 乾薑

川芎 各一兩

右五味為細末。以水量打稀稠和勻。灌肺中。煑熟焙乾。

細研為末。每服二錢。食後米飲調下。

細辛丸 治肺寒鼻塞。清涕流出。腦冷所致。

通草 辛夷各五錢 細辛 甘遂 桂心

川芎 附子各兩

右細末蜜丸。如菽豆大。綿裹納鼻中密封。勿令氣泄。微



覺少痛。即効。

枇杷葉散 治齲鼻紅鼻

枇杷葉 乾新者佳 一兩去毛陰 梔子 五錢

右為末每服二三錢温酒調下早晨服先去左邊臨卧服去右邊効如神。

大柴胡湯治濕熱痰熱上蒸于肺鼻塞者此方主之。見寒門

齒門

夫齒雖腎之標骨之餘然其痛亦各有別痛甚而齒搖動者惡寒腰痛此腎之虛極也上下齒齲腫痛者惡熱畏風此腸胃積熱也上齒齲痛多屬胃下齒齲痛多屬大腸手

陽明大腸也故惡寒而喜熱足陽明胃也故惡熱而喜寒其人腸胃素有濕熱上發於齒齲之間適被風寒或飲冷所鬱則濕熱不得外達遂作痛也其虛痛宜補實痛宜瀉痛既不一治法亦宜通變。

約方

常歸龍胆散 治寒熱牙痛

升麻 麻黃 各一錢 生地黃 八分 龍胆草 一錢 白芷 五分

當歸 六分 黃連 一錢 草豆蔻 去壳 八分 羊脰骨 灰 五分

右為細末擦齒上立効

石膏清胃湯 治胃熱牙齲腫痛



石膏

煨一錢半

升麻

一錢

防風

八分

白芷

一錢

連翹

去心八分

黃連

一錢

荆芥

五分

羌活

五分

大黃

一錢

右水

二鍾

急火煎

一鍾

不時服

細辛

白芷

飲

治風寒

齒痛

連頭目痛

寒熱往來

。

防風

一錢

羌活

白芷

各八分

細辛

甘草

陳皮

各五分

升麻

一錢

薄荷

六分

藁本

四分

右水

二鍾

薑一片

葱白二寸

煎一鍾

不時溫服

獨活散

治牙根腫痛

川芎

獨活

各八分

羌活

薄荷

六分

細辛

荆芥

各五分

防風

羌活

各八分

薄荷

六分

細辛

荆芥

各五分

生地黄

右剉水

二鍾

煎一鍾

不時服

定痛散

治牙風疼痛

細辛

生五分

白芷

生

川烏頭

生各一兩

乳香

三錢

右為末

每少許

擦牙痛處

引涎吐之

須臾

以鹽水灌漱

一方無白芷

川烏

有全蝎

草烏

立効散

治牙齒痛

不可忍

及頭腦項背痛

微惡寒飲

大

惡熱飲

防風

一錢

升麻

七分

甘草

炙三分

細辛

二分

龍胆草

酒洗四錢

右剉水

二大盞

煎至一盞

去渣

以匙挑入口中

銜痛處

少時立止

如多惡熱飲

更加龍胆草

一錢

此方原無定



新... 據寒熱多少。臨時加減。如更惡風作痛。加草豆蔻黃連各五分。勿加龍胆草。

防風通聖散。治熱風齒痛。連頭腦痛。見風門。加減。地黄丸。

治腎虛齒痛。見火門。補中益氣湯。治胃弱齒痛。見內傷。

救苦散。治一切牙痛。及風寒蛀牙疼痛。

草烏去皮川烏去尖桂枝去梗良薑各四錢紅豆

胡椒草撥細辛各五分石膏煨官桂各三錢

右為細末。先用水漱口。將此藥末乾擦。涎出立愈。

治虫散。治大寒犯腦。牙齒疼痛。及啣風作痛。虫痛。胃經

濕熱腫痛。

麻黃去節羌活各三分黃連各一分當歸身各五分吳茱萸八分藁本

白芷各三分升麻各一分桂枝一分羊脛骨熟地黃各二分黃芪

升麻各一分桂枝一分羊脛骨熟地黃各二分

右研細末。先用溫水漱口。方以此藥擦之。

羌活防風湯。治風寒濕氣犯腦。頭項拘急。齒浮搖動。內

齟袒脫。疼痛難忍。

麻黃去根白芷各三錢羌活根一錢五分防風根三錢藁本

當歸各三錢升麻各三錢細辛根柴胡根蒼朮各五錢

桂枝各一錢草薳各一錢羊脛骨灰二錢五分

右研細末。先用溫水漱口。淨搽之。其痛立止。



腰痛門

夫腎之外候。腰脊是也。諸經之脉貫于腎。而絡于腰脊。故腎氣一虛。則腰脊便發痛矣。其痛有五。若脉按沉細。二便清利。惡寒腰痛者。此元陽不足。腎中之氣虛也。脉舉浮洪。二便結滯。煩熱腰痛者。此真陰虛極。腎中之精虛也。精不足者。補之以味。地黄丸之類是也。形不足者。補之以氣。腎氣丸之類是也。此言本藏之陰陽。更有所感不同。為病不一者。風寒温燥。皆能入客為痛。夫身重如沙墜悶。腰脊疼痛者。此感寒濕為病也。大便結滯不通。腰連季脇脹痛者。此濕熱內滯為病也。背脊連腰痛。或時痛而時止者。此風熱為病也。腎乃北方之水藏也。其所感之病。大抵寒濕多。而風熱少。治宜審其所痛之繇。或內或外。或風或濕。或實或虛。從內而發者。虛也。從外而感者。實也。虛當補益。實當行散。豈可亂乎。

約方

羌活勝濕湯 治風寒感入腰背疼痛。腿膝酸痛。遍身拘急。行履艱難。不可俛仰。

羌活 各一錢 桂枝 去皮 杜仲 炒 各五分 加皮 酒洗 各一錢  
川芎 八分 牛膝 酒洗 附子 製熟 續斷 酒炒 丹參 酒洗 各一錢  
麻黃 五分 當歸 一錢



右剉水二鍾薑二片煎一鍾不時溫服

獨活寄生湯 治腎氣虛弱喜卧濕地腰腿拘急筋骨攣

痛冷痺麻木腰痛牽脚俱痛

獨活 桑寄生 杜仲 牛膝 人參 各一錢

秦艽 白茯苓 防風 桂心 川芎 各一錢

芍藥 當歸身 地黃 二錢

右剉水二鍾生薑五片煎一鍾食前溫服

川芎肉桂湯 治寒濕久客腰痛不能轉側或血因寒滯

積痰於中致經絡不活此方神妙也

羌活 柴胡 獨活 防風 漢防已 各一錢

當歸 蒼朮 川芎 炒麴 甘草 各一錢

桃仁 去皮尖研 右剉水二鍾煎一鍾食遠服

杜絲丸 治腰痛脉大腎虛極者或遺精脚腿酸軟

杜仲 鹽水炒去 兔絲子 酒蒸晒五 龜板 酥油煨一

黃柏 酒炒 黑色 枸杞子 人乳拌一 知母 去毛炒一

五味 一兩 二錢 兩五錢 兩五錢 兩五錢

右製為末煉蜜為丸每服四錢空心淡鹽湯送下此方

不獨腰痛可服凡腎虛皆宜服也

歸鹿膏 治精虛脉大腰痛不能屈伸

當歸身 五兩酒洗 大鹿茸 五兩去毛

唯在景考腰痛 六卷八



右用酒水各八碗。放銅鍋內。陰煉成膏。不可見火。每早用五六茶匙。百沸湯調下。久服大補元陽。烏鬚黑髮。輕身延年。

八味腎氣丸。治元陽不足。陽痿腰痛。滋陰丸。治真陰不足。遺精腰痛。方俱見類中。

寄生牛膝酒。治腎氣虛。風熱客入。或寒濕相侵。腰痛不可忍。併足痿脚氣諸症。

桑寄生 二兩 牛膝 川芎 羌活 地骨皮

五加皮 各一 薏苡仁 海桐皮 各二兩 生地黃 兩八

右剉以絹袋裝裏。入好酒二十斗。浸十四日。夏天七日。

每服只用一盃。一日飲三五盃。令酒氣不輟行於經絡。

達於四肢為妙。

四物桃仁湯。治腎脉微弱。血氣俱滯。膀胱虛冷。胸中飽悶。腰間空痛。或瘀血積聚。不散作痛。皆効。

當歸 川芎 生地黃 白芍 桃仁 去皮

續斷 各二 石斛 川草薺 各一 牛膝 杜仲 各三

蘇木 兩半 羌活 各一 澤蘭花 一兩 錢 兩 各三

右剉以絹袋裝裏。用好酒四斗。浸五宿。每服二盃。日服六盃。亦要其酒氣不間斷也。脚氣服更効。

如神湯。治婦人經血不通。男子瘀血滯於腰脇間疼痛。



玄胡索 醋炒 當歸 各一錢 桂心 一錢 杜仲 二錢炒去絲

右剉酒水各一鍾煎一鍾去渣食前溫服

戊寅芝山寺施醫。一人患腰痛。經年不愈。服補腎諸藥。其痛愈劇。漸至飲食減少。骨瘦如柴。諸醫謂不治之症。求余診視。見其脉弦長而大。按之有力。小腹堅硬悶痛。當時以挑仁承氣湯與服。大便遂通。黑糞半桶。其痛立止。繼用桃仁酒服半月全痊。有問者曰。腰乃腎之府。腎既虛而腰痛。服補腎藥罔效。服下藥得愈者何也。余荅曰。此非真腰痛。乃季肋痛也。季肋屬大腸。與腎相近。凡有積熱於腸胃之間。鬱伏不得通達。亦能發痛。今與通藥。非治腎虛腰痛。乃治積熱腰痛也。

一友腰痛不可轉側。六脉散大。重取之則弦小而長。服補腎劑半年不效。有欲改濕熱治者。予以為惡血病者曰。內有惡血。可以下否。予曰。脉細未可驅逐。且用歸芪益母湯補之。然後用桃仁酒行之可也。服益母湯十劑。而痛漸減。飲食亦進。遂與桃仁酒飲一月而安。

歸芪益母湯

當歸 二錢 黃芪 錢生三 益母草 錢洗一 蘇木 八分 香附 五分

右水二鍾煎一鍾不時服

脇痛

桂枝湯 脇痛

六卷八



夫兩脇乃肝之分野。其所以發痛者。肝火盛。木氣實也。經云。肝氣實則怒。肝氣虛則恐。然脇痛善怒。小便紅赤。肝脉弦急者。實痛也。當以龍薈丸瀉其肝火。脇痛善恐。小便清利。調中順氣丸。和其肝氣。大抵暴怒傷觸。悲鬱內結。飲食失調。積痰瘀血為痛者。發於內也。寒暑不避。風寒外襲。暑熱相侵。風寒暑熱為痛者。感於外也。治內清肝火。破結氣。化痰和血為要。治外散風邪。解暑熱。辛涼順氣為主。

約方

桂枝散 治肝虛脇痛。或因驚傷所致。痛連脊骨者宜服。  
枳殼去一兩小者 桂枝五錢六

右剉為細末。每服二錢。薑棗湯調下。

勻氣散 專治肝虛脇痛

山梔子 熟地黃 川芎 細辛 桂心

白茯苓各等分

右研為末。加羊脂煎服。

沉香導氣散 治一切氣不升降。脇肋痞塞。

沉香二錢五分 人參五錢 檳榔二錢五分 紫蘇葉 白朮

烏藥 麥蘖炒 神麴 大腹皮炒 厚朴製各

薑黃 橘紅 甘草各四兩 訶子皮炮五錢 香附泡一兩

廣茂泡四兩 益母二兩 紅花四兩 京三稜二兩



右為細末每服二錢食前沸湯調服  
調中順氣丸 治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺

痛。

白豆蔻 去壳 木香 青皮 炮 京三稜 炮 各一兩

大附子 陳皮 各二 縮砂 去壳 製半夏 湯泡七次 一兩

沉水香 檳榔 各五

右為末煑麩糊為丸如桐子大每服三十九漸加六十

丸食後陳皮湯送下

薏苡丸 治脇痛如前手足枯悴。

薏苡仁 一兩 石斛 二錢 附子 五錢 牛膝 生地黃 各三

細辛 人參 枳殼 栝子仁 川芎

當歸 各五 甘草 桃仁 各一

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九酒吞一日

服二次更妙

當歸龍薈丸 治熱在兩脇寅卯甚多怒多驚屬肝病也。

當歸 枳子 黃連 黃柏 草龍胆

黃芩 各一 大黃 盧薈 青黛 各五 木香 二錢

麝香 另五分 研分

右為末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯送下

二三十丸此方不獨治脇痛如肝積發熱亦効



枳殼、黃散 治悲哀煩惱致傷肝氣。兩脇骨痛筋脉拘緊。

腰脚重滯。兩股筋急。四肢不能舉動。此藥大治脇痛之

劑也。

枳殼 先煎 四兩 細辛 桔梗 防風 川芎 各一兩

葛根 一兩 甘草 五錢

右為粗末每服四錢水一鍾半薑棗同煎至七分空心

温服

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脉弦緊此寒痛也當

以此藥下之。

大黃 八分 附子 炮 一錢 細辛 去葉 五分

右水二鍾煎八分二次温服

芎藭湯 治肺弱感冒脇下疼痛。

川芎 乾芎 各八分 桂枝 細辛 各五分 枳殼 一錢

人參 五分 芍藥 八分 麻黃 六分 防風 八分 甘草 三分

右水二鍾薑二片煎八分温服

諸疝 癰疝 狐疝

疝痛屬足厥陰肝經也。小腹亦肝經也。故疝痛與小腹痛。

同一治法。所謂疝者。畢九連小腹痛也。其痛有獨在畢九

者。有獨在小腹偏於一邊者。有畢九如升斗者。癰疝是也。

又立卧出入往來者。狐疝是也。丹溪曰。疝痛之甚者也。或



有。形。或。無。形。或。有。聲。或。無。聲。或。有。形。如。瓜。有。聲。如。蛙。者。素。問。以。下。歷。代。名。醫。皆。以。為。寒。蓋。寒。主。收。引。經。絡。得。寒。收。引。不。行。所。以。作。痛。理。固。然。也。有。履。霜。雪。踴。水。涉。水。終。身。不。病。此。者。素。無。熱。在。內。也。按。此。症。始。於。濕。熱。在。經。鬱。而。至。久。又。感。寒。氣。外。束。濕。熱。之。邪。不。得。疏。散。所。以。作。痛。若。只。作。寒。論。恐。為。未。備。或。曰。此。症。多。客。厥。陰。一。經。鬱。積。濕。熱。何。繇。而。致。予。曰。大。勞。則。火。起。於。筋。醉。飽。則。火。起。於。胃。房。勞。則。火。起。於。腎。大。怒。則。火。起。於。肝。本。經。火。積。之。久。毋。能。令。子。虛。濕。氣。便。盛。厥。陰。屬。木。係。於。肝。為。將。軍。之。官。其。性。急。速。火。性。又。暴。為。寒。所。束。宜。其。痛。亦。大。暴。也。愚。見。有。用。烏。頭。梔。子。等。分。作。湯。用。之。其。効。亦。敏。後。因。此。方。隨。症。與。形。加。減。用。之。無。有。不。應。然。濕。熱。又。須。分。多。少。而。施。治。但。濕。者。腫。多。癩。疔。是。也。又。有。挾。痛。而。發。者。當。以。參。朮。為。君。而。以。疏。導。藥。佐。之。診。其。脉。不。甚。沉。急。而。大。豁。無。力。者。是。也。然。其。痛。亦。輕。惟。覺。重。墮。牽。引。耳。

約方

丁香痲氣丸 治臍下撮急疼痛併臍下週身皆急痛小便頻數脉急洪緩瀋沉按之皆虛獨腎脉按之不急皆虛無力名曰腎疝。

當歸

茴香 各五錢  
甘草梢 五錢  
麻黃根節 一錢



丁香 五分 全蝎 十三箇 玄胡索 五錢 羌活 梢 三分  
肉桂 一錢 防已 三錢 川烏 五錢

右研末酒糊丸如桐子大每服五十九淡鹽湯送下空  
心服

玄胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒。

玄胡索 二分 苦練子 三分 肉桂 附子 各三分

甘草梢 分灸五 熟地黄 一錢 黃柏 一錢

右水四鍾煎一鍾食前服

右四方桂附治寒玄胡當歸川練茴香丁香木香和血  
調氣蓋寒症挾汚血滯氣者宜

天台烏藥散

烏藥 木香 茴香 炒 良薑 各五錢 川練子 十箇

檳榔 三錢 巴豆 粒十四 青皮 五錢

右八味先以巴豆打碎一同練子用麩炒俟黑色去巴  
豆麩為細末每服一錢温酒調下痛甚炒生薑熟酒下  
木香練子散 治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不効者服此

其効如神。

川練子 三十箇 巴豆 三十粒 同炒黃色 草薺 五錢

石菖蒲 一兩 炒 青木香 一兩 炒 荔枝核 二十枚 炒

右研末每服二錢入麝香少許空心炒茴香鹽湯調下



右以巴豆炒藥例。許學士云。大抵此疾因虛而得之。不可以虛驟補邪之所湊。其氣必虛。留而不去。其病則實矣。故必先滌去所畜之邪熱。然後補之。是以諸藥多借巴豆氣者。蓋為此也。

茴香散 治膀胱氣痛

茴香 金鈴子肉

蓬莪朮

京三稜 各一兩

甘草 五錢

右為細末。每服二錢。熱酒調下。每發痛甚。連日只二三服。立定。

沉香桂附丸 治中風虛弱。脾胃虛寒。飲食不美。氣不調。

和。退陰助陽。除臟腑積冷。心腹疼痛。脇助膨脹。腹中雷

鳴。面色不澤。手足厥逆。便利無度。又治下焦陽虛。及療

七疝痛引。小腹不可忍。腰痛不能伸。喜熱熨稍緩。

沉香 附子炮去川烏炮去乾薑炮良薑炒

官桂去皮茱萸湯洗茴香炒各

右研末。醋煮麪糊為丸。如桐子大。每服五十丸。至七八

十丸。止空心食前米飲湯下。日三次。忌物

挂枝湯。治肝氣不斂。小腹疼痛。自汗不止。見傷寒

香附散 治癩脹。用香附子不拘多少為末。每用酒一鐘。

海藻一錢。煎至半鐘。先撈海藻嚼細。用所煎酒調末二



錢服。

安息香丸

治陰氣下墜痛脹。卵核腫大。堅硬如石。痛不

可忍者。

玄胡索

炒

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去白

茴香

炒

川練子

去核

馬蔴花

各一兩五錢

木香

五錢

大戟

酒浸三宿切片焙乾三錢五分

右為細末。另將硃砂真阿魏真安息香三味各二錢五

分。用酒一鍾。醋一鍾。將硃砂阿魏安息香淘去沙石。用

酒醋各一鍾。熬成膏。再入麝香一錢。沒藥二錢五分。俱

各另研細。入前藥一同和丸。如菉豆大。每服十九。至十

五丸。空心用綿子灰調酒下。



程