

東醫寶鑑內景篇卷之三上

東醫忠勤貞亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君

許俊

教撰

五臟六腑

醫當識五臟六腑

先儒嘆世人務審天地萬物之理不知我之一身五臟六腑毛髮筋骨之

所存况醫者乎

臟腑陰陽

內經曰言人身之臟腑中陰陽則臟者為陰府者為陽肝心脾肺腎五臟皆為陰膽胃大

腸小腸膀胱三焦六腑皆為陽

臟腑異用

靈樞曰五臟者所以藏精神血氣魂魄者也六腑者所以化水穀而行津液者也。內經

曰五臟者臟精氣而不瀉也故滿而不實六腑者傳化物而不臟故實而不滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛。脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也

臟腑有合

靈樞曰肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合膽膽者中正之府

脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陰屬腎上連肺故將兩臟三焦者決瀆之官水道出焉屬膀胱是孤之府也是六腑之所與合者也

五臟通七竅

靈樞曰五臟當內閱于上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣心氣通於

舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目肝和則目

能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀矣

腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五
和則七竅作九不通六腑不和則留結爲

五臟有官

靈樞曰鼻者肺之官也肺病則喘息鼻張
者肝之官也肝病者皆青口唇者脾之官也

脾病者唇黃舌者心之官也心病者舌捲短顙
赤耳者腎之官也腎病者顙與顏黑耳焦枯

五臟有大小

靈樞曰五臟皆小者苦焦心多愁憂五臟
皆大者緩于事難使以憂五臟皆高者好

高舉措五臟皆下者好出入下五臟皆堅者無病

五臟皆脆者不離于病五臟皆端正者和利得人

心五臟皆偏傾者邪心而善盜

不可以爲人平反覆言語也

臟又有九

內經曰神臟五形臟四合爲九臟肝藏魂心
藏神脾藏意肺藏魄腎藏志是謂神藏五也

一頭角二耳目三口齒四胃中以其如器
外張虛而不屈以藏於物故曰形藏四也

腑又有六

內經曰腦髓骨脉膽女子胞此六者地氣之所生名曰奇恒之府註謂奇異於恒常之府

腸胃之長水穀之數

靈樞曰腸胃之長凡五丈八尺四寸受水穀九斗二升一合合之大

半此腸胃所受

水穀之數也

五臟中邪

黃帝問曰邪之中人臟奈何岐伯對曰愁憂恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺

其兩寒相感中外自傷故氣逆而上行有所墜墜惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脇下則

傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

五臟正經自病

難經曰正經自病者憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺悲怒氣逆上而不下

則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地強力入房則傷腎是正經自病者也

脈辨臟腑難經云何以知臟腑之病也然數者府也遲者藏也數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰

為寒故知藏府之病也

臟腑異證難經曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者而各不同其病在何臟腑然病欲得寒而欲得見人者病在腑也病欲得溫而不欲得見人者病在臟也何以言之腑者陽陽病欲得寒又欲見人臟者陰陰病欲得溫而又欲閉戶獨處惡聞人聲故以別知臟腑之病也

也○臟病者止而不移其病不離其處府病者彷彿賁響上下行流居處無常

臟腑病治有難易難經曰臟病難治腑病易治何謂也然臟病所以難治者傳其勝也腑病所以易治者傳其勝也

易治者子也臟病傳其所勝者假令心病傳肺肺傳脾脾傳腎腎傳心一臟不再傳故

言次傳者死肺病傳其子者假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母相傳周而復始故言生也。內經曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也

臟腑

相闕內經曰五臟不平六腑閉塞之所生也。五臟穿鑿論曰心與膽相通心病怔忡宜溫膽

為主膽病戰慄癲狂宜補心為主肝與大腸相通肝病宜疎通大腸大腸病宜平肝經為主脾與小腸相通脾病宜瀉小腸火小腸病宜潤脾土為主肺與膀胱相通肺病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺氣為主腎與三焦相通腎病宜調和三焦三焦病宜補腎為主此合一之妙也

五臟病間甚

內經曰大邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生

而持白得其位而起必先定五臟之脈乃可言間
甚之時死生之期也。凡病以五臟時日占病愈
甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉。○薛
曰如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘倣此
五臟死期內經曰五臟受氣於其所生傳之於其所勝
先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故
死肝受氣於心之子傳之於脾肥臑氣舍於腎旺
心之至肺而死之勝心受氣於脾傳之於肺氣舍於
肝至腎而死脾受氣於肺傳之於腎氣舍於心至
肝而死肺受氣於腎傳之於肝氣舍於脾至心而
死腎受氣於肝傳之於心氣舍於肺至脾而死此
皆逆死也一日一夜五分之
此所以占死者之早暮也

臟腑氣絕候

詳見氣門

單方 凡二十
三種

粳米

平和五臟煮白粥早晨常服暢胃氣生津液

小麥麵

和五臟可常服之

大麥

實五臟作飯作粥皆佳

蕎麥

能鍊五臟滓穢作麵作粥食之佳

黑豆

散五臟結積。水積生芽名大豆黃卷主五臟胃氣結積可煮食

胡麻

潤五臟作飯作麵常服最佳即黑荏子也

人乳

補五臟可常服之

牛肚

補五臟醋和
爛煮食之

牛髓

安五臟以酒
和服之

鹿肉

強五臟爛煮食之
亦補益五藏可常食

狗肉

安五臟和五味爛煮
鹽正調與狗肉最勝

黃雌

雞益五臟爛煮
和五味食之

雀肉

續五臟不足氣
作煎食之

蜜

安五臟補不足氣
和藥長服佳

牛乳

卽酪也補五臟
作粥常服佳

鯽魚

益五臟或煮或煎或蒸常食佳韮

蓮子

主五臟不足氣為末作粥常服其根曰藕蒸食甚補五藏韮

海松子

肥潤五臟作粥常服甚佳韮

大棗

補五臟煎湯飲之佳韮

葵菜

通五臟壅氣每月一食葵通利臟腑又是菜之主也韮

生薑

開臟腑常食不可缺也

葱白

調和臟腑煮食之佳韮

芥子

通利五臟微熬研作醬食之其嫩莖煮為茹食之亦佳韮

五臟

肝臟

肝臟圖



肝形象

肝有二大葉一小葉如木甲拚之象各有支絡
 脉居中以宣發陽和之氣魂之宮也
訥經 ○肝

有二大葉一小葉左三葉右四葉分兩如木甲拚
 之多葉也
門 ○肝重四斤四兩左三葉右四葉共

七葉主

藏魂經難

肝部位

肝主於左經。肝之系者自膈下着左脇肋上。貫膈入肺中與膈膜相連也。期門二穴肝

之募也在兩乳直下一寸半在背則肝俞在九頤下是肝之分也。

肝主時日

肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙。東方生風風生木木生酸酸生肝。肝為陰中之

少陽通於春氣經內

肝屬物類

在天為風在地為木在體為筋在臟為肝在色為蒼在音為角在聲為呼在變動為握在

竅為目在味為酸在志為怒其液為淚其榮為爪其臭為臊其卦為震成數。其穀為麻麥作其畜

為犬雞一作其蟲為毛其數為八其果

為李其葉為韭其脈為足厥陰經內

肝臟大小

肝者主為將使之候外欲知堅固視目大小

者肝高合脇免骸者肝小麓理者肝大廣胷反骸

者肝脆膺背好相得者肝端正脇骨偏舉者肝偏

傾也○肝小則臟安無脇下之病肝大則逼胃迫

咽苦膈中且脇下痛肝高則上支資切脇挽為息

賁肝下則逼胃脇下空易受邪肝堅則臟安難傷

肝脆則善病消瘴易傷肝端正則和利難傷肝偏

傾則脇下

痛也

樞

肝傷證

有所墜墮惡血留內有所大怒氣上不下積於

脇下則傷肝又曰大怒氣逆則傷肝

難

氣逆上而不

下則傷肝

肝病證

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內樞○肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒○肺傳之肝病

名曰肝痺一名曰厥脇痛出食○肝熱者色蒼而

瓜枯綱○外證善累面青善怒內證臍左有動氣

按之牢若痛其病胸脇滿悶淋漓便難轉筋有是

者肝也無是者非也經難○大骨枯槁大肉陷下胃

中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱破膈脫肉目

眶陷真臟見目不見人立死其見人者至其所不

勝之時則死註曰此肝之藏也

所不勝之時謂庚辛之月也經內

肝病虛實

肝藏血血含魂肝氣虛則恐實則怒○肝實則兩脇下痛引小腹善怒虛則目眈眈無所

見耳無所聞善恐如人將捕之震○肝藏血血有

餘則怒不足則恐經○人動則血運於諸經靜則

血歸於肝臟肝

主血海故也經

肝病間甚冬起於春○肝病者愈於丙丁丙丁不愈加

於庚辛庚辛不死持於壬癸起於甲乙
○肝病者平朝慧下晡甚夜半靜納

肝病治法

肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉
棗葵註曰肝苦急是其氣有餘也肝欲散急

食辛

以散之川芎肝虛以生薑陳皮之類補之細

也

○肝病宜食甘粳米牛肉棗葵取其自能緩急

經

○肝病宜食麻犬肉李韭皆酸取本味也

宜瀉

○肝虛宜四物湯方見清肝湯或補肝丸肝實

薈丸

○肝病禁當風經內

清肝湯

治肝經血虛有怒火白芍藥一錢半川芎當
歸各一錢柴胡八分山梔仁牡丹皮各四分

右判水

煎服

補肝丸

治肝虛即四物湯加
防風羌活蜜丸也

瀉青丸

治肝實當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活防風各等分右為末蜜丸芩實大每一丸竹

葉湯

同砂糖溫水化

下。一名涼肝丸

洗肝散

治肝實羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子炒甘草炙各一錢右剉水煎服加草龍胆一

錢尤

妙藏

當歸龍薈丸

治肝臟實熱脇痛當歸草龍膽山梔子黃連黃柏黃芩各一兩大黃蘆薈青黛

各五錢木香二錢牛麝香半錢右為

末蜜丸小豆大薑湯下二三十丸

肝絕候

足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而結於舌本也故脈不榮

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌捲卵縮則筋

先死矣日篤辛日死。厥陰終者中熱盛乾善尿

心煩實則舌捲卵上縮而終矣。○唇吻反青。○肢槩習。○縮汗出者此為肝絕也。○肝絕八日

死何以知之。面青但欲伏。眼目視而不見。人汗出如水不止。○入脈經十三

肝臟修養法

常以正月二月三月朔旦東而平坐叩齒三通吸震宮青氣入口九吞之閉氣九十

息○
養性

肝臟導引法

可正坐以兩手相重按膝下徐緩身左右各三五度又可正坐兩手拽相又翻覆向

胃三五度此能去肝家積聚風邪毒氣

單方

凡二十一種

草龍膽

益肝膽氣。○煎服治肝臟濕熱。

空青 益肝氣法木飲色青而入肝
細末水飛點服或入藥服

黃連 鎮肝去熱毒木
服煎服皆可

細辛 益肝膽煎服
末服皆可

決明子 除肝家熱助肝氣又治肝毒熱
為末服又取嫩莖葉作菜食

車前子 養肝為末服或炒煎服
又取嫩葉作羹茹佳

薺子 即薺子也主肝痛明目為末服又
取嫩根和米煮粥服能引血歸肝

覆盆子 補肝明目為末服
生食之亦可

青箱子 鎮肝主肝臟熱
毒為末服之

酸棗仁

益肝氣末服
煮服皆佳
乾

山茱萸

溫肝末服
煮服佳
乾

沙參

養肝氣煮服或
作茹常食之
乾

蒼耳子

主肝家明目煮
服末服並佳
乾

芍藥

補肝緩中損其肝者緩其中
即此也末服煮肝皆可
湯

苦參

養肝膽氣
煮服之
乾

青皮

疎肝氣不達用青皮以
疎之末服煮服皆佳
湯

木瓜

入肝絡益筋與
血煮服之
乾

小麥 養肝氣煮
飲服之


葱白 除肝邪氣煮湯
飲或取汁飲

韭 能充肝氣作
菹常食佳

李 肝病宜
食之

心 臟

心 臟 圖



心形象

心形如水敷蓮花中有九空以導引天真之氣
神之宇也訥經○心重十二兩中有七孔三毛

盛精汁三合主藏神繼○上智人心有七竅三毛

中智人心有五竅二毛下智人心有三竅一毛常

人心有二竅無毛愚人心有一竅下愚人心有一

竅其小無竅則神無出入之門○心有七孔三毛

七孔以應北斗七星三毛以應三合故心至誠則

天無不應也吠○心包絡實乃裹心之膜包于心

外故曰心包絡也衞○心形如未

開蓮花上天下下銳倒懸着肺類

心部位

心居肺下肝上吠○五臟系通於心心通五臟

於心其系上系於肺其別者自肺兩葉之中向後

通脊者腎自腎而之於膀胱與膀胱膜絡並行而

之洩尿處乃下極部分也吠○巨闕穴乃心之募

也在背則心俞在脊五傾下是心之部位也鋼

心主時曰

心主夏手少陰太陽主治其日丙丁○南方

也神之變也為陽中之太陽通於夏氣納

心屬物類

在天為熱在地為火在卦為離在體為脉在

動為憂在竅為舌在味為苦在志為喜其液為汗其榮為色其臭為焦其數為七其穀為麥一作其

畜為羊一作其其蟲為羽其果為杏其菜為薤納其脉為手少陰

心臟大小

以候鬲音即心音下音也○赤色小理者心

小麓理者心大無鬲音者心高鬲音者心短舉者心

下鬲音者心堅鬲音者心高鬲音者心脆鬲音者心

下不舉者心端正鬲音者心偏頰也○心

小則易傷以憂心大則憂不能傷心高則滿於肺

中悅而善忘同與難開以言心下則易傷於寒易
恐以言心堅則臟安守固心脆則善病消痺熱中

則探持不一無守司也標
心端正則和利難傷心偏傾

心傷證

憂愁思慮則傷心標○邪客使魂魄不安者血
氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏

合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰
者為癰陽氣衰者為狂○心傷者其人勞倦則頭

面赤而下重心中痛而自煩發熱臍
上跳其脉弦此為心臟傷所致也景仲

心病證

邪在心則病心痛喜悲時肢仆標○腎傷之心
病筋脉相引而急病名曰瘵○心熱者色赤面

絡脉溢也標○外證面赤口乾善笑內證臍上有
動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而腕有

是者心也無是者非也標○大骨枯槁大肉陷下
胃中氣滿喘息小便內痛引肩項期一月死真臟

見乃與之期曰諺曰此心之臟也期後三十日內
死纏○健忘失記驚悸不安心丙喫懷不樂皆心

血少也

心病虛實

心藏脈脈舍神心氣虛則悲實則笑不休○
心實則胃中痛脇支滿脇下痛膺背肩脾間

痛兩臂內痛心虛則胃腹大脇下與腰背相引而
痛○心藏神神有餘則笑不休神不足則悲纏

心病間甚

病在心愈在長夏長夏不愈甚於冬冬不死
持於春起於夏○心病者愈於戊己戊己不

愈加於壬癸壬癸不死持於甲乙起於丙
丁○心病者口中慧夜半甚平旦靜纏

手少陰無輸

黃帝曰手少陰之脈獨無輸何也岐伯曰
少陰者心脈也心者五臟六腑之大主也

為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則
傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪在於心者

皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰無輸也帝曰少陰無輸心不病乎岐伯曰其外經病而臟不病故獨取其經於掌

後銳骨之端也神門穴

心病治法

心苦緩急食酸以收之註曰心苦緩是心氣虛也心欲奠同急食鹹以奠之用鹹補之

甘瀉之綱○心苦緩宜五味子又心虛以炒鹽補

之心欲奠宜芒硝補之甘草瀉之是心氣實也疎

○心病宜食酸小豆大肉李非皆酸取其能收也

綱○心病宜食麥羊肉杏薤取本味也綱○心

虛宜錢氏安神丸朱砂安神丸神醒心散心實

宜瀉心湯導赤散十味導赤散綱○心病禁溫食

熱衣

綱

錢氏安神丸

補心虛硃砂水飛一兩麥門冬馬牙硝白茯苓山藥寒水石甘草各五錢龍腦

二分半右為末蜜和一兩作三
十丸每一丸砂糖水化下錢

醒心散

治心虛熱人參麥門冬五味子遠志茯苓
神生地黃石菖蒲各等分右剉水煎服

瀉心湯

治心熱黃連不拘多少為極細末每服二分
半或五分或一錢溫水調下錢黃連瀉心湯

導赤散

雖治心熱實小腸
之藥也方見下

十味導赤散

治心臟實熱口舌生瘡驚悸煩渴黃連
黃芩麥門冬半夏地骨皮茯苓神赤芍藥

木通生地黃甘草各五分右剉
作一貼薑五片水煎服人

一方

黃連生用為君佐官桂少許煎百沸湯
入蜜空心服能使心腎交於頃刻明

心絕候

手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不
流則色不澤故其面黑如漆紫者血先死壬日

篤癸日死靈。○形體如烟煤直視搖頭者此為心絕。神。○心絕一月死。何以知之。肩息回視立死。一

云二日死。蘇

心臟修養法

常以四月五月朔望清旦面南端坐叩金梁九漱。玄泉三靜思。注想吸離宮赤色氣。

入口三吞之。閉氣三十息。養生書

心臟導引法

可正坐以兩手作拳。用力左右互相等。各六度。又可正坐以一手按腕上一手向下。

拓空如重石。又以兩手相又以腳踏手中各五六度。能去心胷間風邪諸疾。閉氣為之。良久閉目三

嚥津三叩

齒而已

單方

凡二十種

朱砂

法火故色赤而入心能鎮養心神
心熱非此不除水飛入藥或點服
湯草本

赤石脂

養心氣火煨水飛
入藥或末服之

金箔銀箔

皆鎮心入藥服之
鞞

黃丹

鎮心安神水飛
入藥用之
鞞

石菖蒲

開心孔益心智令聰明
或末服或煮服皆佳
鞞

麥門冬

清心熱補心氣不足
去心煎服最佳
鞞

遠志

定心志去心或末
服或煎服並佳
鞞

生地黃

補心血又治心熱
又十服或煎服
鞞

黃連

瀉心熱能去心中惡血或煎服或作末點服亦可草

茯神

開心末服煎服皆佳韃

龜甲

補心龜靈物故補心甚驗作末點服良心

蓮子

助心安心能通心氣末服煎服皆佳一方蓮子一斤帶黑皮炒極爛搗為細末其黑皮不可一

則去之甘草微炒一兩為末每服二錢沸鹽湯點服之大能補心虛益氣

杏

心病宜食韃

小麥

養心氣心病宜食韃

犀角

鎮心神作末入藥或水磨取汁服韃

雞子

鎮心又白除心下
伏熱生吞一枚

苦菜

安心神可
常食之

赤小豆

開心孔煮粥服
或煮汁飲之

竹葉

涼心除心煩
煎飲之

薄荷汁

去心熱
飲之

連翹


除心家客熱
煮湯飲之

梔子

去心中客熱又去心中懊
懷煩躁可煮湯飲之

脾臟

脾臟圖



脾形象

脾形象馬蹄內包胃脘象土形也經絡之氣交歸于中以營運真靈之氣意之舍也訥經○脾

形扁似馬蹄又如刀鎌狀○脾重三斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五臟主藏意

化水穀也胃主受納脾主消磨
綱 脾者俛也在胃下俛助胃氣主

脾部位 脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口即中脘穴也

脾居中央中脘一寸二分上去心三寸六分下去腎三寸六分中間一寸二分名曰黃庭在天

為太陽在地為太陰在人為中黃祖氣道家以脾

為黃庭黃者中央之色庭者四方之中也脾居一

身之中央故曰黃庭脾與胃以膜相連耳

○章門穴乃脾之募也直臍傍季肋端在背則脾俞在十一傾下是脾之部位也

脾主時曰脾主長夏足太陰陽明主治其曰戊巳○中央生濕濕生土土生甘甘生脾○脾屬土主

長夏及四季

脾屬物類 在天為濕在地為土在卦為坤在體為肉在

動為噦在竅為口在味為甘在志為思其液為涎

牛其蟲為保其氣為棗其棗

為葵經內其脈為胃太陰經內

脾臟大小

脾者主為衛使之運糧視唇舌好惡以知吉
凶。黃色小理者脾小。龜理者脾大。揭唇者

脾高唇下縱者脾下唇堅者脾堅唇大而不堅者

脾脆唇上下好者脾端正唇偏舉者脾偏傾也。

脾小則臟安難傷於邪脾大則苦湊眇而痛不能

疾行脾高則眇引季脇而痛脾下則下加于大腸

臟苦受邪脾堅則藏安難傷脾脆則善病消瘴

脾端正則和利難傷脾偏傾則善滿善脹也。

脾傷證

有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾。
飲食勞倦則傷脾。脾為諫議大夫蓋飲食

人之大慾心所欲食而脾不能

化則不敢食故名為諫議也。

脾病證

邪在脾胃則病。別肉痛陽氣有餘陰氣不足則
熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹

痛慳。外證面黃善噫善思善味內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠

惰嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也難。○

大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不便內痛引

肩項身熱脫肉破爛真臟見十月之內死註曰此

脾之臟也期後三百日內死。肝傳之脾病名曰

脾風發瘴腹中熱煩心出黃

○脾熱者色黃而肉蠕動經內

脾病虛實

脾藏營營舍意脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹溼洩不利註曰溼大便也洩小

便也經。○脾實則身重善飢肉痿足不收行善癢

脚下痛虛則腹滿腸鳴殮泄食不化。○脾有餘則

腹脹溼洩不利不

足則四肢不用經內

脾病間甚

病在脾愈在經內秋秋不愈甚於春春不死持於夏起於長夏。○脾病者愈在庚辛庚辛不愈

加於甲乙甲乙不死持於丙丁起於戊
己○脾病者日昃慧日出甚下晡靜

脾病治法

脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩
之納○脾苦濕是有餘宜白朮脾欲緩是不

足宜甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連○脾虛

以甘草大棗之類補之脾實以枳實瀉之○脾虛

宜用益黃散補脾湯脾實宜用瀉黃散調胃承氣

湯方親也飴也寒○脾病宜食鹹大豆豕肉果藿皆鹹

味也取也所也勝也經○脾病宜食粳米牛肉棗葵也

味也乙經○脾病禁溫食飽食濕地濡衣也

益黃散

治脾臟虛冷腹痛泄利陳皮一兩青皮訶子
肉甘草炙各五錢丁香一錢右為末每二錢

或三錢水煎服或剉五錢作

一貼亦可一名補脾散海藏

補脾湯

治脾臟虛冷嘔吐泄瀉飲食不消麥芽炒甘
草炙各一兩半人參白茯苓草果乾薑炮各

一兩厚朴陳皮白朮各七錢
半右剉五錢水煎服三因

瀉黃散

一名瀉脾散 藿香甘草各一錢石膏末八分防風六分右

剉作一貼蜜酒拌

微炒水煎服藏海

脾絕候

足大陰氣絕則脉不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脉不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿人

中滿則唇反唇反者肉先死甲曰篤乙曰死○太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面

赤不逆則上下不通上下不通則面黑皮毛焦而終矣靈樞○脾絕十二日死五云何以知之口冷足

腫腹熱臙脹泄利不覺出時無度經脉環口黧黑柔汗發黃者此為脾絕景仲

脾臟修養法

常以季夏之月朔旦并四季之末十八日
旭旦正坐中宮禁氣五息鳴天鼓十二通

吸坤宮之黃氣入口十二
吞之閉氣五十息謹性

脾臟導引法

可大坐伸一脚屈一脚以兩手放後反掣

力虎視各三五度能去

脾臟積聚風邪喜食脾

單方

凡二十四種

雄黃

益脾。雄黃法土故色黃而大脾水飛用乾

蒼朮

健脾燥濕米泔浸一宿剉乾末服煎服皆佳乾
○山精丸蒼朮泔浸爲末神麴糊和丸服研

白朮

補脾服法同蒼朮研

升麻

脾痺非此不除剉水煎服之研

縮砂

溫脾胃末服煎服並佳

藿香

助脾溫脾煎服末服皆佳

丁香

溫脾治脾冷氣不和煎服末服並佳

通草

療脾疔常欲眠水煎服

厚朴

溫脾行脾氣水煎服之

橘皮

主脾不能消穀煎服末服並佳

大棗

養脾安中煮湯飲之又煮棗取肉和脾胃丸藥尤佳

乾柿

健脾氣和酥蜜煎食主脾虛薄食不消化

飴糖

健脾即黑糖也
可常食之

稷米

脾之穀也
可常食

粟米

益脾作粥飯常食
佳諸梁亦可

陳倉米

煖脾宜作
湯飲之

糯米

味甘脾之穀脾病
宜食作湯飲之

大麥牙

補脾消食煮服
末服皆佳


神麩

健脾消食末服
煮服皆佳

蜜

養脾氣和脾葯最佳
和粥飲可常服之

肺臟圖



肺臟

葵

能充脾氣作羹
作菹食之佳韃

鯔魚

補脾此魚亦食坭
故與鯔魚同功韃

鯽魚

補脾此魚食坭故有補脾養胃
之功作羹作蒸作膾皆佳韃

牛肉

養脾氣牛肚力佳
煮爛宜常服之韃

肺形象

肺之形似人有耳六葉兩小葉中有二十四孔
行列以分布諸臟清濁之氣主臟魄訥經○肺

重三斤三兩六葉兩耳共八葉難經○肺形似
人肩又如磬懸於五臟之上而為華蓋門入

肺部位

肺臟於右網○肺系有二一系上通喉嚨其中
與心系相通一系自心入於肺兩大葉之間曲

折向後門入○中府二次肺之募也在孔直上三肋
間在背則肺俞在第三頷下是肺之部位也銅

肺主時日

肺主秋手太陰陽明主治其日庚辛○西方
生燥燥生金金生辛辛生肺○肺為陽中之

太陰通於
秋氣經內

肺屬物類

肺在天為燥在地為金在卦為兌在體為皮
毛在臟為肺在色為白在音為商在聲為哭

在變動為咳在竅為鼻在味為辛在志為憂其脉
為手太陰其液為涕其榮為毛其臭為腥其數為

九其穀爲稻其畜爲雞馬一作其蟲爲介其

果爲李其菜爲韭納其經爲手太陰經

肺臟大小

五臟六腑肺爲之蓋○白色小理者肺小麤

者肺下好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚

者肺端正脇偏疎者肺偏傾也○肺小則少飲不

病喘喝肺大則多飲善病胃痺喉痺逆氣肺高則

上氣肩息咳肺下則氣賁迫肺善脇下痛肺堅則

不病咳上氣肺脆則苦病消痺易傷肺端

正則和利難傷肺偏傾則腎偏痛也經

肺傷證

形寒飲冷則傷肺經○肺傷者其人勞倦則咳

之肺傷氣壅所致經○熱在上焦因咳爲肺痿其

人咳口中及有濁唾涎沫寸口脈數此爲肺痿也

若口中辟辟燥咳咳則腎中隱

肺病證

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀脇膈

足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗑乾○肺熱者

色白而毛敗綱○外證面白善噫悲愁不樂欲笑

內證臍右有動氣按之牢若痛其病喘咳洒淅寒

熱綱○大骨枯槁大肉陷下胷中氣滿喘息不使

其氣動形期六月死真藏脈見乃予之期日此肺

之臟也一百八十日內死綱

肺病虛實

肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝胸憑仰

則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音綱

○肺臟氣氣有餘則喘咳上氣氣不足則息利少

氣

肺病間甚

病在肺愈在冬冬不愈甚於夏夏不死持於長夏起於秋。肺病者愈於壬癸壬癸不愈

加於丙丁丙丁不死持於戊己起於庚辛。肺病者下晡慧日中甚夜半靜納

肺病治法

肺苦氣上逆急食苦以泄之。註曰肺氣上逆是其氣有餘也肺欲收急食酸以收之用酸

補之辛瀉之納。○肺苦氣上逆宜訶子皮一作黃

芩肺欲收宜白芍藥以酸補宜五味子以辛瀉宜

桑白皮疎。○肺病宜食黍雞肉桃葱取本味也乙卯

經。○肺病宜食麥羊肉杏薤取苦能下氣納。○肺

病禁寒飲食寒衣納。○肺虛宜補肺獨

參湯勑。○肺寔宜瀉白散人參瀉湯

補肺散

一名阿膠散治肺虛阿膠珠二錢鼠粘子糯米炒各一錢二分馬兜鈴炒七分甘草炒五

分杏仁麩炒九箇右剉作

一貼水煎服雞林米

瀉白散

一名瀉肺散治肺實桑白皮地骨皮各二錢

母枯梗梔子麥門冬生地黃亦可

人參瀉肺湯

治肺實熱黃芩梔子枳殼薄荷連翹各

右剉作一貼

水煎服

肺絕候

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮

節傷皮節傷則瓜枯毛折毛折者則毛先死丙日

篤丁日死○肺絕三日死何以知之口張鼻虛張

髮潤喘不休者此為肺絕

髮潤喘不休者此為肺絕

肺臟修養法

常以七月八月九月朔望旭旦西面坐鳴天鼓七次玉漿三然後瞑目正心吸兌宮

白氣入口七石之
閉氣七十息謹姓

肺臟導引法

可正坐以兩手據地縮身曲脊向上五舉
去肺家風邪積勞亦可反拳挺脊上左右

各三五度此法去胃臆間風毒閉氣
爲之良久閉目嚙液三叩齒爲止嚙

單方

凡二十
二種

雲母

補肺○雲母法金故色白
而入肺水飛爲粉服之韌

人參

補肺中陽氣○主上氣喘鳴肩息氣欲絕此將
肺絕之候人參膏獨參湯或作末以五六服韌

天門冬

保定肺氣煮服或作
末服酒浸服皆佳韌

麥門冬

治肺熱○麥門冬人參五味子爲
生脈散治肺中火氣飲色湯

五味子

收肺氣作茶
作丸常服

沙參

益肺氣能補肺中陰氣
煮服作齏常服佳

片黃芩

治肺熱丸服煮
服末服皆佳

紫菀

益肺清肺煮
服之佳

貝母

潤肺作末和砂糖作丸
含化或煮服之並佳

桔梗

理肺氣又治肺熱氣
促末服煮服並佳

馬兜鈴

補肺去熱治喘
急煮服之

桑白皮

瀉肺去肺中水
氣煮服之

葶藶子

治肺癆喘急取子炒五錢大棗五枚同煎服

橘皮

剉肺氣治肺逆上或煮服或末服鞣

枳殼

泄肺氣或煮或未服鞣

胡桃

斂肺止喘常服之錫

烏梅

收肺氣作茶飲之湯

杏仁

治肺潤燥散結作湯服甚佳鞣

桃

肺病宜食鞣

黍米

肺病宜食作飯食鞣

牛乳


潤肺養肺作酪
粥常食之佳

雞子白

潤肺清熱
生吞之

腎臟

腎臟圖



腎形象

腎臟有二形如缸豆相並而曲附於脊筋外有
脂裏裏白表黑主藏精納○腎有兩枚重各九

兩共一斤二兩左屬水而右屬火男以左腎為主
女以右腎為主○腎形如缸豆相並如環曲貼脊

膈膜中募
心系通而為一所謂坎北離南水火相感者也

腎臟有二

臟各有一腎獨有兩者何也然腎兩者非皆

所舍元氣之所係也男子以藏精女子以繫胞故

知腎有二也難命門非正臟三焦非正腑也

腎部位

腎與臍相對與腰相應○腰者腎之外候○腎

也在腰中挾脊季肋下一寸八分在背則腎俞在

脊十四頤下兩傍命門次在脊十四頤下與臍相

對乃脊之部位也人頤命門之系即心包絡其經

手厥陰其府三焦其部分在心下橫膈膜之上豎

斜膈膜之下與橫膜相粘其處黃脂漫包者心也

其漫指之外有細筋膜如絲與心肺相連者此包

絡也

門

腎主時日

腎主冬足少陰太陽主泊其日壬癸○北方

少陰通於冬氣納○腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已呶

腎屬物類

腎在天為寒在地為水在卦為坎在體為骨

變動為慄在竅為耳在味為鹹在志為恐其脈為足少陰其液為唾其榮為髮其臭為腐其數為六其穀為豆其畜為兔其蟲為鱗其果為栗其菜為藿納其經足少陰納

腎臟大小

腎者主為外使之遠聽視耳好惡以知其性○黑色小理者腎小龕理者腎大耳高者腎

高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也○腎小則藏安難傷腎大則善病腰痛易傷於邪腎高則苦背以俛仰腎下則腰尻痛或為

狐疝腎堅
端正則和利
腎偏傾則苦腰尻痛也
腎脆則善病消瘴腎

腎傷證

有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎
傷腎
○久坐濕地強力入水則傷腎
難

腎病證

邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹
脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩
脾傳之

腎病名曰疝瘦少腹窵熱而痛出自白一名曰蠱註
曰出自謂溲出白液也
○腎熱者色黑而齒枯
○

大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真臟來
見期一歲死見其真臟乃與之期日註曰此腎之

臟也期後三百六十五日內死
○外證面黑善
恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣

小腹急痛泄如下
重足脛寒而逆
難

腎病虛實

腎氣虛則厥實則脹
○腎實則腹大脛腫喘
咳身重寢汗出憎風虛則胃中病大腹小復

痛清厥意不樂○腎
虛則心懸如飢善恐○腎

腎病問甚

病在腎愈在春春不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬○腎病者愈於甲乙甲乙不

愈甚於戊己戊己不死持於庚辛起於壬

癸○腎病者夜半慧四季甚下補靜經內

腎病治法

腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之

納○腎苦燥宜知母黃栢腎欲堅宜知母補以黃

栢瀉以澤瀉又曰腎虛宜熟地黃○腎病宜食

辛黃黍雞肉桃葱取其辛潤也○腎病宜食大

豆豕肉栗藿取本味也○腎病禁犯焮煖熱

食溫灸衣○腎本無實不可瀉錢氏只有補腎

地黃元無瀉腎之藥○左腎屬水水不足則陰

虛宜補腎丸六味地黃丸滋陰降火湯右腎屬火

火不足則陽虛宜八味丸加減八味丸溫腎散

補腎丸

治腎水不足陰虛龜板酒炙四兩知母黃柏並酒浸炒各三兩乾姜一兩右為末粥丸梧

子大空心鹽湯下五七十九丸

六味地黃丸

治同上熟地黃八兩山藥山茱萸各四兩澤瀉牡丹皮白茯苓各三兩右為末

蜜丸梧子大溫酒鹽湯空心吞下五七十九丸

血虛陰衰熟地黃為君精滑山茱萸為君小便或

多或少或赤或白茯苓為君小便淋澀澤瀉為君

心氣不足牡丹皮為君皮膚乾澀山藥為君

滋陰降火湯

治腎水不足陰虛火動白芍藥一錢三分當歸一錢二分熟地黃天門冬麥門

冬白朮各一錢生地黃八分陳皮七分知母黃柏

並蜜水炒甘草炙各五分右剉作一貼姜三片棗

二枚水

煎服

八味丸

治命門火不足陽虛熟地黃八兩山藥山茱萸各四兩牡丹皮白茯苓澤瀉各三兩肉桂

附子炮各一兩右為末蜜丸梧子大空心溫酒或

鹽湯下五七十丸若加五味子名曰腎氣丸

又治老年水火俱虧腎氣虛乏下元冷憊

腰痛腳軟夜多旋尿面黑口乾耳焦枯咽

加減八味丸

專補腎水兼補命門火熟地黃二兩山藥微炒山茱萸各一兩澤瀉酒蒸牡丹

皮白茯苓各八錢五味子畧炒一兩半肉桂五錢

右為末蜜丸梧子大五更初未言語時鹽湯或溫

酒下五七十丸又晚間空腹再服

或以此材細剉煎服名曰加減八味湯

溫腎散

治腎與命門虛寒腰脊重痛熟地黃一錢半牛膝肉蓯蓉五味子巴戟麥門冬甘草炙各

八分茯苓神乾薑杜仲炒各五分右剉作

一貼水煎服或為末溫酒調二錢服心

兩臟同一腑

小便清利脈沉遲是冷氣歸腎小便赤澀脈沉數是熱氣歸命門是腎與命門脈同

者謂其所受之病同歸於膀胱一府也

腎絕候

少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉塞上下不通而終矣

也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能着也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死戊曰篤己曰死
失狂言目反直視者此為腎絕也脈浮而洪身汗如油喘不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者此為命門絕也
髀曰腎絕四日死何以知之齒為暴枯面為正黑目中黃色腰中欲折自汗如流水一云人中平十日死

腎臟修養法

常以十月十一月十二月朔望施旦北面平坐鳴金梁七飲玉漿三吸玄宮黑色氣

人口五吞之閉
氣六十息譚

腎臟導引法

亦可正坐以兩手上從耳左右引脇三五度

亦可以足前後踰左右各十數度能去腰腎膀胱

開風邪積聚○擦腎俞穴法臨臥時坐於床垂

足解衣閉氣舌抵上腭司示頂仍提縮穀道以手

摩擦兩腎俞穴各一百二十次以多為妙畢叩齒

臥專治腎元虛冷

小便滑數老

單方

凡二十
三種

磁石

養益腎氣腎虛耳聾目昏皆用之。磁石
法水故色黑而入腎為末水飛大藥用韃

陽起石

補腎氣治腎氣虛冷
為末水飛入藥用韃

鹽接藥入腎和鹽炒入
鹽服之皆此意也

兔絲子

補腎中陽氣治腎冷酒浸
爲末和酒服或入藥用

肉蓯蓉

命門相火不足以此
補之酒浸蒸入藥

五味子

煖水臟補腎述類象形
者也或丸服或煮服

熟地黃

假火力蒸九數故能補腎精八味
丸以此爲君天一所生之源也

知母

補腎陰不足治腎熱鹽
水炒或丸服或煮服

栝子仁

潤澤腎臟治腎冷或
丸服或入藥服

杜仲

治腎冷又治腎勞腰脚冷
痛或者煮服或丸服炒用

沉香

補命門不足為未入藥水磨取汁服之

鞞

山茱萸

補腎添精煖水臟澁精氣或丸服或煮服

鞞

牡蠣

補腎煖為粉入丸藥用其肉亦可煮食

鞞

桑螵蛸

主腎衰漏精酒洗略蒸入丸藥

鞞

覆盆子

益腎臟又煖腎酒浸焙入丸藥用或末服之

鞞

破故紙

溫補腎臟能引氣歸腎炒為末入丸藥或末服

鞞

鹿茸

補腎虛治腰腎虛冷酥灸為末入丸藥或作末服

鞞

鹿角膠

主腎臟氣衰虛損炒為珠作末服

鞞

臙胸臍

益腎主腎精衰損多色成勞瘁能煖腎酒浸灸令香為末服或入丸藥用之

狗陰莖

補腎主陰痿不起令強熱火灸為末服或入丸藥

牛腎

補腎可常食之

粟

補腎腎病宜食宜煨常食之

黑豆

入鹽煮能補腎宜常食之

膽腑

膽形象

其色玄其形如懸瓠附肝之短葉間重三兩作兩三銖成精汁三合無出入竅

外視物而得明為清淨之府能通於眼目

膽部位

膽主腋兩腋缺盆皆膽之絡也。日月二穴膽之募在乳下二肋端期門下五分在背則膽俞

在脊第十節下兩傍此膽之部位也。

膽主決斷

膽生於金。金主武故為中正之官決斷出焉。人稟剛正果斷直而無疑無私者膽之氣正

也。

膽外候

目下裏大其膽乃橫。肝應爪爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪濡色

赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多紋者膽結也。

膽傷證

膽者敢也驚怕則膽傷矣。面青脫色膽受怖也。

膽病證

膽病者善太息口苦嘔有苦沫心中澹澹恐如人將捕之嗑中訶訶然數唾。痛悶左邊五

肋之中血瘀生癭馬刀又膽候咽門故
熱壅則生瘡腫痛門○膽病多寒熱門

膽病虛實

膽虛則恐懼不能獨臥膽實則怒門○膽實則怒而勇敢膽虛則善恐而不敢也○膽虛則

不眠膽實則多睡門

膽病治法

膽虛宜仁熟散膽實宜半夏湯○小柴胡湯治寒熱往來乃少陽經主藥也門○水煎澄

清溫服則能入膽門

仁熟散

治膽虛恐畏不能獨臥栝子仁熟地黃各一錢人參枳殼五味子桂心山茱萸甘菊茯神

枸杞子各七分半右剉作一貼水煎服或為末溫酒調二錢服之門

煎服或為末溫酒調二錢服之門

半夏湯

治膽實熱煩悶生地黃酸棗仁炒各五錢半門

錢黍米一合右判每

一人

膽絕候

膽為足少陽其終者耳聾百節皆縱目寰暗禪

白乃死矣。○膽絕七日

經脈

膽腑導引法

可平坐合兩脚掌仰頭以兩手挽脚腕起

舉身勞腰脊三五度能

去膽家風毒邪氣

單方

凡五種

柴胡

治膽病寒熱足少陽經主藥也又曰

膽痺非此不能除到水煎澄清飲湯

乾地黄

助心膽氣或煎服或丸服之

黃連 益膽或煎服或丸服或未服乾

細辛 添膽氣水煎服之

白百合 定服水煎服之

胃腑

胃形象 胃長一尺六寸胃紆曲屈伸之長三尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀二斗五升其中之穀

常留二斗水一斗五升 ○胃重二斤十四兩

○胃之為市註曰水穀所歸五味皆入如市雜故

為市也 ○胃號太倉俗呼為壯受水穀三斗五

升平人曰再圖一行二升半一日五升七日則二

斗五升而水穀盡矣故平人不飲食七日而死者胃中水穀津液俱盡也

胃部

咽門至胃長一尺六寸胃居心蔽骨與臍之中
上下各四寸繼○中腕一穴胃之募也在心蔽

骨與臍之中上下各四寸在背則胃俞
在脊第十二頷下兩傍胃之部位也人

胃為水穀之海

人之所受氣者穀也穀之所注者胃也
胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣

者天下也胃之所出氣血者經隧也經隧者五臟
六腑之大絡也○胃者五臟六腑之海也水穀皆
入於胃臟腑皆稟氣於胃五味各走其所喜酸先
走肝苦先走心甘先走脾辛先走肺鹹先走腎穀
氣津瀉已行榮衛大通乃化糟粕以次傳下靈○
胃為水穀之海脾為消化之器水入於經其血乃
成穀入於胃脉道乃行血不可不養衛不可不溫
血溫衛和得盡天年呶○飲食入胃則胃實而腸
虛食下則腸實而胃虛胃滿則腸虛腸滿則
胃虛更虛更實故氣得上下而無病矣樞

胃經
卷之三
上內景篇
三

胃腑大小

過則胃大不及則胃小

八寸

胃外候

胃為之海廣骸大頸張胃五穀乃容○脾應肉

者胃不堅肉脘不稱身者胃下者下腕約不

利也肉脘六堅者胃緩肉脘無小裸累者胃急肉

脘多少裸累者胃結胃結者上

脘約不利也後肉如塊翻

胃傷證

飲食自倍腸胃乃傷納○胃傷之證不思飲食

嗜臥常多

自利疎

胃病證

胃病者腹臙脹胃脘當心而痛上支兩脇膈噎

不通飲食不下○飲食不下膈塞不通邪在胃

腕也○胃中寒則手魚際之絡脉多赤○面熱者是陽明病兩附之

上脉豎豎者足陽
明病此胃脉也

胃病虛實

胃脉實則脹虛則泄
綱○胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺則能食而

肥脾胃俱虛則不能食而瘦或
少食而肥雖肥而四肢不舉

胃病治法

人之根本也水食為命蓋脾胃屬土主納水穀
人之根本也○五味淡薄令人神爽氣清

翻○胃病治法調其飲食適其寒溫澄心息慮從
容以待真氣之復常也

宜異功散補中益氣湯
不進飲食宜養胃進食湯

平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脹痛嘔噦惡心
噫氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜臥常多自利或

發霍亂及五噎入痞膈氣反胃等症蒼朮二錢陳
皮一錢四分厚朴一錢甘草六分右剉作一貼薑

夏... 監... 卷三十一 內景篇 看

三片棗二枚水煎服或為末取二錢薑棗湯點服
嗽○平胃散決烈耗散之劑實非補胃之藥能瀉
土氣之敦阜使之平耳用之而胃
氣和平則便止不可常用也調

異功散

治脾胃虛弱不思飲食腹痛自利人參白朮
白茯苓陳皮甘草各一錢右剉作一貼薑三

片棗二枚
同煎服調

養胃進食湯

治脾胃虛弱飲食不進面黃肌瘦胃膈
痞悶食不消化或噫氣吞酸蒼朮一錢

人參白朮各一錢陳皮厚朴白茯苓甘草炙各七
分神麴炒麥芽炒各五分右剉作一貼姜三片棗

二枚同煎服或為末蜜和作
凡梧子大每二錢米飲下調

胃絕候

胃為足陽明其終者口目動作善驚妄言色黃
其上下經盛不仁則終矣調○胃絕五日死何

以知之脊痛腰中
重不可反覆

單方

凡二十
七種

石膏

除胃熱專瀉胃中之火
研水煎一兩服或水飛二錢和水服

葛根

開胃下食解酒毒
水煎服或水飛澄取粉和水服

人參

補胃氣能開胃消食
煎服末服皆佳

白豆蔻

主胃冷能消磨水穀
研水煎服或末服皆佳

蒼朮

強胃去胃中濕
或煎或丸或末服皆佳

白朮

補胃服如
上法

大豆

除胃中熱痺。○大豆黃卷理胃氣。或者煮或末和丸服。二錢。韮。

丁香

治胃寒能溫胃。或者煮或末服。韮。

縮砂

溫胃消化水穀。煎服末服皆佳。韮。

乾薑

開胃溫胃煎服末服丸服並佳。韮。

生薑

開胃煎湯服之。韮。

大麥

平胃氣開胃作飯作粥皆可。常食。○大麥芽開胃消食。韮。

粳米

補胃氣作白粥可常服。韮。

稷米

利胃作飯作粥並佳。韮。

青梁米

主胃虛作飯
飲之佳

牛肚

補胃煮爛食之
除胃中熱可常服之
○酪粥

羊肉

開胃煮爛食之作羹
亦可○羊肚補胃

黃狗肉

補胃厚腸胃煮爛
食或作脯炙食

黃雌雞

補胃煮爛
作羹食

鯽魚

平胃氣補胃作蒸作
羹作膾食並佳

鱸魚

開胃作羹作
膾並佳

石首魚

開胃可
常食

芋

開胃又寬腸胃
作羹常食佳

橘皮

開胃作茶飲之或
作末姜湯點服

大棗

平胃氣厚腸
胃可常食

乾柿

開胃厚腸胃
可常食之

韭

除胃中熱
可常食

小腸腑

小腸形象

小腸長三丈一尺廣二寸半徑八分分之少
半重二斤十四兩當臍左迴疊積十六匝盛

穀二斗四升水六升

三合合之太半

小腸部位

小腸候附脊當臍左環迴周叠積而下也○胃之下口即小腸上口各日幽門臍上一寸

水分穴即小腸下口也也○關元一穴在臍下三寸小腸之募也在背則小腸俞在脊十八領下兩

傍此小腸部位也也

小腸傳受

凡胃中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳入於小腸上口自小腸下口泌別清濁水液入

膀胱上口滓穢入大腸上口難經曰小腸

大腸會謂之闕門言由關闕分隔也也

小腸外候

唇厚人中長以候小腸○心應脈皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈薄者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈衝

薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈衝小者小腸小而短諸陽經脈皆多紆屈者小腸結

也

小腸病證

中氣不足腸為之苦鳴。○小腸病者小腹疼痛。腰脊控睪而痛。燐蠅時窘之候。當耳前熱。○

小腸控睪引腰脊上衝心邪在小腸也。○小腸

為泄。○小腸有氣則小腹痛。小腸有血則小便

澁。小腸有熱

則莖中痛。○

小腸病治法

小腸者心之府也。有病宜通利用導。赤散赤茯苓湯。

導赤散

治小腸熱小便不利。生地黃木通甘草。各一錢。右剉入青竹葉七片同煎服。○

赤茯苓湯

治小腸熱面赤多汗小便不利。木通赤茯苓。各一錢。右剉作一貼。入

生薑五片同煎服。○

小腸絕候。如乾麻不得屈伸。自汗不止。○

小腸絕候

如乾麻不得屈伸。何以知之。髮直。○

單方

凡九種

澤瀉

通小腸利小便
水煎服之

木通

通小腸下水
水煎服之

瞿麥

通心經利小腸為
最要水煎服之

連翹

通小腸水
煎服之

茯苓

治小腸不利水
煎服或本服

黑豆

煮汁飲除腸中
酒飲之

梔子

療小腸熱水
煎服之

本草綱目卷之九 內景篇

冬瓜汁

利小腸可飲之

煮葵汁

滑小腸作茹食之

大腸腑

大腸形象

大腸一名廻腸又名廣腸長二丈一尺二寸廣八寸徑二寸之太半重二斤十二兩右

廻疊積十六曲盛穀二斗水七升半難○腸胃自所入至所出長六丈四寸四分廻曲環反三十二

曲也凡腸胃合受水穀八斗七升六合八分合之一難

大腸部位

大腸後附脊以受小腸滓穢當臍右廻疊積上下辟大大腸下口連於肛門天樞二

穴大腸之募也在臍傍各三寸在背則大腸

俞在脊第十六傾下兩傍此大腸部位也

大小腸連系

大小腸之系自膈下與脊膂連心腎膀胱絡大小腸與膀胱其細脉之中

乃氣血津液流走之道也

大腸外候

鼻隧以長以候大腸。肺主皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相

離者大腸結。天樞以下至橫骨長六寸半過則

迴腸廣大不濡則狹短

大腸病證

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬月重感于寒則泄當臍而痛不能久立。腹痛腸鳴氣

上衝胃喘不能久立邪在大腸也。腸中寒則腸鳴殭泄腸中熱則出黃如糜。大腸小腸為泄

腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發殭泄。大腸有寒者多驚澹有熱者便腸垢。腸虛

則鳴又寒氣相搏則爲腸鳴

大腸病治法

黃帝問曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯對曰調

此者飲食衣服亦欲適寒溫寒無淒淒暑無出汗飲食熱無灼灼寒無滄滄寒溫適中故氣將持乃不致邪辟也

○大腸熱宜瀉白湯大腸寒宜實腸散

瀉白湯

治大腸實熱臍腹痛腹脹不通生地黄二錢赤茯苓芒硝各一錢陳皮竹茹黃芩梔子黃

柏各五分右剉作一貼薑

三片棗二枚水煎服

實腸散

治大腸虛寒腹痛泄瀉厚朴肉豆蔻煨訶子皮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢木香甘

草炙各五分右剉作一貼

姜三片棗二枚水煎服

大腸絕候
大腸絕不治何以知之
泄利無度利絕則死

單方
凡二十四種

訶子皮
澁腸止泄或煎或末服

黃狗頭骨
止泄痢能固大腸滑脫灸黃為末米飲調服或作丸服

五倍子
治腸虛泄利能澁腸固脫為末和水服或丸服

石榴殼
澁腸止泄或煎服或末服

陳倉米
澁腸胃又調味作飯作粥作飲服

粟米粳
實大腸和水服之

東醫雜錄
卷三十一內景篇
四

烏梅

飲之 澁腸作茶

椽實

厚腸胃 澁腸為末和米
飲服之 或丸服皆佳 鞞

牡蠣粉

澁大小腸 取末和
米飲服 或丸服 鞞

郁李仁

治腸中結氣 為末和水服 鞞

大黃

利大小腸 煎服
丸服皆佳 鞞

續隨子

利大小腸 為末和水服 或丸服之 鞞

桑白皮

利大小腸 煎飲之 鞞

梔子

療大小腸大熱 水煎服 或為丸點服之 鞞

桃花

利大小腸花
落時拾取
和麵作燒餅
食之

脂麻油

即香油也
通大小腸
單服
之或和水
荏粥服之

麻仁

治大腸風熱
大便結澁
水研取汁
作粥服

水芹

利大小腸
取莖葉搗
絞汁
飲之或作
菹茹常食
之

絲蓴

補大小腸
虛氣
羹作齏
食之佳

葱白

通大小腸
取汁飲
之並佳

冬瓜

利大小腸
作羹
常食之

菘菜

通利腸胃
作羹
常食

牛乳

利大腸作粥常服
或生飲之亦佳

童尿

利大腸和姜汁或和
甘草末少許飲之

膀胱腑

膀胱形象

膀胱以虛受水為津液之府有上口而無下
口得氣海之氣施化則溲便注瀉氣海之氣

不足則秘澁不通
廣九寸盛尿九升九合重九兩二銖

膀胱部位

膀胱在小腹之內
在臍下四寸在脊則膀胱俞在脊第十九

下兩傍此膀胱部位也

膀胱傳受

水液自小腸泌別汁滲入膀胱之中
而為尿以泄出也

府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中類纂曰膀胱者胞之室也

膀胱外候

鼻孔在外膀胱漏泄腎應骨蜜理厚皮者三焦膀胱厚理薄皮者三焦膀胱薄疎

急毫毛美而麤者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱

也

膀胱病證

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩上熱若脉陷及足小指外廉脛

踝後皆熱膀胱不利為癰不約為遺尿

膀胱病者熱結不焦小腹苦滿胞轉小便不利令

人發狂冷則濕痰上溢而為多唾小便淋漓或遺尿

膀胱病治法

膀胱虛則小便不禁宜既濟丸加減入味湯倍山茱萸加烏藥益智仁破故紙腎臟

實則小便不通宜益元散
子湯○五苓散膀胱主藥也

既濟丸

治膀胱虛小便不禁
肉蓯蓉酒洗當歸熟地黃各

五錢黃柏知母並鹽炒牡蠣煨山茱萸酒蒸去核
各三錢五味子一錢右為末酒麩糊和丸梧子大

空心鹽湯下百丸

葵子丸

治膀胱實熱小便不通
葵子赤茯苓猪苓枳實瞿麥滑石木通黃芩車前子甘草各一錢

右剉作一貼姜五片同煎服

膀胱絕候

遺尿狂言日反直視此為膀胱絕也○膀胱之脈為足太陽其終也戴眼反抗瘕瘕其色

白絕汗乃出絕汗出則死矣

單方 凡十種

澤瀉

利膀胱熱宜通水道水煎服

茴香

溫膀胱去冷氣或炒為末點服或煎服

防已

去膀胱熱剉水煎服之

石韋

治膀胱熱滿水煎服之

地膚子

主膀胱熱通小便或水煎服或為末服

瞿麥

逐膀胱邪道通小便水煎服之

栝子仁

去膀胱冷膿宿水或未服或丸服皆佳

本草綱目

卷三十一 內景篇

七

威靈仙

去膀胱宿膿惡水
或末服或煎服

郁李仁

治膀胱急痛為
末服或丸服

青橘皮

除膀胱留熱停水
或煎服或末服

黃柏

瀉膀胱之熱利下竅
或煎服或丸服

烏藥

主膀胱腎間冷痛或
煎服或為末點服

椒目

主膀胱急或末
服或為丸服

猪腎

通利膀胱又補膀胱水
煮並汁服猪胞尤佳

吳茱萸

能煖膀胱水
煎服之

昆布

療膀胱急妨下水氣切細咽入葱白
三莖煮爛下姜椒鹽末調和服之

魚膾

除膀胱水以姜
醋蒜齏食之

三焦腑

三焦形象

上焦如霧中焦如漚下焦如瀆
出陽氣溫於皮膚分肉之間若霧露之漑焉

故曰上焦如霧。中焦主變化水穀之味其精微
上注於肺化而爲血行於經隧以榮五臟周身故
曰中焦如漚。下焦主通利溲便以時傳下出而
不納開通秘塞故曰下焦如瀆。三焦指腔子
而言包含乎腸胃之總司也。胃中育膜之上曰上
焦育膜之下胃之上曰中焦臍之下曰下焦總名
曰三焦

焦

三焦部位

上焦者在心下下膈在胃上口主納而不出其治在臍中玉堂欲下十六分直兩乳間

陷者是○中焦者在胃中脘欲不上不下主腐熟

水穀其治在膈傍○下焦者在臍下當膀胱上口

主分別清濁主出而不納以傳導也其治在臍下

一寸經○頭至心為上焦心至臍為中焦臍至足

為下焦經○三焦之府在氣衝欲氣衝乃陰陽道

路足陽明之所發主腐熟水穀之氣三焦發用貫

通十二經絡往來上下營運氣血是知氣衝為三

焦行氣之府也經○上中下三焦通為一氣衛於

身也三焦非正府

也無形而有用疎

三焦傳受

上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胃中走腋循大陰之分而行還至陽明上至舌下

陽明常與榮俱行太陽二十五度行於陰亦二五度為一周而復大會於手太陰命曰衛氣也

○中焦亦病胃中出上焦之後此所受氣者必精粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而爲血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣○下焦者別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常並居於胃中成糟粕而俱下於大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉○上焦如霧者氣下焦如瀆者血也中焦者氣血之分也竦○心肺若無上焦何以宗主榮衛脾胃若無中焦何以腐熟水穀肝腎若無下焦何以疎泄津液無形而有用主持諸氣三焦者水穀之道路氣之所終始也門

三焦外候

鼻柱中央起三焦乃約樞○三焦外候詳見膀胱府

三焦病證

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急温則水留卽爲脹○小腹痛腫不得小便邪

在三焦約也靈樞○上焦如霧霧不散則為喘滿此

出而不納也中焦如漚漚不利則為留飲留飲不

散久為中滿此上不能納下不能出也下焦如瀆

瀆不利則為腫滿此上納而下不出也藏海○下焦

溢為水納○三焦為丙丁之府

故其發也為無根之相火賦

三焦病治法

內經曰三焦者決瀆之官水道出焉蓋三焦為上中下水穀之道路其病宜通利大

小便○宜用枳殼丸木

香檳榔丸二和散賦觀

枳殼丸

治三焦約大小便不通枳殼二兩陳皮一兩

生用一半炒熟擣取頭末一兩半餘不用

右為末蜜丸梧子大姜湯下三五十九劑

木香檳榔丸

疎導三焦快氣潤腸半夏麴皂角酥炙去皮弦子郁李仁去殼另末各二兩木

香板榔枳殼杏仁青皮各一兩右爲末別以皂角
四兩侵漿水搓揉熬膏去滓入蜜少許和丸梧子

大空心姜湯下

五七十九疴

單方

凡十
三種

黃芪

補三焦實衛氣上中下內
外三焦之藥也水煎服湯液

燕覆子

除三焦客熱取
熟者食之鞞

牛髓

平三焦以
酒和服鞞

益智仁

安三焦去服
丸服並佳鞞

脂麻油

下三焦熱毒氣
單取飲之鞞

甜瓜 通三焦間壅塞
氣熟者食之 韎

人參 補上焦元氣煎服
末服丸服並佳 湯

黃狗肉 實下焦煮爛和
五味食之 韎

鶉肉 同酥煎食偏合
人下焦肥 韎

青橘 治下焦冷氣煎
服末服並佳 韎

藕 蓮根也蒸食
實下焦 韎

猪腸 補下焦虛竭煮爛
食或作羹食之 韎

絲蓴 安下焦作
羹食之 韎

東醫寶鑑內景篇卷之三上終



東醫寶鑑內景篇卷之三下

東醫忠勤貞亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君

訥

奉

教撰

胞

胞形象

胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生化之原非五行也

非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也。內經曰胞者藏於陰而象於地名曰奇恆之府註曰奇異於恆常之六府也

○此胞非膀胱中盛尿之胞也

胞部位

婦人胎之所居名曰子宮亦曰胞門竦○胞一名丹田一名開元欲在臍下三寸方圓四寸着

脊梁兩腎之中央赤是也左青右白上黃下黑一寸法三光四寸法四時五色法五行兩腎間名大

胞為血室

衝脈任脈皆起於胞中上循腹裏為經絡之

海而貯其血氣亦名大中極言取人身之上下四面最為中也。胞一名子宮胞有寒則無子。神

衝脈盛月事以時下故有子。註曰癸謂壬癸北方

水干名也任脈衝脈皆奇經脈也衝任流通經血

漸盈應時而下天真之氣降與之從事故云天癸

也然衝為血海任主胞胎二者相資故能有子所

以謂之月事者平和之氣常以三旬而一見也故

愆期者謂之有病。頰。血室者血之所居也榮衛

停止之所經脈流會之處衝脈是矣。衝脈為血

海諸經朝會男子則運而行之女子則停而止之

男既運行故無積而不滿女既停止故有積而能

滿滿者以時而益謂之信。卽月水也。以象月盈則

虧也

脈法

脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子不利為可否者此為居經三月一來。少陰脈微而遲微則無

精遲則陰中寒澁則血不來此為居經三月一來

經。婦人漏下赤白日下血數升脈急疾者死遲

者生。婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊

實數者死。寸關調如故而尺脈絕不至者月

水不利。尺脈來而斷絕者月水不利。肝脈沉

主月水不利。尺脈滑血氣實也婦人經脈不利

。脈來至狀如琴絃若小腹痛主月水不利

孔竅生瘡。帶下之脈宜遲滑忌浮虛。經

經行有法

婦人年二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲性魯鈍通行則陰陽和合始能生子

行年十四歲當下二十歲不行命如風燭有疾發

則死間有不死百中無一亦令一生多病未嘗一

日安裕然有四季行亦可又有一年一次者亦不

甚佳或一生不循正道而行者晚年有僻疾則難

治效

月候形色

經水者陰血也。陰必從陽，故稟火色也。血為氣之配，氣熱則熱，氣寒則寒，氣升則升，氣降則降。氣凝則凝，氣滯則滯，氣清則清，氣濁則濁。往往見有成塊者，氣之凝也；將行而痛者，氣之滯也；行後作痛者，氣血俱虛也；色淡者亦虛也；而有水渾之也，錯經妄行者，氣之亂也；紫者氣之熱也，黑者熱之甚也。今人但見其紫，有黑者作痛者，成塊者，率指為風冷而行溫熱之劑，禍不旋踵矣。心主血，故以色紅為正，月候雖不對期，而色正者易調。

和血治法

經色紫者風也，四物湯。妨靨加防風。白芷、荆芥。黑者熱甚也，成塊色紫黑者血熱也，四物湯加黃芩、黃連、香附子。淡白者虛也，芎歸湯。妨靨加人參、黃芪、白芍、藥香、附子。淡者有水渾。

之也二陳湯痲飢加川芎當歸一云色淡者

俱虛宜八物湯虧類如烟塵水者如屋漏水

如豆汁者或帶黃者濕痰也二陳湯加秦艽防風

蒼朮一云如黑豆汁者四物湯加芩連○成塊色

不變者氣滯也四物湯加香附子玄胡索祗殼

陳皮○通用百子附歸丸嬾規琥珀調經丸

琥珀調經丸

治胞冷無子能令經正香附米一升分作二包用童尿米醋各浸九日加淨熟

艾四兩拌勻再加醋五碗入炒鍋內同煮乾為度

入川芎當歸白芍藥熟地黃生乾地黃沒藥各二

兩琥珀一兩右為末醋糊和丸梧

子大每百丸空心艾醋湯下臥

月候不調

婦人經水少不如前者何也師曰曾經下利若汗出小便利亡其津液故今經水反少也

設經下多於前者有所苦因當言恐大便難身復

無汗也經○月候不調之由或前或後或多或少

調血治法

治經水或前或後或多或少或逾月不至或不調當以四物湯爲主治

凡行後作痛者虛也少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者滯而挾熱也。月候不調之中有兼疼痛者有兼發熱者其不調之中有趨前者有退後者則趨前爲熱退後爲虛也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛者爲血積經後爲血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時爲血虛有積經行爲血虛有熱。不調當以四物湯爲主治。臨經行腹痛此血澁故也宜清熱調血湯又四物湯加立胡索苦練根蓬朮香附子桃仁紅花黃連。經行後腹痛乃虛中有熱八物湯加減服。先期而來乃氣血俱熱宜清經四物湯又四物湯加柴胡黃芩黃連。過期不來是血虛宜通經四物湯又四物湯。

加黃芪陳皮升麻人參。○月候不調通用者。

附丸墨附丸四製香附丸七製香附丸。

調經散

一名溫經湯治月候不調麥門冬二錢當歸一錢半人參半夏製白芍藥川芎牡丹皮各

一錢阿膠珠甘草炙各七分半吳茱萸肉桂各五

分右剉作一貼薑三片水煎服。○千金調經湯

治同上當歸川芎白芍藥各一錢麥門冬半夏各

七分人參阿膠珠牡丹皮吳茱萸肉桂各五分甘

草三分右剉

服如上法。

清熱調血湯

治經水將來腹中陣痛乃氣血俱實也當歸川芎白芍藥生乾地黃黃連香附

子桃仁紅花蓬朮玄胡索牡丹皮

各七分右剉作一貼水煎服。

醫鑿

清經四物湯

治經水不及期而來乃血虛有熱當歸一錢半生乾地黃條芩香附子各一錢

白芍藥黃連薑汁炒各八分川芎阿膠珠黃柏知母各五分艾葉甘草各三分右剉作一貼煎服

通經四物湯

治經水過期不行乃血虛有寒當歸一錢半熟地黃白芍藥香附子蓬朮蘓木

各一錢木通八分川芎肉桂甘草各五分紅花二分桃仁二十箇右剉作一貼空心水煎服

煮附丸

治經候不調臍腹疼痛面色萎黃飲食減少或崩漏帶下香附子擦去毛好醋煮半日焙

為末醋糊和丸梧子大米飲下五七十丸○一名香附丸又名醋附丸治婢妾氣鬱經多不調

墨附丸

治婦人經水不調久無子四製香附子一斤蒸熟艾四兩用醋一碗煮至乾入石臼內擣

爛捏作餅子於新瓦上焙乾入白茯苓當歸人參川芎熟地黃京墨火煨紅醋淬各一兩水香且錢

右為末醋糊和丸梧子大

溫酒吞下七八十九丸

四製香附丸

治月候不調能調和經脈香附米一斤分作四製○一用鹽水加薑汁浸煮略

炒主降痰○一用米醋浸煮略炒主補血○一用

山梔仁四兩同炒去梔主散鬱○一用童便洗過

不炒主降火○右為末入川芎當歸各一兩同為

末酒麩糊和丸梧子大每五七十九丸隨證作湯使

吞下鹽○入門香附米一斤分四包用酒醋童便

鹽水各浸七日焙乾擣末醋糊和丸鹽酒吞下

七製香附丸

治月候不調結成癥瘕或骨蒸發熱香附米十四兩分七包○一包同當歸二

兩酒浸○二包同蓬朮二兩童便浸○三包同牡

丹皮艾葉各一兩米泔浸○四包同烏藥二兩米

泔浸○五包用川芎玄胡索各一兩水浸○六包

同三稜柴胡各一兩醋浸○七包同紅花烏梅各

一兩鹽水浸○右各浸春夏三秋七冬十日晒

乾只取香附為末以浸藥水打糊和丸梧子大臨

血閉

月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中
 今氣上迫肺心氣不得不通故月事不來也經內○
 小腸移熱於大腸為伏瘕為沉註曰血澁不利則
 月事沉滯而不行經曰二陽之病發心脾
 有不得隱曲女子不月蓋衝任為經絡之海與手
 太陽小腸手少陰心為表裏衝任氣盛則血依時
 下若憂思傷心則不能生血脾者心之子脾失所
 養則食少絕生化之源經閉不調矣須知心為氣
 血之主脾胃為氣血之本也經閉不行有三
 一者胃弱形瘦氣血衰津液不生而致經水斷絕
 名曰血枯經絕此中焦胃熱結也○二者心包脈
 洪數時見躁作大小便不利而經水閉絕乃血海
 乾枯此下焦胞脈熱結也○三者或因勞心火
 上行月事不來者胞脈閉也此上焦心肝肺熱結

也。疎。○世有室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭故神色先散月水先閉目心病不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽矣

通血治法

胞脈閉月事不來先服降心火之劑宜三和湯玉燭散次服五補元虧後以衛生湯補

脾養血。○二陽之病月事不來先瀉心火血自下亦用上藥潔。○氣上迫肺月事不來宜導痰降火

則心氣下通而月事來宜通經湯研。○先賢治血

閉之法皆主於補血瀉火補血者四物湯瀉火者

調胃承氣湯即玉燭散也彌。○胃弱血枯經斷宜

補中益氣湯觔。○加川芎生地黃天花粉。○正半

產後失血多經閉宜十全大補湯方。○規虛勞。○濕

痰粘任經閉者導痰湯勸。○加川芎當歸黃連不

可服地黃丸。○室女勞心血閉宜栢子仁丸澤蘭

湯煇。○氣血盛實經血過閉者宜萬痛丸血極膏

門入○血海疼痛宜烏藥湯疎○血閉通用增味四
物湯導經丸瑞金散六合湯○脾胃鬱火耗血不
通宜歸脾湯規肝脾鬱怒
月水不通宜加味歸脾湯娘

三和湯

治熱結血閉生乾地黃白芍藥川芎當歸連
翹大黃樸硝薄荷黃芩梔子甘草各七分左右

剉作

一貼水煎服此方乃集四

物湯調胃承氣湯涼膈散三方也

玉燭散

治月候凝滯不通漸成癥瘕當歸白芍藥川
芎熟地黃大黃芒硝甘草各一錢右剉作一

貼水煎服大便
泄者不可用研

衛生湯

補脾養血黃芪二錢當歸白芍藥甘
草各一錢右剉作一貼水煎服素丸

通經湯

治月閉當歸川芎白芍藥生乾地黃大黃官
桂厚樸枳殼枳實黃芩蘓木紅花各七分左右

剉作一貼入烏梅一箇薑三片棗二枚水煎服
○心氣不得下通故月事不來宜用黃連厚朴之
類導痰降火則月事來矣
此藥是也宜加黃連七分

栝子仁丸

治勞心月閉澤蘭二兩栝子仁炒另研牛
膝酒炒卷栝各一兩右爲末蜜丸梧子大

空心米飲下

一七十九

澤蘭湯

治同下澤蘭葉二錢當歸白芍藥炒
甘草各一錢右剉作一貼水煎服

萬痛丸

治月經瘀閉臍腹疼痛乾漆碎炒令烟盡牛
膝酒浸一宿焙乾各一兩右爲末入生地黃

汁一升盛銀器內慢火熬成膏丸如梧子大每
服二三十丸空心米飲下

血極膏

治月閉不通大黃爲末醋熬成膏丸如雞頭
太子黃燐每一丸熱酒和開臨臥溫服大便

利一二行後紅脈自下是婦人之仙藥也加當歸

頭一名單大黃膏麟。一方治月閉不通服補藥

無效危篤者大黃酒蒸九次晒四兩血竭沒藥各

五錢右末水丸以四物湯煎水下七八十九丸

烏藥湯

治婦人血海疼痛香附子二錢烏藥一錢半
當歸一錢木香甘草各五分右剉水煎服

導經丸

治經閉不通腰腹疼痛大黃二兩當歸川芎
白芍藥官桂桃仁甘草各一兩血竭二錢半

紅花一錢斑貓糯米同炒二十箇

右末蜜丸梧子大酒下三十九丸

瑞金散

治月經不行血氣刺痛薑黃一錢半牡丹皮
蓬朮紅花當歸赤芍藥川芎玄胡索官桂各

七分右剉作一貼水

一盞酒半盞煎服

六合湯

治月經不行結塊疼痛四物湯
加蓬朮官桂各等分剉煎服

加味歸脾湯

治肝膽怒鬱月經不通即歸脾湯加柴胡山梔仁各一錢右剉水煎服之

室女月經不行

女子十四歲衝任脈盛而血自下若過期不通則宜紅花當歸散血極膏坊見

三神丸牡丹皮湯通經丸或四物湯坊見
加蓬朮桃仁牡丹皮玄胡索紅花酒焙

紅花當歸散

治室女月經不通或積瘀血腰腹疼痛赤芍藥二兩劉寄奴一兩二錢半紫葳

當歸尾牛膝蘓木甘草各五錢白芷桂心紅花各

三錢半右為末酒調二錢服紅花酒下尤佳

峽

三神丸

治室女經候不調腹痛橘紅二兩玄胡索醋製當歸酒炒各一兩右為末酒糊和丸梧子

大艾醋湯

下百九切

牡丹皮湯

治室女經閉咳嗽發熱當歸牡丹皮各一錢半白芍藥生乾地黄陳皮白木香附子

各一錢川芎柴胡黃芩各七分甘草四分右剉作一貼水煎服之翻

通經丸

治室女月候不通或成血瘕桂心青皮大黃乾薑川椒蓬朮乾漆炒當歸桃仁紅花各五

錢右為細末先取二兩和醋熬膏乃八餘未和勻作丸梧子大醋湯下五七十九丸馱

血結成瘕

衝脈任脈能起於胞中為血之海血澁不行則成瘕作痛○任脈為病男子為七疝女子

為瘕聚纏○月事不行血結成瘕宜歸朮破瘕湯增味四物湯四物調經湯立效散地黃通經元無

極丸桃仁煎

歸朮破瘕湯

治月經不通腹中有積塊疼痛香附子醋炒一錢半三稜蓬朮並醋煮赤芍藥

白芍藥當歸尾青皮各一錢烏藥七分紅花蘇木官桂各五分右剉作一貼入酒少許水煎服雙

增味四物湯

治血痲疼痛四物湯料入三稜蓬朮並醋炒乾漆炒官桂各一錢右剉煎服

四物調經湯

治經閉有積塊動痛香附醋炒一錢當歸川芎白芍藥酒炒柴胡黃芩枳殼各

七分熟地黃陳皮白朮三稜蓬朮並醋炒白芷

香鹽水炒玄胡索各五分青皮縮砂紅花甘草各

三分右剉作一貼入生薑

三片葱白三莖水煎服

立效散

治經年積血腹中常痛青皮陳皮烏藥乾薑香附子蓬朮三稜各五分右剉醋煮焙乾為

末空心陳皮煎

湯調下二錢

地黃通經丸

治血痲如盃在臍下作痛熟地黃二兩

十箇右為末蜜丸梧子大

空心溫酒下七八十丸

無極丸

治經閉有血塊苦痛錦紋大黃四兩一兩酒

煮一兩醋煮一兩童便煮一兩鹽水煮各七次右合一處又七蒸七晒為末用當歸熟地黃各一兩半濃煎汁煮糊和丸梧子大紅花湯下三十

九鬮

千金桃仁煎

治血瘀血積經候不通桃仁大黃朴硝各二兩蟲五錢右為末好醋二升半

銀石器中慢火煎取一升半下桃仁大黃蟲攪千下次下朴硝更熟攪良久出之丸如梧子大前一曰不吃晚飯五更初温酒吞下五丸取下惡物末下再服見鮮血即止藥娘

血枯

黃帝曰有病胷脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事漸

少不來也治之以烏賊丸內治血
枯宜烏賊骨丸八物湯方覲爐勞

烏賊骨丸

烏賊魚骨藺茹各等分右為末雀卵不拘
數和丸小豆大每十九丸煎鯉魚湯吞下日

三服壓以美饍類○血枯經閉

四物湯方覲加桃仁紅花研

血崩血漏

內經曰陰虛陽搏謂之崩註曰陰脈不足陽
脈盛搏則內崩而血流下也○悲哀太甚則

胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數澁血
也研○蓋悲哀則心系急肺布葉舉而上焦不通
榮衛不散熱氣在中故胞絡絕而陽氣內鼓動發
則心下崩數澁血也心下崩謂心包內崩而下血
也研○非時血下淋瀝不止謂之漏下忽然暴下
若山崩然謂之崩中研○崩漏不止有三一者脾
胃虛損下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏下
止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶脈沉細

疾數或沉弦洪大其熱明矣或腰痛或臍下痛宜
大補脾胃而升舉血氣○二者或富貴奪勢或先
富後貧心氣不足其火大熾旺於血脈之中又飲
食失節其容顏似不病者此心病者不行於診其
經水不時而下或適來適斷或暴下不止當先說
惡死之言令心不動以大補氣血之藥舉養脾胃
復加鎮墜心火之藥補陰瀉陽經自止矣
○三者悲哀太甚則胞絡絕云云見上疎

崩漏治法

血崩乃經血錯亂淖溢妄行遽止則便有積
瘀凝成窠白不止則又恐昏暈必先服五靈

脂末銘一錢溫酒調下其性能行血止血然後

月五積散勦加防風荆芥入醋煎服一二匙後

再服五靈脂散去故生新如再不止乃用五灰十

灰丸散勦○悲哀太甚而崩漏宜備金散四製

香附丸坊見○經行犯房損傷衝任經血暴下宜

過經湯坊見○熱下迫而為崩漏其色紫黑腐

原书缺页

原书缺页

半右爲末酒糊和丸梧子
大白湯下五七十九門入

開鬱四物湯

治崩漏多因心氣所使而下故貴奪勢
先富後貧皆是也香附米炒當歸身白

芍藥酒炒熟地黃白朮各一錢川芎黃芪蒲黃炒
地榆人參各五錢升麻三分右剉作一貼煎服衞

升陽調經湯

治內傷中氣下陷暴崩不止柴胡羌活
蒼朮黃芪各一錢當歸升麻防風藜蘆本

甘草各七分蔓荊子五分獨活三分
右剉作一貼水煎服以飯壓之門入

益胃升陽湯

治血塊暴下并水泄俱作是前後二陰
有形血脫竭於下也血脫益氣占聖人

之法此陽生陰
長之義也助

升陽除濕湯

治崩漏不止因脾胃虛而心包乘之故
血漏而下黃芪蒼朮羌活各一錢柴胡

升麻防風藁本甘草炙各七分蔓荊子五分
獨活當歸各三分右剉作一貼水煎服棘

柴胡調經湯

治同上蒼朮一錢半柴胡一錢羌活獨
活藁本升麻各七分葛根當歸甘草各

五分紅花二分右剉作一貼水煎服棘○已上四
方皆升舉之劑先服益胃升陽湯不止却服後二
方乃大舉大升助春夏一
濕之久陷下之至治也綱

伏龍肝散

治衝任經虛崩漏不止臍腹冷痛川芎艾
葉各一錢半伏龍肝一錢赤石脂麥門冬

各七分當歸乾薑熟地黃肉桂甘草各五分右剉
作一貼入棗二枚煎服或為末米飲調二錢服臥

丁香膠艾湯

治經漏不止氣弱困倦此中氣虛弱下
陷之甚蒼朮白朮當歸白芍藥各一錢

二分阿膠珠七分川芎丁香各五分熟地

黃白芍藥各四分右剉作一貼水煎服棘

當歸芍藥湯

治經漏不止氣弱困倦此中氣虛弱下陷之甚蒼朮白朮當歸白芍藥各一錢

半黃芪一錢陳皮熟地黃各五分炙甘草生地

黃各三分柴胡二分右剉作一貼水煎服疎

奇效四物湯

治血崩神效四物湯加阿膠珠艾葉黃芩共七錢右剉作一貼薑五片煎服稠

如聖散

止血崩棕櫚烏枚各一兩乾薑一兩半右並燒存性為末每二錢烏枚湯酒調下空心研

立效散

治血崩當歸蓮花藥白棉子紅花茅花各一兩右剉紙包鹽泥固濟火煨存性為末入麝

香少許每二錢溫酒調下空心疎

酒調下空心疎

金生活血湯

治崩漏太多昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴

損氣血豈能久活今當補而升舉之以助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽

赤白帶下

脾傳之腎病名曰疝瘕小腹寃熱而痛出白

白濁之類也納○任脉為病女子帶下瘕聚註曰

任脉自胞上過帶脉貫於臍上故為帶下帶脉起

于季肋章門欲似束帶狀今濕熱寃結不散故為

病也寃者結也屈也屈帶而病熱不散也○赤者

熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結於脉

故津液漏溢是為赤白帶下臍下痛陰中綿綿而

下也○小腹寃熱結於任脉自胞上而過帶脉

出於大小腸之分洩出白液淋瀝以下故曰帶下

與赤白濁一般但不痛耳○婦人帶下是第一

等病令人不產育宜急治之扁鵲過邯鄲聞貴婦

以補手足厥陰之不足白芍藥升麻各一錢防風

羌活獨活柴胡當歸身葛根甘草各七分藁本川

芎各五分生地黃熟地黃各四分蔓荊子細

辛各三分紅花一分右剉作一貼水煎服煉

人所以專為帶下醫也。婦人帶下，脈浮惡寒，漏下者，不治。

帶下治法

帶與漏俱是胃中痰積，流下滲入膀胱，出於大小腸，宜升提之。甚者上必用吐，不用二陳。

湯藥，鯁加蒼白朮升麻柴胡或蒼栲樗皮丸。婦人月事不調，暮則發熱，小腹裏急，手掌煩熱，唇口乾燥，何也？師曰：此病屬帶下，何以故？曾經半產，瘀血在小腹，不去，何以知之？其證唇乾燥，故知之。溫經湯，坊見，主之。帶下是濕熱為病，赤屬血，白屬氣，主治燥濕為先。赤白帶宜伏龍肝散。坊見苦練丸，白芍藥散。肥人白帶是濕痰，宜蒼栲樗皮丸，瘦人是熱，宜芩栲樗皮丸，通用補經固真湯，白欽元補宮丸。四神丸清白散。久帶下，陽氣虛極，下流白滑如涕，腥臭多悲，不樂，宜酒煮當歸丸。固真丸，桂附湯。孕婦白帶宜芩朮栲樗皮丸。室女帶下宜琥珀朱砂丸。帶下必須斷厚。

味

蒼栢樗皮丸

治肥人白帶是濕痰蒼朮黃栢樗根白皮海石半夏製南星炮川芎香附子乾

薑各等分右為末醋糊和丸梧子大白

湯下五七十九丸夏月去乾薑代滑石

苦練丸

治熱人大小腸為赤白帶下最妙苦練子碎酒浸茴香炒當歸各等分右為末酒糊和丸

梧子大每服三五十

丸空心温酒下

白芍藥散

治赤白帶久不止白芍藥二兩乾薑五錢右各炒黃色為末米飲調下二錢日二

芩栢樗皮丸

治瘦人帶下是熱黃芩黃栢樗根白皮滑石川芎海石青黛當歸白芍藥各等

分右為末醋糊和丸梧子

大白湯下五七十九丸

補經固真湯

治白帶脈訣曰崩申日久為白帶漏下多時骨髓枯言始病血崩久則血少復

亡其陽故白滑之物下流不止血海將枯也乾薑細末人參各二錢郁李仁泥柴胡甘草灸陳皮不去白黃芩生各一錢白葵花七朶右剉除黃芩以水二盞先煎藥至一盞七分再入黃芩煎至一盞

空心熱服以美膳壓之棘

白斂元

治衝任虛寒帶下純白鹿茸燎去毛醋蒸焙二兩白斂金毛狗脊各一兩右為末艾煎醋

湯打糯米糊和丸梧子大空心温酒下五七十九得

補宮丸

治白帶及白淫鹿角霜白茯苓白芷白朮烏賊魚骨白薇白芍藥牡蠣粉山藥各等分右

為末糊丸梧子大米飲下五十丸心

四神丸 治白帶香附米八兩以酒醋鹽水童便各浸二兩過三日乃出炒蒼朮四兩米泔浸牡蠣

粉炒縮砂炒樗根白皮蜜水炒各二兩右為末以

黃米煮飯和丸梧子大空心酒下五七十九丸

清白散

治白帶當歸川芎白芍藥生地黃酒洗黃柏鹽水炒貝母樗根白皮酒炒各一錢乾薑炒

黑甘草各五分右剉作

一貼薑三片水煎服

酒煮當歸丸

治白帶長流不止腰以下如在冰雪中面自青肌肉消瘦此上中下三陽真

氣俱虛也當歸一兩良薑附子炮各七錢茴香五

錢右剉以酒一盞半同煮至酒盡焙乾乃入炒

黃鹽全蝎各三錢柴胡二錢炙甘草川練子丁香

木香升麻各一錢玄胡四錢右同為細末酒麩

糊和丸梧子大空心

醋湯下五七十九丸

SHINA

固真丸

治白帶久不止臍腹冷痛乾薑四兩龍骨當歸各二兩柴胡白石脂各一兩黃栢白芍藥

各五錢右爲末麩糊和丸梧子大白湯下二三十丸以飯壓下

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒之證附子炮三錢肉桂一錢黃栢知母各五分右剉作一貼

水煎服

芩朮檮皮丸

治孕婦白帶黃芩白朮各三錢檮皮白芍藥山茱萸各二錢半白芷黃連

各一錢黃栢一錢右爲末酒糊和丸梧子大白湯下五十丸孕婦帶下專是濕熱也

琥珀硃砂丸

治室女經水初下一時驚悸或感風冷以致經水止而卽患帶下琥珀木香當歸沒藥各四錢乳香二錢麝香硃砂各二分

半右爲末水丸芡實大每一丸温温磨服

黃如爛瓜傷腎則黑如衄血○所下五色各應

五臟五藏俱虛五色併下是皆血之為病也○

五色帶下宜胃風湯坊覲五積散勑覲去麻黃加

荆芥穗伏龍肝散坊見溫清飲地榆散香附散

溫清飲

治崩漏不止五色相雜面黃腹痛

見

地榆散

治漏下五色黃瘦虛竭地榆三兩剉醋一升煮十餘沸空心熱服一合呷

香附散

治五色崩漏香附子去毛搗碎醋煮半日焙為末每二錢米飲調下空心神効軒

寒入血崩

客於血室血凝不行所以作痛宜桂枝桃仁

湯濟陰

桂枝桃仁湯

桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十箇右剉作一貼入

生薑三片棗二枚水煎温服
服法○瑞金散亦良
坊見

熱入血室

婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室宜用柴胡

破瘀湯或

調經湯

柴胡破瘀湯

治熱入血室及蓄血證柴胡二錢黃芩半夏赤芍藥當歸生地黃各一錢桃仁

五靈脂甘草各五分右

剉作一貼水煎服

調經湯

治熱入血室柴胡生地黄各一錢半夏人參川芎甘草各五

當歸黃芩各一錢半夏人參川芎甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

海分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服
藏○此方乃小柴胡湯與四物湯合劑也

經斷復行

婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止宜參小柴胡湯與四物湯合劑也

苓心丸

治婦人天癸過後復行或漏下不止條黃芩二兩泔浸或醋浸一日炙乾又浸又炙如此

七次為末醋糊和丸梧子大每七十九丸空心温酒送下日二服端

子芩丸

治同上條黃芩四兩剉醋浸透紙裏煨七次當歸酒洗香附米醋炒各二兩右為末醋糊

和丸梧子大空心酒下五七十九丸蠶

當歸散

治婦人天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛內經云七損八益

謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善當歸川芎白芍藥炒條黃芩炒各一兩白朮五錢右為末每服二錢空心酒調下日二轉。良方有山茱萸一兩半

加味四物湯

治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱四物湯四錢加人參吳茱萸各

一錢右剉作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

單方

凡四十
一種

伏龍肝

卽竈心土也主婦人崩中帶下爲止血之聖藥蓋燥可去濕也湯。治血露蚕沙阿膠各

稱一兩伏龍肝半兩同爲末温酒調下二錢

百草霜

治血崩。百草霜末一錢狗膽汁拌勻分作兩服以當歸酒調下

芒硝樸硝

並治月候不通血閉癥瘕取末一錢醋湯下空心

乾地黄

治胞漏下血或煎服或丸服並生

益母草

治赤白帶下
末空心飲調二錢日三服

蒲黃

止崩漏及赤白帶下炒取
二錢溫水調服或九服

當歸

主崩漏及月水不利煎服末服並佳
當歸四錢乾漆三錢為末蜜丸酒下十五丸

黃芩

下血閉治淋露下血
末二錢以燒稱錘碎酒調下空心

芍藥

治血閉不通煎服
末服丸服並佳

白芷

治崩漏及赤白帶下煎服末服皆佳
帶白芷一兩烏賊魚骨二箇燒胎髮一團煨右

為末空心酒下
二錢

酸漿草

治赤白帶下陰乾為
末空心酒下二錢

地榆

主帶下十二病一日多赤二日多白三日月水不通四日陰蝕五日子藏堅六日子門僻七曰

合陰陽患痛八曰小腹寒痛九日子門閉十日子空冷十一曰夢與鬼交十二曰五臟不定又治崩

漏不止煎服末服並佳韌。赤白帶骨立者

地榆一斤剉水熬成膏空心服二合日二服

芎藭

治崩漏煎服末服並佳韌。治血崩取一兩挫酒五盞煎至一盞去滓下生地黃汁一盞再煎

二三沸分
三服

艾葉

主崩漏及帶下煎服之。血崩熟艾雞子大阿膠珠五錢乾薑炮黑一錢同煮服韌

大薊小薊

血崩取根五兩茅根三兩酒煎服。血崩取根五兩茅根三兩酒煎服

牡丹皮

主月經不通煎末服

三稜

通月經破血瘀煎服末服丸服並佳

玄胡索

主月經不調崩中淋露煎服末服丸服並佳

大黃

主血閉脹及諸老血留結成瘕煎服丸服並佳

桑木耳

主月水不調崩中帶下月閉血凝酒煎服或燒爲末酒服二錢。槐木耳亦同

蕎麥麵

治赤白帶下不拘多少以雞子清和丸白湯空心下三五丸卽愈

樗根白皮

治崩漏及赤白帶取白根切一大握水一升煮分二服或爲末蜜丸服亦佳

橡實殼

主崩中帶下燒灰和米飲服。取殼與蒼耳燒爲末再加白芷乾薑炮四物湯調下

棕櫚皮

治崩漏帶下燒灰與白礬枯爲末鹽湯調下錢又與絲瓜燒灰茅分爲末鹽湯調下

牡蠣

治崩漏及赤白帶下取粉醋調作丸再煨研細
却用艾醋湯熬膏和丸艾醋湯下五十九丸

鼈甲

治漏下五色羸瘦灸黃爲末酒下
一錢又用鼈肉作羹常食之佳

蠶退紙

主崩漏帶下燒爲末米飲調服

烏賊魚骨

治血枯又通月經療血崩血漏爲末丸服或末服皆佳

鱧魚

療婦人帶下百病作羹食或燒食皆佳

牡鼠屎

治室女月水不通燒灰爲末酒下一錢神效勿令知

蠹蟲

主室女月水不通逐瘀血散積血破血閉去翅足炒爲末醋湯調下或丸服之

水蛭

治同上破血最良須切斷同石炭再三炒爲末或末服或丸服

五靈脂 行經血有功 治血崩不止及赤白帶下
半生半炒為末酒下一錢或丸服之心丹

荆芥穗 治崩漏不止 燒存性為末每二錢童便調下根

蜀葵花 赤花治赤帶 白花治白帶為末温酒下二錢
單葉紅蜀葵根治帶下排膿血極驗草

水芹 療崩漏帶下作羹菹
或煮或生食並佳草

鹿角膠 主崩漏赤白帶下炒為末酒
下二錢或丸服或煮服良草

鹿茸 治崩漏赤白帶下炙為末酒服一錢
或丸服之草 鹿角燒灰服亦佳

雀肉 治血崩帶下或燒
食或作煎食之草

牛角鯁 止血崩不止及赤白帶下燒
灰酒下二錢或作丸服草

黃狗頭骨

主崩及赤白帶下燒為末酒下一錢或作丸服之陰莖及陰卵主帶下十二疾

燒作末酒服

錢或丸服之韎

鍼灸法

月經不調取陰極中極三陰交腎俞氣海
月經斷絕取中極三陰交腎俞合谷四滿三星

綱○崩漏不止取血海陰谷三陰交行間大衝中

極○赤白帶取中極腎俞氣海三陰交童門行

間○赤白帶帶脈灸穴之最奇一女患此灸此穴

鬼附身云灸着我即去俄而即差頓○崔氏四

花穴治帶下如神○赤帶取中極氣海委中○

白帶取曲骨承陰中極○經斷久忽大崩下取

豐降石門天樞

中脘氣海

蟲

原书缺页

原书缺页

虫各一兩白藜蘆殺尸虫乾漆殺白虫厚朴殺

虫雄黃殺尸虫各七錢半右為末蜜丸梧子大新

汲水下五丸三服後漸加至十九

至二十日三尸九虫盡滅而下甗

五臟蟲

人勞則生熱熱則生虫心虫曰蛔脾虫曰寸白
腎虫如刀截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕皆能

殺人惟肺虫為急肺虫居肺葉內蝕肺系故成瘵

疾咯血聲嘶藥所不到為難治也鈺。宜服獺瓜

散
鈺方

濕熱生蟲

濕熱鬱積則生虫臟腑虛則侵蝕。濕熱
生虫正如今人俗驗禾苗雨洒日照禾即生

虫此說明矣人患虫積者或飢餓失攝或腥膾白

酒或炙食牛羊或啖莧驚中脫氣弱濕熱少運故

生寸白蛔蠖諸虫形如蚯蚓又

相似團魚曰血鱉小兒最多翻

脉法

關上脉緊而滑者蛔毒。脉沉而滑者寸白虫。關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蛔虫心健忘。諸虫脉沉實者生虛大者死。尺脉沉而滑者為寸白虫。虫脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔虫甚也。齏。勞瘵脉數或濇細如潮汗咳血肉脫者。烈。蠶蝕陰肛脉虛小者生弦急者死。齏。熱。後。以下三四寸熱者腸中有虫。胃中有

蟲外候

凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有或吐清水夢中嚙齒面色青黃飲食雖多不生肌。往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫。凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有

或吐清水夢中嚙齒面色青黃飲食雖多不生肌。往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫。凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有

或吐清水夢中嚙齒面色青黃飲食雖多不生肌。往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫。凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有

或吐清水夢中嚙齒面色青黃飲食雖多不生肌。往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫。凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有

或吐清水夢中嚙齒面色青黃飲食雖多不生肌。往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫。凡虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有

也。小兒腹痛口中出清水者虫痛也。翻。三虫之證皆口流涎也。

諸物變蟲

山澗中蛇虺水蛭遺精誤飲其水或果菜蔬

止諸藥不效宜雄砂丸。夜間飲水誤吞水蛭而人腹能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦主不進食不治則死取田中乾泥一小塊小死魚三四箇去殼巴豆十粒同研爛將猪脂熔化和丸菘豆大以田中冷水吞下十丸須臾大小蛭皆瀉出却以四物湯飭服加黃芪煎服調補。李道念有疾褚澄診之曰非冷非熱當是食白淪雞子過多所致取蒜一升煮食之吐一物大如升涎裏之開看則是雞雛羽翅爪足皆具既而病差軼。一人患腰痛牽心每至輒氣欲絕徐文伯視之曰此髮瘦也以油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動掛門下滴盡惟一髮而已。一道人心

夏... 卷三下內景篇

腹煩滿彌二歲甄立言診曰腹有蠱誤食髮而然

令餌雄黃一劑少頃吐一蛇無目燒之有髮氣乃

愈譚。春秋二時蛟龍帶精入芹菜中人偶食之

得病發則似癩手足青腹滿病不可忍取寒食餚

飴糲三升日三服遂吐出蛟龍有兩頭三五枚乃

差仲。誤飲蛇交水成瘕腹滿痛雄黃服之臥。

通用七轉靈應

丹防見萬應丸

雄砂丸

善殺諸虫貫衆酸石榴皮各五錢鶴虱蕪荑
乾漆白殭蚕各三錢朱砂雄黃雷丸甘遂各

一錢半右為末米粉煑糊和丸麻子大每

十丸五更時粥飲下加麝香少許尤佳臥

萬應丸

善下諸虫大黃八兩權榔五兩黑牽牛頭末
四兩並為末以皂角十錠苦練根皮一斤同

煎汁熬膏和丸梧子大先用沉香末為衣次用雷

丸末為衣又用木香末為衣五更時以砂糖水吞

下三
丸

蛔厥吐蟲

心痛靜而復煩須臾復止得食而嘔又煩吐
蛔蟲爲蛔厥○蛔厥者當吐蛔病者靜而復

時煩此爲藏寒蛔上入膈故煩須臾復止得食而
嘔又煩者蛔聞食臭出其人當自吐蛔烏梅丸主
之○病人者寒復發汗胃中冷必吐蛔先用理中
湯勑門八烏梅三箇煎服次服烏梅丸勑○蛔
者胃寒所生經曰蛔者長虫也胃中冷則吐蛔
可用冷藥宜理中湯加炒川椒檳榔煎水吞下
梅丸最效研○經云虫貫心則殺人欲驗之
大痛不可忍或吐清汁黃綠水出涎沫或吐虫
發有休止宜蕪荑散化虫丸齏○小兒虫痛
宜靈礬散翻○蛔厥心痛宜安虫散化虫散
取積散虫不療則子母相生無有休
止○小兒口鼻中出黑血虫不治齏

烏梅丸

治蛔厥心腹痛烏梅十五箇黃連七錢半當歸川椒細辛附子炮桂心人參黃栢各三錢

右為末醋浸烏梅取肉和藥末搗極細

令勻丸如梧子米飲下一二十九丸

蕪荑散

治蛔咬心痛蕪荑雷丸各五錢乾漆砂烟盡一錢右為末濕水調二錢服小兒服半錢

化蟲丸

治蛔厥心痛胡粉炒白礬半生半枯檳榔苦練根各五錢鶴虱三錢右為末麩糊和丸

梧子大人二十九小兒五丸以淡米飲入香油

二三點攪勻吞下虫小者化為水大者自下

化蟲散

治蛔厥心腹痛口流涎雷丸二箇檳榔二箇鶴虱二錢使君子肉七箇右為末入輕粉一

字分作兩服當晚取猪肉一兩切片以皂角汁浸

一宿至曉微火炙熟又以香油塗肉取一服藥末

糝肉上空心嚼下

至下間虫目下得

靈礬散

治小兒蛔厥心痛五靈脂二錢枯白礬五分
分右為末每二錢水煎服當吐虫即止

安蠱散

治虫痛以右化虫丸材為
細末每一錢米飲調下

追蟲取積散

治虫積蕪黃雷丸錫灰使君子檳榔黑
牽牛子頭末大黃鶴虱木香各等分右

為末蜜丸麻子大茶清下二三十丸或
為末以蜜水或砂糖水調一匙服

溫胃安蟲

一安患惡心吐虫累治不差每用殺虫藥
則吐愈多孫兆診之曰六脉皆細非虫脉

也乃臟寒而虫不安因而吐復用殺虫藥為
藥所苦不能自安所以吐愈多也取硫黃附子炮

各一兩為末米糊和丸麻子大米
飲下三十丸遂不吐後不復作

酒蟲心痛

楊仲臣病心痛此人常好飲酒初飲二三
盃必奔走頓兩足三五六次其酒稍散方

能復席飲至前量一醉必五七次至明嘔青黃水
數日後變魚腥臭六七日始安戴人曰酒虫也宜
漏之乃吐虫一條赤黃色長六七寸

口目鼻皆全狀如蛇其疾即愈研

寸白蟲

寸白虫色白形扁居腸胃中時或自
下乏人筋力耗人精氣宜碧金散

碧金散

治寸白虫苦練根一兩鶴虱檳榔使君子肉
青黛各五錢麝香二錢半右為末大人一錢

小兒半錢空心以
猪肉煮湯調下效得

一方 療寸白虫錫灰蕪荑檳榔為末每二錢空心取
米飲調下極佳。子每覺心中多嘈雜疑是虫

漫服此藥翌日下寸白一裹中有長虫
二條長二尺五寸一則皆寸斷矣林事

又方

下寸白虫當晚勿食飯五更空心時取東引石
留根皮一屋農煎湯調瀉即末一錢先取炙猪

肉一塊細嚼嚥汁去肉却

取藥頓服午間虫盡下效

應聲蟲

人每言語時喉中有物作聲相應名曰應聲虫昔有人患此病醫者教誦本草隨物皆應至雷

丸則無聲遂服數丸而愈。腹中有物作聲隨人言語名曰應聲虫用七藍汁一盞分三次服之

即愈

效得

狐惑蟲

見傷寒門

消渴有蟲

見消渴門

痔瘻有蟲

見後陰門

諸瘡有蟲

見諸瘡門

齒痛有蟲

曰元牙
其門

勞瘵蟲

勞瘵又名傳尸病人死後復易家親一人故曰傳尸亦名傳疰其病自上注下與前人相似故

曰疰有屋傳服傳食傳之異死後又注易傍人乃

至滅門疰也○瘵虫之形或似蜣螂或似紅絲

馬尾或似蝦蟆或似刺蝟或似鼠形或似爛麩或

有足無頭或有頭無足或化精血歸於元陽之內

種種形狀實難辨之若傳至三人則如人形如鬼

狀婦瘵疾之因多有少年時血氣未定酒色傷

損其熱毒鬱積生異物惡虫蝕人臟腑精血變生

諸般奇怪之物其侍奉之人熏陶日久受其惡氣

多遭傳染是以氣虛腹餒最不可入勞瘵之門

吊喪問疾衣服器用中皆能乘虛而染觸焉指

驗瘵法 勞瘵傳尸皆有虫先將安息香令烟出病人吸

之不嗽非傳尸也若烟入咳嗽不止乃傳尸也

宜服大乙明月丹。見○又法用乳香燒熏病人之手，乃仰手掌以帛覆其上，熏良久，手背二出，平長寸許，白而黃者可治。紅者稍難，青黑者死。最驗。若熏之良久無毛者，卽非此證也。綱目

勞瘵病證

瘵有六證：潮熱盜汗、咯血痰嗽、遺精泄瀉也。輕者六證間作，重者六證兼作。蓋火炎於上，則爲潮熱；咯血火動於下，則爲遺精泄瀉。○瘵病初得，半臥半起，號爲殞。氣急痰嗽，名曰肺痿。骨髓中熱，稱爲骨蒸。丙傳五臟，名爲復連。因虛損而得名，爲勞極。男子自腎傳心，心傳肺，肺傳肝，肝傳脾，脾傳腎，腎傳肝，傳脾。女人自心傳肺，肺傳肝，肝傳脾，脾傳腎，腎傳心，則死。○病證大槩：令人寒熱盜汗，夢與鬼交，遺精白濁，髮乾而聳，或腹中有塊，或腦後兩邊有小結核。心胃滿悶，肩背疼痛，兩目不明，四肢無力，膝股痠疼，多臥少起，狀如佯病。每至平旦，精神尙好，日午向後，四肢微熱，面無顏色，喜見人，過常懷忿。

怒行立脚弱睡臥不安夢見先亡或多驚悸有時
 咳嗽痰涎稠粘或咯膿血如肺痿狀或時下痢羸
 痺困乏口燥鼻乾臉紅唇赤雖思飲食不能多餐
 死在須臾精神尙好猶若涸魚不覺死矣勞
 瘵主陰虛蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛
 則熱在午後子前寤屬陽寐屬陰陰虛則汗從寐
 時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則痰涎上逆而連綿吐出也心

瘵不治證

身瘦屬火因火燒燥也肉脫盡者難治心
 瘵疾至於骨痛骨痿聲沉聲啞色枯面黧斷

不可治補。勞瘵咽瘡失音者死虛勞泄不止者亦死心

殺諸蟲服藥法

道藏經中載諸虫頭皆向下行至初一

月朙以前蓋爲此也綱。上半月虫頭向上易治
 下半月虫頭向下難治先以肉汁及糖蜜食下以

虫頭向上然後用藥打出。靈異所用藥

物永不得與病人知之。三。虫種種靈異

用藥及灸莫令病人知之。恐虫覺悟永難取下也。

蓋此虫性已通靈務宜精審勿令有悟可也。

凡服取虫藥前日勿食晚飯明朝極飢。

時先嚼燒肥肉一片嚥汁後乃服藥。

治諸蟲藥

凡取虫作藥之法禁聲勿語道作藥則虫便

盛當破積殺虫宜木香三稜散下虫散追虫取積

散坊見妙應丸七轉靈應丹萬應丸坊見遇仙丹

追虫丸萬病解毒丹觚覲五仙丸。治察之法一

則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復其真元

若病勢已劇元氣已脫雖依法取虫亦無一生只

可絕後人之傳注耳。勞瘵至陰虛痰與血病

四物湯。加炒黃柏竹瀝童便薑汁。勞瘵

傳尸寒熱交攻久嗽咯血日漸羸瘦先服三拗湯

効觀次與蓮心散萬不失一研。勞瘵殺虫宜太

乙明月丹天靈蓋散紫金錠子五枝散神授散。

勞瘵補虛宜瓊玉膏紫河車丸凝神飲子。古

人云勞瘵三十六種惟陰德可以斷之人患此疾

或入山林或居靜室清心靜坐即齒焚香節食斷

慾專意保養庶乎可免若不遵此禁忌雖服藥無

效。勞瘵傳尸之疾熏治之藥非一而鮮

有驗者。惟取末後死者焚之可以無傳矣。瘵

木香三稜散 治腹中有虫而面色萎黃黑牽牛子半生

半炒取頭末五錢大黃三錢大腹子檳榔雷丸錫灰醋炒三稜煨蓬朮煨木香各二錢右

爲末每三錢空心蜜水調下先嚙肉汁乃服藥。瑞

下蟲散 治腹內諸虫使君子肉檳榔各一錢大

黃五分右爲末以苦練根煎湯調下。醫

妙應丸 治虫積檳榔一兩二錢黑牽牛頭末三錢大

黃雷丸錫灰蕪荑木香使君子各一錢右爲

未用葱白煎湯露一宿和丸粟米丸每四錢五更
葱湯吞下取寸白虫以石榴根皮煎湯下小兒服
一錢或五分天明取下虫物此藥不動真氣有虫
卽下虫有積卽下積有氣卽消氣一服見效

七轉靈應丹

治諸般虫積卽妙應丸除使
君子一味也服如上法

遇仙丹

治虫積黑牽牛子半生半炒取頭末四兩三
稜蓬术茵陳檳榔俱生用各五錢右爲末每

藥末四兩白麩一兩皂角五錢浸揉汁糞糊和丸

梧子大每三錢五更茶清送下病淺者一服見效

病深者再服必候惡物下盡爲度所下之虫曰滂

心虫曰血驚虫曰傳尸虫曰肺虫曰疾心虫曰馬

尾虫曰積血虫曰細虫長虫寸白虫其狀不一或

作五色或如魚凍此乃王經畧赴廣東得沾山嵐

瘴氣肚腹脹滿百藥無效偶得一道人付此藥

服之下虫一條狀如蛇長三寸餘病乃愈

追蟲丸

下虫積黑牽牛子頭末一兩 大黃三錢 使君

右為末先將皂角與苦練根皮濃煎二大碗熬成膏和丸梧子大將沉香末為衣又以雷丸末為衣

每五十丸空心砂糖

水下下虫乃愈

五仙丸

治諸虫如神 大黃四兩 皂角雷丸苦練根各一兩 木香二錢 右為末酒糊和丸 梧子大茶

清下三四

十九丸

蓮心散

治勞瘵當歸黃芪甘草驚甲醋灸前胡柴胡獨活羌活防風防已茯苓半夏黃芩陳皮阿

膠珠官桂芍藥麻黃不去根節杏仁蓮花藥南星

川芎枳殼各五分 芫花醋炒黑色一撮 右剉作一

貼薑三片 棗二枚 水煎服 須待吐有異物 芫花漸

減少 蓋芫花反甘草所以殺虫 炒之所以斷熱去

寒妙在
此處研

太乙明月丹

治傳尸勞瘵兔尿二兩天靈蓋酥炙龜
甲酥炙各一兩雄黃木香各五錢輕粉

二錢半右為末以好酒一升大黃末半兩熬膏和
丸彈子大朱砂為衣五更初童便和酒化一丸服
勿令人知必吐蟲物未效次日
再服綱。得效方名雄黃元

紫金錠子

治傳尸勞瘵。一女久患勞瘵為尸蟲所
嚙磨一錠服之一時吐下小蟲十餘條後

服蘇合香元半月如常此藥廣施瘵病無不驗賦
。一家兄弟五人並患傳尸勞已死者三人有方
士報令服紫金錠遂各服一錠一人下惡物如膿
狀一人下死蟲皆愈鑑。一名萬病解毒丹綱。覲

天靈蓋散

下瘵蟲天靈蓋兩指大以檀香湯洗過酥
炙檳榔五箇阿魏甘遂麝香安息香各二

錢朱砂一錢右為末每服三錢別以薤白葱白各

十四莖青蒿一握甘草桃枝桃枝梅枝俱東引者

各五寸桑白皮石榴根皮各一片以童尿四升於

磁器內文武火煎至一升分作三服每取一服調

前藥末五更初服男患女煎女患男煎服藥後如

欲吐用白梅含之五更末須下勞虫或惡物黃水

黑糞如未下又進一服天明更進一服如瀉不止

用龍骨黃連等分為末三錢白水調服白粥補之

一虫。有一婦人兩男子俱患勞瘵服此藥婦人下

一虫如蜈蚣狀一男下赤小虫數十中有一虫色

微紫大於象虫頭有細毛一男下一物

如烏梅之狀撥之有足正類蜘蛛類

五枝散

取下列傳尸勞虫桃枝李枝梅枝桑枝石榴枝

並取東向小枝各七莖長三寸青蒿一小握

苦練根七寸生藍青七葉葱白連根洗七箇切右

以童尿二升半煎取其半去滓入香薷合香

阿魏各一錢煎至一盞濾清入朱砂

白礬硫黃各半錢為末檳榔末一錢

調和分作二服月初旬五更空心一服若未下早

朝再服或吐或下虫物惡積如出大虫急用鐵鉗

取烈火焚之收人磁瓶中埋深山中

病人衣服床席並皆火燒埋僻處

神授散

殺傳尸瘵虫紅椒二斤去子及合口者炒出汗右為末每一錢二蠟空心米湯調下如暈

悶不能禁卽以酒糊和丸梧子大空心服三五十

丸授名神昔有人與勞病婦人交遂得疾遇一異人

云勞氣已入藏令急服二斤其病當去如言服之

幾盡大便出一虫狀如蛇遂愈後人服亦驗

瓊玉膏

治勞瘵滋血補氣固元氣之聖藥本方云以一料分十劑可救十人勞瘵正謂此也

紫河車丸

治傳尸勞瘵兩月皆可愈其餘勞怯一月平復紫河車焙乾一具鼈甲醋炙五錢菩

夏... 卷... 內景篇

黃胡黃連大黃苦參黃栢知母貝母 敗鼓皮心人
中白各二錢半草龍膽甘草各一錢 犀角蓬水芒
硝各一錢半辰砂一兩水飛右為末 蜜丸梧子大
辰砂為衣溫酒下二三十九腸熱食 前服隔熱食
後服

歌

凝神飲子

治勞瘵寒熱自汗咯血瘦劇人參當歸白芍藥白茯苓神白茯苓黃芪白朮半夏麩五

味子熟地黃蓮肉麥門冬苦梗甘草 各七分
右剉作一貼入烏梅一紅棗二水煎服 粥

辨瘵蟲形色

取肺脂膏故其虫色白次食血故其虫
肺脂膏故其虫色白次食血故其虫

色黃赤次食精髓故其虫紫色精髓盡故其虫黑

色傳入腎中病人方思死其虫白色可三十日服

補藥其虫黃赤色可六十日服補藥其虫紫黑色

北疾已極可百二十日服補藥其虫可活一二

一云虫頭赤食人肉其病可治虫頭白食人髓其病難治。虫角青赤黃色可療黑色與白色乃食精髓不可療也。又云虫紅色可治肚下黑色者難治。肚下白色者萬不一差。螻。○療虫觜黑則已入腎臟不可治。醫醫

諸蟲畏忌藥

凡虫病忌用甘草蓋虫聞甘則起聞酸則止。靜作間苦則定聞辣則頭伏而下。酸則動於上得酸

治虫不可用甘草甜物蓋虫得甘則動於上得酸則靜見苦則安得辛辣則頭伏而下。翻。○蛔聞酸則靜見苦則安。蠶。○甘謂甘草飴糖蜂蜜砂糖之類酸謂醋烏梅石榴之類苦謂熊膽猪膽黃柏苦參之類辣謂芥子川椒生薑之類也。

單方

凡四十一種

黃精 久服下三尸虫或末服或丸服上尸好寶貨百
日下皆 爛出鞋

爛出鞋

天門冬 殺三尸虫去伏尸
末服九服並佳

胡粉 殺三虫療尸虫尤長
胡粉炒一錢空心和臍中服大效

石硫黃 殺腹臍虫金液丹
服之良方見寒門

黑鉛灰 治有積白吐虫者取鉛炒成灰同檳榔末米
飲調下一錢

嚼肥肉少許却以砂
糖水調服虫盡下

白蠟塵 大殺瘰虫可入丸散藥中用之
子炒白蠟塵酒糊丸服治寸白虫

石菖蒲

殺腹內諸虫煎服末服丸服並住草

薺根

下三虫又治蛔虫心痛取根煎汁作糜食之又濃煎服一升大效

苦參

殺惡虫酒積飲之

蕪荑

去三虫逐寸白虫能殺諸虫取二兩和麩炒黃色為末米飲調二錢服

艾汁

殺蛔虫取一升空心飲當下虫

青黛

殺惡虫化為水此是以藍葉作齏者作末和水服

藍青汁

殺諸虫皆化為水飲一升良。殺瘵虫化為水生藍青汁一大盞入雄黃枯白礬安息香

降真香末各半錢麝香一分

研和月初五更空心調服

本草綱目卷之...

貫衆

殺三虫及寸白虫空心煎服或末服之良

狼牙

殺腹內一切虫。殺寸白虫取為末蜜丸麻子大空心米飲下一二錢

使君子

殺虫治小兒蛔虫尤良取七箇火煨去皮空心熟水嚼寸虫盡出

篇蓄

殺三虫及蛔虫止虫痛煮取濃汁空心服一升虫即下

鶴虱

殺五臟虫殺虫藥此為最要又主蛔蟯虫。蛔厥心痛取為末蜜丸梧子大空心蜜湯下四五

十九。虫痛取末二錢空心温醋調下虫當出。大腸虫出不斷斷之復生。鶴虱末水調服。

生地黃

治虫心痛擣取汁搜麩作餅或冷淘食之忌用鹽當利出虫永差。一女患心痛氣垂

絕作地黃冷淘食之便吐一

物如蝦蟇狀其病頓愈

槐木耳

治蛔虫心痛取槐上木耳燒存性爲末和水服若不止飲熱水一升虫卽下

川椒

殺瘵虫及諸虫煎服九服皆佳。治瘵紅椒二分苦練根一分作末丸服尸虫盡從大便泄

出煎服亦良傳

乾漆

殺三虫及傳尸勞虫碎炒令烟盡爲末蜜丸梧子大温水下十五丸或爲末温水調一錢服亦

治蛔厥心痛

檳榔

殺三虫伏尸及寸白諸虫赤色味苦者殺虫炮爲末每二錢空心以葱蜜湯調下卽效

榧實

去三虫又治寸白虫去殼常食七枚久則其虫自下盡一斤乃除根

苦練根

殺諸虫及蛔虫寸白虫。治五種虫取根白皮爲末米飲下二錢。蛔厥心痛取白皮

細切濃煎汁一盞徐徐飲之或以汁煮米作粥服之。下寸白虫及諸虫取白皮細切一兩人黑豆

二十粒水煎臨熟入砂

糖二錢調服虫即下

雷丸

殺三虫及蛔虫寸白虫水浸去皮切焙為末每一錢月初五更調米飲服之

鰻鱧魚

殺傳尸勞瘵虫又殺諸虫久病疲瘵人和五味煮熟常食之或曝乾炙之令香常食亦良

○昔有女子病瘵家人取置棺中流之於江漁人取視猶活多煮此魚食之病愈遂為漁人之妻

白頸蚯蚓

去三虫伏尸殺長虫蛔虫取乾熬作末和米飲服或作汁服

金線蛙

殺尸瘵虫及蛔虫或燒或者常服之

石榴東引根皮

瘵虫寸白虫取皮一握煎空心服諸虫盡下

櫻桃東行根

療地虫及寸白虫
濃煎空心服

桃葉

治三虫除尸虫
取汁一升飲之
葉

脂麻油

殺一切虫
取油一合雞子二箇
芒硝一兩攪勻服之
虫即下

馬齒莧

殺諸虫及寸白虫
生搗絞汁服或
煮熟和鹽酸空腹食之
虫即下

野鴨

殺腹中一切虫
消十二種
虫煮熟食肉飲汁
良

熊膽

殺虫又治蛔心痛
取大豆許溫水和服
鞣

猫肝

殺瘵虫黑猫生取肝
晒乾為末
月首五更空心溫酒調服
搗

啄木鳥

殺瘵虫啄木鳥一隻
活取朱砂四兩為末
猪肉四兩細切拌勻
喂禽一晝夜肉盡為
末

取禽以鹽泥固濟火煨一夜來日不見太陽取出
不得打破埋入地中二尺計經一晝夜取出去鹽
泥銀石器內研爲細末以好酒入麝香少許作一
服調下置病者帳中緊閉候之其虫必從口鼻中
出急以鐵鉗鉗入
沸酒中煎殺之儻

童子尿

治勞瘵取飲之極效古人云服涼藥百無一
生飲溲尿萬無一死惟脾胃虛及氣血弱者

必以滋補藥中量人以代降火之藥服
時入薑汁或甘草末少許和服尤佳門

獺肝

治傳尸勞瘵沉頓羸瘁急取獺肝一具
陰乾爲末溫水調一錢日三服神效神

獺爪

瘵虫居肺葉內蝕肺系或咯血聲嘶
最難治獺爪爲末溫酒調下神效神

鍼灸法

骨蒸傳尸勞瘵宜早灸崔氏四花穴鍼灸見晚則
無及矣門瘵虫居肺間蝕肺系故絡血聾斯

此所謂膏之上有之下針之不到藥之不及宜早
灸膏肓肺腧四花穴爲佳凡○治勞瘵癸亥夜
三更六神皆聚之時解去上體衣服於腰上兩傍
微陷處謂之腰眼直身平立以墨筆點定始上床
合面而臥每灼小艾炷灸七壯或吐或瀉下
卽安名曰遇仙灸得○先一日點定腰眼穴至半
夜子時交癸亥日期便灸七壯或九壯或十一壯
尤妙其虫從大便出卽焚之蠶○骨蒸勞勢灸膏
肓三里○勞瘵骨蒸或版齒幹燥大頰鳩尾各穴
二七壯又膏肓肺腧四花大頰等穴若灸之早百
發百中○傳尸勞瘵涌泉鍼三分瀉六吸有血可
治無血必危豐隆治痰針入一寸瀉下吸丹田治
氣喘鍼入三分
補二呼凡

東醫寶鑑內景篇卷之三下

終

