

瘍醫大全目錄

卷三十九

救急部

解救砒霜門主論 附方

救誤服蒙汗藥門主論 附方

救飲鴆酒毒門主論 附方

救誤服銀疔門主方

救誤服水銀門主方

救誤吞五金門主方



救誤吞針門主方

誤吞諸木竹釵門主方

救誤吞磁鋒門主方

解誤服銀粉門主論 附方

解誤服銀珠騰黃門主方

駁中蠱毒門主論 附方

解中斷腸草毒門主論

解中藥毒門主論 附方

解服鹽滷門主論 附方



中飲食門主論附方

解麯酒毒門主論附方

解中煤炭毒門主方

解中閉口椒毒門主方

救誤食桐油毒門主方

救誤吞田螺門主方

救誤吞桃李門主方

救誤食豬骨門主方

救誤吞雞骨門主方



救誤中猪肉毒門主方

救誤吞頭髮門主方

救誤吞蜈蚣門主方

救誤吞螞蝗門主論
附方

救誤中蛇虺百蟲毒門主方

解中蜈蚣毒門主方

解中蜘蛛毒門主方

解中蜥蚓毒門主方

解中廔牛肉毒門主論
附方



解中馬肉門主方

解中犬馬肉門主方

解中河豚毒門主論附方

解食魚中毒門主方

解食黃鱔魚毒門主方

解誤食毒蟹毒門主方

解中鰲毒門主論

解中野菌地蕈靈芝毒門主論

解荳腐毒門主方



解麩毒門主方

解中白菓毒門主方

解中輕粉毒門主方

救六畜瘟疫法

解中櫻桃毒門主方



傷醫大全卷三十九

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之柏京陽
男 擺燻用和
全校

救急部

凡解一切中毒以及誤吞金石虫蟄等證俱彙於此
部中以便檢閱叅治



解救砒霜門三論

雷真君曰世人有服砒霜之毒五臟欲裂者腹必大痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也急用瀉毒神丹飲之如立時大瀉則生否則死矣此砒毒已入於臟非可用羊血生甘草上吐能愈特又變下法救之飲之如不瀉此腸已斷矣又何救乎倘用之早未有不生者不可執吐法而無變通若初飲砒霜但飲甘草羊血立吐而愈如不吐速用瀉毒神丹瀉之則無不救矣

活人錄

凡中砒毒其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不出
面色青黑四肢極冷者是

凡服砒人不可仰臥恐毒流四肢難治愈後須忌百

日烟酒姜椒煎炒

願體集

凡中信毒因氣惱自服者急用香油一碗灌之或吐

或下卽活若係酒調者難救其毒發散於週身也

陳遠公曰服砒毒疼欲死若不急救必腐腸胃吐紫
血而死蓋砒石乃天生之石不會經火煨煉何毒

至此不知砒石生南岳之山鍾南山火毒又經火



氣則其性大熱有火毒加之大熱酷烈之至安得
不殺人哉性又善走砒石下喉必升降於腸胃之
上下徃來數十次腸剝皮穿人乃死矣疼欲死者
正毒氣上下攻也毒藥之橫莫此爲甚治法必吐
出其毒然不能盡出其毒也必用解毒之味但初
下喉以羊血吐之亦有能生之者食久入胃則無
益矣宜用救死丹久暫皆可救用生甘草一兩兒
參二兩地榆五錢瓜蒂七箇水煎下喉卽吐者渣
服之又叶砒毒全解矣

甘草解毒得瓜蒂必上涌
而叶砒能上升故引之盡

出也然砒又下行得元參地榆解大腸之火
之大毒已從上而出走下者亦餘毒耳得二
之則上下共相解毒所以能制毒也此方不可
榆俱潤中解毒所以能制毒也此方不可
不吐者此腸胃已壞不可救矣非方不效也倘藥
不及煎於飯錫中煮灌之庶不至因循失救也

不又... 論... 申... 無... 至... 日... 夫... 進... 也...
 不... 出... 也... 胃... 口... 渴... 不... 可... 效... 矣... 其... 亦... 不... 效... 也...
 之... 相... 也... 共... 時... 論... 毒... 人... 論... 其... 對... 病... 也...
 之... 毒... 也... 論... 毒... 人... 論... 其... 對... 病... 也...
 之... 毒... 也... 論... 毒... 人... 論... 其... 對... 病... 也...

正... 論... 下... 攻... 也... 毒... 矣... 之... 精... 也... 此... 也... 公... 也...
 正... 論... 下... 攻... 也... 毒... 矣... 之... 精... 也... 此... 也... 公... 也...



南京中医药大学图书馆版权所有

解救砒霜門主方

解信毒法 願體集

速取梁上燕子窠用井水三四大碗放水桶內將
手多攪調之用夏布手巾如榨腐法濾去泥葉取
所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醒

初中砒毒 雷真君活人錄吐法

生甘草叁兩急煎湯加羊血半碗和勻飲之立吐
卽愈飲之不吐速用下法

瀉毒神丹 雷真君活人錄下法



當歸 三兩

大黃 一兩

白礬 一兩

生甘草 五錢

水煎湯數碗飲之立時大瀉則生否則死矣

又方

黑鉛一兩磨水灌之

凡中砒霜一切毒藥垂死者

急用上號潔白糖靛花淡荳豉甘草各等分研勻

冷水調灌即甦

又方



無名異

即淡匠用者

和生雞蛋清攪勻服之

又方

陳壁土攪水灌之

又方

急飲人溺及人糞汁或金汁灌之

又方

虎耳草葉洗淨搗汁攪冷水灌之

又方

牙硝不拘多少研末冷水調下

又方

生鴨血灌之

又方

小薊根搗汁灌之

又方

大黃明礬研末新汲水調灌之得吐利卽解

誤中砒毒橫身紫纍百解不效此名砒霜纍瘡

黃土地上挖一斗大坑以井水滿之攪令渾濁以

一碗與之少刻又與之待渾身紫纍俱散一吐卽



甦雖冬月間亦宜用此法必效

解砒霜及一切草藥六畜肉中毒

白花藕豆經過霜者生收晒乾研末用新汲水調服三錢

又方

真萊豆粉

黃土

各四兩

研極細用生雞蛋清九個共一處以浸萊豆冷

水和稀服之卽解若有黑羊血再灌碗許更妙

又方

天竺菓煎服如無取根搗汁煎服亦可

又方

明礬三錢研末冷水攪勻送下一吐即愈

又方未盡用萊豆甘草夏枯草煎湯冷服

生漆搗子瓦上煉存性研末滾湯冲服五分



北京中医药大学图书馆版权所有

救誤服蒙汗藥門主論

蒙汗藥大約用天仙子爲君加入狐心等物雖不殺人然令人迷而不醒山東村店多乘心迷以取財物醒來全不記憶恍惚不能辨別所以道途誤服蒙汗藥以致頭重足輕口吐涎沫目瞪不言此迷心之故也雖不殺人久迷不醒亦可畏人以涼水解之亦能少甦但涼水入心水停心下倘虛人必變他症

或曰此症必是痰迷心竅宜以生姜開之投以姜汁

傷醫大全
平殊不知藥中天仙子居多得姜則愈迷其心矣
故不可用也

解誤服蒙汗藥門主方

止迷湯

白茯苓 五錢

生甘草 二錢

瓜蒂 七個

陳皮 五分

水煎服卽大吐而醒其從前事斷不遺忘不似
凉水之解如醉如癡也

又方 飲冷水卽安

救飲鳩酒毒門主論

凡飲鳩酒白眼朝天身發寒戰忽忽不知大醉之狀
心中明白但不能言至目閉卽死夫鳩毒乃鳩鳥
之糞非鳩之羽毛亦非鶴頂紅也鳩羽與鶴頂紅
皆不能殺人不過生病惟鳩糞則毒此鳥出異國
異國人恐言鳥糞則人必賤之故但言鳩以貴重
之也此鳥非蛇蝎不食故毒甚於孔雀之糞孔雀
糞冲酒飲有死有不死者而飲鳩則無不死也益
鳩毒性熱功緩善閉人氣所以不能言發寒戰者



心中熱毒心脉通目大眚心熱則目必上視目閉
而死者心絕目乃閉也幸其緩可施救 鳩音邊
救飲鳩酒毒門主方

消鳩

金銀花

八兩煎取
汁二碗八

白礬

寒水石

天花粉

各三錢

石菖蒲 二錢

麥冬 五錢

全煎灌之一時後目不主視口即能言矣再照

方減半煎湯二劑全愈



救誤服銀焰門主方

驗方

濃煎烏梅湯灌之卽解

又方

黃泥水服兩茶鍾卽解

救誤服水銀門主方

驗方

揀開口花椒二兩吞下卽裹水銀從大便出



蘇頌曰水銀一兩吞下即毒水銀從大便出

蘇頌

蘇頌照水過門生衣

蘇頌水銀項下生白粉

蘇頌

蘇頌水銀項下生白粉

蘇頌

蘇頌照臉散門生衣



南京中医药大学图书馆藏书

救誤吞五金門主方

誤吞金銀銅鐵錫

蠶豆炒研末砂糖調服其物從大便出

又方

猪板油全青菜煮食自出

吞金 丹方

羊脰骨燒焦研末參錢米飲調下從大便出

吞鐵物 丹方

栗樹炭二塊將鐵錘搗極細砂糖和細丸米飲送



下三錢立出

吞銅錢

羊脛灰煮粥食之

吞銅錢或銅

多嚼生葶薺食之自化

吞金

紅棗煮爛不時食之金從大便自出

吞金銀銅錫

先飲生鴨血杯許再多食炒蠶豈不切熟苜蓿其



物卽從大便裹出

吞鐵

艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服卽下

吞錢在喉不出

麩炭末指彈入喉中其兒當卽咯出

吞釘及箭金針鐵

多食肥羊肉及諸肥肉自裹出

吞金環及釵

飴糖一觔一頓漸漸食盡多食之環及釵便出



知是服金屑死而未絕者

水銀一兩灌口中搖動令下咽喉入腹金卽消滅
成泥而出

解金銀銅鐵毒

鴨屎汁解之

人以銅條兩個作戲法由鼻孔進而從口出忽一

口銅條滑入腦中奇癢難忍無法可救黃公曰尔
磕我三百個頭我當救尔其价卽連磕其頭叩木
百餘其銅條從鼻出此亦聰明人慧心智囊耳



吞錢

桑柴燒灰研末米飲調服二錢

又方

菜豆粉冷水調服三錢

又方

多服飴糖

吞金銀銅鐵

砂糖同砂仁煎濃湯多服自下



卷之三

少壯同法... 眼目... 公曰尔

金... 眼...

眼...

水... 眼... 公曰尔

公曰尔... 眼...

公曰尔... 眼...



南京中医药大学图书馆版权所有

救誤吞針門主方

吞針入腹

蠶豆煮熟同生韭菜食之針從大便而出

又方

櫟炭末井水調服三錢

又方

蝦蟇眼睛一對冷水送下針穿眼內而出冬月無蝦蟇在

桑根下尋

又方



黑砂糖和黃泥爲丸吞下泥卽裹針在大便中出
誤吞針刺咽中痛者

亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外以
湯浸濕急吞下咽頃刻扯出其針必刺於麻中而
出如一圓不中節再吞再扯

又方

雄磁石研末水丸如櫻桃大吞下卽服通利之藥
針從人便而出

針入咽喉無藥可施

癩蝦蟇數個將頭剝去倒垂流血以甌接之得一
盃許灌入喉中移時連針吐出針自軟曲

又方

舊茗籬煨存性研末每服三錢酒調服亦能化鐵

又方

將半生半熟出芽蠶豆場爛以韭汁爲丸吞下

又方

磁石如棗核大吞之其鍼立出

又方

磁石如棗核大吞之其鍼立出



又磁石研細將黃蠟和撚如針大小涼水下裹針從大便出

又式... 龍眼大以綠穿繫留

將半坐半熱出黃蠟豆

又式如... 節再吞再吐

書... 針未至則三

又式... 研末水化如櫻桃大吞下即服通利之藥

益精... 劑中... 自煉曲

... 垂流血以調... 針一



南京中医药大学图书馆版权

誤吞諸木竹釵門主方

驗方

取剪刀故鋸燒赤入漬酒中以女人大指甲三枚
燒存性研末和服

杏桃枝竹杖

但口中數數多食白糖自消去

木屑蒼喉

鐵斧磨汁灌之

竹絲鯁



女醫之全
誤吞磁鋒方
三

不拘黑白芝蔴炒熟泡湯飲再以乾芝蔴嚼服幾
口或以生芝蔴搗爛嚼食

救誤吞磁鋒門主方

驗方
誤吞磁鋒之食自熱自消去

生紅蘿蔔搗爛吞下其磁鋒即從大便而出

誤吞磁鋒未吐服

誤吞磁鋒未入胃中或以女人大便甲二枚

誤吞

誤吞磁鋒未入胃中



解悞服銀粉門王論

凡服鉛粉者非婦女角口憤不欲生冀其鉛能墜腸
而殞更有婦女打胎服之不惟不效每致求生不
得欲死不能且生子多癡呆身體發瘡毒更有因
服銀粉鑽筋入骨老來遍身筋骨疼痛無法可療
此故白取之也深可憫焉特立此門救之

新增

其見證面色呈青腹中墜痛欲死者是

解悞服銀粉門王方

驗方

誤服銀珠方 二

藤油

黃蜜

紅砂糖

攪勻服之

又方

多食生葶薺即解

又方

香油灌之即解

又方

急搗蘿蔔汁飲之

解誤服銀珠騰黃門主方

驗方

薑菜水溫服即解



南京中医药大学图书馆版权所有

驗中蠱毒門主論

令病人朝取井華水唾水中壘如柱直下沉者是蠱

也浮者非蠱也 三四

中蠱者大便黑如漆或堅或薄或微赤者是蠱也 金

孫真人曰凡中蠱毒噉白礬不瀆而味反甘嚼生黑

豆不暱者是

若含甘草而不吐者非蠱也 徵今鐸

遯齋閑覽云海南魚有石首蓋魚枕也取其石為器

可盞飲食如遇蠱毒器必製其效甚著閩人製作



最精人但玩其色而鮮有識其用者

又曰唾津在淨水中沉卽是浮則非

又曰口含大豆中蠱者荳卽脹而皮脫無蠱者豆雖

脹皮不脫

又曰煮雞蛋一枚去殼以銀簪一隻插入蛋中併含
入口內一飲之頂取視簪卵俱黑卽爲中蠱

訣曰脉緊數如釵股弦直而吐甚者卽中蠱也急治

之

又曰脉洪大者生微細者死



陳遠公曰有遊兩粵與女人交好或與男子成雙孛
蠱於飲食之中食之則兩目漸黃飲食倦怠三年
三載無藥解之必致暴亡世傳造蠱土人各將毒
虫與蛇蝎等物共投缸內彼此相食食完止存一
物不死者取爲蠱母此訛傳也蓋彼地別有蠱藥
乃天生之毒也土人治此症有方可解大約用礬
石化蠱恐外人知之故秘不言礬石消痰又善化
堅蠱積腹中內必堅硬而外以痰包之所以一物
二用奏功頗神惟人身柔弱者多強健者少而蠱

結胸腹間必正氣大虛倘用礮石不更虛其虛乎
必於補氣血之中加消痰化蠱之味有益無損始
稱萬全也宜破蠱全生湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

解中蠱毒門主方

治中蠱毒

濃煎石榴皮汁飲之使吐惡毒

又方

熱茶化膽礬半分服之令吐

又方

米飲調礬金末三錢服之

又方 徵今鐸

先取炙甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍



以炙甘草三兩生姜四兩水六升煮二升日三服
若嚼甘草不吐則非蠱也

又方 范石湖文集

昔李熹爲雷州推官得治蠱方毒在上用升麻吐
之毒在腹用鬱金下之或合二味服之不吐則瀉
活人甚多

破蠱全生湯

人參

當歸

各一兩

白礬

生甘草

半

夏各三錢

白茯苓

五錢

水煎服



解中斷腸草毒門主論

人有服斷腸草者初則胸中隱隱作痛久則氣不能
通及至腹痛二便俱不能出而死此草卽鉤吻也
至陰之物狀似黃精葉如毛鉤子二個此草喜閉
氣尤使血不行氣血閉塞故爾人死非腸斷也聞
廣間多生此草婦女小忿往往短見食之覓死如
飴以其不大苦楚也有用羊血灌之得吐則生然
亦有不吐者往往不救此草殺人甚緩用解毒通
利之味無不生者不似砒之酷也宜通腸解毒湯

冰鑑

冰者不烈者非冰非冰者不烈故草野人其氣冰野
謂以其不大者致也言用羊血新之得也
亂則參聖此草故文小參非非既良食之
益其氣血不許於血用寒者雨入其氣則

冰者不烈者非冰非冰者不烈故草野人其氣冰野
謂以其不大者致也言用羊血新之得也
亂則參聖此草故文小參非非既良食之
益其氣血不許於血用寒者雨入其氣則
冰者不烈者非冰非冰者不烈故草野人其氣冰野
謂以其不大者致也言用羊血新之得也
亂則參聖此草故文小參非非既良食之
益其氣血不許於血用寒者雨入其氣則



南京中医药大学图书馆版权所有

解中斷腸草毒門主方

誤中斷腸草卽珍珠蘭之類又名水莽藤毒

生雞蛋三四個打開灌之

又方

黑豆一杯研生甘草五錢

煎濃汁服之登時卽解

又方

白礬化水解之

又方



熱羊血灌碗許以吐盡惡物自甦

又方

冬青樹葉冷水搗汁服下即解

又方

雞抱雛卵劈開以清油調勻灌之

通腸解毒湯

金銀花

生甘草 各一兩
大黃 一錢

水煎服一瀉而愈



南京中医药大学图书馆藏书

救中藥毒門主論

凡中草烏川烏天雄附子毒則心煩躁悶甚則頭昏

岑然遍身皆黑必死

入門

凡服藥過多生出毒病頭腫如斗唇裂流血或心口
飽悶或臍腹撮痛皆中藥毒也

脉訣曰人中百藥毒傷其脉洪大者生微細者死

又曰洪大而遲者生微細而數者死

凡解藥毒湯劑不可熱服宜涼飲之蓋毒得熱則勢
愈盛也然此特以中熱毒爲言耳若解木鱉菌蕈



黃連石膏之類而中陰毒者豈仍避熱而猶堪以
寒飲乎

又曰將大毒散者其毒雖而燥清致
和熾曰人中百藥毒毒其利其大者生燭也
前問者謂即謝脈者中藥毒也之

本經遺自首黑文取

人門

此中草品川山天藥劑于毒限心飲烈以甚似既

本中藥毒門主論



南京中医药大学图书馆版权所有

救中藥毒門三方

凡中相反藥毒面青脉絕腹脹吐血

蠶退紙

即出過蠶的紙

燒灰研一錢冷水調服雖危可活

中草烏川烏天雄附子毒

入門

煎菜豆黑豆汁冷服之

黑豆即馬料豆

又方

甘草黑豆濃煎飲汁

又方

防風甘草湯冷飲之入口即定



川椒毒戟人咽喉氣閉欲絕 入門

喫大棗三枚解之

多服犀角則令人煩 入門

麝香一字調水飲之

解百藥毒

菘豆研開甘草全煎服

誤服巴豆口渴面赤五心煩熱泄不止者

川黃連一錢煎服立解

又方



南京中医药大学图书馆藏

石菖蒲汁立解

又方

小豆汁立解

又方

藿汁立解

又方

大豆汁立解

皂礬毒

急取麩糊一碗服之



南京中医药大学图书馆版权所有

葛... 卷二十九 救中藥毒方 顏氏必書

救中雄斑毛毒

早用馬料豆煎汁服

凡敷搽藥內有砒霜患處作痛或腐潰者

用濕泥頻塗換之若毒氣入腹胸膈苦楚或作吐

瀉冷飲米醋一二杯卽止多亦不妨生菜豆末蘇

油調服亦可

敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉

防已煎湯解之

服川烏草烏等藥悶亂流涎或昏潰嘔吐或吐血下



血

大黑豆遠志肉防風甘草任用一味煎湯解之
凡服風藥過多皆宜用之如不應急用生姜汁并
草解之

敷貼巴豆患處作痛肌肉潰爛

生黃連爲末水調敷之卽解 若毒入內吐瀉等

症更以水調服一二錢或大小豆菖蒲汁皆可

敷貼藜蘆毒入內

煎葱湯解之

解諸藥毒

生薑汁灌之

又方

又方

薺苳汁解之

錫糖汁解之

又方

又方

白扁豆汁解之

米糖汁解之

解一切藥草中毒

濃煎甘草飲之無不生也又食少蜜更佳



北京中医药大学图书馆版权所

解服鹽滷門主論

服鹽滷者口鹹作渴腹痛身蹇足縮而死夫鹽能補
腎何便殺人不知鹽滷味苦苦先入心心遇鹽滷
氣鬱不通滷見心不受乃犯於腎腎見味苦又不
受遂往來心腎之間心腎之氣交相悖而滷流入
於腸則不可救矣夫大小腸最惡鹽滷入之必縮
小其腸而成結結則氣不通安得不蹇曲而死乎
治法以甘草湯解之



此書以甘草為藥之

小其照而取謙謙順康不能安持不無曲

然無則本何遠矣夫大小照是惡惡隨入

受必去來心習之間必習之派交財幸而

其精不無幽良心不受代財其習習良精苦

習何勤勤人不賦靈而和苦苦去人心必

照靈而香口其新則新良新良新而深大

賦靈而門主命



北京中医药大学图书馆藏书

解服鹽滷門主方

驗方

急搗肥皂汁和水灌之卽吐如吐未盡用熱豆腐漿灌之卽吐腐形如不吐以鶯翎絞喉數次必吐

甘草湯

生甘草 三兩

煎湯救之如滷未久加淡豆豉一兩全煎服之腸潤未必皆死要在活用之耳

又方

又冷豆腐漿灌之

又方 煎糯米心苦茶要至甜用之

抹桌布瀝水灌之

又方 甘草三兩

甘皂角水冷服

瀝洲鹽麻門注水



南京中医药大学图书馆版权所有

中飲食毒門主論

書云善解毒者無如火蓋火能革物之性

陳遠公曰誤食漏脯以致胸膈滿飽上吐下瀉腸如

刀割痛瀉不止而有死者夫漏脯乃隔宿之肉爲

屋漏水滴入而名之也似無大害何以殺人此言

歲久之屋梁塵甚多屋上必有蛇蝎行走塵灰倒

掛蛛網結成無非毒物天雨之水順流而下凡毒

氣得水則化然化於水中也水入肉內毒將何往

自然結於肉中而不化食之安得不變生不測哉



亦有食而不死又何故此必非歲久之屋未經毒
物故也雖不死而病必不免所以爲太上所戒急
用解毒之藥自可得生天而之木則

歲久之屋果壞甚多氣土必自抽融行去
氣然木而人而合之也則無大害何以對人此
以陰氣散不出而存於首夫誠誠以謂富之內
則必公且其食滿則以文微釋滿論上且不富則
清以善其毒善無以火益火而毒其也

中刻會毒門三篇



中飲食毒門主方

凡一切飲食毒

用蘇油一二杯飲之得吐毒即解

化漏湯

大黃

山查

厚朴各三錢

白芷

麥芽各二錢

生甘草五錢

水煎服

解百般飲食毒

粉甘草

生用二兩

萊菔

荳

一升



水煎類服

解燒酒毒門主論

人有恣飲燒酒大醉而死必身腐爛臭穢夫酒爲大
熱之物純陽無陰尤爲至熱多飲過度力不能勝
一時醉倒而熱性發作腐爛腸胃其人已入醉鄉
不知生死用井水頻撲其心胸解開頭髮浸頭於
冷水中候溫卽換凉水後用解炎化酒湯主之
又曰錫壺盛燒酒過夜有毒飲之傷人
又曰鱔魚浸燒酒內卽成泥



解燒酒毒門主方

凡過飲燒酒人事昏沉

將醉人放板門上矮櫬架住頭低脚高將頭髮打
散以盆乘水入生研菜豆於水內隨將頭髮浸水
盆內如水一溫卽另換一盆浸至酒散人事清白
方止仍用大片熱豆腐鋪胸前豆腐蒸變拔出酒
毒又換熱豆腐貼之自活醒後宜喫菜豆湯

又方

葛花濃煎汁或葛根湯灌之



又方

枳椇子搗研煎湯解

又方

甘蔗削去皮搗汁飲乾嘔自止

又方

白蘿蔔汁灌之並救受狼烟煤炭毒

又方

熱尿灌之

又方



一鍋蓋上氣汗水數鍾徐徐灌之

解炎化酒湯

人

參

一兩如無以黃芪二兩代之

柞木枝

二兩

白茯苓

五錢

黃連

寒水石

各三錢

石菖蒲

一錢

水煎一碗待冷灌之得人口即活此方以柞木

解酒毒黃連寒水石解火毒菖蒲引入心中茯苓

分消酒食之氣用人參者所以固真氣使不

傷酒而散蓋火酒係氣酒也熱極則氣易散固



真氣則火可瀉毒可解氣不脫也

解中煤炭毒門主方

中煤炭毒一時悶倒不救殺人言瑤方

急以新汲清水灌之

中煤毒昏暈惡心跌倒急移在風涼處

鹹菜水灌之

解中閉口椒毒門主方

閉口椒食之令人身冷吐白沫欲絕金匱方

地漿小飲之即解



解誤食桐油毒門主方

桐油入咽令人發吐不止

秘方

急飲熱酒卽解

救誤吞田螺門主方

誤吞田螺鯁喉不下死在須臾

活鴨以水灌於鴨子喉中少頃將鴨倒懸令鴨吐
出涎水與患者服之其螺自化



救誤吞桃李門主方

誤吞桃李不下

狗骨煮汁摩頭上即下

又方

以少許水灌小兒頭承其水與飲即

救誤食猪骨門主方

驗方

象牙刮未浮於新汲水上吸之即下



北京中医药大学图书馆藏书

救誤吞雞骨門主方

驗方

隔年灶糖食之自化

又方

香油煎滾溫服卽下

救誤中猪肉毒門主方

驗方

猪牙燒爲末一錢開水調服



南京中医药大学图书馆版权所有

誤吞頭髮門主方

吞髮繞喉不出

燒開水隨服

自己亂髮煨灰開水調服一錢

外煎中煎內毒門主方

香前煎藥隨服開水調服

入代煎藥全書門主方

誤吞公藥食之自公

誤吞公藥食之自公

誤吞公藥食之自公



救誤吞蜈蚣門主方

驗方

急吞生雞蛋二枚不可嚼次日即裹出

蜈蚣誤入咽喉中咬之垂死

生公雞熱血灌入喉中蜈蚣即出

人喉中似有物行動吐痰則痛更甚身上皮膚開裂
有水流出自紅腫而又不痛足如斗腫而又可行
真絕世莫辯之症此乃人食生菜有蜈蚣在葉上
不知而食之乃生蜈蚣於胃口之上入胃則胃痛



上喉則喉痛饑則痛更甚也方用鷄一隻者熟五
香調治芬馥之氣逼人乘人睡熟將雞列在病人
口邊則蜈蚣自然外走倘有蜈蚣走出立時拿住
不可讓其仍進口中或一條或數條出盡自愈大
約喉間無物走動則無蜈蚣矣然後用全膚湯苳
苓三兩黃芪當歸薏仁各一兩白芍五錢生甘草
二錢荆芥陳皮各一錢防風五分水煎服十劑則
皮膚之裂自愈而雙足如斗亦消矣蓋蜈蚣在上
焦非藥食能殺因藥下喉卽至胃中而蜈蚣却在

胃口之上故不能殺之也所以引其外出然後以藥調治其氣血自愈皮膚開裂者乃蜈蚣毒氣盤踞肺邊肺主皮毛故皮膚開裂足如斗者足乃腎之部位肺居上爲腎之母母病則子亦病然腎水終是不乏而毒氣留於腎部故足之皮大而浮非骨之病也所以能走也眼屬肝肝受肺氣之毒薰蒸故紅腫也

秘錄



中醫藥大學圖書館

救誤吞螞蝗門主論

芹菜內螞蝗極多摘洗不淨每每誤食下咽肚腹作

痛

或云螞蝗煨灰研細散於水碗內露一宿卽變細螞

蝗何況誤吞活螞蝗乎

螞蝗一名水蛭以火焙爲灰見水復活惟土井及藏

芹菜根內小如米麥人所難防誤食必害人若知

此物在腹但以芝麻油潤肛門虫聞香盡出可無

害矣



救誤吞螞蝗門主方

驗方

水田泥爲丸如桐子大每服二三錢用水送下
螞蝗即隨泥解出空心服之更效

又方

蜜糖一杯和水服之

又方

空心飲地漿水少許自下

誤中蛇虺百虫毒門主方



癩醫方全

百虫毒方蜈蚣毒万蜘蛛毒万

驗方

雄黃一錢

巴

荳

去油一粒

乾

姜

五分

麝香一分

共研細開水調服

解中蜈蚣毒門主方

驗方

桑汁或桑根桑葉煎湯服

解中蜘蛛毒門主方

驗方

藍青汁服之



南京中医药大学图书馆版权所有

解中蚯蚓毒門主方

凡中蚯蚓毒者形如大痲瘋眉鬚脫落

石灰泡熱水候冷浸良人卽愈

小兒受之

鹽湯溫洗或鴨血塗之



監製馬州支調血金文

蘇州府水... 合製夏人酒愈

中... 大... 蘇州府...

門主式



解中瘟牛肉毒門主論

人有食牛大肉一時心疼不能吐瀉此毒

心胃不

升不降也亦宜用吐如吐之不效當用消肉化毒

丹夫牛大無毒本補精血之物何以一至於此必

牛犬抱病將死又加縛束以激動怒氣三結於皮

肉之間適當其處人誤食之故食之生病重至暴

亡也

凡中馬矢河豚魚蟹毒者心下必堅硬或腹脹口渴

忽發熱妄語者是



癸發辨妄請答吳

此中愚夫何根魚鱗毒者必不心望前夜即明

古也

肉之間處當其烈人病食之若食之本原也

本夫叶神機來入以縣東以海虞以鳳三古不

凡夫中大無毒本漸離血之能所以一至於此必

世不剝出亦宜用也破劫之不效當用前肉分毒

人育食半大肉一部必熱亦指也為血毒 心胃不

輒中盛乎肉毒門主論



南京中医药大学图书馆版权所有

解中瘟牛肉毒門主方

凡誤食瘟牛肉口吐白沫不醒人事

早稻草煎湯灌之立醒

又方

烏柏樹根皮酒煎全熱酒服

又方

菊花連根搗汁全熱酒服

消肉化毒丹

山查

神曲

大黃



南京中医药大学图书馆藏

雷丸各三錢
枳殼
厚樸各一錢

肉水煎服

解中馬肉毒門王方

驗方

蘆根搗汁一碗飲之或者汁服並煎湯洗浴

凡患此毒者宜早服之立止
凡患此毒者宜早服之立止
凡患此毒者宜早服之立止



南京中医药大学图书馆版权所有

解中犬馬肉毒門主方

犬馬肉毒

杏仁去皮四兩研以百沸湯和仁絞汁作三服喫

卽解

又方

急喫冷粥一碗頃刻毒解思食

犬馬河魴諸魚蟹毒心下堅硬或腹脹口渴發熱譫

語梅師方

蘆根煮汁服立解



中六畜肉毒

水煎牆上黃土二錢飲之即解

食自死六畜諸肉中毒

搗黃栢末以水和方寸七服未愈再服

治法以四兩酒以百沸湯味之蘇書對三服也

大魚肉毒

灌中大魚肉毒門主式



南京中医药大学图书馆藏书

解中河魴毒門主論

人有愛食河魴以至血毒中人舌麻心悶重者腹脹
而氣難舒口開而聲不出若久延則害人夫河魴
水族也有食之死有食之無事者何也乃人之腸
胃有宜有不宜耳大約肝經血燥胃氣又弱者多
能中毒蓋河魴乃魚中善怒者也食之自能動氣
况肝血本燥之人肝氣自急以急濟急安得不增
急暴之氣哉氣急難舒故心悶也氣急聲難出故
舌麻也治當吐出其肉則氣舒腹寬聲出何有舌

麻心悶之害乎古有拚死喫河鮪之語其實河鮪不能殺人但性怒不甚相宜耳宜瓜蒂散加味治之

又曰河鮪魚血令人麻子能令人張眼睛令人昏凡食之者必須洗盡血去其子其眼庶無害也

又曰河鮪魚第一宜洗淨血水第二防有灰塵落在鍋內所以炒河鮪賣者多在露天上免灰塵落在在鍋內也

又曰以蘆笋全包則解毒矣

解中河鮠毒門主方

驗方

槐花煎濃汁服之卽解

又方

橄欖煎湯服

又方

急飲人糞汁

中河鮠子毒

急取臘鵝煮食卽不脹矣



湯醫大全
卷三
金魚
聖
卷五
秘書

河鮑菌毒 錢氏

多服金汁即解如難得即於乾地上挖一潭用水
和泥漿稍定服水一二碗即解

又方

香油灌之吐出毒物即愈

又方

磨紫金錠服

加味瓜蒂散

白茅根

蘆根各一兩
瓜蒂 個



南京中医药大学图书馆版权所有

水煎汁服必大吐吐後必愈

救食魚中毒門主方

驗方

煎冬瓜仁汁飲之

又方

煮橘皮湯停冷飲

解黃鱔魚毒門主方

驗方
簡便

食此犯荆芥能害人急服地漿解之

解誤食毒蟹毒門主方



驗方

家紫蘇汁或乾紫蘇煎湯即解

又方

薑汁服

又方

靛青汁或小藍汁服

又方

蒜汁服

又方

薤汁飲之

又方

冬瓜汁服

又方

黑豆汁煎服



解中蠶毒門主論

有食蠶腹痛欲死手足發青而亡者夫蠶雖介屬本無大毒然蠶類多屬化生有蛇化有龜化有魚化者龜魚所化皆益人惟蛇化最毒其腹下必隱隱蛇皮之狀其色大紅必不可食食必殺人腹大痛者乃毒氣攻腸也不必解蠶之毒仍當解蛇之毒

解中蠶毒門主方

煨將蠶肉同莧菜喫成蠶腹脹

速飲白馬尿一碗卽化

中驚毒

白芷

雄

黃

各三錢

丹

砂

山查

枳

實

各一錢

白茯苓

五錢

水煎服一劑痛止二劑毒出矣

又方

飲藍汁數碗或靛青水亦效

又方

鹽汁飲



解中野菌地蕈靈芝毒門三論

陳遠公曰人誤食竹蕈或吞樹菌以致心疼胸脹腸
瀉腹痛而死夫蕈亦芝草之類生於莎葉朽木所
謂臭腐出神奇何以毒種於中乎殊不知竹根樹
柯而生蕈菌者以土之濕熱也濕熱之下必聚蛇
蝎惡虫其氣上騰而蕈菌得氣易於生發故較他
產更肥其味極美而其質實毒也解菌湯救之

Faint vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are mostly illegible due to fading and ghosting.



南京中医药大学图书馆版权所有

解中野菌地蕈靈芝毒門主方

驗方

黃泥漿灌之即解

地漿能解百毒真神方也

又方

橄欖搗為泥食之即解

又方

金汁解

又方

紫金錠磨服即解



南京中医药大学图书馆版权所有

又方

菘豆研生甘草煎濃汁飲卽解

解菌湯

主甘草 二兩

白 芷 三錢

水煎服以鵝翎探喉必盡吐而愈如已入腸探引不吐亦必腹疼下瀉可保生全



解豆腐毒門主方

驗方

蘿蔔湯飲之即解

解麵毒門主方

驗方

多食生蘿蔔即解



解中白菓毒門主方

凡中白菓毒驟然一聲卽暈去儼如驚狀者是
白鯊頭煎湯灌三四次卽甦

又方

麝香一分煎湯服

解誤服輕粉門主方

誤服輕粉筋骨疼痛

川椒去目

每日清晨白湯不拘多少吞之



救六畜瘟疫法

立救丹

白礪砂

白附子

高良薑

猪牙皂

各一錢

雄

黃五分

火

硝二分

麝

香一分

共乳極細末

凡牛馬驢用三分猪羊只用

分俱吹左鼻孔內再點眼角避風立效

癩犬欲死

用蜈蚣三條研末入飯與癩犬食之數日立愈



驗方

甘蔗汁解之

解中櫻桃毒門主方



南京中医药大学图书馆版权所有