



雜局類方發名揮方







揮發方局

朱震亨撰

叢書集成初成編

(本印補)

局方發揮及其他種

一九三七年六月初版

一九五九年十月補印

商務印書館出版

上海虹口印刷廠印刷

局方發揮

元 金華朱彥脩 撰

和劑局方之爲書也。可以據證檢方。卽方用藥不必求醫。不必脩制。尋贖見成丸散。病痛便可安痊。仁民之意可謂至矣。自宋迄今。官府守之以爲法。醫門傳之以爲業。病者恃之以立命。世人習之以成俗。然予竊有疑焉。何者。古人以神聖工巧言醫。又曰醫者意也。以其傳授雖的。造詣雖深。臨機應變。如對敵之將。操舟之工。自非盡君子隨時反中之妙。寧無愧於醫乎。今乃集前人已效之方。應今人無限之病。何異刻舟求劍。按圖索驥。冀其偶然中病難矣。

或曰。仲景治傷寒。著三百一十三方。治雜病。著金匱要略。曰二十有三門。歷代名方。汗牛充棟。流傳至今。明效大驗。顯然耳目。今吾子致疑於局方。無乃失之謬妄乎。

予曰。醫之視病問證。已得病之情矣。然病者一身血氣。有淺深。體段有上下。臟腑有內外。時月有久近。形志有苦樂。肌膚有厚薄。能毒有可否。標本有先後。年有老弱。治有五方。令有四時。某藥治某病。某經用某藥。孰爲正治。反治。孰爲君臣佐使。合是數者。計較分毫。議方治療。貴乎適中。今觀局方。別無病源議論。止於各方條述證候。繼以藥石之分兩脩製藥餌之法度。而又勉其多服。常服。久服。殊不知一方通治諸病。似乎立法簡便。廣絡原野。冀獲一二。寧免許學士之誚乎。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲

爲方圓平直者必於是而取則焉然猶設爲問難藥作何應處以何法許學士亦曰我善讀仲景書而知其意然未嘗全用其方局方制作將擬仲景耶故不揣荒陋敢陳管見倘蒙改而正諸實爲醫道之幸今世所謂風病大率與諸痿證衰同論治良由局方多以治風之藥通治諸痿也古聖論風論痿各有篇目源流不同治法亦異不得不辨按風論風者百病之長至其變化乃爲他病又曰善行數變曰因於露風曰先受邪曰在腠理曰客曰入曰傷曰中歷陳五臟與胃之傷皆多汗而惡風其發明風邪係外感之病有臟腑內外虛實寒熱之不同若是之明且盡也別無癱瘓痿弱卒中不省僵仆喝斜顰縮眩運語澁不語之文新舊所錄治風之方凡十道且卽至寶丹靈寶丹論之曰治中風不語治中風語澁夫不語與語澁其可一例看乎有失音不語有舌強不語有神昏不語有口噤不語有舌縱語澁有舌麻語澁治大腸風祕祕有風熱有風虛曾謂一方可通治乎又曰治口鼻血出夫口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經豈可以輕揚飛竄之腦麝佐之以燥悍之金石乎又曰治皮膚燥痒經曰諸痒爲虛血不榮臍膝所以痒也當與滋補藥以養陰血血和臍潤痒自不作豈可以地黃汁生血夫枯槁之血果能和而生乎果能潤澤臍肉之乾瘦乎又曰治難產死胎血脉不行此血氣滯病也又曰治神昏恍惚久在床枕此血氣虛弱也夫治血以血藥治虛以補藥彼燥悍香竄之劑固可以却滯氣果可以治血而補虛乎潤體丸等三十餘方皆曰治諸風治一切風治一應風治男子三十六

種風其爲主治甚爲浩博且寒熱虛實判然迥別一方通治果合經意乎果能去病乎龍虎丹排風湯俱係治五臟風而排風又曰風發又似有內出之意夫病既在五臟道遠而所感深一則用麻黃三兩以發其表一則用腦麝六兩以瀉其衛而謂可以治臟病乎借曰在龍虎則有寒水石一斤以爲鎮墜在排風則有白朮當歸以爲補養此殆與古人輔佐因用之意合吁臟病屬裏而用發表瀉衛之藥寧不犯誅伐無過之戒乎寧不助病邪而伐根本乎骨碎補丸治肝腎風虛乳香宣經丸治體虛換腿丸治足三陰經虛或因感風而虛或因虛而感風旣曰體虛肝腎虛足三陰經虛病非輕小理宜補養而自然銅半夏葳靈仙荆芥地龍川練烏藥防風牽牛靈脂草烏羌活石南天麻南星檳榔等疏通燥疾之藥居補劑之大半果可以補虛乎七聖散之治風濕流注活血應痛丸之治風濕客腎經衛汗以散風導水以行濕仲景法也觀其用藥何者爲散風何者謂行濕吾不得而知也三生飲之治外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛及痰厥氣虛大有神效治外感以發散仲景法也治內傷以補養東垣法也誰能易之脉之沉伏浮盛其寒熱表裏虛實之相遠若水火然似難同藥痰厥因於寒或能成功血氣虛者何以收救已上諸疑特舉其顯者耳若毫分縷析更僕未可盡也姑用寘之忘言

或曰吾子謂內經風論主於外感其用麻黃桂枝烏附輩將以解風寒也其用腦麝葳靈仙黑牽牛輩將以行凝滯也子之言過矣

予應之曰風病外感善行數變其病多實少虛發表行滯有何不可治風之外何爲又歷述神魂恍惚起

便須人手足不隨神志昏憒癱瘓顰曳手足筋衰眩運倒仆半身不遂腳膝緩弱四肢無力顫掉拘攣不語語澁諸痿等證悉皆治之攷諸痿論肺熱葉焦五臟因而受之發爲痿壁心氣熱生脈痿故脛縱不任地肝氣熱生筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痹而不仁腎氣熱生骨痿故足不任身又曰諸痿皆屬於上謂之上者指病之本在肺也又曰昏惑曰瘛瘲曰瞀悶曰瞀昧曰暴病曰鬱冒曰曠昧曰暴瘡曰瞀瘲皆屬於火又曰四肢不舉曰舌本強曰足痿不收曰痰涎有聲皆屬於上又禮記註曰魚肉天產也以養陽作陽德以爲倦怠悉是濕熱內傷之病當作諸痿治之何局方治風之方兼治痿者十居其九不思諸痿皆起於肺熱傳入五臟散爲諸證大抵只宜補養若以外感風邪治之寧免實實虛虛之禍乎

或曰經曰諸風掉眩皆屬於肝諸暴強直皆屬於風至於掉振不能久立善暴僵仆皆以爲木病肝屬木風者木之氣曰掉曰掉振非顫掉乎曰眩非眩運乎曰不能久立非筋衰乎非緩弱無力乎曰諸暴強直非不隨乎曰善暴僵仆非倒仆乎又曰瞀悶曰瞀昧曰暴病曰鬱冒曠昧曰暴瘡曰瞀瘲與上文所謂屬肝屬風屬木之病相似何爲皆屬於火曰舌本強曰痰涎有聲何爲皆屬於上痿論俱未嘗言及而吾子合火土二家之病而又與倦怠並言總作諸痿治之其將有說以通之乎

予應之曰按原病式曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風而有癱瘓諸證者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外於中風良由將息失宜腎水虛甚則心火暴盛水不制火也火熱之氣怫鬱神昏迷冒筋骨不用而卒倒無所知也亦有因喜怒思悲恐五志過極而卒中者五志過熱甚故也

又原病曰。脾之脉連舌本散舌下。今脾臟受邪。故舌強。又河間曰。胃腑熱甚。火氣炎上。傳化失常。故津液涌而爲痰涎潮上。因其稠黏難出。故作聲也。一以屬脾。一以爲胃熱。謂之屬火與土。不亦宜乎。雖然岐伯仲景孫思邈之言風大意似指外邪之感。劉河間之言風明指內傷熱證。實與痿論所言諸痿生於熱相合。外感之邪有寒熱虛實。而挾寒者多。內傷之熱皆是虛證。無寒可散。無實可瀉。局方本爲外感立方。而以內傷熱證衰同論治其爲害也。似非細故。

或曰。風分內外。痿病因熱。旣得聞命矣。手陽明大腸經。肺之腑也。足陽明胃經。脾之腑也。治痿之法。取陽明一經。此引而未發之言。願明以告我。

予曰。諸痿生於肺熱。只此一句。便見治法大意。經曰。東方實。西方虛。瀉南方。補北方。此固是就生尅言。補瀉而大經大法。不外於此。東方木。肝也。西方金。肺也。南方火。心也。北方水。腎也。五行之中。惟火有二。腎雖有二。水居其一。陽常有餘。陰常不足。故經曰。一水不勝二火。理之必然。肺金體燥而居上。主氣。畏火者也。脾土性濕而居中。主四肢。畏木者也。火性炎上。若嗜慾無節。則水失所養。火寡於畏。而侮所勝。肺得火邪而熱矣。木性剛急。肺受熱則金失所養。木寡於畏而侮所勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不能爲用。而諸痿之病作。瀉南方。則肺金清而東方不實。何脾傷之有。補北方。則心火降而西方不虛。何肺熱之有。故陽明實則宗筋潤。能東骨而利機關矣。治痿之法。無出於此。駱隆吉亦曰。風火旣熾。當滋腎水。東垣先生取黃芩爲君。黃芪等補藥之輔佐。以治諸痿。而無一定之方。有兼痰積者。有濕多

者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治瘧者乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜聖醫不治也天產作陽厚味發熱先哲格言但是患瘧之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

或曰小續命湯與要略相表裏非外感之藥乎地仙丹治勞傷腎懶非內傷之藥乎其將何以議之予曰小續命湯比要略少當歸石膏多附子防風防己果與仲景意合否也仲景謂汗出則止藥局方則曰久服差又曰久病風陰晦時更宜與又曰治諸風似皆非仲景意然麻黃防己可久服乎諸風可通治乎地仙丹既曰補腎而滋補之藥與僭燥走竄之藥相半用之腎惡燥而謂可以補腎乎借曰足少陰經非附子輩不能自達八味丸仲景腎經藥也八兩地黃以一兩附子佐之觀此則是非可得而定矣非吾之過論也

又觀治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用安息香丸丁沉丸大沉香丸蘇子丸勻氣散如神九集香丸白沉香丸煨姜丸鹽煎散七氣湯九痛溫白丸生姜湯其治嘔吐膈噎也用五膈丸五膈寬中散膈氣散酒癥丸草豆蔻丸撞氣丸人參丁香散其治吞酸也用丁沉煎丸小理中丸其治痰飲也用倍朮丸消飲丸溫中化痰丸五套丸且於各方條下或曰口苦失味曰噫酸曰舌澁曰吐清水曰痞滿曰氣急曰脇下急痛曰五心中熱口爛生瘡皆是明著熱證何爲率用熱藥夫周流於人之一身以爲生者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不傷於七情外不感於六淫其爲氣也何病之有今曰冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而至於上焦不納中焦

不化下焦不滲。展轉傳變爲嘔爲吐爲脢爲噎爲痰爲飲爲翻胃爲吞酸。夫治寒以熱治熱以寒此正治之法也。治熱用熱治寒用寒此反佐之法也。詳味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能無疑也謹按原病式曰諸嘔吐酸皆屬於熱諸積飲痞脢中滿皆屬於濕諸氣逆衝上嘔涌溢食不下皆屬於火諸堅痞腹滿急痛吐腥穢皆屬於寒深契仲景之意金匱要略曰胃痹病胃背痛括萎薤白湯主之胃痹心痛微背括萎薤白半夏湯主之心下痞氣氣結在胃脇下上逆搶心者枳實薤白括萎桂枝湯主之嘔而心下痞者半夏瀉心湯主之乾嘔而利者黃芩加半夏生姜湯主之諸嘔吐穀不得入者小半夏湯主之嘔吐病在膈上者猪苓湯主之胃反嘔吐者半夏參蜜湯主之食已卽吐者大黃甘草湯主之胃反吐而渴者茯苓澤瀉湯主之吐後欲飲者文蛤湯主之病似嘔不嘔似嘯不嘯心中無柰者姜汁半夏湯主之乾嘔手足冷者陳皮湯主之嘔逆者陳皮竹茹湯主之乾嘔下痢者黃芩湯主之氣衝上者皂莢丸主之上氣脈浮者厚朴麻黃湯主之上氣脈沉者澤漆湯主之大逆上氣者麥門冬湯主之心下有痰飲胃脇支滿目眩茯苓桂枝湯主之短氣有微飲當從小便出之宜茯苓桂朮甘草湯腎氣丸亦主之病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿者此爲流飲欲去故立甘遂半夏湯主之病懸飲者十聚湯主之病溢飲者當發其汗宜大青龍湯又宜用小青龍湯心下有支飲其人若冒眩澤瀉湯主之支飲胃滿者厚朴大黃湯主之支飲不得息葶苈大棗瀉肺湯主之嘔家本渴今反不渴心中有支飲故也小半夏湯主之卒嘔吐心下痞脢間有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而頭眩

水也。五苓散主之心胷有停痰宿水，自吐水後，心胷間虛氣滿，不能食消痰氣，令能食。茯苓飲主之，先渴後嘔，爲水停心下此屬飲家半夏加茯苓湯主之。觀其微意可表者汗之，可下者利之，滯者導之，鬱者揚之，熱者清之，寒者溫之，偏寒偏熱者反佐而行之。挾濕者淡以滲之，挾虛者補而養之，何嘗例用辛香燥熱之劑，以火濟之火實虛虛，咎將誰執。

或曰：脉訣謂熱則生風，冷生氣，寒主收引，今冷氣上衝矣，氣逆矣，氣滯矣，非冷而何？吾子引仲景之言而斥其非，然則諸氣諸飲，嘔吐反胃，吞酸等病，將無寒證耶？

予曰：五臟各有火，五志激之，其火隨起，若諸寒爲病，必須身犯寒氣，口得寒物，乃爲病寒，非若諸火病自內作，所以氣之病寒者十無一二。

或曰：其餘痰氣嘔吐者，酸噎脅反胃作熱，作火論治，於理可通，若病人自言冷氣從下而上者，非冷而何？

予曰：上升之氣自肝而出，中挾相火，自下而出，其熱爲甚，自覺其冷，非真冷也，火極似水積熱之甚，陽亢陰微，故見此證。冷生氣者，出高陽生之謬言也。若病果因感寒，當以去寒之劑治之，何至例用辛香燥熱爲方，不知權變，寧不悞人。

或曰：氣上升者，皆用黑錫丹、養正丹、養氣丹等藥，以爲鎮墜，然服之者，隨手得效，吾子以爲熱甚之病，亦將有悞耶。

予曰相火之外又有臟腑厥陽之火五志之動各有火起相火者此經所謂一水不勝二火之火出於天造厥陽者此經所謂一水不勝五火之火出於人欲氣之升也隨火炎上升而不降孰能禦之今人欲借丹藥之重墜而降之氣鬱爲濕痰丹性熱燥濕痰被劫亦爲暫開所以清快丹藥之法偏助狂火陰血愈耗其升愈甚俗人喜溫迷而不返彼此禍者滔滔皆是

或曰丹藥之墜欲降而升然則如之何則可

予曰投以辛涼行以辛溫制伏肝邪治以鹹寒佐以甘溫收以苦甘和以甘淡補養陰血陽自相附陰陽比和何升之有先哲格言其則不遠吾不贅及

或曰吐酸素問明以爲熱東垣又言爲寒何

予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間略不得上嚥不得下臟表得風寒則內熱愈篤而酸味刺心臟表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法爲未合經意予嘗治吞酸用黃連茱萸各製炒隨時令迭爲佐使蒼朮茯苓爲主病湯浸炊餅爲小丸吞之仍教以粗食蔬菜自養則病

易安

或曰蘇合香丸雖是類聚香藥其治骨蒸殮瘞月閉狐狸等病吾子以爲然乎

予曰古人製方用藥羣隊者必是攻補兼施彼此相制氣味相坎孰爲主病孰爲引經或用正治或用反佐各有意義今方中用藥十五味除白朮朱砂阿子共六兩其餘十二味共二十一兩皆是性急輕竄之劑往往用之於氣病與暴仆昏昧之人其衝突經絡漂蕩氣血若摧枯拉朽然不特此也至如草豆蔻散教人於夏月濃煎以代熱水夫草豆蔻性大熱去寒邪夏月有何寒氣而欲多服縮脾飲用草果亦是此意且夏食寒所以養陽也草豆蔻草果其食寒之意乎不特此也抑又有甚者焉接氣丹曰陽氣暴絕當是陰先虧陰先虧則陽氣無所依附遂致飛越而暴絕也上文乃曰陰氣獨盛陰氣若盛陽氣焉有暴絕之理假令陽氣暴絕宜以滋補之劑保養而鎮靜之庶乎其有合夏食寒以爲養陽之本何至又服辛香燥熱之劑乎且此丹下咽暴絕之陽果能接乎孰爲是否君其筭之

或曰局方言陰勝陰邪盛也陰邪既盛陽有暴絕之理子之所言與陽氣相對待之陰也果有陰虧而陽絕者吾子其能救之乎

予曰陰陽二字固以對待而言所指無定在或言寒熱或言血氣或言臟腑或言表裏或言動靜或言虛實或言清濁或言奇偶或言上下或言正邪或言生殺或言左右求其立言之意當是陰鬼之邪耳陰鬼爲邪自當作邪鬼治之若陰先虧而陽暴絕者嘗治一人矣浦江鄭兄年近六十奉養受用之人也仲夏久患滯下而又犯房勞忽一晚正走廁間兩手舒撒兩眼開而無光尿自出汗如雨喉如拽鋸呼吸甚微

其脉大而無倫次無部位可畏之甚余適在彼急令煎人參膏且與灸氣海穴艾炷如小指大至十八壯右手能動又三壯脣微動參膏亦咸遂與一盞至半夜後盡三盞眼能動盡二斤方能言而索粥盡五斤而利止十斤而安

或曰諸氣諸飲與嘔吐吞酸膈噎反胃等證局方未中肯綮我知之矣然則要略之方果足用乎抑猶有未發者乎

予曰天地氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也醫之良者引例推類可謂無窮之應用借令略有加減脩合終難踰越矩度夫氣之初病也其端甚微或因些少飲食不謹或外冒風雨或內感七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒火炎上以致津液不行清濁相干氣爲之病或痞或痛不思食或噫腐氣或吞酸或嘈雜或膨滿不求原本便認爲寒遽以辛香燥熱之劑投之數貼時暫得快以爲神方厚味仍前不節七情反復相仍舊病被刦暫開濁液易於攢聚或半月或一月前證復作如此延蔓自氣成積自積成痰此爲痰爲飲爲吞酸之由也良工未遇繆藥又行痰挾瘀血遂成窠囊此爲痞爲痛嘔吐爲噎膈反胃之次第也飲食湯液滯泥不行滲道蹇澁大便或祕或溏下失傳化中焦愈停醫者不察猶執爲冷翻思前藥隨手得快至此賓主皆恨藥欠燥熱顚侗久服可以溫脾壯胃消積行氣以冀一旦豁然之效不思胃爲水穀之海多血多氣清和則能受脾爲消化之氣清和則能運今反得香熱之偏助氣血沸騰其始也胃液凝聚無所容受其久也脾氣耗散傳化漸遲其

有胃熱易饑急於得食脾傷不磨鬱積成痛醫者猶曰虛而積寒非尋常草木可療徑以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入亦不多名之曰噎其槁在下與胃爲近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便祕少若羊矢然名雖不同病出一體要略論飲有六曰痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲分別五臟諸證治法至矣盡矣第恨醫者不善處治病者不守禁忌遂使藥助病邪展轉深痼去生漸遠深可哀憫

或曰千金諸方治噎膈反胃未嘗廢姜桂等劑何吾子之多言也

予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不足以行然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯苓黃芩蘆根括囊等藥爲之佐使其始則同其終則異病邪易伏其病自安

或曰胃脘乾槁者古方果可治乎將他有要捷之法者或可補前人之未發者乎

予曰古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以消痰乾薑以養血粟米以實胃蜜水以潤燥姜以去穢正是此意張雞峯亦曰噎當時神思間病惟內觀自養可以治之此言深中病情而施治之法亦爲近理夫噎病生於血乾夫血陰氣也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二氣有養陰血自生腸胃津潤傳化合宜何噎之有因觸類而長曾製一方治中年婦人以四物湯加和白陳皮留尖桃仁生甘草酒紅花濃煎入驢尿飲以防其或生蟲也與數十貼而安又台州治一匠者年近三十勤於工作而有艾妻且喜酒其面白其脉濇重則大而無力令其謝去工作臥於牛家取新溫牛乳細飲之每頓進一杯一晝夜

可飲五七次。盡卻食物。以漸而至八九次。半月大便潤。月餘而安然。或口乾。蓋酒毒未解。間飲甘蔗汁少許。

或者又曰。古方之治噎膈反胃。未有不言寒者。子何不思之甚。

予曰。古人著方必爲當時抱病者設也。其人實因於寒。故用之而得效。後人遂錄以爲今式。不比局方泛編成書。使天下後世之人。凡有此證者。率遵守以爲之定法。而專以香熱爲用也。雖然。挾寒者亦或有之。但今人之染此病。率因痰氣久得醫藥傳變而成。其爲無寒也明矣。

或曰。治脾胃以溫補藥。豈非局方之良法耶。吾子其將何以議之。

予曰。衆言淆亂。必折諸聖。切恐脾胃有病。未必皆寒。觀其養脾丸。治脾胃虛冷。體倦不食。嘉禾散。治脾胃不和。不能多食。消食丸。治脾胃俱虛。飲食不下。小獨聖丸。治脾胃不和。不思飲食。大七香丸。治脾冷胃虛。不思飲食。連翹丸。治脾胃不和。飲食不下。分氣紫蘇飲。治脾胃不和。木香餅子。治脾胃虛寒。溫中良姜丸。曰溫脾胃。奪命抽刀散。曰脾胃冷。燒脾散。曰脾胃虛。進食散。曰脾胃虛冷。不思飲食。丁香養散。曰脾冷胃寒。二姜丸。曰養脾溫胃。姜合丸。曰脾胃久虛。蓬煎丸。曰脾胃虛弱。守金丸。曰脾胃虛冷。集香丸。曰脾胃不和。蟠葱散。曰脾胃虛冷。壯脾丸。曰脾胃虛弱。人參丁香散。曰脾胃虛弱。人參煮散。曰脾胃不和。丁沉透膈湯。曰脾胃不和。丁香五奪丸。曰脾胃虛弱。膾肭臍丸之壯氣暖腎。兔絲子丸之治腎虛。金釵石斛丸之治氣不足。茴香丸之治臟虛冷。玉霜丸之治氣虛。安腎丸之治腎積寒。麝香鹿茸丸之益氣養正丹之治諸

虛朴附丸之治脾胃虛弱。接氣丹之治真氣虛。四神丹之治五臟沉香鹿茸丸之治氣不足。椒附丸之溫五臟。蔻蓉大補丸之治元臟元氣虛。鍾乳白澤丸之治諸虛。三建湯之治氣不足。甚者類聚丹劑悉曰補脾胃。溫脾胃。補腎補五臟。補真氣。而各方條下曰舌苦。曰面黃。曰舌苦無味。曰中酒吐酒。曰酒積。曰酒口。曰飲酒多。曰酒過傷。曰氣促喘急。曰口淡。曰舌澀。曰噫醋。曰舌乾。曰溺數。曰水道澁痛。曰小便出血。曰口苦。曰咽乾。曰氣促。曰盜汗。曰失精。曰津液內燥。曰氣上衝。曰外腎痒。曰枯槁失血。曰口唇乾燥。曰喘滿。曰肢體煩疼。曰衄血。曰小便淋瀝。悉是明具熱證。如何類聚燥熱而謂可以健脾溫胃而滋腎補氣乎。經曰。熱傷脾。常服燥熱。寧不傷脾乎。又曰。腎惡燥。多服燥熱。寧不傷腎乎。又曰。熱傷元氣。久服燥熱。寧不傷氣乎。又曰。用熱遠熱。又曰。有熱者寒而行之。此教人用熱藥之法。蓋以熱藥治寒病。苟無寒藥爲之嚮導。佐使。則病拒藥而扞格不入。謂之遠熱者。行之有寒也。兩句同一意。恐後人不識此理。故重言以明之。今局方辛香燥熱。以類而聚之。未嘗見其所謂遠熱也。用熱而不遠熱。非惟不能中病。抑且正氣先傷。醫云乎哉。夫良醫之治病也。必先求其得病之因。其虛邪也。當治其母。實邪也。當治其子。微邪也。當治其所勝。賊邪也。當治其所不勝。正邪也。當治其本。經索矩。又謂雜合受邪病者。所受非止一端。又須察其有無雜合之邪。輕重。較量視標本之緩急。以爲施治之先後。今乃一切認爲寒冷。吾不知脾胃與腎。一向只是寒冷爲病耶。論方至此。雖至愚昧。不能不致疑也。吾又攷之要略矣。諸嘔吐穀。不得入者。小半夏湯主之。疸病寒熱不食。食則頭眩。心腎不安者。茵陳湯主之。身腫而冷。腎室不能食。病在骨節。發汗則安。心腎停痰吐

水虛滿不能食者。茯苓湯主之。中風手足拘急。惡寒不欲飲食者。三黃湯主之。下利不欲飲食者。大承氣湯主之。五勞虛極羸瘦不能食者。大黃蠙虫丸主之。虛勞不足。汗出而悶。脈結心悸者。炙甘草湯主之。虛勞腰痛。小腹拘急者。八味丸主之。虛勞不足者。大薯蕷丸主之。虛勞虛煩不得眠者。酸棗仁湯主之。夫嘔者。胃滿者。吐水者。下利者。惡寒者。腫而冷者。不能飲食者。虛勞羸瘦者。虛勞汗而悸者。虛勞而腰痛者。虛勞不足者。虛勞煩而不眠者。自局方之法觀之。寧不認爲寒冷而以熱藥行之乎。仲景施治則不然也。痰者導之。熱者清之。積者化之。濕者滲之中。氣清和自然安裕。虛者補之。血凝者散之。躁者寧之。熱者和之。陰氣清寧。何虛勞之有也。

或曰。傷寒一門。雖取雜方。仲景之法。亦摘取之矣。吾子其忘言乎。

予曰。傷寒之法。仲景而下。發明殆盡。局方是否。愚不必贅。雖然。仲景論傷寒矣。而未及乎中寒。先哲治冒大寒而昏中者。用附子理中湯而安。其議藥則得之矣。曰傷。曰中。未聞有議。其意同之者。予俛而思之。傷寒有卽病。有不卽病。必大發熱。病邪循經而入。以漸而深。中寒則倉卒感受。其病卽發而暴。傷寒之人。因其舊有鬱熱。風寒外束。肌腠自密。鬱發爲熱。其初也。用麻黃桂枝輩。微表而安。以病體不甚虛也。中寒之人。乘其腠理疎豁。一身受邪。難分經絡。無熱可發。溫補自解。此謂氣之大虛也。傷寒熱雖甚不死。中寒若不急治。去生甚遠。其虛實蓋可見矣。

或曰。脾胃一門。予以局方用藥太熱。未合經意。若平胃散之溫和。可以補養胃氣。吾子以爲何如。

予曰蒼朮性燥氣烈行溫解表甚爲有力厚朴性溫散氣非脹滿實急者不用承氣用之可見矣雖有陳皮甘草之甘緩甘辛亦是決裂耗散之劑實無補土之品經謂土氣大過曰敦阜亦能爲病況胃爲水穀之海多氣多血故因其病也用之以瀉有餘之氣使之平爾又雖察其挾寒得寒物者投之胃氣和平便須卻藥謂之平者非補之之謂其可常服乎

或曰調胃承氣亦治胃病謂之調者似與平胃散之平意義相近何用藥之相遠也

予曰調胃承氣治熱中下二焦藥也經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘功在乎導利而行之以緩平胃

散止治濕上焦之藥也經曰濕上甚而熱治以苦濕佐以甘辛以汗爲效而止

或曰治濕不利小便非治也非仲景法耶何子言之悖也

予曰淡滲治濕以其濕在中下二焦今濕在上宜以微汗而解不欲汗多故不用麻黃乾葛輩

或曰局方用藥多是溫補或以爲未合中道積熱痼冷二門其制作其取用吾子其無以議之矣

予曰張仲景言一百八病五勞六極七傷與婦人共三十六病孫真人言四百四病凡遇一病須分寒熱果寒耶則熱之果熱耶則寒之寒熱甚耶則反佐而制之今列病之目僅十有餘而分積熱痼冷兩門何不思之甚也要略中風脈緊爲寒浮爲虛肺痿吐涎不能飲不渴必遺溺此爲肺中冷甘草乾姜湯溫之腹滿痛時減如故此爲寒宜溫之下利欲嘔不能此腹中寒也脇下偏痛脈弦緊此寒也宜大黃附子細辛湯溫之痰飲脉雙弦者寒也黃疸發熱煩喘胃滿口燥又被火劫其汗病從濕得身盡熱而黃此熱在

內宜下之下利脈數而渴設不差則清膿血以其有熱也婦人能食病七八日而更發熱者此爲胃實氣熱宜大承氣下之產後七八日若太陽證小便堅滿此惡露不盡不大便四五日發熱晡時煩燥食則妄言此熱在裏結在膀胱宜大承氣利之安婦人或中風或傷寒經水適來適斷有寒熱者爲熱入血室今局方不曾言病而所謂寒與熱者其因何在其病何名果然雜合所受邪果無時令資稟之當擇耶據外證之寒熱而遂用之果無認假爲真耶果以是爲非也

或曰以寒熱爲篇目固未合經意若其諸方果有合乎

予曰有積熱爲篇目固有可議若諸方之制作取用儘有妙理吾其爲子發明前人之意恐可爲用者涓埃之助夫紫雪者心脾肝腎脾胃經之藥也通中散洗心散表裏血氣之藥也涼膈散心肺脾胃之藥也龍腦飲子勝冰丹真珠散靈液丹上中二焦之藥也碧雷雞蘇丸三黃丸八正散三焦藥也甘露丸心脾肝之藥也涼膈丸心脾胃之藥也抱龍丸麥門冬散心肺肝之藥也妙香丸疏快腸胃制伏木火藥也甘露飲心肺胃藥也五淋散血而裏藥也消毒飲氣而表藥也麻仁丸氣而裏藥也導赤丸氣與血而裏藥也導赤散心小腸藥也有升有降有散有補有滲導有驅逐有因用有引經或緩之以甘或收之以酸或行之以香或因之以蠟或燥之以苦觀其立方各有所主用方之人宜求其意若夫痼冷門尤有可議者冷卽寒也內經以寒爲殺厲之氣今加痼於冷之上豈非指身惡寒而口喜熱之病耶若以外證便認爲痼冷宜乎夏英公之常飭烏附常御綿帳不知濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒經曰亢則害承

乃制。又劉河間曰。火極似水。故見此證。當治以鹹寒。佐以甘溫。視標之先後。正邪之虛實。孰緩孰急。爲之正法。何至類用烏附丹劑。僭燥之藥。抱薪救火。屠劙何異。古人治戰慄。有以大承氣湯下之而愈者。惡寒戰慄。明是熱證。亦是因久服熱藥而得之者。但有虛實之分耳。進士周本道年近四十。得惡寒證。服附子數日而病甚。求余治。診其脉弦而似緩。遂以江茶入薑汁。香油些少。吐痰一升許。減綿大半。又與通聖散去麻黃。大黃芒硝加當歸。地黃百餘貼而安。又一色目婦人。年近六十六。月內常覺惡寒戰慄。喜啖熱御綿。多汗如雨。其形肥濶厚。已得附子二十餘。但渾身痒甚。兩手脉沉濶。重取稍大。知其熱甚而血虛也。以四物湯去川芎。倍地黃。加白朮。黃芪。炒藥生甘草。人參。每貼二兩重。方與一貼。腹大泄。目無視口無言。予知其病熱深而藥無反佐之過也。仍取前藥熟炒與之。蓋借火力爲嚮導。一貼利止。四貼精神回。十貼病全安。又蔣氏婦年五十餘。形瘦面黑。六月喜熱惡寒。兩手脉沉而濶。重取似數。以三黃丸下以姜汁。每三十粒。三十貼。微汗而安。彼以積熱痼冷爲敍方之篇目。其得失可知矣。

泄痢一門。其用鍾乳健脾丸。朝真丸。駐車丸。呵梨勒丸。大溫脾丸。黃連阿膠丸。胡粉丸。桃花丸。訶梨勒散。木香散。七聚湯。赤石脂散。養臟湯。御米湯。金粟湯。狗頭骨丸。豆蔻丸。肉豆蔻散。三神丸。丁香豆蔻散。止瀉丸。皆用熱藥爲主治。以澁藥爲佐使。當爲腸虛感寒而成滑痢者設也。彼瀉痢者。將無熱證耶。將無積滯耶。內經曰。春傷於風。夏爲膿血。多屬滯下。夫瀉痢證其類尤多。先賢曰。濕多成瀉。此確論也。曰風曰濕。固不可得而通治矣。況風與濕之外。又有雜合受邪。似難例用澁熱之劑。今方中書證。有兼治裏急者。有兼

治後重者有兼治裏急後重者此豈非滯下之病乎今瀉利與滯下衰同論治實實虛虛之患將不俟終日矣

或曰然則瀉痢與滯下爲病不同治法亦別吾子其能通之乎

予曰經曰暴注下迫皆屬於熱又曰暴注屬於火又下痢清白屬於寒熱君火之氣火相火之氣寒水之氣屬火熱者二屬水寒者一瀉痢一證似乎屬熱者多屬寒者少詳玩局方專以熱瀉爲用若用之於下痢清白而屬於寒者斯可矣經所謂下迫者卽裏急後重之謂也其病屬火相火所爲其毒甚於熱也投以瀉熱非殺之而何謹按仲景之法謂下痢脉滑而數者有宿食當下之下痢脉遲而滑者實也痢爲未止急下之下痢脉反滑當有所去下之安下痢不欲食有宿食者當下之痢腹滿痛爲寒爲實當下之下痢腹堅實當下之下痢譖語有燥矢當下之下痢二部皆平按之心下堅急下之下痢已差至其時復發者此爲下未盡更下之安下痢脉大浮弦下之當自愈風寒下者不可下下後心下堅痛脉遲此爲寒宜溫之脉浮大此爲虛強下之故也設脉浮革者因而腸鳴當溫之下痢脉遲緊痛未欲止當溫之下痢心痛急當救裏可與理中四逆附子輩下痢大孔痛宜溫之觀仲景可下者十法可溫者五法謂之下者率用承氣加減何嘗以砒丹巴硝決烈燥熱重毒之劑謂之溫者率用姜附爲主何嘗用鍾乳龍骨石脂粟殼緊瀉燥毒之劑

或曰可下者豈非腸胃有積滯乎不用砒丹巴硝恐積滯未易行也吾子以爲未然幸發明承氣之意

可乎。

予曰大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快無所留滯積行卽止砒丹巴硇毒熱類聚劑成丸藥其氣凶暴其體重滯積垢雖行毒氣未過譬如強暴貪賊手持兵刃其可使之徘徊顧瞻於堂奧間乎借使有愈病之功其腸胃清淳之氣能免旁損暗傷之患乎仲景治癆可溫者溫可下者下或解表或利小便或待其自己區別易治難治不治之證至爲詳密然猶與滯下衰同立方命論其後劉河間分別在表在裏挾風挾濕挾熱挾寒挾虛明著經絡隄防傳變大概發明滯下證治尤爲切要和血則便濃自愈調氣則後重自除此實盲者之日月聾者之雷霆也。

或曰局方法將終不能彷彿仲景之方耶。

予曰圓機活法內經具舉與經意合者仲景之書也仲景因病以製方局方製藥以俟病若之何其能彷彿也宋命近臣讎校方書彼近臣者術業素異居養不同焉知爲醫之事哉雖然知尊仲景矣亦未嘗不欲效之也徒以捧心效西施爾觀桃花丸一方可見矣卽要略桃花湯也仲景以治便膿血用赤石脂完者乾薑粳米同煮作湯一飲病安便止後藥意謂病屬下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之澀且重不能止血粳米味甘引入腸胃不使重澁之體少有凝滯故煮成湯液藥行易散餘毒亦無局方不知深意不造妙理但取易於應用喜其性味溫補借爲止瀉良方改爲丸藥劑以麵糊日與三服其果能與仲景之意合也。

或曰河間之言滯下似無挾虛挾寒者然乎否乎幸明以告我

予曰泄痢之病水穀或化或不化並無勞責惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相混雖有痛不痛大痛之異然皆裏急後重逼迫惱人攷之於經察之於證似乎皆熟證實證也余近年涉歷亦有大虛大寒者不可不知敢筆其略以備采覽余從叔年踰五十夏間患滯下病腹微痛所下褐色後重頻併穀食大減時有微熱察其脉皆弦而濡似數而稍長卻喜不甚浮大兩手相等視其神氣大減余曰此非滯下憂慮所致心血虧脾氣弱耳遂與參朮爲君當歸身陳皮爲臣川芎炒白芍藥茯苓爲佐使時暄熱甚加少黃連與兩日而安梅長官年三十餘奉養厚者夏秋間患滯下腹大痛有人教服單煮乾薑與一貼痛定少頃又作又與又定由是服乾姜至三斤八日後予視之左脉弦而稍大似數右脉弦而稍大減亦似數重取之似緊余曰此必醉飽後喫寒冷太過當作虛寒治之因其多服乾姜遂教四物湯去地黃加入參白朮陳皮酒紅花茯苓桃仁煎入生姜汁飲之至一月而安金氏婦年近四十秋初尙熱患滯下腹但隱痛夜重於晝全不得睡食亦稍減口乾不飲已得治痢靈砂二貼矣余視之兩手脉皆濡且不勻神思倦甚飲食全減因與四物湯倍加白朮爲君以陳皮佐之與十數貼而安此三病者若因其逼迫而用峻劑豈不悞人

或曰局方諸湯可以清痰可以消積可以快氣可以化食口鼻既宜脅膈亦紓平居無事思患預防非方之良者乎

予曰清香美味誠足快意揆之造化恐未必然經曰陰平陽祕精神乃治氣爲陽宜降血爲陰宜升一升一降無有偏勝是謂平人今觀諸湯非豆蔻縮砂乾姜良姜之辛宜於口非丁香沉檀蘇桂之香宜於鼻和以酸鹹甘淡其將何以悅人奉養之家閑佚之際主者以此爲禮賓朋以此取快不思香辛升氣漸至於散積溫成熱漸至鬱火甘味戀膈漸成中滿脾主中州本經自病傳化失職清濁不分陽亢於上陰微於下謂之陰平可乎謂之陽祕可乎將求無病適足生病將求取樂反成受苦經曰久而增氣物化之常氣增而久夭之由也其病可勝言哉

或曰舍利別非諸湯之類乎其香辛甘酸殆有甚焉何言論弗之及也

予曰謂之舍利別者皆取時果之液煎熬如餳而飲之稠之甚者調以沸湯南人因名之曰煎味雖甘美性非中和且如金櫻煎之縮小便杏煎楊梅煎蒲桃煎櫻桃煎之發冒火積而至久濕熱之禍有不可勝言者僅有桑椹煎無毒可以解渴其餘味之美者並是嬉笑作罪然乎否乎

或曰婦人一門無非經候胎產帶下用藥溫暖於理頗通吾子其無忘言乎

予曰婦人以血爲主血屬陰易於虧欠非善調攝者不能保全也餘方是否姑用置之若神仙聚寶丹則有不能忘言者其方治血海虛寒虛熱盜汗理宜補養琥珀之燥麝香之散可以用乎面色萎黃肢體浮腫理宜導濕乳香沒藥固可治血可以用乎胎前產後虛實不同逐敗養新攻補難並積塊堅癥赤白崩漏宜於彼者必妨於此而欲以一方通治乎世人以其貴細溫平又喜其常服可以安神去邪令人有子

殊不知積溫成熱。香竄散氣服者無不被禍。自非五臟能言。醫者終不知覺。及至變生他病。何曾歸咎此丹。余姪女形色俱實。以得子之遲。服此藥。背上發癰。證候甚危。余診其脈。散大而濁。急以加減四物湯。百餘貼。補其陰血。幸其質厚。易於收救。質之薄者。悔將何及。若五積散之治產後餘血作痛。則又有不能忘言者。以蒼朮爲君。麻黃爲臣。厚朴枳殼爲佐。雖有芍藥當歸之補血。僅及蒼朮三分之一。且其方中言婦人血氣不調。心腹撮痛。閉而不行。並宜服之。何不思產後之婦。有何寒邪。血氣未充。似難發汗。借曰推陳致新。藥性溫和。豈可借用麻黃之散。附以蒼朮枳麻。虛而又虛。禍不旋踵。率爾用藥。不思之甚。

或曰。初產之婦。好血已虧。瘀血尚留。黑神散。非要藥歟。

予曰。至哉坤元。萬物資生理之常也。初產之婦。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必寒。何以藥爲飲食起居。勤加調護。何病之有。誠有污血體怯而寒。與之數貼。亦有簡便。或有他病。當求病起何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。疑者行之。虛者補之。血多者止之。何用海製此方。不恤無病生病。彼黑神散者。用乾姜當歸之溫熱。黑豆之甘。熟地黃之微寒。以補血之虛。佐以炒蒲黃之甘。以防出血之多。芍藥之酸寒。有收有散。以爲四藥之助。官桂之大辛熱。以行滯氣。推凝血。和以甘草之緩。其爲取用。似乎精密。然驅逐與補益似難。同方施治。設有性急者。形瘦者。本有怒火者。夏月坐蓐者。時有火令。姜桂皆爲禁藥。論語未達之戒。不知誰執其咎。至於將護之法。尤爲悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具有訓戒。胡爲以羊雞濃汁作糜。而又常服當歸丸。當歸建中湯。四順理中丸。雖是滋補。悉犯桂附乾姜。

僭熱之劑。臟腑無寒何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便啖雞子。且喫火鹽。不思雞子難化。火鹽發熱。展轉爲病。醫者不識。每指他證。率爾用藥。寧不悞人。余每見產婦之無疾者。必教以卻去黑神散。與夫雞子火鹽諸般肉食。且與白粥將理。間以些少石晉蠶。令甘淡食之。至半月以後。方與少肉。若雞子亦須豁開淡煮。大能養胃。卻疾。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風。氣痛膈滿。痰逆口乾。經水不調。髮脫體熱。皆是陽勝陰虛之病。天生血氣。本自和平。曰勝曰虛。又因知非此等繆妄。有以啓之耶。



方名類雜

詳不人撰

本館據濟生拔萃
本影印初編各叢
書僅有此本

雜類名方藥目錄

濟生拔粹卷第十九

麒麟竭散

虎骨丸

如聖散

清膈湯

增損防風通聖散

防己黃耆湯

交解飲子

木香分氣丸

藿香安胃散

流氣飲子

大枳殼丸

木香欒榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅鉛散疳瘡

固真丹

噙藥

蒼金砂散丁瘡

蟾光膏目疾

搽牙藥

破傷方

益智湯

取丁瘡藥 經効

勻氣散

復堅散 瘡

三和丸

神應散 牙疼

善應膏

通頂散

刀剪藥

金砂流溫丸

三腕瘡氣丸

二十八宿散

治大疥方

治疥癬

桃紅散

烏金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五痔散

赴筵散

玉壺散 瘻

咽喉痛方

如聖散 吹效

治風狗傷

藥蛆方

治癰瘡

祛風至寶丹

起死神應丹

諸惡瘡方

治破傷風將死

獨聖散

常山散瘧

三和湯

浴疥癬方

治血疝

沉香尊重丸

神人阿魏散勞

救苦黃耆散

受拜平胃散

獨活散

導水丸下劑

治大頭喉痺散

當歸散血崩

蓮殼散

治喉痺方

防風通聖散

萬應針頭丸

舶瘞丹

桃仁煎丸諸積

雜類名方藥目錄 濟生拔粹卷第十九

雜類名方

麒麟竭散

治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸

各一錢
陸參

水蛭

杵碎炒令烟盡

麝香

各一錢

虎脰骨

酥炙黃五分

右八味爲細末和勻每服二錢

溫酒調下食前

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脉挛急遇陰寒愈痛

南乳香

另研沒藥

另研赤芍藥

熟地黃

虎脰骨

酥炙黃

當歸

各一錢

血竭

五分

右爲末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻繩綁定勿令透氣好酒一升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和爲丸如桐子大每服五十丸病在上食後在下

食前溫酒下

如聖散 治時氣繹喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃

細研

白礬

飛藜蘆去皮用心生用

猪牙皂角

去皮炙黃

右等分爲細末每用一豆許吹鼻內立効

清膈湯

治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草

炒

芥蔞根

桔梗炒

紫蘇葉

各貳兩

雞蘇葉

壹兩半

荆芥穗

四兩炒

桑白皮

右爲細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

瓊損防風通聖散

治鼻塞不利肺氣不和

桑白皮

桔梗炒

桑白皮

紫苑首上各半兩

荆芥穗

四兩

甘草

貳兩已上各生用

右爲鹿末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入
生姜五片同煎去滓溫服食後

防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節
煩疼自汗酒浙惡風不欲去衣及風水客搏眼腳浮腫上輕
下重不能屈伸

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

貳兩

白朮

參兩

右為鹿末每服二錢水一盞半生姜三片棗一枚同煎至一
盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

交加解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

各一

個

一個用

水和

一個用

生用

厚朴

一寸

半生用

姜汁

一個用

水和

一個用

生用

生姜

紙裹煨熟

大塊

一塊用

溫

甘草

大者二寸

一半

生用

右各㕮咀同勻每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫
服空心

木香分氣丸

善治脾胃不和心腹脹滿兩脇脹脹脅注悶痰

嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香

檳榔

青皮

去白
皮

陳皮

去白
皮

荆三稜

溫帝累
根香

姜黃

玄胡

蓬莪茂

炮
乾生姜

當歸

白术

赤茯苓

去皮
肉豆蔻

枳殼

麸炒
炒

秋冬加丁香妙

右爲細末用白麵糊爲丸小豆大每服三五十丸

生姜湯下

忌生船馬齒

藿香安胃散治嘔吐不止

藿香葉

壹兩

半夏

貢兩

洗

陳皮

貢兩

厚朴

壹兩
姜製

蒼朮

參三兩
泔浸

甘草

貢兩
炙

右爲麌末每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚同煎去滓溫服

流氣飲子治男子婦人五藏不調二焦氣壅心胃痞滿噎塞不通腹脹脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纔癒得疾服此升降陰陽汗出立愈又治腳氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉

青皮去白

當歸洗

芍藥

烏藥

梔苓

桔梗

半夏洗

甘草炙

川芎

黃耆

枳實麸炒

防風已上各半兩

陳皮去白七分

木香

貢分

檳榔

枳殼麸炒

大腹子剉姜汁浸一宿焙各伍分

右㕮咀每服秤半兩水一盞半生姜三片棗一枚同煎去滓熟服

如心脾病入菖蒲五片同煎

如婦人血氣病入艾同煎

如傷寒頭痛發熱咳嗽入連翹根白三寸同煎

如五膈氣病入陳皮少許同煎

如心中怔忪入麥門冬數粒同煎

如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或鹿茸歸亦可

大怒殼丸 治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消癆逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麸炒 桃芩去皮 白朮 厚朴姜製 半夏湯洗

人參 木香 青皮 陳皮二味去枳京二稜 煅熟

檳榔 廣茂煨熟神麩炒黃 麥蘖微炒 已上各壹兩

乾生姜半兩 牛肉淨微炒 大黃各貳兩

右爲細末生姜汁面糊爲丸桐子大每服一百丸生姜湯下
食後

木香檳榔丸治食傷太陰

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣茂燒

黃連

枳殼

麸炒各壹兩

黃蘖

大黃

各叁兩

香附子

炒牽牛各四兩

婦人加當歸壹兩

右爲細末水丸如桐子大每服三十丸

食後生姜湯下

集金丹

治丁瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥

半分

朱砂

水飛參不輕粉半分

枯白礬

續寒水石半分

海羊

二十個另研

銅綠

壹分

麝香

壹字

即蠍牛也

右件爲細末將海羊另研爲泥就藥一處丸如棗豆大如丸
不就加好酒成之病輕者一丸一丸重者二丸未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥丸于葱內裹合
以熱酒送下暖處卧汗出爲効忌冷水

接骨丹

金半兩錢一文

燒紅醋蘸淬如瓦古老錢代

木當歸

藿香葉

各壹錢

水水蛭

卷之六同糯米炒紫色爲度

血竭

壹錢

火虎骨

壹錢酥炙紅紫燒成

血餘

貳個微炒焦即
兒孩兒胎頭也

土乳香

麝香

沒藥

各壹錢

右爲細末另裹若損折甚者每服三錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒二五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

神聖膏治癰瘡一切惡瘡

當歸

半兩

杏仁

四十個

歷青

壹兩

木鱉子

五個去殼

輕粉

已上三味
不以多少

黃丹

參兩

乳香

四分另研

麝香

四寸各

鷹調

輕粉

已上三味
不以多少

桃柳枝

各長參寸各

計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鱉子桃柳枝於沙石器內文武火熬却用一枝鹿槐稍縛短嫩枝攏之藥焦取出不用乃離火下黃丹歷青攏勻再上火少時滴水中不散爲度勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉鷹調畢傾在水盆內凝滯

紅鉛散

治走馬牙疳

綠礬

不以多少

相攀色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嗽淨用指蘸藥有指處貼之

固真丹

沉香

丁香

木香

茴香

人參

當歸

微炒

滑石

各半兩

乳香

另研五分

沒藥

另研五分

乾胭脂

另研半分爲衣

琥珀

另研五分

川山甲

蛤粉

炒五分

金蝎

微炒五分

代赭石

水飛五分

乾蓮心

微炒三分半

木通

頭未五分

灯草

另研五分已上

桑螵蛸

炒或酥一分半

麝香

另研五分半

血竭

另研五分同川山甲搗

腽肭脐

一對酒浸酥炙

蛤蚧

乙對去頭足五分

火欒草

酒蜜酒九分蒸九曝

晚蚕蛾

青蜓

各五分

右爲細末於辰火日合醤浸餅爲丸如櫻桃大每服二丸溫酒送下空心忌豬羊血蒜騎馬服乾物壓之

呪曰

三祝然後合之

北海泠泠雪浪如銀三江四海尽头

藥中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡急急如律

令奉勑攝

治偏頭疼眼疾

蒼耳道人頭

薄荷葉 益硝

石膏

各壹分
文者水飛

乳香

華細辛 貫芎

各半分

右爲極細末晨午夕三時噙之

蒼金沙散取丁瘡

道人頭

微炒存性壹兩

硇砂

半分

雄黃

三分

加蟾酥

不以多少大妙

右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡內紺帛封之數日
丁自出如瘡入腹嘔逆者煎道人頭濃汁飲之

治遠年病目不通道路退去雲膜須用膈月成閉日合

白砂蜜

四兩色白者妙用隔年葱一根去須皮切短与蜜一同熬去白膜觀葱軟熟為度以錦攢牽放定用

希取
蠟面

黃丹

參水飛生用

蜜陀僧

參水飛生用

盧甘石

火煅過秤

巴上參味熬研極細重羅賦末傾入

前蜜中挑柳

無節病者各一枝攬勻

當歸

赤芍藥

杏仁

湯去皮尖紀上三味各五錢

黃連

去苦頭并英淨秤二兩

川芎

半兩

秦皮

呵子皮

防風

石膏

玄精石

電背文者妙

井泉石

無名異

玄參

代赭石

石決明

已上十味各參子咬咀用雪水或長流河水五升於銀器內熬至二升擣去滓

下單再熬至壹升將一十五味熬至壹升藥水內才傾入放的藥蜜一同銀器內慢火熬藥紫金色肘再添入後藥

過火

乳香

沒藥

琥珀

朱砂

另飛

蕤仁

帶皮秤三錢去皮用仁

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入蕤仁水飛一同研細折澄看淨再水飛澄清再水飛才傾入前紫金色藥內一同復熬一二沸以筋點藥滴於水中不散爲度大抵勿令過

與不及取下於土中埋七日取出置於銀器盒中或磁器中
如法收貯便再添入後細藥傾入藥時亦用桃柳枝攬勻

南鵬砂 珍珠

龍腦

珊瑚枝

已上四味各壹分

麝香

半分

右件五味熬研極細亦以桃柳枝攬勻傾入前藥中復攬勻
然後以紙封器盒口旋旋取用元盛藥器盒中如有取不尽
藥用淨水斟酌洗滌却將滌藥水熬三五沸另行收拾或洗
點眼或膏子藥稠了時傾入些小調解 右用桑柴燒 計
二十九味

細辛

香白芷

滑石

縮砂仁

川芎

已上各
參三分

金絲礬

五膽礬

麝香

半分

上品茶

壹兩半

右爲細末臨卧搽之

治破傷見血酒一椀煎服

半兩當歸蠟二錢

直須軟爛連相啖

合來搗碎酒同煎

一切傷瘡保萬全

益智湯

乾生姜四兩

杏仁一斤

白麵三斤

甘草七兩

鹽三兩炒

旋加

益智仁三兩

京三稜一兩

青皮一斤

陳皮各貳兩

蓬莪朶壹兩

取丁瘡藥

金効

雄黃

硇砂各壹兩

蟾酥

金脚信各半冬

右爲細末刺破紙之

加輕粉半冬

巴豆壹十個生用

勻氣散治氣痞痛脹噎嘔吐等證

丁香

壹兩

藿香葉

四兩

甘草

四兩

木香

白豆蔻仁

壹兩

縮砂仁

兩

檀香

壹兩

右爲極細末入鹽少許沸湯點服無時

復壓散治瘡

太陽本經

獨活

半分羌活

防風

半分藁本

壹分半

調經中血氣

黃芩

各壹分半上

黃連

黃蘖

各壹分半味皆酒洗

散瘡結聚

防風稍半當歸身

連翹各叁分

益元氣瀉火於三焦

黃耆

壹分半

人參

半分

甘草

壹分半

生甘草稍

半分

瀉腎間火補下焦元氣

補胃

橘皮

半分

除膀胱留熱

漢防已

半分酒洗

澤瀉

七分助秋去酒中濕熱

舟楫

桔梗

壹錢

右㕮咀作二服水二盞浸半日煎至一盞去滓稍熱服將二服滓更作一服服藥後不得飲冷水恐再作脹

三才丸

治三焦不和氣不升降心胃痞悶腸肋刺痛

枳實

麸炒

檳榔

半夏

湯洗各參兩

木香

青皮去白

陳皮

去穰

丁皮

赤茯苓

去皮蘿蔔子

桂去鹿皮

藿香葉

白豆蔻仁各壹兩半

廣茂

參兩

沉香

桂去鹿皮

蘿蔔子

桂去鹿皮

藿香葉

白豆蔻仁各壹兩半

黑牽牛

壹斤微炒取頭末半斤

京三棱

四兩

右爲細末酒糊爲丸桐子大每服三十九生姜湯下

神應散

搽治牙疼

川芎

防風

升麻

細辛

茯苓

白芷

香附子

葛粉

甘松各等

石膏比上加

三倍

上加

右用水五升慢火煮乾搗作餅子曬乾再焙搗爲極細末每服一錢入鹽少許點服。如泄瀉每服三錢姜五片烏梅二個鹽少許水一大盞煎至八分溫服。

獨活散清頭目陽明邪攻注眼目牙齒斷肉腐痛兼治偏頭痛

攻注眼目

院方

川芎

獨活

羌活

防風

各半兩

華細辛

貳分

荆芥

鄆薄荷

生地黃

各三分

右爲末水煎去滓食後

草水丸下劑

大黃

黃芩

各貳兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩另取

頭未用

加甘遂

壹兩

去濕熱腰痛泄水

濕腫滿久不則

加依法製用

加白芥子

壹兩

去遍身走注

疼痛

右爲細末噙水噙之

刀剪藥

石灰

壹斤千年者

龍骨

四兩

刺薊

壹小束

右於五月五日早晨搗爲泥作餅子放乾用
愈久愈堅治男子婦人雜證又風濕酒濕

木通

壹兩去皮

澤瀉

壹兩半去皮

木香

壹兩去皮

白茯苓

去皮一錢

大黃

去皮各壹兩半

滑石

五兩去皮

海金沙

五兩去皮

牽牛頭末

五兩去皮

郁里仁

壹兩去皮

右爲細末滴水丸桐子大每服五十丸至八十丸生姜湯下
忍濕麪如小便不通灯草湯下

如傷酒生姜湯下

酒疸食黃蘿蔔湯下

痢疾高良姜湯下

婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛溫酒下

心痛者薤根湯下

膈氣枳實湯下

中風槐角湯下

三昧客氣丸治二焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香

青皮

去白陳皮

去白京三稜

泡白豆蔻仁

各一兩

大腹子

七分半

半夏

湯洗七次貳兩

縮砂仁

檳榔

沉香

各半

右爲細末水麵糊和丸如桐子大每服五十丸陳皮湯下

十八宿散治遠年日近發牙痛

在元戎方

丁香

草撥

大椒

蝎梢

已上各七个

右爲末用津蘸擦痛處効

柏油不以多少鐵器內熬次下鵝鴨糞雞糞細末同
和加小油少許擦之

柏大亦

治人疥癬

以臘豬脂不以多少同生白礬杏仁少加輕粉搗

爛擦之

桃紅散

貼瘡生肌止痛

張正卿傳

滑石

壹兩

赤石脂

參黃丹貳分

同爲細末乾貼

烏金散

貼惡瘡疳瘻

橡子二個內一個實黃丹一個實以白礬末相合定用黑硝
麻皮纏了火內燒研細加麝香少許洗淨瘡貼之
治頸下結核不消經効

大肚蜘蛛不以幾個以好酒浸了研爛同浸的酒去滓溫熱
臨卧服之

治甜瘡 大棗去核實以綠礬火燒微存性研細貼之如瘡乾
以小油調塗

諸瘡腫痛不可忍者以葵花根去黑皮搗爛若稠點井花水少

許若不稠不須用水以紙花如膏藥貼之立効

治五種喉痺

(五瘧散)

在元戎內

大黃

白僵蚕

炒各等分

右爲末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一匙調服以利爲度
赴遊散 治舌上口瘡不能食

銅綠

半兩研

香白芷

壹兩末

右拌勻摻舌上溫醋嗽立愈

(玉露散) 治三種瘻

海藻

各半兩

海帶

昆布

雷丸

各壹兩

青鹽

廣茂

各半兩

右等分爲細末陳米飲爲丸擦子大噙化以煉蜜和丸亦好

治咽喉閻太師傳

薄荷

壹兩半

紫荷車

半兩

甘草

參三分炙

右爲細末

煉蜜爲丸彈子大臨卧噙化

知聖散

治惡瘡背腦疽寒癰吹研打搆損傷並治之

甘草

壹兩半生熟

皂角

參三分燒存性去皮絲秤用

右爲細末

每服二錢熟酒調下無時

治風狗傷

口噙漿水洗淨以乾姜末塗貼

又方以吮去血

漿水洗畢紙上炒黃丹赤色貼之

藥蛆方

以皂礬飛過乾貼其中即死

治臙瘡

趙舍傳

以葱漿水洗淨帛淹去膿囊厚貼輕粉了上用蠍牛不以多

少搗爛作膏藥貼定瘡可自落

法風至寶丹治諸風熱等證

防風半兩

石膏

川芎

大黃

白木

連翹

麻黃

川芎

滑石

當歸

葛根

甘草

甘松

山梔子

六分

芍藥

甘草

大黃

白木

連翹

芒硝

桔梗

熟地黃

天麻

黃連

黃芩

甘草

連翹

葛根

甘草

山梔子

六分

荆芥穗

甘草

大黃

白木

連翹

芒硝

桔梗

熟地黃

天麻

黃連

黃芩

甘草

連翹

葛根

甘草

山梔子

六分

人參

羌活

獨活

黃連

黃芩

甘草

連翹

葛根

甘草

連翹

葛根

甘草

連翹

葛根

甘草

連翹

葛根

細辛

全蝎

五分

右爲極細末煉蜜爲丸彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨

起死神應治風癱瘓四肢不舉手足麻痺等證汗劑也

麻黃

數十

佛去

滓再

熬成膏

至半

瓶

內熬

甘松

蒼术

桑白皮

吳白芷

浮萍草

川芎

苦參已上各參兩

右同爲細末用麻黃膏子爲劑丸如彈子大每服一丸溫酒一大盞研化臨卧服於不透風處睡汗出爲度隔五七日再服一丸大有神効不可具述

采浮萍草法

不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風或瘧風些小微風都不筭豆淋酒內下三錢鐵鎻頭上也出汗

馬書史傳

治諸惡瘡初得發汗

槐花不以多少

皂角棘針

不以多少挫碎

右將二味熬三五十沸用胡桃一个一生一燒存性細嚼以前槐花水送下可半椀許不過三五服見効

治破傷風將欲死者

川烏頭

生

天南星

生

半夏

生

天麻

去芦各等分

右爲細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次用酒一盞投之
若牙噤幹開囁之但藥得下無不活者

吐劑獨聖散

茯苓

不以多少剉細微炒

右爲細末蜜汁調下 脇痛加全蝎 頭痛加蔚金
好茶中停爲茶調散

常山散吐瘧

常山

貳兩水煮曝乾壹兩半

水煎服空心

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停水煎服

浴遍身瘡疥及厲風 以滾鹽水浴之極妙宋夏太尉用此良愈
治血癆 川練子七個炮

爲細末空心酒調下屢効

大沉香
重力治蠱脹腹滿水腫遍身仰滿氣逆嘔噦喘之小便赤澁大便不調一切中滿下虛危困病證其効不可具述

沉香

丁香

人參

檳榔

車前子

苦孽麌

各貳分

青皮

去白陳皮

去白枳實

麸炒

白牽牛

木通各四分

胡椒

木香

海金沙

蝎尾

去毒赤茯苓

白豆蔻

各貳分半

蘿蔔子

六分炒湯浸去皮壹兩貳分半

白丁香

壹分半

滑石

參分

郁里仁

湯浸去皮壹兩貳分半

右爲細末生姜自然汁爲糊丸如桐子大生姜湯下日三忌
鹽魚麵等

神人阿魏散

遺山傳

治骨蒸傳戶等勞寒熱羸劣困倦喘嗽

右阿魏

參分

研青蒿

壹握

細切東北桃枝一握細剉甘草如

病人中指許大男左女右以童子小便二升半隔夜浸藥明日煎取一大升空心溫服分爲三服進次服調檳榔末三錢如人行十里更一服丈夫病婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢物雞犬等後忌油膩濕麵生冷硬物服至一二劑即吐出蟲子或泄瀉更不須服余藥若未吐利即當盡服病在上即吐在下即利皆出蟲如馬尾人髮即差萬金良藥可以當之

服藥後逐去諸疾五藏虛弱魂魄不安即以白茯苓湯補之

白茯苓

紅

人參

參

不

遠志

參

不

龍骨

心

防風

各

貳

不

各

貳

不

各

貳

不

各

貳

不

各

貳

甘草

參

水

不

犀角末

五

生地黃

四

大棗

七枚

麥門冬

四

不

去心

不

各

貳

不

各

貳

不

各

貳

不

各

貳

不

右以水二大盞煎作八合分三服溫服如人行五里一服仍避風寒若竟未安隔日更作一劑已上兩藥須連服之

救苦黃耆散 治諸惡瘡癰癧

張郎中傳

黃耆 甘草 當歸

葛根

芍藥

各等分膏
兩五錢

懸裏 壹對 熟地黃 不以多少

金銀花

貳兩

皂角棘針爲引

右咬咀每服五錢無灰好酒一升同引子裝於磁瓶內將瓶用箬葉封坐於鍋內上以大盆覆鍋口盆外用黃土封之母令出氣煮之外聞藥香爲度取出瓶澄定飲清將藥滓再添酒一升依前煮服若不飲酒者以水煮服若酒少者酒水各半煮服瘡在上食後臨卧在下空心服之神効

受拜平胃散

治脾胃不和鬲氣咽塞嘔吐酸水氣刺氣悶脇肋

虛脹腹痛腸鳴膏膈閉滯寬中進食

川厚朴

炙甘草

陳皮

各參兩

生姜

四兩和皮切

蒼朮

五兩去皮切浸

棗

一百個去核切

右爲細末每晚臨卧刷淨牙以指蘸搽熟麻漱去常用牢牙
去風

善應膏

當歸

白芨

桂

白歛

白芷

木鱉子仁

杏仁

各壹兩

丹

貳斤

油五斤

乳香

亂髮灰

沒藥

各半

加黃耆

參分

當歸稍搘瀝青

少許

右先將藥油內煎令燒黃濾去滓再煎清油沸下丹濕柳木
箇子不住手攪熬六時辰滴於水中成圓珠子住火入沒藥
乳香黃耆當歸稍末攪勻囊盒內收貯

通順散 健藥

石膏

川芎

赤小豆

蕎蕷

各壹

藜蘆

少許

加朴硝壹兩退熱散腫毒止痛久旱則加

加郁里仁壹兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脉

加獐柳根壹兩去腰腿沉重

右爲細末滴水爲丸如桐子大每服五十丸或加至百丸
臨卧溫水下

治大頭病兼治喉痺

人間治疫有仙方

一兩僵蚕二大黃

姜汁爲丸如彈大

井花調蜜便清涼

當歸散治血崩

當歸壹兩龍骨燒赤香附子參玄炒 檻毛灰半兩

右爲細末空心米飲調下四錢忌油膩等物

蓮殼散治血崩

乾蓮蓬

燒灰存性

棕櫚皮及毛

燒灰各半兩

香附子

卷之水炒

右爲細末每服四錢空心米飲調下

治喉痺并時疫毒

桔梗

甘草

升麻

連翹

黍粘子

防風

酒製黃芩

右㕮咀每服五錢水煎細嚥

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

去節已上各半兩

石膏

桔梗

黃芩

各一兩

白朮

山梔子

荆芥穗

各二分

滑石

貳兩

甘草

壹兩

一方去芒硝加牛膝

半兩酒浸

人參

半兩

半夏

姜製半兩生

右爲鹿末每服一兩生姜同煎日再服

若勞汗當風爲皺齧乃瘞勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝加芍藥當歸

若生癰疹或赤或白倍加麻黃蜜豉葱白出汗亦去芒硝若依前方中加四物黃連解毒二藥合而飲之日二服

若小便淋閼去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末一錢匕若腰脇痛走疰疼痛加硝石當歸甘草一服內各二錢調車前子末海金砂末各一錢

若破傷風每一兩加荆芥穗大黃各一錢調全蝎末一錢羌活末一錢

若諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋動轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二

錢梔子一錢調茯苓一錢羌活末一錢

若風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫苑各一錢
若打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各二錢半調酒藥乳香末各一錢

若解利四肢傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十
莖鹽豉一合生姜半兩水一椀同煎五七沸溫冷服一半以
筋投之吐罷後服一半稍熱服汗出立解

若飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚一錢葱白十莖依
法立愈

若頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連各一錢半

萬應針頭丸治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈

閑千戶秘收此藥大都治可者八十余人

武昌

麝香參各

血竭

去不嚼如蠟者用
散者不用非真

蟾酥

參各
擦者用
舌試

輕粉

參各

石硝

參各
礪沙

片腦

壹分

蜈蚣

壹對全用

右爲極細末，煉蜜和爲劑。如瘡有頭者，用針挑破，微有血出。將藥一黍米大，放於挑開瘡口內，上用紙花周圍唾津濕沾。瘡上其藥，不過時刻即愈。

如兩腋見無頭瘡者，即是暗疔。俗云耍胡是也。即將兩手虎口內白土紋，用針挑破，如前用藥封蓋。忌雞鵝酒濕麵一切發熱之物。

驅瘡丹

常山

壹斤剉碎，宿熟乾不見火，酒浸一

檳榔

四兩

右同爲末，酒糊丸桐子大。於發日當夜五更冷酒下五十丸。至早辰空心又冷酒下五十丸。忌食熱物。一日更忌生冷硬

物葷腥濕麴等數十日如夜發者却於當日早辰午後二次
依前服之

治諸積

鱉甲桃仁煎丸

桃仁五兩湯浸去皮尖
用酒研瀝取三升

荆三棱

貳兩燜黃

鱉甲九肋者
炙黃三兩
醋

木香

檳榔

青橘皮

去穰炒
各壹兩

右先取桃仁汁慢火熬至二升再加好醋一升再熬如糊將
余藥五味細末拌和勻丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯
下空心日二服

雜類名方