


卷三十七  
卷三十六



浙江圖書館



浙江圖書館

醫學綱目卷之三十七

小兒部

心主熱

潮熱

積熱

溫病

變蒸熱

心痛

弄舌

重舌

木舌

舌白胎

鼻衄

遲言

盜汗

自汗

癰癤

腮腫

惡核

癰癤

赤丹

疥癬

眉煉

耳瘡

面瘡

口瘡

癩頭

痘瘡

痘太密

痘出不快

痘痒塌

痘灰白色

痘黑陷倒靨

痘寒戰

痘散熱

痘寒熱

痘渴

痘渴瀉

痘瀉

痘吐逆

痘腹痛

痘喘

痘大便秘

痘餘毒

痘入目

痘咽痛

痘疔

痘痛

痘疥

痘膿不痂

痘癰

中惡客忤

歲府

肝热手持衣領

肺热手插眉毛

心热上竈咬牙

脾热目黄肚大

腎虛下竈畏明

热者吐热一向热而不正也

錢肝热。手持衣領及衾捨物瀉青丸主之吐热飲食喘

汗瀉白散

手插眉目鼻面甘桔湯主之

肺虛热唇深紅色治之散肺虛热少腹瀉白散

心热視其睡口中氣温或合面睡及上竈咬牙皆心热

也導赤散主之

热则心昭亦热欬言不能而有就冷之意故合面睡

田脾热则目黄肚大瀉黄散主之

腎虛则下竈畏明地黄丸主之

五歲面目証

頰赤由心藏邪熱上攻也宜眼導赤散

錢面上証左頰為肝右頰為肺額上為心鼻為脾額

赤者熱也隨証治之目內証赤者心熱導赤散主之淺

紅者心虛熱生犀散主之青者肝熱瀉青丸主之淺

者補之黃者脾熱瀉黃散主之無精光者腎虛地黃丸

主之潔古云目中五色者瀉本藏色淺者宜補之又

青是腹痛檢頭散主之

脈小兒脈沉而數者骨間有熱欲以腹按冷清也

錢身熱不飲水熱在外身熱飲水者熱在內

海四順飲子治熱在內而不厥

連翹散治熱在外而不厥

表裏

脈沉數欲飲

水者為內熱

脈沉浮數不飲

水者為外熱

虛

虛

丹小兒發熱手足伏熱痰熱頭用吐法輕劑若多赤小豈  
末重劑苾蒂散瀉酸蓋調服之如不吐用鴉翎探之  
錢朱監簿子五歲忽發熱鑿曰此心熱也腮赤而唇紅煩  
燥引飲遂用牛黃丸三服以一物瀉心湯下之未日不  
食反加無力而不能食又下之便利黃沫錢曰心經虛  
而有畜熱在內必被涼藥下之致此虛勞之病也錢先  
用白朮散主之生胃中津液後以生犀散治之朱曰大  
便黃沫如何曰胃氣正即瀉自止虛熱也朱曰鑿用瀉  
心湯如何錢曰瀉心湯者黃連一物耳黃連性寒  
則利能寒脾胃也坐久衆鑿至日實熱錢曰虛熱  
熱何以瀉心湯下之不安又加面黃頰赤五心煩

食而引飲鑿曰既虛熱何大便黃沫錢咲曰便黃

脈瀉心湯多故也錢与胡黃連丸治愈鄭人齊郎

家好收藥散施人其子忽藏熱奔自取青金膏三服併  
一服而餌之脈畢至三更瀉五行其子困睡奔言子睡  
多亦驚又与青金膏一服又瀉二行加口乾而身熱奔  
言尚有微熱未盡又与青金膏其妻曰用藥十余行未  
安莫生病否召錢氏曰已成虛羸先多煎白朮散時時  
服之後服香瓜丸十三日愈

海風熱邪熱四君子湯加生姜荊芥煎

雲保小兒客熱在內不思乳食宜導赤散次服益黃散

實熱在內者四順飲之類在上者吐之方見表裏条

濕熱

丹小兒熱病六一散炒藥也

食傷胃熱薑蒸

白朮一兩

半夏

黃連半兩

加平胃散粥食後白湯下

本事治小兒驚熱

驚熱

蝎七个

天南星

取心為末一分

人多三分

蛇退

三重

右為末薄荷蜜湯調下

錢風溫潮熱壯熱相似

江

潮熱者時間發熱過時即退來日依時發熱此欲發驚也

壯熱者一向熱而不已甚則發驚痲也

風溫者身熱而口中氣熱有風証溫者但溫而不熱

湯傷寒熱口熱呵欠頓項急

治見心傷寒部

診

抵有八狀

潮熱有作止

壯熱一向不已

風溫而不熱

傷寒熱呵欠項

急

瘡疹抵噴

嚏耳冷

變蒸抵唇

白泡起

疳抵吃土泥

驚風抵投

搐

診生死

忌

抵

瘡痘抵噴嚏悸動耳尖冷治見痘瘡

變蒸抵唇上白泡珠起耳冷不須治

疳抵面黃吃炭土羸瘦鼻下赤爛治見疳

驚風抵投搐驚痛治見急驚

素常日乳子而病抵脈懸小者何如岐伯曰手足溫則生

寒則死通評虛實論。甲乙經謂婦人乳子者

錢抵証疎利或解化後無虛証勿溫補抵頭隨生

潮抵

抵有作止每日應時而發也

錢地骨皮散治虛抵潮作亦治傷寒吐熱及餘抵

知母 炙甘草 半夏 洗七次 銀州紫胡 去芦

人多 去痰 地骨皮 赤茯苓 已上各等分

右为细末每服二分生姜五片水煎食后温服量大小

加減 海藏云地骨皮散无汗者柴胡汤加減法自汗

景所 用钱氏改及以香連橘連 諸丸加減並出古注法

生犀散治证同前

生犀 錯末 地骨皮 赤芍藥 柴胡 葛根 各一两

炙甘草 半两

右为麤末每服一二分水煎食后温服 海藏云生犀

角地 黃湯 加減法 此 少陽湯明相合也

田氏犀角散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮热

盜汗五心烦燥四肢困倦飲食雖多不生肌肉

盜汗五心煩燥四肢困倦飲食雖多不生肌肉

犀角末 地骨皮 麥門冬 枳壳去穢炒 大

柴胡 茯苓 赤芍藥 黃芪 桑

人參 鳖甲醋金 煨 已上各等分

右為籛末每二外入青蒿少許小並量見大小加減

錢秦瓦散治朝熱減食逆瘦

秦瓦去頭切煨 甘草炙各一 乾蓍 芎藭半切

右為籛末每服二外水一鍾煎八分食後服

丹小兒朝熱盜汗胡黃連柴胡等分為末煉蜜為日艾矣

大每二 入火水煎小沸

錢朱監簿子五歲夜發熱腕即如故眾醫有作寒治者有

作熱治者以涼藥解之不愈其候多隨而喜睡化豎以

虎

缺降丸下延其病益甚至五日大引飲錢曰不可下之

乃酌白朮散一斗煎藥汗三升使任其意加豆服朱生

曰殷多不作瀉否錢曰無生水不能作瀉後多不作怪

也但不可下耳朱生曰先治何病錢曰止瀉厚糜退熱

房神皆此藥也至脫服盡錢看曰更可服三升又煎白

朮散三升服盡得稍愈第三日又服白朮散三升其子

不渴無延又投阿膠散二服而愈

緊朝熱有時胸滿短氣者挑枝丸方見熱小

湯凡痰熱晚熱早涼吃水無時此候乃痰作朝而生

即宜金星丸下之或氣弱者不可下宜奪命散如

及心服惺散加南星白附子奪命散方見驚風

山突執一

凡痰熱宿食

熱血熱皆在

夜

金星丸治風熱結聚喉內痰鳴喘急咳嗽而仁脫  
草壅塞發熱狂燥多渴

礬金末一分

雄黃一分另研

膩粉半分

巴豆七粒去油

右末末醋糊丸麻子大厚苛脾茶下

脈經云小腸

有宿食常暮發熱明日復止此小腸

食夜熱也

海藏云夜熱屬陰四順殷之類此血熱在夜也

積熱

久熱也府熱亦久但面黃吃炭土寔下爛也

無掃小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤

表裏虛實  
無擇法

面赤大小赤  
佳者清涼  
下之

下之不退者序  
之

大便佳黃先以四順清涼飲子利動藏府熱則去或既  
去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿  
散加麻黃微發汗表熱延去表熱去後又發熱者何也  
世醫到此盡不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不  
可鑿誤致大傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮  
於外所以丹皮熱非熱証也只用六神散入粳米煎和  
其胃清涼飲子每服二方見治寒熱去

紅綿散

白姜蚕

者二方直

天麻生肌

蘇木節

二方半

天

右為末每服一外水一小盞入紅綿少許同煎

汗下不退者

分温服凡小  
目不清並宜服之若傷

表裏証發熱者每服入去節麻黃末

熱心躁渴者入滑石末半分以下同煎服之

和胃六神散

人參 白茯苓 干山藥 白朮 白扁豆

甘草 炙各等分

圖

右為末每服一大錢小一小盞棗一個生姜二片同

煎豆五分通口服此藥用處甚多治胃冷加附子治

風証加天麻治痢加罌粟壳

銀白散

乾山藥 白朮 白茯苓 人參 白扁豆

錢氏法

胸膈短氣者  
挑枝下之

煩燥昏迷者  
挑枝吐之

知母

甘少矣

升麻各等分

右細末每服一匙水一盞藥一匙七分溫服不

拘時候

館

錢桃枝丸煉所積熱反結胸又名桃符丸

巴豆霜 川大黃末 黃柏末各分 輕粉

硃砂各半分

圖

右為末麵糊丸粟米大煎桃枝湯下一碎兒五七丸

五七歲二三十九丸未碎兒二三丸臨臥服

挑枝煎子治小兒富熱在中久熱狂燥昏迷不食

大桃仁七個碎破 豆豉半又

右用水三盞煎至二盞青豆少服之無時或壯

吐立効

變蒸熱

變蒸熱者唇上白泡珠起耳冷也

錢變蒸小兒在母腹中乃生骨氣五歲六府成而未具自

生之後即長骨筋五歲六府之神智也變者易也巢原

云生長變氣又生變蒸者自內而長自下而上又多熱

故以生之日後三十二日一變、每半即清性有異於

前何者長生歲府智意故也何謂三十二日長骨添精

神人有三百六十骨除子中四十五碎骨外有三百

二十數自生下骨一日十段而上之十日百段而上之

十月尿段而三十二日計三百二十段為一遍亦曰一

蒸骨之餘氣自腦分入髓中作三十二齒而齒牙有不  
及三十二數者乃變不足其常也或二十八日即長二  
十八齒已下微此但不过三十二之數也凡一周遍乃  
發虛熱諸病如此十周則十蒸畢也計三百二十日生  
骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎志六十  
四日再變生膀胱其發平與軌令腎與膀胱俱主於水  
水數一故先變生之九十六日三變生心喜一百二十  
八日四變生小腸其發汗出而微驚心為火火數二一  
百六十日五變生脾笑一百九十二日六變生膽  
開而赤肝主木木數三二百二十四日七變  
聲二百五十八日  
腸其發膚熱而汗或

肺者金數四二百八十八日九變生脾

日十變生胃其若不食腸痛而吐乳此後乃齒生

知喜怒

大倉云氣入四肢長碎骨於十

六十四日長其經脈手足手受血能握物足受血能行  
立經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日師曰不汗而

汗大吐者微下不可別治是以小兒頃變蒸乾

齒者如花之易苗所謂

十二齒由變之不及齒

與當日變日相合年壯而視齒方明

視當作明  
當作周

湯千金變蒸論凡兒生下三十二日一變六十四日再變

變且蒸二百

九十六日三變百二

十八日四變、且蒸一百六十五日五變一百九十二日

六變、且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變  
變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變、且蒸  
積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸、後六十四  
日復大蒸、後一百二十八日後大蒸凡小兒自生三  
十二日一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸  
積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸  
者是榮其

覺清態有異其

變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有輕重其輕者體  
熱而微驚耳冷尻冷上唇頰白泡起如魚目珠子少  
出重者體壯熱而脈亂或汗或不汗不欲食食輒  
目白睛微赤黑睛微白又云目白者重赤黑者微

五早十日热自

禁服藥劑

耳尻热非变

蒸热久不解者

山下

畢自精明矣此其証矣单变少微兼蒸小劇凡蒸

五月而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為

之中热乃除耳或遺日數不歇切不可妄治及矣

歲云言变蒸通一十八日小蒸蓋前三有二十日為十  
小蒸後二百五十六日為八小蒸也日塊于典切不顧

而此也

無擇者身热耳尻亦热此乃它病可作別治

紫元治小兒变蒸後热不解并挟傷寒温壯热汗後热

不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哕食癩先寒後

热者

代赭石

赤石脂各一斤

巴豆

三十粒去壳壓碎

右以上二味為末別研巴豆杏仁為膏相和更搗一

診治

二千杵當自相得若硬入少密同杵之密共中收三十  
日兒服如麻子大一粒與少乳汁令下食頃後與少乳  
勿令多至日中當小下除熱若未全除明日更與一粒  
百日兒服如小豆一粒以此準定增減夏月多熱喜令  
散疹二三十日朝一服佳紫元無所不治雖下不慮人

心痛

當於大人心痛門參用之

心痛吐水者重痛

心痛不吐水者冷心痛

錢靈丸散治小兒虫咬心痛如絕

五靈脂末二分

白礬火燒半分

右同研每服一二分水一盞煎至五分溫服無

右同研每服一二分水一盞煎至五分服無

吐虫虫

弄舌

脾热

錢弄舌脾藏微热令舌絡微緊時時舒舌治之勿用

及下之

漸服之

用牛黃散治之

肥美者亦或飲水

醫疑為热必診藥下之者非也

胃津液少故

也又加面黃肌瘦五心煩热即為疳宜加胡黃連等

若大病未已用藥弄舌者凶

重舌

診治

湯重舌附舌下近舌根生形如舌而小故謂之重舌其有

舌下如此者名重舌其著颊裏及上腭如此者名重腭

其有齒斷上如此者名重斷皆刺之去血汁也

執一疾

田氏重舌竹歷漬黃柏末點舌上如不愈後用真蒲黃

傳之不過三次愈

用真蒲黃微炒帝鋪地上出火氣研  
便及温水煎飲

帛裹指輕輕捺  
之按罷捺藥

姚和衆治小兒重舌馬牙硝塗舌下日三度

世治小兒重舌本舌先用新水捺口并舌上下後用皂角

針曉反入腦子少許每用半字捺舌上下出涎定皆愈

子母治小兒重舌燒烏賊魚骨細研和雞子黃付痰及舌上

簡要治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半外付舌下

不用之

丹重舌桑白煮汁塗乳齦之秘錄又以蟻娘燒末嚼

木舌

雜方

熱

雜方

血熱

湯本舌者舌腫漸、簾大喘口、不急治、即塞殺人也

用氏木舌治法用局方中紫雪一分竹瀝半合和之

抹入口中自消

丹小兒本舌百草霜活石芒硝為末以調付

舌白胎

丹舌上生如粥立菜白皮汁付之三又及炒官去牙

鼻血

湯地黃湯以菜中熱及肺壅鼻血生瘡一切丹毒

真生地黃 赤芍藥 浙當歸 川芎 各等分

右咬咀水煎去滓大小加減鼻血臨熟入生痛黃少

許生瘡加黃芪等分同煎丹毒加防風等分同煎累驗

春冬血者用生地黄研取汁加生鹿角少許砂糖并花水

浸服之愈

秋夏血者用車前草一握洗淨研取自然汁同生姜一處

研取汁入生密一匙先用查塞裏次用新汲水和密并

半前草姜汁飲之即愈

又方備急生蘿蔔取根搗自然汁仰頭痛入鼻管中即

止次以新汲水和密蘿蔔汁飲之良

犀言

錢葛痛大渴小兒心氣不足五六歲不能言

石葛痛多 人參去芦 丹參三分 赤石脂五分

天麥冬門

雜方

卷

右為末煉蜜丸茶豈大溫水下十九至二十九

三服久 病後腎虛不語宜並服六味

九海藏云也黃丸之少陰也與菖蒲丸上下通經

雞頭丸治小兒諸病後不語

雄雞頭一个炙 鳴蟬三个炙佳 甘草二五炒 當歸三个炙

大黃一及取慶溫帝煨 木通半及 黃芪切煨 川芎

遠志去心 麥門冬去心焙各三个 人參半及

右同為末煉蜜丸小豆大平旦米飲下五丸空心日三

四服兒大者加之久服不効雞蟬二物宜求死者用

之不可旋殺孫真人所謂殺生於生去生更遠

海百舌鳥今之鶯也各反舌主小兒不語灸食之又治虫

絞咬

錢腎怯失音相似口病吐瀉及大病後雖有聲而不能言

又欲識藥此非失音為腎怯不能上接於陽故也當補

腎地黃丸主之失音乃猝病耳

猝恐同

口噤不止則失音遲聲亦同

明堂五六歲不語者

心俞三壯

盜汗

錢黃芪散治虛熱盜汗

牡蠣煨

黃芪

生乾地黃各等分

右為末葱服不拘時

虛執

右為末煎服不拘時

盜汗睡而自汗出肌肉虛也止汗散主之遍身汗

芾丸主之

止汗散

故蒲扇灰 如無扇只將故蒲燒灰

右研細每服三分溫酒調下無時

虎放散治實熱盜汗

虎放

右小煎服量多少與之無時

海郎子晉子自嬰至童盜汗凡七年矣諸藥不效子與涼

膏散三黃丸三日病已蓋腎為五液化為五濕相火迫

腎一水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺

山支丸

雜方

上下

歎其不勝已也皮毛以是而開腠理玄府不閉而為汗  
出也出於睡中者為盜汗以其覺則無之故經云寢汗  
僧風是也先以涼蒿世宥中相火相火退次以三黃丸  
瀉心火以助陰則腎水還本歲玄府閉汗為之已矣  
世傳治小兒盜汗

用鬱金末塗兩乳下立効

自汗

錢治病有等張氏三子病大歲者汗通身次者上至頂下

至胸小者

衆醫以麥煎散治之不効錢

者與香薷丸次者與益脾散小者

五日而

香薷丸

胡黃連 大黃瓜 黃色者 一个 苦胡芦 去 川黃連 至

驚甲 醋炙 黃柏 黃連 芦薈 青皮

右除黃瓜外同為細末將黃瓜割去頭填入諸藥

端却盖口用杖子插定煨火內煨熟將黃瓜及藥同

用麵糊丸如藟豆大每服三二丸食後冷漿或新水

下大者五七丸至十九丸

中節汗

胃怯汗上至項下至臍此胃虛當補胃益黃散主之

海胃怯汗炒小麥苗湯調四君子服之

錢六陽虛汗上至項不過胸也不須治之

喜汗厚衣卧而額汗出也止汗散主之

額汗

癰癤

表散

湯凡癰癤未結之初微見有紅頭瘡子起隱疹者急用不  
語唾夜半頻塗之即消散飲酒了不可

治炭背癰疽方

羌活 一兩

川山甲

妙焦

生人骨

煨留性

射香

少許

右末煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向內者服之即  
突其功效不可盡述羌兒豆瘡黑陷者只一服而起

萬不失一

腮腫

本事治小兒毒氣攻腮赤腫可畏者

皂角

考核

天南星

二名

糯米

一合

右為末姜汁調塗立効

表

惡核

表裏  
除本於裏

惡核瘰癧

陽小兒惡核生於項頸上遇風寒所折不消結成瘰

而潰膿成瘡也宜服四味大黃飲即四順清涼飲子是也

瘰癧又方

川升麻 射干 連翹 犀角屑 大黃 微炮

朴硝 各半兩



右吹咀水煎大小加減忌酒麵炙煨物

貼惡核方

赤小豆 猪牙皂角 浙消石 木鱉子 各半兩

黃藥 大黃 一兩

右末雞子清調塗患處

貼散療癰神效方

白膠香

降真香

用心無土氣

海標梢

右等分為末搗患處外以水帝掩之一夜而退

赤丹

田氏赤流治法宜服犀角散

一法先鑊去惡血服上藥

犀角

散方見朝執

湯小兒丹毒乃熱毒之氣極與血相搏而風乘之故赤腫

及起走遍身者又名赤起風入腎入腹則殺人大抵

丹毒雖有各種病原一也有赤丹毒遍身痒者或女

十五六而脉未通者多惡葭丹疹皆由血有風毒

宜服防已散

莫方已半西  
外消  
犀角  
黃芩  
黃芩

漢防已 半兩 朴硝 犀角 黃芩 黃芪

升麻各一分

右以咀竹葉煎大小加減

丹小兒黑斑紅斑瘡痒癢疹皆並用防風通聖散

荆芥散

防風 天花粉 羌活 生地黄 當歸

蟬退各等分

解毒散

寒水石 滑石 石膏 辰砂

三石等分為末入辰砂些少量見大小灯心湯下

又方

赤小豆 木鱉子 椽斗子 南星 大黃

朴硝

右為末用慈姑薄荷靛青和蜜水調塗患處外用雄黃圍了却用荆芥散解毒散

敷貼正法

聖惠小兒痘班散毒氣用生葵菜葉絞取汁以少與服之千金治小兒丹毒慎火草生一握搗絞汁以拭之喻上

日十遍夜三四次譚氏小兒方同

子母秘錄治小兒赤起行於上下至心即死搥芭蕉汁莖

塗之

兵部治孩子赤丹不止以胡荽汁付之瘡

子母秘錄小兒赤起行於体上下至心即死以芒硝

中取濃汁以拭丹上

錢丹瘡熱毒氣客於腠理搏於血氣發於外皮上赤

當以白玉散

白玉散

白土一分

寒水石

各兩

右末之用米醋或新水調塗

山居火丹磨銅鉄水調廁上泥付之

小兒赤起以用朝草燕巢泥雞子清調付將腫處用針

割破鮮血魚

丹小兒天火丹臍腰起者赤留不效

蚯蚓泥炒研細香油付之

敷貼反以法

田氏又法用牛膝一兩去苗甘草半兩生剉碎水煎一大

盞去滓調伏龍肝塗之

山居小兒赤腫伏龍肝為末芭蕉油調付

又方用雉雞毛及鵝毛燒灰香油調付

湯又付丹毒方只一夜活盡

右用花蕊石生薑薄荷白然汁調鵝毛刷上患處為妙

張三太尉女十五歲病此諸醫百藥俱試而不能偶中召

予視之以生料四物湯加防風黃芩一日而愈

生料四物湯治血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常弱不

大黃等冷藥尤宜服之

生乾地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風

生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸 防風

黃芩減半

右吹咀水煎大小加減忌酒麪猪羊肉豆腐

丹小兒赤淫主傷血生地黃水通京芥苦藥沒表之類

芭蕉油塗患處

世傳丹癰者用韭菜挾共鹽麩香油以子摩熱於丹上搯

之立愈



十種丹治法

丹小兒丹瘡草麻子五个去皮研入麵一匙水調塗之甚

効 脩真 叔者

本事治小兒十種丹瘡腫毒漸起形候那并方治法

一飛電丹從項頭起腫光

用葱白研取自然汁塗

二吉竈丹頭從上紅腫痛

用赤小豆末雞子清調塗

譚氏方同治

三鬼火丹從面赤腫

用竈心土雞子清調塗

按不拘何處皆治

四天火丹從背起皆赤点

用桑白皮末羊脂膏調塗

五天灶丹從兩臂赤腫黃色

用柳末燒灰水調塗

六水丹從兩脇處腫虛腫

用生鉄為末猪糞調塗

七胡次丹從臑上起黃腫

七胡吹丹從腹上起黃腫

用檳榔為末，米醋調塗。

八野火丹從兩脚赤腫

用乳香末，羊脂膏調塗。

九烟火丹從兩脚有赤白點

用猪槽下土，麻油調塗。

十胡漏丹從陰上起黃腫

用屋漏處土，羊脂調塗。

右此十種丹，毒變易，非輕治之，或緩則終不救，故

余不借是方能逐一仔細辨認，依此方法治之，萬

不失一如經三日不治，攻入臍府，則終不可救，不

可緩也。

診

虎热

雜方

丹赤遊風於身上下至心即死  
薺煎汁洗之子母秘錄口薺

薺即白花  
草藥也

世傳百日肉散丹必死不治

疥癬

海小兒經絡蘊熱頭面及身體生瘡  
四君子加瓜蔓根

拈梗各半外煎

湯小兒惡瘡天氣溫和頻與澡浴  
更衣名曰外宣亦不

宜服藥小兒不得已而服藥此乃下策  
將養合宜何

疾可侵更令乳哺有節勿過飽  
其身乃如菓樹

養生之理也

浴惡瘡方頻浴身安外宣無病

春用柳條荆芥 夏用棗葉槐枝 秋冬用苦參

付瘡藥方

剪刀草 宣連 苦參

右等分為末先洗淨次用麻油輕粉調付

田氏瘡癬治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊蹄

根絞自然汁調臍務塗之濕癬宜用青金散貼之

苦瓠散治小兒浸淫瘡漸展不止

苦瓠 二又 蛇退皮 煖灰 露蜂房 微炒

果上塵 一合

右為細末生油調塗故帛上貼

青金散治小兒虛癬浸淫瘡

雜方

白膠香

研二又

蛤蚧半又

青黛

二又半

右研為細末乾摻瘡上

子母治小兒風癩不止白髮十二分煖熱泥投化用馬尾

濕沼塗之

山居小兒頭面爛瘡木耳春細密調付干則換又冷水調

平胃散付半則換

肩煉

甲氏肩煉治用青金散付之如不愈燒小麥煮性研細

油調塗

耳瘡耳凍瘡

丹小兒耳後月餘瘡如物矢燒以猪油和付之

耳上生瘡竹葉燒末猪脂付之妙

秘錄

楊氏以雞子白和付立差

唇象才月

耳月餌餌方胡粉和土付之

秘錄

耳後月餌黃連末付之安

湯白欵散治小兒凍耳成瘡或痒或痛

黃柏 白欵各半又

右為末先以湯洗瘡後用生油調塗

面瘡

世治小兒面瘡通面曬無全膚膿小流無百藥不効者陳

年臘猪油不入鹽者付之神治

口瘡

竹如聖散治小兒口瘡不能吃乳食仁子一立或二粒研爛不去油入朱砂黃丹亦土少許剝開小兒頭門貼在頰上如四邊起粟米泡便用溫水洗去藥為成瘡便用蒼蒲水洗便效其効如神書

世傳南星膏治口瘡小兒雜用藥但以大南星去皮取中心龍眼大為末却用酸醋調塗脚底心其效

千金治小兒口瘡飲乳不得以白礬姪雞子大置醋中塗之兒足底二七即愈

無擇牡礪散治小兒口瘡

牡礪理較一通紅 尺土中七形出火氣研細以帛裹了

甘少灸為末一糸七

熱

寒

上熱

止治

右和勻時時抄少許搽口中或吐皆無害

田氏口瘡治片乳母同見宜服洗心散瀉心湯然後

柏子研細搽之

瀉心湯方黃連一味為末蜜水調石可煎

易治口瘡驗方

黃柏

蜜炙赤

清代一書

右二件為末搽上內愈

圖

丹口瘡服涼藥不愈者此中佳氣不足虛火從上附子理

中湯

癩頭瘡

世治久癩頭用黃連細末付之神効

常治年久癩首內用苦參丸食後服之外用苦參末

反治

油付之一月愈

丹方用防風逆聖散酒製除大黃另研為末再用酒拌

晒干為末每水煎服月四五服至三十貼見效

又方

川芎 酒片苓

酒首藥

陳皮半又酒泉木

酒歸 酒天麻

蒼耳七分半

酒柏

酒粉中

防風系

右為末水盪起煎服日四五服之服了睡片時

小兒癩頭用紅白炭碎長爪水令熱悅之仍用元姜

煎猪脂去子用脂塗患處又法用胡荽子伏龍

龍尾黃連白丸為末細調付

頭瘡

猪油

二升半  
生半熟

雄黃

水銀

二升半

研和勻付瘡上

又方治小兒癩頭并身癩等証用松皮燒灰白交香枝

礬大黃黃柏油調付

人方用臘月馬脂油搽患處極妙

簡要頭瘡大笮壳燒為灰量瘡大小用灰調生油付入少

臍粉佳

子母秘錄小兒頭身諸瘡燒雞卵壳和猪脂付之

世傳治癩首

松香

一兩乾  
令形起入  
銚開  
銚在石上  
同

黑龍尾

三升即屋  
塵垂掛者

寒

大皮

錢氏溫序及後

隨寒

白芷

羊兩

松樹皮

燒灰 二斤

黃丹

三斤

水銀

二斤

雄黃

二斤 白礬 二斤

右為末以血餘入香油煎爛調付

脚凍瘡

湯生附散治凍爛脚成瘡用生附子為末麵水調貼之愈

瘡瘡治法通論

錢瘡疹惟用溫涼藥治之不可妄下及妄攻受風冷

云溫于者非熱劑如京芥薄荷防風牛蒡子甘草之類  
也丹溪云黍粘子陽明黍粘子連翹山查甘草此四味  
瘡瘡如終必用之藥

錢氏診睦親宮十大王瘡疹云瘡疹始出未有它

可下也但當用平和藥頻與乳食不受風冷可也

可下也但當用平和藥類其乳食不受風冷可也

疹三日不出或出不快即微發之黍和子類微黃不出

加藥如一日一帖加藥不出即大發之升麻葛根

類如大發後不多及脈平無証即瘡本稀不可更發

有大熱者當利小便小熱者當解毒利小便回聖散之類

若不快勿發勿下故止用抱龍丸治之瘡若起能食者

大黃丸瀉一二行即止全見黑陷

有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者

百祥丸下之不黑者慎勿下

身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐此當利

小便不差者宜風散也若五七日痂不焦是內發熱

熱氣蒸於皮中故瘡不能焦痂也宜宣之用生

潔古海藏  
皆宗錢氏

法

潔古法

先宜安裏解

毒大便不秘

宜微發大便

過秘宜微利

犀磨汁解之使熱不生必有痂矣

錢論曰斑疹之病其為証各異瘡發焮腫於外者屬少陽三焦

相火

小紅壓行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂

之疹凡顯斑証者自

勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出

也大便瘡疹首尾皆不可下恐長

謂少陽通表宜和之

也當先安裏解毒次微發之安和解毒須用五藏是也如大便不

秘者須微發之藥錢氏方中甚多宜選用之如大便通秘宜微

利之當歸丸素變百祥丸是也初知斑疹若使之斑疹併

出小兒難禁是以別生他証也首尾不可下者首曰上焦尾

下焦若能吐利猶不可下也便宜安裏若不吐瀉

安裏藥三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若

安裏藥三五服如能食而大便秘結內實者宜疎利之若

虛而利者宜用安裏藥一二服末後一服調微苦

服之大抵安裏之藥多發表之藥少秘則微疎之

氣不壅併而能作番次使見易禁也身溫暖者順身

者逆二者宜多服防風湯和之安裏若大便實秘能飲

食而內實宜當歸丸微利之自吐瀉者多苦若治反也

安裏鮮毒防風湯



防風 一兩 地骨皮 黃芪 芍藥 京芥

黍粘子

右為細末溫水調服粗末並四五分亦得若大便實

必能飲食而實宜當歸丸微利之

當歸丸 棗變百祥丸 二方並見虛  
大便秘明

海藏法

惡寒者發表大熱者奪

之陽者清之

大秘者下之

小秘者利之

驚者安之

世者分之

澀滯者不可

物肯尾禁下

夏月者不可

拘不通凡

海夫痲之為病皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而

成毒皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也曰小兒真

氣既盛正氣又王邪無所容或曰天考或曰傷表或曰

傷裏痲由是而生焉治當何如外者外治內者內治中

外皆和其痲自出至於惡寒者發之表大熱者奪之渴

者清之大便秘結者下之小便不通者利之驚者安之

世者分之可以執一為哉大抵傷寒同治最為高論隨

經用藥不可缺已假令五日已盡諸病與痲疹不能辯

別者不可疑作痲疹必須發之但各從其所傷應見

之皆不妨痲出若強發之其變不可勝數矣前人

尾俱不可下者為痲未顯於表下則邪氣不得伸

尾俱不可下者為癰未顯於表下則邪氣不得伸

脉証有表而無裏故禁首不可下也尾不可下者

毒已顯於外內無根蒂大便不實無一切裏証下

癰氣逆陷故禁尾不可下也有如所言溫暖蓋覆不

通風以其癰或身表涼而惡寒或天令寒而惡冷溫暖

蓋覆不令通風也癰若已出身熱天暄何必用蓋覆而

不使之通風乎後人執此二句首尾俱不取下溫暖不

令通風不知天令之加人身之所感鼓使悞人多矣大

抵前人之言隨時應變以其所可者而言之後之不知

其變故執常而不移也噫首尾俱不可下者以終

歲府元無凝滯也若有一切裏証及大便結者安得不

下溫暖不以其故在冬時故如此也若故在

夏時痲雖未出亦不用於此也痲

率以脈為

主浮中沉之脉手舉按之候察其虛實定其中外則可

以

外傷升麻湯主之

方見本門

內傷枳實丸主之

大便突者枳朮丸主之 方見內傷飲食

若傷冷者温之神應丸主之 方見內傷飲食

惡寒者芫之豆防風蒼朮湯 方見本門前條

表大熱者奪之此表者通言三陽也夫陽盛者氣必

行言奪者治法不合上行也是知無三陽標証有

裏証果於有形也此言表証三陽之名也

裏証果於有形也此言表証三陽之各也

湯者清之大渴者白虎湯暑月用之小渴者涼葶散涼葶散

者加甘摻者摻

大便秘結者下之桃仁承氣湯四順飲子柴胡飲子瀼

用察其在氣在血必內實能食而結者可

小便不通者利之導赤散八正散之類當求上下二焦

何結而用之

驚者安之涼驚丸重者瀉青丸

泄者分之寒則異攻散四君子湯熱則澤瀉茯苓湯

小兒癰疹初發未化辨認間但求所出之由目內目外

及不目內外隨其所傷如法服餌防其變故其柳感氣

比之它証尤不可緩或泄或解其肌或化其毒求

其所啟之由涼血清肺調其歲府平其飲食謹其禁忌  
嚴其養攝適其寒溫將理有法俾盡其道使生無不快  
之徑成無不痾之潰既愈之後不致起毒流于虛膝目  
疾膜翳瘡癰癰癩喉閉噎腫潮熱汗油此治癰之大畧也  
凡未出而發搐者是外感風寒之邪內發心熱之所作  
也當用茶粉下解毒丸犀角地黃湯主之

一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其內連翹  
升麻湯

若癰已發密重微喘飲水者有熱証用去風藥微下之  
若出不快清便自調知其表不在裏當微發散

葛根湯

若清乾黑陷身不大熱大小便澀則是熱在內煎大

湯下宣風散

若身表大熱者表証未罷不可下

若痲疹已出見小熱小便不利當利小便八正散

若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當用茶粉

下鮮毒丸

瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病也

瘡疹未出先聲音不出者乃形不病而氣病也

若瘡疹出而聲音不出者是形氣俱病也當清其肺氣

宜用八風湯并涼葦散去硝大黃亦可

丹小兒痘瘡分氣血虛實以四君四物酒炒芩連等服之

丹厚分氣血虛實

氣虛參朮加解毒藥

血虛四物加解毒藥

右解毒者酒炒黃芩炒黃連是也海藏云解毒者三

黃湯

丹痘瘡今人之清濁既形氣上取勇怯

痘瘡黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷

而外白色起

氣零帶涼血藥

陳痘瘡未出已出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之裏虛

速與十一味木香散治之

如已出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表

速與十一味異攻散治之

補陳氏偏主虛

如已出之間其瘡不光澤不起發相窠不紅或瀉

腹脹或氣促是表裏俱虛也速與十二味異攻散

七味肉苁蓉丸治之廿溪云和香散異攻散二藥治

如瘡始出一日至十日渾身壯熱大便黃稠是表裏俱

實也其瘡必光澤必起發必肥滿必易腐而不致損傷

也若無它疾不宜服藥



表實俱實者易出易腐表實裏虛者易出難腐表虛難

出裏虛難腐

張翼之治痘要法○吐瀉少食為表虛陷伏倒腐灰白為

表虛二者俱見為表裏俱虛全用異攻散救之甚至姜

附灵砂亦可用若止裏虛減官桂若止表虛減肉苁蓉

論錢氏法詳  
陳氏法偏

不減官桂丁香却多差能食便秘而陷伏倒屬者為不  
吐瀉能食為表實、而補則結癰毒紅活綻凸為表  
實、而用表則瀉爛不結痂凡痘但見斑點便忌葛  
根湯恐發得表虛也

丹讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意  
亦適於用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經  
絡明分表裏虛實開陳施治之法而又証以論辨之言  
深得著書垂教之体學者讀而用之如求方圓於規矩  
較平直於準繩引而伸之觸類而長之可為無窮之  
用也今人不知致病之因不窮立方之意倉卒之際  
症驗方謬亦一試設有不應并其書而廢之不思之

在方論亦一試設有不應并其書而廢之不思之

也近目局方之教久行素問之學不講抱疾者談

期皆喜虛而惡寒喜補而惡解刑冬得陳氏方論

燥熱補劑其婦確其文簡權然用之翕然信之遂以為

錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方為不足歟曰陳

氏方誠一篇偏之論也雖然亦可謂善於病情者其意

大率歸重於太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛是太

陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易於感胃胆上惡濕兩言

物不受觀其用丁香官桂所以治肺之寒也用附朮半

夏所以治脾之濕也使脾與肺果有寒與濕而兼有虛

也中病則已何傷之有今但見出遲者身熱者泄瀉者

驚氣急者渴思飲者不問寒熱虛實率投木香散

異故散間有隔中隨

或誣投禍不旋踵何者

吾人用藥製方有白導有監制有反佐有

方

固未嘗廢細辛丁香白朮參芪等率有監制輔佐之藥

不專務於

其用寒涼者多而於補助一片畧

示端緒未嘗係入瘧人之前不可之慮至矣亦

時以候達者曠元推廣用之雖然局者用溫藥痺塌用

氏葭之迥出於葦也其多用桂附丁香等燥

燥熱也末道中也何者桂附當有寒而慮固是

的當慮而未必寒者其為當何如耶陳氏之才之時

寒瘧而瘡者其用燥熱補之固其宜也今未

而用一編之才寧不迨於熱乎予嘗會諸家之粹

初月一編之方寧不也於執手予嘗會諸家之辨

意而用之實未敢授其成方至至正甲甲春陽氣

正月間邑間豆瘡不越一家率投陳氏方童幼死

餘人雖由天數吾恐人事亦或未之盡也

錢傷寒男軀重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頓

悶項急也瘡疹則腮赤躁急噴嚏悸動昏倦四肢傷寒

當散之瘡疹當平有大熱者解毒

昏睡喜嚏悸動昏者將散瘡疹

垣辨証証呵欠噴嚏睡中急驚耳尖冷眼赤

川傷寒口熱口中醋氣妳辨不消暖中疼痛

錢瘡疹候面燥腮赤目胞赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽

嚏噴足指冷夜臥驚悸多睡並瘡疹証此夫行之病也

癩瘡未頭法  
辨驗  
傷寒三熱醋  
氣妳不脘腹  
痛  
瘡呵欠嚏噴  
睡驚耳冷月  
出  
瘡先見候論  
異說氏論病  
之盛  
肝呵欠以胃  
心時發龍悸

脾乍凉  
肺面赤噴嚏  
腎耳散凉冷

睦親言十大尉病瘡疹衆醫治之至曰疹未出屬何歲  
府一鑿言胃氣熱一鑿言傷寒不退一鑿言在母腹中  
有毒錢氏白着言胃氣熱何以乍凉乍熱着言母腹中  
有毒屬何歲也鑿曰在脾胃錢氏曰既在脾胃何以猶  
悸錢曰大胎在腹中月至六七則以成形母食穢液入  
兒五歲食至十月常胃院中五生之時口有不潔產母  
以手拭淨則無病疾俗以黃連汁壓之方下膈糞及涎  
穢也此亦母之不潔餘氣入兒歲中本先因微寒而成  
瘡疹未出五歲皆見病証內一歲受穢多者乃出瘡疹  
初欲病時先呵欠頓問驚悸乍凉乍熱手足冷面  
燥欬嗽噴嚏此五歲証俱也呵欠頓問肝也特甚驚悸

燥欬嗽噴嚏此五歲証俱也呵欠懶同肝也時疫驚馬嘔

心也乍凉乍热手足冷脾也面赤腮颊赤噴嚏肺也惟

腎無候以此在府下不能食穢故也凡瘡疹乃五歲

若出歸一証肝小疱肺膿疱心斑脾疹惟腎不食穢毒

而無諸証瘡黑者屬腎由不慎風冷而不飽內虛也又

用抱龍丸數服愈以其別他候故未發出則見五歲証

已出則冷一歲矣治歲之本先目微寒一自勿認作寒慎風冷而不飽內虛

証當用抱龍丸即知瘡疹多用熱也

瘡疹始出之時五歲証見惟腎無候但見乎証耳飢凉

耳凉是也飢耳俱屬於腎其居北方主冷之

垣夫瘡疹始出之証必先見面臊腮赤目胞赤呵欠

頓悶乍凉乍热咳嗽喘足稍冷多睡驚並瘡疹之

東垣論屬五  
太陰逆於四肢  
而赤叮不驚悸  
噴嚏

証或生膿胞大班或生小紅班或生等不同

何故俱顯上証而後乃出蓋以上諸証皆太陽寒水起

於右熱左腎足之太陽膀胱寒小夾脊逆氣

上頭下額達手太陽子火入於面上故顯是証蓋壬寒

水翹丙丁熱火故也諸癰病皆從寒水鑿者

當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名

命門主施化婦人擊胞者孕後為生化之源

非五行也非水亦非火此天地之象坤土之

生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其

血則為男子三日四日五日血脉已狂精不勝血

女子乃二物相搏長先夕生謂之神又謂之精道此輝

二門言之本未面目是也其子在腹中十月之間隨母  
呼吸母呼亦呼母吸亦吸者陽氣也而生動作益卷  
氣神飢則食母血渴則飲母血兒隨日長筋骨皮肉血  
脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血啼聲一若隨吸  
而下此惡血復歸命門胞中僻于一腸隱伏而不若直  
至兒曰內傷乳食濕熱之氣下溜合于腎中二火交攻  
致營氣不從逆於肉理惡血乃發諸斑疹皆出於壬水  
甚瘍壞肉理歸於明陽故三番痧始頭之証皆足太陽  
壬水膀胱剋而內小腸其始出皆見於面終歸於陽明  
肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此  
理皆從足太陽傳變中來也夫小兒斑疹之由皆始生

之時其声一散其口中恶血随吸而下還於右腎包絡  
之胞中其小兒內傷乳食營氣不足積於腎之右胞中  
其瘡發焉下焦相火大熾遂從太陽寒水之脉上行故  
班疹出焉見上為寒水所遏下為二火相攻故胃氣逆  
於肉理為腐者也其三等班皆出於太陽寒水之經外  
為大寒內為二火相攻化血肉為膿當外發寒邪使令  
消散內寫二火不令交攻其中令濕氣上歸復其本位  
可一二服立已何班疹得出矣余嘗以此療疾可使一二  
服立愈其班疹即愈使已後令兒再無二番班疹出之  
患此內外之經之去是令小兒定無班疹之患也何  
而有疼痛苦楚而損生命者矣

而有疼痛若楚而損生命者矣

驗熱時候

早熱為水泡

午熱為疔

晚熱為膿疔

四季熱為疹

用藥驗癩是

否

驗症施治

傷寒瘡疥

疑似之間均

宜微發

錢始發潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡疹而不甚多

者熱晉皮膚之間潮熱隨歲出如早食潮熱不已為

疱之類也

巳午潮熱為癩甲酉潮熱為膿  
戌丑未潮熱為疹也

王驗癩法差三日未見形迹當以生酒塗其身上特一看

之狀如蚤痕者是也或曰傷寒傷食潮熱與癩疹不能

辨者宜以辛涼之劑調之五日以裏發出即癩五日以

外無者非班也或隨應見而治之

閻治小兒壯熱昏睡傷風、熱瘡疹傷食皆相似未能辨

認間服升麻葛湯惺、散、浙、柴、胡、湯甚驗蓋此數藥通

治之不致悞也惟傷食則大便酸臭不消化畏食或吐

宜以藥下之

海葷云傷食宜以藥下之者當詳其兩傷  
何物生硬寒熱不等不可遽用巴豆之類

大毒之藥下之升麻葛根湯小便利不利也小柴胡湯往來寒熱胸脇微痛少陽也然欲知其經當以脈別之

小耳冷見熱冷手足乍暖乍涼面赤時嗽時嚏驚悸此

瘡疹欲發也未能問服升麻消毒散已發未發皆

宜服仍用胡荽酒黃柏膏暑月煩白角湯玉

露散熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依

錢見同治法惟大小不同耳  
海藏云消毒散

身熱目赤甘桔湯明藥也  
正謂地時暑之劑甘

寒飲子甘桔湯少陰藥也  
煎雪天門冬麥門

升麻葛根湯治傷寒溫疫熱壯熱頭痛支體痛瘡

發未發並宜

升麻 乾葛 芍藥 甘草

升麻 乾葛 芍藥 甘草 炙各等分

石同為麻末每服四升水一盞半煎至一盞溫服

時熱海藏云升麻藥太陽陽明之藥身熱驚悸者身熱汗出者

但見癍點便忌葛根湯恐後得表虛也

惺散治小兒風熱癢疥傷寒時氣頭痛壯熱目眩多

嘔咳嗽氣粗鼻塞涕



白朮 桔梗 細辛 瓜蒌根 人參

茯苓 甘草 各等分

右以咀每服二升水一盞生姜二片入薄荷三葉煎

至半盞時一匙服活人加防風川芎亦冬隨經也

云惺散風熱嘔不利也

右二方散表平劑

王朝奉曰物解肌湯

芍藥 黃芩 升麻 葛根

每服四升水一盞煎至七分去滓服或云小兒傷寒

疫癘潮熱瘡疹五日已裏疑土不能辨別者並以辛

涼之劑調之即此四物解肌湯之類海藏云此論即

腹中有物未得大便而發熱者當以食藥去其物則

可差得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯此此錢

田氏防風蒼朮湯治小兒邪熱在表惡風惡寒所傷瘡疹

未出可出表散瘡疹

防風半兩 蒼朮 石膏各一兩 炙甘草半兩 川芎

大便酸臭為  
傷食宜消導  
之  
昏不知人脈  
大宜補虛

黃芩 各二分半

右為粗末每服二分 生姜三片 薄荷七葉 小茴日

服 此方惡寒者宜因之

右二方辛涼之劑表有熱者宜之

大便酸臭不消化畏食或吐乃內傷飲食宜枳朮

丸傷冷食飲神應圖

丹一男子年十六七歲發熱而昏目無視耳無聞兩手脈

皆豁大而畧數知其為勞傷矣特里中多發痘瘡者雖

不知人與藥則飲與粥則食遂教以參芪當歸白朮陳

皮大料濃與之飲至二十余帖豆始出又二十餘帖則

成膿胞身無全膚或曰病勢可畏何不用陳氏全方治

防風半兩 蒼朮 石膏各一兩 炙甘草半兩 川芎

癩瘡已顯法

肝水疱

肺膿疱

心癩

脾疹

歸腎變黑

之子曰此但虛耳無寒也只守前方又數十帖而後

詢其病曰謂先四五日恐有出豆之病遂極刀樵採連

日出汗甚多

錢五歲各有一証

肝歲小泡

肺歲膿疱

心歲癩

### 脾歲疹

歸腎變黑

海歲

云肝

歲小

或清

肺

歲膿

色或

白

脾

此五色凡

皆於瘡或

一作次弟大小

不一或三色

小兒在胎十月食五歲血穢血穢生下則其毒當出故

瘡疹之狀皆

肝主泪肺主涕心主血脾為裏

血其瘡出有五名肝為小泡以淡出青小肺為膿疱

涕稠濁色白而大心為癩主心血色赤而小次於

涕稠濁色白而大心為癩主心血色赤而小次於

診洋順

疹小次班瘡其主畏血故色赤黃淺也涕出多

故膿疱水疱皆黑眼所出不多故班疹皆小也病

者涕泪俱少譬疱中容水去則瘦

右水疱者俗謂之水痘也膿疱者俗謂之痘子也癩

者俗謂之瘡子也者俗謂之麻子也痘子形狀最

大水痘以之癩瘡又之麻子最小隱、如麻也

更者時月輕重大抵瘡疹屬陽出則為順故春夏病為

順秋冬病為逆冬月腎旺又感寒病多歸腎變黑又當

辨春膿疱夏黑陷秋班子冬疹子亦不順

凡瘡疹只出一般者善先發膿疱後發疹子者順先

發水疱後發疹子者逆先發膿疱後發水疱多者順

少者逆 先發小泡後發痲子多者逆少者順 先疹

子後痲子者順 先發膿疱後發痲子者逆

海藏云此一句足以知雜出者諸歲相合而不齊也用藥亦難矣又云前出例五色各隨五歲亦有二色相合

或有三色即無定也與此前後膿水

凡瘡疥者出辨視輕重者一發便出盡者必重也瘡疥

者半輕半重也出稀者輕袞外紅肥者輕外黑裏赤者

微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者熱

劇也青乾黑陷昏睡汗出不止煩燥熱渴腹脹啼喘大

小便不通者困也凡瘡疥當乳母慎口不可令飢及受

風寒必歸腎變黑難治也海藏云或熱反黃水化者

可不察以脉別之可也或有出色正者出內素者熱頭反陷色或青灰似黑中有針眼下陷當急以涼藥疎之

便結者大匠黃牽牛之類  
便結者金苑丸死之類

陳輕者作三次出

大小不一等

頭而稀少

眼中無

糧窠紅

肥滿光澤

重者一齊並出

如蚕種

身溫腹脹

灰白色

稠密

瀉渴書

頭溫足冷

輕變重

犯房室

不忌

先曾瀉引飲冷水

餌涼藥

重變輕

避風寒

常和暖

大便稠

不燥渴

忌外人

漸

左飲冷水餌涼藥者內有實熱者不須忌之

二日三日瘕瘡始見微瀉欲出者如粟米大或如黍

米或如菜豈大似水珠光澤明淨者佳

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

四月五月瘡瘡大小不一等相窠紅光澤明淨者輕如稠密隔及灰白色瀉瀉者重

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

六日七日瘡瘡肥紅光澤者輕如身濕氣促口乾腹脹足指冷重

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

八月九月瘡瘡長足肥滿蒼蠅者輕如寒戰胸亂腹脹煩渴氣急也

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

十日十一月瘡瘡當屬瘡而欲愈也

痘初出全而  
護眼法

初出噴嚏令  
便法

十日 十一日 痘瘡當屬瘡痂落而欲愈也

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

錢黃藥膏治瘡疹已出此藥塗面次用胡荽酒外治法

黃藥 一兩  
新芥豆 一兩半  
廿四 四及

右同為末生油調從耳前至眼匡並厚塗之日三四次

如早用瘡不至面縱有赤少用臍脂臍脂云疹痘讓眼人多

錢氏一方黃相膏好諸家護眼法既出此亦也

肅痘瘡初出用黍粘子為末水調付顛門並無患眼神妙

胡荽酒 胡荽細切四兩滋好酒二盞煎一二沸入胡

荽再煎少時用物合定放冷右每吸一兩口微貴

從項至足勻遍勿噴頭面人左右常令有胡荽即

初出變重  
為輕法

能辟去汗氣瘡疹出快

丹痘瘡初出時或未出時見時人有患者宜預服藥多者

令少重者令輕

絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性為末沙糖拌乾吃入

未砂亦妙

恒治毒救苦湯

治麻疹悉具消化便令不出若已出稀

者再不生斑十一月立以此方隨四時加減

藥性者能之

麻黃根五分

羌活五分

防風五分

柴胡二分

川芎二分

細辛一分

薑本一分

升麻五分

葛根二分

酒黃芩二分

生地黄二分

生黃芩一分

黃連三分

酒黃柏五分

紅綠花少許

蘇木一分

葛根 二份  
酒黃芩 二份  
生地黃 二份  
生黃芩 一份

黃連 三分  
酒黃柏 五分  
紅粉花 少許  
蘇木 一分

當歸身 三分  
吳茱萸 半分  
白朮 一分  
蒼朮 二分

生甘草 指一分  
搗皮 一分  
連翹 半份初出者  
咸出大者加

右剉如麻豆大每服五分小二大盞益至一盞去滓

稍熱服癩疹者曰內傷飲食至令榮氣逆故也大禁

牽牛巴豆食藥宜以半夏枳實大黃益智仁五類去

其清瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡驚噴眼澁知必

出癩也

諸大膿胞小紅斑疹三色皆營氣逆而寒覆其表宜錢

氏曰味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

升麻 葛根 白芍藥 甘草 當歸身

分五威癩

連翹

如肺或膿癰先頭喘嗽或氣高而喘促加人參少加  
黃芩以寫浮大而補元氣

如心出小紅癍必先見血溢驚身熱肌肉腫脉弦洪

少加黃連

如命門出癰疹必先骨痛身熱其疼痛不敢動搖少

加生地黃黃

諸癍疹皆為陰証瘡須用內

傷乳食脾胃不足營氣逆行確火熱

其外錢仲陽製四味升麻湯散之如有傳受証依加

減服之

世如疹痘則皆於脾胃宜陳氏人參清葛散

疹者皮膚隱  
如麻故名曰麻

水痘者多因傷寒熱毒而發宜升麻散羌活散

分乾濕治

論生死

水疱者多因傷寒熱毒而宜升麻散羌活散

丹瘡乾者用退火濕者便有寫濕退火之劑用輕、涼藥

京芥升葛梗翹 瀉濕乃肌表間濕用輕、風藥防風

白芷之類

瘡初起時自汗不妨蓋溫熱薰蒸而起故也

世傳一憂齒瘡黑隔喉中頰端目先冷冷血氣虛弱即變

此証一不可治

二增寒因倦豆子縮依二不治

三瘡作坑內無膿血或黑色泡或瘡跡作黑色三不可治

四癰疽癰腫瘡毒變疔口臭齩爛牙落四不可治

五聲啞氣噎或咽藥腹中鳴五不可治

世如疥瘡則宜於脾宜陳氏人參清葛散 疥瘡者皮膚瘙癢 如疥瘡者皮膚瘙癢 如疥瘡者皮膚瘙癢

六痘初出而畔在皮膚帶紫黑色不出者六不可

七誤於踈氣轉氣吐者七不可治

凡痘出前後心容及兩手心足心容皆死

陳論痘不治有五

痒峭寒戰齒牙煩不止

瘡紫黑喘渴不寧

頭溫足冷呵亂喘促

目睛上視齒方喘渴足冷

灰白色陷項腹脹渴不止

活小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足冷脉數疑似之間

只與升麻湯解肌兼治瘡子已潰未潰皆可服但不

禁忌

忌妄下

轉此為大成傷寒身熱一固不可下瘡疹發熱一在

可踈轉以為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表猶不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宣其毒也

殺笑或海藏云論當在佳則可若便甚則遇極以食

藥通或海藏云論主之然當小費藏府秘其入秘脈道如何

耳許或海藏云論下今傷食也痲疹內熱手足亦冷唯傷

寒傷或海藏云論則不宜用之王德庸用感應丸治之

痘瘡已出不可踈轉出得已定膿血大盛却用踈利亦

非也或海藏云論後重如利疾及以脈滑在裏亦當微下

大抵瘡疹首尾皆不可下或海藏云論府有疑

小兒身耳熱冷咳嗽輒用利藥即毒害人或海藏云論此言

之氣在經者故用化毒犀角湯為氣出或海藏云論此言

世凡疹痘終馮則令內隔決不可輕易轉下惟大小多日

忌房事

忌房事

忌穢氣

忌風冷及重溫

不利宜微、利、瘡已靨尚有餘熱停蓄或尚作

或發瘡瘻或癰疽曰順飲下之不亦免生他

証累試累驗

每見疹瘡者服者表麻黃藥出汗陽氣盡出膚表遂致

斑爛瘡疔利或作寒或成作陰癰死者多矣

陳瘡瘡自初出至已愈之際父母切忌行房事觸之

世凡瘡瘡勿令親近狐臭偏腋者房中淫慾者及婦人經

候醉酒葷穢藥一切腥臊度汗蒸濕設燒油髮

五辛煖糞林石煎油等物俱當忌之

海瘡瘡忌外人及穢觸之物雖不受風冷亦不可擁逼常

令衣服得中垂虛涼處坐臥

陳瘡瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水吃亦不宜與

易生冷

陳瘡瘡發熱口乾煩渴不止者切不可與水吃亦不宜與

容紅柿西瓜搗等冷物食之

脈定中者必忌生

熱者

痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜

等冷物食之或頭溫足指冷或瀉渴氣促亦不可與之

十二日十三日瘡痂已落其痂尤黧或凹或凸肌肉尚

嫩不可燥浴亦不宜食炙煨物不宜食五辛酸辣有毒

之物恐熱毒熏蒸眼目多生翳障

易過愛

海世徒恰過愛信其佞而不藥病已成而方要摩撫位容

無所不從豈知愛之適足以害之惜之適足以矣之始

不早治、不全終卒之殞斃勞而無功至是咎暨嗚呼

其恫計其繆矣

熱

毒宜原形

痘出太密

丹疎則無毒密則有毒用涼藥解之雖數十帖不妨無害  
眼之患

潔古云一發便密如針頭形勢重者合輕其表而涼其

內連翹升麻湯土之

垣黍粘子湯治麻疹已出稠密身表熱急與此藥防已後

青乾黑陷

黍粘子

炒香

骨綿身酒洗

炙甘草各不

紫胡

連翹

黃芩

黃芪各一不半

地骨皮

右同為粗末每服秤二分以酒煎去滓溫服空心藥畢

且休與乳食

田氏調肝散治瘡疹大盛宜服今瘡不入眼

田氏調肝散治瘡疹大盛宜服今瘡不入眼

生犀 二多半  
龍膽 一多  
黃芪 半兩  
大黃 二多

桑白皮 半兩 炒黃  
麻黃 一多 去節  
鈞藤子 一多  
石膏 半兩

瓜蒌 去皮  
甘草 炒各二多

在為粗末每服二多水煎食後溫服微利効

海出太多者犀角地黃湯地骨皮黍粘子湯 犀角地黃湯才見血地

骨皮黍粘子湯即地骨皮散加黍粘子是也

丹又解瘡毒藥

絲瓜 升麻 酒芍藥 生甘草 唐菖

黑豆 赤小豆 犀角

瘡癰已發密重微喘飲水者有熱証用去風藥微下之

丹治男子勞傷出豆昏不知人身無全膚者 方見豆未出

痘出不快

大法

出不快用溫

平微發之

微發不白加藥

分丹

加藥不出即大

發之

有執不出者

利小便解毒

若又不快用

抱龍丸

錢消毒散

活鼠粘子湯

化毒易

已上三方並見表中有黍粘

右三方發瘡痘皆溫平溫涼藥錢氏所謂三日不出

或出不快即微發之者是也如微發不出者即就於

前項藥誤每服二名者即加至三四名誤每日二服

者即加至三四服也如加藥又不出者即用升麻葛

根麻黃挂枝大發之也如大發後不多及喉平無事

者即瘡本掃不可更發也如喉洪有熱有火熱者當

用四聖... 正... 利小... 便... 有... 小... 熱... 者... 當... 用... 升... 麻... 葛...

者即瘡本辨不可更費也如瘡法有熱在大熱者當

用四聖導赤八正輩利小便有小熱者當用苓連及

金花丸輩解毒也若利小便解毒後又不快則勿發

勿下故止用抱龍丸治之此皆錢氏心法也

丹剋奴豆已出第三日色淡不肯發此血氣俱虛此方

人參一分 白朮炒二分 書芪酒炙一分 酒歸身二分 陳皮一分

甘中炙 煨訶子一分 煨豆蔻五分

煎入好酒些飲之

右氣血俱虛

彭疹豆散米透宜四君子湯加黃芪紫草糯米煎元鑿云

百病不可損胃氣故四君子及糯米助其胃氣

編錢氏方中

孝忠

世六一湯專投瘡之膿

黃芪六分 炙甘草一分

右吹咀每服二分水六分蓋入酒二分同煎至半盞

溫服更加椒攪同煎尤好山藥亦得

右氣虛

活活血散治瘡子或出不快

白芍藥一分

酒調如欲止痛只用溫熱水調下

海藏云張和之防

凡大劑此証大陰藥也

世四物湯治瘡瘻出不快不甚紅活不起根窠緣血虛而

滋故也此藥能活血調順瘡疾無如此方及今用

虛寒

之如宝只加甘草

右血虛

丹女子瘡後出豆血氣俱虛又值冬寒熱易退豆不出

丁香 五立 附子 五合 桂 羊分 甘 灸二分 人參 羊分

芪 分 陳皮 羊分 酒 歸 羊分

陳文中異攻散治瘡痘已出之間不光澤不起發根窠不

紅謂之

木香 當歸 各三分 桂 白木 茯苓

陳皮 去白 厚朴 姜制 浙人參 去芦 肉苳蔻 丁香

半夏 姜制 附子 炮去皮各一分半

右吹咀每服二升水一盞姜五片棗三枚煎服

滋故也此藥能活血調順痘疾無如此方自古及今因

表裏  
清便月調  
宜表

右虛寒

虛而不寒者宜用前方氣血虛之劑不宜用此必厥虛細四月身體冷者方可用之

錢藍根散始瘡疹出不快及劑屢一名二聖散救小兒垂死

板藍根 一兩

甘草

剉炒七多半

一法等分

右末每服半分或一分取雄雞冠血三兩點同溫酒

少許食後調下無時甚則三五服立效

丹溪云藍根散敗血

潔古云養出不快清便自調知其不在表不在裏當

微啜之升麻葛根湯

錢治毒散治瘡未出或已出未幾勻遍又治一切瘡涼亭

去痰治咽喉痛

丹溪云治毒飲氣而裏藥也

牛蒡子

三兩炒

甘草

半兩剉炒

荆芥穗

二兩半

右同為粗末每服三升水一盞半去滓溫服

海藏云此藥所註皆

溫中商一法  
防風薄荷

治黍粘子湯治小兒瘡痘欲出未  
能得透皮膚熱氣攻咽  
喉眼赤心煩

黍粘子 四兩炒  
荆芥穗 二兩  
甘草 一兩  
防風 羊兩

右為細末沸湯點服臨卧大  
利咽喉化痰涎止嗽老

幼皆宜 海藏云太陽少陽也  
首論溫平者此也

海又法用牛蒡子炒熟為末同  
荆芥煎服

右三方消毒飲加減法也

治化毒湯治小兒瘡痘已出未  
出並可服之

紫草 茸  
升麻 甘草 灸各等分

右吹咀水二盞粳米五十粒同煎  
此陽明之藥也 歲

云出不快者化毒湯本事方  
用糯米去糠米

丹重玉豆出兩日不甚透食粥進汗微出熱畧減但食物

口不好有惡味此出得遲葭未透酒微表之

升麻 炙甘草 紫草 白朮 陳皮

芍 半炒

作一帖煎與酒飲白芍須炒見其大便雖出不多却

自帶瘡疔

世透肌湯治痘不透

紫草 升麻 林米粉炒各 甘草八分

右三方皆化毒湯加減法也

海太陽出不快身之後也

荆芥甘草防風湯

陽明出不快... 升麻加紫草湯... 紫草湯

煩不得眠宜汗利

陽明出不快身之也

升麻加紫草湯升麻葛根加紫草

少陽出不快側也

連翹防風湯即連翹散

四肢出不

防風芍藥甘草湯

瘡疹煩不得眠者甘桔加枳子湯

桔梗

甘草

枳子

活治瘡出不快煩燥不得眠者水解散麻黃黃芩湯升麻

黃芩湯主之

其氣血用右膏枳子之類尤佳麻黃黃芩湯升麻黃芩湯亦當求責的是太陽陽明也

水解散治天行頭疼壯熱漸二日並治瘡瘡未出煩燥

或出尚身體發熱者

麻黃

四升去節

大黃二兩

黃芩

桂心

甘草炙

芍藥各二兩

右為粗末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二升相  
次二服得汗利便差強人服二方寸此調風寒之人  
三伏中亦宜用之若去大黃春夏通用

升麻黃芩湯治瘡瘡出不快煩燥不得眠

麻黃黃芩湯治瘡瘡不快益煩燥昏潰或尚出身疼批  
者已上二方見小兒傷寒

便隨宜利

錢曰聖散治瘡瘡出不快及倒靨

紫草茸 木通制 甘草制炒 枳殼  
麩炒 去穢

黃芪 切焙 各等分

右同為粗末每服二升水一中盞煎入八分溫服無

時木通 枳壳 煨 及 差 大 小 尿 汗 不 必 苦 泥

田氏紫草 廼散 小兒 痲疹 出 不 快 或 倒 撮 毒 氣 入 腹

紫草 草 黃茂 桑白皮 木通 枳壳

白朮 各 等 分

右為粗末 每三升水 酒各半 盞射 香少許 同煎

海紫草木通湯治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓 粳米 各 等 分

甘草 減半

右為末 每服四升水 煎 小便不利之劑也

世人參蟬蛻散治小便不利 瘡疹不散 頓燥 多渴 夏牙齒

咬 氣 喘 滿

人參 蟬蛻 白芍藥 木通 赤茯苓

甘草 紫草茸

錢紫草散 散斑疹

釣藤釣子 紫草茸 各等分

治為末 每服一字或半茶匙 溫酒調下 無時

海小兒瘡疹出未快 可濃煎紫草汁服

右紫草例為通利腠理要藥也

瘡不綻 黃犬蠟 三四个用常酒研細服之 未綻再脹

真指絲瓜湯 散瘡疹最妙 絲瓜連皮燒灰存性 百沸湯調下

痘痒翮

丹痒翮者 於形色脉上 今之實則脉有力 氣壯虛則脉無

活血 雜方

虛實

別唐氣性為 力氣 性 虛實則氣 虛實則氣 表之齋

虛實

脈虛氣怯為

虛

脈實熱力切為

實

不屬為虛

如水齊不紅活

為虛

雜方

力氣 怯 饑

炊 虛 瘰 則 氣 怯 虛 瘰 以 實 表 之 齋

加涼血藥實瘰以 大黃寒涼下其

瘰瘡瘰

榻 不 掩

白朮 羊 參

炙 黃

羊 參

歸 羊 參

陳 皮 羊 參

炙 草 參

予治一七歲子瘰疔出未出際腹泄數行其色黑

黃根窠三日後瘰塌批即黑色口渴其根窠如冰疥

狀不紅澤不起發食少厥浮數有力按之虛遂用參

芪歸朮陳皮肉豆蔻為君炙草訶子桂為佐使水煎

熟入好酒常少下咽瘰疔止食立進根窠紅澤而起

發二服全愈

丹輕者用淡淡蜜水調活石末雞羽圍之於上

陳痘痒難任恠之成瘡或膿或血出者敗草散治之切不可

可用牛糞灰貼則臭穢斑痂多矣

屋爛草

屋上爛草也如無墻頭上爛草亦可用此草經霜雪而露感天地陰陽之氣善解瘡毒

右一味為末每用干貼無時着渾身瘡破爛膿水不

絕於衣裳雜以坐卧可用二三斗雜於席褥令見坐

卧其効如神

小兒痘瘡痒難任恠燒成瘡及瘡痂欲落不落用上好

白蜜一味塗於瘡上其痂易落自無紫黑瘡痂痕世傳

落後痘毒不尺變成癩癬甚痒難任者用陳年臘猪脂付之其効如神也

又方用羊髓骨髓煉一二沸乃輕粉少許研成白膏塗

合盛之塗瘡

痘灰白色

痘灰白色

丹炉灰白色靜者怯者作寒者燥者勇者欬者作熱者

全全白色將屬如豆壳盖回初起特飲小多其屬不瘡

俗呼倒屬不妨但服實表之劑如毒鬱裏消息大小便

大閉通大小閉通小

吳店小兒周歲豆瘡色白甚痒夜來藥中每加炙芪半分

參半分 丁香二个 歸一不 桂三分 芍一分

予族姪女笄年出痘灰白色身熱喘嗽渴脈洪有力

與八物湯加翹桔犀屑半夏木通紫葛石膏杏仁枳實

連苓前胡瓜蒌實服之十帖後色紅活喘嗽緩減漸

謝但熱未除遂於前方減苳杏胡枳連苓萸七味而

寒熱虛實

靜怯為寒

躁勇為熱

大小利為表虛

大閉為裏實

虛寒

虛熱

虛山頭

氣虛毒不出

者補中有通

色後補血

色紫解毒

而服三十余帖而後髮皆落月余方起虛之甚

也又一男子二十餘歲出痘破者未破者灰白色又

雜間以黑陷倒靨者發熱寒戰身痛脈洪或時弦亦

與八物加木通紅花紫草陳皮連翹服之十余帖而

痘黑陷倒靨

圖元 辰紫草散治瘡痘黑曾陷曾出此方愈元云錢氏

方有扣壳雜

紫草 甘草

糯米

元云此味極如

黃芪

右為末小煎

丹痘瘡黑陷二種曰氣虛而毒氣不能尽出者用酒黃芪

人參酒紫

色正如上法治

參芪之補佐以紫草之通劑也

如得飲成乾之際却淡色不正者屬血虛用助血之

人參酒紫

色正如上法

治參草之通

如得飲成就之際却淡色不正者屬血虛用助血之

藥當歸川芎之類或加紅花

如將欲成就之際却紫色不正者屬熱用涼藥解毒

升葛苓連梗翹之類甚者用犀角屑大鮮痘毒如用後項

諸法成就之際色不正者並用二法治之

世治瘡疹倒靨黑陷回生散

人牙燒存桂入射香少許

右研細每服半分用黃芪白芍藥煎湯調下立效極

妙錢氏方用温酒調下雲岐子方用升麻紫草並湯

調下海藏去若平昔油膩賜培者通丸下之紫草湯自

酒好錢氏方用射香五酒蓋瘡痘最特射香與

大小清利助序  
者躁通表

湯治瘡黑，隔藥不能拔用之用驗

右用穿山甲燒存性，味為末，大射香當門子少許一

歲半外三歲一分，温酒調下一服，雖即老半身黑，隔欲絕

者亦能暫甦，而後紅色，但目閉無魂者不復生矣。方山

雖驗回生散又佳

今詳射勿入亦佳

衍義：麻黃剪草根節半，西以蜜一匙，七日炒良，以水半

升，並候沸去上味，再並去三分之一，不用滓，病瘡痘倒

靨黑者末，熱盡服之，避風，伺其瘡復出一法，用無灰酒

並，但小兒不能飲酒者，雞眼然其效更速，以此藥入表

也。世傳此法

活黑瘡倒，隔猪尾湯，無比散，龍膽膏，子無不驗

海藏云：此証若以草葉下之，則勝于腦射，必不得已而後

活黑瘡倒陷猪尾湯法散龍膽膏子無不驗

海藏云此証若以草藥下之則勝于腦肘必不得已而後

用之可也

活猪尾膏治痘瘡倒陷

小猪兒尾尖刺血兩點入生肌子少許同研新小

調下食後主効

龍腦膏子治時疫痘瘡及赤瘡子未透心煩狂燥氣

喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不爾毒

入藏必死

生龍腦一分

右研細滴猪心血秘丸如雞頭肉大每服一丸心煩

狂燥者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用温酒化下

小赤大倍服  
實者調和裏

少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息即安也

云此一法証極而用  
取活人法不得已也

海藏四翼散治班瘡倒靨黑陷出御藥

人猫猪犬鼠及燒人糞猪狗糞

每服三分蜜小調每日一分至三分量先大小

選甚倒靨并黑陷

萬兩黃金也合消治班瘡倒靨黑

子和人中黃臘月者最佳通風及以火煨成煤水調三五

錢陷者自陷甚者燒人  
屎即此方也

世治疹痘不透乾黑危困用山查肉一味為末每服二分

紫草酒下  
減徐徐進三兩服即紅消

紫草酒下  
減徐徐進三兩服即紅活

海守真涼葷治小兒斑疹黑陷亦妙然止能治大便結硬

小便赤澁 便小便已通不宜用此惟以易老

去大黃硝者最為穩 當

錢重者猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒

孰噤牙或身黃腫紫宜急以百祥丸下之復惡寒不已

身冷出汗耳聾反熱者死何以然腎氣大旺脾虛不能

治故也下後身熱氣溫飲水者可治以脾 勝腎寒

去而溫熱也治之宜解毒不可妄下長下則內虛多喘

於腎若欲食而痲頭焦起或未焦而喘實者可下之

瘵黑陷而耳聾反熱者為逆用百祥丸牛李膏各三服

不食者死也

寒戰咳多夕  
黃腫紫者下  
之

百祥丸 一名 車陽丸 治瘡疹黑陷寒戰咬牙憂齒身黃

紫腫

紅牙大戟

不以多少 葶干好 煮乾去骨 月中 晒干 瘦納片中 煮汁 焙干為末

右水丸如粟米大每服書二十九丸研赤脂麻湯下吐

利同焉此方治憂齒甚妙

牛李膏

用牛李子不以多少取汁石臼內熬成膏牛李子野

生道邊至秋結實黑丸成穗或無生者市肆中買乾

者為末水熬代用每服皂子大杏仁膠湯化下睦親

宅一大王疔瘡疹始用一李鑿又召錢氏錢晉抱龍

丸三服李以藥下之其疹稠密錢見大驚曰若水轉

下則為送病主曰李已用藥下之錢曰富家如出未

下則為送病主曰李已用藥下之錢曰瘡疹如出未  
有化証不可下也但當用平和藥頗與乳食不受以  
冷可也云、瘡痂若起能食者大黃丸瀉一二行即  
止今先下一日瘡疹未出盡而稠密甚則難治此  
悞也繼得安其病有三上者齋二者癰三者目赤李  
不能治徑三日黑陷復召錢氏錢氏曰幸不設寒而  
病未困也遂用百祥丸為藥半李膏為助各一大服  
至五日間瘡復紅活七日而愈蓋黑者歸腎也腎旺  
勝脾土不克水故脾虛寒戰則難治所用百祥丸者  
以瀉膀胱之腑府若不實感自不盛也何以不瀉腎  
曰腎主虛不受瀉故二服不効即加寒而死

子和治瘡疥果陷銑脚成臺仙為末炒一升腦子一合用

溫水調下服之取效

活無比散治小兒瘡疥惡候不快及瘡疹應一切惡候

朱砂一兩 牛黃 射香 鼈腦 臙粉各一升 研

右同研細如有患者小兒一字大人半升水銀少許

同小豬尾上血 滴新水同調服先寧穩得睡

然後取轉下如爛魚 臙蒲菊之類 便安小

見用如汁滴妙海歲云此治內熱 雅過世不能開

即透肌肉之藥典至

雲岐小兒疳疹黑陷方

乾胭脂三分 胡桃一个烧存性

活血帶氣

右為末煎胡荽酒調藥一服之立效

右治死血黑陷丸前方用川山甲及腦射等藥治

黑陷者皆也

雲岐治癰瘡黑陷

膈月禿梟腦子一个或二个以好酒調服若乾者以

好酒浸少時化開依上調服立效梟者禿也

無擇箬葉散治倒靨

箬葉一味燒灰為末射香酒下

錢蒼黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水較不消者逆可以

然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎

雖用事脾可制之令膾入腹為膿血及連痂皮得出是

未定一音不為

隔

已定逐處里

為屬

唐寒

唐寒

唐寒

唐寒

唐

脾強腎退即出而為七瀉米穀及瀉乳不化者是脾虛

不能制腎故自泄也此必難治後藏云瀉也表裏俱病是為大

疾水谷不化者送順

未定而一齊黑為黑隔已定而不齊黑為將腐

痘寒戰

世增寒因倦或昔寒戰能令巨子縮伏宜用陳文中異攻散  
錢寒戰咬牙黑隔者百禪丸下之

嘗治痘寒戰用白朮芫歸加苓治之全

痘苗熱

丹胡宅豆瘡苗熱此血少有餘毒也

陳皮 白朮 歸身 白芍 牛蒡子

木通 犀角 一子羊 生甘草 芫一子

表熱

少壯者鮮毒

木通

犀角

一子半

生甘節

芎一子

分六帖水盞半薑小盞食麥稍熱飲之

透連翹散治一切熱蕪治瘡疹有神

連翹

防風

梔子

甘草

右為末水煎

書

海藏之治熱在外而不願此少陽藥也

易老之涼葛去大黃芒硝者能解六經中熱此不惟解熱

治小兒斑疹熱候亦佳欲散之則本藥與防冷荆芥

二物各半白水煎服

浙

阿膠梔子金花丸

黃芩

黃連

黃柏

梔子

右末滴水丸麻子大每三五丸

錢三黃丸治諸熱

黃芩

半兩

大黃

濕帝畏

黃連

各二分半

煨

右為末糊丸棗豆大每服五七丸至十五二十九食

後米飲送下

右錢氏之有小熱者解毒海藏謂解毒者三黃湯

金花丸之類

四聖散方見出不快

海棠草木通湯方見全上

導赤散方見治虛實

八正散方見林

大熱煩渴腹  
喘喘便此者  
利小便

丹月初起煩燥譫語短渴引飲若飲水多則後屬不齊

丹有初起烦燥譫語矢渴引飲差飲水多則後屬不齊急

以凉藥解其標如益元散之類可用

右五方利小便退热之劑錢氏云有大热者利小便

又云身热烦渴腹喘而喘大小便泄面赤同乱大吐

此當利小便盖此四聖導赤之類是也

錢宣風散

利小便之類不  
差下者之

枳櫛 二斤 橘皮

甘草 各半斤

牽牛 四斤 生熟用

右為末三二歲密湯下半升已上一升食前易光加

防風海藏云與通葶丸相上下氣血也

通葶丸

大黃

牽牛

木通各等分

診  
瘡  
瘡  
瘡  
得  
以  
而  
活

右為未滴水丸粟粒大每服三五十九量虛實加減

右錢氏云有大勢利小便不羨者宜以下之是也

子和近年予之庄鄰于蔡河往來之舟常艤於此一日舟  
師偶見敗蒲一束流墜而下斬治舟次似笑啼聲而微  
舟師疑其喜人也揆而開出視之鷺見一兒四五歲許瘡  
庖周匝密不容隙又目眩然飢而索食目以粥飽其舟  
師之要怒曰自家兒女之羞瘡庖傳染乃私料此兒片  
蔡河未其流後必不遠時見一鞋逆流而上而何皆曰  
無此兒行且二十里至一村落舟師高料曰有兒年狀  
如許不知雞氏瘡庖病死矣之阿中今復若是開厝即  
中飲者詳道有人出曰我某村某人也見四五歲死於

中飲者詳讀有人出曰我某村某人也見四十五歲死於

瘡疤舟師出其鞋以示之其父泣曰真吾兒也奪走未

視驚見兒活大慟流涕拜謝舟師喜抱兒歸年二十余

歲矣此兒本死得水而生伏念未者瘡疤之疾寒耶熱

痘寒熱

虛

執

舟治陳卜妹出痘血氣大虛而寒熱交作大渴者痘觀

湯大和散治瘡痘後寒熱往來嗜臥煩悶燥亂

生地黃 當歸 地骨皮 人參 甘草炙

白芍藥 各等分

右攻咀每服一分水半盞煎至三分去滓溫服

痘渴

舟陳卜妹年二十歲出痘而有孕七个月大渴不甚出秀

虛

寒熱交作

虛

人參五分

白朮五分

芪五分

陳皮五分

炙甘草二

歸身一分

薑片

酒水各半煎

唐執

治瘡癩大腸閉澁或發渴四君子加瓜蒌根桔梗主之

陳身熱小渴者六味人參麥門冬散治之如不愈七味人

參白朮散身熱大渴者七味人參白朮散治之如不愈

十一味木香散

六味人參麥門冬散

麥門冬

去心

人參

甘草炙

陳皮

白朮

厚朴

姜制各半兩

右吹咀每服三升水一盞煎至六分去滓溫服

面赤煩燥大  
小便為熱

面白腹瀉且  
指冷為寒

右吹咀每服三匙水一盞黃至六分去滓溫服人減

七味人參散白朮見消渴門已也四方

丹溪云初起煩燥狂渴引飲者急以涼藥解其標益

元散可用

錢氏云身熱煩渴腹滿喘大小便澀面赤悶亂大

吐此當刺小便不差者宜風散下之

陳文中木香散集驗方本治瘡癰身熱作渴方見寒

文中云腹脹渴者瀉渴者足指冷渴者驚悸渴者身

溫渴者身熱面眊白色渴者寒戰渴者不止氣急咬

牙渴者飲水轉渴不已者已上九証即非熱也乃津

液少脾胃肌肉虛故也宜木香散治之如不愈更加

虛

身熱脈洪  
數為執

丁香官桂

此說必加審用之脹渴者不可不察

痘渴

丹陳牙兒十九歲出痘有紅班肚泄而渴

蒼朮五分 白朮三分 薑一分半 陳皮五分 茯苓五分

炙甘草 生薑 燭砂各半 煨參半

從子六七歲時患痘瘡發熱微渴自利一小方脈視之用  
木香散每帖又增丁香十之予切疑焉觀其出遲固目  
自利而氣弱察其所下皆臭滯陳積因腸胃熱蒸而下  
也恐非有寒而虛遂急止之已投一帖矣雖以黃連解  
毒湯加白朮與十帖以解丁香之熱利止瘡亦出其後  
肌常有微熱而手足生癰瘡與涼劑調補踰月而愈

從而達之

是冷脈虛  
遲為寒

一男子十余歲出痘熱時出却脚密嘔吐不食腰肩

骨節痛大渴候亦痛全不食者半月餘脈厚弦

洪而數與參芪歸朮炙甘草陳皮並服之至

五日色淡又加桂些少歸芪再用以制至七日瘧甚

粒附子些少瘧止豆八九日濁大作而腹泄瀉

瘧甚至半寒戰為居民歸陳莖冬甘冬為

臣至十一日不厭或譏語但守後自

吐出痰多而安

陳文中木香散出疹痘腹腹獨瀉其効如神必領審察的

休用四肢不甚熱或後寒或嘔吐腹集驗

木香 大伏皮 人參 桂 赤茯苓

江圖

兼不起紅  
活為氣新  
但虛

虛寒

青皮 去白 前胡 去芦 呵子皮 半夏 丁香

炙甘草 冬冬冬

右吹咀每服二升水小盞姜三片煎空心服

異攻散集驗方治瘡瘡頭溫足冷腹脹瀉渴方見瘡出

瀉之去吐瀉胃丸食為寒虛異及散  
減官桂主之出証瀉渴不可吃密水

瘡出之間不光澤不起皮据寒不紅或瀉渴或腹脹

或氣促是謂表裏俱虛與異攻散送下七味肉苁蓉

凡治之異及散方見

瘡瀉不渴

海瘡瘡不渴藏寒下利四君子加干姜減半主之

湯治瘡瘡大便不通瘡斷黑隔異兒乳母同服

浙

人參 白茯苓 肉桂 黃芪 各半兩

陽明瘡疹大便不通瘡漸黑瀉是兒乳母同服

人參 白茯苓 肉苳蔻 黃芪 各半兩

炙甘草 家

右咬咀每服一升水半盞姜五片棗一個煎至三升

乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用脰

陳豆蔻治疹瘡泄瀉

木香 砂仁 白龍骨 訶子肉 肉豆蔻各半兩

赤石脂 白礬 各七升半

右末糊丸黍米大一歲三五十九三歲百丸溫米飲

下瀉止住服此方大秘不可妄用

瘡吐逆

世瘡瘡吐逆無痰益黃散有痰二陳湯或搗皮半夏湯不

寒疾 寒執

腹滿小溲為  
實熱

虛

止者加丁香若吐而瀉者亦宜益黃散及陳氏木香  
散異攻散

吐而身熱煩渴腹喘喘大小溲而赤者當利小便  
不差者宜風散下之

痘腹脹

丹魁奴豆後渴肚急小便少發熱

芍藥半分

芎三分

白朮半分

陳皮三分

炙芎三分

炙甘一分半

木通二分

寄子五歲莖後肚急

白朮一分

陳皮

木通半分

犀角

川芎

蘇梗

白芷

炙甘三分

寒熱

喘急冷為寒  
喘大小為熱

寒

熱

陳文中木香散治痘瘡腹脹渴瀉方見痘

腹滿而喘大小便澀身熱面赤阿亂大吐者當利小便不差者

痘腹痛

痘腹痛多是痘毒當隨証消息

丹吳店豆疹腹痛

丁香三个 桂一糸 芍一糸 白木半糸 歸半糸

作一帖

嘗治痘始出腹痛或身痛脈洪數者解毒涼藥加芍

藥甘草漸安

痘喘

表

推

痘喘

世瘡痘出後喘急痰盛宜杏甘湯人參清葛湯

杏甘湯治瘡痘煩喘渴燥

麻黃 桑白皮 杏仁 甘草

右等分為粗末每三升重水一盞煎食後服

海瘡疹肺不利紫草茸甘草枳殼湯

陳人參清葛飲

人參 柴胡 當歸 芍藥 知母

桑白皮 白朮 黃芪 紫苑 地骨皮

茯苓 冬草 甘草 桔梗 各一兩 黃芩 半兩 石膏

活石 各一兩半

右吹咀每服三升水一盞薑三片煎至六分溫服不拘時

寒

寒

右咳咀每服三升水一盞姜三片煎至六分温服不拘時

地黃散治瘡瘰身熱口乾咳嗽心煩

生地黃半升麥門冬去心杏仁去皮尖欵花三升

陳皮三升甘少二升半

右咳咀每服三升水煎温服

痰實壯熱胸中壅阿則喘急全胡枳壳湯主之

全胡枳壳赤茯苓甘少各大黃

右咳咀每服三升水一盞煎至六分旋服

喘而腹滿大小滿者利小便不差者宣風散下之錢氏

瘰出之間或氣促者木香散主之

瘰大便秘

海藏治瘡疹已出未出大腸閉臨戒時發渴四君子

加瓜蒌根

當歸丸

當歸半斤

甘草一分

黃連

大黃各二斤半

右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸加服之以利

為度

海藏素變百祥丸治癰瘡大便秘脂

紅牙大戟去骨一枚

青州棗去皮三十个

右用水一椀同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙

于可和作劑旋丸

至多以利為度

后先心散治瘡癰大熱大小不利狂語多渴

凡心散片瘡瘡火熱大小不利狂語多渴

大黃 甘少 當歸 荆芥 麻黃 去節

白木 芍藥 等分

右粗末量病輕重多少生薑薄荷並溫服則平執一服

則瘡

雜方

陳四五月不大便者可用肥嫩猪脂一塊淡白水煮熟切  
如豆大與見食之令臍府滋潤使瘡痂易落百無得滯

瘡餘毒

診治

海癰疹餘毒或財虛入眼目或肺虛為癰疥或為癰瘡及  
在骨節腎之虛也或在肌肉脾之虛也或在筋或在頭  
面或牙齦甘觸或咽喉腫痛各隨本徑而見皆毒不掣  
蘊積而成或病人始不早治或醫者失時遺於後其所以

由来盖有自矣

世痘毒攻脾则泄瀉身浮攻肝则眼生翳膜攻心则烦燥

啼哭攻腎则耳疼膿聚攻肺则咳嗽痰涎

丹垣兒豆瘡餘毒未散食粟太早補住主母氣

粘子 二分 枳壳 二分 甘草 半份 犀角 二分 京芥 五分

防风 五分 木 三分

痘八月

丹如痘傷眼必用山梔决明赤芍藥犀角連翹防风外梗

小香末之調服加眼無光过百日後氣血復又可明

張炳治瘡疹後毒氣攻眼或生翳膜赤脉之類宜用四物

湯加京芥防风煎服並用黑豆皮殼精草海蛤粉甘草

大法  
丹溪法

等分為末用熟猪肝切片蘸服神效  
用一江  
西  
痘  
疹  
粉  
甘  
草

錢氏法

等分皮甘草蜜蒙花等為末用熟猪肝切片蘸服神妙用江西蛤粉黑豆

皮甘草蜜蒙花等

丹豆後生翳數服效趙侍郎家施與威靈仙仙灵脾等分

淨洗不見火與日細末每服隨宜第三次末甘下

錢黃柏膏痘初出塗面護眼方見痘大法

調肝散治瘡疹大盛服之不入眼方見瘡毒

羊肝散即蜜蒙散方見活人錄

蟬蛻散治癰瘡入眼羊年已衰者一月即効

猪懸蹄甲

二兩入歡子內

蟬壳

去土取末一兩

右二味研入羚羊角細末一公拌勻每服一字百日

外兒羊角三

溫水或新水調下日三四夜

一二食後一年已上者難治

治瘡疹入眼

馬尾草

羊兩

臭角子

十五个

蛇皮羊兩

右入小瓶子內盛泥固濟燒存性研細溫酒調下一

二外食後

治瘡疹入眼成翳

瓜蒞根羊兩

蛇皮二外

右為末用羊肝一个批開入藥末二外麻纏定米泔

煮熟類與食之未飽食肝乳母多食之

又方蟬蛻末用水煮羊肝湯調服二三外

海地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤脈或白膜偏

睛四邊散陽者猶易治若黑遮黑睛者多致失明且速

睛四边散漫者，猶易治。若黑遮黑睛者，多致失明。宜速用此方，亦治瘡疹入眼。

熟地黃 一分 當歸 一分 黃連 一分 大黃 炒 一分

生地黃 去土 木通 一分半 防風 去芦 羌活

生康朮 蝉壳 去土 木賊 穀精草

白茯苓 沙苑 蒺藜 已上各一分 甘草 一分半 炙

玄參 半斤

右為末，每服一字，或半小量，大小加減。煎半肝湯食。

後調下，日三夜一。為折，將息亦治大人。

恒治 癰疽熱毒翳膜氣暈遮睛，以瀉青丸瀉之。大効。初覺

易治

雲岐子曰：竹葉湯和砂糖水化下。瀉青丸一二丸，漸至微利，神効。

東垣法

活癰入眼用決明散雲密蒙花通聖鈴散之類然無出此

海藏云莫若病時隨經而取不使毒氣傳入  
眼中為尤妙然眼有五輪亦宜辨責此言決明散者誤也

決明散治瘡痘疹入眼海藏云此少陽太陰之藥劑

決明子 瓜蒌根半兩 赤芍一分 炙甘草一分

右細末入射香少許令勻每服二分生米泔調下臨卧

撥雲散治瘡痘入眼及生翳

柴蠟蛸 真者一兩炙令焦細研

右搗為末入射香少許每服二分米泔調下

蜜蒙花散瀆小兒痘瘡入眼及無辜氣入眼

蜜蒙花 三兩 青箱子 決胡子 車前子各一兩

右為末各別收之每服蜜蒙花末二分餘藥各一分

詳白同羊肝一大片 批榜上濕 帝畏 環狀量多

右為末各別收之每服蜜蒙花末三升餘甘果各一升

特勻同羊肝一大片 批榜上濕帛裏煨熟量多

少空心服之 錢氏海藏各羊肝散

通聖散治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花

之如無不甘菊  
然不如此白菊

菜豆皮

穀精草一各  
西

右為細末每服一大分干書珙一个生粟米廿一錢共

一處煎候末汁

干柿去核

之不拘時候一

月可吃三枚日淺者五七日有効遠者

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草

蛤粉冬等

右為細末每服一分七猪肝一兩許批開榜藥捲了

青竹葉麻縷纏定水一碗煮令熟入收口在瓶裏熏

針灸

表

眼淚溫眇食之日作不過十日退

明堂癰瘰入眼

大抒一吐

痘咽痛

如聖餅子口見瘡疹毒攻咽喉腫痛便毒連云經也節

牛蒡

甘草生一兩

麥門冬

桔梗一兩

右為末竹葉同煎細服眼喉癰毒子門湯

鼠胎子湯

錢消毒飲二方至見已頭癰瘰瘻各

雲蚊小兒癰出欲透皮膚身熱咽嗑不利甘草桔梗升麻湯

甘草半兩

梧梗一兩

升麻半兩

右劉細每服二...

白<sup>拖</sup>  
拖

右劉細每服二升水煎

錢甘露飲子治心熱咽痛口舌生瘡并瘡疥已潰未潰並

可服之治熱氣上攻牙齦腫齒動搖

生地黄 熟地黄 天門冬去心 麥門冬去心

枇杷葉去毛 枳壳去穢 書黃芩去心 石斛去苗

甘草制砂 山茱萸葉

右冬等分為粗末每服二升水一盞食後溫服牙齒

則含嗽并服海歲云甘露飲為血利

田氏地黄丸治小兒瘡疥口瘡咽喉腫痛牙疳臭

天門冬 麥門冬 玄參 各三兩 甘草

薄荷葉 各一兩

虛實  
補中有通

右為末熬生地黃汁和丸櫻桃大每服一丸溫蜜水  
化服

瘧風

丹瘧風今氣血虛實以日子守之多帶氣血不

虛則黃芪生血之劑助之各佐以風藥

實則白芍藥黃苓為君連翹白芷續斷之類為佐

楊宅小娘年十余豆蔻不透掩露後骨節痛食少夜間

或熱此餘毒在內虛甚難於疎導須在補中有通此

方主之

歸一糸

白朮一糸

犀角二分

陳皮一糸

通草三分

炙甘二分

牛膝半糸

蘇梗三分

姜三片

男子七歲豆瘡初出不透毒氣攻內骨節作痛兩足不

可直癩痕欠

而利小便赤少

歸身

白朮

陳皮

木通

犀角屑

人參

茯苓

炙甘草

分二帖

痘癩搗

錢瘡疹由內相勝也惟班疹能作搗疹為脾所生脾虛而

肝旺乘之木未勝土熱氣相擊動於心神心喜為熱神

氣不固搗成癩癩子為心所生心生熱熱則生熱

風屬於肝二藏相搏風火相爭故發搗也治之當瀉心

冷火  
痘不若搗  
癩疹若搗

肝補其母瓜蒌湯主之

海藏云諸痛瘵皆屬於心火無論虛實皆從心火上說脾虛

則肝氣乘之與心火相合故用瓜蒌湯若脾土實火旺則肝氣乘之與心火相合故用瓜蒌湯若脾土實火旺

瓜蒌湯方見驚風

潔古云未出而搐者是外感風寒之邪內蓄心

熱之所作也嘗用蘇粉下解毒丸厚用地黃湯主

世瘡疹欲出身熱煩燥忽發驚搐宜驅風膏小如聖飲

小便不通八正散延盛利驚丸抱龍丸

丹欲發瘡疹先身熱驚跳搐搦此非驚風宜發散藥

世麻豆風搐方

身熱驚跳宜發散

人參 羌活 防風 姜蚕 醋炒

南星 姜制 白附 姜制 甘草 炙

人參 羌活 防風 長春 醋炒

南星 姜制 白附 姜制 甘草 炙

右等今生姜三片水煎服其搗立定

錢惟癩疹病後或發癩餘瘡雜發癩矣木勝脾木歸心故

也若涼驚用涼驚丸溫驚用粉紅丸 即溫驚丸

瘡瘡痛

書

活活血散治瘡瘡痛用溫熟水調下 方見瘡出不狀

海治瘡出煩疼五物木香散

青木香 二兩 丁香 一兩 重陸香 一兩 射香 二分

白兀 一兩

每服四錢小一小盞半煎服 劫 盛者加犀角一兩無

則以升麻代之輕者大劫

癩疹後發

活活血氣

又塗瘡上以芒硝和猪膽塗令動痂落無痂仍用黃土  
 抹之良此病小便澁有血者中壞瘡皆黑腐不出膿  
 死不瘳

世痘將結屬乾硬而痛宜駝酥潤之屬可揭去則去之如  
 云能酥用猪油或代之此痛非服藥可免也

痘膿而不痂痂居牙切  
 瘡腐曰痂

海歲症疹膿而不焦此未以失清涼之氣有如五穀得陽

氣而成熟非而不能實也天地嚴肅之氣一加

則萬物秀而實矣斑疹何異夫此共而清涼之

或下而成大肅之氣則瘡氣必不至於膿而不痂矣要

當知不盡而疾作蓋出於此當是清涼飲非陽

初則苗而不秀非肅殺則秀

劉涓子論云痘

和則苗而不秀作爾殺則秀

劉涓子訣云痘

發如膿窠不肯靨者但調砂糖水与吃劉提点云亦曾

試但後來結癩痕

錢氏去五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦

痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之必自痂矣

陳痘已靨未愈之間忽被風邪搏之成疔蝕瘡宜雄黃散

綿繭散治之又不愈清骨傷筋殺人

雄黃散治小兒牙齦生疔蝕瘡

雄黃 一分

銅礬 二分

右二味同研極細每用量瘡大小千帖

綿繭散治小兒身體及肢節上生疔蝕瘡膿水不絕

出蛾綿繭

石用生白皂槌碎入繭內令滿以炭火燒令白丸汁  
尽凡出研細每用乾糝貼瘡口上

錢凡痘瘡才欲有痂即用酥或面油不住潤之可揭若不  
潤及遲揭瘡痂硬即成痂痕

陳痘痂雖落其痂猶黯或凹凸肉起當用滅痂藥塗之

黏粉一五 輕粉一字

右研細入煉了猪脂油拌和如膏塗痂上

痘後瘡癢

丹連翹飲治小兒瘡癢痘疹餘毒作楚或生於頭面耳疼

顏赤生瘡

抵毒

連翹

黃芩

瞿麥

木通

滑石

連翹

黃芩

瞿麥

木通

滑石

柴胡

荆芥

牛蒡子

防風

羌活

甘草

赤芍

右手分每服三分小一蓋並至半蓋更又生薄荷炒

痘癰

實毒氣

丹痘癰多是實毒血熱成癰分上下用藥一日不可緩成

膿必用潰涼血為主上引用赤芍藥甘草節連翹桔梗

下引用升葛根柳牛膝物以貝母忍冬草香芷瓜蒂大

便燥用火黃菔寒熱用芥柏丹溪此法累效

保木香散治小兒斑後生癰如神

地骨 一兩

木香 半兩

穿山甲

交羊炙黃

射 一字

雜方

右末米飲下三分

丹痘癰付藥用貝母南星姜蚕天花粉寒小石多白芷草  
烏大黃猪牙

調付患受

中惠

湯小兒神守則強邪不干正若真氣衰弱則鬼毒惡氣中  
之其狀卒然心腹刺痛胸亂欲死是凡中惡腹大而滿  
診其脈緊細而微者生緊大而浮者死即服蘇合香丸  
未醒再以皂角末搗鼻吹服藥沉香降氣湯加入參苓  
苓又且辟邪膏密忤亦宜服

降真香

白膠香

沉香

虎脰骨

鬼臼

草龍膽

人參

茯苓

各半兩

右末次入桂黃半兩射香一各煉蜜丸乳香湯化及

中暑

針灸

右末次入椎黃半兩射香一各煉蜜丸乳香湯化及  
令兒帶佩及燒卧内妙

廣利治中暑客忤睡死射香一各重研和醋二合服之

海危腦膏治小兒伏地在地冒昧不知人

方見瘧黑隔  
門即活人方

湯凡中暑悶倒急扶在陰涼處切忌与冷得冷即死當用

布蘸湯熨脐腹間暖即差如無湯即相地土於脐上仍

撒小窩子尿於中可湯熨之良久嚼大姜一塊以水燕

下續用鮮暑藥

甲小兒口中暈自死胸脇滿勞宮主之

客忤

湯客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或未經識見之

人觸之或經歷神廟佛寺与鬼神气相忤也故謂之  
客忤亦名中客又名中風其状吐下青黄赤白色水  
穀鮮雜腹痛反倒面变其土色其状似痲但目不止  
揺耳視其脉数者是也宜服蘇合香丸并真珠散

真珠散治客忤驚風鬼座驚邪痰熱心舍不寧精神不  
定心常怔忡睡卧驚跳或時咬牙也心煩熱有汗並  
啼面赤舌白呵欠煩渴小便赤澁或吐利黃沫常服  
辟驚邪安神舍

真珠末 海螵蛸 滑石各一各 白茯苓 人各

白附子 甘少矣 全蝎 腦子 射香 別研各

生珠 一各另研 金銀箔 共五片 金三 良二

右末和勻半匙並灯心麥門冬湯入審少許調服每  
日午臨卧服

田氏客忤曰而驚忤者治法用竈中黃土二兩研鷄子一  
枚去壳二件相和入少許水調先以桃柳湯浴兒後將

此藥塗五心及頂門上

陳無梓法用灶中黃土  
此藥塗之

外臺治卒寒忤停口不能言細辛桂心等分納口中

浙江

醫學綱目卷之三十七終

此書之序... 凡醫家... 必資... 博考... 詳論... 其... 旨... 深... 遠... 矣... 夫... 醫... 道... 之... 大... 矣... 非... 博... 考... 詳... 論... 不... 可... 及... 矣... 故... 今... 特... 將... 此... 書... 之... 序... 刊... 布... 於... 世... 俾... 後... 學... 有... 所... 稽... 焉... 此... 序... 之... 始... 也... 夫... 醫... 道... 之... 大... 矣... 非... 博... 考... 詳... 論... 不... 可... 及... 矣... 故... 今... 特... 將... 此... 書... 之... 序... 刊... 布... 於... 世... 俾... 後... 學... 有... 所... 稽... 焉... 此... 序... 之... 始... 也...

浙 江 圖 書 館

此書之序... 凡醫家... 必資... 博考... 詳論... 其... 旨... 深... 遠... 矣... 夫... 醫... 道... 之... 大... 矣... 非... 博... 考... 詳... 論... 不... 可... 及... 矣... 故... 今... 特... 將... 此... 書... 之... 序... 刊... 布... 於... 世... 俾... 後... 學... 有... 所... 稽... 焉... 此... 序... 之... 始... 也...

醫學綱目卷之三十六

小兒部

脾主濕 吐瀉

吐

泄瀉

乳食不化

腹脹

丁奚即脹

水腫

虛羸

鶴節

書宿食

痞

哺露

癖

圖

脾弱多困

渴

大小便秘

黃

腹痛

穉口

口瘡

見心主熱門

口噤

滯頤

撮口

濕痰

世仁附丸治小兒欬嗽有痰感冒發熱吐瀉心神不安效神

南星 二升

半夏 一升

白附子 一升

白礬 一升

右為細末姜汁打糊丸梧子大一歲兒八九丸薄荷湯



夏秋治裏

化下

南星半夏用冬藏雪水於六月六日浸起晒干又浸晒丸九次方用

吐瀉

錢初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白

色是傷食當下

和胃下用白餅子和胃益黃散主之

初生三日已上至十日吐瀉身溫涼。不思乳食大便

青白色乳食不下乃上實下虛也更有薰見証。肺睡

露睛喘氣。心驚悸飲水。脾困倦

呵欠頓

悶。腎不語畏明。當瀉一作見兒薰藏補脾益黃散

主之病於秋夏也

五月二十五日已後吐瀉身壯熱也小兒藏府中十分

中九分熱也或

乳食吐乳不消瀉深黃色玉露

五月身熱瀉

黃丸分下分

補

中九分也成  
乳食吐乳不消瀉深黃色玉露

散主之

玉露散一名甘露散

寒水石

半斤 軟而微青黑 中有細紋者是

甘草

生一分

石膏

半斤 方解石伐之堅白似石膏敲之段皆方是

右用為末每服一字或半分一食後溫湯調下海

歲云非腎熱相火火盛不宜服

六月身溫瀉  
黃吳冬下  
分補

六月十五日已後吐瀉身溫似熱歲府六分熱四分冷

也吐瀉乳食不消瀉黃白色侶渴或食乳或不食乳食

前少服益黃散食後多服玉露散

廣親北宅四大王宮五太尉病吐瀉不止米穀不化眾

聖用補藥言用姜汁調服之六月中服溫藥一日而加

喘吐不定錢曰當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內  
必同石膏湯三服并服之衆鑿皆言吐瀉多而米穀又  
不化當補脾何以用涼藥王信衆鑿又用補脾散丁香  
散<sup>三服</sup>後至曰不可服此三書外必腹滿身熱飲水吐逆  
三日外一如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而  
令引飲熱傷脾胃即大吐瀉也鑿又行溫藥即上焦亦  
熱故喘而引飲三日當死衆鑿不能治復召錢至宮中  
見有執証以白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥  
二分二日三日又與白虎湯各二服四日用石膏湯一  
服旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂為  
衣與五丸竹葉湯化下熱退而安

七月身涼溫  
三分七分補

七月七日已後吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食  
乳多似睡肉亂硬氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便  
不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月其症全不食而  
昏既覺而肉亂噦氣干嘔大便或有或無不渴衆醫  
作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史君子丸  
補脾退熱石膏湯次日又以水銀硫黃二物末以生姜  
汁水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分下而一分補  
八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉暨妄治之至  
於虛損下之即死當即補脾若以史君子丸即緩錢又  
留溫胃益脾藥治之暨者李生曰何食而噦錢曰脾虛

一月身冷瀉者  
一分下九分補  
下後不食頂  
証用藥

津少即嘔逆曰何瀉青褐水

曰腸胃至虛冷極故也錢治而愈

八月十五日已後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾熾瀉青  
褐水當補脾益黃散主之不可下也

田凡小兒感暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐亡津  
必渴用玉露散 時、與啜之過三日不食

如身熱脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之  
如身涼脈細小便清早晨益黃散午後玉露散

如過四五日困弱宜異攻散和中丸開胃丸

潔如有風而瀉防風羌活  
謂吐瀉煎肝病  
風搖拘急也

有批而瀉黃連黃芩六苓大黃  
病身熱也

冬春治表  
身温馬黃白咳  
嗽先表後補

有熱而瀉黃連黃芩大黃謂吐瀉蕪心

有寒而瀉用附子吐瀉蕪腎病身冷

有濕而瀉白朮茯苓吐瀉蕪本藏脾

有肺而瀉芍藥桂枝喘荆芥人參甚者加枳榔大便不

通加大黃吐瀉蕪肺

更詳看病新舊新則止之久則有腸風之患宜推陳致新

法當宣風導過以用入藏君臣藥調之益黃散

錢傷風吐瀉身温。乍涼乍熱睡多氣粗大便黃白色嘔

吐乳食不消時咳嗽更有五藏蕪見証當益入藏君臣

藥先大青膏後益黃散如先曾下或蕪下証慎不可下

此乃脾肺受寒不能入脾潔古云身温吐瀉咳嗽是

如右風而瀉仿風羌活  
風掃蕪急也

身熱而黃而渴先止渴後表

身涼瀉青不渴先補後表

失表不詳

弱法當益  
檳榔 豆蔻湯  
下大青膏及服益黃散

傷風吐瀉身熱。多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃

水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止

後用散散藥止渴多服白朮散散大青膏主之紫古

瀉身熱而渴小便少者五苓散主之身熱而嘔者當服白朮散後益檳榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身涼。吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出

氣睡露睛此傷風桂萹輕怯目成吐瀉當補脾後散

補脾益黃散散大青膏主之此二証多病於春冬也

潔古云身涼吐瀉不渴者則知身寒益附子桂枝湯下大青膏

又小兒傷於風冷病吐瀉豎謂脾虛以溫補之不已復

以涼藥治之又不能散謂之本傷風豎亂攻之曰脾氣

即屋內不能散外不能解至十餘日其証多變

以涼藥治之又不能散謂之本傷陰豎孔收之自脾氣

即虛內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身  
温風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風、退則  
利止宣風散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐利  
久不差者脾虛生風而成慢驚

海吐瀉過多脾胃虛之欲生風候者四君子加白附子減

羊生薑煎服

錢玉露散 方見  
囊條

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛

人參 茯苓 白朮 甘草 干葛

黃芪 炙 白扁豆 炒 藿香葉 各等分

右為末每服三升水一盞半棗二枚去核生薑五片

寒吐  
身熱瀉黃多  
渴為熱

薑八分食前温服

海藏云和中散四君子湯加減法

丹周歲小兒吐乳腹瀉

活石煨三分 白木炒三分 葛一分 陳皮一分 炙甘三分

作細末飲之

右吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治之在夏秋用

玉露散兼益黃 春用白木散間大青膏也

丹萬安膏方見吐門

海吐利四肢厥逆腦門低陷 四君子加藿香丁香芍藥等

分薑服

錢益黃散方見小兒大法。治身冷吐瀉青白不渴

世和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

肢冷瀉者不渴為寒

丁香 白木各一分 半夏 藿香 蠟尾各一分

世和胃丸治吐瀉不止故生慢驚

丁香 白朮各一兩 半夏 藿香 蝎尾各一兩

為末姜汁打糊為丸如小豆大三歲兒三十丸姜湯下

開理中丸治吐利不歇米穀不化手足厥冷 方見傷寒

金液丹治吐利日久脾虛損手足厥逆精神昏睡寒多

睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風者又治大人陽虛陰盛

身冷脈微自汗吐利小便不禁

船上硫黃 十斤先瓦煉去砂石秤研為末用砂合

子威令八分 湍水 和赤石脂封縫 鹽泥

固濟晒干露地先埋一水罐水盛水湍坐合子在

右以柳木樵乳鉢內研為細末每服二分生薑米飲

調下多服取効大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水

餅和丸梧子大晒干每服五十丸至百丸米飲下空  
心連并服

右閻氏云吐瀉虛極當速主胃氣宜與理中丸并  
研金液丹末薑生薑米飲調灌之惟多服乃効候  
胃氣已生手足漸暖然猶痠瘳即減金液丹一二  
分增青州白丸子一二分同研如上服兼用異改  
散羌活膏温白丸釣藤飲子之類仍頻與粥雖至  
危者往死中得生十救八九沈存中論金液丹  
親見小兒吐利劇氣已絕服之後活者數人須多服  
方驗

錢豆蔻散治吐瀉煩渴腹脹小便少

身温瀉黃白似  
易易二氏集

船上疏黃一分桂府滑石三分丁香

豆蔻

身温湯黃白似  
錢異攻散治吐瀉煩渴腹脹小便少

舟上疏黃一分 桂府滑石分三 丁香 豆蔻 各半分

為末每服一字至半分米飲調下無時 豆蔻散治虛寒而渴 白木散治虛熱而渴

右吐瀉身温瀉黃白似渴錢氏仲寒熱雜合病治在

夏秋用玉露益黃相间服在冬春用 黃大青膏相

間服也

錢異攻散温中和氣治吐瀉不思食丸小兒虛冷病先與

數服以正其氣

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮 各等分

為末每服二分水一盞生薑五片棗二枚同煎 海藏云四

君子湯補脾湯加減法

温中丸治小兒瀉白胃寒故也腹滿痛腸鳴吐酸水不

思飲食霍亂吐瀉

人參 去芦

甘草

白木 等分

右為末姜汁麵糊丸棗豆大飲下二三十丸無時

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

右胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治

法錢氏玉露

益元散是也

半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷疾

齊州半夏

一次子湯浸七切火焙

陳粟米

三分陳粳米六分得

右吹咀每服三匙水一大盞半生姜十片同煎至八

分食前溫熱服

世白附丸治吐瀉方見脾主濕

睡露睛為虛

熱

睡不露睛為

實熱

脾

寒痰

乳不化為傷

錢吐瀉乳不化為傷食也下之

乳不化為傷

食  
微則消積  
甚則下之

錢吐瀉乳不化傷食也下之

馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢氏曰目中黑睛少而白睛多面色晄白此子必多病面色晄白黑睛少腎虛也黑睛屬水本性而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不柰寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣淫慾若不保養不遏壯年面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也不可下、之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛此俱以消積丸磨之為微有食也如傷食甚則可下不下則成癖也實食在內乃可下之下必補脾必食隨其虛實無不効者

丹小兒吐瀉黃疸

三稜 莪朮 陳皮 青皮 神曲

麥芽 黃連 甘少 白朮 茯苓

為末調服傷乳食吐瀉如山查子時氣吐瀉加滑石

皆熱加薄荷

吐

丹萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃治小兒一切疾

木香 沉香 檀香 香附 檳榔

白朮 肉豆蔻 薄荷 人參 甘少

辰砂 琥珀 真珠 青代 犀角末

天竺黃 黃芪 射香 史君子

為末煉蜜丸臨卧服薄荷汁或蜜水米飲化下

丁香 干葛 半夏 煨薑 水

丁香 干葛各子

半夏次湯切焙

水銀各半

右上一味同為末，特水銀與藥研勻，生姜汁丸麻子

大每服一二丸，至五七丸，黃金銀湯下，無時

本事小兒嘔吐脈遲，細有寒，白朮散

白朮 人參各三 半夏曲各 茯苓 干姜

甘草各子

為末，每服二升水，一盞姜三片，棗一個，煎至七升去

滓，溫日二三服

湯小兒寒吐者，由乳母當風而涼，解脫致令風冷入令乳  
變敗，兒若飲之，故嘔吐也。乳母當食後，捏去旧宿敗  
乳，急服理中湯，次用釀乳法。其候是寒清，夾妨吐出，是

吐稠涎及脉数  
為批

也凡有此候脈藥不効胃氣將絕藥不能下當脈與砂  
如大便三兩通宜未復丹二藥常用驗

丹吐乳田中蛆刺矢研如泥食前未飲下半夏不過三升

次妙聖惠方

錢藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉過度者宜服

麥門冬 去心焙  
干研

半夏曲炒

甘草炙各半升

藿香一分用葉

石膏半升

右同為末每服半升至一升水一中盞煎七分食前

溫脈

本事 治小兒嘔吐脉數有熱麥門冬散

麥門冬

半夏曲

人參

茯苓各二分

甘草一分

麥門冬 半夏曲 人參 茯苓各一 甘草子

世又方萬安膏治小兒肝胃虛弱腹生疳疔疔食積世

馮常服消疳去積助胃氣和中疎氣滯

人參一兩 木香半兩 沉香半兩 藿香半兩

厚朴二兩 甘草半兩 陳皮一兩 青皮一兩

干姜炮一兩 桂一兩 夏角 史君子七 澤瀉冬不用春秋

右末煉蜜丸芡實大食前米飲化下如熱薄芎湯下

一方無木香沉香藿香青皮史君子有白木蒼木

茯苓猪苓

錢吐沫及痰或白絲水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱

久則虛吐痰涎冷者溫之

田朱况益治小兒嘔吐不止

寒熱 吐沫痰白絲 及脈遲為冷

朱砂水石 沉香 藿香 滑石羊叉 丁香十斤

為末每服半小用新汲水一盞芝麻油點成花子抄

藥在上頂 去水却用別水送下空心

定吐此金校治小兒一切嘔吐不止

半夏煨洗七 人參 白朮 木香 丁香

藿香

右六味各二分半為細末稀麵糊為丸李校大後用

沉香二分為末朱砂二分水石二味同研勻為衣蔭

干每服一丸用小棗一枚去核納藥在內濕布裹燒

熟嚙與小兒服後以米飲壓之

錢香銀丸治吐

右為末每服二分水一盞薑三片益子五分去滓溫

右為末每服二三次水一盞姜三片煎至五分去滓溫

服上二三

錢玉露散 方見吐瀉

湯治小兒伏暑嘔吐清葛飲子

香薷 淡竹葉 各五分 白茯苓 人參 半夏曲

檀香 甘草 炙各半及 白粳米

右吹咀姜葱溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小

便或赤而少乃 或乾嘔而無物宜香薷飲亦見中暑

本事治小兒疳積黃瘦吐食

川烏 豕 定粉 艾灰 豕 龍骨 豕

歲府 黃瘦為疳積

潮搗為風

右末瀉水為丸龍眼大核仰餅子每服一餅飲磨下  
錢鉄粉丸治延威潮搗吐逆

水銀砂子 朱砂 一分 鉄粉 一分 輕粉 家

天南星 一分炮去皮臍取末

右同研水銀星盡為度姜汁麩糊為丸粟米大生  
姜湯下十九至十五丸三二十九丸等時

結者散之

田朱况

紫金核二方見寒条

散者收之

經驗治小兒吐不定五倍子二个一生一熟甘草一握用  
濕布裹炮過同搗末每服半升調下半升七差

雜方

錢二氣散治虛寒冷泄霍乱吐逆

硫黃 半斤 煅石 半斤

水銀 一分

與硫黃 再研

錢二氣散治虛寒冷熱霍亂吐逆

硫黃 不夾石者  
半斤研細

水銀 一分與硫黃再研

同研如墨煤色不見星每服一字至半小生薑水  
調下不以時候量兒大小加減此散厚泛難仍死膈少  
水以指緩緩研之稍增湯使調之治大人小兒一  
切吐逆諸藥不効者

陽凡小兒乳哺不宜過飽滿而必溢故嘔吐

生下吐見胎病

明堂吐乳

中庭一吐

吐水吐舌

錢面皸白魚精先口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之

寒

禁忌  
生下吐  
針灸

於

脾

虛弱者補氣  
虛弱者補血

虛者有積者  
補後改

丹冬月吐純虫多是胃寒胃虛而虫作用錢氏白朮散加

丁香二粒

錢吐水不心痛者胃冷吐水心痛虫痛口中吐沫水

者後必虫痛

世瀉

丹萬安膏治吐瀉腹痛吐乳方見吐瀉

海世瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎

一法加陳皮姜棗

歲府瀉世四君子加何子半各米飲調下

錢黃承務子二歲病瀉衆醫工轉瀉十餘日其証便青白

乳食不消身涼加硬氣昏睡豎謂病困萬錢氏先以益

黃散三服補肺散三服三日身溫而不硬氣後以白餅

微下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷

黃散三服補肺散三服三日身溫而不瘦氣後以白解

子微下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷

食初 大下措置十日上實下虛脾氣弱引肺亦虛

補脾肺病退即身溫不硬 有所傷食仍下之也

何不先下後補曰便青為下感冷先下必大虛先

下之則不虛而後更補之也 益黃散方見  
小兒大法

溫中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴 方見吐瀉

丹瀉青丸亦是寒

蘇合香丸 平胃散 各等分

右用蜜丸服之

田便青曰驚冷內感脾氣不和治宜白朮湯

案凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散利病亦回

瀉者白為寒

白虛寒

青風寒

瀉黃赤星而瀉  
為執

瀉而痰脹為疴

診

虛實

丹小兒夏月泄瀉用益元散

瀉黃赤里皆熱益元散黃柏丸之類是也

錢史君子丸治疴瘦泄利腹脇脹滿方見疴

脈小兒大便赤澀強世脈小手足寒難已脈小手足溫易已

乳食不化

錢食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

繫食乳不消。初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤

精神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸

益黃散

若病泄瀉日久不差乳食不化是脾胃有風今先服益

黃散二服後用宣風散導之後便再補胃

黃散二服後用宣風散導之後便再補胃

### 赤白痢

丹小兒痢疾

黃連 黃芩 大黃 甘草

並服赤利加紅花桃仁白利加活石末

湯治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩雖取積又

胞治利萬無一失積以下急以四君子湯加豆蔻呵子

補之次常服厚腸香連丸此得利有準也

子母治小兒赤白痢多體弱不堪下大因重者麻子一合

炒令香熟為末服一外七密漿水和服立効

府瀉利日久不差見府門獨瀉不脹条

錢瀉黃 紅赤黑皆熱赤亦毒 瀉青白穀不化曾冷

虛實

治利先後補

弱不墜下者

滑之

府利久利

寒熱

白附子香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜瀉利赤  
白痢急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香各一分

白附子大二分

右末粟米飯丸黍豆大或黍米大每服十九至二三

十丸食前清米飲下日夜各四五服

豆蔻香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸

鳴切痛立効如

黃連三分炒肉豆蔻

南木香各一分

右末粟米飯丸米粒止大每服米飲下十九至三二

十丸日夜合

食前

田木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連 炒 木香 一分 炒 豆蔻 二分 木香 一分 炒

田本香丸治小兒世為青白膿血相雜

黃連

炒一兩後同去疑菜菜蔓

三菴

木香

一兩炒

右末 麩糊丸 黍米火亦痢 粟米飲下 白痢厚朴湯下

空心

錢小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香

呵子肉各一分

黃連半兩

右末米飲和丸 丸黍豆大末飲下十凡至三五

丸頻服之食前

黃者為執

海赤痢四君子加赤芍藥當歸等分入果末少許今煎

湯治熱病危急方

浙

用并花水調滕茶蜜磨生薑喝則飲之

錢黃柏丸治小兒熱痢下血

黃柏 去皮半兩

赤芍藥 四兩

右末飯和丸麻子大每服一二十丸食前米飲送下  
大者加數丸

本草治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服

聖惠方治小兒中蠱下血

地和衆方治小兒屎血甘草五分以水六合煎取二合去

滓一歲見一日服全盡

海白痢四君子等分加干姜減半入粟米少許同煎

廣利治小兒久痢瀝水穀不消枳實六分煨末以飲汁

調二升七二歲服一錢

丹小兒噤口痢釀乳法

釀乳 樽方

脾 宿食

青白為寒

厚朴

枳殼半斤

白朮

芍藥半兩

滑石一兩

木通

陳皮

甘草半斤

木通

陳皮二斤

甘草半斤

分四帖細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母飲

錢黃連例

要藥

黃連治疳

加黃柏為二聖丸治疳

加橘皮為橘連丸治疳

加榆仁為榆連丸治疳

加黃芩大黃為三黃丸

加阿膠茯苓為阿膠丸治疳

加訶子本香為小香連丸治疳

加豆蔻木香為豆蔻香連丸治疳

加木香白附子為白附子香連丸治疳

加阿膠當歸干姜為註車丸治疳

針灸

田氏小兒脈下喘瀉痢體重四肢不收疔癰積聚腹痛不嗜食痰瘡寒熱脾二穴在十一椎下又停相去各一

寸五分

明堂秋淫冷刺不止

脐下二三寸間動脈中二壯

利下赤白脫肛

十二椎下節間三壯

又法

翠尾骨上三寸骨陷間三壯如小麥大

又法

龜尾一壯脊端窮骨也

腹脹

腹脹虛實口凡久病土寫之後虛則其脈微細肺主目

錢氏家法

虛實法

胞及

脾主四支

若色笑

黃目

胞

胞

虛腫

手足

冷

合先

錢氏醫方 虛實法 凡火病土為之後虛則其肺微細肺主目

虛實法

脹目病後那

手足冷不喘者

虛寒

胞及脾主四支若色淡黃目胞腮虛腫手足冷合先

服塌氣丸後服異攻散和中丸四君子湯益黃散之類

諸溫藥其氣異攻散和中丸方見吐瀉

塌氣丸

胡椒五 稻尾平又 書

為末麵糊丸粟米大每服五七丸至一二十丸陳米

飲下無時一方有木香了又

本事治小兒久傷脾胃腹脹調中丸

干姜 橘紅 白朮 茯苓 木香

砂仁 官桂 良姜等分

右末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

服不曰病後則  
實有熱而喘為  
實熱

脹宜下忌下

喘滿者宜下

不喘滿忌下

脹目眩下致虛

未氣喘目腮腫

宜木香丁香等

散之

已氣喘目腮腫

宜搗氣丸漸消

之

紫實則脈洪實不曰吐瀉久病之後亦不曰痢下腹脹而

喘急胸亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹宜脹白

餅子大黃丸解毒丸下之並順許認大小便如却不通

先利小便後利大便白餅子方見癖解毒丸方見

雲岐小兒熱結於內腹脹吐熱大便赤黃燥煩向孔者瀉

青丸

錢腹脹由脾胃虛氣攻作也實者向孔滿喘可下之用此藥

霜丸白餅子此言未下而喘者為實故可下若慢下而

不喘者虛也不可下此言霜丸白餅子方見癖脹若慢下致脾虛氣

上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主

四支母氣虛甚即目胞腮腫也色黃者為脾也治之用

搗氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香搗丸

四支母氣虛甚即目胞腮腫也色黃者屬脾也治之用

脹端  
脹末下喘者  
為實  
已下而喘者  
為虛

塌氣丸漸消之未愈漸加丸數不可以丁香木香橘皮

豆蔻大溫散藥治之何以然脾虛氣未出腹脹而不喘

可以散藥治之使上下分消其氣則全也若虛氣已出

附肺而行即脾胃內塌弱每生虛氣入於四肢面目矣

小兒易於虛實脾虛不受寒溫脹寒則生冷脹溫則生

熱當識此勿悞也胃久虛熱多生疔病或引飲不止脾

虛不能勝腎隨肺之氣上行於四肢若水狀腎氣浸淫

於肺即大喘也當脹塌氣丸病愈後面未紅者虛未

復故也此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下之

治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之必

可獲寇若出林攻攻必有失當以意漸收之即

虛服用塌氣  
丸不全宜下

東垣丹虛

實法

腹如蜘蛛時

痛便濁為

疝脹

順也冠未出林謂虛氣未出而不喘不

已出林謂虛氣已出為喘為

治虛腹脹先服塌氣丸不全腹中有食積結糞小便黃

時微喘脈伏而實 水能食者可下之蓋脾初虛而

後結有積於治宜先補脾後下之下後又 即食也

補恐生虛喘

丹阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏研如尼

黃連半及炒

花減三及研如粉

查肉二及 連翹半及 半夏一及 皂角水浸一宿

右末炒神曲糊丸薑蘿子大每瓶二十九丸空心米飲

下吃果子多者加胡黃連米食多者加神曲肉多者

加阿魏

下吃果子多者加胡黃連米食多者加神曲內多者

加阿魏

又阿魏丸

阿魏 一丸

黃連 六丸 酒制

為末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不

小阿魏丸

查肉 三丸

石減 三丸 半夏 一丸

為主阿魏半丸醋浸如糊丸

小兒疳病或腹大

胡黃連

去暴子積

阿魏

去由積

神曲

去食積

黃連

去食積

射香 四粒

為末每十二立白木湯下

無擇小兒疳病者多目缺乳吃食太早所致或日久患藏  
府胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮墜皮執無精  
神肥兒丸主之

肥兒丸

黃連

神曲各二升

大麥五月煨

木香二升

檳榔

二升不見火

為末麵糊為丸如梧桐子大每服三二十九量兒減

數加減既水吞下

六神丸世如前証

可香

本香

白豆蔻

煨壳各半升用面裹同入

阿子

半升煨去核

史君子

差文會各一升細研入

阿子... 史... 各... 研入

丁亥即肝脹

異石

右末以膏肉和凡如麻子大每服五丸至七丸溫酒飲下乳食前服

湯丁亥者腹大頸小黃瘦是也若穀哺露三候大体相似

輕重立名宜服十全丹

十全丹治丁亥哺露神效方

核棉生

枳壳夫必

青皮

陳皮

三稜必

義木必

砂仁各半又

丁香一分

木香一分

香附二又

右末神曲末打糊丸黍米大空心食前米飲下百丸

世傳治小兒蜘蛛腹四支瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛

一枚於內以紙掩竅文武火煨熟去蜘蛛食其雞子

累効必效救

實者分氣  
消積

垣中端分消圓

黃連 去鬚

枳實

厚朴 各半

生薑

黃芩

猪苓

縮砂仁

澤瀉

茯苓 各三分

橘皮

白朮 各一分 半夏 四分

黃芩 二分

甘草 一分

右末 蒸餅為丸 每服三十丸 溫水送下

消積丸 快利

黃連 半斤

枳實 二分

黃芩 三分

甘草 二分

人參 三分

厚朴 七分

干生薑 四分

橘皮 一分

生薑 半斤

為末 蒸餅為丸 如黍米大 每服三十丸 隨氣下

丹腹脹

蘿蔔子

紫蘇梗

甘草

陳皮 各等分 甘草 減半

虛不大便者  
升陽潤血

瘦黃食者  
升陽消食

食減加白朮煎服

恒升陽滋血湯二月間小兒未滿百日病腹脹不大便一

日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便

蝟梢二分 麩末三分 厚朴 當歸各一分

桃仁十枚 升麻三分

都作一服水一盞煎至半盞去滓執服食前

麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月

僕散家小兒服之神效

麻黃二分 桂枝一分 杏仁 一个 吳茱萸 一个 草豆蔻 一个

厚朴一分 麩末一分 升麻根一分 柴胡根 半份 羌活 一分

白朮半份 青皮半份 蒼朮 一分 澤瀉 二分 白茯苓 一分

痘後者益胃

解毒

針灸

滯氣

猪苓一分 橘皮一分 黃連半外 黃柏一分

右以咀作一服水一大盞煎七分去滓熱服食前

丹寄子年五歲豆後肚急

白朮一分 陳皮半外 書木通半外 犀角屑 川芎

白芷 蘇梗 炙甘各三分

田治腹脹引背食飲多漸羸瘦黃可灸脾俞三穴七壯

在十一頓下兩傍相去各一寸五分黃疸者可灸三壯

甲小兒腹滿不能饑飲懸鍾主之

丁奚即脹 治見脹門

水腫

丹白舉 小兒五歲身面皆腫而少

帶氣  
舟白舉  
小兒  
五歲  
身面皆腫  
不引少

槐子炒  
辛皮炒各一分  
黃芩二分  
白朮  
蘇梗各一分

公三帖水一盞半煎至半盞

湯退腫散氣方

赤小豆  
陳皮  
蘿蔔子  
甘草炙  
木香炮

右味姜棗並去滓大小量加減通口服

又方

白朮炒  
木香炮  
甘草炙  
茴香炒

青皮各半兩已豆三十立之  
同青皮炒去已豆不用

右末半飲調下

又方

用錢氏益黃散去丁香加木香去呵子加蘿蔔子為

夫大小加減半飲調下

錢腫病腎熱傳於膀胱熱感逆於脾胃脾胃虛而不能制水

腎水反克土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也

若加喘者重也何以然腎水勝而克退脾土土勝心火

少人勝肺肺為心克故喘或問曰心刑肺肺本心虛

今何喘實曰此有二一者肺大喘此五藏逆二者腎水

氣上行傍侵於肺故令大喘此皆雜治

明堂水氣浮腫

分水三仕

府

潔疝者小兒疝瘕或久吐瀉鑿者妄投轉過之藥小兒

大法

針灸

廂在內脹

寫

易於虛實致之胃虛而亡其津液內黃虛熱外消肌肉

一啟虛則諸歲皆弱其病目胞腫後脹痢色無常漸如

瘦瘠久不痊可是腸胃有以積法當宣以散導之後各

依本歲補其母

錢諸病皆依本歲補其母及其治疳藥冷則木香丸熱則

胡黃連丸主之

疳在內目腫腹脹利色無常或赤或青白漸瘦弱此冷証也

史君子丸治歲府虛滑及疳瘦下利腹脇脹痛滿可思

乳食常服安虫補胃消疳肌肥

厚朴

去粗皮姜汁

史君子

去壳一兩麵不用切燥

陳皮

去白

甘少

訶子半兩半生

青黛 半兩如是蕙及帶熱滑即以此入時  
如只歲府不調不用此一吋也

石末煉蜜和丸如小雞頭大每服一丸米飲化下見  
生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元之無音

黛

恒厚腸丸治小兒失乳以食餉之未有食腸不能消化或

生腹脹四肢柴瘦 利色無常

陳皮三分 大麥蘆半分 半夏三分 枳實半分

蒼朮二分 青皮二分 人參二分 厚朴二分

麵末半分

右件細末水煮麵糊丸如麻子大每服二十九溫水

送下忌飽食

脾胃  
面白肢冷便  
清為寒痛  
曲腰干哭者  
內吊  
不思飲食者  
胃虛

吊小兒腹痛曲腰乾哭無泪面青白唇黑肢冷為盤腸內  
吊凡有此証急黃湯淋洗其腹揉其蕊熨臍腹間良  
久尿自桶中出其疼立止續次服藥

乳香

沒藥 冬少許透  
明者細研

右件木香一硯於乳鉢內磨水一分盞內滾數沸了

調乳沒末此藥只一服効

錢鈞藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名腸盤內吊

真乳香

水中坐乳  
鉢研細秤

沒藥 研

木香

姜黃 各累

木鱉子仁

二十个  
去外皮

折

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成

劑收之每一歲兒可服半皂子大餘以意加減

釣藤湯化下無時次用魏香散

魏香散

蓬莪朮半升

真阿魏半

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙干為細末  
每服一字或半小匙蘇米飲空心調下

無擇蒜元治冷瘡腹痛夜啼

大蒜

一顆煨火煨香  
研爛日中或大上焙半乾研切

乳香

半升另研

右研為丸如芥子大每服七立乳空時乳頭以乳汁

送下

前五方治寒腹痛屬盤腸內吊其候曲腰乾哭是也  
我胃冷虛面皸白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若不

後胃冷虛面皖白色腹痛不思食當補脾益黃散主之云不

服小柴陽甚者服承氣湯

潔不自病後身微黃者胃熱也瀉黃散

田氏小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如漬橘之黃白睛亦

然濕熱所致也宜加減瀉黃散主之

黃連

苜蓿各五分

黃柏

黃芩各四分

梔子

茯苓

澤瀉各三分

右以咀都作一服水一大盞煎至六分去滓稍熱服

食前

潔陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制

腎水常用益黃散下史君子丸

益黃散方見治法  
史君子丸方見疴

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散

陰黃清便自調散冷

雜方

針灸

診

平胃散方見世醫調中方見  
見腹痛人參白朮散方見

田氏丸裏生黃見胎驚條

明堂飲水不歇面黃

陽剝一吐

書

館

錢黃相似口身皮目皆黃者黃病也身痛

皆發大也便澁一  
身盡黃面目皆

爪背黃小便如屋塵色着物皆黃渴者難治此黃疸也

二証多病於大病後。別有一証不目病後身微黃者

胃熱也大人亦同又有面黃腹大食止渴者脾疴也又

有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者

是也若淡黃蒸白者胃怯胃不和也

腹痛

握宣丸治小兒大小便難嘔吐藥食不下命在頃刻

巴豆

一分半

礞石

良姜

附子

檳榔

甘遂

各等分

右為末粟米飯和丸茶豆大用井湯洗小兒男左女  
右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用即止  
錢郁李仁丸治襁褓小兒大小便不通并驚熱疾實欲得

澹動者

川文黃

一分去毒皮用實者剉碎  
酒浸半日炒干為細末

郁李仁

一分去皮

滑石

一分細研

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二  
歲服三二丸更量大小與之以乳汁薄苛湯下食前

寒執  
陽黃大小者  
澁身執面赤  
飲水

黃

潔陽黃則大小赤澁身執是脾土與心火相搏為陽病法

當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用首陳蒿湯調下五苓散若先利小

便去大黃若利大便加大黃之類有陽証可服謂

面赤飲水者是也

瘧病一身盡黃大小便澁首陳蒿湯調下五苓散

陽五苓散  
方見傷寒

陽身疼轉背強大小便澁

齒爪皆黃小便如麈色宣利者易治澁者難治宜服五

苓散加首陳蒿湯調又宜服導赤散加首陳蒿或身執宜

浙  
土

皮  
膚面目

苓散加首藤當歸調又宜脈導苓散加首藤當歸身批一宜

脾胃虛弱生風多困四君子加炒半夏麩沒石子等分

為末入冬瓜子少許同益

本事曰脾胃多困人參散入楊醬蒸用

人參 冬瓜人 各半兩 南星 一兩 薑汁切蒸存性

右細末每一分小半盞薑二三分溫服

渴

渴有三種

一者乘熱積於心脾胃煩躁大渴飲引白虎湯謂不自吐

渴大病忽然而作

二者因以病或取轉過度致脾胃虛引飲白木散

海藏治渴曰君子加于葛根把葉益藥湯者過等  
分炙干去毛入衣瓜以許同也亦治虛渴法也

執  
不自病後為  
實執  
日久病後為虛  
執

復利為

濕熱

雜方

三者曰患濕熱病熱結膠膜小便不利大渴引飲有表裏証五苓散

大小便不通

館

無擇小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先嗽口了吸啞兒前後心并臍下手是心去七塊無一慶凡三五次嗽。吸晒而紅亦為度頃更自通不痛無生竟有此証遇此方可謂再生

甲氏生下不大便治法先硬葱針任取門如大便不下後因牛黃散送朱砂丸一時自見

便難燥結兒或認藥腹脹悶亂命在頃刻可用握宣丸以男左女右手握之不移時大小便

驚癖

倭硫黃 三斤

右細末糊丸小豆大三歲兒十九日落山時米飲下

吃乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃膺

屎丸妙

錢紫霜丸

代赭石

研二斤

巴豆

以一個去油心皮膜

杏仁

廿一個去皮尖

右為末飯丸如菜菜粟米大每服三五丸至十丸

英子湯下無時海藏云五色加減並見后法

湯驚癖須用礞石藥方可服之

右七方治癖皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益

黃散之類重服之

針灸

虛

子母秘法小兒氣癱取三稜汁作羹粥以米麪為之其好  
 母食每日取一棗大與兒吃亦得作粥與癱熱食之治  
 小兒十歲已下及新生百日無間癩熱無辜癩癱等皆  
 理之妙不可言

田氏小兒癱氣久而不瘳者灸中腕一穴章門一穴在大  
 橫外直臍脇端側卧曲上足舉臂取之右中腕章門  
 各灸七壯臍後脊中灸二七壯取中腕從髑髀取病人  
 四指是穴灸之無不効

脾弱多困

海脾胃不和四君子加白朮一倍姜棗煎

脾困四君子加木香宿砂人參各半分煎

胃石

輕粉

半夏

湯浸

天南星

白朮

脾胃困四君子加木香宿砂八各半分

滑石

輕粉

半夏

湯浸七次焙干

天南星

各二分

巴豆

一二升<sup>十四</sup>者<sup>八</sup>去皮膜水

右研白巴豆後入衆藥以糯米飲為丸小菴豆大捏

作餅子三歲已上三五餅子以下一二餅子並蒼白

湯下臨卧

書

局方進食治乳食不化心胞脹滿有積肚疼

木香炮

枳壳炒白

當歸去芦

代赭石

朱砂

三分別研

巴豆

一分

射香

別研

右為末麪糊丸如黍米每歲一丸二丸以意加減米飲

送下

活双丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹滿或心腹疼

痛大小便不利或下重數起未差可再服

巴豆

六十個去皮心膜研細在  
白土油中安之自如雪

甘遂 羊而

麥門冬

湯洗去口  
三西半

甘草

一西一  
分

朱砂 一研

牡蠣 二西

雞核

研  
別研

右麥門冬甘草甘遂朱砂四味為細末入巴豆朱砂

麩仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸半歲

見如荏子大一雙一歲見服如半麻子大分為一雙

二歲服如麻子大一枚分為一雙三四歲者服如麻子

大二丸五六歲者服如麻子大三丸七八歲者如小

豆大二丸十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服如

至日出時不下者熱粥飲數合投之即下藥丸皆及

世也善利甚者服前冷粥飲數合即更上在子似紫

出也差利甚者濃煎冷粥數合即便止  
蘇子似葶

錢珠丸取小兒一切積聚驚涎宿食乳癖治大小泄瀉

療腹脹行滯氣

巴豆仁十四个浸 木香 白丁香 丁香各半

白滑石二斤 輕粉半斤 局少許 為衣

右為末研勻濕紙裹燒粟半飯丸麻子大一歲一丸

八九歲至十五歲服丸炮皂子煎湯放冷下挾冷

熱難動者先服涼藥一帖乳癖者減丸數服

本事治小兒食積氣溫氣面黃白多腫大便黃赤酸臭消積丸

砂仁三个 丁香九个 烏梅肉三个 巴豆二个 出油

右細末糊丸如黍米大三歲已上五六丸已下二

乳癖

三丸用溫水下。每時服。三丸。小兒身溫壯。非變蒸之候。大便白而酸臭。為胃有音。冷宜九葉消下。後服溫胃藥。若身溫壯。大便赤而酸臭。為胃有音熱。宜九葉下。後服涼胃藥。若不愈。

子和丁香化癖散治乳癖

白丁香 蜜陀僧 船 上 硫黃 已上各二分 硃砂 半分

輕粉少許

右研細末。每兒一歲服半。小兒男病。女乳。調女病。男乳。

調過。累屎為度。後用通草丸泄之。

世二十九。過治小兒乳癖。

白丁香 半兩 丁香 一兩 蜜陀僧 一兩 韶粉 一分

白丁香半兩  
丁香一兩  
蜜陀僧一兩  
蘇木一兩

雜方

虛實

視之和曰合服何物藥余答曰當服甘遂大黃張鷟駭  
曰以前諸醫皆用補助此女久不進食豈宜利動余答  
曰信我者生違我者死張但云更有旨甘遂而次於此  
藥力者可否余全其交情謬令即服大承湯二服而食  
次日見之尚有餘滯積實必過數日而復閉復服前藥  
始可除根數日後果由腹滿痞結再投此藥一服而痊  
錢急欲乳不能食口猶赤今熱入兕臍流入心脾  
厚唇燥口不能秉乳當涼心脾

哺露

陽哺露者目乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣咸損肌  
肉不榮柴骨羸 吸昔熱謂之哺露也宜射香進食丸

診

癰

陽小兒面黃腫是積

肚脹是積

面令地卧是積

小便如油是積

多嘔是積

眼睛黃是積

腹內虛鳴是積

多睡是積

眼白黃是積

赤白痢下是積

驚黃是積

眼赤是積

多瀉是積

凡有積帶頭辨虛實既孩兒肥瘦不同長短不同黑白不同黑白不同南北不同古今不同豈可一槩論也余

今之法實者可服進食丸虛微白者及疳瘦孩兒宜服

肥兒丸 肥兒丸一方見疳門心疳条

白餅子

食癖

白芍藥 七分 陳皮 子不 黃連 少許 白茯苓 四分

右為粗末每服水二盞煎至佛去滓溫服

丹治小兒驚而有熱者

人參 茯苓 白芍 酒炒 白朮

右入生姜煎服暑月如黃連生甘草以竹葉煎服

陳明遠小兒驚曰脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮 二分 茯苓 二分

並湯入竹歷煎下龍膏丸廿保和丸升

陽奪命散大能控冷涎不則急慢驚冷痰潮壅盛塞於咽

喉其響如潮 涎百藥不能過咽命在頃刻但先

用此藥入喉其痰墜下功有萬全奪天地之造化

通以急慢二驚 痰盛氣實者 痰石石砂類 之



右為末甘草膏為丸如雞頭大每一丸或二丸姜蜜

薄荷湯下

如慢驚用桔梗白朮湯下

鎮驚丸治急慢驚

琥珀 二錢

青黛 半兩

辰砂 二錢半

天竺黃 二兩

天麻 一兩

真珠母 二錢半

芫花 半兩

紫胡 半兩

青皮 二錢半

甘草 二錢半

膽星 二兩

雄黃 一錢半

乳香 一兩

青礞石 半兩

右為末甘草膏為丸如雞頭大每一丸或二丸姜蜜

蜜湯下

小兒急慢驚風

全蠍

四十九个  
缺微黄色

辰砂

半两研極細和勻

取蚯蚓十全条洗淨入小瓶內以温火煨之蚯蚓化  
為小丸如胡椒大每三章用順流水化服

小兒急慢驚風

真姜蚕

三条

辰砂

一立

全蝎

不真珠母一掃

右末蓬蒿中小虫兒每十个作一丸如麻子大每一粒

放在口中乳汁下

本事治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口禁涎口不止保

命丹

虎睛

一對瓦上安之又以  
瓦蓋之煨火逼干

箭頭朱砂

半两

全蠍

蜈蚣

二条去頭尾赤脚者

天麻

一分

射羊角

疾盛濕阻者  
膽星半夏  
燥之

右為細末煉密為丸如此口大丸觀貯之又入腦射  
審定急驚風薄苛  
化下慢驚風薄苛傷化下各

三丸

錢溫驚丸 一名粉紅丸

天南星

脾月穰牛膽中百日陰牙取未  
四又別研如無穰者只炒熟用

朱砂

天竺黃

罌子腦

朱砂  
罌子腦

龍腦

右用牛膽汁和丸雞頭大每服一丸小者半丸以糖

湯化下

抱龍丸治傷風濕疫身熱昏

早五起在右

一痰實壅嗽驚

風潮搐及盡毒中暑沐浴

馬家小兒驚

買小兒宜時

此服之  
肺云抱龍丸  
肝藥也

天南星  
如無牛脾者只行生者去皮臍  
射以然不用然不及中者四又

天竺黃 一升  
雄黃 一升  
夜砂 別研  
射香 另研

右為細末者甘草木和丸皂莢子大濕水化下服之

百日小兒每丸分作三四服五歲一二丸大人三五

丸宜喫服亦治室女白帶仗暑用鹽少許嚼一二丸

新水送下臍月宜水者甘少和藥尤佳一法用漿水

或新水浸天南星三日候透煮軟三五沸取出乘軟

切去皮只取白軟者薄切焙干炒黃色取末八又以

甘少二又半拍破用水二椀浸一宿慢火煮至半椀

去滓斬入夫南星末慢研之令甘少水盡入餘藥

世奪命散治急慢驚風諸藥不効隨手見功

白附子 三錢 黑附炮去浸隔半及急驚不用 南星 炮一丸

天麻 三錢 辰砂 二丸半另研 防風 半又

半夏 半又 全蝎 七个蜈蚣 赤足者一錢 灸燥入在內

射香 半分 姜蚕去系前妙 慢驚不用

右為末三歲兒半又薄荷生薑自然汁加酒少許入

沸湯火許調下急者加輕粉腦手少許

湯治急慢驚甚驗

赤脚蜈蚣全者一條 瓦塗灸 白姜蚕 七枚炒 辰砂 一錢另研

全蝎 七枚包裹 全者各用生薄荷葉 雙麻條 繫定火上灸 青州白丸子 三錢立

射香 火許另研

右末慢驚前人參麥門冬湯調下急驚加腦子牛黃  
各少許金銀薄荷湯調下

羅天麻散治小兒急慢驚風其效如神及大人中風涎盛  
半身不遂言語難不省人事

半夏七分 天麻二分半 炙甘草 白茯苓

白朮各三分

右一處用水一盞入磁器煮令水乾將老生姜三斤  
一同煮候乾為細末服一分半生姜素子湯調下

徑驗治驚風墜涎天南星一个重一兩換酒浸七伏特取  
出於新瓦上周回炭火炙令乾烈置於濕地去火毒用

麤呂令盛之冷擣末用朱砂一分研同拌 服半分

集弱身執  
者天麻參福

芥湯調下每服空心午時進一二服

田氏天麻防風丸治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸手足

搐掣精神

不刺熱風溫

天麻

防風

人參各一兩

蝎尾

去毒半兩

甘草

朱砂

雄黃

各二分半

牛黃一分

射香一分

姜蚕

半

右為細末煉蜜丸

櫻桃

大朱砂

為衣每服一二丸

薄

苛湯下無時

雲保七味羌活膏治急慢驚風吐熱葭搐

羌活

獨活

烏蛇肉

酒浸

各一兩

天麻

全蝎

人參

白善蚕各半兩

右為細末煉蜜為丸如皂子大每兩作五十九每服

雞鳴者  
釀乳

一九並荆芥湯下

經驗治小兒驚冷用蠟一分不去頭尾薄荷四葉裹合火

上灸令薄苛焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服

行義治小兒驚風白姜蚕蝎珀等分天雄尖附子尖共一

錢炮過為細末每服一字或半外以生姜溫水調灌之

羅小兒驚風釀乳方

用白羊頭一個丁香一两同熬至軟用乳母盡食之空心

丹其強母月胎中受溫熱午莖搗唇黑面青每少作一次

未半週難與藥且釀乳飲之

白朮一分 陳皮 半夏 芍藥 青皮各五分

人參 川芎 木通各三分 黃連二分 炙甘草一分

痰積疳者  
攻積

八帖

小兒急慢驚風發熱口瘡手足攣執瘕熱瘕嗽瘕喘並  
用涌法吐藥重劑用瓜蒂散輕劑苦參赤小豆末厚酸  
薑汁調服之後用通神散密丸服之間以菜米陰干碾  
末調服以平其風

本方治小兒急慢驚風積

扁銀丸

青黛三大分

水銀

一皂角子文同  
里鉅倍砂子

寒石麩

黃明膠

炒令焦為  
末各二分

輕粉炒為

雄黃

粉霜

朱砂各一分

巴豆

二十不  
古用

腦射少許

右都研細勻滴小為丸如麻子大担令漏曝干蘘合

錢一歲一丸隨意加減並卓子湯送下不得化破

傳濟治急慢驚風乳香半又甘遂半又同研細每服半小

用乳香調下或小便調抄

右二十方通治急慢驚者蓋謂虛實又見急慢五出

故有通治之法合而言之無急慢雖異皆一本之於

痰故礞石是半之屬通能治之也分而言之礞石之

屬寫痰青黛之屬寫木朱砂之屬寫火而又皆治氣

實草之屬補上天麻全蝎之屬補木烏附之

屬補火而又皆治氣補瀉黃地虛實通

能治之也

山原小兒驚風狗孫薰燒存性椀覆出火毒生密調灌許

海心神不安四君子加辰砂半分棗湯調

瘡疹搖動  
風者搖

針灸

又有一証欲發瘡疹先身熱驚跳或昔搖擲此非驚風

當用荖散藥

間驚冷或洩瀉等病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜  
荖錢氏白朮散使隨意而足飲之弥多弥好

明堂急慢驚

印堂

灸急驚寫慢驚補

急驚

支正

下虛

小兒慢驚冷灸尺澤二穴各七壯在肘中橫紋約上動  
脈中柱如小麥大睡中驚掣手

厲兌一壯

診  
男擗左視順右  
視遲  
女擗右視順左  
視遲

睡中驚目不合矣屈肘橫文上三壯

錢咬牙甚者皆驚目赤並青者皆擗目直而青身反

折者生驚呵欠面青者驚冷呵欠面黃者脾虛驚

驚癇者擗男者擗目左視無聲右視有聲女者擗目右

視無聲左視有聲相勝故也更有者時証案右白男為

位無聲右視金位相擊則有聲女為金故右視金位無聲左視木位亦有聲

李寺丞子三歲者擗自外至已數豎不悅後召錢氏視

之擗目右視大呼哭李曰何以擗右錢曰逆也李曰何

以逆曰男為陽而本者左女為陰而本者右是男目左

視若擗無聲右視有聲女者時右視無聲左視有聲所

以然者左肝右肺肺金肝木男目右視肺勝肝也金來

以然者左肝右肺肺金肝木男目右視肺勝肝也金來

刑木二歲相戰故有聲也治之瀉其強而補其弱心實  
亦當瀉之肺虛不可瀉肺虛之使悶亂哽氣長出此病  
男反女故男易治於女也假令女叢擡目左視肺之勝  
肝若病在秋即肺重旺位肝不為任故哭叫當大瀉其  
肺然後治心續肝所以俱言目反右視者乃肝主目也  
凡擡者冷熱相搏於肉以風屬肝故引見之於目也錢用  
瀉肺湯瀉之二日不乱當知肺病退後用地黃丸補腎  
三服後用瀉青丸涼驚丸各二服凡用瀉心肝藥五日  
方食不妄治也又言肺虛不可瀉者何也曰設令男目  
右視木尅金肝旺勝肺而但瀉肝若更病在春夏金氣  
極虛故當補其肺填勿瀉也

脈急為癩

癩

不修症

陽凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治

心脈急甚為癩

全文見心法口  
徑云急者多寒

脾脈急甚為癩

全前

陳驚風不吐証 搐而不休休而再搐 驚叫者搐汗出

是冷 瘕

開目直

間凡小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚難靜乃危

病也急驚

持不可擒提蓋風氣方感恐候入

筋脈或至手足拘攣

驚癇

驚癇即急慢之証但驚癇者時仆地作聲醒時吐沫

急慢驚則不

吐沫也

大法

湯癰作之初身熱瘦癢啼而復發脈浮者為陽癰乃急驚也內在六府外在皮膚尤易治先身為不驚瘦不啼喚而作脈沉者為陰癰乃慢驚也此疾內在五臟外在骨髓劇者難治

錢凡治五癰皆隨歲治之每歲各有一款並五色丸治小病也

犬癰反折上竅犬叫肝也。羊癰目瞪吐舌羊叫心也

牛癰口立視腹滿牛叫脾也。雞癰驚癰反折手縱雞

叫肺也。猪癰如尸吐沫猪叫腎也

五色丸

朱砂研 兩 水銀 一分 雄黃 二兩 鉛 三兩同

真珠末 一兩研

陰陽  
身壯驚啼  
脈浮為陽

右煉蜜丸麻子大每服二四丸並金銀薄荷湯下

潔如亦客痰受熱布声並大黃荆芥湯下五色丸

潮熱有時積熱也批枝丸主之壯熱不退當用地骨皮

散下五色丸白虎湯蒼木防風湯

冷熱當用防風黃芩湯下大青膏

溫不熱當用白虎湯加蒼木下五色丸

本  
事  
以  
小  
兒  
癩  
癩  
欲  
發  
眼  
暗  
庚  
癩  
聲  
裏  
嚳  
舌  
雄  
黃  
丸

雄黃

黃丹各一兩微炒

射香一分乳

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前件藥

末并三五而下丸如芥豆大每服三丸溫熱水下一

日三服此方得自明鑿之家後予嘗傳與一貧鑿曰

是藥鑿道大行

湯蛇黃丸治驚癇

真蛇黃

煨醋淬

鬱金

三分一  
覆為末

射香

一分另研

右為末粳米飯丸如桐子大每服三二丸煎金銀磨

刀小化

海古鏡味辛無毒主驚癇邪直小兒諸惡疾煮取汁和諸

藥煮服之文字弥古者尤佳

治痢方治太陽陽明二經為病

荆芥穗

四兩

白礬

二兩為細末

右棗肉為丸桐子大每服二十九荆芥湯下次三十

丸四十九次五十九食前

身冷不寐啼  
脈沉為陰

羅驚痾治驗魏敬甫之子四歲一長老瘳項授記衆僧念

呪曰而大

瘳延壅塞目多白睛項暗強喉中

有聲一時許方醒後每見衣皂之

服朱犀龍

射鎮墜之藥四年餘前症猶在又添行步動作語言如

癡其脈沉弦而急黃帝針經有云心脈喘大

癩瘦筋牽又云肝脈小急蓋小兒血氣未定

神思尚弱且而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故痾

牽病久氣弱小兒易於虛實多服鎮墜寒涼之劑

復損其氣故添動作如痴內經云暴擊痾眩足不任身

可天柱穴是也天柱穴足太陽脈氣所發陽蹻附而行陰

也又云癩痾瘳瘳不知所苦兩蹻之下男陽女陰與古

老人之盡發治陽蹻申脉穴夜發治陰蹻照海穴先灸  
兩蹻各二七壯次處沉香天麻湯

沉香 二斤 天麻 三斤 羌活 四斤 防風 三斤

益智 二斤 川烏 炮去皮 炙草 二斤 當歸 一斤

半夏 湯炮七次 獨活 一斤 附子 炮去皮 姜屑 一斤

右吹咀每服五斤生姜一片水煎舉痛論云恐則氣

下精怯而上焦閉又從下上者引而去之以羌活獨

活皆溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入厥陰之

經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘

草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣

附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷

胃腎主五液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑  
之重可去怯况香辛温體重氣清去怯安神故以為  
使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得而平矣

湯牛黃丸治驚中風五癰天吊客忤潮涎灌壅

白花蛇酒浸 白附子 全蠍 真川烏一枚半

天麻 薄荷葉各半兩

已上六件先為細末次入

雄黃半兩 辰砂三分 腦子半兩 牛黃五射 香一兩

右件一處和勻麻黃去根二兩酒壹升並麻黃至一

盞去麻黃用酒熬藥得所太過佳赤不及疾人如黃

實大密器盛之一丸作五服並金銀薄荷湯磨化大

能者散鶴邪

治五癩得効方

露蜂房一丸

石菖一丸

桂心 遠志 志

人參 各半丸 朱砂一丸

世傳小兒風癩

膽星二丸

金蝎去翅足半丸炒

白附子一丸

薄荷半丸

姜蚕一丸炒

川芎一丸

右末粥丸青黛為衣每一二丸

治小兒癩癩用甘遂末一丸猪心一个取三管頭血三条

和甘遂末

作两片以藥入在內用綿縛定

外以皮紙包裹水濕入文武火內煨

度徐

濕疾

實疾

紙以藥細研入辰砂末一水和勻分作四丸每服一

丸猪心湯豈此方神效

湯斷癩丹治癩瘡後復作連綿不除用豕

黃芪

蜜水

釣藤

細辛

甘草

各半升

地退皮

三寸

蟬退

去土

牛黃

一字

右末煮棗肉丸如麻子大豈人參湯下一歲十丸

治久年癩瘡心火不足神驗方

蝎虎一枚褐色者用剪子取下四足瓜連血細研入生

珠末射香腦子各少許一處研細薄荷湯調下作一服

須先用奪命散控下促次服之能奪造化雖數年癩瘡

亦能除之此藥所以神效蓋癩皆心血不足此物可守

雜方

宮其血與心之血類也取下如室女之童服之於心故

能補也

此乃怪虫去其足而後行又再生而居也。蝎虎即雅蛇又名五龍子奪命散方見驚搐

肘後小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成痼當歸末小

豈大乳汁灌之日夜三四度服

本草治小兒卒得痼用釣藤甘草炙各二分水五合煮取

二合服如小素大日五夜圖大良又廣濟及崔氏方治

小兒驚痼諸湯飲皆用釣藤皮

野猪黃味辛甘平療癩痼水研如素核日二服效衍義

云野猪黃在膽中不常有間得之治小兒痼疾

子和李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰心火勝

也勿持捉其手當從搐搦此由乳母保抱太極所致乃

虫似癩

針灸

癩瘻脊強  
取背筋

令掃淨地以水洒之乾令復洒之令極濕耗脫卧兒于

地上良久渾身轉側泥濘皆濡仍以水洗之少頃而差

杜壬治小兒胃寒舌上諸疔危惡與癩相似乾漆搗炒相

盡白入燕蕒等分為細末米飲調下一字至一匙

甲小兒癩癩瘻瘻脊強低引項灸長強穴三十壯在脊低

端秩地取之乃得甲乙曰

小兒驚癩瘻脊強目轉運上插筋縮主之

田氏小兒癩癩驚風目眩灸神庭穴七壯在鼻直上入髮

際五分

小兒風癩灸鼻柱上髮際宛宛中灸三壯柱如小麥大

小兒驚癩先驚怖啼後乃發也灸項上旋毛中三壯

小兒驚癇先驚怖啼後乃昏也多項上旋毛中三壯

及耳後青絡脉柱如小麥大旋毛中即百會穴也青絡脉手足少陰脉穴也

甲小兒驚癇本神及前項顛會天柱主之

明堂癇灸巨關三壯

甲小兒驚癇反視臨泣主之

小兒癇瘧嘔吐世注驚恐失精瞻視不眈眈瘵脉之主

羊癇會宗下堂主之我氏云羊癇目眩吐舌羊吃

癇者目上挿撥竹主之

馬癇金門及僕恭主之

今從頭至足癇瘵口閉不能開每大便腹暴滿按之不

下噎意作悲喘崑崙主之

小兒癇瘵遺精弱虛則病諸癇顛實則閉瘵于腹中批

癇反視吐瀉  
形少陽

癇目上視  
形太陽

癇遺弱閉瘵  
形厥陰

診

風執

善寐大敦主之

癩癘如有兇者列缺主之并取陽明絡

錢五癩重者死後甚者亦死

天吊

天吊亦癩風之証但天吊發時須目仰視癩風則無也  
陽小兒癩癘不定翻眼壘睛狀若神葉須目仰視各為天  
吊凡有此疾宜服蘇合香丸矣凡手大姆指面甲肉相  
半男先矣左女先矣右及兩足大姆指節中間各三壯  
五壯又手心五壯又後心五壯此皆得効之法

九龍檀涎散治天吊

赤脚蜈蚣酒炙

滴乳

天竺黃 子另研

... 二名 准黃 二名 另研 甘草 二名 另研 刺米 二名 另研

臘茶 二升 雄黃 二升另研 甘草 二升 荊芥穗 五炒

白礬 一升 葛豆 一升 槐羊生半熟炒

右末每服半升至一升 並人參薄苜湯調下

釣藤 飲治天吊潮熱

釣藤 人參 犀角屑 各半兩 全蝎 一分 天麻 一分

右末每一錢水煎服

圖

丹癩迷悶 嚙舌仰視 牛黃 大豆許 和蜜水服 廣利方

眼目

明堂目 澁羞明 狀如青盲

浙

中渚 炷 一炷 如小兒艾

三五歲 思生白翳 遮瞳子 疼痛不可忍 者

針灸

診

虛

濕痰

九椎上灸一壯

好癩目不明者

有中俞一壯

錢目赤薰青者按摺

眼白多

世治眼白多

康草 半兩

澤瀉 二兩

茯苓 一兩

山茱萸 二兩

地黃 一兩

牡丹皮 一兩

牛膝 一兩

右為耒蜜丸桐子大鹽湯食後下二十九

雀目赤眼

羅煮肝丸治小兒疳眼翳膜羞明不見物服十日必退下

館

書

圖

目直而射反折強直者

生醫

如大人雀效

夜明砂 青蛤粉 穀精草各一兩

右件為細末每服一錢五七歲已上二分 猪肝匙

大批開摻藥在內攤勻麻厘定淘半日半碗煮肝

熟附出肝湯傾碗內董眼候湯溫分肝三服嚼吃却

用肝湯下一日三服不拘時候大人雀盲空心服至

夜便見物如雲多時日二服

龍膽飲子治疳眼淚膿生疳翳濕熱為病神效不治寒

濕為病

青蛤粉半兩 羌活三分 草龍膽二分 炒黃芩二分

蛇退皮半兩 麻黃二分 穀精草半兩 升麻二分

針灸

熱

川鬱金半分 炙甘草半分

右為細末每服二分食後茶清調下

灸雀目疔眼法口小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一

寸內廔廔橫紋頭白肉際各一壯如小支大

小兒疔眼灸合谷二穴各一壯如小支大在手大指

次指又骨間隔中

赤眼

陽導赤散治心熱小便赤服目赤腫方見海虞氏

洗肝散

赤芍藥 羌活 防風各半 又大黃分 甘草分

右末灯心黑豆煎食後

左書灯心星豆並會後

余平生氣赤眼之患用之如神大人小兒可通用凡眼  
赤腫之初只用自已小便張目弱出一手可用指接抹  
眼中永畢閉目少頃後即效此以真氣逼去邪熱也  
本事治小兒赤熱腫眼

川大黃 白礬

右二味等分為末用冷酒調作卷子貼眼之效

明堂眼忽大小皆赤

合谷 三壯

拔毒冷感眼疼

中指本節頭 三壯

婦小兒通睛皆目失候築打觸着額面額角並倒撲令兒

針灸

肝

肝受驚風遂

晴開名曰通晴宜服牛黃丸

忌酒麪猪肉

牛黃 白附子 肉桂 全蝎 芫花影

石膏各二分 煨通紅 白芷 藿香半斤 朱砂 射香

右末煉蜜為丸如芡實大三歲已下每服一丸薄荷

湯化下乳食

偏墜

雜方

田氏小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛十回救教

佳桂枝半斤二散每服八分一七日再酒調下蜜丸

亦通也

偏墜宜服防葵丸令兒坐於土中午時笑印下偏墜之

處七壯防葵丸未詳

針灸

小兒偏墜者非胎中所有在後者生於產下腎囊前中  
間弦子上灸七壯會

明堂胎產疝如偏腫

囊縫後十字文上

三壯春灸夏瘡  
夏灸冬瘡

陰腫囊腫脫囊

氣血

湯小兒陰腫由啼斗怒氣閉擊於下 成此疾宜海蛤散

海蛤散三分 茴香三分

炒 薏苡仁半兩

白朮半兩

檀榔半兩

右末食前溫酒調下 大漸加減

陰腫又方

桃仁 三分去皮  
炒

牡丹皮 半兩

桂半兩

白芷 半兩  
去刺炒

汚血

虞七世防癸丸未詳

批

雜方

針灸

郁李仁 一分 湯浸去皮

丹脫脰脫囊即腫大

木通 甘草

耆歸館 黃連

黃芩

煎服

雙蚯

蚓散治腎子腫硬成疔用干蚯蚓為末唾調付常避

風冷濕地先用葱熨過洗却付之用之累變

世治小兒囊腫如升用甘草煎濃汁調地龍末塗之立退

累效

丹脫囊用紫蘇葉末水調付上荷葉包之

明堂陰腫

崑崙 各三世

疝痛

滯氣

湯治小腸疝氣家傳妙方

芫花半兩醋浸炒 木香半兩 檳榔半兩 三稜炒半兩

茯苓一分 青皮一分 全蝎一分 桂一分

附子一分炮 研砂一分書

右末將研砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子和糖

醋打麵糊為丸如芡豆大每服二十九空心溫酒下

未効再服

小便不通

錢槍頭散治小便不通

玄胡索 川芎 練各等分

活血

右同為末每服半分或一分捻頭湯調下量多火其

之如無

中脘油數點食前

湯木通散治心經伏熱小便頻通碎叫

木通

一兩

牽牛子

半兩炒

滑石 一兩

右為末灯心葱白煎服

冬葵子散治小腹急悶

冬葵子 一兩 木通 半兩

右為末每服一分煎服

錢尿深黃色以則尿血

小便不通久脹滿當利小便

淋

血

湯治血淋神效方

紫草

連翹

車前子等分

水煎

又方

海螵蛸

生地黄

白茯苓

右等分柏葉車前草黃陽調下

治氣淋

赤芍藥一兩

楸柳麵裹煨一升

右末灯心同棗子煎湯調下

遺尿

湯治小便不禁或睡中遺出不覺

雜方

雞腸草一兩 牡蠣粉三升 龍骨半兩 麥門冬去心半兩

白茯苓半兩 桑螵蛸半兩

右件以咀每服一升牽子一个擘破同食前服

又方破故帛一味炒為末黃葉煮湯調下

外臺療小兒夢中遺尿薏苡仁一合許去心不去殼敲碎

入鹽一小撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空腹服之

累効

喉痺

當於大人喉痺法各用之

湯 喉痺別無治法非吐不可生此証萬一危亟前法無効

急用官局碧

細用薄荷自然汁入醋調雞翎蘸

上宜

急用官局碧

細用薄荷自然汁入醋調雞卵黃

葉送入喉內徐導引得吐出

方論碧霞丹

能害人此不然蓋當時遇有合死之人耳

碧霞丹方頭

尖蝎梢汁化下取涎也  
方見法上下条

針灸

明堂喉中鳴咽乳不利

璇璣三壯

急喉痺

天突一壯

浙江圖書館

醫學綱目卷之三十六終

檢閱

浙江圖書館


浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號：010777

一九 年 月 日





浙江圖書館

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007


Centimetres



卷三十七  
卷三十六



浙江圖書館



浙江圖書館

