

DISSERTATIO
DE
RECINO
et
THUNBERG





Smithsonian Libraries

Adopted for Conservation by

Kathy and Keith Boi

December 29, 2016





59
1865
P.T.
56

DISSERTATIO

DE

R I C I N O

QUAM

VENIA EXP. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. P. THUNBERG

EQUIT. AURAT. REG. ORD. DE VASA,

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. LOND. HOLM.
AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. SCIENT. UPS. ET OECON. PHILAD. PATR
HOIM. ET CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. BEROL. NAT. SCRUT. PARIS.
HAFN. MOSCOU. ET HALENS. HIST. NAT. GORENKENS. LUND. HARLEM. AM-
STELD. OECON. ET INST. LITT. ZELAND. NIDROSIENS. TICINENS. IENENS.
LINN. LONDIN. REG. SCIENT. PHYS. ET PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. MÜNCHEN.
ERLANG. WETTER. NANCiens. MED. PARIS. EMUL. MONSPEL. MED.
MATRITENS. MEDIC. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET PETROP. MEDICO-
CHIR. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. ET INSTITUT. NATION. MON-
SPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCANDINAV. FLORENTIN. ET
BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

PRO GRADU MEDICO

P. P.

MAG. F. J. LÖNEGREN.

SMÖLANDUS.


IN AUDIT. BOTANICO D. XIII. JUNII MDCCCXV.

H. S.

U P S A L I Æ

EXCUDEBANT ZEIPEL ET PALMBLAD,
REG. ACAD. TYPOGR.





SB
299
C3
753
1815
SCNMRB

585.151
1758

DE RICINO.

§. 1.

In non paucis variare deprehenduntur Genera ex Or-
dine Naturali Tricoccarum plantarum varia, imprimis
Acalyphae, *Crotonis*, *Ricini* et *Jatrophae*; sic ut omnium
difficile sit, hæc ipsa rite ab invicem distinguere. Di-
elina quidem pleraque sunt; sed diversumode Sexus ta-
men in diversis Speciebus variare solet, floribus scilicet
Monoicis et dioicis. In Monoicis situs non semper idem
in eodem ramo vel pedunculo. Non numquam Calyx
et ipsa quoque Corolla variat, vel omnino deficit. Flo-
res masculi Crotonis corolla instructi sunt; feminei vero
illa destituuntur. Neque Stigmatum et Capsulæ exterior
fabrica semper eadem, sed, licet rarius, variabilis. Sta-
mina coalitis filamentis sæpissime numerosa, et Capsula,
tricocca maxime constantia videntur.

§. 2.

Optimi Charakteres, quibus a Congeneribus dignoscitur
Ricinus, sunt sequentes:

Flores sunt et *Monoici* et *Dioici*.

3 *Perianthium monophyllum* quinquepartitum: *lacinis o-*
vatis, concavis.

Corolla nulla.

Stam. Filamenta numerosa, filiformia, infer-
ne ramoso-coalita in varia corpora.

♀ *Peri-*

♀ *Perianthium monophyllum*, tripartitum, deciduum: *lacinias*, ovatis, concavis.

Corolla nullia.

Pist. Germen ovatum, tectum aculeis subulatis.

Styli tres, bipartiti, erecti, hispidi.

Stigmata simplicia vel bifida.

Peric. *Capsula* subrotunda, trisulca, saepius aculeata, rarius laevis, trivalvis, trilocularis.

Semina solitaria, subovata.

Folia saepius peltata, lobata.

Distinguitur a *Jatropha* et *Crotone* imprimis floribus incompletis.

§. 3.

Specierum Characteres.

* *foliis indivisis.*

† *foliis petiolatis.*

1. *globosus*: foliis ovatis obtusis integris.

2. *chinensis*: foliis ovatis, acuminatis, dentatis, subtus tomentosis.

3. *japonicus*: foliis ovatis, acuminatis, indivisis trilobisque.

4. *integrifolius*: foliis ovatis, acuminatis integris, glabris.

5. *dioicus*: foliis cordatis acuminatis integris.

6. *angulatus*: foliis angulatis trilobisque dentatis glabris.

† † *foliis peltatis:*

7. *tanarius*: foliis peltatis, ovatis, acuminatis, repando-dentatis.

8. *Mappa*: foliis peltatis, ovatis, acuminatis subtus tomentosis; caule glabro.

9. *toment-*

9. *tomentosus*: foliis peltatis, acuminatis, subtiliobis, tomentosis; caule tomentoso.

* * foliis palmatis, peltatis:

10. *trilobus*: foliis peltatis trilobis denticulatis.

11. *communis*: foliis peltatis palmatis; lobis lanceolatis serratis; caule herbaceo pruinoso; stigmatibus tribus apice bifidis.

12. *viridis*: foliis peltatis palmatis: lobis oblongis dentatis, intermedio obsolete trilobo; caule herbaceo pruinoso; stigmatibus sex. simplicibus.

13. *Africanus*: foliis peltatis palmatis; lobis oblongis, serratis; caule fruticoso laevi; stigmatibus sex.

14. *lividus*: foliis peltatis palmatis: lobis oblongis, serrato-dentatis; caule fruticoso laevi colorato; stigmatibus sex.

15. *inermis*: foliis peltatis palmatis: lobis oblongis serratis; caule fruticoso pruinoso; stigmatibus tribus bifidis.

16. *speciosus*: foliis peltatis digitato-palmatis: lobis ellipticis serratis.

§. 4.

Descriptio Specierum novarum et minus cognitarum.

R. *chinensis*. *Rami* sulcati, albo-tomentosi.

Folia petiolata, ovata, acuminata, denticulata, supra glabra, subr. niveo-tomentosa.

Petoli folio paulo breviores, erecti, niveo-tomentosi.

Flores spicati.

Spicæ

*Spicæ terminales, erectæ, totæ niveo-tomentosæ,
digitales.*

Styli tres capsula echinata.

R. Angulatus. Rami cinerei.

*Folia ovato-rotundata, subangulata trilobaque, den-
tata dentibus remotis, utrinque glabra palmaria.*

Petioli cinereo-tomentosi, pollicares et ultra.

Flores racemosi, cinereo-tomentosi.

Facies Crotonis.

R. tanarius. Tota herba glabra;

Radix fibrosa.

Caulis herbaceus, erectus.

*Folia peltata, ovata, acuminata, repando-dentata,
supra viridia, subtus pallida, palmaria.*

Petioli alterni, longitudine folii.

R. Mappa. Caulis erectus, glaber.

*Folia peltata, ovata, acuminata, subdenticulata,
inæqualia; adultiora spithamæa, supra glabra,
subtus tomentosa; juniora vix palmaria, utrin-
que valde tomentosa, crassiuscula.*

Petioli alterni, teretes, folio breviores.

Pedunculi compressi, longitudine petiolorum.

Flores racemosi.

Capsula echinata.

*R. tomentosus. Folia peltata, lato-ovata, acuminata,
angulato-subtriloba, inæqualia, supra glabra
nervis hirtis, subtus valde tomentosa et nervis
reticulata; pollicaria usque spithamæa vel ultra.*

Petioli tomentosi, foliis duplo breviores.

Flores racemoso-globerati, calycibus tomentosis.

Pedunculi subangulati, tomentosi, petiolis longiores.

R. trilobus. Caulis fruticosus, erectus, glaber.

*Folia peltata, lato-ovata, triloba, denticulata,
utrinque glabra, palmaria, usque spithamæa.*

Lobi

Lobi ovati, acuminati.

Capsulæ inerimes.

§. 5:

S y n o n y m a.

In Wildenowii Speciebus Plantar. Tom. IV. P. I
citantur *communis* et *viridis* p. 564.

Africanus, lividus et inermis p. 565.

speciosus, tanarius, dioicus p. 566.

globosus et integrifolius p. 567.

In Linnæi Speciebus Plantarum Ed. XIV. occurrit
Mappa p. 1430. item apud Rumphium in Herbar. Am-
boinensi Tom. 3. p. 172. tab. 108. atque in Wildenowii
Specieb. supra citatis p. 526. sub *Acalyphæ* genere et
nomine triviali *mappa*.

Ricinus tanarius ab incolis Ceilonæ dicitur: Kian-
deghas.

japonicus in flora Cel. Præsidis descriptus fuit sub
titulo *Crotonis japonici* et citatur a Wildenowio
in Spec. Pl. p. 555.

shinenſis, tomentosus et trilobus species sunt, antea
Botanicis ignotae, nec, quantum nobis constat,
ullibi commemoratae.

§. 6.

L o c u s.

Omnis crescent in Zonis calidioribus, ut in Indiis
Orientalibus ut *communis* pluribus in locis.

Viridis, inermis, speciosus in Java;
tanarius in Ternatis, Moluccis, Ceilona;

Mappa

Mappa in Java, Amboina, Ceilona;
trilobus in Ceilona;
tomentosus in Java;
 in Africa boreali *africanus*.
 in Capite bonæ spei *lividus*.
 in Montibus Jamaicæ *globosus*.
 in Insula Tanna *dioicus*.
 in Insula Mauritii *integrifolius*.
 in China *chinensis*.
 in Insulis Japonicis *japonicus*.
 in Coromandelia *angulatus*.

De Oleo Ricini ejusque Usu Medicō.

Probabile quidem est, plures esse, quæ remediū usum haberent, Ricini species; quantum autem cognovimus, nulla præter *Ricinum communem* adhuc fuit in hanc finem recepta.

Folia externo usui variis modis et ad variōs morbos depellendos, ut dolores arthriticos, ophthalmias, affectiones erysipelaceas, scabiem, herpetem, cet. adhibuerunt, qui loca, ubi indigena est hæc planta, incolunt. *Videsis Apparat. Medicamin.* Jo. And. Murray. Vol. IV. p. 200. — K. Vetensk. Acad. Nya Hdlr T. VII. p. 238.

Radix quoque in usum adhibita ut efficax censetur diureticum. *Murray l. c.*

Semina (*Cataputiae majoris*, *Pharin.*) tamen sunt potissimum, quæ olei causa, quod in illis continetur, *R. communis* in *Pharmacopœis nostris recentioribus locum asseruerunt. In Preussische Pharmacopœ. Dritte verbess. Ausg. Aus d. latein. Urschrift übersetzt Berlin 1813. extat *Ricinus undulatus*.*

Anti-

Antiquiores rei Medicamentariæ Scriptores, ut *Geoffroy*, v. *Linné*, *Cranz*, *Rudolph Aug. Vogel*, cett., hoc oleum vehementer purgans et aniceps censuerunt. Recentiores autem, exceptis nonnullis a), qui aut huic opinacioni adsentient, aut qui aliis, ejus loco adhibitis, pingueolis æquam vim tribuant, id ut remedium purgans valde efficax et tutum proponunt b). Ejusmodi dissensus si equenter apud eos occurrit, qui de viribus medicamentorum scripsierunt. Atqui causam ejus scepissime, aut in eo, quod morbus, cui usus remedii inservisse dicitur, perperam fuit cognitus, aut in singulari rei nedii natura latere, facili potest negotio deprehendi. Heic posterior esse causa videtur, unde sit discrepantia opinionum profecta. Inter omnes, qui de Oleo Ricini scripsierunt, convenit: Acre illud Seminum Ricini in testa potissimum latere, nucleum esse innocuum, recentem forsitan urendo fauces leviter afficere. *Murray* d. c. p. 203. Celeberrimo autem Deyeux embryonem

in

-
- a) Handbuch der praktischen Arzneymittellehre &c. v. Ernst Horn. Berlin 1805; p. 675. — Taschenbuch der Arzneymittellehre &c. v. C. W. Consbruch, Leipz. 1810. p. 317. — Handbuch der Pharmacologie, &c. v. Fr. Alb. C. Gren. Halle 1813. p. 347. Cfr. C. Bernhard Fleisch Kritische Bemerkungen &c. in Martens Paradoxi-en. 3:ter Bd. 1:ter Hft. p. 180.
 - b) Mat. Medica &c. Petr. Joh. Bergius Tom II. Stockholmiæ 1778. p. 773. — Versuch einer theoretisch-praktischen Darstellung der Wirkungen der Arzneyen von Fredr. Kretschmar. 2:ter Theil. Halle 1800. p. 366. — Archiv der praktischen Heilkunde für Schlesien und Südpfauen. Herausgegeben von Dr. Zadig und Dr. Fries. IV. B. 1:es St. Art. VI. — Anleitung zum Zweckmässigen Gebrauche der Arzneymittel, &c. v. D. Aug. Fr. Hecker. Berlin 1806. p. 188. — Praktische Erfahrungen &c. v. J. G. Obersteuffer in: Journal der praktischen Arzneykunde &c. von C. W. Hufeland 9:ter B. 3:es St. p. 116. — C. W. Hufeland. l. cit.

in nucleo, id tantum esse videtur, quod acre contineat, unde hic, ab utroque lobo sejunctus, si abjectus, oleum ex iis mite ac saponi gratum obtinetur. Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie &c Mars 1806. — Huse-land I. c. 24^{ter} B 2^{tes} St. p. 178. Facile autem apparet embryonis sejunctionem, si vel semper fieri potest, tanto, quod requireret, temporis et exactæ operæ dispendio nimiam sic olei comparati caritatem adferre. Unum igitur, quod in quantitate majori forsitan succederet et aliquid momenti habere aestimetur, si quidem oleo testa id acre revera tribuit, quod tam noxium Auctores ducunt, hoc esset opus, ut nuclei antea decorticati facrint, quam vel coquendo vel premendo (hunc modum et si minus tentatam, Ph. Sv. prescribit) oleum ex illis educeretur. Horum uterque preparandi modus apud Auctores jam laudatus, jam vituperatus, si cum judicio et exacte servatur, oleum, sine dubio usui idoneum, tamen testa etiam non sejuncta (acre utpote, quod illa continet, difficulter solubile) praebent. — Quem vero colorem, saporem et quasnam ceteras habeat, ut bonum vel genuinum sit, qualitates, discrepant sententiæ. Secundum Deyeux et Consbruch, I. citt., genuinum esse oportet clarum ac pellucidum; secundum Murray, Bergium I. citt., Schreger c) et Ebermaier d) opacum, album vel subflavum. Inter omnes convenit, mite adeo esse oportere, ut odore ac sapore ferme careat; Ebermaier et Bergius contendunt illud frigore, quin imo secundum Schreger, vel fortissimo non congelari; Murray autem congelari illud

c) Tabellarische Charakteristik der ächten und unächten Arzneikörper. Fürth. 1804. p. 88.

d) Tabellarische Uebersicht der Kennzeichen, der Achtheit und Güte der sämmtl. Arzneimittel. Leipz. 1804. p. 68.

illud fūgore et Zahn id nec segniter fieri addit.). Tolluntur hæc aliaeque plures de hujus olei proprietatibus, ut prius videntur, contradictiones, si diversi quibus apparatur, modi, plus minusve tunc exhibiti caloris, dissimilitudo varietatum, unde sensuā fuerunt collecta, utrum recentia, an diu conservata, sitne oleum recens præparatum, an jam veteratum &c. spectantur. Quod in communī mercatura versatur, in India occident. est consecutum f) et in pharmacopoliis ut crassum, tenax, speciem præ se ferens recens ex favo expressi, clari, liquidi mellis, obvenit; deglutitum levem in fauicibus tamquam ex sinapi excitat ardorem. Propter hanc acrimoniam, quam noxiā adeo putant, Deyeux et Consbruch, aqua illud coquere, usque dum acre evanescat, svadent. Quo autem perdatne multum de vi sua, ut *De Machy* g) videtur, nēc ne, satis non est experientia probatum. Etiam quod ad solubilitatem ejus in spiritu vini pertinet, ulterioribus, antequam de hoc recte constat, argumentis opus adhuc esse videtur. Qui Jenaische allgem. Litt. Zeit. 1807. N:o 156 recensuit: *Pharmacopoea Borussica oder Preuss. Pharmac.* Aus d. Latein. Uebers. &c. von Dr. C. W. Fuch. Nürnberg 1805, eum esse genuini Olei characterem, quod in spiritu Vini rectificatissimo in totum solvatur, contendit; Joh. Beckmann in *Anleitung zur Technologie &c.* 6:te verbess. Ausgabe. Göttingen 1809, de oleis generatim dicit, ea non nisi subrancida posse qua partem in spiritu vini solvi, atque tandem in *Pharm. Boruss.* Edit. III. supra citata de *Oleo Ricini*, dicitur, id magnam

e) Auswahl der wirksamsten &c. Arzneymittel oder praktische Materia Medica &c. 2:ter B. Neue Aufl. Erfurt 1807. p. 793.

f) Läkaren och Naturforskaren. IX. B. p. 304.

g) Murray l. c. 209.

magnam esse partem in Spiritu Vini rectificatis no
solubile.

Quod vero ad usum hujus Olei therapeuticum at-
tinget, latissime illum patere facile perspicitur, quin præ-
ter ceteras vires, quæ ei eam plurimis pingueolis sunt
communes, alvum, vel ad minorem portionem haustum,
moveat^{h)} et hoc absque terminibus (*Murray* et *Friese*
l. citt.), ex narcotica forsitan vi, quam *Friese* et *Huf-
eland* i) ei se se dicunt non posse derogare; atque proprium
aliquid et præ reliquis oleis insigne, illud habere, extra,
omnem dubitationem positum videtur, experientia enun-
constat, ubi hæc inutilia fuerint, illud cum successu suis-
se adhibitum, ut in omni genere obstructionum alvi, Co-
licarum, in Ileo, etiamque in aliis morbis cum spastico
ac dolore conjunctis, ubi adeo fuit irritabilis tubus inte-
stinalis, ut ne mitissimum quidem oleum amygdalarum
posset tolerari, quod interdum in Dysenteriis, venenosis
vel corrosivi medicaminis usu, accedit & s. p. Adversus
Tetanum & vermes non plus illud valere, quam alia olea
unguinosa credibile quidem est.

Dosis adulto conveniens uncia dimidia usque ad to-
tam esse solet singulis horis vel altera quoque, dum ef-
fectus prodit, repetenda. Pro vehiculo calidum juscum-
lum carneum optimum habitum est. Mox inde aroma
quoddam manducatur ad nauseam & vomitum evitandum.
Copiosius hæc omnia a *Murray*, *Jahn*, *Hufeland*, *Friese*
&c. l. citt. tradita invenies.

^{h)} Handbuch d. inn; u. äuss. Heilkunde. 2 B. 2 Theil. Herausg. v.

Dr. H. G. Spiering. Leipzig. 1802. p. 373.

ⁱ⁾ L. c. IX B. 3 St. p. 117.





