

醫方類聚卷之三百五十六

其不

本小兒門十八

驚癇

直指小兒方

青大急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽癇是

陽陽盛而陰虧慢者屬陰陽虧而陰盛陽動

而燥痰陰靜而遲緩其始也皆因臟腑虛而

得之虛能發熱熱則生風是風生於肝痰



生於脾驚出於心熱出於肺永類鈔方作肝而心亦

主熱天官疾醫注云肺驚風痰熱合為四證

四證已具八候生焉搐搦掣顛反引凡擦眼

搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青唇青瀉

青太陽髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或

青者皆驚風狀也大抵熱論虛實證別逆順

治有後先蓋實熱為急驚虛熱為慢驚慢驚

本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用

藥以寒慢驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽

無別故曰執論虛實者此也男搐左視左女

搐右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出

外女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引

手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先

搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有

聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出

入相半者難痊目屬肝肝受風熱則目直視

赤五心煩熱之證却不發搐必熱心熱則肝

與瀉青圓更急驚受病之處瀉青圓去肝風

肝風心火乃急驚受病之處瀉青圓去肝風

導赤散降心火幼故曰證別逆順者此也病  
 幼新書以為要藥故曰證別逆順者此也病  
 陰脉陰病熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風  
 陽脉亦反熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風  
 盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚  
 先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又  
 常兼施並理壹或有遺必生他證故曰治有  
 先後者此也綱領如此若析急慢脾風而言  
 之則暴烈者為急驚沉重者為慢驚脾則重  
 而深矣鈐方至重者所風未之急驚之候牙  
 關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動指

開合唇口眉眼眨引頻併口中熱氣鈐方頰赤  
 唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊蓋由內有  
 實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風  
 而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣并痰涎  
 壅塞所以百脉凝滯關竅不通風氣蕃盛而  
 無所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關  
 以後且與截風定搐痰熱尚作適下之鈐方  
 截風定搐風搐既定却下痰熱理為至當若  
 患在痰熱未有驚風只可退熱化痰不可妄  
 投驚風藥蓋藥中多用寒涼恐引入痰熱入  
 絡絡凡病在熱不可妄下痰止當解表病在



驚不可妄治風蓋驚由痰熱得只可退熱化痰而驚自止病在痰不可便治驚急須退熱化痰病在風不可便治蓋風由驚作只可利驚化痰其風自散若也有搐須用截風散驚至妙之道若治驚而痰不化熱亦不退驚安得自止化其痰熱若不退風亦不散痰安得去是知不治之治所以治之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖常下切不可過用寒涼及銀粉巴硝輩蕩滌太驟水銀輕粉巴豆芒硝鈔霜蟾酥腦麝等劑醫家不得甚而用之僅去痰即止或不常用

而用或常用而過焉往往由此成慢驚矣下痰熱不必須用銀粉巴硝但能斟酌大黃可也欲下之法須當審問

前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以枳殼菖蒲寬氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌截風定搐先與通關驚重次則人參羌活散截風圓膏字散



陽癩散擒風湯定搐散瀉青圓木通散清寧  
 散阿膠散以意擇用 下劑有三輕下則用  
 定命丹利驚圓防風湯宣風散枳殼散小柴  
 胡湯輩 稍重下則用揭風湯朱砂膏疎風  
 散柴胡加大黃湯輩 重下則用青金圓天  
 麻圓盧會散牛黃涼膈圓青金丹王監驚墨  
 圓輩 下後和胃揭氣如生氣散銀白散茯  
 苓二陳湯異功散天麻蘇合香圓參苓白朮  
 散和中散醒脾散之類皆可選用 定志寧

神則以定志圓溫膽湯定心圓百枝膏與之  
 他如太乙保生丹聚寶丹蟬蝎散不冷不熱  
 祛風鎮驚之劑又當繼此以防其再發也下  
 之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作  
 慢驚理之 鈞方此下云其不可治之証爪甲  
 黑肝絕瀉黑血心絕多盜汗衛氣  
 絕忽作鴉聲肺絕咬人骨絕眼半開合腎絕  
 口鼻乾黑脾絕逆搐吐瀉交作而喘不可治  
 其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎  
 者未可直指以為驚風恐是傷風傷寒傷食  
 成三等證或夾驚而成如錢氏假搐之說 傷風



夾驚神困昏悸頭疼氣虛先用參耆活散  
惺惺散消風散輩取其次與天麻防風  
圓傷食夾驚身熱溫壯或吐不思食大便酸  
臭先用參耆活散加青皮紫蘇取表消積  
次用驅風凡搐搦者不可把握但扶持之否  
鎮驚之劑則風癘逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾  
此治急驚之大要然也慢驚之候或叫或瀉  
涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚跳搐搦乍  
發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷  
氣面色淡白淡青眉間唇間或青或黯其脉  
沉遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉下太驟

傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴

吐瀉而成者錢云夏月脾胃伏熱大吐瀉有者當解暑熱不可專曰固陽

臟腑虛洞泄成者風邪入於腸胃故大便不聚而瀉有久痢

氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成

者有感風不解誤藥成者有傷寒傳變陰證

成者有得之久嗽作痢者有得之發痢不已

者有得之虫積衝心者有得之卵腫疝氣腹

痛者其或日夜汗出脚困多睡煩燥引飲四

肢浮腫大小便閉丹瘤腫毒龍帶蹶腰走馬



急疴並傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之則證  
變甚速或經止瀉便是慢驚須用溫中扶裏  
不可誤作急驚用藥世言抽搐慢驚非也  
若泥此往往指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子  
以瀉得之為重女子以吐得之為重○鈔方  
此下云又吐有五証瀉有五証各明所因主  
治古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚  
如因洩瀉不止且先治瀉若更治風則驚風  
愈甚如因他證例當循原施治也其慢驚候  
若從急驚傳來只可截風調胃均平陰陽不  
可全用陽藥使陽歸陽復作急驚之候用藥  
施治無過不及可也急驚以開格不通略施  
腦射開通定其抽搐尚可慢驚陰重陽虧諸  
經已虛不宜通關又涼其臟易作慢脾風慢  
驚危急如眼睛昏定定而不眨雖眨不左右  
或竄視四肢厥冷汗出如流口面黧黯指

甲黑如體垂鞞至重慢驚証眼半開半合似  
睡不睡是也其脈或浮沉身或或熱或涼或  
吐或瀉或不吐瀉或食乳或阻乳名半  
陰半陽合病即如傷寒半表半裏也 治法

大要須當審問源流不可槩曰慢證如吐瀉

得之則理中湯加木香以溫其中五苓散以

導其水臟寒洞泄得之則先與朮附湯下積

收轉得之則先與調氣散外感寒邪得之則

先與桂枝湯解肌湯輩其他可以類推矣然

慢驚雖屬陰準亦須較陰陽虧盛淺深如何

不可純用溫藥及燥烈太熱之劑惟於生胃



氣中加以截風定搐如全蝎花蛇僵蠶白附  
天麻南星輩為良方傳慢候而尚有陽證  
者八候尚在不必回陽但與截風調胃可冷可熱  
均平陰陽而已太一保生丹聚寶丹蟬蝎散  
神保既濟丹來復丹王氏惺惺散醒脾散大  
醒脾散溫白圓可選用之若陽虧陰盛病  
已傳過純屬慢驚無搐掣反引窺視之證而  
但昏沉者與星香全蝎散定命飲四聖散烏  
蝎四君子湯天南星散烏沉湯沉香散之屬

若手足冰冷者方可回陽用硫黃附子 慢  
驚下痰身煖者天南星圓蘇合香白圓子  
痰盛者神保既濟丹礞石散虛甚而不可下  
痰者靈脂圓七珍圓如腦麝銀粉巴霜寒涼  
通關利腸輩一切禁止麝雖溫然性屬陰能化陽通腠其有  
陽已傳陰或者不知但見引搐誤用腦麝銀  
粉及寒涼輩必為慢脾陰逆若慢驚之候其  
眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯  
時也陰氣易盛陽氣易微時刻少延則藥力



不及頻併投藥則勢又不可纔進壹二劑須  
審有無傳變稍定則和平爲愈勢篤則以剛  
劑投之此治慢驚之大要然也慢脾風之候  
面青額汗舌短頭低眼合不開困睡中搖頭  
吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收  
或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極  
盛胃氣極虛十救壹二盖由慢驚之後吐瀉  
損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾  
風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療

但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏  
神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療  
者慢脾風是也然慢脾壹名虛風凡小兒或  
吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而  
發熱繼此必得慢脾風纔見搖頭斜視以手  
摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其聲沉  
小而焦卽是脾風之證不必皆由急慢風傳  
次而至又當識之鈐方此下云又慢脾之候  
言脾而不言胃何也盖胃  
爲腑屬陽非若脾乃陰臟也故小兒病傳在  
腑多自愈在臟不可不治盖小兒純陽之氣

在腑為順在臟為逆古人皆理其臟未言治  
 腑也又腎一臟常主虛不可攻治若腎臟有  
 患但清心肺絳心與腎即所濟也肺與腎又  
 子母也無與腎藥及諸補藥也慢脾惟吐與  
 瀉積血痢傳入慢候其証變至速虛又速也  
 治必循次平和無令速愈之理既和且平調  
 脾養胃不可過劑也錢氏有黃土湯以土治  
 勝水木得其平則風自止以脾土為本也治  
 法大要生胃回陽黑附湯川烏散金液丹白  
 圓子各半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸  
 復則異功散輩溫平而調理之如蝎附散陰  
 痢散靈砂震靈等亦可參用 若其眼半開  
 半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽

或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫  
 黃附子丸服回陽湯劑手足漸煖者仍以醒  
 脾散等繼其後以調之 鈐方此下云慢脾風  
 如燈無油漸見昏滅錢氏用金液丹與青州  
 白元子各半細研和勻飯飲薄荷湯下乙錢  
 半許此截風回陽又一方以四君子湯加黑附  
 子末四錢之二脚手冰冷者用每對半生薑  
 棗子煎服古人之善也 慢脾下痰輕者神保  
 和同常服盡世之善也 既濟丹白僵蠶圓重者辰砂膏甚則七寶妙  
 砂痰慢驚慢脾逆惡證候諸藥不效者如有  
 太衝脈則取百會穴灸之此治慢脾風之大



要然也雖然小兒有病問之則幼不能言望  
 之則易驚易喜診之則或揚或動自六歲以  
 下黃帝不載其說者以其難也又况驚風特  
 科古無全書則尤為難如前所云固足以知  
 三證之詳矣至於辨析體認通變之際有言  
 而不能盡其蘊者可不深加之意乎驚風一  
 也痲痺發痲卒中夭癆撮口亦風之種類焉  
 痲者手足冰冷痲者舉身僵作痲痺本一  
 病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗

肢體強直腰身反張甚於風痲大抵不治

痲者目瞪涎流神氣鬱勃四體不收沉默昏

滑似死似生其聲惡叫身軟時醒有聲者為

為痲痲凡治驚遇咬牙啼痲亦多種錢氏有

牛羊雞犬猪之說大抵以風驚食三證別而

治之 中風者五臟各有麻證隨五臟俞以

施灸法與大科則同特小小分劑耳 天癆

者身體壯熱翻眼擡精手足搐掣其狀如魚

之上釣又內虧腹痛多啼唇黑陰腫偏優反

張眼有紅筋斑血乃寒氣壅結兼驚

得撮口者壹臘內之篤疾臍風胎風鎖肚弔  
腸卵疝俱不撮口蓋風入心脾故令小兒氣  
促口撮如囊而不乳也 其有初生百日頻  
頻吐兒呵來噴去睡裏多驚眼翻肚脹手足  
緩怠煩燥多啼者當作胎驚風理之 又有  
變蒸亦發微驚不治自愈 又瘡豆欲發亦  
或搖掣如風右鼻冷脚冷尻冷耳後有紅脈  
赤縷者必是瘡豆之證戒不可以腦麝開腠  
及銀粉巴硝轉下而冰壓之是辨析之不可

不審也至若眼陷無光白睛灌人瓜甲青黑  
四體垂羸一臟氣絕不面赤如緋面青背冷  
頭目仰後足冷目青腹脹胷高手拳脣膈唇  
舌鼻黑魚口氣麓顛腫顛坑啼哭無淚冷汗  
不止汗出如珠如油眼青渴黑血悶涎入心  
肺噓舌出口咬人五硬五軟五冷五乾皆惡  
證也 急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳  
腹肚搖動或神緩而摸體尋衣或證罷而神  
昏氣促噴藥不下通關不噉心中痛絕忽大



叫者難愈。慢驚四肢厥冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鷓聲兩脇動氣口生白瘡髮胃閉損也直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊。慢脾身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背毋口噤頭搖者最難爲力。或者慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸麓大脉來浮數是謂陰盛強陽錯認以爲陽氣已復直與峻藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺咎之此則不識覆燈將

絕之證雖不下藥亦無生意矣。又有喉中痰涎聲如拽鋸壹兩日間但閉目不開者此爲虛候之極虛痰飽養其氣然也凌遽下痰亦未可保姑以蘇合香白圓子輩與之。他如急驚安靜之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後淹延必至沉重若急驚證候徒知定搐不去驚熱纔見搐定遂指爲安未幾復搐是爲過街候。若慢驚之候藥服已瘥尙虛乏數日未省者或妄攻之則前

功俱廢是體認之不可不精也其或傷風傷寒傷暑傷濕傷食停積疴勞煩渴盤腸肚瀉諸瘡疽證皆因之而發風須當體認隨其證療其病正病去則風自去矣按錢氏方小兒發搐身熱喘急日斜露睛四肢逆冷李醫槩以定驚搐壹劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐為肝實身熱喘急為肺虛目斜露睛為肝肺相勝四肢冷為脾虛治法先用益脾補肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安 一證直視而不能食或謂神祟使然錢知其為肝旺勝脾與之瀉肺而愈

一證吐瀉或利小便過多以致脾虛不食錢用益黃散作效已經數日忽爾不語眾醫類以失音湯劑生之竟無寸效錢氏用地黃圓數劑補腎於是能言所以然者前乎清利小便太過遂使脾腎俱虛雖已補脾而腎尚虛故爾 至論肺虛痰實治法當下散下之必先益脾然後瀉肺經云欲瀉其子先補其母此錢氏要訣錢氏方瀉青圓瀉白散導赤散瀉黃散宣風散乃瀉五臟藥益黃散白朮散阿膠散地黃圓皆補五臟心中驚熱清心而熱不退則與之助胃



胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便  
難則不爲之疏利蓋利之則胃愈虛而身必  
冷其有傷風寒而吐瀉者欲止吐瀉不特溫  
脾須以發散之劑先之風寒散而吐瀉自止  
矣不特此爾小兒平常服藥過多頑玩臟腑  
調和之劑不愈則易之以攻擊固守之劑太  
過則時乎而疏利主治在我不可不問源流  
不可端徇病家所欲圓機達變消息輕重而  
應之其通變之不可無法也大藥小兒臟腑

柔嫩易實易虛易冷易熱兒有大小壯弱病  
有輕重淺深所貴乎目視指切意度心惟醫  
權藥衡斟酌對治用之得中爲上矣

虎口三關訣法

虎口者以手處是也三關者第二指之三節

是也徐梅指爲近虎口第一指爲初關亦名

風關第二節爲中關亦名氣關近指端第三

節爲末關亦名命關男以左手女以右手側

看之驚風初得救出虎口或在初關多是紅



色傳至中關色赤而紫看病又傳過其色紫  
 青病勢深重其色青黑青而紋亂者病深重若見純黑  
 危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫  
 者驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有  
 主急驚風青而淡紫伸縮來去主慢驚風紫  
 絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾  
 風凡手紋在初關者易治過中關者難治透  
 末關者不治三關直透大抵不治然紋勢彎  
 曲入裏者病雖重而證順猶可用力若紋勢

得反出外駮駮靠於指甲者斷不可回其有  
 三關紋如流珠流米三五點相連或形於面  
 或形於身危惡尤甚陽為男陰為女三關  
 虎口紋男以右手女以左手驗之蓋取左手  
 屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主耳  
 然男女一身均具此陰陽在右兩手雖皆參  
 驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾  
 然此消息只得變而通之之意詳論夫謂  
 脈皆發痛方論



痛者小兒之惡病也小兒血脈不斂氣骨不聚爲風邪所傷爲驚怪所觸爲乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣怫鬱瞳眼直視面目牽引口噤涎流腹肚澎緊手足搐掣似死似生或聲或嘿或項脊反張或腰脊強直但四體柔軟發而時漉者爲痛若壹身強硬終日不醒則爲癎瘵矣癩曰五癩病關五臟而赤目瞪吐舌嗜齒心主煩燥氣短息數者曰心癩面青唇青其眼水窻手足拳攣抽掣反折

者曰肝癩而黑而晦振目視人其吐清沫不動如尸者曰腎癩面如枯骨目白反視驚跳掃動亦吐涎沫者曰肺癩面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰脾癩此五臟之證然也調理之法惟以驚風食三種陰陽二證別而治之風癩者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱生痰是也驚癩者震駭懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神魂是也食癩者食時得驚停宿結滯其初吐乳不

補大便酸臭或結成乳癖先寒後熱是也別  
之以陰陽則始者身體有熱抽掣啼叫是爲  
陽癩陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此  
猶易愈始者身體無熱手足清冷不抽掣不  
啼叫是爲陰癩陰病脈沉面色黧晦病在五  
臟骨髓此最難痊或以仰臥屬陽覆卧屬陰  
亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒  
風癩則先爲之散風驚癩則先爲之利驚食  
癩則先爲之消積續以定癩等劑主之若臟

若腑一陰一陽是固不可無別大槩血滯心  
竅邪氣在心積驚成癩通行心經調平心血  
順氣豁痰又其要也繼令小兒有熱有痰不  
欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癩之漸  
卽以紫霜圓導之時間量與紫霜圓減其盛  
氣則無驚風癩癩之患癩證方萌耳後高骨  
間必有青紋紛紛如線見之急爲爪破須令  
血出啼叫尤得氣通澀濯兒衣不可露天恐  
爲純雌落羽所汚染觸其間未有不爲癩也



扶邪恠者面色變易不常見人羞伯諸癩瘡不能言者益咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮爲末雄猪膽汁調和少許啖之輒効若夫錢氏五癩圓并南星散以昌蒲煎湯調下甘遂猪心湯以和蘇合香圓皆治癩之要藥也故表而出之

諸癩不治證候  
目睛不轉  
眼生白障  
眼慢

唇黑  
瞳人瞬動  
眉間色青黑  
面青指  
黑  
口中涎沫如白膿  
口噤肚脹不乳  
喉如鋸聲多睡不乳  
身熱下血不食  
身體痿軟不醒  
腹滿虛鳴  
厥逆而痛  
吐利不止  
汗出壯熱不止  
卧久不寢  
癩  
瘡身體反張大人脊下容側手小兒脊下容  
三指並不治  
諸癩僵仆搯掣但扶持之謹  
勿把捉  
其可以治  
風濕  
諸癩  
藥  
小兒論髮際穴  
谷多  
效  
風濕  
諸癩  
中  
風

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以截風路也諸風驚證藥力不及昏迷沉絕嘿然無聲於此灼艾每有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳前集所載百會一穴在頂心端正施毛間亦濟危困者以是哉

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用  
小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用腦麝麻黃以通其關窮銀粉

巴硝以下其痰熱蓋不得已而用之其實爲風熱盛實者設也世俗無見不權輕重每見發熱發搐輒用腦麝蟾酥鈔霜水銀輕粉巴豆芒硝等劑視之以爲常惟其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉爲慢驚吐瀉胃虛荏苒時月驚風之所爲難療者正坐此也萬壹發熱驚搐本爲傷風傷寒傷食瘡豆而作誤藥至此其爲害豈淺淺哉以理觀之能用細辛羌活青皮乾薑荆芥之類以爲



發散勝如腦麝能用獨活柴胡山梔枳殼大黃之類以爲通利勝如銀粉膏硝設或常用而不可無之亦須酌量勿過可劑此幼幼書所謂瀉青圓導赤散乃醫用之上藥者良以是歟故論此以爲輕用藥者勸

### 論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之然其風氣暴烈非蜈蚣能截能擒亦不自止但用之貴乎藥病相當弗容固執或半字或一字或

桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉當以蚯蚓桑皮爲解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右盼伸手握拳悶聲發氣情態不若尋常如此者有驚卽散驚有熱卽退熱壅實卽去壅實熱退則不生痰驚散則不生風壅滯通則氣得其平病無由作是同當以吐劑治之若夫患在痰熱全未有風癇搐搦顛引之狀則只與退熱壯痰如參蘇飲之類



可也謹勿妄投通關利腠等劑忌或透其熱  
流入經絡反成風痰此又小兒無病不可服  
藥之戒  
世俗玩習以為小兒體熱或遇澡浴即與久  
坐湯水之中風冷外傷水濕內滲頃刻間遽  
成風搐或惡叫頻吐或昏迷失音或洞泄不  
已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒人等  
管見大全良方說  
常服驚藥說

凡小兒無疾之時不宜常服藥餌或有些小  
驚恐欲常服驚藥只宜與天麻防風圓與生  
犀膏其藥性平和不冷不熱久服不能致疾  
如金箔鎮心圓性寒不宜輕用  
小兒急驚諸治  
凡小兒驚風則涎潮上咽喉中痰響勿令以  
藥吐之但以藥壓下涎令歸骨節也  
若小兒涎盛搯搦間但扶持不可掄捉恐血  
脈不流涎不歸元令兒偏廢手足也



治病百法

痰驚潮搐

夫小兒三五歲時或七八歲至十余歲候驚潮搐涎如拽鋸不省人事目睛喘急將欲死者內經曰此皆得於母胎中所授悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者為驚弔重者為癇病風搦為腹中積熱為臍風已上諸候可用吐涎及吐之藥如吐訖宜用朱犀腦射清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂

定魄之齊定志丸之類如婦人懷孕之日大

忌驚憂悲泣縱得子必有諸疾治法雜論小兒風熱涎嗽

者可以通聖加半夏同煎溫服

十形三療

戴人常曰小兒風熱驚搐乃常病也當搦時

切戒把捉手足握持太急必半身不遂也

血偏勝必痺其一臂漸成細瘦至老難治當

其搦時置其竹篋鋪之涼地使小兒寢其上

其搦時置其竹篋鋪之涼地使小兒寢其上

待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷人  
小兒手足搐搦漸次睡與全水飲命當  
李氏一小兒病手足搐搦以示戴人戴人曰  
心火勝也勿持捉其手當從搐搦此由乳母  
保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令  
復洒之令極濕俛卧兒于地上良久渾身轉  
側泥洿皆滿仍以水洗之少頃而差

兒寐不寤

陳州良吏一小兒病寐而不寤二日諸醫作

睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚丸及  
水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟  
有驚乎以子之病乃問于戴人戴人診其兩  
手脉皆平和戴人曰若驚風之脉當洪大而  
強今則平和非驚風也戴人竊其乳母亦三  
日前會飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見  
餉酒味甚美三飲壹罌而睡陳酒味甘而戀  
隔酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花  
縮砂仁貫衆煎汁使吸之立醒



澹寮方

急慢驚風小兒發癇俗云驚風有陰陽證因身熱而赤而發搐上視牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐而不瀉日漸面色白脾虛成冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也陽證用涼藥陰證用溫藥不可壹槩作驚風治也又有壹證欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

醫說

衛生寶鑑

閻孝忠辨急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可悞也急驚由有熱熱即生風又或因驚而發則自爲連斜潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之劑壹貳服



候驚勢已定須更以藥下其痰熱利下痰熱  
心神安寧即愈慢驚得於大病之餘吐瀉之  
後或誤取轉致脾胃虛損風邪乘之似搐而  
不甚搐此名瘵瘵似睡而精神慢四肢與口  
中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲  
此證已危蓋脾胃虛損故也  
潔古老人辨急慢驚風  
急驚陽證小兒咳嗽痰熱積於胃膈屬少陽  
諸膽腑受病也謂熱即生風或因聞大驚而

作譫與在震卦得火氣而發搐火本不動焰  
須風而動當用利驚藥與導赤散瀉青丸地  
黃丸搐止服安神丸天麻散風小亦同  
慎驚陰證小兒噴瀉病外脾胃虛損大便  
燥實去則特出風池以宣風調導之使用史  
蘇子加滋養藥其痢即止若不早治即成慢  
驚痰涎積聚抽搐而喘甚則胃虛損痰積肝  
木所乘屬驚風變病也燥濕補送治驚去積  
拔粹煎時驚風同無所視聽之聞睛耳無所



對對魚慢驚風

潔古因急驚漸慢證也後世誤服遂以降火驚  
驚麻藥驚風藥亦清瀉青地瀉麻淋瀉黃芩  
搐疳宜服安神丸除風散  
慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐  
而筋微搐亦名瘈瘲脈有力先用宣風散導  
引復麻益黃散平之天麻防風丸亦可

犬凡小兒過煖生熱熱極生風提抱疳癰饑  
餉牛癩也氣性肝火麻而發證以木不濕故

省翁活幼口議主風其脈五熱其脈并熱其

脈其議急慢驚風等證候總療以自驚風因

驚者物也嬰孩小兒心氣亦足智志率伏

恍惚無定神不守舍怯人怕物漸作怖畏怖

畏之盛已作恐懼恐懼之多乃抱狂松泄松

之久則自惕惕惕既既有瘰癧已為斯必必

氣不足而生之漸正訛云漸但分輕重耳又

有心氣虛弱暴觸作驚更不由漸即便而青

唇白視之定睛目無所視聽之聞曠耳無所



其神氣慢驚風  
潔古曰急驚者陽證也客熱勝心因驚  
實麻涼驚并導赤散瀉青丸瀉脾并地黃丸  
搐正宜服安神丸  
慢驚者陰證也因吐瀉病久脾胃虛損似搐  
前不似搐亦名瘈瘲脈有力先用宣風散導  
赤散用益黃散平之天麻防風丸亦可  
大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱并癱餒  
餉牛癩也

省翁活幼口議  
主風其脈五熱其神昏  
驚者物也嬰孩小兒心氣亦足智志率伏  
恍惚無定神不守舍怯人怕物漸作怖畏怖  
畏之盛已作恐懼恐懼之甚乃馳狂松泄松  
之久則自惕愕惕既有瘈瘲已為斯必必  
氣不足而生之慚正訛云慚但分輕重耳又  
有心氣虛弱暴觸作驚更不由漸即便面青  
唇白視之定睛目無所覩聽之聞聾耳無所



聞精神頓亡心智全失及至良久收斂且五臟六腑虛處所受驚風而作疾已述前議然幼幼多因吻母不意之乳耗其心氣作驚以漸凡小兒因水火所加者悸也自跌撲所致者恐也人物之所觸者愕也惕惕不散鬱鬱悶於胃堂者怔忡也是知積驚難散由其不能自化如恐恐悸悸者蓋自能知之矣不爲積聚且怖畏之誠常在其中無以自遣偶因觸悶心神其肝主風其脾生痰其肺作熱其

心發驚四證相臨重者先發假如雷聲霹靂至響不爲咎者何蓋聲相應情無所加矣惟有小兒在僻靜處或神廟中心存怖畏之時忽被無知小人戲叫鬼來鬼來且兒奔走無門驚氣入心若不速利其驚氣少頃則指甲黑唇口青所受重害不可得療理自古及今調理嬰孩最爲難事悉皆憑藥取愈且驚風至難也慢驚又難也慢脾候尤難也今摘述調理小兒至難者證候前後有所不堪療理

或古人未備其意或已著于集後人未明者  
今與詳悉本末開陳利害指於迷塗直徑可  
進庶有益於學者曾次務家治產之夫及仕  
宦子弟易曉其理勿勿陰陽稍有偏側遵而  
扶之不至夭橫暇日熟研可補緩急良士一  
觀足知野老肺腑意不藏機亦無緣飾巧偽  
更無妄語隱情直欲普濟使嬰孩初生自幼  
至長有患無踈受疾不害權忻鼓腹歌笑嬉  
娛父母即無鬻眉蹙頰憂苦之歎怡然順事

不勞再三快哉妙哉至誠減獲休焉  
以令議急驚風證候  
議急驚風證候止寬反張搐搦口流痰涎壯  
熱併有之其或有視左視右者有僵有仆僵仰  
也屬陽仆拳握指有囊有外醫勞男安定陰  
陽順逆之理有左右引搐連及脚手身體顛  
動初則搐搦俱作久而搐往只搦有急有緩  
但只肩動也癱瘓瘳瘳者候之輕也搐則癱  
也搦又重也反張牙關緊急喉中有涎餅是



驚風候如牙關不緊口無痰涎只反張搐搦上竄者未可使作驚風候蓋夾驚夾食傷寒疹豆或三焦蘊熱五臟不宜流入經絡熱在筋脉亦作搐搦錢氏云搐有真假不言病也前有云急驚量其分數者是約熱之輕重而與利之

議急驚若是正候氣蘊涎潮其證候猛緊不只徐徐而來搐卽急促唇口眉眼眨引連併俗諺云急驚驚爺娘慢驚驚藥王然雖是說

治之有法輕重調理

議急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散不移其時弱搐又作所謂過街候乃是醫家不明纔見搐定便言安樂僕謂急驚風難治有三項有初驚時其風痲發作斟酌輕重去風定搐隨而愈也斯恐庸醫或常人執以治便平之既平不諸證猶存者其難治也又其見正搐親人一向執捉不令渠搐且風痲不得

縱恣游入經絡藥力不及雖病減瘥根在血  
脉或注經絡二難治也又兒患候有順有逆  
順卽易理逆卽難療惟恐病延既久不得良  
餌證候傳變越去元由而作它證者三難治  
也

議治急驚風候用藥非謂難也專至審察病  
候循其法度不荒不佞次第下藥無不愈之  
理多是病家倉皇不求善醫信乎山野庸鄙  
之言病候延久不無傳變傳卽證重變卽候

惡凡經二三手醫藥不效兒受困苦無能安  
樂士夫之家收方錄證一日兒病證候危惡  
緊急臨時以何方對治告急無門衆口磬磬  
皆言有藥不明端的壹向攻擊信乎見識淺  
陋擔負不起有乎得失用藥不及則無妨事  
可以療理若也大過卽時害生

議療嬰孩豈可以藥有悞投之大過或不及  
由尚不可况越證候乃爲柱究兒童雖分長  
幼有忠臟腑背令怯弱易冷易熱易虛易實



若攻之相重其不任彼藥孰言疾不瘳反爲  
它害曷不謹歟今著議急慢驚風及慢脾風  
方藥卽是老漢指準應備緩急至要尅效之  
者不得更較可否之理  
議患驚風痰熱癇瘵此八種候惟瘵與  
瘵少有識者類同驚風發作之狀瘵脚手冰  
冷瘵舉身僵仆癇瘵不殊目瞪流涎手足搐  
搦十歲以下常作驚風卽謂之癇至十歲以  
上所發則曰癲

議驚風痰熱已論在前且驚與風其痰與熱  
各自有本證候受病急風爲疾四者併聚有  
驚有風有痰有熱或因驚而有風生痰作熱  
或有熱而作驚成風生痰或積痰而發熱熱  
盛生驚變風或久有風候痰涎常有因驚而  
發熱調理嬰孩童稚四者形證一不可有善  
明脉醫士於暴作者亦常知之理驚截風混  
熱化痰久盛二者醫風散熱療痰鎮驚四證  
相須藥宜併理古人處方亦合此意然學醫

者不可不究其源遠若見候將作尋常用方  
輕忽病無少安證傳宅候不逆且惡禍不旋  
踵

議嬰孩急驚風候便須先審察四證四證之  
中而作八候八候者一搐二搦三掣四顛五  
反六引七竄八視一搐者臂肘搐縮二搦者  
十指開合搦之不已卽成握拳男子看大拇  
指其指握在外爲順在裏爲逆女子反看之  
三掣者肩膊搐掣或連身跳起四顛者或手

或脚或頭或身四體顛動五反者身首反張  
六引者以手有如挽弓狀男左手直右曲爲  
順右直左曲爲逆女子反看之七竄者眼上  
竄覷高男子左竄爲順下竄爲逆女子反看  
之八視者男子斜目視左爲順視右爲逆女  
子反看之既有四證八候次第隨生若只去  
得驚風且痰熱不散未可言安痰與熱聚將  
來必致癩疾所治之法其痰與熱須察之可  
下卽下痰熱既下驚風未盡消去則病依前



又有發作所言四證相須不可留一若理得  
驚風已定隨便下了痰熱且驚風不復有作  
此理至爲妙也不始末何言安熱與驚風  
議嬰孩有患在痰熱未有驚風者只可退熱  
化痰不宜妄投驚風藥何也驚風之藥其味  
多寒涼經絡本自無事稍有攻擊透其痰熱  
入於經絡却成風痰之疾搐搦致之  
議嬰孩五臟經絡虛卽生風既虛所受且驚  
然而有作驚風有作八候次第而生所謂

兒無病不可與服攻擊所治之藥

議嬰孩有小太有壯弱驚風發作有淺深但  
輕重大者加分劑重者多與服數乃合其理  
議嬰孩開響卽掣跳者乃肝肺不足魂魄不  
穩故神有不安卽開響掣跳者非謂驚風犀  
角地黃圓主之又兒心氣虛怯神不安庭連  
併掣跳者宜與四君子湯加煑砂脾胃氣壯  
神魂俱清自然不恐  
議嬰孩欲發驚風候先神不定顧左復右觀

上及下或已定其睛凝其神恍恍惚惚怕物  
懼人不若常相嬉戲者急當療之如有熱先  
退熱有驚散驚熱退不生痰驚散不作風良  
久自然安定神情和悅氣脈舒暢若待風變  
而理驚痰盛而退熱事由至緩不若四證俱  
全由可治療  
議嬰孩急驚風發搐手足不可執捉及以手  
用力灸之卽傷經絡經絡既傷亦無所益則  
擦肢害體

議醫急驚風候有大有小有輕有重有順有  
逆有偏有正詳審久暴次第進藥且病家無  
不倉皇驚恐醫家須是正定無自昏惑

議急驚卽日用醫其驚氣和平方可調理若  
以急驚之謂調理事致緩也慢醫准此消息  
議醫急驚初用藥在我則我依證候遵法度  
參傳變審緩緊治之切不可信病家乃左右  
人說其所欲稍順人情有平得失主治在我  
豈可妄信致之差謬罪累誰耶



議急驚初無痰而後痰盛初有搐而後不搐者此證所傳候之至盛人少知之蓋由初醫縱恣病家不謹經三五家用藥或庸士所見不同有太過不及之害如此曷不謹歟議醫急驚須量輕重下之得其中爲良且驚風頓去痰熱已化不作後患所下之藥稍多巴霜膩粉爲重卽傳慢候無疑議嬰孩有患風痙風痙風中等證候皆上竄拳搐號曰天弔書載甚多初無痰後有痰初

作搐後不搐不拳身直皆風之惡候已是傳過若作驚風更與下之爲害必也議急驚欲下之理須在急驚上竄斜視反張所作之時可下若傳過或已搐定少緩之間未可直便緊下有乎得失議急驚用藥先與服截風定搐次與下熱熱去則無風風散則不搐是知以藥之功在我意設不至恣妄爲咎到此顯功方知難易議急驚有上竄者有搐有搦有引有反有僵



有仆有叫者有淚者有痰涎潮盛有溫壯發  
作各隨四證輕重而受之急驚截風定搐爲  
要風搐既定諸證漸息定搐須用通關非搐  
鼻之  
謂截風乃用調絡  
議凡定上竄左視乃於男女之順候忽反是  
則逆也大抵逆則難治順則易理不以逆證  
候爲不可治古人言難治謂陰陽相反證候  
乖生須用審究其證詳察其候以意盡力致  
之取效而弗謬者爲之奈何

議世方有一云治急慢驚風候者言之失意急  
驚及陽癇慢驚乃陰癇正恐治陽作陰治陰  
反陽豈貴藥以全兩證又有云治陰陽二證  
傷寒之說能曉此理可謂通變

議急驚候至爲要急在於片時之間若或差  
殊互有得失虛時所見見其端的用藥無疑  
尙在疑情未須投藥藥發無疑其意辨善疑  
在未發藥之前良且妙矣  
議急驚頭額心背死被灸者決定發癇不



可常藥僕嘗謂風癩可灸驚熱不可灸蓋風  
與癩痰涎壅盛胃觸膈室昏亂逆悶不能省  
知心如所失既灸著穴痰化心開即漸安愈  
驚之與熱心神常存聞知救急忍痛不能驚  
悸轉盛其疾差重所以用艾在先藥必未有  
益  
議驚風疾愈未嘗見因灸而活每見老嫗鄙  
婦無術只投艾炷兒生三五日之間便以艾  
燒之不惟失穴因痛增悸經絡未全如何愈

病智者汨詳不可枉究  
議初生尙爲腐血三五七日有患弔腸鎖肚  
世言人帶鎖匙相衝愚曰非也客忤所致初  
生氣弱不在其邪肚緊青筋脇助脹滿氣促  
禁口不乳斯證但用真珠天麻圓下之纔通  
即愈屢救初生無不獲安若經患服藥得痊  
長大皆肥壯重實未詳其意請較之荅曰初  
生之兒方離淤滯分降之後偶被邪氣于亂  
臟腑微怯不受其觸故作疾曰弔腸撮口鎖

壯乃以天麻圓推下惡毒虛邪之氣悉去而  
脈順得流行臟腑和調充實自然肌長氣壯  
形神俱備體質醇厚誠爲可愛  
議嬰孩又有臍風因斷臍不如法有傷臍帶  
受濕乘風由此成患皆能撮口乳食不下膨  
脹青筋脚直無力只依臍風治法  
議發急驚風吼叫三兩聲者難治心受驚觸  
痛絕于內乃傷其根本之謂  
議發急驚風未投藥四證俱全已服藥四肢

垂禪者難治

議急驚噴藥者難治又藥不下者亦難治

議急驚搐搦之後四體俱軟者難治

議急驚發作之後脚作擺跳者難治

議急驚搐後目睛翻轉者不可治

議驚風搐搦已住神情緩慢手尋娘衣或尋

自身體者亦不可治

議驚風諸證候盡皆已住但神情昏慢氣促  
者未可保治



議驚風證候已住其兒拈物不捨情性緩緩  
於中非謂十全必其再發之理如或再發不  
可調治矣

議急驚風鼻中出血者易治口中出血者難  
治鼻中出血者其熱已散故易治口中出血  
者心血妄行故難治

議驚風屎尿已遺者難治大小便閉者易治

慢驚風傳變

治法  
截要

凡慢驚風候若是急驚傳來而尚陽證其陽

卽虧不必回陽又不特治陽只可截風調胃  
均平陰陽可冷可熱可緩可急是也若直便  
與服附子流黃之屬使陽歸陽又是急驚學  
者理宜知之既知陽證傳作陰證卽與服保  
命丹三二服兼前牛黃清心元子其有四證  
且入候稍緩疾成陰癩者卽與服之若已傳  
過入候不作四證尙存只冥冥者與服定命  
飲乎若脚手冰冷者乃四逆候方可回陽次  
第眼合者卽傳作慢脾風候其兒驚風痰涎

壅盛搐搦不止不可下者宜與靈脂元其痰壅熱盛口角自垂者白羌元功效驚風搐搦身體雖煖風痰不化宜服天南星元此藥議嬰孩所受此等證候別無他疑者只依下頂用藥無不甦省切不可延久其陽易化陰氣漸盛藥力不及使人難治又不可一向連併投藥每次一二服了須審察證候緩緊有無傳變稍覺寬定其藥放慢或勢漸緊宜以次第緊急藥與服不可執殢一藥又不可便

換湯餌連併與之所謂察其輕重審其進止而後已今著妙方不勞檢閱修合如法對證投治尅效萬一此藥議慢驚若是急驚傳來是知前人不曾截風定搐陽脫而傳陰陰重傷其風與熱隨流縱入經絡又有曾服太寒涼之藥過多又有下積取瀉致作又有臟腑虛寒洞洩而爲其所受多端已載前篇藥以此藥議理慢驚常知陰癘之說其證屬陰穢寒氣



虛或尚泄瀉不止且驚正作多因無識之人  
一向治驚更不理瀉藥用寒涼投之令氣愈  
虛曳瀉不止陰證愈重驚搐愈增若用化瀉  
藥陷熱入候復加四證不退慢驚雖曰難活  
蓋醫亦不曾究竟病作加進深爲重害  
議慢驚當察所之視爲要眼睛昏定爲重窺  
視爲重四肢厥冷爲重睛定不眨爲重雖眨  
不左右顧亦重汗出如流亦重口而忽作黦  
黯色至重或風搐弱慢驚眼在半開半合之

間乃知陰氣所盛傳入臟間陽氣已虧脾經  
屬陰次第入脾故言慢脾風候  
議醫慢驚與急驚風候自是不同未可一向  
下 搐藥急驚謂關竅不通故以腦子射香  
等藥通利定其搐搦慢風陰重陽虧諸經尸  
虛不宜通關又涼其臟易作慢脾風  
議醫慢驚不可爭攻急驚陽癰稍易理慢驚  
陰證最難治服藥已愈而尚虛乏未省三五  
日之間者有之俗謂過街候發無定論不可

輕易妄劑投之攻擊則前功俱喪  
議慢驚所治之理須究問元因所發若是急  
驚傳陰為慢驚者乃陽癰所作陰癰也當察  
陽證未純其陰證用藥斟酌如因洩瀉而作  
慢驚者男兒為重如因吐逆而作慢驚者女  
子為重即陽脫而陰盛小兒有長幼之別臟  
腑有虛實之分有瀉三五次便成風候乃由  
虛之盛也或有二三日泄方成風候或有五  
七日瀉不止而成風候暴瀉成風由可速治

蓋回陽調中補氣之為易若久瀉漸傳成風  
候者為虛為乏故難療理  
議嬰孩小兒洞泄成風以補藥治之宜用附  
寒洞泄取瀉成風因藥宜以溫脾止氣藥調  
當服宜服觀音全有服寒涼藥成風下藥太涼  
之身散愈之有服寒涼藥成風下藥太涼  
先寒運涼藥吐以助氣醒脾藥溫之王氏大  
瀉即抽成風候以助氣醒脾藥溫之王氏大  
喝起散與服之即效若手陽癰傳作陰癰者  
足冷回陽木附湯效  
急驚傳作以截風藥治之藥在前方截風定搐  
慢驚風候以截風藥治之藥在前方截風定搐  
驚候便以截風藥治之藥在前方截風定搐  
病自虛乏得之所以未為當蓋由



議慢驚證候所以用藥不壹治療不等由發  
作不同故述在前雖則四者之議猶爲大槩  
智者得之開發詳其輕重可否之意而施設  
之  
議醫理慢驚之候其意在慢治急驚之候其  
意在急何也且急無過因熱生風作驚跌撲  
作驚他物觸之作驚驚熱傳極卽變生風搐  
搦等候皆熱所乘若也順證依法下之諸候  
自息然慢驚所作不常當宜省察用意子細

所以故宜消息爲之慢也不可倉皇恐懼有  
乎得失非失治躊躇疑貳之爲慢也又曰慢  
驚無爭攻蓋所療至爲難事無妄當何受何  
議醫慢驚不可與語無妨疎脫有之無誠不  
謹亦有之無見不明亦有之又不可言難恐  
於人事俱存妙理究竟深得法度者投藥必  
愈不曉於理裁度求良者乎萬無順人情投  
餌既無可否之說或所見不到卽與善術  
者調治庶不枉究也壞證傷候必敗其德

實有勉強倉皇者耶

慢脾風候

治法  
截要

慢脾風候卽是慢驚風所傳元由吐瀉脾虛驚與風傳入故曰脾風謂其脾家受風若更逐風無風可逐皆也退驚無驚可療但有療涎虛熱來去兒病至此所以難醫蓋由證與候驚與風傳經已極摠歸虛虛惟脾所受何故不曰胃風胃屬陽其病卽傳陰臟故無胃候兒既尚有胃氣可以一向主胃兼與回陽

卽漸甦省若更一向攻擊驚風脾亦不受而又傳散諸經不可得而加藥若見眼合卽是脾風宜服下項藥

議治慢脾風乃是不得已而設其疾危如燈無油漸見昏滅錢氏所用金液丹又青州白圓子各半細研和勻飯飲薄苛湯下壹錢半錢許此乃截風回陽又一方以四君子湯加黑附子末四分之二脚手冰冷者用和對半生姜棗子煎與服此方古人用之豈不同常



所較下項良方亦盡世之善也

議治慢驚慢脾須禁腦麝膩粉水銀粉霜之類及寒涼動臟腑等或以燥熱俱不可用只宜回陽醒脾湯使與服

議慢脾風候十箇孩兒有个以艾灸之須當斟酌病候有已未脉絕之理若也豈臟絕卽不可用藥謂如眼無光指甲黑四肢垂躄五體俱冷並不可勉強下藥

議慢驚風候至於痰涎在膈之時諸臟皆虛

喉中聲如拽鋸壹一日之間不散但只閉目

此乃虛之盛也只是虛痰飽養其氣未有所知之者直便下去痰涎其兒隨時化去宜用下項妙砂丹服之乃良

議嬰孩所患急驚慢驚脾三者皆由風痰所作以漸傳及未有初得病而便慢脾或急驚傳來或卽吐瀉而得久痢其氣虛脫而得傷寒表裏俱虛傳入陰證亦成慢候久嗽成癩亦傳慢候霍亂吐利亦傳慢候脾困久睡亦

作慢候吐血亦傳慢候虫積衝心亦傳慢候  
 肝風筋急亦傳慢候大小便閉亦作慢候心  
 虛煩躁亦作慢候煩渴引飲亦傳慢候腹肚  
 疴痛亦傳慢候睡裏咬牙亦傳慢候日夜汗  
 出亦傳慢候走馬疳急亦傳慢候諸般丹毒  
 亦傳慢候童帶纏腰亦傳慢候膀胱疝疝卵  
 腫莖曲亦傳慢候莖曲陰莖勾曲四體浮腫亦傳慢  
 候以上小兒所患諸疾皆能傳作慢驚風候  
 由慢驚乃傳作慢脾脾氣既絕胃氣已盡無

可得而治療故也

議嬰孩五臟易冷易熱易虛易實醫方並不  
 治腑受病曰脾不病耳曰非也小兒在腑者  
 疾自愈者有之在臟不可不治臟者陰屬腑  
 者陽屬謂小兒先陰而後陽又曰小兒及純  
 陽之氣在腑則順在臟則逆故前賢若謂其  
 臟未言治腑也又腎壹臟常主虛不可攻療  
 若有腎臟患但清心肺緣心與腎即既濟也  
 肺與腎乃子母也無與腎藥及諸補藥若治



腎臟卽他病發生故戒止不可療  
議嬰孩慢候皆由虛陽虧陰虛應小兒所  
患臟病陽虛陰盛者無不入慢候而難惟此  
與瀉痢與積致人慢候其證速也虛又速也  
宜用良方治法循其次第無不獲安然其慢  
驚脾無令速愈頓瘳之理既和且平更用調  
脾養胃萬萬不可過劑用冷熱湯藥若失之  
卽時哉正細微公易難家識及醫計並不  
再辨痢疾證候也

古方具述多端王氏著載有三驚痢風痢食  
痢風痢之疾由於風熱而作驚痢之疾由於  
驚積而得食痢由於食時而得其驚三者發  
作大抵相類風痢有熱生痰驚痢神魄散亂  
恍惚無定食痢因食而致驚食未尅化氣佇  
關鬲之間生痰致風由風成痢  
議治風痢先用化痰寬利胃膈開通關竅安  
鎮心神定其搐掣然後與治風痢藥服之  
議治驚痢先涼三焦利驚去熱安神定志平

調臟腑溫化痰涎然後與治驚癇服之  
議治食癇先用推下關鬲停積驚氣次和順  
中皖次安臟腑然後與治癇藥服之

議曰驚之與癇風之與熱皆迥相襲有熱  
必恐有風有驚必懼成癇治風先退其熱  
治癇先用散驚此乃至要之議學者當明  
其理所言癇之為疾古述繁多或云六畜  
牛馬雞羊猪犬其聲音相類形體相尚有  
若六畜之狀故得其名寶鑑載云壹百二

十種其說大繁其傳乃熱但是癇疾無哉  
三證皆由所生惚而言之不必煩求有悞  
初機在究遂成艱學如是一病尙陳羅縷  
向其驚風者乎王氏獨之得其詳要以合  
禮法今則著書特示其妙截治至簡庶幾  
不所受頓漸瘳瘳靡不快歟學者深詳必無  
枉究  
永類鈐方  
急驚風脈紅者風熱輕赤者風熱盛紫者驚



熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有  
慢驚風脈青而淡紫伸縮來去

慢脾風脈紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出  
不出

發癇方論

古云驚風三發便為癇

癇為小兒惡病病關五臟故有五癇之名其  
發也如驚風狀但發而四體柔軟時醒者為  
癇若一身強硬終日不醒則為痙瘓治法先  
審驚風食三種陰陽二證別之風癇者風邪

乘虛有熱生痰先與化痰散熱安神定搐然  
後治風驚癇者駭怖積驚啼叫恍惚先涼三  
焦去熱化痰然後治驚食癇者食時得驚停  
結大便酸臭先寒後熱先與推下然後治癇  
陽癇則身熱抽掣啼叫面光脈浮病在腑易  
治陰癇身無熱手足冷不掣不啼而黯脈沉  
病在臟難愈或仰卧屬陽覆卧屬陰亦可驗  
大槩血滯心竅邪氣入心積驚成癇清心調  
血順氣豁痰又其要也尋常小兒有痰有熱

阻乳不睡時常驚悸皆癩之漸即以紫霜元  
導之量輕重以減其盛氣可免驚風癩癆之  
患癩証方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如  
綠見之急為爪破出血啼叫尤得氣通仍晒  
兒衣恐有純雌落羽所汚即作癩也諸癩瘡  
不能言此風傷其氣痰滯於心以南星為末  
雄猪膽汁調少許啖之輒效  
玉機微義  
論急慢驚風

錢氏曰急驚因聞大聲云云如不分別則誤

甚矣

詳見小兒  
藥譜直訣

不藥大驚變為驚風

閻孝忠曰急慢驚風古人無之惟曰陰陽癩  
云云此則危證脾胃虛損故也

詳見小兒  
藥譜直訣

潔古曰急驚陽證也俱肺受病余云云常用

溫補羌活膏

詳見衛  
生寶鑑

謂不思飲食發熱

全嬰方云驚證因風則目青面紅痰搐因驚  
其病在心忽然叫聲發搐因食則其證暖吐  
氣即發搐皆陽癩也肺胃經虛則生粘痰痰



者肺胃所出也痰則凝滯在於咽喉如牽鋸  
之聲時復瘕瘕或咽吐瀉所致脾虛則肺亦  
虛涎痰流溢其證亦然皆陰瀰也身熱脉  
浮精神恍惚或吐或瀉不思乳食發搐卽是  
半陰半陽合病身涼脉沉精神倦怠不吐  
不瀉又能乳食發搐者亦是半陰半陽合病  
正如傷寒半是表半是裏也亦有急驚涼瀉  
而不愈或與吐下藥太過變爲慢驚慢驚瀉  
補而不愈變爲急驚互相更變者多矣

按此正諸家所論殆盡證治之要矣但錢  
云遷驚用括蕁湯恐傳寫誤再此括驚主  
風沐裡水瀉陽府病效急湯治乙木屬陰  
藏病厥腹難治如厥人驚恐卽後瀉蓋甲  
乙木尅戊土也况小兒五臟之氣未實神氣  
未壯先瀉身病未瘳非病後及吐瀉脾弱虛  
損得瀉中有夾次來難來痰來食病因不  
同蓋風邪內陷沐蕁以瀉亦與沐蕁風相  
刺故治此者當未錢氏虛實補瀉法則不

致把禁之悞藥有太過不及之失去問不  
論發搐有風有熱有痰有食補瀉不同  
驚癇發搐錢氏曰男發搐目左視無聲右視  
有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故  
也  
潔古曰男為木左視木位右視金位相擊  
則有聲男反右視女反左視亦皆有聲  
早辰發搐錢氏曰因潮熱寅卯辰時身體壯  
熱上視手足動搖口內生熱涎項頸急此肝

旺當補腎治肝也

潔古曰潮熱於寅卯辰時之位是肝旺也  
當補水以制心火瀉肝木以止其搐  
日午發搐錢氏曰因潮熱巳午未時發搐心  
神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手  
足動搖此心旺也當補肝治心  
潔古曰巳午未火之位而發潮搐者心熱  
也導赤散及涼驚散  
日晚發搐錢氏曰因潮熱申酉戌時不其搐



而喘自微邪視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃本是肺旺當補脾治心肝

潔古曰肺之位而肝強法當補脾恐被木  
之賊所剋害先瀉心肝以挫其勢瀉心導  
赤散瀉肝瀉青丸而後補脾益黃散  
夜間發搐錢氏曰亥子丑時不甚搐而睡不  
穩身體濕壯自睛斜視喉中有痰大便銀  
褐色乳食不消多睡不省補脾治心導赤涼  
驚生之

潔古曰皆因大病之後脾胃虛損多有此  
疾法當補脾涼心

傷風後發搐錢氏曰傷風後得之口中氣出  
熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之  
小兒本怯者多此病也

潔古云因傷風而得已之證者同大人傷  
風寒之類當辨有汗無汗陰陽二證用人  
青膏仲景小續命之類開發則愈

傷食後發搐錢氏曰因食得之身體溫多唾

多睡或吐不思食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後與安神丸

潔古曰傷食發搐謂不因他病忽然而搐此因飲食過度致損脾胃故見多睡或吐不思飲食脾胃既虛引肝風則發搐當先定其搐加羌活防風煎下瀉青丸後用白餅子下其食漸漸用調中丸異功散養其氣

百日內搐錢氏曰真者不過三兩次必死云

云及用塗額浴體法

詳見小兒藥證直訣

錢氏曰惟癩疹能作搐風火相爭故也治當

瀉心肝補母雜病目赤兼青者欲發搐咬牙

甚者發搐

全嬰方曰凡身體壯熱耳輪鼻尖及手足梢

俱冷忽發搐者此非驚是豆搐也夫驚搐有

陰陽兩證陰者拇指在內陽者拇指在外陽

牽者順陰牽逆也

凡目鮮目眦目白目青目斜目闕目轉目



瞪聲焦聲啞聲顛聲輕哂口弄舌捲舌露  
筋噓氣哽氣噎氣撮唇噎乳噎食忽然定  
睛上涎叶沫拗頸仰身搖頭擦面藏頭畏  
明手攣手顛脚彎不伸忽捺忽亂恍惚精  
神失張失志眠睡不寧睡中喜笑困戛齒艱  
心煩躁熱啼哭咬人面臉弄色或紅或青  
伸舒用力微微作聲有已上證候驚搐先  
證也預防之驅風膏琥珀散更擇對證藥  
關孝忠曰似搐而不甚搐此名瘈瘲

按此所論諸癇旺實或傷風因食所致發  
搐旺者當瀉實補虛傷風者當發散食宜  
下之此則與因驚發搐所異也大抵驚病  
發搐多自外感自內因者如吐瀉後脾虛  
所致或熱極生風之類是也餘證發搐已  
上亦備所因不同但世俗罕能分於臨證  
用藥不無實實虛虛之失反爲害耶  
千金方  
龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四

肢驚掣發熱大吐哕者若已能進哺中食實  
 不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚  
 癩方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒竜  
 膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大  
 者以次依此爲例若必知客忤及有魘氣者  
 可加人參當歸各如龍膽多少也壹百日兒  
 加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘  
 藥皆準耳

竜膽 鈞藤皮 柴胡 千金翼方去苗 黃芩 桔

梗 芍藥 茯苓 一作甘草 蟻蝦 二

大黃 有 右十味 以水一升煮取五合爲劑也

服之如後節度藥有虛實虛藥宜足數合  
 水也兒生壹日至七日分一合爲三服兒  
 生八日至十五日分二合爲三服兒生  
 十六日至三十日分三合爲三服兒生  
 三十日至四十日分五合爲三服兒生三十



止勿再服也。○直指小兒方治胎驚月內

氣盛經驗良方發熱凡臍風撮口壯熱皆

可用龍膽草釣藤柴胡黃芩北梗赤芍藥

茯苓甘草各半兩蛻蜋二枚法大黃壹分濕

右為末每服壹錢北東煎服或加防風麥

門冬以導心熱黃芩減半用其方龍膽草

釣藤柴胡桔梗赤芍藥茯苓甘草各半兩蛻

蜋二枚去翅足炙大黃壹錢濕紙裏煨黃芩一錢防風麥

門冬法心各壹錢右為末每服壹錢水壹小盞

北棗壹枚同煎七分服至正公法若入平

大黃湯治少小風癩積聚腹痛禾矯五

癩方用川大黃三兩此地黃今黃西黃芩

大黃諸人參細辛乾姜當歸甘

皮各三坐惠法治小兒風癩曾中熱白

布六味咬咀以水粒升煮取四合服如棗

許日三日三許連日熱而脈不測許四更

白羊鮮湯治小兒風癩骨中有疾方二合

白羊鮮三蚱蟬二大黃四甘草許釣藤皮

細辛各二牛黃如大豆蛇蛻皮寸

右八味咬咀以水三升半煮取壹升二合

分五服日三若服已盡而痛不斷者可更

加大黃鈞藤各一銖以水漬藥半日然後

煮之○聖惠方治小兒風癩胷中痰涎白

鮮皮散方白鮮皮半兩細辛半兩蚱蟬二枚鈞

藤半兩川大黃三分到研微炒蛇蛻皮五寸炙甘草

三分炙牛黃半兩右件藥搗麝羅為散每

服一錢以水壹小盞煎至五分去滓入牛

黃末少許量兒大小分減溫服

茵芋圓治少小有風癩疾至長不除或遇天

陰節變便發動食飲堅強亦發百脈攣縮行

步不正言語不便者服之永不發方

茵芋葉味鉆丹二秦芎九鈞藤皮六石膏

杜蘅防葵兩各菖蒲黃芩兩各松蘿

兩蟪蝮十甘草三兩外蘇黃本

右十二味為末蜜丸如小豆大五歲已下

服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十



凡十歲已上可至十五丸。聖惠方兩半

葉兩半黃丹兩半秦艽兩半鈎藤兩半石膏兩半

水飛兩半杜衡兩半防葵兩半松蘿兩分首蒲一分黃芩一分

一分麤蝮一分甘草一分茯苓一分藥搗羅一分

末鍊蜜和搗三二日杵丸如黍米大每服

以粥飲下五丸量兒大小加減服之

鎮心圓治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑拾二錢水銀二十錢牛黃六錢大黃六分伏苓三錢

三伏神一分遠志一分防己一分白欬一分雄黃一分

人參一分芍藥一分紫石英一分真朱一分防葵一分

鐵精各四分

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸

藥和丸二歲兒如麻子二丸隨兒大小增

減之一方無牛黃壹味

丹參赤膏治少小心腹熱除熱方

丹參各二錢雷丸各二錢消小各二錢菝葜各二錢大黃各二錢

右五味咬咀以苦酒半升浸四種一宿以

成鍊豬肪一斤煎三上三下去滓乃內其

消膏成以摩心下冬夏可用一方但用丹

參雷丸亦佳千金翼方同

五物甘草生摩膏治少小新生肌膚幼弱喜

為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣

方之一式千金翼方同

甘草二兩防風兩各一白朮二桔梗各二雷丸

半右咬咀以不中水猪肪一斤煎為膏以煎

藥微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如

彈丸大壹枚灸手以摩兒百過寒者更熱

熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩顙

上及手足心甚辟寒風千金翼方同

千金翼方千金翼方同

小兒

禁石圓主小兒胎寒偃啼驚癩臚脹滿不嗜

食大便青黃并治大人虛冷內冷或有實不

可叶下方

馬齒禁石壹斤燒

半白

馬齒禁石

馬齒禁石

馬齒禁石

馬齒禁石



右壹味末之棗膏和圓大人服如梧子二枚日三服小兒減之以意增損以腹中溫暖為度有實亦去神良  
治小兒新生客忤中惡發癩發熱乳哺不消中風反折口吐舌并注忤面青目上插腹滿癩癩羸瘦疰及三歲不行雙丸方

上麝香貳兩牛黃貳兩黃連貳兩宣丹砂壹兩特  
生礬石壹兩附子壹兩炮雄黃兩巴豆六  
枚去皮桂心壹兩烏賊魚骨壹兩赤頭蜈蚣一兩  
心熬

熬

右壹拾壹味各異搗篩別研巴豆如膏乃內諸藥鍊蜜和搗三千杵密塞之勿洩氣生十日二十日至壹月日服如黍米大二丸四十日甚至百日服如麻子大二丸一歲以上以意增加有兒雖小而病重者增大其丸不必依此丸小兒病客忤率多耐藥服藥當汗出若汗不出者不差也壹日壹夜四五服以汗出為差凡候兒中人者為

人乳子末了而有子者亦使兒客忤口中  
銜血卽月客也若有此者當尋服此藥卽  
兒可全也口聚唾腹起熱者當灸臍中不  
過二七壯并勤服此藥若喜失子者產訖  
兒墮落地聲未絕便卽以手指刮舌上當  
得所銜血如韭葉者便以藥二丸如粟米  
大服之作七日乃止無不痊也若無赤頭  
蜈蚣亦是者亦得三枚皆斷取前兩節其  
後分不可用也

### 小兒藥證

#### 小兒風癘驚章

但小兒生下分長四大未和骨粹微虛筋肉  
輕嫩不居味物尚約姝食病則從口而招熱  
則因驚而有且憑淺業悞療所疾日去月逾  
實難上救盡自人言高舌嗔怒不期致小兒  
目視頻頻使小兒情儀恍惚因茲入腑傳在  
心脾睡息不安夢中頻哭或歌或叫風駐四  
肢自脉癱局手足緩急不尋好藥懇檢名方



但取妖巫日增患害疾既篤遂便乖張悉是後代淺學不窮古訣勞於心胃之覺亦難痊念以時童遂留祕典

風癩驚吊歌

羚羊角妙眇君臣分 牛黃熊膽最為珍各半

龍膽佐扶因蟬殼各半 乾蠍偏能伸藥君

豈屏烏蛇本調風胃各半 弔藤只解共安

神分 甘草人參量多少各半 雄黃出自妬

言真青錢 疆蠶欲作天麻主各壹 馬牙消

半湯桃仁四拾 黃連不是真珠客各半 却

朱為防風北蒼隣之書 山椒散藥出陳類章

日右附三十一味特為散木蜜為丸丸如茶

四耳屎大每服三九劑芥湯下亦驗

服量本兒邪許驚頑羣而言心泉 效良婦笑

凡小兒遺膿已後百日已前多有驚卒蓋以

脈德未定氣尚虧無 則姊母難有所食其 則

五臟傳於諸腑初從壹入未致數深頗有驚

貼梗散即臥者自乳中不頓恣意為食未見

疾危將同閑事及親病勢復想神祇稱是魍  
 魎之間旋致不安之兆人已愚亂不察所由  
 祭醮求神比希獲福却令小兒孿牽轉甚睡  
 卧不安或啼來而繫時或歡來而盡日母見  
 如是各意參量觀啼哭而言有鬼妖見歌笑  
 則話無神祟尋巫師而解送求香火於佛前  
 日去月來果深疾疹雖斯後悟難以療持此  
 者号爲驚忤邪風之苦也聊述樂川列歌章  
 邪忤驚殞歌

犀角壹分 臣輔要雄黃錢一 花蛇偏作藥中王  
 分壹 乾蝎壹分 共君和龍膽半 芎藭不備蚱蟬  
 妨壹分 牛黃剛捷何垂力半 仁參兼望竹茹  
 將各半 疆蠶順籍天麻主各半 姜活由來  
 要大黃各壹分 朱砂少少相爲助錢一 微微只  
 要好麝香錢一 芍藥桔梗和心肝各半 藜葛  
 防風事亦當各半 竹瀝澹澆和藥嚙二此  
 疾必差永爲常

右件已上二十壹味搗散用木蜜爲丸



如菜豆大每服三丸暖水下要散勃荷湯下壹錢

海上仙方

小兒急慢風奪命有神功青礞磨水下煎痰

時刻通

聖惠方一

治小兒驚悸諸方

夫小兒驚悸者由心臟壅熱為風邪所乘邪搏於心則令多驚不安驚不已則悸動不定

世傳

治小兒心熱驚悸煩亂茯神散方

茯神三分 龍齒兩 寒水石壹斤 升麻三分 石膏

兩 麥門冬一分 心焙 甘草半兩 炙 麥門冬

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓入竹瀝並合更煎一兩

沸量兒大小以意加減黃竹半合 更煎一

治小兒驚悸情思不要人參散方以水壹小

大參半兩 去 麥門冬一分 心焙 龍骨一兩 茯神

三甘草 半兩炙 犀角屑 半兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

蓋煎至五分去滓入地黃汁半合更煎一

兩沸量兒大小以意分減溫服更煎一兩

治小兒風熱驚悸炸蟬散方一

炸蟬 半兩去翅 茯神 半兩 龍齒 三分 麥門冬

半兩去心 人參 一分 法鈞藤 二分 牛黃 二分 杏

心焙三分 人參 一分 法鈞藤 二分 牛黃 二分 杏

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

每服以新汲水調下半錢量兒大小加減服之

治小兒身體壯熱驚悸心神不寧安心神遠

志煎方

遠志 去心 羚羊角屑 扶神 甘草 炙微

人湯浸去皮尖雙 紫苑 洗去 龍骨 防風

去蘆頭已 龍膽 壹分 去 炸蟬 壹分 去 百合

上各半兩 龍膽 壹分 去 炸蟬 壹分 去 百合

壹兩 牛黃 細研 麝香 壹分 川升麻 叁分 川大黃

微炒 酥 兩 蜜 半斤



右件藥先研牛黃麝香二味爲粉除酥蜜等二味麝搗用冰三升入銀鍋內煎至半升以新綿濾去滓却入鍋內下牛黃麝香酥蜜等以柳篦不住手攪慢火熬如稠飴方止入瓷合內盛每服取兩百計大用溫水調服日三四服量兒大小加減服之

治小兒心熱多驚悸晝差夜甚象鬼神所著

鐵粉煎方

鐵粉一分牛黃一分細研分菖蒲兩酥兩犀角屑兩

人參去蘆茯神去蘆百合去蘆防風去蘆川人

黃剉青黛細辛細遠志去心芎藭去心麻黃去根

節去根薯蕷去根甘草炙微赤到巳蜜斤半

右件藥先齋搗諸藥用水三升入銀鍋中煎至半升以新綿濾去滓却入銀鍋內入研了藥及酥蜜以慢火熬不住手以柳篦攪如稠飴收於瓷合中每服以溫水調二大豆許日三四服量兒大小加減服之治小兒心熱多驚悸金泥煎方

金薄七十片水銀一兩遠志壹兩菖蒲叁分釣  
 藤叁分龍膽三分去頭龍齒叁分人參叁分去頭赤  
 茯苓叁分青黛一分蚱蟬叁枚去麝香壹分虎睛  
 一對壹分牛黃壹分甘草壹分酥四分蜜半斤  
 右件藥水銀金薄同研如泥又別研麝香  
 虎睛牛黃青黛四味如粉其餘藥搗篩為  
 散入銀鍋中先以水二升文火煎取半升  
 以新絲濾去滓再入鍋內下酥蜜及金泥  
 并研了藥等慢火煎不住手以柳篋攪如

稠飭入瓷合內盛每服取二大豆許以湯  
 水調服日三四服量兒大小加減服之  
 治小兒驚悸壯熱黃瘦不思乳食天竹黃丸  
 方  
 天竹黃細研黃連去鬚柴胡去苗羚羊角屑天  
 荆子去刺犀角屑磁石去渣石膏碎川升  
 麻良麥門冬去心甘草炙玄參炙白茯苓  
 梨微炒朱砂細研木香去心各壹分龍腦研麝香  
 細研各一錢已上藥各壹分研令勻煨



右件藥搗羅為末與研了藥都研令勻鍊  
蜜和丸如菉豆大每服以溫水化兩五丸  
量兒大小以意加減

治小兒驚悸壯熱黃瘦髮墜牛黃花方川代

牛黃青錢細研朱砂半兩細研犀角屑天竺

黃細研白附子炮裂伏神 黃連去鬚羚羊角屑

防風去蘆頭玄參 枳殼麩炒微黃去瓢甘菊花

人參去蘆頭黃耆剉甘草炙微赤剉黃芩已上各

右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻鍊

蜜和丸如菉豆大每服以淡竹葉湯研下

前五丸日三四服量兒大小加減服之

治小兒壯熱驚悸不得眠睡天竹黃丸方

天竹黃剉碎黃連去鬚川大黃剉碎牡蠣粉

滑石去心已上黃芩剉碎天竹黃剉碎

夫右件藥搗羅為末鍊羅和丸如菉豆大

服以新汲水兩五丸量兒大小加減服之

治小兒心熱驚悸存涎磨犀角飲子方

竹瀝經犀角煎犀角煎內服令點量兒大

右件藥將犀角於竹瀝內磨令濃量兒大  
 小分減服之曰三四服  
 治小兒心熱夜臥多狂語諸方  
 夫心者火也內主於血神之所舍小兒蘊積  
 邪熱臟腑壅滯則令氣血不和心神煩亂故  
 夜臥多狂語也  
 治小兒心藏壅熱夜臥狂語及手足多掣犀  
 角散方  
 犀角屑用邦麻黃其柴胡  
去苗已

分茯神川大黃微炒釣藤麥門冬去心焙  
 甘草炙微赤剉已  
 右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小  
 盞煎至五分去滓量兒大小分減服  
 治小兒心熱多驚睡中狂語煩悶赤茯苓散  
 赤茯苓剉碎龍齒黃芩甘草炙微釣藤  
 玄參白石膏半兩治小兒心熱多驚  
 治小兒心熱多驚睡中狂語煩悶赤茯苓散  
 治小兒心熱多驚睡中狂語煩悶赤茯苓散



右件藥搗麝羅為散每服壹錢以水壹小  
盞入竹葉七片煎至五分去滓量兒大小  
以意分減

治小兒心熱夜卧狂語煩渴黃連散方

黃連去川升麻黃芩犀角屑川大

黃剉碎麥門冬去心甘草炙赤剉茯苓

神分右件藥搗細羅為散每服以竹瀝調下半

錢日三四服量兒大小以意加減

治小兒心熱不睡多驚狂語犀角散方

犀角屑茯神人參去蘆天竹黃細研朱

砂細研川升麻麥門冬去心葛根剉子芩

黃耆剉羚羊角屑赤芍藥大甘草炙赤

豈上各柴胡龍齒細研已半兩合

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

每服以溫水調下半錢量兒大小臨時加

減

治小兒心藏風熱神思恍惚夜多狂語不得

安眠牛黃散方

牛黃半分 白竜腦一錢 金薄五十片 朱砂

半兩 寒水石半兩 眞珠末 鈆霜細研 犀

角屑 甘草 防風去蘆頭 黃芩已上各

右件藥搗細羅爲散入研了藥都研令勻

每服以蜜水調下半錢量兒大小加減服

之

治小兒壯熱心神煩躁夜臥狂語龍腦散方

龍腦壹錢 牛黃壹錢 黃連壹分 犀角屑

羚羊角屑 玳瑁末 甘草微炒 眞珠末

大鐵粉細研各半兩

右件藥搗細羅爲散每服用蜜水調下半

錢量兒大味以意加減服以

治小兒心脈積熱黃瘦焦睡卧多驚狂語

朱砂沈方

朱砂三分 水飛過細研 人參半兩 去龍腦壹錢

牙消半兩 薄荷壹錢 蘇黃壹錢 天竹黃壹錢 麥門

冬壹錢 心犀角屑 茯神 升麻 子芩





右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小  
盞煎至五分去滓入生地黃汁半合不計  
時候量兒大小分減服之

治小兒驚熱釣藤散方

釣藤微炒 蟬殼微炒 馬牙消 黃連去鬚 甘草微炙  
赤川大黃剉碎 天竹黃研細 已上各等分  
右件藥搗細羅爲散每服半錢以水壹小  
盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大  
小以意加減服

治小兒驚熱心神煩亂手足縮掣不定龍齒  
散方

龍齒壹兩細研 犀角屑壹兩 茯神壹兩 人參壹兩去蘆頭  
牛黃壹分細研 蟬殼壹分微炒 赤石脂兩 黃芩三分  
礪粉三分 川升麻三分

右件藥搗細羅爲散不計時候以荆芥薄  
荷湯調下半錢量兒大小加減服之

治小兒驚熱煩悶天竹黃散方

天竹黃壹兩細研 甘草壹兩炙 川大黃一兩剉碎微炒



馬牙消兩膩粉兩蒲黃兩藿香壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以熟水調  
下半錢量兒大小加減服之

治小兒驚熱下瀉不定兼渴龍齒散方

龍齒一分盧會壹分朱砂一分黃連壹分

赤石脂壹分鐵粉一分牡蠣一分燒

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候  
以溫水調下壹字

治小兒驚熱心煩不得睡卧龍腦散方

龍腦半錢麝香半錢甘草壹分牛蒡子壹分

梔子一分黃半分馬牙消壹分鬱

命壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以溫薄荷

湯調下半錢量兒大小以意加減

治小兒驚熱煩燥不得眠卧虎睛丸方

虎睛壹對酒浸壹分蘆會一分朱砂壹分黃連壹分

赤石脂壹分鐵粉壹分牡蠣壹分

右件藥細羅為散都研令勻不計時候以

煖水調下半錢量兒大小以意加減服之

治小兒驚熱煩躁手足抽掣心忪宜服扶神

散方

扶神兩半 龜齒兩半 寒水石兩壹 升麻兩半 石

膏兩兩 犀角兩兩 煇黃兩兩

右件藥搗細羅為散不計時候以竹漚調

下半錢量兒大小加減服之

治小兒驚熱心神煩悶朱砂散方

朱砂兩兩 遠志壹分 馬牙消壹分

粉壹分 牛黃壹分 龍腦半 麝香半 鐵粉半

右件藥都細研如粉不計時候以冷水調

下半錢看兒大小以意加減

治小兒驚熱客忤煩悶牛黃散方

牛黃壹兩 麝香半 雄黃壹分 龜腦壹分

朱砂壹分 虎睛壹分 子芩壹分 梔子壹分

人參壹分 川大黃壹分 肉桂壹分

甘草壹分

右件藥搗細羅為散入研子藥更研令勻



不計時候以薄荷湯調下半錢量兒大小以意加減服之

治小兒驚熱延齡散方

河清散內掛始史

鈞藤兩消石兩半甘草壹分炙

右件藥擣細羅為散每服以溫水調下半

錢日三四服量兒大小加減服之

治小兒驚熱鐵粉丸方

鐵粉兩蛇黃壹兩以火斷後甘草水猪糞

十兩朱砂半兩細研麝香六兩端午日大

蟾壹枚生薑汁浸

右件藥都研為末用糯米飯和丸如麻子

大壹二歲兒每服用金銀湯下三丸人參

湯下必得三四歲兒每服五丸每日三四

服量兒大小以意加減

治小兒驚熱多啼不喫乳虎睛丸方

虎睛人二枚犀角兩子芩兩梔子人

川大黃半兩碎微炒

右件藥除虎睛外擣羅為末鍊蜜和丸如

麻子大每服以粥飲下五丸日三四服量  
兒大小以意加減

治小兒五驚身體熱大黃丸方

川大黃一分判黃芩一分判遠志一分判牡蠣粉一分判

龍骨一分判

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黍米大一

二歲兒每服用乳汁下三丸更量兒大小

以意加減

治小兒從滿月至百日已來五藏多熱夜間

驚搐牛黃丸方

牛黃壹分白龍腦壹分烏犀末半兩朱砂半兩研水飛

過乾蠍末壹分黃芩末半兩

右件藥都研如粉以粟米飯和丸如麻子

大壹二歲兒每服以溫水下三丸三四歲

每服五丸日三服夜一服量兒大小以意

加減

治小兒驚熱化涎除煩渴鐵粉丸方

鐵粉半兩牛黃一分朱砂壹分黃芩一分犀



角屑一分 川大黃一分 人參壹分 去去 甘草

壹分分 金薄一十片 銀薄三十片

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菘豆大不計時候以薄荷湯研破三丸服

之量兒大小以意加減

治小兒驚熱煩躁多渴少睡鎮心丸方

牛黃壹分 犀角屑半 金薄三十片 銀薄三

片細 川大黃半兩 伏神半兩 子芩半兩 馬牙

消半兩 麝香壹分 朱砂半兩 天竹黃

半兩 龍齒壹兩

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菘豆大不計時候以竹瀝研三丸服之量

兒大小以意加減

治小兒驚熱鎮心犀角丸方

犀角屑半兩 蚺蛇膽壹分 升麻半兩 子芩半兩

齒半兩 鐵粉半兩 牛黃壹分 麝香半兩

右件藥搗羅為末都研令勻用軟飯和丸

如菘豆大每服以粥飲下五丸量兒大小

以意加減

治小兒驚熱心神忪悸痰涎壅滯宜服鈆霜  
丸方

鈆霜半分滑石一分膩粉壹分真珠末壹分巴豆霜

半分麝香一分光明砂一分

右並都細研以蒸餅和丸如粟米大壹歲  
以薄荷湯下壹丸

治小兒驚熱喘齎腹脹有食壅滯不消青黛  
丸方

青黛一分蝦蟆一箇木香壹分檳榔壹顆  
細研令黃色

麝香壹分續隨子一分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻用糯米  
飯和丸如菉豆大每服以溫水化破壹丸  
服之其水於銀銚子內煎不得犯鐵器甚  
効

治小兒驚熱口乾煩悶眠臥不安及變蒸諸  
疾真珠丸方

真珠末壹分牛黃壹分朱砂半兩雄黃壹分  
細研水飛過



犀角末半兩龍齒壹分麝香錢二金薄三十片銀薄三十片

右件藥同研如粉以糯米飯和凡如菜豆大不計時候煎金銀湯下三九

治小兒驚熱鎮心神鈆霜丸方

鈆霜半兩人參半兩去蘆頭兩朱砂半兩細研

水飛麝香一分細研

右件藥搗羅爲末都研令勻鍊蜜和丸如菜豆大不計時候以薄荷湯下五九量兒

大小以意加減

治小兒驚熱乳食積聚不消朱砂丸方

朱砂半分巴豆七粒去皮心研膩粉半麝香分

紙裏壓去油

右件藥都研爲末鍊蜜和丸如黍粒大每服以溫溫荆芥湯下壹丸三歲已上加丸數服之

治小兒驚熱化聚滯妨食墜涎利大腸宜服真珠丸方

真珠一分天竹黃壹分朱砂壹分丁頭代赭兩半雄

黃兩半麝香兩半杏仁三十枚湯浸去皮雙人麩炒微黃巴豆

十粒去皮用油煎令褐色與杏仁同研

右件藥都細研為末鍊蜜和丸如菜豆大每服以生姜湯下壹丸三歲已上加丸數服之

治小兒驚熱及疳氣保童丸方

牛黃壹分射香半朱砂三分細研虎睛

一對真珠三分赤芍藥壹分赤茯苓壹分杏仁壹分

半分湯浸去皮尖甘草壹分牡蠣壹分

雙人麩炒微黃犀角屑壹分盧會半兩胡黃連兩半熊膽壹分

研細右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻鍊

蜜和丸如菜豆大每服以溫水下三丸量

兒大小加減服之

治小兒驚熱不退胡黃連散方

胡黃連壹分朱砂半兩細研牛黃壹分麝香

半分犀角屑壹分



右件藥搗細羅為散不計時候用乳汁調下壹字二歲已上用溫水調下半錢

治小兒驚熱發歇不定牛黃丸方

牛黃一分川大黃兩蟬殼壹分子芩兩龍

齒半兩細研豆大並細研木下三錢量

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大不

計時候煎金銀薄荷湯下三丸量兒大小

加減服之

治小兒驚熱心神煩悶多啼鐵粉丸方

鐵粉三分米砂半兩青黛三分伏神分

羚羊角屑分蛇蛻皮壹條射香半分

右件藥搗羅為末都研令勻以粟米飯和

丸如棗豆大不計時候以粥飲下五丸看

兒大小以意加減

治小兒驚熱不退變為發癩龍膽丸方

龍膽一分去頭牛黃壹分龍齒分

右件藥搗羅為末研入射香二錢鍊蜜和

丸如黃米大不計時候荆芥湯下五丸

治小兒驚熱至甚必効方

天竹黃兩半馬牙消兩半鈆霜兩半

右件藥同細研為散不計時候以熟水調  
下半錢量兒大小臨時增減

治小兒驚熱川消散方

川消兩半

右件藥細研為散每服以鷄子清調下半  
錢量兒大小加減服之

治小兒被驚方

雄雞冠血

右件藥壹二歲兒每服用少許滴在口中  
三四歲兒每服取壹小椀許滴在口  
中一日二服○肘後方治小兒卒驚似有  
痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上

滴少許差備類百要方同

治小兒生便喜多驚方

剪取父母兩手爪甲燒為灰

右件藥研為末用麩糊和丸如麻子大每



服以井華水下壹丸日再服壹云能治客忤

治小兒驚心多驚宜服解心熱止虛驚土瓜丸方

土瓜根五兩

右搗羅爲末以粳米飲和丸如麻子大每服以薄荷生姜湯下三丸量兒大小以意加減

治小兒慢驚風諸方

夫小兒慢驚風者由乳哺不調藏腑壅滯內有積熱爲風邪所傷入舍於心之所致也其候乍靜乍發心神不安嘔吐痰涎身體壯熱筋脉不利睡卧多驚風熱不除變化非一進退不定在莨經時故名慢驚風也宜速療之治小兒慢驚風壯熱四肢拘急痰涎壅滯發歇不定白殭蠶散方

白殭蠶壹分 蟬殼壹分 盧會一分 蠍尾壹分  
微炒 微炒 微炒 細研  
炒白附子一分 五靈脂壹分 蟾頭壹分 令煇黃

朱砂一分牛黃一分麝香一分雄黃一分

壁官子二枚塗一分黃一分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻不計

時候以薄荷湯調下半錢看兒大小加減

服之甚善

治小兒慢驚風心胃痰涎上攻咽喉如呀身

體壯熱筋脉拘急或時發歇抽掣龍腦散方

龍腦一分雄黃一分麝香一分盧會一分

胡黃連一分青黛一分木香一分丁香一分牛黃一分

細研一分乘竹黃一分熊膽一分犀角一分乾蠍

右件藥搗細羅為散同研令勻不計時候

薄荷湯調半錢服之量兒大小以意加減

治小兒慢驚風壯熱心煩發歇搐搦牛黃散

方

牛黃一分麝香一分雄黃一分熊膽一分盧會一分朱

砂一分天竹黃一分夜尿一分煨一分犀角

末一分胡黃連一分白蠟一分乾蠍一分

末一分



本都細研爲散不計時候以薄荷湯調  
 錢服之量兒大小以意加減兼調吐許吹  
 禾鼻中良香身散黃公煎調牛溫會一末  
 治小兒慢驚風心神煩熱多驚體瘦四肢抽  
 掣犀角散方風根心熱發熱淋澀半黃蜡  
 犀角屑壹分朱砂半兩細研天麻壹分白附子壹分  
 一分乾嗽壹分膩粉半兩麝香壹分朱黃細研  
 晚蠶蛾一分未一分  
 右件藥搗細羅爲散不計時候煎龍膽湯

放溫調下半錢量兒大小以意加減  
 治小兒慢驚風發歇不止牛黃丸方  
 牛黃半兩天竹黃半兩犀角屑半兩麝香壹分  
 人參壹分白茯苓壹分麝香壹分龍腦半錢  
 胡黃連半兩丁香壹分鈞藤壹分龍齒一分  
 右件藥搗羅爲末用木蜜和丸如菉豆大  
 每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減  
 治小兒慢驚風或發即戴眼向上手足搐搦  
 烏犀散方



烏犀角屑壹分獨角仙三枚去翅足多驢胎耳壹分

煨雀兒飯糰五枚乾蟾一枚煨灰一分白殭蠶壹分朱

砂壹分煨黃壹分細研一分丁香壹分香壹分蠶紙壹分煨紙壹分好

麝香壹分細研一分牛黃壹分細研一分羌活兩青黛壹分天

竹葉壹分細研一分丁香壹分香壹分蠶紙壹分煨紙壹分好

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候

以溫水調下半錢量兒大小加減服

治小兒慢驚風及天癆麝香散方

麝香壹分細研一分麻粉一分牛黃壹分細研一分乾蠍壹分白附

子壹分煨裂一分...

右件藥搗細羅為散不計時候以薄荷汁

調下壹字量兒大小加減服之

治小兒慢驚風體熱搐搦天竹黃散方

天竹黃半兩細研一分川大黃三分剉炒天麻兩栝枝

半兩兩蟬殼壹分微炒一分白附子壹分炮裂一分鬱金兩乾蠍

微炒壹分...

右件藥搗細羅為散不計時候以乳汁調

下壹字量兒大小加減服之



治小兒半臘後月內忽中慢驚風及無辜之候朱砂散方

朱砂一分麝香一分乾蠍十四枚

雀兒飯糞二七枚炒令黃去殼

右件藥細研為散不計不候以乳汁調下

半錢薄荷湯調下又得更量兒大小以意

加減

治小兒慢驚風墜涎真珠丸方

真珠壹分牛黃壹分朱砂壹分雄黃壹分賦粉一分

右件藥都細研用粳米飯和丸如黃米大

壹二歲兒每服以薄荷湯下三九日三服

量兒大小以意加減

治小兒慢驚風胃膈多涎迷悶口噤發歇搐

搦縱睡多驚比金丸方

牛黃一錢麝香一錢烏犀角屑一分朱砂壹分

研烏蛇肉壹分乾蠍一分雄黃壹錢

銀分壹分金薄二拾片銀薄二十壹片已上三

兒飯糞三十枚內有天南星壹分羚羊角



屑壹分

右件藥搗羅為末都研令勻鍊了蜜和丸如菜豆大不計時候以薄荷汁下三九量見大小加減服之

治小兒慢驚風搐搦天竹黃丸方

天竹黃一分細研牛黃一分麝香一分龍腦半

細研木香半丁香半雄蠶蛾十四枚雄黃半

胡黃連半朱砂壹分金薄拾四片膩粉半

熊膽半盧會半犀角屑半

右件藥搗羅為末都研令勻鍊了蜜和丸

如菜豆大不計時候以粥飲下三九量兒

大小加減服之

治小兒慢驚風熱筋脉跳掣精神昏悶風涎

不利宜服天麻丸方

天麻壹兩乾蠍壹兩白僵蠶壹兩防風壹兩

頭甘草壹分白附子壹兩朱砂壹分雄

黃壹分牛黃壹分麝香一分

右件藥搗羅為末研入朱砂等四味令勻

藥錄

卷七

藥錄

卷七



鍊蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯  
 化破三九服之着兒大小臨時加減服之  
 治小兒慢驚風體熱多涎發歇搗搗青黛丸  
 方

青黛壹分 牛黃一分 朱砂半兩 細研 蝸牛  
壹分 烏蛇壹兩 酒浸壹分 乾嗽二七枚 胡  
 黃連壹分 白殭蠶壹分 白附子壹分 麝香壹分  
 細研 蟾酥三片 如柳葉 狗膽二枚 取汁  
 研 右件藥搗羅為末入狗膽汁與糯米飯和

丸如黃米粒大壹二歲兒以薄荷湯下三  
 九日三服三四歲兒服五丸

治小兒慢驚風及取風涎積聚牛黃丸方

牛黃壹分 甘草一分 陳橘皮一分 湯浸

黃連壹分 天南星壹分 附子壹分 附子壹分

炮裂去壹分 半夏壹分 湯洗壹分 乾嗽壹分 犀角屑

皮臍壹分 水銀半兩 燒棗壹分 金薄十片 硫黃

分壹分 硃砂壹分 麝香半兩 巴豆

十枚去心皮膜  
 別研壓去油

右件藥搗羅為末都研令勻以麵糊和丸  
如黍米大每服以甘草薄荷湯下三九至  
五九

治小兒慢驚風兼有疳氣壯熱及乳哺減少

丁香丸方

母丁香半錢 胡黃連半分 盧會半兩 雄黃半兩

朱砂壹分 牛黃半分 麝香壹分 蠟梢一分

青黛壹分 膩粉半分 白附子壹分 天竹黃壹分

細研半兩 鈇霜半兩 天竹黃壹分

右件藥搗羅為末取再研細目糯米糝

丸如菉豆大不計時候以粥飲下三九量

兒大小以意加減

治小兒慢驚風四肢拘急心胃痰帶身腫壯

熱朱砂丸方

朱砂半兩 牛黃壹分 麝香半兩 天麻

天南星半兩 乾姜半兩 白附子半兩 乾姜

藥到巴豆研壓七

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黍米大每



服以蘇汁下壹花粥芥湯下亦得重兜沃

小兒驚風加戒用鹽甘草薄荷湯下三九至

治小兒慢驚風及天瀉驚熱保命丸治

牛黃壹分細研吹天麻壹分天漿子壹分雄黃壹分麝香壹分朱砂壹分麝香壹分麝香壹分

蘇蠟壹分天麻壹分天漿子壹分雄黃壹分麝香壹分朱砂壹分麝香壹分麝香壹分

治法白附子炮壹分青黛壹分朱砂壹分麝香壹分麝香壹分麝香壹分

犀角壹分龍腦壹分朱砂壹分麝香壹分麝香壹分麝香壹分

春伴藥麝香羅為末用猪膽汁和丸如漿

豆大不計時候用薄荷湯下三九又以水

化二丸滴入鼻中令連連嚏後再服更在

臨時量兒大小增減

治小兒慢驚風搐搦發歇不定喉中涎聚時

作聲漸覺虛羸不下乳食眼澁多睡朱砂丸

方

朱砂半兩細研雄黃半兩牛黃壹分龍腦

一分水飛過雄黃半兩牛黃壹分龍腦壹分

細研乾蠍半兩膩粉壹分水銀半兩以鈔壹

兩砂細研砂細研



右件藥先研水銀砂子令細即與諸藥同  
 研入棗肉和凡如菉豆大百日已上兒以  
 薄荷湯下一丸一歲兒兩丸二三歲兒三  
 丸取下粘涎惡物為効此藥慢善不瀉但  
 是虛因瘦瘁宜與服之神驗  
 治小兒慢驚風精神昏迷痰涎逆上咽喉中  
 作聲有時口噤發歇搐搦如聖丸方

牛黃二錢犀角屑一分朱砂一分雄黃壹分  
 麝香壹錢人參一分去蘆頭壹分白茯苓壹分龍齒壹分

方  
 治小兒慢驚風面青口噤四肢拘急七聖丹  
 下三丸量兒大小以意加減  
 棗肉和凡如菉豆大不計時候煎犀角湯  
 右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻以  
 鈞藤壹分羌活壹分蟬殼二七枚甘草半分  
 右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻以

朱砂壹分牛黃壹分麝香一分蠹尾七枚  
 白殭蠶七枚羌活壹分天南星半兩  
 右件藥搗羅為末用棗肉和凡如菉豆大



不計時以薄荷湯下三丸看見大小加減服之

治小兒慢驚風面青口噤吐涎脚冷身熱頻頻搐搦水銀丸方

水銀半兩入黑鉛半兩天南星壹分鉛霜壹分

壹分朱砂細研雄黃壹分天竹黃壹分犀

角屑壹分麝香細研牛黃細研龍腦細研馬

牙消壹分金薄三十片白附子壹分乾蠍

一分膩粉半微炒

右件藥搗羅為末入諸藥同研令勻用雀

兒飯糲內蟲十枚鍊蜜同研和丸如菜豆

大不計時候以薄荷湯化破三丸服量兒

大小加減服之

治小兒慢驚風多涎昏悶或口噤搐搦發歇

作時保生丹方

朱砂半兩天麻半兩白附子半兩白殭

蠶半兩乾蠍全者牛黃

麝香壹分細研



右件藥搗羅為末入朱砂等同研令勻鍊  
蜜和丸如麻子大不計時候以金銀湯下  
三丸量兒大小以意加減

治小兒慢驚風搐搦吐涎烏犀丸方

烏犀角屑壹分羚羊角屑壹分麝香壹分胡黃

連壹分盧會一分雄黃壹分朱砂壹分丁香

壹分牛黃壹分龜腦壹錢天南星一兩用酒

為度切半真壹分漿水壹升煮破噉乾盡為度切破噉乾

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻銚

子內火上化石腦油和丸如菜豆大不計

時候以溫酒化下壹丸金銀薄荷湯下亦

得諸凡只以救苦外如常此洲二數日下

治小兒慢驚風發歇搐搦喉內多涎涎生丹

方

朱砂壹分天南星半兩牛黃壹分麝香壹分

細研二七枚白殭蠶七枚羌活一分

本件藥搗羅為末用棗肉和丸如菜豆大

以薄荷湯化破兩丸服之量兒大小以意



加減

治小兒慢驚風四肢搐搦五靈脂丸方豆大

五靈脂

壹兩

附子

用去

兩生

天南星

壹兩

乾

生用

乾

生用

乾

生用

蠍

壹兩

蟬殼

半兩

生用

半兩

生用

半兩

生用

半兩

生用

半兩

生用

半兩

生用

半兩

生用

半兩

右件藥搗羅為末以醞醋二大盞以藥末

壹兩同煎成膏入餘藥末和丸如菉豆大

未滿月兒以妳汁化破膏丸服二歲已下

二丸漸大以意加之鼻上并出為効

治小兒慢驚風肘熱手足拘急龍齒丸方

龍齒

壹分

麝香

壹錢

朱砂

壹分

白芥子

壹分

阿魏

壹錢

裏煨

水銀

壹分

金薄

二十

銀薄

二十片已上三

右件藥搗羅為末都研令勻以鍊蜜和丸

如黍米大每服以溫酒下三丸量兒大小

以意加減

治小兒慢驚風多涎腹脹發歇搐搦萬靈丹

方

牛黃

壹錢

麝香

半錢

熊膽

半錢

膩粉

半錢

細研入

乾蠍五枚 朱砂壹分 巴豆二枚 木香二枚

白附子三枚 蟬殼七枚

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

黍粒大每服以薄荷荆芥湯下三丸量兒

大小加減服之

治小兒慢驚風痰涎壅悶發歇搐搦迴生丹

方

天麻一分 白附子壹分 白殭蠶壹分 桃膠壹分

天南星壹分

右件藥搗羅為末以爛飯和丸如黍米大

每服以溫薄荷酒下三丸量兒大小加減

服之

治小兒慢驚風及天癆夜啼返魂丹方

蝙蝠一枚 人參一分 乾蠍一分

麝香壹錢

右件藥搗細羅為散入人參白等研令

勻鍊蜜和丸如菜豆大每服以乳汁研下

三丸量兒大小加減服之



治小兒慢驚風心胃痰涎腹內壅悶或時搐搦黃連丸方此散茶豆大或細以厚片紙不

黃連一分青黛一分麝香一分朱砂一分巴豆一分

霜半

右件藥都研令細用猪膽汁和丸如黍米

命大每服以薄荷湯下空如量兒大小加減

服之

治小兒慢驚風及疳熱龍腦丸方大小心熱

龍腦一分麝香一分天香一分天香一分天香一分天香一分

細射香一分蟾酥半牛黃一分犀角末

青雄黃壹分

右件藥都研令勻用猪膽一枚別入黃連

末一分入在猪膽內繫却以漿水一椀入

銚子內煮盡取出與藥末和丸如黍米大

壹二歲兒以溫水下壹丸欲喫先用一丸

子研破吹入鼻內得嚏為効

治小兒慢驚風及天癆熱疳心驚悸等玉液

丹方

白附子 壹分 生用 赤箭 壹分 白殭蠶 壹分 膩粉 壹分

右件藥以三味搗羅為末 研令勻

鍊蜜和丸如麻子大壹二歲 熟水

下三九三四歲每服五九日二三

大小以意加減

治小兒慢驚風發歇不定天漿子丸方

天漿子 二七枚 麩炒 蟬殼 二七枚 微炙 棘刺 三七枚 微炙

炒微蠶紙 二張 燒灰 防風 壹兩 去蘆頭 朱砂 一分 射

香 壹分 細研

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

麻子大壹二歲兒每服五丸連夜三服量

兒大小以意加減

治小兒慢驚風搐搦煩熱犀角丸方

犀角屑 壹分 帶 蟬殼 二七枚 微炙 烏蛇 半兩 酒浸去

牛黃 壹分 細研 青黛 壹分 細研 天漿子 二七枚 微炙 地

竜 壹分 炒 蟾酥 半錢 鐵器上焙過 朱砂 半兩 細研 防

風 半兩 去蘆頭 蠶紙 一張 燒灰 麝香 一分 細研

右件藥搗羅為末 藥都



蜜升丸如膠泥末

藥精

用牛乳大 蠶絲 一匙 麝香 一分

治小兒慢驚

積滯 吐瀉 疳積 米 牛 水 煎 服

麝香

精份 牛黃 天附子 鐵器 土磨 片 猪

三 中 夏 七 湯 洗 蟾 酥 於 鐵 器 土 磨 片 猪

膽一枚天漿子十枚

右件藥搗羅為末用麵糊和丸如黍米大

壹二歲兒每服五丸未差頻服量兒大小

以意加減

治小兒慢驚風天南星煎丸方

天南星壹兩細剉以水二盞煎至白

附子半兩天麻兩

右件藥搗羅為末以天南星煎和丸如棗

豆大三五歲兒每服以薄荷湯下二丸五

六歲兒每服三丸日再服量兒大小以意

加減

又方雀兒飯麤三枚有白殭蠶三枚乾蠍三枚

炒

右件藥擣

又八日服藥由香白散散三劑外

服法

大氣以時服三式日再服量服大小以意

更大三正慈良以藥治盡才二九正

醫方類聚卷之五百五十六

天麻

天麻治風濕痺痛

小兒驚風

