

Einführung in die mathematische Logik

Arbeitsblatt 9

Übungsaufgaben

AUFGABE 9.1. Bestimme die freien Variablen in den folgenden Ausdrücken, wobei x, y, z Variablen seien und f ein einstelliges Funktionssymbol und R ein zweistelliges Relationssymbol sei.

- (1) $\forall x (fx = y)$,
- (2) $\forall x (fx = y) \wedge \exists z (fx = y)$,
- (3) $\forall x \exists y Rxfy$,
- (4) $(\forall x \exists y Rxfy) \rightarrow x = y$.

AUFGABE 9.2. Es sei $\alpha \in L_0^S$ ein Satz einer erststufigen Sprache über einem Symbolalphabet S . Es sei eine S -Struktur mit Trägermenge M gegeben und I_1 und I_2 zwei auf M definierte S -Interpretationen. Zeige $I_1 \models \alpha$ genau dann, wenn $I_2 \models \alpha$ gilt.

AUFGABE 9.3. Es seien c, d Konstanten einer erststufigen Sprache, x, y, z, v Variablen, f ein einstelliges und g, h zweistellige Funktionssymbole. Bestimme die Substitution

$$ghhxcdfz \frac{fx, \quad gxz, \quad hvfx}{x, \quad y, \quad z}.$$

AUFGABE 9.4. Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien x_1, \dots, x_k paarweise verschiedene Variablen und t_1, \dots, t_k fixierte S -Terme.

- a) Interpretiere die Termsubstitution $\frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ als Abbildung.
- b) Interpretiere die Substitution von Ausdrücken $\frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ als Abbildung.

AUFGABE 9.5.*

Es seien x, y, z Variablen (mit der angegebenen Reihenfolge), c eine Konstante und f ein einstelliges Funktionssymbol.

(1) Bestimme

$$(\exists x(x = c)) \frac{z}{x}.$$

(2) Bestimme

$$(\exists x(x = c)) \frac{x}{x}.$$

(3) Bestimme

$$(\exists x(x = c)) \frac{fx}{x}.$$

AUFGABE 9.6.*

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben.

- (1) Zeige, dass die Substitution $\frac{x}{x}$ für die Terme die Identität ist.
- (2) Zeige, dass die Substitution $\frac{x}{x}$ für die Ausdrücke die Identität ist.

AUFGABE 9.7. Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben, es sei x eine Variable und t ein fixierter S -Term. Gehört die Symbolkette (!) $\alpha \frac{t}{x}$ zu L^S ?

AUFGABE 9.8. Es sei c eine Konstante einer erststufigen Sprache, x, y, z, u Variablen, f ein einstelliges Funktionssymbol, g, h zweistellige Funktionssymbole und R ein zweistelliges Relationssymbol. Bestimme die Substitution

$$(\forall y Rxy \wedge \neg Ryfz) \frac{fx, \quad gxz, \quad hcfx}{x, \quad y, \quad z}.$$

AUFGABE 9.9. Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Man gebe ein Beispiel für eine Substitution $\frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ und einen S -Ausdruck α derart, dass die sukzessive substituierten Ausdrücke

$$\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \left(\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \\ \left(\left(\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \dots$$

immer länger werden.

AUFGABE 9.10.*

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien x_1, \dots, x_k paarweise verschiedene Variablen und t_1, \dots, t_k fixierte S -Terme. Zeige, dass für jeden S -Satz $\alpha \in L_0^S$ die Gleichheit

$$\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} = \alpha$$

gilt.

AUFGABE 9.11. Es sei $\alpha \in L^S$. Zeige, dass die Gleichheit

$$\left(\alpha \frac{y}{x} \right) \frac{z}{y} = \alpha \frac{y, z}{x, y}$$

im Allgemeinen nicht gilt.

AUFGABE 9.12.*

Es seien x_1, x_2 Variablen, t_1, t_2 Terme und α ein Ausdruck in einer prädikatenlogischen Sprache. Zeige, dass

$$\alpha \frac{t_1, t_2}{x_1, x_2} \rightarrow \left(\alpha \frac{t_1}{x_1} \right) \frac{t_2}{x_2}$$

im Allgemeinen nicht allgemeingültig ist.

AUFGABE 9.13.*

Es seien x_1, x_2 Variablen, t_1, t_2 Terme und α ein Ausdruck in einer prädikatenlogischen Sprache. Zeige, dass

$$\left(\alpha \frac{t_1}{x_1} \right) \frac{t_2}{x_2} \rightarrow \alpha \frac{t_1, t_2}{x_1, x_2}$$

im Allgemeinen nicht allgemeingültig ist.

AUFGABE 9.14.*

Es seien x, y Variablen, s, t Terme und α ein Ausdruck in einer prädikatenlogischen Sprache. Es seien u, v neue Variablen, die weder in s noch in t noch in α vorkommen. Zeige, dass

$$\alpha \frac{s, t}{x, y} \leftrightarrow \alpha \frac{s \frac{v}{y} t \frac{u}{x} x y}{x y u v}$$

allgemeingültig ist, wobei der Ausdruck rechts als die Hintereinanderausführung von vier Einzelsubstitutionen (von links nach rechts) zu lesen ist.

AUFGABE 9.15.*

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben, $\alpha \in L^S$ und I eine Interpretation mit $I \models \alpha$. Zeige durch ein Beispiel, dass daraus nicht im Allgemeinen die Gültigkeit $I \models \alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ unter einer Substitution folgt.

AUFGABE 9.16. Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien x_1, \dots, x_k paarweise verschiedene Variablen und t_1, \dots, t_k fixierte S -Terme. Zeige, dass zu einem allgemeingültigen Ausdruck α auch die Substitution $\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ allgemeingültig ist. Gilt hiervon auch die Umkehrung?

Aufgaben zum Abgeben

AUFGABE 9.17. (2 Punkte)

Es sei α ein S -Ausdruck. Zeige, dass es einen S -Ausdruck β der Form $\beta = \alpha \wedge \gamma$ derart gibt, dass

$$\text{Frei}(\beta) = \text{Var}(\alpha) = \text{Var}(\beta)$$

gilt.

AUFGABE 9.18. (2 Punkte)

Es seien c, d Konstanten einer erststufigen Sprache, x, y, z, u, v, w Variablen (in dieser Reihenfolge), f ein einstelliges Funktionssymbol, g ein zweistelliges Funktionssymbol und P, R einstellige Relationssymbole. Bestimme die Substitution

$$(\forall y(y = c) \vee (\neg Rfz \rightarrow \exists x \neg Pu)) \frac{gzz, \quad c, \quad fu}{x, \quad y, \quad z}.$$

AUFGABE 9.19. (3 Punkte)

Man gebe für jedes $r \in \mathbb{N}_+$ ein Beispiel für eine Substitution $\frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}$ und einen S -Ausdruck α derart, dass die sukzessive substituierten Ausdrücke

$$\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \left(\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \left(\left(\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k}, \dots$$

eine Periode der Länge r besitzen.

AUFGABE 9.20. (3 Punkte)

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_\ell$ paarweise verschiedene Variablen und $t_1, \dots, t_k, s_1, \dots, s_\ell$ fixierte S -Terme. Zeige, dass für Terme τ , in denen y_1, \dots, y_ℓ nicht vorkommen, die Gleichheit

$$\left(\tau \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell} = \tau \frac{t_1 \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}, \dots, t_k \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}}{x_1, \dots, x_k}$$

gilt.

AUFGABE 9.21. (2 Punkte)

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_\ell$ paarweise verschiedene Variablen und $t_1, \dots, t_k, s_1, \dots, s_\ell$ fixierte S -Terme. Zeige durch ein Beispiel, dass für Terme τ die Gleichheit

$$\left(\tau \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell} = \tau \frac{t_1 \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}, \dots, t_k \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}}{x_1, \dots, x_k}$$

nicht gelten muss.

AUFGABE 9.22. (4 Punkte)

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_\ell$ paarweise verschiedene Variablen und $t_1, \dots, t_k, s_1, \dots, s_\ell$ fixierte S -Terme. Zeige durch ein Beispiel, dass für Ausdrücke α die Gleichheit (von Ausdrücken)

$$\left(\alpha \frac{t_1, \dots, t_k}{x_1, \dots, x_k} \right) \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell} = \alpha \frac{t_1 \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}, \dots, t_k \frac{s_1, \dots, s_\ell}{y_1, \dots, y_\ell}}{x_1, \dots, x_k}$$

nicht gelten muss.

AUFGABE 9.23. (3 Punkte)

Es sei ein Symbolalphabet S einer Sprache erster Stufe gegeben. Es seien x, z verschiedene Variablen, t ein S -Term und α ein S -Ausdruck, wobei z weder in t noch in α vorkomme. Gilt dann die Gleichheit

$$\left(\alpha \frac{z}{x} \right) \frac{t}{z} = \alpha \frac{t}{x}?$$