

-290

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海簡 謂半本訂
飛光炳宣助校

傷寒發頭第四十七

傷寒發頭亦名汗毒。此因原受風寒。用藥發散未盡。日久傳化為熱不散。以致項之前後結腫疼痛。初起身熱口渴者用柴胡葛根湯清熱解毒。患上紅色熱是者如意金黃散敷之。初起身涼不渴者牛蒡甘桔湯散之。患上微熱不紅疼痛者牛蒡桔梗和之。腫深不退砍作膜者宜托裏消毒散。已潰氣血虛弱食少者宜補中益氣湯以此治之。未成者消已成者潰已潰者飲用之最穩。徐曰此段所用之藥俱切病。此症宜平涼疎散最忌大寒。

牛蒡甘桔湯
加川芎食通眼

柴胡葛根湯
柴胡葛根湯花粉
石膏升麻并桔梗

桔梗連翹牛蒡子

石膏各一
甘草分五

升麻分三 水二茶鍾煎八分不拘時服

牛蒡子桔梗陳皮天花粉

治頭毒表散未盡身熱不解。紅腫堅硬作痛者

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩

牛蒡甘桔湯
加上川芎

花粉黃連蘇木陳
傷寒頭毒即時平

治頭毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者

牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉

桔梗連翹牛蒡子

石膏各一
甘草分五

升麻分三 水二茶鍾煎八分食後服

徐曰即前方意

傷寒發頭應用方

如意金黃散 托裏消毒散

冲和膏俱見腫瘍門

補中益氣湯見潰瘍門

癟發第四十八

癟發乃天時不正之氣所感而發。非毒內作也。此患多生於手足掌心或腰腿臂下伸縮之處。漫腫無頭。憎寒發熱四肢沉重煩渴為甚。以下句斷句。初起宜服萬靈丹。發汗解表腫仍不消者必欲作膿。托消毒散。兼蠅蠶丸間服。以後俱照潰瘍法治。徐曰此症人多不識。各人自造一說。用藥亦各各樣雜藥亂投。往往致死而人總不知也。

又曰此症最難識。乃溼熱之症。即所謂無名腫毒也。以消痰利溼為主。

癟發應用方

萬靈丹 托裏消毒散

蠅蠶丸俱見腫瘍門

癟瘍第四十九

癟瘍一名蛇瘡。川廣烟瘴地而有之。初出先作紅點。次變黑色腐爛筋骨。小者如粟如豆。大者如梅如李。發無定處。初用蟾酥膏貼。數熱交作者泰米寸金丹。或飛龍奪命丹亦可。紅腫遊走不定者真君妙貼散。加雄黃敷之自然截住。破後脾胃虛弱食少乾嘔者補中益氣湯加黃連芩冬補而不應。腫高疼甚惟出清水搗汁者不治。徐曰此症江浙所無。

癟瘍應用方

飛龍奪命丹即蟾酥丸加金頭蜈蚣二條

泰米寸金丹 真君妙貼散見腫瘍門

補中益氣湯見腫瘍門

小腹癰乃七情火鬱。以致脾虛氣滯而成其患。小腹漫腫堅硬肉色不變。有熱漸紅者屬陽易治。無熱不紅者屬陰難治。初起七日以前用艾

傷寒發頭 滅核瘻疽 小腹癰鵝口瘡 龍渠瘻虎頭瘡 石榴疽

上海大成書局印行

當腫項火七壯。膏鹽首尾內服。健脾胃。養氣血。行經補托之劑。可保終吉。如誤用剋伐攻利涼藥者。敗症必出。十全大補湯倍加冬耆附以救之。此句徐勒批曰。是癘藥不切。內腐深陷者。玉紅膏。長肉收斂補托不應者。雖愈終久成漏。

小腹癰應用方

十全大補湯

王紅膏見清瘡門

徐曰。以上有症無方者。即於諸症之中。擇其切病者用之。

鶴口疽第五十一

瘡門

治鶴口疽初起。朝寒暮熱。日輕夜重。如瘡等症。

川芎

當歸

白芍

熟地

錢一錢

鶴口疽乃三陰虧損。督脈之經濁氣。溼痰流結而成其患。發在尾閭之穴。高骨頭尖。初起形似魚肚。久則突如鶴嘴。朝寒暮熱。日輕夜重。清後稀膿出而無禁。又或鮮血出而不停。凡發此者。壯年猶可。老年可慮。初起宜滋陰除溼湯和之。已成未潰者。和氣養榮湯托之。潰而不斂者。滋腎保元湯補之。久而成漏者。琥珀蠟礬丸兼先天大造丸服之。甚妙。徐曰。因各不同。不僅三陰也。

柴胡

黃芩

陳皮

知母

貝母

分八

澤瀉

地骨皮

甘草

分五

水二茶鍾

薑三片

煎八分

食前服

徐曰。此

通治之方。不切此症。

梔子熟地徐勒。

和氣

養榮

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。破後膿多可服。

滋腎

保元

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

和氣

養榮

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

滋陰

除溼

湯

丹皮

當歸

熟地

錢各一

沈香

甘草

分五

水二茶鍾

煎八分

食前服

徐曰。此

龍泉疽

虎頭毒

應用方

如意金黃散

內疏黃連湯

荆防敗毒散

荆門

石榴疽者乃少陽相火與外溼相搏而成。具惠生在肘井上二十日此奇症初起一黑黃粟小泡根便開紅腫硬脹如鐵碗皮破泛出

疊如榴子令人寒戰猶如重瘧初起即灸九壯此句內服蟾酥丸發汙以解溫毒火頂上蟾酥餅貼之膏益消腫處金黃散敷之內服菊花清燥湯

清燥湯琥珀蠟蕊丸煩燥甚者護心散金液丹九日後患上作膿稠黃痛苦稍減表裏症退飲食微進者可保無虞反此為逆潰後

元氣虛弱症相兼者照癰疽調理法治之

徐曰此症初起易忽已成則無人能識此篇治法最良

菊花清燥湯菊花清燥湯生地

知母芍藥地骨

甘草升麻等

犀角冬白皮宜

甘草分量

柴胡黃芩各一

水二茶鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

徐曰此病主方

麥門冬地骨皮各一

金液丹土丹

見脫

石榴疽應用方 蟾酥丸 痞門 琉璃蠟蕊丸

王紅膏

如意金黃散

銀屑丸

金液丹

見脫

穿踝疽應用方

蟾酥丸

瘡門

琥珀蠟蕊丸

護心散

如意金黃散

銀屑丸

金液丹

見脫

穿踝疽第五十四

大麻風

第五十五

大麻風乃天地間異症也但感受不同有體虛之人因驟被陰陽暴晒露霧風雨之氣所侵感之不覺未經發泄凝滯肌膚積久必作有房慾後體虛為風邪所襲或露臥當風睡眠溼地或洗浴乘涼希圖快意俱能致之其患初起起麻木不仁次發紅斑久則破爛浮腫無膿其症最惡故曰皮死麻木不仁肉死刀割不痛血死破爛流水筋弛指節脫落骨死鼻樑崩塌有此五症俱為不治又曰受之先損於目肝受之面發紫泡脾受之偏身如癱肺受之眉毛先脫腎受之足底先穿又為五敗症也總皆風濕相乘氣血凝滯表裏不和臟腑痞寒陽火所變初起麻木不仁肌肉未死者宜萬靈丹洗浴發汗以散凝滯之風後服神農真丹加白花蛇等分久服自愈年久肌破肉死者先用必勝散疏通臟腑次服萬靈丹每日酒化一丸通活血脉服至一月換服苦參丸輕者半年重者一載漸愈或兼服酒藥戒房事厚味動風等味可保不發徐曰此症總屬不治遷延歲月則有之然患此者絕少若稍似風症並非真風醫者竟以治風之藥治之反傷敗氣血變成風症此等最多不可不知楊案王君士雄謂此證粵閩江右甚多內因淫火蘊毒熱極生風外因山嵐惡障毒風交互之邪前理初矣已

鴻鵠與梅瘡同論得其旨矣徐氏以為絕少但指江浙言也

萬靈丹

治大麻風初起麻木不仁或既久皮膚破裂手足拳掣肢體不便但末指脫足穿者

必勝散

必勝散中用大黃

白芍枳榔共粉霜

生薑搗汁水和糖

治大麻風血熱秘結臟腑不通宜用此藥利之

大黃

枳榔

白牽牛各一

粉霜五分

右各為細末年壯者作五服中久虛者作七服

用生薑四兩搗汁赤砂糖三錢加水一大杯三味和勻

臨睡時腹中稍冷頓溫通口服之

即睡至三更偏身麻木如針刺頭目齒縫俱痛此藥專病之功已達行出大小二便或青白黑黃又或紅蟲之類此乃病根也一月內服藥三次漸痊眉髮俱生肌膚如舊齒縫有血宜漱後藥徐曰大麻風本無愈理如此峻劑徒傷人耳。

漱藥方水煎加入些水片齒縫何愁血似泉貫眾黃連各三錢水二茶鍾煎至一杯加冰片少許每日隨續漱之其血自止切忌動風油

苦參丸古今丸新久麻風諸癰症 品味難將一一列

防風新久麻風諸癰症 劝君久服自能安

治大麻風不斬久穿破潰爛老幼俱可服之。苦參一千克 大楓子肉兩 荆芥兩

川芎 大胡麻 川芎 菖黎 大皂角

白附子 杜仲 草烏泡去皮尖

當歸 天麻 杜仲

蔓荆子 蒼朮 萬年青

全蝎 風藤 番活 連翹 蒼朮

獨活各五錢 滾熟苦杞尤善活

麻風藥酒方麻風酒用歸防桔草扇子與白茅根炒黃 右藥共為細末醋打老東糊為丸梧桐子大每服三四十九溫酒食前後任下避風忌

一伏寺取服數杯自效。徐曰亦可備用。

雄硫散雄硫散內屬鳳皮眉毛脱落此甚醫 治大麻風眉毛鬚髮脫落作瘡者宜此藥擦之。雄黃 硫黃 凤凰皮即雄雞設燒黃 各五錢

穿山甲炒黃一斤 右各為細末用半油核桃肉一兩搗爛同公猪膽汁一箇并前藥和勻用青紗包藥擦之日用三次其瘡漸生

如舊。徐曰未必有效。徐曰未必有效。

又擦麻風病面生紫塊疮瘡方。穿山甲研末研末存性 川椒炒研末各二錢 右用薑汁土大黃根汁調稠絹包擦之如藥乾加水調擦亦效。忌動風

發物等件。

翻花瘡應用方 水蠅散見據 珍珠散見下 又擦麻風病面生紫塊疮瘡方。穿山甲研末研末存性 川椒炒研末各二錢 右用薑汁土大黃根汁調稠絹包擦之如藥乾加水調擦亦效。忌動風

翻花瘡第五十六

翻花者乃頭大而蒂小者如豆大者若剪無苦無疼。割每流鮮血久亦虛人以津調水蠅散偏搽正面用軟油紙包裹根蒂處。用線

連紙扎緊十日後其患自落。珍珠散捲之收口又有根蒂如蠶頭棋子樣難扎以前藥搽上用麪糊綿紙封上二重用心勿動十日外亦

落換珍珠散。徐曰此又一種最輕者如真翻花大如杯碗膿血淋漓無藥可治乳岩即此類也。又曰楊梅毒亦有此症。

翻花瘡應用方

水蠅散見據

珍珠散見下

腋癰第五十七

腋癰俗稱夾癰此肝脾二經為患。肝經血滯脾經氣凝共結為腫。初起皮色不變漫腫無頭。日久方疼乃生寒熱。此寒難消終必作脹。未破者柴胡清肝湯已破者十全大補湯去肉桂加香附陳皮。軟腫脹脹脹痛者針之膏肓徐曰無頭此症尾溫補忌用寒涼

腋癰多從鬱怒肝火而發。肥胖內實者鮮此症。初起宜施子清肝湯。柴胡清肝湯解鬱瀉火已成。託裏消毒散加青皮香附。膿已成即針之勿傷內膜。此句海圖已破後八珍湯加丹皮山萸澤瀉熱滋腎水如虛勞所得破流臭水敗腐稀膿補託不應者死徐曰與腋癰同治。

腋癰應用方

託裏消毒散見睡竈門

施子清肝湯

柴胡清肝湯見瘡門八珍湯見瘡門

鼻痔第五十九

鼻痔者由肺氣不清風溼鬱滯而成。鼻內瘻肉結如榴子漸大下垂。閉塞孔竅氣不宣通。內服辛夷清肺飲外以硇砂散逐日點之漸化為水乃愈。兼節飲食斷厚味戒暴食。鼻中瘻肉自然不再發。徐曰此症服藥為輕外治為重。如別有他恙乃宜服藥。

辛夷清肺飲甘草升麻及知母 挑斧參冬生石膏

枇杷葉用湏去毛

百合 石膏 知母

葛根一 甘草伍

枇杷葉三片

升麻分

水二茶鍾煎八分食後服

徐曰此症主

辛夷分 黃芩

升麻分

山梔 離門冬

石膏

知母

葛根一

甘草伍

枇杷葉去毛

升麻分

水二茶鍒煎八分食後服

徐曰此症主

辛夷分 黃芩

硇砂散硇砂散內用雄黃 水片再加輕粉

鼻中瘻肉自然

光

治鼻生瘻肉初如榴子漸大下垂名為鼻痔也

硇砂錢一 輕粉三分

水片五厘

雄黃三分

右共為末用草桔咬毛蘸藥勤點痔上日用

五六次自然漸化為水而愈

徐曰其方甚多此亦可用

如草薢苦丁鹽梅麝香辰蒂藜

蘆甘遂龍骨生地俱可選用

俱可點綿亦可

又曰降藥亦如

取鼻痔秘方先用回香草散連次二次

用細銅筋一根筋頭鑽一小孔用線繩穿孔內

二筋相離五分許以二筋頭直入鼻痔根上

將筋

綫繩緊向下拔其痔自然拔落

置水中觀其大小用頭胎髮燒灰同衆牙末等

分吹鼻內其血自止戒口不發

徐曰此乃手法但痔形

不一有根在鼻孔之內將鼻寒滿從何處拔此法不必學

回香草散回香草散為末共吹鼻痔上 取如拾芥一味同

回香草高良薑酒乾等分為末用此先吹鼻痔上

二吹片時許方行取法其痔自然易脫

骨槽風第六十

骨槽風初起生於耳前連及腮項痛陽筋骨久則漸漸漫腫寒熱如瘡牙關緊閉不能進食此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急則虛傷脾致肌肉

腐爛高粱厚味致膿多真誠

初則堅硬難消久則瘡口難合

徐曰不各七壯膏貼以泄內毒餘腫用

真君妙貼散敷之牙關內腫用線針刺去惡血水硼散搽之使內外毒氣得解

宜服降火化痰清熱消腫之劑

清後當挑裏藥中加參冬五

味外腐者搽玉紅膏使水升火降脾健金清乃愈又有外腐不合虛熱不退堅腫不消形佳體削者死

徐曰此症以清火消痰為主

又

此症又有初起並非骨槽瘡口老腫久變成骨者

治牙根盡處結腫連及耳項作痛名骨槽風也

升麻 白芷 黃芩 牛蒡子

白芷藜與當歸身

升麻白芷共防制

清陽散火湯

清陽散火湯組苓

甘草牛蒡子

升麻白芷共防制

清陽散火湯

清陽散火湯

骨槽風初起生於耳前連及腮項痛陽筋骨久則漸漸漫腫寒熱如瘡牙關緊閉不能進食此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急則虛傷脾致肌肉

腐爛高粱厚味致膿多真誠

初則堅硬難消久則瘡口難合

徐曰不各七壯膏貼以泄內毒餘腫用

真君妙貼散敷之牙關內腫用線針刺去惡血水硼散搽之使內外毒氣得解

宜服降火化痰清熱消腫之劑

清後當挑裏藥中加參冬五

味外腐者搽玉紅膏使水升火降脾健金清乃愈又有外腐不合虛熱不退堅腫不消形佳體削者死

徐曰此症以清火消痰為主

又

清陽散火湯

連翹

石膏 防風

當歸 荆芥

白蒺藜子 甘草

水二茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

黃耆 白芷 川芎

甘草分量同前

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

骨槽風應用方

真君妙貼散

玉紅膏

水硼散

鼻門

俱見腫

咽門

紫白癰風第六十一

大胡麻油

防風

咸靈仙

石菖蒲

大黃酒

白芷

川芎

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

紫白癰風乃一體二種。紫因血滯，白因氣滯。總由熱體風溼所侵，凝滯毛孔，氣血不行所致。皆從外來。初起毛竅閉而體强者，宜當散以汗

散之。次以胡麻丸常服。外用蜜陀僧散搽擦，亦可得愈。

胡麻丸 苦参各二錢。白附子 納參各一錢。胡麻丸內用防風 灵仙石菖蒲各一錢。同前。

雌雄四黃散。雄散用石硫黃，共研為末。雄雌二黃要相當。

羊煎炒海腥火酒等物，不復發。

徐曰：此方最切近他方，總不外此。

右為細末。紫癰醋調用堅槿木毛頭蘸藥擦之。

白附子

桐子大一錢。形圓者一錢五分。食後臨卧白滾湯送下。

石黃 硫黃 雄黃

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

肥皂方 韭角 甘松 山柰 白芷

大胡麻油

防風

咸靈仙

石菖蒲

大黃酒

白芷

川芎

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

涼皮弦肥皂一斤，粗匀洗擦患處，日久自效。

川槿皮

右為細末。

紫癰醋調用堅槿木毛頭蘸藥擦之。

白附子

桐子大一錢。形圓者一錢五分。食後臨卧白滾湯送下。

石黃 硫黃 雄黃

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

紫白癰風應用方 雄黃 紗布各等分研細末，塞陀僧散，見汗門。

齒病第六十二

蜜陀僧散

見汗門

右用架帝蘸擦患處，如白癰加蠍散同擦。

齒病有風有火，亦有陽明溼熱，俱能致之。風痛者遇風發作，浮腫隨後生痛。消風散治之。火痛者則齒根必齧扯腮頰，陣陣作痛。時發時止。

以水硼散擦之。出涎自愈。陽明經溼熱作痛者，腮頰浮腫，甚者牽引太陽，疼痛頸項，口中氣熱，大便結燥，宜涼膈散加石膏治之。腫高而

軟者，內必有膿，用針刺破，出膿自愈。齒齧腐爛出血不止者，內服犀角地黃湯，外搽人中白散。又小兒鑽齒疳牙根，穿出齒根，內外芒刺。

嘴唇作痛，用拔針挑破牙齧，以手取去本牙，出血不止，以溼紙換貼二三次，其血自止。必兼戒厚味，其牙復生如舊。

涼膈散涼膈散中用石膏

山梔海桔共連翹

大黃還宜用朴硝

治陽明經溼熱上攻致牙根腮頰作腫多痛者

連翹

山梔

黃芩

薄荷

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

涼膈散涼膈散中用甘草

黃芩甘草淡竹葉

右水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

甘草分量同前

大黃根

朴硝

石膏五錢

淡竹葉三十片

水一茶鍾煎八分食後服 徐曰此亦通治方

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈
犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥
牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服面色姜黃大便黑者更宜服之又牙縫中無草出血者亦妙

止血四生湯止血四生湯荷葉
童便一盃更妙

徐曰此治一應血熱妄行之要方

人中白散

見口消風散

癰漏第六十三

齒病應用方

齒漏者又名鼻漏總由風寒凝入腦戶與太陽溼熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點滴長流無久則頭眩虛暉不凹治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已須補中益氣湯六味地黃丸此二方徐勒相間服之以滋化源始愈

謂風火外侵膽熱上移膾漏上竇皆成鼻漏若腦漏乃本元不固所流腥水黏而不稠煩勞即發治宜補攝與鼻漏同流鼻冰頸分別言之

奇授藿香湯舌有奇根藿香湯連枝帶葉水煎服

專治鼻漏潤涕長治鼻漏黃水濁涕長致腦戶虛眩不已用藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加

公猪膽汁一枚和同食後口服之至重者不過三服如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪膽汁熬稠膏為丸每服一錢食後白滾湯送下亦效

徐曰此方甚穩但服者多無效

齒漏應用方

破傷風第六十四

破傷風因皮肉損破復被外風襲入經絡徐園漸傳入裏其寒熱交作口噤咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼自汗傷處反平臨如故其毒內收矣當用萬靈丹發汗令風邪外出次以玉真散貼之得膿為效如汗後前症不退傷處不高漸醒昏時發時止口噤不開聲

脳漏第六十五

補中益氣湯

六味地黃丸俱見清

天麻餅子見頭

破傷風第六十六

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮分

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈

犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥

牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服

止血四生湯止血四生湯荷葉

童便一盃更妙

徐曰此治一應血熱妄行之要方

人中白散

見口消風散

癰漏第六十三

齒病應用方

齒漏者又名鼻漏總由風寒凝入腦戶與太陽溼熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點滴長流無久則頭眩虛暉不凹治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已須補中益氣湯六味地黃丸此二方徐勒相間服之以滋化源始愈

謂風火外侵膽熱上移膾漏上竇皆成鼻漏若腦漏乃本元不固所流腥水黏而不稠煩勞即發治宜補攝與鼻漏同流鼻冰頸分別言之

奇授藿香湯舌有奇根藿香湯連枝帶葉水煎服

專治鼻漏潤涕長治鼻漏黃水濁涕長致腦戶虛眩不已用藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加

公猪膽汁一枚和同食後口服之至重者不過三服如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪膽汁熬稠膏為丸每服一錢食後白滾湯送下亦效

徐曰此方甚穩但服者多無效

齒漏第六十五

補中益氣湯

六味地黃丸俱見清

天麻餅子見頭

破傷風第六十六

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮分

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈

犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥

牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服

止血四生湯止血四生湯荷葉

童便一盃更妙

徐曰此治一應血熱妄行之要方

人中白散

見口消風散

癰漏第六十三

齒病應用方

齒漏者又名鼻漏總由風寒凝入腦戶與太陽溼熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點滴長流無久則頭眩虛暉不凹治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已須補中益氣湯六味地黃丸此二方徐勒相間服之以滋化源始愈

謂風火外侵膽熱上移膾漏上竇皆成鼻漏若腦漏乃本元不固所流腥水黏而不稠煩勞即發治宜補攝與鼻漏同流鼻冰頸分別言之

奇授藿香湯舌有奇根藿香湯連枝帶葉水煎服

專治鼻漏潤涕長治鼻漏黃水濁涕長致腦戶虛眩不已用藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加

公猪膽汁一枚和同食後口服之至重者不過三服如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪膽汁熬稠膏為丸每服一錢食後白滾湯送下亦效

徐曰此方甚穩但服者多無效

齒漏第六十五

補中益氣湯

六味地黃丸俱見清

天麻餅子見頭

破傷風第六十六

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮分

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈

犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥

牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服

止血四生湯止血四生湯荷葉

童便一盃更妙

徐曰此治一應血熱妄行之要方

人中白散

見口消風散

癰漏第六十三

齒病應用方

齒漏者又名鼻漏總由風寒凝入腦戶與太陽溼熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點滴長流無久則頭眩虛暉不凹治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已須補中益氣湯六味地黃丸此二方徐勒相間服之以滋化源始愈

謂風火外侵膽熱上移膾漏上竇皆成鼻漏若腦漏乃本元不固所流腥水黏而不稠煩勞即發治宜補攝與鼻漏同流鼻冰頸分別言之

奇授藿香湯舌有奇根藿香湯連枝帶葉水煎服

專治鼻漏潤涕長治鼻漏黃水濁涕長致腦戶虛眩不已用藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加

公猪膽汁一枚和同食後口服之至重者不過三服如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪膽汁熬稠膏為丸每服一錢食後白滾湯送下亦效

徐曰此方甚穩但服者多無效

齒漏第六十五

補中益氣湯

六味地黃丸俱見清

天麻餅子見頭

破傷風第六十六

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮分

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈

犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥

牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服

止血四生湯止血四生湯荷葉

童便一盃更妙

徐曰此治一應血熱妄行之要方

人中白散

見口消風散

癰漏第六十三

齒病應用方

齒漏者又名鼻漏總由風寒凝入腦戶與太陽溼熱交蒸而成其患鼻流濁涕或流黃水點滴長流無久則頭眩虛暉不凹治以藿香湯主之天麻餅子調之亦可漸愈如日久虛眩不已須補中益氣湯六味地黃丸此二方徐勒相間服之以滋化源始愈

謂風火外侵膽熱上移膾漏上竇皆成鼻漏若腦漏乃本元不固所流腥水黏而不稠煩勞即發治宜補攝與鼻漏同流鼻冰頸分別言之

奇授藿香湯舌有奇根藿香湯連枝帶葉水煎服

專治鼻漏潤涕長治鼻漏黃水濁涕長致腦戶虛眩不已用藿香連枝帶葉者五錢水一碗煎七分加

公猪膽汁一枚和同食後口服之至重者不過三服如此藥苦甚不堪服用藿香末一兩公猪膽汁熬稠膏為丸每服一錢食後白滾湯送下亦效

徐曰此方甚穩但服者多無效

齒漏第六十五

補中益氣湯

六味地黃丸俱見清

天麻餅子見頭

破傷風第六十六

當歸酌用

清中散清中微用牡丹皮

丹皮分

升麻分

生地黃連甘草歸

胃經積熱皆可醫

單撥散單撥散用真阿魏

麝香水片同研細

治風溼蟲牙作腫疼痛如陽明內熱作疼勿用

單撥

真阿魏錢各二

水片

麝香

各一右為細末每用半豆許擦放牙根痛縫中吐去熱涎溫湯漱之再擦即愈尚有阿魏恐怕作吐

媚案真阿魏徐園此品最難得真

者諸書皆言極臭此亦氣防作吐蓋皆為肆中以胡蒜白僵造者所未見真品故也余有友人胎以塔爾巴哈臺阿魏精其色黑中帶黃

並非真品之氣味極清不作恶心乃知真品固自不同江浙去西番萬里而肆中所售阿魏乃甚賤其價可知

又牙疼方附鹽加入更和研

麝香川椒共為末

熟上牙根痛如失

單撥錢

蟾酥分

川椒分

飛鹽分

右共為末用草鞋咬毛雞糞搽點痛牙根上

徐曰方太熱烈

犀角地黃湯犀角地黃湯芍藥

牡丹皮各等每五錢水二茶鍾前八分不拘時服

止血四生湯止血四生湯荷葉

童便一盃更妙</p

不出者終為死候。徐曰此症總以驅風為主。

玉真散

王真散肉用南星

海上防風用白附子各等分

右為末

每服二錢

熱酒一鍾調服密黑

更敷傷處若牙關緊急腰背反張者每服三錢用熱黃便調服雖內有瘻

血亦愈至於昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若治風大咬傷更敷傷處亦效

徐曰此專治風入肌膚之藥以此方

為主更隨症加減尤妙其得竅處在為末藥

楣案南星等六味徐俱圓

又案王君士惟云古方玉真散止南星防風二味等分此方

一名止血補傷丹以白附子為君宜用十二兩餘五味各一兩俱生嚼勿犯火研細末專治破傷風破傷坐臘大敵及跌打損壓刀箭諸傷

雖腎子壓出者亦可救但以藥傅傷處立能止血定痛重者溫酒調服一二錢青腫不破者水調傅之即效并不忌風故為金刀跌打最妙

之方製備濟人如遇鬪毆傷者一藥可全兩命且其價極廉已製送多年無不見效小兒跌磕傅之尤便家家宜便也

萬靈丹

見種

治破傷風牙關緊急角弓反張時昏時止者

鎮風散

每服二錢用培鱗膠

抗粉朱砂礬末調

破傷風症可速退

治破傷風諸藥不效事在危急者用之必應

鯨膠切段

抗粉培燒

皇礬各一兩

硃砂

炒紅色

另研

右為細末每服二錢無灰熱酒調服如一切諸年等風發時昏倒不醒人事者每服三錢二服即愈不發外氣傷處七壯知疼痛者

乃為吉兆

徐曰此方甚別

又曰此方之義不解

跌撲第六十五

跌撲者有已破未破之分亡血瘀血之故且如從高墜墮而未經損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沈不醒二便必難當以大成湯通利二便其人自甦不醒者獨參湯救之此句徐又批曰尋常墜墮輕者以復元活血湯調之又如損傷骨節筋斷血流不止者獨勝散止之次用花蕊石散搭之又有跌斷骨節等症另有專門接骨扎縛此未及詳

大成湯

大成湯用朴硝黃蘇木當歸甘草良

肺脹結胸不食惡心乾嘔大便燥結者

陳皮

當歸

蘇木

木通

紅花

厚朴

甘草各一錢

枳殼二錢

大黃三錢

朴硝二錢

右水一碗煎八分不拘時服服後一時不行渣再煎臨卧服加白蜜三匙亦妙

徐曰此下瘀之方瘀血不結者不必服

楣案

蘇木徐園

調中二陳湯

調中二陳湯防風

蘇木歸青皮芩芍桔梗

紅花同

治前症已服行藥之後當進此藥二三服調之

陳皮半夏茯苓甘草紅花

川芎當歸白芍各八

防風檳榔

桔梗青皮烏藥蘇木枳實

紫蘇各

六木香三分茶鍾薑三兩棗一枚煎

分不拘時服

徐曰方雜不可學此等方皆出於前明不知醫理強作鮮事如薛立齋一輩

人遂使古聖製方之法從此變可為長嘆

謂之易經脉一脉宜微急

跌撲金瘡血瘀出

治跌撲損傷或金瘡出血過多昏沉不醒者人參一兩切片水二碗煎一半不拘時通口服

謂之易經脉一脉宜微急

跌撲金瘡血瘀出

之。再煎服其人自甦。再用溫加川芎一合。煎湯溫服。徐曰：如血出太多。一時不能止。可此一停。更用也。

乳香 没藥

花蕊石散。龍骨。白芷。細辛。

紫蘇 草烏

輕粉

鴟門 腎俞

花蕊石。童便。松香

右研極細。罐收聽用。溫湯洗。第用此。綿紙蓋扎。一日一換。神效此藥。

一日未備。

檀香 龍骨

金瘡第六十六

右研極細。罐收聽用。溫湯洗。第用此。綿紙蓋扎。一日一換。神效此藥。

一日未備。

乳香 没藥

花蕊石。次五錢。治跌撲損傷或金瘡斷損肋骨。已經血止。疼痛作脹。宜葱湯洗淨。用此膏日搽傷處。膏益之。

南星

金瘡乃刀刃所傷。或有磁鋒割損者。皮破血流而已。深者筋斷血飛不住。皮破者桃花散。其血自止。筋斷者如聖金刀散。繫扎止。而又去幾味。遂成方矣。梔案蛇含石蘇木花蕊石徐園法矣。

如聖金刀散。如聖金刀散二錢。

加減。如陽坡橫肌流血。松上應知。致不凡。

治刀刃所傷。皮破筋斷。血不止者。用松香淨末七兩。枯礬生薑各一兩五錢。共為極細末。罐收。繫傷處。膏益絹扎。止後三四日。必軟痛作脹。換松生肌散三日三次。其疼即止。以後日用葱湯洗之。換搽玉紅膏。長肌收斂。兼戒口味房事為要。

桃花散。桃花散可治金瘡。止血消瘀。肌肉長。加減。用石灰與大黃。治金瘡出血不止。用石灰半升。大黃一兩五錢。切片同炒。石灰變紅色為度。去大黃。節細繩。益絹扎止血。後用葱湯洗淨。換搽玉紅膏。長肌收斂。兼戒口味房事為要。

金瘡應用方

獨參湯。見跌撲門。

八珍湯。見清熱門。

杖瘡第六十七

杖瘡

枝瘡

金瘡

房事

膏

金瘡

杖瘡乃良肉受傷。有已破未破之分。已破肌內者。以清涼拈痛膏敷之。疼腫即消。未破衆血內攻者。用針放出。內蓄於血。微圓。再以太成湯下。

之。便通自愈。如傷處瘀結。已作皮痛者。王紅膏搽之。自然腐化生新而愈。至於辱刑重刑。難受之時。宜預服鐵布衫丸。方得保身全命也。

鐵布衫丸

無名異

七次

當歸酒洗

七次

梔子

乳香

上乳

木蠶子

肉桂

此是木蠶

上灰培用

蘇味

右八味

各等分

為細末

蜜丸如

雖豆實大。每服三九。預用白湯送下。非刑辱拷打。可保無虞。徐曰：定痛之藥不外此方。更加山羊血。減半。南星膽少許。審化犀黃減半水。水少許。古金醋。煅七次。朱砂。魚衣。丸如豆。梔案自然。

銅木蠶子。沒藥。地龍。蘇木。徐園

散瘀拈痛膏。散瘀。拈痛。金黃散。石灰。清水。對麻油。加上三錢。換臘配。通共調敷。將紙蓋。治杖瘡皮肉損破。紅紫青斑。挾腫疼痛。重擊者。用臘湯。門如意金黃散一兩。加樟冰三

鐵碾以白石灰一升用水二碗和匀候一時許。粉灰上面清水傾入碗內加麻油對分以竹節攢百轉自成稠膏調前藥稀搗研所聽用。杖後帶血不用湯洗將藥通敷紙蓋絹扎。夏月一日冬月二日方用熱湯淋洗乾淨仍再敷之。痛止腫消紫即退傷重者另搽王紅膏完口。

大成湯見跌撲門 治杖後瘀血內攻肚腹脹脹惡心便秘者。珍珠散見跌撲門 治杖瘡已經長肉平滿惟不生皮用此搽之。

竹木刺第六十八 第六十九 治竹木刺傷。腫痛流膿。以葱湯洗淨用此搽之。楣案竹木刺與金刀杖傷一類。原本在漆瘡之後。今移於此。

湯潑火燒此患原無內症。皆從外來也。有湯火熱極逼毒內攻。又有外傷寒涼致毒入裏。外皮損爛者。以清涼膏塗。毒氣入裡。煩躁口乾二便秘澀者。四順清涼飲下之。泡破珍珠散搽之自愈。

四順清涼飲當歸甘草山梔等 防風羌活共連翹。治湯潑火燒熱極逼毒入裏。或外被涼水所浸。火毒內攻。致生煩躁。內熱口乾大便秘實者。連翹赤芍羌活防風當歸山梔甘草各一。大黃炒二水二茶鍾燈芯二十根煎八分食送服。

徐曰此症原不必服藥。或傷重有引弓則隨症施治。

鴛粟膏鴛粟膏鹽湯火燒麻油白蠟共煎熬 治湯潑火燒皮肉損爛。疼痛微熱。起泡流水者。麻油四兩。鴛粟花十五朵。無花以殼代之。浸油內煎枯瀉清。將油再入杓內下白蠟三錢。熬花傾入罐內。待四邊將凝時。下真輕粉細末二錢攪勻水內。頃冷取起。臨用將泡挑破用紙腳挑膏手心中搽化。搽患上軟綿紙蓋。九日換一次。其疼即止。次日將軟帛泡爭腐皮再搽之自愈。徐曰此方須預備。一切爛瘡皆妙。

珍珠散見跌撲門 治湯潑火燒腐皮已盡。疼痛已止。用此搽即愈。前杖瘡門中石灰水調麻油成膏。即清涼膏也。搽湯潑火傷良方。甚多。進士以活冷廬雜識。或以秋葵花浸麻油研碎罐內。勿見水愈久愈佳。用塗傷處立時止痛獲愈。最為簡便。此方兼治一切熱毒瘡。全生集載以地榆末浸香油調塗。仍以乾末搽之亦妙。

甲疽者。或因甲長侵肌。或因修甲損傷良肉。或靴鞋窄小。俱能生之。其患旁肉裏上指甲。腫痛異常。難於步履。初宜三品一條槍貼。旁肉上。此日大化盡自愈。日久筋肉堅硬須冰蠅散化之後。用珍珠散。上必瘥。楣案全生集甲疽方。用狼毒一兩。黃耆二兩。醋浸一夜。入豬脂五兩。微火上前取二兩絞去渣。退火氣以封疽口。日易三度。毒消可飲。

甲疽第七十

甲疽者。或因甲長侵肌。或因修甲損傷良肉。或靴鞋窄小。俱能生之。其患旁肉裏上指甲。腫痛異常。難於步履。初宜三品一條槍貼。旁肉上。此日大化盡自愈。日久筋肉堅硬須冰蠅散化之後。用珍珠散。上必瘥。楣案全生集甲疽方。用狼毒一兩。黃耆二兩。醋浸一夜。入豬脂五兩。微火上前取二兩絞去渣。退火氣以封疽口。日易三度。毒消可飲。

甲道應用方 三品一條槍

見原屬火

珍珠散

門下

齒脣乃陽明胃經症也。因過食煎炒炙燙，又兼思慮暴急，致火行留注於脣。初結似豆，漸大若蠶頭，突腫堅硬，甚則作痛，飲食妨礙，或破而流血，久則變為消渴，中難治之症。初起及已成無內症者，用附子大艾炷灸三壯。此句余圖此貼膏益日久漸消，內症作渴，草。

服加減八味丸，午服清涼甘露飲以滋化源。日久流血不止，形體瘦弱，虛熱生面色黧黑，肥頤紅現，口乾渴甚者，俱為不治之症。

清涼甘露飲（清涼甘露飲屏角銀柴茵陳熟石斛知母枇杷葉枳殼治膏梁所釀，暴怒所結，致成齒脣。高突堅硬，或損破流血，或虛熱生瘡，或渴症久作。

屏角 銀柴胡 茵陳 石斛 积梗 徐曰：此方甚穩切。

竹葉燈心各二十佈煎八分食後服。徐曰：此方甚穩切。

蟾酥餅

見附

委門冬 甘草 生地 黃芩 知母 杷杷葉

錢一水二茶匙淡

齒脣應用方

加減八味丸

見遺

蟾酥餅

見附

委門冬 甘草 生地 黃芩 知母 杷杷葉

錢一水二茶匙淡

齒脣皆緣內傷過度，氣血橫逆，結聚而生。初起腹中覺有小塊，舉動牽引作疼。久則漸大成形。甚者翕翕內動，斯時必氣衰弱，飲食減，內

阿魏化痞散（阿魏化痞散川芎歸芷蓬萊生熟地乳沒薑藥二芍桂調末服用酒一錢）

川芎 當歸 白芍 赤芍 紅花 阿魏 鱔甲六味丸

各一錢

此膏專治齒疾，毋論新久立效。又治諸風癰瘍，溼痰流注，各樣惡瘡，百般怪症。男子夜

前。

乾坤一氣膏（氣膏用真阿魏草巴附甲鹽靈元乳沒薑藥二芍桂調末服用酒一錢）

此膏專治齒疾，毋論新久立效。又治諸風癰瘍，溼痰流注，各樣惡瘡，百般怪症。男子夜

前。

夢遺精婦人亦白帶下。又男女精寒，血冷，久無嗣息者，並貼之。

當歸

見附

白附子 赤芍 白芷 生地

熟地

此膏專治齒疾，毋論新久立效。又治諸風癰瘍，溼痰流注，各樣惡瘡，百般怪症。男子夜

前。

穿山甲

錢二兩

麝香

錢一兩

真阿魏

二兩切薄

巴豆仁

草麻仁

三棱

蓬遂

五靈脂

續斷

肉桂

元參各一

乳香

沒藥各

此膏專治齒疾，毋論新久立效。又治諸風癰瘍，溼痰流注，各樣惡瘡，百般怪症。男子夜

前。

每淨油一斤，配飛丹十二兩，將油入鍋內，下丹塊，攪令成膏，撈下鍋，來用盆坐，聽漸下，阿魏片泛化已盡，方下乳未腐，再撈去乘熱，傾入瓷罐內，分三處盛之。臨用湯中頓化，齒病紅綵搘貼，餘病綵絹俱可搘之。有腫者對患貼之。男子遺精婦人帶下，患貼丹田，諸風癰瘍

貼腎俞穴，並效。

徐曰：此治齒之專方。

天蛇毒第七十三

天蛇毒一名蛇頭疔，乃心火旺動，攻注而成。其患指大若蛇頭，赤腫掀痛，甚者疼至連心，寒熱交作，或腫痛延上，宜用小火灸五壯，以雄黃散。

塗之內服蟾酥丸發汗解毒輕者漸消腫者清腫甚則腐爛破後腫仍不消者以蟾酥條插入孔內膏益有效腐爛者王紅膏捲之虛而不

飲者兼服補劑

水片遇時輕粉加

雄黃散四味同研為細末

水調患處

濕粉和日用三次極效

治天蛇毒初起紅腫發熱疼痛徹心者雄黃二錢

蟾酥二分冰片分輕粉加

共為細末新汲水調塗紙益日用三次極效

徐曰此乃專治此毒之方楣案蟾酥徐園

天蛇毒應用方蟾酥丸見附

玉紅膏見附

頭痛第十四頭痛者風火溼痰四者皆能致之又楊梅瘡毒上攻或婦人產後梳洗當風太早亦能致之名曰頭風宜用後方毋論病之新久受之真似並故

天麻餅子

全蝎黃白附子

更入薄荷此甘松動耳哨蟬鳴蟲塞多噴皮膚頑麻癰瘍瘻瘍久治婦人頭風作痛眉棱骨疼牙齒腫痛發逆惡心

天麻

草烏湯池

川芎

薄荷

甘松

防風

白附子去皮

白芷各五

雄黃

全蝎各三

雄黃

全蝎各三

雄黃

全蝎各三

右為細末寒食麪打糊搗稠如寒豆大捏作餅子每服二三十餅食後細嚼熱湯送下屬火熱發燒者冷湯下甚者日進二服忌諸般發物。徐曰此方治寒毒頭風之症藥味雖峻厲而與病情頗切此唐人之遺法也。楣案天麻草烏白附子雄黃全蝎徐皆圓又案頭風最能損目余見一人頭風痛甚目眞偏求良醫不效有鄉人教以用十字路口及人家屋脚邊野莧菜煮湯注壺內塞住壺嘴以雙目就壺蓋之日漸見光竟得復明如舊附著於此亦單方之一也。

三聖散三聖散用開楊花紅槿樹花榧子肉葱酒一杯調未服治男婦頭痛不論偏正新久但夏月欲重綿包裹者並效。開楊花一錢槿樹花一錢。大楓子肉五分共研每服六分。勿調服。洗浴發汗自愈。

合谷毒第七十五合谷疔俗稱虎口百日此患者有疮瘡包起亦有紅絲走上故有疔名。乃手陽明胃經溼毒攻注癰熱掀疼初起挑破貼蟾酥餅膏益金黃散

敷之三日後腫聚必砍作膿換膏貼之軟腫脹痛者膿已成針之即愈腫甚寒熱者必內外消托徐曰此症與疔毒同治又曰紅絲盡處以針出少血為妙。

合谷毒應用方如意金黃散見附

蟾酥餅見附

鼻出血第十六鼻中出血乃肺經火旺逼血妄行而從鼻竅出也外用紫土散敷頭頂上內服羚羊清肺湯亦可自止。

徐曰諸血亦同治

羚羊角

黃連

銀柴胡

徐曰諸血亦同治

羚羊角

黃連

銀柴胡

徐曰諸血亦同治

羚羊角

黃連

元參

石膏

川芎

歸身

白芍

生地

蒲黃

地骨皮

山梔子

蘆薈

甘草

桔梗

葛節

三

白茅根
四兩
嫩葉
水一盞
煎水
用茅根汁一大碗煎七分入童便一杯食後服

不必用。又曰茅根一味足矣。

媚案余繼室自幼患鼻衄症來歸後無歲不發。甚且耳目口鼻俱溢出至淡黃色始止。凡外治之法

無不歷試。每發必先額上發熱。鼻中氣亦甚熱。近二十年來每覺鼻熱。余以喻嘉言清燥救肺湯投之。三劑後即覺鼻中熱退不衄或投

之少遲。雖發亦不過畧見微紅。益此方最消肺胃之熱也。惟人參一味。余用西洋参或加鮮生地。勢已定則用乾生地附記以備醫者臨症

酌用。又案喻氏於此方自言不用苦寒恐苦從火化也。此製方妙處。醫者勿妄加減為要。

徐曰外治亦通

紫土散
紫土散為從治法
無端鼻衄此方求
自然血止不須憂

治鼻中無章出血不止。用傾銀紫土新罐研細。以火酒調敷額門上。其血自止。此從治之法

亦外治方。

牙縫出血第七十七

牙縫

出

血

陽明胃經實火上攻而出也。又有胃虛火動腐爛牙齦以致淡血常常滲流不已。實火宜服清胃散并用棟果裹塞之。虛火宜服虛

薑丸并用人中白散搽之自愈。

清胃散

青皮散

升麻散

芩連生地

共和調

治胃經有熱。牙齒或牙齦作腫。出血不止。

黃芩

黃連

生地

丹皮

升麻

治胃經有熱。牙齒或牙齦作腫。出血不止。

徐曰

涼血地黃湯

涼血地黃湯

加元參

倍速

水二茶鍾煎

分食後服

徐曰

陽明實火方

媚案升麻徐圓

棟果裹

治陽明胃經實火上攻

血從牙縫流出

用棟樹果二箇連肉核搗爛綿包裏

先用溫湯漱淨擦

塞於牙縫內。其血自止。

徐曰

牙齦出

血應用方

徐曰

牙齦出

牙縫出血應用方

血箭

痔瘡

第七十

蘆薈丸

人中白散

見口

血箭

出

血

痔瘡

第七十

人中白散

見口

血箭出

於心經火盛逼

血從毛竅出也。血箭由於肝經怒火鬱結初起色紅如痣漸大如豆。揩之血流

治之自止。血須用冰榔散枯去本底。以珍珠散搽之。生皮乃愈。血甚者內服涼血地黃湯。兼戒口味。始痊。

涼血地黃湯

涼血地黃湯

加元參

甘草各等

水二茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

甘草各等

水二茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

甘草各等

水二茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

甘草各等

血箭

痔瘡

應用方

桃

花散

見跌

水

茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

水

茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

水

茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

水

茶鍾前八分量

病上下服之

元參

石

膏

川芎

歸身

白芍

生地

蒲黃

地骨皮

山梔子

蘆薈

甘草

桔梗

葛節

三

蘆薈

甘草

桔梗

葛節

三

蘆薈

鵝掌風

第七十九

外

科

正

宗

卷十一

桃

花散

見跌

水

茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

水

茶鍾前八分量

病上下服之

徐曰涼血方用處頗多

水

茶鍾前八分量

病上下服之

鵝掌風。由足陽明胃經火熱血燥，外受寒涼所凝致皮枯槁，又或時瘡餘毒未盡，亦能致此。初起紫斑白點，久則皮膚枯厚，破裂不已。二聳湯薰洗即愈。

徐曰：此症必用塗藥，以手洗方無益也。

二聳湯（一聳湯中白皂角
西孩兒茶五錢）先薰後洗，油煙照

舊掌風痛愈，不難。

治鵝掌風皮膚枯厚，破裂作痛，宜用此湯薰洗，輕則不甚，越重越效。

白聳

皂角各四錢

水煎，取汁。

每當風寒時，方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

淨桶內用布孟好，將手伸入以湯薰之，勿令泄氣，待微熱傾入盆內，薰洗良久，一次可愈。七日已下湯水，永不再發。

臂瘡風第十

臂瘡風

皮膚枯厚，破裂作痛，宜用此湯薰洗，輕則不甚，越重越效。

白聳

皂角各四錢

水煎，取汁。

每當風寒時，方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

時方將前湯乘潔，

腎囊風乃手經風坐所成，其寒作瘡，喜冷熱湯，甚者吃啞頭麻，破裂作痛，宜蛇牀子湯薰洗，一次即愈。

蛇牀子

水煎，取汁，加威靈仙，同煎薰洗處。

治療腎囊風溼熱為患，尤塔作瘡，之作疼者。

蛇牀子

水煎，取汁，加威靈仙，同煎薰洗處。

治療腎囊風溼熱為患，尤塔作瘡，之作疼者。

蛇牀子

水煎，取汁，加威靈仙，同煎薰洗處。

治療腎囊風溼熱為患，尤塔作瘡，之作疼者。

治療腎囊風溼熱為患，尤塔作瘡，之作疼者。

蛇牀子湯（蛇牀子湯當歸尾，苦參各五錢，水五碗煎，數次和入盆內，先薰待溫浸洗，二次即愈。徐曰：此事治之方。

柏葉半錢，同上藥四味煎，先用桐油搽抹患處，再以桐油蘸紙糊點着，以烟燄薰片時，方將前湯乘潔，

投入皮硝膽汁良，右為末。用香油一大杯煎，滾入皮硝三錢，再煎，滾次下公猪膽汁一個，和勻，調前藥搽擦此藥，諸瘡瘍用之並效。

此句徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

柏葉蛇牀子徐圖

疥瘡論第八十一

夫疥者，微芒之疾也，發之令人搔手不閑，但不知其何以生者。徐曰：吾不根而生，無母而成，乃稟陰陽氣，育溼熱化形，常列於王侯掌上，何妨士庶之身，可使文人怕筆，繡女停針，毋分貴賤，一例施行。醫問曰：不生於身，獨攻於手者，又何也？徐曰：手掌乃太陰溼土所主，手心又少陽相火所司，土能生我，火能化我，此生皆賴溼土陽火所化，故生者必出於手掌。醫曰：然哉！但其形知動，而不知靜，能進而不能退，自非清氣所化也。又脾主消納，胃主傳化，人之飲食，未有不從厚味者，厚味之中，溼熱並化，致生此瘡。又清氣隨脈循行，濁氣留滯不散，停留肌膚，積日不解，隨後生熱發癢，故瘡熱之中，溼火混化為蟲形，隨溼化動，隨火化此無情而之有情也。既化之後，潛隱皮膚，展轉以行，於脊鑽刺化，生生傳偏肢體，近則變為疥癬，人則變成頑風，致皮膚枯槁，浸淫血脈，僵瘻無度。導湯方解是宜外以繡毬丸搽擦止瘡殺蟲，內服消風散風涼血，兼戒口味。卒然草創，忌洗熱湯，其煩自脫，此為小恙，不當陳說，間中之言，隨筆而曰。

消風散

胡麻油半錢，牛蒡子一錢，甘草一錢，石膏甘草各一錢，防風一錢，當歸一錢。

治血燥皮膚作瘡，及風熱瘡疥搔癩，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

食遠服

當歸飲子，當歸飲子，甘草一錢，牛蒡子一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

當歸飲子

當歸飲子，甘草一錢，牛蒡子一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

當歸飲子

當歸飲子，甘草一錢，牛蒡子一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

當歸飲子

當歸飲子，甘草一錢，牛蒡子一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

治血熱瘡疥，或作疼痛。

當歸

川芎一錢，白芍一錢，生地一錢，防風一錢。

繡毛丸 雄黃枯礬內用樟水
雄黃各二 楊子肉一百 諸瘡并瘻瘍之靈

以上共為細末。同大楊子肉再研和勻。加柏油一兩。化開和藥擦之。丸作圓眼大。於瘡上擦之。徐曰。水銀入皮膚中。有毒不宜用。

樟水 川椒枯礬 輕粉 水銀

諸瘡一掃光。諸瘡一掃光。硫黃
苦參 黃柏各一 烟膠升

木鼈內 紅椒明礬

治瘻瘍不論新久。及身上下。或乾或濕。真類殊形。但多癢少痛者用之。俱各有效。

白砒苦參 烟膠升 治一切乾溼疥瘡及臘瘡瘍。無度者。白砒五錢。共為細末。

熟豬油二斤四兩。化開入藥擦之。丸作龍眼大。於瘡上擦之。徐曰。水銀

皮鋪刮下諸皮之膜。炒成灰研末。謂之烟膠。余見今人合瘡藥。多以淡巴菰個箇中之油當。問諸醫者。亦多不知。

硫黃 楓子肉 檳冰 水銀 輕粉各三。白砒五錢。共為細末。

洗瘻瘍方。公猪膽汁和勻。洗之。九日三洗可愈。

苦參半斤切片。用河水三四瓢煎藥數滾。參水一瓢。住火片時。濾去渣。和公猪膽汁四五

枚。攪匀淋洗。三日一洗。三次亦可痊愈矣。

徐曰。此外治良方。

臘瘍論第八十二

臘瘍者。風熱溼毒相聚而成。有新久之別。內外之殊。新者只用三香膏乳香法紙貼之。自愈。稍久紫黑者。以解毒紫金膏搽之。漸可。年久頑腫

皮肉烏黑。下陷。具殼不堪者。用蠅公餌法去風毒。化於腐方可得愈。外臘多服。內臘多服。腎氣丸。

三香膏 三香膏內乳松香

輕粉油調紙內藏。治臘瘍初起。多疼少癢。未經受風紫黑者。

乳香 松香 輕粉各等分。右為細末。香油調

稠用夾紙一面。以金蜜蜂刺細孔。將藥夾搽紙內。先以熱湯洗淨。將紙有孔的一面。對瘡貼之。三日一換。自然止痛生肌。如貼後內無水出。不必

一切溼風瘍俱可治。

徐曰。此法甚奇。一切腐敗頑肉蟲蝕俱可用。

乳香法紙法方。奇用乳香紙捲浸入甘草湯。

治臘瘍作痛不愈。先碾乳香細末一兩。聽用。以至文每紙四張。每紙一張。攤平用乳香二

錢五分。細攤平紙上。雙折卷一寸闊。將捲紙復作三条。外用以綿扎之。用甘草一兩。二錢水三碗。將捲過藥紙浸入甘草湯內。上用重物壓

之。煮數滾。取起紙來。幹去。綠紙捲開。桌上每張用輕粉三錢。抹乳香上。用蠅糊刷排刷。令勻。提起藥紙帶溼以無藥一面。對板壁上貼之。陰乾收用。臨時隨瘍大小剪紙多少。先用溫湯洗淨。隨將紙有藥一面。對瘡貼之。綿扎三日一換。自然脫下。用解毒紫金膏搽之。紙蓋絹扣三日一換。

徐曰。此法無謂。自然脫下。用解毒紫金膏搽之。紙蓋絹扣三日一換。

徐曰。此法甚奇。一切腐敗頑肉蟲蝕俱可用。

解毒紫金膏。治臘瘍。母論新久及頑瘍。年久不愈者。

治臘瘍多年黑腐。真爛作皮。諸藥不效者。用桐油二兩。獨活白芷。甘草。蜈蚣各一錢。入油內

前滾。先用白髮水調作團圓。在瘍之四邊。母令泄氣走油。將脚放平。以茶匙挑油。漸漸乘熱加滿。待油溫取去。已後腐肉風毒

自然脫下。用解毒紫金膏搽之。紙蓋絹扣三日一換。

徐曰。此法甚奇。一切腐敗頑肉蟲蝕俱可用。

解毒紫金膏。治臘瘍。母論新久及頑瘍。年久不愈者。

治外臘血風。頑瘍。骨節疼痛。不能舉動。或行步不前。或渾身疼痛。或麻痺不仁。或生斑疹。

上海大成書局印行

地龍去土

肺門白附子 五靈脂 草烏去皮共泡各等分

右為細末米糊丸桐子大。每服三四十丸。食前茶酒送下。徐曰此法不驗。

血風瘡卷之十三

血風瘡第八十三

卷之十三

20
1

血風瘡乃風熱溼熱血熱。三者互感而生。發則搔癢無度。破流脂水日漸沿開。是著內服消風散。加牛膝黃柏。外搽毒雄黃散。或如意金黃散。人所熟悉。又如平瘡散。治風瘡者。即此文也。

昔如年久，勞傷血不行者，用金匱去黑血以和營，加活血之藥，取其氣少，前導引之方，亦可服。毒外發者，血風頭瘡，紫斑發者，惟黃四流黃散，白二朱、辰田末、白由周茶氏益之，三日一換。余曰：治肺外感，治風淫風注肺膚到生

血風元氣流轉不順。黃雨。白氣。赤氣。綠氣。水氣。皆經三日一轉。行日。江海小溪。

治年久紫黑血風頭瘡流水作養不絕先用葱易先氣以登燭薰之每薰一燃為度

補火助陽門
血風瘡應用方 治血風瘡，見《濟元》。不外於此。

頌辭第十八

頑癬乃風熱溼蟲四者為祟。其形大小圓斜不一。有乾溼新久之殊。風癬如雲朵皮膚嬌嫩。抓之則起白屑。溼癬如蟲形。搔之則有汁出。頑癬

抓之則全然不痛牛皮癬如牛項之皮頑硬且堅抓之如朽木馬皮癬微癢白黑相連狗皮癬白斑相簇此等總由血燥風毒客於脾肺二

經初起用消風散加浮萍一兩，或作引取汗發散者服菖蒲丸、蠟碧丸、外擦土大黃膏，或槿皮散選而用之，俱可漸效。徐曰：此症非

服藥所能治
二大病止。大黃膏用白礬
流黃八兩共四參

土大黃膏 治乾溼瘻不論久但皮膚頑厚串走不定惟瘻不痛者
川椒三味研成末 破癰塗之效不難

黑絲川林雨在名為林用土大黃相和江利耶藥謂成膏。則藥加酒燒之。後年元無加醋和燒如日久無軟レ醯謂搽牛皮癬并穿山甲員藥之以火余曰。比茶葉及炒豆大黃合烹食。胃下身頭之毒。七用刀剗之以上一言皆苦心也。行醫真要。故士人多有此法。

山中折竹枝二束。行日此竹無量矣。大黃作名藥。其根葉皆可之。先用大黃。次以土大黃。酌壓桂酒。剗碎。微浸。瘡疽自愈。

項解必效方 項解必效川槿皮輕粉雄噴巴豆宜治多年項解。首烏藥桑芽先不效者。川芎皮四經分淮黃絡四夏桑煎四。

大黃根 陰二分
海桐皮 阳二分
右為極細末用鳴水調爪屑敷藥必待自落。
徐比方要闡文。

又頑瓣方湧瓣方中川槿子槿皮
加七個榧子肉皮
班蝥輕粉亦相宜
新草燒金瓣可醫
川槿皮錢
輕粉五
班蝥七
大楓子七
河井水共一碗煎一半露一宿筆蘸塗

徐曰此亦闢處之方。

補氣草酒湯丸白滾湯母服一錢隨症上下服

膿瘡瘻乃肺經有熱。經有溼。一氣互感。先起水泡作癢。後變膿泡作疼。以清熱散風涼血除溼為治。涼血消風散是也。外以蛇牀子散或諸

瘻瘻一掃光。擦之亦可。兼戒口味自創。

蛇牀子散蛇牀子散用黃丹大黃楓肉同研末油搽乾燥故非凡

黃丹大黃錢各五厘分三錢右為細末麻油調擦溼爛者乾擦之

徐曰亦有效有不效。

膿瘻又方膿瘻方中用黃柏輕粉黃丹用石膏輕粉黃丹用石膏黃柏之痛癢即時消

徐曰此方治肥瘻大效。

膿瘻瘻應用方涼血消風散諸瘻一掃光

俱見疥門

火丹第八十六

火丹者心火妄動三焦風熱乘之故發於肌膚之表。有乾溼紅白之異。乾者色紅形如雲片。上起風粟作癢發熱。此屬心肝二經之火。治以涼

心瀉肝化斑解毒湯。是也。溼者色多黃白大小不等流水作爛。又且多疼。此屬脾肺二經溼熱宜清肺瀉脾除溼。膏苓湯是也。腰脇生之肝

火妄動名曰纏腰丹。宜柴胡清肺湯。外以柏葉散。

如意金黃散敷之。

化斑解毒湯化斑解毒湯石膏升麻牛蒡等甘草人中黃連高

陳皮厚朴厚朴煎散中用大黃

甘草分

水二茶鍾淡竹葉二十片煎八分不拘時服。

徐曰不外此諸味。

柏葉散柏葉散加上輕粉水調敷

火丹癰痛何須問

治三焦風熱上攻致生火丹延及偏身癰痛者。

元參知母石膏人中黃連

甘草分

水二茶鍾淡竹葉二十片煎八分不拘時服。

徐曰不外此諸味。

除溼潤苓湯除溼潤苓湯二兩木通澤潤防風等還須薄桂與陳皮

治肺脾二經溼熱壅遏致生火丹作癰波痛者。

防風蒼朮白朮赤茯苓

甘草分

水二茶鍾燈心二十根煎八分食前服。

徐曰不合此症。

大黃各立赤豆赤豆黃柏蚯蚓糞火丹癰痛何須問

治三焦火甚致生火丹作癰或作痛延及偏身

側柏葉炒黃為

一日三次即愈

徐曰隨舉三味俱有小效。

纏腰火丹方張完化仔研為細末用米醋調稀雞頭臘塗一日三次即愈忌食發食

如意金黃散如意金黃散見瘻門

治火丹不論新久癰痛用新汲水調敷散汁亦好。

天泡瘻第十七

用寶釧一張燒化仔研為細末用米醋調稀雞頭臘塗一日三次即愈忌食發食。

如意金黃散如意金黃散見瘻門

治火丹不論新久癰痛用新汲水調敷散汁亦好。

天泡者乃心火妄動脾溼隨之。有身體上下不同寒熱。天時微異。上體者風熱。發於溼熱。宜涼血散風。下體者溼熱發於風熱。宜滲溼為先。

用胡粉散石珍散擦之即愈。此不早治變為頑風紫癩則難痊。

解毒鴻心湯解毒鴻心湯荊芥牛蒡石膏全

治心經火旺。酷暑時臨。致生天泡。發於偏身者。

黃連防風荆芥山梔黃芩

水二茶鍾燈心二十根食後服。

徐曰此症重在敷藥。如用煎方亦

牛蒡子

滑石元參

知母

甘草

木通

石膏

錢各一

水二茶鍾

火丹

天泡瘻

水一茶鍾

徐曰此症重在敷藥。如用煎方亦

清脾甘露飲 清脾甘露飲 茵陳
麥門冬 淚湯 蒼朮 枳殼

元明粉各一錢 地榆芩連翹

水二鐘竹葉燈心各二半錢煎服

胡粉散 胡粉散 治天泡瘡

共研極細將泡挑破揩乾參之或用綠瓜葉搗汁

杭粉輕粉石膏蛤粉各三錢

又曰此瘡必用剪刀剪切方不袋膿

石珍散 石珍散 中煅石膏
青黛再添黃柏末 將來搗即能消

治天泡日久作爛疼痛不已 膿水淋漓者

石珍散 石珍散 葉輕粉共相調

水二鐘竹葉燈心各二半錢煎服

徐曰此方加入蜜陀僧冰片尤妙

共研細甘草湯洗淨以此藥擦之其疼即止

肺風粉刺酒敵鼻八十

徐曰此症宜外治須塗青火拔毒藥

枇杷葉丸 治肺風粉刺
天花粉四錢 治新安酒泛及桐子大每服一錢五分

然亦非服藥所能治

治肺風粉刺鼻敵初起紅色久則肉起發腫者

枇杷葉去毛刺八兩

徐曰此症宜服清肺藥

黃芩清肺飲 黃芩清肺飲

黃芩二錢 天花粉一錢

真君妙貼 敖門 治肺風粉刺敵鼻紅赤紫腫早晚用涼水調敷

崔斑第八十九 治症同前 川芎 當歸 赤芍 防風 生地 乾葛 天花粉 連翹

黃芩四兩 甘草一兩

雀斑乃腎水不能榮華於上火滯結而為斑宣六味地黃丸以滋他原外以玉容丸早晚搽洗漸愈

徐曰此必用塗藥

白芨 防風 荆芥 僵蠶 山梔 菟葵本 天麻 羌活 獨活 蜜陀僧 枯箬 檀香 川椒 菊花各一錢

玉容丸 玉容丸 治男婦雀斑酒刺及身體皮膚粗糙並用此洗

甘松 山柰 細辛 白芷

紅棗肉七錢以上共

白芨散 玉肌散 用生菜豆三味過熟白附子各一錢崔斑酒刺研成末

用去淨弦膜肥皂一斤同搗作丸如秋冬加生蜜五錢如皮膚粗槁加牛骨髓三錢早晚洗之

肌膚自然潔潔如玉溫潤細膩徐

玉肌散 三味過熟白附子各一錢崔斑酒刺研成末

每用三匙早晚洗面時湯調洗患處

一切風溼雀斑酒刺白屑風皮膚作癢者並效

菜豆拌滑石

白芷

白附子各二錢

雀斑應用方 六味地黃丸觀肺

龍膽草 當歸 山梔 青皮 黃芩各一 木香錢 南星錢 膜香分 右為末。神鞠糊為丸。每服二十一丸。食後薑湯送下。

日服三次。漸效。

耳病應用方 柴胡清肝湯 梔子清肝湯俱見前 直門 四物湯見前 癰門 腎氣丸見肺

漆瘡第九十四

漆瘡由來自異。有感有弗感也。俗稱木生人感之非也。漆乃辛熱有毒之物。人之皮毛腠理不密。故感甚毒。先發為癰。抓之似隱疹出現。皮膚傳偏肢體皮破爛。斑流水作痛。見者寒熱交作。宜韭菜汁調三白散塗之。服化斑解毒湯。忌浴熱水。兼戒口味。不然變為頑風癬癩。愈而發者名矣。徐曰。宜用貫眾湯洗。三白散三白散中用石膏輕粉杭粉共相調。又曰。石蠻磨汁塗。并飲一杯立愈。

漆瘡應用方 化斑解毒湯見火丹門

座瘡第九十五

座瘡者密如撒粟。六如芒刺。瘡痛非常。渾身草刺。此因熱體見風毛竅所閉。宜服消風散。洗用苦參湯。是者皮損匝匝成瘡。以鴛黃散軟綢帛蘸藥撲之。徐曰。此俗名風癩之疾。

苦參湯苦參湯用大葛蒲滾添水二瓢益片舌口入 河水煎淋效。不虛治座瘡作瘻。抓之又疼。坐如芒刺。難以安睡。用苦參四兩。大葛蒲二兩。河水五瓢同煎數

鴛黃散鴛黃散用黃柏末更將滑石共和勻止痛收斂。入水煎淋。洗瘡上。不二三次全愈。愈後避風忌食發物。 治座瘡作瘻。抓之皮損隨後又疼。用此撲之。菉豆粉一
右為細末。以軟綢帛蘸藥撲之。止痛收乾。

座瘡應用方 消風散見前 癰門

痄腮第九十六

痄腮乃風熱溼痰所生。有冬溫後天時不正感發。傳染者多兩腮腫痛。初發寒熱。以柴胡葛根湯散。外敷如意金黃散。內熱口乾。一便不利者。四順清涼飲利之。表裏俱解。腫仍不消。必欲作膿。用托裏消毒散。膿成者即針之。體虛人兼服補托藥。自愈。徐曰。此症以驅風消痰軟堅清熱為治。赤豆為末。雞子清調塗立效。又曰。此症若任時氣病後餘邪未清。仍宜照本症所感輕劑。表散者無因驅起。則如連翹夏枯草土貝母甘草大力子白芷元參半夏橘紅黃芩赤芍薄荷荆芥等藥俱可用。

痄腮應用方 柴胡葛根湯見前 癰門

四順清涼飲見前 癰門

腹色第九十七

腹門

腹門

痰色乃成飲乘火流行凝古下微圓結而膚腫綿軟不硬俗謂有妨言語作痛不安用利剪刀當已剪破此向流出黃痰若置清潔難斷探盡以冰硼散搽之內服二陳湯加黃芩黃連薄荷數服忌前炒火酒等件徐曰此不常見之病亦有生在頸上者又曰此症人不識者多宜留意

加味二陳湯加味二陳湯半夏
黃連 薄荷各一茶鍾量三片煎八分食前服徐曰此通治方

瘦色應用方 冰硼散喉門

癩風第九十八

癩風乃陽明溼熱沸騰於肌表或外受風寒侵襲而成其患初起水泡作癩成瘡破流脂水瘡至徹骨則成片傳及偏身好冷湯形如風癩初起上體多者防風通聖散去硝黃加葱頭三莖發汗以散外毒下體多者去麻黃以攻內毒通治則初服消風清燥湯久服祛風換肌

九外搽諸瘡一掃光成片流水者真君妙貼散皮膚頑厚有蟲者去食散搽之徐曰此症有似太麻風而毒氣不深全在肌肉故可治

消風清燥湯青風清燥湯生地蠅蛇防歸芩共連

仙各一甘草分五水二茶鍾煎八分食後服徐曰此通治方

癩風應用方 防風通聖散見時門

祛風換肌散見白屑風門

真君妙貼散見瘡門

諸瘡一掃光見濟瘡門

麥錢散見痘風門

溼腫第九十九

溼腫者皆脾氣受傷之病或飲食後驟受風寒或飢渴時誤食生冷寒積於中食不消化其患胸膈不寬小水不利面目浮腫漸至偏身此土書皆載之馬首章專歸內科為宜

二蛟散二蛟散內用皮硝陳米三年要炒焦 治生冷膾怒傷脾致胸膈不寬小水不利面目浮腫漸至偏身此土色為末提淨芒硝二兩鍋內溶化炒乾為末每用一平杯和勻再研極細大人壯實者每服三錢小兒十歲上下者一錢二分俱用赤砂糖三茶匙用白滾湯半茶鍾空心調服至午大便一次至晚再便一次其疾先從眼胞消起日久元氣虛者加味胃苓湯間服至重者不過五服愈

加味胃苓湯加味胃苓湯本答
水煮芍半錢香附一錢 治脾胃受傷胸膈不寬兩脇脹脹小水不利面目四肢浮腫

陳皮 茯苓 白朮

白朮各一
錢 薑香 人參 厚朴 山楂 泽瀉 半夏各五

甘草 猪苓 香附一錢

薑三片燈心二十根水二茶鍾煎八分食

前服徐曰此調和脾胃通用之方 楊紫霞香附徐園

女人面生黧黑斑第一百

文正外斗正示

卷十一

癩風 濕腫 女人面生黧黑斑 鈍鈍風枯筋箭 素體眼丹上

上海大成書局印行

黧黑斑者水虧不能制火。火弱不能華肉。以致火燥結成黑斑色枯不澤。宜朝服腎腎丸以滋化源。早晚以玉容丸洗之。兼戒憂思動火勞傷。

日久漸退。此症不得於夫。及疑事不決者常有之。

面斑應用方

腎氣丸

見肺癰門

玉容丸

見雀斑門

鈕釦風第一百一

鈕釦風

見風癰門

鈕釦風皆由風溼凝聚生瘡。久則搔癢如癬。不治則沿漫項背。當以冰硫散擦之。甚者服消風散亦妙。

冰硫散

冰硫散火內寒令冷藥透

樟腦同搗蘿蔔

硫黃

一兩

樟冰

川椒

生薑

錢各一

共為末

先用白蘿蔔一個

挖空

將藥填滿

復將原皮

蓋之

溼紙

色三四層

火內

煨半時

許待冷取開

將藥同熟豬油調稠

搽之自愈

鈕釦風應用方

消風散

見癰門

枯筋箭第一百二

枯筋箭

見瘡門

枯筋箭乃憂鬱傷肝。肝無榮養。以致筋氣外發。初起如赤豆大。枯點微高。日久破裂。趙出筋頭。徐圖逢鬆枯槁。多生胸乳間。宜用綠藥線齊根繫緊。此向徐圖拔七日後自落。以珍珠散擦之。其疤自收。兼戒口味不發。徐曰。此即肚子大者。

枯筋箭前應用方

絲藥線

見瘡門

珍珠散

見下

枯筋箭第一百三

枯筋箭

見瘡門

珍珠散

見下

婦人脚子作瘡第一百四

婦人脚子

見瘡門

珍珠散

見下

枯磬散

枯磬散中用石膏

黃丹青粉共研調

枯磬散

五錢

石膏

一錢

輕粉

各三

黃丹

錢各三

右為末

溫湯洗淨

擦之即愈

楣案

石膏輕粉

手足破裂第一百五

手足破裂

見瘡門

潤肌膏

見白壳

當歸飲子

見外瘡門

手足破裂第一百六

手足破裂

見瘡門

潤肌膏

見白壳

當歸飲子

見外瘡門

眼丹應用方

眼丹

見瘡門

金黃散

見瘡門

金黃散

見瘡門

眼丹第一百五

眼丹

見瘡門

金黃散

見瘡門

金黃散

見瘡門

眼丹脾經有風。胃經多熱。共結為腫。風多者浮腫易消。甚者堅硬難散。初起宜用金黃散敷之。有表症者荆防敗毒散。裏症者清胃散。加大黃利之。如不散必欲作膿。宜換膏貼之。膿成者即針之。遲則眼頭自破。此乃陽明穴內空難痏。成漏者多。

眼丹應用方

荆防敗毒散

見風癰門

清胃散

見牙齦瘡門

眼肥菌毒第一百六

眼肥

見瘡門

金黃散

見瘡門

金黃散

見瘡門

菌毒者乃此細蟲凝結而成。其患眼肥肉生出如圓頭大蒂小漸長，其出是者眼翻流亦致昏瞓。治宜用軟絲紙蘸水敷之。眼肥少而

用左手大指甲塗於患處。右手以拔針尖頭齊根切下。徐曰：人藥血出不妨隨用。翠雲銛治尤捷。血出不

仍忌海腥。前少椒薑火酒等件不發。

涼膈清脾飲

每荷甘草半錢子

連翹一錢，荆防

防風

荆芥

黃芩

石膏

山梔

薄荷

赤芍

連翹

生地

錢各一

甘草

加

木香

沈香

檀香

木香

零陵香各三

麝香分

共為細末。

每用五釐

津調擦兩腋下。

三

日

後

可

退

水二茶鍾燈心二十根煎八分食服。

徐曰：不必服藥。

翠雲銛治眼胞菌毒用針割後塗之。杭粉五兩銅綠末一兩輕粉一錢共研極細用黃連一兩同川米百粒水一碗煎一半再熬去一分

和藥作銻。早晚時用清水少許淨硯上磨濃難銻。又治爛弦風眼或暴赤腫痛者。捲擦更效。

黑子第一百七

黑子

名也。

此腎中濁氣混滯於陽陽氣收束結成黑子堅而不散。凡人生此終為不吉。面部不善者去之宜細銅管。將患套入孔內燃六七

轉令患入管一拔便去。此四句徐斷此法有痔浮淺不能拔者用針挑損搽冰蠟散許糊紙蓋之三日自脫或以米膏點之亦可。洛後珍珠散

乾糞生皮而愈。已醫醋無斑。

灰米膏用成塊石灰鹹水調稠。將白糯沫插入灰內。留半米在外片時許俟米熟用米點上可落矣。

黑子應用方 水蠟散

見瘧症

珍珠散

見下

疳門

珍珠散

疳門

狐氣第一百八

作餌食之可以漸退。

五香散

五香散內用沉香

更入檀香併木香

沈香

檀香

木香

零陵香各三

麝香分

共為細末。

每用五釐

津調擦兩腋下。

三

日

後

可

退

白秃瘡

第一

九

白秃瘡因剃髮腠理洞開外風襲入。結果不散致氣血不潮皮肉乾枯發為白禿。則髮落根無榮養。如禿斑光潤不癢。內血已朝。以薑蘸潤

肌膏常擦其髮漸生禿斑乾枯作癢者內必有蟲宜用參錢散搽之蟲死風散髮生。然後忌動風發物等件。徐曰：此症之因亦有數種。

參錢散

瘡見風

治禿瘡頭毛脫落白斑如癬瘡。塗藥紫藥膏起瘡甚有如蟲行。熱湯洗淨瘡痂用麻油調搽以瓊帽戴之。隨後作疼發腫忍之

三日後

可

退

其髮

一生

戒諸發物。

交正卜斗工字

眼胞菌毒黑子狐氣白禿瘡奶奶蠟燭挑頭小兒瘡毒爛斑

上海大成書局印行

諸瘡一掃光見
潤肌膏治瘡肉門
黃蠟五錢化盡傾入碗內。頓冷搽自愈。

治禿瘡一錢加倒挂慶二分燈窩宿油調搽自愈。

治禿瘡乾枯白斑作瘡髮脫用麻油四兩當歸一錢同熬藥枯瀉清。將油再熬加

紫草當歸一錢投。禿瘡搽後髮盈頭。

治禿瘡一錢同熬藥枯瀉清。將油再熬加
紫草當歸一錢同熬藥枯瀉清。將油再熬加

奶奶第一百十

奶奶因火在胎中。母食五辛。父滄火燭。遺熱與兒頭面。偏身發為奶奶。流脂成片。睡卧不安。搔癢不絕。以文蛤散治之。或解毒雄黃散。甚則翠雲散用青工調搽。徐曰此乃小兒食乳時之癬。又名胎癬。

文蛤散文蛤散中輕粉末川椒倍子炒湊焦。乳母還須飲食調和。先將文蛤打成細塊。鍋內炒黃色。次下川椒同炒。黑色烟起為度。入罐內封口存性。次日入輕粉研為細末。蓋罐收貯。香油調搽。奶奶戒口為妙。徐曰奶奶與諸癬微不同。此方甚平善。

奶奶第一百十一

奶奶應用方解毒雄黃散見血風

翠雲散見陽梅

翠雲散見瘡門

翠雲散見瘡門

翠雲散見瘡門

翠雲散見瘡門

翠雲散見瘡門

翠雲散見瘡門

奶奶頭俗名腦瘡。是也。患小而粟。受慾遠。質火精母血蓄毒而成。只發一次。其黑腫高。破之又腫。皆真受時原有衣膜相裹。毒雖出而膜未除。故愈而又發。腫甚。膿熟者。用針刺破。以三品一條槍插入孔內。徐曰此却可用化盡內膜自愈。又有不腫而不收口者。此必風襲患口。敗銅散擦之。萬成口味自愈。徐曰此症用草麻子打千槌膏。加提毒粉藥可愈也。

敗銅散銅散用舊鐵末一乾再不復回津

一乾再不復回津

一乾再不復回津

一乾再不復回津

一乾再不復回津

一乾再不復回津

一乾再不復回津

奶奶頭應用方三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

三品一條槍見痔門

小兒遺蟲斑第一百十二

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

小兒遺蟲斑見痔門

遺毒乃未生前。胎裏受。因父母楊梅瘡後。餘毒未盡。精血互成。故既生之後。熱湯洗浴。烘熏衣物。外熱觸動內毒。發於肌膚之表。先出紅點。

次成爛斑。甚者口角。殺道。眼眶。鼻面。皮肉俱黑。更妨乳哺。啼吠不安。初治宜早。內與土茯苓湯調人中黃末。每日數次。共飲四五分。外用解

毒紫金丹磨塗十中可除三四遲延。甚爛斑。偏身不乳者。百中難活。一一此由根蒂受害深故也。

人中黃。治小兒諸胎毒。痘黑。內收脣角。口乾風熱。斑瘡。亦遊丹毒。兼治大人傷寒陽症發狂。或諸惡瘡毒。氣入裏。口燥咽乾。煩渴悶亂。

中諸砒草。河豚等毒。諸般急病。無有不效。毛竹一段。兩頭留節。一頭鑽一小孔。用粉草磨為細末。從孔灌滿。以木條塞緊。孔眼用磚扎之。

沈入大糞池內。半年取起。長流水浸一日。帶竹風乾。瓷罐收貯。大人每服一錢。小兒每服三分。涼水調服。小兒胎毒爛斑。土茯苓湯調服。

尋常熱病。入應病藥中調服。徐曰。人中黃只宜治此等陽明惡毒之症。令其入於腸胃。隨糞瀉出。近日醫家不論何病。加入煎藥之內。竟

是吃費水矣。其可笑如此。

水一茶鍾。心二十根。煎八分。母子同服。徐曰。方太雜。

消毒犀角散。消毒犀角散。防風錢一。甘草分。黃連三分。

右水二茶鍾。心二十根。煎前四分。余服之。

甘草黃連要協同。赤遊丹腹有神功。

紫雪散。紫雪散。犀角石共。

沈木香兼參草用。赤遊丹毒退施送。

及外科一切薦毒在內。煩躁口乾恍惚不寐等症。

升麻。寒水石。石膏。犀角。羚羊角各一。元參二兩。沈香。木香各五。甘草錢一。

水五碗。同藥煎至一碗。瀝清再煎。滾投提淨。下硝三兩、錢微火慢煎。水氣將盡。欲凝結之時。傾入碗內。下朱砂水斤各二錢。金箔一百。

張各預研細。和匀。碗頸水內候冷凝成雪也。大人每用一錢。小兒二分。十歲者五分。徐徐嚥之。即效。病重者加一錢亦可。或用淡竹葉燈心湯化服。徐曰。紫雪另有古方。全劑修合甚費。此改作小料。以便隨時製用耳。楣案紫雪非散。古方但稱紫雪。此加散字。蓋沿明刻本。

針砭法。針砭之法絕世奇。

丹上施針筋掣之。赤道城腫用相宜。

去血多者為妙。血紅者輕。紫者重者。如

此不得已而用之。如意金黃散。見腫。

升麻。寒水石。羚羊角各一。元參二兩。沈香。木香各五。甘草錢一。

如意金黃散。見腫。

治小兒赤遊丹毒。紅如侏。熱如火。走如電。散及偏身不定者。用水芭蕉根搗汁調敷。加蜜亦可。

赤遊丹應用方。五福化毒丹。見胎。

走馬牙疳第一百十六

走馬牙疳。言其患迅速不可遲治也。乃少痘餘毒所中。又有雜病熱甚而成者。初起牙根作爛。隨即黑腐。作臭甚者。牙齦脫落。跟旁魚朽。不數

日間。穿膿破唇。誠為難治。初起宜用蘆薈消疳散。外用人中白散。或冰硼散搽之。取去黑腐。內見紅肉。血流者吉。如取時頑肉不脫。腐爛漸

開。挾腫外散。臭味不止。更兼身熱。不退者。俱為不治。牙疳有五不治。口臭涎滿。一不治。黑腐不脫。二不治。三不治。穿膿破唇。四不治。用藥不效。五不治。

蘆薈消疳散。蘆薈。薄荷。研細末。

元參。甘桔。共研細末。甘草。升麻各三。水一茶鍾。淡竹葉十片。煎六

分。食後服。徐曰。藥味不外乎此。但蘆薈連苦極傷胃。當變通之法。又此方太寒。宜茲陰驅風解毒。清火為妙。

人中白散。人中白散。最稱奇。黃柏。兒茶。青黛。溫湯漱淨。口府吹。

治小兒口疳。走馬疳。及牙齦腐爛黑臭者。人中白散。紅二兩。兒茶一兩。黃柏。薄荷。

青黛。六錢。水一斤。共研細末。先用溫湯漱淨。吹藥。用口。日用六七次。吹約涎從外流為吉。內收涎毒入裏為凶。

徐曰。此治象疳之法。右走馬疳牙內有蟲。又毒火如焚。非殺蟲及清火之藥不能奏效。當另覓良方也。

子用應用方。水硼散。觀。

大人小兒重舌。乃心火妄動而發。當以線針點刺。此句後物批曰不宜用針。令出惡血。內服解毒瀉心湯外。以水硼散搽之。又有紫舌木舌。亦由心火而發。極效。用飛鹽加冰片少許。勤搽出涎自愈。又有痰氣結於舌上。成核作痛。硬強者。用線針點破出血。用水硼散搽之。服幾後。徐曰。此症塗紫雪。

黃連瀉心湯

清心湯內用黃連
鮑草牛蒡薄荷連

荆芥山梔黃芩兼
木通加上故如山

治大人小兒心火妄動。結成重舌。不古紫舌。脹腫堅硬。語言不利。

黃連 山梔

針刺法

治重舌木舌。紫舌等疾。腫脹疼痛。硬強不語。又兼舌根并兩邊。合緣盡處作腫。疼肉塗塞口噤難開。俱用此法刺之。用粗線針。扎在

筋頭上。在患處點刺。出血紅紫。毒輕者。數十點皆可。血盡溫湯漱之。重者。金鎖匙。輕者。水硼散搽之。流去熱涎。內服涼膈散或清涼飲可選用。

徐曰。此法或有用處。然塗藥得宜。自能漸消。不必用此也。

重舌應用方

金鎖匙 水硼散 四順清涼飲

銀花酒

胎瘤第一百十八

胎瘤

一百一十八

胎瘤者。初生小兒頭上胸乳間。腫起大者如饅。小似梅李。此皆胎中寒血凝滯而成。須俟兒滿月外。方可

用針

破出。如赤豆汁則安。

此二句徐園批

胎瘤者。初生小兒頭上胸乳間。腫起大者如饅。小似梅李。此皆胎中寒血凝滯而成。須俟兒滿月外。方可

用針破出。如赤豆汁則安。

此二句徐園批

用針刺勿疑。當內服五福化毒丹。

此二句徐園批

五福化毒丹

元參丹草牙硝甘草殊少衣用金

治小兒瘟結胎毒。以及諸瘡瘍。疹傷風斑症。口舌生瘡。疫癰。盛。語言煩躁。夜睡不寧。

此二句徐園批

牙硝各一。甘草五錢。水一斤分三。殊少。金酒二十個。右為末。

者。元參一錢。黃連一錢。龍胎草一錢。青黛一錢。牙硝各一。甘草五錢。水一斤分三。殊少。金酒二十個。右為末。

燒蜜丸。大實大。每服一丸。薄荷。燈心。湯七服。兼治瘡痘後餘毒。上攻口齒。涎血。真穢。以生地黃汁化下。如無地黃。竹葉。燈心。湯亦可。

此方平妥可用。治上焦火毒尤良。又曰。瘤症非服藥所能愈。外治之時服此以養氣亦宜。

此二句徐園批

鵝口瘡第一百十九

鵝口瘡。皆心脾一經胎熱上攻。致滿口皆生白斑雪。甚則咽間疊疊。腫起。致難乳哺。多生啼叫。以青紗一條。裹筋頭上。蘸新汲水揩去白胎。

此二句徐園批

以淨為度。重者出血不妨。隨以水硼散搽之。內服涼膈之藥。

徐曰。此症宜紫雪最效。

鵝口瘡應用方

水硼散

見門

涼膈散

見門

痘癰第一百二十

痘癰

一百二十

痘癰乃出痘漏漿不足。毒流於肺。一經致手腳胸背。結成漫腫。大如桃李。多發在收醫之後。身涼不渴者為多。有此不必內消。

此二句徐園批

太陽

乙膏。僵臘熱金之元氣虛弱者。兼服保元湯。助脾胃。健胃為要。

保元湯

保元湯用參者。水硼散。葛根。甘草同。變理還。甘草同。

腹清不敏。即收功。

治痘癰出膿之後。脾胃虛弱。膿清不敏者。人參。黃耆。白朮。炙甘草。薑。一帖。

交正斗正采

重古胎瘤 鵝口瘡 痘癰 重古

卷

胎瘤 鵝口瘡 痘癰

卷

胎瘤 鵝口瘡 痘癰

卷之十一

痘

疔

瘡

癰

痘疔第一百二十一

痘疔乃痘毒升發不盡。留於心肝一經。初生紫點。次日變黑。毒淺者浮高而潤。毒甚者深陷而焦。其管多出於七朝上下。將盛之際。又生於脣

腿手足。身溫。疮潤。音清者吉。發在肚腹。青腫。身熱。色枯聲啞者凶。見此者急用針刺疔根。插入蟾酥一條。四邊裂綫。徐動者用刀割去。

徐勃。搽王紅膏。生肌完口。如針無血。挿藥乾枯。不變膿者。終為不治。但此症屬有餘。首尾俱宜加減。鼠黏子湯為要。徐曰。雖是疔毒

割去。徐勃。但係疔後。又屬幼科。不得與治。壯夫同。另有和平安穩之法。又曰。此與真疔微異。不得輒用重藥。內托毒氣外用白疔膏足矣。

但係疔後。又屬幼科。不得與治。壯夫同。另有和平安穩之法。又曰。此與真疔微異。不得輒用重藥。內托毒氣外用白疔膏足矣。

但係疔後。又屬幼科。不得與治。壯夫同。另有和平安穩之法。又曰。此與真疔微異。不得輒用重藥。內托毒氣外用白疔膏足矣。

地戀疔。加蟬蛻川芎。徐曰。此方太寒。

八珍湯。見腫瘍門。治療疔落後氣血虛弱。膿水出多。不能生肌收斂。

痘疔應用方

蟾酥條。見附

王紅膏

見腫瘍門

黃水瘡第一百二十二

花粉。如母相當

蛤粉散。蛤粉散治黃水瘡。農水沿開。痛莫當

水調敷。上最為良

石膏。黃柏。餅。輕粉。水調敷。見腫瘍門

黃水瘡應用方

真君妙貼散。見腫瘍門

外科正宗卷十二

大人人口破第一百三十三

口破有虛火實火之分。色淡色紅之別。虛火者。色淡而有白班細點。其者。陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮傷脾。夕醒少睡。虛火妄動而發。宜四

物湯加黃柏。知母。丹皮。肉桂。肉桂以為引導。從治法也。外以柳花散搽之。實火者。色紅而滿。口爛斑是者。腮舌俱腫。脈實口乾。此因膏粱厚味。醇酒火燭。心火妄動而發。宜涼膈散外搽。赴筵散。吐涎則愈。如口舌生瘡。古乾黃磚作湯。暑加減八味丸。以滋化源。俱禁水漱。徐曰。此症不外清火養陰。亦當用紫雪。碧玉散等。約搽之。

柳花散。柳花散內。君黃柏。青黛肉桂並研末。各分。水。三分。冰片。一分。蜜。三分。各分。共研末。再研。瓷罐收貯。每用少許吹之。

赴筵散。赴筵散內。君黃柏。冰片。各分。蜜。三分。共研末。吹搽口。即安。然吹搽口。即安。然

黃連。黃柏。黃芩。黃芩。淨末。一兩。各分。共研末。吹搽口。即安。

黃芩。肉桂。一錢。水。二分。共研末。吹搽口。即安。

涼膈散。涼膈散內。君黃柏。冰片。各分。蜜。三分。共研末。吹搽口。即安。

加減八味丸。加減八味丸。水。三分。蜜。三分。共研末。吹搽口。即安。

口破應用方

四物湯。見腫瘍門。

涼膈散。見附

加減八味丸。見附

脣風乃易明胃火上攻。具患下脣發瘻作腫。破裂流水不癢難愈。宜銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈。

銅粉丸

銅粉丸中輕粉等
黃連青子同水丸泡洗骨頭散不九

銅青散

官粉錢

明燈五分

麝香五厘

冰片二厘

黃連二兩切片

輕粉五分

銅青散

官粉錢

明燈五分

麝香五厘

冰片二厘

黃連二兩切片

輕粉五分

右共為細末黃連膏丸如芡實大每用一丸放碗內湯泡紙蓋候煥頃熱用上面清水勤洗之自愈。楣素脣風本在一百三十九今移於此。

臭田螺第一百二十五

臭田螺乃足陽明胃經濕火攻注而成。生足指脚白斑作爛先癢後痛破裂流水好似螺鷺。甚者脚面俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗貼。蟠酥餅。三日三枚後用珍珠散。猪脊骨調搽膏蓋。拔腫處用真君妙貼散敷之其腫漸消勿即步履。

臭田螺應用方

蟠酥餅

瘡門

珍珠散

見下

真君妙貼散

瘡門

真君妙貼散

瘡門

牛程蹠第一百二十六

牛程蹠乃程途奔急。脚下水見風以致風帶血枯結成頑硬皮肉紫衝不滋漸生疼痛。腫高突起腳難行走。久則破裂膿水。每日溫湯洗淨。搽牛角散又有內膜攻注皮須難破者。以大線針鋒頭挑破出膿乃寬硬皮敲破者割而去之。徐曰皮尚活不可剪余何肉不生者。玉紅膏長時間滿不生皮者。珍珠散搽上生皮乃愈。徐曰此係內毒。生足跟皮內最難療治。

牛角散

牛角散用牛角灰

松香輕粉共研之

牛角火燒

牛膝調和搽上宜

牛角火燒

蟠酥餅

瘡門

珍珠散

見下

真君妙貼散

瘡門

真君妙貼散

蟻螂蛀第一百二十七

蟻螂蛀多生手指節中。不紅不熱腫如蠍。此句徐乃手少陰痰氣凝滯而生。初起不疼。日久方痛。痛久方腫。腫仍不消。蟠酥餅膏貼漸作稀。膿近者一載。遠者三年。此症體弱者有之。內兼補劑免變癰瘍之病。徐曰治手法與諸頑瘡同。

蟻螂蛀應用方

蟠酥餅

瘡門

田螺泡第一百二十八

田螺泡多生手足。忽如火燃隨生紫白黃泡。此脾經風溼攻注不久。漸大脹痛。不答線針挑破泄去毒水。太乙膏益挑破又生者。內服解毒。鴻臚湯可愈。

解毒鴻臚湯

解毒鴻臚牛蒡子

石膏甘草黃芩等

木通燈草鴻心脾

防風

牛蒡子

山梔

石膏

黃芩

蒼朮

甘草

木通鑑

水二鍾

燈心二

十根煎八分量病上下食前後服之

田螺泡應用方

太乙膏
碧玉膏

培木丹
培西乳

見腫
見疔

王紅膏

見腫
見疔

皴通多起於手足。乃風寒擗於皮毛致血不榮於肌表。皮槁多痛似無皮之狀。宜葱湯淨洗良久。隨以潤肌膏擦之。勿見風冷就暖自愈。每

年逢冬即發者。湏三伏時。晒楊爛大蒜。間擦三次。不再發。

凍風第一百三十

凍風者。肌肉寒極。氣血不行。初起紫斑久則變重。腐爛作膿者。以碧玉膏主之。生肌斂口。

碧玉膏
見結毒門

獨勝膏
獨勝膏方最散寒六月每逢三六日採之冬東不相干

治凍風皮肉損爛。膿血淋漓。疼痛不止者。

治凍風凍跟凍耳。每遇冬寒則發。六月初六。一十六日。用獨蒜搗膏。日中曬熱。四字在

於遇冬所發之處擦之。忌下湯水。一日共擦三次。可以不發。又每常凍風用柏根同葱前湯浸洗亦不重發。

。

搗案此即皴痛之甚者。原本在膿窠瘡之後。今姑仍分為二門而移於此。

陰蝨第一百三十一

陰蝨又名腳蟲。乃肝腎一經濁氣所成。生此不為清吉。銀杏散津調擦之。內服六味地黃丸。每斤加蜜炒黃柏一兩。蘆薈五錢。以清化源。愈後不發。

徐曰。髮內亦有。

銀杏無憂散
銀杏無憂散。磨粉。水銀輕粉與雄黃。七味研和。調擦良。

水銀鉛
杏仁去皮
搗膏

輕粉 雄黃 狼毒 蘆薈各一錢。麝香分。除水銀杏仁膏。

餘藥共碾細。入上二味再研。先用土菖蒲煎湯洗之。用針挑去蟲孔。隨用津唾調擦。使藥氣入內。則不復生。切忌牛大鼈肉。

。

百部湯洗妙
百部湯洗妙

搗案杏仁徐園

。

陰蝨應用方

六味地黃丸

見肺病門

葡萄疫第一百三十二

葡萄疫。其患發生於小兒。感受四時不正之氣。鬱於皮膚不散。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在偏體頭面。乃為朋症。邪毒傳胃。牙根出血。

久則虛人。初起宜服羚羊散。清熱涼血。久則胃脾湯滋益其內。又有牙齦腐爛者。用人中白散。

羚羊角散
羚羊角散用防芩牛蒡知母與元參。甘草。甘草子。甘草梢。水茶鍾淡。

竹葉十片。前六分食透服。

徐曰。此為主方。

搗案羚羊角牛蒡子徐園。

。

胃脾湯
胃脾湯。冒脾湯內甘草陳白。不參。冬五味子。附草。冬桑枝。遠志沙參共爲神。白。不參。冬桑枝。附草。冬桑枝。遠志沙參共爲神。

分食透服。虛弱自汗者。去沙參。加入參黃者各五分。徐曰。白朮一味不切。

葛萄疫應用方
人中白散

見病門

人咬傷良肉受傷。陽明胃經之脈循頸車入齒。維多水火熱。凡食經此無不燙下咽。又飲食火燭之毒。無不侵襲。故傷人發腫。其痛且常。臭膿腐爛。痛徹連心。初咬時一日內眾微熱。小便漫傷處。洗淨牙黃乘血咬乳上。蟾酥貼之。膏盡後出微膿漸愈。如咬時未經此法致腫痛發熱。甚者亦與童便浸洗。汽用粗紙燃離麻油點火。用烟紙薰咬處。久方住以解牙毒。仍以蟾酥條插入孔內。膏盡候腫消時換玉紅膏。搽之長肉完口。如有雜症相兼者。亦隨症而治。

葱白甘草湯

葱白甘草湯無日洗之樣。另用紅消散。能治咬傷疼痛。更微細。

日洗淨傷處於癰膿血方用王紅膏搽

王紅膏見附

王紅膏

見附

台咬傷。拔腫疼痛。膿血淋漓。臭穢腐爛者。用葱白二兩。甘草五錢。水三碗煎至一碗。每

咬傷應用方 蟾酥餅條

卷門

咬傷應用方 蟾酥餅條

卷門

風大傷第一百三十四

風大朝夕露卧。感非時不正之氣。故心受之。其舌外出。肝受之。其目眴脾受之。其涎自流肺受之。其音不出腎受之。其尾下施五臟受之。乃成風大。金粟陰陽。肅殺之氣。故常無故陽人。初咬即服救生散。令小便中行出血片。宜居靜室。忌諸味發物。并忌見諸麻。赤豆等物及聞鑼聲。百日乃安。治之遲者。毒大而小便難出。必攻腑。久而成丹。腹脹攻急。人聲若大。眼神露亡。則不可治。有愈後犯前。甚復發者。仍死。

救生散

救生散用斑蝥七枚。同作末。去頭足用其身。空心酒服效如神。

血片白脂乃惡物也。如便痛煎甘草湯飲之。自利如毒未盡。次早再一服。至小便清白。方為毒盡。

又方 治風大咬。具人頂中。必有紅髮一根。徐圓急湧反去。以追風如聖散。敷傷處。抽毒氣。內服救生散。

徐曰。宜更服木鼈末。如髮數根。加黃加上有奇功。

追風如聖散

追風如聖散吹風川草烏。各蓮荷同研。雄黃加上有奇功。

治風大咬傷。隨用敷之。其毒即可拔出。

細辛 防風 川烏 薄荷 草烏 川芎

白芷 蒼朮

雄黃

共為末。溫酒調敷傷處。以紙蓋扎。早晚換二次。

惡蟲叮咬第一百三十五

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生。且如蠅蛆用鉗。蜘蛛用尾。蛇以舌見之者勿觸其惡。首不被螫。苟有所傷。各尋類而推治。

治蠅蛆咬方

用蟾酥餅磨濃塗傷處。粗紙燃離麻油點火。用烟紙薰之。疼腫自消。或用雄雞糞搗水以塗之。或用頭垢搽傷處。以撲酸薰

之俱效。

徐曰。人馬平安散外塗內服。大妙。

人馬平安散

補 西牛黃

分六

水灰

麝香

一錢

滑石

四錢

石膏

二兩

大赤金

四錢

共研極細末。瓷瓶收藏。切勿溴氣。此方本治夏月受暑。頭目昏暈。或不省人事。或患赤腹痛。吹入鼻中。立時起死回生。如驃馬受熱暈倒。亦將此吹鼻即愈。

治蝎蟹方 蝎有雌雄二種。雄者螫人痛在一處。雌者痛牽偏體。用井底泥敷痛處。乾則易之一時無泥。取新汲水。以青布隨痛處搭之。溫則

再易。又方五月五日用黃蠍二兩谷化將凝時投雄黃末各三錢和勻搗成餅。當仍用貓兒眼草白芷端午時滴入窩內陰乾愈久愈佳。復捏成塊密收。臨用取一米許刺針尖上以燈蕊花開滴正蠍之處。其痛即止矣。

治蛇蟄方 用雄黃末徐閑(閑葉搗十調敷腫上)內用半枝蓮搗爛取汁一兩熱酒四兩和汁服之。益汗為效。仍用燈敷傷處亦妙。又方。連用端午收採蒼耳草末五錢水煎一鍾熱服。益汗即安。如無端午收採者。便用常日採取陰乾者。煎服一兩發汗亦效。

又治七寸蛇蟄方 七寸蛇青色扁升火尾短足紅口者毒輕。青口者毒重。以舌舐人。其毒最惡。初蟄時用雄黃末一錢生岩二錢均內溶化將筋頭點藥傷處。此二向徐密點他日冷則易之。連點七次即愈。毒氣入裏者解毒紫金丹酒磨服一錢益汗即愈。遲延毒走腫痛者麻油燭薰之亦瘥。

治河豚毒方 河豚血毒中人。舌麻心悶。白茅根搗汁。冷飲子。毒中人。昏悶腹脹。口噤難言。非金汁不能解也。

百蟲入耳 第一百三十六

百蟲入耳乃偶然誤入。如蠅蚊細蟲。以麻油數點滴入竅中。蟲即自死。取出。如蜈蚣蜜蜂等大蟲。以肉炙香耳邊。其蟲聞香自出。有蟲夜間暗入者。切勿驚慌响叫。逼蟲內攻。宜正坐點燈。光向耳竅。其蟲見光自出。對面有人見其蟲不出。

誤吞針鐵骨哽咽喉 第一百三十七

誤吞針刺哽咽疼痛者。用亂麻筋一團。搓龍眼大。以線穿繫。以線頭在外。湯溼急吞下咽。噴刻扯出。其針頭必刺入麻中。同出如不中節。再吞再扯。以出為度。誤吞銅物多食芋蕷化敗為軟。若吞鐵骨之類者。腸中不能轉動。覺墜者多食青米。豬脂自然送入大腸。與糞同出。諸骨哽候用玉簪花根八錢。各隨所犯之肉。為引。煎服之轉出乃愈。徐曰玉簪花易湏用竹管放喉間。又諸骨硬於咽下。不能外出者。烏龍針推之骨下則安。具法以細鐵線燒軟對折。雙頭用黃蠍作丸。如龍眼大。裹鐵線頭。外用絲綿裹之。推入咽內。其骨自然順下。不下再推。餘此去。又方用玉簪花根切片。煎湯漱之。徐徐吐出。其骨自軟。再用乾飯嚥之。自下。

人面瘡第一百三十八

人面瘡古有生者。近世罕聞。其瘡全似人面。眼鼻俱全。多生膝上。亦有臂患者。方書皆云積冤所致。先瀉清心懺悔。改過自新。然後服十六味流氣飲。外用貝母為末。敷之。乃聚眉閉口。次用生肌散。口約亦可得愈矣。

人面瘡應用方 十六味流氣飲見流門

陰毒第一百三十九

陰毒乃純陰無陽。被天時寒冷肅殺之氣。侵入肌膚。沈於骨髓。致氣不能升。血不能行。凝滯經絡。疼痛切骨。初起不腫不熱。朝輕暮重。不則作腫漸紅爛斑黑膿。真水淋漓。穢氣薰蒸。腐爛漸開。久必死。一人年三十歲。冬月隔港與鄰婦私交房事。方畢。勿笑。婦回。慌忙隔江赴水而死。熱身受寒。五日後。小腹大脅陰痛。不腫日夜呻吟。至二月後。敷道傍生一爛斑黑膿。倒陷諸約不效。至半月。大脅連黑腐爛作臭。乾膿無

頭又十日大脹俱壞黑敗而死又一人年四十歲夏月每飲大酒至夜亦身露時手腳通計陰痛難忍一月後肩發爛斑一塊周圍微紅色如紅棗。日漸延開半月後手脣半背成黑色。其極不堪。一月不食而死。一人中年肥胖冬夏好飲火酒飲後隨吃涼水方吐。一日頸項作疼微腫堅硬如石。三月外項大如頭。石硬不熱真陰毒也。余詳不治請別醫治之項同身大不食而死。又一人夜夢城隍拘見責打二十。喊叫其妻喚醒隨後受刑處極腫作痛。青紫急脹視之真棒毒也。用針刺破流來血碗許外肉腐爛作疼調理兩月而安此亦陰毒故附記之。

失榮症第一百四十

失榮者先得後失。始富終貧亦有雖居富貴其心或因六欲不遂損傷中氣鬱火所凝遂廢失道停結而成。其事多生肩以上初起微腫皮色不變日久漸大堅硬如石推之不移按之不動半載一年方生陰痛氣血漸衰形容瘦削破爛紫斑滲流血水或腫泛如蓮葉氣薰蒸晝夜不歇半生疮瘡愈久愈大越潰越堅犯此俱為不治予立二方曾治數人雖不獲全愈而不夭札速死誠緩命药也。

和榮散堅丸和榮散堅歸地參丹砂連柏保龍齒治失榮症堅硬如石不熱不紅漸漸腫大者歸身熟地茯神香附人參白朮橘紅各二錢貝母南星酸棗仁遠志柏子仁丹皮各一錢蘆薈角沈各八錢龍齒一兩煅無龍齒或用朱砂六錢

右為細末煉蜜丸桐子大每服八十九食後用合歡樹根皮煎湯送下患者若猛省自寬活潑甘命亦有十中一二得愈者否則難脫然也徐曰不成方。

飛龍阿魏化堅膏治失榮症及癰瘤乳石瘻癥結毒初起堅硬如石皮色不紅日久漸大或疼或不疼但未破者俱用此貼用蟾酥丸藥末一料加金頭蜈蚣五條。炙黃去頭足研末同入熬就乾坤一氣膏二十四兩化開攪和重湯內頓化紅綬撲貼半月一換輕者漸消重者亦可不大常貼保無後虞。

中砒毒第一百四十一

砒乃陽精大毒之物服之令人臟腑乾涸皮膚紫黑氣血乖逆而死知覺早者大蘭根葉搗汁灌之輕則可解無蘭處以生菜豆腐水研爛以水灌之多則見效如不解者以金汁灌之必甦甦後如頭不語者每日以菜豆水飲之毒盡則愈。取金汁法用大毛竹一連二節用刀刮去外青一半用磚孔節中沈入大糞池內一年後取起以長流水浸一日取起鑽開節孔內置黃清瓷罐收貯。凡遇有中砒毒河豚毒傷寒陽毒發狂疔瘡砂疽毒氣入裏煩躁口乾渴欲飲水脈大有力者並宜此藥。落卜頭攀法第一百四十二 樞葉頭當作頭攀下正中骨即下把散第一百四十二

自創者乃迅速之燙項救在早遲則額冷氣絕矣。初創時氣未絕身未冷急用絲線縫合刀口繆上桃花散多繆為要即以棉紙四五層益刀落卜頭攀法第一百四十三

口藥上以女人舊布裹腳。將頭抬起。周圍繩繞五六轉。其事者仰卧。以高枕枕在腰後。使項斷而不直。刀口不開。冬夏避風。反被僵硬。待其氣從口鼻通出。以墨五斤。人參一錢。用米一合。煎湯或稀粥。每日隨便食之。接補元氣。三日後。急手解去。前藥用桃花散。研刀口上。仍急繩札。二日急用濃葱湯。軟絨蘸洗傷處。渴乾用紙脚桃王紅膏。放手心上。捺化搽於傷口。上用舊棉花。擦淨。益之外。用長黑膏貼裏。周圍交札。不脫骨之兩橫頭。再用黑膏長四十闊二十。暨貼膏上。上下黏連。好向底不脫落。外用絹條圍裹。二轉針線縫頭。冬月三日。夏月二日。每用葱湯洗過。換藥。自然再不疼痛。其肉漸從兩頭長合。內服八珍湯。調理月餘。如大便結燥。用豬脂套法。不可用利藥。雙喙俱斷者。百日單斷者四十日。必收功完。此法曾治強盜郭忠。隸沙萬家人。顧興俱雙喙齊斷。將危者。又單喙傷斷者十餘人。治之俱全活。

自刎應用方

王紅膏

見腫瘍門

桃花散

如聖金刀散

見金瘡門

八珍湯

見瘡門

試知百病死生法第一百四十四

疾病非明醫不能決。其凶吉死生。非神聖不能洞其機。閑子得呂祖一枝梅方。真仙傳也。不敢私秘。刊以傳世。

呂祖

一枝梅

呂祖傳授一枝梅

二株雞屎共臘脂

餅貼印堂。治生死

巴豆蜜脂草麻子

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間。用藥火實大一餅。貼印堂之中。點管首

枝香

益去珠已後一時許

月

約處有紅斑暈色

腫氣飛散。謂之紅霞。擗日病雖危篤。其人不死。如貼藥處一時後。無腫無紅皮肉照甚不變。

徐曰

血肉已謂白雪漫野

病雖輕淡終歸冥路

小兒急慢瘧風

一切老幼刺疾。如貼之。紅腫即愈。此方可預知生死也。

朱砂

三錢

銀朱一錢

銀朱立分

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間。用藥火實大一餅。貼印堂之中。點管首

五靈脂

三錢

麝香分

草麻仁分

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間。用藥火實大一餅。貼印堂之中。點管首

雄黃

五錢

巴豆仁各五錢

治大人男婦小兒新久諸病生死難定之間。用藥火實大一餅。貼印堂之中。點管首

造孽報病說

第一百四十五

怪症出於無端。事必因乎有據。感應篇曰。若聞如是花。必結如是果。一黃冊書手。每至甲首家。務要殺雞一隻。先食頭尾。一歲二熟。下鄉殺雞不計其數。一朝數益口。中生出如廄者。大小六枚。填塞滿口。湯水難下。余視之。乃孽疾也。解不可治。請一醫。用刀割去。次日又生如舊。延至六十日。肌膚盡削。仔骨如柴而死。又一竿槍戶。傷殘生瘡。假如每日十命。一歲共計三千六百。益屬死無辜。况其離之不得生者。多矣。彼生子三人。俱至一七歲。偏身發出紅點。瘡痛異常。數日後。點如鑽趙。腐爛流血。口稱百鳥相啄。令人趕打不去。至月外。氣血源盡。俱亡。予後勸解。燒毀竿矢。合族持齋。六十二歲生一子。方得成立。一人五十餘歲。家中養雞十餘隻。一朝眾雞齊叫。彼怒之。將取雞兩腳。齊時安檻上。剁斷其雞。鳴飛跳血。益俱死。一年後。生脫疽。筋骨伶仃。流血不止。令妾將刀割去。脚骨。溼盡。氣血而亡。一富家買高弓。兼養鷹犬。十後方生一子。二歲左右。頭角生孔。一處俱已露骨。視之。乃孽病也。不敢言其不治。奉上藥方。修合用之。無效。請眾醫治之。強投藥餌。延至三歲而沒。具人後。遭橫事死於非命。莊家以獄事為樂。五十後。偏身生瘡。破後腐爛見骨。余知為孽報。謂曰。先當杜養鷹犬。然後此病可治。彼從之。內服益氣養榮之药。外用當歸甘草。煎水。搽王紅膏。長肌完口。三月而愈。二年後。復養鷹犬。又一年六月內。患陰症而沒。次子十歲赴水死。以上數條。余所親見。皆慘戮生靈之報也。一訟師作中。與訟破眾家私傷殘。骨肉不計其數。一日大腹腫痛。堅硬如石。疼苦莫

常嘗欲以繩系足高懸梁上。具疫乃止。如放下皮即如故。知解繩而不可治。似此兩月一日午時。新友四人相會。忽見腹大脹。其脰即歸於背。腫如斗。其腰即消。背腫痛不著席。將而更懸。挂其痛方可。又兩月百苦而終。又一年。其妻偏身發腫。如鵝作癟。非常破流脂水。其時孟冬。天氣常欲亦身裸露。其瘡稍止。如着衣被。其瘡即生。如蟲攻刺。子知孽報亦辭之。後至隆冬。亦身流水而死。此異常之報也。所謂逆天害理。雖由已古往今來。放過誰決無湯綱。

仙方活命飲古今不同論第一百四十六

古人朴實。其情干涉者少。而從風寒暑溼外感。凝滯者多。故設仙方活命飲。攻散所滯之腫。服此得效者十常八九。由病者五臟不虛耳。今人穿鑿太過。七情煩懶。過其內臟無有不傷。每見冒服過此藥。其瘡必不起。發脾胃再無不傷。夫瘡不起。發脾胃傷敗者。豈可得生。故今之治法。不論夏尾標本。先必固脾胃。次行托藥。病無不活。愚見如此。幸同道者察焉。徐曰。此段真是亂道。對症用藥。無有不愈。豈有容之別。竭案著書者於腫瘍方首。列神後衛生湯。而此乃痛駁仙方活命飲。余取一方以較之。亦大略相同。衛生湯僅少陳皮。身母沒藥。而多羌活。沈香。紅花。連翹石。決明。便祕者加大黃。是其方更猛於活命飲也。何乃是今而非古。此與近人言方甚之方。非望溪所及。何異。

拾遺症第一百四十七

拾遺者因條欵分門。未及細詳。故有失載。今補註於後。以便觀覽。

鼻疔生於鼻內。痛引腦門。不能運氣。脹塞鼻竇。甚者脣腮俱腫。

牙疔生於牙縫之中。頂高突起。痛連腮頰。則流血。

黑疔生於耳竅之内。黑硬腐爛。破血流水。痛及腮頰。以上諸症。俱先針刺。次行發汗。仍照疔類調治。

喉癰生於咽外正中。妨礙飲食。紅腫熱痛。必欲潰膿。軟而脹痛者。針之。內服補托之藥。玉紅膏。搽貼長肌。完口。又有腐潰內通。湯水隨孔出者。曾治數人。俱亦無妨。

瞓疽生於瞓上。連肩通腫。長堅而硬。

兑疽生在當手動脈之處。腫痛寒熱。痛徹手脣。舉動不便。

鳳眉疽發在兩眉之間。形長皮亦痛。引腦戶。二目合縫。光暉發熱。

透臍疽發在額上髮際之間。多發寒熱。頭痛如研。不可忍。而先用萬靈丹。發汗。解散風邪。次宜清利。

附陰疽生在內踝上三寸。初生小泡。漸至赤腫。破流血水。痛亦微骨。不能步履。

咬骨疽發在大腿內股。不腫不紅。痛徹骨髓。初宜雷火針針。之內服萬靈丹。酒調服效。

陰疽生於右眼夾縫之下三寸。痛連陰子。小腹亦疼。

元疽生於左眼夾縫之下三寸。漫腫連陰。及大腹。

淵疽發在脇下。初起不紅堅硬。入則破潰有聲。如嬰兒啼狀。微曰高熱。無聲者高。仍有異我難治之症也。楣案王君士雄歸硯錄載。潘氏子肋下腫潰。鼠孔甚巨。孔中作聲如嬰兒噦泣。吳江陳夢琴妙不。布丸視之曰此淵疽也。證屬太虛。固當補益。但疽孔作聲。則內膜已破。氣從旁出矣。非護其膜。補亦徒施。以人參白朮白芍烏梅炭白附黃蠟。東牙屑。脊髓。和為丸。令曰三服。以固氣。仍清諸藥。益以生肌之品。製若糊餅。塞疽口。絲綿裹青鉛。罨其外。大膏鈎盐之間。布纏繩其體。三日一易。復用生脈六味加龍蠅等品煎汁飲之。如是二十餘日。其聲漸除。三月餘而口斂。又案外科心法亦言。聲如兒啼。為內膜已透。可於陽陵穴灸二七壯。其聲即止。將潰未潰。多服護膜散。白蠟白芨各等分研末。輕者用一錢。微重二錢。重者用三錢。或酒或水調下。可免透膜。通利潰後宜補托。久則宜收斂。此為一定治法。不可亂投。約餌以致危亡。徐曰此篇當記。

繩縛背瘡法第一百四十八

王枕疽生在腦後枕骨中。堅而難潰。痛引肩項。鼻塞氣粗。此太陽膀胱溼熱凝滯而成。以上諸症。初起有表症者。便宜解表。有裏症者。即與研末輕者用一錢。微重二錢。重者用三錢。或酒或水調下。可免透膜。

癰疽內肉不合法第一百四十九

凡發指對口等大瘡。已潰流膿。時冬夏宜絹帛四五層。蓋在膏藥外。再用綿布見方八寸。益在絹外。四角用蛇皮細帶綴之。扎在前胸。繩實瘡肉。麻瘡中暖氣不宣。於腐潰沈瘡時預備二繩。更換務要瘡內暖氣烘烘。此法最善。故補載矣。

癰疽內肉不合法第一百五十

癰疽對口大瘡。內外腐肉已盡。結痂時。內肉不黏連者。用軟綿帛七八層。放瘡上。以絹扎緊。睡寢數次。內外之肉自然黏連。一片矣。有患口未完處。再搭玉紅膏。其肉自平。徐曰東洞庭劉某夫人患乳癰。醫者用刀刃乳頭上。十餘出毒。瘡口向上。膿反下注。乳囊皆腐。寒熱不食。成乳勞。延余台之至九十日。而未見功。益病者悉弱。畏痛既不敢於乳下別出一頭。而膿水從上注下。頗難出盡。故有傳養之害。生一法。用藥袋一個。放乳頭之下。用帛束縛之。使膿不能下。注外以熱茶壺熨之。使藥氣熏熱入內。又服生肌托膿之丸。於是膿從上泛厚。而且多。七日而膿盡。生肌又數日而全愈。後以此法治他證。無不神效。此條從洄溪

煉元明粉法第一百五十一

冬至後用潔淨朴硝十斤。水一斗五升。白蘿蔔五斤。打碎。同入鍋內。將硝煮化。候湯滾足。撈去蘿蔔。以綿紙二層。鋪竹絲簾內。架在新缸上。將硝湯徐入簾內。隨瀘隨添。以湯瀘盡為度。將缸移住天井露。二日。其硝結在缸內。傾去餘水。瀝乾為止。將硝取下。再用砂鍋頓炭爐上。將硝一碗化開。前後以銅匙鑊攪。將凝結時。鑊入小魚酢罐內。上空寸許。餘硝墜續。照上法凍畢。每一罐下用三針。品字樣插入地中。留寸半在外。將罐浮頓針頭上。用瓦斤盃口周圍用段磚切。百眼爐圍繞。離罐寸半。許。著火入爐內。四圍底火頂火。務要周匝。俟罐硝紅為度。次日取硝。來預用大綿紙。攤在潔淨陰土上。將硝碾細。用絹篩篩在紙上。約一錢厚。再不許。另門窗俱關閉。不令人見。三日後。其硝自然復活。色白似粉。輕虛成灰。將該盛腔內。用紙蓋。再放亂紙一寸許。以收潮水。庶不疑結。此品最能降火化痰。清利臟腑。怪症服之可瘳。狂躁用之即愈。擅除百病。安飲心神。不傷元氣。惟久病渴利者不宜。大人每服三四錢。小兒五分至一錢。皆可。俱用白湯或葛湯空心化服。候行二

三次服飲補強自然精神與健脈調和津液固生百病如火又煩過硝石六兩加硫砂三錢青黛一錢五分共研細末照前鋪紙上。每服五錢至一錢俱用大竹葉燈心湯化服。屢有奇效不可盡述。此乃神仙保命服食之品。每一斤加生熟甘草末二兩或湯化服三錢。令人容顏悅澤。輕身耐老。帽紫元明粉乃推湯腸胃之藥。經燥稍緩耳。以為神仙服食之品誤人不淺。又案此下有取紅鉛法徐用筆勾去故不錄。

煉金頂砒法第一百五十一

用鉛一斤。小罐內炭火燒化。投白砒一兩於化粧鉛上。煉至烟盡為度。取起冷定。打開金頂砒結在鉛面上。取下聽用。

煉硝石法第一百五十二

蟾無大小俱有酥用。閼鈎鑷鑷蟾眉較高。剪下微緊。拔出酥來。凝聚鑷裏多。則括下陰乾聽用。其取過之蟾避風一日。仍送青草園中。自然不傷其生。如取之便見風下水俱成破傷風。顛狂而死。

製附子第一百五十四

大附子要一兩以外者。不拘幾枚。以童便浸滌三寸。每日換便。夏浸三日。冬浸五日。再換童便。煮盡二香為度。去皮臍線穿陰乾。或日中晒硬亦可收。藏聽用。

昇白靈藥法第一百五十五

水銀二兩。用鉛一兩化開。投入水銀聽用。火硝二兩。綠薑一兩。明礬二兩。共研為末。投入鍋內化開。炒乾同水銀研細。入泥護陽城罐內。上用鐵蓋蓋之。兜以鐵梁。梁之兩端用燒熟軟鐵線。下扎緊。用紫土鹽泥。如法固口。留出蓋面。烘令十分乾燥。架三針。上砌百眼爐圍之。先加底火二十點。香一枝。中火點香一枝。頂火點香一枝。預用小罐安放易存傍。以筆蘸湯。擦擦蓋內。常濕勿乾。候三香已畢。去火罐。待次日取起。開出藥來。如粉凝結。蓋底刮下。收藏聽用。凡瘡久不收口。用此研細。炒上少許。其口易完。即尋常收斂約中用之。功亦甚捷。徐曰。此藥除濕毒。不收口之瘡。餘俱有害。世人皆以昇藥為收口之聖药。其害無窮。

製拔針喉針法第一百五十六

用白鈣一斤。外再以麪半斤。調稠捏成薄片一塊。將前麪合於中。周圍扎緊合口。於清明正日。蒸熟挂透處。陰乾。將鈣已藏。勿經手。越久越效。

製拔針喉針法第一百五十七

帽紫被當從靈樞
經作鍼大針也

披針古多用馬銜鐵為之。性軟不鋒。利用之多難入肉。今以鋼鐵選善火侯鐵工造之。長二寸。闊二分半。圓柄扁身。劍脊尖鋒。兩邊芒利。入肉深淺得心應手。如膿深欲具口大直針進。而斜針出。劃開外肉。則口大矣。喉針長六寸。細柄扁頭尖鋒。刺破膿血令出。

諸藥製法第百五十八

前方諸藥未詳製法。今開列於後。不湏製者不錄。人參

潤色明亮堅實
為上輕脆不堪

天門冬湯泡
去心去皮去心

麥門冬去心
酒洗去皮

生地黃酒
熟地黃酒

白朮米泔
水浸炒

芍藥

甘草

消毒生用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩酒炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

白

蒼朮米泔

黃耆蜜水

甘草補氣用

桔梗蜜炒

陳皮白去梗

桔梗蜜炒

防風去皮

乾薑黑炒

附子蜜炒

半夏水煮

川芎湯泡去皮

肉蓯蓉酒洗

知母鹽水

瓜蒌仁去殼

生地黃酒

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

山茱萸核

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

威靈仙根

甘草消氣用

遠志心微去

酸棗仁研炒

元參根

香附蜜炒

柴胡去根

黃芩蜜汁炒

黃連蜜汁炒

草烏湯泡去皮

牛膝酒洗

破故紙炒

當歸洗

尻神所在

恨由坤內裸聖人留震宮牙端分明記。位還居乳口頭。中宮肩骨連尻骨。面目還從乾上遊。手膊兒宮難變。艮宮腰項也。

尻神歌圖第一百六十二

甲不治頭乙耳喉丙肩丁背與心求戊己腹脾庚腰肺辛膝壬當腎膀胱癸足

子踝立腰寅在目卯面辰頭已手熱午胸未腹申在酉背戌頭亥股續

十干日針忌歌第一百六十一

尻神歌圖第一百六十二

尻神歌第一千日

尻神歌圖第一千一百六十二

尻神歌第一千一百六十三

尻神歌圖第一千一百六十四

尻神歌第一千一百六十五

尻神歌圖第一千一百六十六

尻神歌圖第一千一百六十七

尻神歌圖第一千一百六十八

尻神歌圖第一千一百六十九

虎

神

圖

醫家五戒第一百六十三

一戒無論貧家大小貧富有請更往勿得遲延厭怠約金勿計較輕重一例盡心施治自然生意日增不傷方寸。

二戒凡遇婦女及孀婦凡僧人等必保侍者在旁然後入房診視倘侍者偶不在旁宣讓避嫌疑真誠診視歸對妻子亦不可妄談閨闥。

三戒不得出脫病家珠珍貴重物送來合私暗中調換如果該用令彼自製庶無謗。四戒凡為醫者勿耽嗜奸巧志慮紛馳勿舉起勿無事他出致尤診者守候無時切脈必當用意寫方務要仔細不可胡亂杜撰受人批駁。五戒凡娼妓及私夥家請看亦當視如風寒子女勿存他意此戲以取不正之名視畢便回負倉者約金可壁病愈不可再往。

醫家十要第一百六十四

一要先明儒理然後習醫或內或外勤讀古書手不釋卷一參明融化得之於心應之於手臨症時自無差誤。

二要選買約品必求雷公炮製或依方修合或隨症加減湯散取辦於臨時丸丹預製於平日膏約愈久愈靈線約越陳越好約不善珍施必臻效。

三要凡鄉井同道之士不可傲慢輕侮年尊者恭敬之有學者師事之名重而身高者遞謙之技精而未顯者薦拔之如此自無謗怨。四要治家湏與治病同人不惜元氣斷傷太過則百病生醫不顧來源雖費太過則百用寡能治家然後養生有資不藉病人為奇貨。五要人受命於天醫者受人謝儀當知天道順逆順取者吉逆取者凶不論多寡是謂順取勒索厚資是謂逆取天即因其順逆為報應不可不做。

六要凡里中親友人情如婚喪疾慶賀及饋送來往之禮不可求奇好勝每食一魚一菜一則省費二則惜祿至病人之家尤不可苛求飲食。

七要貧苦之家及遊食僧道衙門差役人等凡來看病不可要他藥錢只當奉送貧苦至極者當量力資助不然有約無食活命亦難。



此圖一歲起坤
二歲起震逐年

順飛九宮週而

復始行年到處

則所主症切忌

針灸俱勿犯之

否則變生他病。

八要凡有所蓄隨其多寡。重金買產業以為根本。不可收買玩器。及不急之件。浪費錢財。醫本仁術。有餘則以施藥可也。

九要凡店中所用醫藥器具。俱要精備齊整。不得臨時缺少。又古今前賢及近時名公新刊醫書。必尋究參閱。以進學問。
十要凡奉官衙所請。必當速去。毋得怠緩。要誠意恭敬。告明病源。開具約方。而愈之後。不得圖求恩禮。亦不得請托人情。致生罪戾。
以上五戒十要。乃保身保家之法。當置座右。朝夕省覽。賢能子弟。遵而行之。可以成家立業。若不聽信。必有飢寒不足之憂。悔何及矣。楣

案五戒十要。著書者益以垂為家訓。故原本有與醫無涉者。余於全書。俱順文刪改。不參己意。獨此稍為增益。為業醫者。告焉。勤索厚資。尤
外科。已醫。忍習。所望讀此而幡然改悔也。