


聖濟總錄

百全

庫文閣内	
三	漢
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (180)
函號	300 212



大德寺後醍醐天皇御製卷一百八十二

水引

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風



小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

小兒驚風

大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百八十二

小兒門

小兒諸丹

小兒遊腫赤痛

小兒癰瘡

小兒疽瘡

小兒瘰癧結核

小兒惡瘡

小兒凍爛瘡

小兒疥

小兒癬

小兒風瘙癩疹

小兒癩疔

小兒驚風

小兒癇

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒疳積

小兒門

大慈惠對聖本勳藥谷保一百八十二

小兒諸丹

論曰風熱發丹古方謂小兒得之最忌以其氣血未定
 肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定
 處俗又謂之溜流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法
 可鎌洩去毒氣不爾則丹毒入腹近心即死但初發於
 心頭者不可鎌爾

治小兒丹毒赤腫壯熱百治不差者藍青湯方

乾藍青 兩 貳

凝水石 碎

石膏 研

山梔子 人

各壹兩

苳胡 去苗

犀角 鎊

黃芩 去黑心

杏仁 湯浸去皮尖雙入炒

甘草 炙

赤芍藥

羚羊角鑿

葛根剉各兩

知母兩

右一十三味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至四分下蜜半錢竹瀝少許再煎至三分去滓空心日晚分溫二服更量大小加減

治小兒丹毒徧身黃芩湯方

黃芩去黑心

麻黃去節根

秦艽去苗土

升麻各壹分

大黃剉

防風去叉各半兩

右六味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴消末半錢匕去滓空心分溫二服晚再服更量兒大小

加減

治小兒丹毒黃耆湯方

黃耆剉

茯苓剉

黃芩去黑心

大黃剉

甘草炙剉各壹分

右五味麤搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴消末半錢匕去滓食前分溫二服更量兒大小加減
治小兒丹若入腹及下部陰卵百瘵不差麻黃散方

麻黃去根節

升麻各半兩

消石研壹兩

右三味搗羅爲散每服半錢匕并華水調下空心日晚各一

治丹入腹澤蘭湯方

澤蘭

芎藭

附子

炮裂去皮臍

莽草

藁本

細辛

去苗葉

茵芋

等分

右七味剉如麻豆每一錢匕水七分煎至四分去滓

分溫二服空心日晚各一

治小兒丹毒防入腹甘草散方

甘草

炙剉壹分爲末

油麻

升半

右二味先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末

半錢七服日再

治小兒丹毒青藍汁方

青藍汁

壹合

竹瀝

貳合

右二味和勻空心溫服一合日晚再服以差爲度

治小兒丹數十種大黃搗湯方

大黃

剉

甘草

炙

水

正

當歸

切

焙

去

入

芎藭

白芷

獨活

去蘆頭

黃芩

去黑心

芍藥

升麻

沉香

剉

木香

木蘭皮

各半兩

芒消

兩

右十三味麤擣篩拌勻每用二兩以水六升煎至

四升去滓以綿二片蘸之更互溫搨丹上冷即易日
五七度即差

治小兒發丹毒熱痛吳藍湯搨方

吳藍

大黃

槐白皮

商陸

榆皮各貳兩

右五味細剉每用三兩以水五升煎至四升去滓入

欒朴消半兩攪勻以綿二片浸於湯中更互搨丹上日

三五度即差

治小兒發丹苧麻根湯洗方

苧麻根剉參合貳 小豆貳合

右二味都用水七升煎至四升去滓溫洗丹上冷即
再煖日三五度即差

治丹毒徧身絳色鯽魚塗方

生鯽魚壹頭參兩 麻油貳兩

右二味擣魚令細入油研勻塗丹上日三五度即差

治丹走行皮中浸廣者名丹火也入腹殺人蟻螬散塗

方

乾蟻螬

右一味碾末油調塗之以差為度

治小兒野竈丹從膝起贅葉塗方

乾薺葉未 香薺未 赤小豆未各半兩

生蒴藿葉壹握 細剉之以差為度

右四味細研蒴藿入諸藥末和調如糊塗丹乾即易
六之以差為度

治小兒胡吹竈丹從陰下起泥醋塗方
右用磨刀水棚下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差
為度

治小兒胡漏竈丹從臍中起伏龍肝塗方
再伏龍肝

右一味用屋漏水去清取淀和調如糊塗之乾即再

塗以差為度

治小兒神氣丹從項起犬骨灰塗方

右一味為末以青羊脂調如糊塗之日三五次

治小兒飛竈丹從項起鐵槽水洗方

右取淬鐵槽中水日洗三五度

治小兒家火丹發如大指日長一寸徧著兩脇傍兩頰

上梓木灰塗方

梓木白皮 蓼葉各壹分

右二味燒灰研末以雞子白調如糊塗之以差為度

治小兒煙火丹從身起豬槽泥塗方

豬槽下泥壹 生麻油兩

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒烟火丹從背上起或走兩臂足赤如火真珠塗

方

真珠細研如粉壹兩 慎火草研絞汁景天是也

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒神竈丹起兩額傍不出一日變為赤黑色慎火

草汁塗方

慎火草

右一味絞取汁先以刀子微鎌丹上令血出塗藥以差為度

治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出葱薺

薺塗方

葱伍莖和須切研 薺伍莖生者和梗切研 赤小豆末

竈門上灰研各壹

右四味合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為

度

治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上廢塼塗方

廢竈塼末 屋四角茅燒灰各壹兩

右二味和研勻細以新汲水調如糊塗丹乾即易之
以差為度

治小兒私竈丹從背上起竈土塗方

竈中黃土研

右一味取打鐵磨刀槽中水和調如糊塗丹乾即易
以差為度

治小兒廢竈丹從兩脚赤及從臂曲上起五加灰塗方

五加葉根燒灰

右一味研為細末取打鐵磨刀槽中水調如糊塗丹
乾即易之以差為度

治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從面上起戎鹽
塗傅方

戎鹽壹分

附子壹枚

右二味燒過研細用雄雞血調塗丹上日五徧以差
為度

治小兒野火丹發徧身斑如梅李狀雌黃塗方

雌黃研

戎鹽研各壹兩

右二味以雞子白調塗丹上日三五次以差為度
治小兒菜萸丹初從背起徧身如細纈一宿成瘡者雞

子塗方

雞子白

赤小豆末

右二味和調如糊塗之以差為度一方云治水丹

治小兒螢火丹發灼灼在脇下正赤色而長初從額起

而多痛伏龍肝塗方

伏龍肝

研細

生麻油

右二味和研如糊塗傅乾即易之以差為度

治小兒五色丹蒴藿塗方

蒴藿葉

右一味爛搗塗傅丹上乾即易之以差為度

治小兒白丹豬通灰塗方

豬屎灰

雞子白

右二味調和如糊塗之以差為度

治小兒火丹走皮中發赤如火燒狀須臾燥漿起醋豉

塗方

豉

右一味研細入醋調塗丹上以差為度

又芭蕉塗方

芭蕉葉根

右一味取搗汁塗之以差為度

治小兒火丹熱如火遶腰須急救之芸薹塗方

右一味爛搗和汁塗傅之以差為度

又治火丹鍼挑方

右於兒男左女右大拇指面螺文上鍼挑有筋斷之

即差

治小兒伊火丹從兩脇下起青黑色羊脂塗方

煨鐵下槽中鐵屎熨研為末半兩 羊脂貳兩

豬糞壹兩

右三味研勻如糊塗之以差為度

治小兒骨火丹初在臂起赤黑色二蒜塗方

治小兒大蒜壹兩 小蒜各壹兩

右二味爛搗厚塗傅之以差為度

治小兒尿竈火丹發膝下從兩股起及臍間走入陰頭

桑木根洗方

治小兒桑木根伍兩

右一味細剉以水五升煎至二升去滓溫洗日五七

度即差

治小兒尿竈丹從踝及脛起茅灰塗方

茅草屋肆角者 雞子白

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒朱田火丹先發背徧身一日一夜而成瘡棘根

湯洗方

小棘根剉碎

右一味以水五升煎至三升去滓溫洗丹上三五度

即差

治小兒赤丹色純赤為熱毒搏於氣血馬齒莧汁方

桑木馬齒莧

右一味爛搗絞取汁三合空心溫服一合午晚再服

即差

治小兒丹毒赤腫壯熱百醫不差者藍青煎方

藍青切

竹瀝各壹

生葛根汁澄清

蜜貳

寒水石研肆

石膏研參

山梔子貳兩知母貳兩

此胡去

犀角鎊

黃芩去黑

杏仁去皮尖

赤芍藥

羚羊角灰

甘草炙剉各壹

右一十五味除研藥并汁外咬咀以水五升并竹瀝先煎去滓取三升次內杏仁葛汁及蜜微火煎成煎每服半合至一合米飲化下日三

治小兒月內發丹升麻黃芩湯方

升麻

黃芩去黑

犀角鎊

大黃剉

芫胡去苗

山梔子人各半兩

藍葉切

石膏參

甘草炙

右九味麤搗篩每二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小加減

小兒遊腫赤痛

論曰小兒遊腫由風熱客於經絡隨氣行移流走肌膚致赤腫疼痛治法當內服藥以滌其蘊熱外傳劑以散其焮痛則遊腫自消

治小兒風熱遊腫色赤犀角飲方

犀角鎊

黃芩去黑心

升麻

山梔子人

黃耆剉

牛黃研

防己各壹分

朴消參

右八味除牛黃外麤搗篩每二錢匕以水一盞煎取六分去滓下牛黃一大豆許分作二服早晨日晚各一隨兒大小以意加減

治小兒遊腫豬脂膏方

豬脂鍊過

附子生去皮

蜀椒生去目閉口者各壹分

食鹽研

右四味搗研三味為末入脂內熬過候冷塗之以差為度

治小兒頭及體赤遊毒腫痛升麻膏方

升麻貳兩

犀角錢

射干

黃芩去黑心

梔子人

玄參各壹兩

芍藥

大黃

藍實

羚羊角各壹兩

大青兩半

生乾地黄貳兩

右一十二味細剉以豬脂二斤半入鍋中於慢火上

熬不住手攪煎成膏去滓瓷器中盛取摩腫處差不

拘多少

治小兒風熱赤遊腫栝樓散方

栝樓剉人

右一味擣羅為散以醞醋和塗之
治小兒赤遊腫行流於體若不急治入腹即死白豆散
塗方

右取白豆末水和塗之勿令乾差

治小兒赤遊腫漸漸長引不止塗傳方

牛膝剉

甘草剉各貳兩

右二味擣羅為散每用二錢匕以水一盞煎至六分

去滓調竈下黃土和塗之乾即易

治小兒風熱赤遊腫方

右以麥麩末水和塗之

又方

右取伏龍肝和雞子白塗之乾即易

小兒癰瘡

論曰經謂六府不和則留結為癰蓋小兒榮衛否澁不得通利逆於肉理致肌肉腫結皮薄而澤是癰之狀也癰既不得內消則膿潰穿穴而成瘡故謂癰瘡也

治小兒癰腫成瘡犀角湯方

犀角屑

葶藶

升麻

甘草

麥門冬

去心焙

赤芍藥

薺芩

玄參

各半兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎至四分更入消石末一字匕再煎鎔去滓溫服量兒大小加減
治小兒癰瘡藏府壅熱心神煩躁大小便不利大黃湯方

大黃

剉炒

升麻

梔子人

朴消

別研

枳殼

去瓢炒

黃耆

剉各半兩

右六味麤搗篩每服一錢匕水七分煎四分去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡煩熱疼痛黃芩湯方

黃芩

去黑心

梔子人

玄參

升麻

大黃剉

黃耆剉

連翹

藍葉

甘草

木香

芎藭

犀角屑各半兩

右一十二味麤搗篩每服一錢匕水半盞煎三分去

滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡腫痛益母草飲方

生益母草不拘多少洗剉

右一味搗取汁每取三二分服之更量大小加減以

滓傅癰上乾則易

治小兒一切癰腫毒諸風熱神驗黃蘗散方

黃蘗去麤皮蜜炙

鬱金各壹兩

陳橘皮湯浸去白炒

人參

葛根剉各半兩

石五味搗羅為散用溫水調下半錢匕量兒大小加

減日三兩服

治小兒癰瘡腫痛方

又右取豬腦塗紙上貼之乾即易日數徧

又方

又右用芥子爛研水和塗紙上貼之

又方

又右用馬齒莧搗傅之

又方

右以地龍糞新汲水調塗之

又方

右用薑石末和蒜搗封上

又方

右用馬鞭草搗傅之即消

又方

右以芸薹菜搗塗之

治小兒癰有膿令潰方

右取雞羽毛七枝燒末服之即潰

又方

右用人乳和麩封上至晚膿血出盡

小兒疔瘡

論曰小兒因五藏不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫結皮強上如牛領然疼焮堅靱深附筋骨既得膿後其疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣

治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

連翹

白欬剉

芒消

甘草剉

升麻

小麻黃

去根節湯煮掠去沫

枳實

麩炒黃各壹分

大黃

剉炒壹兩

右一十味麩搗篩每二錢匕水一盞煎至五分去滓

分溫二服量大小加減

治小兒熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉

白丹走徧身中胗癢五香連翹湯方

木香

薰陸香

沉香剉

雞舌香

黃芩去黑心

麻黃

去根節湯煮掠去沫

麝香研各壹分

連翹

海藻

洗去鹹焙

射干

升麻

枳實

去麩麩炒各半兩

大黃

剉炒貳兩

右一十三味麩搗篩每二錢匕水七分煎至四分去

滓入竹瀝一合更煎一兩沸分溫二服量大小加減

治小兒癰疽瘡癤腫毒黃耆湯方

黃耆剉

連翹

升麻

惡實炒各半兩

玄參

丹參

露蜂房炙

枳殼去麩炒

甘草

炙各壹分

右九味麩搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓

食後臨臥溫服量大小加減

治小兒疽瘡藍葉湯方

吳藍葉

犀角鎊

升麻

黃耆剉

山梔子人

連翹

甘草炙各半兩

黃芩去黑心

大青

玄參各壹分

大黃剉炒參分

右一十一味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分

去滓食後臨臥溫服量兒大小加減

治小兒疽瘡木通湯方

木通剉

升麻

赤芍藥

黃芩去黑心

山梔子人

麥門冬去心焙各貳分

犀角鎊

大黃剉炒各壹兩

枳殼去瓢炒半兩

右九味麤搗篩每二錢匕水一盞入生地黄汁半合

同煎至七分去滓分溫二服食後臨臥服量大小加

減

治小兒瘡腫癰疽黃耆湯方

黃耆剉

葛根剉

麥門冬去心焙

黃芩去黑心

犀角鎊

升麻

甘草炙各壹兩

木香半兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓

食後服量大小加減

治小兒癰疽犀角知母湯方

犀角鎊

知母焙

黃耆剉

黃芩去黑心

人參

丹參

葛根剉

大黃炒

甘草炙各壹兩

玄參分

麥門冬去心焙

青兩半

右一十一味麤搗篩每服一錢匕水半盞入生地黃

汁半合同煎至四分去滓食後臨臥溫服量大小加

減減

治小兒癰疽瘡毒未破或膿未潰憎寒壯熱五香丸方

木香壹分

沉香剉

蘇合香研各參合

麝香研半

犀角鎊貳兩

大黃生剉壹兩半

雞舌香研

吳藍葉

梔子人

熟乾地黄貳兩

白芍藥壹兩

人參壹兩去蘆頭

白茯苓壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

五二十九煎黃耆湯下食前服

又方小兒癰疽瘡毒未破或膿未潰憎寒壯熱五香丸方

乾蝦蟆壹箇

右一味燒灰細研以豬脂和傅之

又方

又敗鼓皮不以多燒灰

右一味細研以豬脂和傅之

小兒瘰癧結核

論曰小兒身生熱瘡久不差者必生瘰癧其狀作結核在皮肉間三兩箇相連瘰也是風邪搏於血氣焮結所生也

治小兒瘰癧焮腫疼痛身體壯熱大腸壅滯小便赤澀心神煩躁少得眠臥犀角散方

犀角鎊屑壹兩

惡實壹兩

連翹貳兩

麝香研壹兩

木通剉炒壹兩

玄參貳兩

沉香剉壹兩

兩半

丁香壹兩

兩半

朴消壹兩

右九味麤搗篩每三錢匕以水一盞煎至六分去滓

分溫三服早晨日午晚後各一以利為度更量兒大

小以意加減

治小兒頸生瘰癧榆白皮傅方

右以榆白皮爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘰癧鉛丹塗方

鉛丹兩

右以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡汁出拭却

更貼半月差內消不作瘡極効

治小兒瘰癧連綴如梅李核狀硃砂丸方

硃砂 硃黃 各壹分

右二味研如粉用糯米飯為劑熬如小麥粒大有患

者即烙破內一九五日一換後用生肌膏

治小兒瘰癧生肌膏方

鉛丹 杏人 湯浸去皮尖 雙入炒壹兩

蛇蛻皮 蠟 頭髮 大壹團

菜子油 皂莢 去黑皮并子參寸

右七味先搗杏人蛇皮皂莢如粉與諸藥於銚子中

煎以柳篋子不住手攪成膏但有瘡塗貼日換無不

差者

治小兒瘰癧結核久不差追毒斑猫膏方

斑猫 巴豆 去皮

松脂 參分

右三味先研二味為粉次入松脂鎔化攪令勻更搗

一二百杵作餅熱貼在瘰癧上藥力盡別換以差為

度

治小兒腦熱結瘰癧連兩耳下腫痛身體寒熱坐臥不

安食飲不下玄參膏方

玄參

黃藥子

大黃剉炒

木香

卷柏

芒消

紫檀香各壹兩

右八味搗羅為細末以雞子白調和稀稠得所塗於

瘡上瘡腫破時則去芒消塗之

治小兒瘰癧結核寒熱防風丸方

防風去蘆頭

連翹

桑根白皮炙

牡丹皮

白頭翁

黃藥去麤皮

豉炒

獨活去蘆頭

秦艽去黃土

海藻洗去鹹

右二十味搗羅為細末鍊蜜丸如麻子大每服三九米飲下早晨日晚各一服更量兒大小加減

治小兒瘰癧麝香散方

麝香研壹分

鴿糞炒參兩

右二味再同研如粉每服半錢匕酒調下日二服早

晨晚後各一更量兒大小加減

治小兒熱毒風腫瘰癧內消赤小豆散方

赤小豆炒

豬牙皂莢炙去黑皮并子

黃藥子

消石

大黃炒

木鼈子去殼各壹兩

右六味搗為散每用量瘡大小以不語津唾調塗乾即易以差為度

小兒惡瘡

論曰小兒氣血純陽肌肉柔脆風毒邪熱易以致傷若榮氣不從逆於肉理結成悍毒疼痛腫焮非常故名惡瘡其候或痒或痛或赤根隱肉鞭不作膿或穿穴作膿久不得差治法隨內外證藥之則瘡可愈

治小兒惡瘡鉛丹膏方

鉛丹兩拾

風化石灰

豬脂各壹斤

右三味將二味同研細以豬脂按作餅火燒通赤如

此五度藥成搗羅為末濕瘡乾貼如乾瘡即作膏用

豬脂調紙上貼

治小兒惡瘡大黃湯洗方

大黃生

黃連去須

黃芩去黑心

澤蘭

白礬枯

石南各壹兩

戎鹽壹分

蛇牀子炒參合

右八味麤擣篩每以二兩用水三升煮取二升去滓適寒溫以綿絮內湯中蘸洗之日三

治小兒惡瘡茵芋湯浴方

茵芋壹兩

甘草剉

苦參各參兩

細辛去葉

黃連去須各

蕤人去皮

右六味麤搗篩每以三兩用水五升浸汁煮取三升

去滓浴兒逐日用

治小兒惡瘡遍身如麻豆狀包裹膿汁乍痛乍痒甘草

散方

甘草剉生用

芍藥

黃芩去黑心

白欬剉

黃連去須

黃蘗去麤皮剉

右六味搗羅為細散用白蜜和塗於瘡上日再亦可

作湯浴之

治小兒惡瘡人所不能識者胡粉散方

胡粉炒令黃

黃連去須

黃蘗去麤皮剉

右三味搗羅三味為散與胡粉相和一處研勻傳瘡

上日再立驗

又方

豆豉炒合

右一味搗羅為末傳瘡上

又方

蝦蟇壹枚燒灰

右一味搗羅為細散入麝香一分一處同研勻乾傳

瘡上

又方

柳枝葉握

右一味用水五升煮至三升去滓入鹽少許淋洗瘡

上

治小兒頭上惡瘡黃粉膏方

胡粉

黃連末

各壹兩

水銀參

糯米

貳拾貳粒研

赤小豆

拾肆粒和黃連搗

右五味先將水銀於手掌中唾研化後即以麻油調

藥入水銀和勻塗瘡上

小兒凍爛瘡

論曰小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂久而生瘡或痒或痛其狀焮腫破出膿汁多在兩耳或手足間故謂之凍爛瘡

治小兒凍瘡蜀椒湯方

蜀椒

去目并閉口炒出汁

鹽

各貳兩

右二味以清酒五升煎至二升數數蘸之其藥可五

六日用

治小兒凍足爛瘡附子散方

附子

生剉貳枚

乾薑

炮貳兩

右二味搗羅心散入綿中裝鞵如有瘡膿即調臘月

豬脂塗之

治小兒凍耳成瘡或痒或痛黃蘗散塗方

黃蘗去麤皮炙剉 白歛各半兩

右二味搗羅爲散先用湯洗瘡後以生麻油調塗之

治小兒凍脚或痒或痛小麥湯方

小麥半升 穰草參握剉

右二味用醋一升水二升同煮至三升去滓放溫洗

足

治小兒凍手皴拆痛白歛散方

白歛貳分 白及兩半 生麻油貳合生搗爛

右三味將白歛白及同搗羅爲散與油同研勻更人

吹萊菔一枚爛研以酒調如糊先以童子小便洗手

後塗手上

治小兒凍耳并手面皴痛豬脰膏方

豬脰具壹

右一味研如膏入漿水少許候稀稠得所先用童子

小便洗手面後以匙抄少許勻塗手面上

治小兒凍瘡手足指欲墮及耳欲落柏葉膏方

柏葉炙乾爲末參兩 杏仁貳拾枚湯浸去皮尖別搗如膏

麻油參兩 頭髮青團如雞子大 鹽研壹分

乳香研半 蠟兩半

右七味先煎油蠟沸即下諸藥以髮消為度攪勻貯
瓷器中每用先以小便洗瘡綿纏手指裹乾厚塗膏
即以軟帛裹之如脚指相淹處尤須多用膏裹帛紗
厚以綿裹勿令寒氣得入每兩日一洗瘡換藥稍愈
後三四日一換

小兒疥

論曰小兒瘡疥率因於蟻蟲變化而生小兒多此疾仍
喜生於手足指縫間浸淫徧體近煖及衣服過厚則痒
悶不任搔之黃汁出疼痛不止蓋由風熱客於脾肺散

於肌肉熏發皮膚使然也

治小兒風熱肺疖皮膚生疥鼻內瘡痒苦參丸方

苦參末肆兩以酒參 胡黃連貳分

黃連壹兩 棟實去皮 蕪荑炒

蟻去皮 木香各貳

右七味擣羅六味為末入苦參膏內和擣千杵如鞭
入蜜少許和丸如麻子大一二歲兒每服五丸食後
溫水下更量兒大小加減

治小兒瘡疥三黃散塗方

黃連去須 黃蘗去麤皮炙 臭黃研

赤小豆各貳 水銀半兩

右五味將黃連黃蘗赤小豆三味搗羅為散與水銀臭黃同研勻細旋取油調塗瘡上

治小兒瘡疥體熱黃連散塗方

黃連去須 黃蘗去麤皮炙 秫米炒各壹兩

赤小豆 膩粉研各壹分

右五味搗研為散油調塗舊帛上先洗去瘡痂封之

又方

黃連去須為末 糯米粉各貳兩 水銀壹兩

吳茱萸湯浸炒為末 赤小豆為末各壹分

右六味先以水銀和津於手中研如泥次以豬脂四兩入瓷器內慢火化去滓下五味藥末攪勻成膏先洗瘡拭乾塗之

治小兒瘡疥蛇牀子散方

蛇牀子 吳茱萸湯浸焙炒 硫黃研

蕪荑人研各壹分 膩粉少許

右五味搗研為散用油一合入葱一莖同煎候葱黃色停冷調藥塗之

治小兒頭面瘡疥癬大麻子塗方

大麻子研

右一味搗末水和絞汁塗瘡上

小兒癬

論曰小兒體有風熱脾肺不利或濕邪搏於皮膚壅滯血氣皮膚頑厚則變諸癬或斜或圓漸漸長大得寒則稍減暖則痒悶搔之即黃汁出又或在面上皮如甲錯乾燥謂之爛癬此由飲乳乳汁漬著乃生復以乳汁洗之即差

治小兒癩癬風痒雌黃膏方

雌黃研

黃連去須

莽草

蛇牀子炒

黃蘗去麤皮炙

苦參

蕪荑炒各半兩

藜蘆

消石研各壹分

松脂貳兩半

杏人湯浸去皮尖雙人別研如膏壹兩

右一十一味除雌黃松脂杏人外搗羅為末取臘月

豬脂半斤和松脂入鑊中煎令沸下杏人次下諸藥

末攪勻凝為膏每用先以醋泔洗拭乾塗之日三

治小兒癬疥赤腫及濕癬久不差黃連膏方

黃連去須

黃蘗去麤皮炙

蛇牀子炒

藺茹

礬石火煨別研

水銀手掌內唾研如泥入膏中

各壹兩

右六味搗羅前四味為末以臘月豬脂四兩同入銚

子內煎四五沸下礬石末又煎三兩沸取下良久下水銀攪如稀泥候冷先以清泔皂莢湯洗拭乾以火炙痒塗之日三

治小兒一切瘡癬痒痛不止桑螵蛸散方

桑螵蛸拾枚燒存

膩粉壹錢

麝香半錢

右三味研為細散生油脚調雞翎掃候乾有裂處再

掃

治小兒濕癬附子散方

附子生去皮

雄黃研

白礬燒灰

吳茱萸湯浸炒

米粉兩半

右五味搗研羅為散每日三次用綿搵撲之

治小兒諸癬及搔痒蛇牀子散方

蛇牀子炒貳兩

右一味搗羅為散以豬白膏和傅之

又方

羊蹄根搗取汁

右一味以蜜和勻先刮瘡四邊以藥塗之半日許拭去更以陳米醋和羊蹄根滓傅癬上

又方

槐白皮伍兩

右一味以水一升煎三五沸候冷數洗之

治小兒乾濕癬雄黃散方

雄黃

麝香各壹分

右二味細研為散甲煎油調塗之乾再上

治小兒濕癬枸杞根散方

枸杞根壹兩

右一味搗羅為散和臘月豬脂傅之

又方

桃枝青皮貳兩

右一味搗羅為散醋和傅之

小兒風瘙癩疹

論曰小兒風瘙癩疹者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌肉溢於皮膚變生癩疹狀如痞瘤乍差乍發痒瘙不時搔之血出其痒不已故名風瘙癩疹赤疹者熱白疹者寒治法不可不察

治小兒肺風瘙痒癩疹疥癬五參散方

人參

紫參

白附子炮裂各貳分

栝樓根剉

天麻各半兩

玄參剉

沙麻剉各壹兩

丹參參分

右八味同搗為散五十日至百日兒每服一字二百
日至一歲兒每服一字半爛汁調下二歲至三歲每
服半錢匕煎薄荷金銀湯或棗湯調下空心午後各
一服如乳母服每服一錢匕溫酒調下

治小兒風疹壯熱心躁黃耆湯方

黃耆剉 白鮮皮剉 防風去叉各

枳殼去瓤麩炒壹升 黃芩去黑心 甘草炙各壹分

右六味麤搗篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓
溫服食後臨臥各一

治小兒癩疹風痒防風湯方

防風去叉 白茯苓去黑皮 升麻

貝母去心 蒺藜子炒去角 大黃剉

甘草炙到各壹分

右七味麤搗篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓
溫服食後日二

治小兒風疹皮膚腫枳實湯方

枳實去瓤炒黃兩片 芍藥壹分

右二味麤搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓入
清酒半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後

各一更量大小加減

治小兒風疹石南湯方

石南葉

壹斤

蜀椒

去目及閉口者炒出汗半兩

右二味以水二盞煎取一盞半去滓下消石白礬各半兩攪令消以綿搵塗於疹處乾即易

治小兒癩疹莽草湯方

莽草

壹斤

防風

去

附子

炮裂去皮臍

牡蠣

煨過各壹兩

右四味麤搗篩以水一斗煮取七升去滓通寒溫浴

避風

治小兒風疹出不止塗傅方

白礬

熬令汁枯

右一味研為末酒調用雞翎掃塗疹上

又方

景天

壹兩壹分慎火草是也

藍參

右二味同搗研絞取汁以熱手摩塗之日再

治小兒風疹壯熱心躁犀角湯方

犀角

鎊

升麻

麥門冬

去心焙

蒺藜子

炒去

甘草

炙各壹分

右五味咬咀如麻豆大每服二錢匕水一盞煎至五分去滓食後溫服更量歲數加減

小兒癩疔

論曰小兒陰核氣結腫大者癩疔也由稟受之初肝經虛弱因啼怒軀氣氣脉下墜擊於陰器則筋脉緩縱結聚不散是為癩疔也若氣偏虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之經環陰器抵少腹是動則為癩疔少腹痛之疾

治小兒氣癩土瓜根湯方

土瓜根

當歸切

芍藥各半

又右三味麤搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓分溫二服空心日晚再服量兒大小加減

治小兒癩疔薏苡人散方

薏苡人

芍藥

土瓜根

蛇床子微炒

黃芩去黑心

桔梗炒

蛇含各分

右七味搗羅為散一二歲兒每服半錢匕空心溫酒調下日午晚後再服量大小加減

治小兒陰癩狐陰丸方

狐陰壹具炙黃

蜚生蟲拾肆枚微炙

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

蒺藜子炒去角

細辛去苗各參分

桃人湯浸去皮尖雙人炒別研

卷柏各壹兩半

右九味搗研為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒米飲下五九空心日晚各一服量大小加減

治小兒陰癩氣疝發作有時芍藥丸方

芍藥 大黃剉炒各半兩 赤茯苓去黑皮

半夏湯洗去滑焙 桂去麤皮 蜀椒去目及閉口炒出汗各參分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大三四歲兒食前米飲下五九日三服量兒大小加減

治小兒陰疝偏腫牡丹丸方

牡丹皮 豉炒 防風去叉

黃蘗去麤皮微炙 滑石別研 桂去麤皮各壹分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五九米飲下早晨日晚各一服量兒大小加減

治小兒陰癩韭子丸方

韭子炒參兩半 附子炮裂去皮臍參分 狐陰壹具炙黃

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五九米飲下早晨夜臥各一服量兒大小加減

治小兒陰癩腫硬桂心散方

桂心兩半 地膚子兩壹 白朮兩壹

右三味搗羅為細末三歲兒每服以溫酒調下半錢

七日三服量兒大小以意加減

治小兒癩疔攻注連腎外囊腫脹或疼痛偏墜昆布丸

方

昆布參分洗去鹹味

懷香子半兩微炒

木香

甘草炙微赤剉

黃藥剉

丁香

爛牡蠣生用

銅青以上各壹分

右八味搗羅為末用熟棗肉為丸如麻子大每一二

歲兒煎甘草湯下三丸量兒大小以意加減

治小兒癩疔腫痛方

枳殼參兩微炒

右一味搗為散每用柏枝煎濃汁調厚塗兒囊腫處
妙

治小兒陰癩不消白蒺藜散方

白蒺藜半兩微炒去刺

香鼓半兩微炒

鼠婦

麝微炙

川大黃剉微炒

桂心

細辛以上各壹分

右七味搗羅為細散一二歲兒每服以溫酒調下半

錢匕早晨晚後各一服量兒大小以意加減

治小兒陰癩日夜疼痛桃人丸方

桃人參分湯浸去皮尖雙人微炒

川大黃半兩剉微炒

赤芍藥兩半

防葵兩半

半夏壹分浸洗

桂心壹兩

川椒壹分去目閉口者微炒去汗

赤茯苓兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每三歲兒食前以溫酒下五丸看兒大小虛實以意加減

又方

蝟皮壹箇燒存性

右一味研細臨臥熱酒調下一錢匕

治小兒癩疔及少陰受邪冷氣滯正氣散方

京三稜

壹枚緊小者猛火炮令中心存參分性紙裹壹重淨土埋壹宿

右一味搗羅為散每服一字匕煨葱米飲調下不拘時候

治小兒癩疔蓖麻丸方

蓖麻人

參拾枚

棘剛子

去皮貳拾枚

石燕子

燒壹枚

滑石

末貳錢匕

麝香

研半錢匕

右五味搗研勻稀麪糊和丸如菉豆大每服十五丸空心煎燈心湯下一服即消

木通

剉

膽礬

研各壹分

右二味搗研為散每服半錢匕米飲調下

治小兒癩疔腫鞭疼痛滑石丸方

滑石碎

澤蘭各貳錢

粉霜壹錢

治小兒癩疔去皮半兩

續隨子去皮半兩

白麩糊和丸如菽豆大五歲以下

每服五丸五歲以上七九日菹酒下空心臨臥服

治小兒陰癩偏大白頭翁根傳方

右取生白頭翁根搗隨偏腫處傳一宿當作瘡二十

日愈

治小兒陰癩莧菜根傳方

右取莧菜根搗碎傳之立差馬鞭草傳亦佳

治小兒陰核氣結腫大或偏腫疼痛漆燕散方

漆燕壹枚入瓦瓶子內用鹽泥固濟陰乾炭火燒令通赤為度放冷取出研令細

續隨子去皮壹分

右二味搗研為細散每服半錢匕米飲調下

治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脉下墜陰器腫大久成

癩疔三應散方

穠香蟲壹枚研汁

膩粉貳錢七

胡黃連末壹分

右三味同研令乾每服一字匕陳米飲調下不拘時

穠香蟲壹枚研汁

膩粉貳錢七

胡黃連末壹分

右三味同研令乾每服一字匕陳米飲調下不拘時

穠香蟲壹枚研汁

膩粉貳錢七

胡黃連末壹分

