

○腹中水鳴

丹溪曰腹中水鳴乃火擊動其水也蓋水欲下火欲上相觸而然用二陳湯加苓連梔子亦有臍寒而水聲汨汨者宜分三陰部分而治中脘太陰當臍少陰小腹厥陰各從其宜溫之

又有腸胃空虛而鳴者宜參朮之類補之

腹中水鳴而痛亦有因于火因于鬱者
生生子曰觀丹溪治腹痛無定方蓋欲使人認病自擇且方者隅也隅于一則不能圓活而貫通

是以後人有守死方之謂

凡臍下痛而人中黑者多死

○感暑而痛或泄痢併作其脉必虛宜干味香薷飲或六和湯

感濕而痛大便溏泄小便不利其脉必濡宜胃苓湯

食積痛常欲大便去後而痛減者是也宜溫宜消
久者遇仙丹神芎丸等擇而下之
氣滯而痛其脉必沉宜木香順氣散

苑血痛、有常處宜桃仁承氣湯

痛而欲得熱手按及熱物熨者是寒宜香砂理中湯或五積散

痛而熱手熱物熨不止者是熱宜黃連解毒之類實則以硝黃下之

絞腸沙痛極是急速先與鹽湯探吐或委中并十指出血藿香正氣散正氣天香散

酒積痛 酒傷則發宜泄其積痛自止也 多年敗白螺殼煨存性加三倍于木香檳榔丸

中更加山茵陳等分衆藥中其効甚速

禦痛湯 治火痛

黃連煨汁 山梔仁 炒 鉸 橘紅 茯苓 鉸半

草薹仁 七分 半夏錢一 甘草四分 姜三片 食前服

星半安中湯 痰積作痛

南星 半夏 鉸半 滑石 香附 枳殼 青皮

木香 山梔仁 炒 蒼朮 砂仁 茯苓 橘紅

鉸一 甘草四分 生姜四片 煎服

氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索鉸一

痰甚者加白螺壳烧灰一錢隨服調下
木香順氣散 氣滯腹痛

木香 香附 檳榔 青皮 陳皮 厚朴
蒼朮 枳壳 炒砂仁 錢甘草五分 姜三片煎服
香砂理中湯 即理中湯加藿香砂仁

○小腹痛

傷寒家蓄血在下焦宜抵當桃仁承氣之類若因
氣鬱而痛以青皮主之寒者以桂枝吳茱萸溫
之若因疝奔豚癥聚者又當循各門施治

苦練丸 治奔豚小腹痛寒也

苦練 茴香 大附子 三味酒煮焙乾末之

每兩入玄胡末半兩全蝎炒丁香各十八箇
為末酒糊丸梧子大每食前溫酒下五十九

酒煮當歸丸 治小腹痛及疝

當歸兩 茴香兩半 附子錢七 良姜錢七 四味酒煮乾

再焙加後藥 鹽炒 丁香略半 全蝎錢二

柴胡 升麻 木香 略一 苦練 伍 甘草 條五 玄

胡索 錢四 為末酒煮糊丸梧子大 每上三十九 空 心 白湯下

小腸癰作痛者其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀
腹常痛或逸臍生瘡急宜下之或以雲母膏太
乙膏為丸服之自愈

○脇痛門

有風寒

脉浮弦而數者是也

有食積

脉沉弦而伏者是也

有痰飲

或滑或沉

或結

有死血

有虛

脉弦大而無力

有氣鬱

脉沉而細

有火

脉洪滑而數

當分條類析明別左右施治


經曰左右者陰陽之道路氣之所終始也又曰肝

木氣實則脇痛肝氣實則怒夫謂實者指邪氣

而言經曰邪氣盛則實是也

脇痛屬肝木及胆火木氣實者以柴胡川芎青皮

蒼朮疎之肝火盛者以當歸龍會丸瀉之死血



積者以桃仁紅花香附川芎破之痰飲流注者以南星半夏蒼朮川芎豁之鬱宜開鬱寒宜散寒以大法也

兩脇走痛是痰實者可用控涎丹方見痰飲門

左脇痛為肝經受邪宜枳芎散或柴胡疎肝散

右脇痛為肝經移病于肺宜推氣散

食積痛凡痛有一條扛起者是也當于積塊門

氣弱人脇痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得者八物湯加木香青皮

肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡黃芩退熱木香青皮調氣

瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜桃仁紅花柴胡青皮大黃滑石

去滯氣必用青皮乃肝胆二經之藥若二經血不足者先當補血少加青皮可也

脇痛發寒熱似覺有積塊必從飲食大飽勞力所致必用龍會丸

痰飲停伏脇痛宜導痰湯

脇下痛而大便秘結者木香檳榔丸或龍會丸

亦有虛寒而作痛者一人脇痛連膈服氣藥不效後用辛熱補劑下黑鉛丹而愈

解痛外以琥珀膏貼之或以白芥子水研敷之或吳茱萸醋研敷之韭菜炒熨亦佳

當歸龍會丸 肝木實火兩脇痛之要藥

當歸 龍胆草 酒 山梔 黃連 黃芩 各半

蘆會 大黃 酒 各 木香 半 錢 黃栢 兩 青皮 兩

柴胡 錢五 射香 許少 右末 神麴糊 丸 梧 子大 每 姜湯 下 三 五 十 九

枳芎散 左脇痛

枳實 炒 芎 各 五 錢 半 甘草 錢 一

為末 每服二三錢 姜棗湯或酒調下

推氣散 右脇痛

片姜黃 枳殼 炒 桂心 各 五 錢 甘草 錢 三

為末 每服二錢 姜湯調下

鷄鳴散 跌蹶損傷瘀血停積脇內日久作痛

復元活血湯 從高墜下 惡血流于脇下 疼痛不

可忍 二方見跌蹶門

柴胡瀉肝湯 鬱怒傷肝左脇痛

柴胡二錢 甘草五分 青皮 芍藥各一錢 黃連炒

山梔炒 龍膽草各八分 川歸二錢 水煎服

死血作痛瘦人多怒者常患此

桃仁個紅花 川芎 柴胡 青皮各錢 芍藥

香附 歸尾半錢 水煎服

治脇下氣痛神方

小茴香炒一兩 枳殼炒五錢 為末每二錢鹽湯調下

○心痛門

真心痛者手足青至節旦發夕死夕發旦死寒邪

傷其君主也今之治例皆非真心痛也以其在

心之部位而名或心之脈絡或手心主之脈絡

或胃脘或胸膈或食傷或寒傷或氣逆或痰飲

或死血或虫或鬱火皆致痛也

鍼經曰足太陰之脈其支者復從胃別上膈注心

中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫

心下急痛 胃病者腹膜脹胃脘當心而痛上

支兩脇咽高不通。脉經曰：憂愁思慮則傷心，傷心則苦驚喜忘善，怒心傷者，其人勞倦即頭面赤而下重，心中痛徹背，其脉弦，此心臟傷所致也。諸虫痛者，如心腹痛懊懣，發作腫聚，往來上下行痛，有林作心腹中熱，善渴，涎出面色乍青乍白，赤嘔吐清水者，蛇也。

病機要曰：有大實而心中痛者，因氣而食卒然發痛，大便或秘，久而心胸高起，按之至痛，不能飲食，急以煮黃丸利之，利後以藜蘆湯去其邪。

也。有寒厥心痛者，手足逆而通身冷，汗出便溺清利，或太便利而不渴，氣微力弱，急以木附湯溫之。寒厥暴痛，非久病也。朝發暮死，急當救之。是知久病無寒，暴病非熱也。

陳無擇云：若諸經心痛，心與背相引，心痛徹背，背皆痛徹心。若諸府心痛，難以俛仰，小腹上冲，卒不知入，嘔吐泄瀉，此皆外感內淫，則其氣閉塞鬱于中焦，氣鬱爭發為疼痛。又曰：九種心痛曰：飲曰食，曰風，曰冷，曰熱，曰悸，曰虫，曰疰，曰去來痛。

者除風熱冷屬外所因餘皆不外更婦人惡
血入心脾經發作疼痛尤甚于諸痛更有卒中
客忤鬼擊尸症使入心痛亦屬不外因在人
以意推充施治

丹溪云凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣
口食寒物而病于初得之時當用溫散或溫利
之藥若其病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱
久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫
利寧無助火添病即由是古方多以山梔為君

加熱藥為嚮導則邪易伏病易退然向安之後
若縱恣口味病必復作凡治此病必要先問平
日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以
致死血留于胃口作痛者用桃仁承氣湯下之

○治寒之劑

金匱赤石脂丸 心痛徹背、痛徹心此寒厥痛
烏頭三錢 附子炮 錢 蜀椒 乾姜 赤石脂各
右末蜜丸梧子大食後白湯下一丸日三服
木附湯 寒厥暴痛脉微氣弱

甘草炙一 白朮兩 附子一兩 每三錢姜棗煎
立應散 寒痛氣痛腹痛皆効

良姜 香附各炒 為末白湯調下二錢

二姜丸 養脾溫胃去冷消痰治心脾痛寬胸下

氣進飲食一切冷物所傷並皆治之

乾姜炮 良姜 等分為末麵糊丸梧子大每服

十五丸至二十九丸食後陳皮湯下妊婦人

不宜服此皆溫中之藥也

○散寒之劑

麻黃桂枝湯 外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘

急不得轉側 麻黃 桂心 芍藥 細辛

乾姜 甘草錢各七 半夏 香附錢各五 每服五

錢姜片五水煎食前服大便秘入大黃量虛實減

○一人心痛諸藥不効服此而愈

檳榔 桂心 葛根 甘草半 細辛 半夏

桔梗 枳殼 川芎 防風 等分水煎服

草豆蔻丸 客寒犯胃

草豆蔻半 煨吳茱萸炮 益智仁 姜蚕炒 當歸

身 青皮各六分 神曲 姜黃各四分 甘草三分 桃仁個

半夏一錢 澤瀉一錢 利小 便 麥芽錢半 炙甘草分六

柴胡四分 詳之 脇痛 入參 黃芪 陳皮

右除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯

浸蒸餅為丸梧子大每二十九熱湯下臍遠

治心痛

荔枝核燒存性為末醋湯下二錢

○內傷飲食之劑

煮黃丸 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痲痺

椎黃一兩 巴豆五錢 研去皮 入白麵二兩 同研勻

滴水丸梧子大滾水煮十二丸 瀝入冷水內

令沉冷每用時用浸藥冷水下二丸 一日十

二時盡十二丸 以利為度不必盡劑

藁本湯 治木實心痛大便已利宜以此徹其痛

藁本兩 蒼木兩 水煎溫服

飲食在膈上未入胃者宜吐之經曰在上者因而

○氣痛之劑

越之如瓜蒂散之類

正氣天香散但忍氣則發

七氣湯

蕪子降氣湯門氣

○治痰飲痛劑

丹溪方 痰飲停積胃脘作痛

螺螄殼墻上年煨 滑石炒 蒼朮 山梔 香附

南星略 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁各錢

右末 生姜汁浸 餅為丸 菘豆大 每三四十

丸 姜湯下 春加川芎 夏加黃連 冬加吳茱萸兩

又方 治痰心痛

半夏油炒為末 每服二錢 姜湯下 痛甚者太

陷胸湯或為丸亦同

○治死血痛劑

丹溪方 治死血胃脘痛者

玄胡索半 兩桂 滑石 紅花 紅麴各五

桃仁個 十 右末湯浸 餅糊為丸

桃仁承氣湯 方見傷寒門

斗門方 血氣攻心痛不可忍

藜根剉酒浸服之瘥

○治火鬱之劑

丹溪方

治火痛

黃連

山梔炒 二錢

陳皮

茯苓 錢半 半夏 錢一

草豆蔻分七 甘草分四

姜三片 水煎 食前服

又方 治火痛

山梔

仁姜汁 炒

水煎 磨木香分三 或加川芎錢

雜方

牡蠣煨

為末 每二錢 酒調下

失笑散

有人心痛百藥不効 用此而愈

五靈脂

蒲黃

等分為極細末 以醋調二錢

熬成膏 入水 下盞 食前溫服 有瘀血作痛 加

玄胡沒藥 螺螄殼 陳年日久之者 治心痛 洗淨 為末 熱酒調下 一錢半

乾漆丸

九種心痛 腹脇積聚 滯氣

乾漆二兩 搗碎 炒去烟 細研 醋煮 麵糊丸 梧子

大每服十五丸 至十七丸 熱酒下 醋湯亦好

不拘時 日進二服

蚕沙散

男婦心氣痛 不可忍

晚蚕沙 不拘 為末 用滾水泡過 瀝淨 取清水服

慰法

治心腹俱痛 以包川椒 薄注腹上 火慰冷

椒汗出良

梅硫丸

酸熱以收散寒凡服辛劑及其甚者改服

水梅去核生硫黃

為末相和搗勻以可丸為

一度作一丸白湯下立愈病不再作

濟世方 治心痛

稀菽草搗汁醋汁相和服立效昔有人服此吐

虫二條終身不發

綠礬止痛方

綠礬七八分好酒化下再不發

衍義方 治心痛

銅青下味淡醋湯些小服之

○治虫之劑可與虫部參治

化虫丸

霍虱

檳榔

胡粉炒

苦練根

去厚皮各五十兩

白礬飛二兩

兩

為末

麩糊丸

桐子大

小兒

疾病多

有諸虫或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而

動即腹中疼痛往來上下攻心痛則哭不

寐合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐

清水四肢羸困面青黃色飲食雖進不生肌

肉或寒或熱沉默不明知病處一歲五

九溫水下入香油一二點打勻下之其米飲亦得
生生子曰已上論寒熱痰氣虫痛火食等痛治法
皆已備矣但病久正氣虛損及稟賦素弱之人
或被峻利伐太過以致羸弱而痛不愈者皆虛
痛也當從補養氣血此根本之治不可全恃攻
克以致虛之禍予嘗治于病壞之後
黃芪建中湯隨症加減治虛弱及被克伐損傷
局方蘓合丸治疰忤鬼氣卒心痛甚妙
山梔并劫藥止之不效者玄明粉一服立止

○胸滿胸痛胸痺
肝虛則胸痛引背脇實則胸痛不能轉側喜太息
仲景曰肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胸
中痛不得轉側食則吐而出汗也肝著其人常
欲蹠其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯麥
素問曰陽明所謂胸痛少氣者水氣在臟腑也水
者陰氣也陰氣在內故胸痛少氣也
仲景治胸痺之病喘息咳唾胸背短氣寸口脈沉
而遲關上小緊數者宜以瓜蒌薤白白酒湯注

大瓜蒌

搗碎一個 薤白半斤 白酒半升

三味同煮取二升分溫再服

婦人患胸中痞急不得喘息按之則痛脉數且

瀋此胸痺也因與小陷胸湯二劑而愈

支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴兩一 大黃兩六 枳實兩一

水五升煮取二升分溫再服

斗門方 治胃腹壅滯去痰開胃

半夏泡淨焙乾為末生姜自然汁和為餅子用

濕紙包于慢火中煨令香熟水一盞用餅子

一塊如彈子大入鹽半錢煎取一盞溫服大

能去胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其

功效大矣

人年二十三歲膈有一點相引痛吸氣皮覺急

此有汚血也 滑石兩一 桃仁錢五 黃連錢五 枳殼兩一

甘草錢二 為末每服一錢半以蘿蔔自然汁

煎熟飲之一日五六服

人因服溫補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱

嗽血消瘦，膈間有一點氣，梗痛似有一條系垂，映在腰與小腹，皆痛大率偏在左邊，此肝部有惡血也。滑石、枳殼炒、略黃丹炒、三黃連、柴胡各五錢、紅花一錢、桃仁二兩、甘草生二錢，為細末，每服錢半，以蘿蔔汁煎沸服之。有寒邪于干胸中者，宜發散之，如紫蘇、前胡、杏仁、防風、桂枝、葛根之類。

茯苓杏仁甘草湯 治胸痺胃中氣塞短氣
茯苓二兩 杏仁五十箇 甘草一兩

水一斗，煮五升，溫服一升，一日三服。

橘枳姜湯 治同上

陳皮一斤 枳實二兩 生姜半斤 水五升，煮二升，分溫服。

千金方 治胸痺氣滿，壅心膈不利。

枳實二兩 麩炒 為末，清米飲下二錢。

仲景薏苡附子湯 治胸痺緩急。

苡仁兩五 大附子一個 為末，每服方寸匕，日三。

旋覆花湯 治胸中嘈雜，汪洋常覺冷涎泛上，兀兀欲吐飽悶。

兀欲吐飽悶



旋覆花 橘紅 半夏 茯苓 甘草
厚朴 芍藥 細辛 姜三片水煎服

○虫痛

虫本濕熱所生臟腑虛則侵蝕

瘡寸白虫錫灰蕪荑檳榔極佳宜和中下人每覺
心中多嘈雜意欲作飲又疑虫漫依此方翠日
下長虫二條一長二尺五寸頭匾濶尾尖銳每
寸作二節班如錦紋一條皆寸斷矣
千金方云勞則生熱則生虫心虫曰蛔脾虫曰

寸白腎虫如刀截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蚕
皆能殺人惟肺虫為急居肺葉內蝕入肺系故
成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之為難道歲中
載諸虫頭皆向下行惟自初一至初五日以前
頭上行故服藥多取月出以前蓋為此也

取寸白虫方

錫灰兩一木鱉子 蘆會文二十黃丹文十輕粉文十
為末猪膏油九桐子大先一日食素晚莫喫
飯次早五更溫水調下分三服

又方

畫粉

蜜佗僧

各等分為末每二錢用

麻油調服空心下頃刻成涎取下

虫蠱之生由飲食不節傷飢過飽喜啖腥膻多食生冷酷嗜麪糗愛食肥甘臟腑虛弱濕熱內淫則生虫積也

三虫者謂長虫赤虫蛻虫也乃有九種而蛻人多病之寸白虫從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之盡出乃佳蛻虫多小兒患之大人亦有令人口吐清汁心痛煩躁乍作乍止

其餘各種總不利于人胃中若有者宜化虫丸

速除之

腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡曰惑虫食其臟下唇有瘡曰狐虫食其肛得此疾者十無一生也

寸白虫上半月虫頭向上易治下半月向下難治先以肉汁或糖蜜引虫頭向上然後用藥

集効丸

木香 鶴虱 炒 檳榔 訶子 麵 炮 煨 蕪荑 炒

赤心朱

五卷

廿

附子

炮去

乾姜

各七錢半

大黃

半兩

烏梅

十四個

去核

右末煉蜜丸麻子大每三四十九

陳皮湯或淡醋湯下

秘方萬應丸

大人小兒腹內有虫及積氣塊痛

小兒疳病

三稜

莪朮

醋陳皮

燻橘紅

史君子肉

麥蘖麴

炒神麴

炒雷丸

乾漆

炒

盡各

檳榔

兩一

燕蕩

半二錢

鶴虱

炒

炙各

木香

良姜

陳壁

砂仁

錢各二

右末醋米糊

為丸

菘豆大

每三五十九

空心

淡姜湯下

靈礬散 治小兒虫咬心痛欲絕

靈礬散

治小兒虫咬心痛欲絕

五靈脂末

錢二

白礬

枯五錢

每服二錢水煎服不拘時虫出即愈

安虫散

凡虫不可盡去宜安之

檳榔

胡粉

炒川練子

去核

鶴虱

炒各

枯礬

錢二

半右末每服一錢米飲調下

川練丸

上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆

炒烟

盡雄黃

五分

巴豆霜

錢一

右末麵糊丸黍米大者小與服取東向石

榴根煎湯下痛者苦練根湯或蕪荑湯下

蕪荑散

治諸虫作痛臨發時服

白蕪荑

去翳乾漆

炒烟各等分 各等分為末每一錢米飲下

化虫丸

治小兒疳虫五心煩熱

蕪荑

黃連

神麴

炒

麥蘗

炒各等分

右末麵糊丸黍米大空心米飲下

制虫制勞悅肌膚去勞熱

檳榔

半兩

龍膽草

兩乾漆

錢五

為末煉蜜丸梧

桐子大每十九至十五丸滾水下

木香三稜散

腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑

半生半熟

大腹子

檳榔

雷丸

錫灰

炒醋

三稜

煨

蓬朮

煨

木香

大黃

略一

為極細末每三錢空心蜜水調下或砂糖水

下須先將燒肉一片口中嚼之休噉下吐出

口中肉汁後服藥

舟溪治蛔虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔夜勿

食次早五更以肥香脯方寸匕先喫令虫聞香

隨即飲汁一升必下蛔虫凡胸喉中覺有虫上

下偏喜聞葱鼓油食之香者兩三日不食開口

而卧將鼓煎葱油令香放口邊虫當自出引而去之但隨喜所用之亦可

吾有一人忽患一疾凡惡心則吐血數條後乃頗作累治不效每用殺虫藥則吐虫愈多招孫尚先生診之曰六脉皆細非虫也今雖吐虫乃臟寒而虫不安失居上膈因而吐虫復用殺虫藥虫為藥所苦不能自安所以虫吐愈多也硫黃附子各一两為末粳米糊丸每服三十九飲下之五服後再不吐虫而痛亦止

仲景曰凡腹中痛其脉當沉弦今反洪大故有蛔虫熱則生虫故脉洪大

○嘔吐噦門

坐生子曰機要云有聲有物謂之嘔無聲有物謂之吐空嘔濁惡而聲長謂之噦要知噦屬陽而吐屬陰也無形者肺有形者胃以胃兼氣血言也又云上焦吐者為氣中焦吐者為食積下焦吐者為寒內經云食不得入是有火也食入復出是無火也有飽後逢怒或傷力跌撲以致痰

血積于胃脘者有膽虛及風痰作吐者有胃虛而虫行求食者有中氣虛弱者有風寒外覬者有鬱火作痛而吐者有傷酒而嘔吐者有脚氣發而吐者惟細心體認治之無不愈矣

東垣云大便閉者通利之陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也正當用生地黄當歸桃仁紅花之類和血潤燥兼用甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣降嘔噦自不見矣復有胃中虛熱穀氣大虛

發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止五穀皆屬陰或食或飲白湯或喜凉水皆能止嘔噦不必用藥也治嘔吐生姜半夏橘皮必用之聖藥但只治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實以辛藥瀉之

東垣嘔吐噦分為三陽經云嘔吐噦者皆屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也

仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下

孫真人云嘔家多服生姜乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生姜為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以姜製半夏為主故朱奉謙治嘔吐噦以生姜半夏陳皮之類究其三者之源皆因其脾虛弱或因寒氣飲食所傷而致也宜丁香藿香半夏茯苓陳皮之

類若但只內傷宜察其虛實使內消之痰飲者下之當分何經對症用藥不可亂也

○嘔吐膈氣總論

潔古云吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從于氣者天之陽也其脉浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中

中焦吐者皆從于積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而弦其症或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從于地道也其脉大而遲其症朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法宜毒藥通其閉溫其寒氣大便漸通以中焦藥和之不令大便閉結而自安也
君索古論三焦吐蓋本黃帝所謂氣為上膈食飲入而還出為下膈食時乃反出之其上焦

食已暴出者今世謂之嘔吐也中下二焦朝食暮吐暮食朝吐者今世謂之膈氣反胃也今分嘔吐膈食為二門

仲景云諸嘔吐穀不得下小半夏湯主之

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

卒嘔吐心下痞腸閉有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之胃反嘔吐者大半夏湯主之服前小半夏湯諸湯不愈者此胃虛當以甘益之立愈

○治氣之劑

仲景陳皮湯 乾嘔手足厥者治宜辛散

橘紅兩四 生姜兩八 水七升煎三升溫服一升下即愈

木香 檳榔 等分為細末以後桔梗湯調下

潔古桔梗湯 上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮洪

宜先降氣和中

桔梗 白朮各一兩半 半夏二兩 橘紅 枳實炒

茯苓 厚朴各一兩 每服一兩水煎調木香散二

錢隔夜空腹服之三服後氣漸下吐漸去然

後去木香散加芍藥黃芪一兩半同煎服之

病愈則止如大腑燥結食不盡下以大承氣

湯去朴硝微下之少利為度再服前藥補之

如大便復結又依前微下之

檳榔橘紅散 治嘔吐

白檳榔枚 橘紅半錢 水煎服

○治寒之劑

加減二陳湯 痰火為患嘔噦頭眩心悸中脘不

快發寒熱或食生冷脾胃不和並治

丁香兩半夏 陳皮兩各五 茯苓兩二甘草半一兩

每服四五錢姜三片烏梅一枚水煎熱服

治痰痞加草豆蔻一兩半

藿香安胃散 脾胃虛弱不飲食嘔吐不時

藿香一錢半 丁香 人參各二錢 橘紅五錢

每服二錢姜三片水煎服

東垣丁香吳茱萸湯 治嘔吐噦胃寒所致

丁香 甘艸 茯苓 柴胡 半夏 乾姜各

分吳茱萸 草豆仁 蒼朮 黃芩 人參各

鐵升麻各半錢 當歸半錢

每服五錢姜三片水煎食前熱服忌生冷

藿香平胃散 治嘔吐不止

藿香 厚朴各一兩 半夏 甘草各一兩 蒼朮三兩

陳皮二兩 白朮每服五錢 姜三片棗三枚水煎溫服

羅太無紅豆丸 諸嘔吐逆膈氣反胃亦治寒濕

丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二粒

右末姜汁糊為丸每角子大每十丸以大棗

一枚去核填藥麵裹燒麵熟去麵細嚼白湯下食前進三服効

丁香附子散 膈氣吐食及下焦寒而奔豚上冲

黑附子炮去皮脂去丁香銛五檳榔一枚大硫黃砒胡椒

銛二右先將四味為末次入硫黃再研勻每服

二錢用綿蝠一箇去翅足腸肚填藥在內用

濕紙五七重裹定置慢火內燒熟取出細嚼

用溫酒送下一日三服米飲送下亦可

仲景吳茱萸湯 治嘔而胃滿者

吳茱萸湯泡一人參分生薑半一兩大棗三水煎

治火之劑

蘆根湯 熱而嘔吐不止及治惡阻

蘆根取中新白者半斤水二碗煎一碗熟服

竹茹湯 治胃熱而嘔

乾葛 半夏姜汁煮甘草二錢

每服五錢姜片竹茹半棗一枚水煎溫服

晉有人病傷寒得汗後數日忽嘔吐藥食俱不得

下醫皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐後以

此竹茹湯與之即愈

枇杷散

治嘔吐利膈氣止嘔啞又治卒嘔吐不

食單煮枇杷葉汁飲之此物味苦平下氣

枇杷

葉

人參

半夏

各一錢

茯苓

茅根

二兩

姜七片水煎磨檳榔末五分和勻服之

丹溪治膈上有熱胃中有痰二陳湯加炒梔子黃

連生姜主之嘔而發熱者小柴胡湯主之溫膽

湯治嘔吐不下飲食極妙

仲景青鎮丸

治寒熱往來脉弦嘔吐頭痛即小

柴胡湯加青黛以姜汁打糊為丸白湯下

劉河間治暴吐上焦氣熱所冲經曰諸嘔吐酸暴

注下迫皆属于火脉浮而洪者荆黃湯主之

荆芥

一人

參

五錢

甘草

二錢

大黃

二錢

右水煎調檳榔散二錢空心服

檳榔散

檳榔

二錢

木香

半錢

輕粉

少許

右為細末同煎藥下如欲作丸子用蒸餅

糊為丸小豆大每二十丸食後服

○治瘀血之劑

香靈丸 又名六丁丸 治嘔吐如神及產後嘔不止者

丁香 辰砂 錢六 五靈脂 兩一 右香脂先研末後

入砂再研勻用狗膽汁或猪膽汁為丸雞頭

子大每服丁丸生薑陳皮湯磨下

治痰血獨以五靈脂狗膽汁為丸雞頭子大每服

一丸生薑湯磨下及生薑酒送下極熱服

草靈丹 五靈脂 姜汁煮透 甘草 燒酒煮透

焙乾為末每服五分置掌中用舌舐下此方

治膈氣反胃嘔吐梅核氣及胃脘疼痛効

○治虛之劑

丹溪云久病嘔者胃虛不納穀也

生姜 人參 黃芪 白朮 香附 治之類

李澤治反胃嘔吐無常粥飯入口即吐困倦無力

垂死者以人參三兩作一服水煮帶熱頓服愈

理中湯 治脾胃虛寒嘔吐不食

調中湯 治脾胃虛弱嘔吐

治中湯 治霍亂吐瀉 即理中湯加橘紅青皮各一兩是也

六君子加砂仁治脾胃虛弱惡心欲吐及不思食

○治積氣之劑

遇仙丹 木香枳榔丸 枳實導滯丸 七聖丸
皆可選用

○治風痰之劑

金花丸 吐食而脉弦肝乘脾也由脾胃之虛宜
治風安胃 半夏湯泡一兩 檳榔錢二 椎黃一錢半
右末姜汁浸餗餅糊為丸桐子大小兒另丸
姜湯下從少至多漸次服之以吐止為度風
痰羈絆於脾故飲食不下也

○治水飲之劑

小半夏湯 治嘔吐穀不得下者
半夏一斤 生姜一斤半 水七升煮取一升半分溫再服
小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞腸閉有水
眩悸者即前方加茯苓四兩

大半夏湯 治胃反嘔吐服前小半夏湯諸藥不
愈者此胃虛宜以甘益之服此立愈

半夏二斤 人參二兩 白蜜一斤 右水一斗三升和蜜揚
之二百四十遍煮藥取三升從服一升餘分再服

猪苓湯 治嘔吐而病在膈上後思水解急與之
思水者此湯主之 猪苓 茯苓 白朮各等分
為末飲調方寸匕日三

○胃風

胃風之症治嘔愈嘔者是也用川烏一兩洗淨去
皮臍不去尖以漿水一碗煮乾每枚切作二片
復用漿水一碗煮盡更切作四片每細嚼一片
以少溫水下共少頃嘔遂止此皆好食甘甜之物
膏粱之味積久成熟因而生風非一朝一夕之
故也

雜方碧霞丸

治吐逆立效

黃丹四兩篩過用好米醋半斤用藥入銚內煎
乾却用炭火三斤就銚內煨透紅冷取出研細
末用粟米飯搗為丸梧子大煎醇湯下七丸効
木瓜湯 主嘔碗風氣又吐而轉筋者煮木瓜汁
飲之甚良此酸收之劑欲吐不吐者是也

○惡心

舟溪云惡心有熱有痰皆用生姜隨症用藥
仲景生姜半夏湯 治胸中似喘不喘但嘔不嘔

似噦不噦徹心中憤然無恙者

半夏一斤半 生姜一斤 右二味以水三升煮半夏

取二升內生姜汁同煮二升半少冷分四服

日三夜一如病止住後藥 此濕痰症也

東垣茯苓半夏湯 胃風虛弱身重有痰惡心欲

吐是邪氣羈絆于脾胃之間當先實其脾胃

炒麴錢三 大麥芽五錢 陳皮 天麻各二錢 白朮

茯苓 半夏各一兩 每五錢姜五片煎熱服

柴胡半夏湯 治舊有風症不敢見風眼溢眼黑

胸中有痰惡心兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如石若在暖室少出微汗其症隨減再遇風病復如是方見痰門

○嘔苦水

丹溪治一婦人清早嘔苦水脉瀦而微起轉如常

此胃弱而上腕有濕

黃芩錢七 滑石 蒼朮炒 陳皮 山查 半夏各兩

桔梗錢五 飛礬兩二 姜水煎服

二陳湯加山梔子一倍黃連減半香附撫芎白豆

仁煎服或臨服時磨檳榔末少許治鬱火惡心

嘔沫

死予目擊十數人矣

仲景治乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之

半夏

乾姜各等分

二味為末取方寸匕漿水

一升煎七合頓服之

嘔膿

予族嫂中年患此半載家數嘔膿血後竟無事此亦肺癆症也膿盡即愈

仲景云嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔長虫

舟溪治吐虫用黑錫灰檳榔末米飲調下

仲景治魛厥當吐魛今病靜而復時煩此為臍寒

魛上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者聞

食臭出其人當自吐魛

魛厥者烏梅丸主之又主痢方在厥證門

傷酒嘔吐

東垣葛花解酲湯方見傷飲門

益元散姜汁為丸治酒熱嘔惡殊驗

乾姜丸治酒癖成飲吐酸水

乾姜 葛根 枳殼 橘紅 前胡 錢各五 半夏

麴 白朮兩 酪乙 吳茱萸 甘草錢半

右末煉蜜丸桐子大每三十九丸米飲下

嘔吐清水

許學士神木丸 治嘔吐清水如神

蒼朮一斤去皮切片為末用白芝蔴半兩水二

盞研瀝取汁太棗十五枚煮爛去皮核以芝

蔴汁研勻成稀膏搜和入臼搗熟丸如桐子

大每空心溫湯下五十九丸加至百丸忌桃李

雀鴿初服時膈上微燥且以茅朮製覺燥甚

再進山梔子散一服久之不覺燥也

山梔散 山梔一味乾之為末沸湯點服

仲景茯苓散 治心胸中有停痰宿水自呷出水

後心胸間虛氣滿不能食消痰氣能飲食

人參 白朮 茯苓各三兩 枳實二兩 陳皮五錢 生姜

三兩右水煎溫服如人行九里許又進之一日服

丹溪治兩手脉弦飲後嘔清水

神麴 蒼朮 香附各五錢 益元散兩 半夏七錢

右末姜汁浸餅為丸

舟溪治一人年四十因灸艾火太多病腸內下血
 糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口
 之熱 黃芩 甘草 茯苓各五分 陳皮 地黃
各一錢 白朮 連翹各半錢 姜三片水煎服
 仲景治渴欲飲水水入則吐各水逆五苓散主之
 千金方治痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度
 遂令脾胃氣羸不能消于飲食飲食入胃則皆
 變成冷水反吐不停皆用赤石脂散主之
 赤石脂一斤研細末每服方寸匕酒飲調下時

稍加至三七服盡一斤終身不吐痰水又不
 下痢補五臟令人肥健有人痰飲服藥不愈
 用此方愈經云諸病水液澄徹清冷皆屬于寒是也
 白苳散 治胃口寒作吐及作痛者
 白苳仁三錢為末酒送下効

○噎膈

丙經陰陽別論篇曰三陽結謂之膈結謂熱結也
 三陽者小腸膀胱也小腸熱結則血脉燥膀胱
 熱結則津液涸故隔塞而不便焉其始也或由

飲食不節，痰飲停滯，或因七情過用，脾胃內虛，而作。或者不察，悉指為寒，例用香熱之藥治之，反動七情之火，脾胃之陰反有所耗，是以病日益深。今治此疾，或見咽嗌閉塞，胸膈痞悶，似屬氣滯，然有服耗氣藥過多，中氣不運，而致者，當補氣而自運；有大便秘結，如羊屎者，似屬血熱，然有服通利藥過多，致血耗竭而愈結者，補血潤血而自行；有因火逆冲上，食不得入，其脉洪大有力而數者，有痰飲阻滯而脉結澀者，當清

痰泄熱，其火自降。又有脾胃陽火衰弱，其脉沉細而微者，當以辛香之藥溫其氣，仍以益陰養胃為之輔，可也。大槩又有寒熱之辨，若食已即吐者，火也；食久始吐者，寒也。王註曰：食不得入，是有火也；食入復出，是無火也。痰內經王註曰：明二陽也。大陽三陽也。一陽膽與三焦二陽也。腸與胃三陽小腸膀胱張子和乃曰三陽者木小腸膀胱也。并大腸而言，不知從何所據耶。

傷寒論云：食入反吐，穀不得前，者腎水乾也。王冰曰：病嘔而吐，食久反出，是無水也。此與內經病



能篇註異

氣厥論云膈中陽氣與寒相薄故隔食而陽氣不通此論亦云陽與寒相薄未嘗專主于寒也
丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力有痰者脉必沉或伏而大又有氣滯結者寸關沉而濇又有擊跌內積瘀血忽然嘔吐食不能納者其脉必乳
張鷟峰曰噎當是神思間病惟內觀自養庶或可安又曰噎生于血乾血陰也陰主靜內外兩靜

則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自生
賜胃津液傳化合宜何噎之有

吾方用人參以補脾御米以解毒竹瀝以清痰乾姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去噦有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治有積血者當消息去之

○糞如羊屎者不治五十以上者不治口中多出白沫者不治

治法木槩用童便韭汁姜汁竹瀝牛羊乳氣虛入

四君子湯血虛入四物湯切不可驟用辛燥之藥宜薄滋味宜用乾蒸餅等物少用湯粥六節藏象云人迎四倍以上為格陽蓋陽上之極故格拒而食不得入金匱云病人脈數為熱當消穀引飲而反吐者以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在于上醫反下之今脈反弦故名曰虛

跌陽脈浮而濇浮則為虛濇為傷脾傷則不糜朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難治

氣虛胃反右手脈無力者

四君子湯加蘆根以伏龍肝浸長流水澄清煎之臨服入童便韭汁牛羊乳入黑驢尿和服以防其生虫

參苓白朮散 錢氏白朮散皆治中氣虛弱胃反血虛胃反左手脈無力者以四物湯加童便或再

加桃仁紅花 有酒積加甘蔗汁

二陳湯合平胃散 治有痰而胃反者

人參利膈丸 治胸中不利痰嗽喘滿而膈

木香 檳榔各七錢半 人參 川歸 藿香

甘草 枳實各一兩 大黃酒浸 厚朴各二兩

右末滴水丸梧子大溫水送下

○千葉白木槿花陰乾為末陳皮湯調下三五口不轉再服

○奇方

未出毛啄木鳥 蝙蝠 小鮎鴨魚 三味入

新瓦內鹽泥固濟煨存性為末外用狗寶為末和勻每服五七分漸至一錢姜湯下

○又方 陳蜆殼燒灰米飲下

○老牛涎如棗核大水中飲之終身不復噎

○又方 芎根 茅根各二兩 水四鍾煮二鍾頓服之良

姜附散 膈氣不通胸膈間結塊大如拳堅如石

嘔吐惡心飲食不下

香附子一斤 生姜三斤 搗取汁浸香附一宿曬乾再

浸再晒以姜汁盡為度為末每二錢米飲下



病機紫沉丸

治中焦吐食由食積與寒氣相格

故吐而痛

半夏麴

代赭石

砂仁各三錢

杏仁 沉香

木香

白木各一錢

烏梅仁

丁香

檳榔各二錢

陳皮五錢

巴豆霜

研肉果各五分

右末醋糊丸

黍米大每五十九柿霜湯下愈

東垣厚朴丸

主反胃吐逆飲食噎塞氣上冲腹

中諸疾藥味即與萬病紫沉丸同

厚朴

蜀椒

微炒去目

川烏

炮去皮各一兩半

紫苑

吳茱

萸 柴胡

菖蒲

桔梗

茯苓

官桂

皂角

去皮乾姜炮

人參各二兩

黃連半兩

巴豆霜

五右蜜為丸桐子大每服三九漸加至五七九

以利為度姜湯下食後而卧此丸治効與局

方溫白丸同及治處暑已後秋冬下痢大効

加減法

春夏加黃連二兩

秋冬再加厚朴二兩

如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲

茯苓各一兩半如治風痛不愈者依春秋

加藥外更加人參菖蒲茯苓各一兩半如

心之積加菖蒲茯苓為輔如肝之積加柴

胡蜀椒 如肺積加黃連人參 如脾積加
茱萸乾姜 秋冬久瀉不止加黃連茯苓
脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下用粟
米半升為粉水丸梧子大煮令熟點少益空
心和汁吞下

本草云駝屎極治反胃外臺載昔幼年經患此疾
每食餅及羹粥頃臆吐出貞觀中許奉御兄弟
及紫蔣寺時稱名醫奉勅令治醫竭其術竟不
能療漸至羸瘵死在旦夕忽有士云駝屎極驗

旦服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定
時食粥吐則便定後奏知大內中五六人患反
胃同服一時俱瘥此藥稍有毒服時不可過多
盛取熱服二合病深者日服之良驗本草云駝屎治瘵瘵反胃又云性冷味甘服之不生氣

濟世方 駝屎調平胃散亦効

新瓦散 治反胃用多年瓦一片燒紅入駝屎內
淬二十一次研末倉米飯焦為末二分飯末下
分瓦末蠟精和飯丸以駝屎和平胃散服之

丹溪番胃方

黃連姜汁炒 山查肉錢一保和末 右粥丸錢六 桐

子大以入參湯入竹瀝再煎沸熱下六十九

本事大黃湯

治冷涎番胃其症欲發時先流冷

涎次則吐食此乃勞証治不早死在早夕用大

黃一兩生姜自然汁半茶盞炙大黃令燥又淬

入姜汁內如此淬汁盡切焙為末每服二錢陳

米一撮葱白二莖水一大盞煎七分先食葱白

次服藥不十日即除根

羅太無云

玄明粉

硝提八九次入瓦罐煨成汁不尚再加頂火煨其煨

過淨硝一斤入甘草末一兩和勻名曰玄明粉

每用一二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣

壅滯五藏秘結和熱忌魚及藕

丹溪治番胃積飲通用益元散生姜自然汁澄清

白脚丸小丸子時服治番胃用吳茱萸貝

母瓜蒌根牛膝草

本事治積聚停飲痰水生虫久成反胃及安為胃

癰其說在靈樞及巢氏病源芫花丸

芫花醋炙 牛膝 狼牙根 桔梗炒 藜蘆炒
 檳榔各五錢 巴豆炒大粒 右末醋糊丸如赤豆大
 每服二三九加至五七九食前姜湯下
 此方常服化痰消堅殺虫手患飲癖三十年
 暮年常是多雜痰飲來潮遲即吐有時飲半
 杯酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒
 癥云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常欲
 思酒不得酒則吐多睡不復能食是胃中有
 虫使然名為酒癥此方治之要之須痛禁酒

則易治不禁無益也

羅太無桂香散 治膈氣反胃諸藥難痊朝食暮
 吐甚者食已輒出其効神速此重劑也 速

水銀 黑錫各三錢 硫黃五錢 右三味銚內用柳木
 搗熬研微火上細研為灰取出後用丁香末
 二錢桂末二錢生姜末三錢都一處研令勻
 每服三錢米飲調下一服効甚若再服神効
 又云男婦小兒遠近番胃吐食或有汚血停蓄胸
 膈者方用五靈脂一味為末以黃狗膽汁為丸

龍眼大每服一丸好酒半盞溫服不止再服即效
 丹溪治東陽王仲延咽膈間常覺有物悶每食
 物必屈曲自膈而下且梗滯作微痛食亦減他
 無所苦予脉之右甚瀯而關甚沉左却和予曰
 汚血在胃脘之口氣因而鬱為痰此必食物所
 致明以告我彼不自覺予又曰汝去冬好食何
 物為多曰我每日早必畢飲點剝酒兩三杯逼
 寒氣為製一方用生韭汁半盞令細呷之一日
 三服盡韭二斤而安

○濟世方 治噎食

鷄腹內穀袋不拘多少不可失包內物一粒用
 泥固濟火煨存性用姜汁炒香附末半兩配穀
 袋一箇為末神麩糊為丸姜湯送下

○治氣噎不下飲

枇杷葉去毛 青皮 陳皮去
 右等分每服三錢生姜五片水煎服

○金匱玉函 五噎心膈氣滯煩悶吐逆不食

蘆根五兩剉水三大盞煮二盞溫服

永徽中有僧惟則病噎不能食羈諸弟子曰吾死
 後便可開吾曾喚視有何物甘經而卒弟子果
 開喉胸中得一物形似魚而有兩頭遍體皆肉
 鱗弟子置碗中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡
 時夏中盛藍作激適有一僧以激置碗中此虫
 遂逸碗而走須臾化為水此乃虫瘕非噎比因
 此後人多以藍治噎悞矣

秘方潤腸膏 治膈噎大便燥結飲食良久復出
 及朝食暮吐暮食朝吐其功甚捷

新取歲靈仙四兩搗汁生姜四兩真麻油二兩白沙蜜四兩
沸去沫 右四味同入銀石器內慢火熬成膏
時以匙挑食之良驗

雄黃二豆丸 治番胃噎食神驗

大烏梅二十枚取水一升取肉一升 雄黃各二錢 乳香一錢
 真百草霜 黑豆 菘豆各四粒

右五味為細末烏梅肉搗丸彈子大每服一
 丸噙化待一炷香時藥力方行烙白麩餅一
 枚清熱湯泡開吃之無碍為妙設仍有微碍

一二日後再驗下丸三五丸除根

紫蘓子飲

炒逆上氣噎膈因怒氣叫喊未定便

挾氣進飲食或飲食甫畢使用性恚怒以致食

與氣相逆氣不得下或咳嗽不透心氣逆惡心

蘓子炒

訶子

煨去核

蘿蔔子

微炒

杏仁

去皮尖

人參

木香

各一錢半

青皮

甘草

炙各三錢

右分二服生薑三片水煎服

太倉丸

脾胃虛弱不思飲食番胃不食亦宜服

砂仁

白豆仁

各二兩

陳倉米

一升用朝東向陽壁土炒去土不用

右末生薑自然汁丸桐子大每服百丸淡生
姜湯下

體仁彙編曰硫磺結成砂子吐逆立痊方用嚴氏

青金丹治一切吐逆

水銀

八錢生硫黃一錢

為末入鉢內慢火化開以

柳木棍攪炒或有烟焰以醋沃之結成砂子

再研為末用粽尖杵和丸菴豆大每服三十

丸生薑陳皮煎湯送下

青囊治反胃久藥不效及小兒吐不止者硫黃五

錢為末入水銀二錢半同研無星為度每服二錢先取生姜汁酒一盞煎熟調藥空心服調時逐漸著酒緩調令勻服訖以被蓋出汗安

又曰人參治番胃之良用入參二兩拍破每服一兩水一鍾半煎四分熱服兼以人參汁煮粥吃愈有入患番胃諸方不瘥只服人參而愈若卒嘔吐逆九粥飲入口即吐因弱為丸服良劉宗厚曰按古治番胃諸方悉是香燥太熱之藥皆不足為法今姑採一二方以備用耳至于

丹溪所言補血益陰潤燥和胃調中等藥雖無其方自宜隨証設施觀其立論則思過半矣

治噎禁方

皂角黃三分每春夏雨後 蘆根浮露水上 橘紅樹上生如菌樣者三錢

七 烏藥錢一 桔梗錢二 枳實分八 水二鍾煎一鍾先

服一酒杯漸加之渣再煎

生生子曰噎膈之病氣鬱居多然亦有陰血不足者少壯之人日以酒色是耽胃中之火沸騰則上焦肺金先受邪矣金主降令者也火凌于肺

津液成濁况又下竭腎水將何攝伏其火以下
行耶經曰大使者腎之所主陰血既虧則大便
燥結則下焦閉而氣反上冲經曰幽門不通
上冲吸門又曰肺出氣腎納氣虛則失司乃職
是有陽而無陰有升而無降也故守真子和丹
溪皆以火熱而言戒用剛燥其意深矣然用藥
必假滋陰潤燥為主陰血生則大便潤則下
焦開則氣降腎司職而病尋愈矣噫用藥之
法固為詳悉然人不能銖石其痛斷酒色則雖

日飲瓊漿亦莫能以致其生也予特附于篇末
俾病者自加珍重孰非愈病之藥石耶

○腰痛門

腰痛有腎虛有濕熱有痰有氣滯有跌撲瘀血
脉大而無力為虛弦為陰虛瀼為死血沉滑為痰
沉細為氣濡弱為濕緊數為風

東垣曰大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎
虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經曰腰
者腎之腑轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸茴香

九之類以補陽之不足也膏粱之人久服湯藥
醉以入房損其真氣則腎氣熱而腰脊痛不能
舉久則髓減骨枯發為骨痿宜六味地黃丸滋
腎九鳳髓丹之類以補陰之不足也

丹溪曰久痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦然
煨腎丸 肝腎脾損穀不化治宜益精緩中消穀
腰不起者神効

川萆薢 杜仲姜汁炒 牛膝 破故紙 芦芭
鬼絲子 肉蓯蓉 沙苑蒺藜各一兩 桂心兩

右酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十九
空心鹽酒送下

金剛丸 腎損骨痿不能起床

川萆薢 杜仲炒 照前法丸服

麋茸丸 腎虛腰痛不能轉側

麋茸一兩鹿茸亦可 兔絲子一兩 舶上硫黃五錢

右末以羊腎二對酒煮爛去膜研如泥和丸
梧子大陰乾如羊腎不數入酒糊佐之每服
三五十九溫酒或鹽湯下

鹿角散

新角刮去黑皮取白者炒黃為末酒服

一錢日進三服禁生魚餘不禁陳者不用角中

心黃亦不用此方治腰痛神效東垣曰鹿角能去惡血

羊腎散

羊腎為末酒服一錢日進三服本草云

羊腎補腎氣益精髓

腎氣丸

茴香丸 青娥丸 已上皆補陽之不

足也

八味丸

治虛勞小腹拘急小便不利此則陰陽

兼補也

六味地黄丸

虎潛丸

滋腎丸

大補丸

已上皆補陰之不足也

治陰虛脉大者

杜仲

龜板

黃柏

知母

枸杞子

五味

子等分為末以猪脊髓為丸每服五七十丸

空心鹽酒送下

補腎丸

治腎虛腰痛効

烏藥葉

本草云烏藥葉嫩葉補中益氣

側柏葉

右酒蒸晒乾為末粥丸梧子大照前服

腰腿濕痛方

龜板酒炙五錢

黃栢酒炙四錢 青皮三錢 甘草生一錢半

右末研姜一大片次入藥末一錢研細以蒼耳汁煎令沸服

治陰虛性急腰痛者

龜板 黃栢 知母 側栢

右為末地黃膏為丸

治濕熱腰腿疼痛

龜板酒炙二兩 黃栢酒炙二兩 炒蒼朮 蒼耳子各一兩 側栢半兩

葳靈仙酒浸二兩

右以牛膝膏為丸以黑豆汁煎

四物湯加陳皮生甘草生姜一片煎吞下

又方 治腰腿疼痛

龜板半兩 黃栢 白芍藥各一兩 炒陳皮 知母

葳靈仙 蒼朮 蒼耳子各半兩 為末蜜丸服

治濕熱腰痛大便瀉

龜板酒炙一兩 楮皮炒 蒼朮 滑石各半兩 芍藥酒浸

香附各四錢 為末粥丸如內傷白朮山查湯下

東垣蒼朮湯 治濕熱腰腿疼痛