

詳校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十八

婦人諸疾門

雜病

萬病丸保慶集方治婦人久虛血氣衰少急情嗜卧百病諸

虛飲食不進精神不足

當歸四兩地黃二兩一方  
熟乾者

欽定四庫全書

普濟方

明周王朱橚撰



右為末蜜和為丸如桐子大每服十五丸食前米飲下

沉香萬應丸

沉香另研沒藥細研茯苓去粗皮川芎 當歸去蘆官桂去皮

白朮 白芷 白薇 玄胡索 牡丹皮 赤石

脂 藁本去蘆 赤芍藥

右為細末煉蜜為丸每錢十九每服十九嚼空心溫酒送下專治男子婦人妊娠傷寒諸虛百損或氣滯

不勻飲食不化遍身走疼婦人妊娠傷寒身體腫大者麻黃湯送下妊娠打撲損傷或宿冷物動胎不安腹痛不止月水不調或前或後或多或少產前一切諸虛百損並用酒下或難產或逆血運當歸湯下或死胎在腹不過二丸或胎衣不下三丸即出亦溫酒下惡物過多當歸湯下惡物不行紅花湯下自幼年無孕每日一服至一箇月次有神驗

治婦人血氣出肘後方

用通草煮飲之濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踈折煮汁釀酒妙

玉露通真丸 出大全良方 治婦人諸疾

半夏 薑汁人參 各半 食茱萸 醋炒 厚朴 製各一兩一分 澤蘭

葉 三兩 甘草 蟬蛻 炒 白芍藥 蠶蛻 炒用如無以蠶故紙

三張代之 石膏 白朮 當歸 羌活 熟地黄 洗白焙

茯苓 各三兩 防風 乾薑 栝子仁 蒼朮 白薇

木香 黃耆 川牛膝 附子 白蕪荑 與蟬腿同

炒然此方無蟬腿想馬鳴蛻是也 川芎 藁本 各一兩 川椒 苦棟

各三兩 白芷 一兩

右為細末煉蜜為丸每九錢分作十九丸切記蜜煉無令太過及生也男子婦人諸虛不足狀如勞疾黃耆

煎酒下 血氣燒秤鎚淬酒下產前安胎用醋湯下

產後諸疾用酒或鹽湯下 產前產後瀉用米飲

送下 男子婦人牙疼用半丸指疼處良久鹽湯嚥

下 產前產後血悶用童子小便下經脈不調用紅

花酒下 產後風毒生瘡荆芥茶下冷痰逆心乾嚼  
下 婦人子宮久冷崩漏赤白帶下童子小便米醋  
熨處緩熱下

治婦人血氣

用紫背金盤草根洗去粗皮焙乾搗羅溫酒調服半  
錢又治氣孕婦不可服忌雞魚濕麵羊血等

橘歸丸

出危氏方

治肌膚手足俱有血脈路此怒氣傷肝血  
失常經以致如此服之神效

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒

沒藥散

出危氏方

治月信退出背為禽獸之狀似傷人先將

綿塞陰戶只頓服用沒藥一兩作丸散皆可服即愈  
一方細研溫酒一錢治內傷血暈臍腹痛者昔有莊  
婦人病此危甚其夫來告急以此藥旋即愈痊

治婦人發寒熱不止經久日後四肢堅如石以物繫之  
似鐘聲身日漸瘦惡菜萸木香等分煎湯飲即日可  
愈

有一婦人小便中出大糞諸方無治余以意度之乃用生五苓散利水穀而愈後見夏書云有此病名交腸治以舊幘頭燒灰為末酒服之更不曉其故

懷娠產前產後加減良方

出澹寮方

川芎洗 當歸 桂心不見火 白芍藥洗

右各為細末取淨各一兩各隨病證加減用產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下臨產腹痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂末一錢溫酒下扶產婦運行產

後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便調下仍時時打醋炭令香不絕則血脈自收安然無病切不可妄投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服川芎當歸末各一錢童子便調下日三服三日後只服四順理中丸空心童子小便吞下七日內補虛當歸川芎末各一錢童子小便或米飲調下七日外方可服補藥補得太早則留住惡血纔平善四味各半錢童子小便調下產後頭昏目暈川芎芍藥當歸末各半

錢童子小便調下未滿月已病月四味各半錢水一盞煎至八分溫服腹痛當歸末一錢桂心末半錢童子小便調下心胃煩悶當歸芍藥各一錢童子小便調下惡露過多桂心芍藥當歸各一錢童子小便調下大便冷用理中丸水一盞煎八分溫服

佛手散

出危氏方

治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾纔產了未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生心血

川芎

二兩

當歸

三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服

一方為粗末每服四錢水七分酒三分同煎至七分熱將產前先安排此藥將兩服藥末煎之產了速進之三日內日二服三日外一服 一方名芎歸湯只

是此二味等分咬咀水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血援牙去血不止及一切去血過多心眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒息能治之若產後眩暈宜加芍藥服之 一名桂香

散治產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與童子小便合煎服之立效。一名當歸湯治妊娠子死或未死胎重不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死服之使下若未死其胎自安此經累效萬不失一。一名琥珀散臨月服之則縮胎易產兼治產後諸疾。一名羊肉湯治虛損羸乏腹中疴痛往來寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉一兩薑十片水二盞煎至六分溫服。一名君臣

散治婦人室女心腹疴痛經脈不調用水煎服若妊娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服。一名芎藭散治婦女血氣上喘下腫二味等分為細末每服二錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝心腹脹氣絕者神驗難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末煎至一盞以上分為二服未效再服產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服又此藥兼治臟毒每

服一錢半入炒槐花末半錢水一盞煎至六分無時  
候服三日取下血塊即愈如產後頭疼加荆芥煎如  
吐血亦宜服之

治產難

用百草霜香白芷等分為末名烏金散每服二錢童  
子小便好醋各一合沸湯浸服止一服見效甚者再  
服已分娩矣

一方

用五積散加醋煎亦能催生

治崩中漏下失血過多不能止用芎歸湯療之不愈者  
以香附子炒去皮毛為末每兩用甘草一錢清米飲  
點服名順元湯仍以震靈丹間之 有白帶者於順  
元湯加芍藥半兩仍間以白丹或謂香附子耗氣則  
不然許學士謂資血養氣婦人仙藥雖羸人亦宜服  
之 兼治男子婦人吐衄便利及諸證失血用此藥  
佐以米飲圓百草霜末每服百餘圓或以其他燒灰

藥皆能作效不可遽以燥澀之劑止之必致壅遏腐敗却生他證大抵血不能行氣使之然者氣得其平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之每得其宜

三聖散出全良方治產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不下皆治之

川芎 羌活等分

右為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫

服

二聖大寶琥珀散出大全良方

生地黄一斤生薑一斤取自然汁將地黃汁炒生薑汁炒地黃津各稍乾焙為末

當歸 川芎 牡丹皮 芍藥 莪朮 蒲黃

香白芷 羌活八味桂心不見熟地黄炒

右各一兩同煎二味為細末於磁合內收之婦人冷氣痛并血海不調隔氣炒薑酒下二錢產後脫衣不下煖酒調下二錢產婦臨月日進三服滑胎易產溫

調二錢產後血犯心眼見鬼神用童子小便半盞酒  
半盞同煎調服婦人久服則顏色紅白無血來相攻  
一生無子者久服則有孕此藥治療婦人百病空心  
日午食前一日二服產後百病並煖酒下

一捻金散

出仁存方

治婦人產後百病疼痛不可忍者此

藥

馬蘭草

醋炒麒麟竭

沒藥

乳香

各半兩

川當歸

去蘆

一兩

右為細末每服二五錢熱酒調下

保安丸

出上海上方

治產前產後諸證列于後

白豆寇

赤茯苓

牡丹皮

紅芍藥

沉香

阿子皮

檳榔

硃砂

石茱萸

各三錢

馬明腿

炒

生地黄

各一兩

人參

當歸

官桂

牛膝

酒浸

白芷

木香

藁本

麻黃

去節黑附子

炮川芎

細辛

去葉蘭香葉

甘草

桔梗

去蘆

寒水石

燒粉

防風

去蘆

蟬

殼乳香

沒藥

白朮

各五錢

龍腦

一錢

射香

許少

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心細嚼  
溫酒送下治證于後八分淋血緊不過三丸胎衣不  
下只三丸產前產後腹痛只一丸子死腹中只三丸  
臍下如刀刺只一丸遍身生黑痣只一丸經脈不通  
只一丸產前產後傷寒只一丸臨產時一丸則易生  
返魂母 治婦人胎前產後諸疾危證

舊黑箭野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形名荒  
蔚子是也又名益母又名大扎又名貞蔚又名負蟾

四五月採取陰乾用葉及花子磁器研為末煉蜜丸  
如彈子大隨後治證嚼服其根燒存性為末酒調服  
之功與黑神散不相上下胎前臍腹作痛或作聲者  
溫米飲下胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止  
水煎秦苧糯米湯下或當歸湯亦可如產時先用一  
丸以童子小便化下安魂定魄氣血自然調順諸病  
不生又能破血止痛養脈息調經絡溫酒送下產後  
胎衣不下落在胞中及橫生不順死胎經日不下者

脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下產後中風牙關緊急  
半身不遂失音不語童子小使用無灰酒各半下後  
咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇痛舉  
動失力者溫酒下產後兩太陽痛呵欠心怯氣短肌  
體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫  
米飲湯下產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見  
鬼神狂言不省人事薄荷自然汁如無生者濃煎薄  
荷湯下及童子小便酒各半亦可也產後垢面顏赤

五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗  
者童子小便酒各半下溫薄荷自然汁亦可產後餘  
血惡露不盡結滯腸臍刺痛惡物上衝心胃主悶者  
童子小便酒各半下產後大小便不通煩燥口苦者  
薄荷自然汁如無生薄荷濃煎薄荷湯下產後瀉血  
者小煎棗湯下產後白帶下者煎膠艾湯下月水不  
調溫酒下血崩漏下溫酒下婦人久無子息溫酒下  
服之十九至二十九亦能主喜槐一方用槐花子陰

乾搗末煉蜜丸如彈子大每服一丸一子死腹中蓋因  
卒病臟腑熱極蒸其胎是其子死也蓋子死不居子  
宮或墮胎腹間冷痛小便沫出腹脹四肢亦冷爪甲  
青是也或臨產之時此藥安魂定魄血氣自然調順  
諸疾不生破血補虛上痛養血氣調經絡用童子小  
便各七分化下二分產難者胎已食母之血十月滿  
足則餘血結成塊俗名為兒枕欲產之時血塊先破  
敗血裹其子是以難產或產後惡物不盡臍腹刺痛

惡上衝心胸主悶用童便酒各七分化下三垢面顏  
赤胎衣不下既產了臟腑虛羸五心煩燥血流如水  
中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自出  
如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者童便  
酒各七分化下薄荷自然汁鹽湯亦可四產後三日  
起卧不得眼前黑暗生花蓋產後血氣未定運走五  
臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱口  
乾煩渴心悶亂見鬼神狂言妄語不省人事童便酒

各七分薄荷自然汁亦可五產後口乾心悶及煩渴者血氣未定即食熟麩積滯在內以治熱燥煩渴者俗為胸膈壅塞或兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短身體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛甚者溫米飲童子小便各七分化下六產後四肢浮腫及寒熱者蓋因敗血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘或小便澀或咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水兩脇疼痛舉動乏力溫酒化下七產後寒熱往

來蓋因敗血入心則熱入皮脾則寒狀熱瘧臍腹作痛或作聲溫米飲化下桂枝湯亦可八產難中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒各七分化下產後利未經月滿或誤食物下與血相攻擊前所積受濕因此敗血相攻煎棗湯下十產後大便秘結口苦煩渴非時不與以敗血衝心而蔽其心孔童便酒各七分化下薄荷汁亦可十一產後遍身疼痛百節開張血乘流入腸中停留不散臍腹疼痛米餘化下十

二產後崩中漏下不止蓋是傷酸物狀如雞肝脊背  
倦悶煎糯米秦芫湯化下當歸桂枝湯亦可十三產  
後未經月滿血氣不通蓋是月水未還或食熱麩壅  
結成塊喘嗽四肢無力多睡而汗出不止月水不調  
為骨蒸勞便服此藥童便各七分化下十四產後吐  
逆不止蓋因敗血停于脾胃即發吐逆胸膈虛脹俗  
為翻胃溫酒化下十五產後鼻衄口乾舌黑蓋因入  
心臟熱則舌黑鼻衄也童子小便各七分化下十六

產後赤白帶下煎秦芫湯下十七產後氣急喉中猫  
聲者蓋因敗血衝心入喉中萬無一瘥矣十八產後  
中風者蓋因未經七日勞動則百日之中傷其房事  
中風初病之狀眼澀腰強筋急角弓反張牙關緊急  
若此者皆自傷犯耳十九產後面色黑及遍身生黑  
靨者乃敗血入其皮膚萬無一瘥矣

烏雞煎

出三因方

治婦人百病

吳茱萸

良薑

白薑

當歸

赤芍藥

延胡

索炒破故紙 田椒炒生乾地黄 劉寄奴 蓬

莪茂 橘紅 青皮 川芎各一兩 熟艾二兩

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服三五丸湯

下于後月經不通紅花蘇木酒下白帶牡蠣粉調酒

下子宮久冷白茯苓煎湯下赤帶多茶清下血崩豆

淋酒調綿花灰下胎不安和蜜好酒下腸風陳米飲

調百草霜下心疼菖蒲煎酒下漏胎下血烏梅溫酒

下耳聾蠟點茶下胎死不動斑猫三四箇煎酒下腰

脚痛當歸酒下胎衣不下芸薹研水下頭風薄荷點

茶下血風眼黑豆甘草湯下生瘡地黄湯下身體疼

痛黃耆末調酒送下四肢浮腫射香湯下咳嗽喘滿

杏仁桑白皮湯下腹痛芍藥調溫下產前後痢白者

乾薑湯下赤者甘草湯下赤白雜者二宜湯下常服

酸湯下任下並空心食前服之

大效琥珀散一名烏藥散治婦人心胸迷悶臍腹拍撮疼痛

氣急氣悶月信不調等疾方見室女月水不調類

通真丸出危氏方隨證加減

當歸去尾 蒼朮炒切 肉桂 防風 川芎 人參 白

芍藥 白薇去土熟 地黃酒炒 牡丹皮 茴香 白朮

白茯苓 桔梗 附子炮 澤蘭葉各等分

右為末煉蜜丸每服一九血崩經脈不勻赤白帶下

炒當歸酒下血風癩疹癢薄荷蜜湯冷氣塊築心

腹嘔逆反胃炒鹽湯下腸風瀉血赤白痢月信不止

米飲下血風勞倦青蒿酒下頭疼眼花酒下月信不

行室女經脈不通產後中風不語迷悶五丸下紅花

蘓木湯治漏下血氣刺心腹脹滿炒薑酒下

育真丹出簡易方治婦人三十六種風疾下臟久虛沉寒痼

冷帶下五色變易不定漸見瘦弱

代赭石 紫石英 赤石脂 左顧牡蠣去二頭

右為末米醋和成劑分為六錠入鐵鍋內燒通紅半

時辰傾出放冷搗為末次入

乳香別研 茴香微炒 乾薑炮 五靈脂去炒石各二兩

右為末却入前末和勻醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服二十九煎茴香酒下空心服

艾煎丸 出經驗良方 治婦女諸疾腹痛赤白帶下

香附子 艾葉 各四兩 蔓荊子 神麩 枳殼 去穰當

歸 各一兩 茱萸 莪朮 各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附子艾葉以醋盡為度揀去艾葉入糯米粉糊捻作餅子晒乾同前藥為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九米飲醋湯任意

送下

補陰丹 出家藏方 治婦人百疾經候不勻或崩漏不止腰腿

沉重臍腹作痛潮熱往來虛煩自汗中滿氣短嘔噦不時肢體酸疼不思飲食日漸瘦弱此藥潤肌體悅顏色調榮衛逐風寒進飲食

熟乾地黄 洗焙 生乾地黄 各七兩半 白朮 五錢 蒼朮 五兩米

宿蒙本 去土 牡丹皮 當歸 四味洗焙 秦朮 四味各十兩 細辛

去葉土 蠶退紙 燒灰留 肉桂 去粗皮 甘草 炙六兩

黃卷

焙乾出六兩半炒取

枳殼

麩炒去穰六兩

陳橘皮

去白六兩

羌活

去蘆頭

香白芷

乾薑

炮三味各五錢

糯米

三升炒黑色大煙出

白茯苓

苓

去皮一兩

右件為細末煉蜜為丸每兩作一十九丸每服溫酒化

下醋湯亦得空心食前服

內補黃耆湯

出危氏方

治婦人七傷身體疼痛小腹急滿面

目黃黑不能飲食並諸虛之不足少氣心悸不安方

黃耆

三兩

當歸

三兩

芍藥

三兩

乾薑

四兩

乾地黄

半夏三

兩

人參

桂心

遠志

麥門冬

去心

甘草

五味

子

白朮

茯苓

澤瀉

各二兩

大棗

三十枚

右以咀為散以水一斗半煮取三升去滓每一服五

合日三服夜一服

治女人風虛血悶

出本草

以羊肉髓和酒服之

阿膠煮散

出生育寶鑑方

治婦人宮臟百病

阿膠

大芎

人參

白朮

五味子

麥門冬

當歸 茯苓 黃耆 續斷 乾地黄各一兩 甘

草半兩

右細剉為煮散每劑八銖婦人宮臟妄致肝氣攻衝喘促咳嗽入水五七分煎空心熱服若是血臟冷痛赤白帶下加生薑兩片大棗一枚煎服若補血入枸杞子覆盆子煎若嘔逆不思飲食加草豆蔻煎或丁香二十枚煎服若孕婦不安加桑寄生枝一兩細剉勻拌煎服若產後血多及半產下血宮臟全虛加白

微半兩微炙蕤蓉一兩細剉勻拌煎服若是久患宮臟骨節腰腿兩脇逆痛四肢少力常患風寒有如勞狀候加木香半兩鼈甲一兩醋炙柴胡一兩並剉拌之每服三錢入生薑三片水兩盞如茶法煎至七分空心熱服號萬全不傳方

繹皮丸

出朱氏集驗方

治婦人百病大有效驗

當歸

四兩洗淨好酒浸一宿鹿出焙乾再浸酒盡為度

赤芍藥

人參

白芍藥

肉桂

去皮

白朮

益智仁

白微

五靈

脂 附子 陳皮 青皮各二兩 牡蠣煨 赤石脂

香附子 玄胡索 牡丹皮去木 蒼木 敗薑 京

三稜 蓬莪木 劉寄奴 艾葉 澤蘭 生乾

地黃 熟乾地黃各兩 蒲黃三兩隔炒 雄黑豆

右件將蒼木敗薑陳皮青皮京三稜莪木劉寄奴艾

葉澤蘭小雄黑豆等十味用好醋煮藥候黑豆蘭熟

為度醋炒又添煮為住焙乾和衆藥為細末醋煮麩

糊為丸如梧桐子大每服四五十九丸空心薑酒或艾

醋湯下有孕不可服

玉仙散出鮑氏方 治婦人諸疾

香附子瓦器炒黑 色勿焦 白芍藥一兩 甘草一錢

右為末每服三錢沸湯下血崩不止麻竹葉煎湯下

或不用月水不行手足加生薑炒當歸煎木通湯下

月水不勻當歸酒下頻下胎血脈不住米飲下氣痛

及老婦人忽下血加炒薑黃炒陳皮任下

勝金丹出王氏博劑方 治婦人血海虛冷臍腹痛黃瘦飲食進

退多因發煩產前後諸疾但依法服大效

大黃

三兩用米醋浸兩宿以竹子細切於甑上蒸九度研為胡

當歸

蒲黃

官桂

去皮乾地黃

以醋微炒

赤芍藥

各半

芫花

一分下黑內醋炒令

黃

劉寄奴

一分畧炒

蓬莪茂

炮

芎藭

延胡

金石器杜內炒

牛膝

地龍

去頭醋炒過已上各半兩

右為末入大黃膏內和丸如芡實大早晨臨卧温酒

化下一丸如產後有疾炒薑酒化下一丸產前温酒

化下一丸如月數多末勻服

大琥珀丸

出王氏博濟方

治婦人百病

木香

二兩細切微炒

琥珀

二兩生用

北亭

一兩以熟湯化為水澄去砂石取青者白

磁器內熬如膏川芎

二兩炒

官桂

一兩去皮不見火

當歸

一兩去蘆頭各炒

白僵蠶

一兩直者去絲薑汁浸於椀內焙乾

沒藥

一兩生用

薑黃

一兩炒

殼

去頭足洗淨用一兩

右十味依法修熬一處為末別以乳香一兩用水研

在水內入白麵為丸如菉豆大以好硃砂一兩半射

香一錢為衣分為三度上之貴色勻也治婦人室女

百病當服三十九温酒醋湯任下舊病十五丸至二十九日二服赤白帶下煎荊芥酒下脈不通虎杖芎蜜同煎酒下心氣痛生薑醋湯下上喘咳嗽訶子人參湯下五勞烏梅鼈甲蔥白煎酒下血邪發狂磨刀水磨生犀下鉛白霜亦得四肢瘙癢遍身生瘡及五痔何首烏煎酒下血海積冷絞痛食後氣脹腰脚無力炒薑酒下血暈悶亂童子小便酒各半盞煎服温下血出崩艾葉煎酒下臨產作陣血閉悶亂胎息不

順子死腹中脆衣不下及催生並用生雞子清一箇熱酒冲調下小產後敗血奔心口噤舌強寒熱發渴頭面浮腫坐卧不得百節酸疼生地黃生薑汁各少許入童子小便酒各半盞同煎三五沸去滓温服產後風炮烏頭二箇白殭蠶少許為末酒煎半盞下產後淋瀝不止口苦盜汗乾荷葉阿膠煎酒下頭面及四肢腫痛筋縮拘急延胡索酒下血癥結塊刺痛難忍煎當歸酒下赤白等痢熱陳米飲下有孕不得服

保生丸 出衛生家寶方 治婦人胎前產後一切等疾

知母 細辛 石膏 火煨 白薑 火炮製 血竭 細研 黃芩

綿黃耆 洗蜜水浸一宿炙 肉桂 去皮不見火 沒藥 研 川當歸 去蘆

洗貝母 生地黄 洗淨 防風 去蘆已上各一分 甘草 一分半炙 糯

米 炒令微黃 黑豆 微炒 大麻子 瓦上炒已上各三分 川椒 去子炒 石

斛 淨洗剉蜜水浸一宿已上各半兩

右件各為末煉蜜為丸搗多杵為妙一兩分為五丸  
婦人胎前產後眾疾常服調氣進食在孕兩三月可

服安胎益血不生諸疾孩子易生一丸分作兩服温  
酒細嚼下或月候不調當歸酒下子難生死腹中橫  
生倒產衣不下死絕不語但看心頭有氣暖煎棗湯  
化開灌入口中立瘥產後惡血攻心刺腹脇腰疼炒  
豆淋酒下增寒壯熱嘔逆半身不遂血暈血崩帶下  
不止狂言飲食少味日漸黃瘦並酒下忌生冷毒物  
黃金散 治婦人產前後諸疾

生薑 一斤四兩薄切先炒令水氣盡再入米醋二升熬乾為度 當歸 白芍藥

熟地黄洗 桂心去皮 大黄炮各一兩

右五味淨洗細剉都炒乾同前炒薑為細末婦人產後敗血攻心暈悶欲死微有氣存細擦老薑炒令水氣盡用童子小便兩盞同煎百沸傾去慮去薑滓調藥二大錢熱服立醒或口噤以物挑開灌藥如分娩後產母雖無病亦依前湯使調藥服之使佳白粥壓下即不生血暈之患或胎不下者一服即下產後仍每日進藥一二服服後五七日一服使遂去惡少久後

百病不生產前後血氣及婦人尋常氣疾痛刺不可忍者並用無灰酒調服

牡丹散 治婦人脾血臟冷氣不和心胃煩悶不思飲食四肢少力頭目昏身體疼

牡丹 芍藥 白芷 乾薑 當歸 延胡索

陳皮穰去 官桂皮去 烏藥 苦杖 紅花 川芎各一兩

右件十二味並生杵為末每服一錢半用薑二片酒水各半盞同煎至七分溫服如初生產後每日三服

一七日後漸減服數如啞藥後腹內有小疼痛請不  
怪如啞至滿月永無病生

當歸散 治宮胃虛冷

當歸 附子

桂 各半 白朮 一兩

甘草 一分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓空心腹  
治婦人任性常多嗔怒傷損肝心上氣心氣結澀因而  
積涎怒而氣逆涎隨氣上其病狀聞得心前昏悶潰  
亂不快遂有一塊物上觸到咽喉即手足俱冷口噤

不開不省人事宜服此方忽懷孕而得此疾其治之  
與此方不同自有方在妊娠藥方中也

藿香

細辛

羌活

芎

菖蒲

各一分

獨活

牽

牛 各二分 半夏 三分

生

右細剉為末內有牽牛半夏自作一處杵為末煎前  
藥三錢取汁調牽牛半夏末一錢半為一服若吐涎  
即安若未吐如人行一里再進壹服

撮攬散 治婦人口乾煩燥上渴潤咽喉

川百藥煎 烏梅 甘草 石膏各等分

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸嚙化下

沖和補氣湯 十月十二月嚴霜作時有一婦人病四

肢無力痿厥溫熱在下焦也醋心者獨氣不降欲為滿也合目麻木者

陽道不行也惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也開目不麻者助陽道行

故陰寒之氣少退也頭目眩運風氣下陷於血分不得伸越而作也近火則有之

羌活七分獨活三分柴胡二分人參一分甘草炙半錢白芍藥

三錢黃耆二錢白朮二錢蒼朮二錢橘皮二錢黃蘗三分黃連一分

澤瀉一錢猪苓一錢麴二分木香 草豆寇各二分麻黃不去

節二分升麻半錢當歸身三分

右件分作二服每服水二盞去滓稍熱服食遠神效

麻黃桂枝升麻湯 治婦人先患渾身麻木睡覺則少

減開目則已而全愈又證已痊又因心中煩惱遍身

骨節痛身體沉重飲食減少腹中

黃耆兩半人參半錢炙甘草三分麻黃不去節半錢桂枝三分

升麻三分白朮三分半夏三分湯洗七次 生薑一分陳皮二分厚朴

六分木香一分茯苓三分澤瀉三分黃蘗二分黑附子分草豆

菟仁二分

右都作一服煎法如常

補氣升陽和中陽 治六脈俱中得弦洪緩相合按之  
無力弦在上是風熱溫陷入陰中陽道不行其證閉  
目則渾身麻木晝少而夜甚覺而開目則麻木漸退  
則絕無常開其目此證不得懼其麻木不敢合眼致  
不得體安重時有痰嗽覺中常似有痰而不利時有

躁作氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常  
惟畏其麻木不敢合眼是為苦楚觀其色脈形病相  
應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜  
重又云諸脈皆屬於目靈樞經云閉目則陽道行陽  
氣布週遍身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知  
其陽衰而陰旺也且麻目為風三尺之童皆以為然  
細按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛  
之人釋之覺麻不敢動久則自己以此驗之非有風

邪乃氣不行也治之當補肺中之氣麻自去矣知經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當煎去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也則實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏內而賊也時見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

黃耆五錢 人參三錢 炙甘草四兩 生草稍一錢去腎熱 白木二錢

當歸身二錢 橘紅二錢 佛耳草四錢 白芍藥三錢 草豆仁一錢 益陽一錢 酒黃柏一錢 蒼朮一錢 白茯苓一錢 外寒一錢 澤瀉二錢 升麻一錢 除濕一錢 導火一錢 濕導火一錢 陽助經一錢

右吹咀每服五錢煎法如常 時間服之

一方出海上方專治婦人血敗

佛尼降真二兩

右剉碎每服水一大碗煎至半碗空心連進二服

治婦人血露出本草

以蠶退紙燒灰服之

治婦人懷子不乳出本

史記云菑川王美人懷子而不乳來召淳于意往診

意以葇蕪藥一撮酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁

者有餘病即飲消石一劑出血如豆者五六枚

通血脈破血出本

取黃麻汁煮粥食之

治下閉血瘀女子帶出本

以沙牛角腮燒灰煖酒服

治婦人一切血病產婦一切傷損方見本門虛損類

班珠藤出本主風血羸瘦婦人諸疾

用班珠藤浸酒服

綖木出本主風血羸瘦補腰脚益陽道

以綖木浸酒服

木香丸出危氏方治婦人氣虛不能制血凡婦人稟受怯弱

其證有氣虛者血虛者氣虛者則不能管攝陰血時

腹淋瀝下濁白淫經候不調漏下五色形體瘦悴飲食減少不成胎也

木香兩半白茯苓

茴香黃炒益智仁

醋浸三夕陳皮去白各一

兩蒼朮三兩香附子

三夕焙乾附子二兩淨酒浸三夕焙乾

右末酒煮麩糊為丸如桐子大每服五十九丸不拘時候米飲多下服收效尤速

茸歸丸

出危氏方

治婦人血虛者胃之水氣不足則無煩作

熱手足掌心熱四肢煩疼或寒熱夜出盜汗口乾舌

燥此是血虛當補其血

嫩鹿茸

煨去毛酥塗炙

川芎

人參

肉蓯蓉

烏梅肉

肉桂

白子仁

牡丹皮

京芍藥

以上各一兩

當歸半兩

黃芪二兩

蜜炙

紫石英一兩

大熟地黄

洗淨再以酒蒸

二次焙乾一兩

右末米打薄糊為丸如梧桐子大每服五十九至六十丸空心淡醋湯下

黃耆白朮散

出衛生寶鑑方

治婦人四肢沉重自汗上至頭際

項而還惡風燥熱

黃耆一兩白朮兩半黃蘗酒製二錢細辛三分川芎五分羌活二錢

人參兩半吳茱萸五分當歸一錢半柴胡一錢升麻一錢

五味子三個

右件吹咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞

去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出不

止加黃栢半錢

延胡苦棟湯出衛生寶鑑方治臍下冷撮痛陰冷大寒

肉桂三分附子三分熟地黄一錢炙甘草五分延胡二分黃栢二分

三分為引用苦棟子二分

右吹咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服空

心食前

千金丸出保慶集方治產前產後一切風冷血氣等疾產前

胎氣不安腰腹多疼四肢昏倦妊娠臨月預合下每

日空心一服臨產五臟不通產尊中不生諸疾兼治

產後惡血不盡及胎衣不下憎寒壯熱吐逆煩悶皮

膚虛腫或血暈狂迷眼見神鬼能補勻血氣

金釵石斛別搗為末秦艽 細辛 川椒去子微炒防風

貝母麩炒乾薑炮大豆蘗施以合盪生牙焙乾熟乾地

黃細切糯米炒甘草炙已上各等分當歸焙切大麻仁 黃芩

石膏已上各等分

右精擇為末以爛蜜成劑入木臼中杵一千下分為七十二丸擇破除天德月德佳日合每服一丸溫酒調下產後產前赤白帶下溫酒嚼下產前後血氣薄

荷湯嚼下月信不通當歸酒下臨產艱難或三五日

難產及胎衣不下子死腹中橫生倒產死絕不語但

心頭有熱氣用藥一丸京棗湯研化灌之下喉立瘥

產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱憎寒煩悶月候

不調或多或少肢體虛怠皮膚浮腫產血不止虛勞

中風口禁不語半身不遂產前後赤白痢大小便秘

澀眩暈狂語頭痛面色痿黃漸成勞瘦飲食無味並

溫酒研下一丸產前臨月每日一丸至臨產當歸酒

下一兩丸催生五臟不痛子易生

當歸荆芥散 出家藏方 治女人血氣攻注四肢疼痛飲食減

少胸滿惡心日漸羸瘦及血海虛冷經脈不調夜夢

多驚疲癖氣塊並皆治之

荆芥穗 川芎 人參 去蘆頭 當歸 洗焙 桔梗 去蘆頭

附子 炮去皮臍 柴胡 去苗 防風 去蘆 丁香 白芍藥 蒲黃

炒 鼈甲 醋炙令黃 香白止 牛膝 酒浸一宿焙乾 白薇 肉桂

去皮 半夏 湯洗七次 羌活 去蘆 杏仁 湯洗去麩炒 木香 白茯苓

去皮 續斷 檳榔 沒藥 別研 肉蓯蓉 酒浸一宿焙 栢子仁

地骨皮 已上等分

右件為細末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分溫服不拘時候

烏金散 出危氏方 治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水

如葵汁

百草霜 鈿內炒煙盡為度 紫金皮 木泔浸煮熟炒焦色 粉草 炙

右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服

又方加入住紅蘇根金 子根心嘈猪血入鹽炒酒吐  
 紅飯飲下月水木瓜當歸浸酒赤白帶下蔥白連根  
 煎酒血海虛冷下白不止用鯉魚一個去腸肚不去  
 鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭灰內燒烟淡  
 留性去泥碾為末後入當歸頭甘草炒為末每服一  
 錢用醇酒調下

養榮湯

出楊氏家藏方

治婦人血海虛弱氣不升降心怯恍惚

時多驚悸或發虛熱經候不調可進飲食

白芍藥

川芎

熟乾地黄

洗焙

當歸

酒浸一宿焙乾

青皮

去白薑黃

牡丹皮

五加皮

海桐皮

香白芷

十味半兩

牛膝

酒浸一宿焙乾

延胡索

沒藥

別研

五靈脂

去石

肉桂

去皮已上味各一分

右件咬咀每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一枚  
 煎至一盞去滓溫服不拘時候

黃耆地黄丸

出衛生家寶

治婦人血虛肌瘦面黃腹脹飲食

不進

黃耆一兩 蜜炙 當歸去蘆酒浸三兩 川芎 熟乾地黄酒浸二兩

鵝卵礬朱二兩 火煨通亦盆 覆地上出火毒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心温酒

鹽湯下

麝珀散出衛生家寶 治婦人諸虛不足產前產後等疾大效

獨莖川當歸一兩 去蘆頭并稍洗以好酒浸一宿 次日漉出控乾切作薄片子火焙令

乾須秤紫團人參去蘆頭秤八錢切切片子慢火焙乾 琥珀四錢 別

末候眾藥成末子脚柏子仁半兩 揀去殼如眾藥 八琥珀末一處拌勻

仁一味入碾中碾一二三百碾却將眾藥末子又在碾內一處又同碾一二百碾炒出再用紗羅子

隔節餘者藥碾芎藭一兩 剉碎焙乾 官桂削去粗皮剉碎

又羅只候張蓋日熟乾三錢半令碾作甘草一兩 火上微炙透 熟地黄二

細末却拌和入藥尤妙白術乾好者剉碎 白茯苓一兩 剉

右件為細末每服三大錢水一鍾盞半煎至八分去

滓乘熟再入射香少許攪勻急以盞子蓋定藥少時

通口服空心食前如急要服便服抄二平錢泡射香

湯調下酒浸服亦得忌生冷油膩硬物

清肺湯 出簡易方 治婦人肺熱生風面痛用

當歸 防風 大川芎 剉 生地黄 洗切 赤芍藥 剉 黃

耆 去根 荆芥穗 各一分 甘草 炙半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後通服日三

服

滋陰萬病丸 出十便良方 治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩

肢節痠疼鬚髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰背

去血過多崩傷內竭胸中氣短晝夜不得眠情思不

樂怔怯多汗

熟地黄 當歸 各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九米飲

下不以時

地髓煎丸 通經脈補虛弱強脚膝潤肌膚

生地黄 一斤 牛膝 製了末二兩

右二件攪勻銀石器中熬可丸即丸如梧桐子大每

服三十九食前酒下

渾身碎痛飲子 治婦人勞倦

虎骨五銖茯苓

甘草 防風

藁本

白芷

各一銖

當歸

芍藥

續斷

吳朮

附子

茯苓

各三銖

右為粗末生薑棗鍊服不拘時

黃耆飲子

屢經大效方治婦人血氣不足夜間虛乏

有汗倦怠少力

黃耆

五味子

當歸

茯苓

各半兩

芍藥

遠志

麥子

人參

吳朮

各一兩

甘草

三銖

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分

去滓不拘時服神驗

地黃散

治婦人血少氣寒面色青白方

地黃

乾薑

各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下不以時

治婦人血海虛憊面無顏色飲食減少

灸艾綿

蒼朮

吳茱萸

白朮

各一分

當歸

半兩

右為細末煉醋煮麩糊丸如梧桐子大空心米湯下

二十九

治一切婦人血海虛弱將養不到變成勞候其狀面色青黑肌體消瘦多困少力吃食減少口無滋味經後過少多時盜汗頻發寒熱兩脇脹滿忽時氣痛

當歸 澤蘭 五味子 黃耆 官桂去皮 木香

山茱萸 獨活各一分 芍 牛膝 石斛 乾地黄

人參各半兩 藿香三銖

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下五

十九

治婦人血海虛冷肌肉黃瘁飲食減少腹中非時刺痛或有氣塊非時走作不定少有嗣續

延胡索 桑寄生 當歸 牛膝各半兩 獨活 芍

五味子 防風 藁本 白芷 木香 鼈甲

醋炙各一分

右為細末作一處相和令勻煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十九丸至五十九丸

溫濕阿膠丸 除風冷煖血海治月事過多血氣諸疾

方

阿膠 附子 熟乾地黄 洗焙 乾秘 白芍藥 各二兩 艾葉

兩四

右五味用米醋二升一處煮令盡醋用烈火焙燥碾為細末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒送下不拘時候

芎藭湯 調益榮衛滋養血氣治諸疾血虛羸短氣腹

中疼痛面體少色心怯驚悸虛煩汗出時發寒熱倦久無力妊娠溫和胞絡助氣產後順行餘穢滋生新血

芎 當歸 等分

右為粗末每服三錢水一盞半入酒少許煎至七分去滓食前服一方加宿砂

桑黃丸 治積煖血海女人諸疾補益

桑黃 半斤 牛膝 酒浸切 桃仁 去皮尖雙仁 炒研如膏 麥蘖 炒白

術 陳麩炒 當歸焙切 大黃剉炒各半斤 生地黄十斤絞自然汁

生薑十斤絞自然汁

右搗羅七味為末與桃仁膏同入二汁內拌勻瓷器盛甑內蒸一日取出焙乾搗羅末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹溫酒下漸加至三十九

治室女月露滯澀心煩恍惚

用鉛白霜研細為散每服一錢溫地黄汁一合調下生乾地黄煎湯調服亦得

治一切疾病

取預知子仁每日服二七粒患者服不過二千粒永瘥

治女子赤白沃止血養精神保血脈益氣嗜飲食利人

口齒去頭中熱風出本草

用水芹和醋作齏菹及煮食之並亦得能滋人患齏瘕不可食

治婦人瘕子臟急痛出本草

以一七月七日取槐實搗汁同器盛之日煎令可丸  
大如鼠屎內竅中三易乃愈

鬼膊藤

出本  
草

去風血

以鬼藤浸酒服之

治血氣逆心煩滿

用羚羊角或水羊角燒為末水服方寸匕

治婦人十二疾

出本  
草

以狗陰卵燒灰服之

治血氣

出本  
草

取蟪蠓血飲之若無生血取其皮甲名鼈皮煎汁代  
之

治婦人血痛寒上

出本  
草

以白馬蹄燒烟盡取灰末酒服方寸匕日三夜一

治女子胞中餘血不盡欲死者

以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效

治婦人傷子帶下諸血著臍腹中瘀痛身體黃瘦欲死

用乾地黃大黃各四兩杏仁四十枚春酒五升合煮

取三升分三服日夜一

治脚膝風濕產汁少力多疼痛及陰汁出御藥方

用燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處

理中茯苓湯出試效方單治婦人六十歲病振寒戰慄太陽寒水

也容呵欠噎嘔溢足少陽也口亡津液足陽明不足也心下急痛而

痞手以陰受寒也故急身熱近火熱在皮表寒在骨髓亦有拒寒戰慄

也溺黃赤而黑頻數寒溫勝也自病來身重如山便著牀

枕至陰溫勝也其脈診得在右關并尺命門中得弦而急

極細雜之以洪而極緩弦急為寒加之以細者寒水雜以寒甚者溫勝出黃色也

又洪大者心火受制也左尺按之至骨舉指來實者壬癸俱六旺也

脈按之俱空虛下焦無陽也先以輕劑去其中焦寒濕兼

退其洪火服理中湯

白朮 乾薑 炙甘草 人參 茯苓除寒溫各五錢

右件為細末每服秤二錢水一盞半煎至一盞冰之

冷寒服之謂之熱因寒用其寒以對足太陽之假熱

也以乾薑之新熟以瀉其寒也故曰真對真假對假

若不愈當以木附湯冰之令寒以補下焦元氣也

黃芪白朮湯出試效方治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸

而還惡風頭燥熱

黃芪兩一白朮兩半黃蘗酒製二錢細辛二分川芎半錢吳茱萸

半錢羌活二錢五味子三錢人參半錢炙甘草二錢當歸身一錢

半柴胡升麻各一錢

右件吹咀每服半兩水二大盞入生薑五片煎至一

盞去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出

不止加黃蘗一錢

療胸脇肢滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾

血四肢清目眩時前後血病名血枯得之年少時有

所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來

治之方素問云出本草

以烏鰂魚骨薏茹二物并合之丸以雀卵大如小豆

以五丸為後飯飲飽魚汁以利腸中及傷肝也注云

飲後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳

魏志華陀 治婦人長病經年世謂為寒熱注病冬月

中陀令坐槽中平旦用冷水汲灌云當滿百始七十灌冷戰欲死陀令滿數至八十灌熱氣乃蒸出囂高二三尺滿百灌陀乃使然火温狀厚覆衣良久汗洽

出著粉便愈 出鳳科 集驗方

烏金散 出朱氏 集驗方 治婦人諸般發搐

真川墨乃松烟也磨酸醋緩吸兩甲即效婦人產後頭搖目不開服之便住次用豆淋酒一味封過一宿次日兩服好

治婦人血噤失音衝惡 出本草

用鑰匙以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

治因血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也

以諸血並生飲之

神仙濟陰丹 治婦人胎前產後一切積氣血塊血癥

血瘀血暈血虛血悶血壅血崩血淋血露赤白帶下  
 月事不調臍腹疼痛腰膝沉重乾嘔惡心不思飲食  
 五心煩熱四肢倦怠或寒熱嘔吐酸水頭目昏眩遍  
 身隱痛坐卧不安經絡凝滯榮衛不調氣血虛弱變  
 成血勞面黃體瘦夢中驚悸虛怯盜汗或產後有失  
 調理至天陰雨下渾身疼痛常服此藥升降陰陽溫  
 緩血海或子宮久冷或少病三四十丸細嚼炊薑酒  
 下立愈若室女經脈不行宜服之治腸風食毒下血

不住槐花劉寄奴各等分為細末用米湯空心送下

妙

敗薑 青皮 陳皮 三稜 蓬朮 各一兩 烏頭 一升

以上六味先以米醋煮  
 焙乾為度醋用二升 熟地黄 生地黄 赤芍

藥 當歸 白芍藥 劉寄奴 薑黃 肉桂

蒲黃 各半兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十九空心薑

酒食前送下

治婦人口乾方

用黃雞肝一具燒灰酒下即安瘥

普濟方卷三百二十八

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官學錄臣常循

謄錄監生臣宋逢震