

科簡效方



脣緊

青布燒灰酒調下

脣齶

指頭十指戒去華盛嫩命加

栗子一個連殼燒灰硫黃等分同研傅
凝水一粒

固牙法

青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用
擦牙永無齒疾併可洗目至老不昏

齒
梗米糠燒取白灰日用擦牙則齒黃變白



齒疎

蘆甘石
寒水石等分爲末每臼指蘸擦之
自密忌用刷牙

齒搖

乾地黃
羌活
蘆等分爲粗末每服一錢水一
酒少許煎十餘沸去滓溫漱冷吐

齒損

因磕傷打動者蒺藜子爲末日日揩之

骨碎補銅刀細切慢火炒黑爲末如常揩齒良久



吐之此方併治元氣不足牙齒浮痛

齒齦

胡桃肉細嚼食之

齒蛀

花椒 牙皂醋煎漱之

雄黃爲末和棗肉丸塞孔中

冰片 硼砂等分擦之

齦衄 俗呼牙宣其實血自齦出也

鮮竹筍二兩醋浸一宿含漱三四次愈童洩熱漱



南京中医药大学图书馆版权所有

亦佳

枯礬敷擦五倍子燒存性研敷亦妙
松鍼熬汁入飛麵少許攢勻澄飲

齦痛

俗呼齒痛其實齦是肉故知痛齒是骨則之亦不痛也不腫者屬虛火

甘松

硫黃等分爲末泡湯漱之淫羊藿煎湯

齒漱亦妙

西洋參切片貼之龍眼肉亦可貼

齒長出礙于嚼物者常服乾地黃良

齦腫

腫痛畏風者風火也



南京大学图书馆版权所有

白芷焙乾爲末蜜丸櫻桃大硃砂爲衣每服一
荆芥煎湯嚼下

蘆菔子十四粒生研人乳和之左痛點右鼻孔右
痛點左鼻孔

荔枝殼燒存性研末頻擦之

腫痛喜吸涼風者溼熱也

槐樹枝煎濃汁二碗入鹽一斤棗乾炒研日用揩
牙或用生絲瓜一個擦鹽火燒存性研末頻擦涎
盡卽愈腮腫以水調傅之亦效

氯水齶加冰糖



孩兒茶 硼砂等分爲末頻擦涼水漱吐勿嚥
齦爛

生地一斤鹽二合擣和成團以溼麵包煨令烟盡
去麪入麝香一分研勻日夜貼之

絲瓜藤一握川椒一撮燈心一把水煎濃汁漱吐

牙疳

黃檗 青黛各一冰片分研細擦

雄黃一錢銅綠二錢爲末擦

五倍子 青黛 枯礬 黃檗等分爲末先以鹽



湯漱淨參之

牙關緊

白礬 鹽等分擦之涎出自開

牙歇脫

烏梅 一個含之卽止或紙撫搖鼻取嚏亦妙

南星研末生薑汁和塗兩頰一夜卽上

咽喉猝噎

羚羊角研末飲服方寸七

橘紅研末水一錢煎減半熱服



炭末蜜丸含之嚥汁

失音

猪脂一斤煉過去渣入白蜜一斤再煉少須濾淨
冷定不時桃服或用梨汁頻飲或以人乳竹蔗
服或以蘆菔汁少加生薑汁和服

馬屁勃 馬牙硝等分研末沙糖丸如芡子大含
之

不語

美酒半升人乳半合和服或煮淡豆豉湯加美酒



南京中医图书馆版权所有
大学图书馆版权所有

服之

因驚而猝不能語者蜜陀僧末一匕茶調服

喉閒癰肉

綿裹箸頭蘸鹽點之日五六次

喉閒結塊

不通水食危困欲死者百草霜蜜和丸芡子大新
汲水化服一丸灌下甚者二服必效名百靈丸

喉癌 俗呼喉蛾

荆瀝徐徐嚥之



頭髮指甲燬存性研吹之男右用女左指髮女左
用男右指髮男左用女右指髮女右用男左指
燈心一錢黃檗分並燒存性白礬七分冰片三分
每以一二分吹之

喉風

壁錢卽喜兒窠數箇瓦焙研細吹之卽血散痰消而愈
黃瓜去瓢入生礬末裝滿仍將瓜口蓋好外以紙
封之挂有風無日處陰乾過驚蟄後七日取下研
細收藏吹入患處立瘥實火牙痛擦之立止兼治



南京中医药大学图书馆藏

急心痛欲死但口有微氣者用點眼四角立愈

蘇薄荷

十四兩

柿霜

五兩

桔梗

四兩半

甘草

三兩半

八川百藥煎

五錢

防風

一兩

砂仁

四錢

建青黛

三錢

片元明粉

白硼砂

各二錢

研細末

蜜丸

大

名玉液上清丸治喉風痛口舌生瘡風痰壅頭
目不清諸證每服一丸噙化妙

喉爛

紫蘇葉八分蘆菔湯煎服

生末

蘇薄荷葉研細絹篩

三分

兒茶末

二分

黃檗

以荆芥

穗細甘

蘇薄荷葉研細絹篩

三分

兒茶末

二分

黃檗

以荆芥

穗細甘

紫蘇葉八分蘆菔湯煎服

生末



草煎濃湯浸至柔軟取起攤瓦上慢火炙至金黃色如黑色者去之再以白蜜湯漬過曬乾研取末用一釐

白龍骨末各二釐
草末珍珠細末各五釐
共研極細粉加梅花冰片二釐半
生薑者用四釐

堅細白芷末二釐半
再研勻入瓷瓶封固吹之卽愈若初起腫熱已退但
者多加薄荷取其辛涼能發散也若腫熱未甚
宜長肉者可加兒茶龍骨此方兼治各種口瘻甚
效

飛青黛 蘇薄荷各八分 飛淨雄黃 白硼砂 眞
珠各三分 兒茶五分 冰片一分 西牛黃半分 各爲極細末研

勻瓷餅封固勿令泄氣吹之卽愈。並治喉瘡。乃杭州定水寺祕方也。一方有膽星無真珠。

黃解毒丸

穀賊

稻芒刺。謂也。

咽中痛癢用脂麻炒研白湯下。

硼砂。馬牙硝等分爲末。蜜和五分含嚥。

髮繞咽

余舊木梳燒灰服。

竹木刺咽

乘涼散

故鋸燒赤漬酒乘熱飲之

金銀釦鑲鯁咽

鵝羽燒存性研白湯下

多食鴉糖自下亦治錢鯁魚骨鯁

銅鐵物鯁咽

南燭根燒細研水調一錢服

大蒜塞鼻中卽出

諸骨鯁咽

鹿角爲末含津嚥下



魚骨鯁咽

臘月取鱖魚

卽鱠魚

膽懸北檜下令乾每取

許酒煎化溫呷以吐出爲度卽鯁物已在臟腑

而黃瘦腹痛者服此皆出若無鱖魚之處則蠡魚

魚卽黑

鯩魚

卽草

鰆魚之膽臘月皆可收之

雜物鯁咽

舌解衣帶目窺下部不下卽出

舌瘡

延胡索

錢一黃連

黃檗

各五分

青黛

蜜陀僧各三

分

中醫

卷八

十一

中

國

大

學

圖

書

館

版

權

有

所

研細吹

黃丹

黃連

青黛

蜜酒

舌羊脛骨中髓和鉛粉塗

舌蕈

沙帶目癰不可凹出

先以醋漱再用茄母燒灰飛鹽等分米醋調稀時

時擦之

臘草根煎之點眼以膏可效之

重舌

更與銀礬各半錢同研末水服無驗後又以銀礬研

一黃連

黃芩

各三

牙硝 青黛

硃砂

各六

雄黃

一牛黃

硼砂

各三

冰片 分各爲細末研勻先用

思薄荷末抹口再以藥繆此方兼治喉瘡



生蒲黃末擦之

舌腫

甘草濃煎熱漱頻吐

生蒲黃研細敷之或以盆底煤醋和厚薄舌之上

下

秤錘燒赤淬醋一瓊飲之

木舌

硼砂末生薑片蘸揩

僵蠶研末吹之吐痰即愈



蚯蚓一條以鹽化水塗

舌縮

生艾擣傅之無生艾以乾艾浸溼擣

舌苔

薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之

薄荷 黃檗 硼砂等分冰片減半蜜丸彈子大
含化兼治口舌粟瘡

舌齶

海螵蛸蒲黃炭等分研繆



割舌將斷

急用雞子白軟皮袋好以花粉三兩赤芍一兩

白芷各一兩

研極細蜜調塗舌斷處血卽止再以蜜

調蠟稀稠得所敷在雞子皮上蓋性軟能透藥性
故也當勤添敷三日舌接住方去雞子皮只用蜜

蠟勤敷七日全安

舌頭齦斷

先以乳香沒藥煎水含口中止痛後急將水銀

寒水石

黑鉛

輕粉

硼砂研細粉頻抹以



中国药大学图书馆版权所有

長全爲度

痄腮

濃煎葱湯頻洗

赤豆爲末醋和涂

蝸牛同麵研傅

項強

僵蠶炒爲末每五分或一錢酒泡薄荷湯下日三

項頰

五加皮爲末酒調塗項骨上乾則易



烏鬚

真鳥骨小牝雞二隻以黑脂麻一味同水
卵時取先放者一枚開孔用硃砂末填入封好
眾卵抱之出籬時取起其藥已自結實研細粉蒸
餅丸綠豆大每酒下五七丸

生柏葉末猪脂和丸彈子大每以布裹一丸納泄
水中化開沐之一月色黑而潤矣

曖氣

旋覆花三錢蘇葉三分煎湯呷

呃逆

濃煮蘆根汁飲之或以枇杷葉濃煎服

橘皮 竹筍等分煎服

恶心 乾嘔也

苔白不渴者寒也 橘皮或生薑煎湯服口苦或
者火也 黃連煎汁飲

吐酸

黑山梔錢三煎濃汁入生薑汁少許和服

黃連六分吳茱萸一分煎湯飲



生黑脂麻嚼嚥或生瓜子亦可或爛嚼胡
生薑湯下

嘔吐

蘇葉一錢連二分煎汁徐呷下此治火證

蘆菔蜜餞細嚼嚥此治氣證

乾紅蓮子細嚼嚥此治虛證

咳燥嗰也

猪脰一具薄切煮食不過二服

甘梨恣啖老人無齒者加白蜜蒸服



南京中医药大学图书馆所有

胡桃肉不去衣甜杏仁去皮尖大棗肉共搗爲丸
彈子大卧時嚼服
有痰而嗰也

浮海石爲末蜜丸服

蘆菔子炒杏仁去皮尖炒等分蒸餅丸麻子大每服
五丸時時津嚥

芒根煅存性研生豆腐蘸三五錢食之

哮

每晨飲豆腐漿以愈爲度



北京中醫大學

西醫藥學圖書館版權所有

白前研末溫酒調服二錢匕

蘆菔子一合研煎湯頻服

喘

胡桃肉

不去衣去尖皮

生薑各一兩研膏入煉蜜

丸彈子大卧時嚼服

人參爲末每服三錢匕雞子清調之五更初服便
可仰卧年久者再服必愈

因奔馳勞瘁驟飲冷水成喘者用竹葉三斤橘皮
三兩水一斗煮取三升去滓分三日服一劑愈



南京中医药大学图书馆版权所有

肺癆 頻吐涎沫煩躁而不渴者

甘草二兩水三升煮取升半分再服

天門冬搗取汁一斗
醃酒一斗
飴糖一升
紫菀末合盛銅器內隔湯煎至可丸每服杏子大一枚日

梨汁

地黃汁各一升

蜜各一兩

緩火煎沸和勻

待涼細細含嚥

肺癆

咳吐濃血臭痰胸膈痛悶者是也

淡竹遞二合日三五服

白花百合洗淨搗汁日服一錢七日全愈

桔梗

一兩

甘草

二兩

爲末每服二錢冰一錢煎

分法

滓細細溫呷亦治咽喉生瘡

咯血

半錢

甘草

一兩

蜜丸

一錢

研末

米湯送服

杏仁

半錢

炒

青黛

一兩

研匀

黃蠟化和作三十餅

子

每服一餅以乾柿

半箇夾定溼紙包

煨香簪去

火氣嚼食粥飯送下

日三米湯

紅棗肉

二斤

沙糖

一斤

麻油

四兩

共搗爛每晚服

一兩

良

蘆菔

和羊

或鰜魚煮熟

熟頻食

吐血

大黃

甘草

一兩

蜜丸

一錢

每日正裏



中大

南京

大學

圖書館

藏書

權所有

梗米五錢蓮子心七枚研末陳墨汁丸如梧子大童便
下又方紅蓮子同豬肚煮爛不可放鹽每旦五更
恣啖以愈爲度

藕節荷帶各七枚爲末米飲下一錢日一
嘔血

黃檗蜜塗炙爲末麥冬湯下二錢

側柏葉研末米飲調服二錢

鱠膠長八寸廣二寸炙黃刮一錢以甘蔗節三十
五箇取汁調服



睡血

甜梨

酸者不用

取汁二十

生地汁

茅根水

各

杯

蘆菔汁

麥冬煎取濃汁

各五

六

汁和勻重濾

去渣火上煎煉入煉白蜜一斤飴糖

柿霜各八

兩

生薑汁半小杯攬勻火上再熬如稀糊收好窖去

火氣每日點服三次名元霜紫雪膏

童洩頻服

海螵蛸研粉驢皮膠丸如綠豆大藕節湯下三錢

上消飲不解渴也

白茅根洗淨搗汁恣飲

甜梨汁或蘆菔汁熬稠入蜜同收點湯飲
冬瓜瓢或苗葉不論鮮乾並煮汁飲頻食生梨亦妙

中部諸證

腋氣卽狐臭

生薑汁頻塗

龍眼核六枚胡椒粒十四粒共研勻頻擦之

白豆仁

丁香

藿香葉

零陵香

青木香



南京中医药大学图书馆版权所有

白芷

桂心

沉香各一
兩

香附二
兩

甘松

薑歸各一
兩

錢檳榔一枚

爲末煉蜜丸如豆大瓷器封盛每日二

夜一含一丸嚥汁五日口香十日體香腋氣除

七日衣被香以後只須每夜含一丸三七日下風

人聞香四七日洗手水落地香五七日把他人手

亦香忌五辛此宋時宮方也治腋氣身臭極效但

須戒炙燉之物兼服二冬膏庶久餌不耗真氣

臂痛

當歸浸醕酒頻飲



北京中医药大学图书馆版权所有

桑枝熬膏服

體肥痰入于絡者指迷茯苓丸

掌痛

椒鹽末等分醋和塗

鵝掌風

艾湯乘熱熏洗

豆腐泔水日日洗之

手背皸裂

生白果嚼爛塗之



南京中醫大學圖書館版權所有

老絲瓜燒存性研豬油和塗

蘆菔煮熟搗傅

凍指欲墮

馬糞煎湯漬半日

凡患凍瘃者初夏取極熟櫻桃數十枚入瓦罐內
聽其化爛成汁俟五月五日午時塗向患各處不
發矣

指腫痛
防患毒漿水入鹽熱漬之冷卽易



指痛木癢

防患毒以蠅蠍

銀硃共攜擦之

指麻

不知痛癢者經霜桑葉煎濃湯頻洗

指甲軟薄

僵蠶燒烟熏之

膈食

乾柿飯上蒸熟同乾飯頓頓嚼食之不飲湯水半

月必愈



冰片一硼砂二飛金三寸共研細紅糖
卽通

油透舊木梳燒灰酒調下

胃脘痛

香附子

略炒三兩烏藥略泡二兩

共研細水醋煮蒸餅糊丸

如梧子大名青囊丸每服二三錢白湯下並治氣

鬱諸病

胡桃肉一枚以大棗肉一枚夾之溼紙裹煨熟細

嚼生薑湯下

鰻鱺淡煮薑葱酒皆可用飽啖三五次瘥

但勿入鹽醬

腰痛

地膚子爲末酒服二錢

元胡索去皮金鈴子去核等分爲末旋覆花
二錢

腰痛

黑脂麻熬香研末溫酒下服至一斗永瘥

栗子不拘生熟細嚼服以愈爲度

羊腎恣啖良

腹痛

鹽炒熟布裹熨痛處

烏藥水磨汁一錢入橘皮一片紫蘇一葉煎服

白沙糖水調服

小腹痛

鴿糞一合研極熱酒一鍾和勻澄清服
乾黃土煮數沸去滓溫服
黃芩木通甘草各一錢煎服

腹脹

(氣病)



香附子一斤童便浸三日焙爲末丸如梧子大旋

覆花湯下四五十丸日二

陳香櫟

四兩去瓢

人中白

三兩

共研末每服一錢

宜湯

忌鹽百日

肉蓯蓉

兩

紅棗

三

青礬各一斤入罐內燶烟盡爲

末再將香附

童便製

麥芽

半炒

各一斤爲末和前末翻

丸每酒下二三十丸治單腹脹大四肢極瘦名諸

鹽保命丹

腹腫

水病



医药大学图书馆版权

白茅根一大把赤豆三升水三升煮乾食豆水隨
小便下

五苓散三錢白滾湯下日三

冬瓜恣啖

臍聞出水

附子

二錢甘遂

半錢

蛇牀子

一錢

麝香

五釐

各研細末和勻

填臍中外加膏藥封之

癬塊

痰凝氣滯之病在皮裏膜外者

延胡索爲末猪脰一具切塊炙熟蘸藥食之

臭椿樹皮內肉打碎煎膏貼患處塊卽下行而消
生芋艿一升敲裂醃酒五升漬半月飲之

此結塊于腹內者

積聚

陳醬茄燒存性入麝香 輕粉少許猪油調貼
雄黃 白礬各一兩共研麪糊調膏攤貼患處
者再貼必消

皮硝一兩大黃末八分獨蒜一箇攜餅貼之以消爲度

腹內生蟲

空腹食榧以愈爲度

二代本草綱目卷一百一十五

生蕪荑 生檳榔等分爲末蒸餅丸梧子大每白

湯下二十丸

雷丸煎服

中蠱 含白礬不瀝而反甘嚼生豆不腥者是也

濃煎石榴皮飲

鬱金末三錢米飲下

畜刺蝟則蠱毒不入

中毒 毒之爲毒暗藏于服食起居中更有令人不可
方物者如日用飲食其物性相反不知誤食以
及庖人不善烹飪未得其法食之卽
爲中毒不必服砒鵝始云中毒也



解諸藥毒

濃煎甘草湯涼飲或飲地漿水

白扁豆研末涼水調服

解蒙汗藥毒

令人身不能動目瞪不言口吐涎沫服薑

飲冰水

白茯苓

五錢生甘草二錢

甜瓜蒂

七箇陳皮分

煎冷服大

吐而愈

解誤服相反藥

蠶退紙燒灰冷水服



南京中医药大学图书馆版权所有

解冰片毒

飲新汲水

解椒毒 令人身冷而麻口吐白沫

飲地漿水或新汲水或喫大棗二枚

解桐油毒

食乾柿餅

解巴豆毒

芭蕉葉搗汁服

石菖蒲搗汁服



南京中医药大学图书馆版权所有

大黃 黃連煎湯冷服

巴豆貼肉潰爛

生黃連末水調傅

解諸熱藥

綠豆煎湯冷服

甘草煎湯冷飲

解誤服人參

蘆菔搗汁服或搗蘆菔子煎湯服

解多服犀角



麝香一字水調服

解石藥毒

芹菜或葵菜搣汁飲

解水銀毒

開口花椒吞二兩

解銀黴毒

銀腳也性主腐爛皮肉今人每用以去癰
脣齒豁裂七竅流血之外傷係粘著腸胃漸
漸腐爛令人如患病狀或半月一月而死並無

以生羊血灌之吐盡即愈或黃泥水亦效

解鉛粉毒

面青腹中墜痛欲死者是



蘆菔搗汁飲

麻油 蜂蜜 餡糖和服

生勃臍恣食

解輕粉毒

川椒去目白湯吞服

生扁豆浸胖搗汁服

解吞金銀毒

紅棗煮爛恣食

飴糖一斤頓食盡



南京中医药大学图书馆版权所有

雞屎半升水淋取汁一升服之日二已外者奇活
解吞銅鐵錫毒

木賊草研末雞子清調服

王麵筋置新瓦煅炭研開水調服

連根葱煮汁麻油和服

吞鍼入腹

慈石研末黃蠟和揉如鍼樣涼水送下

黑砂糖和黃泥吞下

銅錢銅鉤入腹



鵝毛 象牙等分燒灰慈石皂子大一塊蝦共研

末新汲水下五分

瓷鋒入腹

香生紅蘆菔搗爛吞

乾餳糖頻吞

玉石入腹

葱白煮濃汁服之

解鍾乳毒

豬肉煮食

本草綱目一卷加水煎服



南京中医药大学图书馆版权章

解雄黃毒

白芷三錢煎服以鵝飼探喉

防己煎服

解皂礬毒

山楂也甚效亦用脚之皮主通

麥麴打糊頻服

燒丹患臘證者以酒或黃酒煮

解鹽滷毒

食鹽者宜熟薑一瓣嚼與服勿日布

中生甘草三兩煎汁冷服

殺鴨以鴨頸塞口中飲其熱血卽活

生黃豆以水研絞汁服

解砒霜毒
煩躁如狂心腹疼痛頭旋欲吐不吐面色
青黑四肢極冷者是



硼砂一兩研末雞子清七枚調灌

柏樹根或冬青葉或夏枯草擣汁服

明礬大黃研末新汲水調灌

中砒毒渾身紫癰者

急作地漿頻灌待癰散盡一吐即甦雖冬月亦可
此法若砒霜敷身患處痛潰以溼泥頻塗設毒
氣入內而作吐瀉飲冷米醋解之或生綠豆研末
麻油調服

解野蕈毒



北京中醫大學圖書館版權所有

生甘草

二兩

白芷

三錢

煎服以鵝翎探喉不

吐

止

血

毒

解

解

解

解

金銀花

搗汁服

綠豆生研新汲水攬之澄清服

解鉤吻毒

卽斷腸草水莽藤

一名胡蔓草又名火把花黃藤

麻油或桐油或韭菜汁灌之

白礬化水服

金銀花

甘草

各一兩

大黃

一錢

煎服入內煎慈母

解草烏射罔烏頭附子天雄毒

綠豆或黑豆煎湯冷服

甘草 黑豆同煎冷飲

解藜蘆毒

雄黃一錢研水服

藜蘆傳內毒氣入內煎

服

解芫花毒

防風煎湯服

解仙茅毒

大黃 朴硝煎服

解藤黃毒

白芷

頭風目赤眼瞼瞤瞤不生睛



南京中医药大学图书馆版权所有

壅菜水溫服

解黃蠟毒

冬葵子或白菜煎湯服

費青蠍頭

解蟹螯蛇青毒

六一散涼水調服

解蛙毒

車前子搗汁服

一加蒜
一煎頭

解鱠魚毒

食蟹解之 嘁鱠魚犯荆芥作地漿水飲之

嘂



鮎魚忌犯甘草

解河豚毒

茅根

蘆根

各兩

瓜蒂

一箇煎服

紫蘇或薄荷煎濃汁飲

麻油灌之

解蝦毒

淡豆豉一合新汲水浸濃汁燉服

桔皮煎湯飲

解魚毒



生薑汁或藕汁或蘆根汁灌之

誤犯荆芥誤同

柿食均濃煎木香飲之

解鼈毒

靛青水灌之

鹽化水飲之

解田螺毒

鴨涎灌之

冰片三分水化服

解鳩毒

凡申此毒者白眼朝天身發寒顫心中明白不能言一閉目卽死



南京中医药大学图书馆版权所有

犀角磨汁服

金銀花八兩煎汁一椀入白礬

寒水石

各三錢 石菖蒲二錢 麥冬五分

煎灌待日不上視

言照方減半再服二帖愈

解雄雞毒

磨犀角服

醋飲之

解牛馬內毒

魚木香鷄之

飲人乳

煎服十劑可愈

醫學圖書館藏



石菖蒲研水服
蘆薈香少着點

蘆根或菊花連根搗汁酒和服

解羊內毒

栗子殼濃煎服
等量去殼取肉

甘草煎服

解豬肉毒
如瘦肉煎熟並水醃服

白沙糖一兩白湯調服

解芭蕉根搗沫服
兩腮開水呑各三匙

解狗狼肉毒
雞搗和水灌之



蘆根搗汁服

杏仁去皮尖四兩研開水和分三服

解馬汗毒

猪骨灰或淡豆豉或頭垢並水調服

服猪脂一斤佳

解白果毒

驟然一聲卽暈去者是也

白果殼煎服

解白瘡頭煎湯頻灌

滾水磨木香入麝香少許灌



解苦杏毒

杏樹皮煎服

解櫻桃毒

青蔗漿灌

解諸果毒

猪骨燒灰煎服

玉樞丹水調服

解鴉片毒

文魚卽金活搗和水灌之



肥皂杵爛和水絞汁灌之

生南瓜搗汁頻灌

飲水停中

五苓散白湯調服二三錢以愈爲度

飲茶成積

蒼朮兩製南星

青皮

橘紅各三錢

醋煮蒸餅丸

梧子大淡薑湯下二三十丸

酒醉

葱白
豆豉煎湯飲



南京中医药大学图书馆版权所有

菊花煎濃汁服

大醉不醒者人乳熟黃酒和服外以生熟湯洗其身則湯化爲酒而人醒矣瓜果過度者亦可用此法

燒酒醉

蘆菔汁 青蕉漿隨灌
綠豆研水灌或以枳椇子煎湯灌
大醉不醒急
以熟豆腐徧貼之冷卽易以醒爲度外以井水浸
其髮併以故帛浸溼貼于胸膈仍細細灌之或童

瀆灌之至甦爲度凡燒酒醉後吸咽則酒焰內燃而死亦有醉後內火如焚而反惡寒者厚加五味亦能致死卽口渴飲冷只宜徐徐飲之以引毒外達若連飲過多熱毒反爲驟冷所遏無由外達亦多閉伏不救

酒積

雞肫腰子乾葛等分爲末蒸餅丸梧子大每酒下五十九粒

飲食過多點此照



橘皮五錢濃煎細呷

蘆菔生嚼數片

米穀食積

大麥芽煎服

麵食不消

生蘆菔恣啖或以子煎湯服

食肉過度

山楂四兩濃煎服

牛肉過飽



半稻草濃煎服

過食鴨

食梗米泔水溫服

過食蛋

蘇子煎服

飲醋

過食魚

燒魚鱗研末水服一錢

啜芥醋

過食魚



過食蟹

蘇葉煎湯入白沙糖服

過食豆腐

蘆菔汁服

過食荔枝

荔枝殼煎服

過食菱

飲酒或薑汁

過食萐苣蘆菔



南京中医药大学图书馆版权所有

薑汁服

過食瓜

飲酒或飲鹽湯

過食紫菜

飲醋

過食木耳

冬瓜汁飲

過食筍

生薑汁合麻油服



過食索粉

啖杏仁良

諸果成積

桂心

錢五分研細飯九

綠豆大大人十五丸小

兒七丸白湯下

中消食不充飢也

綠豆

小麥白梗米各一斗炒熟磨粉每白湯服

一杯三五日效

羊肚爛煮空腹食之



南京中医药大学图书馆所有

雄猪肚一具洗淨以黃連兩花粉 麥冬 知母

五兩

麥冬

知母

各四兩

爲末入肚內線縫口蒸爛搗細入蜜少許

水

如梧子大每百丸米飲下名黃連豬肚丸

中醫下部諸證

瘧

手足痠弱不能運動俗名軟癱是也而體爲甚故列于下部

羊腎一枚煮熟和米粉六兩煉成乳粉空腹食之

以愈爲度

杜仲二兩切碎酒水各半煎服三日能行又三日
愈矣 虛而挾溼者草薢十二兩 杜仲四兩搗末每旦



南京中医图书馆藏

上海图书馆藏

酒服三錢效忌牛肉

痺

病在陰曰痺。痺者氣閉不通或痛或癢或頭眩或緩弱與瘓相似但瘓屬虛而痺屬實乃風寒溼三邪入于陰分久則亦有化火者。

川芎

兩

生薑

三

大葱把

水煎熏洗

燒酒糟初出甑時乘熱將腰足插入熏洗數次卽止病久化熱者黃檗酒浸透焙乾爲末每服溫酒下一二錢名潛行散

鶴膝

別無所因而膝骨日大上下肌肉日枯乃肝腎大

虛也宜服虎潛丸因虛而風溼外襲者十全大補湯加杜仲牛膝獨活風溼盛者四物湯加荊芥半

膝送服大活絡丹

小活絡丹方中只用草烏乳沒地龍數味者勿服

川芎

下利後膝腫痛乃風邪乘虛入三陰也宜用雷火

鍼法每日焫之不可著傷肌肉方用陳艾

五丁香

粗工所傳

分麝香二分合研勻入紙筒中痛處襯厚紙三五層

點火焫之以筋脈活動爲度數日自效

粗工所傳雷火鍼用

藥甚雜鍼法亦謬不可信也

若初起漫腫不紅屈伸不利者

防其潰破急用陳年芥菜子研細以生薑汁葱白

汗和白蜜調塗一炊時患處起疮疤乾脫痕
上二法若膿成者不可用也

脚氣

田螺搗敷兩股便覺冷氣下趨至足而安

鹽擦腰足至足甲旋用熱水浸洗或用鹽滷煮熟
置深桶內浸之

甘遂末水調傅內服濃煎甘草湯常以杉節或蘆
菔煎湯洗之可除根

脚氣入腹威靈仙爲末酒服一錢痛減一分藥亦

減一分

腳氣衝心白檳榔十二粒爲末分二服熱童便調
外用附子末鹽滷調塗涌泉穴

腳駁紅腫

熱如火炙俗名赤遊風用鐵鑄水塗之

腳心腫痛

脚因遠行久立所致者水調蚯蚓糞塗一夕

因毒熱而痛欲脫者苦參煮酒漬之

腳冷難行



白酒或酒腳盛大口盃中灰火溫之漬腳至膝時
加灰火勿令冷三日止蒸藥蘇毒融金
溼氣腳腫

葱湯日漬三五次

腳多溼汗

濟水無効患客觀溼脚

用生辣根

楊花著鞶轍內

斧

白木

雨

東面干

正卦心

發木

腳極溼爛

愈後更宜潤益云頭脚毒寒也通

茶葉嚼爛傅之

黃丹

花蕊石研末繆

蚌蛤粉研細繆

過末

趾縫出水

病中過飲涼水愈後見此卽俗云脫腳傷寒也
脚用薏苡仁三錢芩二兩白朮一兩車前子

兩錢桂一錢

五錢

水

煎服十劑永無後患名驅溼保脫湯外用生蜂房

脚研末醋調搽之

腳重凍瘃

以醋洗足研藕傳之或蒸熟藕擣爛塗

鷄掌上黃皮焙研油調塗或濃煎黃蠟塗

南京大學圖書館版權所有

桐油

一
椀
握

熬化瓶收每熱湯洗後搽之

戶腳坼裂

不分冬夏者雞屎糞湯漬半日取瘥乃止

腳底木硬

牛皮膠生薑汁化開調南星末塗烘物熨之

嵌甲

而愈亦當甲如故

趾甲入肉不能行履濃煎陳皮湯浸良久甲肉目

離輕翦去以虎骨膠搽之 已成瘡者蛇蛻一條

燒灰雄黃一彈丸大同研以溫漿水洗瘡鍼破貼

之

胡桃皮燒灰貼

礬石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去甲角不
旬而愈亦治割甲成瘡

遠行足趼

水調半夏末塗一夕

舊草薢浸溺桶內半日以新瓶燒紅取草薢放紅
瓶上以腳踏之令火逼溺氣入內卽消此名腳墊
毒失治能潰爛殺人故遠行人息足時宜浸足于



溺桶中可免諸患也。起疱者水調生麵塗之。
凡遠行者以蘆菔子炒研和白礬末鋪鑊內則
不疼

腳跟腫疼不能著地

黃牛屎入鹽烘熱罨之

轉筋

大蒜擦足心令熱卽安再以冷水吞蒜一瓣

釜底墨研細酒和服一錢

鹽滷煮熱以長桶盛而漬之

泄瀉

車前子爲末米飲下二錢七

生薑連皮切如粟大細茶等分煎服亦治

四兩

黃連

一兩

剉如豆大慢火同

炒令薑乾脆深赤色去薑取黃連爲末每

一錢

腹臘茶清下甚效

帶下

俗名痢疾

鮮荷葉燒研每服二錢陳皮甘草湯下

黃連

白芍

各一錢

吳茱萸

五分

水煎服

南京

大學

圖書館版權所有

風菱殼煎濃汁飲

乾薑 黃連 當歸 黃檗等分皆炒爲末
二錢烏梅一箇煎湯下赤痢加黃檗白痢加薑後
重腸痛加黃連腹中痛加當歸名四神散若治泄
瀉則等分用亦佳

便血 此爲血脫于下稍久卽黃瘦宜補澀

臭椿根白皮洗淨曬研細末飯糊丸梧子大每三
錢荷葉蒂煎湯下

烏梅肉紅棗肉等分杵丸梧子大米飲下三錢日



二又方五倍子研末艾湯下一錢

痔血

此乃溼熱蘊于大腸血出不爽或如箭射亦與

便血肛門熱痛者雖久延而久不消粹治當清化亦

歸身

二地榆炭一錢

水煎服

老絲瓜

全燒存性每服二錢酒下

新槐花炒研酒服三錢日三

脫肛

蟬蛻研末菜油調敷

慈石煅研極細米飲下一錢外以鐵屑煎湯洗之



貫眾 朴硝 橘皮等分爲粗末每用五錢煎
淋洗後以木賊燒存性研摵

肛門腫痛

木鼈子肉四五枚研細泡湯洗另用少許塗之作
癢者杏仁杵爛傅其頭部于黃太早鼻去皮

凡便燥努掙肛痛異常者以冰片
硼砂研末雄

猪膽汁調勻後搽之

大便不通

連鬚葱白三莖淡豆豉七粒共搗爛貼臍上紮定

良久自通

草烏爲極細末以葱一莖切去根將葱頭蘸草烏末納肛門內卽通此名霹靂箭又名提益散
巴豆仁 乾薑 韭子 良薑 硫磺 檳榔等分研末飯丸如雞子黃大早晨先以椒湯洗手麻油塗手掌男左女右握藥一丸移時便通欲止則開握去藥以冷水洗手此名宣積丸杭人以出便溺爲解手蓋本於此

二便不通

白礬末填滿臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即
通臍平者以厚紙作環圍之

甘遂末麪翻調傅臍中及丹田以艾炷灸三壯內
飲甘草湯

小便不通

白蘆菔子炒香白湯下數錢外以紙撲揩鼻取嚏
立通

犀角 璇璫等分磨水衝服

葱白三斤細切炒熟分二包互熨小腹仍以手擦

掌心及涌泉穴

諸藥不效者以麝香少許和患者項心頭垢作
入溺莖紙封馬口使氣透進莖內須臾卽通
癃淋小溲不利而管痛也

細白砂三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一
治諸淋冬瓜煮湯恣飲亦佳

浮海石一大把研篩以水三升醋一升煮取二升
澄清服一升三服愈治石淋

白茅根四斤以水一斗五升煮取五升服一升日



三夜二治熱治

蒲黃 滑石等分末之酒服方寸匕日三

芝根煎湯服亦良

淡豆豉五錢水一椀煎一沸去滓入鹽一捻和服

治氣淋

海金砂

滑石各

兩

甘草二錢

爲末每服二錢

鹿

角霜

麥冬

燈心煎湯下治膏淋

此敗精血

塞漏竅也

溺血

管痛者爲血淋不痛者爲溺血

牛膝一味煎膏不時服之

生綠豆浸溼
絞取汁隔水微溫日服一椀

人參黃耆各分爲細末以白蘆菔切片蜜

時蘸末食之名玉屑散

遺溺

鹿角霜研末溫酒下三錢

雞脬脬炙研稜米湯服二錢入鹽一錢

瘡

七種瘡氣痛不可忍灸大敦穴穴在足大拇指聚毛處去甲一韭葉炙七壯屬厥陰井也須用厚蒜



瓣襯不可貼肉貼肉則傷指甲

睾丸腫痛名木腎用荆芥穗一兩

朴硝一兩

蘆薈

各二錢

葱莖七根煎湯淋洗

偏墜初起用穿山甲一錢 茵香二味爲末酒調服乾物壓之若患久者用牡蠣灰一錢 良薑末等分唾津調塗腫大一邊須臾如火熱而痛已

小腹腫痛不得小溲者名膀胱氣用五苓散加棟子一錢 茴香一錢 葱白煎成入鹽少許熱服更有肺氣不化膀胱爲熱邪所滯而小便不通小腹與睾丸

脹痛一味沙參大劑煎服肺氣化而小溲通覆杯
可愈但溲不閉者勿用

小腹引睾丸連腰脊而痛名小腸氣用四製香附
鹽水炒茴香等分爲末空心酒下三錢
寒疝引急痛連小腹及睾丸偏縮者以胡椒十餘
粒研細繆膏藥上烘熱貼陰囊上痛卽已若偏縮
者須貼偏小半邊蓋縮卽寒而墜卽熱也

熱疝痛處如火溲赤便艱口乾畏熱多露火象熟
藥禁施用芙蓉葉肉黃檗各三爲末以木鼈子仁



一箇磨醋調塗囊上即效

囊腫

葱白汁調飛麪塗

水調牡蠣粉塗

杉木焰灰熟雞子黃炒油調搽

囊腫痛

葱白汁調乳香末塗

囊腫痛

蛇牀子研末雞子黃調塗



囊溼

石斛二錢生薑一片煎湯代茶

蛇牀子研末繆饼以代茶

囊溼

川椒杏仁研膏塗

囊溼癩

海螵蛸蒲黃研末繆

先以葱椒煎湯洗再以五焙子

臘茶研末少加

鉛粉擦



南京中医药大学图书馆版权所有

滑石

一兩 煅石膏

五錢

白礬少許 共研細

陰冷

冷氣入腹滿悶殺人以椒炒熟布裹包裹下熱氣
大通日夜易之以消爲度

陰毛生蟲

檳榔煎湯頻洗末各三錢甘草等分研末
燒酒浸百部擦

桃仁杵爛搽



南京中医药大学图书馆版权所有

肥皂燒存性去火氣研末麻油調擦

莖腫

羊屎黃檗煎汁洗

兒茶冰片研末各三分甘草湯洗過搽
莖瘻

羊腎煮粥食

鹿角霜茯苓等分爲末酒糊丸梧子大每三十
丸鹽湯下

遺精

白朮共用



蓮子心一兩辰砂一錢分各研細和勻每服一錢白湯

日二

北五味烈日曝乾研末每一錢酒或白沸湯調服
日二名元及散

白茯苓二兩縮砂仁一錢爲末入鹽二錢精羊肉批片繆

藥炙食以酒下十枚溫水細嚼日之頭項及止

赤白濁

赤濁用菟絲子、麥冬等分爲末蜜丸梧子大鹽

湯下七十丸

重者加桂枝

大者加附子

共研末各一錢



又乾紅蓮子連心衣六兩
炙甘草兩共研末每一錢
燈心湯下

白濁用乾冬瓜子炒研末每服五錢米飲下
又生白果仁三十枚搗水飲日一服取效止

強中

甘草黑大豆煎湯頻飲

破故紙
韭菜等分爲末每服三錢水煎服

下消
下焦火熾精液受燶悉隨溺出而不覺也

懷慶直生地

直熟地

俱用竹刀切

麥冬

淡酒浸一日
鹽湯浸二日

天冬

各一斤
酒浸三日
醃

西洋參

刮去皮八兩
鍋上蒸極熟
飯

以

水

泉

水

于沙鍋煎至味盡去滓慢火熬成膏和入熟
擣丸梧子大每晨淡鹽湯服五七十九名固本丸

六味丸加知檗或丹溪大補陰丸亦可服



医药大学图书馆版权所有

內科簡要

卷一

大悲丸散銀梨丸甘草大青金大衣石脂
葛氏解王大通氣病解酒解酒解酒解酒
王好醫類正則解去寒風大寒以解寒人解
天冬解支二日解去寒解去寒解去寒解去

