

王機微義卷之十六

氣證門

○內經叙諸氣動爲病

陰陽應象論云。喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。滿脈去形。喜怒不節。寒暑過度。生乃不固。故重陰必陽。重陽必陰。

玉機真藏論云。憂喜悲恐怒令不得以其次。故令人有大病矣。因而喜大虛則腎氣乘矣。憂則心氣乘矣。怒則肝氣乘矣。悲則肺氣乘矣。恐則脾氣乘矣。

舉痛論云。百病生於氣也。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。炅則氣泄。驚則氣亂。勞則

氣耗思則氣結。九氣不同也。爲病詳見本文

○脉法

經曰脉滑者多血少氣。○澀者少血多氣。○大者血氣俱多。○脉來大而堅者血氣俱實。○小者血氣俱少。○脉來細而緩者血氣俱虛。○代者氣衰。○細者氣少。○浮而絕者氣欲絕。○弦大而滑中有短氣。○尺脉濶而堅爲血實氣虛。○尺脉細而微者血氣俱不足。云云見本文。

劉立之脉理玄要曰。下手脉沉便知是氣沉極則伏濶弱難治。其或沉滑氣兼瘀飲○論凡氣動爲諸證

子和云夫天地之氣常則安變則病而況人稟天地之氣五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人蓄氣如持至寶庸人投物而反傷太和此軒岐所以論諸痛皆因於氣百病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而爲九怒喜悲恐寒暑驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣太僕云恐則傷精却上而不下流下焦

陰氣亦廻還而不散故聚而脹也。然上焦固禁下焦氣還故氣下行也。寒則腠理閉氣不行故氣收矣。太僕云身涼則衛氣沉故皮膚支理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散也。戾則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣。太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也。驚則心無所依神無所歸慮無所定或氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣。太僕云疲勞役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也。思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣。太僕云繫心不散故氣亦停

留此素問之論九氣其變甚詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔血及飧泄餘皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜樂愁憂盛怒恐懼而言其病曰心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胸脫肉毛瘁色夭死于冬脾憂愁而不解則傷意意傷則恍亂四肢不舉毛瘁色夭死于春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮而攀筋兩脇不舉毛瘁色夭死于秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人毛革焦毛瘁色夭死于夏腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可俛仰屈伸毛瘁色夭死于季夏恐懼不解則傷精精傷則骨瘦

廢厥精時自下是故五藏主藏精者也不可傷。傷則失守而陰虛。虛則無氣。無氣則死矣。靈樞論神意魂魄志精所主之病。然無寒暑驚勞四證。余以是推而廣之。怒氣所至爲嘔血爲飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲胸滿脹痛。食則氣逆而不下。爲喘渴煩心爲消痺爲肥氣爲目暴盲耳暴閉筋縱發於外爲疽癰。喜氣所至爲笑不休爲毛革焦爲肉病爲陽氣不收甚則爲狂。悲氣所至爲陰縮爲筋攣爲肌痺爲脉瘻。男爲數溲血女爲血崩爲酸鼻辛頰爲目昏爲少氣不能報息爲泣則臂麻。恐氣所至爲破脢脫肉爲骨瘦。瘞厥爲暴下尿水爲面熱膚急爲陰瘞爲懼而脫順。

驚氣所至爲潮涎爲目暎爲口咷爲癰癧爲不省人
爲僵仆久則爲病痺。勞氣所至爲咽噎病爲喘促爲
嗽血爲腰痛骨痿爲肺鳴爲高骨壞爲陰痿爲唾血
爲寃視爲耳閉。男爲少精女爲不月。衰甚則潰潰乎
若壞都。汨汨乎不可止。思氣所至爲不眠爲嗜卧爲
昏瞀爲中痞三焦閉寒爲咽喉不利爲膽瘅嘔苦爲
筋痿爲白淫爲得後與氣快然如衰爲不嗜食。寒氣
所至爲上下所出水液云云見寒門。氣氣所至爲喘嘔吐
酸累注下迫火門。凡此九者內經有治法。但以五
行相勝之理治之。夫怒傷肝。肝屬木怒則氣并於肝
而脾土受邪。木太過則肝亦自病。喜傷心心屬火喜

則氣并於心而肺金受邪。火太過則心亦自病。悲傷
肺。肺屬金。悲則氣并於肺而肝木受邪。金太過則肺
亦自病。恐傷腎。腎屬水。恐則氣并於腎而心火受邪。
水太過則腎亦自病。思傷脾。脾屬土。思則氣並於脾
而腎水受邪。土太過則脾亦自病。寒傷形。形屬陰。寒
勝熱則陽受病。寒太過則陰亦自病。炅傷氣。氣屬陽。
熱勝寒則陰受病。熱太過則陽亦自病。凡此七者更
相爲治。故悲可以治怒。以愴惻苦楚之言感之。喜可
以治悲。以譁浪穠狎之言娛之。恐可以治喜。以迫遽
死亡之言怖之。怒可以治思。以汚辱欺罔之言觸之。
思可以治恐。以慮彼忘此之言奪之。凡此五者必詭

詐謫恠無所不至。然後可以動人耳。自易人覩聽。若胸中無材器之人亦不能以此五法也。反可以治寒塞可以治足。反可以治勞。習可以治驚。經曰驚者平之平謂平常也。夫驚以其忽然而遇之也。使習見習聞則不驚矣。此九者內經自有是理。庸工廢而不行。今代劉河間治五志獨得言外之意云云後見。昔余治一書生勞苦太過大便結燥欬逆上氣。時喝喝然有音。唾嘔鮮血。以苦劑解毒湯加木香漢防已煎服。時時啜之。復以木香檳榔丸泄其逆氣。不月餘而痊。余又嘗以巫躍妓抵以治人之悲結者。又嘗以鍼下之時使雜舞忽鼓笛應之以治人之憂而心痛者。余嘗擊

拍門窓使其聲不絕以治因驚而畏響魂氣飛揚者。嘗治一婦人名思而不眠。余日醉而不問。婦果呵怒。是夜困睡。又嘗以酸棗仁丸治人多憂者。然惟勞而氣耗。恐而氣奪者爲難治。喜者少病。百脉舒和故也。又聞莊先生者治喜樂之極而病者。莊切其脉爲之失聲。佯曰吾取藥去。數日更不來。病者悲泣辭其親友曰吾不久矣。莊知其將愈慰之語其故。莊引素問曰懼勝喜可謂得玄關者也。

按此論九氣所動病機至爲詳悉。然七情諸證局方多用氣藥論治固然。但不分其夾熱兼痰虛實之例。而於寒熱二證亦似謂備於九氣兼用氣藥。

而治之其弊甚矣。且夫七情諸證有乘逆厥中之殊人有苦樂安擾之異是以先哲就用五志相勝之理治之藥之於傷寒溫暑自有其例也。後世俗不能本此特之於藥而相勝之理不行。況其藥不熟即峻虛虛實實不無差悞故河間戴人者出論已上病機究所至之因以平火爲主兼五志相勝之理或音樂抵戩甚至詭詐譎怪諸法爲治應變亦已至矣我東垣丹溪先生更論諸氣爲病有鬱痞逆滯不同隨證用藥有寒熱溫涼之異如勞氣者宜補中益氣滋陰助陽或兼取挾之邪論治深備先哲旨趣惜乎其道皆不能大行于世者由局

方障之也

○氣中似風證論

詳見中風門

○理氣宣導痰論

詳見飲門痰

○氣屬陽動作火論

原病式曰氣爲陽而主輕微。諸所動亂勞傷乃爲陽火之化。神狂氣亂而爲病者多矣。子和云河間治五志獨得言外之意。凡見喜怒悲恐思之證皆以平心火爲主。至于勞者傷於動。動便屬陽。驚者駭于心。心便屬火。二者亦以平心火爲主。今之醫者不達此旨。遂有寒涼之謗。

謹按或云捍衛冲和不息之謂氣。擾亂妄動變常

之謂火。當其和平之時。外護其表。復行於裏。周流一身。循環無端。出入升降。繼而有常。源出中焦。總統於肺氣。曷嘗病於人也。及其七情之交。攻五志之間。發乖戾失常。清者遽變之爲濁。行者抑遏而反止。表失衛護而不和。內失健悍而少降。營運漸遠。肺失主持。妄動不已。五志厥陽之火。起於焉上。燔於肺氣。乃病焉。何者。氣本屬陽。反勝則爲火矣。河間有曰。五志過極。皆爲火也。何後世不本此議。而一槩類聚香辛燥熱之劑。氣作寒治。所據何理。且言指迷七氣湯製作者。其皆用青皮陳皮三稜。蓬朮益智官桂甘草。遂爲平和。可以常用通治。七

情取傷混同一意未喻某藥以治某氣已下諸方
尤有甚焉者茲不復叙况所起之情各各不同且
夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上等
證其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者
寒之驚者平之勞者溫之結者散之喜者以恐勝
之悲者以喜勝之九氣之治各有分別何嘗混作
寒論而類以香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂
歟若香辛燥熱之劑但可劫滯氣衝快於一時以
其氣久抑滯借此暫行開發之意藥中不佐制伏
所起之氣服甚則增熾鬱火蒸熏氣液而自成積
積滋長而成痰一飲下膈氣乃氤氳清虛之象若

霧露之著物。雖滯易散。內挾痰積。開而復結。服之日久。安有氣實而不動氣動而不散者乎。此皆人所受悞之由。習俗已久。相沿而化。卒莫能救。升發太過。香辛散氣燥熱。傷氣真氣耗散。濁氣上騰。猶曰。腎虛不能攝氣歸原。遂與蘇子降氣湯。四磨湯。下黑錫丹。養氣丹。鎮墜上升之氣。且硫黃黑錫佐以香熟。又無補養之性。藉此果能生氣而補腎乎。請熟詳之。夫濕痰甚者。亦或當之初服。未顯增變。由喜墜而愈進。形質弱者。何以收救。不悟肺受火炎。子氣亦弱。降令不行。火無以制。相扇而動。本勢空虛。命絕如縷。積而至深。丹毒濟火。一旦火氣狂。

散喘息奔急而死。吁以有形丹石丸藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨而降之乎。譬以石投水水故未嘗沉也豈不死歟。丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱爲甚自覺其冷非真冷也。火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此證認假作真似是之禍可勝言哉。內經雖云百病皆生於氣以正氣受邪之不一也。今七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發爲諸病當詳所起之因滯於何經上下部分臟氣之不同隨經用藥有寒熱溫涼之同異。若枳殼利肺氣多服損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣與夫木香之行中下焦氣香附之快

滯氣陳皮之泄逆氣。紫蘇之散表氣。厚朴之瀉衛氣。檳榔之瀉至高之氣。藿香之馨香上行胃氣。沉香之升降真氣。腦麝之散真氣。若此之類氣實所宜其中有行散者有損泄者其過劑乎。用之能却氣之標而不能制氣之本。豈可又佐以燥熱之藥以火濟火。混同謂治諸氣使之常服多服可乎。氣之與火一理而已。動靜之變反化爲二。氣作火論治與病情相得。丹溪發摶論之。冷生氣者出於高陽生之謬言也。身非自受寒氣口食寒物而是論寒者吾恐十之無一也。

○論局方用熟藥治諸氣之誤

丹溪曰治氣一門有曰治一切氣冷氣滯氣逆氣上氣用安息香丸丁沉丸大沉香丸蘇子丸勺氣散如神丸集香丸白沈香散煨姜丸搗煎散七氣散溫白丸生氣湯悉用熟藥夫天地周流於人之一身以爲生者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不傷於七情外不感於六淫其爲氣也何病之有今曰滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降裏蒸清道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲遂展轉傳變爲嘔爲吐爲脇爲噎爲痰爲飲爲翻胃爲吞酸夫治寒以熱治熱以寒此正治之法也治熱用熟治寒用寒此反佐之法也詳

味前方既非正治又非反佐此愚之所以不能無疑也。觀其微意可表者汗之可下者利之滯者導之鬱者揚之。熱者清之寒者溫之偏寒偏熱者反佐而行之。挾濕者淡以滲之。挾虛者補而養之。何嘗例用辛香燥熱之劑以火濟火。實實虛虛咎將誰執

○論氣無補法之誤

丹溪曰氣無補法俗論也。痞悶壅塞似難於補。不思正氣虛者由七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛。脾土之陰受傷轉運之官失職。胃雖受穀不能運化故陽升陰降而成天地不交之否。清濁相混邪何由行此等理宜補養却厚味斷妄想遠音樂無有不

安

謹按氣者本腑臟天真之原也。虛由七情及勞傷等因所致則正氣原氣不足也。故宜補之則氣實氣化病邪漸除。經曰虛則補之是也。此補者補其不足也。非爲病邪陷下腑臟精氣已燼。天真元氣已絕而施補乎。此等非虛也。非不足也。無補之法必矣。大抵世俗拘此止謂治病攻邪不審補虛養正之理。實實虛虛悞人生命。蓋不思之甚矣。

氣證治法

○升散之劑

局方七氣湯治七情之氣鬱結于中心腹絞痛

人參

甘草炙

內桂
各一錢半

半夏
一錢

右咬咀水煎服

按此出太陽例寒則氣收宜辛散之甘緩之治氣虛寒鬱藥也

。 盐煎散治一切冷氣攻冲胸膈刺痛不已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉

砂仁

甘草炙

茯苓

草果

肉豆蔻

川芎

茴香

炒

澄茄

來蘖

檳榔

良姜

枳殼

厚朴

炒

陳皮

羌活

蒼朮

各一錢分等

右咬咀每服四五錢入盐些少煎

按此足太陽陽明太陰經藥也

木香流氣飲治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮

四肢腫滿

半夏

錢二

厚朴

青皮

紫蘇

香附子

甘草

各一錢

陳皮

二錢

桂

莪朶

丁皮

大腹皮

檳榔

藿香

木香

草果

各六分

木通

麥門冬

白芷

茯苓

白术

木瓜

人參

石首蒲

各四分

右㕮咀每服四五錢人姜棗煎服

按此太陽例藥與已上方世俗多用之故收入然

類以香燥非寒者氣實者不可用

秘傳降氣湯治上盛下虛氣不升降頭目昏眩痰實

嘔逆胸膈不快

骨碎補

訶子

草果

五加皮

半夏

桔梗各半錢

桑白皮二錢

地骨皮

枳殼

陳皮

柴胡

甘草各一錢

右㕮咀入姜水煎服

按此出少陽例然怒則氣上驚則氣亂意例宜求諸此

易簡參蘇飲

方見熟門

謹按天地六氣併入之氣分爲病治例亦詳見各

門故當分治也

東垣升陽順氣湯治七情所傷及勞役飲食不節滿

悶短氣

升麻

柴胡

陳皮

各一錢

半夏

人參

各三錢

黃芪

四錢

甘草

各半錢

黃柏

各半錢

當歸

一錢

草豆蔻

二錢

神曲

炒一錢半

右㕮咀每服半兩入姜煎

按此補劑也然恐則氣下宜求諸此

○攻下之劑

戴人木香枳榔丸散滯氣胸腹脹滿實痞氣結痛

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣術

枳殼

黃連

黃柏

大黃

各半兩

牽牛

香附

各二兩

右爲末水丸梧子大每服五六十丸煎水下量虛實與之

按此陽明例藥下熱之劑也

局方神保丸治諸積氣爲痛

乾竭

一撮

木香

胡椒

各二錢生

巴豆

十箇

去心皮
別研取霜

右爲末和勻湯化蒸餅丸如麻子大硃砂爲衣每五十丸隨病氣例湯下

按此太陽例藥下寒之劑也

導氣丸宣壅導氣除脹滿利大腸

大黃四兩
煨

胡椒四十
九粒
九粒

青皮
陳皮

蝎稍炒

茴香炒

乾薑炮

甘草炙各
一兩

阿魏半錢用
麪和炒

黑牽牛取頭末
二兩

右爲末水丸

御院方木香順氣丸治諸氣不和方見續
裹門

按已上二方手足太陰足厥陰陽明經藥導滯之劑也

○調理之劑

局方沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞悶噫醋吞酸

沉香四錢

砂仁半兩

甘草炙一兩

香附子四兩

右爲末每二錢入鹽少許湯調下

分心氣飲治一切氣留滯於胸膈之間不能流暢以致痞悶噎塞

木香

丁皮各二錢

人參

麥門冬

大腹皮

大腹子

桑白皮

草果

桔梗

厚朴

白术

各半兩

香附子

藿香

陳皮

紫蘇

各一半兩

甘草

炙兩

右㕮咀每三錢入姜棗煎服

按此二方手足太陰陽明足少陰經藥也

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐致臟氣

不平心腹脹滿

半夏五錢

白茯苓四錢

厚朴炒三錢

紫蘇二錢

右剉入姜煎服

按此足陽明手足太陰經藥也

紫沉通氣湯治三焦氣滯不能宣通腹脹大便滯

紫蘇

枳殼炒

陳皮

茯苓

甘草

檳榔各一兩

沉香

木香

麥門冬

五味子

桑白皮

黃芪

乾生薑

薄荷

枳實

荆芥穗各半兩

右咬咀每半兩水煎服

按此手太陰之劑也。世俗調理之劑而多雜峻削之藥故並略去。然此方有發散意而不大燥烈。姑存之用者自宜損益。按經云氣血弱者不可服枳實以其損氣也。氣血盛者不可服丁香以其益氣也。於調理不可不分。

東垣木香順氣湯治濁氣在上則生腹脹

方見脹滿門

按此亦七情所致。濁陰之氣不降而爲腹脹也。故出陽明承氣剝然七氣之方先哲亦未見分其異者。蓋氣之厥逆收緩久而鬱變病機不同。而亦不可不本其所因而治之也。

○補養之劑

東垣補中益氣湯治喜怒憂恐損傷元氣勞倦體息

方見
熱門

調中益氣湯

方見
傷門

按此二方治勞則氣耗宜益之也出少陽例

清暑益氣湯治暑傷元氣食少體倦

方見
暑門

按此所謂戾則氣泄宜益之也

局方養氣丹

養正丹

方並
和劑見

按已上方治元陽虧損氣短身羸氣不升降食少

脉弱陰陽之氣下陷者甚捷然不可盡劑也論見

補虛門

○消導之劑

局方異香散治胃氣不和腹脇膨脹飲食難化一切

冷氣結聚

石蓮肉

一兩

莪朶

三稜

益智仁

甘草

炙各六兩

青皮

陳皮

厚朴

炙各二兩

右爲末每服三二錢薑棗煎服

按本方云治腎氣不和腎字爲胃字之誤爾出湯

明例藥

御藥院方助氣丸

方見積
裏門

分氣丸治胸膈氣痞痰實不化並宜服之

砂仁

青皮

陳皮

白豆蔻

三棱

炮

莪术

煨

草澄茄

蘿蔔子

炒

枳實

木香

各一兩

黑牽牛

炒二兩
取頭末

右爲末糊丸如梧子大每五十丸薑湯下

按已上諸方治氣積痞之劑非調理比也。宜分虛實寒熱用之。又皆氣中之血藥也。

○治痰之劑

二陳湯

桔梗半夏湯

四七湯

益見葵散門

蘇子降氣湯

方見效門

按此諸方散鬱和中之藥也

○理血之劑

本事方槐角散

濟生歸脾湯

拔萃門冬欽子

並見血證門

按氣病血從已見前論故錄已上方以備其例用者自宜推格之

○宣劑

稀涎散

元戎勝金丸

並見痰飲門

謹按諸氣薰或七情所滯最宜宣導正木薑達之
之意也。大抵是證中夾火熱者多已上端方恐未
合宜用者自隨時通變可也。

○通關竅之劑

局方薰合香丸治氣中或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣

沉香

麝香

罰子

丁香

青木香

安息香

罰附

草�

白术

白檀

各二兩

蘇合油

龍腦

各一兩

硃砂

烏犀角

各一錢

右爲末入研極勺用安息香膏并煉蜜丸如梧桐
子大溫水化四丸

按此手足太陽足陽明手足太陰足三陰藥也

○雜方

嚴氏四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右四味各濃磨水和作七分煎三五沸溫服

解珠正氣天香湯治一切上氣湊心心胸築痛

方見婦人

門

王機微義卷之十六終

玉機微義卷之十七

血證門

○諸經敘血證所因

內經厥論云陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血○溫
滯汗出孰衄○生氣通夫論云陽氣者大怒則形氣
絕而血菀於上○氣厥論云脾移熱於肝則爲驚衄
胞移熱於膀胱則癃溺血○舉痛論云怒則氣逆甚
則嘔血故氣上矣○陰陽別論云結陰者便血云云見下
鍼經云厥氣生足惋惋生脛寒云云則後血見續見裏門○
脉經云下血先見血後見便此近血也。先見便後見
血此遠血也

○脉法

內經云脉來懸鈎爲衄血常脉脉至而搏血衄身熱者死○腸澼下膿血脉弦絕則死滑大則生○血溫身熱者死○脉經曰脉得諸溢濡弱爲亡血○脉來輕輕在肌肉尺中自浮目精暉黃衄必未止○太陽脉大而浮必衄吐血○病人面無血色無寒熱脉沉沈也○脉浮弱手按之絕者下血○脉芤爲失血○濇爲少血○尺脉滑而疾爲血虛○脉弦而緊脇痛臟傷有瘀血○吐血嘔血脉滑小弱者生實大者死○唾血脉緊强者死滑者生○腎脉小搏沉爲腸澼下血心肝澼亦下血

○論血證分三因

陳無擇云衄者因傷風寒暑濕流傳經絡湧泄如清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢清氣道中而致者屬內因飲酒過多啖炙燉辛熱或墜墮車馬傷損致者爲不內外因○吐血者或因四氣傷于外七情動于內及飲食房勞墜閃傷損致榮血留聚膈間滿則吐溢世謂妄行或吐瘀血此名內傷○便血或清或濁或鮮或黑或在便前便後或與泄物並下此由內外有所感傷凝停在胃隨氣下通亦妄行之類○尿血因心腎氣結所致或憂勞房室過度

此得之虛寒不可專以血得熱而淖溢。二者皆致尿
血與淋不同。

謹按衄血下血傷寒邪氣壅迫於經而致者故有
乏雜證見者多火熱所致或吐溢於空竅皆五志
耳動或陰分鬱熱或內外有所傷而成有寒邪者
少如尿血因房勞者實由精氣滑脫陰虛火動榮
血妄行爾已上論爲虛寒恐未必然也若便血清
者屬榮虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬火黑者
火極與泄物並下屬有積或絡脈傷也並宜分治

○論下血爲內傷絡脉所致

詳見積聚門

○論嘔血溢爲逆氣所致

東垣曰經云怒則氣逆甚則嘔血暴瘡內逆肝肺相搏血溢鼻口取天府穴又足少陰腎之脉從腎上貫入肺中循喉嚨其病則飢不欲食面黑如地色咳唾則有血夫氣者陽也血者陰也氣主喒之血主濡之今血妄行上出於鼻口者皆氣逆也故經言陽明厥逆怒則氣逆暴瘡內逆者是也

謹按悲氣勞氣等皆能致血證詳見氣門但怒氣致血證者則暴甚故經曰抑怒以全陰者是矣否則五志之火動甚火戴血上錯經妄行也

○論衄吐血泄爲火熱所致

原病式曰衄者陽熱怫鬱干於足陽明而上熱則血

妄行鼻衄也。○血溢者上出也。心養於血故熱甚則血有餘而妄行。或謂嘔吐紫凝血爲寒者誤也。此非冷凝由熱甚銷爍以爲稠濁而熱甚則水化制之故亦兼黑而爲紫也。○血泄熱客下焦而大小便血也。○衄血汚血出也。汚者濁也。心火熱極則血有餘。熱氣上甚則爲血溢。熱勢亢極則燥而污濁害承乃割則色兼黑而爲紫也。

○論衄血下血爲傷寒所致

成無巳曰傷寒衄者爲邪氣不得發散壅盛於經道迫於血則因致衄也。桂枝湯麻黃湯治衄者非治衄也。即是發散經中邪氣爾。至畜血者血在下焦結住

而不行。畜橫而不散者是也。血菀於上而吐血者謂之薄厥。留於下而瘀者謂之畜血。由太陽隨經瘀熱在裏。血爲熱所搏結而不行。畜於下焦之所致。經曰太陽病七八日表證仍在。脉微而沉反不結脢。其人如狂者以熱在下焦。少腹當軟滿。小便自利者下血乃愈。

傷寒例少陰證下利便膿血者桃花湯以固脫散寒補正

許氏治少陰誤汗衄血及廡中出血用姜附湯治少陰之本

陰證畧例治三焦出血色紫不鮮此重沓寒濕化毒

凝泣浸漬而成。治要用黑錫丹

見直指方

按所論已上證皆寒邪之變病也。至又有甚者如論云服桂枝湯吐血其後必吐膿血。又厥陰證傷寒六七日大下後。十脉沉而遲。手足厥冷。下部脉不至。咽喉不利。唾膿血泄利不止者爲難治。宜麻黃升麻湯。火邪亦咽燥唾血。陽毒亦吐血。皆變證之極者也。非訛證之比。大抵傷寒畜血。下血爲傳變。故下血衄血。身涼乃愈。其不傳變入裏。邪氣不得發散。逼迫於血。因致妄行於下者爲逆下血。必多不能止。爲難治也。

○論結陰便血

衛生寶鑑云真定史十年四十一形體本瘦秋時因
勉強飲酸酒數杯少時腹痛次傳下利無度待十餘
日便後見血或紅或紫腹鳴時痛諸醫以爲血熱用
芍藥柏皮丸治之未効仍不欲飲食食則嘔酸形體
愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁
不得安卧診時脈弦細而微遲手足稍冷經曰結陰
者便血一升再結二升三結三升又邪在五臟則陰
脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣內結不
得外行無所稟滲入腸間故便血也外發中脘三里
氣海等穴內服平胃地榆湯而愈

按此治例實內傷法也宜與積聚門叙積之始兼

看

○血屬陰難成易虧論

丹溪曰經云人年至四十陰氣自半而起居衰矣。又曰男子六十四而精絕女子四十九而經斷夫以陰氣之成止供給三十年之運用已先虧矣人之情欲無涯此難成易虧之陰氣若之何而可以縱欲也

謹按或曰經云榮者水穀之精也和調五臟酒陳於六腑乃能入於脈也。源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臍得之而能液臍得之

而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也。
注之於脈少則濇充則實常以飲食日滋故能陽
生陰長取汁變化而赤爲血也生化旺則諸經特
此而長養衰耗竭則百脉由此而空虛可不謹養
哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血
盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢
陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血
氣之常陰從乎陽隨氣運行於內苟無陰以羈束
則氣何以樹立故其致病也易調治也難以其比
陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見
矣諸經有云陽道實陰道虛陽道常饒陰道常乏

陽常有餘陰常不足。以人之生也。年至十四經行。
年至四十九而經斷。可見陰血之難成易虧如此。
陰氣一傷所變之證。妄行於上則吐衄。衰涸於外
則虛勞。志反於下則便紅。移熱膀胱則癃閉澀血。
滲透腸間則爲腸風。陰虛陽搏則爲崩中。濕蒸熱
癥則爲滯下。熱極腐化則爲膿血。火極似水。血色
紫黑。熱勝於陰發爲瘡瘍。濕滯於血則爲痛痒癰
癧。凝滯皮膚則爲冷癰。畜之在上則人喜忘。畜之
在下則人喜狂。墮恐跌仆則瘀惡內凝。若分部位。
身半以上同天之陽。身半以下同地之陰。此特舉
其明顯之證者。治血必血屬之藥。欲求血藥其四

物之謂乎。河間謂隨證輔佐。謂之六合湯者。詳言之矣。余故陳其氣味專司之要。不可不察。夫川芎血中氣藥也。通肝經性味辛散能行血滯於氣也。地黃血中血藥也。通腎經性味甘寒能生真陰之虛也。當歸分三治。血中主藥也。通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也。芍藥陰分藥也。通脾經性味酸寒能和血治血虛腹痛也。若求陰藥之屬必於此而取則焉。脾胃論有云。若善治者隨經損益摘其一二味之所宜爲主治可也。此特論血病而末血藥之屬者也。若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之。陽旺則生陰血也。若四物者獨能

主血分受傷爲氣不虛也。輔佐之屬。若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者。血滯所宜。蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者。血崩所宜。乳香沒藥五靈脂凌霄花者。血痛所宜。蕤蓉瓊陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者。血虛所宜。乳酪血液之物。血燥所宜。乾薑桂者。血寒所宜。生地黃苦參血熱所宜。特取其主治大略耳。以能觸類而長。可謂應無窮之變矣。

○論治血證大法

東垣曰。傷寒家衄血者。仲景言不可發汗。蓋爲脉微也。若浮緊者。麻黃湯。浮緩者。桂枝湯。脉已微者。二藥

俱不可用。宜黃芩芍藥湯主之。雜病見血多責其熱。
如衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地黃
紫參丹參阿膠之類主之。咯唾血者出於腎以天門
冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃柏遠志熟地黃之
類主之。痰涎血者出於脾葛根黃芪黃連芍藥當歸
甘草沉香之類主之。嘔吐血出於胃也實者犀角地
黃湯主之虛者小建中湯加黃連主之。血證上行或
唾或嘔或吐皆逆也若變而下行爲惡痢者順也。血
上行爲逆其治難下行爲順其治易故仲景云畜血
證下血者當自愈也與此意同若無病之人忽然下
痢其病進也今病血證上行而復下行惡痢者其邪

欲去是知吉也。經曰：諸見血，身熱脉大者難治。是火邪勝也。身涼脉靜者易治。是正氣復也。故脉訣云：鼻衄吐血沉細宜忽然浮大，即傾危此之謂也。

血證治法

婦室經血諸證
詳見婦人門

○治風之劑

薰連

方見
效門

按此出少陽例表裏藥也

本事方槐花散治腸風臘毒下血

槐花

炒

柏葉

杵

荆芥穗

枳殼

各等分

右爲末，每服二錢，空心米飲送下。

技革方結陰丹治腸風下血臘毒下血

枳殼

炒

歲靈仙

黃芪

陳皮

椿根皮

白

何首烏

荆芥穗

各等分

等

右爲末酒糊丸桐子大每五七十丸米飲下入醋

少許

按此二方手太陰陽明藥也

濟生加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉

生地黃

當歸

川芎

各一兩

枳殼

荆芥穗

槐花

炒

甘草

各半兩炙

右㕮咀每四錢入烏梅姜同煎溫服

按此手足厥陰太陰藥也大抵此藥主補血涼血

而以風爲虛象者蓋非風客於陽間也

東垣黃芪芍藥湯治衄多歲面黃眼澁多眵手麻

黃芪

三兩

甘草

炙二兩

升麻

葛根

白芍藥

各一兩

羌活

半兩

右㕮咀每三錢水煎溫服

按此手足太陰陽明藥也。然血虛久則陽亦虛矣。故血不足則麻木。陰虛火動變證百出。亦實非風也。此出升陽滋陰例。

○ 治寒之劑

東垣麻黃桂枝湯治感寒發衄脉微弱者

麻黃

黃芪

白芍藥

甘草

各一錢

桂枝

當歸各半錢

人參四分

麥門冬三分

五味子五箇

右㕮咀作一服水煎

按此太陽例藥也。傷寒論有例茲不詳錄

濟生斷紅丸治臟腑虛寒下血不止面色痿黃羸瘦

側柏葉炒

川續斷酒浸

鹿茸醋煮

附子炮

黃芪

阿膠炒

當歸各兩

白朮桔梗二兩

右爲末醋煮米糊。凡如梧子大每七十丸空心米飲送下。

按此厥陰例藥也。

寶鑑平胃地榆湯治結陰便血

白术

陳皮

茯苓

厚朴

葛根

各半

地榆

分七

乾薑

五分

炙甘草

當歸

炒神麴

白芍藥

人參

益智仁

各三分

蒼朮

升麻

附子

炮各一錢

右㕮咀作一服水煎加姜棗

按此少陰例藥也

○治暑之劑

局方黃連香薷飲治伏暑純下鮮血

方見暑門

按此手少陰足太陰藥心主血脉裏血也

枇杷葉散治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷

二錢

厚朴

半錢

甘草

炙

麥門冬

乾木瓜

白茅根

各一錢

枇杷葉

陳皮

丁香

各半錢

右細末每二錢入姜煎

按此手足太陰經藥中熱者慎之

○治濕之劑

胃風湯治風濕乘虛入于腸胃下瘀血者

方見滯下門

拔萃升陽和血湯治腸癖下血作淤其血唧出有力而遠射四散如箭脊二月中下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈

生地黃

牡丹皮

生甘草

各半錢

炙甘草

黃芪

各一錢

當歸身

熟地黃

蒼朮

秦艽

肉桂各三

陳皮二分

升麻七分

白芍藥一錢半

右㕮咀作一服水煎

當歸和血散治腸癬濕毒下血

槐花

青皮

各六分

當歸身

升麻

各二錢

川芎

四分

荆芥穗

熟地黃

白术

各六分

右爲末每服三二錢米飲調下

按此諸方疎風勝濕藥也。然濕熱者多宜從滯下

法擇用

○治熱之劑

局方龍腦鷄蘇丸治膈熱欬嗽或吐血衄血

方見熱門

甘露飲治男女血妄流溢。或吐或咯衄血。齒齦臭出

並治之

方見熱門

簡易選奇黃芪散治欬血成勞

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗

白芍藥

各半兩

甘草

四錢

右㕮咀每服半兩水煎

按此手太陰足少陰藥也

濟生犀角地黃湯治鬱熱不解于經絡隨氣湧泄爲
衄血。或清道閉塞流入胃脘吐出清血。如鼻衄吐
血不盡。餘血停留致面色痿黃大便黑者並宜服

犀角

生地黃

白芍藥

牡丹皮

各等分

右或咀每四錢水煎服

按此足大陰藥也

良方四生丸丸吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜此

生荷葉

生艾葉

生柏葉

生地黃

各等分

右爛研丸如雞子大每一丸水煎服或用鹽湯化

下

河間生地黃散治鬱熱衄血咯血吐血

枸杞

柴胡

黃連

地骨皮

天門冬

白芍藥

甘草

黃芩

黃芪

生地黃

熟地黃各等分

右㕮咀水煎服下血者加地榆

按此二方手足少陰太陰藥也

局方槐角丸治五腫腸風下血痔瘻脫肛下血並宜
服之

槐角炒一兩

地榆

黃芩

當歸

防風

枳殼麴炒各半斤

溪心法各半兩○丹

右爲末酒糊丸如梧子大每三四十丸空心米飲
下

按此雖有治風例而性味辛苦寒故從熟劑少陽
藥也

秘方枳殼湯治便血下血

枳殼一兩炒

黃連一兩

以槐花四兩同炒去花不用

右二味水煎取濃食前溫服

按此又氣例藥也

○治火之劑

黃連解毒湯

大金花丸

方並見火門

○理氣之劑

三因茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色

黃連五心煩熱欬嗽吐血

半夏

前胡

紫蘇

茯苓

人參

枳殼

炒

桔梗

甘草

乾葛各半

當歸一兩

三錢

川芎七錢

五分

陳皮

白芍藥

各二兩

熟地黃

一兩

右咬咀每半兩入薑棗煎溫服

本事槐角散治腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

各一兩

槐角

二兩

甘草

烏梅

各半兩

右咬咀每五錢水煎服

按已上又氣血藥也。然三因方雖云補劑而雜以
發表之藥姑存之收入此理氣例

○補劑

濟生鷄蘇散治勞傷肺經嘯內有血咽喉不利

雞蘇葉

黃芪

生地黃

阿膠炒

貝母

白茅根

各一兩

桔梗

麥門冬

蒲黃

甘草

各半兩
炒

右㕮咀每四五錢入薑煎服

歸脾湯治思慮傷脾不能統攝心血以此致妄行或

吐血下血

白朮

茯神

黃芪

龍眼肉

當歸

酸棗仁

各一兩

人參

五錢

木香

甘草

炙二錢
五分

右㕮咀每四五錢入棗薑煎服

東垣麥門冬飲子治吐血久不愈者

五味子

十箇

麥門冬

去心

黃芪

各一錢

當歸身

人參

生地黃
各半錢

右㕮咀水煎服

金匱赤豆當歸散治先血後糞此近血也

赤豆

浸出
半

當歸各等分

右二味爲散漿水調服

三因伏龍肝湯治先糞後血此遠血也

伏龍肝

半斤

甘草

炙

白朮

阿膠

黃芩

熟地黃
各三兩

右㕮咀每四五錢水煎服

髮灰散治小便尿血或便前便後亦遠近之謂也

髮灰

右一味每二錢以米醋二合湯少許服井花水調亦得

玉屑膏治尿血

黃芪

人參各等分

右爲末用蘿蔔大者切一指厚四五片蜜淹少時
蘸蜜灸乾盡蜜二兩爲度勿令焦點藥末與不以
時仍以薑湯送下

按已上諸方平補藥也然病體亦有寒熱氣積等
因不同用者自宜求責

○止瀉之劑

三因龍骨散治衄過多

龍骨不以多少研爲末以少許吹入鼻中丸九
竅出血皆可用

御藥院方麝香散治衄不止

白礬
桔

龍骨

粘舌者各
另研半兩

麝香

半
字

右拌勻每先將冷水洗淨鼻內然後用藥吹入孔
內或以濕紙蘸入尤妙

濟生烏梅丸治便血不止

烏梅三兩燒存性爲末用好米醋打糊丸如梧
子大每七十丸米飲下

經驗方治漏血

百藥煎

一兩半兩
燒爲灰

右和飯丸如梧子大每三四十丸空心米飲下或作末服三二錢

又方乾柿燒灰米飲調下一二三錢

○雜方

試効方治吐血不止以三稜針於氣衝出血立愈
鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗者

以紙一張作八牒或十牒於極冷水內濕過置
頸中不止仍以熱熨斗於濕紙上熨之立止

○灸法

便血不止宜灸等穴

勞宮 手厥陰經

大白 足太陰經

會陽 足太陽經

三里 足陽明經

按血證宜灸等穴詳見資生等經茲不備錄然火
熱脈盛實者非所宜也

○通利之劑

拔萃犀角地黃湯治熱鬱血結上焦寸脈亢

生地黃二

黃芩半兩

黃連一兩

大黃半兩

右㕮咀每一兩水煎食後服之

桃仁承氣湯治血結胸中心下手不可近爲中焦蓄

血無寒熱胸滿漱水不欲嚥喜妄昏迷其人如狂

桃仁半兩

大黃一兩

甘草二錢半

桂

芒硝各三錢

右㕮咀每兩入姜煎服

抵當湯治下部畜血即廢下手不可近或其人發狂少腹滿硬小便自利大便反黑如狂者在中發狂者在下也

大黃

水蛭

炒各半兩

蜜丸

三錢去足

右製每五錢水煎服如作丸煉蜜和之

當歸導滯湯治跌撲擊損傷血滯於中

大黃

當歸各錢

右㕮咀每一兩或半兩水煎服

按已上血諦證諸方也蓋畜血有上中下之分故藥亦隨而輕重之也至血熱血積陰虛等證例見各門茲不詳錄

○解鬱之劑

丹溪麌

音戈細
麌也

鞠丸治血鬱

桃仁

香附子

撫芎

青黛

各等分

紅花

右爲末糊丸每四五十丸食前服

按丹溪有香附
丹参末神曲

梔子無桃仁
紅花青黛

卷之十七終

青囊合集

答相子

清江

卷之十七終

青囊合集

○解卦

卷之十七終

青囊

卷之十七終

青囊

卷之十七終

青囊

卷之十七終

青囊

卷之十七終

王機微義卷之十八

內傷門

按此一門。東垣先生内外傷辨法也。議論方製精備。故不取他書。但其間不係內傷法。皆節而不錄。內論暑證者。附入暑門。

○辨脈法

古入以脈上辨內外傷於人迎氣口。人迎脈大於氣口爲外傷。氣口脈大於人迎爲內傷。此辨固是。但其說有所未盡耳。外感風寒。皆有餘之證。是從前客邪來也。其病必見於左手。左手主表。乃行陽二十五度。內傷飲食。及飲食不節。勞役所傷。皆不足之病也。必

見於右手。右手主裏。乃行陰二十五度。故外感寒邪。則獨左寸人迎脉浮緊。按之洪大。緊者急甚於弦。是足太陽寒水之脉。按之洪大而有力。中見手少陰心火之脉。丁與壬合。內顯洪大。乃傷寒脉也。若外感風邪。則人迎脉緩而大。或大於氣口一倍。或兩倍。三倍。內傷飲食。則右寸氣口脉大於人迎一倍。傷之重者過在少陰。則兩倍。太陰則三倍。此內傷飲食之脉。若飲食不節。勞役過甚。則心脉變見於氣口。是心火刑肺。其肝木挾心火之熱。亦來薄肺。經云侮所不勝。寡於畏者是也。故氣口脉急大而數。時一代而澀也。澀者肺之本脉。代者元氣不相接。脾胃不及之脉。洪大

而數者。心脉刑肺也。急者。肝木挾心火而反尅肺金也。若不甚勞役。惟右關脾脈大而數。謂獨大於五脉。數中顯緩時一代也。如飲食不節。寒暑失所。則先右關胃脈損弱。甚則隱而不見。惟內顯脾脈之大數微緩時一代也。宿食不消。則獨右關脈沈而滑。經云。脈滑者有宿食也。

○辨內傷諸證與外感不同

甚哉陰陽之證不可不詳也。徧觀內經中所說變化百病。其源皆由喜憂怒過度。飲食失節。寒溫不適。勞役所傷而然。夫元氣。穀氣。營氣。清氣。衛氣。生發諸陽上升之氣。此六者皆飲食入胃。穀氣上行。胃氣之異

名其實一也。旣脾胃有傷，則中氣不足。中氣不足，則六腑陽氣皆絕於外。故經言五臟之氣已絕於外者，是六腑之元氣病也。氣傷臟乃病。臟病則形乃應。是五臟六腑真氣皆不足也。惟陰火獨旺，上乘陽分。故榮衛失守。諸病生焉。其中變化，皆由中氣不足乃生發耳。後有脾胃已受勞役之疾。飲食又復失節。耽病日久。事息心安。飽食太甚。病乃大作。緊其外傷風寒六淫客邪。皆有餘之病。當瀉不當補。飲食失節。中氣不足之病。當補不當瀉。舉世醫者。皆以飲食失節。勞役所傷。中氣不足。當補之證。認作外感風寒有餘客邪之病。重濁其表。使榮衛之氣外絕。其死只在旬日。

之間所謂差之毫厘謬以千里可不詳辨乎按陰陽應象論云天之邪氣感則害人五臟是八益之邪乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨蓋有形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者地之氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎主骨故風邪感人則筋骨疼痛筋骨之絕則肝腎之本亦絕矣乃有餘之證也又云水穀之寒熱感則害人六腑是七損之病乃內傷飲食也黃帝針經解云適飲食不節勞役所傷濕從下受之謂脾胃之氣不足而反下行極則衝脈之火逆而上是無形質之元氣受病也系在上焦心肺是也心肺者天之氣也故難經

解云。心肺之氣已絕於外。以其心主榮。肺主衛。榮者血也。脉者血之府。神之所居也。衛者元氣也。神之別名。衛護周身。在於皮毛之間者。肺絕故皮毛先絕。神無所依。故內傷飲食。則亦惡風寒。是榮衛失守。皮膚間無陽以滋養。不能任風寒也。皮毛之絕。則心肺之本亦絕矣。蓋胃氣不升。元氣不生。無以滋養心肺。乃不足之證也。謂受病之人。飲食失節。勞役所傷。因而飽食。內傷者極多。外傷者間而有之。世俗不知。往往將元氣不足之證。便作外傷風寒表實之證。而反瀉心肺。是重絕其表也。安得不死乎。古人所謂實實虛虛。醫殺之耳。若曰不然。請以衆人之耳目聞見者證。

之。向者壬辰改元，京師戒嚴。迨三月受敵者凡半月。
圍解之後，都人之不受病者萬無一二。既而病死者繼踵不絕。都門十有二所，每日各門所送多者二千，少者不下一千。似此者幾三月。此百萬人，豈俱感風寒外傷者耶？大抵人在圍城中，飲食不節，乃勞役所傷。不待言而知。由其朝飢暮飽，起居不時，寒溫失所。動經兩三月，胃氣虧乏久矣。一旦飽食太過，感而傷人。而又調治失宜，其死也無疑矣。非唯大梁爲然，遠在真祐興定間，如東平，如大原，如鳳翔，解圍之後，病傷死無不然者。余在大梁，凡所親見，有發表者，有以巴豆推之者，有以承氣湯下之者。俄而變結胸，發黃

又以陷胸湯丸及茵陳湯下之無不死者。蓋初非傷寒。以調治差互變而似真傷寒之證。皆藥之罪也。往者不可追來者猶可及。輒以平生已試之效。著内外傷辨論一篇。推明前哲之餘論。歷舉近世之變故。庶幾同志者審其或中觸類而長之。免後人無橫夭耳。僭易之罪。將何取逃乎。

右辨陰證陽證

外傷寒邪之證。與飲食失節。勞役形質之病。及內傷飲食。俱有寒熱。舉世盡將內傷飲食失節。勞役不足之病。作外傷寒邪。有餘表實之證。反漏其表。枉死者。豈勝言哉。皆由不別其寒熱耳。今細爲分解之外傷。

寒邪發熱惡寒。寒熱併作。其熱也翕翕發熱。又爲之拂拂發熱。發於皮毛之上。在羽毛之拂。明其熱在表也。是寒邪犯高之高者也。皮膚毛腠陽之分也。是衛之元氣所滋養之分也。以寒邪乘之。鬱遏陽分。陽不得伸。故發熱也。其面赤鼻氣擁塞不通。心中煩悶。稍似袒裸。露其皮膚。已不能禁其寒矣。其表上虛熱止此而已。其惡寒也。雖重衣下幕。逼近烈火。終不能禦其寒。一時一日增加愈甚。必待傳入裏作下證乃罷。其寒熱齊作無有間斷也。其內傷飲食不節。或勞役所傷。亦有頭痛項強腰痛。與太陽表證微有相似。餘皆不同。論中已辨之矣。內傷不足之病。表上無陽。不

能禦風寒也。此則常常有之。其燥熱發於腎間者間而有之。與外中寒邪略不相似。其惡風寒也。蓋脾胃不足。營氣下流而乘腎肝。此痿厥氣逆之漸也。若胃氣平常飲食入胃。其營氣上行以舒於心肺。以滋養上焦之皮膚。腠理之元氣也。既下流其心肺無所稟受。皮膚間無陽失其營衛之外護。故陽分皮毛之間虛弱。但見風見寒。或居陰寒處。無日陽處。便惡之也。此常常有之無間斷者也。但避風寒。及溫暖處。或添衣。蓋溫養其皮膚。所惡風寒便不見矣。是熱也。非表傷寒邪。皮毛間發熱也。乃腎間受脾胃下流之濕氣。閉塞其下。致陰火上衝。作蒸蒸而燥熱。上徹頭項傍。

徹皮膚。渾身燥熱作。須待袒衣露居。近寒涼處即已。
或熱極而汗出。亦解。彼外傷惡寒。發熱。豈有汗出者乎。若得汗。則病愈矣。以此辨之。豈不如黑白之易見乎。當內虛而傷之者。燥熱也。或因口吸風寒之氣。鬱其陰火。使咽喉不通。其吸入之氣欲入。爲膈上衝脈之火所拒。使氣不得入。其胸中之氣。爲外風寒所遏。而不得伸。令人口開目瞪。極則聲發於外。氣不得上下。塞於咽中。而氣欲絕。又或因噦。因噎。因吐。而燥熱發。必有所因。方見此證。其表虛惡風寒之證。復見矣。表虛之弱。爲陰火所乘。燥發湏臾而過。其表虛無陽。不任風寒。復見矣。是表虛無陽。常常有之。其燥熱則

間而有之。此二者不齊。作燥作寒已。寒作燥已。非如外傷之寒熱。齊作無有間斷也。百病俱有身熱。又爲之肌熱。又爲之皮膚間熱。以手捫之方知者是也。乃肌體有形之熱也。亦須皆待陰陽既和汗出則愈矣。慎不可於此上辨之。以其虛實內外病皆有之。故難辨耳。只依先說病人自覺發熱惡寒之熱乃燥作之熱上辨之爲準則矣。

右辨寒熱

外感八風之邪。乃有餘證也。內傷飲食不節。勞役所傷。皆不足之病也。其內傷亦惡風自汗。若在溫暖無風處。則不惡矣。與外傷鼻流清涕頭痛自汗。頗相似。

分之特異耳。外感風邪其惡風自汗。頭痛鼻流清涕。
常常有之一。日一時增加愈甚。直至傳入裏作下證。
乃罷。語聲重濁高厲有力。鼻息擁塞不通。能飲食腹
中和。口知味。大小便如常。筋骨疼痛不能動搖。便著
床枕。非扶不起。其內傷與飲食不節。勞役所傷。然亦
惡風居露地中。遇大漫風起。却不惡也。惟門窓隙中
些小賊風來。必大惡也。與傷風傷寒俱不同矣。況鼻
流清涕。頭痛自汗間而有之。鼻中氣短少。氣不足以
息。語則氣短而怯弱。妨食或食不下。或不飲食。三者
互有之。腹中不利。或腹中急而不能伸。口不知五穀
之味。小便頻數而不渴。初勞役得病。食少小便赤黃。

大便常難。或秘或結或虛坐。只見些小白膿。時有下氣。或泄黃如糜。或溏泄色白。或結而不通。若心下痞。或胸中閉塞。如刀剗之痛。二者亦互作不併出也。有時胃脘當心而痛。上支兩脇痛。必臍下相火之熱。如巨川之水。不可遏而上行。使陽明之經。逆行亂於胸中。其氣無止息。甚則高喘熱傷元氣。令四肢不收。無氣以動。而懶倦嗜卧。其外感風寒俱無此證。故易分別耳。

右辨外感八風之邪。或有飲食勞役所傷之重者。三二日間。特與外傷風者相似。其餘證有特異者。若不將兩證重別分解。猶恐將內傷不足之證誤。

作有餘外感風邪。雖辭理有重復處。但欲病者易

辨醫者易治耳。

內傷及勞役飲食不節病手心熱手背不熱。外傷風寒則手背熱手心不熱。此辨至甚皎然。

右辨手背手心

若飲食勞役所傷。其外證之顯必在口。必口失味。必失穀味。必腹中不和。必不欲言。縱勉強對答聲必怯弱。口沃沫多唾。鼻中清涕。或有或無。即陰證也。外傷風寒。則其外證必顯在鼻。鼻氣不利。聲重濁不清利。其言壅盛有力而口中必和。傷寒則面赤鼻壅塞而乾。傷風則鼻流清涕而已。內經云鼻者肺之候。肺氣

通於天。外傷風寒。則鼻爲之不利。口者坤土也。脾氣通於口。飲食失節。勞役所傷。口不知穀味。亦不知五味。又云傷食惡食。傷食明矣。

右辨鼻口

外傷風寒者。故其氣壅盛而有餘。內傷飲食勞役者。其口鼻中皆氣短促。不足以息。何以分之。蓋外傷風寒者。心肺元氣初無減損。又添邪氣助之。使鼻氣擁塞不利。面赤不通。其鼻中氣不能出。併從口出。但發一言必前輕而後重。其言高其聲壯厲而有力。傷寒則鼻乾無涕。面擁色赤。其言前輕後重。其聲壯厲而有力者。乃有餘之驗也。傷風則決然鼻流清涕。其聲

嘆其言響如從瓮中出亦前輕而後重高揭而有力
皆氣盛有餘之驗也。內傷食勞役者。心肺之氣先損。
爲熱所傷。熱既傷氣。四肢無力以動。故口鼻中皆短
氣少氣上喘懶語人有所問十不欲對其一縱勉強
答之其氣亦怯其聲亦低是其氣短少不足之驗也
明白如此雖婦人女子亦能辨之豈有醫者反不能
辨之乎

右辨氣少氣盛

內證頭痛有時而作。有時而止。外證頭痛。常常有之
直須傳裏實方罷此又內外證之不同也

右辨頭痛

內傷等病。是心肺之氣已絕於外。必怠惰嗜卧。四肢沈困不收。此乃熱傷元氣。脾主四肢。既爲熱所乘。無氣以動。經云。熱傷氣。又云。熱則骨消。筋緩。此之謂也。若外傷風寒。是腎肝之氣已絕於內。腎主骨爲寒。肝主筋爲風。自古腎肝之病同一治。以其迺相維持也。故經言。膽主骨。膀胱主筋。是也。或中風或傷寒。得病之日。便著床枕。非扶不起。筋骨爲之疼痛。不能動搖。乃形質之傷。經云。寒傷形。又云。寒則筋攣。骨痛。此之謂也。

右辨筋骨四肢

外感風寒之邪。三月已外。穀消水去。邪氣傳裏。始有

渴也。內傷飲食失節。勞役久病者。必不渴。是邪氣在
血脉中有濕。故不渴也。初勞役形質飲食失節。傷之
重者必有渴。以其心火熾上尅於肺金。故渴也。又當
以此辨之。雖渴欲飲水者。當徐徐少與之。不可縱意
而飲。恐水多峻下。則胃氣愈弱。輕則爲脹。重則傳變
諸疾。必反覆悶亂。百脉不安。夜則增劇。不得安卧。不
可不預度也。

右辨渴與不渴

仲景傷寒論中。風能食。傷寒亦能食。二者皆口中和
而不惡食。若勞役所傷。及飲食失節。寒溫不適。三者
俱惡食。口不知五味。亦不知五穀之味。只此一辨。足

以分內外有餘不足二證也。傷寒證雖亦能食而不惡食。口中和。知五味。亦知穀味。蓋無內證。則心氣和。脾氣通。知五穀之味矣。

右辨外傷不惡食。若勞役飲食失節。寒溫不適。二者皆惡食。

○論飲食勞倦爲胃氣不足所致

古者至人窮陰陽之化。究生死之際。所著內經。悉言人以胃氣爲本。蓋人受水穀之氣以生。所謂清氣營氣衛氣。春升之氣。皆胃氣之別稱也。夫胃爲水穀之海。飲食入胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四

時五臟陰陽揆度以爲常也。苟飲食失節，寒溫不適，則脾胃乃傷。喜怒憂恐勞役過度而損耗元氣，既脾胃虛弱，元氣不足，而心火獨盛。心火者，陰火也，起於下焦，其系繫於心，心不主令，相火代之，相火下焦包絡之火，元氣之賊也。火與元氣不兩立，一勝則一負。脾胃氣虛，則下流於腎肝，陰火得以乘其土位，故脾胃之證始得之，則氣高而喘，身熱而煩，其脉洪大而頭痛，或渴不止，皮膚不任風寒而生寒熱，蓋陰火上衝，則氣高而喘，身煩熱爲頭痛，爲渴而脈洪大，脾胃之氣下流，穀氣不得升浮，是生長之令不行，則無陽以護其榮衛，不任風寒，乃生寒熱，皆脾胃之氣不足。

所致也。然而與外感風寒之證形頗同而理異。內傷脾胃乃傷其氣。外感風寒乃傷其形。傷外爲有餘。有餘者瀉之。傷內爲不足。不足者補之。汗之下之吐之克之之類皆瀉也。溫之之類皆補也。內傷不足之病。苟認作外感有餘之病。而反瀉之。則虛其虛也。難經云實實虛虛。損不足而益有餘。如此死者醫殺之耳。惟當以甘溫之劑補其中升其陽。甘寒以瀉其火。則愈。內經曰勞者溫之。損者溫之。蓋溫能除大熱。大忌苦寒瀉胃土耳。今立補中益氣湯主之。

○論勞役傷與內傷外感不同

或因勞役腎間陰火沸騰。事閑之際。於陰涼處解脫。

衣裳。更有新沐浴。於背陰處坐卧。其陰火下行。還歸
腎間。皮膚腠理極虛無陽。但風來爲寒涼所遏。表虛
不任其風寒。自認外感風寒。求醫解表以重絕元氣。
取禍如反掌。苟幸而免者。致虛勞。氣血皆弱。不能完
復。其表虛之人。爲風寒所遏。亦是虛邪犯表。始病一
二日之間。特與外中賊邪有餘之證。頗相似處。故致
疑惑。請醫者只於氣少氣盛上辨之。其外傷賊邪必
語聲前輕後重。高厲而有力。若是勞役所傷。飲食不
節。表虛不足之病。必短氣氣促。懶語。上氣高喘。其聲
困弱而無力。至易見也。

右辨勞役受病表虛。不作表實治之。

復有一等乘天氣大熱之時。在於路途中。勞形得之。
或在田野間。勞形得之。更或有身體薄弱。食少。勞役
過甚。又有修善當齊之人。冒氣久虛。而因勞役得之。
者。皆與陽明中熱。白虎湯證相似。必身體捫摸之。壯
熱必燥。熱悶亂。大惡熱渴。而飲水以勞役過甚之故。
亦身疼痛。始受病之時。特與中熱外得有餘之病相
似。若悞與白虎湯。旬日必死。此證脾胃大虛。元氣不
足。鼻口中氣皆短促而上喘。至日轉以後。是陽明得
時之際。病必少減。若是外中熱之病。必到日晡之際。
大作譁譁。其熱增加。大渴飲水。煩悶不止。其勞役不
足者。皆無此證。尤易爲分解。若有難決疑似之證。必

當待一二日而求醫治療必不至錯誤矣

右辨中熱頗相似

○論飲食自倍腸胃乃傷分而治之

痺論云。陰氣者靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此混言之也。分之爲二。飲也。食也。又經云。因而大飲則氣逆。因而飽食筋脉橫解。則腸澼爲痔。飲者無形之氣。傷之則宜發汗。利小便。使上下分消其濕。解醒湯。五苓散之類主之。食者有形之物。傷之則宜損其穀。其次莫若消導乎。香爛飯丸。枳术丸之類主之。稍重則攻化三棱消積丸。木香見曉丸之類主之。尤重則或吐或下。瓜蒂散備急丸之類主之。以平爲

期。蓋脾已傷。又以藥傷使營運之氣減削。食愈難消。故五常政論云。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。不盡行復加法。聖人垂此嚴戒。是爲萬世福。如能慎言語。節飲食。所謂治未病也。

謹按王安道曰。勞倦傷飲食傷。二者雖俱爲內傷。然不可混而爲一。難經所謂飲食勞倦。則傷脾者。蓋爲脾主飲食。而四肢亦屬脾。故飲食失節。勞役四肢。皆能傷於脾爾。非謂二者同類而無辨也。夫勞倦傷飲食傷。雖與風寒暑濕有餘之病不同然。

飲食傷又與勞倦傷不同。勞倦傷誠不足矣。飲食傷尤當於不足之中分其有餘不足。何也？蓋飢餓不飲食與飲食太過，雖皆失節，然必明其有兩者之分。方盡其理節也。者何也？無不及無太過之道也。夫飢餓不飲食者，胃氣空虛，此爲不足，固失節也。飲食自倍而停滯者，胃氣受傷，此不足之中兼有餘，亦失節也。以受傷言，則不足以停滯；言則有餘矣。惟其不足，故補益；惟其有餘，故消導。亦有物滯氣傷，必補益；消導兼行者，亦有物暫滯而氣不甚傷，宜消導獨行，不須補益者，亦有旣停滯而復自化，不須消導，但當補益者，察

古東垣枳木丸之類雖曰消導固有補益之意存乎其間其它如木香分氣丸導氣枳實丸大枳殼丸之類雖無補益然施之於物皆滯氣不甚傷者豈不可哉但不宜視為通行之藥爾且所滯之物非枳木丸之力所能去者亦安可泥於消導而弗知變乎故備急丸煮黃丸瓜蒂散等之推逐者繫古東垣亦未嘗委之而弗用也故善用兵者攻亦當守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推逐之理矣斯論本已上所辨又推廣之因取參

附以備其旨

又曰經云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱嗟夫此內傷之說之原乎請釋其義如左夫人身之陰陽有以裏言者有以上下之分言者有以升降呼吸之氣言者餘如動靜語默起居之類甚多不必悉舉此所謂陰虛之陰其所指與數者皆不同蓋勞動之過則陽和之氣皆亢極而化爲火失況水穀之味又少入是故陽愈盛陰愈衰也此陰虛之陰蓋指身中之陰氣與水穀之味耳或以下焦陰分爲言或以腎水真陰爲言皆非也夫有所勞倦者過動屬火也形氣衰少者壯火食氣也穀氣不

盛者勞傷元氣則少食而氣衰也。上焦不行者清陽不升也。下脘不通者濁陰不降也。夫胃受水穀故清陽升而濁陰降以傳化出入滋榮一身也。今胃不能納而穀氣衰少則清無升濁無降矣。故曰上焦不行下脘不通然非謂絕不行不通也。但比之平常無病時則謂之不行不通耳。上不行下不通則鬱矣。鬱則少火皆成壯火而胃居上焦下脘兩者之間故胃氣熱熱則上炎故熏胸中而爲內熱也。斯東垣所謂勞傷形體所謂飲食失節而致熱者此言正與調經論篇之旨相合宜引此段經文於內外傷辨以爲之主今特采附併外傷內傷。

所受經旨異同論錄于左

客或難予曰。素問陰陽應象論云。天之邪氣感則害人五臟水穀之寒熱感則害於六腑太陰陽明論云。犯賊風虛邪者陽受之。飲食不節。趙居不時者陰受之。陽受之則入六腑。陰受之則入五臟。兩說正相反。願聞其解。余復之曰。此所謂似反而不可反者也。夫感天之邪氣犯賊風虛邪外傷有餘之病也。感水穀寒熱飲食不節內傷不足之病也。二者之傷。臟腑皆嘗受之。但隨其所從所發之處而爲病耳。不可以此兩說之異而致疑。蓋並行不相悖也。讀者當合而觀之。其旨斯盡。若曰不然。請以

諸處所論證之。金匱真言論曰。風觸五臟邪氣發病。八正神明論曰。夫八正之虧邪。以身之虛而逢天之虛。兩虛相感。其氣至骨入。則傷五臟。靈樞經曰。五臟之中風。又曰東風傷人。內舍於肝。南風傷人。內舍於心。西南風傷人。內舍於脾。西風傷人。內舍於肺。北風傷人。內舍於腎。觀乎此。則天之邪氣。固傷五臟矣。靈樞又曰。邪之中人也。無有當中于陰。則溜于腑。又曰。虛邪之中人也。始從皮膚以入。其傳自絡脉而經。而輸而伏衝之脉。以至於腸胃。又曰。東北風傷人。內舍於大腸。西北風傷人。內舍於小腸。東南風傷人。內舍於胃。觀乎此。則天之邪

氣豈不傷六腑乎。素問曰飲食自倍腸胃乃傷觀乎此則水穀寒熱固傷六腑矣。靈樞又曰形寒飲冷則傷肺難經曰飲食勞倦則傷脾觀乎此則水穀寒熱豈不傷五臟乎。至於地之濕氣亦未必專害皮肉筋脈而不能害臟腑邪氣水穀亦未必專害臟腑而不能害皮肉筋脈也。但以邪氣無形臟主藏精氣故以類相從而多傷臟水穀有形腑主傳化物故因其所由而多傷腑濕氣浸潤其性緩慢其入人也以漸其始也自足故從下而上從淺而深而多傷於皮肉筋脉耳孰謂濕氣全無及於臟腑之理哉至若起居不時一語蓋勞役所傷之

病不系上文異同之義。故不及之。

○論酒飲傷

夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也。若傷之止當發散汗出則愈矣。此最妙法其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性太熱已傷元氣而復重濁之况亦損腎水真陰及有形陰血俱爲不足如此則陰血已虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命不然則虛損之病成矣金匱要略云酒疸下

之。久久爲黑疽，慎不可犯此戒。不若令上卡分消其濕解醒湯主之。

謹按酒者是有形之物，即水飲同體也。今言無形元氣受病不得傷於有形陰血者，蓋謂酒者濕耗之物，入胃則臟氣俱熱，逐氣升降之際而半有消耗之矣。至傷於腸胃，則升之不散，降之不下，鬱於氣分無形之地位。故言無形之物，非若水飲然體全降於腸胃中也。若今人之飲醇酒，則便少此其可驗。是以傷則宜汗之泄之，不得用重峻下劑。蓋此等藥不能入氣分，反傷有形陰血爾。但斯意隱然使人不能無疑，故或有辨之者，茲不復具。然昔

人有用下劑者。蓋或有酒飲傷。積日久而汗之泄之。不能愈則重峻下劑而或可哉。故用者自宜對證詳審。勿以詞害意可也。

○論傷食宜吐

解云。盛食填塞於胸中。爲之窒塞。兩手寸脉當主事。兩尺脉不見其理。安在。胸中有食。故以吐出之。食者物也。物者坤土也。是足太陰之號也。胸中者肺也。爲物所傷。肺者手太陰金也。金主殺伐也。與坤土俱在於上。而旺於天。金能尅木。故肝木生發之氣。伏於地下。非木鬱而何。吐去上焦陰土之物。木得舒暢。則鬱結去矣。食塞於上。脉絕于下。若不明天地之道。無由

達此至理。水火者陰陽之徵兆。天地之別名也。故曰獨陽不生。獨陰不長。天之用在於地下。則萬物收藏矣。地之用在於天上。則萬物收藏矣。此乃天地交而萬物通矣。此天地相根之道也。故陽火之根。本於地下。陰水之源。本於天上。故曰水出高源。故人五臟主有形之物。物者陰也。陰者水也。右三部脉主之。偏見於寸口。食塞在上。是絕五臟之源。源絕則水不下流。兩尺鵠絕。此其理也。何疑之有。

○論內傷飲食用藥所宜所禁

內傷飲食。付藥者受藥者。皆以爲瑣末細事。是以所當重者爲輕。利害非細。殊不思。胃氣者營氣也。衛氣

也。穀氣也。清氣也。資少陽生發之氣也。人之真氣衰
旺。皆在飲食入胃。胃和則穀氣上升。穀氣者升騰之
氣也。乃足手少陽元氣始發生長萬化之別名也。飲
食一傷。若消導藥的對其所傷之物既消。則胃氣愈
旺。五穀之精華上騰。乃清氣爲天者也。精氣神氣皆
強盛也。七神衛護。生氣不乏。增益大旺。氣血周流。則
百病不能侵。雖有大風苛毒。弗能害也。此一藥之用。
其利博哉。易水張先生嘗戒不可用峻利食藥。食藥
下咽。未至藥丸施化。其標皮之力。始開便言空快也。
所傷之物已去。若更待一兩時辰。許藥盡化。開其峻
藥。必有情性。病去之後。脾胃安得不損乎。脾胃既損。

是真氣元氣敗壞。促人之壽。嘗時用枳朮丸一藥。消化胃中所傷。下胃不能即去。須待一兩時辰許。食則燒飯爲丸。荷葉一物。中央空虛。象震卦之體。震者動也。人感之生。足少陽甲膽也。甲膽者風也。生化萬物之根蒂也。左傳云。履端於始。序則不愆。人之飲食入胃。營氣上行。即少陽甲膽之氣也。其手少陽三焦經。人之元氣也。手足經同法。便是少陽元氣生發也。胃氣穀氣元氣。甲膽上升之氣一也。異名雖多。正是胃氣上升者也。若內傷脾胃。以辛熱之物。酒肉之類。自覺不快。貢藥於醫者。此風習以爲常。醫者亦不問所。

傷即付之以集香丸巴豆大熱藥之類下之。太便下
則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣。七神不
識經云熱傷氣正謂此也。其人必無氣以動而熱困
四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣。
若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投
之物隨藥下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重
瀉其陽陽去則皮膚筋肉血脉無所依倚便爲虛損
之證論言及此令人寒心夫辛辣氣薄之藥無故不可
亂服非止牽牛而已至真要大論云五味入胃各
先歸其所喜攻攻者克伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺
之正氣正氣者真氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈奪

人尤甚。飲食所傷。脾胃受邪。當以苦味泄其腸胃可也。肺與元氣何罪之有。夫牽牛不可用者有五。此其一也。况胃主血。爲物所傷。物者有形之物也。皆血病。血病漏氣。此其二也。且飲食傷於中焦。止合克化消導。其食重瀉。上焦肺中已虛之氣。此其三也。食傷腸胃。當塞因塞用。又寒因寒用。枳實大黃苦寒之物。以治有形是也。反以辛辣牽牛散瀉真氣。犯大禁四也。殊不知針經有云。外來客邪風寒。傷人五臟。若誤瀉胃氣必死。誤補亦死。其死也。無氣以動故靜。若內傷腸胃。反瀉五臟必死。誤補亦死。其死也。陰氣有餘。故躁。今內傷腸胃。是謂六腑不足之病。反瀉上焦虛無

肺氣。肺者五臟之一數也。爲牽牛之類。朝損暮損。其元氣消耗。此乃暗裏折人壽數。犯大禁五也。良可哀歎。內經曰。胃惡熱而喜清。大腸惡清冷而喜熱。兩者不和。何以調之。岐伯曰。調此者飲食衣服。亦欲適寒溫。寒無淒愴。暑無出汗。飲食熱無灼灼。寒無滄滄。寒溫適中。故氣將持。乃不致邪僻。詳見本經。是必有因用。豈可用俱寒俱熱之食藥。致損者歟。內經云。內傷者。其氣口脈反大於人迎。一倍二倍三倍。分經用藥。又曰。上部有脉。下部無脉。其人當吐。不吐者死。如但食不納。惡心欲吐者。不問一倍二倍。不當正以瓜蒂散吐之。但以指或以物探去之。若所傷之物去不盡。

者更診其脉。問其所傷。以食藥去之。以應塞因塞用。
又謂之塞因寒用。泄而下降。乃應太陰之用。其中更
加升發之藥。令其元氣上升。塞因塞用。因曲而爲之
直。何爲曲。內傷胃氣是也。何爲直。而升發胃氣是也。
因治其飲食之內傷。而使生氣增益。胃氣完復。此乃
因曲而爲之直也。若依分經用藥。其所傷之物。寒熱
溫涼。生硬柔軟。所傷不一。難立定法。只隨所傷之物。
不同。各立治法。臨時加減用之。其藥又當問病人。從
來稟氣盛衰。所傷寒物熟物。是喜食而食之耶。不可
服破氣藥。若乘飢困而食之耶。當益胃氣。或爲人所
勉勸。強食之。宜損血而益氣也。診其脉候。傷在何臟。

方可與對病之藥。豈可妄瀉天真生氣。以輕喪身寶乎。且如先食熟而不傷。繼之以寒物。因後食致前食亦不消化而傷者。當問熟食寒食孰多孰少。斟酌與藥無不當矣。喻如傷熱物二分。寒物一分。則當用寒藥二分。熟藥一分。相合而與之。則榮衛之氣必得固流。更有或先飲酒。而後傷寒冷之食。及傷熱食冷水與冰。如此不等。皆當驗其節次所傷之物。約量寒熱之劑。分數各各對證而與之。無不取驗。

內傷治法

○消導之劑

潔古枳术丸治痞消食强胃

枳實麸炒

白术兩

右同爲細末。荷葉裹燒飯爲丸。如桐子大。每五十丸。多用白湯送下。

按論云。用术者本意不取其食速化。但久令人胃氣強。食不復傷也。

丁香爛飯丸治飲食所傷

丁香皮

甘草炙各二錢

砂仁

益智仁

甘松各三錢

丁香

京三棱炮

木香

廣術

一錢

香附子半兩

右爲細末。湯浸蒸餅爲丸。如棗大。每三十丸。白湯下。或細嚼亦可。不拘時候。

按此寒濕勝者最宜用之

東垣橘皮枳朮丸治老幼元氣虛弱飲食不消或臘
腑不調心下痞悶

橘皮

枳實各一兩

白朮二兩

右爲細末荷葉燒飯爲丸如桐子大每五十丸食
遠溫水送下

按此內傷用藥之大法所貴服之強人胃氣益
厚雖猛食多食而不傷此能用食藥者也

麴蘖枳朮丸治爲人所勉強食之致心腹滿悶不快

白朮

三兩

枳實

炒一兩

神麴

炒半兩

麥蘖麵

炒各一兩

右爲細末荷葉燒飯丸如桐子大每五十丸溫水

下

木香枳术丸破滯氣消飲食開胃進食

木香

枳實

炒各一兩

白朮

右製服如前

木香化滯湯治因憂氣食濕麪結於中脘。腹皮底徹
痛心下痞滿。不思飲食。食之不敢。常常痞氣。

木香

紅花

各三錢

橘皮

當歸

稍各二錢

柴胡

四錢

草豆蔻

甘草

炙各半兩

半夏

一兩

枳實

炒二錢

右剉如麻豆大。每服三五錢入姜煎食。遠服。

半夏枳术丸治因冷食內傷。

半夏湯洗

枳實

炒各一兩

白朮

二兩

右爲細末荷葉燒飯爲丸如菉豆大每五六十丸
溫水下如食傷寒熱不調每服加二黃丸十粒
草豆蔻丸治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩

脇膈咽不通

草豆蔻

麪裹煨一兩

神麴

炒半兩

白朮

一兩

橘皮

乾生姜

青皮

各一錢

黃芩

麥蘖

半夏

炒鹽

各半兩

枳實

炒一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸

白湯下量所傷多少加減服之

按論云如冬月用別作一藥不用黃芩歲火不及

又傷冷物加以溫劑是其治也。然有熱物傷者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也。

除濕益氣丸治傷濕麌心腹滿悶肢體沉重

枳實炒

各一錢

白术

黃芩各一兩

蘿蔔子炒熟去氣半兩

神曲炒一兩

紅花三錢

右爲細末荷葉燒飯爲丸如棗豆大每五六十九丸

白湯三下

二 黃丸治傷熱食痞悶兀丸欲吐煩亂不安

黃芩二兩

黃連酒浸一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草二錢

枳實炒半兩

右爲極細末湯浸蒸餅丸如棗豆大每五七十丸

白湯下

白朮丸治傷豆粉濕麴油膩之物

白朮

半夏

湯洗

神龜

炒

枳實

炒各兩

橘皮

七錢

黃芩

半兩

白礬

枯三錢

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如棗豆大一倍每五十丸白湯下量所傷加減服

論曰素食者多用乾姜故加黃芩以漏之接已上諸方並宜隨寒熱所用出太陰例

葛花解醒湯

白豆蔻

砂仁

葛花

各半兩

木香

半錢

青皮

三錢

陳皮

白茯苓

猪苓

人參

各一錢半

白朮

神麴

炒

澤瀉

乾生薑

各二錢

右爲細末和勻每三錢白湯調下但得微汗酒病去矣

論云此蓋不得已用之。豈可恃賴日日飲酒。是方氣味辛辣。偶因酒病服之。則不損元氣。何者。敵酒病故也。若頻服之。損人天年也。

除濕散治傷馬乳并牛羊駱水一切冷物

車前子

炒

澤瀉

各半兩

神麴

炒一兩

半夏

湯炮七次

乾生姜

各三錢

紅花

甘草

炙各二錢

茯苓

七錢

右爲細末每三錢匕白湯調食前服

五芩散方見濕門

按已上三方並太陽例藥滲利之劑也

○推逐之劑

三黃枳术丸治傷肉食濕麴辛辣味厚之物填塞腸亂不安

黃芩二兩

黃連

大黃一兩

神曲炒半兩

白朮

橘皮各一兩

枳實炒半兩

右爲細末湯浸蒸餅丸如棗豆大一倍每五十丸
白湯下量所傷服之

枳實導滯丸治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶
不安

茯苓

黃芩

白朮

黃連

各三錢

澤瀉

錢二

大黃

兩一

枳實

炒

神曲

各五錢

右爲細末如上法丸服至七十九丸

枳實梔子大黃湯大病瘥後傷食勞復

枳實

炒一箇

梔子

三枚大者

豉

一兩綿裹

右以清漿水一盞。煮至八分。內枳實梔子。少時下豉再煮五六沸。去相內大黃如薄棋子六七枚。煎五六沸溫服。食膏梁之物過多。煩悶亂者亦宜服之。如無宿食。止因食傷煩亂者。減去大黃令溫服。

取汗

木香見眼丸治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜

錢半

荆三稜

一兩

神麴

炒一兩

木香

二錢

香附子

半兩炒

石三稜

半兩

升麻

三錢

柴胡

二錢

草豆蔻

麵裹半兩

右爲末湯浸蒸餅丸如棗豆大一倍每二十丸白
湯下量所傷多少服之

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁皮

益智仁

各三錢

陳皮

青皮

各五錢炮

茴香

炒半兩

炒麴

廣术

炮各

京三稜

七錢炮各

巴豆

和米五錢炒去

右爲細末醋糊丸如桐子大每十九丸至二十丸溫

薑湯下食前量虛實如減如更衣止後服

備急大黃丸療心腹諸卒暴百病

大黃

乾姜

巴豆

去皮各兩

右湏精擇好藥搗羅蜜和更搗一千杵。丸如小豆大每三丸若小量之。若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐力刺痛氣急口噤停戶厥卒死者以煖水苦酒服之或不下捧頭起令下嚥須臾瘥未瘥更與三丸以腹中鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之令人尤妙忌蘆筍猪肉冷水肥膩易水張先生又名獨行丸乃急劑也

海藏神應丸治因一切冷物冷水及醣乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

巴豆

杏仁

乾姜

百草霜各半兩

丁香

木香

各二錢

黃蠟一兩

右先將黃蠟用好醋煮去粗。將巴豆杏仁同炒黑。烟盡研如泥。將蠟再上火入麻油半兩溶開入在杏仁等泥子內。同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作鏈子。油紙裹了旋丸。每用三五十丸溫米飲下食前服。

○吐劑

瓜蒂散

方見前

按論云。若不兩尺脉絕無不宜便用此藥。恐損元氣令人胃氣不復。若止是胸中窒塞悶亂不通。以

指探去之。如不得吐者。以物探去之。得吐則已。如食不去用此藥去之。

○補益之劑

補中益氣湯

方見熟門

按立方本指云。夫脾胃虛者。因飲食勞倦。心火亢甚而乘其土位。其次肺氣受邪。須用黃芪最多。人參甘草次之。脾胃一虛。肺氣先絕。故用黃芪以益皮毛。而閉腠理。不令自汗。上喘氣短。損其元氣。用人參以補之。心火乘脾。炙甘草之甘溫以瀉火熱。而補脾胃中元氣。若脾胃急痛。腹中急縮者。宜多用之。經云急者緩之。白朮苦甘溫除胃中熱利腰。

臍間血。胃中清氣在下。升麻柴胡以引之。引黃芪。
甘草甘溫之氣味上升。能補衛氣之散解。而實其
表也。又緩帶脉之縮急。二味苦平。味之薄者。陰中
之陽。引清氣上升也。氣亂於胸中。爲清濁相干。用
陳皮以理之。又能助陽氣上升。以散滯氣。助諸甘
辛爲用也。脾胃氣虛不能升浮。爲陰火傷其生發
之氣。榮血大虧。營氣不榮。陰火熾盛。是血中伏火
日漸煎熬。血氣日減。心主血。血減則心無所養。致
使心亂而煩。病名曰恍。恍者心惑而煩悶不安也。
故加辛甘微溫之劑。生陽氣。陽旺則能生陰血。更
以當歸和之。少加黃柏以救腎水。能瀉陰中之伏

火如煩不止。少加生地黃補腎水。水旺而心火自

降。如氣浮心亂。以硃砂安神丸鎮固之則愈。安神

丸

方見熟門

頭痛加蔓荆子三分。痛甚加川芎五分。頂痛腦痛
加藁本五分。細辛三分。諸頭痛併用此四味。頭痛
有痰。沉重懶倦者。乃太陰厥頭痛。加半夏半錢。姜

三分

耳鳴目黃。頰額腫。頸肩腰肘臂外後廉痛。面赤脈
洪大者。以羌活一錢。防風七分。甘草五分。藁本十
分。通其經血。加黃芩三分。黃連三分。消其腫。人參
五分。黃芪七分。益元氣而瀉火邪。

嗌痛領腫脉洪大面赤加黃芩三分桔梗七分甘草三分口乾嗌乾者加葛根五分升引胃氣上行以潤之

心下痞効悶者加芍藥黃連各一錢如痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香三分砂仁三分如天寒少加乾姜

心下痞覺中寒加附子黃連各一錢不能食而心下痞加生姜陳皮各一錢能食而心下痞加黃連半錢枳實三分脉緩有痰而痞加半夏黃連各一錢

腹中痛加白芍藥半錢甘草三分如惡寒覺冷痛

加中桂半錢。夏月腹中痛。不惡寒。不惡熱者。加黃芩五分。芍藥一錢。甘草五分。以治時熱也。

腹痛在寒涼時。加半夏。益智豆蔻之類。

脇下痛或縮急。俱加柴胡。

臍下痛加真熟地黃半錢。有寒者加肉桂半錢。

升陽散火湯

方見火門

當歸補血湯

方見熱門

升陽順氣湯。治因飲食不節。勞役所傷。腹脇滿悶。短氣。遇春則口淡無味。遇夏雖熱。猶有惡寒。饑常如飽。不喜食冷。

升麻

柴胡

各一錢

葛氏一兩

半夏三錢

甘草炙半錢

陳皮一錢

人參三錢

神龜炒半錢

當歸身一錢

黃柏半錢

華豆蔻仁二錢

右㕮咀每三錢或半兩水煎入生薑三片食前溫服

按論云脾胃不足之證。須用升麻柴胡苦平味之薄者。陰中之陽。引脾胃中清氣行於陽道。及諸經生發陰陽之氣。以滋春氣之和也。又引黃芪參草甘溫之氣。味上行。充實腠理。使陽氣得衛外而爲固也。凡治脾胃之藥。多以升陽補氣名之者。此也升陽補氣。湯治飲食不時。飢飽勞役。胃氣不足。脾氣下溜。氣短無力。不能寒熱。早飯罷後。轉增昏悶。湧

要眠睡。急墮四肢不收。懶倦動作。及五心煩熱。能音

耐古能
通用

升麻

羌活

獨活

防風

白芍藥

澤瀉

甘草

炙各一錢

厚朴

姜製半錢

柴胡

二錢半

生地黃

一錢半

右爲粗末每五錢水煎入姜三片棗二枚如腹脹
及霍或加厚朴腹中似硬加砂仁三分
按此用升浮扶持胃氣抑肝清脾藥也

參术調中湯瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芪

四分

桑白皮

五分

人參

甘草

炙各三分

白茯苓

各三分

五味子

二十箇

白术

三分

地骨皮

麥門冬

陳皮分各三

青皮一分

右㕮咀作一服水煎大溫服。早飯後忌多言語勞役。

按論云。內經曰。火位之主。其瀉以甘。以黃芪甘溫瀉。熟補氣。桑白皮苦微寒。瀉肺火。定喘。故以爲君。肺欲收。急食酸以收之。以五味子之酸。收耗散之氣。止咳嗽。脾胃不足以甘補之。白朮入參炙甘草苦甘溫。補脾緩中爲臣。地骨皮苦微寒。善解肌熱。茯苓甘平降肺火。麥門冬甘微寒保肺氣爲佐。青陳皮苦辛溫散胸中滯氣爲使也。

升陽益胃湯治脾胃虛。則怠惰嗜卧。四肢不收。時值

秋燥令行。濕熱少退。體重節痛。口燥舌乾。飲食無味。大便不調。小便頻數。食不消。兼見肺病。酒淅惡寒。慘慘不樂。面色惡而不和。乃陽氣不伸故也。當以升陽益胃名之。

羌活

獨活

防風

各半兩以秋旺故以辛溫瀉之

柴胡

白术

茯苓

渴者勿用

澤瀉

各三錢

黃芪

二兩

人參

半夏

甘草

炙各一兩

黃連

一錢

陳皮

四錢

白芍藥

五錢

何故秋旺用

補旺。蓋脾胃虛則肺俱受邪。故因時而補易爲力也。

右㕮咀每服三錢水煎入薑棗溫服早飯後或加至半兩服藥後如小便罷而病加劇。是不宜利小

便當少去茯苓澤瀉。若喜食初一二日不可飽食。
恐胃再傷。以藥力尚少。胃氣不得轉運升發也。須
薄味之食。或羹食助其藥力。益外浮之氣而滋其
胃氣。慎不可淡食以損力。而助邪氣之降沉也。可
以小役形體。使胃與藥得轉運升發。慎勿大勞役
使氣復傷。若脾胃得安靜爲佳。若胃氣稍強。少食
果。以助穀藥之力。經云五穀爲養。五果爲助者也。
雙和散補血益氣治虛勞少力。

黃芪

川芎

當歸

熟地黃名兩

官桂

甘草

炙各七錢半

白芍藥二兩半

右爲粗末每四錢入薑棗水四盞煎溫服

論云治大疾之後虛勞氣之者以此調治不寒不
冷溫而有補

調中益氣湯夫脈弦洪緩而沉按之中之下得時一
滯其證四肢滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重
煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味腹難伸
舒大小便清利而數或上飲下便或大便滯滯不行一日二日一見芟月飧泄米穀不化或便後見
血見白膿胸滿短氣咽膈不通食入反出耳鳴耳
聾目中流火視物昏花熱壅頭目不得安卧嗜睡
無力不思飲食

升麻二

黃芪一

錢

甘草半錢

蒼朮一

分四

木香二分

人參五分

柴胡

橘皮各二分

右咬咀作一服水煎食前熱服

如時顯熱躁。是下元陰火蒸蒸發也。加生地黃黃柏

如大便虛坐不得。或大便了而不了。暖常逼迫血虛血澁也。加當歸身

白术和胃丸治病久不能食。而臟腑或結或滯。此胃氣虛弱也。常服則和中理氣。消痰去濕。和脾胃。進飲食。

厚朴

製

半夏各一

白术

一兩

陳皮

八錢

檳榔

枳實

各二錢半

木香

一錢

人參

七錢

甘草
炙三錢

右爲細末生薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每三十丸溫水送下食遠服之

寬中進食丸滋形氣羨飲食

神曲
炒五錢

甘草
炙一錢

木香
分五錢

草豆蔻仁
五錢

枳實
炒四錢

半夏
七錢

人參

乾生姜

青皮
各一錢

陳皮

白术

白茯苓

澤瀉
各二錢

猪苓
一錢

砂仁
半錢

大麥牙
兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每三四十丸

溫米飲下食遠服之

厚朴溫中湯治脾胃虛寒心腹脹滿及秋冬客寒犯

胃時作疼痛

厚朴

製

陳皮

各二兩

茯苓

草豆蔻

甘草

炙

木香

各半兩

乾姜

二錢

石爲粗末每五錢入薑煎食前服

論云。戊火已衰不能運化。又如客寒聚爲滿痛。散以辛熱佐以苦甘。以淡泄之氣溫胃和痛自止矣。按此三方又消導之劑也。

益胃散治服寒藥過多或脾胃虛弱胃脘痛又名溫胃湯

白豆蔻

薑黃

乾生薑

各三錢

澤瀉

砂仁

甘草

人參

厚朴

各二錢

陳皮

黃芪

各一錢

益智仁

六錢

右爲細末。每服三錢。水煎溫服。如脉弦惡寒腹痛。乃中氣弱也。以仲景小建中加黃芪錢。氏異功散。加芍藥選而用之。如渴甚白朮散倍葛根。

沉香溫胃丸。治中焦氣弱。脾胃受寒。飲食不美。氣不調和。臟腑積冷。心腹疼痛。大便滑泄。腹中雷鳴。霍亂吐瀉。手足厥逆。大便利無度。又治下焦陽虛。臍腹冷痛。及療傷寒陰濕形氣沉困自汗。

沉香

甘草

炙

當歸

良姜

吳茱萸

人參

木香

茯苓

白朮

白芍藥

各半兩

附子

炮

巴戟

浸酒

乾薑

炮

茴香

各一兩

官桂

十錢

丁香

三錢

右爲細末用好醋打麪糊爲丸如桐子大每五七
十丸。熟米飲空心下日二服忌一切生冷物。

按此治腎之脾胃虛寒藥也。論云。凡脾胃之證。謂
治差悞。或妄下之。未傳寒中。復遇時寒。則四肢厥
逆。而心胃絞痛。冷汗出。舉痛論云。寒氣客於五臟
厥逆上泄。陰氣竭。陽氣未入。故卒然痛死。不知人。
氣復則生矣。夫六氣之勝。皆能爲病。惟寒毒最重。
陰主殺故也。聖人以辛熱散之。復其陽氣。故曰寒
邪客之。得炅則痛立止。此之謂也。

神聖復氣湯治氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水。子
能令母實手太陰肺。實反來侮土。火木受邪腰皆

胸膈閉塞疼痛。善嘔口中涎。目中泣。鼻流濁涕不止。或息肉不聞香臭。欬嗽痰沫。上熱如火。下寒如冰。頭作陣痛。目中流火。視物瞓瞓。耳鳴耳顛。頭井口鼻。或惡風寒。喜日陽。夜卧不安。常覺痰塞。膈咽不通。口失味。兩脇縮急而痛。牙齒動搖不能嚼物。陰汗出。前陰冷。行步欹側。起居艱難。掌中寒。風痺麻木。小便數而晝多。夜頻而久。氣短喘渴。少氣不足以息。卒遺失無度。婦人白帶。陰戶中大痛。牽心而痛。面如赭色。食少大便不調。煩心霍亂。逆氣裏急。而腹皮色白。後出餘氣復不能努。或腸鳴膝下筋急。肩胛大痛。此皆寒水來復火土之讐也。

乾姜分 炮三半夏湯洗

柴胡錢一

藁本分八

半夏七分

研各

防風

人參

桔李仁半錢

升麻分七

附子分二

當歸身六分

羌活一錢

甘草分八

白葵花五朵

去心

右哎咀都作一服水五盞煎至二盞入

黃芪一錢

陳皮五分

草豆蔻

麴裹煨一錢在內前

至一盞再入下項藥

黃柏浸酒

黃連洗酒

枳殼

生地黃各三

已上四味預一日別用新水浸又以

華陰細辛二分

川芎

蔓荆子各三分

預一日用新水半大盞分作二處浸此三味并黃

柏等煎正藥作一大盞不去粗入此浸者藥再上

火煎至一大盞去粗空心稍熱服

又能治咬頰咬唇咬舌根強硬等證如神宜食
肉湯不宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎與膀
胱經中有寒元氣不足者皆宜服之神驗於月生
月滿時隔三五日一服如病急不拘時分

益胃湯治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁
熱氣短口不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶
口乾不喜食冷

草芪

半錢

甘草

二分

黃芩

三分

當歸

半錢

薯朮

半錢

陳皮

升麻

各五分

柴胡

人參

白术

益智仁

各三分

半夏

二分

右咬咀作一服水煎食前稍熱服忌生冷硬物酒

濕麴

強胃湯治因飲食勞倦所傷。腹脇滿悶短氣。遇春口淡無味。遇夏雖熱而惡寒。常如飽不喜食冷物。

前方減黃芩蒼白术益智加草豆蔻黃柏麴生薑右爲散每服五錢水煎食前服

論云治法已驗者可以意求其的。觸類而長之則不可勝用矣。予病脾胃久衰。視聽半失。此陰乘陽而上。氣短精神不足。且脉弦皆陽氣衰弱。伏匿於陰中故耳。癸卯歲六七月間霖雨陰寒踰月不止。時人多病瀉痢乃濕多成五泄故也。一日體重肢

節疼痛。大便泄。併下者三。而小便閉塞。默思內經。
有云。在下者引而竭之。是先利小便也。又治諸瀉。
小便不利者。先分利之。治濕不利小便。非其治也。
法當淡滲之劑。意聖人之法。雖布在方策。其不盡。
者。以意求之。今客邪寒濕之勝。自外入裏。而甚暴。
若以淡滲之劑利之。病雖即已。是降之又降。復益。
其陰。而重竭其陽也。則陽氣愈削。而精神愈短。陰。
重強而陽重衰也。茲以升陽之藥。是爲宜爾。羌活。
獨活。升麻各一錢。防風半錢。炙甘草半錢。一劑乃。
愈。大法云。寒濕之勝。助風以平之。又曰。下者舉之。
此得陽氣升騰。故愈。是因曲而爲之直也。夫聖人。

之法可以類推舉一則知百矣

○雜方

拔萃檳榔丸治傷食心腹膨脹

檳榔半

二錢
陳皮一兩

木香半

二錢
牽牛頭末

枳實半

各一兩

右爲細末醋糊丸桐子大米飲下二三十丸

千金紫丸治食癟

赤石脂

代赭石

各一錢

巴豆

三箇另研

杏仁

五箇另研成膏

右以杏仁膏相和杵二千下入蜜些小丸麻子大三十日小兒用一丸乳下

丹溪麌鞠丸治食癟

方熟門

玉機微義卷之十八終