

醫藥顧問

上海大眾書局印行



序

馬君小琴。東哲名醫。馬松琴先生哲嗣。擅文學。弱冠蜚聲儒林。時學校初興。君服務教育界。主師範中學講席。逸遁十載。暇則喜閱醫書。以自遣。民初來滬。任浙江公學校長。珂里之人。咸知君稟家學。有病輒往就診。多奇效。由是名播遐邇。聲譽日隆。民四撤校務。設硯應診。戶限爲穿。第素性恬靜。落落寡交。故同道中。雖多知君名。而莫或識之者。歲丁卯季夏。君以積勞感暑熱。病甚。囑其壻。惜民。邀僕診視。先後數次。服藥三五劑。病良已。由是識君。但彼此俱爲業務所牽。不獲時相過從。至爲悵結。今聞君以診餘暇。晷。蒐輯前賢所論各症。所定諸方。匯爲一編。覽其內容。則類別症候。條分治法。刪繁摘要。系

統井然。真所謂實獲我心。蓋僕夙具此志。三十年來。心爲形役。輒違所願。不圖君竟先我爲之。君誠有志之士哉。夫著書立說。詞必已出。力避前人窠臼。斯爲能事。若夫醫書。採列聖列賢之菁華。規爲一系。俾後之學者。無散漫難覓之苦。有按圖索驥之便。而更附以己意。屢以驗方。更使有醫學常識者。可資爲導師。鄉僻編氓。可恃爲救星。述而不作。功在人間。壽之梨棗。誰曰不宜哉。是爲序。

民國二十年

月

日

丁仲英拜撰

原书缺页

原书缺页

序

馬君小琴。初業儒。自科舉廢後。遂改習醫。蓋其尊甫松琴先生。固當時東浙名醫也。君民初來滬。任浙江公學校長。初不願以青囊問世。惟戚友中。偶有攫疾者。咸邀君診。無不立效。越三載。求治者日衆。聲名播遐邇。乃遂撤校務。正式懸壺焉。第君猶坎然不自足。日惟窮研玉機金匱之微。漆葉青黏之散。鏤而不舍。嘗謂人曰。無術而行道。不啻持刀以殺人。烏乎可。明年。整其尊甫遺案。輯爲一編。友人慫恿付梓。君曰。未得全豹。方滋遺憾。草草問世。非所以彰先人之學。友固請之。乃選錄什一以畀。定名醫學錦囊。後附白喉治法。并諸驗方。由出版者採之。君筆記中。以足成之。書出。遠近爭購。大有紙貴洛陽。

之概。而君之名亦遂以益振。特君性耽僻冷。寡交游。診餘之暇。輒著書自遣。詩古文辭。積稿夥頤。每度書笥。任鼠嚙蟲蝕。不自顧惜。由其壻朱君惜民。甥傅君永年。爲之珍護。惟尊甫之稿。已刊行者外。累年從亂。紙堆中覓獲。並輒轉託人購。自病家者。又都爲一帙。冀以行世。其體例頗類葉案。近又自輯一書。類別病症。條列治法。殿以簡易本草。名曰醫藥顧問。僕覽其內容。大劑小劑。單方複方。無不兼備。條理井井。蔚然大觀。至其酌盈劑虛。補偏救弊。道古人之所不能道。言古人之所不敢言。具傳燈之隻眼。秉如椽之大筆。以述爲作。緯翼前賢。誠近世醫林之創著。民間苦海之慈航也。謹序。

民國二十年七月卅一日滬上後學陳存仁識

自序

內難傷寒論金匱諸書。醫界後賢。所奉爲導師。第著理雖深切。立方雖神奇。人事遞變。風氣嬗易。豈能墨守成法。膠固不化。賴名賢代興。會其通而神其變。紬繹先聖之旨。探索奧義之微。監腦絞髓。立說著書。緯翼經訓。昭示後學。於是後之任司命者。循其軌程。始有準則。外感內因。嚴分涂術。七情六氣。各明系統。每遭一症。必先察天時之氣候。人體之強弱。而後辨其在臟在腑。入經入絡。氣分血分。爲表邪。爲裏症。理密法縝。絲絲入扣。此固先哲成法之善。而亦後賢廣紹之功也。降及後世。風俗日媮。究心實學者。固不乏人。而略涉皮毛。廣資宣傳。盜名眩世。聚斂金錢。視人命如兒戲。等業務若弁髦。若人之

儔。微特爲醫界害馬。實啓後來退化之門。蓋作之俑者。獲此致富捷徑。而坐享大利。彼硜硜致力於學者。殫畢生精神。老死而不售其技。茆簷蔀屋。蟄伏終身。以視夫涉皮毛而資宣傳者。勞逸之分。詎可同日語。故一般舞文弄墨之失志士人。羣起效尤。朝闢利源。夕盈囊橐。語所謂不勞而獲之事。無有易於此者。鄉里俗眼。皆涎羨之。有子弟者。寅緣奉贄。使投門牆。彼覲然人師者。其教授方法。則令侍坐左右。聽其臨診之妄譎病名。錄其所定之硬湊方藥。如是而已。頭痛防風。腰痛杜仲。認作師門獨得之秘。祇能醫病。不能醫命。奉爲口頭傳統之談。解本草備要。且亥豕魯魚。誦雷公泡製。亦生江花菽。嗚呼。以五千年神聖廣博之學說。累世名賢。力圖進展。猶慮勿給。而一旦假手小人。竊其名而施其伎倆。彼見金不見人。誤人罪惡。已不可道。復廣播謬種。蔓

延徧植。流毒無窮。真天下痛心之事矣。無怪社會之信用日墮。外來之詆譏叢集也。考此風昉於清季。民初則變本加厲。自廣告之術興。更濫觴江河矣。嗚呼。金珠失耀。鐵石爭鳴。璧玉韜光。砒砒生色。甯不大可哀也哉。小琴髻。侍先君子診。暇則誦古今醫書。頗能領悟。比弱冠。兼理儒業。伊唔咕。誤於應制之學。雖忝竊白望。而大好光陰。已一去不能復返。旋復稟承家訓。重理故業。甚欲揭俗醫革命旗幟。實事求是。有所建樹。乃貧賤焉。衣食於奔走。三十年來。廁身司命之列。亦不免隨俗浮沉。與時俯仰。蓋竊愧讀書不多。見理不澈。縱不敢私心自用。離古人之範。而自爲規矩。第臨床診斷。輒復自疑。殊滋遺憾。今老矣。豈復尙能長進。甚願操吾業者。不以吾之學爲學。而以吾之心爲心。庶幾五千年來。廣博淵深之學理。發揚光大。進化可期。不致如今日。

之隨波逐靡。而爲欺世盜名之輩。恣行腐化手段。致神聖之學。日趨頹敝。駸乎退化。一蹶而不復振也。茲於應診之暇。纂輯昔賢方案。而類別之。俾鄉俗之間。偶患疾病者。庶可遴方市藥。不爲庸醫所愚。並附簡易本草數卷。以資檢閱。非敢自儕著作之林。聊任識途老馬之責已耳。

民國二十年 月 日 會稽馬絳彰小琴自題

人人必備 **醫藥顧問** 凡例

會稽馬小琴纂述

(一) 是編述而不作。凡足供病家之採擇者。無不選入。

(二) 內外科。婦幼科。喉科。痧疫科。及一切疑難雜症。應有盡有。皆採自古聖昔賢名著。對症覓方。有藥到病除之效。

(三) 醫理取淺近。方藥取妥穩。藥餌取普通。配合取單簡。俾閱者擇方遴藥。易於措辦。

(四) 大劑小劑。複方單方。內服外治。一切丸散膏丹。無不蒐輯匯列。并附配製修合諸法。

(五) 醫書係活人之用。苟非前人未經發明之方。未敢任意羈入。若有裨病家治效。雖鄉俗口傳丹方。無不應選。

(六)是編主旨。備家居旅行。猝抱採薪。不及延醫。或僻居鄉隅。良醫難覓者。翻閱各門。方藥具在。苟對準病症。錄方市藥。不啻良師之在左右。起死回生。厥功殊偉。

(七)家居旅行者。苟人手一編。無異與良醫相伴。微特可保一己安全。且可遇人病困。示以治法。而拯其急。

(八)是編不拘體裁。重在系統。蓋詩古文詞。所以華國。此則爲活人計也。苟明系統。奚取體裁。

(九)古今醫籍。浩若江海。每見一斑。難窺全豹。而後賢縱有集腋成書。屬單方者居多。間有大方複方。各科完備之著。論列艱深。非普通人所能了解。是編則盡人可讀。單方複方。亦復細大無遺。

(十)古今名著。多先論病理。後書宜某某湯。迨溯述病源。反復詳盡。累牘連篇。字隔千萬。然後將湯名藥味。一一標出。普通人學理膚淺。幾有睹病理而無從檢藥。睹方藥而無從審症之苦。是編臚一病案。卽從案下綴列諸藥。苟遇急病。一查便得。何等簡易。

人人必備 醫藥顧問 總目錄

會稽馬小琴纂述

口卷一

▲切脈

診脈樞要	一
持脈手法	一
診脈三要	一
察脈六字	二
十二經脈候	二
奇經八脈為病	二
八脈主病	二
反關脈	三
無脈候	三
脈貴有神	三
男女異脈	四

老少異脈	四
診婦人脈法	四
診婦人妊娠	四
小兒虎口三關圖	五
小兒虎口三關說	五
又歌	五
死脈	五
脈之總名	五
脈理淺解	六
五臟四時平脈	六
五臟四時邪脈	八
▲望聞		
五臟作用	九
察色	九

聞聲……………九

察舌……………一一

黃苔 青苔 舌刺 灰苔 絳苔

黑苔 紫苔

▲用藥

用藥次序……………一二

諸藥相反……………一二

諸藥畏忌歌……………一三

五味主禁例……………一三

五臭湊五臟例……………一三

五臟所欲……………一三

五臟所苦……………一三

五色所屬……………一三

五味所屬……………一三

▲醫理

五臟所主……………一三

六淫主治……………一四

十二經表裏例……………一四

十二經補瀉……………一四

五行生尅……………一四

手足三陽表裏引經……………一四

瀉諸經之火……………一四

五臟生成喜惡色味表……………一五

天之六氣……………一八

人之七情……………一八

▲製方

七方……………一八

十劑……………一九

□卷二

▲傷寒

傷寒概要……………一三

結胸	二五
陰陽易	二六
狐惑	二七
百合病	二七
傷寒摘要	二八
難經	二九
可發汗	三一
不可發汗	三一
可下	三三
不可下	三三
可吐	三五
不可吐	三五
瘧	三五
陽結陰結	三五
仲景百十三方簡註	三五
古今分量	四九

煎藥須知	五〇
傷寒治驗	五〇
▲溫病	
溫病概要	五八
春溫	六一
風溫	六三
濕溫	六三
冬溫	六三
溫毒	六三
溫病諸方簡註	六四
春溫治驗	六七
春溫始感	六七
春溫化熱	六八
絡熱未清	六九
婦人熱入血室	六九
婦人衝熱未淨	七〇

衝間餘熱	七〇
壯熱瀉利	七一
溫熱瀉利譫語	七二
身熱下利	七二
熱入營分	七二
熱入營分譫語	七三
身熱水泄不止	七三
溫病汗後使鞭	七五
溫熱鼻衄	七五
溫熱鼻衄便血	七六
熱病解後子宮挾帶下墜	七六
溫熱紅斑痧	七七
溫熱痘毒	七八
風疹嚙語	七八
溫熱紅白痞	七九
熱除利止痞透	七九

春咳嗽	七九
尋常咳嗽之忠告	八〇
春溫呃忒	八〇
風溫治驗	八一
選錄古方	八一
風溫治驗	八二
選錄古方	八二
冬溫治驗	八六
冬溫犯肺	八六
表熱傳裏	八六
冬溫挾虛	八六
冬溫初起	八七
冬溫化熱	八七
冬溫汗大出微喘	八七
冬溫氣血兩燔	八七
冬溫吐血	八七

溫毒治驗……………八八

溫毒諸方……………八九

治時毒發頤……………九〇

▲傷風

傷風概要……………九〇

風傷衛陽……………九〇

浴後感風……………九一

風溫傷肺……………九一

冬春傷風……………九一

四時發散宜九味羌活湯……………九一

感冒風寒……………九一

□卷三

▲中風概要

口噤……………九四

痰壅……………九四

口眼歪斜……………九四

半身不遂……………九四

四肢不收……………九五

角弓反折……………九五

瘳癱……………九五

猝倒無知……………九五

舌強不語……………九五

遺尿……………九六

眩暈……………九六

麻木不仁……………九六

中風諸方簡註……………九八

選錄古方……………九八

單方附選……………九八

▲溫疫概要

辨明傷寒時疫……………一〇九

疫症治法……………一一〇

大頭瘡……………一一一

捻頭瘡……………一一一

楊梅瘡……………一一一

疥瘡瘡……………一一一

絞腸瘡……………一一二

軟脚瘡……………一一二

治疫大要……………一一二

疫症諸方簡註……………一一三

古方雜選……………一一五

▲熱暑

熱暑概要……………一一七

暑之淺深變症……………一一八

傷暑……………一一八

中喝……………一一八

中暑……………一一八

內傷夾暑……………一一八

暑風……………一一八

暑厥……………一一九

暑瘵……………一一九

疰夏……………一一九

濕溫……………一一九

暑濕……………一一九

暑瘍……………一一九

伏暑……………一一九

暑症諸方簡註……………一二〇

▲濕概要

濕阻上焦……………一二三

濕滯中焦……………一二三

濕痰阻竅……………一二三

濕流關節……………一二三

風濕……………一二三

濕熱	一二三
寒濕	一二四
暑濕	一二四
中濕	一二四
濕症諸方簡註	一二四
古方雜選	一二六

▲燥火概要

『燥症』

燥氣乘肺燥咳	一二八
肺中有火乾咳	一二八
內外合邪	一二九
肺痿欬唾	一二九
燥傷胃陰	一二九
胃燥有死血	一二九
善消水穀	一二九
大便燥結	一二九

風秘血燥	一二九
津枯秘結	一二九
血枯膈噎	一三〇
血燥風動	一三〇
熱亢液燥	一三〇
婦人臟燥悲哭	一三〇
火灼真陰血燥	一三〇

『火症』

上焦熱	一三〇
中焦積熱	一三〇
三焦火盛	一三〇
陽明潮熱	一三〇
下焦火溺血淋閉	一三一
血分火毒	一三一
虛熱傷脾 以上實火	一三一
思慮房勞火元傷腎	一三一

火升躁渴	一三一
產後無根火 以上虛火	一三一
濕熱腫脹 以上濕火	一三一
肌熱心煩	一三一
手心烙熱	一三一
血虛骨蒸	一三一
血中伏火	一三一
風勞骨蒸 以上鬱火	一三一
火起臍下	一三一
火從足下入腹 以上陰火	一三一
火起於肺	一三一
大怒肝火	一三一
(脾) 醉飽火	一三一
(心) 怵惕火	一三一
(腎) 房慾火	一三一
六腑火表	一三一

卷四

▲勞瘵概要

游行之火	一三三
五志火表	一三三
虛實痰鬱表	一三三
一切壯火狂陽	一三四
積熱煩躁	一三四
燥火諸方簡註	一三四
雜病久不愈	一三七
思慮太過	一三七
房勞傷腎	一三七
飢飽傷脾	一三七
積勞疲瘦	一三七
負重致傷	一三七
傷暑咯血	一三七

縱酒傷脾	一三七
童年骨蒸黃瘦	一三七
婦女經閉	一三八
積想耗陰	一三八
血虛熱	一三八
往來潮熱	一三八
骨蒸熱	一三八
五心熱	一三八
遍體熱	一三八
腹脹常熱	一三九
腎水虛涸	一三九
陰傷陽浮	一三九
水泛爲痰	一三九
陽虧痰喘	一三九
肺痿吐膿	一三九
勞嗽兼喘	一三九

嗽血	一四〇
痰血	一四〇
吐血	一四〇
血成塊	一四〇
咯血	一四〇
嘔血	一四〇
桃花疔	一四〇
傳尸癆	一四一
▲虛損概要		
心損	一四二
脾損	一四二
肝損	一四二
腎損	一四二
肺損	一四二
腎中真陽虛	一四二
腎中真陰虛	一四二

陽虛不復	四三
陰虛不復	四三
火炎於上	四三
火動於下	四三
筋極	四三
骨極	四三
血極	四四
肉極	四四
精極	四四
氣極	四四
咳嗽概要	四四
寒	四四
熱	四五
虛	四五
實 <small>以上焦肺咳</small>	四五
感風	四五

感寒	四五
感暑	四五
感濕	四五
感燥	四五
感火	四五
濕熱痰火 <small>以上外因咳嗽</small>	四五
肝膽氣升	四五
土虛不能生金	四五
腎陰虛	四六
腎陽虛	四六
勞心動火	四六
久嗽不已 <small>以上內因咳嗽</small>	四六
臟腑咳嗽	四六
肺咳	四六
心咳	四六
肝咳	四六

脾咳	一四六
腎咳	一四六
胃咳	一四六
膽咳	一四六
大腸咳	一四七
小腸咳	一四七
膀胱咳	一四七
三焦咳	一四七
▲四季咳嗽		
春咳	一四七
夏咳	一四七
秋咳	一四七
冬咳	一四七
晨咳	一四七
上午咳	一四七
午後咳	一四七

黃昏咳	一四七
夜半咳	一四七
▲風寒咳嗽		
感風暴嗽	一四八
感寒暴嗽	一四八
風寒並感	一四八
倚息不得臥	一四八
風溫化燥	一四八
火熱嗽	一四八
感濕嗽	一四八
咳痰卽出	一四八
連咳無痰	一四八
客邪傷肺	一四八
久嗽氣虛	一四八
脾虛食減	一四九
胃虛嘔逆	一四九

咳沫吐食	一四九
寒飲停胃	一四九
噎咳膈痛	一四九
勞神乾咳	一四九
肺燥喘咳	一四九
痰喘怯冷	一四九
肺虛嗽血	一四九
欬痰見血	一四九
咳方備選	一五〇
單方附選	一五一
▲肺痿肺癰概要	
肺痿	一五三
肺勞成痿	一五三
喘汗肺虛	一五三
往來寒熱	一五三
欬膿發熱盜汗	一五三

午熱聲嘶	一五三
失音咯血	一五三
虛寒胸滿	一五三
肺癰	一五三
肺受風寒	一五四
喘不得臥	一五四
咳逆唾濁	一五四
咳膿腥穢	一五四
短氣溺少	一五四
膿已潰者	一五四
痰血胸痛	一五四
吐膿咽痛	一五四
癰潰不斂	一五四
肺癰痰臭	一五五
痰臭轉甚	一五五
癰潰進風	一五五

附選單方	一五五
▲哮喘概要	
邪留肺絡	一五五
貪涼露臥	一五五
冷哮	一五五
熱哮	一五六
鹹哮	一五六
酒哮	一五六
糖哮	一五六
▲喘概要	
疔喘	一五六
虛喘	一五六
痰火作喘	一五七
飲邪喘逆	一五七
火盛而喘	一五七
浮腫而喘	一五七

肺脹水停	一五七
痰喘	一五七
怒喘	一五七
病後氣喘	一五七
產後喘	一五七
老人久病喘嗽不臥	一五七
動即作喘	一五七
陰虛作喘	一五七
陽虛作喘	一五七
陰陽不交作喘	一五七
▲痰飲概要	
治痰總錄	一五八
治飲總錄	一五九
痰飲諸方簡註	一五九

卷五

▲血症概要

咳血	一六一
嗽血	一六二
咯血	一六二
唾血	一六二
嘔血	一六二
吐血	一六二
口鼻衄	一六二
耳衄	一六二
眼衄	一六二
齒衄	一六三
舌衄	一六三
肌衄	一六三
九竅衄	一六三
血溢	一六三
心漏	一六三

▲汗症概要

臍血	一六三
諸血諸方簡註	一六四
附選單方	一六七
自汗	一六七
盜汗	一六七
臟腑汗	一六八
胃汗	一六八
肝汗	一六八
心汗	一六八
脾汗	一六八
腎汗	一六八
肺汗	一六八
虛汗	一六八
產後汗	一六八
津脫汗	一六八

頭汗	一六八
額汗	一六九
陰囊汗	一六九
兩腋汗	一六九
脚心汗	一六九
血汗	一六九
產後血汗	一六九
黃汗	一六九
珠汗	一六九
油汗	一六九
汗症諸方簡註	一七〇
附選單方	一七一
▲脫症概要		
精脫	一七一
氣脫	一七一
津脫	一七一

液脫	一七一
血脫	一七一
脫陽	一七一
脫陰	一七一
上脫	一七二
下脫	一七二
上下俱脫	一七二
內閉外脫	一七二
附選脫方	一七二
▲肝氣概要		
疏氣解鬱	一七三
因怒動肝	一七三
噯而吐沫	一七三
嘔而脹滿	一七三
怒傷脇痛	一七三
腸鳴殮泄	一七三

癢疔腫硬	一七三
吞酸脇痛	一七三
脇痛引腰	一七三
氣痛入絡	一七四
脇痛筋痿	一七四
痞滿	一七四
呃噎	一七四
厥逆	一七四
肝陽化風肝風肝火	一七四
火動痰升	一七四
腎虛陽浮	一七四
舌麻肢痺	一七四
頭重腕痺	一七四
頭暈便秘	一七四
食少知飢	一七四

胃陰虛	一七五
胃陽虛	一七五
脾陰虛	一七五
脾陽虛	一七五
脾胃陽虛	一七五
濕傷脾胃	一七五
中氣虛	一七六
飢傷	一七六
食傷	一七六
病後調理脾元	一七六

▲嘔吐概要

食入嘔吐	一七六
食入不變	一七七
腹脹痛嘔	一七七
噫噎欲嘔	一七七
吐黑綠苦水	一七七

▲脾胃概要

時吐清水	一七七
吐酸吞酸	一七七
漾漾欲吐	一七七
腕痛嘔涎	一七七
脇痛乾嘔	一七七
湯水下咽即吐	一七七
肝風擾胃嘔吐	一七八
嘔吐暈眩	一七八
食入即吐	一七八
噎咳吐逆	一七八
心痛吐衄	一七八
痛嘔不納	一七八
嘔至絕粒	一七八
每食必吐	一七八
▲膈膈反胃	
陽結於上陰結於下	一七九

關格概要

肝陰胃汁枯	一七九
煩勞陽亢	一七九
液虧氣滯	一八〇
肺胃氣不降	一八〇
肝鬱氣逆	一八〇
酒熱鬱傷肺胃	一八〇
胃陽虛	一八〇
陽虛陰濁凝滯	一八〇
陽衰腕痺血瘀	一八〇
附選單方	一八二
潤燥	一八四
降火	一八五
豁痰	一八五
和陰	一八五
降逆	一八五

通痞.....一八五

通潤.....一八五

滋化源.....一八五

填虛損.....一八五

上格下關.....一八五

吐止後調養法.....一八五

卷六

▲鬱症概要

七情諸鬱.....一八七

思鬱傷脾 神 肝 心脾.....一八七

憂鬱傷肺 中.....一八七

悲鬱臟燥.....一八八

驚鬱膽怯 神亂.....一八八

怒鬱肝傷 火升.....一八八

恐鬱陽消精怯.....一八八

諸鬱久風陽内生.....一八八

氣鬱脈 生涎心悸.....一八八

血鬱脈 絡傷脇痛.....一八八

肺心脾鬱.....一八八

肝膽鬱.....一八九

脾胃鬱.....一八九

三焦鬱.....一八九

六氣諸鬱.....一八九

火 寒 濕 鬱.....一八九

痰 食.....一八九

通治諸鬱.....一八九

陰陽壅滯.....一八九

婦人咽中如有炙燭.....一九〇

▲呃逆概要

寒滯爲呃.....一九〇

肺痺爲呃.....一九〇

胃火爲呃	一九〇
胃虛爲呃	一九〇
怒動肝火	一九〇
氣逆作呃	一九一
痰滯爲呃	一九一
食滯爲呃	一九一
氣爲邪抑	一九一
氣衝作呃	一九一
胃虛膈熱	一九一
病後中虛陰虛	一九一
氣滯爲呃	一九一
肝腎虛寒致呃	一九一
衝氣上逆	一九一
陰火上衝	一九二
產後呃逆	一九二
死血作呃	一九二

附選單方	一九二
▲饋雜概要	
得食暫止	一九三
常作虛饋	一九三
似飢非飢	一九三
脾胃陽衰	一九三
吐沫噯腐	一九三
饋雜醋心	一九三
食後噯腐	一九三
婦女悒鬱胸饋	一九四
血虛心饋	一九四
火饋	一九四
痰饋	一九四
鬱饋	一九四
▲噫噯概要	
肺氣失降	一九四

胃虛寒氣滯	一九四
噁氣嘔痰	一九四
虛飽噁氣	一九四
痞滿噁氣	一九五
痰火噁氣	一九五
脾胃陽虛	一九五
▲痞滿概要	
痰熱內閉	一九五
邪熱裏結	一九五
氣閉化熱	一九五
邪熱入厥陰	一九六
暑濕伏邪夾食	一九六
暑邪阻氣	一九六
濕熱傷胃	一九六
濕阻氣分	一九六
中陽不運	一九七

胃寒清陽不運	一九七
肺氣不降	一九七
寒熱各邪	一九七
附選單方	一九七
▲腫脹概要	
水腫	一九九
膚脹	一九九
鼓脹	一九九
蟲脹	一九九
單腹脹	一九九
濕在上中下	二〇〇
濕在下	二〇〇
濕濁在裏	二〇〇
風水	二〇〇
皮水	二〇〇
正水	二〇〇

石水	二〇〇
肺氣壅熱	二〇〇
肝經鬱熱	二〇〇
三焦壅滯	二〇〇
清陽痺結	二〇〇
胃陽虛	二〇〇
脾陽虛	二〇〇
脾腎陽虛	二〇〇
濕熱夾滯	二〇〇
氣虛兼寒	二〇〇
氣血鬱積	二〇〇
通身腫脹	二〇〇
濕熱痰積	二〇〇
脹滿拒按	二〇〇
病後產後腫	二〇〇
水分	二〇〇

血分	二〇二
先喘後脹	二〇二
先脹後喘	二〇二
虛腫溺瀉	二〇二
附選單方	二〇三
▲積聚癥瘕概要		
息賁	二〇九
肥氣	二〇九
伏梁	二〇九
痞氣	二〇九
奔豚	二〇九
息積	二〇〇
腸覃	二〇〇
石瘕	二〇〇
通治五積	二〇一
通治六聚	二〇一

血癥	二二一
食癥	二二一
疝癥	二二一
蛇癥	二二一
鼈癥	二二一
髮癥	二二一
痞塊	二二一
痞積	二二一
胸痞	二二一
肋痞	二二一
瘡痞	二二一
飲癖	二二三
酒癖	二二三
茶癖	二二三
麵積	二二三
肉積	二二三

狗肉積	二二三
菜果積	二二三
魚蟹積	二二三
蛋積	二二三
小腹癥積	二二四
蟲積	二二四
血積	二二四
寒積	二二四
痰積	二二四
疔積	二二四
附選單方	二二五
▲癩症概要	
癩症主方	二一九
狂症主方	二二一
附選單方	二二二
▲癰症概要	

馬痢	二二三
牛痢	二二三
豬痢	二二三
羊痢	二二三
雞痢	二二三
在腑通治	二二四
在臟通治	二二四
風痢驟發	二二四
痰火	二二四
痰多	二二四
痰迷心竅	二二五
心熱痰迷	二二五
火盛	二二五
氣逆食滯	二二五
因驚	二二五
因怒	二二五

心臟氣血不足	二二五
神不守舍	二二五
癩痢屢發	二二五
痢愈復發	二二五
婦人患痢	二二五
附選單方	二二五
怔忡驚恐		
附卑燥	二二六
「怔忡症」	二二六
「驚症」	二二七
夜臥驚寤	二二八
膽虛善驚	二二八
肝膽俱虛	二二八
神不定而驚	二二八
神擾而驚	二二八
恍惚煩躁而驚	二二八

思慮過度……………二二八

痰擾心包……………二二八

被物所驚……………二二九

『恐症』……………二二九

恐由腎傷……………二二九

肝膽虛者……………二二九

由心包絡者……………二二九

思慮勞心……………二二九

腎中陽虛……………二二九

卷七

▲煩躁概要

津涸而煩……………二三一

血虛煩渴……………二三一

心火上炎……………二三一

虛煩不安……………二三一

病久煩熱……………二三一

肥人虛煩不眠……………二三一

煩而溺瀉……………二三一

煩而嘔……………二三一

▲健忘概要

因病善忘……………二三一

縈思過度……………二三一

上盛下虛……………二三一

上虛下盛……………二三一

神明不定……………二三一

痰迷心竅……………二三一

怔忡健忘……………二三一

年老神衰……………二三一

喜忘如狂……………二三一

▲不寐多寐

『不寐症』……………二三一

思慮勞神不寐	二二三
痰阻痺不寐	二二三
心血虛不寐	二二三
肝虛不寐	二二三
膽火鬱熱不寐	二三四
腎虛陽越	二三四
心火焦煩	二三四
驚恐傷神	二三四
脾血虧損	二三四
病後虛煩	二三四
虛勞煩熱	二三四
高年血衰	二三四
喘不得寐	二三四
寐易驚醒	二三五
通宵不寐	二三五
遺精不寐	二三五

『多寐症』	二三五
食罷即倦寐	二三五
身重多寐	二三五
神倦嗜臥	二三五
長夏午倦	二三五
病後身熱好寐	二三五
▲三消概要	
上消	二三六
中消	二三六
下消	二三六
陽消陰消	二三六
三消	二三六
風消	二三七
肺消	二三七
鬲消	二三七
腎消	二三八

消瘴	二三八
食休	二三八
酒渴	二三八
蟲渴	二三八
腎消強中	二三八
陽強陰脫	二三八
小水反甜	二三八
渴飲即泛	二三九
附選單方	二三九
▲黃疸概要	
黃疸	二四〇
穀疸	二四〇
酒疸	二四一
女勞疸	二四一
黃汗	二四一
黃胖	二四一

脫力黃	二四二	
風黃	二四二	
虛黃	二四二	
瘀血黃	二四二	
黑疸	二四二	
陽黃	二四三	
陰黃	二四三	
疫癘發黃	二四三	
附選單方	二四四	
▲瘡症概要		
六腑瘡	二四六	
足太陽	足太陰	二四六
足小陽	足少陰	二四六
足陽明	足厥陰	二四七
肺	脾	二四七
心腎	五臟瘡	二四七

肝胃	二四七
六淫瘡	二四七
風暑	二四七
寒濕	二四八
痺瘡	二四八
雜瘡	二四八
溫疫	二四八
牝鬼	二四九
痰勞	二四九
食	二四九
瘡母	二四九
似瘡非瘡	二五〇
三陰瘡	二五〇
小兒胎瘡	二五一
芽兒患瘡	二五二
附選單方	二五二

▲霍亂概要

吐利	二五三
乾霍亂	二五三
轉筋	二五四
▲泄瀉概要	
內經五泄	二五五
殮濡	二五五
溏滑	二五五
鶩	二五五
難經五泄	二五五
胃	二五五
脾	二五五
大腸	二五五
小腸	二五六
大瘕	二五六

痰泄	二五六
食泄	二五六
傷酒泄	二五六
暑泄	二五六
伏暑久瀉	二五六
腎泄	二五六
脾胃泄	二五七
飯後即便	二五七
滑泄久不止	二五七
大便滑泄	二五七
泄瀉通治	二五七
▲痢疾概要	
痢純血	二五八
痢紫黯血	二五八
痢黑色(二)	二五八
痢清血	二五八

痢五色	二五八
赤白痢	二五八
痢純白	二五八
痢膠凍魚腦	二五九
痢稀白	二五九
痢清穀	二五九
先白後膿血	二五八
先白後鮮血	二五九
先膿血後 <small>變青黑 白沫白膿</small>	二五九
休息痢	二六〇
禁口痢	二六〇
風痢	二六一
倪涵初痢疾三方	二六二
附選單方	二六三
▲頭風概要	
附雷頭風	二六五

痛在正頂	二六六
痛偏左	二六六
痛偏右	二六六
痛冷欲束綿	二六六
痛連齒齦	二六六
痛掣眉稜	二六六
鼻流鼻涕	二六六
久年頭痛	二六六
膽火上逆暈痛	二六六
肝陽嘔吐頭痛	二六六
暑熱頭痛	二六六
陽浮頭痛	二六七
內風頭痛	二六七
頭腦鳴響 <small>名天白蟻</small>	二六七
頭多白屑作癢	二六七
雷頭風	二六七
腦風	二六七

▲首風概要

首風	二六七
心肝脾肺腎表	二六七
皮肉血筋骨表	二六八
通治風癩方	二六八
又毒癩 除濕 痿痛 麻頑方	二六九
腎臟風	二七〇
繡球風	二七〇
雁來風	二七〇
蛇皮風	二七〇
鵝掌風	二七一
赤白遊風	二七一
紫白癩風	二七一
紫雲風	二七一
牛皮頑癬	二七一
新久疥癩	二七一

夏月汗斑……………二七一

雀斑酒刺……………二七二

附選單方……………二七二

▲痺症概要

行痺……………二七四

痛痺……………二七四

著痺……………二七四

骨痺……………二七四

筋痺……………二七四

脈痺……………二七五

肌痺……………二七五

皮痺……………二七五

五臟痺并表……………二七五

冷痺……………二七五

熱痺……………二七六

氣痺……………二七六

血痺……………二七六

濕痺風濕 寒熱 濕熱……………二七六

風痺……………二七七

經痺……………二七七

絡痺……………二七七

瘀血……………二七七

支飲……………二七七

停痰……………二七七

周痺……………二七七

肢痺……………二七八

▲痿症概要

皮毛痿……………二七八

脈痿……………二七八

筋痿……………二七八

肉痿……………二七八

骨痿……………二七八

濕熱成痿	二七九
宗筋不約	二七九
陰虛肢痿	二七九
陰虛足熱成痿	二七九
腎督陽虛成痿	二七九
久病筋骨痿	二七九
食滯成痿	二七九
瘀血成痿	二八〇
瘦人病痿	二八〇
肥人病痿	二八〇
痛風	二八〇
歷節風	二八〇
附鶴膝風	二八〇
破傷風	二八〇
「痛風」	二八〇
因寒作痛	二八〇
因火作痛	二八〇
血虛燥作痛	二八〇
留飲作痛	二八一
風濕 <small>在經入絡</small> 作痛	二八一

濕熱相搏	二八一
瘀血阻隧	二八一
「歷節風」	二八一
邪毒停留	二八一
痰飲流注	二八一
血枯	二八一
老人腿痛	二八一
風氣走痛	二八一
附選單方	二八二
鶴膝風	二八七
膝游風	二八七
膝眼毒	二八七
膝癰	二八七
破傷風附通治方	二八八
破傷濕	二八八
破傷火	二八八

卷八

▲麻木概要

治麻諸藥表	二九一
治木諸藥表	二九一
渾身麻木	二九一
皮膚麻木	二九二
肌肉麻木	二九二
暑月麻木	二九二
冷風麻木	二九二
腿足手臂麻木	二九二
十指麻木	二九二
指尖麻木	二九二
面麻木	二九二
口舌麻木	二九二
合眼渾身麻木	二九三
開眼則止	二九三
腹皮麻木	二九三

▲瘧症概要

局部麻木	二九三
婦人鬱結麻痺	二九三
自頭麻至心窩而死	二九三
自足麻至膝蓋而死	二九三
大小指忽然麻木	二九三
剛瘧	二九四
柔瘧	二九五
血虛發瘧	二九五
痰火發瘧	二九五
嘔瀉發瘧	二九五
身冷瘧厥	二九五
暑風搖擗成瘧	二九五
溫邪劫液成瘧	二九五
產後血虛汗多成瘧	二九五

▲眩暈概要

上焦竅絡火鬱	二九六
中虛風陽擾胃	二九六
下元水涸火升	二九六
陽冒不潛眩暈	二九六
痰多作眩	二九六
心悸不寐	二九六
厥陽不斂	二九六
▲厥症概要	
寒厥	二九七
熱厥	二九七
氣厥	二九七
血厥	二九八
食厥	二九八
痰厥	二九八
尸厥	二九八
虺厥	二九八

煎厥	二九九
薄厥	二九九
痿厥	二九九
瘧厥	二九九
風厥	二九九
痲厥	三〇〇
痞厥	三〇〇
鬱厥	三〇〇
骨厥	三〇〇
痛厥	三〇〇
腎厥	三〇〇
色厥	三〇〇
暴厥	三〇〇
瘡厥	三〇〇
▲脚氣概要	
濕脚氣	三〇一

乾脚氣	三〇一
身痛肢腫便秘	三〇一
一脚偏軟	三〇一
脚踝腫痛	三〇二
脚氣衝胸	三〇二
入脛作痞	三〇二
腫滿喘促	三〇二
少腹不仁	三〇二
▲頭痛概要	
雷頭風	三〇二
大頭痛	三〇二
發顛	三〇三
眉稜痛	三〇三
頭腦鳴響	三〇三
眼眶痛	三〇三
真頭痛	三〇三

附選單方	三〇三
▲耳目口鼻	
選錄各種內服外治法附選單方	三〇八
齒舌	三一九
齒	三二〇
齒齦腫	三二〇
齒齦不腫而痛	三二〇
齒腫腐臭	三二〇
齒連頭痛	三二〇
痛連巔頂	三二〇
結核齦痛	三二〇
痛如針刺	三二〇
蟲蝕齦齒	三二〇
齦腮俱痛	三二〇
齒齦俱痛	三二一
齒齦 <small>腫痛</small> <small>黑腐</small>	三二一
齒縫出血	三二一

齒根腐爛	三二一
牙宣出血	三二一
牙挺出一二分	三二一
髓溢	三二一
牙癰	三二一
骨槽風	三二一
小兒牙疳口瘡	三二一
齒齲忽出齧肉	三二一
齲齒	三二一
齒齲	三二一
<small>齒齲</small> 多骨疽腫腐	三二一
舌	三二一
腫大塞口	三二一
重舌	三二一
舌菌	三二一
舌蟄	三二一

舌出不收	三二二
腫硬血湧	三二三
不硬腫痛流血	三二三
舌腫滿口	三二三
舌猝腫滿口	三二三
舌捲囊縮	三二三
附選齒牙單方舌無	三二三

卷九

胸痺概要

選錄諸方	三二七
------	-----

九種心痛

附心痛 心癰	三二七
一飲 ● 二食 ● 三寒 ● 四火 ● 五	
氣 ● 六血 ● 七悸 ● 八蟲 ● 九痞	三二八
心疝	三二九

心癱.....三二九

附節註方.....三二九

附選單方.....三三一

▲脇痛概要

兩脇痛.....三三一

腹脇常痛.....三三一

脇痛煩躁不寐.....三三一

脇痛善恐.....三三一

跌仆閃挫作痛.....三三一

痰滯經脇痛.....三三一

因怒脇痛.....三三一

因鬱脇痛.....三三一

肝絡痺痠.....三三一

右脇.....三三一

左脇.....三三一

▲腹痛概要

寒腹痛.....三三三

氣虛痛.....三三三

食滯痛.....三三三

腹痛吐酸濁.....三三三

乾霍亂腹痛.....三三三

火鬱腹痛.....三三三

七情氣鬱腹痛.....三三三

血虛腹痛.....三三三

跌傷瘀血作痛.....三三三

死血阻絡腹痛.....三三三

蟲痛.....三三三

疝氣痛另立一門.....三三四

腸癰另立一門.....三三四

▲胃脘痛概要

胃陽衰脘痛.....三三四

肝木乘胃.....三三五

腎寒厥逆腕痛	三三五
煩勞傷氣腕痛	三三五
客寒犯膈猝痛	三三五
積寒致痛	三三五
火鬱致痛	三三五
痰積腕痛	三三五
停飲腕痛	三三五
食滯腕痛	三三五
氣鬱腕痛	三三五
傷力腕痛	三三五
怒氣腕痛	三三五
虻動腕痛	三三五
痛久不愈	三三六

▲腰脊腿足痛

附腰痠 腰僂廢	三三六
腰軟 尻 膝 跟	三三六

腰傷濕痛	三三六
風寒濕痺腰痛	三三六
陰虛火盛腰痛	三三六
閃挫跌仆諸痛	三三六
血瘀腰痛	三三六
肝氣失暢	三三七
痰注	三三七
帶束以上腰痛	三三七
陰虛脊痛	三三七
陽虛脊痛 <small>以上腰痛</small>	三三七
腿足 <small>陰</small> 虛作痛	三三七
血虛	三三七
腎虛	三三七
寒濕	三三七
腿轉筋衝腹 <small>以上腿足</small>	三三八
婦女腰痠	三三八

腰僂廢	三三八
腰軟	三三八
斷傷太過	三三八
尻痛	三三八
膠挾風濕痛	三三八
膝疲腫痛	三三八
屈伸不利	三三八
足跟痛	三三八
足心及踝骨熱痛	三三九
▲腸癰概要	
小腸癰	三三九
大腸癰	三三九
盤腸癰	三三九
見症施治	三四〇
寒症	三四〇
膿未成	三四〇

潰後	三四〇
膿滯	三四〇
血瘀	三四〇
▲腸鳴概要	
中氣不足	三四〇
腹滿腸鳴	三四〇
腸中雷鳴	三四〇
土鬱腸鳴	三四〇
腸鳴氣上衝胸	三四一
▲疝氣概要	
寒疝	三四一
水疝	三四一
筋疝	三四一
血疝	三四一
氣疝	三四一
狐疝	三四一

癩疔	三四一
小腸氣	三四一
膀胱氣	三四一
奔豚響疔	三四一
九癩兒疔罌丸偏腫	三四二
附選丹方	三四二

▲淋濁概要

「淋症」	三四四
沙淋	三四四
血淋	三四四
氣淋	三四四
膏淋	三四五
勞淋	三四五
冷淋	三四五
一切雜淋	三四五
「濁症」	三四六

便濁	三四六
精濁	三四六
赤濁	三四六
白濁	三四六
赤白濁	三四六
溺血	三四六
白淫	三四七
髓條	三四七
一切濁症	三四七
附選單方	三四八

▲遺精概要

相火動	三五一
用心過度	三五一
腎虛不固	三五一
精想不遂	三五一
不夢而泄	三五一

陽陷遺精	三五二
久曠溢精	三五二
濕熱下注	三五二
醇酒厚味	三五二
▲陽痿概要	
附類及諸症	三五二
陽事不起	三五二
睪丸冷	三五三
相火大盛	三五三
陰五內縮	三五三
陰縱不收	三五三
陰莖堅舉	三五三
玉莖長硬	三五三
玉莖潰爛	三五三
▲便血 ●腸風 ●臟毒	
遠血	三五三

近血	三五四
實熱迫注	三五四
脾胃虛寒	三五四
血下紫黑	三五四
肛頭血出	三五四
腸風便血	三五四
腸風	三五四
臟毒	三五四
血射如線	三五四
▲二便不通	
婦人風秘	三五五
肺氣不降	三五五
老人氣秘血秘	三五五
脾約	三五五
失血便結	三五五
血液燥結	三五五

氣虛迫注肛門……………三五五

小便不通……………三五六

▲閉癰遺溺

熱在下焦……………三五六

熱在上焦……………三五六

腎火衰……………三五六

元氣下陷……………三五七

下焦瘀血……………三五七

小兒睡中遺溺……………三五七

遺溺不知……………三五七

命火衰……………三五七

老人溺多……………三五七

妊婦溺出不知……………三五七

產後小便不禁……………三五七

胞痺……………三五八

溺瀉痛引穀道……………三五八

▲轉胞交腸

轉胞……………三五八

妊婦轉胞……………三五八

強忍房事……………三五九

老人轉胞……………三五九

驚憂暴怒轉胞溺閉……………三五九

交腸……………三五九

前陰出尿……………三五九

▲脫肛附臟頭癢痛

探選單方內外治法……………三五九

脫肛氣熱……………三五九

氣虛脫肛……………三五九

久痢肛痿……………三五九

痢後脫肛……………三六〇

脫肛……………三六〇

痔痢脫肛……………三六一

虛冷脫肛	三六一		
瀉痢脫肛	三六一		
久痢脫肛	三六一		
肛門蟲蝕	三六一		
肛門腫痛	三六一		
肛門痛癢	三六一		
洗脫肛方	三六一		
掀赤腫痛	三六一		
肛頭癢	三六一		
肛頭癢痛	三六一		
挾濕熱生蟲而癢	三六一		
腸頭努出下血	三六一		
痔瘡			
附耳痔	鼻痔	腦漏偷冀鼠瘡	
騎馬癰			三六二
牡痔即外痔			三六二

牝痔	三六二
脈症	三六二
腸痔	三六二
血痔	三六二
氣痔	三六二
酒痔	三六二
氣痔方	三六二
酒痔方	三六二
血痔方	三六二
不拘痔瘦腸紅方	三六三
不論痔瘦蟲痔法	三六三
腫痔洗痔法	三六三
洗翻花痔方	三六三
點痔法	三六三
枯痔法	三六三
敷痔法	三六三

透膿法	三六四
追毒	三六四
閉管	三六四
四邊硬肉突起	三六四
穿腸漏方	三六四
去管生肌方	三六四
退管漏眼未平	三六四
洗瘡孔穢物	三六四
耳痔	三六四
鼻痔	三六五
腦漏	三六五
偷糞鼠瘡	三六五
騎馬癰	三六五
▲人身蟲病	
五臟蟲	三六六
消渴蟲	三六六

卷十

▲婦科

寸白蟲	三六六
應聲蟲	三六六
狐惑	三六六
糞後蛆蟲	三六六
大腸蟲	三六七
溺竅蟲出	三六七
婦人陰蝕蟲癢	三六七
渾身蟲出	三六七
八角蟲	三六七
筋肉化蟲	三六七
附選單方	三六七
沉門	三六九
經多經少	三六九

經濃經淡	三六九
經水欲來臍腹先痛	三六九
臨經腹痛	三七〇
經後腹痛	三七〇
經後參前	三七〇
經來落後	三七一
經先後不定	三七一
臨經倦寐	三七二
經來溺痛	三七二
經一月兩至	三七二
延經不淨	三七二
臨經潮熱	三七三
熱入血室	三七三
經後寒熱	三七四
寒入血室	三七五
經方淨寒熱	三七五

經病寒熱	三七五
經病諸痛	三七六
經來大小便俱血	三八〇
經少腹大狀如漏胎	三八〇
經逆行從口鼻出	三八〇
臨經誤動房事	三八一
經數月一行	三八一
停經	三八二
經閉腹塊	二八三
經閉膚腫	三八四
經阻咯血	三八五
經阻痰血	三八五
經阻狂血	三八五
經阻咳嗽痰血	三八六
經閉腹膨	三八六
經閉腹痛	三八七

經阻咳嗽……………三八八

卷十一

▲崩漏門

停經忽崩……………三九一

童女血崩……………三九一

老婦血崩……………三九二

崩後滴瀝不止……………三九二

崩後白帶……………三九四

崩後虛脫……………三九五

血熱崩漏……………三九五

勞傷崩漏……………三九七

血崩通治……………三九九

殺血心病……………四〇二

老婦行經……………四〇三

▲帶症門

赤白帶……………四〇三

五色帶……………四〇七

青帶……………四〇八

黃帶……………四〇八

黑帶……………四〇八

白崩……………四〇九

白淫……………四〇九

白帶通治……………四一一

▲種子門

久年不孕……………四一五

子宮寒冷不孕……………四一七

血虛不孕……………四一九

血熱不孕……………四二二

痰凝不孕……………四二二

體肥不孕……………四二二

體瘦不孕……………四二二

男女與偏長不孕 四二三

卷十二

▲胎前門

妊娠食忌 四二五

驗胎法 四二五

男女預知法 四二五

妊娠帶多 四二六

胎動不安 四二六

逐月保胎法 四二八

房事傷胎胎動 四三二

漏胎 四三二

惡阻 四三四

妊婦心痛 四三六

附心腹痛 四三七

妊娠腰痛 四三八

妊娠咳嗽 四三九

妊娠咯血 四三九

小便不通 四四〇

大小便不通 四四〇

小便不禁 四四一

尿血 四四一

子淋 四四一

子懸 四四三

子煩 四四四

子疝 四四五

子暗 四四六

子腫 四四六

子鳴 四四七

中風卒倒 四四八

妊娠霍亂 附瘡 四四九

妊娠食忌 四五〇

▲難產●臨產●小產

附胎視不下	四五〇
難產單方	四五〇
臨產一二月不下	四五〇
分娩交骨不開	四五一
活水無憂方	四五一
千金保胎法	四五一
交骨不開產門不開	四五二
急救難產方	四五二
治慣要小產方	四五三
濟陰還魂丹	四五三
難產水下胞乾	四五三
催生遇仙方	四五三
死胎不下	四五四
胞衣不下	四五四
臨產一切血痛	四五五

胎漏下血 四五五

漏胎 四五五

橫生逆產 四五五

子死腹中 四五五

氣血俱虛慣於三月內墮胎 四五五

胎動腹痛下血 四五五

小產氣虛 四五五

小產痛證 四五六

▲產後門

生化湯 四五六

加減生化湯 四五六

下胞衣及縮腸法 四五六

胎衣不下 四五六

惡血冲心腹中血塊 四五七

難產橫逆血乾死胎 四五七

腸出 四五七

產後氣血虛損	四五七
產後三日牙關緊閉眼目直視	四五八
產後汗出不止	四五八
產後陰戶腫痛癢	四五八
產後胞損小便淋瀝	四五八
產後血暈	四五八
產後血積成塊	四五九
產後一切諸疾	四五九
產後陰戶突出	四五九
產後寒熱如瘧	四五九
敗血凝結	四五九
保孕催生	四五九
胎衣內停	四六〇
產後血氣痛	四六〇
血暈急治法	四六〇
乳癰 乳吹	四六〇

產後宜注意者	四六〇
產後鄉俗習弊	四六一
產後用藥十誤	四六一
產後禁用藥	四六一
產後宜忌食物	四六一
▲求子驗方	
蠡斯丸	四六一
滋陰暖宮丸	四六一
五子衍宗丸	四六二
八珍益母丸	四六二
▲雜治	
陰戶腫痛	四六三
陰腫堅痛	四六四
陰中腫痛	四六四
陰腫如石	四六四
陰癰	四六四

陰中生蟲	四六四
陰癢不止	四六四
陰中生細蟲	四六四
陰蟲癢且痛	四六五
陰戶生瘡	四六五
又	四六五
陰痔	四六六
陰挺下脫	四六六
陰中生物	四六七
薰洗法	四六七
托藥	四六七
糝藥	四六七
敷藥	四六七
治陰冷	四六七
癰瘦陰冷	四六七
交接出血	四六八

小戶嫁痛	四六八
女人傷丈夫	四六八
又	四六八
陰挺	四六八

卷十三

▲兒科

脈法	四七一
面上氣色	四七二
小兒初誕	四七三
去口中惡涎	四七三
消乳	四七三
噤風	四七四
撮口	四七四
臍風	四七五
口禁不開	四七六

胎驚……………四七六

斷臍後腹腫臍痛……………四七六

變蒸……………四七六

小兒五臟主治

心臟……………四七九

肝臟……………四七九

脾臟……………四八〇

肺臟……………四八〇

腎臟……………四八一

發搐……………四八二

急驚……………四八五

慢驚……………四八六

脾風……………四八八

急慢驚脾風……………四九二

驚痛……………四九四

驚風……………四九九

天鈞內鈞……………五〇一

盤腸氣……………五〇二

胎驚風……………五〇三

胎風遍身軟……………五〇四

〔五軟〕……………五〇五

頭軟……………五〇五

項軟……………五〇五

手軟……………五〇五

腳軟……………五〇五

肌肉軟……………五〇五

〔五硬〕……………五〇六

仰頭取氣……………五〇六

氣壅痛聯胸膈……………五〇六

腳手如冰……………五〇六

肚大青筋……………五〇六

面青心腹硬……………五〇六

卷十四

風症 風熱	五〇七
瘧症	五〇八
夜啼客忤驚啼	五一〇
解顛	五一一
顛陷	五一一
顛瀾	五一二
小兒眼患	五一二
小兒斗病	五一三
口瘡鵝口重勝	五一四
重舌木舌弄舌	五一六
齒遲	五一七
喉痺腮腫	五一八
小兒語遲	五一八
小兒滯頤	五一九

龜背龜胸鶴膝行遲	五一九
疳積腫脹	五二〇
肚硬 熱渴 吐瀉	五二一
乳食不消	五二二
吐瀉酸臭	五二三
小兒熱病	五二三
小兒傷寒夾驚	五二四
小兒時氣病	五二五
傷風寒咳嗽	五二七
乳嗽	五三一
喘	五三二
潮熱	五三二
壯熱溫壯	五三三
黃疸	五三六
嘔吐乳汁	五三八
熱吐	五三八

寒冷嘔吐噦逆	五三八
霍亂吐瀉	五四〇
魘病	五四一
瀉利	五四二
冷瀉	五四二
熱瀉	五四三
諸色痢	五四三
傷食瀉	五四四
驚瀉	五四五
脫肛並痔症	五四七
便血臟毒	五四八
大便不通	五四九
小便不通	五四九
大小便不通	五五〇
白尿	五五〇
遺尿	五五〇

卷十五

疖病	五五一
疖傷	五五五
虛實腫脹	五五九
虻蟲	五五九
陰腫疝氣	五六〇
盜汗骨蒸	五六一
白汗	五六一
餉飴	五六三
瘡證	五六四
赤遊丹毒	五六五
瘡癬	五六六
麻痘水痘	五六六
瘡疹	五六九
痘疔 兔出痘	五七三

小兒斷乳……………五七五
小兒河白……………五七五

卷十六

瘡癤

對口瘡……………五七七
發背……………五七七
賺瘡……………五七八
天泡瘡……………五八〇
黃水瘡……………五八〇
膿窠瘡……………五八〇
肥瘡……………五八〇
凍瘡……………五八〇
坐板瘡……………五八一
爛脚丫……………五八一
貓眼瘡……………五八一

蛇纏瘡……………五八一

蛇形瘡……………五八二

魚臍瘡……………五八二

蜂窠瘡……………五八二

蜘蛛瘡……………五八二

八面瘡……………五八二

寒毛瘡……………五八二

天蛇頭瘡……………五八二

翻花瘡……………五八三

一切腫毒……………五八三

瘰癧

鼠瘻……………五八三

髮瘤……………五八三

肉瘤……………五八三

血瘤……………五八三

粉瘤……………五八四

腋下瘰癧……………五八四

枯瘤法……………五八四

消瘤法……………五八四

繫瘤法……………五八四

瘰氣……………五八四

▲瘰症

石瘰……………五八五

軟瘰……………五八五

瘡癩頭……………五八五

▲癰疽

落頭疽……………五八五

發背……………五八六

搭手……………五八六

石癰……………五八六

石疽……………五八六

甲疽……………五八七

癰疽……………五八七

脫骨疽……………五八七

多骨疽……………五八八

附骨疽……………五八八

陰疽……………五八八

▲瘰癧

鼠癧……………五九〇

九子瘍……………五九〇

流注……………五九〇

遮腮……………五九二

疔瘡……………五九二

螺疔……………五九四

紅絲疔……………五九四

刀鏹疔……………五九五

羊毛疔……………五九五

水疔……………五九五

面疔	五九五
唇疔	五九五
魚臍疔	五九五
疔瘡出血	五九五
疔瘡走黃	五九六
蛇頭疔	五九六
疔瘡不破	五九六
疔根不出	五九六
▲湯火傷	
湯火瘡	五九六
火燒爛	五九七
火燙傷	五九七
湯炮火燒	五九七
初燙與潰爛	五九七
▲流火方	
流火毒	五九七

卷十七

漆瘡	五九八
▲跌打損傷	
玉真散	五九九
傷處濕爛	五九九
當歸湯	五九九
牙關緊閉	五九九
氣絕不省人事	五九九
傷方之又一靈驗者	五九九
金瘡藥方——一切刀斧傷	五九九
七釐散——一切跌打損傷	六〇〇
萬金膏——墜撲傷	六〇〇
吉利散——新舊傷	六〇〇
大西洋十寶散——刀斧跌仆統治	六〇〇
破傷風	六〇一

綴耳鼻法	六〇二
導氣通瘀錠—跌仆破頭	六〇二
人口咬傷	六〇二
金瘡犯房事	六〇二
跌躓諸傷	六〇二
血瘀脹痛	六〇二
跌壞日久腫痛	六〇二
跌傷青腫	六〇三
傷痕紫黑	六〇三
氣絕不言	六〇三
墜跌吐血	六〇三
渾身打傷	六〇三
宿傷立愈	六〇三
刀斧傷	六〇三
續骨丹	六〇三
硃砂膏	六〇三

三黃寶蠟丸—跌打損傷蛇蟲咬傷	六〇四
一切金瘡	六〇四
集靈接骨膏	六〇四
刀斧傷	六〇五
骨節跌損脫者	六〇五
松肉葱白膏	六〇六
治痧傷	六〇六
▲痧症 暑霍亂立有專門	
急救時疫方	六〇六
預避不染痧疫方	六〇六
白痧藥	六〇六
火龍丹	六〇六
細金丹	六〇七
截疫保命丹	六〇七
急救萬應丸	六〇七
痧脹腹痛方	六〇八

沉香鬱金散……………六〇八

痧藥方……………六〇八

又……………六〇九

辟瘟丹……………六〇九

神聖辟瘟丹……………六〇九

大頭瘟……………六〇九

又……………六〇九

又……………六〇九

抱頭火丹亦即大頭瘟……………六〇九

顛鷺瘟……………六〇九

卷十八

▲喉科指正

斗底風……………六一一

又喉風……………六一一

咽瘡風……………六一二

魚鱗風……………六一二

雙松子風……………六一三

單松子風……………六一三

雙蛾風……………六一四

單蛾風……………六一四

雙嚙口風……………六一四

單嚙口風……………六一五

重鵬風……………六一五

木舌風……………六一五

重舌風……………六一五

坐舌蓮花風……………六一五

合架風……………六一六

角架風……………六一六

爆骨搜牙風……………六一六

牙癰風……………六一六

懸度風……………六一七

奪食風	六二七
魚口風	六一七
驢嘴風	六一八
魚腮風	六一八
雙搭頰風	六一八
單搭頰風	六一九
落架風	六一九
粟房風	六一九
癩癧風	六一九
穿頰風	六一九
肥珠子風	六一九
掩頸風	六二〇
雙纏風	六二〇
單纏風	六二〇
邊頭風	六二〇
乘枕風	六二〇

附耳風	六二〇
-----	-----

十九藥

▲白喉忌表

洞主先師前論	六二三
遵定藥將三表	六二五
次將	六二五
除溫化毒湯	六二六
正將	六二六
養陰清肺湯	六二七
猛將	六二七
神仙活命湯	六二七
一切禁忌藥	六二八
誤服禁忌藥	六二八
洞主先師後論	六二九
白填鴨散	六三二

鐵爪長匙散	六三三
三不可要訣	六三三
一不可刮破	六三三
二不可近火	六三三
三不可多臥	六三三
增刊各方	六三三
吹喉冰硼散	六三三
吹喉鳳衣散	六三四
吹喉瓜霜散	六三四
外治異功散	六三四
外治蒜泥拔毒散	六三四
善後養正湯	六三四
善後銀花四君子湯	六三五
附末	
備急之急	六三五
羊鬚瘡	六三五

小兒甜瘡	六三五
黃水溜瘡	六三五
爛瘡成孔	六三五
婦人乳吹	六三五
白禿頭	六三五
遠年頭風	六三六
止小兒夜啼	六三六
走馬牙疳	六三六
乳頭開花	六三六
乳起結核	六三六
乳吹又一方	六三六
脚底起泡	六三六
斷乳奇法	六三七
小兒語遲	六三七
湯泡火傷	六三七
刀傷出血	六三七

誤斷指頭	六三七
天絲入目	六三七
婦人血崩	六三七
終夜不寐	六三八
小兒急慢驚風	六三八
霍亂 吊腳痧	六三八
救急痧驗方	六三八
霍亂應驗方	六三九
誤吞鴉片方	六三九
治砒霜應驗方	六三九
瘋犬咬傷方	六三九
疔瘡	六四〇
人中疔	六四一
閉口疔	六四一
唇上疔	六四一
蛇頭疔	六四一

紅絲疔	六四一
纏腰瘡	六四二
小兒驚風	六四二
跌損筋骨痛	六四二
止瘡萬應膏	六四二
毒蛇咬	六四三
又眼黑口禁欲死	六四三
土蝮咬傷	六四三
蛇蠍蜈蚣傷	六四三
吐狂血急救方	六四三

人人必備
醫藥顧問卷一

會稽馬小琴纂述

切脈

【診脈樞要】

經曰。脈者氣血之先也。氣血盛則脈盛。氣血衰則脈衰。氣血熱則脈數。氣血寒則脈遲。氣血微則脈弱。氣血平則脈和。又人長則脈長。人短則脈短。性急人則脈急。性緩人則脈緩。男子左手脈大。女子右手脈大。男子尺脈常弱。女人尺脈常盛。室女尼姑與老人之脈。皆濡而弱。此皆其常現也。反之者則爲逆耳。

【持脈手法】

滑伯仁曰。診脈之道。先調平自己氣息。男子先診左手。女人先診右手。而以己之中指按對彼之掌後高骨。是爲關位。若不見脈。其人脈在手之上側。遍尋而得之。名曰反關脈。此亦百中之偶一耳。既得關位。卻齊下名食二指。其人臂長。疎排其指。臂短密排其指。初以食指輕按寸上。浮以消息之。次中按以消息之。次重按以消息之。上竟以消息之下。竟以消息之。推而外以消息之。推而內以消息之。然後中關名尺一一類此以消息之。復

以三指合總以消息之。兩手六部皆如是以消息之。要以一呼一吸之間。脈行四至爲準。呼出心肺。吸入肝腎。脾居其中。故五至而得胃氣。爲平脈也。如其有太過不及者。卽是病脈也。

【診脈三要】

滑伯仁曰。診脈之要有三。一曰舉。二曰按。三曰尋。輕手得之曰舉。重手取之曰按。不輕不重。委曲求之曰尋。初持脈。輕手候之。脈見皮毛之間者。陽也。腑也。亦心肺之應也。重手按之。脈伏於肉下者。陰也。臟也。亦肝腎之應

也。不輕不重。而取之。其脈應乎
血肉之間者。陰陽相適中和之
應。脾胃之候也。若浮中沉之不
見。則委曲而求之。若隱若見。則
陰陽伏匿之脈。六脈皆然也。

【察脈六字】

經曰。上下來去至止六字。為脈
之神機也。不明六字。則陰陽虛
實不別也。上者為陽。下者為陰。
來者為陽。去者為陰。至者為陽。
止者為陰。

上者自尺部上於寸口。陽生於
陰也。

下者自寸口下於尺部。陰生於

陽也。

來者自骨肉之分。而出於皮毛

之際。氣之升也。
去者自皮膚之際。而還於骨肉
之分。氣之降也。
應曰至。息曰止也。

【十二經脈候】

左寸心 右寸肺 左關肝

右關脾 左尺腎 右尺相火

小琴按關前一分左為人迎

右為氣口或疑為寸上非也

神門屬兩關後即根本脈又

上焦候上中焦候中下焦候

下并浮中沉三候此全在神

會初不必沾沾於某脈屬某

臟也

【奇經八脈為病】

陽維 陰維 陽蹻 陰蹻

衝督任帶不與十

二經共貫

【八脈主病】

陽維為病苦寒熱

陽主衛主氣主表陽維受邪

為病在表故表病苦寒熱

陰維為病苦心痛

陰主榮主血主裏陰維受邪

為病在裏是榮合血合心故

苦心痛

陽蹻為病陰緩而陽急

陽蹻陽之絡也故陰緩而陽

急是陽病而陰不病也

陰蹻為病陽緩而陰急

陰蹻陰之絡也故陽緩而陰

急是陰病而陽不病也

衝之爲病氣逆而裏急

衝脈爲五臟六腑十二經脈之海其氣不順血不和則胸腹之氣循經壅逆而上故裏急矣

督之爲病脊強而折厥

督者總督諸陽與太陽合行於背故督爲諸陽之總太陽爲五陽之長故風邪傷陽表先受之所以脊強反折而癱瘓

任之爲病則男疝而女瘕聚

任者承任諸陰與衝脈并行於腹故腹屬陰背屬陽也男子疝瘕女子瘕聚者蓋七疝之發必在前陰少腹之間任

脈所經之地雖屬肝經未有不以任爲原者

帶主帶下腹脹滿而腰溶溶

帶脈總束諸脈不使妄行如

人束帶而前垂故名帶婦人

惡露隨帶脈而下故謂之帶

下張子和曰任督衝三脈同

起而異行一源而三岐皆絡

於帶脈因諸經往來上下遺

熱於帶脈之間客熱鬱抑白

物滿溢隨洩而下是爲白帶

腹脹滿腰溶溶如坐水中

【反關脈】

反關脈者不行於寸口由肺列

缺穴斜刺臂側入大腸陽豁穴

而上食指故名有一手反關有

二手反關此得之於有生之初非病脈也其三部定位九候淺深與平常寸口無異

【無脈候】

夫無脈之候所因不一久病無脈氣絕者死暴病無脈氣鬱可治傷寒風痛痰積經閉憂驚折傷關格吐利運氣不應斯皆無忌

【脈貴有神】

脈六數七極熱也脈中有力卽有神矣爲洩其熱三遲二敗寒也脈中有力卽有神矣爲去其寒苟無力卽無神苟不知此而洩之去之神將何以生耶故曰脈者氣血之先也氣血者人之

神也。

【男女異脈】

男子以陽爲主。兩寸之脈常旺於尺。若寸弱尺盛者。腎不足也。腎不足。則火盛。遺精淋濁。陰虛發熱。咳嗽等症作矣。女人以陰爲主。兩尺之脈常旺於寸。若尺弱寸盛者。上焦有餘也。上有餘。則下虧。衝任不調。月事不準。崩帶等症作矣。故不足固病。有餘亦病。過猶不及也。

【老少異脈】

老弱之人。脈宜緩弱。若過旺者。病也。少壯之人。脈宜強實。若脈過弱。亦病也。然尤有說焉。有老人脈旺而非躁。此天稟之厚。

引年之叟也。名曰壽脈。若脈躁疾。有表無裏。此孤陽也。其死近矣。有少年脈細而和緩。三部皆同。此天稟之靜。清逸之士也。名曰清脈。

【診婦人脈法】

經過後。脈來濡弱者。婦人脈態之常。如經來先後。或竟居經。亦不爲病。倘寸關調而尺絕不至。或至亦嫌小弱。主月水不利。小腹痛。脈沉緩。爲下虛弱。經來防多兼虛崩中。脈微虛。主經二月一至。是爲閏月。脈三部浮沉一止。寸關微瀉。爲氣血交虛。關伏寸浮。經水不至。乃病起憂鬱。心脾兩傷。恐成癆瘵。少陽卑沉。

少陰脈細。爲經水不利。血化爲水。痰水閉塞胞門。須防經斷。寸脈沉數。跌陽微弦。少陰沉滑者。係胞門血結。經絡不通。寸脈虛數。尺脈沉微者。爲癆瘵者。汗出潮熱而咳。與男子陰虛火動等。跌陽脈浮緊。主腹鳴腹痛。少陰浮緊。主疝瘕腹痛。脈浮動主帶下崩中。陰戶脫下。滑數主氣淋。陰瘡。絃主陰戶掣痛。白腸挺出如核。

【診婦人妊脈】

婦人妊脈。爲寸微關滑。尺帶數。流利往來。浮沉不絕。三月後。嗣滑疾不散。左手爲陽。脈疾實滑大。則孕男。右手爲陰。脈疾實滑。

大爲女孕婦二三月間常有身熱嗜臥嘔吐惡食等現象此乃精血結聚以榮養胎元乃應有見症名曰惡阻。

【診小兒虎口三關脈圖】



【小兒虎口三關說】

小兒初生至三歲內凡有疾病看虎口三關以氣血未定寸關尺三部脈未全故不可憑也初節爲風關次節爲氣關三節爲

命關風關則輕氣關則重命關則危紫爲熱紅爲寒青爲驚白爲疳黃則主脾病黑則主危惡此其大概而已至於臨症時必觀色聆音問症察脈以盡病情。

【小兒虎口三關脈歌】

小兒三歲下看虎口三關男左女右歌曰

紫熱紅傷寒青驚白是疳黑時因中惡黃卽困脾端淡紅淡黃者斯作無病看。

【死脈】

雀啄連連止而又作(肝絕)屋漏水流半時一落彈石沉弦按之指搏(腎絕)乍密乍疎亂如

解索(脾絕)本息(息不動也)未搖魚翔相若(心絕)蝦遊冉冉忽然一躍(大腸絕)釜沸空浮絕無根脚(肺絕)七怪一形醫休下藥。

此言五臟絕脈也六府中獨言大腸與胃者以其屬於陽明一爲倉廩之官一爲傳導之官爲全身之最重者也。

【脈之總名】

浮陽 沉陰 遲陰 數陽 滑陽 中陰
瀉陰 虛陰 實陽 長陽 短陰 洪陽
微陰 緊陽 緩陰 亂陽 中陰 弦陽
中陰 革陰 牢陰 中陽 濡陰 弱陰

散陰 伏陰 動陽 促陽 結陰 代陰

細陰

【脈理淺解】

浮

如捻葱葉。病在外也。

沉

着骨乃得。病在中也。

遲

去來極慢。一息三至。主裏寒。

數

一息六至。主陽熱。

滑

如珠應指。主痰。

濡

細短塞滯。主精血俱傷。

虛

遲大而爽。主血不榮心。又主傷暑。

實

堅實而強。主陽火鬱結。發狂傷食等症。

長

如循長竿。主陽毒癩癧。又主

短

陽明熱深。

應指而迴。主三焦氣壅。宿食

不消。戴同父曰。短脈只見尺

寸。若關中見短。上不通寸。下

洪

不通尺。是陰陽絕。脈必死矣。

來盛去衰。主陽盛陰虛。咳嗽

最忌。小琴按此脈宜盛夏。不

宜秋冬。

微

按之如欲絕。主氣血衰微。寸

主氣促心驚。關主脹滿。尺主

緊

血弱。

如轉索無常。主熱為寒。東人

迎緊盛。傷寒氣口緊盛。傷食

尺緊腹痛。又咳嗽沉緊。主死。

緩

一息四至。往來甚勻。主風濕

脾虛。小琴按有緩慢不收之

象。

孔

中空。湯實。主脫血。尺部見之。
主下血。赤淋崩漏。

絃

綽。綽如按琴絃。主痰飲寒熱。
諸瘡。小琴按寸絃。頭痛。膈中。
多痰。左關癥瘕。右關胃寒。腹。
痛。尺中陰疝。

革

絃而孔。如按鼓皮。小琴按昔。
賢謂弦寒孔虛。虛寒相搏。為。
革。男子亡血失精。婦人半產。
漏下。脈經曰。三部脈革。長病。
得之死。

牢

實大而長。微弦。主心腹寒痛。

木乘土位。癩疝癥瘕。惟陰虛。

失血者忌之。蓋虛病見實脈。
也。

濡

如水上浮漚。主亡血陰虛。又。
主傷濕。

弱

極奕而沉。陰氣虛。陽氣衰。
惡寒發熱骨疼。

散

有表無裏。渙漫不收。左寸主。
汗。右寸忤忤。獨兩尺見之不。
祥。

細

若絲線。應指。主氣血衰。諸虛。

勞損。又寸見嘔吐。關腹脹。尺。

丹田冷。並泄痢遺精脫陰。

脈行筋下。重按着骨。主霍亂。
吐瀉。

動

如豆大。厥厥動搖。主痛與驚。

又男子亡精。女子崩中。小琴。

按婦人手少陰脈動甚者。妊。
子也。

促

一止復來。徐疾不常。主喘嗽。
痰積。發狂斑毒。

結

時一止復來。主老痰結滯。內。
為積聚。外為癰腫疝瘕。

代

動而中止不能自還因而復動經曰代則氣衰滑伯仁曰若無病羸瘦脈代者危脈也小琴按女子三月懷胎亦見代脈

附代脈歌

五十不止身無病數內有止皆知定四十一止一臟絕四年之後多亡命三十

一止即三年二十一止二年應十動一止一年殞更觀氣色兼形證

又歌白
兩動一至三四日三四動止應六七五六一動七八

朝次第推之自無失。

【五臟四時平脈】

春	夏	四季	秋	冬
心脈 絃而浮洪	洪而散	緩而洪	浮而洪	沉而洪
肝脈 絃而長	洪而絃長	緩而絃	浮而絃長	沉而絃
脾脈 絃而緩	洪而遲緩	緩而慢	浮而緩大	沉而緩
肺脈 絃而微濇	洪而浮濇	緩而浮濇	浮而短濇	沉而濇
腎脈 絃而沉細	洪而沉滑	緩而沉濡	微而滑	沉而滑

小琴按以上諸脈應時而見其病必莫得而侵倘或心見肝脈肝見肺脈腎見脾脈皆為邪脈例如心脈在春宜弦而浮洪今見弦而長矣肝脈在春宜弦而長今見弦而微濇矣皆為凌所不勝或侮其所勝也為恆人所大忌。

【五臟四時邪脈】

春	夏	四季	秋	冬
正邪 絃	賊邪 浮濇而短	虛邪 沉細而滑	實邪 浮洪	微邪 緩大
浮洪而散	沉細	絃	緩大	浮濇而短

四季 緩慢而大 絃

秋 浮濇而細 浮洪

冬 沉細而滑 緩大

順候常下 反候

無邪無病 尅賊

浮洪 微濇而短 沉細而滑

緩慢而大 沉細而滑 絃

浮濇而短 絃 浮洪

從後來者 從前來者 妻來乘夫

初虛邪 爲實邪 爲微邪

望聞

【五臟作用】

靈蘭秘典篇曰。心者君主之官。神明出焉。肺者相傳之官。治節出焉。膻中者臣使之官。喜樂出焉。脾胃者倉廩之官。五味出焉。大腸者傳導之官。變化出焉。小腸者受盛之官。化物出焉。腎者作強之官。伎巧出焉。三焦者決瀆之官。水道出焉。膀胱者州都

之官。津液藏焉。肝者將軍之官。謀慮出焉。胆者中正之官。決斷出焉。

【察色】

內經舉面目謂望色之要。謂面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑者。皆不死。面青目赤。面赤目白。面青目黑。面黑目白。面赤目青。皆死。蓋以黃爲中土之色也。肝熱病者。左頰先赤。心熱病者。

額先赤。脾熱病者。鼻先赤。肺熱病者。右頰先赤。腎熱病者。頤先赤。

仲景謂鼻頭色青。腹中苦冷痛者死。蓋厥陰肝木之青色。挾腎水之寒威。上徵于鼻。下徵于腹。是爲暴病。頃之亡陽而卒死耳。鼻頭微黑者。但主水氣。黃者。胸有積痰。口者。知爲亡血。微赤非時者死。蓋火色歸土。非其時而有其氣。則火非生土之火。乃尅金之火。又主臟燥而死矣。面色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者。便難。色鮮明者。爲留飲。凡色之善者。青如翠羽。赤如雞

冠黃如蟹腹。白如豕膏。黑如烏

羽。色之惡者。青如草茲。赤如鮠

血。黃如枳實。黑如哀。白如枯骨。

靈樞謂赤色出于兩額。大如拇

指。病雖小愈。必卒死。黑色出于

天庭。大如拇指。必不病而卒死。

久病之色。必有受病之應。肺熱

病者。色白而毛敗。心熱病者。色

赤而絡脈溢。肝熱病者。色蒼而

爪枯。脾熱病者。色黃而肉蠕動。

腎熱病者。色黑而齒槁。

岐伯謂生于心如縞。裹朱。生于

肺如縞。裹紅。生于肝如縞。裹紺。

生于脾如縞。裹黃。生于腎如縞

裹紫。

察色之妙。全在察神。血以養氣

氣以養神。病則交病也。

【聞聲】

內經本宮商角徵羽五音。呼笑歌哭呻五聲。以參求五臟表裏虛實之病。五氣之邪。其謂

肝木在音爲角。在聲爲呼。在變動爲握。

心火在音爲徵。在聲爲笑。在變動爲憂。

脾土在音爲宮。在聲爲歌。在變動爲噦。

肺金在音爲商。在聲爲哭。在變動爲欬。

腎水在音爲羽。在聲爲呻。在變動爲慄。

變動者遷改其常志也

經謂中盛藏滿。氣勝傷恐者。聲

如從室中言。是中氣之濕也。謂

言而微。終日乃復言者。此奪氣

也。謂言語善惡不避。避諫者。此

神明之亂也。是聽聲中并可得

其神氣之變動。

金匱以病聲內合病情。謂病人

語聲寂然。喜驚呼者。骨節間

病。語聲暗暗不徹者。心膈間

病。語聲啾啾然細而長者。頭中

病。只此三語。而卜中上三焦變

病。莫不有變動。可徵。語聲寂寂

然者。不欲語而欲嘿也。靜嘿統

屬三陰。此則顯係厥陰所主。何

以知之。厥陰在志爲驚。在聲爲呼。病本緘默。而有時驚呼。故知之耳。惟在厥陰病必深入下焦。骨屬筋節間也。

暗暗然不徹者。聲出不揚也。胸中大氣不轉。出入升降之機艱而且遲。是可知其病在中焦。胸膈間也。

啾啾然細而長者。謂其聲自下焦陰分而上。緣足太陽主氣。與足少陰爲表裏。所以腎邪不劑。顛而還。得從太陽部分達于巔頂。腎之聲本爲呻。今腎氣從太陽經脈直攻于上。則腎之呻並從太陽變動。而啾啾細長爲頭中病也。

【察舌】

【白苔】

微白 風寒表邪也。

白潤 邪猶在表也。

白燥 表邪漸欲入裏。勢將化熱也。

熱也。

滑白 表邪挾濕挾痰也。

白膩而垢 雖邪猶在表。胃濁上僭也。

上僭也。

【黃苔】

微黃 表邪入裏化熱也。

黃糙 邪熱漸有劫陰之象。

老黃無液 熱勢漸重。津液被劫。

劫。

黃黑 熱勢大重。化原欲竭。

【灰苔】

微灰 表邪挾有濕熱之象。

老灰 濕熱較重。

小琴按凡見此苔。須尚有舌啞。過橄欖甘草瓜子陳皮梅等。蓋

舌有薄白苔。往往經過此等食物。變爲深灰。甚至變黑。如啖枇

杷舌苔作老黃色。同一例也。倘

泥於苔色。認爲病象。率然處方

毫釐千里矣。

【黑苔】

黑潤 濕熱內蒸。

黑燥 傷寒陽明病。熱從火化。津液鑠乾。或有積糞。下後自

差。

滿舌黑。此舌久病後得之水

來。尅火必死。

【青苔】

苔青 無故見此苔。不久必死。

孕婦見之子死腹中。唇舌兩

青。母子俱死。

【絳苔】

微絳 熱邪漸偏傷營。

絳潤 熱雖偏營。津液尙充也。

絳燥 熱勢傷營。液回。起苔得

生。

絳剝 營陰已竭。九死一生。若

起雪花苔。不出旬日即死。

【紫苔】

微紫 血熱。

深紫 熱勢深入。或挾溫毒時

邪。

【舌刺】

紅刺 諸苔中若見紅刺。必內

有伏熱。

紫刺 較紅刺爲甚。

黑刺 熱勢化火。或胃有熱毒。

小琴 按以上諸舌。係就其最淺

者言。若論其詳。當參閱舌鏡。蓋

此書非以餉醫家爲鄉僻民衆

稍增醫學常識而設。當世明達

幸勿見哂。

用藥

【用藥次序】

藥之治病。各有所主。主治者君也。輔治者臣也。與君相反而助之者佐也。引經及引治病之藥。至于病所者使也。如治寒病用

熱藥。則熱藥君也。凡溫熱之藥。

皆輔君者。臣也。然或熱藥之過

甚而有害也。須少用寒涼之藥

以監制之。使熱藥不至爲害。此

則所謂佐也。至于五臟六腑。及

病之所在。各須有引導之藥。使

藥與病相遇。此則所謂使也。餘

病推此。

喻嘉言按前論。乃用藥之權。最

爲精切。舊謂一君二臣三佐四

使爲定法。此不可泥。藥性論。又

以衆藥之和厚者定爲君。下次

爲臣。爲佐。有毒者多謂使。此說

殊謬。設若削堅破積。大黃巴豆

輩。豈得不爲君耶。

【諸藥相反】

甘草反大戟 芫花 甘遂
海藻 烏頭反半夏 栝蒌
貝母 白芨 白蘞 藜蘆反
人參 沙參 苦參 丹參
細辛 芍藥

【諸藥畏忌歌】

硫黃原是火中精。朴硝一見便
相爭。水銀莫與砒霜見。狼毒最
怕密陀僧。巴豆性烈最爲上。偏
與牽牛不順情。丁香莫與鬱金
見。牙硝難合京三稜。川烏草烏
不順屏。人參最怕五靈脂。官桂
善能調冷氣。若逢石脂使相欺。
大凡修合看順逆。炮燼炙博莫
相依。

【五味主禁例】

醫藥顧問問

心病之人毋多食苦。
肝病之人毋多食酸。
脾病之人毋多食甘。
肺病之人毋多食辛。
腎病之人毋多食鹹。

【五臭湊五臟例】

燥氣入肝。腥氣入肺。香氣入脾。
焦氣入心。腐氣入腎。

【五臟所欲】

肝欲散。急食辛以散之。以辛補
之。以酸瀉之。心欲奠。急食鹹以
奠之。以鹹補之。以甘瀉之。脾欲
緩。急食甘以緩之。以甘補之。以
苦瀉之。肺欲收。急食酸以收之。
以酸補之。以辛瀉之。腎欲堅。急
食苦以堅之。以苦補之。以鹹瀉

卷一 用藥

之。

【五臟所苦】

肝苦急。急食甘以緩之。脾苦濕。
急食苦以燥之。心苦緩。急食酸
以收之。腎苦燥。急食辛以潤之。
肺苦氣上。急食苦以泄之。

【五色所屬】

青色屬肝 赤色屬心 白色
屬肺 黃色屬脾 黑色屬腎

【五味所屬】

酸味屬肝 苦味屬心 辛味
屬肺 甘味屬脾 鹹味屬腎

醫理

【五臟所主】

心主脈。肝主筋。脾主肌肉。肺主

氣腎主骨。

【六淫主治】

風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。
 以甘緩之。以辛散之。
 熱淫於內。治以鹹寒。佐以甘苦。
 以酸收之。以苦發之。
 濕淫於內。治以苦熱。佐以酸淡。
 以苦燥之。以淡泄之。
 火淫於內。治以鹹冷。佐以苦辛。
 以酸收之。以苦發之。
 燥淫於內。治以苦溫。佐以甘辛。
 以苦瀉之。
 寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。
 以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。

【十二經表裏例】

手少陰心。與手太陽小腸為表。

裏。手厥陰心。包絡。與手少陽三焦為表裏。手太陰肺。與手陽明大腸為表裏。足太陰脾。與足陽明胃為表裏。足厥陰肝。與足少陽膽為表裏。足少陰腎。與足太陽膀胱為表裏。

【十二經補瀉】

足厥陰肝。足少陽膽。味辛補酸瀉。所以制金。氣溫補涼瀉。
 手少陰心。手太陽小腸。味鹹補甘瀉。所以制水。氣熱補寒瀉。
 足太陰脾。足陽明胃。味甘補苦瀉。
 手太陰肺。手陽明大腸。味酸補辛瀉。所以制木。氣涼補溫瀉。
 足少陰腎。足太陽膀胱。味苦補。

鹹瀉。所以制火。氣寒補熱瀉。

【五行生尅】

金生水。水生木。木生火。火生土。
 金尅木。木尅土。土尅水。水尅火。

【手足三陽表裏引經】

膽 柴胡 三焦 青皮 肝 青皮 命門
 柴胡 胃 升麻 白芷 大腸 石膏 脾
 白芍 肺 桔梗 膀胱 羌活 小腸 黃
 柏 腎 知母 心 黃連

【瀉諸經之火】

黃連瀉心火。梔子黃芩瀉肺火。
 白芍瀉脾火。柴胡黃連瀉肝膽火。
 知母瀉腎火。木通瀉小腸火。
 黃芩瀉大腸火。柴胡黃芩瀉三焦火。黃柏瀉膀胱火。

【五藏生成喜惡色味表】

<p>肝 臟</p>	<p>心 臟</p>
<p>乙 木 也</p>	<p>丁 火 也</p>
<p>屬東方。司震位。爲風。木王於春。味本酸。顏色青。</p>	<p>屬南方。司離位。爲君火。王於夏。味本苦。顏色赤。</p>
<p>其喜麻麥。液化爲淚。其惡風。聞竅於目。其藏魂。其華在爪。又藏血。其充在筋。生於三。其聲爲呼。成於八。其臭爲臊。</p>	<p>其喜黍。液化爲汗。其惡熱。開竅於舌。其藏神。其華在髮。主生血。其充在血。生於二。其聲爲言。成於七。其臭爲焦。</p>
<p>足厥陰經。將軍之官。實夢山林。虛夢細草。脈絃長順。浮濇短逆。</p>	<p>手少陰經。尹主之官。實夢驚怪。虛夢烟火。脈洪大順。脈沉細逆。</p>
<p>足少陽膽經爲之府。中正之官也。爲甲木。</p>	<p>手太陽小腸爲之府。受盛之官也。爲丙火。</p>

<p>臟 脾</p>	<p>臟 肺</p>
<p>也 土 己</p>	<p>也 金 辛</p>
<p>屬中州 司坤位。 為濕土。 王於四季。 味本甘。 顏色黃。</p>	<p>屬西方。 司兌位。 為燥金。 王於秋。 味本辛。 顏色白。</p>
<p>其喜梁。液化為涎。 其惡濕。開竅。口。 其藏意。其華在唇。 其主肉。其充肌膚。 生於五。其聲為歌。 成於十。其臭為香。</p>	<p>其喜稻。液化為涕。 其惡寒。開竅於鼻。 其藏魄。其華在毛。 其主氣。其充在氣。 生於四。其聲為哭。 成於九。其臭為腥。</p>
<p>足太陰經。 倉廩之官。 實夢歌樂。 虛夢爭食。 脈緩慢順。 脈絃長逆。</p>	<p>手太陰經。 相傳之官。 實夢兵戈。 虛夢田水。 脈浮濇短。 脈大洪逆。</p>
<p>足陽明胃 經之為府 水穀之海 也為戊土</p>	<p>手陽明大 腸為之府 傳道之官 也為庚金</p>

<p>腎 右</p>	<p>臟 腎</p>
<p>也 火 相</p>	<p>也 水 癸</p>
<p>同 與左腎 色味俱 其方位</p>	<p>屬北方。 司坎位。 為寒水。 王於冬。 味本鹹。 顏色黑。</p>
<p>同 與左腎 生成亦 其喜惡</p>	<p>其喜豆。 液化為唾。 其惡燥。 開竅於耳。 其藏志。 其養在骨。 其主骨。 其充在髓。 生於一。 其聲為呻。 成於六。 其臭為腐。</p>
<p>心肝脾肺俱一。 惟腎則二。 二者陰數也。 故位居至下。 左腎雖然屬水。 其中有火。 詳見五行相生應脈圖內。</p>	<p>足少陰經。 作強之官。 實夢腰重。 虛夢涉水。 脈沉滑順。 脈緩慢逆。</p>
<p>精氣之 舍元氣 之所性 水屬火</p>	<p>足太陽勝 胱為之府 州都之官 也為壬水</p>

【天之六氣】
風寒暑濕燥火

【人之七情】

喜 怒 哀 樂 悲 恐
驚

製方

【七方】

大方

岐伯曰。君一臣二佐九。制之大也。張從正曰。大方有二。有君一臣三佐九之大方。病有兼症而邪不一。不可以一二味治之者。宜之。有分兩大而頓服之大方。肝腎及下部之病。道遠者宜之。

小方

從正曰。小方有二。有君一臣二之小方。病無兼症。邪氣專。可以一二味治者。宜之。有分兩少而頓服之。小方。心肺及在上之病者。宜之。

緩方

岐伯曰。補上治上。制以緩。補下治下。制以急。急則氣味厚。緩則氣味薄。從正曰。緩方有五。有甘以緩之。之方。甘草蜜糖之屬是也。病在胸膈。取其留戀。也有丸以緩之。之方。比之湯散。其行遲慢也。有晶件衆多之緩方。藥衆則遞相拘制。不得各騁其性也。有無毒治病之緩方。無毒則性純功緩也。有氣味俱薄之緩方。

氣味薄則長於補上。治上比至其下。藥力已衰矣。

急方

好古曰。治客宜急。急則治其標也。從正曰。急方有四。有急病急攻之。急方。中風關格之病是也。有湯散蕩滌之急方。下咽易散而行速也。有毒藥之急方。毒性能上湧下泄。以奪病勢也。有氣味俱厚之急方。氣味俱厚。直趨於下。而力不衰也。

奇方

王冰曰。單方也。從正曰。奇方有二。有獨用一物之奇方。病在上而近者宜之。有藥合湯數一三五七九之奇方。宜下不宜汗。元

素曰。假如小承氣湯。奇之小方也。大承氣。抵當湯。奇之大方也。

偶方

從正曰。偶方有三。有兩味相配之偶方。有古之二方相合之偶方。古謂之複方。皆病在下而遠者。宜之。有藥合陽數二四六八十之偶方。宜汗不宜下。

複方

好古曰。複者再也。重也。所謂大補一泄。數泄一補也。從正曰。複方有三。有二方三方及數方相合之複方。又王太僕以偶爲複方。今七方有偶。豈非偶乃二方相合。複乃數方相合之謂乎。

【十劑】

宣劑

之才曰。宣可去壅。生薑橘皮之屬是也。杲曰。天分氣分。窒塞不通。或噦或嘔。所謂壅也。經曰。高者因而越之。木鬱則達之。宣者升而上之。時珍曰。壅者塞也。宣者佈也。散也。故宣劑宜於壅塞之症。

通劑

子才曰。通可去滯。通草防己之屬是也。元素曰。留而不行。必通以行之。從正曰。通者流通也。時珍曰。滯留滯也。濕熱之邪。留于氣分。而爲痺痛癱閉者。宜淡味之藥。上助肺氣。下降通其小便。而洩氣中之滯。木通猪苓之類。

是也。經曰。味薄者通。故淡味之藥。謂之通劑。

補劑

之才曰。補可去弱。人參羊肉之屬是也。經曰。精不足者。補之以味。形不足者。補之以氣。時珍曰。經云。不足者補之。又云。虛則補其母。生薑之辛。補肝。炒鹽之鹹。補心。甘草之甘。補脾。五味子之酸。補肺。黃蘗之苦。補腎。又如伏神。補心氣。地黃。補心血。人參。補脾氣。白芍。補脾血。黃芪。補肺氣。阿膠。補肺血。杜仲。補腎氣。熟地。黃。補腎血。芍藥。補肝氣。當歸。補肝血。不特人參爲補也。

洩劑

之才曰洩可去閉。葶藶大黃之屬是也。從正曰實則瀉之。諸病爲實。痛隨利減。芒硝大黃牽牛。甘遂巴豆之屬皆瀉劑也。時珍曰去閉當作去實。經云實者瀉之。實則瀉其子矣。

輕劑

之才曰輕可去實。麻黃葛根之屬是也。從正曰風寒之邪始客皮膚。頭痛身熱。宜解其表。內經所謂輕而揚之也。癰瘡疥癩俱宜解表。汗以洩之。毒以薰之。皆輕劑也。時珍曰當作輕可去閉。有表閉裏閉上閉下閉表閉者。風傷衛。寒傷營。腠理閉密。陽氣拂鬱。不能外出而爲發熱惡寒。

頭痛脊強諸病。宜輕揚之劑。

重劑

之才曰重可去怯。礞石鐵粉之屬是也。從正曰鎮絕之謂也。經云重者固而絨之。貴其漸也。時珍曰重劑凡有四。有驚則氣亂而魂氣飛揚。如喪神守者。有怒則氣逆而肝火激烈。病狂喜怒者。並鐵粉雄黃之類。以平其肝。有神不守舍。而多驚健忘。迷惑不寧者。宜硃砂紫石英之類。以鎮其心。有怒則氣下。精志失守。而畏人如將捕者。宜磁石沉香之類。以安其腎。大抵重劑壓浮火而墜痰涎。不獨治怯也。

滑劑

之才曰滑可去澀。著冬葵子榆白皮之屬是也。元素曰澀則氣著。必滑劑以利之。三焦約者宜先以滑劑潤養其燥。然後攻之。

澀劑

之才曰澀可去脫。牡蠣龍骨之屬是也。元素曰濕則氣脫。如開腸洞泄。便溺遺失之類。必澀劑以收斂之。從正曰脫者氣脫。血脫。精脫。神脫也。脫則散而不收。故用酸澀溫平之藥。以斂氣之耗散。

燥劑

之才曰燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是也。元素曰濕氣淫勝。腫滿脾濕。必燥劑以除之。從正

曰大寒之病宜薑附胡椒輩以燥之若病濕氣則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也時珍曰濕而有熱苦寒之劑燥之濕而有寒辛熱之劑燥之不獨桑皮小豆爲燥劑也濕去則燥故謂之燥

潤劑

之才曰濕可去枯白石英紫石英之屬是也時珍曰濕劑當作潤劑枯者燥也元素曰濕者潤濕也與滑類少有不同經云辛以潤之元素曰津耗爲枯五臟痿弱營衛涸流必濕劑以潤之

醫藥顧問 卷一 製方

八人必備醫藥顧問卷二

會稽馬小琴纂述

傷寒門

小琴按傷寒一症門類繁多。若舉其詳。累牘難盡。有背本編主旨。蓋本編之作。爲灌輸恆人常識計也。倘有美必收。纖悉無漏。微特多占篇幅。抑古書之論傷寒者。汗牛充棟。甯無蛇足之譏乎。茲姑節搜其要者錄左。以備閱此編。稍知途術焉。

【傷寒概要】

自霜降後。天令沍寒。感之卽病者。傷寒也。脈浮緊爲傷寒。浮緩爲傷風。或寒不即病者。春爲

溫。夏爲熱。一曰太陽受之。尺寸俱浮。以其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強。二曰陽明受之。尺寸俱長。以其脈挾鼻絡於目。故身熱。目痛。鼻乾。不得臥。三曰少陽受之。尺寸俱弦。以其脈循脅絡於耳。故脅痛耳聾。此三陽受病。未入腑。可汗而已。若不解。四日太陰受之。尺寸俱沉細。以其脈布胃中。絡於噎。故腹滿而咽乾。五日少陰受之。尺寸俱沈。以其脈絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。尺寸俱微。緩以甘脈。循陰器。絡於肝。故

煩滿而囊縮。此三陰受病。已入腑。可下而已。腑謂胃腑。可下諸症。其兩感於寒者。一曰大陰與少陰俱病。有頭痛項強。而又口乾煩渴也。二曰陽明與太陰俱病。有身熱譫語。而又腹滿不欲食也。三曰少陽與厥陰俱病。有脅痛耳聾。而又囊縮厥逆也。此陰陽表裏俱病。欲汗之則有裏症。欲下之則有表症。故內經仲景皆爲必死。汗下均不可。傷寒有傳經。有直中。傳經者。由太陽傳陽明。由陽明傳少陽。由

少陽傳太陰。由太陰傳少陰。由少陰傳厥陰。此爲循經傳。『傳經一』

太陽傳少陽爲越經傳。太陽傳太陰爲誤下傳。太陽傳少陰爲表裏傳。太陽傳厥陰爲首尾傳。太陽傳本腑（膀胱）爲傳本。

『傳經二』

陽明有不傳少陽。而徑入本腑者（胃）。少陽有不傳三陰。而徑入胃腑者。有傳一二經而止者。有始終止在一經者。（當隨症施治。不必拘日數。）其直中者。則不由陽經傳入。而徑入三陰者也。『傳經三』

凡傳經之邪。在表爲寒。入裏化

熱。不比直中之邪。但寒無熱。爲急宜溫也。（先明傳經直中庶寒熱之劑。不致混投。）

太陽爲表之表。陽明爲表之裏。少陽居表之間。爲半表半裏。太陰少陰厥陰俱爲裏。

凡傷寒自陽經傳入陰經者。爲熱邪。不由陽經傳入。而直入陰經者。謂之中寒。則爲寒邪。傷寒症有表寒。有裏寒。有表熱。有裏熱。有表裏皆熱。有表裏皆寒。有表寒裏熱。有表熱裏寒。凡三陽在經之邪。未入腑者可汗而已。三陰之邪。已入腑者可下而已。三陽三陰之邪。一入胃腑。則無復傳矣。胃者土也。萬物

歸土之義也。『可汗可下』

假令邪在太陽。不傳陽明經。而徑入胃腑。曰太陽陽明。邪在陽明經。不傳少陽。而自入本腑。曰正陽陽明。邪在少陽經。不傳三陰。而徑入胃腑。曰少陽陽明。凡三陽之邪。已入胃腑。俱下之勿疑矣。雖然。三陽入腑。人所共知。三陰入腑。鮮或能識。夫三陽之經。去腑尚遠。三陰之經。與腑爲近。若既入腑。則無外出之路。惟有通其大便。令邪從內出也。此大小承氣調胃承氣所由設也。『可下』

嘗見病人體質素厚。有傳經盡而自愈者。皆由汗解也。傷寒論

云其不再傳經。不加異氣者。七日太陽病衰。頭痛稍愈。八日陽明病衰。身熱稍歇。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減思食。十一日少陰病衰。渴止舌乾。已而噎也。十二日厥陰病衰。囊縱小腹微下。大氣已去。病人精神爽慧也。

凡邪已入裏而復發其表。是增其熱矣。故曰陰不得有汗。邪雖入裏而復返乎表。是邪外出矣。故曰還陽而向汗。

仲景曰病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而下之。因作痞熱。入者言入胃也。三陰下早。雖不至成結胸而已不免

爲痞氣矣。暗經腑之間。可不辨哉。

小琴按本編惟揭築傷寒病理而不附某病服某方者。以此病較他病爲難治。非老於醫事之家。斷難辨症處方。故苟遇是症。必延名醫診治。始爲穩妥。否則雖熟讀傷寒全論。無經驗以副之。猶慮動手便錯。蓋十里矧藉此。僅爲無醫學常識者。冀作導師哉。第既列傷寒一門。當不能無方。願手此編者。熟閱上錄概要。先明表裏藏府脈象傳經應汗應下宜溫宜寒謹節抄長沙一百十三方於下。以

備採用。

【結胸】

經云發於陽而反下之。熱入因作結胸是也。

太陽病脈浮而數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動變數遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣煩燥。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞭。硬也。則爲結胸。又傷寒六七日結胸。熱實脈沉而緊。心下痛。按之石鞭者。大陷胸湯主之。

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無

大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭汗出者。大陷胸湯主之。太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。胸有宿飲。日晡所小有潮熱。從心上至少腹。鞭滿而痛不可近者。大陷胸湯主之。傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。心下滿而鞭痛者。大陷胸湯主之。病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。熱入因作痞。發熱惡寒。熱入陽位。乃作結胸。無熱惡寒。熱入陰位。乃作痞。所以成結胸者。下之太早故也。按大承氣所下者。

燥屎。大陷胸所下者蓄水。小陷胸所下者爲黃涎。涎者輕於蓄水而未成水故也。小結胸正在心下。按之則痛。上不至心。下不及少腹。必按之作痛。非不可近手。脈浮滑者。小陷胸湯主之。寒實結胸。無熱症者。與三物小陷胸湯。白散亦可。小瘥按結胸係熱症。此云寒實。乃水氣寒冷所結。痰飲。小陷胸寒劑。似非所宜。當以白散爲是。蓋白散內有巴豆。性熱烈也。

陰陽易】

成無已傷寒論註曰。男子病新

差。未平復。而婦人與之交。得病。名曰陽易。婦人病新差。未平復。男子與之交。得病。名曰陰易。以陰陽相感動。其餘毒相染着。如換易也。傷寒論原文曰。陰陽易之爲病。其人身體重少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒棍散主之。〔附治〕交接勞復。陰卵腫縮。腹中絞痛。便欲死方。千金取所交接婦人衣服。以覆男子。立愈。竹皮湯。外臺治交接勞復。卵腫腹痛。便絕欲死。青竹皮一升。

右一味水三升。煮五六沸。絞汁頓服。立愈。此方范汪亦治大便後勞復。

療食勞方（外臺）杏仁五十枚。一味以酢二升煎取服之。取汗則差。

【狐惑】

（治法見下治蟲門）

狀如傷寒。或傷寒後變症。默默欲眠。目不能閉。不欲飲食。面目乍白。乍赤。乍黑。蟲食其喉。爲惑。其聲啞。蝕其肛。爲狐。其咽乾爛。見五臟則死。當視其唇。上唇有瘡。蟲食其臟。下唇有瘡。蟲食其肛。多因下利而得。濕蠶之病相似。（錄徐靈胎文）

【百合病】

論曰百合病者百脈一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默然。欲臥不能臥。欲行不能行。飲食或有美時。或有不用聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月。微見者。各隨證治之。百合病見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻

陰。復發其汗。此爲逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦爲逆。（此等症病後得之者甚多。醫者不知多方誤治。以致病氣日深。不可救療。始終無一人能識之者。遍地皆然也。）○百脈一宗。悉病。蓋肺朝百脈。故以百合治肺爲主藥也。

百合知母湯（金匱）百合病發汗後者主之。

百合（七枚擘）知母（三兩）切。右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升煎取一升。去滓。別以泉水二升煎知母。取一升。去滓。後合和煎取。滑石代赭湯（

金匱)石合病下之後者主之。

百合(七枚擘)滑石(三兩碎棉裹)代赭石(如彈丸大一枚碎棉裹)

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升煎取一升。去滓。別以泉水二升煎滑石代赭取一升。去滓。後合和重煎取一升。五分溫服。

百合雞子湯(金匱)百合病吐後主之。

百合(七枚擘)雞子黃(一枚)右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉

水二升煎取一升。去滓。內雞子黃攪勻。煎五分溫服。

百合地黃湯(金匱)百合病不經吐下發汗。病形如初者主之。

升 百合(七枚擘)以地黃汁一

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升煎取一升。去滓。內地黃汁煎取一升。五分溫再服。中病勿更服。大便當如漆。

百合洗方 百合病一月不解。變成渴者主之。

百合一升。以水一斗。漬之一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿以

鹽鼓也。

括蕒牡蠣散(金匱)百合病渴不差者主之。

括蕒根 牡蠣(熬等分)

右為細末。飲服方寸七。日三服。

百合滑石散(金匱)百合病變發熱者(一作發寒熱)主之。

百合(一兩炙)滑石三兩。右為散。飲服方寸七。日三服。當微利者。止服。熱則除。

【傷寒摘要】

【兩感】素熱論。帝曰。其病兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯曰。兩感於寒者。病一日則巨陽與少陽俱病。則頭痛。口乾。

而煩滿。二日則陽明與太陽俱病。則腹滿身熱不欲食。譫語三日則少陽與厥陰俱病。耳聾囊縮而厥。水漿不入。不知人。六日死。帝曰。五臟已傷。六腑不通。營衛不行。如是之後三日乃死。何也。岐伯曰。陽明者十二經脈之長也。其血氣盛。故不知人。三日其氣盡。故死。兩感則表裏同病。

【溫病暑病】素熱論。凡病傷寒而成溫者。先夏至日者爲病溫。後夏至日者爲病暑。暑當與汗出勿止。

【陰陽交】素問熱病論。帝問曰。有病溫者。汗出輒復熱而脈

躁。疾不爲汗衰。狂言不能食。病爲何。岐伯曰。病名陰陽交者。死也。帝曰。願聞其說。岐伯曰。人所以汗出者。皆生於穀。穀生於精。今邪氣交爭於骨肉。而得汗者。是邪却而精勝也。精勝則當能食而不復熱。復熱者邪氣也。汗出者精氣也。今汗出而輒復熱者。是邪勝也。不能食者精無俾也。病而留者其壽可立而傾也。且夫熱論曰。汗出而脈尙躁盛者死。今脈不與汗相應。此不勝其病也。其死明矣。狂言者是失志。失志者死。今見三死。不見一生。雖愈必死也。

【遺證】素熱論。帝曰。熱病已

愈。時爲所遺者何也。岐伯曰。諸遺者熱盛而強食之。故有所遺也。若此者皆病已衰而熱有所藏。因其穀氣相薄。兩熱相合。故有所遺也。帝曰。善治遺。柰何。岐伯曰。視其虛實。調其逆從。可使必已矣。帝曰。病熱當何禁之。岐伯曰。病熱少愈。食肉則復。多食則遺。此其禁也。

【難經】

傷寒有幾。其脈有變。不然。傷寒有五。有中風。有傷寒。有溼。有熱病。有溫病。其所苦各不同。中風之脈。陽浮而滑。陰濡而弱。溼溫之脈。陽濡而弱。陰小而急。傷寒之脈。陰陽俱盛而緊。濇熱病

之脈。陰陽俱浮。浮之而滑。沈之散濇。溫病之陽。行在諸經。不知何經之動也。各隨其經所在而取之。傷寒有汗出而愈。下之而死者。有汗出而死。下之而愈者。何也。然陽虛陰盛。汗出而愈。下之即死。陽盛陰虛。汗出而死。下之而愈。陽虛陰盛者。風傷衛而汗自洩。寒氣在內而未出也。陽盛陰虛者。身熱汗閉。燥火內結。津液乾枯。陰氣欲竭也。此以有邪處爲虛。無邪處爲盛。

【傷寒論上經脈證】

太陽病脈浮。頭項強痛而惡寒。尺寸俱浮者。太陽受病也。其脈上連風府。故頭項痛。腰脊強發

熱。汗出惡風。脈緩者。名曰中風。惡寒體痛。嘔逆。脈陰陽俱緊者。名曰傷寒。發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六也。陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。惡寒未離太陽。陽明病若能食。名中風。不能食。名中寒。尺寸俱長者。陽明受病也。其脈挾鼻絡於目。故身熱。目疼。鼻乾。不能臥。陽明外證。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。邪氣已離太陽。故不惡寒。陽明脈大。以上皆陽明經病。有太陽陽明。有正陽

陽明。有少陽陽明。此三條皆傳腑之證。太陽陽明者。脾約是也。少陽陽明者。發汗利小便。已胃中燥。煩實。大便難是也。陽明之爲病。胃家實也。此正陽陽明。陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。少陽之爲病。口苦舌乾。目眩也。尺寸俱弦者。少陽受病也。其脈循脅絡於耳。故胸脅痛。而耳聾。少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿。而煩者。不可吐。吐下則悸。而驚。傷寒脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。頭痛發熱。與太陽同。而脈之弦細獨異。三陽合

病脈浮大上關。但欲眠睡。目合則汗。內熱已極。傷寒六七日無大熱。外熱輕則內熱重。其人躁煩者。此爲陽去入陰也。若熱輕而不煩躁。則病欲退矣。傷寒三日。三陽爲盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此爲三陰不受邪也。太陰之爲病。腹滿而嘔。食不下。自利益甚。時腹自痛。尺寸俱沈細者。太陰受病也。其脈布胃中。絡於噎。故腹滿而噎。乾傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。同一太陰病。而有沈細浮緩之殊。蓋沈細乃太陰病。脈浮緩乃太陰本脈也。自利不渴者。

屬太陰。以臟有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。少陰自利而渴。熱入下焦也。此自利而不渴。寒入中焦也。少陰之爲病。陽微細。但欲寐也。衛氣行於陽則寤。行於陰則寐。少陰病欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。尺寸俱沈者。少陰受病也。以其脈貫腎絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。厥陰之爲病。消渴氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐。吐下之利不止。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。以其脈循陰器。絡於肝。故煩滿而囊縮。厥陰中風。脈

微浮爲欲愈。不浮爲未愈。

【可發汗】

春夏陽氣在外。邪氣亦在外。可發汗。

發汗欲令手足俱周。時繫繫然。不可令如水淋漓。

汗涇涇出。表裏之邪悉解。汗大出。則邪氣不除。但亡陽也。

陽虛無津液。不可重發汗。

服湯發汗。中病便止。不必盡劑。

下利後身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯發汗。

【不可發汗】

脈浮數者。法當汗出而愈。下之。身重心悸者。不可發汗。當聽自汗出乃解。所以然者。尺中脈微。

此裏虛。須表裏實。津液自和。便自汗出愈。

脈浮緊者。法當身疼痛。宜以汗解之。假令尺中遲者。不可發汗。以營氣不足。血少故也。

發汗後。水漿不得入口。為逆。若更發汗。必吐下不止。

咽喉乾燥者。不可發汗。

淋家。不可發汗。汗必便血。

瘡家。雖身疼痛。不可發汗。發汗則瘡。

衄家。不可發汗。汗出必額上陷。

脈緊急。直視不能。不得眠。

亡血家。不可發汗。發汗則寒慄。

而振。

汗家。重發汗。必恍惚心亂。小便。

已陰。疹與禹餘糧丸。

病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐。

脈濡而弱。弱反在關。濡反在巔。

微反在上。濇反在下。微則陽氣。

不足。濇則無血。陽氣反微。中風。

汗出而反躁煩。濇則無血。厥而。

且寒。陽微發汗。躁不得眠。

動氣在右。不可發汗。發汗則衄。

而渴。心苦煩。飲即吐水。

動氣在左。不可發汗。發汗則頭。

眩。汗不止。筋惕肉瞤。

動氣在上。不可發汗。發汗則氣。

上衝。正在心端。

動氣在下。不可發汗。發汗則無。

汗。心中大煩。骨節苦疼。目連惡。

寒。食則反吐。穀不得前。

咽中閉塞。不可發汗。發汗則吐。

血氣欲絕。手足厥冷。欲得蹠臥。

不能自溫。諸脈得數。動微弱者。

不可發汗。發汗則大便難。腹中。

乾。胃燥而煩。

脈濡而弱。弱反在關。濡反在巔。

弦反在上。微反在下。弦為陽逆。

微為陰寒。上實下虛。意欲得溫。

微弦為虛。不可發汗。發汗則寒。

慄不能自還。

欬者。則劇。數吐涎沫。咽中必乾。

小便不利。心中饑煩。晬時而發。

其形似瘡。有寒無熱。虛而寒慄。

欬而發汗。蹠而苦滿。腹中腹堅。汗厥脈緊。不可發汗。發汗則聲。

亂咽嘶舌萎聲不得前。諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死命將難全。欬而小便利若失小便者不可發汗。汗出則四肢厥逆冷。傷寒頭痛翁翁發熱形象中風常微汗出自嘔者下之益煩心中懊憹如饑發汗則致瘧身強難以屈伸。熏之則發黃不得小便久則發欬唾。

【可下】

秋時陽氣下行則邪亦在下。故可下。凡用下藥中病即止不必盡劑。如服讞語止更莫服也。下利脈當微厥若反三部皆平。

醫藥顧問問

卷二 傷寒門

此內實也。而又按之心下鞭者邪甚也。宜大承氣湯下之。下利脈遲滑者內實也。胃有宿食宜下之。下利不欲食者有宿食也。宜下之。病腹中滿痛者此爲實也。當下之。傷寒後更發熱脈沉實者以下解之。宜大柴胡湯。經曰脈遲爲在藏。雙弦而遲者陰中伏陽也。必心下鞭。又脈大而緊者陽中伏陰也。可以下之。宜大承氣湯。

【不可下】

陽微不可下。下之則心下痞鞭。

動氣在右不可下。下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也。動氣在左不可下。下之則腹內拘急食不化。動氣更劇雖有身熱臥則欲蹠。動氣在上不可下。下之則掌握熱煩。身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌。動氣在下不可下。下之則腹脹滿卒起頭眩。食則下清穀。心下痞也。咽中閉塞不可下。下之則上輕下重水漿不下。臥則欲蹠身急痛。下利日數十行。外實者不可下。下之則發微熱。亡脈厥者常臍握熱。亡脈厥。

者則陽氣深陷客於下焦故當
臍握熱。

諸虛者不可下。下之則大渴。求
水者易愈。惡水者劇。（金匱玉
函曰。虛者十補勿一瀉之。）（虛
家下之是爲重虛。）

內經曰。感於寒則受病微。則爲
效。甚則爲泄爲痛。下之氣。效
雖止。而因利不休。利不休。則奪
正氣而成危惡。胸中如蟲齧。粥
入則出。小便不利。兩脅拘急。喘
息爲難者。裏氣損也。頸背相引。
臂爲不仁。極寒反汗出。身冷如
水者。表氣損也。表裏損極。至陰
陽俱脫。眼睛不慧。語言不休。難
經曰。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。

陰陽脫者。應不能食。而穀多入
者。此爲除中。是胃氣除去也。口
雖欲言。舌不得前。氣已衰脫。不
能運也。

（小琴按此節錄傷寒論成無
已註）

裏邪未實。表邪未解。醫反下之。
裏氣益虛。邪熱內陷。故脈數發
熱。狂走見鬼。心下爲痞。此熱陷
於中焦也。若熱氣深陷。則客於
下焦。小便淋瀝。小腹甚鞭。小便
尿血也。（節成無已註）

病欲吐者不可下。嘔多。雖有陽
明證。不可攻之。

太陽病。外證未解。不可下。下之
爲逆。

病陽多者熱。下之則鞭。（陽多
者表熱也。下之則心下鞭。）

無陽陰強。大便鞭者。下之則必
清穀腹滿。傷寒心腹滿。下之則
短氣。小便難。頸項背強。

發熱口中勃勃。氣出者。咽中熱
也。下之亡津液。則咽中生瘡。

【可吐】

春時陽氣在上。邪氣亦在上。故
宜吐。

病胸上諸實。胸中鬱鬱而痛。不
能食。欲使人按之。而反有涎唾。

下利日十餘行。其脈反遲。寸口
脈微滑。此可吐之。吐之利則止。

宿食在上脘者。當吐。內經云。其
高者因而越之。其下者引而竭

之。
病人手足厥陰。脈乍結。以客氣在胸中。心中滿而煩。欲食不能食者。病在胸中。當吐之。

【不可吐】

虛家產婦。均不可吐。餘見「概要」不贅。

【瘧】

按瘧卽瘧之誤

太陽病發熱無汗反惡寒者。名曰剛瘧。（一作瘧餘同）太陽病發熱汗出而不惡寒。名曰柔瘧。太陽病發熱脈沈而細者。名曰瘧。爲難治。太陽病發汗太多。因致瘧。夫風病下之則瘧。復發汗必拘急。瘧家雖身疼痛。不可發

汗。汗出則瘧。病者身熱足寒。頭項強急。惡寒時頭熱而赤。目赤。獨頭動搖。卒口噤。背反張者。瘧病也。若發其汗者。寒溼相得。其表益虛。卽惡寒甚。發其汗已。其脈如蛇暴。腹脹大者。爲欲解。脈如故。反伏弦者。瘧。夫瘧脈按之緊如弦直。上下行。瘧病有灸瘡難治。太陽病其症備。身體強。几然。脈反沈遲。此爲瘧。太陽病無汗而小便反多。氣上衝。胸膈不得語。欲作剛瘧。瘧爲病。胸滿口噤。臥不著席。脚攣急。必齟齬。

【陽結陰結】

能食不大便。裏實也。爲陽氣結。

固不與陰氣和雜。是爲陽結。其脈浮而數。期十七日當劇。不能食。身體重大。大便鞭者。爲陰氣結。固不與陽氣和雜。是名陰結。其脈沉而遲。期十四日當劇。

小琴按。傷寒爲病。北方多有之。南方之所謂傷寒者。眞傷寒絕少。多係傷風。溫病。昔賢謂傷寒傷表。溫病傷裏。蓋一則起於足太陽。一則起於手太陽也。茲勿具論。大抵此症。陽病見陰脈者多死。陰病見陽脈者多生。

【仲景百十三方簡註】

【桂枝湯】桂枝三兩。去皮。芍藥三兩。甘草二兩。炙。大棗十二枚。

劈生薑三兩切。右五味。咬咀水。十升。微火煮取三升。去滓。溫服。一升。須臾。飲稀粥一升。助藥力。

溫覆一時許。取微汗。勿令如水。流漓。一服。差。停後服。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服小促。其期。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。未愈。更作。禁生冷。

粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物。
(主太陽中風汗出惡寒等症)

【桂枝加桂湯】即於桂枝湯中加桂二兩成五兩。(主奔豚氣)

從小腹上等症)

【桂枝加厚朴杏仁湯】桂枝湯加厚朴二兩杏仁五十個。去皮尖。(主咳逆上氣)

【桂枝去桂加苓朮湯】桂枝湯去桂加苓朮各三兩。(主利小便)

【桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯】桂枝湯去芍藥加牡蠣五兩熬。龍骨四兩。蜀漆三兩洗。(主以火迫劫亡陽驚狂)

【桂枝甘草龍骨牡蠣湯】桂枝一兩。去皮。甘草二兩。炙。龍骨二兩。牡蠣二兩。熬。水五升。煮取二升。半。去滓。分三服。(主鎮冷氣散火邪)

【桂枝麻黃各半湯】桂枝一兩。十六銖。去皮。芍藥一兩。生薑一兩。甘草一兩。炙。麻黃一兩。去節。杏仁二十四個。去皮尖。大棗四

枚。水五升。先煎麻黃一二沸。去沫。內諸藥。煮取一升八合。分三服。(主如瘧狀熱多寒少)

【桂枝加芍藥湯】桂枝湯倍芍共六兩

【桂枝加大黃湯】於加芍藥方中加大黃一兩。(以上二方俱治太陰症)

【小建中湯】加芍藥方中加膠飴一升。(主腹中急痛)

【桂枝新加湯】桂枝湯加芍藥一兩。人參三兩。(主發汗後身疼痛)

【桂枝加附子湯】桂枝湯加附子二枚。(主發汗太過如水流漓等症)

【桂枝去芍藥湯】（主太陽病脈促胸滿）

【桂枝去芍藥加附子湯】去芍藥方中加附子一枚泡。（主前症微惡寒）

【桂枝加葛根湯】桂枝原方中加葛根四兩。桂芍各減一兩餘。以水一斗。先煮葛根減二升去上沫。內諸藥煮取三升。去渣溫服。覆取微汗。不須啜粥。（主太陽病汗出惡風）

【茯苓桂枝甘草大棗湯】茯苓半斤。桂枝四兩去皮。甘草二兩炙。大棗十二枚擘。右四味以甘瀾水一斗。先煮茯苓減二升。內諸藥煮取三升。溫服一升。日三

服。（主發汗後臍下悸欲作奔豚）

【又陽旦湯】（卽桂枝湯加黃芩）夏至以前。或有用者。夏至後。更加知母石膏。或升麻。

【桂枝二越婢一湯】桂枝十八銖去皮。芍藥十八銖。甘草炙十八銖。麻黃十八銖去節。石膏二十四銖碎綿裹。生薑一兩三錢。大棗四枚擘。煎如前法。分二服。（主熱多寒少無陽不可更汗）

【桂枝二麻黃一湯】桂枝一兩十七銖去皮。白芍一兩六銖。生薑一兩六銖。甘草炙二兩二銖。麻黃十六銖去節。杏仁十六個去皮尖。大棗五個擘。煎如前法。

分二服。（主形如瘧日再發）

【桂枝甘草湯】桂枝四兩去皮。甘草二兩炙。水煮一升頓服。（主過汗心氣痛）

以上桂枝加減諸方。

【麻黃湯】麻黃三兩去節。桂枝二兩去皮。甘草一兩炙。杏仁七十個去皮尖。水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥煮取二升半。去滓服八合。覆被取微汗。不須啜粥。餘如桂枝湯。（主太陽病頭痛發熱身疼腰痠骨節痛惡風無汗而喘者）

【小青龍湯】麻黃三兩去節。芍藥三兩。五味子半升。乾薑二兩。甘草三兩炙。桂枝三兩去皮。半

夏半升洗。細辛二兩。右八味。水一斗。先煮麻黃減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。服一升。主表不解。心下有水氣。乾嘔發熱。欬渴痢噎等。

【大青龍湯】麻黃六兩。去節。桂枝三兩。去皮。甘草二兩。炙。生薑三兩。切。杏仁四十枚。去皮。尖。大棗十二枚。劈。石膏如雞子大。碎。綿裹。水九升。先煮麻黃減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗多者。溫粉撲之。主發熱惡寒。身疼。不汗而煩者。

【麻黃附子細辛湯】麻黃二兩。去節。附子一枚。炮。細辛二兩。水

一斗。先煎麻黃減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。主少陰病二三日。無裏症。發微汗。

【麻黃附子甘草湯】麻黃二兩。去節。附子一枚。炮。甘草二兩。炙。煎如前法。分三服。主少陰病始得之。反發熱。

【麻杏石甘湯】麻黃四兩。去節。杏仁五十個。去皮。尖。炙。甘草二兩。石膏半斤。碎。綿裹。煎如前法。分二服。主汗出而喘。無大熱者。

以上麻黃加減諸方

【葛根湯】葛根四兩。麻黃三兩。去節。桂枝二兩。去皮。芍藥二兩。甘草二兩。炙。生薑三兩。切。大棗

十二枚。劈。水一斗。先煮麻黃。葛根減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。主太陽病項背強。几几。無汗惡風。

【葛根加半夏湯】葛根湯加半夏半升。洗。主太陽陽明合病。不下利。但嘔者。

【葛根黃芩黃連湯】葛根半斤。甘草二兩。炙。黃芩三兩。黃連三兩。上四味。以水八升。先煮葛根減二升。內諸藥。煮取二升。去渣。分溫再服。主太陽桂枝症。誤下。利不止。脈促而表不解。喘汗者。

以上葛根加減方

【小柴胡湯】柴胡半斤。半夏半

升洗。黃芩三兩。人參三兩。甘草三兩。炙。生薑二兩。切。大棗十二枚。劈。右七味。水一斗。二升。煎取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加括婁實一枚。渴者去婁根。四兩。腹痛。去黃芩。加白芍三兩。脅下痞。去大棗。加牡蠣四兩。心下悸。小便不利。去黃芩。加茯苓四兩。不渴。外有微熱。去人參。加桂枝三兩。溫覆取微似汗。愈。欬。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑二兩。

【大柴胡湯】柴胡半斤。半夏半升。洗。芍藥三兩。枳實四枚。黃芩

三兩。大黃二兩。生薑五兩。大棗十二枚。劈。上八味。水一斗。二升。煮取六升。去渣。再煎至三升。分三服。主先與小柴胡。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。此湯下之。

【柴胡加芒硝湯】小柴胡中加芒硝六兩。主胸脅滿而嘔。日晡所潮熱。微利。先解其外。後以此湯下之。

【柴胡桂枝湯】柴胡四兩。黃芩人參。桂枝芍藥。生薑各一兩。半夏二合。甘草一兩。炙。大棗六枚。劈。上九味。水七升。煮取三升。去渣。溫服一升。主傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼痛。微

嘔。心下支結。外症未去者。

【柴胡加龍骨牡蠣湯】柴胡四兩。半夏二合。洗。人參一兩。半生薑一兩。半切。大棗六枚。劈。茯苓一兩。半。桂枝一兩。半。龍骨一兩。半。牡蠣一兩。半。煨。大黃一兩。鉛丹一兩。半。右十一味。水八升。煮取四升。內大黃。切如碁子。更煮一二沸。去渣。服一升。主胸煩驚。小便不利。讎語身重。

【柴胡桂枝乾姜湯】柴胡半斤。桂枝三兩。黃芩三兩。乾姜牡蠣（先熬）甘草各二兩。括婁根四兩。上七味。以水一斗。二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出。

便愈。(主已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱諸症。)

以上柴胡加減諸方

【梔子豉湯】梔子十四枚。劈。豉四合。綿裹。水四升。先煮梔子。得二升半。煮取升半。去渣。分二服。得吐止後服。(主反覆顛倒心中懊憹)

【梔子蘗皮湯】梔子十五枚。劈。甘草一兩。炙。黃蘗一兩。水四升。煮取一升半。去滓。分二服。(主傷寒身黃發熱)

【梔子甘草豉湯】梔子湯內加炙甘草二兩。(主清上焦之火而補中氣)

【梔子生薑豉湯】梔子湯內加生薑五兩。(主止嘔)

【梔子乾薑湯】梔子十四枚。乾薑二兩。上二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐止後服。(主外有微邪虛煩)

【梔子厚朴枳實湯】梔子十四枚。厚朴四兩。姜炙。枳實四枚。水浸去穢。煮服法同前。(主傷寒下後心煩腹滿臥起不安者)

【枳實梔子湯】枳實二枚。梔子十四枚。豉一升。上三味。以清漿水(即淘米泔)七升。空煮取四升。內枳實。梔子。煮取二升。下豉。更煮五六沸。去滓。分溫再服。覆

令微似汗。(主大病差後勞復者)

以上梔子加減諸方

【大陷胸湯】大黃六兩。去皮。芒硝一升。甘遂一錢。零研。水六升。先煮大黃取二升。去滓。內芒硝。煮一二沸。內甘遂末。溫服一升。得快利止後服。(主表邪未盡。誤下使陽氣下陷。致成結胸)

【大陷胸丸】大黃半斤。葶蘗半升。熬。芒硝半升。杏仁半升。去皮尖。熬黑。先搗篩。二味。內杏仁。芒硝。合研如脂。和散取如彈丸一。枚。別搗甘遂末一錢。匕白蜜二。合。水二升。煮取一升。溫頓服。一。宿乃下。如不下更服。(主誤下

結胸)

【大承氣湯】大黃四兩。酒洗。厚朴半斤。去皮炙。枳實五枚。炙。芒硝三合。水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。煮取二升。滓去。內芒硝。更上火。一二沸。分二服。得下止後服。(主傷寒不大便。發熱譫語。有燥屎者。)

【小承氣湯】大黃四兩。酒洗。厚朴二兩。炙。枳實大者三枚。炙。右三味。水四升。煮取一升二合。去滓。分二服。(主微瀉。以和胃氣。)

【調胃承氣湯】大黃四兩。酒浸。芒硝半升。甘草二兩。炙。水三升。煮取一升。去滓。內芒硝。更上微火。令沸。少少溫服。(主下而不

傷胃氣)

【桃核承氣湯】桃仁五十個。去皮尖。桂枝三兩。去皮。大黃四兩。酒洗。芒硝二兩。甘草二兩。炙。右五味。水七升。煮取二升半。去滓。內芒硝。上火微沸。先食。溫服五合。日三服。常微利。(主太陽病熱結膀胱。其人如狂。血自下。)

【抵當湯】水蛭三十箇。熬。蠱蟲三十箇。熬。去翅足。大黃三兩。酒洗。桃仁二十箇。去皮尖。右四味。爲散。水五升。煮取三升。去滓。溫服一升。不下再服。(主熱在下焦。少腹鞭滿。其人如狂者。)

【抵當丸】水蛭二十箇。熬。蠱蟲二十五箇。熬。去翅足。桃仁二十

箇。去皮尖。大黃三兩。酒洗。右四味。杵分爲四丸。水一升。煮一丸。取七合。服。時常下血。不下更服。(主少腹滿。小便反利。者。有血也。須緩下其血。凡緩也。)

以上承氣諸方加減。

【半夏瀉心湯】半夏半升。洗。黃芩三兩。黃連一兩。乾薑三兩。甘草三兩。炙。大棗十二枚。擘。人參三兩。右七味。水一斗。煮取六升。去滓。煎。煮三升。溫服一升。日三服。(主下後心滿不痛。而痞痞者。)

【生薑瀉心湯】生薑四兩。黃芩三兩。黃連一兩。乾薑一兩。甘草三兩。炙。大棗十二枚。擘。人參三

兩半夏半升洗。右八味水一斗。煮法同前。(主脅下有氣。腹中雷鳴下利。)

【旋覆代赭石湯】旋覆花三兩。人參二兩。生薑五兩切。代赭石一兩。半夏半升洗。甘草三兩炙。大棗十二枚劈。右七味水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。(主吐下後心下痞。嘔氣不除。)

【朴黃甘半參湯】厚朴半斤。去皮炙。生薑半斤切。半夏半升洗。人參一兩。甘草二兩炙。右五味水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。(主發汗後。腹脹滿。)

【附子瀉心湯】大黃二兩。黃連

黃芩各一兩。附子一枚炮。去皮別煮。汁麻沸。二升。漬須臾。絞去滓。內附子。汁分兩服。

【甘草瀉心湯】甘草四兩。黃芩三兩。黃連一兩。乾薑三兩。半夏半升。洗。大棗十二枚。劈。上六味水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。(主下利不化。腹鳴心痞等。)

【大黃黃連瀉心湯】大黃二兩。黃連一兩。上二味以麻沸湯二升。漬之。須臾。絞去渣。分溫再服。(主心下痞。按之濡。脈關上浮者。)

【黃連湯】即半夏瀉心湯。去黃芩。加桂枝三兩。上七味以水一

斗。煮取六升。去渣。溫服一升。日三夜二服。(主胸中有熱。胃中有邪。腹痛嘔吐者。)

【黃芩湯】黃芩三兩。甘草炙。芍藥各二兩。大棗十二枚。上四味以水一斗。煮取三升。去渣。溫服一升。日再夜一服。

【黃芩加半夏生薑湯】黃芩三兩。甘草炙。芍藥各二兩。半夏半升。生薑三兩。大棗十二枚。上六味以水一斗。煮取三升。去渣。溫服一升。日再夜一服。(主太陽少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。此湯主之。)

【乾薑黃芩黃連湯】四味各三兩。以水六升。煮取二升。去渣。分

溫再服。(主誤治正氣虛。食入口即吐)

以上瀉心加減諸方

【白虎湯】知母六兩。石膏一斤。碎。蘇葉甘草二兩。粳米六合。共四味水一斗。煮米熟湯成。去渣溫服一升。日三服。(主陽盛偏陰於外。而汗泄者)

【白虎加人參湯】前方加人參三兩。(主表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥。而煩。欲飲水數升者)

【竹葉石膏湯】竹葉二把。石膏一斤。半夏半升。人參三兩。麥門冬一升。甘草二兩。粳米半升。上七味以水一斗。煮取六升。去渣

內粳米。煮米熟湯成。溫服一升。日三服。(主傷寒解後。虛羸少氣。逆欲吐者)

以上白虎加減諸方

【茯苓甘草湯】茯苓四兩。甘草一兩。生薑三兩。水四升。煮取三升。去渣分三服。(主傷寒厥而心下悸者)

【五苓散】澤瀉一兩六銖。豬苓十八銖。去皮。茯苓十八銖。白朮十八銖。桂枝半兩。去皮。爲散。白飲和服。初方寸匕。日三。多服。煖水汗出。愈。(主小便不利。微熱消渴)

【豬苓湯】豬苓一兩。茯苓一兩。滑石一兩。碎。澤瀉一兩。阿膠一

兩。先煮四味。取二升。去滓。內膠。烱消。分三服。(主脈浮發熱渴。欲飲水。小便不利)

【文蛤散】文蛤五兩。爲散。沸湯五合。和散一錢匕。(主肉上粟起。意欲飲水。反不渴者)

以上五苓加減諸方

【四逆湯】甘草二兩。炙。乾薑一兩。半。附子一枚。生用。去皮。破八片。上三味。以水三升。煮取一升。二合。去滓。分溫再服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。(主吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥冷等等)

【四逆加人參湯】前方加人參一兩。煎服同上。(主脈微而利

利止亡血等)

【通脈四逆湯】甘草二兩。炙乾薑三兩。附子一枚。生用。上三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脈即出者。愈。面色赤者。加葱九莖。腹中痛者。去葱。加芍藥二兩。嘔者。加生姜二兩。咽痛者。去芍藥。加桔梗一兩。利止。脈不出者。加人參二兩。(主少陰病下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。不惡寒。反惡熱。面赤。腹痛。乾嘔。咽痛。或利止。脈不出等症。)

【通脈四逆加豬膽汁湯】原方加豬膽汁半合。如前煎成。內膽汁溫服。(主汗出而厥。四肢拘

急不解。脈微欲絕等候。)

【乾薑附子湯】乾薑一兩。附子一枚。(去皮生用)上二味。以水三升。煮取一升。去渣頓服。(主汗下後。煩躁不眠。不嘔不渴。無表證。身無大熱等候。)

【白通湯】即前方加葱白四莖。煎服如前法。(主少陰病下利。)

【白通加豬膽汁湯】即前方加人尿五合。豬膽汁一合。上三味。以水三升。煮取一升。去渣。內膽汁。人尿。分溫再服。(主少陰下利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。但服湯。脈暴出者。死。微續者。生。)

【茯苓四逆湯】茯苓四兩。人參一兩。附子一枚。(生用)甘草炙

二兩。乾薑一兩半。以水五升。煮取三升。去渣。溫服。七合。日三服。(主汗下後。仍躁煩。由陽氣不攝。所謂陰煩也。)

【四逆湯】甘草(炙)枳實。柴胡。芍藥。各十分。搗篩。白飲和服。欬加五味。乾薑各五分。小便利。利加茯苓五分。腹痛加附子一枚。泡今拆泄利下重。以水三升。先煮薤白取三升。去滓。以散方寸匕。內湯中。煮取一升半。分溫再服。(主少陰病。腹中痛。泄利下重者。)

【當歸四逆湯】當歸。桂枝。芍藥。細辛。甘草。通草。大棗。二十五枚。水八升。煮取三升。溫服一升。日

三服。

【當歸四逆加吳茱萸生薑湯】
當歸。甘草。通草。各二兩。芍藥。桂枝。細辛。各三兩。大棗。二十五枚。生薑。半斤。水六升。清酒六升。和煮取五升。去渣。溫五服。（主手足厥冷。脈細欲絕者。）

以上四逆加減諸方

【理中丸】人參。甘草。白朮。乾薑。各三兩。搗篩爲末。蜜丸。如雞子黃大。以沸湯和一丸。溫服。日三四服。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。但不及湯。（主霍亂頭痛。發熱身疼。寒多。不用水者。）
【真武湯】茯苓。三兩。芍藥。三兩。生薑。三兩。切。白朮。二兩。附子。一

枚。炮。去皮。破。右五味。水五升。煮取三升。去滓。分四服。欬加五味子半升。細辛。乾薑。各一兩。小便利。去茯苓。下利。去芍藥。加乾薑三兩。嘔。去附子。加生薑。足成半斤。（主太陽病。汗出不解。頭暈身瞶。振振者。）

【附子湯】附子。二枚。去皮。破。茯苓。三兩。人參。二兩。白朮。四兩。芍藥。三兩。右五味。水八升。煮取三升。去滓。分三服。（主少陰病。身體疼。手足寒。骨節痛。脈沉者。）

【桂枝附子去桂加白朮湯】白朮。四兩。甘草。二兩。附子。炮。三枚。生薑。三兩。大棗。十二枚。水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。盡其

人如冒狀。勿怪。此以附朮併走皮膚。逐水氣也。附子虛弱。家及產婦。減服。（主風溼相搏。身體疼。煩不能轉側。）

【茯苓桂枝白朮甘草湯】茯苓。四兩。桂枝。三兩。去皮。白朮。甘草。各二兩。以水六升。煮取三升。去渣。分溫三服。（主傷寒吐下後。心下逆滿。氣上衝胸等症。）

【芍藥甘草附子湯】芍藥。甘草。各三兩。附子。一枚。炮。去皮。破。八片。上藥。以水五升。煮取一升五合。去滓。分溫三服。（主汗不解。反惡寒等候。）
【桂枝人參湯】桂枝。四兩。甘草。

四兩(炙)白朮。人參。乾薑。各三兩。上藥水九升。先煎四味。取五升。內桂。更煮。取三升。去滓。溫服。一升。日再夜一服。(主協熱下利不止。心下痞鞭。表裏不解等症)

以上理中諸方加減

【赤石脂禹餘糧湯】上二味各一斤。水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。(主傷寒下利不止。心下痞鞭)

【炙甘草湯】又名復脈湯。甘草(炙)四兩。生薑三兩。人參二兩。生地黃一斤。桂枝三兩。麥門冬半斤。阿膠二兩。麻仁半斤。大棗三十枚。上藥以清酒七升。水

八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠。烱消盡。溫服。一升。日三服。(主傷寒脈結代。心動悸)

【甘草乾薑湯】甘草(炙)四兩。乾薑炮二兩。水三升。煮取一升。五合。去滓。分溫再服。

【芍藥甘草湯】上二味各四兩。水三升。煮取一升。五合。去滓。分溫再服。(主小便數。心煩惡寒。脚攣急。誤服桂枝湯。厥咽中乾。煩燥吐逆者)

【茵陳湯】茵陳蒿六兩。梔子十四枚。大黃三兩。上三味。水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。一宿腹減。病從

小便出也。(主頭汗。劑頸。小便瀉。欲飲。瘀熱在裏。身發黃)

【麻黃連軹赤小豆湯】麻黃。去節。二兩。連軹。二兩。赤小豆。一升。生梓白皮。一升。杏仁。四十枚。甘草。二兩。生薑。二兩。大棗。十二枚。上藥以潦一斗。(無根之水)先煮麻黃。再沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。分溫三服。半日服盡。連軹即連軹根。今人不採。以連軹代可也。(主傷寒瘀熱在裏。身必發黃)

【麻黃升麻湯】麻黃。二兩。升麻。一兩。一分。當歸。一兩。一分。知母。黃芩。萎蕤。各十八銖。白朮。石膏。乾姜。芍藥。天冬。桂枝。茯苓。甘

草各六銖。七十四味。水一斗。先
煮麻黃一味。沸去上沫。內諸藥
煮取二升。去滓。分溫三服。相去
炊三斗米。頃令盡汗出愈。（主
傷寒大下後。手足厥逆。下部脈
不至。咽喉不利。唾膿血。泄利不
止者。爲難治等候）

【瓜蒂散】瓜蒂赤小豆各一分。
杵爲散。取一錢匕。以香豉一合
用熱湯七合。煮作稀糜。去渣。和
散頓服。得快吐。乃止。諸亡血
虛家忌之。（主寸脈微浮。胸中
痞鞭。氣上沖。咽喉不得息者。是
胸中有痰等症）

【吳茱萸湯】吳茱萸一升。洗。人
參三兩。生薑六兩。大棗十二枚。

水七升。煮取二升。去滓。溫服七
合。日三服。（主少陰病吐利。手
足厥冷。煩躁欲死者）

【黃連阿膠湯】黃連四兩。黃芩
一兩。芍藥二兩。雞子黃二枚。阿
膠三兩。水五升。先煮三物。取二
升。去渣。內膠烱盡。少冷。內雞子
黃。攪勻。溫服七合。日三服。（主
少陰病心煩不得臥）

【桃花湯】赤石脂一斤。一半全
用。一半篩末。乾薑一兩。粳米一
升。上三味。水七升。米熟。去滓。溫
服七合。內石脂末方寸匕。日三
服。若一服止。餘勿服。（主少陰
病下利。使膿血）

【豬膚湯】豬膚一斤。水一斗。煮

取五升。去滓。加白蜜一升。白粉
五合。熬香。和相得。溫分六服。（
主少陰病下利。咽痛。胸滿。心煩
者）

【甘草湯】甘草二兩。一味。水三
升。煮取一升。半。去渣。分二服。（
主少陰病咽痛）

【桔梗湯】桔梗一兩。甘草二兩。
二味。水三升。煮取一升。半。去渣。
分二服。（主服甘草湯不效。與
此湯）

【苦酒湯】半夏。如棗核大。十四
枚。洗破。雞子一枚。去黃。內苦酒。
著雞子殼中。內半夏。著苦酒中。
以雞子殼。置刀環中。安火上。令
三沸。去滓。少少嚙下。不差。更作

三劑服之。(主少陰病咽中生瘡語聲不出)

【烏梅丸】烏梅三百個。黃連一斤。乾薑十兩。桂枝六兩。去木。細辛六兩。附子六兩。炮。人參六兩。黃蘗六兩。蜀椒四兩。出汗。當歸四兩。右十味。異搗篩研勻。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之。五升。米下飯熟。搗成泥。入藥拌勻。加蜜杵二千下。圓如桐子。先食下十九丸。日三稍加。至二十九。禁生冷滑臭食物。(主臟寒蛔上得食而嘔)

以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煎三沸。令稍冷。緩咽之。(主少陰病咽中痛)

【白頭翁湯】白頭翁二兩。黃連黃蘗。秦皮各三兩。上藥以水七升。煮取二升。去滓。溫服一升。不愈。更服一升。(主熱利下重者)

【牡蠣澤瀉散】牡蠣澤瀉蜀漆。括蕪根。葶藶子。商陸根。熬海藻。洗去鹹。各等分。杵散。白飲和服。方寸匕。(主大病差後腰以下有水氣者)

【蜜煎導方】蜜七合。銅器內煎。凝如飴狀。勿令焦。俟可丸。捻作錠頭。銳大如指。長二寸許。內穀道中。以引宿糞。

小琴按此法不及今之灌腸。及西藥房等出售之導肥錠。所以錄之者。存其古方之真也。

【豬膽汁方】大豬胆一枚。瀝汁和醋少許。灌穀道中。宿糞即出。

小琴按以膽汁麻油稍和。溫水用灌腸器。注穀道中。甚效。

【燒棍散】取婦人襯近陰處。剪燒灰。以水和服。方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫。即愈。若婦女取男子襯。燒灰。水和服。效。(病狀檢上陰陽。易自知)

以上雜方

小琴按傷寒之症。必老於醫事。熟讀內難傷寒論。金匱等

書並臨證年遠者。始克任之。草草翻閱諸方。斷不可苟且爲也。余集此編。列入傷寒一門。不過聊備一格耳。願病家。遵是症者。審之慎之。萬不可視爲病與方合。貿然錄方。購藥輕嘗試之。且古方分量。往往半斤一斤。若數兩之藥。直視若尋常。倘刻舟求劍。食古不化。以爲古人用藥。固如是也。此所謂讀死書矣。要知古之分量。雖較今重。（注明下方）其最當注意處。在『中病卽止』。『知後服不知再作服』等語。今則製一方藥。輕填分量。一般江湖醫家。且

今日換一方。診病既無主張。用藥又無一定。服藥病減。固彼之功。病重。則信口雌黃。妄譎病名。絕不認過。再更一醫。又復如此。是病者不死於病。而死於醫。殊爲可慨。余自幼習醫。弱冠後。廁身學界。誤於科名。未幾。重理故業。意欲考覽羣書。追步仲聖。奈貧賤焉。衣食於奔走。未免亦趨市醫一流。然知之爲知之。不知爲不知。非敢謬借宣傳。炫己以才。盜名欺世。誤人自誤也。但恨不能克樹市醫革命旂幟。浮沉社會。負吾初願矣。今作是編。未習醫事者。傷寒一門。

雖不能檢方。遴藥。據書自療。苟延醫而爲庸工者。將是編概要。古方簡註。相與談論。設彼而非喪心病狂之儔。亦當結舌不致坐爲所誤矣。古方分量註後。

【古今分量】

靈素至漢晉宋齊古方與今比較表

古一兩 今七八六釐

徐洄溪傷寒方注古一兩今

二錢零

古一升 今六勺七抄

凡唐人方一兩當古之三兩

厥後吳鞠通氏引古方輒改用

錢分。王孟英嘗其未當。但葉香

嚴氏已先吳氏行之。後人譏吳氏一書實剽葉案。殆春秋責賢者意耶。

【煎藥須知】

煎藥用水。今通用河水。通商碼頭。則自來水。已成習慣。若或告以某病當用某水。必視爲迂談。今亦不粥粥。惟普通表病。藥宜輕煎（如寒熱頭痛等）裏症及補劑（如腹痛等並調補）必須久煎。輕煎待藥沸。香氣出。即可服。久煎如水二三碗。煎取一碗是也。煎藥必須用炭。洋油火煤火。斷不可用。恐有毒也。若喉症而用煤煎。立見壞象。

傷寒治驗

小琴方案

【俞左】立冬後十餘日。驟感寒邪。瑟瑟以寒。翕翕以熱。乾嘔不已。診其脈浮緊。舌白。與桂枝湯。桂枝三分。白芍三錢。清炙甘草四分。鮮薑二片。大棗三枚。劈。清煎令服。服後進熱薄粥一碗。汗出而解。此桂枝湯原方也。惟分量減輕。藥苟中病。捷如應響。【周左】立冬後二旬。天氣驟寒。舟車勞頓。感傷寒六七日。寒已熱化。大便積日不下。譫語連連。頭痛。小便清長。知邪猶在表也。即與前方。熱頓退。頭痛亦止。診其脈數實。按之有力。舌黃燥。無

液。紅刺密佈。議增液調胃承氣法。

細生地四錢。鮮石斛三錢。生錦紋三錢。元明粉二錢。沖。生甘草五錢。

清煎令服。大便潤澤而下。次日思食安寐。

【黃右】冬至前二日。感寒。前醫投以汗劑。汗出不止。惡風。小便濇。四肢不能屈伸。議桂枝加附子湯。略事增減。

桂枝三分。白芍三錢。炙甘草六分。淡附塊八分。鮮薑三片。大棗四枚。清煎服後。陽回汗止。小便赤長。四肢舒展矣。

【沐右】立冬後二三旬。感傷寒。醫下之。咳逆上氣。痰凝微喘。此表未盡解也。議桂加厚朴杏仁湯。

桂枝前方中（分量亦同第一節）厚朴錢半。杏仁四錢。（勿打）清煎服後喘平痰釋微汗而安。

【尹左】年事垂五旬。凌冬遇寒。腹中急痛。診其脈浮濇而沉弱。

與小建中湯。

桂枝前方中加膠飴一兩。（卽

米糖今市上破布店中有出售

者）

藥煎就。去滓。內飴攪融。令朝晚

各一服卽安。

【史左】年事已逾四旬。驟感傷寒。經前醫汗後。身疼脈遲。與桂枝加芍薑人參法。

卽前桂枝方中芍薑各增一倍。

加人參（吉林參）五分。

清煎服後身疼頓止。脈亦振。

【洪右】冬至後感傷寒七八日。

前醫投表劑。汗後臍下悸動。欲

作奔豚。議茯苓桂枝甘草大棗

湯。

茯苓四錢。桂枝四分。甘草六分。

炙大棗四枚。擘。

水三碗。先煮茯苓減一碗。內諸

藥。煮取一碗。服。二浦再煎服。

【洪右】冬至前後傷寒七八日。

發熱惡寒。病狀如瘧。熱少寒多。

面現微熱。身痒。此邪鬱皮膚中。無路得出也。與桂枝麻黃各半湯。輕減其製。

桂枝三分。芍藥三錢。麻黃四分。

（去節）甘草五分。炙。生薑一

片。大棗一枚（擘）。

清煎服後微汗。諸病悉解。

【章左】冬日病如瘧。狀脈洪大。

雖經汗出。邪猶未解。與桂枝二

麻黃一法。

桂枝三分。麻黃三分。白芍三錢。

杏仁三錢。甘草六分。生薑一錢。

大棗四枚。

煎服後汗出病解。

【薛左】冬日發熱惡寒。熱多寒

少。診脈微弱。此無陽之候。與桂

枝二越婢一法。

桂枝三分白芍三錢甘草五分。

麻黃四分(去節)鮮薑一錢大

棗三枚。

先煎麻黃數沸去沫。內諸藥煎

服得微汗病勢竟減。

【宋右】冬日感寒向火自取其

汗汗出起臥不安驚狂萬狀諸

醫作癲狂治不效乃與以桂枝

去芍加蜀漆龍牡法。

前桂枝方中加蜀漆三錢牡蠣

五錢龍骨五錢。

以水先煎蜀漆減其三分之一。

內諸藥煎服遂安蓋漆去心腹

邪積龍牡治驚癇熱氣也。

【楊左】隆冬頭痛發熱身疼腰

痛骨節疼痛惡風無汗喘逆頻

作議麻黃湯。

麻黃三分桂枝三分甘草五分。

杏仁三錢。

先煎麻黃去沫。內諸藥煎服汗

出諸症遂罷。

【諸左】仲冬天氣寒邪襲人診

其脈浮緊發熱惡寒身疼痛無

汗煩躁主以大青龍湯。

麻黃四分桂枝三分甘草五分。

杏仁三錢鮮薑一錢大棗三枚

先煎麻黃去沫內諸藥煎服汗

出即甯。

【費左】冬初寒傷表陽發汗未

透心下有水氣乾嘔發熱口渴

且痢且噫小便濇少腹滿與小

青龍湯。

麻黃去節四分白芍三錢細辛

三分乾薑八分甘草六分桂枝

去皮三分五味子五分半夏三

錢(湯洗)

先煎麻黃去沫入諸藥得三分

之一去滓令服。

【陳左】仲冬斬寒感病後醫者

誤下之邪陷而利不止且喘且

咳診脈現促此表猶未解也與

葛根芩連湯。

葛根錢半甘草六分黃芩錢半

川連八分。

水三碗先煎葛根得二碗內諸

藥煎至減半去渣溫服利止喘

平。

【連左】冬至後二日風雪交作。從火爐屋內被客勦外出。遇寒歸家而病。往來寒熱。胸脅苦滿。心煩喜嘔。認爲少陽症。議小柴胡法。

柴胡七分。黃芩錢半。人參八分。甘草(炙)四分。鮮薑錢半。半夏三錢。大棗四枚。

水三碗。內藥煎至碗半。去渣。分三次服。次日病解。

【滕右】冬末風雪感寒。適近汛(月經)至。入暮譫語。遍體如灼。認爲熱入血室。與小柴胡湯。加丹皮錢半。服後即安。

【曾右】大雪前後。驟攪寒邪。經旬不解。發熱微汗。心中痞鞭。嘔

吐下痢。認爲當下。與大柴胡湯。柴胡八分。半夏二錢。黃芩錢半。白芍三錢。枳實錢半。生薑二錢。大棗四枚(劈)。生錦紋三錢。水三碗。煎至一碗。去滓。服二浦。再煎服。

再煎服。

【徐左】傷寒六七日。發汗傷陽。譫語迭作。胸腹結氣。微似喘逆。此營衛不和也。議柴胡桂枝湯。柴胡七分。黃芩錢半。人參七分。桂枝三分。白芍三錢。半夏三錢。甘草五分。鮮薑錢半。大棗三枚。水三碗。煮取一碗。二浦再煮。分二次服。不知。再照原方配一劑。【勵左】初冬感寒。旬餘不解。日晡所潮。熱胸脅滿。而嘔。自利止。

先與小柴胡。表症解。議柴胡芒硝湯加減。

柴胡六分。黃芩錢半(酒炒)。甘草四分(炙)。潞黨一錢。半夏三錢。元明粉錢半。生薑錢半。大棗三枚。

水三碗。煎取一碗。去渣。內元明粉。更煎。俟沸。分溫服。不得暢瀉。中夾糞塊。病勢乃罷。

【胡左】纔過陽至。嚴寒。值人中。年氣血漸衰。寒傷表陽。經前。醫汗下傘。施輾轉。不留身熱。不去。胸煩且窒。與梔子鼓湯。

梔子三錢(生用)。香鼓四錢。水四碗。先煮梔子。得二碗。內鼓。再沸少頃。去滓。分作二服。先進。

一服得吐止後服。不知再服。按氣虛用梔子。甘草鼓湯。嘔用梔子生薑鼓湯。胸煩腹滿。用梔子厚朴枳實湯。今胡姓之病。適合梔子鼓湯。乃減製與之二服。畢得大吐。熱去胸舒。臥亦得安矣。

【孫左】寒夜單衣操作。如廁被冷。臥病旬餘。醫者施以汗吐諸法。大便六七日不下。脈弦而數。舌心黃厚。邊尖紅刺累累。日晡潮熱。讖語無倫。與大承氣湯。生大黃三錢（酒洗）厚朴錢半（去皮）枳實三錢（炙）芒硝三錢。

水四碗。先煎厚朴枳實。得三碗。內大黃再煎得二碗。去滓內芒

硝。俟稍沸。分溫令先服一碗。下硬糞十餘枚而安。棄餘藥。

【全左】嚴冬旅行遇寒。臥病垂旬。服前醫藥。表症漸解。惟輾轉不寐。惡寒腹中轉矢氣。認為有積糞。與小承氣湯。

生大黃三錢（酒洗）厚朴錢半。焦枳實二錢。

水三碗。煎取碗半。去滓。分作二服。先與一服。大便潤下。棄去餘藥。

【經右】冬夜途次。遇風雪受寒。臥病服前醫藥六七日不解。惟身熱較減。其人如狂。血涿涿出。少腹掣急作痛。認為太陽之邪。由經入腑。與桃仁承氣。

桃仁三錢（去皮尖）生大黃三錢。甘草六分。桂枝三分。芒硝二錢（沖）。

水三碗。煎取一碗。頓服之。不下。次日再服一劑。下血塊硬糞。續遂愈。蓋膀胱一經。多氣多血。熱甚。則血凝而上。于心胞。故神昏如狂也。

【封右】冬日臥病。經旬。脈微而沉。狀若發狂。少腹鞭滿。小便自利。經曰。小便自利。其人如狂者。血症諦也。因與抵當湯。

水蛭（熬）蟲蟲各十四個。生大黃三錢（酒浸）桃仁三錢（去皮尖）。

水三碗。煎取二碗。分二服。大便

雜瘀血而下。

【符左】大寒前數日。勞力致汗。去衣受寒。臥病七八日。醫藥雜投。膈內拒痛。短氣煩躁。心下按之石鞭者。由病發於陽而反下之。因作結胸也。與大陷胸湯。生大黃三錢。芒硝二錢。甘遂四分。

先煮大黃去滓。內芒硝一二沸。再內甘遂末。服下瀉。利二次遂愈。

【井右】驟撓冬寒。臥病有日。經數醫診治。表症似解。惟胃部鬱鬱痞悶。按之作痛。認爲傷寒小結胸。與小陷胸湯。

黃連七分。半夏三錢。括蕪實三

錢。

水三碗。煎取碗半。去渣。分二次服。小琴按此症乃蓄水之漸。徐靈胎傷寒方註謂輕於蓄水而未成水也。小陷胸偏於寒性。似非所宜。傷寒論謂白散亦主之。蓋白散係桔梗貝母巴豆配合而成。巴豆熱性能散水驅寒。此症施治似以白散爲宜。余前遇此症而主以小陷胸亦徵效果。因該劑頗能行水也。

【王左】深冬寒傷表陽。諸醫投汗劑。表解。覺心下有水氣。腹中雷鳴。頻作乾噫。認爲有留飲。主以生姜瀉心湯減製。

鮮薑錢半。炙甘草五分。人參（

改潞黨二錢。炒焦。黃芩錢半。半夏三錢。黃連七分。

水三碗。煎取二碗。去渣。分二次服。

【童左】立春將近。天氣漸寒。臥病垂旬。身尙微熱。腹痛頻欲嘔吐。此表邪未盡也。與黃連湯。黃連六分。炙甘草六分。乾薑六分。桂枝三分。人參六分。半夏三錢。大棗四枚。

水三碗。煎取二碗。日夜分作三次服。服後痛嘔稍止。次日再作服而愈。

【李右】傷寒初罷。心下痞鞭。噫嚅頻作。此腹中邪毒未盡。胸脅留有結氣也。主以旋覆代赭湯。

旋覆花三錢。包。人參七分。半。夏三錢。代赭石三錢。炙甘草六分。鮮薑錢半。大棗四枚。

水三碗。煎取二碗。分作二次服。

【李左】傷寒經旬。面垢讞語。自汗。溲溲。手足厥冷。此上焦陽盛。偏陰於外。而欲上泄也。主以白虎湯。

知母三錢。生石膏六錢。甘草八分。粳米二兩。

水五碗。內諸藥與米。俟米熟。湯成。約得四淺碗。分作三次服。服後汗止。神清。安眠達旦。

【步右】傷寒經諸醫表後。汗大出。煩渴不解。惡風。診其脈洪大。舌上乾燥。詢之。素體本虛。乃與

白虎加入參湯。前方加入參一錢。此參不得以別直潞黨代用。人參另煎。餘藥同上。服後煩渴即解。

【傅左】病後津液不復。肺胃陰虛。氣逆欲吐。奄奄無力。與竹葉石膏湯調之。

竹葉二錢。石膏四錢。半夏三錢。人參八分。麥冬三錢。甘草六分。粳米二兩。

水四碗。煮藥減去碗半。內粳米。俟米熟。湯成。約得兩滿碗。分二次服。

【成左】傷寒表熱裏寒。下利清穀。診脈沉遲。與以四逆湯。甘草八分。乾薑錢半。附塊八分。

水三碗。煮取二碗。分溫二服。【姁右】仲冬天氣寒中少陰。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脈微欲絕。面赤腹痛。乾嘔。煩作。主以通脈四逆湯。

甘草八分。乾薑三錢。附塊一錢。葱五莖。

煎服法同四逆湯。傷寒方註面赤者宜之云云。

【林左】少陰下利。主以白通湯。乾薑一錢。附子八分。葱白三莖。即乾薑附子湯。加葱白水二碗。煎一碗。頓服。

【陳左】頭痛發熱。身疼痛。吐利。此霍亂也。主以理中丸。人參。甘草。白朮。乾薑。各等分。

此丸藥肆中有出售研碎一錢白湯和服。

次服。服後大便溏。小便如藥汁。尋愈。

子四錢。梗通草八分。赤苓四錢。【鄒右】病後得食便嘔。時吐涎。沫認爲胃氣虛寒。與吳茱萸湯。

【井右】立春未屆。大雪連綿。旅行受寒。臥病六日。醫藥雜投。迄無效果。自覺四肢沉重。腹痛。小便時利。時不利。此上焦液枯。腎水上泛也。主以真武湯減製。

【邢右】冬日病後。目黃。胸悶塞。面足微腫。小便短赤。氣急欲喘。此痰熱挾濕也。與麻黃連軹赤小豆湯。

【馮右】熱病胸煩。不得臥。時或交睫。則惕然自驚。與黃連阿膠湯。

茯苓三錢。白芍三錢。白朮三錢。附塊一錢。泡。鮮薑錢半。

水三碗。煎二碗。去滓分作二服。古此方也。連軹係連翹根。今之藥肆不備。卽以連翹代之。連進二劑。未甚效。小琴乃小變其製。服三劑。病若失。錄方如下。

水二碗。煎取一碗。阿膠另烱沖。俟藥汁稍溫。攪入雞黃頓服之。小琴按此降火養陰之聖劑也。雞子黃能引藥。達又能去風。

水三碗。煎二碗。去滓分作二服。

小豆四錢。生梓白皮三錢。杏仁四錢。甘草四分。生薑錢半。大棗三枚。

水三碗。煎取一碗。頓服之。嘔止。吐沫亦不作。

【盧左】傷寒後。頭汗涔涔。渴欲飲水。小便短濇。此經訓謂痰熱在裏。身將發黃也。與茵陳蒿湯。

西茵陳三錢。梔子二錢。大黃三錢。

水三碗。先煮茵陳得二碗。分二

錢。

錢杏仁四錢。赤小豆四錢。冬瓜

錢。

溫病方稱爲定風珠。以此治熱。盛化風之候。最爲相宜耳。

【瞿左】病後中焦氣虛。陰火上炎。與以豬膚湯減製。

豬膚四兩。以水四碗。煎取碗半。去滓。掠去浮油。令淨。加白蜜一兩。米粉半碗。熬香。和令相得。分作五六次服。

【谷右】冬暖。咽痛頻作。喉際頗感燥瀼。此陽不潛藏。虛火上燔也。與桔梗湯。

桔梗錢半。生甘草八分。

水二碗。煎取一碗。服之。小琴按。今日白喉初起。亦可用。惟陰虛喉痛更宜。

【宗左】熱利下重。紅白黏滯之

物。雜下。日數十行。主以白頭翁湯。

白頭翁錢半。黃連一錢。黃柏三錢。秦皮三錢。

水三碗。煎取二淺碗。分作二服。利止。卽見燥糞。雜有五色者。小琴於三十年來。治傷寒一症。何止數萬。第所留方案。或則散

佚。或則皮之敗筩。鼠嚙蟲食。無復留遺。今所錄存者。尙賸萬餘。擬日後訂爲一帙。以調當世上

錄諸方。乃千中偶選一二。以與傷寒門。可互相發明。故特遴當。日治病用。仲景原方。減製者。實之編中。餘則概歸刪去。蓋限於篇幅也。惟古方中。多人參。今

日人參之貴。盡人而知。苟悉仍其舊。有力者固能任之。貧病者其何以堪。余遇用人參之方。量病之輕重。可代以黨參者。黨參代之。否則代以高麗參。其重者。則不得不用人參。而輕減其量。用表而出之。俾閱者知所效法也。

溫病概要

春令溫暖。腠理開泄。或引動伏邪。或乍感異氣。當春發爲溫病。由冬藏不密。腎陰下虧。虛陽爲寒氣所闕。陷入陰中。至春裏氣大泄。木火燔昌。始見現症。必壯熱煩躁。口乾舌燥。經所謂冬不

藏精。春必病溫也。喻西昌指此精釋爲房勞。吳鞠通謂當作有動乎中。必搖其精之精字解。余甚以吳氏之說爲然。其脈數盛。右倍於左。發熱而渴。不惡寒。與傷寒浮緊脈異。此熱邪由內達外。最忌發汗。宜辛涼解表。如「葱白香豉湯」。苦寒泄熱。如「黃芩湯」等類。蓋裏氣一通。自然作汗也。倘舌乾便秘。用「涼膈散」。協熱下利。「葛根芩連湯」。咽痛。「甘桔湯」。心煩。「黃連阿膠湯」。由熱邪內發。無表症也。倘從口鼻吸入而病溫者。異氣所感。邪由上受。首先犯肺（手太陰）逆傳心包（手

厥陰）或留三焦（手少陽）若傷肺則胸滿氣窒。宜辛涼輕劑。「杏仁桔梗括蕞梔皮枳殼連翹」。挾風加「薄荷牛蒡」。挾溼加「蘆根滑石」。或透溼於熱外。或滲溼於熱下。俾風溼不與熱相搏。庶不貽風溫溼溫之患。如辛涼祛風。甘淡滲溼。熱勢不解。則入心營。而血液受劫。咽燥舌黑。煩渴不寐。或見斑疹者。宜清解營熱。「犀角生地麥冬石斛竹葉元參沙參青蒿」。兼透斑。「牛蒡山梔連翹銀花丹皮赤芍」。斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒重則「玉女煎」。輕則梨皮蔗漿之類。若邪

入心包。神昏譫語。目瞑而內閉者。宜芳香逐穢。宣神明之竅。驅痰熱之結。「牛黃丸至寶丹」。若氣病不傳血分。而邪留三焦。宜分消其上下之勢。如「杏仁厚朴茯苓等或溫膽湯」。因其猶在氣分。可冀戰汗而解。或轉瘧也。若三焦不得從外解。必致裏結腸胃。宜用下法。「承氣湯加元明粉」。若脘痞胸悶。瀉心湯小陷胸湯。若腹脹滿。或痛邪已入裏。必驗其舌。或灰黃老黃。中有斷紋。皆當下之。「承氣加檳榔枳實之屬」。其病溫復感風者。爲風溫。必陽脈浮滑。陰脈濡弱。風屬陽。溫化熱。兩陽

輩灼。先傷上焦。上焦近肺。肺氣既閉。致頭脹。腕痞。身熱。汗出。宜微苦以清降。微辛以宣通。杏仁。香鼓。鬱金。括蕩。橘紅。山梔。薄荷。牛蒡。忌溫散劫津。宜「葳蕤湯去麻黃羌活木香」。若風溫誤。汗身灼熱者。脈陰陽俱浮。自汗身重。多眠鼻鼾。語言難出。危症也。急用「蔗漿麥冬白芍生地炙草玉竹阿膠之屬」。誤下誤火（以火薰灼也）亦危。其病溫而溼勝者。爲溼溫。身熱頭重。胸滿嘔噦。足脛冷。「蒼朮白虎湯或滑石蘆根苡米茯苓半夏」。其冬行春令。襲溫氣而成病者。爲冬溫。蓋本秋燥之餘。

氣。故發熱咳嗽。喉腫咽乾痰結。甚則見血（與傷風之痰一效而上者不同）。其脈虛緩或虛大無力。亦有先病冬溫。更加暴寒。寒鬱熱邪。則壯熱頭痛自汗。欬喘。「陽旦湯加桔梗茯苓」。切忌風藥升舉其邪。致欬愈劇。熱愈甚。遂變風溫。灼熱以死。亦忌辛散。致咽喉不利。痰唾膿血。「加減葱白香鼓湯調之」。若兼風寒外襲。「葱鼓湯加羌活紫蘇」。寒邪盛汗不出煩躁者。「葱鼓湯加少許麻黃石膏」。若冬溫誤汗。致發斑毒者。「升麻葛根湯加犀角元參」。如昏憤譫妄者。大便瀉。手足冷。不治。

其病溫更遇時毒者。爲溫毒。脈浮沉俱盛。煩悶嘔欬。甚則狂言下利而發斑。凡煩悶躁熱。起臥不安。皆發斑候也。熱毒內攻。陷於營分。乃發斑毒。「黃連解毒湯」。斑不透者。「犀角大青湯」。凡紅赤爲胃熱。「人參化斑湯」。紫爲胃傷。「犀角地黃湯」。黑爲胃爛。不治。鮮紅起發者。吉。紫色成片者。重。黑色者。凶。青色者。不治。由失表者。求之汗。由失下者。取乎攻。火盛清之。毒盛化之。營氣不足。助其虛。而和之。託之。其輕者。則有疹。細碎如粟。主治不外肺胃二經。宜辛涼或甘寒。淡滲等法。皆溫症中所宜細審。

者。

【春溫】

溫熱與傷寒異。忌汗下浪施。初起頭痛。憎寒發熱。得汗便解。熱傷肺分。上焦氣阻。宜辛涼輕劑。『梔鼓芩翹杏桔花粉鬱金』。嘔吐。『黃芩湯加半夏生姜』。溼熱內搏。熱迫下泄稀水。『枳殼赤苓蘆根滑石苡米』。胸脘痞痛。宜開泄宣滯。『杏薤橘半括萋』。上焦氣熱。鑠津。『涼膈散』。勿用滋膩血藥。熱傷胃津。『石膏竹葉生地麥冬』。熱邪專在氣分。必得戰汗。或大渴索飲。熱達腠開。得汗而解。凡邪在衛汗之到。氣方可清。氣入營則

疏氣透熱。入血則涼血散血。『生地丹皮阿膠赤芍』。至溼邪爲害。面色白者。常顧其陽氣。蓋溼勝則陽微。濕卽化熱。法應清涼。不可過用。恐溼去陽傷也。面色蒼者。常顧其津液。但亦不可過用清涼。若熱減身寒。并不可遽認宜補。恐灰中有火也。凡溫熱病救陰易。通陽難。救陰不在血。而在津。與汗。通陽不在溫。而在利小便。與雜症不同。如三焦不得從外解。則熱結於腑。必舌灰黃。或老黃。乃下之。『小承氣加減』。溼邪內搏。下之宜輕。傷寒以大便溏爲邪盡。溼溫以大便秘爲已盡。至大便秘。慎不

可再攻。以屎燥爲無溼也。舌若苔黃不厚而帶滑者。熱未傷裏。猶可清熱透表。胎薄而乾。津傷也。宜禁苦寒。治以甘寒輕劑。熱傳營分。舌色必絳。但兼黃白色者。氣分之邪未盡。泄衛透營。兩和之。絳鮮澤者。胞絡受病也。『犀角鮮生地連翹鬱金石菖蒲』。絳而粘膩似胎非胎。可作『苦字』。溼熱薰蒸爲痰。閉心胞也。急加芳香逐之。『醒頭草藿香鬱金石菖蒲』。以開其閉。恐昏厥爲瘧也。『牛黃丸外熱陷而裏絡閉。須』。『牛黃丸至寶丹等』。絳而乾燥者。火邪劫營。涼血清火爲妥。絳而有碎

點黃白者。當生疳也。大紅點者。熱毒乘心也。用「黃連金汁」。色絳而不鮮。乾枯而痿者。此腎陰涸急。以「阿膠雞子黃生地天冬等」。救之。緩則不及矣。舌獨中心絳乾者。胃熱而心營受劫也。清胃方中加入清心之品。否則延及舌尖。爲火盛津乾也。尖絳獨乾。此心火上炎。用「導赤散」。利其腑。胎白而薄。外感風寒也。當疏散之。白而乾薄。津液傷也。「麥冬花露蘆根汁」。輕清之品。「白胎絳底者。溼遏熱伏也。當泄溼透熱。防其就乾也。再從裏透外。則變潤矣。舌生芒刺。上焦熱極也。以絹蘸薄荷汁。

揩之。卽退者輕。旋生者重。胎不燥。自覺悶極者。脾溼盛也。胎粘膩吐濁沫者。口必甜味。此爲痺痺。乃溼熱與穀氣相搏。用佩蘭芳香辛散以逐之。則退。胎如碱。胃中宿滯挾穢濁鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從募原達出矣。黑而滑者。水來尅火。爲陰症。宜溫之。若見短縮爲腎氣竭。欲救之。如「人參五味子」。勉希萬一。黑而乾者。津枯火熾。急瀉火補水。舌淡紅無色。或乾而色不榮。胃津傷。氣不化液也。「炙甘草湯」。勿用寒涼。色紫暗。捫之溼。乃熱傳營血。或素有瘀傷宿血在胸膈。爲熱所搏。宜加

散血之品。「琥珀丹參丹皮桃仁之屬」。否則瘀與熱結。阻遏正氣。變爲如狂發狂。舌脹大不能出口。脾溼胃熱鬱極化風。而毒延口也。「用大黃磨汁入應用藥內」。舌脹自消。舌白如粉。滑四邊紫絳者。溫疫病初入募原。未歸胃府。急急透解。莫待傳陷而爲險惡症。婦人病溫有娠者。保胎爲要。古法用「四物湯加減」。護胎法用「伏龍肝調塗臍下三寸。乾卽易之」。熱極用「井底泥或青布浸冷水蓋腹」。產後慎用苦寒。察其邪可從上中解者。從症用之。勿犯下焦。恐血去多。邪內陷也。至經水

適來適斷。熱陷血室。與瘀血結。少腹必滿痛。『小柴胡去參棗加丹皮延胡桃仁歸尾查肉』。挾寒加『桂心』。氣滯加『香附陳皮枳殼』。若譫語如狂血結者。身必重。宜祛瘀通絡。若延久上逆心包。胸痛不可按。是血結胸也。『海蛤散加桃仁』。

【風溫】

溫症感風。寸口脈大。肺受熱鑠。宜辛涼清上。『杏貝梔萸花粉沙參桑葉之屬』。身痛腕痺肺氣不舒。『梔鼓香萸鬱金橘紅之屬』。頭脹欬嗽。懊懣痞滿。『芥蘘梔鼓枳桔桑葉鬱貝母之屬』。熱灼劫陰。煩躁。『麥冬

白芍蔗漿生地阿膠之屬』。餘參春溫治法。

【溼溫】

傷暑挾溼。鬱蒸爲熱。脈寸濡而弱。尺小而急。身痛頭重。妄言自汗。兩脛逆冷。乃溼遏陽氣也。忌發汗。汗之名重。喝必死。『蒼朮白虎湯』。胸滿。『香薷飲加半夏蒼朮』。頭脹耳聾。邪與氣混也。『正氣散去腹皮白朮薑棗加連翹銀花牛蒡』。小便不利。大便反快。『五苓散合白虎湯或天水散』。

【冬溫】

冬氣溫暖感而即發。身熱頭痛。不惡寒面腫欬嗽咽痛。下利。

陽旦湯加減。忌風藥升舉。初感頭痛身熱。『葱鼓湯』。咽痛。『甘桔湯』。風寒外襲。葱鼓湯加羌活蘇葉。餘參春溫治法。

【溫毒】

病溫更遇時毒。面赤斑如錦紋。咽痛煩躁。『黃連解毒湯』。自汗而渴。胃熱發斑者。『人參化斑湯』。斑透熱不退者。『犀角大青湯』。去黃芩升麻。加生地人參柴胡。一誤用熱藥。邪毒深陷。發爲狂亂。面赤眼紅。舌黑鼻煤。下利脈洪數者。『消斑青黛飲』。忌下藥。惟便秘躁渴可微下之。『大柴胡湯』。凡斑疹初見胸背兩脅點大者爲斑。點小者爲

疹。斑。屬。血。多。疹。屬。氣。多。或。陽。症。誤。用。熱。藥。或。當。下。不。下。及。下。後。不。解。皆。能。致。之。萬。不。可。發。汗。重。

令。開。泄。更。增。斑。爛。斑。紫。點。小。心。胞。熱。也。點。大。而。紫。胃。中。熱。也。斑。

黑。而。光。亮。熱。毒。盛。也。黑。而。晦。者。死。黑。而。暈。脚。紅。者。邪。火。內。伏。用。

清。涼。發。散。間。有。轉。紅。可。救。者。凡。斑。疹。皆。邪。氣。外。透。發。出。宜。神。情。

清。爽。為。外。解。裏。和。如。斑。疹。出。而。昏。者。正。不。勝。邪。或。胃。津。內。涸。白。

泡。如。水。晶。者。溼。鬱。邪。於。衛。分。汗。不。澈。故。也。當。理。氣。分。之。邪。若。毒。

瘳。者。『。消。毒。犀。角。飲。大。青。四。物。湯。』

葱。豉。湯。〔。涼。解。〕

葱。白。豆。豉。

諸。方。如。下。

溫病諸方簡註

小琴按傷寒除傷寒論一百

十三方外金匱中所載者亦

復不少茲不具錄溫病之方

尤為繁多晉唐以逮有清諸

名家所訂定者錄不勝錄即

以喻西昌葉香巖吳又可諸

氏而後吳鞠通王孟英雷少

逸輩新添諸劑亦卓然可師

具錄以實篇幅微特違本編

初旨抑且有美不勝收之憾

也茲姑錄林義桐先生所選

黃芩湯〔微熱〕已見傷寒方中

所以重錄者冀免閱者麻煩耳

下做此

黃芩 白芍 甘草 大棗

涼膈散〔瀉火〕

連翹 大黃〔酒浸〕 芒硝

甘草 梔子 黃芩 薄荷

竹葉 生蜜

葛根 黃芩 黃連湯〔熱利〕

葛根 黃連 黃芩 甘草

甘桔湯〔咽痛〕

甘草 桔梗

黃連 阿膠湯〔除煩〕

黃連 黃芩 阿膠 雞黃子

玉女煎〔生液〕

生石膏 熟地 麥冬 知母

牛膝。

牛黃清心丸(清心)

黃連。黃芩。山梔。鬱金。

辰砂。西牛黃。此萬氏牛黃

清心丸與醫宗方別出。

至寶丹(宣竅)

犀角。硃砂。雄黃。玳瑁。各

一兩。琥珀。麝香。龍腦香。

各一錢。金銀箔十五片。牛

黃半兩。安息香一兩。將安

息香熬膏和諸藥末。分作百丸

蠟護。

溫膽湯(痰熱)

半夏。陳皮。茯苓。甘草名

二陳湯。再加。竹茹。枳實

合六味名溫膽湯。

承氣湯(攻裏)

大黃。枳實。芒硝。厚朴。

(名大承氣除去芒硝。名小承

氣)

瀉心湯(消痞)湯名五下列係

半夏瀉心湯。去熱。痞。

半夏。黃連。黃芩。人參。

甘草。乾薑。大棗。

小陷胸湯(散結)

黃連。半夏。括蕒。

葶蕈湯(風溫)

葛根。白芷。麻黃。羌活。

杏仁。甘草。葶蕈。川芎。

石膏。木香。

蒼朮。白虎湯(濕溫)

石膏。知母。甘草。粳米。(

本名白虎湯再加)蒼朮。或人

參(即名本湯)

陽旦湯(冬溫)

麻黃。桂枝。杏仁。甘草。(

本名桂枝湯加)黃芩(即名

本湯)

升麻葛根湯(發斑)

升麻。葛根。白芍。甘草。

紫草茸

黃連解毒湯(斑毒)

黃連。黃芩。黃柏。山梔。

毒盛加大青

犀。大青湯(透斑)

大青。犀角。梔子。香豉。

人參化斑湯(胃熱)

即白虎湯加人參

犀角地黃湯(胃傷)小琴按熱傷胃津也。

犀角 地黃 赤芍 丹皮

導赤散(利府)小琴按火腑也。

生地 木通 甘草梢 竹葉

炙甘草湯(滋液)又名復脈湯

甘草(炙) 生薑 人參 生

地 桂枝 麥門冬 阿膠

麻仁 大棗 水酒各半煎

四物湯(保胎)

當歸 川芎 熟地 白芍

小琴按熟地應改生地芍炒

小柴胡湯(熱陷)

柴胡 半夏 人參 甘草

黃芩 生薑 大棗

海蛤散(結胸)

滑石 甘草 芒硝 海蛤
每服二錢雞子湯調下

香薷飲(溼溫)

香薷 厚朴 扁豆 川連

除穢瀉名黃連香薷飲除黃連

名三物香薷飲加荅草名五物

香薷飲

正氣散(溼溫)

藿香 紫蘇 腹皮 白芷

茯苓 白朮 陳皮 半夏

厚朴 桔梗 甘草各一兩加

生薑大棗每服五錢

五苓散(利溼)

豬苓 茯苓 澤瀉 白朮

桂枝

天水散(瀉溼)即六一散

滑石 甘草 燈芯湯調下
加辰砂名益元散加薄荷名雞蘇

散加青黛名碧玉散

消斑青黛飲(溫毒)

人參 石膏 知母 甘草

青黛 黃連 犀角 元參

山梔 生地 柴胡 苦酒煎

大柴胡湯(便秘)

柴胡 半夏 黃芩 白芍

枳實 大黃 生薑 大棗

消毒犀角飲(毒壅)

犀角 炒牛蒡子 (研)荆芥

穗 防風 甘草 咽痛加桔

梗薄荷

大青四物湯(斑毒)

大青 錢半 阿膠 甘草各一錢

豆豉百粒。

小琴按上錄諸方。係林義桐
溫病劑中所採用者。小琴編
溫病一門。彙參諸集。上自仲
聖。下逮羣賢。其釋病之詳密。
遊藥之精要。已纖悉備具。一
絲不漏。無復後人有置喙地。
自喻氏葉氏。顯別傷寒傷溫。
一爲外受。一爲內發。一起於
足太陽。一起於手太陰。一由
腑傳經。一由經傳腑。皆燦若
列星。畢分眉目。厥後吳鞠通
王孟英輩。以述爲作。揭治溫
之旗幟。爲後世法。林義桐雷
少逸諸君。又苦心孤詣。本歷
年之經驗。具宏深之學識。各

有名著。於是太陰內發之病。
不致與太陽外受之症混淆。
而治。吳鞠通謂晉元以後。治
溫治寒。太陽太陰。嚴劃界限。
明定治法者。惟葉香巖氏。獨
具隻眼。甚謂賢如西昌。或有
以治溫之法。而治寒者。噫。吳
氏之說。雖未免過甚。其辭要
亦不爲無見。夫以西昌之學
識。後人猶有議其短長者。而
餘子更不足道。不才如僕。質
然搦管。欲綜古昔聖賢之書。
斷章取義。割裂方案。以灌輸
鄉僻民衆。詳之則爲篇幅所
不容。略之則取什里百。殊爲
憾事。故傷寒儘拾先賢唾餘。

敘其概要。殿以歷年治驗方
案。溫病亦取是法。雖塵埃野
馬。貽笑高賢。而木屑竹頭。或
裨小用。願世之君子。有心醫
事者。列聖列賢之著作。浩若
江海。可資考鏡。此則爲鄉僻
常識。計不妨淺簡也。

春溫治驗

【春溫始感】

陰兩連綿。春寒料峭。偶患頭痛
身熱。目瑩鼻塞。時或思噓。咳嗽
痰毛。跖痠骨楚。夜寐愴恍。其
脈必弦數寸大。舌白乃風寒束
表。衛氣阻闕也。宜桑菊飲。
苦光杏三錢（勿打）連翹壳三

薄荷尖一錢。冬桑葉錢半。滌
甘菊錢半（後下）玉桔梗錢半。
生甘草五分。鮮蘆根一尺。
如熱重加炒研牛蒡子三錢。頭
痛甚加荆芥穗錢半。有宿食加
焦建曲二錢。

又小琴自製方

帶葉蘇梗五分。竹瀝半夏三錢。
丹皮一錢。煨防風一錢。苦光杏
泥三錢。象貝二錢（後下）荆芥
穗一錢（後下）淨銀花三錢。
焦梔衣五分。焦六麩錢半。霜桑
葉錢半。竹葉捲芯錢半。
水兩碗。煎一碗服。二浦再煎服。
【方解】按蘇梗辛溫發表。杏仁
開肺。瀝夏象貝豁痰利肺。丹皮

清血分之熱。荆防祛風。銀花梔
衣透絡退熱。桑爲箕星之精。使
風不內擾。六麩消積食。竹葉通
火腑。所謂相體裁衣。初不必過
事重劑也。

【春溫化熱】

驟感風寒。延日不治。遂致化熱。
目赤而頰唇紅。舌絳引飲。竟體
痠楚。神昏譫語。夜寐多夢。此熱
欲化火。凌衝心包也。蓋溫邪首
先犯肺。不能汗解。必逆傳心包。
由肺主衛而心主營。過衛入營。
譬之高屋建瓴。必然之勢。宜銀
翹散不應投。加減銀翹散。否則
參以涼膈散去大黃芒硝。以春
禁瀉也。

銀翹散

連翹三錢。薄荷錢二分（後下）
荆芥穗錢半。淨銀花三錢。玉桔
梗錢半。竹葉卷芯錢半。淡豆豉三
錢。炒牛蒡三錢。生甘草五分。小
琴再加鮮蘆根選肥一支。去節
劈。

加減銀翹散

連翹三錢。淨銀花三錢。元參三
錢。麥冬三錢。犀角屑四分。竹葉
卷錢半。

小琴自製方

炒牛蒡子三錢。連翹壳三錢。新
竹茹三錢。生梨肉一兩。薄荷尖
一錢（後下）淨銀花三錢。淡黃
芩八分。煨防風一錢。二分。苦光

杏四錢（勿打）丹皮六錢。鮮蘆根一支。選肥大者。去節劈碎。先煎。

水三碗。先煎蘆根至兩碗。下諸藥。依次煎至一碗。服。二浦再煎。服後大汗。切宜避風。病當解。【方解】按牛蒡薄荷。解表發汗。銀翹泄熱清絡。助以竹茹而絡氣通順。黃芩涼入細竅。去營分之熱。梨肉滋營。防風祛風。杏仁利肺。丹皮涼血。更加以蘆根者。取其辛涼透發。潤燥生津。蓋慮牛蒡薄荷之表泄太過。耗陰損陽。以爲之制也。

【絡熱未清】

溫病罷後。絡熱未清。主以清絡。

飲。

清絡飲原方

鮮荷葉邊（乾可代）鮮銀花

（乾可代）西瓜翠（鮮者尤佳）扁豆花（鮮者尤佳）絲

瓜皮（鮮者尤佳）竹葉芯（鮮者尤佳）或加甘草桔梗甜

杏仁剖麥冬

小琴自製方

竹茹二錢焦梔皮錢半丹皮一

錢生梨皮四錢蟬衣錢半淨銀

花三錢新會白錢半絲瓜絡二

錢如咳嗽加勿打苦光杏三錢竹

瀝夏三錢頭暈加滁甘菊錢半

荆芥穗一錢胃呆加炒穀芽三

錢不寐加夜交藤抱茯神各三

錢熱汗出洒淅畏冷加黑櫓

豆皮淮小麥各二錢

【婦人熱入血室】如婦人患前證亦同一治法。惟病中適近經至。照前方須重用丹皮。或絳通益母草等類。恐其服藥後。經不驟止也。萬一經來四五日。方始欲淨。而寒熱陡作。衝宮正虛。邪熱下陷。其證必神昏譫語。如見鬼狀。頭員員然。目時欲閉。甚至腹痛。少腹脹重。寒熱忽有忽無。此爲熱入血室。勿遽用柴胡。宜後法。

小琴自製方

淡豆豉三錢連翹壳三錢丹皮

錢半。霜桑葉錢半。蘇梗葉錢半。淨銀花三錢。桃仁泥二錢。荆芥穗一錢。

水二碗。煎一碗服。二浦再煎服。

【方解】按淡鼓表泄。蘇葉辛散。

銀翹排熱清絡。桃仁丹皮祛瘀。

血清衝熱。桑葉定內風。荆芥清。

頭目。倘服此得汗。切宜避風。

小柴胡湯亦可加減採用。原方錄下。

柴胡半。夏人參。甘草。黃芩。鮮薑。

大棗。

小琴按本方。當去人參。薑棗。

加丹皮等清血熱諸品。

【婦人衝熱未淨】

婦人汛期中。感春溫病。服藥後。

寒熱解。頭猶岑岑。作暈。腰足痠楚。夜寐輾轉不寧。恹恍多夢。大少腹似痛非痛。脹滿重滯。泛泛欲嘔。此熱入血室也。表邪退舍。而血室之熱未清耳。宜後方。

小琴自製方

鼈血拌柴胡七分。滁甘菊錢半。

夜交藤三錢。廣藿梗三錢。丹皮。

錢半。霜桑葉錢半。竹茹二錢。川。

朴花一錢。小木通八分。玄胡索。

二錢。

水二碗。煎一碗服。二浦不用。如。

病未除。次日再服一劑。

【方解】按柴胡表泄。制以鼈血。

性不輕揚。又鼈血屬陰。爲柴胡引經。以提陷衝之邪。桑菊平木。

去風。交藤交合心腎。竹茹清營熱。止噦。嘔。藿梗瀉土中之木。朴花泄滿。木通開火腑。玄胡利結氣。蓋邪熱陷衝。衝脈隸肝。其木火必旺。侵佔脾土。故立方必須顧及之。

【衝間餘熱】

服前方一二劑後。病自己。但須。

忌風。忌啖腥膩。並勞力。房室等。

事。此時卽不再服藥。必無何種。

變症。卽或尙有不寐。洒淅畏風。

腹中脹悶。或少腹重滯。此表後。

衛虛。心陽不能俯就。腎陰及衝。

間餘熱。未能清肅所致。主以後。

法。小琴自製方。

鼈血柴胡五分。抱茯神二錢。姜竹茹二錢。澤蘭錢半。丹皮一錢。夜交藤三錢。薄橘紅八分。佛手花一錢。砂仁四分。金鈴子皮錢半。

水三碗。煎一碗服。二浦再煎服。【方解】按柴丹去衝間之餘邪。清血分之瘀熱。茯神交藤。交合心腎。姜竹茹溫衛氣。橘紅辛溫芳香。亦走衛分。澤蘭佛手。理腹中滯氣。助以砂仁。益暢行無阻。金鈴皮散少腹氣結。通利小便。

【壯熱瀉利】

如溫邪入營。目赤舌絳。口乾引飲。頭暈骨楚。膚熱灼手。泄瀉頻作。診脈細澀者。其症甚危。蓋陽

症見陰脈是也。設在暑期。猶屬濕滯。爲梗而在春季。木火正旺之時。亦有是症。必誤於醫者之投以涼藥。太過以致寒積於中。逼陽在外也。投以泄熱。則恐助

寒。投以溫中。又慮鑠液。余每近此症。於分利小便中。恭以斂陽熄風等法。多有效者。或投古法葛根芩連湯。

葛根二錢。黃芩酒炒錢半。小川連八分。生甘草六分。

倘服後不解。內風歛動。手足牽引。時欲作冒者。陰虛於下。風擾於上也。當採黃連阿膠湯。

黃連阿膠湯

黃芩酒炒錢半。黃連一錢。清阿

膠三錢。雞子黃一枚。水二碗。先煎諸藥。取一碗。俟藥溫。入雞子黃與藥汁和融。不令雞蛋熟爲佳。

小琴目製方

熟牡蠣三錢。川草薢三錢。炒白芍二錢。炒半夏三錢。銀花炭三錢。竹葉苾錢半。黑梔衣錢半。小川連八分。粉葛根錢半。南花粉四錢。

水二碗。煎一碗服。二浦再煎服。【方解】按牡蠣斷下。又能熄風。白芍味酸。能斂浮陽。草薢分清小便。竹葉宣通火腑。銀花用炭者。取其芳香透絡。而不涼潤。梔衣用黑者。減其苦性。以清衛熱。

半夏川連能燥脾堅陰。葛根花粉生津止渴無礙裏寒。總之祛邪熱而無損浮陽。散裏寒而不助虛熱。取是法而已。

【溫熱瀉利證治】

如溫邪入營。概同前症。更加譫語而神思恍惚者。八九難治。蓋其真陰已耗。損殆盡。陽無所戀。而浮越於外。與邪熱合德。若滋陰以戀陽。而斷下無法。泄熱以祛邪。而陽脫可虞。余每遵此症。必謝不敏。聊議後方。以備一格。未敢自信。爲必當也。

葛根。連湯加味。

湯見前。再加犀角竹葉。心。

小琴自製方

研沖紫雪丹三分。粉葛根錢半。生白芍二錢。竹葉。心錢半。漂龜版四錢。小川連八分。玉桔梗一錢。青鹹半。夏三錢。元金石斛三錢。先煎。熟牡蠣三錢。

水二碗。半先煎石斛至二碗。入諸藥煎至一淺碗服。二浦不作服。

【方解】按紫雪芳香以開竅。涼鎮以安宮。龜版潛陽。葛根引津上行。川連固下。焦之脫。白芍收耗散之陰。桔梗開肺。痺竹葉通支河。半夏宣陰陽之隔。青鹹滋腎陰之燥。石斛生津。牡蠣斷下。譬如積勞傷陽。衛疎溫邪上受。

【身熱下利】

內入乎肺。肺主周身之氣。氣窒不化。外寒似戰。栗其溫邪內鬱。必從熱化。令人氣短胸滿。病邪在上。大便瀉出稀水。肺與大腸表裏相應。亦由熱追下泄耳。用

辛涼輕劑爲穩。

苦光杏仁。香豆豉。炒枳殼。連翹殼。

玉桔梗。薄荷。橘紅。薄荷尖。雲茯苓。

此方宜輕煎。祇服一浦。最好先煎雲苓數沸。再入他藥。

按此方採葉案列入。以供閱者與上列二症參攷。

者與上列二症參攷。

【熱入營分】

如溫邪入營。目赤舌絳。兩旁灰厚。口乾引飲。頭疼骨楚。膚熱灼

手。診脈洪數。有刀者。此溫邪化

手。診脈洪數。有刀者。此溫邪化

熱陽症見陽脈也。症勢非重宜銀翹散。方見前。

小琴自製方

生牛蒡二錢。連翹三錢。淡黃芩八分。霜桑葉錢半。薄荷尖一錢二分。淨銀花三錢。生知母錢半。竹茹二錢。原麥冬三錢。鮮蘆根。劈洗去節。先煎壹兩。荆芥穗一錢（後下）或不用亦可。

水三碗。先煎蘆根至二碗。入諸藥煎至一碗。再下薄荷荆芥數沸。服二浦服否聽便。

按此症與第二方症相類。不過久暫之間耳。第二方亦可通服。方解從略。

【熱入營分謔語】

溫邪入營。頭暈足痠。膚熱引飲。謔語連連。神思恍惚。此邪逼心包。熱留營分之重候也。但須察其大解。如三四日未下。小解赤。診脈洪數有力。舌黃燥者。下方主之。

涼膈散去蜜加石菖蒲方。

連翹。薄荷。生錦汶（酒浸）。芒硝。

甘草。梔子。黃芩。竹葉。鮮石菖蒲。

小琴自製方

研冲紫雪丹三分。連翹三錢。原麥冬三錢。霜桑葉錢半。鮮生地三錢。淨銀花三錢。玄參三錢。丹皮五分。薄荷尖一錢二分（後下）。竹葉捲芯錢半。或再加鮮

蘆根。

水二碗。煎一碗。入薄荷數沸。冲紫雪丹服。二浦服否聽便。

【方解】紫雪芳香涼沁。能解營熱而清心神。冬地涼潤。玄參滋腎。銀翹泄熱透絡。桑葉定風。丹皮涼血。薄荷涼透。竹葉通火腑。俾表熱外泄。內熱裏解也。

【身熱水泄不止】

溫邪上受。由衛傳營。唇黑舌苔黃燥。中光絳。身熱嚙語。頭重足痠。大便涓涓旁流。此峻表過汗。熱追下泄之徵。主以後方。

清營湯

犀角屑（另煎逗入）。鮮生地（炒）。元參丹皮（炒）。黃連麥冬。

(炒)銀花。(炒)連翹。竹葉。苳鮮石菖蒲。

小琴按癸亥仲春。有閩北孫姓者。患此候由亡兒振麟擬方。今錄其方案。並解實之編中。雪泥鴻爪。殊碎我心。

「脈浮而弦數。重取豁然。獨右關後數實。按弦數而浮。陽外越而與溫邪合德也。重取豁然。內氣已虛。真元殆絕之象。右關後主陽明大腸。既數而實。邪熱煎逼。宿糞結滯。金受火刑。氣化失司。所飲茶水。不卞循膀胱。直注陽明。順流而出。未能與宿糞台化也。嚙語熱逼宮城。心神替亂所致。投苦寒以退熱。則孤陽無

留戀之地。用甘潤以滋陰。則陽明有洞泄之虞。症勢殊爲棘手。但溫病無不由汗而解。今大汗如此。而熱勢不殺。何也。蓋由藥力太峻。汗爲心液。藉藥性而驟溢肌表。而營中之邪。依然不動。因汗之太驟。過於病所也。故汗雖出而病不出。此立方之所以貴相體裁衣。不可以鹵莽滅裂爲也。茲議後方。並殿方解。」

先煎元金石斛五錢。炒銀花三錢。小青葉錢半。鮮石菖蒲錢半。新創竹茹三錢。焦梔衣錢半。乾西瓜翠三錢。勿打苦光杏三錢。霜桑葉錢半。赤小豆四錢。水三碗。先煎石斛至兩碗。再入諸藥。煎至一碗。服。二浦再煎服。【方解】麟按。石斛滋真陰。用乾者。取其不潤也。竹茹清營熱。以植物之絡。通人身之絡。銀花芳香。梔衣退熱。俱用炒者。一則減其潤性。一則減其苦性耳。小青較大。青力緩。能清肝熱而不潤。西瓜名天生白虎湯。取其翠衣直走皮膚。又無滋潤滑腸之慮。菖蒲辛溫。能開心竅。不妨用鮮杏仁利肺。大凡溫病。首先犯肺。逆傳心包。開其肺腑。不啻通其衛陽。俾邪有外出之路。桑爲箕星之精。陰虛則風必內動。借以定風。較勝他藥爲穩。赤豆能通火腑。且其性酸。能斂肝氣。總按

以上諸藥涼而不潤。疏而不散。但服後內液增滋。尙常有汗。此汗出。則邪隨汗解。初非有一二表藥。羸雜其間也。

【溫病汗後便鞭】鞭硬也。

溫邪由衛入營。表熱悉解。惟脈數。舌黃引飲。目瑩然微赤。大便秘。旬內外不下。按腹左右隱有硬塊者。或重按作痛。間有矢氣臭穢異常。或屢欲如廁。肛重如墜。而絕不見糞者。由表邪雖退。津液大耗。燥糞滯腸。不能遽下耳。舊法蜜煎導。豬胆導。皆嫌笨滯。宜用放瀉袋（西藥房均有出售。白帶筒亦可）吸藥水。注入肛門。腸液滋澤。大解卽下。勿

固執大承氣湯也。

藥水小琴製方

豬膽一個。去外皮。瀝汁。白蜜一

兩。麻油一調羹。

右三味。放一面盆中。用沸水一

二升。沖攪融。待溫度適宜。吸入

放瀉袋內。注肛門中。如日久糞

堅。最好先用鹹湯一杯（比尋

常飲者稍重）先行注入。約半

小時。再以藥水注之。蓋鹹能軟

堅也。萬不可用肥皂。若甘油。橄

欖油。均可。清水加麻油少許。亦

可。

小琴按。增液湯。護胃承氣湯

均可酌用。

增液湯鹹寒苦甘法

元參。麥冬。細生地。（小琴按內熱盛。可加黃芩。梔子。

護胃承氣湯

生大黃。元參。細生地。丹皮。生知

母。麥冬。

【溫熱鼻衄】

溫邪入營。舌黑唇焦。目喜閉。大

解微利。嚙語。迭作鼻衄。膚澈熱

掌心如灼。此熱燔肺胃。絡裂血

逆也。（下方小琴製）

研沖紫雪丹三分。青蒿葉錢半。

連翹三錢。竹茹葉三錢。丹皮錢

半。黑山梔錢半。淨銀花三錢。鮮

生地三錢。鮮蘆根一支。生甘草

五分。或再加淡黃芩八分。（酒

炒）

【方解】按紫雪清心丹皮涼血。青蒿梔子祛結熱。連翹銀花清營熱。竹茹入絡。隨竹葉通火腑。生地蘆根增液潤燥。使氣血不內燔。甘草守中禦邪。使客感不內襲。或再加黃芩取其涼入細竅。退熱之速也。

小琴按葛根芩連湯亦可採用。但黃芩或可刪去。加黑山梔。

【溫熱鼻衄便血】

溫邪入營。舌黃燥。無液。唇齒俱黑。大解結。嚙語。先一二日鼻衄。繼大便秘下血。鮮紅濃厚。此熱邪內逼陽明所致。蓋陽明一經固多血也。宜犀角地黃湯加味下。

方小琴製。犀角屑一錢。(加水另煎逗入)。鮮生地三錢。炒黑荆芥穗錢半。生知母錢半。連翹壳三錢。帶心元參三錢。淡芩一錢。(酒炒)生甘草五分。鮮蘆根一尺。竹葉捲芯錢半。水二碗。煎至一碗服。二浦再作服。

【方解】按犀為靈獸。聚精於角。性涼。能透經走絡。肅心營之熱。連翹表泄。生地涼潤。元參帶心者。取心入心之義。芥炭去風止血。子芩涼入細竅。知母滋化原。甘草守中宮。蘆根涼透生津。竹葉利便清熱。余編書至此。適近恆慶里馬。

姓童女患是症。照此方治之。效如應響。但此候非初病。如是皆由粗工恣用牛蒡淡鼓豆卷。表泄太峻。過於病所以致汗出邪留。鬱而化火。鑠傷真液耳。與初病失表者不同。

【熱病解後子宮挾帶下墜】參閱下編婦科

婦人溫邪化熱。經醫者狂表汗出。邪留唇舌及齒均黑。嚙語。膚熱炙手。使服前諸方。病悉解。惟自述沿陰戶焦黑。子袋下懸。白帶滲涔。臭穢。臨溺刺痛。平常亦懷懷作痛。乃屬腎水乾涸。邪熱乘虛下陷。偃子宮墜。精門不闔。使然。雖宜藥餌內清。但亦須外。

治。檢閱古方。絕妙藍本。余以後方治之。(下方小琴製)

小琴按此條余因當時治先施公司職員戎姓之婦。婦病小愈。自述其證如是。故列入。亦差算治驗方也。

另煎。逗入犀角屑六分。連翹三錢。焦山梔錢半。竹葉苾錢半。鮮生地三錢。淨銀花三錢。丹皮錢半。生知母二錢。

水三碗。煎至一碗。另煎犀角屑汁。逗入服。二浦不要。

【方解】犀角地黃清血分之熱。銀翹泄熱敗毒。焦梔瀉三焦之火。丹皮涼血。竹葉利火腑。知母滋化原。

小琴按邪熱直入腎臟。子宮突出腐爛。白淫涿涿。臭穢異常。刺痛且熱。刻不可耐。宜用蚌蛤肉不落水者一枚。繫以線塞入陰戶內。露線頭於外。逾時一換。日五六次。俾熱毒由蚌肉收吸。一二日後。熱必減輕。痛亦較差。外用珠母粉。稍加冰片。糝之。珠母即大河蚌之殼。俗呼雞官。磨去外層黑衣。生研極細。糝患處。如生者。難研以火煨之。覆地上一夜。出火氣。亦可惟力較遜耳。或燥糝。或用真麻油調塗。皆效。(河蚌小菜場有買宜活剖)

再如急切不能得珠母粉。向藥肆購黛蛤散。稍加冰片。亦可代之。但總不逮珠母之靈效也。

【溫熱紅斑痧】

小琴按此以下數條。當參看溫毒門。

春日頭痛骨楚。目瑩咳嗽。或瀉或不瀉。面部胸部。陡見紅疹者。世俗皆誤認爲瘡子。實係紅痧。即西醫所謂猩紅熱也。由風陽激衛。血熱外排所致。但亦屬肺經。若投以西河柳。棉紗湯等。陽氣驟發。必起變端。其在孩提。立見敗象。治宜辛涼解肌。芳香透絡。若疹出不澈。加春筍。去壳切片三枚。荔子壳三枚。最好如

在春初冬末用冬筍尾大冬菇最效。蓋冬筍與冬菇皆於氣候潛藏之時而自能生發者也。

升麻葛根湯

升麻葛根白芍甘草紫草茸。

小琴按如斑色紫肌熱口鼻氣炎宜後方。

黃連解毒湯

黃連黃芩黃柏山梔。

小琴按如斑出不透宜後方。

犀角大青湯

香豆豉大青葉犀角屑焦山梔。

小琴按如胃熱甚宜後方。

人參化斑湯

即白虎湯加人參。

小琴按熱傷胃津宜後方。

犀角地黃湯
犀角生地赤芍丹皮。

小琴按初起此症後方亦屢

徵效驗（下方小琴製）

薄荷尖煨葛根荊芥穗連翹蘆

根尖煨防風玉桔梗淨銀花

如咳嗽加勿打苦光杏以利肺

氣瀉加竹葉芯以開支河。

【溫熱痘毒】

春日日皆瑩然膚熱二三日咳

嗽或不咳面部胸前陡見紅顆

色微紫氣血旺者潤而飽突弱

者白而平塌此名風痘因疹鬱

不發稽於肌肉一旦為風陽所

搏挾血熱而出衛其風毒尤甚

於疹蓋由太陰而逆傳陽明也。

但雖太陰陽明風熱蘊結之候

亦挾有穢濁使然若痘頂黑陷

膚熱泄瀉目瞤眩無光診脈浮

濡者十無一活然間亦有生者

吉林人參五分生嫩苳苳五分

老蘇梗三錢廣橘白一錢酒炒

歸身二錢酒炒細生地四錢竹

葉芯錢半建曲炭一錢春筍尖

去壳切片約寸餘長者三枚荔

子壳三枚。

【風疹嚙語】

溫邪搏激營衛紅疹星羅不徹

微咳或不咳膚熱嚙語大便微

利者宜辛涼芳香法（下方小

琴製）

炒牛蒡錢半連翹壳三錢大青

葉錢半。香豆豉一錢。後下薄荷尖八分。淨銀花三錢。霜桑葉錢半。丹皮錢半。如咳嗽加苦光杏三錢。利甚加小大通一錢。水二碗。煎一碗。後入薄荷服。二浦再輕煎服。

【方解】按牛蒡薄荷。辛涼表泄。連翹排熱。銀花香潤。大青清肝。而殺毒。桑葉潤肺而定風。香豉開上焦。丹皮涼血分。

【溫熱紅白瘡】

溫邪搏激營衛。紅疹白瘡雜見。或咳或不咳。或祇見白瘡者。膚熱甚。嚔語。並泄瀉日數行。此氣虛而兼寒也。若白紅雜見。可消息前方以爲治。僅有白瘡而兼

瀉。須主以下方。勿視爲輕症也。嫩蘇梗錢半。丹皮錢半。炒銀花三錢。清炙甘草六分。陽春砂五分。連翹壳三錢。建曲炭錢半。竹葉苡錢半。

水兩碗。煎一碗。服。二浦再煎服。【方解】按蘇梗順氣而開表。砂仁醒脾而快膈。丹皮清血分之熱。銀翹透絡。隨之邪。建曲燥脾。甘草助氣。竹葉開火腑。俾中滯者疏之外。熱者泄之。並扶氣燥脾。以助瘡之透發。實切要之驗方也。

【熱除利止瘡透】

服前藥熱除瀉止。白瘡稍澈。沉沉好寐。不渴不飢。診脈細濡。無

力。舌無苔者。此氣血並虛也。余每遇此症。主以後方。皆大效。

清營湯去犀角黃。連加大青白薇方。

細生地。大青葉。東白薇。元參。丹參。麥冬。淨銀花。連翹。竹葉苡。

【春日咳嗽】

小琴按咳嗽。編中另立一門。惟春日風傷肺衛。膈氣不宜。發爲咳嗽。往往而然。故列入數則。以便閱者檢查也。

春日咳嗽。別無他恙者。此風邪外束。熱聚於肺也。

沖苦光杏泥三錢。竹瀝半夏三錢。霜桑葉錢半。玉桔更一錢。象貝三錢。橘絡一錢。白前錢半。嫩

蘇梗錢半。

此藥宜輕煎。俟香氣出。卽瀝渣。俟溫服。二浦再服。

【方解】按杏仁開肺潤燥。象貝去時感風痰。竹瀝夏滑痰順氣。橘絡通肺絡。桑葉去風白。前下氣。桔梗載藥上浮。蘇梗疏衛絡。去表邪。皆上焦輕清之藥。而不犯中下。故治咳如神也。

【尋常咳嗽之忠告】參閱

後編咳嗽門

脈不細數。咳嗽連聲。乃屬風傷肺分。非勞怯弱症。最宜止咳散。倘有好善君子。製此藥。製送。多獲捷效。此方小琴採自毛世洪氏。便易經驗。方頗有至理。蓋肺

屬金畏火。金受火刑。則咳以起。且金性剛燥。惡寒。故遇寒亦咳。肺爲嬌藏。攻擊之劑。既所勿任。而外主皮毛。最易受邪。不行表散。則邪氣留連不解。經云。微寒微咳。寒之感也。若小竅然啓門。逐之卽愈矣。今醫者不審。妄用清涼酸澀之劑。未免閉門留寇。寇欲出無門。必致穿竅而走。咳傷肺絡。以致咯血。必然之勢。此方溫潤和平。不寒不熱。散客邪。甯肺氣。至穩極妥。幸勿以輕微目之。

桔梗炒荆芥穗。白部。飯上蒸一次再炒。以上各四兩。甘草紫苑。飯上蒸一次再炒。白前兩。右共妍細末。每服三錢。臨睡時開水調下。如初感風寒者。生薑一片泡湯下。

小琴按初感風寒。可勿用薑湯。加蘇梗葉一錢泡湯送服。爲妥。再按此藥宜作爲散。用開水泡服。勿啖其渣。蓋肺氣宜輕宣。藥渣入口。而清輕上浮之品。直走肺經。慮渣滓黏滯肺絡。反或不美。如防川貝粉之阻。肺絡旋覆毛之黏。肺管相

同。【春溫呃忒】此亦另立一

門

春温罷後。過服涼藥。呃忒連。甚至兩脇。腹筋掣痛。投丁香柿蒂湯不效。宜主以後方。若夏日濕停胃中。而作呃者。列呃逆門內。此方統治病後呃忒。頗徵效果。

包旋覆花三錢。姜竹茹二錢。炒陳皮錢半。磨沖廣木香汁五分。代赭石三錢。姜半夏三錢。廣藿梗三錢。乾荷梗尺許。

水二碗煎一碗服。二浦知停服。【方解】旋覆通肺氣。代赭鎮肝逆。姜茹止嘔。姜夏醒脾。陳皮藿梗。開鬱通中。木香温脾。疏滯磨沖者。取其力峻也。荷梗首尾通。

醫藥顧問

卷二 風温門

貫用乾者。慮鮮之一時無覓處也。

【風温治驗】

小琴按經云。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。蓋謂萬事須領悟其要旨。否則千端萬緒。總難捉摸也。風温者。由病温之人。復感風寒。故名風温。治忌温散。劫津誤汗。則熱盛致危。〔詳上概要〕傷寒論曰。發汗已。身灼熱者。曰風温。其誤用辛熱發汗可知。蓋肺胃爲温邪必犯之地。風温爲燥熱之邪。燥則傷陰。熱則傷津。故泄熱和陰。爲風温一定之治法也。

葉香巖曰。風温者。其人素傷於風。又傷於熱。風熱相搏。故也。其症四肢不收。頭痛身熱。常自汗出。治在少陰厥陰。

下錄葉氏案

風温症身熱口渴。自汗咳嗽。煩悶。脈數舌苔微黃者。熱在肺胃也。當以下方涼泄裏熱。川貝。桑白皮。廣陳皮。牛蒡子。連翹。竹葉苳等。風温症身熱咳嗽口渴。下痢苦黃。讞語胸痞。脈數。此温邪由肺胃下注大腸。當以後方升泄温邪。黃芩。煨葛根。甘草。桔梗。大豆卷。廣皮等等。

八一

風溫熱久不愈。咳嗽唇腫。口渴胸悶。不知肌身發白疹。如寒粟狀。自汗脈數者。此風邪挾太陰脾濕發為風疹。當以後方涼解之。

牛蒡子。防風。廣皮。荊芥。

穗。連翹。甘草等等。

風溫身熱咳嗽。口渴胸痞。頭目

脹。大面發泡瘡者。風毒上壅。陽

絡。當以後方清熱散邪。

荊芥穗。連翹壳。牛蒡子。

馬勃。薄荷尖。元參。青黛。

銀花等等。

風溫身大熱。口大渴。目赤唇腫。

氣粗煩躁。舌絳齒板。痰咳。甚至

神昏讞語。下利黃水者。風溫熱

毒深入陽明營分。最為危候。當以後方解毒提斑。間有生者。犀角。葛根。赤芍。麥冬。連翹。元參。丹皮。紫草。川貝。人中黃等等。

風溫毒邪始得之。便身熱口渴。

目赤咽痛。臥起不安。手足厥冷。

泄瀉脈伏者。熱毒內壅。絡氣阻

遏。當用後方升散熱毒。

升麻。犀角。甘草。黃芩。

銀花。豆卷等等。

風溫身熱自汗。面赤神迷。身重

難轉側。鼻鼾多眠。睡語難出。脈

數者。溫邪內偪。陽明津液劫奪。

神機不運。當用後方泄熱救津。

生石膏。麥冬。竹葉芯。生

知母。半夏。生甘草等等。

風溫身熱痰咳。口渴神迷。手足

痲癢。狀若驚癩。脈弦數者。此熱

劫津液。金囚木旺。當用後方以

息風清熱。

羚羊角。連翹。麥冬。鈎藤。

青蒿。川貝。生知母等等。

風溫熱渴煩悶。昏瞶。不知人不

語。如尸厥脈數者。此熱邪內蘊。

走竄。心包絡。當用後方泄熱通

絡。

犀角。梔子。鮮石菖蒲。川

貝。連翹。遠志。麥冬。牛黃。

至寶丹等等。

濕溫治驗

小琴按葉香巖氏曰。濕溫症先惡寒後但熱不寒。汗出胸痞。舌苔白或黃。口渴不引飲。此濕溫症之提綱也。蓋陽不衛外則汗出。濕擾清陽則胸痞。濕霧上騰則苔白與熱相蒸則苔黃。熱極則液不升而口渴。濕盛則飲內留而仍不引飲云云。

下錄葉氏案

濕溫惡寒無汗。身重頭痛。胸痞腰疼。濕在表分。乃陰濕傷表之候也。
羌活。六神曲。廣皮。葛根。蒼朮。枳殼等等。如頭不痛去羌活。

濕溫汗出。惡寒發熱。身重關節疼。胸痞腰痛。濕在肌表。不可汗解。宜後方。

滑石。茯苓皮。神曲。豆卷。蒼朮皮。廣皮等等。若汗少惡寒加葛根。濕溫症發熱汗出。胸痞不知飢。口渴不喜飲。舌苔滑白者。濕初內伏。蒙閉清陽。宜後方。

白蔻仁。玉桔梗。廣鬱金。石菖蒲。杜藿香。焦枳殼。六一散。佩蘭葉等等。濕溫身熱而赤。胸痞口渴。時或譫語。舌上黃澀。汗出乃濕伏中焦。蘊化爲熱也。
六神曲。連翹。川草薺。大

豆卷。廣皮。飛滑石等等。濕溫身熱口渴。胸悶自利。溺澀。此濕流下焦也。

神曲。滑石。草薺。廣皮。豬苓。茯苓等等。濕熱壯熱口渴。舌苔黃。或焦紅。發瘧神昏。譫語或笑。邪灼心胞。營血已耗。

犀角。連翹。元參。鮮菖蒲。羚羊。生地。鈎藤。至寶丹等等。濕溫發瘧撮空。神昏笑妄。舌苔乾黃起刺。或轉黑色。大便不通。乃熱邪閉結胃腑也。
承氣湯（見溫病方簡註）
（舌黃不起刺者仍不

可投)

濕溫壯熱煩渴。舌焦紅。或縮。癍疹胸痞自利神昏癱厥。濕熱充

斥表裏三焦也。

犀角。生地。連翹。鮮菖蒲。

羚羊。元參。丹皮。紫草。

茸等等

濕溫壯熱口渴自汗。身重胸痞。

脈洪大而長者。此太陰之濕與

陽明之熱相合也。

石膏。知母。甘草等味。

濕溫濕熱傷氣四肢困倦精神

減少。身熱氣尚。心煩溺黃口渴

自汗。脈虛者。東垣用清暑益氣

湯主治。

人參。白朮。蒼朮。青皮。

乾葛。黃耆。甘草。神曲。

升麻。麥冬。五味子。當歸。

黃柏。澤瀉。廣皮。

濕溫寒熱如瘧。舌苔滑白。口不

知味。濕熱阻遏募原也。瘧由

暑溫伏於內。秋涼束於外。若夏

月腠理大開。毛竅疏通。安得成

瘧。寒熱有定期。如瘧之發作

者。乃邪留募原故耳。

厚朴。神曲。蒼朮。草果。

半夏。六一散等等。

濕溫身熱口渴嘔吐清水。或痰

多。此濕熱內留。木火上逆也。

溫膽湯加黃連碧玉散。溫膽

湯見溫病方簡註。

濕溫四五日。大渴胸悶欲絕。乾

嘔不止。脈細數。舌光如鏡。此胃

液被劫。膽火上衝也。

西瓜白汁。鮮生地汁。磨服

鬱金烏藥木香香附等味。

濕溫嘔吐不止。晝夜不差。欲死

者。此肺胃不和。胃熱移肺。肺不

受邪也。

黃連三五分。蘇葉二三分。煎服

其嘔立止。

濕溫咳嗽喘逆。面赤氣粗。晝夜

不寧者。暑邪入於肺絡也。

葶藶子。枇杷葉。六一散等

等。

濕溫胸痞發熱。肌肉煩疼。始終

無汗者。腠理氣機拂鬱。不能達

外也。

六一散一兩。薄荷葉三四十片。泡湯調服即汗解。

濕熱內滯太陰鬱久而為滯下。

其症胸痞腹痛下墜窮迫膿血稠黏裏急後重脈數者宜後

方（此本痢症因與濕熱同源

故列入）

厚朴 神曲 木香 柴胡

黃芩 陳皮 檳榔 葛根

煨 銀花炭 荆芥炭

濕熱痢久傷陽脈虛脫者宜真

人養臟湯

人參 甘草 白芍 肉桂

白朮 當歸 木香 肉果

粟壳 訶子肉

濕熱痢久傷陽虛坐努責者宜

後方。

熟地炭 炒白芍 廣皮 炒

當歸 炙甘草等等

暑濕內襲腹痛吐利胸痞脈緩

者濕濁內阻太陰宜縮脾飲

砂仁 藳豆 葛根 草果

烏梅 甘草等等

暑月飲冷過多寒濕內留水穀

不分上吐下瀉肢冷脈伏者宜

大順散

乾薑 甘草 肉桂 杏仁

或加陳皮茯苓

小琴按本方原註暑月過於

貪涼陰暑外襲者香薷飲陰

暑內侵者大順散此暑濕傷

表傷裏之扼要方也

腹痛下痢胸痞煩躁口渴脈數

大按之豁然空者宜冷香引子

附子 廣皮 草果 甘草冷

服（此屬陽虛外越非熱邪內

擾）

下利咽痛口渴心煩尺脈數疾

者熱邪內耗少陰之陰宜做猪

膚涼潤法

猪膚湯見傷寒方簡註

濕溫症五六日忽大汗出手足

冷脈細如絲或絕口渴莖痛而

起坐自如而神清語亮此因汗

出過多衛外陽亡濕熱內結一

時表裏之氣不相接故肢冷脈

伏非真陽脫也宜五苓去朮加

黃耆皮滑石

五苓散見溫病方簡註。

濕溫症數日後汗出熱不除。或
瘧忽頭痛不止者。營液內耗。厥

陰風木上升也。

羚羊角。鈎藤。生地。蔓荊

子。元參。白芍等等。

濕溫症十餘日後大勢已退。惟

口渴汗出。骨節隱痛不舒。小便

赤澀不利。此餘邪留滯經絡。宜

煎元米泔漬於布絞汁飲之。

濕溫病默默不語神識昏迷。不

知所苦與飲食亦不却。二便自

通。諸藥不效者。此病不在脾胃

而在乎厥陰營分凝滯血絡。塔

塞陽明。非辛香氣藥所能開泄。

醉地鼈蟲。土炒甲片。桃仁泥醋

炙鼈甲柴胡。

冬溫治驗

小琴按編中春溫多錄平日

自製方案。濕溫風溫。則採自

葉氏案。蓋此編原為灌輸無

醫學常識者。故但求有用不

嫌複雜。並規規於書之體例

也。此下冬溫門。則雜採列入。

【冬溫犯肺】

此症醫者用傷寒法發表。致燥

渴熱煩。又進柴葛解肌。咳喘痰

多。竟夜無寐。蓋傷寒傳足經。溫

邪直犯手經。治法本異。況溫邪

忌汗表散。即是劫津液。診脈虛

數。目赤舌絳。溫已化熱。再令液

涸。必延昏瘧。宜甘潤生津。苦辛

降氣。

麥冬。栝蘂。知母。桑皮。

杏仁。山梔。貝母。橘紅。

如熱減。咳定。小溲赤濇。去桑皮。

加沙參。赤苓。木通。百合。

【表熱傳裏】

此症唇燥舌乾。渴飲嘔沫。大便

迫瀉。稀水無度。脈濡緩。乃濕甚

生熱。飲水鮮。蘆根湯。隨用後法。

黃芩。通草。車前子。半夏

麩。栝蘂。赤苓。豬苓。

如嘔渴自利。悉定。去豬苓。夏麩。

加滑石。燈芯。滲利濕熱。

【冬溫挾虛】

此症挾虛。灼熱。欬嗽。因誤治邪。

邪陷營分。便血甚多。陰液內涸。舌黑齒焦。神機不發。脈左虛數。右浮疾。耳聾目瞑。頰紅。遺溺失禁。此陰欲絕而孤陽浮也。急救液以存陰。生地。五味子。沙參。石斛。犀角汁。阿膠。麥冬。雞子黃。

如脈虛去犀角。加洋參。茯神。棗仁。白芍。如服加味藥後。舌潤神清。不饑不食。此上脫熱痰結也。再加川貝。萸霜。

【冬溫初起】

寒水之氣冬氣也。非辛溫春夏之氣。不足以解之。蓋溫自內發。風寒從外。搏成內熱外寒之症。

故採舊用桂枝湯。辛溫解肌。俾得微汗。

桂枝。芍藥。甘草。生薑。大棗。

【冬溫化熱】

脈浮洪。舌黃。渴甚。大汗。面赤。惡熱者。辛涼重劑主之。

白虎湯（見溫病方簡註）

【冬溫汗大出微喘】

此症鼻孔或有扇者。蓋陰虛而陽不固也。宜人參白虎湯。

人參白虎湯（見溫病方簡註）

【冬溫氣血兩燔】

冬溫此症宜玉女煎去牛膝加元參。

生石膏。知母。元參。細生地。麥冬。

【冬溫吐血】

冬溫血從上溢者。犀角地黃湯合銀翹散主之。若見中焦症。參中焦法治之。惟吐粉紅血者。死。血從上溢。脈七八至以上。面反黑者。死。

犀角銀翹方均見前。

小琴按以上數條。聊備大概。至所見諸症。不特冬溫爲然。春溫風熱風溫中。悉皆有之。倘能靜心會悟。理實一貫。總之溫病治法。不宜表散。並上焦之症。不可犯中下。爲第一要義。若白虎症承氣症大陷

胸症等等。與傷寒一樣制裁。故不備錄。爲免繁瑣。亦限於篇幅也。

再按冬溫者。冬感溫氣而成。即時行之氣也。蓋冬令嚴寒。而反溫暖人觸犯之。卽名冬溫。冬溫與傷寒大異。以溫則氣泄。是失其閉藏之令。故古人有用補中益氣兼表藥治之。

溫毒治驗

小琴按溫毒者。冬令嚴寒。觸胃寒邪。待天氣暄熱而發。或傷寒之熱未已。再遇溫熱。變爲溫毒。溫毒爲病之最重也。

治宜寒涼大解其熱。若邪熱日深。毒氣不泄。發爲癰疹。斑爛。視時氣發斑。其病尤重。或升麻葛根湯。或化斑湯治之。升麻葛根湯。化斑湯。(均見溫病方簡註)

再按溫毒由冬令過暖。人感乖戾之氣。至春夏之交。更感溫熱伏毒自內而出。表裏皆熱。又有風溫溫病冬溫。誤用辛溫之劑。以火濟火。亦能成是病也。其脈浮沉俱盛。其證心煩熱渴。咳嗽喉痛。舌絳苔黃。宜用清熱解毒法。加甘草。桔梗治之。然有因溫毒而發。癍發疹發。頤喉腫等證。不可

不知。蓋溫熱之毒。抵於陽明。發於肌肉而成斑。其色紅。爲胃熱者輕也。紫爲熱甚者重也。黑爲熱極者危也。鮮紅爲邪透者吉也。當其欲發未發之際。宜用清涼透斑法治之。如斑發出。神智昏蒙。加犀角元參治之。心法云。疹發營分。營主血。故色紅。棒喝云。邪鬱不解。熱入血絡而成疹。疹亦紅。輕紫重黑危也。雖然邪鬱未解。熱在營分。但其溫毒已發。皮毛與斑在肌肉。爲大異。蓋肺主皮毛。胃主肌肉。所以古人謂斑屬足陽明。胃病疹屬手太陰。肺病。疆界攸分。不

容混論。鞠通混而未別。虛谷已駁其非。洵無謬也。當其欲發未發之時。速用辛涼解表法。加細生地。桑豆衣治之。甚者加青黛連翹治之。又有溫熱之毒。協少陽相火上攻耳。下硬腫作痛。此爲發頤之病。頤雖屬於陽明。然耳前耳後皆少陽經脈所過之地。速當消散。緩則成膿爲害。宜內服清熱解毒法。去洋參麥冬加青黛馬勃荷葉治之。連面皆腫。加白芷漏蘆腫硬不消。加山甲皂刺。外用水仙花根。剝去赤皮。與根鬚入臼搗爛。敷於腫處。乾則易之。俟膚生。黍

米黃痛爲度。又有溫熱之毒。發越於上。盤結於喉。而成腫痺。內經云。一陰一陽結。謂之喉痺。一陰者。手少陰君火也。一陽者。手少陽相火也。二經之脈并絡於喉。今溫毒聚於此間。則君相之火並起。蓋火動則生痰。痰壅則腫。腫甚則痺。痺甚則不通而死矣。急用玉鑰匙以開其喉。繼以清熱解毒法。去洋參麥冬加僵蠶。桔梗牛蒡射干治之。溫毒之病。變證極多。至於斑疹。頤喉時所恆有。故特表而出之。

【溫毒諸方】

清熱解毒法

治溫毒深入陽明。劫傷津液。舌絳齒燥。西洋參。大麥冬。細生地。元參。淨銀花。連翹壳。

辛涼解表法

治風溫初起。風熱新感。冬溫襲肺咳嗽。薄荷錢半。蟬退一錢去足。前胡錢半。淡豆豉錢半。瓜蒌壳二錢。牛蒡子錢半。

清涼透邪法

治溫病無汗。溫瘧渴飲。冬溫之邪內陷。鮮蘆根五錢。石膏六錢煨。連翹壳三錢。竹葉錢半。淡豆豉三錢。桑豆衣三錢。

清涼透斑法

治陽明溫毒發斑

石膏五錢煨生甘草五分銀花

三錢連翹壳三錢鮮蘆根四錢

豆卷三錢【井水送下】

消毒犀角飲

治風熱之毒喉腫而疹發斑發

疹

防風 荆芥穗 牛蒡子 甘

草 犀角屑

知熱盛加連翹薄荷黃芩黃連

連翹敗毒散

【治時毒發頤】

連翹 歸尾 牛蒡子 柴胡

荆芥 川芎 升麻 桔梗

羌活 天花粉 紅花 蘇

木 防風 獨活 粉甘草

犀角地黃湯

治胃火熱盛陽毒發斑吐血衄

血 犀角 大生地 生白芍 牡

丹皮

熱甚如狂者再加黃芩

三黃石膏湯

治傷寒溫毒表裏俱盛或已經

汗下或過經不解三焦大熱六

脈洪盛及陽毒發斑

黃連 黃芩 黃柏 石膏

梔子 麻黃 淡豆豉

傷風

傷風概要

葉案曰感冒風邪即為傷風其症頭痛身熱惡風自汗煩躁脈來浮緩宜桂枝湯脈緊而濇無汗惡寒者傷寒也緊為惡寒濇為無汗然寒傷營屬陰陰主閉藏是以無汗故用麻黃輕揚以發表浮緩惡風者傷風也浮為傷風緩而自汗故用桂枝甘溫以解肌

小琴按傷風一症用桂枝湯減製法甚效吳鞠通每主杏蘇法見症施治之可也不必泥定一法茲採各方列后

【風傷衛陽】

傷風欬嚏。多涕畏風。頭目重眩。

宜辛以散之。

防風 杏仁 桔梗 生薑

蘇葉 川芎 甘菊

【浴後感風】

冬春喜浴。腠疏感風。主以玉屏

風散。

白朮 防風 黃耆 研末白

湯和服。

【風溫傷肺】

風邪傷肺。欬而暈眩。用輕涼肅

上。

丹皮 桑葉 貝母 杏仁

山梔 枇杷葉

【冬春傷風】

深秋初冬。或上春。偶感風寒。洒

洒翁翁。咳嗽。涕泗稠粘者。小琴

每以後方治之。覆杯即安。

細桂枝三分。酒黃芩錢半。薄橘

紅八分。嫩柴胡五分。竹瀝半夏

三錢。苦光杏三錢。

【四時發散宜九味羌活

湯】張元素方

羌活 防風 川芎 白芷

細辛 蒼朮 黃芩 甘草

生地 右加生薑三片。葱白三

莖。水煎服。

【感冒風寒】

治感冒風寒。頭痛發熱。憎寒欬

嗽。涕唾稠黏。胸膈滿悶。脈弱無

汗。宜參蘇飲簡易方。

人參 蘇葉 乾葛 前胡

陳皮 枳殼 茯苓 半夏 各八

分 桔梗 木香 甘草 各五

分 生薑 五片 大棗 一枚 右十

三味水煎熱服取汗。

醫藥顧問 卷二 傷風門

人人必備
醫藥顧問問卷三

會稽馬小琴纂述

中風概要

小琴按風爲百病之長。善行數變。受之輕者爲感冒。重則爲傷最重。爲中。然有真中類。中中血脈。經絡臟腑之辨。西北高寒風勁。真氣虛者。猝爲所中。是名真中。經所謂風中六腑五臟之俞也。真中者。風邪在表。身痛拘急。宜汗。小續命湯。或疏風散。風邪在經口眼喎斜。偏枯疼痛。大秦芫湯。或愈風湯。風邪入裏。多滯九竅。脣緩便秘。口不能言。耳聾。

鼻塞。目瞽。痰涎昏冒。宜下。三化湯。或麻仁丸。東南卑濕。釀熱。眞陰虧者。風自內生。虛陽上冒。亦致昏仆。是爲類中。實與外風無涉。經所謂陽之氣。以天地之疾。風名之也。類中者。痰多壅塞。搗蘿蔔子。以溫湯和飲吐之。脾虛嘔痰者。六君湯。異功散。腎虛水泛爲痰者。六味丸。或八味丸。湯服。中氣虛者。補中湯。陰虛者。補陰煎。其中血脈。則口眼喎僻。中絡。則肌膚不仁。中經。則脊重。不伸。中腑。則肢節廢。便溺阻。

中臟。則舌瘖吐沫。金匱分晰。旣明。至于千金引歧伯論中風大法。四一偏枯。半身不遂也。二風痹。四肢不收也。三風懿。奄忽不知。舌強不能言也。四風痺。諸痺類風狀也。迄乎河間主火。心火暴盛。腎水虛衰。東垣主氣。猝中乃本氣自病。丹溪主痰。濕生痰。痰生熱。熱生風。總之氣虛。則火動。痰升。其症似風。非風。專宜養氣。虛清。痰火。大忌風燥藥。若虛風外中。輕則麻痺不仁。羌活愈風湯。重則癱。

痰不用。大秦芫湯其痰火內升。輕則舌強難言。滌痰飲重則痰壅神昏。至寶丹既辨其中絡中經。中腑中臟及中經絡中臟腑并審其兼虛兼實兼熱兼痰而入手先分閉症脫症。如牙關緊閉兩手握固是爲閉症。蘇合香丸三生飲開之。如口開脾絕。手撒心絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。鼻鼾肺絕。以及吐沫直視搖頭面赤如妝。汗出如珠皆爲脫症。大劑理中湯灌之。兼灸臍下。凡初中先用通關散吹鼻。有嚏可治無嚏多死。

【口噤】

足陽明之經。上夾口。風寒乘虛襲入。則攣急口噤。先用烏梅肉冰片生南星爲末擦牙。其噤可開。宜竹瀝薑汁調蘇合香丸灌之。再用巴豆油紙捲皂角末燒煙熏入鼻中。人事自省。

【痰壅】

宜吐之。稀涎散加橘江。或薑鹹湯灌之。再用鵝毛探吐。或三聖散瓜蒂散加蠟吐。之後用星香散二陳湯。滌痰飲道。痰湯挾虛加參。著竹瀝挾寒。加桂附薑汁。脾虛嘔痰。六君湯異功散。中氣虛理中湯。溫胃飲。

【口眼喎斜】

因血液衰涸。不能榮養筋脈。靈

樞云。足陽明經病。頰筋有寒。則急引。頰移口有熱。則筋弛。縱緩不勝收。故僻（斜也）又云。足陽明手太陽經急。則口目爲僻。治宜潤燥以熄風。大秦芫湯或十全大補湯。

【半身不遂】

因氣血不至。故痛癢不知。經云。營虛則不仁。衛虛不用。營衛俱虛。則不仁且不用。丹溪以左枯屬血虛。用四物湯。右枯屬氣虛。用四君子湯。氣血兩虛而挾痰。用二陳湯。加釣藤竹瀝薑汁。宗其治者。多不效。何也。治偏枯宜從陰引陽。從陽引陰。從右引左。從左引右。使氣血灌注周流。

不息。莫如養血溫經。補中湯少加附子。下七味。地黃丸以附子能行參耆之力。而陽和自轉。肉桂能通血脈。而筋節自榮。挾痰者。八珍十全等湯。加南星半夏。薑汁。營衛俱虛者。黃耆五物湯。膝骨軟。加牛膝虎膝。骨節軟。加木瓜當歸。

【四肢不收】

諸陽經皆起於手足。循行身體。如邪氣客於肌膚。隨其虛處。停滯。與氣血相搏。故肢不舉。脈緩。大有力。土太過也。當瀉其濕。胃苓湯。脈細小。無力。土不足也。當補其氣。補中湯。瘦人血枯。筋急。木旺。風淫者。四物湯。加鉤藤秦

芫。防風。木瓜。肥人。色白。多痰者。六君湯。加秦芫。天麻。竹瀝。薑汁。

【角弓反張】

邪入經絡。則腰背反折。攣急。如角弓狀。小續命湯。如先受風。後感寒。無汗惡寒。爲剛瘳。先受風。後感濕。惡風有汗。爲柔瘳。剛瘳。續命湯。去附子。柔瘳。續命湯。去麻黃。

【瘳癱】

因肝經風火。搏於經絡。則手足抽掣。或伸或縮。而動不止。由血虛不能榮筋。而燥氣乘之。宜滋肝腎。灌輸筋脈。使水旺火熄。則風木自平。大秦芫湯。或十補湯。加減。

【猝倒無知】

凡類中病。出於臟。精去則氣去。所以暈眩。猝倒。氣去則神去。所以昏憤。無知。陰陽脫離。精氣不交。須參附大劑。峻補其陽。繼以地黃丸。加杞子。當歸。或十補丸。填補真陰。若心火盛。腎水衰。致猝倒神昏。肢掣口喎。宜地黃飲子。去桂。附巴戟。峻補其陰。繼以生脈散。滋其化源。

【舌強不語】

舌爲肝脾心腎四經所系。邪中其經。則痰涎閉其脈道。舌機不掉。因痰迷心竅者。滌痰湯。因濕痰者。清脾熱。六君湯。加枳實。竹茹。因風熱者。清肝火。涼膈散。加

減。腎虛內奪爲瘖瘵。地黃飲子。

舌強口角流涎。脾不能攝者。六

君湯加竹瀝薑汁驚痰堵寒舌

本強硬者。正舌散加薄荷。舌麻

語蹇者。省風湯加沉香。唇緩舌

強者。解語湯。肥人舌本強。作濕

痰治。瘦人作心火治。不可純補

恐堵塞經絡。中痰火通用加味

轉舌膏。外取龜尿少許點舌。神

效。置龜於新荷葉上。以猪鬃搗

其鼻尿立出。倘飲食照常。但失

音不語者。名曰啞風。宜小續命

湯。去附子加石膏菖蒲。

【遺尿】

係腎氣虧極。用參耆朮附益智

五味。以保元陽之脫火虛者。地

黃飲子。水虛者。六味丸。

【眩暈】

凡虛陽上巔。得痰升則眩暈。經

所謂上虛則眩也。宜培其中氣。

五福飲。或大補元煎。加甘菊炭

牡蠣白芍。天麻。此猝倒所由來

也。

【麻木不仁】

遍體頭麻。無汗氣實。烏藥順氣

散。十指及面麻木。乃氣虛風襲

補中湯。去朮歸陳。加白芍五味

子。麻木體軟。搔起白屑。乃脾血

不榮。補中湯。去柴胡。加地黃白

芍。芝麻。

小琴按。真中風。雖風從外中。

亦由內虛召風。其變急枯偏。

口喎舌強。二便不爽。由風挾

痰火壅塞。致榮衛脈絡失和。

先用通關散。繼則養血順氣。

消痰清火。大秦芫湯。或愈風

湯。宣通經隧。風閉用桂枝羌

活寒凝。用薑附桂心。熱痞用

梔芩石膏。濕滯用蒼朴五苓。

血瘀用桃仁牛膝。氣滯用木

香枳壳青陳。痰阻用星夏浮

石牛黃。類中風本非外風。猝

仆昏厥。無喎斜偏廢等症。是

宜辨也。故葉氏謂內風乃身

中陽氣變化。肝爲風藏。因血

液衰耗。水不涵木。肝陽偏亢。

內風時起。宜滋液熄風。濡養

經絡。以熟地杞子首烏當歸。

牛膝胡麻石斛五味子甘菊
牡蠣補陰潛陽如虎潛固本
復脈之類陰陽並損無陽則
陰無以化宜溫柔濡潤如沙
苑子淡菘蓉杞子人參阿膠
當歸通補如地黃飲子還少
丹之類風木過動中土受戕
致不寐不食衛疏汗泄飲食
變痰如六君湯玉屏風散茯
苓飲酸棗仁湯之類風陽上
升痰火阻竅神識不清至寶
丹芳香宣竅或辛涼等品如
竹葉菖蒲山梔羚羊天麻丹
皮釣藤清上痰火若陰陽失
交真氣欲絕用參附湯回陽
佐以攝陰如五味龍骨牡蠣

此其治也。自士材以類中症
條分火中虛中濕中寒中暑
中氣中食中惡中而金鑑因
之火中即河間所謂癱瘓多
由火盛水衰心神昏冒筋骨
不用也。心火盛涼膈散腎水
衰六味湯虛中即東桓所謂
猝中昏憤皆屬氣虛煩勞氣
陷補中湯房勞精脫生脈補
精湯濕中即丹溪所謂東南
濕土生痰痰熱生風因而昏
冒內中濕者醇酒厚味生冷
過節滲濕湯外中濕者陰雨
霧露坐臥濕地除濕湯寒中
體強口噤臍腹冷痛薑附湯
身寒無汗附子麻黃湯暑中

面垢暈倒須分陰陽得之受
暑納涼寒外暑內香薷飲二
香湯得之亦日長途中外皆
熱昏仆不醒蒜汁合水灌之
繼以辰砂益元散氣實者蒼
朮白虎湯氣虛者人參白虎
湯氣中氣逆痰潮牙關緊急
極似中風但中風身溫中氣
身冷中風脈浮應人迎中氣
脈沉應氣口蘇合香丸灌之
俟醒以八味順氣散加香附
因怒氣逆忽然昏噤木香調
氣飲有痰星香散食中醉飽
後或感寒或惱怒胃氣不行
忽然厥逆誤作中風中氣治
必死薑鹹湯探吐感寒者薑

香正氣散。氣滯者。八味順氣散。惡中。飛尸。鬼擊。卒厥。客忤。肢冷。口噤。蘇合香丸。灌之。俟少甦。服調氣平胃散。

【中風諸方簡註】

小續命湯(中風)

麻黃。人參。黃芩。白芍。

杏仁。防己。官桂。防風。

甘草。附子。川芎。生薑。

疏風散(表邪)

麻黃三兩。益智一兩。杏仁一兩。

升麻一錢。研末。每服五錢。

大秦芫湯(經邪)

茯苓。白朮。甘草。獨活。

川芎。羌活。生地。秦芫。

白芍。歸身。防風。細辛。

石膏。白芷。黃芩。生薑。

愈風散(通治)

大秦芫湯。加入參。黃耆。桂心。厚

朴。柴胡。枳殼。杜仲。防風。知母。半

夏。薄荷。蔓荊子。甘菊。麻黃。前胡。

枸杞子。蒼朮。地骨皮。

三化湯(府實)

大黃。枳實。厚朴。羌活。

麻仁丸(中藏)

大黃。枳實。厚朴。白芍。

麻仁。杏仁。蜜丸。如桐子大。

六君子湯(脾虛)

人參二錢。茯苓二錢。生薑三片。

白朮二錢。甘草一錢。棗二枚。以

上名四君子湯。再加陳皮。半夏。

即名六君子。

異功散(嘔痰)

即六君子去半夏。

六味地黃丸(腎虛)

熟地黃。酒蒸。晒八兩。萸肉。山藥

各二兩。茯苓。丹皮。澤瀉。各三兩

蜜丸。

八味地黃丸(陽虛)

六味丸。加桂心一兩。名七味地

黃丸。再加附子一兩。即名八味

丸。

補中益氣湯(中風)

黃耆錢半。人參。甘草。各一錢。白

朮。陳皮。當歸。各五分。升麻。柴胡

各三分。大棗

補陰煎(滋腎)

熟地。黃柏。知母。龜版。

白芍。當歸。牛膝。虎脛骨。
瑣陽。廣皮。

滌痰湯(除痰)

人參。南星。半夏。枳實。
茯苓。橘紅。菖蒲。竹茹。
甘草。生薑。

至寶丹(宣竅)

犀角。硃砂。雄黃。玳瑁。

虎珀各研一兩。麝香。龍腦。
各研一錢。金銀箔各十五片。

牛黃半兩研。安息香一兩。

將安息香熬膏和諸藥末分作

百丸蠟護

蘇合香丸【僻邪】

蘇合香。安息香各二兩。薰陸。
香龍腦。丁香。麝香各研一兩。

青木香。白朮。沉香。香附。犀角各

一兩研。加煉白蜜和分作五

十九另以硃砂爲衣一兩水飛

蠟護原方又有檀香。畢撥。訶黎

勒

三生飲(閉症)

南星。川烏。附子。木香。

人參。生薑

理中湯(脫症)

白朮二兩土炒。人參。泡姜。炙甘

草各一兩。每服四錢。加附子名

附子理中湯

通關散(取嚏)

南星。皂角。細辛。薄荷。生半夏。爲

末吹鼻。又(南星。冰片。烏梅肉。

擦牙開噤亦名開關散)

稀涎散(吐涎)

剛子仁六粒劈開。牙皂角三錢。

礬一兩將礬化開入二味攪勻。

待礬枯研末用三分吹喉

小琴按剛子仁。卽巴豆肉。熱

烈善瀉有大毒俗呼剛子。

三聖散(吐痰)

防風。藜蘆。甜瓜蒂。

全蠍散(吐痰)

甜瓜蒂。赤小豆。全蠍。亦

名瓜蒂散

星香散(痰滯)

南星四錢。木香五分。

二陳湯(化痰)

半夏二錢。陳皮。伏苓各一錢。甘

草五分。加生薑煎

導痰湯(膠痰)

二陳湯再加膽星枳實。

溫胃飲(溫中)

人參 炮薑 當歸 炙草

白朮 薏豆 陳皮

十全大補湯(補氣)

當歸 生地各三錢 芍藥二錢 川

芎錢半 名四物湯合四君子湯

名八珍湯再加黃蓍肉桂即是

本方

黃蓍五物湯(營衛)

黃蓍 白芍 桂枝 薑棗

胃苓湯(瀉濕)

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草

名平胃散 白朮 瀉猪 澤苓

名四苓湯二方合用即名本

方。

地黃飲子(補陰)

熟地 附子 巴戟 萸肉

桂心 茯苓 遠志 石斛

麥冬 薄荷 茯苓 五味

菖蒲

涼膈散(瀉火)

大黃 連翹 甘草 薄荷

芒硝 山梔 黃芩 蜜 此

原方去硝黃加桔梗竹葉名加

減涼膈散

正舌散(舌強)

蠟尾三錢 醋炮炒 茯苓一兩 姜

汁拌炒 共為末 每服二錢 溫酒

下并擦牙齦

省風湯(痰熱)

防風 生南星 各二錢 生半夏 黃

芩 甘草 各一錢 加薑煎

解語湯(不語)

防風 天麻 附子 棗仁 各錢半 羚

羊角 官桂 羌活 各八分 炙甘草

五分 竹瀝 半杯 沖

加味轉舌膏(言蹇)

連翹 遠志 薄荷 柿霜

菖蒲 梔子 防風 桔梗

黃芩 炙草 犀角 大貝

元明粉 川芎 共研末 蜜丸

五福飲(補氣)

人參 熟地 當歸 白朮

炙甘草 大補元煎(培中)

人參 熟地 山藥 杞子

茵肉。當歸。炙草。杜仲。
陽虛加薑附氣虛加薯朮

烏藥順氣散(中絡)

麻黃。枳殼。桔梗。烏藥。
僵蠶。白芷。陳皮。乾薑。

川芎。甘草。

虎潛丸(補陰)

黃柏。知母。熟地。龜版。
虎脛骨。鎖陽。當歸。牛膝。

白芍。陳皮。羯羊肉搗丸。

固本丸(補元)

人參二兩。天冬。麥冬。生地。熟地。
各四兩。蜜丸。

復脈湯(潤燥)

炙草四兩。生薑。桂枝。人參。阿膠。
各二兩。生地一斤。麥冬。麻仁各

八兩。大棗十二枚。水酒各半煎。
一名炙甘草湯。

還少丹(通補)

熟地二兩。山藥。牛膝。杞子各兩。
半。萸肉。茯苓。杜仲。遠志。五味。楮

實。茴香。巴戟肉。菴蓉各一兩。石

菴蒲五錢。加棗肉蜜丸。鹽湯送。

玉屏風散(表虛)

黃耆。防風各一兩。白朮二兩。

外臺茯苓飲(扶脾)

茯苓。人參。白朮。枳實。

橘皮。生薑。

酸棗仁湯(補脾)

棗仁。甘草。知母。茯苓。

川芎。

生脈補精湯(精虛)

人參。麥冬。五味。熟地。
當歸。鹿茸。

滲濕湯(內濕)

即胃苓湯加香附。川芎。砂仁。黃

連。除濕湯(外濕)

羌活。藁本。升麻。柴胡。

防風。蒼朮。

附子麻黃湯(身寒)

附子。麻黃。甘草。

香薷飲(驅暑)

香薷。厚朴。扁豆。黃連。
除薤豆。名黃連香薷飲。除黃連。

名三物香薷飲加荅草名五物

香薷飲。

二香飲(陰暑)

香薷飲。合藿香正氣散。名本湯。

蒼朮白虎湯(除熱)

石膏 知母 甘草 粳米。

以上名白虎湯。加蒼朮。或加人

參。

八味順氣散(調氣)

人參 茯苓 白朮 甘草。

烏藥 白芷 青皮 陳皮。

木香調氣散(暴怒)

木香 藿香 砂仁 蔻仁。

炙草 丁香 檀香。

藿香正氣散(中暑)

藿香 紫蘇 白芷 腹皮 茯苓 各三

兩 白朮 陳皮 半夏 厚朴 桔梗 各

二兩 甘草 一兩 加薑棗煎每服

五錢

調氣平胃散(惡中)

木香 檀香 砂仁 蔻仁。

厚朴 陳皮 蒼朮 藿香。

甘草。

小琴於中風一門。既錄其真

中類。中經中絡中臟腑諸

候。又備錄應用諸方。竊以為

病之中人。無一定欲懸擬其

方。而盡列之。斷不可能之舉。

但遇中風者。苟於上列諸條

詳參細閱。已渺望漏矣。猶恐

板用古方。不知變通。乃更遴

昔賢方案。節錄數則如下。

再按此書。雖為灌輸。無醫學

常識者。計倘徒事若藥治。若

病而不詳其源。不道其委。無

異溝澮之水。一汲便盡。今編

中將病源治法。觀縷彙錄。俾

閱者可審症遴方。不致有頭

痛治脚之誤。更不致一方無

效。便無從研究也。

【葉案選錄】

脈左緩大偏枯在左。血虛不榮

筋骨。內風襲絡使然。

製首烏四兩。烘。杞子二兩。去蒂。

歸身二兩。淮牛膝二兩。蒸。明天

麻二兩。麵煨。三角。胡麻二兩。打

水洗。烘。黃甘菊三兩。水煎。汁。石

斛四兩。水煎。汁。小黑豆皮四兩。

水煎。汁。上藥研末。和三汁。加蜜

搗丸。早服。四錢。滾水送。(肝腎

虛內風動)

失血有年。陰氣久傷。復遭憂悲。邑鬱陽挾內風。大冒血舍自空。氣乘於左口。喎肢麻舌。暗無聲。足痿不耐行。走明明肝腎虛。餒陰氣不主上承。重培其下。冀得風熄。議河間法（同上）。

熟地四兩。萸肉二兩。牛膝兩半。遠志兩半。炒黑杞子二兩。菊花二兩。炒五味兩半。川斛二兩。四錢。伏神二兩。淡菴蓉一兩二錢。爲末。蜜丸。每服四錢。

初起神呆遺溺。老人厥中顯然。數月來夜不得寐。是陽氣不交於陰。勿謂痰火專以攻消。乃下虛不納。議與潛陽（陽升熱蒸液虧）。

醫藥顧問

卷三 中風概要

龜腹甲心。熟地炭。乾菴蓉。

天冬。生虎脛骨。淮牛膝。

炒杞子。黃柏。噴怒動陽。恰

值春木司升。厥陰內風。乘陽明

絡脈之虛。上凌咽喉。環繞耳後

清空之地。升騰太過。脂液無以

營養。四末而指節爲之麻木。是

皆脾中根萌。所謂下虛上實。多

致巔頂之疾。夫情志變蒸之熱。

閱方書無芥連苦降。羌防辛散

之理。肝爲剛臟。非柔潤不能調

和也（同上）。

鮮生地。元參心。桑葉。丹

皮。連翹心。羚羊角。

又方

生地。阿膠。牡蠣。川斛。

知母。

左肢麻木。膝蓋中牽縱如針刺。

中年後精血內虛。虛風自動。乃

陰中之陽損傷（陰中陽虛）。

淡菴蓉二兩。枸杞子三兩。歸身

二兩。生虎骨二兩。沙苑子二兩

巴戟肉二兩。明天麻二兩。桑寄

生四兩。精羊肉膠。阿膠丸。早服

四錢。交冬加減。用人參丸服。

中風以後。肢麻言蹇。足不能行。

是肝腎精血殘。慙虛風動。絡下

寒。二便艱阻。凡腎虛忌燥。以辛

潤溫藥（陰陽並虛）。

淡菴蓉。枸杞子。當歸。柏

子仁。牛膝。巴戟。川斛。

小茴。

男中右屬氣虛。麻木一年入春。口眼歪斜。乃虛風內動。老年力衰。當時令之發泄。忌投風藥。宜

以固衛益氣。(氣虛)

人參。黃耆。白朮。炙草。

廣皮。歸身。天麻。煨薑。

南棗。

神傷思慮則肉脫。意傷憂愁則

肢廢。皆痿象也。緣高年陽明脈

虛。加以愁煩。則厥陰風動。木橫

土衰。培中可效。若窮治風痰。便

是劫燂。則謬。(胃虛陽升)

黃耆。於朮。桑寄生。天麻。

白蒺藜。杞子。當歸。菊

花汁。加蜜丸。

陽明虛。內風動。右肢麻痺。痰多

眩暈。(肝胃同治)

天麻。釣藤。半夏。茯苓。

廣皮。

風中廉泉。舌腫喉痺。麻木厥昏。

內風亦令阻竅。上則語言難出。

下則二便皆不通調。考古人呂

元膺。每用芳香宜竅解毒。勿令

壅塞致危也。(胞絡熱邪阻竅)

至寶丹。四九勻四服。

脈濡無熱。厥後右肢偏痿。口喎

舌歪。聲音不出。此陰風濕晦。中

於脾絡。加以寒滯湯藥。蔽其清

陽。致清氣無由展舒。法宗古人

星附六君子湯。益氣仍能攻風

祛痰。若曰風中廉泉。乃任脈為

病。與太陰脾絡有間矣。(風濕

中脾絡)

人參。茯苓。新會皮。香附

汁。南星。薑汁。炒竹節。

白附子。薑汁炒。

厥症脈虛。數病在左。軀腎虛液

少。肝風內動。為病偏枯。非外來

之邪。(腎陰虛肝風動)

製首烏。生地。杞子。茯神。

明天麻。菊花。川斛。

液少。下虧。陽挾內風。上引。陰不

上承。舌絡強。則言蹇。氣不注脈。

則肢痿。乏力步趨。凡此皆肝腎

臟陰本虛。鎮補之中。微逗通陽

為法。以臟液虛不受純溫藥耳。

(同上)

水製熟地四兩。阿膠二兩。女貞

子二兩。魯豆皮二兩。淡菴蓉一兩。伏神二兩。旱蓮草二兩。川石斛三兩。用精羯羊肉膠爲丸。早上滾水服四五錢。

【先嚴遺案節錄】

（寒）高年陽氣素虛。時屆隆冬。忽然暴中。致致神昏不醒。口眼歪斜。右肢偏痿。聲音不出。痰涎上湧。種種危症。診脈左大右濡。是陰陽失交。真氣欲絕。有暴脫之虞。擬進回陽攝陰法。用星附六君益氣。仍以攻風祛痰。製胆星一錢五分。半夏一錢五分。白附子一錢五分。橘紅八分。茯苓三錢。生晒朮二錢。黨參三錢。炙甘草八分。送志一錢五分。

（清煎）

（熱）時交春節。卒然肢體拘攣。口歪言蹇。二便不爽。診脈弦數。此本體先虛。風陽上僭。痰火阻竅。以致營衛失和。治法急則先用開關通竅。繼則益氣養血。佐以消痰降火之品。宜通經隧。使氣充血盈。脈絡通利。可冀痊愈。薄荷一錢五分。化橘紅八分。杏仁三錢。石菖蒲二錢。鬱金一錢五分。牛黃三分。羚羊一錢五分。瓜蒌霜五錢。蠟稍四尾。竹瀝半盃冲。

（虛）左脈弦緩。右脈虛弱。右肢麻木。語言蹇澀。此內風襲絡。血虛不榮筋骨而然。法宜滋養熄

風。

製首烏三錢。當歸三錢。茯苓三錢。淮牛膝三錢。沙苑子錢半。胡麻二錢。甘草五分。山藥三錢。白芍三錢。丹皮錢半。木瓜錢半。

（實）肝脈獨弦。病從鬱起。卽言蹇肢麻。似中非中之象。顯然厥陰內風。乘陽明絡脈之虛。挾痰火上。上凌空竅。所謂上實下虛症也。然肝爲剛藏。必須柔劑制之。

羚羊角五分。白芍三錢。茯苓三錢。橘紅八分。鬱金錢半。梔子二錢。白蒺藜三錢。石菖蒲一錢。天麻錢半。丹皮二錢。半夏一錢五分。清煎。

【單方選附】

治痰厥。昏暈不醒。口噤痰喘。及小兒驚風發搐。五疳等宜牛黃清心丸。藥肆有出售。

膽星一兩。薑汁炒。白附子一兩。煨鬱金五錢。川烏一兩。麩包煨。半夏一兩。皮硝湯泡五次。皂莢湯泡五次。礬湯一次。曬乾爲末用之。

右五味共爲細末。用臘日黃牛膽三個。取汁和藥。仍入膽內。紮口掛風簷下。至次年取膽內藥一兩四錢。加度過芒硝水。飛辰砂。礬砂各一錢。冰片麝香各一分。研極細末。和在一處稀糊爲丸。如芡實。大金箔爲衣。薑湯化

下。

【治暴仆痰涎壅塞】

竹瀝一盞。薑汁五匙。調入白礬末一錢。灌下。

治中風卒然倒仆。痰涎壅盛。難辨虛實。扶病人於避風室內。用炭火一盆。將米醋灑上。使醋氣衝入口鼻。病輕者卽甦。重者亦易治。勿遽服補藥。米湯之類。恐痰涎滯高。致成危候也。

【中風昏迷不省】不論風寒食

痰邪祟。一時昏仆不省者。用生薑汁半鍾。童便一鍾。和勻。燙溫灌下卽醒。

牙皂莢去皮弦二兩。生明礬一兩。二味同人水中煮化。取出曬

乾爲末。北細辛五錢。去葉土淨。共研細末。用少許吹入鼻中卽醒。

人手足指甲。炒黃酒煮服。立醒。

【中風口噤不開】

白鹽梅楷齒卽能開。並不傷齒。不論男婦小兒。中風口噤身直。用乾雞屎。或鴿糞炒黃。再以黑豆同炒。酒煎。去滓服。卽齒開能言。

【中風口噤不語】

白明礬二錢。研末。用生薑自然汁調化。幹開口灌服。其涎或吐。或化下卽醒。

馬料豆一升。煮濃汁如飴。含汁在口卽能言也。

側柏葉一握。去枝梗。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一觔煎十餘沸。溫服。按柏葉能行血消風。葱白散氣祛痰。酒能通經助藥力。如初中即服數杯。能使風退氣和。一切易治。

【初中痰盛不省人事】

蘇合香丸一圓。用竹瀝薑汁調藥灌下。醒後用。

白朮土炒。當歸天麻各二錢。川芎薄荷桂枝。南星薑汁製。陳皮各一錢。水煎。臨服加竹瀝一酒杯。薑汁三茶匙。和勻服。

【中風口眼喎斜】

生瓜蒌絞汁。和大麥麵炙熱。熨心頭。一正。便止。勿令過分。

口喎用皂莢五兩。去皮爲末。三年老醋和糊。左喎塗右。右喎塗左。乾更上之。以正爲度。

又用石灰一合。醋炒調如泥。於不患處塗之。立便牽正。灸法最妙。聽會穴。耳珠前陷中。開口有空。頰車穴。目下八分。曲頰陷中。用麥大艾丸灸三壯。即效。如不效。再灸。

【中風灸法】一時昏仆。氣塞。涎流。不語。藥物難施之際。灸法最善。

百會穴。頭頂中。風池穴。耳後一寸五分。并治偏正頭風。大椎穴。項背第一節骨陷中。曲池穴。屈手陷中。足三里穴。膝眼下三寸。

骨外廉陷中。絕骨穴。一名懸中。

外踝上三寸。附飛陽之前。間使穴。手掌上橫紋中。後一寸以上七穴。凡入心中昏亂。或手足麻痺。不拘是風是氣。用菽豆大艾丸各灸三五壯。并治卒死。心頭尚熱。不知何證。用此灸法。即甦。

【中風手足麻癢】

羌活煎湯洗。大腸燥閉。不見虛證者。用枳實厚朴大黃羌活。各二三錢。水煎服。自解。即三化湯。

【中風拘攣】中風昏仆。省後筋絡攣結。肢節疼痛。或半身不遂者。用八角刺樹皮。俗名老鼠刺樹。高三五尺。冬季結紅子。鮮者取皮。

西兩木蓮葉似茶花葉而色老。生於土牆頭上者多一歲一片。無灰酒二觔煎至兩碗作二次服。大有奇功。三四服全效。治中痰塞不語宜太元湯。染布活靛缸水一盞溫灌下。卽能言語。按藍汁解諸風熱毒。散經絡結氣敗血染布活水內有石灰能下痰水之義。

溫疫概要

大頭癰 捻頭癰 瓜瓢癰

楊梅癰 疔瘡癰 絞腸癰

軟脚癰

小琴按傷寒與中暑感天地

之常氣疫者感天地之厲氣

此氣之來無老少強弱觸者卽病邪自口鼻入而其所客內不在臟腑外不在經絡舍於伏膂之間去表不遠附近於胃乃表裏之分界爲半表半裏卽內經癘論所謂橫連募原是也。夫邪在募原正當經胃交關之所爲半表半裏其熱淫之氣浮越於某經卽現某經之證如浮越於太陽卽頭項痛腰脊強浮越於陽明卽目痛鼻乾不眠浮越於少陽卽脅痛耳聾寒熱嘔而口苦大概邪越太陽居多陽明次之少陽又其次也。林義桐氏謂沿門闔境發於兵荒

之後者爲大疫一隅數家一家數人症多相似者爲常疫春夏秋三時皆有夏秋特甚病由濕土蒸鬱而發其後更相傳染人自口鼻遂流募原吸自鼻者頭額暈脹背微惡寒吸自口者嘔噎悶滿臍痛下利足膝逆冷邪出募原故壯熱有汗不解必俟表氣入內精氣外達大發戰汗然後脈靜身涼亦有自汗而解者但以出表爲順內陷爲逆從表解者戰汗自汗發斑從裏陷者胸腹痞痛使祕熱結旁流協熱下利嘔噎譫語舌黃黑刺其脈不沉不浮而數盛

於左。以濕土之邪犯胃。募原附於胃者也。胃爲陽明。三陽溼之中道。邪伏其間。必表裏分解。但不能一汗卽盡。有得汗熱除。二三日復熱者。有得下裏和。二三日復見表症者。有表和復見裏症者。有表裏偏勝者。有表裏分傳者。吳氏所謂疫有九傳也。

【辨明傷寒時疫】

或曰。子言傷寒與時疫。有霄壤之隔。今用三承氣。桃仁承氣。抵當茵陳。諸湯。皆傷寒方也。旣用其方。必同其證。子何言之異也。曰。夫傷寒必有感冒之因。或衣單風露。或冒雨入水。或臨風脫

衣。或當簑洗浴。隨覺肌膚寒慄。旣而四肢拘急。惡風惡寒。然後頭疼身痛。發熱惡寒。脈浮而數。脈緊無汗。爲傷寒。脈緩有汗。爲傷風。時疫初起。原無感冒之因。忽覺凜凜。以後但熱而不惡寒。然亦有因所觸而發者。或饑飽勞碌。或焦思氣鬱。皆能觸動其邪。是促其發也。不因所觸而發者。居多。促而發者。十中之一二耳。傷寒投劑。可一汗而解。時疫發散。雖汗不解。傷寒不傳染於人。時疫能傳染於人。傷寒之邪。自毫竅而入。時疫之邪。自口鼻而入。傷寒感而卽發。時疫感久而後發。傷寒汗解在前。時疫汗

解在後。傷寒投劑。可使立汗。時疫汗解。俟其內潰汗出。自然不可以期。傷寒解以發汗。時疫解以戰汗。傷寒發斑。則病篤。時疫發斑。爲外解。傷寒邪感在經。以經傳經。時疫以邪在內。內溢於經。經不自傳。傷寒感發甚暴。時疫多有淹纏。二三日或漸加重。或淹纏五六日。忽然加重。傷寒初起。以發表爲先。時疫初起。以疎利爲主。種種不同。其所同者。傷寒時疫。皆能傳胃。至是同歸於一。故用承氣湯。輩導邪而出。要知傷寒時疫。始異而終同也。夫傷寒之邪。自肌表一逕傳裏。如浮雲之過太虛。原無根蒂。惟

其傳法。始終有進而無退。故下後皆能脫然而逾。時疫之邪。始則匿於募原。根深蒂固。發時與營衛交併。客邪由經之營衛。未有不被其所傷者。因其傷故名曰潰。然不潰則不能傳。不傳邪不能出。邪不出而病不瘳。然時疫多有未能頓解者。何耶。蓋疫邪每有表裏分傳者。因有一半向外傳。則邪留於肌肉。一半向內傳。則邪留於胃府。邪留於胃。故裏氣結滯。裏氣結。表氣因而不通。於是肌肉之邪。不能即達於肌表。下後裏氣一通。表氣亦順。而鬱於肌肉之邪。方能達發於肌表。或斑或汗。然後脫然而

愈。傷寒下後無有此法。雖曰終同。及細較之。而終又有不同者矣。或曰。傷寒感天地之正氣。時疫感天地之戾氣。氣既不同。俱用承氣。何藥之相同也。曰。風寒疫邪。與吾身之真氣。勢不兩立。一有所着。氣壅火積。氣也。火也。邪也。三者混合。失其本來真面目。與之俱化爲邪矣。但以驅逐爲功。何論邪之同異也。假如初得傷寒。爲陰邪。主閉藏。無汗。傷風爲陽邪。主開發。多汗。始有桂枝麻黃之分。原其初感而未化也。傳至少陽。並用柴胡。傳至胃府。並用承氣。至是亦無風寒之分。

矣。推而廣之。是知疫邪傳胃。亦同治法。

【疫症治法】

外解

香鼓。葱白。連翹。薄荷等味。

內清

山梔。黃芩。黃連。人中黃。滑石等

味。

下奪

芒硝。大黃等味。

熱痰蒙蔽（挾穢濁也）

犀角。菖蒲。銀花。鬱金。佩蘭等味。

煩渴多汗

石膏。知母等味。

斑發咽痛

犀角。牛蒡。生地等味。

衄血下血

山梔犀角丹皮等味。

發熱自利

葛根黃芩黃連等味。

胸膈痞滿

枳實枳殼桔梗等味。

嘔吐呃逆

藿香竹茹等味

熱結血分(邪混三焦也)

元參銀花露金汁等味

普通專藥

人中黃香豆豉。

溫疫之發於外者條列治法如

左。

【大頭瘟】

溫熱傷巔腫大如斗赤癩無頭。

或結核有根令人多汗氣蒸(

邪熱客心肺上蒸頭面爲腫)

初則憎寒壯熱體重頭面痛目

不能張上喘咽喉不利甚則堵

塞不能飲食舌乾口燥恍惚不

安不速治十死八九宜人中黃

普濟消毒飲子如大便硬加酒

炒大黃一二錢緩緩服下或沈

氏頭瘟湯若潰膿必傳人若發

於面部焮赤腫痛屬陽明普濟

消毒飲子加石膏發於耳前後

額角旁紅腫屬少陽普濟消毒

飲子加柴胡天花粉發於腦頂

後并耳後赤熱腫痛屬太陽荆

防敗毒散去人參加芥連

【捻頭瘟】

喉痺失音項大腹脹如蝦蟆狀

亦名蝦蟆瘟荆防敗毒散此症

甚危

【瓜瓢瘟】

胸高脅起嘔血如汁生犀飲便

結加大黃湯加花粉虛加鹹水

炒人參表熱去蒼朮加桂枝黃

連便膿血倍黃土加黃柏便滑

以人中黃代金汁

【楊梅瘟】

遍身紫塊忽然發出微瘡清熱

解毒湯下人中黃丸并宜刺塊

出血

【疔瘡瘟】

發塊如瘤遍身流走旦發夕死

急用三稜針刺入委中穴三分

出血。服人中黃散（穴在膝後陷中）

【絞腸瘻】

腸鳴乾嘔。水洩不通。類絞腸痧。急宜探吐。服雙解散。常效。

【軟脚痢】

便清洩白。足腫難移。此卽濕溫症。宜蒼朮白虎湯。

小琴按。瘟疫一症。始於天行。

盛於傳染。與傷寒溫熱不同。

不探索其源委。貿然選二三

方案。冀以活人。譬之懸木求

魚。抑且誤人。非淺故本編綜

其病症治法。俾閱者能辨症

始能用方。乃不嫌繁鎖。更採

節林義桐氏治疫大要列后

若果遇大疫之年。則專司醫事者。尙或棘手。並吳又可溫疫論。或慮未詳。非本編所敢負擔也。

【要】

【左錄林義桐氏治疫大

疫症初起三日。葱豉湯加童便。熱服。汗之不汗。少頃更服。以汗出。熱除爲度。三服不解。尙屬表症。用白虎湯見裏症。用承氣湯解毒湯。表裏不分。用涼膈散。雙解散。加減汗下後。復見表症。再與白虎湯。復見裏症。再與承氣湯。裏熱結。用三黃石膏湯。梔鼓湯。汗之有汗。下三四次。而熱退者。有熱退後。忽復作壯熱。再

汗再下而愈者。若脈症皆虛。用清熱解毒湯。人中黃丸調之。非如傷寒有下早變症之慮。亦無溫熱不可頻下之比。總當以熱除邪盡爲度。惟下元虛者。非六味生料補其真陰。不能化其餘熱。初發邪伏募原。營衛交阻。凜寒發熱。甚則厥逆。迨陽鬱而通厥回。而中外皆熱。不可發汗。宜透其邪。用達原飲。輕者苦白面。薄脈不數。可從汗解。重者舌胎如粉。舌根先黃。延及中央。邪漸入胃。須下之。達原飲加大黃。若脈長洪而數。汗而渴。此邪適離募原。欲表未表也。白虎湯。舌黃兼裏症。邪已入胃。大小承氣

湯。凡舌胎白。邪在募原。不可下。胎黃邪在胃。宜下。黑而芒刺急。下目赤咽乾。氣噴如火。揚手擲足。脈沉數下之。俱承氣湯。凡失下。循衣摸床。撮空肉惕。目不了了。邪熱愈甚。元氣將脫者。宜陶氏黃龍湯。既下。急用生脈散。加歸芍。痰滯胸膈。瓜貝養榮湯。斑不透。仍熱。舉斑湯。屢汗而液枯。人參白虎湯。表症多。裏症少。達原飲。加大黃。枳實。裏症多。表症少。大柴胡湯。燥結便祕。熱結旁流。日久失下。自利黑水。協熱下利。潮熱便作泄瀉。俱承氣湯。疫兼痢者危。檳榔順氣湯。熱結下焦。小便不利。導赤散。熱瘀

發黃。茵陳湯。血蓄膀胱。夜熱譫語。桃仁承氣湯。婦人病疫。經水適來。邪入血海。熱隨血下。自愈。小柴胡湯。加赤芍。丹皮。細生地。如結胸狀者。血因邪結也。宜刺期門穴。經水適斷。血室乍空。邪乘虛入。難治。柴胡養榮湯。孕婦病疫。隨症施治。以安胎保胎爲主。亦有宜用承氣湯者。反得母子。今俱慎勿生疑。掣肘也。

【瘟疫應用諸方簡註】

葱鼓湯（初起）
葱白豆豉
白虎湯（表證）
見前辛涼發散。清肅肌。表氣分藥也。

承氣湯（裏症）
解毒湯（解毒）
卽黃連解毒湯。均見前。
涼膈散（表裏均解）
見前。
雙解散（表裏均解）
荆防芩梔歸芍
桔草麻黃薄荷川芎
連翹石膏滑石白朮
三黃石膏湯（熱結）
芩連柏梔名黃連解毒湯。再加石膏豆豉麻黃。
梔鼓湯（虛煩）
見前傷寒方簡註。
清熱解毒湯（清熱）
白虎湯去粳米。加入人參。羌活。升

麻葛根。白芍。黃芩。黃連。生地。黃

入中黃丸(夾虛)

大黃三兩。人中黃。蒼朮。桔梗。滑

石各二兩。人參。黃芩。川連各一

兩。防風。五錢。香附一兩。五錢。爲

末丸。

達原飲(透邪)

黃芩。錢半。炙草。白芍。厚朴。草果

各一錢。知母。檳榔各二錢。薑七

片。棗一枚。此方能除邪。破結潰

散。募原之伏疫也。

黃龍湯(失下)

大承氣湯加參。草。歸。桔

薑。棗。

生脈散(生津)

見前

枳實養榮湯(痰滯)

知母。花粉。川貝。枳實。

橘紅。白芍。當歸。蘇子。

薑。

舉斑湯(透斑)

白芍。當歸各一錢。升麻五分。白

芷。柴胡各七分。甲片二錢。薑。

大柴胡湯

見前。

檳榔順氣湯(疫痢)

檳榔。白芍。枳實。厚朴。

大黃。薑。

導赤散(溺瀉)

見前。

茵陳蒿湯(發黃)

見前。

桃仁承氣湯(血蓄)

見前。

小柴胡湯(和解)

見前。

柴胡養榮湯(清血)

柴胡。黃芩。陳皮。甘草。

當歸。白芍。生地。知母。

花粉。

普濟消毒飲(大頭溫)

荅。連。陳。草。胡。桔

元參。連翹。升麻。薄荷

板藍根。馬勃。牛蒡子

頭瘟湯(同上)

川芎一錢。荆。防。桔各錢

半。柴胡七分。黃芩。歸尾各二錢

荆防敗毒散

見前傷風門。

生犀飲（瓜瓢蘊）

黃土二錢。犀角二錢。川連。蒼朮。各一錢。金汁半杯。茶葉一撮。

人中黃散（疔瘡溫）

辰砂。雄黃各錢半。人中黃一兩。爲末。薄荷。桔梗湯下二錢。

【古方雜選】

時邪傷肺。逆傳膈中。由衛入營。釀毒發疹。密如雲片。神昏遺溺。

是邪氣方張。陰氣已虧也。治議後方。

沙參。麥冬。牛蒡。連翹。

生地。五味子。丹皮。鮮藕。

菖蒲。鬱金。

小琴按。麥保肺陰。勞連泄。

醫藥顧問

卷三

溫疫概要

二一五

疹毒。地味。同腎氣。丹藕引入。

血分。菖蒲。開心竅。降熱痰也。

疫症。初起。誤補。壯熱。煩冤。齒焦。

唇黑。舌芒。刺昏。譫循。衣撮。空領。

顛手。戰脈。小數。此熱邪深。陷液。

潤風生。已顯瘵象。

生地六錢。鮮斛。天冬。各四錢。赤芍。元參。各三錢。連翹。梔子。知母。

各一錢。鮮藕二兩。石菖蒲。汁沖服。

疫癘。誤投五積散。煩渴昏譫。不寐。舌縮。唇黑。又誤進麻黃湯。肢

搖鼻。衄脈。數無度。蓋五積治傷寒。惡寒方中。薑桂蒼朴。皆燥熱

疫症。本不惡寒。服此。營液愈涸。

邪欲益熾。是抱薪救焚。又投麻

桂。強汗劫津。更傷表氣。與內陷。

熱邪。風馬不及。勢必痙厥。衄紅。

矣。勉議後方。

鮮生地。鮮石斛。各五錢。天冬。麥冬。各二錢。山梔。知母。赤芍。連翹。

各錢半。犀角七分。磨汁。蔗漿一。

杯沖。

小琴按。疫症。初起。惡寒。俗醫

不識。誤投辛熱表劑。往往而

然。故選入此方。以備一格也。

初春感疫。寒熱不時。頭脹而腫。

此鼻吸癘邪。襲入竅絡。目閉項

痛。失治。則結核潰膿。急須解散。

做普濟消毒飲。

升麻。柴胡。桔梗。薄荷。陳皮。連翹。甘草。再加山梔。

荊芥冬桑葉。

病起頭暈欲嘔。是穢邪從口鼻

吸入。壯熱肢冷昏譫多寐邪已

重灼心包。神明蒙閉。急宜開解

勿令竅閉。

羚羊角八分人中黃一錢豆豉

二錢梔心連翹心各錢半薄荷

一錢竹葉苾五錢菖蒲根汁五

匙沖服後汗出而解。

暑疫煩汗疹出目瞑舌焦脈洪

長症已傳胃。傲右頑以穢攻穢。

人中黃豆豉石膏犀角

磨汁沖銀花露沖梔子

知母

口鼻吸入癘邪頭暈腕痞煩熱

面紅適值經行連少腹亦脹悶

脈石小數左模糊。乃濕熱與氣

血混併。治宜上下分解。(一)

梔皮嫩桑葉枳壳栝蘆

霜鬱金杏仁薄荷人

參丹皮赤芍桃仁日二

服服前劑頭暈腹脹減但熱煩中

腕微痛猶是熱蒸濕痰阻氣且

煩出於肺防其變現斑疹用宣

通法(二)

枳壳栝蘆霜白蔻壳大

貝母杏仁丹皮赤芍

牛蒡子連翹燈芯

服第二劑汗出未徹紅疹稀疏

邪已外透渴不多飲而溺赤便

溇胸仍不寬脈仍小數濕熱尙

熾。法宜辛涼透熱於表。甘淡滲

濕於裏

薄荷豆豉通草牛蒡子

杏仁貝母栝蘆枳壳

赤苓滑石車前子燈

芯。

服第三劑諸症漸平但口燥飢

不思食乃病後胃津未復法宜

涼潤調養胃陰

麥冬石斛玉竹白芍

沙參薏仁茯神蔗汁

服此數劑而瘳小琴按綜此

三方和平中正步驟井然殊

可效法尙遇此症不幸而延

世俗庸醫毋寧檢閱是編抄

方市藥較爲穩妥也

時疫躁煩譫妄。舌黑齒焦。循衣撮空。此邪熱入營。將變昏瀜。爲棘手重症。議透營宣竅救液法。犀角五分。磨汁。鮮生地五錢。乾生地五錢。山梔連翹赤芍各二錢。鮮石膏蒲四錢。鮮藕西瓜翠衣各二兩。

如神。清舌潤去犀角。鮮生地。菖蒲。西瓜翠。加茯神二錢。燈芯八分。六一散六分。沖。

疫熱挾膽火上升。頭痛如裂。旬日外汗出熱減。煩渴震眩不解。脈虛面垢。此疫兼暑也。

羚羊角。天麻。嫩桑葉。薄荷。香薷。山梔。麥冬。花粉。石斛。燈芯。花。

如服後諸症悉平。惟液涸口燥。不思納食。宜調肺胃之陰。麥冬沙參。玉竹。白芍。生地。篇豆。

暑熱概要

小琴按。夏至前發爲溫症。夏至後發爲熱症。熱甚於溫。以白虎湯爲主方。但舌上苔滑者。有表邪。宜梔子鼓湯。渴欲飲水。口乾舌燥者。熱在裏。必耗津宜白虎加人參。惡寒煩渴腹滿。舌黃燥。或乾黑者。宜涼膈散。或承氣湯。熱兼暑濕。宜涼膈合天水散。小便不利。竹葉石膏湯。此治夏日熱症之大較也。若夫暑則入自口。

鼻與熱之由伏寒而化者。不同。蓋暑爲陽邪。感之者。尤阻上焦氣分。頭脹眩悶。漸至面垢。舌苔煩渴。自汗。或嘔噎。腹痛泄瀉。肢冷。倦怠。少神。經所謂熱傷氣也。蓋暑內擾於營。則汗上迫於肺。則喘。內干於心。則言多。可知暑邪始傷肺。繼傳心胞也。夫暑本屬火。兼風寒濕燥。則傳變爲疫痢霍亂。而條其淺深。同異。變症甚多。其感而不卽病者。至秋爲伏暑。皆華香巖氏宗河間三焦立法。在上以辛涼清解。竹葉連翹杏仁薄荷梔皮鬱金沙參鮮荷葉在中以辛苦宣

通。半夏瀉心湯之屬。在下以溫行寒性。質重開下。如桂苓甘露飲等。然更宜審其邪在氣分營分。若氣分宜。蒼白虎天水等。溫則從。二陳正氣等。若營分宜。清則犀角地黃湯。加入心之品。宜補則如三才湯。人參固本丸。復脈湯。又如濕熱沉混。蒼朮石膏湯。氣血兩燔。玉女煎。宜閉逐穢。至寶丹。牛黃丸。紫雪等。扶虛養正。參附湯。兩儀膏等。隨其變幻。審其陰陽。而治要得矣。

【暑之淺深變症】

(一) 靜而得之。爲「傷暑」。陰症也。或納涼廣廈。現症躁汗脈細。

宜清暑益氣湯。或過襲陰涼。現症惡寒。頭痛。肢體拘急。膚熱無汗。脈弦緊。宜消暑十全散。或外感暑。內傷生冷。腹痛吐利。宜正氣散。六和湯。或身熱溺濇。乃濕盛而氣不化。宜益元散。或煩熱頭痛。燥渴。乃濕蒸而熱耗津。宜麥冬湯。

(二) 動而得之。爲「中暑」。陽症也。或遠行熱傷。腎水喘渴。猝暈。用蒜搗汁。童便和服。醒後。隨症用藥。忌辛溫劑。

(三) 盛暑勞役而得者。爲「中喝」。頭痛壯熱。汗泄肌熱如火。大渴。此熱傷元氣也。益元散。白虎湯。或清暑益氣湯。若吐瀉不

宜涼藥。六和湯。大順散。
(四) 暑月房勞。兼啖膏粱。水果而得者。爲「內傷夾暑」。而垢無汗。惡寒。四肢厥逆。拘急。霍亂吐瀉。吐宜冷香飲子。瀉宜漿水散。倘「暑痿症」。即暑月膏粱之人。陽事頓痿。涼熱劑忌。偏用黃連解毒湯。合生脈散。

(五) 病暑忽手足搖擗。昏迷不醒。曰「暑風」。白湯。化蘇合香丸。灌之。醒。用黃連香薷飲。加羌活。嘔吐。前藥加陳皮。藿香。小便不利。加二苓。瀉滑痰多。加石菖蒲。薑汁。口渴。去半夏。加花粉。瀉利。加白朮。轉筋。加木瓜。腹滿身重。口噤。讞語。遺尿。乃熱兼喝也。白

虎湯。

(六)中暑手足逆冷。爲「暑厥」。二香散。或人參羌活湯。台香薰。飲昏躁。便閉。大小承氣加減。濕熱沉混。蒼朮白虎加滑石寒厥。理中四逆加減。

(七)暑熱劫陰。欬吐血。爲「暑擦」。六味湯加阿膠。麥冬。丹皮。或杏仁。西瓜。翠竹。葉。鮮石斛。(八)頭痛足軟。食少體羸。倦臥。煩熱。爲「疰夏」。乃元氣不足也。補中湯去升麻。加半芍。薏味沙參。肺胃陰虛。生脈散加玉竹。杞子。扁豆。石斛。

(九)傷濕又中暑。是爲「濕溫」。頭重脛冷。胸滿譫汗。發其汗必

醫藥顧問

卷三

暑熱概要

死。蒼朮白虎主之。又有冷水澡。浴。暑濕相搏。身痛發熱。自汗。五苓散加羌活。冒暑勞役。乘汗冷浴。身痺如針刺。間或赤腫。或發水泡者。六和湯加蒼朮。荆防。(十)暑傷腸胃。挾食挾濕。煩渴。溺赤。腹痛。陣瀉如水。桂苓甘露飲加減。是爲「暑濕」。若暑傷心脾。嘔瀉浮腫。霍亂轉筋。六和湯。暑熱引飲過多。致水暑交併。上吐下瀉。解暑三白散。(十一)暑月頭項赤痛。咽喉腫痛。或腿足痲痛。長數寸。不堪步履者。爲「暑瘍」。日夜發熱。敗毒散。濕熱入經。膝暑瘡。發泡黃連解毒湯。香薷飲。

(十二)暑邪內結。募原。至秋爲新涼。引動。爲「伏暑」。頭痛。腕悶。漸至唇齒乾燥。內熱甚熾。忽然鼻冷氣窒。仲景所謂熱深厥亦深也。宜山梔石膏天冬竹葉枳壳。栝蒌鬱金汁等。若初但氣分阻痺。宜治上焦。杏仁貝母薄荷米仁滑石通草半夏橘皮厚朴等。若延血分。神呆舌縮。鼻煤唇血邪已逆走。臚中當內閉外脫。石菖蒲犀角尖汁連翹元參鮮地銀花露等。或芳香逐穢宣竅。藿香佩蘭鬱金牛黃丸。至寶丹。紫雪等。若熱痰黏膩。竹瀝川貝。橘紅。栝蒌花。紛沙。參甘草。蔗梨汁。若正虛邪陷。神昏厥逆。溺短。

自利。中下焦均受。可參用六一四苓等。然總以清理上焦爲要。小琴按。總暑症淺深變症。凡十二候。計傷暑一。中暑二。中喝三。內傷夾暑四。暑風五。暑厥六。暑療七。疰夏八。濕溫九。暑瀉十。暑瘍十一。伏暑十二。更有普通『冒暑』者。偶或腹痛水瀉。係胃與大腸受之。宜香薷飲。若兼惡心。胃口有痰飲也。香薷飲下消暑丸。此暑病之輕者。故并表而出之。葉香巖曰。熱地如爐。傷人最速。暑期中病候。較平時爲多。若冀選錄古人方案。爲閱此編者。考查實錄。不勝錄。蓋由

於病多方亦多也。故僅僅揭熱症暑症之病况治要。閱者苟能細心紬繹。病候已大略。備治法亦應有盡有也。暑症應用方錄左。

【暑症應用諸方簡註】

半夏瀉心湯（見溫）

白虎湯（見中風）

天水散（見溫）

二陳湯（見中風）

藿香正氣散（見中風）

犀角地黃湯（見溫）

復脈湯（見中風）

玉女煎（見溫）

至寶丹（見中風）

牛黃丸（見溫）

香薷飲（見中風）

黃連解毒湯（見溫）

生脈散 見前

大小承氣湯（見溫）

理中湯（見中風）

六味湯（見中風）

神中益氣湯（見中風）

桂苓甘露飲（清熱）

肉桂伏苓猪苓白朮澤瀉。名五

苓散。加石膏滑石寒水石。名本

方。

三才湯（滋陰）

天冬熟地人參。名三才湯。加麥

冬生地。名蜜丸。名人參固本丸

蒼朮石膏湯（濕熱）

卽蒼朮白虎湯。見中風

紫雪丹（開竅）

黃金十兩。或真金葉。煮取汁一斗。去金入石膏寒水石磁石滑石各五兩。以四味搗入前汁。煮五升。去渣入犀角鎊羚羊角鎊木香沉香研各五錢。元參升麻各一兩六錢。甘草八錢。丁香搗一錢。以八味入前汁。煮取一升五合。去渣入芒硝焙硝各二兩。入前汁中。微火煎以柳木槌攪不住手。候熬至七合半。傾入盆中。半日欲凝入硃砂研細末。水飛五錢。麝香研一錢二分。攪勻候結成霜紫色鉛罐收貯。每服一分至二分。冷水或薄荷湯下。能治一切實火閉結狂越躁亂。

口舌生瘡

參附湯（回陽）

人參 附子

兩儀膏（補潤）

人參 熟地 熬膏 白蜜 收

四苓散（除濕）

白朮 茯苓 猪苓 茯苓 澤瀉 加桂 名五

苓散見前

消暑丸（滌飲）

半夏 茯苓 甘草 姜汁 糊丸

清暑益氣湯（傷暑）

黃耆 人參 白朮 蒼朮

神麴 青皮 陳皮 甘草

麥冬 五味 當歸 黃柏

澤瀉 升麻 葛根 黃棗

消暑十全飲（襲寒）

香薷 錢半 薏豆 厚朴 蘇

藳 赤蘇 藿香 木香 檀

香各一錢 甘草五分

六和飲（食傷）

香薷 厚朴 薏豆 甘草

赤茯苓 藿香 砂仁 木瓜

人參 半夏 杏仁 藿棗

麥冬湯（清燥）

石膏 知母 茯苓 白芍

山梔 竹茹 麥冬 白朮

薏豆 人參 陳皮 烏梅

蓮子 甘草

大順散（夾暑）

乾薑 杏仁 官桂 甘草

冷香飲（內傷）

生附子 草果 橘紅 甘草 各

一錢。薑五片。水煎冷服。

漿水散(溫裏)

肉桂。附子。乾薑。甘草各五錢。良薑。半夏各二錢。半漿水即淡醋。

上藥爲末。以淡醋調服壹錢。

二香散(暑厥)

香附。香薷各二錢。蘇葉。蒼朮。陳皮各一錢。厚朴。扁豆。甘草各五分。木瓜二片。葱薑。

人參羌活散(暑風)

二活。二胡。參。苓。芎。草。枳殼。桔梗各六分。天麻。地骨。薄荷各三分。

四逆湯(回陽)

生附子。乾薑。甘草。葱。冷服。

玉龍丸(久瀉)

硫磺。硝石。滑石。明礬。

水丸。

解暑三白散(暑瀉)

茯苓。白朮。澤瀉各二錢。薑三片。

燈芯二十莖。

香朴飲(瀉煩)

香薷。厚朴。扁豆。甘草。

赤茯苓。澤瀉。陳皮。木瓜。

半夏。人參。烏梅。蘇葉。

薑棗。

連理湯(理中)

理中湯。加茯苓。黃連。

桂苓丸(止瀉)

肉桂。茯苓。蜜丸。

縮脾飲(祛暑)

砂仁。錢半。草果。烏梅。香薷。甘草各一錢。葛根。扁豆各七分。薑五片。

荆防敗毒散(暑瘍)

人參。敗毒散。見前。此加荆芥。防風。

清燥湯(濕溫)

人參。黃耆。白朮。茯苓。

甘草。當歸。麥冬。五味。

生地。升麻。豬苓。神麴。

柴胡。蒼朮。黃柏。澤瀉。

黃連。陳皮。

溼概要

小琴按經曰。諸濕腫滿。皆屬於脾。又曰。因於濕。首如裹也。

蓋濕爲冷邪。重濁有質。外爲霧露之侵襲。內爲水穀之停滯。皆足以致病。茲將諸濕中人之候。條分如左。

【濕阻上焦】

皖悶頭脹不飢。溺瀼治宜開肺。氣通膀胱。桔梗。通草。滑石。半夏。栝蘘。厚朴。杏仁。薏仁。薏苡。茯苓。香豉。竹葉等味。

【濕滯中焦】

濕熱阻滯腸胃。大便不爽。宜主溫通佐淡滲。枳殼。砂仁殼。橘白。草果。藿香。半夏麴。大腹皮。

猪苓。澤瀉等味。

【濕痰阻竅】

濕鬱蒸痰神呆語塞。宜主開鬱。佐辛香。鬱金。石菖蒲。厚朴。半夏。佩蘭。銀花。茯神。栝蘘。枳殼等味。

【濕流關節】

體痠骨痛不利屈伸。獨活寄生湯。羌活勝濕湯。其夾風者。煩熱拘急。防風湯。夾寒者。攣痛浮腫。五積散。加減風寒濕合則成。痺當另治。

【風濕】

一身盡痛。頭重鼻塞。或瀉利。或下清血爲風木之邪。內于濕土。

尤神湯。脈浮身重。汗出惡風。防已黃耆湯。身痛除濕羌活湯。

【濕熱】

溺赤引飲自汗。宜主清火。佐分利。清熱滲濕湯。或小分清飲。濕盛身痛。溺瀼體重。發渴。五苓加羌活身黃。溺瀼腹微滿。茵陳湯。身黃溺瀼。五苓加茵陳。煩熱溺瀼而渴。桂苓甘露飲。濕熱相搏。清熱滲濕湯。肩背重。肢節痛。或遍身痛。腳膝腫痛。屬外因之濕。熱當歸拈痛湯。內因濕熱。則水腫。小便不利。五苓散。神芎丸。陰虛多火。兼遺精者。係濕襲精竅。虎潛丸。加白朮牡蠣。有氣如火。從脚下起。入腹屬濕鬱成熱。二

妙丸加牛膝防已。

【寒濕】

溺清便利。身痛無汗。關節掣痛。宜溫利七味滲濕湯。五苓散。脈虛者。宜溫補。理中湯。加茯苓。米仁。四肢浮腫。不利。屈伸。大便溏。除濕湯。或升陽除濕湯。腰痛。身重。小便不利。腎著湯。如寒熱之氣外中。而非內生之濕。宜溫散。五積散。或加味五苓散。

【暑濕】

溽暑釀濕。嘔吐瀉利。六和湯。先傷濕後中暑。脛冷胸滿。頭重。譫汗。此名濕溫。切不可汗。蒼朮白虎。

【中濕】

關節重痛。浮腫。喘滿。腹脹。昏悶。不知人。屬中濕。除濕湯。破傷。深浴。傷濕。名破傷濕。神昏。口噤。肢強。體重。白朮酒。或用煨牡蠣粉。二錢。甘草湯調服。再取粉敷創口。頗效。

【濕症應用諸方簡註】

至寶丹（見中風）

除濕羌活湯（同上）

神朮散（傷風）

五苓散（見溫）

桂苓甘露飲（見暑）

六君湯（見中風）

異功散（同上）

虎潛丸（同上）

理中湯（同上）

六和湯（見暑）

蒼朮白虎湯（見中風）

清燥湯（見暑）

平胃散（見中風）

胃苓湯（見中風）

二陳湯（見中風）

實脾飲（寒濕）

白朮。茯苓。甘草。厚朴。

大腹子。草薢。木香。木瓜。

附。泡。薑。棗。

勝濕湯（風濕）

羌活。防風。蒼朮。甘草。

黃連。黃柏。豬苓。澤瀉。

獨活寄生湯（經絡）

獨活。桑寄生。熟地。人參。

茯苓。牛膝。杜仲。秦艽。

白芍。當歸。細辛。防風。

甘草

羌活勝濕湯(風濕)

羌活。獨活。各一錢。川芎。薑本。防

風。甘草。各五分。蔓荊子。三分。

防風湯(夾風)

防風。葛根。羌活。秦芫。

桂枝。甘草。當歸。杏仁。

黃芩。薑酒煎。

加減五積散(夾寒)

芩。夏。陳。草。麻黃。白

芷。川芎。當歸。乾薑。桔

梗。赤芍。蒼朮。厚朴。

防已黃耆湯(惡風)

防已。黃耆。白朮。甘草。

黃棗

清熱滲濕湯(濕熱)

黃柏。川連。茯苓。澤瀉。

蒼朮。白朮。甘草。

小分清飲(濕滯)

茯苓。澤瀉。猪苓。薏米。

枳殼。厚朴。

茵陳蒿湯(發黃)

茵陳。大黃。梔子。

當歸拈痛散(外因)

二朮。二苓。參。羌。葛。

升。歸。知。防。茵。苦參。

神芩丸(導水)

黃芩。川連。川芎。大黃。

薄荷。滑石。牽牛水丸。

二妙丸(濕火)

黃蘗。蒼朮。

味滲濕湯(溫利)

蒼朮。白朮。炮姜。茯苓。

丁香。橘紅。炙草。

除濕湯(寒濕)

六君湯。薑。蒼朮。腹皮。

升陽除濕湯(寒瀉)

升麻。柴胡。神麴。澤瀉。

腎著湯(腎虛)

炮姜。茯苓。白朮。甘草。

如溺亦便糖加蒼朮陳皮丁香。

加味五苓散

五苓散加羌活

白朮酒(傷濕)

白朮一兩酒三杯煎一杯。

芩薑朮桂湯(腹滿)

芩。薑。朮。桂。

葛花解醒湯(酒濕)

葛花 砂仁 蔻仁 木香

青皮 陳皮 人參 白朮

茯苓 神麴 乾薑 猪苓

澤瀉

蒼朮丸(止瀉)

茯苓 蒼朮 厚朴 白芍

炙草 川椒 茴香 破故紙

糯米粥九

【古方雜選】

溽暑蒸濕水穀聚濕致胸脘煩

悶呃逆嘔吐口甜燥手心熱頭

汗舌白不飢便溏溺少由濕邪

瀰漫胸膈間鬱蒸成熱所服湯

飲變濁瘀上泛脈息亦三五不

調治宜辛以通壅苦以降逆

佩蘭 香薷 白蔻 公丁香

柿蒂 鬱金 半夏麴 枳

壳炒 杏仁炒

按口甜經名脾瘰用蘭草除

陳遵經旨立方也

服前方脾瘰除嘔呃猶作惟一

切較減改用後法採清輕淡滲

例

淡竹茹 通草 滑石 石斛

萹霜 象貝 赤苓 藿梗

燈芯

受水濕者跗腫潰今懋遷瀕海

潮溢之區更冒時邪身痛頭暈

嘔噦乃濕阻氣分治者又誤汗

劫液繼用消導遂致熱渴脘悶

呃逆自利不思濕家忌汗消導

更劫胃津復妄投丁香參甘翼

以止呃溫補詎能利濕議先疏

解再滲利俾氣機升降如常法

列后

豆豉 枳壳 梔皮 萹皮

製夏 藿梗 通草 茯苓

猪苓 荷葉

如前症悉減尙或嘔渴乃中焦

水穀之氣不運使然

半夏 橘白 茯苓 杏仁

薏苡 花粉 砂仁

客路感邪熱上壅嘔渴頭重

痛脈浮濡此熱蒸濕伏也治先

宣解表分風熱不與濕搏

牛蒡 薄荷 桔梗 山梔

甘菊 桑葉 赤苓 薑皮

頭蒙如裹。胸悶便艱。腑氣失降。以濕鬱論治。

通草。白蔻壳。枳壳。萹霜。

川芎。山梔。杏仁。半夏。

淡竹葉。冬桑葉。

絡熱蒸痰。腮緊口甜。脈沉濡。左

寸差大。此風熱鬱於膽絡。兼脾

有濕痰壅熱。而為脾瘰也。

鉤藤。絲瓜絡。桔梗。連翹。

象貝。薄荷。鮮佩蘭。橘

紅。鬱金。

酒肉之濕助熱。內蒸釀痰。阻塞

氣分。便溺不爽。亦三焦病。先論

上焦。莫如治肺。以肺主一身之

氣化也。(濕阻上焦)

飛滑石。白蔻仁。杏仁。括

萹皮。半夏。川朴。

酒客濕勝。變痰化火。性不喜甜。

熱聚胃口。犯肺氣逆。吐食上中

濕熱。主以淡滲。佐以苦溫。(同

上)

大杏仁。金石斛。飛滑石。

川朴。活水蘆根。

濕溫阻於肺衛。咽痛。足踳痺腫。

當清上焦。濕走氣自和。(濕溫

阻肺)

滑石。竹葉。連翹。桔梗。

射干。蘆根。

陽虛挾濕。邪熱內陷。所以神識

如蒙。議用瀉心法。(濕熱內陷)

人參。生乾姜。黃芩。川連。

枳實。生白芍。

舌白目黃。口渴溺赤。脈象呆鈍。

此屬濕鬱。濕阻中焦。陽氣。

綿茵陳三錢。生白朮一錢。寒水

石。飛滑石各三錢。桂枝一錢。茯

苓皮三錢。木猪苓二錢。澤瀉一

錢。

脈緩身痛。汗出熱解。繼而復熱。

此水穀之氣不運。濕復阻氣。鬱

而成病。仍議宣通氣分。熱自濕

中而來。徒進清熱。不應。同上。

黃芩。滑石。茯苓皮。大腹

皮。白蔻仁。通草。猪苓。

穢濕邪吸受。由募原分布三焦。

升降失司。脘腹脹悶。大便不爽。

當用正氣散法。(濕邪瀰漫三

焦)

藿香梗。厚朴。廣皮白。苦
光杏。茯苓皮。神麴。麥芽。

西茵陳

淳酒水濕傷中。上嘔食下泄。脂
液陽氣傷極。再加浮腫作脹。則
危。(酒濕傷陽)

人參。茯苓。熟附子。生於
朮。生白芍。生薑。

燥火概要

小琴按天氣肅而燥勝精血
奪而燥生燥者陽明秋金之
化也。在上乘肺為燥。欬肺中
有火為乾。欬。內外合邪。為肺
痿。欬唾胃中燥熱。善消水穀。
燥乘大腸。使結氣。祕濁陰不

降。且血虛外燥。皮膚皴揭。筋
急。爪枯。肺燥。亢熱。百骸失榮。
手足痿弱。婦人臟燥。悲傷欲
泣。恆人感燥。口舌乾裂。多由
燥火銷鑠。真陰。血液不能相
劑也。古書無秋傷於燥。明文。
喻西昌出。毅然決然。闡發其
旨。立清燥救肺湯。為後世法。
誠軒歧之功。臣仲聖之良佐。
哉。第燥多屬外因。而內因之
火。較燥為烈。試述如下。
經曰。諸熱瞽。皆屬於火。又
曰。諸禁鼓慄。如喪神守。皆屬
於火。諸躁狂越。皆屬於火。諸
病踴腫。酸痛驚駭。皆屬於火。
可見火自內生。病屬動而非

靜。在丹田之下者為少火。少
火則生氣。是為真火。離丹田
而上者為壯火。壯火則食氣。
是為邪火。更有實火虛火。濕
火。鬱火。陰火。五臟六腑。火遊
行不歸經之火。一切諸火。皆
能致人病。故東垣謂火為元
氣之賊也。

燥火治法條列如后

【燥症】

【燥氣乘肺燥欬】宜俞氏清燥
救肺湯

霜桑葉三錢。杏仁七分。麥冬二
分。石膏二錢。半人參七分。阿膠
八分。胡麻甘草各一錢。枇杷葉
一張。此俞氏原方。分量悉仍其

舊。

小琴按麥冬二分者。麥冬分量非輕。而用二分。閱者多疑為二錢之誤。其實非是。蓋其主藥為桑葉三錢。麥冬當作三分中之二分。解杏仁七分。當是二錢一分也。

【肺中有火】乾欬宜瓊玉膏。

地黃四斤。茯苓十二兩。人參六兩。白蜜二斤。先煎二味。以蜜收膏。

【內外合邪】宜千金麥門冬湯。麥冬二錢。桔梗。桑皮。夏生地。紫苑。竹茹。麻黃各七分。炙甘草五分。五味子十粒。薑一片。

【肺痿欬唾】宜仲景炙甘草湯。

方見前傷寒簡註。

【燥傷胃陰】宜金匱麥門冬湯。

麥冬。半夏。人參。甘草。粳米。大棗。

【胃燥有死血】胃翻便秘。宜丹溪韭汁牛乳飲。

韭汁。牛乳。有痰加薑汁。血膈去乳加陳酒。

【善消水穀】宜丹溪消渴方。

黃連。花粉。生地汁。藕汁。牛乳。

【大便燥結氣祕濁陰不降】宜東垣通幽湯。潤燥湯。玉函麻仁丸。選擇。

【通幽湯方】

當歸。升麻。桃仁。紅花。

當歸。白芍。熟地。天冬。

甘草。生地。熟地。或加栝

榔末。

【潤燥湯方】

大黃。歸尾。桃仁。麻仁。升麻。紅花。生地。熟地。

【麻仁丸方】

厚朴。白芍。枳實各二錢。大黃四錢。麻仁。杏仁各錢半。煉蜜為丸。

【風祕血燥】宜東垣潤腸丸。加郁李仁。防風。

麻仁。桃仁。羌活。羌活。

當歸。大黃。皂角。秦芫蜜丸。再加郁李仁。防風。名潤燥丸。

【津枯祕結】宜丹溪潤燥生津湯。加麻仁。

當歸。白芍。熟地。天冬。

當歸。白芍。熟地。天冬。

當歸。白芍。熟地。天冬。

當歸。白芍。熟地。天冬。

當歸。白芍。熟地。天冬。

當歸。白芍。熟地。天冬。

麥冬。栝蒌。桃仁。紅花。

【血枯膈噎便結如粟】宜生料

六味丸去山萸。

加首烏當歸。或加肉蓯蓉。桃仁。

搗水煎服兼食人乳酥蜜。

【六味丸】方見前

【血燥風動】宜滋燥養榮湯。治

外大補地黃湯。

【滋燥養榮湯】

當歸。生地。熟地。白芍。

甘草。黃芩。秦艽。防風。

【大補地黃湯】

二地。山藥。萸肉。杞子。

白芍。當歸。元參。知母。

黃柏。茯苓。蜜。

【熱亢液燥手足痿弱】宜虎潛

丸。

【虎潛方】見前

【婦人臟燥悲泣】宜仲景甘麥

大棗湯。

甘草。小麥。大棗。

【火灼真陰血燥】宜滋燥飲。生

血潤膚飲。

【滋燥飲】

秦艽。花粉。白芍。生地。

天冬。麥冬。蜜。或加人乳

牛乳。梨汁。蔗汁亦可。

【生血潤膚飲】

二地各二錢。二冬錢半。歸薯各

一錢。黃芩。桃仁。栝蒌各五分。紅

花一分。五味子九粒。

【火症】

【上焦熱】宜清心湯。加減涼膈散。

【清心湯】

甘草七分。連翹。山梔。薄荷。黃連。

黃芩。大黃各七分。朴硝五分。竹

葉七片。白蜜一匙。

【加減涼膈散】

涼膈方見前。再加桔梗。竹葉。減

大黃。芒硝。

【中焦積熱燥渴便閉】宜涼膈

散。

方見前。

【三焦火盛躁狂吐衄】宜黃連

解毒湯。

方見前。

【陽明潮熱】宜白虎湯。

方見前。

【卜焦火瀉血淋閉】宜立效散。

瞿麥四錢。山梔二錢。甘草一錢。

薑一片。燈芯五條。

【血分火毒】宜四順清涼飲。

蒸大黃。赤芍。歸身。草炙。

各錢二分。

【虛熱傷脾】宜補中益氣湯。

方見前。

(以上實火)

【思慮房勞火亢傷腎】宜六味

地黃湯。

方見前。

【火升躁渴虛陽無附】宜八味

丸料煎服。

方見前。

【產後發熱口渴面紅】屬無根之火。宜獨參湯。

人參水煎。(小琴按宜加重便

一杯。

(以上虛火)

【濕熱腫脹溺閉】宜胃苓湯。

方見前。

(以上濕火)

【肌熱心煩及食冷遏抑脾陽】

宜升陽散火湯。

升麻。葛根。二活。參。芍。

各一錢。柴胡。甘草各七分。

防風五分。

【手心烙熱】宜火鬱湯。

葛根。升麻。白芍。人參。

羌活。銀胡。甘草各一錢。

防風五分。葱三條。(一方無人參)

【血虛下部骨蒸】宜五蒸丸。四

物湯加味。

【五蒸丸】

青蒿。薑便。浸。地骨皮。生地。

石膏各一兩。當歸七錢。

胡黃連五錢。鼈甲一個醋製。

蜜丸。

【加味四物湯】

四物見前。加丹皮。山梔。柴胡各

一錢。

【血中伏火】宜加味四物湯。

方見上。

【風勞骨蒸】宜秦羌鼈甲散。

蒼朮。歸。苓。草。地。芍。

羌。胡。鼈甲。天冬。地骨。

桑皮。紫苑。知母。半夏。

人參。薑。

(以上鬱火)

【火起臍下】宜大補陰丸。坎離

既濟丸。

【大補陰丸】

黃柏。知母。各鹽水炒四兩。熟地。

龜版。酒炒六兩。猪脊髓。蒸熟。蜜

丸。

【坎離既濟丸】

二地。萸肉。牛膝。天冬。麥冬。各四

兩。白芍。五味。山梔。龜版。各三

兩。當歸。知母。黃柏。二兩。川

芎。一兩。蜜丸。鹽湯下。

【火從足下入腹虛極難治】宜

七味地黃丸。

方見前外以附子研末。敷足心

湧泉穴。

(以上陰火)

【火起於肺】宜瀉白散。清金丸。

(氣鬱)

【瀉白散】瀉肺經氣分之

火

桑皮。地骨。各一錢。甘草五分。粳

米百粒。

【清金丸】瀉肺金血分之

火

黃芩炒研水丸。

【大怒肝火】宜加味逍遙散。加

青皮。膽草。

歸。芍。朮。芩。胡。各一錢。

甘草五分。薑薄荷。少許。名逍遙

散。加丹皮。梔子。再加青皮。膽草。

【脾】弊飽火。宜瀉黃散。加白芍

枳殼。

防風四兩。藿香七錢。山梔一兩。

石膏五錢。甘草二兩。蜜酒調服。

【心】恍惚思慮火。宜導赤散。清

心蓮子飲。

【導赤】見前溫

【清心蓮子飲】

蓮子二錢。人參。茯苓。薏各一錢

黃芩。麥冬。車前。地骨。甘草。各七

分。

【腎】房慾火。宜八味丸。

方見前。

【清胃散】

生地。丹皮。川連。當歸。

升麻（一方加石膏）

【通幽湯】

見前燥。

【八正散】

車前。木通。瞿麥。蕭蓄。

滑石。甘草梢。山梔。大黃。

燈芯

【大補丸】

黃柏。鹽酒炒。研米粥和丸。血虛

四物湯下。氣虛四君子下。氣血

虛八珍下。

【游行之火】或散。或清。或降。

無定方。

六腑火

胃火	牙疼頤腫	宜清胃散
膽火	眩暈口苦	宜羚羊桑梔翹龍
大腸火	便秘不通	宜通幽湯加槐米
小腸火	癰閉淋瀝	宜八正散加減
膀胱火	腹痛溺瀉	宜大補丸
三焦火	肢熱體倦	宜上梔中翹下地骨
心胞火	怔忡不安	宜麥丹犀翹菖燈

小琴按此治火症之大概也。至於五志之火。起於五位。列表如下。

肺 (降) 黃苓清肺飲 (調) 人參平肺散

心 (泄) 瀉心湯 (養) 補心丹

脾 (發) 瀉黃散 (升) 補中益氣湯

肝 (平) 左金丸 (折) 龍薈丸

腎 (補) 六味地黃湯 (相火) 滋腎丸

虛 (清) 人參竹葉湯 (補) 保元湯盛而狂亂 (從治) 生薑湯

實 (瀉) 三黃湯

痰 (滌) 淡竹茹湯

火 (散) 發鬱湯

鬱

一切壯火狂陽。痰壅心胞。內外熱熾。以紫雪丹平之。

【紫雪丹】

方見前。

積熱煩躁。咽腫口瘡。主以碧雪。寒水石。芒硝。朴硝。焰硝。馬牙硝。石膏。青黛。甘草。

各等分。先將甘草煎湯去渣。入前藥再煎。用柳木槌攪不住手。入青黛和勻。傾入砂盆內。候冷結成霜。研末。每用少許。含化津咽。如喉閉。用鵝翎管吹入喉中。神效。

【五志火以下諸方備檢】

【滋腎丸】（相火）

黃柏二兩。知母一兩。俱酒炒。肉

桂一錢。蜜丸。

【都氣丸】火喘

六味丸加五味子三兩。

【黑錫丹】（氣衝）

黑鉛。硫磺各二分。將錫鎔化入。硫磺候結成片。傾地上。出火毒。研至無聲為度。

【黃芩清肺飲】降肺火

黃芩。山梔。或加鹹豉。

【人參平肺散】

人參。青皮。天冬各四分。茯苓七分。陳皮五分。地骨。炙甘草各五分。桑皮一錢。五味子十一粒。加薑煎。

薑煎。

【瀉心湯】（瀉心）

黃連一味濃煎。

【天王補心丹】（養心）

生地四兩。人參。元參。丹參。茯神。桔梗。遠志各五錢。天冬。冬棗。仁。柏子仁。五噉子。當歸各一兩。蜜丸。彈子大。硃砂為衣。

【左金丸】（平肝）

黃連六兩。薑汁炒。吳茱萸一兩。鹽水泡水丸。

【龍薈丸】（瀉肝）

當歸。龍膽草。山梔。川連。黃柏。黃芩各一兩。炒。大黃。青黛。蘆薈。五錢。木香。二錢。麝香。五分。蜜丸。

【人參竹葉湯】（虛火）

石膏。麥冬各二錢。半夏一錢。炙甘草。人參各五分。竹葉七斤。粳米一撮。

【保元湯】（補虛）

人參、黃耆、白朮各一錢、炙草六分、陳皮五分。

【三黃湯】（實火）

黃連、黃芩、大黃。

【淡竹茹湯】（痰火）

麥冬、小麥各二錢、半夏錢半、茯苓、人參各一錢、甘草五分、竹茹二分、薑棗。

【紫雪】（火熾）

方見前。

發鬱湯（鬱火）

升麻、葛根、羌活、柴胡。

細辛、香附、葱白。

千金朴硝煎（丹毒）

朴硝一斤、芒硝八兩、石膏。

二兩。寒水石四兩。

先將二硝入湯中攪令消化。以紙封一宿。取清納銅器中。另搗二石碎如豆粒。以絹袋盛之。入汁中以微火煎至沫起。以箸投之。著箸如雪凝。白卽傾瀉盆中。待凝取出。日乾。如積熱成悶。不已者。以方寸七白蜜一合。和水五合。攪和令消頓。服日二次。熱定卽止。

小琴按此治丹石藥毒發渴壯熱者。如實火大便鞭者。亦可斟酌用之。

醫藥顧問

卷三

燥火概要