婦人大全良方

壹

共八

世之醫者於婦人一科有專治婦人方有產寶方治以專言治專攻也方以寶言愛重之也蓋醫之術難醫婦人尤難醫產中無治則又隕而難彼其所治專治者產寶者非不可用也綱領交漫而其統節目譯略而未備醫者置於簡易不能深求編覽有才進一

方不效輒來手者有無方可據揣摩臆度者
有富貴家鄙菜賤而不服者有貧乏人憚菜
貴而无可得服者有醫之貪利以賤代貴失
其正方者古云看方三年无病可治之病三
季無藥可療又云直無難治之病有不善治
之醫菜無難代之品有不善代之人此之謂
也僕三世學醫家藏醫書若干卷既又徧
行東南所至必盡宏方書以觀暇時閑淨
室繙閱涵泳究極未合採摭諸家之善附以
家傳經驗方秤而成編始自調經訖于產後
凡八門門數十餘澧總二百六十餘論之後
有藥之不惟與貴賤惟與效綱領節目燦

然可觀庶幾病者隨索隨見隨試隨愈僕
於此編非敢求異者人也蓋亦補其偏而會
其全聚於散而斂於約期決無憾云愚者
千慮必有一得君子毋以人廢言者嘉點
元年八月良日建康府明道書院醫諭
臨川陳自明良文序

新編婦人大全良方綱目

凡八門

調經門 凡醫婦人先須調經故以爲初

衆疾門 經脉不調衆疾生焉故以次之

求嗣門 衆疾既無須知求嗣故以次之

胎教門 胎教已明須知胎教故以次之

姙娠門 姙娠疾病故以次之

坐月門 知坐月已明須知坐月故以次之

產難門 產難已明須知產難已明須知產後疾病故以次之

產後門 產後疾病故以次之

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗麤者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各不同今開于前無復更註于逐方之下

辰砂（如鏡面箭鏃者為上）
雄黃（如雞冠通明者為上）
雌黃（無夾石者為上）
石硫黃（赤如鵝兒黃色為上）
伏龍肝（正對釜下生石亭脂者名是也）

大陰玄精石
禹餘糧（已上並研令極細如麪無聲為妙）
代赭石（磁石極雄者妙）
紫石英（有紫色如節鏃者為上）

雲母石　太一餘糧

已上並用火煆令通赤釅醋淬如此七次或十次方可研令極細如麪或用水飛尤妙

赤石脂　白石脂　陽起石

崧如狼牙者產於此地方可用若是鋪茸茁角者不可用已上並用火煆一伏時研如麪或有生用者

青蠓石

每一兩用硝石二兩大銀鍋子內煆一日一夜自然解散研如麪仍用水飛為妙

梁上麋

炒令烟盡研如粉

絳礬　青礬

並生研細

白礬

枯過亦有生用者

石膏

如無眞者以方解石代之凡諸石入湯並碎以綿裹

滑石

出桂府者明白而堅者方可用若赤色而暗者是吉州所產色黑者名鱉石皆不可用

蘇合香油

先用生布絞去淳秤却用煉熟蜜解開用

竹茄

輕輕刮淡竹皮是也其葉如祐對節而生根冬不凋复生小花用之

桑寄生

僕隨倉使吳常丞寓廣州方識此物枝梗類木

木通

有川木通有錢子木通即奇效剉細用之所用者力淺但得隨衆宜

罌粟殼

去頂蒂節膜淨洗蜜水淹一宿炒令集黃

阿魏

以麪搜和成餅炙黃用

葛根

當用家葛切片曬乾用今人多取於鋪家者乃野葛也有大毒能動胎氣多見醫者

贖鋪家見成升麻葛根湯孕婦服之動了胎孕小兒藥中亦不宜用

麻黃

煉小者為上去根節若以止汗用根以水煮去黃沫焙乾不爾令人煩燥

人參

棟色黃明瑩裏面有澤而不油者為上本草云不去蘆則吐人仍煎煮喜何水

北細辛

棟直而極細味辛

地榆

棟如川椒者為上

葳靈仙

柴胡

前胡

羌活

獨活

宣用紫色蘆有蠶頭節稀者為上王子亨云獨活乃是極大羌活自是有細如鬼狠狀尋常白色者乃是老宿前胡謹不可用本草經云二物同一

類今人以紫色節密者為羌沽黃色作鬼者為
獨沽又云獨沽即羌沽母類也療凡宜用獨沽
兼水宜用羌沽

白薇

紫苑 取茸蘆如北細辛者良以
宰山出者為上沂兗次之鄆以東市上皆有之
形色氣味悉與神農本經唐注曰華子相應此
藥肺病最為急須今京師所有皆車前草施覆
花根以赤土染之又味醎大抵醎走血又能熱
中復利小便旦肺病本因亡津液而得之
今又服走津液藥為害茲醫者宜思之

秦艽

茜根

藁本

升麻

漏蘆

防風 棟軟而裏面有澤蘆似蠶
頭者為上去叉股蘆

桔梗 今人多以薺苨為之要棟味苦肥白者為上或生或
炒皆有用

木香 已上並洗去苗蘆細切曬乾秤用
草謂之採棟如朽骨氣味辛辣甚者為上近時川人
香不堪入藥凡方書云用生木香者皆當南木香
南雲根以乱真其性大寒利大小便本
青木香證類謂之獨行根又云土青木

沉香 種類不一惟色黃而沉者為上

檀香

白芷

丁香

官桂 愈嫩則愈厚愈老則
愈薄仍用紫色緊卷者去皮至有油處別為末用

荊芥

薄荷

紫蘇

藿香

諸香藥並不可見火或急甲宜多紙裹懷
煤用

北艾 先去梗焙燥碾爛以馬尾羅隔去灰末只留黃先秤分兩却用糯米粉打糊捏成餅
子炙黃用或以酒炒亦可

敗醬 即今之苦薺足也

唱起草 即蒼耳也

澤蘭葉

紫蘇

藿香

荊芥

薄荷

香薷 音香

栢葉

茵芋

大青

莽草　樗枝　菴蔄

石楠葉　石韋去毛　枇杷葉先用溫水浸制

去毛却用姜汁炙

已上並去梗取葉以紗膈去塵土惟紫蘇

藿香飲藥中宜兼嫩梗大能下氣

黃連宣棟大而似鷹爪者尤佳　石菖蒲一寸九節者佳此種類甚多取生於石上葉有劒脊者眞無劒脊者名溪蓀生於泥中者名昌陽可解巴豆毒二味並去鬚細切白舟

上茴香　北茴香　葫蘆巴漕炒

破故紙　蛇床子　薏苡仁

紫蘇子除是自種自收方是眞者可以代病雖云細而香者是眞近來人多採野蘇子以乱其眞蘇葉按其子亦。小却以令香更不可辨

菴蔄子

葶藶子甜者棟細而脆者眞要分甜苦

黑牽牛亦有半生半炒

牛蒡子　芫花醋浸過炒今黃色去梗

已上並隔紙炒香

五味子色黑肉有年腎者佳入補藥中宣炒用入嗽菜中宣生用

木鼈子去殼切以麪炒　巴豆川中來者似菘子而差小者為上去殼及皮心用皮紙裹折去油如此者三五次油方盡或有不去油者

車前子

兔絲子二味先用溫水淘洗去泥沙涳乾以好酒浸四五日蒸四五炊研令極爛捏成餅子焙乾方可為末

香附子

金毛拘

骨碎補並細切炒令黃色舂擦去毛令淨方秤

石斛棟色黃如金大者去根皮細切用好酒浸一宿蒸一炊久慢火炒燥秤用

卷栢

甘松並洗去根土用

肉蓯蓉棟香而把有麟甲分明者仍其端有心者方眞有鹽霜者勿用

當歸棟如馬尾重半兩已上氣香味甜者為上微炒

川牛膝棟如鼠尾軟而甜者為上

並去蘆酒浸半日不可大過久則失味洗
淨慢火焙乾切方秤分兩

五加皮　桂心 補藥用厚者 發散用薄者
海桐皮　黃蘗皮　楊梅皮
白鮮皮　杜仲　厚朴
桑白皮 或炙炒今人多以梏樹根皮為偽最要子細辨
並削去粗皮細切方用惟杜仲厚朴每一
斤用生姜一斤研取自然汁浸一宿次日
炒令黃色

甜瓜子　瓜樓子　冬瓜仁 去皮
杏仁 却用水煮一二沸去皮以麥麩炒黃秤用　桃人　郁李仁 并先去尖雙仁
酸棗仁 去皮炒香用

栢子仁 棟去殼別炒研用　皂角 去皮弦子酥炙　川椒 棟色紅而
口白卒香者為上去棱目及閉口者然後慢火炒令色變以紙采於地上椀覆出汗為度
山梔 小者佳名越桃　縮砂　白豆蔻
益智 佳　草菓 並去皮取仁秤　檳榔 如雞心者
大腹子 二味生用　肉豆蔻 三味
山茱萸　呵子 炮去核取
麪裏炮令麪黃為度　川練子 蒸去皮核炒　大黃 濕紙裹煨
肉秤雙核者名訶梨勒獨核名訶子　三稜 亦有以紅蒲根為偽者
令香熟亦有酒洗生用　蓬莪茂 二味並用濕紙裹炮令香軟細切或更用醎醋浸半日用　欝金
狼毒　紫荷車 三味並洗切焙　神麯
半夏麯 黃用　麥牙　穀牙 並擣碎炒
白薑 出大通池州者尤佳　天雄 童兩半已

上有象眼者佳

附子 棟圓而堅實者為上

草烏

川烏 重七八錢如鵝腦者為上

五味並用灰火炮裂去皮尖臍用

天南星 重一兩者佳忌用虎掌炮去皮或以白礬水浸一二宿

吳茱萸 去枝一葉

半夏

二味並用湯泡七次

半夏麯 以洗過半夏為末以生薑自然汁捏為餅子炙黃用

生地黃 洗焙乾秤亦有研取自然汁

熟地黃 溫水淨洗好酒發濕乘於甑上蒸再用酒西九蒸九曝焙燥秤地黃生者平宜熟者濕補虛人須補藥當用熟本草云男子宜用熟者女人宜用生者

滴乳香 用蜂粉略炒掛窻孔中風乾研

延胡索 去皮根

貝母 去心薑浸一宿

山藥

川芎

芍藥

知母

續斷 川中來者色赤而瘦者佳

小薊根 已上略洗細切慢火焙乾用

巴戟 棟紫色者為上水浸軟

牡丹皮

狗杞根 即地骨皮也帝虞世云此藥至賤都下並無真者火抵都人雖一錢亦作偽

石蓮

烏藥 洪州者為上

麥門冬

天門冬 略用水浸軟北二門冬去心了火上焙熟即當風涼之如此不過三四次即易乾仍不損藥力它藥並宜如此

遠志 泔浸一宿

黃芩 一名枯腸草刮去朽者

已上有心者並槌去心只取肉焙乾秤用

青橘皮

橘皮 取多年棟小而紅者佳若大而黃者柑皮也不堪入藥大治產後肌浮雷公去產後肌浮柑皮酒服者此也

二味用溫水洗淨却於砂盆內磨去白焙

乾秤

枳殼 棟小而實者為上去穰麩炒黃用

○本草有枳實一條王子享云此物本名曰

枳凡草木有花心有實夫枳穀即枳實之類也

茯苓 補藥宜用白色利水藥宜用赤色堅者佳

猪苓 水浸軟

已上三味並去黑皮細切焙燥秤

蒼朮 取茅山者為上朮淇浸一二宿打洗去皮切焙

白朮 棟白而肥者方是淅朮瘦而皮黃者出幕阜山力弱不堪用油者去之

二朮並去蘆切細焙乾却以麥麩炒令黃燥用

甘草 炙黃五寸槌扁以蜜水或塩水浸透炙令酥脆為上

黃耆 棟如箭簳直而甜者佳去又蘆剉令長四

甘菊花 取自栽可以烹茶者俟花未開者採之佳

施覆花

鶴虱

諸花並去萼蒂

血餘 皂角水洗淨燒存性

童子小便 夏月要入薄荷浸之方免臭壞

龍齒 黑者為下火煅通赤以乳鉢研令極細不可把鐵器或有生用者

龍骨 並棟有布紋者佳白色為上五色者次之

虎頭骨

虎脊骨

天靈蓋

虎前脛骨

龜甲

敝皀頭

鹿茸 棟嫩而有血色者佳大者為麋茸小者為鹿茸冬至日麋角解夏至日鹿角解麋得陽而角解所以利補陽鹿得陰而角解是以利補陰麋茸性熱鹿茸性溫並先燎去毛塗酥炙令黃脆如無酥以好酒浸炙

並用酥炙黃

紫梢花 即湖澤中魚生卵於竹木之上如溏徹狀者是去木用

鹿角膠 甚佳補虛用牛皮膠治風用驢皮膠東平皆京師偽膠雜以馬皮并故鞍韉鞋底之類其惡為

阿膠 棟明用者為上阿膠不必須更平自為之

甚

二味並細切以蚌粉炒燥如珠方用

桑螵蛸 去木塗酥炙黃或以酒炒亦可

真珠母 取末鎖者研令極細

玳瑁 宜生用

犀角 有竹紋者色黑為上

羚羊角 有馬鞭節仍有枏煅痕者佳

諸角宜用馬齗先鎊取屑懷燥為末方可入藥

牡蠣 取左顧者佳用塩泥固濟煅用

地龍 以生布袋盛槌出炒土只取皮秤

烏賊骨 一名海螵蛸去穀用

殭蚕 去觜切炒令絲盡

穿山甲 又名鯪鯉甲去大皮細切蛤粉炒燥用

水蛭 偽者以血調麪而為之宜子細辨認以塩炒黃

蚯蚓

蚕虫

蚘青

紅娘子

班猫 並去頭翅足用糯米同炒令米赤為度

蜈蚣 去頭足炙黃用

全蝎 去毒略炒

蛇蛻 棟全而頭向下者為

蟬蛻 溫水洗去土石仍去

蛤蚧 並酒炙用

白花蛇 棟眼如沽者尾

蜈蚣 炒燒存性用亦有纏於青竹上炙黃焦用

石蜥蜴

烏蛇 棟尾小寄得一百二十錢者仍眼如沽者為上

端有佛指甲腹兩邊有念珠班者為上

二蛇並用酒浸一二宿去皮骨取肉炙香用仍經久不蛀

晚蠶沙 炒

鼈甲 棟大而有九肋生者尤佳先用淡醋煮去裙却用釅醋炙令黃脆為妙

五靈脂 棟似鼠屎者為上似砂頭者次之先以水浸淘去砂土日乾碎之亦有炒用

乾漆 碎之炒令烟盡

猪羊腎及肝 並去脂膜仍下可經水

鯉魚鱗

蝟皮

獖猪左懸蹄甲

露蜂房

蠶蛻　牛角鰓

並用火燒存性研為細末用

鹿角霜研細用　麝香棟味辣者眞名生麝亦有用當門子研令極細用

獺肝炙乾用

並用研細為末用

荷葉　蓮蓬　椶櫚為墨刷者妙

用荷葉中心蒂者生用

益母草去根陰乾今名大香其子名荒蔚子　鬼臼去毛用

鬼箭羽去骨取翎用　五倍子去心中灰虫　麒麟竭

沒藥　安息香去沙石　乳香

琥珀

五味並細研

新編婦人大全良方目録

醫学臨川陳　自明　良甫編

辨識修製藥物法度

卷之一

調經門凡醫婦人先須調經故以爲初

月經序論第一

精血篇第二

産寶方序論第三

王子亨論第四

月水不調方論第五　凡四方

紫石英圓　加減茱萸湯　薑黃散

桃仁散

月水不通方論第六 産寶方論附
養生必用論經病第七 凡十方
當歸散 琥珀散 救急方
産寶方 梅師方 萬病圓
紅花當歸散 鼈甲圓
桃仁煎
室女月水不通方論第八 凡二方
通經圓 聖惠一方
室女經閉成労方論第九 凡十方
栢子仁圓 澤蘭湯 沉香鼈甲散
金花散 刼労散 資血湯
麥煎散 鼈煎圓 八僊飲子
茅香飲子
血枯方論第十 凡四方
烏賊魚骨圓 蓯蓉圓 乾地黄湯
磁石圓
月水不利 不流利也 方論第十一
白薇圓 牡丹散 牛膝散
月水行或不行心腹刺痛方論第十二 凡六方
温經湯 桂枝桃仁湯
地黄通經圓 琥珀散 萆撥圓
月水不斷方論第十三 凡六方
牡丹圓 續斷圓 禹餘糧圓
牡礪圓

婦人殺血心痛方論第十四　凡一方
崩暴下血不止方論第十五　凡三十六方
小薊湯　阿茄陀圓　琥珀散
五靈脂散　荊芥散　獨聖散
神應散　金華散　如聖散
如神散　香附圓　竹茹圓
如聖無比散
崩中帶下方論第十六、
崩中漏下生死脉論第十七　三十三方
鹿茸圓　栢葉散　益母草散
白芷散　乳香散　破故紙散
白礬圓　伏龍肝散　茯苓散
千金溫經湯　紫金散　沉香牡丹圓
白芷暖宮圓　竹茹圓　地黃圓
婦人白濁白濇方論第十八　凡一方
薑黃散
婦人天癸過期經脉不調方論第十九　凡二方
當歸散　茱萸鹿茸圓
婦人血分水分腫滿方論第二十　凡三方
椒仁圓　葶藶圓

卷之二
衆疾門　經脉不調衆疾生焉故以次之
極一方總論第一
產寶方論第二

寇宗奭論第四

通用方序第五

四物湯

勝金圓

玉露通真圓

二聖大寶琥珀散

沉香琥珀煎

卷之三

婦人中風方論第一　凡十方

至寶丹

牛黃清心圓

藿合香圓

五積散

大八風湯

排風湯

三生飲

參蘇飲　木香養散

附子理中湯　加減小續命湯

小風引湯　千金竹瀝湯

婦人中風角弓反張口噤方論第二　凡八方

小續命湯方見前　葛根湯

桂枝加葛根湯　附术散

桂心白术湯　附子防風散

八物白术散　白殭蠶散

烏蛇圓

婦人中風口噤方論第三　凡三方

天南星散　走馬散　烏蛇散

婦人中風不語方論第四　凡三方

神仙解語丹　防風湯
竹瀝湯
婦人風痺手足不隨方論第五　凡二方
三痺湯　二五七散
婦人中風自汗方論第六　凡六方
獨活湯　續命煮散
婦人臂痛方論第七　凡三方
柏子仁圓　茯苓圓
控涎丹　舒経湯
婦人賊風偏枯方論第八　凡三方
十八風湯　白芍子散
續斷湯　流氣飲子
婦人偏風口喎方論第九　凡六方
防風湯　深師續命湯
婦人血風心神驚悸方論第十　凡三方
茯神散　龍齒圓　朱賁琥珀散
婦人失血過多心神不安方第十一　凡一方
寧志膏
婦人風邪顛狂方論第十二　凡四方
防風散
婦人飛尸血厥方論第十三　凡六方
太一神精丹　蘇合香圓
雄朱散　白薇湯　倉公散

婦人血風身體骨節疼痛方論第一 凡五方
芎藭散　羚羊角散　通靈圓
當歸沒藥圓　大効虎骨散
婦人血風白虎歷節走疰方論第二 凡七方
漏蘆散　四生圓　麝香圓
芍藥知母湯　附子八物湯
婦人血風癢瘙痒方論第三 凡八方
何首烏散　附子酒
婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四 凡七方
養正丹　釣藤散
蔓荊子散　四神散
婦人血風頭痛方論第五 凡九方
許叔微方　七生圓　芎辛湯
如聖餅子　玉真圓　硫黃圓
白附子散
婦人項筋強痛方論第六 凡五方
追風散　急風散　蝎附散
都梁圓　木瓜煎
婦人腰痛方論第七 凡二方
如神湯　獨活寄生湯
婦人腰脚疼痛方論第八 凡三方
酸棗仁散　骨碎補散
婦人脚氣方論第九 凡十二方

牛膝散　大腹皮散　半夏散
犀角散　木香散　紫蘇散
桑白皮散　薏苡仁散　四白散
蒼术圓
卷之五
婦人勞瘵序論第一　凡二十一方
二十四種蒸病論附
雞蘇圓　防風湯　温金散
桔梗飲子　瓜樓湯　子苓散
含化圓　河車圓　補肺湯
四君子湯　養正豈　猪肚圓
婦人骨蒸勞方論第二　凡十五方
天靈蓋方　獺肝圓　黄蓍圓
慈愚圓　鼈甲煎　麥煎散
筒骨煎　華陀方　沈蘇良方
地黄煎圓　石膏散　青蒿散
鼈甲煎圓　逍遥散　枳殼散
婦人血風勞氣方論第三
人參荆芥散　鼈甲圓　琥珀圓
香甲散　地黄煎　荆芥散
荆芥煮散　如聖散　乞力伽散
大効油煎散　血風勞方　又香甲散
馬鞭草散
婦人風虚勞冷方論第四　凡二方

澤蘭散
婦人冷勞方論第五 凡七方
桃仁散　木香圓　熟乾地黃圓
硇砂煎　煮肝散　大香甲圓

卷之六

婦人熱勞方論第一 凡四方
黃耆散　半夏散　猪肚圓
泰芃散

婦人客熱方論第二 凡三方
麥門冬散　犀角散　黃耆散

婦人寒熱方論第三 凡四方
地骨皮散　生地黃散　紫胡散
紫石英圓

荊芥散
寡婦寒熱如瘧方論第四 凡一方
生地黃圓

婦人惡寒方論第五 凡一方
赤芍藥散　酸棗仁散

婦人血風煩悶方論第六 凡四方
川烏頭圓
當歸散

婦人血風攻脾不能食方論第七 凡四方
枳神散　桃仁圓　似辟瘟丹

婦人夢與鬼交方論第八 凡三方
桂枝紅花湯　黃芩芍藥湯

婦人傷寒傷風方論第九 凡八方

瀉心三黃湯　乾地黃湯　燒褌散
青竹茹湯　當歸白朮湯
婦人熱入血室方論第十五凡五方
小柴胡湯　乾薑紫胡湯　海蛤散
婦人咳嗽方論第十一凡九方
貝母湯　黃耆散
金不換散
婦人勞嗽方論第十三凡二方
四蒲圓　蛤蚧圓　含化圓
婦人喘滿方論第十四凡六方
神祕湯　杏子散　千緡湯
定喘湯　補肺湯
橘皮湯
棗膏圓　神授湯　九寶湯
婦人風痓方論第十五凡八方
施覆花湯　天南星圓　柴胡半夏湯
金沸草散　大半夏湯
四七湯　瓜蒂散
婦人心胞嘈雜方論第十六凡二方
施覆花湯　半夏茯苓湯
卷之七
婦人嘔吐方論第一凡六方
丁香散　竹茹湯
益智子散　半夏圓　人參七味圓
槐花散
婦人霍亂方論第二凡六方

加減理中圓　千金翼四順湯
猪膽湯　香薷散　呵子散
胡椒湯
婦人飜胃吐食方論第三凡二方
白堊散　白芷散
婦人血膈方論第四凡一方
牡丹煎
婦人鼻衄方論第五凡七方
刺薊散　伏龍肝散　茅花湯
婦人吐血方論第六凡十二方
雞蘇散　千金翼湯　柔脾湯
四生圓　犀角地黃湯

青餅子　乾薑甘草湯
婦人痃癖諸氣方論第七凡四方
麝香圓　神効方　葱白散
桂枝桃仁湯
婦人疝瘕方論第八凡四方
乾漆散　硇砂圓　巴豆圓
良方黑神圓
婦人八瘕方論第九凡一方
桃仁煎
婦人腹中瘀血方論第十凡二方
桃仁散　桃仁圓
婦人癥瘕方論第十一凡三方

川山甲散　蓬莪茂圓
丁香圓
婦人食癥方論第十二　凡二方
礞砂圓　礞石圓
婦人積年血癥堪方論第十三　凡七方
乾漆圓　琥珀圓　礞砂圓
沒藥圓　五靈脂圓
三稜煎　水府丹
婦人血氣心痛方論第十四　凡六方
烏藥散　阿魏圓　鷄舌香散
陳氏二神圓　抽刀散　靈苑方
婦人血氣心腹疼痛方論第十五　凡二十方

延胡索散　琥珀散　沒藥散
瑞舍散　八僊散　不揀金散
定命散　大効琥珀散　蠲痛散
沒藥散　牡丹散　至聖湯
菖蒲圓　延胡索散　當歸煎圓
神聖北亭圓　琥珀散
婦人血氣小腹疼痛方論第十六　凡四方
蔵靈散　當歸散　靈苑方
石灰散
婦人兩脇脹痛方論第十七　凡六方
草豆蔻散　菴閭子散　人參紫金圓
氣針圓　木通散　三脘散

婦人心脹脹滿方論第十八凡三方
白朮散　檳榔散　木香散
婦人淋瀝小便不通方論第一凡十一方
木通散　石韋散　桃膠散
金沙散　雞蘇散　火府丹
婦人脬轉不得小便方論第二凡十方
滑石散　葫葉散　石韋湯
千金翼方
婦人小便數方論第三凡二方
鹿茸散　桑螵蛸散
婦人遺尿失禁方論第四凡七方
鹿茸圓　葱白湯
婦人小便出血方論第五凡九方
鹿茸散　髮灰散　生乾地黃散
當歸散
婦人大便不通方論第六凡八方
牽牛子散　通神散　牽牛圓
大麻仁圓
婦人風入腸間或秘或利方論第七凡四方
蒺藜湯　大五柔圓　二仁圓
蜜兌法
婦人泄瀉方論第八凡八方
杏朴圓　桂香圓　豆蔻分氣散

五香散
人參豆蔻散
婦人悞熱下利方論第九凡三方
王粉丹
婦人滯下方論第十凡十三方
白頭翁湯
三黃熟艾湯
加味參附湯
豆蔻飲
婦人痢後嘔噦方論第十一凡七方
橘皮乾姜湯
半夏生姜湯
橘皮竹茹湯
生姜橘皮湯
退陰散
調中湯
豆蔻圓
木香散
神朮散
六神圓
四順附子湯
三建丹
香茸圓
參香散
婦人大便下血方論第十二凡八方
防風如神散
木香烏荊圓
地榆湯
腸風黑散
婦人痔瘻方論第十三凡五方
鼈甲散
鄔鮮圓方
聖惠一方
集驗方
孫真人方
婦人陰腫方論第十四凡五方
菖蒲散
麻黃湯
白礬散
婦人脫肛候方論第十五凡六方
婦人陰痒方論第十六凡十方
大黃散
礬石散
廣濟方
崔氏方

婦人陰冷方論第十七凡六方
五加皮浸酒方　傳心方
坐導藥方　坐藥法
婦人陰挺出下脫方論第十八凡六方
當歸散　廣濟方　千金翼方
婦人陰中生瘡方第十九凡五疾
集驗方　肘後方　黃芩湯
雄黃散
婦人傷丈夫頭痛方第二十凡二方
集驗方　桑白皮湯
婦人交接輒血出痛方第二十一凡二方
千金方
婦人交接他物傷方第二十二
集驗方
小戶嫁痛方論第二十三凡四方
千金方

卷之九

求嗣門病疾既無須知求嗣故以次之
陳無擇求子論第一
楮尚書求男論第二
婦人無子論第三
千金翼求子方論第四凡十四方
男女受胎時日法　推王相時日法
推貴宿日法　七子散

慶雲散　湯盥胞湯　坐導藥
紫石英圓　延年方　內灸圓
秦桂圓　養真圓　白薇圓
地黃湯　金城大守白薇圓
千金翼白薇圓　茉萸圓
紫石英圓
溫隱居求嗣保生篇方論第五　凡一方
續嗣降生丹

卷之十
胎教門　求嗣已明須知胎教故以次之
妊娠總論第一
妊子論第二
受形篇第三
論胎教第四
孕元立本章第五
凝形殊禀章第六
氣質生成章第七
轉女為男法第八

卷之十一
脉例第一
診婦人有妊歌第二
驗胎法第三　凡一方
胎教避忌產前將護法第四
月遊胎殺第五

十干日遊胎殺第六
十二支日遊胎殺第七
六甲旬遊胎殺第八
太史局日遊胎殺第九
食忌論第十
孕婦藥忌歌第十一

卷之十二

妊娠門 胎教已明須知妊娠疾病故以次之

妊娠隨月數服藥及將息法第一 凡二十方

烏雄雞湯　補胎方　艾湯
黃連湯　雄鷄湯　茯神湯
菊花湯　調中湯　阿膠湯
安中湯　安胎當歸湯　麥門冬湯
柴胡湯　旋覆花湯　葱白湯
杏仁湯　芍藥湯　葵子湯
半夏湯　猪腎湯

妊娠惡阻方論第二

白朮散　人參丁香散　醒脾飲子
保生湯　二香散　近効方
安胎飲

妊娠瘀逆不思食方論第三 凡八方

半夏茯苓湯　張氏方
茯苓散　集驗方
茯苓圓
柴胡湯

胎動不安方論第四 凡二十方

集驗方 安胎方 鈎藤湯

護胎法 産寶方 黄耆湯

又産寶方 安胎鐵罩散 銀苧酒

養生必用方 産寶方

寄生湯 順氣飲子 文仲寄生湯

秦艽湯 止痛湯 膠艾湯

妊娠漏胎下血方論第五

妊娠卒然下血方論第六 凡十二方

妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方

催生神妙佛手散 竹茹酒

秦艽湯 縮砂湯

妊娠胎上逼心方論第八 凡七方

紫蘇飲 當歸湯

妊娠忽然下黄汁如膠或如豆汁胎動腹痛方第九 凡一方

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十 凡三方

奪命圓 腹痛方 阿膠散

妊娠心痛方論第十一 凡七方

川芎當歸湯 白朮湯 千金方

妊娠心腹痛方論第十二 凡十一方

當歸芍藥散 香朮散 草豆蔻散

阿膠散

妊娠中惡方論第十三 凡三方

當歸散
妊娠腰腹及背痛方論第十四 凡十方
當歸散 通氣散 大地黃圓
小品茅根湯
妊娠小腹痛方論第十五 凡一方
當歸散
妊娠心腹脹滿方論第十六 凡三方
茗公千氣湯 阿梨勒散
卷之十三
妊娠數墮胎方論第一 凡五方
千金方 刪繁方 廣濟方
紫石英圓 卷栢圓
妊娠胎不養長方論第二 凡五方
集驗方 養胎白朮散 黃耆散
養胎人參圓 白朮圓
妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方
牛膝湯 桂心散 小品方
文仲方
妊娠墮胎後血下不止方論第四 凡九方
龍骨散 千金方 救急方
妊娠日月未足欲產方第五 凡四方
集驗知母圓 槐子圓
斷產方論第六 凡七方
小品方 斷產方 千金方

廣濟方

姙娠咳嗽方論第七 凡八方
欵冬花散　桔梗散　馬兜鈴散
麻黃散　百合散　紫菀湯
姙娠吐血衄血方論第八 凡二方
馬勃方　白茅花湯
姙娠子煩方第九 凡十方
竹葉湯　竹茹湯　麥門冬散
柴胡散　人參散　黃連湯
一母圓　知母散　葛根散
姙娠煩燥口乾方論第十 凡四方
升麻散

人參黃耆散　白朮酒
姙娠中風方論第一 凡四方
防風散　防風葛根散
姙娠風痙方論第二 凡三方
麻黃散　葛根湯
小品湯
姙娠腹內患胎方論第三 凡三方
雄黃圓
姙娠傷寒方論第四 凡二十方
加減四物湯　阿膠湯　葱白湯
前胡湯　蘇木湯　黃龍湯

柴胡石膏湯　枳實散　旋覆花湯
麥門冬湯　梔子大青湯　芍藥湯
當歸茯苓散　白朮散　柴胡散
麻黃散　升麻散　生地黃湯
良方白朮散　竹葉湯
妊娠時気方論第五　凡三方
秦艽散　葛根飲子　消熟飲
妊娠熱病方論第六　凡五方
葱白蘆根湯　梔子仁飲子　大黃飲子
妊娠傷寒熱病防損胎方論第七　凡七方
升麻散　前胡散　石膏湯
梔子仁飲　伏龍肝方
妊娠熱病胎死腹中方論第八
黑神散　催生湯　鹿角散
烏鷄方
妊娠瘧疾方論第九　凡四方
集驗方　千金方　黃芩散
七寶散
妊娠霍亂方論第十　凡四方
人參散　白朮散
止渴飲　縮脾飲

卷之十五

妊娠泄瀉方論第一　凡三方
厚朴圓　草菓飲

妊娠下痢赤白及黃水方論第二凡十三方

地榆散　赤石脂散　熟艾湯

黃連阿膠散　艾葉湯

根黃方　厚朴散

妊娠大小便不通方論第三凡十方

豬苓散　當歸散

妊娠小便不通方論第四凡八方

葵子散

香仁圓　苦參圓　葵子散

八味圓

妊娠子淋方論第五凡五方

地膚大黃湯　黃芩湯

妊娠遺尿方論第六凡三方

白薇散

妊娠尿血方論第七凡五方

千金方　葉酒　地黃酒

續斷湯　熟地黃湯

妊娠胎水瞳滿方論第八　產乳養子論附凡十一方

天仙藤散　荻苓散　崔氏方

澤瀉散　防己湯　千金鯉魚湯

商陸赤小豆湯　腎著湯

指迷方

妊娠腹內鍾鳴方第九凡一方

龔彥德孕癰方第十凡一方

姙娠不語論第十一
姙娠傷食方論第十二 凡二方
木香圓 白朮散 大棗湯
姙娠臟燥悲傷方論第十三 凡二方

卷之十六

坐月門 姙娠疾病已明須知坐月故以次之
産寶方周頲序第一
將護孕婦論第二
滑胎例第三 凡八方
滑胎枳殼散 張氏方 内補圓
易産滑胎方 神寢圓 楠白皮散
猪肛方 保氣散
月空方位例第四
逐月安産藏衣忌向方位第五
推婦人行年法第六
體玄子借地法第七
禁草法第八
禁水法第九
入月預備藥物第十
催生符第十一

卷之十七

産難門 坐月已明須知産難故以次之
産難論第一
楊子建十産論第二 凡一方

推腸生方　如神散　如聖散
催生方第三　凡三十六方
催生杵木飲子　催生丹　乳香方
曹秀才方　蛇蛻方　遇仙丹
如神開骨膏　寸金散　陸氏方
如聖膏　集驗方　備急方
兔血散　七聖散　神妙乳珠丹
如意散　文仲方
小品方
郭稽中產難方論第四　凡二方
勝金散　神應黑散
產難子死腹中方論第五　凡十八方
文仲方

當歸葵子散
趙和叔傳方
文仲方
鄧知縣傳方
錫粉方　十全
何氏方　水銀方
崔氏方　一字神散
產難生死訣第六
卷之十八
產後門　產难既明須知產後疾病故以次之
產後將護法第一
產後調理法第二
產後通用方論第三　凡二十三方
烏金散　桃仁煎
黑神散　醋墨方
增損澤蘭圓　四味湯

玉露散　地黃煎　理中圓
黑龍丹　當歸散　勝金圓
黑散子　朱砂圓　薑粉散
地黃酒　地黃圓　琥珀散
大當歸方　許仁則方
產科序論　第四　凡二十二方
胞衣不出方論　第五　凡十六方
牛膝湯　花蕊石散
奪命丹　救急方　延年方
牛膝散　廣濟方　獨行散
治胞衣不下訣
產後血暈方論　第六　凡三方
清魂散　近効方　崔氏方
張氏方
奪命散
產後顛狂方論　第八　凡二方
何氏方
產後狂言譫語如有神靈方論　第一　凡一方
產後不語方論　第二　凡三方
七珠散
胡毛狐鳳散
卷之十九
產後乍見鬼神方論　第三　凡七方
調經散
產後臟虛心神驚悸方論　第四　凡三方
產乳七寶散　琥珀地黃圓

産後心驚中風方論第三 凡五方
産後中風恍惚方論第四 凡四方
千金方 天麻圓
産後所下過多虛極生風方論第五 凡一方
濟危上丹
産後虛汗不止方論第六 凡八方
麻黃根散
千金方 止汗散
人參湯
産後冒悶汗出不識人方論第七 凡一方
産後汗出多而變痙方論第八 凡十四方
小續命湯 大豆紫湯 小品方
中風口禁角弓及張方論附
荊芥散
寶方
張文仲方 千金雞屎醴 小品方 羔沽酒
經効方 經效方
産後中風論第九 凡七方
郭稽中産後中風方論
産後中風筋脉四肢變急方論第十 凡四方
産後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一 凡一方
卷之二十
産後遍身疼痛方論第一 凡二方
趁痛散 五積散
産後腰痛方論第二 凡十方

廣濟方　救急方　大豆酒
陳氏如神湯　桃仁湯
五香連翹湯
産後悪露不絶方論第三　凡九方
廣濟方　文仲葛氏方
獨聖湯　牡蠣散
産後悪露不下方論第四　凡六方
芍薬湯　備急丹　荷葉散
廣濟方　没藥圓
産後餘血上搶心痛方論第五　凡三方
大岩蜜湯　失笑散　蜀椒湯
産後悪露不盡腹痛論第六　凡十二方
温隱居澤蘭湯　産寶方
地黄散　巻荷散　芸臺散
産後兒枕心腹刺痛方論第七　凡十八
延胡索散　仙藤散　蒲黄散
黒神散　桃仁芍薬湯　廣濟方
必効方　千金方　千金茱萸酒
薑黄散　獨聖散
産後小腹疼痛方論第八　凡六方
延胡索散　香桂散　紫金圓
産後寒疝方論第九　凡三方
羊肉湯　産寶方
産後両脇脹滿気痛方論第十　凡六方

石子湯　許仁則方　人參鼈甲散
增損紫胡湯　熟地黃散　白茯苓散
黃耆圓　補益方　胡氏牡丹散
黃耆煑散
產後虛羸方論第五　凡十一方
人參散　熟乾地黃湯
補虛圓　羊腎湯　羊肉當歸湯
黃雌雞湯　產寶方　救急方
當歸散　佛手散　當歸羊肉湯
產後風虛勞冷方論第六　凡十二方
黃耆散　木香散　人參散
枸杞子圓　補益白薇圓

產寶方
延年澤蘭圓
產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七　凡二方
抵聖湯
產後嘔逆不食方論第八　凡四方
丁香散　開胃散
產後霍亂方論第九　凡四方
白朮散　附子散　溫中散
良薑散

卷之二十二
產後傷寒方論第一　凡七方
人參當歸散　小柴胡湯
增損柴胡湯　竹葉防風湯　陽旦湯

芍菜湯　千金蜀漆湯
產後頭痛方論第二　凡三方
川芎散　芎附散　一奇散
產後咳嗽方論第三　凡四方
二母散　集驗方　經効方
產後喉中氣急、喘促方論第四　凡四方
施覆花湯　參蘇飲
產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五　凡二方
經驗方　海上方
產後咳癊方論第六　凡六方
丁香散　石蓮散
咳逆方　羌活散　產寶方
產後血崩方論第七　凡八方
固經圓　芎藭芍菜湯
白芍菜散　阿膠圓　乾地黃散
瑞蓮散　菖蒲酒
產後月水不調方論第八　凡二方
琥珀散　薑黃圓
產後月水不通方論第九
產後四肢浮腫方論第十　凡九方
小調經散　加減茱萸湯　枳朮湯
奪魂散　漢防已散　張氏方
產後腹痛及瀉痢方論第十一　凡七方
調中湯　桃膠散　白頭翁湯

張氏的奇散
產後赤白痢疾及虛羸痢氣方論第十二 十三
一方　經効方　張文仲方
黃連圓　必効方　廣濟方
救急方　當帰湯
赤石脂圓　膠蠟湯
許仁則方　續命湯　桂圓方

卷之二十三

產後痢疾作渴方論第一 凡三方
必効方　經効方
產後大便秘澁方論第二 凡七方
麻仁圓　麥蘗散
阿膠枳殼圓　許学士方　蜜兌法
產後大小便不通方論第三 凡三方
葵根湯　集驗方　桃花散
產後遺糞方論第四 凡二方
廣濟方　集驗方
產後諸淋方論第五 凡十五方
茅根湯　集驗方　滑石散
張先愚方　廣濟方　木通散
產後小便數方論第六 凡二方
桑螵蛸散　枯樓湯
產後小便不禁方論第七 凡四方
廣濟方　千金方　固脬散

産後小便出血方論第八 凡三方
産後陰脫玉門不閉方論第九 凡十二方
硫黄散 千金方 廣濟方
當帰散 集驗方 陳氏玉龍湯
熨法集驗方 桃仁音 椶枝散
皂角散
婦人陰蝕五痲方論第十 凡八方
千金方 洗槭湯 井濕散
狼牙湯
産後乳汁或不行方論第十一 凡十五方
漏蘆散 産寶方 靈苑方
滑泉散 下乳方 崔氏方
千金漏蘆湯 天南星散 皂角散
産後乳汁自出方論第十二
産後吹奶方論第十三 凡六方
枯樓散 天南星散
経驗方
産後妒乳方論第十四 凡十方
赤龍皮湯 天麻草湯 飛鳥喜散
黄連胡粉喜
乳癰方論第十五 凡二十五方
連翹湯 張氏橘香散 陳日華方
陳日華方 金黄散 乾膿散
丹參喜 経効方 瓜樓散

卷之二十四
拾遺方　烏喙圓　木香散
石蓼散　大腹皮飲　大黃甘遂湯
竹茹湯　喜髮煎　瓜子湯
固真丹　大効内補圓　濟陰丹
烏雞煎
産乳集將護嬰兒方論
初生浴兒良日　木瓜圓
延胡索散

新編婦人大全良方目録終

新編婦人大全良方卷之一

醫學臨川陳自明　良甫編註

調経門（凡醫婦人、調経、故以醫學先須為初、）

月経序論第一

岐伯曰、女子七歳、腎氣盛、歯更髮長、二七而天癸至、任脉通、大衝脉盛、月事以時下、天謂天真之氣降癸、謂壬癸水名、故云天癸也、然衝為血海、任主胞胎、腎氣全盛、二脉流通、経血漸盈、應時而下、所以謂之月事者、平和之氣常以三旬一見、以像月盈則虧也、若過経脉行時、最宜謹於將理、將理失宜、似産後一般受病、輕為宿疾、重可死矣、蓋被驚則血氣錯亂、経脉斬然不行、逆於身則為血分勞

瘵等疾、若其時勞力則生虛熱、變為疼痛之根、若恚怒則氣逆、氣逆則血逆、逆於腰腿則遇經行時、腰腿痛重、過期即安也、逆於頭腹心肺脊脇手足之間、則遇経行時、其證亦然、若怒極則傷肝、而有眼暈脇痛嘔血瘵瘧癰瘍之病、加之経血滲漏於其間、遂成竅穴淋瀝無有已也、凡此之時、中風則病風、感冷則病冷、久而不愈、變證百出不可言者、所謂犯時微若秋毫、感病重如山岳、可不畏哉、

精血篇第二　齊光禄大夫褚澄遺書

飲食五味、養體骨肉肌膚毛髮、男子為陽、陽中必有陰、陰中之數八、故一八而陽精升、二八而陽精溢、女子為陰、陰中必有陽、陽中之數七、故一七而陰血升、二七而陰血溢、皆飲食五味之實秀也、方其升也、智慮開明、齒牙更始、髮黃者黑、筋弱者強、暨其溢也、凡充身體手足耳目之餘、雖針芥之歷無有不下、凡子形肖父母者、以其精血嘗於父母之身無所不歷也、是以一肢瘁則子一肢不肖、其父母一目虧則子一目不省、其母然雌鳥牝獸無天癸而成胎、何也、鳥獸精血往来尾閭也、精未通而衝女、以通其精、則五體有不滿之處、異日有難狀之疾、陰已痿而思色、以阨其精、則精不出而內敗、小便道澁而為淋、精已耗而復竭之、則大小便道牽疼、愈疼則欲大小便、愈便則愈疼、女人天癸既至、踰十年無男子合、則不調、未踰十年思男

子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而
入骨或變而之腫或雖合而難子合男子多則歷
枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血
氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血為基
本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣和血
凝結則水火相刑月水如期謂之月信不然血凝
成孕此乃調變之常其血不來則因風熱傷於經
血故血不通或外感風寒內受邪熱脾胃虛弱不
能飲食食既不充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤
時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏冷熱久而勞
損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如堀
忽聚忽散其病乃癥瘕血涸不流而搏腹脹時作寒
熱此乃成瘕或先後爽期雖通而或多或寡究病
之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽從伏知其安
危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則
前期而來過於陰則後時而至其有餘多餘少斷
絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說
於下

月水不調方論第五

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之

氣乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若今熱調和則衝脉任脉氣盛大陽少陰所生之血宣流依時而下若寒溫乖適經脉則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少故為不調也

紫石英圓 出本事方 治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不會說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成氷故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當知陰陽調其氣血使不相勝以平為福

紫石英　禹餘糧　人參
龍骨　川烏　官桂
桑寄生　杜仲　五味子
遠志　澤瀉　當歸
石斛　川椒　乾薑各一兩
右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三五十圓空心米飲吞下〇指迷方同　甘草各半兩

加減吳茱萸湯 治衝任衰弱月候愆期或前或後

或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之出張氏方

吳茱萸半兩　麥門冬　乾姜
白茯苓　牡丹皮　南木香
苦梗錢洽三　甘草半三錢　當歸半兩
北細辛半一錢　防風　官桂各一分
半夏七錢

右㕮咀每服四大錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至七分去滓空心温服

治婦人室女經脉不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿至晚則增宜服小烏沉湯吞下艾煎圓見和劑局方

姜黃散　治血臟久冷月水不調臍腹刺痛出專治婦人方

川姜黃成片者四兩子　蓬莪朮　紅花
桂心　川芎各一兩　延胡索
牡丹皮　當歸各二兩　白芍藥三兩

右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服

桃仁散　治婦人月水不調或淋瀝不斷後復來狀如瀉水四體虛贏不能飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重唯欲眠睡多思酸物

桃仁　半夏各一兩
赤芍藥　粉草　生地黃各三兩　澤蘭葉

川牛膝　當歸　桂心
牡丹皮　人參　蒲黃
川芎各二兩

右為粗末每服五大錢水盞半姜三片煎七分空心去滓溫服

月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令體虛受風冷邪氣客於胞內傷損衝任之脈并手太陽少陰之經致胞絡內血絕不通故也衝任之脈起於胞內為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水風冷傷其經血血性得溫則宣流得寒則澁閉既為風冷所搏血結於內故令月水不通也又云膈中鳴則月水不來病本在胃胃氣虛不能消化水穀使津液不生血氣故也醉後入房則內氣竭絕傷冷肝使月水衰少不來所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也又先嘔血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來也所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下也診於腎脉微澁者是月水不通也又左手關後尺內浮為陽絕無膀胱脉也月水則閉又肝脉沉而急隱之亦然時小便難苦頭眩痛腰背痛足寒時疼月水不來時恐得之時有所墮墜也月水不通久則血結於內生堀變為血瘕亦作血

癥血水相并壅滞不通脾胃虚弱变為水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主尅消於水水血既并脾氣衰弱不能尅消故水氣添溢浸漬肌肉故腫滿也

産寶方論

論曰經脉不通日久非細事實為沉病若是室女経脉不通初因貪食酸醎之物遂致血脉乾涸變成勞疾若因経脉正行誤食熱麪生冷房室遂成此疾腹内顆塊誤認為胎時日稍深必見困篤

養生必用論経病第七

初虞世云女子十四天癸至仕脉通月事以時下故令有子天癸者物之自然月者以月至経者有常也其來不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸瘦血虚則発熱氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則為肺癰肺癰必矣醫見経不行則用虫魚水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄意就中不行以藥行之為害滋大経水枯竭則無以滋養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖挫楚並下不可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦人盛實月経瘀閉利之則行自有證候学者宜審焉

當歸散

治血脉不通

當歸　川山甲灰炒　蒲黃各半兩炒
辰砂一錢　麝香少許
右為細末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒
薄荷醋湯亦可

琥珀散 治心膈迷悶腹臟撮痛氣急氣悶月信不
通等疾

天台烏藥二兩　當歸　莪茂各一兩
右為細末每服二錢温酒調下服後以食壓之
大忌生冷油膩等物若産後諸疾用炒姜酒調
下已上出婦人經驗方

救急療婦人月經不調或一月不来或隔月不来
或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不
能食方

當歸　川牛膝　牡丹皮
桃仁各一兩半　大黃　芎藭
土瓜根　芍藥　朴硝
桂心　蚕虫去翅足炒　水蛭各半兩炒
右㕮咀以水九升煮取三升分温五服忌如常
法

療月經不通腹中痛見産寶方

牛膝六分　大黃　桃仁去皮尖雙人炒
細辛各五分　川芎　當歸各四分
水蛭三分糯米炒黃
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心

温酒下

治月水不通（出梅師方已試有驗）

厚朴（姜汁炙香細切）不以多少濃煎去滓空心温服

治婦人經候不来數月臍腹疞痛或有一塊上下相拄飲食減少腹滿惡心大便秘渋者宜服局方北亭圓用石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十圓両服必通

萬病圓 治女人月經淤閉月候不来繞臍寒疝痛徹及産後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病

乾漆（杵碎炒令大烟出烟頭責白如此一時久） 牛膝（去笛酒浸一宿焙各一両）

右為末以生地黄汁一升入二味藥末銀石器内慢火熬俟可圓即圓如梧桐子大空心米飲或温酒下二圓日再勿妄加病去止藥

紅花當歸散 治婦人血藏虚竭或積瘀血經候不行或斷續不定時作腹痛腰膀重疼攻刺小腹緊硬及室女月經不通並宜服之

紅花　當歸尾　紫葳

牛膝　甘草　蘇木（槌碎細剉各二両）

白芷　桂心（各一両半）　赤芍藥（九両）

劉寄奴（去根五両）

右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服若血久不行濃煎紅花酒調下孕婦休服一名凌霄花散

鱉甲圓 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬時發刺痛漸成勞狀 出博濟方

鼈甲去裙醋炙 桂心 三稜醋煮急炒 牡丹皮 牛膝去苗 呵子肉 瑰珀 桃仁去皮尖雙仁麩炒 大黃煨 土瓜根

右各等分為細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁湯送下十五圓破血癥氣塊尤妙

桃仁煎 治月水不調阻滯不通博濟方

大黃炮 二兩 朴硝 桃仁去皮尖雙仁麩炒各 蚖虫一兩去足翅炒黑用

右為細末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏可圓圓如梧桐子大當日晚不須喫食五更初以溫酒吞下一圓至明日午際取下如赤豆汁或似雞肝蝦蟇衣未下再服候鮮紅即住服仍以調氣湯散補之

〇室女月水不通方論第八

論曰夫衝任之脉起於胞內為經脉之海手大陽小腸之經手少陰心之經也二經為表裏心主於血上為乳汁下為月水也女子十四而天癸至腎氣全盛衝任流通經血既盈應時而下名之月水常以三旬而一見謂之平和也若愆期者由勞傷血氣壅結故令月水不通也

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心　青皮　大黃煨
川椒　莪茂　川烏炮去皮
乾漆碎令烟盡炒　去皮尖雙
乾薑各等分　當歸　桃仁去皮尖雙仁麩炒

右為細末分為四分用一分以米醋熬成膏和
餘分藥未成劑臼中治之圓如梧桐子大曝乾
每服二十圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空
心食前服

治室女月水不通出聖惠方

雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下
一錢神效

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不
先傷其氣血者世有室女童男積想在心思慮過
當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉
何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血
逆竭則神色先散而月水先閉也大既受病不能
榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽
既作水氣絶故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦
節痿俟五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一
種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期
藥力亦可及也若或自能改易心志用藥扶接如
此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脉
與證而治之○張氏云室女月水久不行切不可

用青蒿等涼藥醫家多以為室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥通之宜栢子仁圓澤蘭湯

栢子仁圓

栢子仁 炒研 別 牛膝 卷栢 各半兩
澤蘭葉 續斷 各二兩 熟地黃 三兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心飲下三十圓

澤蘭湯

澤蘭葉 三兩 當歸 芍藥 各一兩
甘草 半兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

沉香鱉甲散 博濟方治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目昏悶上瞤積涎肢體不利五心煩熱飲食進退多困少力

沉香 甘草 炙 檳榔 各三分
木香 一兩 鱉甲 半兩 常山
當歸 紫胡 人參
半夏 桂心 生地黃

茯苓　青皮　陳皮各一兩

右為細末每服貳錢水一盞生姜三片煎至七分溫服空心日三服

金花散 治室女骨蒸熱勞

藿香　零陵香　延胡索

芍藥　白芷　川芎

當歸　桂心各一分　蓮子心

晚蠶蛾各二分

右為細末溫酒調下一錢日二服

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩　緜黃耆　甘草

人參　當歸　半夏

白茯苓　熟地黃　五味子

阿膠各二兩炒

右㕮咀每服三大錢水觥半生姜十二片棗三箇煎至九分無時溫服日進三服○陳總領日華云鄉人楊元鼎女及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有效者亦嘗從子求治法無有應之者偶遇名醫得此方只一料遂除根專録此方傳人

資血湯 治婦人血熱氣虛經候渋滯不通至使血聚肢體麻木渾身疼痛煩倦或室女年及經脉未行日漸黃瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等藥它日為患也若是前證則增寒發熱五心煩燥飲食減少宜服此藥滋養而通利之

馬鞭草　荊芥穗各四兩　桂心
枳殼　川芎　當歸
赤芍藥各三兩　牡丹皮一兩

右為粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至一盞去滓空心食前日四服有此證服至半月經脉自通此方至妙不可輕視非一二服便見特達之效而鄙之仍服後素有諸疾因此藥皆去矣

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胸煩壅

鱉甲　大黃溫紙煨　常山
赤茯苓　柴胡　白朮
當歸　乾漆炒令煙盡　生地黃
石膏各一兩　甘草半兩○出蘇沇良方

右為細末每服貳錢水一盞小麥伍拾粒煎至六分食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳判官方治骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珎其效可知

驚煎圓　治男子婦人童男室女五勞七傷傳疰飛
口尸注八極骨蒸肺癆黃瘦虛勞無力肌肉不生
婦人血蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣
堛腹痛經脉不調乾嗽咽膈不利癥瘕積堛臆赤
口瘡已上等疾無不效驗

黃耆　柴胡　枳殼
知母　白茯苓　沉香
人參　附子　木香
升麻　肉桂　胡黃連
杏仁　當歸　常山
羌活　京三稜　烏梅肉
安息香　明者　胡研
槐肉　同
細

右十九味修製了各秤一兩為末用沽鼈一箇
重十兩或半斤者汲河水養七日須逐日換新
水用童子小便五升無灰酒五升銀石器內慢
火熬百沸先更入桃柳枝東南上者各剉三合
烏梅五十箇拍破此三味用綿裹同鼈煎煮至
一半去桃柳枝等三味鼈爛取去將肉研如膏
骨併殼焙乾為末再入汁中熬如漆色或更入
酒少許在此臨時斟酌盛放甕器中搜和前藥
入臼中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人十五
歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荊芥酒
下所煞膏子須契勘多少勻令剩却但少些子
不妨却別熬酒若膏剩恐鼈不全故也凡服此

藥恐熱三日更須服八僊飲子一服解之

八仙飲子

常山　白朮　秦艽
洪州鬼臼　赤芍藥　甘草
紫蘇　銀州柴胡

右等分洗淨為粗末每服半兩水一碗烏梅肉二介葱白薤白桃柳槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服滓併煎

茅香飲子

治女子經脉不行胸膈滿悶身體麻木或有寒熱證候

厚朴　牡丹皮　茅香
藿香　甘草各三錢　陳皮
生半夏　麥牙　當歸
蒼朮炒各半兩　赤芍藥　當歸半兩

右㕮咀每服半兩水一太盞姜三片煎服熱甚加北柴胡三錢半

○羅它大師傳有效

○血枯方論第十　出駱龍吉方

腹中論曰有病胷脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也注云夫藏血受天一之氣以為滋榮者也其經上貫膈布脇助今脫血失精肝氣已傷故血枯涸而不榮胷脇滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳脾胃病至則先聞

腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之先嗑血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也

治婦人血枯胸膈四肢滿妨於食飲病至聞腥臊臭氣先嗑血出清液或前後泄血目眩轉月事衰少不来

烏賊魚骨圓 岐伯方

烏賊魚骨 去甲四兩　藺茹 一兩

右為末以雀卵和成剤圓如小豆大每服五圓加至十圓以鮑魚煎湯下以飯壓之

蓯容圓 治婦人胷脇支滿聞腥臊氣嗑血目眩不能飲食泄血不已日久血枯

蓯蓉 酒浸　熟地黄　白茯苓

兎絲子 制衣　附子 炮　當帰 炒

白石英 研　五味子　禹餘糧 制衣研

烏賊魚骨 去甲各一兩　人參 半兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二三十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服

乾地黄湯 治婦人先有所脱血或醉入房勞傷故月事衰少不来

乾地黄　澤蘭葉　白茯苓

人參　五味子　附子 炮

禹餘糧 制衣　當帰

右等分為粗末每服二錢姜五片水一盞煎至七分空心温服

磁石圓　治婦人陰気衰弱血枯不榮月事不来

磁石　製研　白茯苓　附子炮
乾地黄　人參　當帰

右各一両為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下二十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服

○月水不利　利不流也　方論第十一

夫婦人月水不利者由勞傷血気致令體虚而受風冷客於胞内損傷衝任之脉手大陽少陰之経故也衝任之脉為経脉之海皆起於胞内手大陽小腸之経手少陰心之経也此二経為表裏主下為月水風冷客於経絡搏於血気血得冷則壅滞故令月水来不宣利也診其脉寸口弦苦腹痛主月水不利孔竅生瘡又肝脉沉是厥陰経也沉為陰主月水不利腰腹痛尺脉滑血気實経絡不利又尺脉来而断絶者月水不利也當患小腹引腰痛気尺脉絶不至者月水不利四肢羸瘦嗜食減少漸滞上攻胸膈也

白薇圓　治婦人月水不利覚虚乏故令無子

白薇　柏子仁　白芍藥
當帰　桂心　附子
菖蒲　白朮　吳茱萸
木香　辛　川芎
檳榔　各半両　熟地黄二両　牡丹皮一両

紫石英一両　人参三分　石斛
白茯苓　澤蘭葉　川牛膝各三分
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓
空心晚食前温酒吞下
療女人臍下憋逆気脹満月経不利血気上攻欲
嘔不得睡出産寶方
當帰四銭　乾漆三銭炒令煙盡
右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下十
五圓

牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食
牡丹皮　川大黄炒各一両　赤茯苓
生地黄　桃仁　當帰
桂心　赤芍藥　白朮各三分
石韋去毛　木香各半両
右㕮咀每服三大銭水一盞姜三片煎七分去
滓空心温服

牛膝散 治婦人月水不利臍腹疞痛
牛膝一両　桂心　赤芍藥
桃仁　延胡索　當帰
牡丹皮　川芎　木香各三分
右為末每服方一匕温酒調下食前
○月水行或不行心腹刺痛方論第十二
論曰夫婦人月経来腹痛者由労傷気血致令體
虚風令之気客於胞絡損於衝任之脉手太陽少

陰之經衝脉任脉皆起於胞內為經脉之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則受風冷故月水將行之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也亦可

（就第七卷第十五論尋方）

若經道不通縁腑寒冷疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏所以発痛譬如天寒地凍水凝成氷宜温經湯及桂枝桃仁湯萬病圓（方見第一卷第七論）

温経湯

當歸　川芎　芍藥
桂心　牡丹皮　莪茂　各半兩

人參　右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

桂枝桃仁湯

桂枝　甘草　牛膝　各一兩　生地黃　各二兩
桃仁（製五十箇）　芍藥　甘草　一兩

右為粗末每服五錢水二盞生姜三片棗一箇煎至一盞去滓温服

若経候頓然不行腑腹疠痛上攻心胷欲死或困不行結積漸漸成塊腑下如覆杯久成肉癥不可復治由驚恐憂思意所不決氣尉抑而不舒則衆於血血隨氣行滯則血結以氣主先之血主後之

宜服桂枝桃仁湯不瘥宜地黃通經圓已成塊者宜萬病圓方見前

地黃通經圓

熟地黃三兩　蛮虫去頭足翅炒　水蛭用糯米同炒黃去糯米　桃仁製各五十箇

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下五圓未知加至七圓

琥珀散治婦人月經壅帶每發心腹臍疞痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死出本事方

三稜　莪茂　赤芍藥

牡丹皮　劉寄奴　當歸

熟地黃　桂心　甘菊花

真蒲黃炒各一兩細剉

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前溫酒調下○一方不用菊花蒲黃却用烏藥延胡索亦佳子家之秘方也○若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服尤佳前後救人急切不少此藥易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩

又一方

延胡索　當歸各等分

右二味為粗末每服三錢姜三片水一大盞煎至七分去滓稍熱服○陳氏方有桂名如神湯最治腰痛○雷公炮炙論只用延胡索一味治

心痛○僕詳此方大能治血氣腰腹痛藥簡切
專治疾有效

蓽撥圓 治婦人無時月水來腹痛

蓽撥 塩炒去塩為末　蒲黃 各一兩炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓
食後用塩米飲吞下

○月水不斷方論第十三

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虛損故
也衝任之脉為經脉之海手大陽小腸之經也手
少陰心之經也此二經為表裏主下為月水若勞
傷經脉衝任氣虛故不能制經血令月水不斷也
凡月水不止而合陰陽則冷氣上入於臟令人身
體面目痿黃亦令絶子不產也

牡丹圓 若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛
其脉沉細此因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此
非虛弱蓋邪氣伏留滯於血海譬如有積之人下
利不定有所去即愈

牡丹皮　牡蠣　附子 炮
大黃 蒸　葶歷 炒　苦梗
茯苓 各半兩　當歸　製厚朴
吳茱萸　川椒 炒出汗　人參
川芎　北柴胡　桂心
乾姜 各半兩　細辛 一兩半　䗪虫 五十箇去頭足翅炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下十

圓未知漸加至二十圓以知為度

續斷圓 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食無味漸加之弱

川續斷　黃耆　甘草　熟地黃各一兩　附子　當歸　牛角鰓燒　龍骨煅研　地榆各半兩　乾姜　艾葉　川芎各三分　烏賊骨　五味子　赤石脂

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒下

禹餘糧圓 治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢瘦弱心神虛煩飲食減少

禹餘糧　續斷　川芎各一兩　艾葉　人參　鹿角膠三分炒　紫石英　赤石脂　熟地黃　乾姜　栢葉炒　黃耆　當歸炒　白茯苓各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心米飲下

牡蠣圓 治婦人血海虛損月水不斷

牡蠣粉　阿膠　鹿茸　甘草一分　赤石脂　川芎　續斷　代赭石各一兩　當歸　乾姜各三分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前
温酒下

療経血不止

黄芩五分　當歸
蒲黄各四分　生姜二分　艾葉一分
生地黄二十四分　伏龍肝十二分

右咬咀用水二升煎取八合分為二服

療経血不止謂曰　出婦人經驗方○已試有效

婦人経血正淋漓　舊瑞蓮蓬燒作灰
熱酒一盃調八字　自然安樂更無疑

又一方

蓮蓬殻　拒霜花

右二味等分為末每服二錢空心米飲調服

○婦人殺血心痛方　論第十四

凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小産血過多而心痛甚者亦然

烏賊魚墨炒醋湯調下　此魚腹内有墨汁過見人遇必吐其墨以藏其身

○崩暴下血不止方　論第十五　凡三十六方

論曰夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脉任脉血気俱虚故也衝任之脉為経絡内榮臟腑若無傷損則陰陽和平而気血調適経下依時若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之気虚不能約制其経血故忽然暴下謂之崩中暴

下診其寸口脉微遲尺脉微絃寸口脉微遲為寒在上焦但吐爾今尺脉微弦如此即小腹痛引腰脊痛者必下血也若經候過多遂至崩漏色明如水下得温則煩甚者至於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱所乘攻傷衝仕血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿茄陀圓

小薊湯

小薊莖葉 洗切研取汁一盞
白朮 半兩劉
生地黃汁 一盞
右三件入水一盞煎至一半去滓温服

阿茄陀圓

胡椒
茜根
紫檀 小蘗皮 乃山石榴皮也
右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下二圓

琥珀散 治崩暴下血陳總領方

赤芍藥 香附子 荷葉 枯
男子髮皂莢水洗 當歸 棕櫚 炒焦
烏紗帽是漆紗頭巾取故也 陽氣衝上
右等分陳棕外其餘並切細片新瓦上煅成黑炭存性三分為細末每服三五錢空心童子小便調下如人行十里再進一服不過七八服即

止如産後血去多加朱醋京墨麝少許親感
黃守正卿為和劑局日内子淩夫人忽苦此疾
危殆百藥不效偶得此方旋即安愈
張聲道云大率治血崩先用此譬如治痢有積
不先去之徒服斂下藥一時暫止久則毒氣愈
深甚至危殆血崩乃經脉錯亂不循故道溢
妄行一二日不止便有積瘀之血凝成窠臼更
以藥澁住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投
一二服次服靈脂散及順氣藥去故生新自能
平治此切當之說

靈脂散

治婦人血山崩及治丈夫脾積氣張
氏云治血崩諸藥不能止者妙好五靈脂炒令煙
盡為末每服一錢温酒調下此藥無能鮮藥毒及
蛇蝎蜈蚣咬螫傷處立愈一方每服三錢水酒
童便各半盞煎至八分通口服名抽刀散治産後
有病服三服散惡血或心腹脹助脚痛不可忍者
或只用童子小便尤佳或中風即入草烏頭半錢
重同煎此鄧知縣方
不能飲酒者煎烏梅柏葉湯調下如心煩口乾渴
者加蒲黃炒減半用一方燒存性靈辟靂酒調下然
此藥氣惡難嚥燒之存性極妙
又一方
五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓
澄清再煎成膏入神麴二兩為末和圓如梧

桐子大每服二三十圓溫酒下

荊芥散 治婦人崩中連日不止 夏大君娘娘方

用荊芥穗於燈盞多著燈心好麻油點燈就上燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下

獨聖散 治婦人血山崩不止 出經驗方

防風去叉蘆

右不以多少為細末酒煮白麪清調下二錢空心食前日二服更以麪作糊酒投之極驗

已上三方似非止血之藥然風為動物衝任經虛風皆是去風之藥如靈脂荊芥防風被風所傷致令崩中暴下僕因覽許學士傷寒脉歌曰脉浮而大風傷榮榮血也而

用此藥方悟古人見識深奧如此

一方

熟艾如雞子大 阿膠半兩 乾姜一錢

右為粗末用水五盞先煮艾姜至二盞半入膠消洋溫分二服空心服一日服盡

又一方

牛角鰓 烏賊骨各一分 麝香一錢

右為細末入麝香令停酒調下一錢匕一日二三服

神應散 治婦人血山崩不止

桂心不以多少甘鍋內煅微存性為末每服一二錢米飲調下

一方治崩中下血 出本事方

黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下 許学士云崩中多是用止血菜補血菜此治陽乘於陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也近朝有王御醫值夜忽有一宮女血如山崩其時暑月菜筍中只有大順散兩貼用冷水調服旋即奏效以此知醫要權變金華散亦妙

金華散

治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者

延胡索　瞿麥穗　當歸

乾葛　牡丹皮各一兩　石膏二兩

桂心別為末三分　蒲黃半兩　葳靈仙三分

右為細末每服二錢水一盞煎至六分空心溫服日二服凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥僕常療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥服之愈甚召余診之六脉緊數遂用此藥兼局方龍腦雞蘇元數服即安本事方單用黃芩者亦此意也

如聖散

治婦人血山崩

棕櫚性　烏梅各一兩　乾薑一兩五分並燒過存

右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患者不過三服即愈

一方用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

一方用棕櫚燒存性為末湯破酒令淡調下三錢空心服

一方用棕櫚白礬煅為末酒調二錢服
治婦人血崩屢效方
當帰　白芍藥　乾薑
棕櫚各等分
右各煅存性磠為末秤過醋湯調以有節朱筋
左欖四十九轉食前服
千金翼治婦人崩中去血不止
大小薊根一斤用酒一斗漬五宿任意服之
千金方有白茅根六両半酒煮服

縮砂散　治血崩
新細砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末
米飲調下三錢

一方用益智炒為細末鹽米飲調下
如神散治婦人血崩不止赤白帶下
香附子　赤芍藥各等分
右為細末每服二錢鹽一捻水一盞煎至七分
温服無時候日二服十服見效

一方
用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二
錢放温服不過両服立愈昏迷甚者三錢七如
山崩不可者亦能解之米飲調亦可〇許学士
云治下血不止或成五色崩漏常服資血調気
是婦人仙藥也已上經驗並出婦人方

者艾附圓　治婦人室女一切血気経脉不調臍腹疼

痛面色痿黃心怔之力腹脹脇痛頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治之度心服餌自見其功爾

香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙碾為末醋煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲送下無時候婦人數隨胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方有艾同煮亦可

治血崩方

夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候治崩中下血不止小腹痛

芍藥一兩半 炒黃 柏葉六兩 微炒

右水一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶腰腹疼痛面黃瘦悴出千金聖惠方

治崩中下血久不止或赤或黑腑下痛

芍藥 龜甲炙 側栢炒 桑耳各六分 續斷各五分 牛角鰓燒四分 各

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎黃耆湯空心下

治崩中盡夜不止醫不能治

芍藥一兩 乾地黃 黃耆 當歸炒 艾葉 禹餘糧十分 生地黃汁二合

先用酒五升煑芎藭一升去滓下地黃汁再煎三二沸分為三服不耐者漸進（小品方無地黃汁不飲酒者术煮亦可）

又方

丁香二兩為細末用酒三升煑取一升空心頓服必效方用丁香百顆酒煎服（梅師方同）

治忽患崩中血不止結作血片如鷄肝色碎爛

芎藭（十二分） 阿膠 青竹茹（各八分）

續斷 地榆 小薊根（各十分）

當歸（六分） 生地黃 伏龍肝（各十二分）

右用水九升煑取三升去滓分作三服先服此藥後服補藥圓子

阿膠 鼉甲 川芎

當歸 赤石脂 丹參（各六分）

續斷 甘草 鹿茸（各五分）

龍骨（十一分） 龜甲（十分） 地榆（四分）

烏賊骨（八分）

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日二服常煑小薊汁服之尤佳

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥 白芷 黃耆

龜甲 川芎 烏賊骨（各八分）

乾地黃 牡蠣 五色龍骨

乾姜（各十分） 桂心（六分） 附子（王箇炮）

右為細末空心酒調方寸匕

又一方

白芷　牡厲　龍骨

芍藥　赤石脂　阿膠

當歸　川芎　鼉甲

烏賊骨　人參各六分　艾葉四分

乾地黃八分　呵子四分　乾姜

黃耆各五分

右為細末空心酒調方寸匕

竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下鄧元老方

當歸　白朮　青木香

蠶蛻煅　墨棕刷煅　川山甲煅各一兩

地榆　竹茹　川芎

白茯苓　粉草　血餘煅

牡蠣煅　緜子煅各半兩　熟地黃四兩

赤石脂煅各三兩

右七味煅藥用緜子裹定入瓶子內用塩泥固濟用炭則半煅存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心温酒吞下

經驗方治崩暴下血

百草霜二錢狗膽汁一處拌停分作兩服當歸酒調下

如聖無比散 治血山崩

晚蠶沙一兩　伏龍肝半兩　同為細末酒調

二錢匕

千金治崩中去血不止千金翼無茅根

白茅根二斤　小薊根五斤　一方無小薊根

右二味細切用酒五升煑取四升去滓分温四服

婦人崩中無問久近悉皆治之

伏龍肝一斤　小薊根　桑寄生

續断　地榆　艾葉各三兩

阿膠　當帰　赤石脂

厚朴各二兩　生薑五兩

右十味切以水一斗煑取三升絞去滓分作三服忌如常法

崩中帶下方論第十六　凡三十方

論曰崩中帶下者何荅曰其患有五夫病之中人皆有受處因起之候須盡心講究竊尋方書唯言帶下有色之與形此不參先覽醫中之理也且五崩是婦人極重之患療之最難後之学者莫識其源殷幼習醫方濟衆服餌當極濟人之道偏以思慮於茲彌久其功頗有精妙夫此病昔起於風氣寒熱之所傷或産後早起不避風邪風邪之氣入於胞門或中経脉流傳臟腑而発下血名為帶下若傷足厥陰肝之経其色則青如泥色若傷手少陰心之経其色赤如紅津若傷手太陰肺之経其色則白形如漿若傷足太陰脾之経則其色黄如

爛瓜若傷足少陰腎之經則其色黑如鼓血此為其困也○問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨患此病答曰五藏六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦人有胞門子藏風冷中之則為所病若男子則為它病矣○又問何以名為帶下復有冷熱者何荅曰脉有數經名字不同奇經八脉有帶在腰如帶之狀其病生於帶脉之下其有冷熱者即隨其性也又號崩中者二帶之下別名也諸君子有留心於醫存志備急者以此推之萬不失一

崩中漏下生死脉方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海皆起於胞內而午太陽小腸之經也午少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脉調適則月水依時若其經脉血非時而下淋瀝而不斷謂之漏下也○致五藏傷損五藏之色隨而下診其脉藏不同若五藏皆虛損者則其色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為藏大則為乳藏則為寒乳則為虛虛寒相搏其脉為牢婦人即半產而漏下又云尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤又漏下赤白不止脉小虛滑有生脉大緊實數者死也又漏血下赤白日下血數斛脉急疾者死遲者生也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可

治也

鹿茸圓 治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯左臍下當十三寸

鹿茸 煨去毛酥炙　赤石脂　禹餘糧 製各一兩

艾葉　栢葉　附子 炮各半兩

熟地黃 洗焙　當歸　續斷 各二兩

右為細末酒糊丸如梧桐子大空心溫酒下三十圓

栢葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近

栢葉　續斷　川芎

當皈　生乾地黃　龜甲

鼉甲 各一兩半　禹餘糧 二兩半　阿膠

赤石脂　牡蠣　地榆

艾葉　鹿茸 各二兩

右為末每服二錢食前糨飲調下　一方有丹參如鹿茸數煉蜜丸如梧子大每服三四十圓空心溫酒吞下

益母草散 治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢日三服

療滯下赤白年月深久不差

乾姜 半兩　白芍藥 二兩

右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服

張氏方

乾姜 芍藥等分 又云加香附子

等分 甘草減半 各炒黃色同為

末空心米飲調下方寸匕

白芷散 治婦人赤白滯下

白芷一兩 海螵蛸二箇燒 胎髮一團煅

右為細末空心溫酒調下二錢

乳香散 治赤白帶下

草菓一箇去皮入乳香一小塊用麪餅裹火炮焦黃留性取出和麪用之

右為細末每服二錢陳米飲調下重者三錢

破胡紙散 治赤白帶下

破故紙 石菖蒲等分並剉炒

右為末每服二錢用菖蒲浸酒調溫服更入班

猫五分去翅頭足糯米同炒黃去米

搐鼻香 治子宮久冷赤白帶下

牡蠣煅 黃狗頭骨煅 紫梢花

龍腦 母丁香 蛇床子

破故紙 桂心等分

右為細末煉蜜圓如鷄頭大臨事用一粒

血荅圓 治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖

血海

北荅四兩拈 大附子二箇二兩 黃狗頭骨灰四兩

右為末粟米粥為圓如梧桐子大每服三十圓

醋湯吞下或飯飲亦可空心日三服忌生冷毒物

伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多困之力

棕榈（不以多少燒灰火然急以盆蓋蔭令火住）

伏龍肝（於鍋竈直下去取赤土炒令烟盡煙盡於淨地出火毒）

屋梁上塵（懸長者如無以竈頭虛空中者炒令）

右三味等分碾和令停入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半用可安（一親戚婦人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無效召僕診之六脉微濡問之服何藥云凡是當歸川芎淡血諸藥丹品服之皆不效僕遂合博濟方伏龍肝散兼白蓉四服之愈）

茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤白帶下崩中不止面色痿黃胎氣多損（三方出博濟）

白茯苓　青木香　杜仲

菖蒲　乾地黃　栢子仁

秦艽　青皮　兔絲子

呵子皮　當歸　艾葉

青石脂　五加皮　牛角鰓

烏賊骨等分

右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫抄藥一錢相和喫下後喫餘粥或有胎息用鯉魚糯米粥下

治冷白帶下

桑寄生　芍藥　栢葉各四分
桑耳　禹餘糧各六分　吳茱萸
乾地黃各八分　烏賊骨五分
右為細末空心用飯飲調下二錢匕

治白崩中不絕
牡蠣　禹餘糧　鼉甲各六分
黃皮　阿膠　烏賊骨
續斷　白芷各四分　當歸
赤石脂各六分　白石脂　龍骨各五分
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心
溫酒下

治帶下
茅花一握炒　棕櫚炭　嫩蓮葉三張
甘草節一錢
右為細末空心酒調方寸匕

治赤白帶下骨立者崔元弼方
地榆一斤洗剉用水三升煮至一半去滓再煎如
稠餳絞濾空心服三合日二服

聖惠方治滯下五色亦治嘔血
地榆三兩剉　本草注云地榆主帶下十二病一曰多赤二曰多白三日月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮令十一曰夢與鬼交十二曰五藏不足用醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合

治婦人漏下不斷方

亂髮皂莢水洗燒為細末空心温酒調下一錢

又一方

鹿角燒灰細研食前温酒調下二錢

又一方

桃仁燒灰細研食前温酒調下二錢

千金温經湯治女人曾經小産或帶下三十六病腹脹唇口乾日暮発熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時々泄利経脉不調久不懷孕

吳茱萸三兩　白芍藥　當皈

芎藭各三兩　麥門冬去心　半夏各二兩半

人參　阿膠粉炒　牡丹皮去心

甘草　桂心各一兩

右為粗末每服三錢水一盞姜五片煎七分去滓空心食前温服忌生冷羊肉生葱海藻菘菜等　千金方同

紫金散治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不断腰腹重痛凡是五色帶疾並皆治之男六德續添

禹餘糧煅赤釅醋中淬如此者七次次細研水飞挹乾秤三兩

赤石脂煅　龍骨煅石器研各一兩　白芍藥

川芎　附子　熟地黃

當皈各一兩　乾薑炮　肉桂各半兩

右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食前一日二服

大仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方

禹餘糧煅研　赤石脂煅研　牡蠣煅研
桂心　烏賊骨去皮　伏龍肝炒研
右等分為末溫酒調下方寸匕日二服忌生葱
又一方
鹿茸酥炙　當皈各二兩　蒲黃半兩炒
右三味為末溫酒調下五分匕日三服
又一方京墨為末二匕若燒露蜂房為末三指撮
酒調服
又一方常炙猪腎食之
千金療婦人白崩中方
乾地黃四兩　芎藭　阿膠
桂心　赤石脂　小薊根各二兩
伏龍肝七枚如雞子大
右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓入
膠令洋分為三服日三服千金翼有白馬通汁二升用白石脂
沉香牡丹圓　治婦人血海久虛經候不利赤白帶
下血氣衝心多發刺痛四肢困頓博濟方
沉香三分　牡丹皮　赤芍藥
當皈　桂心　川芎
黃耆去芦蜜炙　人參　茯苓
山藥　白芷　橘紅
吳茱萸泡七次炒　白巴戟去心　木香
牛膝酒洗去苗　枳殼去穰麩炒　肉豆寇
製厚朴　生乾薑　白龍骨各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心
温酒下若心腹痛煎白芷酒下
廣濟治帶下病方
芍藥七兩 熬令黑
干金治帶下方脉數者可用
枸杞根一斤 生地黄五斤
右二味以酒一斗煮取五升分為三服
白芷暖宮圓 暖血海實衝任治子宮虚弱風寒客
滯因而斷緒不成孕音及數嘗墮胎或帶下赤白
漏下五色頭目虚暈吸吸少気胞腹苦滿心下煩
悸腑腹刺痛連引腰背下血過多面脉羣急嘔吐
不食面色青黄肌膚瘦瘁寢常自汗

禹餘糧 製衣 一兩
白芷
艾葉 製
白薑 炮
川椒 製衣
芍藥 各三分
阿膠 炒粉

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓米飲
下或温酒酷湯亦得常服温補胞室和養血気
光澤顔色消散風冷退除百病自成孕音性平
不熱

竹茹圓 治婦人赤白帶下方見崩暴下
血不止方
地黄圓 治婦人月経不調每仔數日不止煎有白
帶漸漸瘦瘁飲食少味累年無子龐安常方
熟地黄一兩 山茱萸 薏苡仁 各一兩
乾薑三分 白芍藥 微炒代赭石 各一兩

白彊蠶　厚朴各三分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下五十圓日三服許學士云凡婦人有白帶是第一病令人不產育宜速治之此扁鵲通邯鄲聞貴婦人有此病所以專為帶下醫也

婦人白濁白淫方論第十八

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交泰水火不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為溲便之道胞今腎損故有白濁白淫宜服局方金鑠正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降心丹威喜圓若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者然思則傷脾故也宜用四七湯吞白圓子此藥極能分利方見

簡易方更宜小烏沉湯每貼加茯苓一錢重益智二十枚去穀碾鹽煎服

薑黃散　治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃一兩　大附子炮一兩　赤芍藥

柳桂　紅藍子　三稜各半兩

牡丹皮　荒花醋浸炒　木香

郁季仁去皮　沒藥各一分

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服

婦人天癸過期經脉不調方論第十九

當皈散　許學士云婦人天癸過期而經脉不調或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損

四十二
四十四

七益謂女子七七數盡而經脉不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善並宜服之

當歸　川芎　白芍藥

黃芩　白朮各半兩　山茱萸肉兩半

右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷者去黃芩加桂心一兩

茱萸鹿茸圓　補氣固血治本臟因虛生寒月經行多或來不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸　五味子　蓯蓉

杜仲　赤石脂各一兩　吳茱萸

附子　乾薑　黑龍骨

肉豆蔻　白茯苓各半兩　乾地黃一兩半

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大空心食前熱米飲吞下五七十圓一月後血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常服中年已後婦人最宜服此藥

婦人血分水分腫滿方論第二十

夫婦人腫滿若元因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜椒仁圓若先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水分宜服亭歷圓

治血分椒仁圓

椒仁　甘遂　續隨子去皮研

附子　郁李仁　黑牽牛

五靈脂碎之炒　當皈　吳茱萸

四十三

延胡索各半兩　芫花醋浸一宿炒黃　石膏各一分

信砒　膽礬各一錢　班猫糯米炒黃去米不用

蚖骨各三十枚去頭足翅糯米炒黃

右為細末麪作糊為圓如豌豆大每服一圓橘皮湯下

治經脉不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此方養生必用方

人參　當皈　大黃湿紙裹三斗米下蒸

米熟去紙切炮　桂心　瞿麥穗

赤芍藥　白茯苓各半兩　葶藶炒別研一分

右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五圓至二三十圓

葶藶圓治水分王氏指迷方

葶藶炒別研　續隨子去殼各半兩研

乾笋末一兩

右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓煎扁竹湯下如大便利者減續隨子葶藶各一分加白朮半兩

又有腸覃臚脹脾氣血氣血蠱水蠱石蠱血癭此數證亦與腫相類並見後拾遺門出二十四卷