實用植物圖說

朱義方著

上海新學會社出版

實用植物圖說

甬上張美翊題

中華民國九年七月初版

（實用植物圖說全一冊）新加一

定價大洋二元
（外埠酌加運費郵費）新加

譯著者　恩縣孫雲臺
訂正者　奉化江起鯤
校閱者　奉化胡朝陽　周葆初
同校者　奉化莊紀慶
發行及印刷者　新學會社
總發行所　上海棋盤街交通路　新學會社
分發行所　寧波日新街　濟南后宰門　新學會社
代售處　奉天科學儀器館　南京共和書局　廣東共和書局　北京郁生記　各省大書坊

新學會社版權所有

例言

一本書為各校學生及實業家參攷自修而輯。故文字務求簡易。不尚高深。

一本書為一般研究植物者記載我國山野之普通植物。為研究地理學者記載外國所產之著名植物。為農工商業家記載內外有用之植物。為研究藥劑者記載藥用植物。

一本書以練習觀察植物之力。使知利用厚生之道。及高尚優美之思想。

一本書之次序。案恩孤來路氏自然分類表而定。先由下等植物起。然後漸及高等植物。

一本書之體例。以日本齋田功太郎佐藤禮介所編之內外實用植物圖說為標準。其他松村任三齋田功太郎之中等植物教科書。

齋田功太郎之最近博物學等書。亦多引用之。

一本書圖畫。除用植物圖說之原圖外。餘均係植物寫生。以期明晰可觀。

一本書因植物名稱。多係音譯。故於各圖之下。特注學名。俾便查考。

一本書於自然分類表前。特設漢字索引表。此表案植物名詞第一字筆畫之多寡而定。且注明頁數。至自然分類表及學名表。亦注有頁數。翻檢查考。悉覺便利。

一各植物名稱。本擬全用漢名。但植物繁博。無漢名者多。不得已以音譯之。名下註漢字者為漢名。註日字者為日名。註拉字者即拉丁。係譯學名之音。使閱者一目了然。省去核對之功。

一本書所用術語。與普通不同。如根莖塊莖。改為根狀莖塊狀莖等。皆是。又圖說內之為植物用途者。皆低一格寫。以示區別。

一本書經膠東鞠思敏日本福山維吉諸夫子校閱。鄭雲笙朱蓮亭諸夫子。亦時賜珍貴助言。茲特附筆誌之。以表謝悃。

中華民國八年十二月　譯者識

漢字索引（按植物名詞字數及筆畫之多寡順序排列）

一字

六—八畫

朽（日）三二三
米（漢）四九
艾（漢）五二三
杉（漢）三八
李（漢）二五〇
杏（漢）二三七
芹（漢）三八〇
芒（漢）五七
芥（漢）二一六

九畫

柾（中俗）三二一
柑（漢）二九七
枹（漢）一三六
柊（日）四〇七
柃（日）三四四
柹（漢）四〇〇
柳（漢）一二七
柿（漢）四〇〇
栂（日）三八
柏（日）一三五
柚（漢）二九八
茄（漢）四四六
苳（日）五二〇
韭（漢）一〇〇

十畫

桃（漢）二五七
桐（漢）四五三
桂（漢）二〇七
栗（漢）一三六
桑（漢）一四五
茶（漢）三四二
茗（漢）三四二

十一畫

梅（漢）二三七
梨（漢）二五三
荻（漢）五〇一
荻（漢）二八二
莞（漢）六七
梓（漢）四五九
嵇（漢）四〇六

十二畫

匏（漢）四八四
椈（漢）一三八
椅（漢）三五四
椙（日）三八
棗（漢）三二八
菱（漢）三六九
堇（日）三五二
菊（漢）五〇三
粟（漢）四八

十三畫

瓠（漢）四八六
楮（漢）一四三
榊（日）三四一
椿（日）三四三
楝（漢）三〇一
楢（日）一三六
楓（漢）二三五
葫（漢）一〇一
葱（漢）一〇一
葛（漢）二六九
菰（漢）六三
椵（日）四二
粳（漢）四九
榆（漢）一四一

十四畫

蒜（中俗）一〇一
榛（漢）一三一
榎（日）一四〇
槐（漢）二六四
構（漢）一四四
蓍（漢）五一七
葦（漢）六四
稗（漢）六〇
槙（日）三二

十五畫

樟（漢）二〇六
樅（漢）四二
槲（漢）一三五
稷（漢）五三
蓮（漢）一七八
榧（漢）三一
蓴（漢）一七八
蔦（日）三二九

十六畫

蕕（漢）四二五
蕨（漢）十九
橡（日）三二三
橙（日）
穇（漢）六二
稻（漢）四九

十七—十九畫

蕗（日）五二〇
薄（日）五七
薤（漢）一〇四
薺（漢）二一九
薑（漢）一一五
薇（漢）二三
檜（日）四〇
檜（漢）四一
藤（俗）二八三
藜（漢）一六三
櫟（漢）一三五
櫧（漢）一三七
樒（日）二〇二
藍（漢）一五六

二十—二十二畫

蘆（漢）六四
櫨（漢）三一三
蘋（漢）二四
櫻（日）二四六
櫸（漢）一四〇

二字

一—二畫

一位（日）三〇
一葉（漢）一〇二
人參（漢）三七四
人參（日）三八三
丁子（日）三六五
丁香（漢）三六五

十藥（日）一二四
刀豆（漢）二八〇
力草（漢）六〇

三畫

大豆（漢）二七七
大青（漢）二一八
大麻（漢）一四二
大麥（漢）五〇
大根（日）二一八
大黃（漢）一六二
大戟（漢）三〇八
大蘭（漢）六七
大蓼（漢）一八九
山榆（漢）一五〇

山茹　四二〇
山吹（日）二五八
山藥（中俗）一〇九
山茶（漢）三四三
山椒（漢）二九五
山車（日）一八〇
山蒜（漢）一〇二
山漆（日）三一四
小麥（漢）五五
三手（日）三七二
小蘖（漢）一九九
三股（日）三六〇
千兩（日）一二五
川穀（漢）五六

五參（漢）三七四
女貞（漢）四〇六
小茄（日）三九八
小車　四九五

四畫

木萩（日）二六八
木瓜（漢）二四四
木蓮（漢）二〇二
木耳（漢）一〇
木槿（漢）三三七
木賊（漢）二六
木棉（漢）三三九
木犀（漢）四〇七
木蘭（漢）二〇二

水仙（漢）一〇七
水瓜（日）四八二
水芹（漢）三八〇
水萍（漢）七七
水斷（漢）三八〇
水鼈（漢）四七
牛膝（漢）一六七
牛房（日）五〇六
牛蒡（漢）五〇六
刈安（日）五二
刈萱（日）六五
巴草（日）三四七
巴豆（漢）三〇九
水綿（漢）二

及已（漢）一二七
五加（漢）三七一
毛茛（漢）一八四
日迴（日）五一九
犬苋（日）一六六
玉瓜（漢）四八〇
勻莖（日）三五三
犬樟（日）二〇六

五畫

石髮（日）二
石竹（漢）一七三
石松（漢）二七
石南（漢）三九三
石茸（漢）十三

石蒜（漢）一〇八
石斛（漢）一二二
石菖（漢）七六
石蓴（漢）三
石岩（漢）三九一
白果（中俗）二九
白樺（日）一三〇
白及（漢）一二一
白桐（漢）四五三
白茅（漢）五九
白菖（漢）七五
白根（日）四三八
白樫（日）一三七
白檀（漢）一五三

甘草（漢）二六七
甘蘭（漢）二二〇
甘蔗（漢）五五
甘藷（漢）四二〇
甘蕉（漢）一一三
冬瓜（漢）四八四
冬青（漢）三一五
玉葱（日）九八
玉簪（漢）九七
玉蘭（漢）二〇三
玉簾（日）一〇七
古加（日）二九一
古柯（日）二九一
田麻（漢）三三一

生馬(日) 四一六
生薑(漢) 一一五
令法(日) 三八六
半夏(漢) 七四
玄參(漢) 四五五
目木(日) 一一九
片栗(日) 八八
瓜木(日) 三八五

六畫

地柏(漢) 二八
地黃(漢) 四五七
地錢(漢) 一四
地錦(漢) 三二九
地膚(漢) 一六六
合萠(漢) 二六八
合歡(漢) 二八二
百合(漢) 九四
百部(漢) 八一
羊蹄(漢) 一六〇
羊桃(漢) 二八九
吉納(日) 二六七
西瓜(漢) 四八二
灰菜(中俗) 一六三
朴樹(漢) 一四〇
肉桂(日) 二〇九
江蘺(漢) 六
血櫧(漢) 一三三
竹柏(漢) 三一
吐根(日) 四七〇
米栂(日) 三七

七畫

赤花(日) 三六七
赤茄(日) 四四三
赤根(日) 四六四
赤松(漢) 三二
赤樫(日) 一三三
赤芽(日) 二四〇
赤楊(漢) 一三二
赤苧 一五〇
杜松(日) 三九
杜松(漢) 四〇
杜衡(漢) 一五五
杉菜(日) 二五
沙木(漢) 三五
沙參(漢) 四八八
沈香(漢) 三五八
牡丹(漢) 一九二
牡荊(漢) 四二七
牡蒿(漢) 四九六
忍冬(漢) 四七四
泡吹(日) 三二五
忍草(日) 二
肝木(日) 四七二
車前(漢) 四六三
伽羅(日) 三五八
佛座(日) 四四〇

血止草(日)　三八一
西洋梨(日)　二五二
西洋莓(日)　二三八
回回蒜(漢)　一八三
肉豆蔻(漢)　二〇五
老鴉眼(中俗)　三三〇
虫捕堇(日)　四六二
老利兒(日)　二〇八
吉祥草(漢)　八九
安石榴(漢)　三六三
安息香(日)　四〇一
江南竹(漢)　六二
羊栖菜(漢)　五
多麻斗(日)　四四三
交讓木(漢)　三一〇
多羅葉(日)　三一七
伊蘋蔔(漢)　四一七
西洋莓(日)　二三八
行儀芝(日)　五三
七畫
阿列布(日)　四〇四
阿足示(日)　一三九
阿仙藥(日)　二六〇
沙列布(日)　一二一
杠谷樹(日)　四〇七
阿仙藥(日)　四六四
杠板歸(漢)　一五七
杜鵑花(漢)　三九三
牡丹蔓(日)　一九四
里木子(漢)　二九八
赤小豆(漢)　二六〇
延命菊(日)　四九五
赤芽槲(日)　三〇四
夾竹桃(漢)　四一四
車百合(日)　九二
貝細工(日)　五〇〇
車輪梅(日)　二四九
君影草(日)　九〇
車葉草(日)　四六九
君遷子(漢)　四〇一
男郎花(日)　四七七
谷空木(日)　四七五
佐保姫(日)　四五七
扶芳藤(漢)　三二〇
防臭木(日)　四二八
含羞草(漢)　二七八
八畫
夜繁花　一六九
使君子(漢)　三六四
治癇草(日)　四三二
依蘭苔(日)　一三
刺酸漿(日)　四四二
泥胡菜(漢)　五〇四
沿階草(漢)　九六
波羅樹(漢)　三一七
油點草(漢)　一〇三

青藜蘆　八二
青夾葉（漢）　三七五
花菖蒲（日）　一一二
花蘇芳（日）　二八三
金絲桃（漢）　三四八
金花菜（漢）　二六三
金絲梅（漢）　三四六
佩蘭葉　五二一
金魚藻（日）　一七九
金錢菊（中俗）　五一一
金魚草（日）　四五四
金粟蘭（漢）　一二六
金盞草（漢）　五〇五
金線草（漢）　一六三
金蓮花（漢）　二九〇
金銀木（日）　四七三
金縷梅（漢）　二三六
長春花（漢）　二三九
長壽花（漢）　一〇六
虎耳草（漢）　二三三
孟宗竹（日）　六二
吳茱萸（漢）　二九五
狗尾草（漢）　四九
狗酸醬（漢）　四四二
宜母子（漢）　二九八
東風菜（漢）　五〇九
第切草（日）
枝垂柳（日）　一二七
知風草（漢）　五一
岩澤瀉（日）　一七
岩高蘭（日）　三一〇
迎春花（漢）　四〇八
柿葉草（日）　三〇二
委陵菜（漢）　二四一
孤刺刀（日）　一〇六
延齡草（日）　八五
金雀枝　二六三
九畫
爬山虎（中俗）　三二九
泊芙蘭（日）　一一一
秋丁子（日）　四二九
紅葉葵（日）　三三七
秋牡丹（漢）　一八六
秋海棠（漢）　三五五
南天竹（漢）　一九七
南京豆（日）　二八一
括失豆（拉）　二九九
毒人參（日）　三八二
毒空木（日）　三一一
胡枝子（漢）　二八二
胡頹子（漢）　三六一
指甲桃（俗）　三二六
苦苣苔（漢）　四六一
苦楝子（漢）　二九九
待霄草（日）　三七〇
茅膏菜（漢）　二二二

厚子(日)　一三九
十畫
浮萍(中俗)　七七
海松(漢)　三九
海苔(日)　四六八
海棠(漢)　二三九
海帶(中俗)　三
海葱(日)　八八
茭白(中俗)　六三
海藤(漢)　三四六
砧草(日)　四六八
殺牛(日)　二四二
栢槙(日)　三二
桂圓(中俗)　三二四
桂皮(漢)　二〇七
桐壺(日)　四二九
俵麥(日)　五四
桔梗(漢)　四八六
狸豆(日)　二七四
荒布(日)　四
茳芏(漢)　六七
茜草(漢)　四六四
茴香(漢)　三七八
荔枝(漢)　三三五
茗荷(日)　一一六
茼蒿(漢)　五〇八
茨藻(日)　四五
草綿(漢)　三三八
草藤(漢)　二六九
馬蘭(漢)　五〇七
狸藻(日)　四六一
馬棘(漢)　二七一
馬蓼(漢)　一五八
烏木(漢)　四〇〇
烏瓜(日)　四八〇
烏芋(漢)　六六
烏白(漢)　三〇九
烏麥(日)　五二
烏頭(漢)　一九〇
唐苣(日)　一六五
唐茄(日)　四八三
拳參(漢)　一五八
射干(漢)　一一二
紅豆(漢)　一四六
桑草(日)　二五
問荆(漢)　二七六
旃那(日)　三二九
夏蔦(日)　三四三
夏椿(日)　二九六
臭橙(漢)　二九五
秦椒(漢)　四四五
秦椒(中俗)　四〇五
素馨(漢)　三五七
鬼縛(日)　二七二
豇豆(漢)
十一畫

荷花（中俗）一七八
側柏（漢）三六
淡竹（漢）六一
梔子（漢）四六八
梫木（漢）三八九
梧桐（漢）三三九
梅桃（漢）二五八
杪欏（漢）十六
莕菜（漢）四一一
莽草（漢）二〇二
莨菪（漢）四四七
莢蒾（漢）四七二
笠菅（日）
笠莎六五

常山（漢）二九四
魚木（日）二一三
甜瓜（漢）四八五
麻黃（漢）四二
麥葱（漢）八二
麥蕈（漢）一二
規那（日）四六七
乾苔（漢）二
旋花（漢）四二一
野芋（漢）七四
野葛（漢）三一二
野菰（漢）四六〇
蛇莓（漢）二五五
崖椒（漢）二九二

粗榧（漢）三〇
商陸（漢）一六九
毬蘭（漢）四一八
通草（漢）一九四
連翹（漢）四〇八
敗醬（漢）四七八
黃柏（漢）二九三
黃麻（漢）三三二
黃梅（日）四〇八
釣花（日）三一九
黃華（漢）二七五
雀稗（日）五八
雀稗（日）八一
黃蓮（漢）一九三

雪柳（日）二四五
掃帚（中俗）一六六
黃櫨（日）三一三
黃瓜（中俗）四八一
黃蘗（漢）二九三
十二畫
朝顏（日）四一九
椎子（日）一三七
椎茸（日）一一
棕梠（日）六九
菜豆（漢）二六三
圓棗（中俗）四〇一
菾菜（漢）一六五
堇菜（漢）三五三

菊藻(日)　四五三
萊菔(漢)　二一八
菖蒲(中俗)　七五
萎蕤(漢)　八三
菘藍(漢)　二一八
菟葵(漢)　一八八
黑松(漢)　三二
黑菜(漢)　四
黑藻(日)　四六
紫芝(漢)　一二
紫草(漢)　四二四
紫菜(漢)　六
紫萼(漢)　九〇
紫堇(漢)　二一二
紫菀(漢)　五〇八
紫荊(漢)　二八三
紫威(漢)　四五八
紫藤(漢)　二八三
紫檀(漢)　二七三
紫薇(漢)　三六二
紫蘇(漢)　四三七
紫蘭(日)　一二一
紫珠(漢)　四二八
絡石(漢)　四一五
絲瓜(漢)　四八五
絲葱(漢)　八二
結香(漢)　三六〇
娵菜(日)　五二二
雁皮(日)　三五七
御形(日)　五一七
御柳(漢)　三五〇
棒子(中俗)　五八
景天(漢)　二二五
雄松(日)　三二
越橘(漢)　三九二
雲實(漢)　二七三
款冬(漢)　五二〇
鹿藿(漢)　二七九
菝葜(漢)　九五
十三畫
蜜柑(日)　二九七
葧薺　六六
溲蔬(漢)　二二八
辣火　四四五
溪蓀(漢)　一〇九
雉席(日)　二四四
楤木(漢)　三七三
椰子(漢)　七二
楊桐(漢)　三四一
楊梅(漢)　一二八
楊櫨(漢)　四七五
榲桲(漢)　二五六
葎草(漢)　一四五
葒蓼(中俗)　一五九
葒草(漢)　一五九
葉蘭(日)　一〇二

蕖耳(漢) 四九七
萵苣(漢) 五一四
葡萄(漢) 三三一
葵菫(日) 三五〇
蓖麻(漢) 三〇七
葶藶(漢) 二一四
裏白(日) 二二
瑞香(漢) 三五九
搗布(日) 四
費菜(漢) 二二五
煙草(漢) 四四五
蜀葵(漢) 三三五
雌松(漢) 三二
鼠李(漢) 三二七

鳩麥(日) 六一
睡蓮(漢) 一七九
當藥(日) 四一三
鈎藤(漢) 四六六
貉藻(日) 二二四
鈎樟(漢) 二〇七

十四畫

榔榆(漢) 一三九
穀樹(中俗) 一四四
榕樹(漢) 一四一
蒼朮(漢) 四九六
蒲桃(漢) 三六六
蒲葵(漢) 七一
蒲蘆(漢) 四八四

蒟蒻(漢) 七六
慈菇(漢) 四六
蓍萩(日) 二八六
蒴藋(漢) 四七五
漆樹(漢) 三一一
銀杏(漢) 二九
銀蘭(日) 一一九
酸模(漢) 一六一
酸醬(漢) 四四九
橐吾(漢) 五一五
壺蘆(漢) 四八六
鳳梨(漢) 七八
綿樹(日) 一二八
綿馬(日) 二二

遠志(漢) 三〇三
翠菊(漢) 四九四
糀菌(日) 八
熊柳(日) 三二七
鳶尾(漢) 一一〇
實櫻(日) 二五九
榮蘭(日) 四三
構莓(日) 二四〇

十五畫

槭樹(漢) 三二二
橘子(中俗) 二九七
蓪草(日) 三七三
淳菜(漢) 二一四
糊木(日) 二三二

蔦漆(日) 三一二
塔花(日) 四三六
蔦蘿(漢) 四二二
駒草(日) 四一一
豌豆(漢) 二六五
箙藤(日) 二六四
箬竹(漢) 六四
蝦根(日) 一一八
櫨子(漢) 二四三
蝦藻(日) 四四
十六畫
蕁麻(漢) 一五一
澤蘭(日) 一二〇
澤瀉(漢) 四五
蕃杏(漢) 一七〇
樗樹(中俗) 二八七
蕪菁(漢) 二一五
蕎麥(漢) 一六一
蕓薹(漢) 二一三
蕃椒(漢) 四四五
鋸草(日) 五一七
錦葵(漢) 三三五
錢葵(日) 三三五
衛矛(漢) 三二〇
曇華(漢) 一一七
十七畫
薄荷(漢) 四四〇
檜柏(漢) 四一
檜扇(日) 一一二
檉柳(漢) 三五〇
檀特(日) 一一七
檀香(漢) 一五三
薏苡(漢) 六一
薺苨(漢) 四八八
蕺草(漢) 一二四
龍眼(漢) 三二四
龍腦(漢) 三四九
龍髭(日) 九六
龍膽(漢) 四一四
隱蓑(日) 三七二
繁縷(漢) 一七五
十八畫
雛菊(日) 四九五
薯蕷(漢) 一〇九
椶櫚(漢) 六九
蓋草(漢) 五四
藜蘆(漢) 九七
瞿麥(漢) 一七二
鷄冠(漢) 一六七
鎌柄(日) 二四二
爵牀(漢) 四六五
十九　二十一畫
檸檬(日) 二九八
鵲豆(漢) 二八四
麴菌(日) 八
櫻草(日) 三九八

櫰槐（漢）	二六二
蘇方（漢）	二七五
蘇鐵（日）	二九
蘆薈（漢）	一〇五
穭豆（漢）	二七九
臘梅（漢）	二〇四
藤豆（日）	二八四
藤黃（漢）	三四六
蘗木（漢）	二九三
鐵樹（中俗）	二九
蘭菊（日）	四二六
蘭草（漢）	五二一
蘭蕉（漢）	一一七
蘡薁（漢）	三二九
藤袴（日）	五二一
蘘荷（漢）	一一六
纈草（日）	四七八
二十二—二十六畫	
藕木（日）	三一八
巖桂（漢）	四〇七
蘿摩（漢）	四一七
蘿蔔（漢）	二一八
鷺草（日）	一二〇
鱧腸（漢）	五一三
靈芝（日）	一二
鷗蔓（日）	四一八
蠶豆（漢）	二七六
鬱金（漢）	一一四
三字	
一—二畫	
一輪草（日）	一八一
二葉葵（日）	一五六
二輪草（日）	一九二
七島藺（日）	六七
七葉樹（漢）	三二三
八仙花（漢）	二二六
八重葎（日）	四七一
九年母（日）	二九四
九輪草（日）	三九七
九蓋草（日）	四五四
九階草（日）	四五四
十二單（日）	四三九
三畫	
大麻子（中俗）	四四六
大丁草（漢）	五一二
大鬼蓮（日）	一七六
大角豆（日）	二七二
大馬蓼（漢）	一五九
大葉藻（漢）	四四
小葉梣（漢）	四〇三
小豆蔻（日）	一一六
小卷丹（漢）	九三
小巢菜（漢）	二七四
小雁皮（日）	三五八
小連翹（漢）	三四五
小鹽竈（日）	四五六

小白根(日)　四三四
山小菜(漢)　四八九
小梅形(日)　九六
山牛蒡(日)　一六九
小判草(日)　五四
山毛櫸(漢)　一三四
小夏椿(日)　三四四
山白竹(漢)　六四
山百合(日)　一〇五
山苦蕒(漢)　四九〇
山茱萸(漢)　三八六
山扁豆(漢)　二六六
山胡桃(漢)　一二九
山荷葉(漢)　一九六
山菜豆(漢)　二八一
山蒲菜(漢)　二二〇
山梗菜(漢)　四八七
山慈姑(漢)　八三
山楂子(漢)　二四七
山櫻桃(漢)　二五八
山蘿蔔(漢)　四七九
千日草(日)　一六八
千日紅(漢)　一六八
千本鎗(日)　五一二
千屈菜(漢)　三六二
三七草(漢)　五〇七
三色堇(日)　三五一
三葉芹(日)　三八四
土馬騂(漢)　一五
千日菊(日)　五〇五
土常山(漢)　二二七
土當歸(漢)　三七一
千竹草(日)　二三二
四畫
水竹葉(漢)　七九
水苦蕒(漢)　四五二
水晶蘭(漢)　三八七
水楊梅(漢)　二五二
水龍骨(漢)　十七
水蠟樹(漢)　四〇三
木天蓼(漢)　三四一
木半夏(漢)　三六一
木防己(漢)　一九九
木珊瑚(日)　四七三
木芙蓉(漢)　三三六
木藜蘆(漢)　三九五
木角豆(日)　四五九
天仙果(漢)　一四三
天門冬(漢)　九一
天南星(漢)　七七
日日草(日)　四一六
月見草(日)　三六八
月季花(漢)　二三九
月桂樹(日)　二〇八
毛連菜(漢)　四九八
毛氈苔(日)　二二三

五蘞子(漢) 二八九
五釵松(漢) 三六
牛皮消(漢) 四一六
牛尾菜(漢) 九五
牛繁縷(日) 一七二
不斷草(日) 一六五
心太草(日) 七
孔雀草(日) 一八
父子草(日) 五一四
公孫樹(漢) 二九
元日草(日) 一九一
木栓樹(日) 一三八
犬黃楊(日) 三一五
犬胡麻(日) 四三〇
犬雁皮(日) 三五八

五畫

布袋草(日) 一一九
母子草(日) 五一七
立壺菫(日) 三五二
田五加(日) 五一二
瓦尼拉(拉) 一二三
田平子(日) 四二四
白萊菔 二一八
白山吹(日) 二五〇
白鶴花(中俗) 九七
白木蓮(日) 二〇三
白根葵(日) 一九一
白花菫(日) 三五一
白娵菜(日) 五一〇
白屈菜(漢) 二一〇
白粉花(日) 一六九
白頭翁(漢) 一八二
石呆樹(俗) 三一〇
石刁柏(漢) 八七
石花菜(漢) 七
石鹹樹(日) 二五九
石菖蒲(漢) 七六
石龍芮(漢) 一八九
石薺薴(漢) 四三〇
石鹼草(漢) 一七四
加麻刺(日) 三〇六
古倫僕(日) 二〇〇
玉羊齒(日) 一
玉蜀黍(漢) 五八
仙台萩(日) 二七五
矢車菊(日) 五二四
仙人頭(中俗) 三五六

六畫

羽子木(日) 一五二
合子草(漢) 四八一
百日紅(漢) 三六二
百日草(日) 五二〇
百脈根(漢) 二八五
光棍紅(中俗) 二八三
向日葵(漢) 五一九
光椰子(漢) 七〇

血止草(日)　三八一
西洋梨(日)　二五二
西洋莓(日)　二三八
回回蒜(漢)　一八三
肉豆蔻(漢)　二〇五
老鴉眼(中俗)　三三〇
虫捕堇(日)　四六二
老利兒(日)　二〇八
吉祥草(漢)　八九
安石榴(漢)　三六三
安息香(日)　四〇一
江南竹(漢)　六二
羊栖菜(漢)　五
多麻斗(日)　四四三
交讓木(漢)　三一〇
多羅葉(日)　三一七
伊蘋蔔(漢)　四一七
西洋莓(日)　二三八
行儀芝(日)　五三
七畫
阿列布(日)　四〇四
阿足示(日)　一三九
阿仙藥(日)　二六〇
沙列布(日)　一二一
杠谷樹(日)　四〇七
阿仙藥(日)　四六四
杠板歸(漢)　一五七
杜鵑花(漢)　三九三
牡丹蔓(日)　一九四
里木子(漢)　二九八
赤小豆(漢)　二六〇
延命菊(日)　四九五
赤牙槲(日)　三〇四
夾竹桃(漢)　四一四
車百合(日)　九二
貝細工(日)　五〇〇
車輪梅(日)　二四九
君影草(日)　九〇
車葉草(日)　四六九
君遷子(漢)　四〇一
男郎花(日)　四七七
谷空木(日)　四七五
佐保姬(日)　四五七
扶芳藤(漢)　三二〇
防臭木(日)　四二八
含羞草(漢)　二七八
八畫
夜繁花　一六九
使君子(漢)　三六四
治癇草(日)　四三二
依蘭苔(日)　一三
刺酸漿(日)　四四二
泥胡菜(漢)　五〇四
沿階草(漢)　九六
波羅樹(漢)　三一七
油點草(漢)　一〇三

青藜蘆　八二
青夾葉（漢）　三七五
花菖蒲（日）　一一二
花蘇芳（日）　二八三
金絲桃（漢）　三四八
金花菜（漢）　二六三
金絲梅（漢）　三四六
佩蘭葉　五二一
金魚藻（日）　一七九
金錢菊（中俗）　五一一
金魚草（日）　四五四
金粟蘭（漢）　一二六
金盞草（漢）　五〇五
金線草（漢）　一六三
金蓮花（漢）　二九〇
金銀木（日）　四七三
金縷梅（漢）　二三六
長春花（漢）　二三九
長壽花（漢）　一〇六
虎耳草（漢）　二三三
孟宗竹（日）　六二
吳茱萸（漢）　二九五
狗尾草（漢）　四九
狗酸醬（漢）　四四二
宜母子（漢）　二九八
東風菜（漢）　五〇九
第切草（日）
枝垂柳（日）　一二七
知風草（漢）　五一
岩澤瀉（日）　一七
岩高蘭（日）　三一〇
迎春花（漢）　四〇八
柿葉草（日）　三〇二
委陵菜（漢）　二四一
狐刺刀（日）　一〇六
延齡草（日）　八五
金雀枝　二六三
九畫
爬山虎（中俗）　三二九
洎芙蘭（日）　一一一
秋丁子（日）　四二九
紅葉葵（日）　三三七
秋牡丹（漢）　一八六
秋海棠（漢）　三五五
南天竹（漢）　一九七
南京豆（日）　二八一
括失亞（拉）　二九九
毒人參（日）　三八二
毒空木（日）　三一一
胡枝子（漢）　二八二
胡頹子（漢）　三六一
指甲桃（俗）　三二六
苦苣苔（漢）　四六一
苦楝子（漢）　二九九
待霄草（日）　三七〇
芎藭菜（漢）　二二二

珍珠菜(漢)　三九九
珍珠花(漢)　二四五
風輪菜(漢)　四三四
風露草(日)　二八八
砂糖桑(日)　五五
砂糟風(日)　三二三
咱芙藍(日)　一一一
眉掃草(日)　一二六
香香草(中俗)　五一
香茶菜(漢)　四二九
看麥娘(漢)　五七
相思子(漢)　二七七
柳穿魚(漢)　四五一
柳葉菜(漢)　三六七
柳葉桃(中俗)　四一四
毒蘿蔔(日)　三八二
紅空木　四七五
胡羅蔔(漢)　三八三
珊瑚樹(日)　四七三
美男葛(日)　二〇一
姥芽櫧(日)　一三四
十畫
粉米草(日)　四五五
凌霄花(漢)　四五八
桔梗蘭(日)　九一
酒母菌(漢)　八
海苔菜(日)　二
海金砂(漢)　二三
高野帚(日)　四九八
海桐花(漢)　二三三
海老根(日)　一一八
浦島草(日)　七三
熊谷草(日)　一一九
桃金孃(漢)　三六五
粉米花(日)　二四五
草石蠶(漢)　四三九
起苦樹(日)　四二七
草牡丹(日)　一八五
草珊瑚(漢)　一二五
笑靨花(漢)　二四七
馬齒莧(漢)　一七〇
馬兜鈴(漢)　一五四
馬鈴薯(漢)　四四四
馬錢子(漢)　四一〇
馬鞭草(漢)　四二六
馬來豆　五二二
唐胡麻(日)　三〇七
唐花草(日)　一四六
烏藤莓(漢)　三三〇
唐松草(日)　一八四
迷迭香(漢)　四四一
唐冬青(日)　二三四
唐三手(日)　三七二
厚皮香(漢)　三四五
狼把草(漢)　五一二
狼尾草(漢)　五九

蚊母樹（漢）二三四
徐長卿（漢）四一九
夏坊主（日）三五七

十一畫

盜人荻（日）二八一
喇叭花（中俗）四四六
婆婆納（漢）四五〇
娑羅樹（漢）三四九
淫羊藿（漢）一九六
旋覆花（漢）四九五
旌節花（漢）三四五
排草香（漢）四三三
接骨木（漢）四七六
通泉草（漢）四五六
通脫木（漢）三七三
硃砂根（漢）三九六
瓶子草（日）二二一
清風藤（漢）三二六
野木瓜（漢）一九五
野決明（漢）二七五
野芝麻（漢）四三二
野嗇薇（漢）二五四
笹龍膽（日）四一四
雀豌豆（日）二七四
雀鉄砲（日）五七
蛇葡萄（漢）三三〇
剪刀股（漢）五一九
剪夏羅（漢）一七三
密兒拉（日）三〇〇
麥角菌（日）九
牽牛子（漢）四一九
常春藤（漢）三七二
黃大豆（漢）二七七
黃心樹（漢）二〇〇
黃瓜菜（漢）五一六
黃花蒿（漢）五〇六
黃梔花（漢）四六八
雞醬蓋（日）三七二
黃蘿蔔三八三
黃素馨（日）四〇五
黃蜀葵（漢）三三六
鈎盤草（日）五一
黃瑞香（漢）三六〇
荷蘭芹（日）三七九
猪殃殃（漢）四七一
荷蘭莓（日）二三八
猪籠草（漢）二二二
睡蕃椒（日）四五〇
野蘿蔔（漢）二二一
梅鉢草（日）二二九

十二畫

紫茉莉（漢）一六九
紫金牛（漢）三九六
紫陽花二二六
紫玉簪（中俗）九〇
敦盛草（日）一一七

鹿尾菜(日)　五
鹿蹄草(漢)　三八七
黑文字(日)　二〇七
黑百合(日)　九二
富士松(日)　四一
菠稜菜(漢)　一六五
兎絲子(漢)　四二〇
菲沃斯(日)　四四七
萍連草(漢)　一七七
菩提樹(日)　三三三
菩提樹(漢)　一四九
無患子(漢)　三二四
富貴花(中俗)　一九二
無花果(漢)　一四二
絞股藍(漢)　四八〇
棣棠花(漢)　二五八
筋骨草(漢)　四三九
番木鼈(漢)　四一〇
雁來紅(漢)　一六八
博落迴(漢)　二一一
裙帶菜(漢)　五
酢漿草(漢)　二八九
朝鮮松(日)　三九
結縷草(漢)　五六
硫黃菌　一
紫丁香(中俗)　四〇九
雄刈萱(日)　五〇
笄石菖　八〇
琴柱草(日)　四三五
棕梠草(日)　九七
十三畫
獅子頭(日)　二十
葉下珠(漢)　三〇七
福壽草(日)　一九一
葉牡丹(日)　二二〇
葉鷄頭(日)　一六八
落花生(漢)　二八一
落葉松(漢)　四一
落霜紅(漢)　三一六
落新婦(日)　二三七
藥刺巴(日)　四二一
溝蕎麥(日)　一六二
萬年青(漢)　八六
萬壽果(漢)　三五五
萬壽菊(漢)　五一一
猿猴草(日)　一八二
蜀羊泉(漢)　四四八
碎米薺(漢)　二一九
齊墩果(漢)　四〇二
遏藍菜(漢)　二一六
道灌草(日)　一七四
鈴子香(漢)　四三七
鼠尾草(漢)　四二九
鼠麴草(漢)　五一七
十四畫
廣東葱(中俗)　九八

槐葉蘋(漢)　二四
廣心樹(漢)　二〇〇
構槭樹(日)　三二二
蒲公英(漢)　五一三
廣葉杉(日)　三五
樟牙菜(漢)　四一〇
酵母菌(日)　八
銀線草(漢)　一二六
腐敗菌　一
熊竹蘭(日)　一一五
鳳仙花(漢)　三二六
鳳尾松(漢)　二九
滿江紅(日)　二五
榎木草(日)　三〇五

漆枯草(漢)　一七五
十五畫
蝌蚪葉(日)　四六五
撒爾沙(日)　九四
蔓梅擬(日)　三一九
撒兒沙(日)　九四
蓬蒿菜(中俗)　五〇八
華澄茄(日)　一二五
蔓苔桃(日)　三九二
蝴蝶董(日)　三五一
蝴蝶花(漢)　一一一
蝴蝶樹(漢)　四七七
積雪草(日)　四三六
醉魚草(漢)　四〇九

糊空木(日)　二三二
諸葛菜(漢)　二二一
數珠玉(日)　五六
輪峯菊　四七九
穀精草(漢)　七八
編筐草(日)　三〇五
十六畫
漿瓣草　六
蕃南瓜(漢)　四八三
頭髮菜(日)　六
瓢簞木(日)　四七三
澤胡桃(日)　一二九
蕃石榴(漢)　三六六
蕃瓜樹(漢)　三五五

蕃紅花(漢)　一一一
蕃茄枝(漢)　二〇四
鴨兒芹(漢)　三八四
鴨跖草(漢)　七九
燈心草(漢)　八〇
錦帶花(漢)　四七六
錦鷄菊(日)　五〇四
戰捷木(日)　七一
麵包樹(日)　一四八
十七畫
濱木斛(日)　二四九
濱防風(日)　三八三
龍舌蘭(日)　一〇八
燕子花(漢)　一一〇

駿河蘭(日) 一二二
耬斗菜(漢) 一九三
龍芽草(漢) 二四二
薄雪草(日) 四九三

十八畫

鵞腸腸(漢) 一七五
檳榔子(漢) 七二
癒瘡木(日) 二九一
轉子蓮(漢) 一八三
鷄兒腸(漢) 五二二
鷄腸草(漢) 四二四
鵝漿果(英) 二三〇

十九畫

蠍子草(中俗) 一五一
藪柑子(日) 三九六
蠅捕草(日) 二二三
蟹蝙蝠(日) 五〇〇
羅望子(漢) 二七八
羅漢栢(漢) 三三
羅漢松(漢) 三二
蟻塔草(日) 三七〇

二十畫

麗春花(漢) 二一二
蘇合香(日) 二三五
罌子桐(漢) 三〇五
罌子粟(漢) 二〇一
鵯上戶(日) 四四八

二十一—二十二畫

攝涅瓦(日) 三〇三
露兜樹(日) 四三
獼猴桃(漢) 三四〇
繡線菊(漢) 二四八
鐵刀木(漢) 三四七
鐵掃帚(漢) 二八六
鐵線蓮(漢) 一九〇
懸鉤子(漢) 二四一
變豆菜(漢) 三七八
護謨樹(日) 一四七
龜葉草(日) 四三三

二十四—二十九畫

釀母菌(日) 八
鹽膚木(漢) 三一三
鹽皂草(日) 四五七
蠶繭草(漢) 一六〇
鬱金香(漢) 八四

四字

一—五畫

八角金盤(漢) 三七六
十大功勞(漢) 一九八
千成酸漿(日) 四四四
三葉通草 一九五
王不留行(漢) 一七四
水石龍芮(日) 二一五
毛白辛樹(日) 四〇二
天竺牡丹(日) 五一五
孔雀羊齒(日) 一八

加耶布的(日)三六四
加加阿木(日)三四〇
加密兒列(日)五〇二
大文字草(日)二三一
巴那麻草(日)　七三
卡塞恩草(日)四九九
井口邊草　一五
夫苦席阿(拉)三六九
天狗巢菌(日)　九
卡斯麻草(日)二六五
由加利樹(日)三六五
大山玄參(漢)四五二
大琉璃草(日)四二三
大婆婆納(日)四五一
古司白里(英)二三〇
玉紫陽花(日)二三一
六—八畫
阿路坑那(拉)四二三
西洋山葵(日)二一七
西洋赤根(日)四七〇
虫捕撫子(日)一七六
拉愛那拉(拉)一一四
西洋林檎(日)二五一
松葉牡丹(日)一七一
西洋鋸草(日)五一〇
拔惡拔勃(日)三三八
西洋薔薇(日)二五一
考盧苦櫟(拉)一三三
赤治風露(日)二八八
阿那那速(拉)　七八
別刺數那(拉)四四八
地獄荃蓋(日)四三五
波羅密樹(漢)一四八
河原松葉(日)四六七
考考凹木(日)三四〇
金銀蓮花(漢)四一一
岩南天竹(日)三九〇
米葉拇櫻(日)三九四
尾狀羊齒
岩柳葉菜(日)三六八
九畫
南五味子(漢)二〇一
兖州卷柏(漢)　二八
砂糖大根(日)一六四
秋鼠麴草(日)四九一
秋胡頹子(日)三六〇
秋之費菜(日)四九〇
耶僕蘭日(日)二九七
刺賢垤爾(日)四四一
為朝百合(日)　九九
持子羊齒(日)　十六
郡內風露(日)二八七
十畫
馬乍子菜(中俗)一七〇
海州常山(漢)四二五
蚊屋弔草(日)　六六

茳芒決明(漢)二六一
烟管頭草(日)五〇一
桃葉珊瑚(漢)三八四
桃葉衛矛(漢)三二一
亞爾尼加(拉)四九二
亞爾答亞(拉)三三三
草夾竹桃(日)四二二
草紫陽花(日)二三〇
粉米空樹(日)二四八

十一—十四畫

細葉菖蒲(中俗)七六
健質亞那(拉)四一二
娑羅雙樹(漢)三九四
側金盞花(漢)一九一
麻葉繡毬(漢)二四五
曼陀羅花(漢)四四六
牻牛兒苗(漢)二八八
象牙椰子(日)六八
紫蒲公英(日)五一二
紫花地丁(漢)三五二
答滿林度(日)二七八
嗎恩孤樹(日)三一四
獐耳細辛(漢)一八八
稚兒百合(日)九九
蜘蛛抱蛋(漢)一〇二
當藥龍膽(日)四一三
荷蘭千日(日)五〇五
梅花黃連(日)一八六
蚰蜒羊齒(日)一九
菱葉垣通(日)一五一
鹿子百合(日)八九

十五—二十一畫

撒爾維亞(日)四三六
魯別利亞(拉)四八九
鐵梗海棠(俗)二四三
墨里老篤(日)二八五
鐵脚海棠(中俗)二四三
雙葉細辛(漢)一五六
攝綿支奈(日)五一一
嘿阿聖篤(拉)一〇四
曩伽結樹(漢)一四八
鐵砲百合(日)九九
鷄脚大黃　一六〇
鴿祖麻路(琉球)一四四
蟹仙人掌(日)三五六

五字

一—五畫

乙斯蘭土苔(日)十三
五加葉黃連(日)一八八
白花除虫菊(日)五〇九
八百屋防風(日)三八三
巴拉護謨樹(日)三〇四
古爾矢屈謨(拉)九三
牛塞郎島麻(日)一〇三
古魯聖篤草(日)四八二
小桃葉衛矛(漢)三一八

加剌拔兒豆(日)二六六
五葉山躑躅(日)三九一
加斯加利剌(日)三〇六
大葉馬兜鈴(漢)一五五
大葉白辛樹(日)四〇二
大葉水蠟樹(漢)四〇四
六—十畫
西洋接骨木(日)四七四
洋馬芹子菜(中俗)一七一
伊吹鈴子香(日)四三一
海州骨碎補(漢)二一
恰白茲耶子(日)六八
勞孤吳島樹(日)二七九
草本威靈仙(漢)四五四
卡那比克草(日)一五二
印度護謨樹(日)一四七
鳥華烏爾矢(日)三九〇
林待拉潑來考苦(拉)
里篤麻斯苔(日)十四
十一—十八畫
圓葉落霜紅(日)三一五
剝度比爾謨(拉)一九八
遠州鬼督郵(日)四九四
喬考來島木(日)三四〇
滁州夏枯草(漢)四三一
舞鶴天南星(日)七三
荷蘭鴉兒芹(日)三七九
彈性護謨樹(日)三〇四
嗎恩古羅布(日)三六三
嗎豪哈尼樹(拉)三〇二
實支答里斯(拉)四五八
照葉野薔薇(日)二五六
蕎麥葉貝母(漢)八五
撒辯啞椰子(日)六九
薩沙富拉斯(拉)二〇八
菱葉積雪草(日)一五一
鵝毛玉鳳花(漢)一二〇
葩阿俺奴阿(拉)四八
六字—八字
亞美利加瞿麥(日)一七一
安母尼亞屈謨(日)三七六
盧比阿起男塞斯(拉)四六六
百露拔爾撒謨(日)二八四
車前葉山慈姑(漢)八八
待囊待比肥達(拉)二二九
剌苦去葛偪謨(日)五三三
倔答百兒加樹(日)三九九
撒而索拉曹達(拉)一六四
羅馬加密兒列(日)五二四
大葉井口邊草(日)一八
木本黃精葉鉤吻(漢)三二
印度彈性護謨樹(日)一四七
卡那達巴魯撒姆樹(拉)三四
亞拉昆亞護謨樹(日)二六一
篤留拔爾撒謨樹(日)二八〇
骨湃波拔爾撒謨樹(日)二七〇

脫肥路的阿加波尼卡(拉)一八四
格拉牛謨也錯烟色
司脫羅芳足斯(拉)四五
慎答吳里吳木(拉)四一二
卡梅累得內拉(拉)三八一
巴拉辯阿以茶(日)三一七
黑德拉斯題司(拉)一九七
阿魯奴司肥魯麻(拉)三二
拉吳羅塞拉司斯(拉)二五七
塞獨母利你亞來(拉)二二四
阿斯捕來尼吳木(拉)二〇
土拉格卡恩土護謨(日)二六
嗎恩孤斯他恩(拉)三四八

實用植物圖說

總目

漢字索引表
恩孫來路氏自然分類一覽表
術語圖解
植物分科圖說
學名索引表

恩孤來路氏（德人）自然分類一覽表　植物名下之字數為本文之頁數

第一部　分生植物　一

硫黃菌

腐敗菌

第二部　肉質植物

第三部　鞭毛類

第四部　鬼鞭毛類

疑問部硅質鞭毛類

第五部　硅藻類

第六部　接藻類

水綿（漢）　二

第七部　絲色藻類

○石蓴科

乾苔（漢）　二

石蓴（漢）

第八部　輪藻類　三

第九部　褐色藻類

○昆布科

昆布（漢）海帶（中俗）　三

黑菜（漢）荒布（日）　四

搗布

裙帶布（漢）若布、和布　五

羊栖菜、鹿尾菜（漢）　五

第十部　紅色藻類

○紅綿科

紫菜（漢）　六

○頭髮菜科

江蘺（漢）頭髮菜　六

○石花菜科

石花菜（漢）心太草　七

第十一部　真菌類

第一綱藻狀菌類　四

第二綱半子囊菌類　四

第三綱子囊菌類　五

一名真子囊菌類

○麴菌科

青黴（漢）　七

麴菌、糀菌

○酵母菌科　八

酵母菌、釀母菌、酒母菌、八
○肉座菌科
麥角菌　九
○外子囊菌科
天狗巢菌
第四綱蟲生子囊菌類
第五綱擔子菌類一名擔子
胞菌類
○蕈科
茅蕈　十
○木耳科
木耳(漢)　十
○菌蕈科
香蕈(漢)椎耳(日)　十一
松蕈(漢)松茸(日)　十一
○麥蕈科
麥蕈(漢)松露(日)　十二
○多孔菌科
紫芝、靈芝(漢)　十二
第三綱及第五綱之附屬
綱　地衣類
○丕挨米立挨科
乙斯蘭土苔　依蘭苔　十三
○石茸科
石茸(漢)　十三
○里篤麻斯地依科
里篤麻斯苔　十四
第十二部無管有胚之植物一名苔蘚植物
第一亞部苔蘚植物
第一綱地錢類一名苔類
○地錢科
地錢(漢)　十四
第二綱土馬騂類一名蘚類
○土馬騂科
土馬騂(漢)　十五
第二亞部羊齒植物
第一綱羊齒類
井口邊草　十五
子持羊齒　十六
第一目蕨類
第一亞目真羊齒類一名

蕨類
○苔葱科
○杪欏科
欏杪(漢)　十六
○水龍骨科
岩澤瀉　十七
水龍骨(漢)　十七
大葉井口邊草　十八
孔雀羊齒、孔雀草(日)　十八
蚰蜒羊齒(日)　十九
蕨(漢)　十九
阿斯浦來尼 吳木、加旁尼苦木(拉)　二十
獅子頭(日)　二十
海州骨碎補(漢)忍草(日)　二十一
玉羊齒(日)　二一
綿馬　二二
○水蕨科
○裏白科
裏白　二二
○海金砂科
海金砂(漢)　二三
○薇科
薇(漢)　二三
第二亞目水生羊齒類
一名蘋類
○蘋科
蘋(漢)　二四
○槐葉蘋科
槐葉蘋(漢)　二四
滿江紅(漢)　二五
第二目觀音座蓮類
○觀音座蓮科
第三目瓶爾小草類
第二綱楔葉類
第三綱木賊類
第一目真木賊類
○木賊科
問荊(漢)杉菜(日)　二五
木賊(漢)　二六
第二目蘆木類
第四綱石松卷柏類
第一目無舌石松卷柏類

第一亞目石松類
○石松科
岞芝(日)　二六
石松(漢)　二七
第二亞目松葉蘭類
○松葉蘭類科
第二目有舌石松卷柏類
第一亞目卷柏類
○卷柏科
卷柏(漢)　二七
兗州卷柏(漢)　二八
地柏(漢)　二八
第二亞目鱗木類
第三亞目木韭類
○木韭科
第十三部有管有胚植物
一名顯花植物
第一亞部裸子植物
第一綱蘇鐵類
○蘇鐵科
鳳尾松(漢)　二九
第二綱亞蘇鐵類
第三綱亞松柏類
第四綱公孫樹類
○公孫樹科
公孫樹、銀杏(漢)白果(俗)　二九
第五綱松柏類
加那佗把兒撒謨樹
○一位科
一位　三〇
粗榧(漢)　三〇
榧(漢)　三一
竹柏(漢)　三一
羅漢松(漢)槙、柏槙　三二
○松科
赤松(漢)　三二
黑松(漢)　三三
羅漢柏(漢)　三三
金松(漢)　三四
卡那達巴魯撒姆樹(漢)　三四
速加加泡尼卡(拉)　三五
沙木(漢)廣葉杉(日)　三五

五釵松(漢)　三六
側柏(漢)　三六
米姆(日)　三七
花柏(漢)　三七
杉(漢)　椙　三八
栂　三八
海松(漢)　朝鮮松(日)　三九
杜松(日)　三九
杜松(漢)　四〇
扁柏(漢)　檜(日)　四〇
檜、檜柏(漢)　栢心、白身、白心(日)　四一
富士松(日)　落葉松(漢)　四一
檓(日)　樅(漢)　四二
第六綱　麻黃類

○麻黃科
麻黃(漢)　四二
第二亞部被子植物
第一綱單子葉類
第一目榮蘭類
○香蒲科
香蒲(漢)　四三
○榮蘭科
榮蘭露兜樹　四三
○黑三稜科
第二目沼生類
○眼子菜科
大葉藻(漢)　四四
蝦藻(日)　四四

○茨藻科
茨藻　四五
○芝菜科
○澤瀉科
澤瀉(漢)　四五
慈姑(漢)　四六
○水鼈科
黑藻(日)　四六
苦草(漢)　四七
水鼈(漢)　四七
第三目本鄉草類
○本鄉草科
第四目穎花類
○禾本科

粟(漢)　四八
葩阿俺奴阿　四八
稻粳米(漢)　四九
狗尾草(漢)　四九
雄刈萱(日)　五〇
大麥(漢)　五〇
知風草(漢)香香草(中俗)　五一
釣盤草　五一
烏麥(日)　五二
青茅(漢)刈安(日)　五二
稷(漢)　五三
行儀芝(日)　五三
小判草(日)俵麥(日)　五四
薑草(漢)　五四
小麥(漢)　五五
甘蔗(漢)砂糖黍(日)　五五
結縷草(漢)芝草(日)　五六
川穀(漢)數珠玉(日)　五六
芒(漢)薄(日)　五七
看麥娘(漢)雀鐵砲(日)　五七
雀稗(日)　五八
玉蜀黍(漢)　五八
白茅茅針(漢)　五九
狼尾草(漢)　五九
力草(漢)　六〇
稗(漢)　六〇
淡竹(漢)　六一
薏苡(漢)鴿麥(日)　六一
穆(漢)　六二
江南竹(漢)孟宗竹(日)　六二
菰(漢)茭白(中俗)　六三
毒麥(日)　六三
山白竹箬竹(漢)　六四
蘆葦(漢)　六四
刈萱(日)　六五
○莎草科
笠莎(日)　六五
蚊屋弔草(日)　六六
烏芋(漢)勃薺　六六
茳芏(漢)七島藺　六七
莞(漢)太藺　六七

第五目棕櫚類

○棕櫚科
恰白茲耶子(日)　六八
象牙椰子　六八
撒翕啞椰子　六九
棕梠椶櫚(漢)　六九
省藤(漢)　七〇
桄榔子(漢)　七〇
戰捷木　七一
蒲葵(漢)　七一
檳榔子(漢)　七二
椰子(漢)　七二
第六目合花類
○巴那嗎草科
巴那嗎草　七三
第七目佛燄花類
○天南星科
虎掌(漢)　七三
野芋(漢)　七四
半夏(漢)　七四
白菖(漢)菖蒲(中俗)　七五
青芋(漢)　七五
蒟蒻(漢)　七六
石菖石菖蒲(漢)　七六
天南星(漢)　七七
○浮萍科
水萍(漢)浮萍(中俗)　七七
第八目粉狀胚乳類
○山藤科
○穀精草科
穀精草(漢)　七八
○鳳梨科
鳳梨(漢)　七八
○鴨跖草科
水竹葉(漢)　七九
鴨跖草(漢)　七九
○雨久花科
○狸菖蒲科
第九目百合花類
○燈心草科
燈心草(漢)　八〇
笄石菖(日)　八〇
雀稗(日)　八一

○百部科
百部(漢)　八一
○百合科
青黎蘆　八二
麥葱絲葱(漢)　八二
萎蕤(漢)　八三
山慈姑(漢)　八三
肥路的阿加波尼卡(拉)　八四
鬱金香(漢)　八四
蕎麥葉貝母(漢)　八五
延齡草　八五
卷丹(漢)　八六
萬年青(漢)　八六
石刀柏(漢)　八七
苦榮羅肥土謨卡麻司謨(拉)　八七
海葱(漢)　八八
車前葉山慈姑(漢)　八八
鹿子百合　八九
吉祥草(漢)　八九
紫萼(漢)紫玉簪(中俗)　九〇
君影草(日)　九〇
天門冬(漢)　九一
桔梗蘭(日)　九一
車百合　九二
黑百合　九二
小卷丹　九三
古爾矢屈謨　九三
百合(漢)　九四
撒爾沙撒兒沙　九四
菝葜(漢)　九五
牛尾菜(漢)　九五
小梅形(日)　九六
沿階草(漢)龍鬚(日)　九六
藜蘆(漢)棕榈草(日)　九七
玉簪(漢)白鶴花(中俗)　九七
玉葱(日)廣東葱洋葱(中俗)　九八
海羅你握浦塞司不來唯卡浦撒(拉)　九八
為朝百合(日)鐵砲百合(日)　九九
稚兒百合(日)　九九
魯斯苦斯阿苦來阿土斯(拉)　一〇〇
韮(漢)　一〇〇
葫(漢)蒜(中俗)　一〇一

葱(漢) 胡葱(俗) 一〇一
山蒜(漢) 一〇二
蜘蛛抱蛋一葉(漢) 葉蘭(日) 一〇二
牛塞郎鳥麻 一〇三
由點草(漢) 一〇三
嘿阿脭篤 一〇四
薤(漢) 一〇四
蘆薈(漢) 一〇五
山百合(日) 一〇五
○石蒜科
長壽花(漢) 一〇六
狐剃刀(日) 一〇六
水仙(漢) 一〇七
玉簾(日) 一〇七
石蒜(漢) 一〇八
龍舌蘭(日) 一〇八
○薯蕷科
薯蕷(漢) 山葯(中俗) 一〇九
○鳶尾科
溪孫(漢) 一〇九
鳶尾(漢) 一一〇
燕子花(漢) 一一〇
蕃紅花(漢) 咱夫蘭(日) 一一一
蝴蝶花(漢) 一一二
花菖蒲 一一三
射干(漢) 檜扇(日) 一一三
第十目芭蕉類
○芭蕉科
芭蕉(漢) 一一三
甘蕉(漢) 一一三
拉愛那拉 一一四
○蘘荷科
鬱金(漢) 一一四
熊竹蘭(日) 一一五
生薑(漢) 薑(中俗) 一一五
小豆蔻 一一六
蘘荷(漢) 茗荷(日) 一一六
○曇華科
曇華蘭焦(漢) 桓特 一一七
第十一目微子類
○雛錫杖科
○蘭科

敦盛草(日)　一一七
海老根蝦根(日)　一一八
金蘭(日)　一一八
銀蘭(日)　一一九
熊谷草布袋草(日)　一一九
鵝毛玉鳳花(漢)　一二〇
澤蘭(日)　一二〇
沙列布　一二一
白及(漢)紫蘭(日)　一二一
建蘭(漢)　一二二
石斛(漢)　一二二
春蘭　一二三
瓦尼拉(拉)　一二三
第二綱雙子葉類
第一亞綱離瓣類
第一目輪生類
○木麻黃科
第二目胡椒類
○三白草科
蕺草(漢)十藥(中俗)　三四
○胡椒科
胡椒(漢)　一二四
蓽澄茄　一二五
○金粟蘭科
草珊瑚(漢)　一二五
金粟蘭(漢)　一二六
銀線草(漢)眉掃草　一二六
及己(漢)　一二七
第三目楊柳類
○楊柳科
柳(漢)　一二七
泥樹(日)綿樹(日)　一二八
第四目楊梅類
○楊梅科
楊梅(漢)　一二八
第五目巴拉撓布斯類
第六目拉衣島奈利亞類
第七目胡桃類
○胡桃科
山胡桃(漢)　一二九
澤胡桃　一二九
第八目山毛榉類

○樺木科
卡阿皮奴司加跑尼卡(拉)一三〇
白樺(日)一三〇
角榛(日)一三一
榛(漢)一三一
赤楊(漢)一三二
阿魯奴司肥魯麻(拉)一三二
○殼斗科
血櫧(漢)赤樫(日)一三三
老蘆苦櫟一三三
山毛舉(漢)一三四
姥芽櫧(日)一三四
槲(漢)柏一三五
櫟(漢)一三五
栗(漢)一三六
柁(漢)楢(俗)一三六
柯樹(漢)椎木一三七
櫧(漢)白樫(日)一三七
椈一三八
木栓樹一三八
第九目蕁麻類
○榆科
榔榆(漢)一三九
厚子阿足示(日)一三九
朴樹(漢)一名楨一四〇
櫸(漢)一四〇
榆(漢)一四一
○桑科
榕樹(漢)一四一
大麻(漢)一四二
無花果(漢)一四二
天仙果(漢)一四三
楮(漢)一四三
構(漢)谷樹一四四
鴿祖麻路(琉球語)一四四
葎草(漢)一四五
桑(漢)一四五
唐花草(日)一四六
桑草(日)一四六
印度彈性護謨樹(漢)一四七
乳樹(日)一四七
波羅密樹曩伽結樹(漢)一四八

麪包樹(日) 一四八
菩提樹(漢) 一四九
忽布 一四九
○蕁麻科
赤苧 一五〇
蕁麻(漢)蠍子草 一五一
菱葉垣通菱葉積雪草(日) 一五一
苧麻(漢) 一五二
第十一目山茂樫類
○山茂樫科
第十一目檀香類
○檀香科
卡那比克草(日) 一五二
羽子木(日) 一五三
檀香白檀(漢) 一五三
○幌幌木科
○槲寄生科
惟衣斯苦母阿魯巴母(拉) 一五四
○蛇菰科
第十二目馬兜鈴類
○馬兜鈴科
馬兜鈴(漢) 一五四
大葉馬兜鈴 一五五
杜衡(漢) 一五五
雙葉細辛(漢) 一五六
第十三目蓼類
○蓼科
藍(漢) 一五六
杠板歸(漢) 一五七
虎杖(漢) 一五七
馬蓼(漢) 一五八
拳參(漢) 一五八
大馬蓼(日) 一五八
紅草(漢)紅蓼(中俗) 一五九
羊蹄(漢)鷄脚大黃 一六〇
蠶繭草(漢) 一六〇
酸模(漢) 一六一
蕎麥(漢) 一六一
大黃(漢) 一六二
溝蕎麥 一六二
金線草(漢) 一六三
第十四目中央子類

○藜科
藜(漢)灰菜(俗)　一六三
撒而索拉曹達(拉)　一六四
砂糖大根(日)　一六四
恭菜(漢)唐苣不斷草(日)　一六五
菠稜菜(漢)　一六五
地膚(漢)　一六六
○莧科
丈莧(日)　一六六
牛膝(漢)　一六七
鷄冠(漢)　一六七
千日紅(漢)千日草(日)　一六八
雁來紅(漢)　一六八
○紫茉莉科
紫茉莉(漢)白粉花　一六九
○大和草科
○商陸科
商陸(漢)山牛蒡　一六九
○蕃杏科
蕃杏(漢)　一七〇
○馬齒莧科
馬齒莧(漢)　一七〇
松葉牡丹(日)　一七一
○落葵科
○石竹科
亞美利加瞿麥(日)　一七一
牛繁縷(日)　一七二
瞿麥(漢)　一七二
石竹(漢)　一七三
剪夏羅(漢)　一七三
石鹼草(日)　一七四
王不留行(漢)　一七四
漆姑草(漢)　一七五
繁縷(漢)　一七五
虫捕撫子(日)　一七六
第十五目毛茛類
○睡蓮科
大芡實(日)　一七六
芡實(漢)　一七七
萍蓮草(漢)　一七七
蓴(漢)　一七八
蓮(漢)　一七八

睡蓮(漢) 一七九
○金魚草科
金魚藻(日) 輪藻 一七九
○雲葉科
開阿塞敵肥路 姆加波你苦姆(拉) 一八〇
山車(日) 一八〇
○毛茛科
塔利苦陶蘆木 米奴司愛拉脫姆(拉) 一八一
一輪草(日) 一八一
猿猴草 一八二
白頭翁(漢) 一八二
轉子蓮(漢) 一八三
回回蒜(漢) 一八三
唐松草(日) 一八四
毛茛(漢) 一八四
梯老里吳司爬足盧司(拉) 一八五
草牡丹(日) 一八五
五加葉黃蓮(日) 梅花黃蓮(日) 一八六
秋牡丹(漢) 一八六
芍藥(漢) 一八七
克米克夫吳格肥題達塞木波來苦司(拉) 一八七
獐耳細辛(漢) 一八八
菟葵(漢) 一八八
大蓼(漢) 一八九
石龍芮(漢) 一八九
鐵線蓮(漢) 一九〇
烏頭附子(漢) 一九〇
白根葵(日) 一九一
側金盞花(漢) 一九一
牡丹(漢) 一九二
二輪草(日) 一九二
耬斗菜(漢) 一九三
黃蓮(漢) 一九三
牡丹蔓 一九四
○木通科
通草(漢) 一九四
三葉通葉 一九五
野木瓜(漢) 一九五
○小蘗科
淫羊藿(漢) 一九六
山荷葉(漢) 一九六
南天門(漢) 一九七

黑德拉斯題斯（拉）一九七
十大功勞（漢）一九八
剝度比爾謨一九八
小蘖（漢）一九九
○防已科
木防已（漢）一九九
古倫僕二〇〇
○木蘭科
廣心樹、黃心樹（漢）二〇〇
辛夷（漢）二〇一
南五味子（漢）二〇一
莽草（漢）櫟二〇二
木蘭、木蓮（漢）二〇二
玉蘭（漢）白木蓮（日）二〇三
厚朴（漢）二〇三
○臘梅科
臘梅（漢）二〇四
○蕃茄枝科
蕃茄枝（漢）二〇四
○肉豆蔻科
肉豆蔻（漢）二〇五
○樟科
林待拉潑來考苦（拉）二〇五
犬樟（日）二〇六
樟（漢）二〇六
鉤樟（漢）黑文字（日）二〇七
桂皮、桂（漢）二〇七
月桂樹、老利兒二〇八
薩沙富拉斯（拉）二〇八
里島塞阿孤拉吳卡（拉）二〇九
肉桂二〇九
○蓮葉桐科
第十六目罌粟類
○罌粟科
白屈菜（漢）二一〇
罌子粟（漢）二一〇
駒草（日）二一一
博落迴（漢）二一一
麗春花（漢）二一二
紫堇（漢）二一二
○白花菜科
魚木（日）二一三

○十字花科
蕓薹(漢)油菜　二一三
蔊菜(漢)　二一四
葶藶(漢)　二一四
水石龍芮(日)　二一五
蕪菁(漢)　二一五
芥(漢)　二一六
遏藍菜(漢)　二一六
西洋山葵(日)　二一七
那司土魯題吳木爬魯司脫來(拉)　二一七
萊菔蘿蔔(漢)大根(日)　二一八
大青菘藍(漢)　二一八
碎米薺(漢)　二一九
薺(漢)　二一九
甘藍(漢)葉牡丹(日)　二二〇
山葡菜(漢)　二二〇
野蘿蔔　二二一
○木犀草科
第十七目瓶子草類
○瓶子草科
瓶子草　二二一
○猪籠草科
猪龍草(漢)　二二二
○茅膏菜科
茅膏菜(漢)　二二二
蠅捕草(日)　二二三
毛氊苔　二二三
貉藻　二二四
第十八目薔薇類
○景天科
塞獨姆利你亞而利(拉)　二二四
費菜(漢)　二二五
景天(漢)　二二五
塞獨姆喜保魯抵(拉)　二二六
○虎耳草科
八仙花(漢)紫陽花　二二六
土常山(漢)　二二七
落新婦　二二七
岩搦(日)　二二八
溲疏(漢)　二二八
梅鉢草(日)　二二九
待囊待比肥達(拉)　二二九

古司白里鷲漿果(英)　二三〇
紫草陽花(日)　二三〇
大文字草(日)　二三一
玉紫陽花(日)　二三一
糊空木(日)　糊木(日)　二三二
阿斯題盧彼起乃恩席斯加保尼蛤(拉)　二三二
虎耳草(漢)　二三三

○海桐花科

海桐花(漢)　二三三
唐冬青(日)　二三四

○金縷樓科

蚊母樹(漢)　二三四
蘇合香　二三五
楓(漢)　二三五

金縷梅(漢)　二三六

○篠懸木科

○薔薇科

扁桃(漢)　二三六
杏(漢)　二三七
梅(漢)　二三七
泡台題爾拉苦來尼亞那(拉)　二三八
荷蘭莓西洋莓(日)　二三八
海棠(漢)　二三九
月季花、長春花(漢)　二三九
構莓　二四〇
赤芽(日)　二四〇
委陵菜(漢)　二四一
懸鉤子(漢)　二四一

龍芽草(漢)　二四二
鎌柄(日)　殺牛(日)　二四二
櫨子(漢)　二四三
苦蘇(日)　二四三
木瓜(漢)　二四四
雉席(日)　二四四
珍珠花(漢)　二四五
麻葉繡球(漢)　二四五
爬滕題拉夫魯撒(拉)　題考　二四六
櫻　二四六
山櫨子(漢)　二四七
笑靨花(漢)　二四七
繡線菊(漢)　二四八
粉米空樹(日)　二四八

阿埋郎其阿（阿塞阿題卡拉）二四九
濱木斛（日）車輪梅（日）二四九
李（漢）二五〇
白山吹（日）二五〇
西洋薔薇二五一
西洋林檎二五一
水楊梅（漢）二五二
西洋梨（日）二五二
梨（漢）二五三
郁李（漢）二五三
野薔薇（漢）二五四
玫瑰（漢）二五四
枇杷（漢）二五五
蛇莓（漢）二五五
榅桲（漢）二五六
照葉野薔薇（日）二五六
桃（漢）二五七
拉吳羅塞拉斯司二五七
棣棠花（漢）山吹二五八
山櫻桃梅桃（漢）二五八
石鹼樹（日）二五九
實櫻二五九
○荳科
阿仙葯二六〇
赤小豆（漢）二六〇
亞拉昆亞護謨樹二六一
茳芒決明（漢）二六一
欀槐（漢）二六二
菜荳（漢）二六二
苜蓿（漢）金花菜二六三
金雀枝二六三
箙藤（日）二六四
槐（漢）二六四
豌豆（漢）二六五
卡斯麻草（日）二六五
山扁豆（漢）二六六
加剌拔兒豆（漢）二六六
甘草（漢）二六七
吉納二六七
木蘇（日）二六八
合萠（漢）二六八
草藤（漢）二六九

葛（漢）　二六九
苦參（漢）　二七〇
骨淨波拔爾撒謨樹　二七〇
馬棘（漢）　二七一
脫里否里吳木（里培恩司拉）　二七一
皂莢（漢）　二七二
豇豆（漢）大角豆　二七二
紫檀（漢）　二七三
雲實（漢）　二七三
狸豆（日）　二七四
小巢菜（漢）　二七四
蘇方（漢）　二七五
野決明、黃華（漢）　二七五
旃那　二七六

蠶豆（漢）　二七六
大豆、黃大豆（漢）　二七七
相思子（漢）　二七七
含羞草（漢）　二七八
羅望子（漢）答滿林度（日）　二七八
鹿藿（漢）穭豆（日）　二七九
勞孤吳島樹　二七九
篤留拔爾撒謨樹　二八〇
刀豆（漢）　二八〇
落花生（漢）長生果（中俗）　二八一
山菜豆（漢）盜人荻（日）　二八一
合歡（漢）　二八二
胡枝子（漢）荻（中俗）　二八二
紫荊（漢）　二八三

紫藤（漢）　二八三
鵲豆扁豆（漢）　二八四
百露拔爾撒謨　二八四
百脉根（漢）　二八五
墨里老篤　二八五
鐵掃帚（漢）蕎荻　二八六
土拉格卡恩土護謨　二八六
洋槐（中俗）刺槐狗槐（日）　二八七

第十九目攏牛兒類

○攏牛兒科

郡內風露（日）　二八七
赤沼風露（日）　二八八
攏牛兒苗（漢）　二八八

○酢漿草科

酢漿草（漢）　二八九
五斂子羊桃（漢）　二八九
○金蓮花科
金蓮花（漢）　二九〇
○亞麻科
亞麻　二九〇
○古加科
古加古柯　二九一
○蒺藜科
癒瘡木　二九一
○芸香科
崖椒（漢）　二九二
枸橘（漢）　二九二
黃蘗蘗木黃柏（漢）　二九三
金橘（漢）　二九三
香橙（漢）九年母（日）　二九四
常山（漢）　二九四
吳茱萸（漢）　二九五
山椒秦椒（漢）　二九五
臭橙（漢）　二九六
芸香（漢）　二九六
柑（漢）蜜橘　二九七
耶僕蘭日
柚（漢）　二九八
里木子宜母子（漢）　二九八
○苦木科
括失亞　二九九
苦楝子（漢）　二九九
○橄欖科
乳香（漢）　三〇〇
蜜皃拉
○楝科
楝（漢）　三〇一
香椿（漢）　三〇一
嗎豪蛤尼樹　三〇二
○金虎尾科
○遠志科
柿葉草（日）　三〇二
攝涅瓦　三〇三
遠志（漢）　三〇三
○大戟科
巴西護謨樹　三〇四

赤芽槲(日) 三〇四
罌子桐(漢) 三〇五
榎木草編笠草(日) 三〇五
加斯加利刺 三〇六
加麻刺(漢) 三〇六
葉下珠(漢) 三〇七
蓖麻(漢) 三〇七
大戟(漢) 三〇八
彈性護謨樹 三〇八
烏臼(漢) 三〇九
巴豆(漢) 三〇九
交讓木(漢) 三一〇
○水馬齒科
第二十目無患子類
○黃楊科
○岩高蘭科
岩高蘭 三一〇
○毒空木科
木本黃精葉鉤吻(漢) 三一一
○漆樹科
漆樹(漢) 三一一
野葛(漢) 三一二
乳香(漢) 三一二
鹽膚木(漢) 三一三
黃櫨(櫨)(漢) 三一三
嗎恩孤樹 三一四
山漆(日) 三一四
○冬青科
圓葉落霜紅(日) 三一五
犬黃楊(日) 三一五
落霜紅(漢) 三一六
冬青(漢) 三一六
波羅樹(漢) 三一七
把拉弇阿以茶 三一七
黐木 三一八
○衛茅科
小桃葉衛茅 三一八
釣花(日) 三一九
蔓梅擬(日) 三一九
扶芳藤(漢) 三二〇
衛茅(漢) 三二〇
柾(中俗) 三二一

駿河蘭(日)　一二二
耬斗菜(漢)　一九三
龍芽草(漢)　二四二
薄雪草(日)　四九三

十八畫

鶩腸腸(漢)　一七五
檳榔子(漢)　七二
癒瘡木(日)　二九一
轉子蓮(漢)　一八三
鷄兒腸(漢)　五二二
鷄腸草(漢)　四二四
鵝漿果(英)　二三〇

十九畫

蠍子草(中俗)　一五一
數柑子(日)　三九六
蠅捕草(日)　二二三
蟹蝙蝠(日)　五〇〇
羅望子(漢)　二七八
羅漢栢(漢)　三三
羅漢松(漢)　三二
蟻塔草(日)　三七〇

二十畫

麗春花(漢)　二一二
蘇合香(日)　二三五
罌子桐(漢)　三〇五
罌子粟(漢)　二〇一
鵝上戶(日)　四四八

二十一—二十二畫

攝涅瓦(日)　三〇三
露兜樹(日)　四三
獼猴桃(漢)　三四〇
繡線菊(漢)　二四八
鐵刀木(漢)　三四七
鐵掃帚(漢)　二八六
鐵線蓮(漢)　一九〇
懸鈎子(漢)　二四一
變豆菜(漢)　三七八
護謨樹(日)　一四七
龜葉草(日)　四三三

二十四—二十九畫

釀母菌(日)　八
鹽膚木(漢)　三一三
鹽皂草(日)　四五七
蠶繭草(漢)　一六〇
鬱金香(漢)　八四

四字

一—五畫

八角金盤(漢)　三七六
十大功勞(漢)　一九八
千成酸漿(日)　四四四
三葉通草　一九五
王不留行(漢)　一七四
水石龍芮(日)　二一五
毛白辛樹(日)　四〇二
天竺牡丹(日)　五一五
孔雀羊齒(日)　一八

加耶布的(日)三六四
加加阿木(日)三四〇
加密兒列(日)五〇二
大文字草(日)二三一
巴那麻草(日)七三
卡塞恩草(日)四九九
井口邊草　一五
夫苦席阿(拉)三六九
天狗巢菌(日)九
卡斯麻草(日)二六五
由加利樹(日)三六五
大山玄參(漢)四五二
大琉璃草(日)四二三
大婆婆納(日)四五一
古司白里(英)二三〇
玉紫陽花(日)二三一

六—八畫

阿路坑那(拉)四二三
西洋山葵(日)二一七
西洋赤根(日)四七〇
虫捕撫子(日)一七六
拉愛那拉(拉)一一四
西洋林檎(日)二五一
松葉牡丹(日)一七一
西洋鋸草(日)五一〇
拔惡拔勃(日)三三八
西洋薔薇(日)二五一
考盧苦櫟(拉)一三三
赤治風露(日)二八八
阿那那速(拉)七八
別刺敦那(拉)四四八
地獄荃蓋(日)四三五
波羅密樹(漢)一四八
河原松葉(日)四六七
考考凹木(日)三四〇
金銀蓮花(漢)四一一
岩南天竹(日)三九〇
米葉拇櫻(日)三九四
尾狀羊齒
岩柳葉菜(日)三六八

九畫

南五味子(漢)二〇一
兖州卷柏(漢)二八
砂糖大根(日)一六四
秋鼠麴草(日)四九一
秋胡頹子(日)三六〇
秋之費菜(日)四九〇
耶僕蘭日(日)二九七
刺賢垤爾(日)四四一
為朝百合(日)九九
持子羊齒(日)十六
郡內風露(日)二八七

十畫

馬乍子菜(中俗)一七〇
海州常山(漢)四二五
蚊屋弔草(日)六六

茳芒決明(漢)二六一
烟管頭草(日)五〇一
桃葉珊瑚(漢)三八四
桃葉衛矛(漢)三二一
亞爾尼加(拉)四九二
亞爾答亞(拉)三三三
草夾竹桃(日)四二二
草紫陽花(日)二三〇
粉米空樹(日)二四八

十一—十四畫

細葉菖蒲(中俗)七六
健質亞那(拉)四一二
娑羅雙樹(漢)三九四
側金盞花(漢)一九一
麻葉繡球(漢)二四五
曼陀羅花(漢)四四六
牻牛兒苗(漢)二八八
象牙椰子(日)六八
紫蒲公英(日)五一二
紫花地丁(漢)三五二
答滿林度(日)二七八
嗎恩孤樹(日)三一四
獐耳細辛(漢)一八八
稚兒百合(日)九九
蜘蛛抱蛋(漢)一〇二
當藥龍膽(日)四一三
荷蘭千日(日)五〇五
梅花黃連(日)一八六
蚰蜒羊齒(日)一九
菱葉垣通(日)一五一
鹿子百合(日)八九

十五—二十一畫

撒爾維亞(日)四三六
魯別利亞(拉)四八九
鐵梗海棠(俗)二四三
墨里老篤(日)二八五
鐵脚海棠(中俗)二四三
雙葉細辛(漢)一五六
攝綿支奈(日)五一一
嘿阿聖篤(拉)一〇四
曩伽結樹(漢)一四八
鐵砲百合(日)九九
鷄脚大黃　一六〇
鴿祖麻路(琉球)一四四
蟹仙人掌(日)三五六

五字

一—五畫

乙斯蘭土苔(日)十三
五加葉黃連(日)一八八
白花除虫菊(日)五〇九
八百屋防風(日)三八三
巴拉護謨樹(日)三〇四
古爾矢屈謨(拉)九三
牛塞郎島麻(日)一〇三
古魯聖篤草(日)四八二
小桃葉衛矛(漢)三一八

加剌拔兒豆(日)二六六
五葉山躑躅(日)三九一
加斯加利剌(日)三〇六
大葉馬兜鈴(漢)一五五
大葉白辛樹(日)四〇二
大葉水蠟樹(漢)四〇四

六—十畫

西洋接骨木(日)四七四
洋馬芹子菜(中俗)一七一
伊吹鈴子香(日)四三一
海州骨碎補(漢)二一
恰白茲耶子(日)六八
勞孤吳島樹(日)二七九
草本威靈仙(漢)四五四
卡那比克草(日)一五二
印度護謨樹(日)一四七
烏華烏爾矢(日)三九〇
林待拉潑來考苦(拉)
里篤麻斯苔(日)十四

十一—十八畫

圓葉落霜紅(日)三一五
剝度比爾謨(拉)一九八
遠州鬼督郵(日)四九四
喬考來島木(日)三四〇
滁州夏枯草(漢)四三一
舞鶴天南星(日)七三
荷蘭鴉兒芹(日)三七九
彈性護謨樹(日)三〇四
嗎恩古羅布(日)三六三
嗎豪哈尼樹(拉)三〇二
實支答里斯(拉)四五八
照葉野薔薇(日)二五六
蕎麥葉貝母(漢)八五
撒搿啞椰子(日)六九
薩沙富拉斯(拉)二〇八
菱葉積雪草(日)一五一
鵝毛玉鳳花(漢)一二〇
葩阿俺奴阿(拉)四八

六字—八字

亞美利加瞿麥(日)一七一
安母尼亞屈謨(日)三七六
盧比阿起男塞斯(拉)四六六
百露拔爾撒謨(日)二八四
車前葉山慈姑(漢)八八
待囊待比肥達(拉)二二九
剌苦丟葛偪謨(日)五三
倔答百兒加樹(日)三九九
撒而索拉曹達(拉)一六四
羅馬加密兒列(日)五二四
大葉井口邊草(日)一八
木本黃精葉鉤吻(漢)三二
印度彈性護謨樹(日)一四七
卡那達巴魯撒姆樹(拉)三四
亞拉昆亞護謨樹(日)二六一
篤留拔爾撒謨樹(日)二八〇
骨湃波拔爾撒謨樹(日)二七〇

脫肥路的阿加波尼卡(拉)八四
格拉牛謨也錯烟色
司脫羅芳足斯(拉)四五
慎答吳里吳木(拉)四二
卡梅累得內拉(拉)三八一
巴拉搿阿以茶(目)三一七
黑德拉斯題司(拉)一九七
阿魯奴司肥魯麻(拉)一三三
拉吳羅塞拉司斯(拉)二五七
塞獨母利你亞來(拉)二二四
阿斯捕來尼吳木(拉)二〇
土拉格卡恩土護謨(目)六六
嗎恩孤斯他恩(拉)三四八

第一部　分生植物　一

硫黃菌

腐敗菌

第二部　肉質植物

第三部　鞭毛類

第四部　鬼鞭毛類

疑問部硅質鞭毛類

第五部　硅藻類

第六部　接藻類

水綿（漢）　二

第七部　綠色藻類

○石蓴科

乾苔（漢）　二

石蓴（漢）

第八部　輪藻類

第九部　褐色藻類

○昆布科

昆布（漢）海帶（中俗）　三

黑菜（漢）荒布（日）　四

搗布

裙帶布（漢）若布、和布　五

○富苦司科

羊栖菜鹿尾菜（漢）　五

第十部　紅色藻類

○紅綿科

紫菜（漢）　六

○頭髮菜科

江蘺（漢）頭髮菜　六

○石花菜科

石花菜（漢）心太草　七

第十一部　真菌類

第一綱藻狀菌類

第二綱半子囊菌類

第三綱子囊菌類

一名真子囊菌類

○麴菌科

青黴（漢）　七

麴菌糊菌

○酵母菌科　八

酵母菌、釀母菌、酒母菌、八
○肉座菌科
麥角菌　九
○外子囊菌科
天狗巢菌　九
第四綱蟲生子囊菌類
第五綱擔子菌類一名擔子
胞菌類
○茅蕈科
茅蕈　十
○木耳科
木耳(漢)　十
○菌蕈科
香蕈(漢)椎耳(日)　十一
松蕈(漢)松茸(日)　十一
○麥蕈科
麥蕈(漢)松露(日)　十二
○多孔菌科
紫芝、靈芝(漢)　十二
第三綱及第五綱之附屬
綱　地衣類
○丕挨米立挨科
乙斯蘭土苔　依蘭苔　十三
○石茸科
石茸(漢)　十三
○里篤麻斯地依科
里篤麻斯苔　十四
第十二部無管有胚之植
物一名苔蕨植物
第一亞部苔蘚植物
第一綱地錢類一名苔類
○地錢科
地錢(漢)　十四
第二綱土馬騌類一名蘚類
○土馬騌科
土馬騌(漢)　十五
第二亞部羊齒植物
第一綱羊齒類
井口邊草　十五
子持羊齒　十六
第一目蕨蘋類
第一亞目真羊齒類一名

蕨類
○苔葱科
○杪欏科
欏杪(漢)　十六
○水龍骨科
岩澤瀉　十七
水龍骨(漢)　十七
大葉井口邊草　十八
孔雀羊齒、孔雀草(日)　十八
蚰蜒羊齒(日)　十九
蕨(漢)　十九
阿斯浦來尼 吳木、加旁尼苦木(拉)　二十
獅子頭(日)　二十
海州骨碎補(漢)　忍草(日)　二十一
玉羊齒(日)　二一
綿馬　二二
○水蕨科
○裏白科
裏白　二二
○海金砂科
海金砂(漢)　二三
○薇科
薇(漢)　二三
第二亞目水生羊齒類
一名蘋類
○蘋科
蘋(漢)　二四
○槐葉蘋科
槐葉蘋(漢)　二四
滿江紅(漢)　二五
第二目觀音座蓮類
○觀音座蓮科
第三目瓶爾小草類
第二綱楔葉類
第三綱木賊類
第一目真木賊類
○木賊科
問荊(漢)　杉菜(日)　二五
木賊(漢)　二六
第二目蘆木類
第四綱石松卷柏類
第一目無舌石松卷柏類

第一亞目石松類
○石松科
岐芝(日)　二六
石松(漢)　二七
第二亞目松葉蘭類
○松葉蘭類科
第二目有舌石松卷柏類
第一亞目卷柏類
○卷柏科
卷柏(漢)　二七
兖州卷柏(漢)　二八
地柏(漢)　二八
第二亞目鱗木類
第三亞目木韮類
○木韮科
第十三部有管有胚植物
一名顯花植物
第一亞部裸子植物
第一綱蘇鐵類
○蘇鐵科
鳳尾松(漢)　二九
第二綱亞蘇鐵類
第三綱亞松柏類
第四綱公孫樹類
○公孫樹科
公孫樹銀杏(漢)白果(俗)　二九
第五綱松柏類
加那倪把皃撒謨樹
○一位科
一位　三〇
粗榧(漢)　三〇
榧(漢)　三一
竹柏(漢)　三一
羅漢松(漢)槙柏槙　三二
○松科
赤松(漢)　三二
黑松(漢)　三三
羅漢柏(漢)　三三
金松(漢)　三四
卡那達巴魯撒姆樹(漢)　三四
速加加泡尼卡(拉)　三五
沙木(漢)廣葉杉(日)　三五

五釵松(漢)　三六
側柏(漢)　三六
米姆(日)　三七
花柏(漢)　三七
杉(漢)　椙　三八
栂　三八
海松(漢)　朝鮮松(日)　三九
杜松(日)　三九
杜松(漢)　四〇
扁柏(漢)　檜(日)　四〇
檜、檜柏(漢)　栢心、白身、白心(日)　四一
富士松(日)　落葉松(漢)　四一
檓(日)　樅(漢)　四二
第六綱　麻黃類

○麻黃科
麻黃(漢)　四二
第二亞部被子植物
第一綱單子葉類
第一目榮蘭類
○香蒲科
香蒲(漢)　四三
○榮蘭科
榮蘭露兜樹　四三
○黑三稜科
第二目沼生類
○眼子菜科
大葉藻(漢)　四四
蝦藻(日)　四四

○茨藻科
茨藻　四五
○芝菜科
○澤瀉科
澤瀉(漢)　四五
慈姑(漢)　四六
○水鼈科
黑藻(日)　四六
苦草(漢)　四七
水鼈(漢)　四七
第三目本鄉草類
○本鄉草科
第四目穎花類
○禾本科

粟(漢)　四八
葩阿俺奴阿
稻粳米(漢)　四八
狗尾草(漢)　四九
雄刈萱(日)　四九
大　麥(漢)　五〇
知風草(漢)　香香草(中俗)　五一
釣盤草
烏麥(日)　五一
青茅(漢)　刈安(日)　五二
稷(漢)　五二
行儀芝(日)　五三
小判草(日)　儀麥(日)　五三
薑草(漢)　五四
小麥(漢)　五四
甘蔗(漢)　砂糖黍(日)　五五
結縷草(漢)　芝草(日)　五六
川穀(漢)　數珠玉(日)　五六
苦(漢)　薄(日)　五七
看麥娘(漢)　雀鐵砲(日)　五七
雀稗(日)　五八
玉蜀黍(漢)　五八
白茅茅針(漢)　五九
狼尾草(漢)　五九
力草(漢)　六〇
稗(漢)　六〇
淡竹(漢)　六一
薏苡(漢)　鴿麥(日)　六一
穆(漢)　六二
江南竹(漢)　孟宗竹(日)　六二
菰(漢)　茭白(中俗)　六三
毒麥(日)　六三
山白竹　箬竹(漢)　六四
蘆葦(漢)　六四
刈萱(日)　六五
○莎草科
笠莎(日)　六五
蚊屋弔草(日)　六六
烏芋(漢)　荸薺　六六
茳芏(漢)　七島藺　六七
莞(漢)　太藺　六七

第五目棕櫚類

○棕櫚科
恰白茲耶子(日)　六八
象牙椰子　六八
撒拿啞椰子　六九
棕梠梭櫚(漢)　六九
省藤(漢)　七〇
桄榔子(漢)　七〇
戰捷木
蒲葵(漢)　七一
檳榔子(漢)　七一
椰子(漢)　七二
第六目合花類
○巴那嗎草科
巴那嗎草　七三
第七目佛燄花類
○天南星科
虎掌(漢)　七三
野芋(漢)　七四
半夏(漢)　七四
白菖(漢)菖蒲(中俗)　七五
青芋(漢)　七五
蒟蒻(漢)　七六
石菖石菖蒲(漢)　七六
天南星(漢)　七七
○浮萍科
水萍(漢)浮萍(中俗)　七七
第八目粉狀胚乳類
○山藤科
○穀精草科
穀精草(漢)　七八
○鳳梨科
鳳梨(漢)　七八
○鴨跖草科
水竹葉(漢)　七九
鴨跖草(漢)　七九
○雨久花科
○狸菖蒲科
第九目百合花類
○燈心草科
燈心草(漢)　八〇
筊石菖(日)　八〇
雀稗(日)　八一

○百部科
百部(漢)　八一
○百合科
青黎蘆　八二
麥葱、絲葱(漢)　八二
萎蕤(漢)　八三
山慈姑(漢)　八三
肥路的阿加波尼卡(拉)　八四
鬱金香(漢)　八四
蕎麥葉貝母(漢)　八五
延齡草　八五
卷丹(漢)　八六
萬年青(漢)　八六
石刀柏(漢)　八七
苦榮羅肥土謨卡麻司謨(拉)　八七
海葱(漢)　八八
車前葉山慈姑(漢)　八八
鹿子百合　八九
吉祥草(漢)　八九
紫萼(漢)紫玉簪(中俗)　九〇
君影草(日)　九〇
天門冬(漢)　九一
桔梗蘭(日)　九一
車百合　九二
黑百合　九二
小卷丹　九三
古爾矢屈謨　九三
百合(漢)　九四
撒爾沙撒兒沙　九四
菝葜(漢)　九五
牛尾菜(漢)　九五
小梅形(日)　九六
沿階草(漢)龍髭(日)　九六
藜蘆(漢)棕梠草(日)　九七
玉簪(漢)白鶴花(中俗)　九七
玉葱(日)廣東葱、洋葱(中俗)　九八
海羅你握浦塞司不來唯卡浦撒(拉)　九八
為朝百合(日)鐵砲百合(日)　九九
稚兒百合(日)　九九
魯斯苦斯阿苦來阿土斯(拉)　一〇〇
韭(漢)　一〇〇
葫(漢)蒜(中俗)　一〇一

葱(漢) 胡葱(俗) 一〇一
山蒜(漢) 一〇二
蜘蛛抱蛋一葉(漢) 葉蘭(日) 一〇二
牛塞郎鳥麻 一〇三
由點草(漢) 一〇三
嘿阿腥篤 一〇四
薤(漢) 一〇四
蘆薈(漢) 一〇五
山百合(日) 一〇五
○石蒜科
長壽花(漢) 一〇六
狐剃刀(日) 一〇六
水仙(漢) 一〇七
玉簾(日) 一〇七
石蒜(漢) 一〇八
龍舌蘭(日) 一〇八
○薯蕷科
薯蕷(漢) 山葯(中俗) 一〇九
○鳶尾科
溪蓀(漢) 一〇九
鳶尾(漢) 一一〇
燕子花(漢) 一一〇
蕃紅花(漢) 咱夫蘭(日) 一一一
蝴蝶花(漢) 一一二
花菖蒲 一一三
射干(漢) 檜扇(日) 一一三
第十目芭蕉類
○芭蕉科
芭蕉(漢) 一一三
甘蕉(漢) 一一三
拉愛那拉 一一四
○蘘荷科
鬱金(漢) 一一四
熊竹蘭(日) 一一五
生薑(漢) 薑(中俗) 一一五
小豆蔻 一一六
蘘荷(漢) 茗荷(日) 一一六
○曇華科
曇華、蘭焦(漢) 桓特 一一七
第十一目微子類
○雛錫杖科
○蘭科

敦盛草(日)　一一七
海老根蝦根(日)　一一八
金蘭(日)　一一八
銀蘭(日)　一一九
熊谷草布袋草(日)　一一九
鵝毛玉鳳花(漢)　一二〇
澤蘭(日)　一二〇
沙列布　一二一
白及(漢)紫蘭(日)　一二一
建蘭(漢)　一二二
石斛(漢)　一二二
春蘭　一二三
瓦尼拉(拉)　一二三
第二綱雙子葉類
第一亞綱離瓣類
第一目輪生類
○木麻黃科
第二目胡椒類
○三白草科
蕺草(漢)十葯(中俗)　三四
○胡椒科
胡椒(漢)　一二四
蓽澄茄　一二五
○金粟蘭科
草珊瑚(漢)　一二五
金粟蘭(漢)　一二六
銀線草(漢)眉掃草　一二六
及己(漢)　一二七
第三目楊柳類
○楊柳科
柳(漢)　一二七
泥樹(日)綿樹(日)　一二八
第四目楊梅類
○楊梅科
楊梅(漢)　一二八
第五目巴拉橈布斯類　一二九
第六目拉衣島奈利亞類
第七目胡桃類
○胡桃科
山胡桃(漢)　一二九
澤胡桃　一二九
第八目山毛櫸類

○樺木科
卡阿皮奴司加跑尼卡(拉)一三〇
白樺(日)一三〇
角榛(日)一三一
榛(漢)一三一
赤楊(漢)一三二
阿魯奴司肥魯麻(拉)一三二
○殼斗科
血櫧(漢)赤樫(日)一三三
考蘆苦櫟一三三
山毛櫸(漢)一三四
姥芽櫧(日)一三四
槲(漢)柏一三五
櫟(漢)一三五
栗(漢)一三六
枹(漢)櫧(俗)一三六
柯樹(漢)椎木一三七
櫧(漢)白樫(日)一三七
椚一三八
木栓樹一三八
第九目蕁麻類
○榆科
榔榆(漢)一三九
厚子阿足示(日)一三九
朴樹(漢)一名楨一四〇
櫸(漢)一四〇
榆(漢)一四一
○桑科
榕樹(漢)一四一
大麻(漢)一四二
無花果(漢)一四二
天仙果(漢)一四三
楮(漢)一四三
構(漢)谷樹一四四
鴿祖麻路(琉球語)一四四
葎草(漢)一四五
桑(漢)一四五
唐花草(日)一四六
桑草(日)一四六
印度彈性護謨樹(漢)一四七
乳樹(日)一四七
波羅密樹曩伽結樹(漢)一四八

麻包樹(日)　一四八
菩提樹(漢)　一四九
忽布　一四九
○蕁麻科
赤苧　一五〇
蕁麻(漢)蠍子草　一五一
菱葉垣通菱葉積雪草(日)　一五一
苧麻(漢)　一五二
第十一目山茂樫類
○山茂樫科
第十一目檀香類
○檀香科
卡那比克草(日)　一五二
羽子木(日)　一五三
檀香白檀(漢)　一五三
○幌幌木科
○槲寄生科
惟衣斯苦母阿魯巴母(拉)　一五四
○蛇菰科
第十二目馬兜鈴類
○馬兜鈴科
馬兜鈴(漢)　一五四
大葉馬兜鈴　一五五
杜衡(漢)　一五五
雙葉細辛(漢)　一五六
第十三目蓼類
○蓼科
藍(漢)　一五六
杠板歸(漢)　一五七
虎杖(漢)　一五七
馬蓼(漢)　一五八
拳參(漢)　一五八
大馬蓼(日)　一五八
紅草(漢)紅蓼(中俗)　一五九
羊蹄(漢)鷄脚大黃　一六〇
蠶繭草(漢)　一六〇
酸模(漢)　一六一
蕎麥(漢)　一六一
大黃(漢)　一六二
溝蕎麥　一六二
金線草(漢)　一六三
第十四目中央子類

○藜科
藜(漢)灰菜(俗)　一六三
撒而索拉曹達(拉)　一六四
砂糖大根(日)　一六四
恭菜(漢)唐苣不斷草(日)　一六五
菠稜菜(漢)　一六五
地膚(漢)　一六六
○莧科
丈莧(日)　一六六
牛膝(漢)　一六七
鷄冠(漢)　一六七
千日紅(漢)千日草(日)　一六八
雁來紅(漢)　一六八
○紫茉莉科
紫茉莉(漢)白粉花　一六九
○大和草科
○商陸科
商陸(漢)山牛蒡　一六九
○蕃杏科
蕃杏(漢)　一七〇
○馬齒莧科
馬齒莧(漢)　一七〇
松葉牡丹(日)　一七一
○落葵科
○石竹科
亞美利加瞿麥(日)　一七一
牛繁縷(日)　一七二
瞿麥(漢)　一七二
石竹(漢)　一七三
剪夏羅(漢)　一七三
石鹼草(日)　一七四
王不留行(漢)　一七四
漆姑草(漢)　一七五
繁縷(漢)　一七五
虫捕撫子(日)　一七六
第十五日毛茛類
○睡蓮科
大芡實(日)　一七六
芡實(漢)　一七七
萍蓮草(漢)　一七七
蓴(漢)　一七八
蓮(漢)　一七八

睡蓮(漢) 一七九

○金魚草科

金魚藻(日) 輪藻 一七九

○雲葉科

開阿塞敵肥路 姆加波你苦姆(拉) 一八〇

山車(日) 一八〇

○毛茛科

塔利苦陶蘆木 米奴司愛拉脫姆(拉) 一八一

一輪草(日) 一八一

猿猴草 一八二

白頭翁(漢) 一八二

轉子蓮(漢) 一八三

回回蒜(漢) 一八三

唐松草(日) 一八四

毛茛(漢) 一八四

梯老里吳司爬足盧司(拉) 一八五

草牡丹(日) 一八五

五加葉黃蓮(日) 梅花黃蓮(日) 一八六

秋牡丹(漢) 一八六

芍藥(漢) 一八七

克米克夫吳格肥題達塞木波來苦司(拉) 一八七

獐耳細辛(漢) 一八八

菟葵(漢) 一八八

大蓼(漢) 一八九

石龍芮(漢) 一八九

鐵線蓮(漢) 一九〇

烏頭附子(漢) 一九〇

白根葵(日) 一九一

側金盞花(漢) 一九一

牡丹(漢) 一九二

二輪草(日) 一九二

耬斗菜(漢) 一九三

黃蓮(漢) 一九三

牡丹蔓 一九四

○木通科

通草(漢) 一九四

三葉通葉 一九五

野木瓜(漢) 一九五

○小蘗科

淫羊藿(漢) 一九六

山荷葉(漢) 一九六

南天門(漢) 一九七

黑德拉斯題斯（拉）一九七
十大功勞（漢）一九八
剝度比爾謨一九八
小蘖（漢）一九九
○防已科
木防已（漢）一九九
古倫僕二〇〇
○木蘭科
廣心樹、黃心樹（漢）二〇〇
辛夷（漢）二〇一
南五味子（漢）二〇一
莽草（漢）二〇二
木蘭、木蓮（漢）二〇二
玉蘭（漢）白木蓮（日）二〇三
厚朴（漢）二〇三
○臘梅科
臘梅（漢）二〇四
○蕃茄枝科
蕃茄枝（漢）二〇四
○肉豆蔻科
肉豆蔻（漢）二〇五
○樟科
林待拉潑來考苦（拉）二〇五
犬樟（日）二〇六
樟（漢）二〇六
鉤樟（漢）黑文字（日）二〇七
桂皮、桂（漢）二〇七
月桂樹、老利兒二〇八
薩沙富拉斯（拉）二〇八
里島塞阿孤拉吳卡（拉）二〇九
肉桂二〇九
○蓮葉桐科
第十六目罌粟類
○罌粟科
白屈菜（漢）二一〇
罌子粟（漢）二一〇
駒草（日）二一一
博落迴（漢）二一一
麗春花（漢）二一二
紫堇（漢）二一二
○白花菜科
魚木（日）二一三

○十字花科
蕓薹(漢)油菜　二一三
蔊菜(漢)　二一四
葶藶(漢)　二一四
水石龍芮(日)　二一五
蕪菁(漢)　二一五
芥(漢)　二一六
遏藍菜(漢)　二一六
西洋山葵(日)　二一七
那司土魯題吳木爬魯司脫來(拉)　二一七
萊菔蘿蔔(漢)大根(日)　二一八
大青菘藍(漢)　二一八
碎米薺(漢)　二一九
薺(漢)　二一九
甘藍(漢)葉牡丹(日)　二二〇
山葡菜(漢)　二二〇
野蘿蔔　二二一
○木犀草科
第十七目瓶子草類
○瓶子草科
瓶子草　二二一
○猪籠草科
猪龍草(漢)　二二二
○茅膏菜科
茅膏菜(漢)　二二二
蠅捕草(日)　二二三
毛氊苔　二二三
貉藻　二二四
第十八目薔薇類
○景天科
塞獨姆利你亞而利(拉)　二二四
費菜(漢)　二二五
景天(漢)　二二五
塞獨姆喜保魯抵(拉)　二二六
○虎耳草科
八仙花(漢)紫陽花　二二六
土常山(漢)　二二七
落新婦　二二七
岩搦(日)　二二八
溲疏(漢)　二二八
梅鉢草(日)　二二九
待囊待比肥達(拉)　二二九

古司白里鷲漿果(英)　二三〇
紫草陽花(日)　二三〇
大文字草(日)　二三一
玉紫陽花(日)　二三一
糊空木(日)　糊木(日)　二三二
阿斯題盧彼起乃恩席斯加保尼蛤(拉)　二三二
虎耳草(漢)　二三三

○海桐花科

海桐花(漢)　二三三
唐冬青(日)　二三四

○金縷樓科

蚊母樹(漢)　二三四
蘇合香　二三五
楓(漢)　二三五

金縷梅(漢)　二三六

○篠懸木科

○薔薇科

扁桃(漢)　二三六
杏(漢)　二三七
梅(漢)　二三七
泡台題爾拉苦來尼亞那(拉)　二三八
荷蘭苺西洋苺(日)　二三八
海棠(漢)　二三九
月季花長春花(漢)　二三九
構苺　二四〇
赤芽(日)　二四〇
委陵菜(漢)　二四一
懸鉤子(漢)　二四一

龍芽草(漢)　二四二
鎌柄(日)　殺牛(日)　二四二
櫨子(漢)　二四三
苦蘇(日)　二四三
木瓜(漢)　二四四
雉席(日)　二四四
珍珠花(漢)　二四五
麻葉繡球(漢)　二四五
爬滕題拉夫魯(拉)　題考撒　二四六
櫻　二四六
山櫨子(漢)　二四七
笑靨花(漢)　二四七
繡線菊(漢)　二四八
粉米空樹(日)　二四八

阿埋郎其阿（阿塞阿題卡拉）　二四九
濱木斛（日）車輪梅（日）　二四九
李（漢）　二五〇
白山吹（日）　二五〇
西洋薔薇　二五一
西洋林檎　二五一
水楊梅（漢）　二五二
西洋梨（日）　二五二
梨（漢）　二五三
郁李（漢）　二五三
野薔薇（漢）　二五四
玫瑰（漢）　二五四
枇杷（漢）　二五五
蛇莓（漢）　二五五
榅桲（漢）　二五六
照葉野薔薇（日）　二五六
桃（漢）　二五七
拉吳羅塞拉斯司　二五七
棣棠花（漢）山吹　二五八
山櫻桃梅桃（漢）　二五八
石鹼樹（日）　二五九
實櫻　二五九
○荳科
阿仙葯　二六〇
赤小豆（漢）　二六〇
亞拉昆亞護謨樹　二六一
茳芒決明（漢）　二六一
欀槐（漢）　二六二
菜荳（漢）　二六二
苜蓿（漢）金花菜　二六三
金雀枝　二六三
箙藤（日）　二六四
槐（漢）　二六四
豌豆（漢）　二六五
卡斯麻草（日）　二六五
山扁豆（漢）　二六六
加剌拔兒豆（漢）　二六六
甘草（漢）　二六七
吉納　二六七
木蔴（日）　二六八
合萠（漢）　二六八
草藤（漢）　二六九

葛(漢) 二六九
苦參(漢) 二七〇
骨湃波拔爾撒謨樹 二七〇
馬棘(漢) 二七一
脫里否里吳木(里培恩司拉) 二七一
皂莢(漢) 二七二
豇豆(漢)大角豆 二七二
紫檀(漢) 二七三
雲實(漢) 二七三
狸豆(日) 二七四
小巢菜(漢) 二七四
蘇方(漢) 二七五
野決明、黃華(漢) 二七五
旃那 二七六
蠶豆(漢) 二七六
大豆、黃大豆(漢) 二七七
相思子(漢) 二七七
含羞草(漢) 二七八
羅望子(漢)答滿林度(日) 二七八
鹿藿(漢)穭豆(日) 二七九
勞孤吳島樹 二七九
篤留拔爾撒謨樹 二八〇
刀豆(漢) 二八〇
落花生(漢)長生果(中俗) 二八一
山菉豆(漢)盜人荻(日) 二八一
合歡(漢) 二八二
胡枝子(漢)荻(中俗) 二八二
紫荊(漢) 二八三
紫藤(漢) 二八三
鵲豆扁豆(漢) 二八四
百露拔爾撒謨 二八四
百脉根(漢) 二八五
墨里老篤 二八五
鐵掃帚(漢)蓍荻 二八六
土拉格卡恩土護謨 二八六
洋槐(中俗)刺槐狗槐(日) 二八七

第十九目犤牛兒類

○犤牛兒科
郡內風露(日) 二八七
赤沼風露(日) 二八八
犤牛兒苗(漢) 二八八

○酢漿草科

酢漿草（漢）　二八九
五敏子、羊桃（漢）　二八九
○金蓮花科
金蓮花（漢）　二九〇
○亞麻科
亞麻　二九〇
○古加科
古加古柯　二九一
○蒺藜科
癒瘡木　二九一
○芸香科
崖椒（漢）　二九二
枸橘（漢）　二九二
黃蘗、蘗木、黃柏（漢）　二九三

金橘（漢）　二九三
香橙（漢）九年母（日）　二九四
常山（漢）　二九四
吳茱萸（漢）　二九五
山椒秦椒（漢）　二九五
臭橙（漢）　二九六
芸香（漢）　二九六
柑（漢）蜜橘　二九七
耶僕蘭日柚（漢）　二九七
里木子宜母子（漢）　二九八
○苦木科
括失亞　二九九
苦楝子（漢）　二九九

○橄欖科
乳香（漢）　三〇〇
蜜皃拉　三〇〇
○楝科
楝（漢）　三〇一
香椿（漢）　三〇一
嗎豪蛤尼樹　三〇二
○金虎尾科
○遠志科
柿葉草（日）　三〇二
攝涅瓦　三〇三
遠志（漢）　三〇三
○大戟科
巴西護謨樹　三〇四

赤牙槲(日) 三〇四
罌子桐(漢) 三〇五
榎木草編笠草(日) 三〇五
加斯加利剌 三〇六
加麻剌(漢) 三〇六
葉下珠(漢) 三〇七
蓖麻(漢) 三〇七
大戟(漢) 三〇八
彈性護謨樹 三〇八
烏臼(漢) 三〇九
巴豆(漢) 三〇九
交讓木(漢) 三一〇
○水馬齒科
第二十目無患子類
○黃楊科
○岩高蘭科
岩高蘭 三一〇
○毒空木科
木本黃精葉鉤吻(漢) 三一一
○漆樹科
漆樹(漢) 三一一
野葛(漢) 三一二
乳香(漢) 三一二
鹽膚木(漢) 三一三
黃櫨(櫨)(漢) 三一三
嗎恩孤樹 三一四
山漆(日) 三一四
○冬青科
圓葉落霜紅(日) 三一五
犬黃楊(日) 三一五
落霜紅(漢) 三一六
冬青(漢) 三一六
波羅樹(漢) 三一七
把拉弇阿以茶 三一七
藕木 三一八
○衛茅科
小桃葉衛茅 三一八
釣花(日) 三一九
蔓梅擬(日) 三一九
扶芳藤(漢) 三二〇
衛茅(漢) 三二〇
柾(中俗) 三二一

桃葉衛茅(漢)　三二一
○省沽油科
○槭樹科
構槭樹(日)　三二二
槭樹(漢)　三二二
砂糖楓(日)　三二三
○七葉樹科
七葉樹(漢)　三二三
○無患子科
無患子(漢)　三二四
龍眼(漢)　三二四
荔枝(漢)　三二五
○泡吹科
泡吹(日)　三二五

清風藤(漢)　三二六
○鳳仙花科
鳳仙花(漢)　三二六
第二十一目鼠李類
○鼠李科
熊柳(日)　三二七
鼠李(漢)　三二七
枳椇(漢)　三二八
棗(漢)　三二八
○葡萄科
蘡薁(漢)　三二九
地錦(漢)　三二九
蛇葡萄(漢)　三三〇
烏蘞莓(漢)　三三〇

葡萄(漢)　三三一
第二十二目錦葵類
○膽八樹科
○田麻科
田麻(漢)　三三一
科木(日)　三三二
黃麻(漢)　三三二
菩提樹(日)　三三三
○錦葵科
亞爾答亞(拉)　三三三
苘麻(漢)　三三四
阿不起羅米格良波塔米苦母(拉)　三三四
錦葵(漢)　三三五
蜀葵(漢)　三三五

黃蜀葵(漢) 三三六
木芙蓉(漢) 三三六
木槿(漢) 三三七
紅葉葵 三三七
草綿(漢) 三三八
○木綿科
拔惡拔勃 三三八
木綿(漢) 三三九
○梧桐科
梧桐(漢) 三三九
加加阿木 三四〇
第二十三目側膜胎座類
○獼猴桃科
獼猴桃(漢) 三四〇
木天蓼 三四一
○山茶科
楊桐(漢) 榊(日) 三四一
茶梅(漢) 三四二
茗茶(漢) 三四二
山茶(漢) 三四三
夏椿(日) 三四三
柃(漢) 三四四
小夏椿(日) 三四四
厚皮香(漢) 三四五
○金絲桃科
小連翹(漢) 弟切草 三四五
金絲梅(漢) 三四六
藤黃海藤(漢) 三四六
鐵刀木(漢) 三四七
巴草 三四七
金絲桃(漢) 三四八
嗎恩孤斯他恩(拉) 三四八
龍腦香科
娑羅樹娑羅雙樹(漢) 三四九
龍腦(漢) 三四九
○溝繁縷科
○椵柳科
椵柳御柳(漢) 三五〇
○堇菜科
葵堇(日) 三五〇
三色堇(日) 三五一
白花堇(日) 三五一

紫花地丁(漢)堇菜　三五二
立壺堇　三五二
堇菜(漢)　三五三
匀堇(日)　三五三
○椅科
椅(漢)　三五四
○旌節花科
旌節花(漢)　三五四
○西蕃蓮科
○蕃瓜樹科
蕃瓜樹萬壽果(漢)　三五五
○秋海棠科
秋海棠(漢)　三五五
第二十四目仙人掌類

○仙人掌科
仙人頭(俗)開來吳司麻路題浦來可斯(拉)　三五六
蟹仙人掌　三五六
第二十五目桃金孃花類
○瑞香科
夏坊主鬼縛(日)　三五七
雁皮　三五七
沈香(漢)　加羅　三五八
小雁皮(日)大雁皮(日)　三五八
瑞香(漢)　三五九
芫花(漢)　三五九
結香黃瑞香(漢)三服(日)　三六〇
○胡頹子科
秋胡頹子(日)　三六〇

木半夏(漢)　三六一
胡頹子(漢)　三六一
○千屈菜科
紫薇百日紅(漢)　三六二
千屈菜(漢)　三六二
○安石榴科
安石榴(漢)　三六三
○玉蘂科
○紅樹科
嗎恩古羅布　三六三
○使君子科
使君子(漢)　三六四
○桃金孃科
加耶布的　三六四

丁香（漢）丁子　三六五
桃金孃（漢）　三六五
蕃石榴（漢）　三六六
蒲桃（漢）　三六六
由加利樹　三六七
○野牡丹科
○柳葉菜科
柳葉菜（漢）赤花（日）　三六七
岩柳葉菜　三六八
月見草　三六八
夫苦席阿（拉）　三六九
菱芰實（漢）　三六九
待霄草（日）　三七〇
蟻塔科
蟻塔草　三七〇
○杉菜藻科
第二十六目繖形花類
○五加科
五加（漢）　三七一
土當歸（漢）　三七一
隱蓑（漢）　三七二
常春藤（漢）　三七二
楤木（漢）　三七三
通草、通脫木（漢）　三七三
土參（漢）　三七四
人參（漢）　三七四
青葵葉（漢）　三七五
刺楸（漢）　三七五
八角金盤（漢）　三七六
○繖形科
安母尼亞屈謨（拉）　三七六
阿魏　三七七
邪蒿（漢）　三七七
茴香（漢）　三七八
變豆菜（漢）　三七八
荷蘭芹　三七九
荷蘭鴨兒芹（日）　三七九
胡荽（漢）　三八〇
水芹、水蘄芹（漢）　三八〇
卡梅累得內拉（拉）　三八一
血止草（日）　三八一
毒芹（日）　三八二

毒人參(日)毒蘿蔔(日)三八二
胡蘿蔔(漢)三八三
濱防風(日)八百屋防風(日)三八三
鴨兒芹(漢)三葉芹(日)三八四
○山茱萸科
桃葉珊瑚(漢)三八四
瓜木日三八五
考阿奴司依古撓拉他(拉)三八五
山茱萸(漢)三八六
第二亞綱合瓣類
第一目石南類
○令法科
令法三八六
○鹿蹄草科
鹿蹄草(漢)三八七
水晶蘭(漢)三八七
○石南科
格吳路梯里亞阿帶撓陶里茲(拉)三八八
巴苦喜牛姆日牙波你苦謨(拉)三八八
梫木(漢)三八九
岩梨(日)三八九
岩南天竹(日)三九〇
烏華烏兒矢三九〇
石巖(漢)三九一
五葉山躑躅(日)三九一
越橘(漢)三九二
蔓苔桃(日)三九二
杜鵑花(漢)三九三
石南(漢)三九三
哖克阿恩祖司加保尼苦司(拉)三九四
米葉拇櫻(日)三九四
木藜蘆(漢)三九五
○岩梅科
岩鏡(日)三九五
第二目櫻草類
○紫金牛科
硃砂根(漢)三九六
紫金牛(漢)藪柑子(日)三九六
○櫻草科
里席麻其阿夫盧格里司(拉)三九七
九輪草(日)三九七
小茄(日)三九八

櫻草
珍珠菜（漢）　三九八
○磯松科
第三目烏木類　三九九
○赤鐵科
倭答百兒加樹
○柿樹科
柹（漢）柿（日）　四〇〇
烏木（漢）黑檀　四〇〇
君遷子（漢）　四〇一
○灰木科
○齊墩果科
安息香
齊墩果（漢）　四〇一
四〇二
大葉白辛樹毛白辛樹（日）　四〇二
第四目回旋花類
○木犀科
小葉梣　四〇三
水蠟樹（漢）　四〇三
大葉水蠟樹（漢）　四〇四
阿列布　四〇四
黃素馨（日）　四〇五
素馨（漢）　四〇五
女貞（漢）　四〇六
梣（漢）　四〇六
枸骨（漢）杠谷樹柊　四〇七
木犀、巖桂（漢）　四〇七
連翹（漢）　四〇八
黃梅（俗）迎春花（漢）　四〇八
紫丁香（中俗）　四〇九
○馬錢科
醉魚草（漢）　四〇九
馬錢子、番木鼈（漢）　四一〇
○龍胆科
獐牙菜（漢）　四一〇
苦菜（漢）　四一一
金銀蓮花（漢）　四一一
健質亞那　四一二
慎答吳里吳木（拉）　四一二
當藥　四一三
當藥龍胆　四一三
龍胆（漢）　四一四

○夾竹桃科
夾竹桃(漢) 四一四
司脫羅芳足司(拉) 四一五
絡石(漢) 四一五
日日草(日) 四一六
○蘿摩科
牛皮消(漢) 生馬 四一六
伊豫葛(漢) 四一七
蘿摩(漢) 四一七
歐蔓(日) 四一八
毬蘭(漢) 四一八
徐長卿 四一九
第五目筒花類
○旋花科
牽牛子(漢) 四一九
甘藷紅薯(漢) 四二〇
菟絲子(漢) 四二〇
旋花(漢) 四二一
葯刺巴 四二一
蔦蘿(漢) 四二二
○花葱科
草夾竹桃(日) 四二二
○幌菊科
○紫草科
阿路坑那(拉) 四二三
大琉璃草 四二三
鷄腸草(漢) 田平子(日) 四二四
紫草(漢) 四二四
○馬鞭草科
猶(漢) 四二五
海州常山(漢) 四二五
馬鞭草(漢) 四二六
蘭菊(日) 四二六
起苦樹(英) 四二七
牡荊(漢) 四二七
防臭木 四二八
紫珠 四二八
○唇形科
香茶菜(漢) 秋丁子桐壺(日) 四二九
鼠尾草(漢) 四二九
石薺薴(漢) 四三〇
犬胡麻(日) 四三〇

伊吹鈴子香（日）　四三一
滁州夏枯草（漢）　四三一
野芝麻（漢）　四三二
垣通、積雪草、治癩草（日）　四三三
排草香（漢）　四三三
龜葉草（日）　四三三
小白根（日）　四三四
風輪菜（漢）　四三四
琴柱草（日）　四三五
地獄釜蓋（日）　四三五
撒爾維亞　四三六
塔花（日）　四三六
紫蘇（漢）　四三六
鈴子香（漢）　四三七

白根（日）　四三八
司苦苦拉里阿寅敵卡加保尼卡拉　四三八
草石蠶（漢）　四三九
筋骨草（漢）十二單（日）　四三九
薄荷（漢）　四四〇
佛座　四四〇
送迭香（漢）　四四一
刺賢垤皃　四四一

○茄科

刺酸漿（日）　四四二
狗酸漿（漢）　四四二
赤茄（日）多麻斗（日）　四四三
枸杞（漢）　四四三
馬鈴薯（漢）　四四四

苦職（漢）千成酸漿（日）　四四四
蕃椒（漢）　四四五
烟草（漢）　四四五
曼陀羅花、大麻子（漢）　四四六
茄（漢）　四四六
莨菪（漢）　四四七
菲沃斯　四四七
蜀羊泉（漢）鵝上戶（日）　四四八
別刺敦那　四四八
酸漿（漢）　四四九

○玄參科

林待路尼挨古路司塔開亞（拉）　四四九
婆婆納（漢）　四五〇
畦蕃椒（日）　四五〇

柳穿魚(漢)　四五一
大婆婆納(日)　四五一
大山玄參　四五二
水苦賈(漢)　四五二
荊藻(日)　四五三
桐白桐泡桐(漢)　四五三
金魚草(日)　四五四
草木威靈仙(漢)　四五四
粉米草(日)　四五五
玄參(漢)　四五五
小鹽竈(日)　四五六
通泉草(漢)　四五六
地黃(漢)　四五七
監竈草　四五七
實芝答里斯(拉)　四五八
○紫葳科　四五八
淩霄花紫葳(漢)　四五八
梓(漢)　木角豆(日)　四五九
○胡麻科　四五九
胡麻(漢)　四五九
○角胡麻科　四五九
○列當科　四六〇
保斯苦尼阿(疾阿孤拉不拉)(拉)　四六〇
野菰(漢)　四六〇
○苦苣苔科　四六一
苦苣苔(漢)　四六一
○狸藻科　四六一
狸藻(日)　四六一
虫捕堇(日)　四六二
○爵牀科　四六二
司士落弼郎梯(司加波你苦斯)(拉)　四六二
爵牀(漢)　四六三
○濱沈丁科　四六三
第六目車前類
○車前科　四六三
車前(漢)　蝌蚪葉(中俗)　四六三
第七目茜草類
○茜草科　四六四
茜草(漢)　赤根(日)　四六四
阿仙藥　四六四
虎刺(漢)　四六五
浦敕依島皮克(斯羅巴祖巴)　四六五

盧比阿起男塞斯(拉) 四六六
釣藤(漢) 四六六
河原松葉(日) 四六七
規那(漢) 四六七
砧草(日) 四六八
梔子、黃梔花(漢) 四六八
車葉草(日) 四六九
咖啡(漢) 四六九
西洋赤根(日) 四七〇
吐根 四七〇
猪殃殃(漢) 八重葎(日) 四七一
○忍冬科
羅尼開拉格拉克里派司 四七一
莢蓮(漢) 四七二
肝木(日) 四七二
金銀木、瓢簞木(日) 四七三
珊瑚樹、木珊瑚(日) 四七三
忍冬(漢) 四七四
西洋接骨木 四七四
蒴藋(漢) 四七五
楊櫨(漢) 四七五
接骨木(漢) 四七六
錦帶花(漢) 四七六
蝴蝶樹(漢) 四七七
○連副草科
○敗醬科
男郎花 四七七
敗醬(漢) 女郎花 四七八
纈草 四七八
○山蘿蔔科
敵潑撒苦司 福而勞奴母(拉) 四七九
山蘿蔔(漢) 四七九
第八目鍾花類
○葫蘆科
絞股藍(漢) 四八〇
王瓜(漢) 烏瓜(日) 四八〇
胡瓜(漢) 黃瓜(中俗) 四八一
合子草(漢) 四八一
古魯腥篤草 四八二
西瓜(漢) 水瓜 四八二
蕃南瓜(漢) 唐茄(日) 四八三
苦瓜(漢) 四八三

冬瓜(漢)　四八四
蒲蘆匏(漢)　四八四
絲瓜(漢)　四八五
甜瓜(漢)　四八五
瓠壺盧(漢)　四八六

○桔梗科

桔梗(漢)　四八六
山梗菜(漢)　四八七
肥脫依馬加波你苦木(拉)　四八七
蔣苑(漢)　四八八
沙參(漢)　四八八
山小菜(漢)　四八九
魯別利亞　四八九

○山羊菜科

○菊科

秋之費菜(日)　四九〇
山苦蕒(漢)　四九〇
秋鼠麴草(日)　四九一
油菊　四九一
亞爾尼加　四九二
愛里格羅里尼否里務斯(拉)　四九二
兎菊(日)　四九三
薄雪草(日)　四九三
翠菊(漢)　四九四
遠州鬼督郵(日)　四九四
延命菊、雛菊(日)　四九五
旋覆花(漢)小車　四九五
蒼朮(漢)　四九六
牡蒿(漢)　四九六
蕖耳(漢)　四九七
苦來皮司加波尼卡(拉)　四九七
高野帚(日)　四九八
毛連菜(漢)　四九八
麻苦羅苦利尼敵吳木羅四巴司土毋(拉)　四九九
卡塞恩草(日)　四九九
蟹蝙蝠　五〇〇
貝細工(日)　五〇〇
狄(漢)　五〇一
烟管頭草(日)　五〇一
加密兒列　五〇二
阿寅斯利拉塔(拉)　五〇二
菊(漢)　五〇三

斯可阿早奈拉（席斯爬尼卡拉）五〇三
泥胡菜（漢）五〇四
錦鷄菊（日）五〇四
荷蘭千日、千日菊（日）五〇五
金盞草（漢）五〇五
黃花蒿（漢）五〇六
牛蒡（漢）五〇六
馬蘭（漢）五〇七
三七草（漢）五〇七
紫菀（漢）五〇八
茼蒿（漢）五〇八
東風菜（漢）五〇九
白花除虫菊（日）五〇九
白娵菜五一〇
西洋鋸草（日）五一〇
攝綿支奈支奈五一一
萬壽菊（漢）金錢菊（中俗）五一一
大丁草（漢）五一二
狼尾草（漢）五一二
鱧腸（漢）五一三
蒲公英（漢）五一三
萵苣（漢）五一四
父子草（日）五一四
橐吾（漢）五一五
天竺牡丹（日）五一五
黃瓜菜（漢）苦菜（日）五一六
苦艾（日）五一六
蓍（漢）鋸草（日）五一七
鼠麴草（漢）御形（日）五一七
土拉高泡個恩波路里否里吳期（拉）五一八
哥來握布席（司提痕苦土里阿拉）五一八
向日葵（漢）日迴（日）五一九
剪刀股（漢）五一九
百日草（日）秋羅五二〇
欵冬（漢）路冬五二〇
蘭草（漢）藤袴（日）五二一
紅花（漢）五二一
唆里格勞恩唆奴司（拉）五二二
鷄兒腸（漢）五二二
艾（漢）五二三
刺苦丟葛偪謨五二三
羅馬加密兒列五二四

矢車菊　五二四



根之種類

一　蕪菁根

二　圓錐根

三　紡錘根

四　塊狀根

上昇莖之種類

一　攀緣莖

二　纏繞莖

圖書館



地下莖之種類

一　球狀莖
二　塊狀莖
三　鱗狀莖
四　根狀莖



葉之排列種類

一　互生
二　對生
三　輪生
四　束生



單葉及複葉之種類

一　完全單葉

二　單身複葉

三　羽狀複葉　（一回奇數羽狀複葉）

四　掌狀複葉　（一回奇數掌狀複葉）



羽狀複葉及脈之種類

一　一回偶數羽狀複葉

二　二回奇數羽狀複葉

三　網脈

四　平行脈





葉形之種類

一　線形　二　披針形
三　橢圓形　四　卵形
五　倒卵形　六　倒披針形
七　匙形

八　楔形　九　心臟形
十　腎臟形　十一　楯形
十二　截形　十三　箭形
十四　耳形



十五　戟形
十六　漸尖頭
十七　鋭頭
十八　鈍頭
十九　截頭
二十　凹頭
二十一　倒心臟頭
二十二　凸頭



葉緣種類

一　全邊
二　鋸齒狀
三　齒牙狀
四　鈍鋸齒狀
五　缺刻





花序之種類

一　總狀花序　二　繖房花序

三　單繖形花序　四　複葉形花序

五　穗狀花序　六　頭狀花序

一　圓錐花序　二　聚繖花序

三　雁木狀花序　四　尾卷狀花序



花之種類

一　上生子房之完全花

二　下生子房之完全花

三　雄花　單性花

四　雌花



花冠之種類

一　蝶形花冠

二　唇形花冠

三　筒狀花冠

四　舌狀花冠



胎座之種類

一、二　側膜胎座

三　中軸胎座

四　特立中央胎座



肉果之種類

一　核果

二、三　漿果

四　多花果





乾果之種類

一　瘦果　閉果
二　蓇葖
三　莢　裂果
四　蒴

一　長角　裂果
二　堅果
三　翅果　閉果
四　毬果



Beggiatoe Alba.

硫黃菌（裂殖植物）　分生菌類

硫黃菌。生於攝氏七十度溫水中之著名植物。呈絲狀。常羣生於含硫黃之溫泉及污水中。以酸化所發生之硫化水素。生硫黃粒及水。而留硫黃粒於其體內。故於人生雖無大關係。亦一著名之細菌也。

Bacillus vulgaris.

腐敗菌（裂殖植物）　分生菌類

腐敗菌者。寄生於動物之死骸。呈桿狀。分解有機物。生安母尼亞。

生於飲食物時。則變蛋白質為有毒成分。人畜食之必致病。又於夏日發惡臭。若生於土中廢棄物內。則漸次分解。變質為土壤。自淨作用之主因也。

Spirogyra arcta Kütz.



Enteromorpha compressa Grev.

接合藻類

水綿（漢）

水綿者。單細胞植物也。生於淡水中。呈絲狀。以多數植物相連續而成。有螺旋狀之葉綠體。故為有名之藻類。

石蓴科

乾苔（漢）石髮（日）海苔菜（日）

乾苔者。產於淺海之綠色藻類也。形為細長之囊狀。而著生於他物。乾燥之供食用。

Ulva Lactuca *Le Jol.*

石蓴（漢）　石蓴科

石蓴。產於淺海之綠色藻類。其形如紙而扁平。附生於他物。如淺草海苔。可漉之為紙狀。以供食用。

Laminaria japonica *Aresch.*

昆布（漢）　海帶（中俗）　昆布科

昆布。生於日本北部之海中。我國閩浙海中亦有之。為褐色之隱花植物。體呈帶狀。長達數十尺。下部有柄。附著於岩礁。帶狀部可供食用。入藥治水腫破積聚。



Ecklonia bicyclis Kjellm.



Eckloniacava Kjellm.

黑菜（漢）荒布（日）　昆布科

黑菜。生於海中之褐色藻類。形為葉狀。有數裂片。以長柄著生於他物。葉狀裂片。具多數之皺紋。

乾葉狀之裂片。可供食用。

搗布（日）　昆布科

搗布。生於海中。呈褐色。大形藻類也。形為葉狀。分裂成羽狀。以長柄著生於他物。

燒此植物。可以灰製沃度。乾其柄部。可為洋傘之柄或杖等。又葉狀部可供食用。

Cystophyllum fusiforme *Harv.*



Undaria pinnatifida *Sur.*

羊栖菜（漢）鹿尾菜（日）富苦司科

羊栖菜者。生於海水中之岩上。為褐色之隱花植物。高一尺餘。軸部細長。而生多數短棒狀之枝。

此菜亦供食用。

裙帶菜（漢）若布　和布（日）昆布科

裙帶菜者。生於海中。褐色之隱花植物也。長三四尺。主部扁平為葉狀。而又分裂成羽狀。中具肋狀之線條。以柄附著於岩礁。

可供食用。

Porphyra tenera *Kjellm.*

紫菜（漢）　紅綿科（牛毛海苔科）

紫菜。產於淺海。為紫紅色之藻類。形扁平而長。著生於砂礫之上。濾為紙狀。可供食用。



Gracilaria confervoides *Grev.*

江蘺（漢）　頭髮菜（日）　頭髮菜科

江蘺。多產於日本近海。暗紅色之海藻也。體為細圓柱狀。生多數之枝。繁殖器為半球形之突起。生於體之各處。

取其灰汁。煮綠色之物。以供食用。（日本習慣食魚肉。必加此植物）

Gelidium cartilagineum *Grev.*

石花菜（漢）心太草（日）　石花菜科

石花菜。生於海中砂石間。紫紅色之隱花植物也。狀類灌木。高四五寸。枝多而細。稍粗者稱為雞脚菜。

晒乾變為白色。煮之則結凍成膠。吾甯波人謂之凍瓊脂。又製成細條。謂之洋菜。皆可供食。又可製印刷版。



Penicillium crustaceum *L.*

麴菌科

青黴（日）

青黴。生於飯餅糊及蜜柑等之腐敗物。為纖維狀之菌。本體白色有間隔。由本體而生多數之枝。各枝又分多數細枝。頂端生數念珠狀之青色胞子。胞子成熟。被風吹落於他物上。則又生芽成新青黴。

此植物為變質分解飯糊果等物。



Aspergillus Oryzae Wehm.

麴菌　糀菌（日）　麴菌科

麴菌。自生於日本各地。為纖維狀植物。合多細胞而成。集生於枝之頂端。作球形。為多數胞子。

此菌有變澱粉為葡萄糖之作用。生於蒸米者稱為米麴。加於飯造甘酒及蒸米與水。則糖化其澱粉。由酵母菌作用。可釀造清酒。又此菌若生長於麥類。即為麥麴。生長於豆類。即為豆麴。



Saccharomyces

釀母菌　酵母菌　酒母菌（日）

英名 Veast　酵母菌科

酵母菌。自生於各地。單細胞植物也。由出芽法而繁殖。

此菌有分離糖類。為酒精及炭酸瓦斯之作用。麥酒則由麥酒酵母菌而釀成。清酒則由清酒酵母菌而釀成。葡萄酒則由葡萄酒酵母菌而釀成。



Claviceps purpurea *Tul.*

Exoascus Cerasi *Sadebeck.*

肉座菌科

麥角菌（日）

麥角菌者。寄生於麥類及其他禾本科之植物。為隱花植物。由麥類等之子房。生黑紫色角狀之堅體。稱之為麥角云。

麥角為止血藥。又用於收縮子宮。然以其為劇藥。不可用之過量。

外子囊菌科

天狗巢菌（日）

天狗巢菌者。寄生於高等顯化植物之枝。能使其宿主植物之葉。變為繁茂小枝。遠望之如鳥巢然。植林家最所嫌惡。

Hydnum olidum *Berk.*

Hirneola polytricha *Fr. Schroet.*

茅蕈（漢）　茅蕈科

茅蕈。生於山野樹下之地中。為纖維狀植物。由多數細胞而成。十分成長。則地上生笠及柄之繁殖器。色黑。笠畧似漏斗狀。下面有多數毛狀突起。內含胞子。其繁殖器乾之。可供食用。氣香味美。

木耳（漢）　木耳科

木耳。寄生於接骨木及桑樹等處。為隱花植物。大者二三寸。形如人耳。為膠質茶褐色之繁殖器。裡面極平滑。乾燥而貯藏之。可供食用。白色者稱銀耳。尤貴。



Cortinellus edodes *Hom.*



Cortinellus Shiitake *Hom.*

香蕈（漢）椎蕈（日）　菌蕈科

香蕈者。寄生於楮櫟槲等枯木之皮。為菌類。體由纖維而成。上如笠。下具柄。以是為繁殖器。

鮮乾皆可供食。芳香味美。亦可以人工種之。

松蕈（漢）松茸（日）　菌蕈科

松蕈。生於赤松樹下。為隱花植物。體由蜘蛛網狀之纖維而成。其繁殖器即笠狀之蕈及柄。大者徑四寸許。柄長三寸許。有特殊之芳香。笠下面具多數放射狀之褶。褶面生微細胞子。

亦稱松茸。可供食用。



Rhizopogon rubescens Tul.

麥蕈（漢）　松露（日）　麥蕈科

麥蕈。自生於松林土中。為菌類。體成於纖維。由纖維而生球形之繁殖器。日本人稱為松露。可供食用。



Fomes japonicus Fr.

紫芝（漢）　靈芝（中俗）　多孔菌科

紫芝。寄生於枯木之隱花植物。體呈纖維狀。繁殖器由笠及柄而成。質堅而不朽腐。笠畧如半圓形。上面黑褐色。有光澤。下面白色或黃褐色。具多數細孔。人家採取之。陳設於几上。以供清賞。

Cetraria islandica *Ach.*

乙斯蘭土苔依蘭苔(日)丕挨米立挨科

依蘭苔產於高山多年生之隱花植物也體灰白而畧帶綠色扁平分枝枝緣有多數毛狀突起

為滋養藥又供食用

Umbilicaria esculenta *Mink.*

石茸(漢)　石茸科

石茸亦作石耳自生於深山岩石上多年生之扁平隱花植物也體圓形或橢圓形徑約一二寸面黑色具多數小突起由中央短柄附著於岩石上面灰白色而平滑乾時供食用



Roccella tinctoria DC.



Marchantia polymorpha L.

里篤麻斯苔（日）　里篤麻斯地衣科

里篤麻斯苔。自生於卡那利衣島。及其附近島嶼海岸之岩石上。為隱花植物。體細長而分歧。且生突起之繁殖器。

由其體製里篤麻斯液。及里篤麻斯試驗紙。

地錢（漢）　地錢科

地錢。自生於陰濕地。為綠色扁平之隱花植物。以毛狀之根。固著於地。雌雄異株。雄株具柄。為盤狀體。雌株作破傘形。又扁平體上。處處凹陷如杯。內生綠色小莖。為繁殖器。形畧如錢。故名。



Pteris serrulata d.

Polytrichum commune L.

土馬騂科

土馬騂（漢）

土馬騂者。自生於山地。為常綠之隱花植物。高四五寸。莖細長直立。密生披針狀之小葉。子囊為方形。有長柄。生於莖之頂。被子囊之笠。密生長毛。

羊齒科

井口邊草

井口邊草者。產於到處之石壁間。葉有無性及有性之別。無性葉分裂為羽狀裂片。有鋸齒。有性葉則分裂雖相同。而緣邊有子囊群。

Woodwardia radicanesm.
Var. orientalis Lürs.

持子羊齒（日）　羊齒科

持子羊齒者。自生於山地。葉大。為羽狀複葉。質甚厚。羽片更深裂而為羽狀。下面生子囊群及胞子。又葉之上面出無性芽。能蕃殖。特別種類也。



Cyathea spinulosa *Wall.*

桫欏（漢）　桫欏科

桫欏者。產於日本南部諸島。為木狀羊齒。於柱狀之幹頂。叢生大葉。葉畧似蕨。裡面生子囊。子囊各處之周圍。有盃狀之包被。幹可為床柱活筒。又栽之為觀賞用。



Polypodium vulgare *L.*
var. japonicum *Fiel Sav.*

Polypodium tricuspe *Sw.*

水龍骨科

岩澤瀉（日）

岩澤瀉者。自生於深山樹上。多年生之隱花植物。葉長四五寸。形頗類慈姑。子囊之各羣為圓形。生於葉之裡面。

栽之為觀賞用。

水龍骨科

水龍骨（漢）

水龍骨者。山地自生之多年生草。莖匍匐於地中。葉常綠為羽狀。下面生圓集之子囊群。

栽之為觀賞用。

Pteris cretica L.

大葉井口邊草（日）　水龍骨科

大葉井口邊草。山野自生之多年生草。莖存於地中。葉大為羽狀複葉。有長柄。小葉細長而尖。長四五寸。子囊生於小葉下面之緣部。緣邊反捲。故為之被覆。

栽培之為觀賞用。



Adiantum pedatum L.

孔雀羊齒孔雀草（日）　水龍骨科

孔雀草者。自生於山地。多年生之隱花植物。葉為複葉。由多數小葉而成。狀似孔雀之擴毛。葉柄黑色有光澤。

栽培之為觀賞用。

Pteridium aquilinum *Kuhn.*



Aspidium decursive-pinnatum *Kze.*

水龍骨科

蚰蜒羊齒（日）

蚰蜒羊齒。自生於山野。多年生之隱花植物也。莖細。生於地下。葉長一尺餘。分裂為羽狀。有毛。子囊集為圓形。

水龍骨科

蕨（漢）

蕨者。自生於山野。多年生之隱花植物也。莖匍匐於地中。幼葉捲曲如拳。後成重複葉。長三四尺。葉之下面緣邊生繁殖器。子赤褐色。

幼葉可食。從地下莖採取澱粉。可作粔籹及糊料用。又搗其莖可作繩。



Asplenium japonicum Thunb.

阿斯浦來尼吳木加旁尼苦木（拉）

水龍骨科

此植物自生於山野之陰地。多年生之隱花植物也。由根狀莖出葉於地上。葉為羽狀複葉。有長柄。子囊群為直線狀。生於葉之下面。具膜質直線狀之被包。



Blechnum Spicant Roth.

獅子頭（日）

水龍骨科

獅子頭者。山地自生。常綠之隱花植物。數葉叢生。為櫛齒狀。生胞子之葉。尤呈細櫛齒狀。初綠。後變為褐色。

有毒植物。祇供觀賞。

Davallia bullata *Wall.*

海州骨碎補（漢）忍草（日）水龍骨科

海州骨碎補。多年生之隱花植物。莖細長。匍匐於樹上或石上。密生褐色鱗毛。葉為三回羽狀複葉。下面生多數子囊群。各子囊群稍具盃狀之被包。

供觀賞用。根入藥。補傷折有效。



Nephrolepis cordifolia *Presl.*

玉羊齒（日）水龍骨科

玉羊齒者。自生於日本之暖地。多年生之隱花植物。莖細長而匍匐於地下。生塊狀莖。故有玉羊齒之名。葉為細長之羽狀複葉。叢生多數。長二尺餘。子囊集生為腎臟形。具同形之被包。

栽培之為觀賞用。



Nephrodium Filix-mas *Rich.*



Gleichenia longissima *Bl.*

水龍骨科

綿馬（日）

綿馬者。自生於山地。多年生之隱花植物也。葉為羽狀複葉。有鱗狀之毛。長達三四尺。多數叢生。子囊生於葉之下面。具圓腎臟形之被包。

地下莖供藥用。有驅除條蟲之效。

裏白科

裏白（日）

裏白者。自生於日本之暖地。多年生草也。莖匍匐於地中。葉常綠。頂端有芽。年年生長。高四五尺。葉之枝為羽狀。上面鮮綠色。下面帶白色。故名為裏白。

葉用於歲首之飾。葉柄可用編為簪籠等物。

Lygodium japonicum Sw.

海金砂科

海金砂（漢）

海金砂者自生於山野多年生之隱花植物有細莖纏繞於他物葉為複葉以分裂之小葉而成小葉裏面生子囊子囊一端有畧似帽狀之彈性環

栽培之為觀賞用

Osmunda regalis L.
var. japonica Mäde.

薇科

薇（漢）

薇者自生於山野為多年生之隱花植物高二三尺尖端卷曲如旋渦葉有二種一色綠為二回羽狀複葉由長卵形之小葉而成一為褐色由細長之小葉而成著多數子囊

嫩葉可食又取嫩葉所被之綿狀毛可為織物料



Marsilia quadrifolia L.

蘋科

蘋（漢）

蘋者自生於淺水。多年生之隱花植物。莖細長。匍匐於地中。葉為有柄之複葉。合四小葉而成。近根處有極堅之囊狀物。中生胞子。



Salvinia natans Hoffm.

槐葉蘋科

槐葉蘋（漢）

槐葉蘋。生於水田池沼等處之隱花植物。無根。有細長之莖。葉三個輪生。分為二種。一綠色橢圓形。浮於水面。一為狀如根。下垂水中。出球形之囊狀體。中生子囊。

Azolla pinnata, R. Br.
var. africana, Baker.

槐葉蘋科

滿江紅（日）

滿江紅者。水田池沼自生之小隱花植物。密生小葉及根狀葉。形態與槐葉蘋同。胞子之生成。全同於槐葉蘋。秋末變綠紅色。故有此名。

觀賞用。然繁茂於水田時。為稻之大害。



Equisetum arvense L.

木賊科

問荆（漢）

杉菜（日）

問荆者。自生於山野。多年生之隱花植物。地下莖橫臥甚長。有綠色之莖。分出於地上。成二種。一中空有節。每節有鞘狀小葉。枝條輪生。謂之裸莖。一頂端有筆頭狀之繁殖器。著生胞子。無枝葉。謂之實莖。故日本又稱為筆頭菜。

筆頭菜可為蔬。



Equisetum hiemale L.



Lycopodium serratum Thunb.

木賊科

木賊（漢）

木賊者。自生於山野。為常綠灌木。多年生之隱花植物。高二尺餘。莖綠色。中空如管狀。每寸許有節。無枝。節間生退化葉。葉為鱗狀及鞘狀。莖頂生筆頭狀之繁殖器。莖粗糙。可用以磨木材及骨角等物。又栽培之為觀賞用。

石松科

岓芝（日）

岓芝者。自生於山野。多年生之隱花植物。高一尺餘。葉細長而尖。有鋸齒。密生於莖。子囊畧呈腎臟形。每葉腋間生子囊一。栽培之為觀賞用。



Lycopodium clavatum L.



Selaginella involvens Sp. bef.

石松（漢）　石松科

石松者。自生於山地。為多年生蔓狀之隱花植物也。莖匍匐於地上。長達數尺。葉細長而尖。密生於莖。繁殖器生於特別之直立枝。

供觀賞用。胞子與根莖並入藥。胞子稱石松子。可為丸藥之衣。又可撒布於人體之糜爛部。

卷柏（漢）　卷柏科

卷柏者。自生於山地之岩石上。多年生之隱花植物也。莖高一尺餘。生多數之枝。葉為小形鱗狀。稍類於扁柏之葉。燥則枝向內方卷曲。濕則開展。枝端生子囊。其性耐久。亦名長生不死草。

兖州卷柏（漢）　卷柏科

兖州卷柏者自生於兖州山地。為多年生之隱花植物。高七八寸。地上莖細長而上部出數枝。密生小形鱗狀之葉。各枝悉為一平面。

栽培之為觀賞用。

地柏（漢）　卷柏科

地柏。自生於山野。多年生之隱花植物也。莖細長。匍匐於地上。葉小。狀如鱗。葉面之下部。有舌片子囊。集生於特別之枝。

栽培之為觀賞用。

Cycas revoluta *Thunb.*

鳳尾松（漢）蘇鐵（日）鐵樹（中俗）蘇鐵科

鳳尾松。一名鳳尾蕉。自生南部暖地。為常綠樹。高達丈餘。葉集生於莖頂。為大形羽狀複葉。以細長多數之小葉而成。花單性。雌雄異株。

栽培之為觀賞用。種子可食。又可從莖之中部採取澱粉。葉可編為籃笠等。



Ginkgo biloba *L.*

公孫樹（漢）銀杏（漢）白果（中俗）公孫樹科

公孫樹。栽培於庭園。為落葉喬木。高達十丈餘。葉為扇形。通常二裂。至秋變為黃色脫落。花小。單性。雌雄異株。結實頗繁。霜後肉爛。取核為果。色白故稱白果。

材質堅重。製器不裂。仁可供食。



Taxus cuspidata S. et Z.



Cephalotaxus drupacea S. et Z.

一位（日）　一位科

一位者自生於深山。為常綠喬木。高約五丈。葉細長而尖。上面深綠色。下面色淡。花小單性。雌雄異株。雌花由一個胚珠而成。下有盃狀假種皮。種子狀如堅果。其一半被包於赤色肉質之假種皮。

材可為建築木板及器具之料。假種皮成熟時可供食用。昔時以其材作弩。用頗著名。

粗榧（漢）　一位科

粗榧自生於山野。為常綠喬木。高約三丈。葉細長而尖。裏面有白色蠟質。花小單性。雌雄異株。種子狀如核果。

材供器具之用。種子榨油。可供燈火及其他之用。

Torreya nucifera Sal Z.

Podocarpus Nagela R. Br.

榧（漢）　一位科

榧者。自生於山地。為常綠喬木。高數丈。葉線形而尖。互生。花單性。雌雄異株。實大如棗。兩端皆尖。為核果狀。俗稱香榧子。材為建築用。又為碁盤。及其他器具之料。仁可食。榨油可點燈。

竹柏（漢）　一位科

竹柏。生峩眉山中。為常綠樹。高數丈。葉對生。為橢圓形。有平行脉。花單性。雌雄異株。種子球形。以其籜似竹。榦類柏而亭直。故名。栽培之為觀賞用。材可為器具及建築之料。



Podocarpus chinensis Wall.

羅漢松（漢）　槙　柏槙（日）　一位科

羅漢松。自生於山地。為常綠喬木。高數丈。葉細長互生。花單性。果分二部。下部為肉質。熟則呈赤色。上部為種子。綠色。

材供建築及器具之料。又栽培之為觀賞用。或植之以抵蕃籬。

Pinus densiflora S. et Z.

赤松（漢）　雌松（日）及黑松（漢）　雄松（日）　松科

赤松為松之別種。山野自生之常綠喬木也。高十餘丈。樹皮及芽皆赤色。葉針狀。二針一鞘。花單性。雄花生於幼枝基部。由多數雄蕊而成。雌花生於幼枝頂部。由多數鱗狀雌蕊而成。實為卵形之球果。成於多數鱗片。

材供建築器具及燃料用。樹枝可加於藥煉及膏藥。



Pinus Thunbergii, Parl.

黑松（漢）　松科

黑松。酷似於赤松。常綠喬木也。芽灰白色。樹皮黑褐色。作鱗片狀。以其葉較粗硬得區別於赤松。

效用與赤松畧同。惟作為燃料。火力較強。樹脂可製松香油。



Thujopsis dolabrata S. et Z.

羅漢柏（漢）　松科

羅漢柏。山地自生之常綠樹也。高約十丈。葉呈鱗狀。頗類扁柏。而大逾數倍。實為球果。由少數鱗片而成。

材可供建築及器具之料。樹皮可製火繩。又栽培於庭園中。足供觀賞。

Sciadopitys verticillata Sieb. Z.

金松（漢）　松科

金松者產於山地。為常綠樹。高數丈。葉線形。輪生。花單性。雌雄同株。實為球果。似松類之果實。

材可為建築及器具之料。樹皮稱為槙肌。用於塞桶之漏口。又可栽於庭園為觀賞用。



Abies balsamea Mill.

卡那達巴魯撒姆樹（拉）　松科

北美原產之常綠樹。高四五丈。葉及花頗類於樅。果實畧似圓桂形。排出多量樹脂。樹脂即稱卡那達巴魯撒姆。主用於作顯微鏡標本。又可栽培之為觀賞用。



Thuja japonica Maxim.



Cunninghamia sinensis R. Br.

速加加泡尼卡（拉）　松科

此物自生於山地。為常綠喬木。高四丈餘。葉似羅漢柏而小。花單性。雌雄同株。實為小形球果。由少數之鱗片而成。

材供建築及器具之用。色淡黑。又可栽培之為觀賞用。

沙木（漢）廣葉杉（日）　松科

沙木。為我國南部原產之常綠樹。幹端直。大者高八九丈。樹皮酷似杉葉。互生。為線狀披針形。花單性。雌雄同株。結實與赤松之毬果畧相類。

其材堅挺。國人多取以製棺。謂之沙方。



Pinus pentaphylla *Mayr.*



Thuja orientalis *L.*

五釵松（漢）　松科

五釵松者。山地自生之常綠喬木。高數丈。葉為針形。每五箇叢生。實毬果。為長橢圓形。由不彎曲之鱗片而成。

材為建築及器具之料。又可供觀賞。

側柏（漢）　松科

側柏為我國北部原產之常綠灌木。高六七尺。葉鱗狀矗立。畧似扁柏。花單性。雌雄同株。實為毬果。鱗片之端。尖而卷曲。

庭園中多植之。又可栽培為蕃籬之用。

Chamaecyparis pisifera Sel. Z.

Tsuga diversifolia Max.

米姆（日）　松科

米姆者。山地自生之常綠喬木。高及數丈。葉為短線形。末端有淺二裂。實為卵形小球果。有甚短之柄。

材供建築器具薪及製紙之料。樹皮為染料。又栽培之為觀賞用。

花柏（漢）　松科

花柏。自生於山地或栽培之常綠樹也。高數丈。葉小。為鱗狀而尖。且層層伸展。花單性。雌雄同株。實為毬果而圓。

材為建築器具料。特用於作桶類。又栽培之為觀賞用。



Cryptomeria japonica *Don.*



Tsuga Sieboldi *Carr.*

杉（漢）　稻　日　　松科

杉多生於山野。為常綠喬木。幹端直。高數丈。葉針狀而小。稍彎曲向上方。花單性。雌雄同株。實為毬果。大如指頭。

材供建築及器具之用。枝葉作燃料。葉又可作線香。我國森林多栽此木。

栂（日）　　松科

自生於山地。為常綠喬木。高達三四丈。葉為線形。末端二裂。花單性。雌雄同株。實為卵形之毬果。稍類於松毬。

材供建築及器具之用。又可為薪料。



海松（漢）朝鮮松（日）　松科

海松。產於寒地。今關東及直隸等處多有之。為常綠喬木。高數丈。葉長針狀。每五箇叢生。花單性。雌雄同株。實為毬果而大。長六七寸。子如巴豆。有三稜。

栽培之為觀賞用。又子可供食。

杜松（日）　松科

杜松。產於北半球之溫帶中。為常綠樹。高約一丈五尺。葉呈針狀。每三箇輪生。實為肉質之毬果。

此果入藥。用於利尿劑及興奮劑。又可釀酒。或附香氣於肉類酒類。

Juniperus rigida S. et Z.

Chamaecyparis obtusa S. et Z.

杜松（漢）　松科

杜松者。自生於山野。為常綠樹。高二三丈。葉細長而尖。畧為針狀。花小單性。雌雄異株。果實肉質。形如圓球。熟則色黑。

材供建築器具之料。又栽培之為觀賞用。

扁柏（漢）　檜（日）　松科

扁柏。自生於山野。為常綠喬木。高者十餘丈。葉為鱗狀而小。密著於莖。全不舒放。花單性。雌雄同株。結實為毬形之果。

材可供建築。又以其質理緻密。可製家具。樹皮可作火繩。實為藥用。稱柏子仁。又栽培之為觀賞用。

Larix leptolepis Gord.



Juniperus chinensis L.

檜　檜柏（漢）　松科

檜亦稱檜柏。自生於山地。為常綠灌木。高丈餘。葉有二種。一為針狀。一為小鱗片狀。花單性。甚小。果實毬形。畧帶肉質。

材供建築器具之料。又栽培之為觀賞用。

落葉松（漢）　富士松（日）　松科

落葉松者。口外高寒之地多有之。為山地自生之落葉喬木。高數丈。枝幹與赤松無異。葉叢生。亦針狀而細長。惟經霜雪後則盡脫。花單性。雌雄同株。實為卵形毬果。

材供建築及器具料。又其質甚堅。根株歷久不朽。沉埋水土中。則更為石。可供磨礪之需。



Abies firma S. et Z.

Ephedra vulgaris Rich
var. helvetica H et T.

松科

樅（漢）椴（日）

樅者。自生於山地。為常綠喬木。高數丈。葉互生。為線形。末端二裂。花單性。雌雄同株。實為長卵形之大毬果。熟則鱗片脫落。材供建築器具及製紙料。又栽培之為觀賞用。

麻黃科

麻黃（漢）

麻黃。自生於地中海沿岸。我國中部各省亦產生之。為小灌木。形狀頗似木賊。莖有節甚顯。節間有小鱗狀葉。並生小枝。花單性。

含有毒成分。莖及根節俱入藥。用為收斂劑。治下痢盜汗等症。



Typh. japonica Miq.

Pandanus odoratissimus L.

香蒲（漢）　香蒲科

香蒲。自生於池沼。為多年生草。高五六尺。葉細長而尖。有平行脉。花單性。為圓柱狀花序。雌花在下。雄花在上。花蕊如金粉。謂之蒲黃。

葉作席扇及裹物之蒲包等。實可為墊褥之襯絮。及引火之火絨。莖葉之嫩者可食。

榮蘭　露兜樹（日）　榮蘭科

榮蘭者。日本暖地自生之常綠樹。生大氣根。高二丈餘。葉細長而尖。有銳鋸齒。具平行脉。花為單性而小。雌雄異株。

栽培之為觀賞用。又葉可編籠及帽臺。灣巴那馬帽。即以此葉製之。

Zostera marina L.

Potamogeton crispus L.

眼子菜科

大葉藻（漢）

大葉藻。生於淺海中。為多年生草。根狀莖匍匐於地為肉質。葉細長。長達一尺至二三尺。花小。近於葉之基部。則隱存於鞘內。莖葉均可為肥料。乾葉可為椅墊及綿被之襯絮。葉之基部。有甘味。海邊兒童恒採食之。

眼子菜科

蝦藻（日）

沈於淡水中之多年生草。葉細長。鈍頭。緣邊有波狀縐縮。互生於細長之莖。花小。排列為穗狀花序。

Najas major. Rl.

茨藻（日）　茨藻科

茨藻者。自生於池沼等之水草也。長一二尺。葉細長有鋸齒。對生或輪生。花單性。雌雄異株。

Sagitta sagittifolia. L. var. longifolia. Turcz.

澤瀉（漢）　澤瀉科

澤瀉。自生於池沼水田等處。為多年生草。葉似慈姑而甚細。故俗稱野慈姑。莖端結蕊。淡碧色。形似如意。閩人謂之如意菜。花白色。地下有毬狀莖。

栽培之為觀賞用。嫩苗可食。毬莖可供藥用。

Sagittaria sagittifolia L.

Hydrilla verticillata Casp.
var. Roxburghii Casp.

澤瀉科

慈姑（漢）

慈姑。一作茨菰。多栽於水田。為多年生草。高三四尺。地下有塊狀莖。葉為箭形。有長葉柄。花白色。排列為圓錐花序。地下塊狀莖可供食用。

水鼈科

黑藻（日）

黑藻者。自生於日本之各地。為多年生之水草。有細長莖。葉輪生。為披針形。有小鋸齒。花小單性。



Hydrocharis asiatica. *Miq.*



Vallisneria spiralis *L.*

水鼈科

苦草（漢）

苦草。生於水中。為多年生草。高一二尺。葉叢生而細長。有平行脈。花單性。雌花以長花梗而突出於水面。受花粉後。花梗為螺旋狀之卷縮而降於水中。雄花成熟。則脫落而浮於水面。

水鼈科

水鼈（漢）

水鼈者。水中自生之雜草也。葉為圓心臟形。有長柄。浮於水面。花單性。瓣色白。

粟（漢）　禾本科

粟為穀類植物。一年生草。即粱也。高四五尺。葉類於玉蜀黍。惟長而且狹。花小。密集為圓錐花序。穗有芒。實為小粒。色白而黃。俗呼為小米。

小米為北方糧食之大宗。其莖葉可供牛馬類之食料。

葩阿俺奴阿（滿）　禾本科

此植物自生於原野。為雜草。高二三寸至八九寸。葉細長而互生。花小而綠色。排列為圓錐花序。早春開花。

為家畜之飼料。

Oryza sativa L.

稻、粳、糯、米（漢）　禾本科

稻為最重要之農作物。東南各省多植之於水田。亦一年生草也。高四五尺。莖中空。有節甚顯。葉細長而夾。有平行脈。互生。花小。雄蕊六。排列為圓錐花序。實為穎果。內外有二殼包之。其種甚多。約分粳糯兩類。實去殼者即謂之米。

除供糧食外。其藁可製繩及草鞋等。又可為抄紙之原料。穀皮即糠。可供種種之用。

Setaria viridis Beauv.

狗尾草（漢）　禾本科

狗尾草。山野自生一年生草。高一二尺。莖葉似粟而小。葉柄有鞘狀之苞圍莖。莖頂叢生細實。有綠色長芒。集合為穗。形似狗尾故名。

Andropogon Nardus L.
var. Goeringii Hack.

雄刈萱（日）　禾本科

雄刈萱者。山野自生之雜草。高三四尺。葉細長而尖。莖上部生枝。著多數下垂之小穗狀花序。

鍋蘭島人蒸餾之。採取其揮發油為香水。

Hordeum sativum Jess.

大麥（漢）　禾本科

大麥為農作物之重要者。多產於北方。一年生或越年生草也。高三四尺。莖中空有節。葉細長而尖。脈平行。下有鞘狀之苞以圍莖。花排列為穗狀。各花下部有細長之穎。二殼之上端有長芒。

種子可為飯。或炒為麥焦及麥湯。其萌芽可為麥酒之原料。又混於米飯及他澱粉質。可製飴。莖可編帽製扇及玩具等。



Eragrostis ferruginea Beauv.

Trisetum cernuum Trin.

知風草（漢）香香草（中藥）　禾本科

知風草者。原野自生之雜草。高二尺餘。葉細長而夫。有平行脈。葉柄作鞘狀。圓莖。花密集為長卵形之小穗狀花序。集多數小穗狀花序。又為圓錐花序。此花雖微風亦善搖動。清一統志。謂為廣東出。土人視其節以占一歲風候。每一節則一風。無節則無風。

釣蟹草（日）　禾本科

釣蟹草。山野自生之雜草。高二三尺。葉細長而夫。有平行脈。葉柄為鞘狀。包莖。花通常每三個集為小穗狀。各花之外殼有芒。

Avena sativa L.



Miscanthus sinensis Hook.

烏麥（日）　禾本科

烏麥。栽培者多。一年生草。高二尺餘。葉細長而尖。有平行脉。具鞘狀葉柄。花每二個集為小穗狀花序。其中一花有芒。他花則無芒。小穗狀花序。又排列為圓錐花序。果實供食用。又此植物為牧草。

青茅（漢）　刈安（日）　禾本科

青茅者。山地自生。多年生草。高三尺餘。葉細長而尖。類於芒草。花雖與芒花相似。但花穗數少。故能區別於芒花。

取其莖葉而乾之。可為黃色染料。

Cynodon Dactylon Pers.

Panicum miliaceum L.

稷（漢）　禾本科

稷者。高粱也。江淮以北多種之。為一年生草。苗有紅白二種。紅者尤多。高四五尺。葉細長而尖。有平行脈。具粗毛。花有三雄蕊。花序為小穗狀。由一花而成。形成則下垂為圖錐花序。

穀類中種之最早。古稱為百穀之長。故農官及穀神皆名稷。種子含富有粘力性之物。可為餅而食之。

行儀芝（日）　禾本科

行儀芝。原野自生。多年生草。高約尺許。葉細長而尖。有平行脈。畧似於結縷草。花序成於三至五排列呈掌狀之枝。各枝有多數無柄之小穗狀花序。而各小穗狀花序。由一花而成。

根莖入藥。用為清血劑。

Arthraxon ciliare Beauv.



Briza maxima L.

小判草（日）俵麥（日）　禾本科

小判草者。歐洲南部原產之一年生草。高約尺許。葉細長而尖。有平行脈。花集為扁平小判狀之花序。以長柄而下垂。

栽培之為觀賞用。

薑草（漢）　禾本科

薑草。山野自生。越年生草。高一二尺。葉為廣披針形或長卵形而尖。有平行脈。花紫褐色。為長穗狀花。而花序又數個叢生。

其汁可為黃色染料。日本八丈島人多用之染黃八丈絹。故有八丈刈安之名。

Triticum [illegible] Linn. var. vulgare Hack.

小麥（漢）　禾本科

小麥。栽培者多。越年生草。或一年生草。高三四尺。莖中空有節。葉細長。端夫。有平行脈。花小。排列為複穗狀花序。其兩側有舟狀之穎果。芒甚短。

子多粉。可為切麵麵包餛飩餅餌。及種種點心類之料。或釀造甜醬醬油。莖可編作草帽。

Saccharum officinarum L.

甘蔗（漢）　砂糖黍（日）　禾本科

甘蔗。為熱帶植物。閩廣多栽植之。多年生草。高丈許。葉狹而夫。長二三尺。莖之外形與竹相似。而中不空。花單性。雄花生於莖梢。雌花生於葉腋。有巨苞包之。

莖可製砂糖。亦可生食。

Zoysia pungens Willd.

結縷草（漢）芝草（日）　禾本科

結縷草。山野自生。多年生之小草。莖細長而匍匐於地。隨處生細根。如線相結。故名。葉細長而尖。長二寸餘。花小。為穗狀花序。植於庭園隄防等處。

Coix agrestis Lour.

川穀（漢）數珠玉（日）　禾本科

川穀者。東印度原產之一年生草。高四五尺。葉類於麥。花單性。雄花為穗狀花序。生於雌花之上。實為卵形之穎果。有琺瑯質狀之堅殼。實可為念珠。及食用。

Miscanthus sinensis Andess

Alopecurus fulvus L.

禾本科

芒（漢）薄（日）

芒者。山野自生。多年生草。高五六尺。葉細長而尖。有平行脈。質堅。傷人如鋒。刃花集生為長穗狀花序。數花序又簇生於莖之上部。

莖葉可編為草履。又足供觀賞用。日本以此植物為秋七草之一。

禾本科

看麥娘（漢）雀鐵砲（日）

看麥娘。多生於麥田之中。為多年生或一年生草。莖稍傾斜於地上。葉細長而尖。有平行脈。花小為圓柱狀穗。以其簇生。且隨風顫動。能驅雀。故名。



Paspalum Thunbergii *Kth.*

雀稗（日）　禾本科

雀稗者。自生於園圃。越年生草。高一二尺。葉細長而尖。有平行脈。花莖生數枝。各枝著多數小花。成穗狀花序。為家畜之飼料。

Zea Mays *L.*

玉蜀黍（漢）　棒子（俗）　禾本科

玉蜀黍者。產於蜀地。北方亦多有之。一年生草。高七八尺。葉為大披針形。花單性。雌雄同株。雌花排列為穗狀花序。以巨苞裹之。出長毛狀之花柱。果實為釀酒料及食用。



Imperata arundinacea *Cyr.*

白茅（漢）茅針（漢）　禾本科

白茅者。自生於山野。為多年生草。高一二尺。苗如鐵。俗稱茅鐵。葉細長而夾。有平行脈。花集生於莖之上部。果實密生白毛。長二寸許。

實之白毛。可為引火之火絨。葉可作簾。根味甜入藥。

Pennisetum japonicum *Trin.*

狼尾草（漢）　禾本科

狼尾草。生於道旁。為多年生之雜草。高二三尺。葉細長而夾。有平行脈。花集生於莖之上部。為穗狀花序。畧似狼尾。花包之殼。及生於殼上之長毛。皆黑褐色。

古時用以覆屋。荒年亦可採食。

Eleusine indica *Gaertn.*

力草（漢）　禾本科

力草。原野自生之雜草。高一尺餘。葉細長而尖。有平行脉。叢生。花序為長穗狀。集生於莖之頂端。

為家畜飼料用。

Panicum Crus Galli *L.*

稗（漢）　禾本科

稗。粟類。原野自生之一年生草。高一二尺至三四尺。葉細長而尖。有平行脉。花小殼具芒。排列為圓錐花序。

為家畜飼料。亦可煮粥磨麵為食。

Phyllostachys pubescens *Mazel.*

淡竹（漢）　禾本科

淡竹。多生於暖地。多年生之常綠植物。高二三丈。地上莖由地下莖而生。中空。節甚顯。有二條環狀突起。葉為披針形。有平行脈。籜無斑點。

地上莖供建築及器具用。籜為笠及草履等原料。筍供食用。又栽培之為觀賞用。



Coix lacryma *L.*

薏苡（漢）　鳩麥（日）　禾本科

薏苡者。栽培於園圃。一年生草。高四五尺。葉狹長。有平行脈。花生於葉腋。酷似川穀。然果實則呈橢圓形。皮無琺瑯狀之堅質。以此為別。

仁色白。可雜米中作粥飯。及磨麵。俗稱為米仁。並入藥。



Panicum frumentaceum Roxb.

Phyllostachys mitis Riv.

禾本科

穄（漢）

穄。粟類。山東河南多種之。為一年生草。高三四尺。葉細長而尖。有平行脈。花小排列為圓錐花序。花序之上部畧彎曲。實如粟粒而細。赤色。

種子可煮粥磨麵。味畧澀。雜糧之一種也。

禾本科

江南竹（漢）孟宗竹（日）

江南竹。多生於我國暖地。為多年生之常綠植物。高三丈餘。地上莖中空有節。節間具一條環狀突起。葉為披針形。脈平行。籜有斑點。

地上莖供建築器具用。籜為笠及草履等原料。筍供食用。又栽培之為觀賞用。



Zizania aquatica L.

Lolium temulentum L.

菰（漢）茭白（中俗）　禾本科

菰者。自生於淺水。為多年生草。高五六尺。葉細長而尖。如蒲葦。有平行脈。花單性。排列成大圓錐花序。雌雄並生於同一花序。葉可製席。中心生白薹。曰菰菜。俗謂之茭白。可供蔬食。結實如米。色白而滑膩。謂之菰米。儉歲可以為飯。

毒麥（日）　禾本科

毒麥者。歐州原產之一年生草。高三尺餘。葉類於麥。花集生而為小穗狀花序。各花序下部出長穎。性有毒。近年始輸入於日本。

Bambusa Veitchii *Gore.*



Phragmites communis *Trin.*

箬竹（漢）　山白竹（漢）　禾本科

箬竹。山野自生。常綠多年生之植物。高三四尺。莖中空而細長。有明瞭之節。葉大。為廣披針形。具平行脈。緣邊帶白色。

莖製籠及其他。筍為食用。籜可裹糉製笠。需用甚繁。

蘆（漢）　葦（漢）　禾本科

蘆。自生於濕地或淺水中。多年生草。高丈許。莖中空。葉細長而尖。有平行脈。花有鼠色之殼。排列為大圓錐花序。

莖可作簾葺屋。或用為薪。萌芽可食。畧如竹筍。俗稱蘆筍。又植於隄防。以防隄之崩壞。

Themeda Forskali *Hook.*
var. japonica *Hook.*

禾本科

刈萱（日）

刈萱者。山野自生。多年生草。高二三尺。葉細長而尖。有平行脈。花排列為小穗狀花序。有長芒之殼。集數小穗狀花序。更為圓錐花序。

根強韌。可製刷子及束藁等用。

Carex dispalatha *Boott.*

莎草科

笠莎（日）

笠莎者。山野自生。多年生草。高三四尺。葉細長而尖。幅三四分。花單性。雌雄皆為穗狀花序。雄花序位於雌花序之上。

幹葉可編笠。



Cyperus amuricus *Maxim.*
var. j ponica *Maxim.*

蚊屋吊草（日）　莎草科

蚊屋吊草。平原自生之雜草。高一二尺。莖色綠。呈三角柱狀。上部生長葉而數少。由葉叢中央出數枝。著多數小花。



Heleocharis plantaginea *R. Br.*

烏芋（漢）勒薺（中俗）　莎草科

烏芋者。水中自生。多年生草。高三四尺。生塊狀莖於地下。莖綠色管狀。外形畧類於荒。花穗為筆頭狀。生於莖之頂端。塊狀莖供食用。

Cyperus tegetiformis *Roxb.*



Scirpus lacustris *L.* var. Tabernaemontani *Trautv.*

茳芏（漢）七島藺（日）　莎草科

茳芏。植於水田。為多年生草。高四五尺。莖三稜形。狀類於蚊屋吊草。而形較大。花開於莖端。綠褐色。

莖為織蓆原料。日本人稱之為琉球表。

大藺（漢）莞（漢）　莎草科

莞者。自生於池澤。多年生草。高五六尺。莖色綠而細長。斷面圓形。上部小葉如鱗片狀。花黃綠色而小。排列成穗狀花序。集生於莖之頂端。

莖可織席。

Cocodoxa oleracea Mart.

Phytelephas macrocarpa Ruiz.

恰白茲耶子（日）　椶櫚科

恰白茲耶子。西印度產之常綠樹。葉為一回羽狀複葉。由多數細長小葉而成。果實長橢圓形。

幼葉可供食。

象牙椰子（日）　椶櫚科

象牙椰子。熱帶亞美利加原產之常綠植物。莖極短。叢生多數羽狀複葉。果實直徑尺餘。含多數種子。子大如雞卵。

子之白胚乳甚堅。以此稱為植物之象牙。用作扣鈕及杖之裝飾品。

Sagus Rumphii Willd.

撒搿啞椰子（日）　椶櫚科

撒搿啞椰子。東印度及馬來隅原產之常綠樹。高約五丈。葉大。為羽狀複葉。叢生於莖之頂端。

莖內有白色之柔部。取出澱粉。稱撒搿啞。可供食用。

Trachycarpus excelsa Wendl.

椶櫚（漢）　棕榈（日）　椶櫚科

椶櫚。暖地自生之常綠樹。莖圓柱形。不生枝。高三四丈。有雌株雄株之別。葉大。分裂成掌狀。有長柄。叢生於莖頂。花小。淡黃色。集生於多數枝之花軸。有巨苞包之。

材為床柱及器具料。葉之基部包莖之毛。可製繩帚雨具箱簞之屬。又栽培之為觀賞用。





梭櫚科

省籐（漢）

省籐。多產於熱帶地方。為常綠木。莖細而多刺。且甚長。依他木而上昇。長數十丈。葉大。為羽狀複葉。由多數小葉而成。

莖編椅子籃等及他用。

梭櫚科

光椰子（漢）

光椰子。自生於暖地。酷似椰子。為木本。高約四丈。葉為羽狀複葉。由多數細長小葉而成。花小。單性。雌雄同株。

取其肉穗花序之汁液。可製砂糖。幹之髓部可採澱粉。葉柄之纖維可作繩。



Phoenix dactylifera L.

Livistonia chinensis Br.

椶櫚科

戰捷木（日）

戰捷木者。產於亞非利加北部。及亞細亞西南。為常綠樹。高五丈餘。葉為羽狀複葉。長達五尺。花單性。雌雄異株。實為核果。類似於棗。

果實供食用。幼葉亦足食。浸莖而出其汁液。可製砂糖或釀酒。材供建築。生長充分。則葉可編籠。葉等於日桂枝。束為花環狀。用於表戰捷及慶祝之時。

椶櫚科

蒲葵（漢）

蒲葵者。吾國原產之常綠喬木。酷似椶櫚。葉分裂為掌狀。其異於椶櫚之點。即葉之裂片形尖。基部連接不分。椶櫚則否。以此為別。

材供種種之用。葉作笠。及製團扇。俗稱為芭蕉扇。行銷甚廣。



Areca Catechu L.



Cocos nucifera L.

梭櫚科

檳榔子（漢）

檳榔子。產於熱帶地。常綠喬木。高三丈餘。葉為羽狀複葉。小葉之上端呈齒嚙狀。五年始結實。實成房。簇生數百。形長而尖。剝其皮。狀如肉荳蔻。

馬來隅半島土人。細切其果。包以胡椒類葉而嚙之。以為有健胃利尿強齒之效。

椰子（漢）

椰子。生於熱帶各地。為常綠樹。高約五丈。葉甚大。為羽狀複葉。叢生幹頂。花單性。雌雄同株。實有三稜。長尺許。徑四五寸。

椰子稱為植物之王。材堅緻而美麗。供建築用。葉含多量砂糖。可釀酒。果皮外圍纖維。強韌。適於網具。內層堅牢。可為杯。又富含堅胚乳。乾之為哥爾拉。具多量油。為燭及石鹼原料。並供藥用。此堅胚乳更有乳狀液。謂之椰子乳。熱帶土人視為重要食物。



Carludovica palmata R. et P.

巴那嗎草（日）　巴那嗎草科

巴那嗎草。產於美洲熱帶地方。為大形之草本植物。叢生如椶櫚。葉大。為掌狀。分裂於甚短之莖。長約三尺。

幼葉細裂之。入於熱湯。次加酸水。終入冷清水。乃取出乾燥之。則呈白色。以之編帽子。稱巴那嗎帽。又編為盛卷烟草之器具。



Arisæma Tuberiferum Bl.

虎掌（漢）　浦島草（日）　舞鶴天南星（日）

天南星科

虎掌。山地自生。多年生草。高二三尺。葉分裂為掌狀。有長葉柄。花雖類於天南星。而花之上部伸長為鈕狀。

性有毒。味苛烈。然日本之八丈島土人。多取其地下莖而食之。



Zantedeschia aethiopica Spr.

Pinellia tuberifera Ten.

野芋（漢）　天南星科

野芋。非洲原產之多年生草。葉畧作箭形。脈似芭蕉。有長柄。花莖由地下莖而生。長一尺餘。花單性。排列為肉穗花序。形大。有白色苞圍之。雌花在下部。雄花在上部。栽培之為觀賞用。地下莖含有毒之成分。

半夏（漢）　天南星科

半夏。自生於平地。為多年生草。高七八寸。葉為複葉。由三小葉而成。葉柄生肉莖。花單性。為肉穗花序。雌花位於下。雄花位於上。花序有大苞包之。花軸上部伸長為線狀。突出於苞外。

地下塊狀莖可供藥用



Acorus Calamus L.

白菖（漢）　菖蒲（中俗）　天南星科

白菖自生於池澤。多年生草。根狀莖甚長。全部具特殊香氣。葉劍狀。有平行脈。長三四尺。花小。淡黃色。花序為肉穗狀。

栽培之為觀賞用。俗於端午剪其葉作劍以懸門上。根莖可入藥。為健胃劑。以一寸九節者良。

Colocasia antiquorum Schott.

青芋（漢）　天南星科

青芋者。東印度及馬來隅半島原產之多年生草。今南方水田亦多植之。高四五尺。地下莖多肉。葉畧似荷而長。一端有大缺刻。柄肥大。花單性。排列成肉穗花序。雄花集生於上。雌花集生於下。花序下部具大苞。地下莖及幹葉柄俱可食。

Hydrosme Rivieri *Engl.*

Arenga saccarifera *Labill.*

蒟蒻（漢）　天南星科

蒟蒻多產於蜀中。為多年生草。高二尺餘。葉掌狀複葉。由羽狀之片而成。有長葉柄。花單性。為長肉質之穗狀花序。花苞頗巨。地下肥大之球狀部。可製褐色之麪。供食用。又採取球狀部之粉末。可為輕氣球及空氣枕之塗料。以防空氣之漏洩。

石菖（漢）　石菖蒲（漢）　細葉菖蒲（中俗）　天南星科

石菖者。自生於水邊。多年生草。有匍匐之莖。葉作細劍狀。長尺餘。亦有僅三四寸者。無中肋。花小。淡黃色。排列為肉穗花序。栽培之置諸案頭。以供玩賞。莖可為強壯劑及明目之藥。



Spirodela polyrhiza Schleid.

Arisæma japonicum Bl.

天南星（漢）　天南星科

天南星自生於山野。為多年生草。高三四尺。葉為複葉。有長柄。由數個廣披針形之小葉而成。花單性。排列為肉穗花序。覆以佛燄狀之苞。乃鈍形之花軸也。地下莖似芋而圓扁。入藥。性有毒。然地下莖含多量澱粉。日本八丈島土人。尚以為食。

水萍（漢）浮萍（中俗）　浮萍科

水萍。浮於水田池沼之水面小植物也。體扁平。為倒卵形。兩面綠者具一根。上面綠下面紫赤色者根多。根為無枝纖維。叢生於植物體下面。又俗稱為藻。



Eriocaulon nipponicum, Maxim.

穀精草科

穀精草（漢）

穀精草。生於水田池沼等處。由根生數線狀葉。秋日抽出數莖。莖頂著數個小單性花。花序為頭狀。在周圍者為雌花。在中心者為雄花。

栽培之為觀賞用。



Ananas sativus *Lindl.*

鳳梨科

鳳梨（漢）阿那那斯（拉）

鳳梨。自生於熱帶亞美利加。及他熱帶之各地栽培者多。常綠草也。葉濶大而尖。緣邊有大銳鋸齒。花多數密集。果實呈松球狀。大者長五六寸。頂上叢生數葉。

果實甘酸芳美。含有如百弗聖成分。能消化蛋白質。可供食用。由葉取纖維作織物及紙等原料。



Aneilema Keisak *Hassk.*

水竹葉（漢）　鴨跖草科

水竹葉。自生於水田池沼等處之雜草。長二三尺。葉披針形。有平行脈。互生。花著於莖或枝之上端。集生二三朶。有綠色之萼。及淡紅紫色之花瓣。

Commelina communis *L.*

鴨跖草（漢）　鴨跖草科

鴨跖草。自生於山野。為越年生草。高一尺餘。葉為廣披針形。有平行脈。葉柄有鞘狀之苞圍於莖。花藍色。不整齊。具編笠狀之苞。

由花被搾取藍色之液。浸於紙。稱藍紙。用為繪具。

Juncus prismatocarpus R. Br. var. Leschenaultii F. Buch.

Juncus effusus L. var. decipiens F. Buch.

燈心草科

燈心草（漢）

燈心草。植於水田。為多年生草。高一二尺至四五尺。莖綠色。細線狀。外觀如葉。葉生於莖之基部及花部。為鱗狀。花小。黃綠色。有三雄蕊。

莖供織席及籃等之料。莖中白髓。稱燈心。為點燈及其他之用。

燈心草科

笄石菖（日）

笄石菖者。自生於濕地之雜草。高一尺餘。葉細長而尖。花色綠。小形也。

Luzula campestris DC
var. capitata Miq

燈心草科

雀稗（日）

雀稗者。山野自生。多年生草。高六七尺。葉叢生。細長而尖。粗生長毛。花莖抽出於葉叢中間。密生小花成頭狀。

Stemona sessilifolia Miq

百部科

百部（漢）

百部者。栽培於園圃。多年生草。高二尺餘。葉為卵形。有平行脈。每四葉或三葉輪生。花淡綠色。生於葉腋。根為塊狀莖。數十相聯綴。似天門冬。

根供藥用。有鎮咳驅蟲之効。其煎汁能殺蚤及他蟲類。以產於廣東廉州者為最佳。

Veratrum Maximowiczii *Baik.*

Allium Ledebourianum *Schult.*

青藜蘆　百合科

青藜蘆者。山野自生之多年生草。高二三尺。葉為披針形。脉平行。長一二尺。花色淡綠。排列為圓錐花序。此植物以有毒著名。

麥葱（漢）　絲葱（漢）　百合科

麥葱者。各地栽培之多年生草也。高尺許。葉細長而稍扁平。地下部為鱗狀莖。類似薤白。鱗莖及葉供食用。味稍類葱而臭氣少。



Polygonatum officinale *Alle.*

百合科

萎蕤（漢）

萎蕤。亦作葳蕤。一名玉竹。山野自生之多年生草。莖柱狀而方。高一二尺。有肉質之根狀莖。葉長卵形。脈平行。花生於葉腋。色白微綠。下部連合作筒狀形。細小如鈴。

根莖製澱粉。及製跌打損傷藥。

Tulipa edulis *Bak.*

百合科

山慈姑（漢）

山慈姑。山野自生之多年生草。高約五寸。葉細長。由地下莖而生。花莖生於地下莖之中央。頂端著生一花。花為白色稍紫。

莖可供食用。

Tofieldia japonica *Miq.*

脫肥路的阿加波尼卡（拉）百合科

山地自生。多年生草。高一尺餘。葉細長而尖。類於石菖蒲。花莖自葉叢中抽出。著白色花。為總狀序。莖之上部出粘性液。以捕獲蟲類。及防禦害蟲。

栽培之供觀賞用



Tulipa Gesneriana *L.*

鬱金香（漢）百合科

鬱金香。小亞細亞原產之多年生草。高一尺餘。葉為廣披針形。色白。花美麗而大。單生於花莖之頂端。香聞數十步。

栽培之供觀賞用。花可入藥。與鬱金用根者不同。

Lilium cordifolium *Thunb.*



Trillium Smallii *Maxim.*

蕎麥葉貝母（漢）　百合科

山地自生。多年生草。高四五尺。葉心臟形。有長葉柄。花大。白而微帶綠色。由地下鱗狀莖採取澱粉。幼葉可食。

延齡草（日）　百合科

延齡草。自生於深山。多年生草。高約尺許。地上莖之上部。輪生三葉。卵圓形而尖。花梗生於葉叢中央。著一花。有三瓣及三萼片。花瓣紫色。有鈍頭。較萼片為短。實為球形漿果。取地下莖煎汁。為治腸胃病用。

Rhodea japonica *Roth.*

Lilium tigrinum *Gmel.*

百合科

卷丹（漢）

卷丹。山野自生。多年生草。高四五尺。葉披針形。互生無柄。葉腋生珠芽。花被大色黃而赤。反捲有暗紫色小點。供觀賞用。地下鱗狀莖為食用。

百合科

萬年青（漢）

萬年青者。自生於日本南部。今我國園圃處處有之。多年生之常綠草也。葉披針形。有平行脈。自地下莖而生。花莖抽於葉叢中央。長四五寸。花淡綠帶白色。排列為穗狀花序。果實為球形。赤色或黃色。著名之觀賞植物。人家植之以盛衰占休咎。

Chlorophytum comosum *Baker.*

Asparagus officinalis *L.*

石刀柏（漢）　百合科

石刀柏者。歐洲原產之多年生草。高三四尺。葉小如鱗片狀。但不甚明瞭。葉腋生細長之枝甚多。狀如綠色葉。花細小。淡綠白色。有長梗。

幼葉可食。亦稱蘆筍。

苦勞羅肥土謨卡麻司謨（拉）百合科

多年生之常綠草。生多數長匍匐枝。頂端叢生多葉。並抽出數個氣根。其葉細長而尖。并有白色線條。花小而白。有雄蕊六。

栽培之供觀賞用。



Scilla maritima L.



Erythronium dens-canis L.

百合科

海蔥（漢）

海蔥者自生於地中海沿岸。多年生草。高三尺餘。有鱗狀莖。似玉蔥。葉為披針形。具平行脈。花莖生於葉叢中央。上部著白色小花。花序為總狀。

鱗莖入藥。為利尿劑。

車前葉山慈姑（漢）　片栗（日）百合科

山地自生。多年生草。由地下部生兩葉。中央抽花莖。葉為長卵形。有平行脈。具赤褐色斑紋。花單性。生於花莖之頂端。花被紅紫。稍類於百合花。

根莖多肉。採取之為澱粉。幼葉可食。又可為觀賞用。

Lilium speciosum *Thunb.*

Reineckia carnea *Kth.*

鹿子百合（日）　百合科

鹿子百合。栽培而生。多年生草。有鱗狀莖入於地下。葉為廣披針形。脉平行。莖高二三尺。上部著大形之數花。花被六。淡紅色。別有深紅色之突起。向外反捲。

鱗狀莖有強苦味。不適食用。但供觀賞。

吉祥草（漢）　百合科

吉祥草。濕地自生之多年生草。莖匍匐於地上及地下。處處叢生。葉叢下部生多數之根。葉細長而尖。有平行脉。長一尺餘。形狀酷似麥門冬。花莖生於葉叢中央。著多數之花。淡紫色。有六裂之花被。

分根種陰崖處即活。亦可登盆。足供觀賞。

Hosta coerulea *Tratt.*

Convallaria majalis *L.*

紫萼（漢）紫玉簪（俗）　百合科

紫萼者。山野自生。多年生草。高二尺餘。葉為卵形。全邊。有平行脉。具長葉柄。由地下叢生。花莖出於葉叢之間。著數花於其上部。花序為總狀。花紫色或白色。花被六裂。

供觀賞用。幼葉可食。

君影草（日）　百合科

君影草者。自生於亞細亞及歐羅巴之山地。多年生草。高尺許。葉皆自地下部生。為長楕圓形。全邊。有平行脉。長四五寸。花莖無葉。著花於其上部。排列為總狀花序。花白色鐘狀。有下向之花被。

供觀賞用。歐產者有強香氣。出日本者則無。

Asparagus lucidus Lindl.

Dianella odorata Bl.

天門冬（漢）　百合科

天門冬。原產於奉島。今山東泰安縣山谷。今處處有之。多年生之蔓草也。以莖卷絡於他物。葉為鱗片狀。葉腋生綠色曲針狀之枝。人或往往誤枝為葉。花小。淡黃白色。每二三朵叢生。

塊狀根入藥為強壯劑。並可製砂糖漬。供食用。

桔梗蘭（日）　百合科

桔梗蘭。自生於暖地。多年生草。高約二尺。葉細長而尖。有平行脈。長八九寸。花生於花莖之上部。花序為圓錐形。花被六片。呈桔梗色。長三四分。實為青紫色橢圓形之漿果。大如指頭。

供觀賞用。



Fritillaria camtschatensis *Gaud.*

Lilium avenaceum *Fisch.*

車百合（日）　百合科

車百合者。山地自生。多年生草。地下生鱗狀莖。莖出地面高二三尺。葉為披針形。花黃而赤。有暗色斑點。供觀賞用。

黑百合（日）　百合科

黑百合。自生於高山。為多年生草。高約一尺。地下有鱗狀莖。葉為長卵形或長橢圓形。輪生。花有暗紫色之花被。栽培之為觀賞用。又鱗狀莖可供食用。

Lilium Maximowiczii *Rgl.*



Colchicum autumnale *L.*

小卷丹（漢）　百合科

小卷丹。自生於山地。多年生草。高三四尺。葉互生。為披針形。花由六片花被而成。赤黃色。又具暗色小點。且反捲。此植物雖酷似於卷丹。而無珠芽。蓋即與卷丹相異之點也。

供觀賞用。鱗狀莖可食。

古爾矢屈謨（拉）　百合科

古爾矢屈謨者。歐羅巴及地中海沿岸。自生之多年生草。高四五寸。葉細長。有平行脈。花單生於莖頂。有淡紅色之花被。果實為乾果而裂開。

種子稱古爾矢屈謨。用於治痛風及僂麻質斯有效。

Lilium japonicum Thunb.



Smilax medica Schlechtd. Cham.

百合（漢）　百合科

百合者。山地自生。多年生草。高二三尺。葉短而濶。為披針形。互生。花大而白。或淡紅色。花被無斑點。

供觀賞用。鱗狀莖可食。並入藥為補肺之劑。

撒兒沙（日）　百合科

撒兒沙者。中央亞美利加原產之植物。形狀類於菝葜。葉互生。畧帶心臟形。托葉細長。變化成捲鬚。

根稱撒兒沙根。用為治黴毒之藥。

Smilax China L.



Smilax herbacea L. var. nipponica Maxim.

菝葜（漢）　百合科

菝葜者。自生於山野。為木質性之多年生植物。高二三尺至六七尺。有刺。葉互生。為卵形或橢圓形。托葉為捲鬚。以卷絡於他物。花黃綠色。集為繖形。

地下部為藥用。其効用同於撒爾沙根。

牛尾菜（漢）　百合科

牛尾菜。山野自生。多年生之蔓草也。葉為卵形。互生。有托葉。而托葉又變成捲鬚。花小黃綠色。排列為繖形花序。

幼莖葉俱供食用。



Veratrum stamineum Maxim.

小梅形（日）　百合科

小梅形。山地自生。多年生草。高二尺餘。葉大豆生。為廣披針形。有平行脈。花色白。較梅形草之花小。而生雌花雄花及兩性花於同株。著名之毒草也。

Ophiopogon japonicus Ker.

沿階草（漢）龍髭（日）　百合科

沿階草。山野自生之多年生草。葉細長叢生。長一尺餘。花莖生於葉叢之中央。著小形淡紫色花。為總狀花序。果實青紫色。為球形果。

栽培於庭園花壇等處之外圍。

Veratrum nigrum L.



Hosta Sieboldiana Engl.

藜蘆（漢）棕榈草（日）　百合科

藜蘆者。自生於山地。多年生草。莖青紫。高二三尺。葉狹長。為披針形。有平行脈。花小。紫黑色。排列為圓錐花序。根莖皆有毛。

根入藥。性有毒。

玉簪（漢）白鶴花（中俗）　百合科

玉簪者。栽培於庭園。為多年生草。高四五尺。葉叢生。為卵形。有長葉柄。葉面具蠟質之白粉。花色白。排列為總狀花序。

栽培之為觀賞用。



Allium Cepa *L.*

玉葱廣東葱洋葱(中俗)　百合科

玉葱。栽培而生。多年生草。高二三尺。地下鱗狀莖。畧扁而圓。葉細長中空。花莖圓柱形。亦中空。較葉為長。頂著多數花。花序為繖形。花小白色。混珠茅。

歐美諸國亦栽培之。近年有輸入日本者。地下鱗狀莖及幼葉。俱可食。

Heloniopsis brevicapsa *Maxim*

海羅你握浦塞司不來唯卡捕撒(拉)　百合科

山地自生。多年生草。高一尺餘。葉叢生。為倒披針形。或長倒卵形。有平行脉。花莖生於葉叢中央。上端生十餘花。呈總狀。花紫紅色。頗美麗。供觀賞用。



Disporum smilacinum *A. Gr.*



Lilium longiflorum *Thunb.*

為朝百合(日)鐵炮百合(日)百合科

為朝百合。栽培於園圃中。多年生草。高二三尺。葉互生。為披針形。有平行脈。花色白而大。略呈喇叭狀。常自傾斜。為觀賞用植物。

雅兒百合(日)　百合科

雅兒百合者。山地自生。為雜草。高一尺餘。葉互生。為卵形而尖。有平行脈。花生莖頂。有白色花被六。



Ruscus aculeatus L.

魯斯苦斯阿苦來阿土司(拉)百合科

歐洲原產。常綠之小灌木。高約一尺。葉小。呈鱗狀。葉腋生卵形之扁平綠枝。其外觀酷似尋常之葉。花小白色。生於葉狀枝之中央。為觀賞用。

Allium cepa L.

韭(漢)　百合科

韭。菜名。處處栽之。為蔬類植物。多年生草。高一尺餘。葉細長而扁平。花小色白。集生於莖之頂端。為繖形花序。

莖名韭白。根名韭黃。味美可食。



蒜（漢）蒜（中俗）圖書館百合科

蒜。大蒜也。故俗稱蒜。自生於歐羅巴。我國得其種。處處栽之。為多年生草。高二尺餘。地下有鱗莖。葉細長而扁。花白色。微帶紫。排列為繖形花序。花間混珠芽。莖葉皆可食。臭氣甚烈。為蔬類植物。

葱（漢）胡葱（俗）百合科

葱者。西比利亞原產之多年生草。傳入中國後。徧地植之。高二尺餘。葉為管狀而尖。中空。有平行脉。花白色。多數集生為球形。幼時以囊狀苞蔽之。

四時皆可采食。葉之下部色白。俗謂之葱白。日本人稱為白根。



Allium nipponicum Fr. et Sav.

山蒜（漢）

百合科

山蒜。自生於山野。多年生草。高一二尺。地下生鱗狀莖。葉細長而尖。有平行脈。花白色。有長莖。排列為繖形。混珠芽。可供食用。

Aspidistra elatior Bl.

蜘蛛抱蛋（漢）一葉（漢）葉蘭（日）百合科

一葉者。產於暖地。常綠之多年生草。葉大。為長橢圓形。兩端尖。有平行脈。具長葉柄。花有暗紫色之花被。單生於短花莖頂。供觀賞用。

Phormium tenax *Forst.*

牛塞郎島麻（日）　百合科

此植物為牛塞郎島原產。常綠草。葉長而簇生。畧似溪蓀。花赤褐色。排列為繖房花序。

自其葉採取纖維。可為繩織物等料。又供觀賞用。

Tricyrtis hirta *Hook.*

油點草（漢）　百合科

油點草者。山野自生。多年生草。高二尺餘。莖葉皆有毛。葉互生。長卵形而尖。基部抱莖。花生於葉腋。花被淡紫色。具濃紫色之小點。

栽培之為觀賞用。



Hyacinthus orientalis L.

Allium Bakeri Rgl.

嘿阿聖篤（拉）　百合科

嘿阿聖篤。產於地中海沿岸。為多年生草。從地下鱗狀莖。叢生細長之葉。花莖生於葉之中間。花青色。排列為總狀花序。變種甚多。有花被為八重者。有呈種種色彩者。栽培之為觀賞用。

薤（漢）　百合科

薤。栽培於園圃。多年生草。亦蔬類植物也。高一尺餘。葉細長。有平行脉。花色紫。排列為繖形。有鱗狀莖。如小蒜。謂之薤白。薤白可供食。亦為藥用。

Aloe vera L.

Lilium auratum Lindl.

百合科

蘆薈（漢）

蘆薈者。栽培於地中海沿岸。及熱帶地方。常綠植物也。葉大而夫。為肉質。緣邊有鋸齒。花生於長莖上部。呈穗狀。其葉分泌汁液。色黑有光。

葉汁入藥。用為瀉下劑及健胃劑。

百合科

山百合（日）

山百合。自生於山地。為多年生草。高四五尺。葉互生。為披針形。花大。生於莖之上部。有白色之花被。內面具暗紅色之斑點。

栽培之為觀賞用。又地下之鱗莖。可供於食用。



長壽花（漢）　石蒜科

長壽花為歐洲原產之多年生草。高約二尺。葉甚細長。畧為半圓筒形。花二朵或五朵集生於莖之頂端。排列為繖形。花被黃色六裂。香氣甚強。口緣具小杯狀之部分。栽培之為觀賞用。



狐剌刀（日）　石蒜科

狐剌刀。山地自生。多年生草。高一尺餘。葉細長。叢生於地下之鱗狀莖。至夏季則枯死。秋季發生花莖。開花於頂端。排列為繖形。黃赤色。有六裂之花被。雄蕊比花被同長或稍短。性有毒。然多供觀賞用。

Narcissus Tazetta L.
var. chinensis Roem.

水仙（漢）　石蒜科

水仙。日本暖地海邊自生。吾國亦多栽培之。為多年生草。高約一尺。葉叢生而細長。有平行脈。花莖生於葉叢中間。著數花。為纖形。花被六。色白。具黃色杯狀之副冠。供觀賞用。地下莖有毒。然可治癰腫。



Zephyranthes candida Herb.

玉簾（日）　石蒜科

玉簾。栽培於庭園之多年生草。高約一尺。葉細長叢生。花莖生於葉叢中間。頂著一花。花被白。微帶紫色。供觀賞用。

Lycoris radiata Herb.

石蒜（漢）　石蒜科

石蒜者。山野自生。多年生草。高一尺餘。葉細長。有平行脈。葉枯後花莖乃生。頂端著數花。為纖形花序。六瓣。色紅。雄蕊甚長。突出於花外。

有毒。惟地下莖。可取澱粉。供食用。



Agave americana L.

龍舌蘭（日）　石蒜科

龍舌蘭者。墨西哥原產之大形草。生數年後始開花。結實則枯死。葉多肉。長而尖。有針狀鋸齒。花莖生於葉腋之中央。著多數之花。

從其葉取纖維。可供織物造紙等用。葉汁可釀酒。又栽培之為觀賞用。

Dioscorea japonica Thunb.

薯蕷科

薯蕷（漢）山藥（中俗）

薯蕷自生於山野。多年生之蔓草也。莖細長。卷絡於他物。葉為長心臟形而尖。有長葉柄。花小單性。實為裂果。有三翅。生於葉腋之零餘子。及多肉之根。可供食用。根莖並入藥。產於河南之舊懷慶府者。尤佳。稱懷山藥。

Iris sibirica L. var. orientalis Thunb.

鳶尾科

溪蓀（漢）

溪蓀。山野自生之多年生草也。高約二三尺。葉劍狀而長。生於長根狀之莖。花莖自葉叢中央抽出。著生二三花。花多青紫色。外圍大形花被。基部有網狀之斑紋。栽培之供觀賞用。



Iris tectorum *Maxim.*

鳶尾（漢）

鳶尾。栽於庭園之中。為多年生草。高一二尺。葉劍狀。淡綠色。相抱擁而互生。花軸生於葉間。上端通常著三花。花六瓣而大。呈淡紫青色。又有紫色小點。散在花被之上。而上面基本部。又具毛狀突起。

供觀賞用。根莖入藥。為吐劑及下劑用。

鳶尾科

Iris laevigata *Fisch.*

燕子花（漢）

燕子花。自生於池沼濕地。多年生草。有長根狀莖。葉為劍狀。長二三尺。花莖生於葉叢中央。頂端著大形花。花通常為青紫色或白色。有二層花被。外層大而下垂。內層狹小而尖長。且向上。

栽培之為觀賞用。

鳶尾科

Crocus sativus L.

Iris japonica Thunb.

番紅花（漢）　洎夫蘭（日）　鳶尾科

番紅花者。小亞細亞原產之多年生草。栽培於諸國。高四五寸。於地下莖呈球狀。與水仙之莖相似。由莖部生細長葉。葉叢間著青紫色花。有香氣。

乾其花柱及柱頭。稱咱夫蘭。為建胃鎮痙通經等藥。又為黃色染料。可染果子及他食品。

蝴蝶花（漢）　鳶尾科

蝴蝶花。自生於陰地。多年生之長綠草。高二尺餘。葉呈劍狀。有平行脈。且光澤。花莖分枝著數花。花被色白而帶紫色之暈。中心色黃。上面有毛狀突起。緣邊具鋸齒。

栽培之為觀賞用。



Iris laevigata *Fisch.*
var. Kaempferi *Sieb.*

Belamcanda punctata *Moench.*

花菖蒲（日）　鳶尾科

花菖蒲。栽培於庭園。多年生草。高二三尺。葉劍狀。有平行脉。花六瓣。有濃紫淡紫及青白色之斑紋。外層三瓣大而下垂。內層三瓣形小頭鈍而向上方。供觀賞用。

射干（漢）　檜扇（日）　鳶尾科

射干者。山野自生。多年生草。高二三尺。葉為廣劍狀而尖。有平行脉。排列成二行。花紅黃色。有六片花被。上著紫色細點。結實成房。種子色黑。栽培之為觀賞用。根可入藥。



Musa Basjoo Sieb.

芭蕉（漢）　芭蕉科

芭蕉。栽培於庭園。為多年生草。高八九尺。莖軟。重皮相裹。外青裡白。葉大。為長橢圓形。中肋之兩側。有平行脈。花不整齊。色淡黃。簇生大形之苞腋。果實為肉質而長。供觀賞用。



Musa sapientum L.

甘蕉（漢）　芭蕉科

甘蕉。產於熱帶地。今粵省多植之。高二丈餘。多年生之大形植物也。全形類芭蕉。頂上叢生八至十之大葉。葉之中央抽出大形花叢。開多數淡黃花。果實長四五寸。直徑約一寸。初青後黃。為柔果肉。果肉芳香而甘。富於營養料。熱帶土人以此為主要食物也。



Ravenala madagascariensis *Sonn.*

拉愛那拉（拉）　芭蕉科

拉愛那拉者。嗎達蛤斯卡路原產之木本植物。莖高約七尺。葉畧類於芭蕉而長大。排列成二行。觀之如開扇狀。葉鞘內常貯清水。故又有水木及旅人木之名。

熱帶地方多栽培之。為觀賞用。嗎達蛤斯卡路土人。以其種子為食物。

Curcuma longa *L.*
var. macrophylla *Miq.*

鬱金（漢）　蘘荷科

鬱金。產於蜀地及西戎。今廣西江西等處亦有之。為多年生草。高二三尺。葉為長橢圓形。類於曇華。畧似蘘荷而大。花黃。有鱗狀之苞。每苞開三四朵。每朵又各有小苞。

地下莖可為黃色染料。又供啞而開利之試藥用。古以之浸酒。祭祀用之。謂之鬱鬯。



Alpinia chinensis Rosc.

熊竹蘭（日）　薑荷科

熊竹蘭者。日本原產之多年生草。形狀頗似薑荷。高三四尺。葉長橢圓形。有多數平行脈。在中肋之兩側。花不整齊。色白。有紅斑點及黃暈。排列為圓錐花序。

栽培之為觀賞用。乾之可作繩。

Zingiber officinale Rosc.

生薑（漢）薑（中俗）　薑荷科

生薑者。為熱帶亞細亞原產之多年生草。高二三尺。葉為披針形。有平行脈。花有不整齊之瓣。形類於薑荷花。

根狀莖為香味料。或沙糖漬。又供藥用。

Elettaria cardamomum *White et Maton.*

Zingiber Mioga *Rosc.*

蘘荷科

小豆蔻（日）

小豆蔻。產於前印度之海岸。多年生草。高丈許。葉類似於蘘荷。花生於莖之上部。其構造似蘘荷花。果實稱小豆蔻。為芳香性之健胃劑。

蘘荷科

蘘荷（漢）茗荷（日）

蘘荷者。山野自生。多年生草。高二三尺。葉長橢圓形而尖。酷似生薑葉。花序生於地下之莖。由多數花而成。花黃色。不整齊。幼莖及花序。可供食用。

Cypripedium macranthum Sw. var. ventricosum Rchb. f.

Canna indica L.

曇華蘭蕉檀特（漢）　曇華科

曇華。栽培於庭園。為多年生草。高四五尺。葉為長卵形而尖。有平行脈。約長一尺。花色紅。不整齊而美麗。

觀賞用之植物。

敦盛草（日）　蘭科

敦盛草者。深山自生之多年生草也。高約尺許。葉長卵形。互生。花大。淡紅色。有幌狀之片。

栽培於庭園。供觀賞用。

Calanthe discolor *Lindl.*

Epipactis falcata *Thunb*

海老根、蝦根（日）　蘭科

海老根者。山野自生。多年生草。高一二尺。葉大。為長橢圓形。有多數平行脈。花莖生於葉叢中央。著數花。花紫白色。甚美麗。旗瓣三裂。中央之裂片。為淺二裂。

觀賞用。

金蘭（日）　蘭科

金蘭者。山野自生。多年生草。高一二尺。葉呈廣披針形。全邊。有平行脈。花雖酷似鍬蘭花。而色黃。



Cypripedilum japonicum Thunb.

Epipactis erecta Thunb.

銀蘭（日）　蘭科

銀蘭者。山野自生。多年生草。高通常不越七八寸。葉長卵形或廣披針形。全邊。有平行脈。花白色。花被六片。其一片有短距。

熊谷草布袋草（日）　蘭科

熊谷草。山地自生。多年生草。莖高一尺餘。上部生二大葉。葉畧圓。有多數平行脈。花大。單生於莖之頂端。色紫。有母衣狀之旗瓣。（母衣日本武人用之）

栽培之為觀賞用。

Habenaria radiata Thunb.

鷺毛玉鳳花（漢）鷺草（日）　蘭　科

鷺草者。生於山野濕地。多年生草。高約尺許。葉細長而尖。花色白。有長距。花被最大。具細裂之緣邊。

栽培之為觀賞用

Arethusa japonica A. Gr.

澤蘭（漢）　蘭　科

澤蘭者。生於山中濕地。多年生草。每莖生一葉。為披針形。花莖無枝。頂端著一花。花呈紫紅色。與白及花相似。

栽培之為觀賞用。並入藥。地下莖。名地筍。可食。



Orchis militaris L.

沙列布（日）　蘭科

沙列布者。產於歐洲之多年生草。高三尺餘。葉為廣披針形。花呈穗狀。有帶紅色而不整齊之花被。

多肉之根。稱沙列布根。為藥用。治胃腸加答兒。

Bletilla hyacinthina Rchb. f.

白及（漢）紫蘭（日）　蘭科

白及。栽培於庭園。多年生草。高一二尺。葉為廣披針形。闊寸許。有平行脈。花紅紫或白。為不整齊之花被。

根可入藥。並可為糊料。

Cymbidium ensifolium Sw.

Dendrobium moniliforme Sw.

建蘭（漢）駿河蘭（日）　蘭科

建蘭。產於福建。故名。多年生之常綠草。高二三尺。葉細長而尖。有平行脈。叢生。花莖生於葉叢之間。上部開不整齊之花。色淡黃帶紫。香極幽雅。

栽培之為觀賞用。

石斛（漢）　蘭科

石斛者。附著於高山之岩石或古樹上。多年生草。高六七寸。莖有明瞭之節。略似木賊而中實。每節生一葉。為披針形而厚。有平行脈。花白或淡紅。為不整齊之花被。生於莖之上部。

莖可入藥。以其狀如金釵之股。亦稱金釵石斛。

Cymbidium virens *Lindl.*

春蘭（日）　蘭科

春蘭者。山野自生。常綠之多年生草。高七八寸。葉細長而尖。有平行脈。花莖生於葉叢中間。頂著一花。淡黃綠色。為不整齊之花被。

栽培之供觀賞用。又花入於熱湯中為鹽漬。

Vanilla planifolia *Andrews*

瓦尼拉（拉）　蘭科

瓦尼拉者。自生於墨西哥。栽培之於熱帶地。為常綠蔓生植物也。葉呈長卵形。肉質而厚。花黃綠色。有黃斑。果實細長。約尺許。有強香氣。

此果稱為瓦尼拉。加於果子及阿衣司苦里衣姆。或著可來脫。則凝聚香氣。



Houttuynia cordata. Thunb.



Piper nigrum L.

三白草科

蕺草（漢）十約（日）

蕺草者。山野自生。多年生草。高七八寸。莖細長。匍匐於地上及地下。葉卵形。互生。花小。淡綠色。無花被。排列成穗狀花序。花序下有白花瓣狀之苞四片。

莖葉皆有臭氣。亦稱魚腥草。可食並藥用。

胡椒科

胡椒（漢）

胡椒。為東印度原產之蔓生植物。長丈餘。葉長心臟形。互生。花小。為長穗。果實球形。初綠色。熟則變為紅色。

乾其果實。皮皺色黑。稱黑胡椒。除去黑皮者。稱白胡椒。味辣而香。研粉供食料及藥用。

Chloranthus brachystachys *Bl.*

Piper cubeba *L.*

胡椒科

蓽澄茄（日）

蓽澄茄產於東印度及爪哇等處。蔓生植物。葉長卵形而尖。甚平滑。實為漿果。大如豌豆。呈黑褐色。果實半熟時。摘取而乾燥之。可為治淋疾之藥。

金粟蘭科

草珊瑚（漢）千兩（日）

草珊瑚。自生於暖地之常綠灌木。高三四尺。葉對生。卵形。有鋸齒。花小。淡黃綠色。無花被。實為球形之果。紅色或白色。栽培之為觀賞用。

Chloranthus inconspicuus *Sw.*



Chloranthus japonicus *Sieb.*

金粟蘭科

金粟蘭（漢）

金粟蘭一名珠蘭。亦稱珍珠蘭。栽於庭園。為常綠植物。莖高二三尺。有節。葉對生。橢圓形而厚。略類茶葉。花小。黃綠色。無花被。排列為穗狀花序。香氣濃郁。觀賞用之植物也。

金粟蘭科

銀線草（漢）眉掃草

銀線草。自生於山野。為多年生草。高七八寸。莖有節。上部輪生四葉。葉為橢圓形而尖。有鋸齒。花小。無花被。由細長白色之雄蕊。及綠色之雌蕊而成。排列為穗狀花序。



Chloranthus serratus R. et S.

及己（漢）　金粟蘭科

及己。自生於山野。為多年生草。高尺餘。莖有節。葉對生。有鋸齒。呈橢圓形而尖。花缺花被。由黃色之短雄蕊及綠色之雌蕊而成花序。通常著生為二。排列成穗狀。

Salix babylonica L.

柳（漢）　楊柳科

枝垂柳（日）

柳。栽培於庭園及路傍河沿等處。為落葉喬木。高三四丈。枝質弱。恆細長而下垂。葉披針形。有鋸齒。花單性。排列穗狀花序。雌雄異株。實熟則絮飛散如雪。

材可編什器。及為薪料。又可為觀賞用。



Populus balsamifera *L.*
[illegible]r. suav olens *Loud.*

Myrica rubra *S. et Z.*

泥樹、綿樹、(日)　楊柳科

泥樹自生於寒地。為落葉喬木。高數十尺。葉互生。呈卵形或長橢圓形而尖。有鈍鋸齒。花單性。雌雄異株。排列穗狀花序。實係裂果。種子具綿狀白毛。

材供自來火木幹及草帽瓣。種毛可用為綿絮。

楊梅(漢)　楊梅科

楊梅。產於暖地。為常綠樹。高約二丈。葉互生。為長橢圓形。花小而單性。雌雄異株。結球形之核果。有多數乳頭狀突起。

果實供食用。樹皮可為褐色之染料。材則車類細工及薪炭多取給之。

Pterocarya rhoifolia *Sieb. Z.*

Juglans Sieboldiana *Maxim.*

胡桃科

山胡桃（漢）

山胡桃。多生於山地。為落葉喬木。通常高二三丈。生奇數羽狀複葉。而葉有短柔毛。花係單性。雌雄同株。實為核果。內含種子一枚。種子供食品。又以之榨油及其他之用。材可為建築及器具。特適於鳥銃等之柄。樹皮又可為染料。

胡桃科

澤胡桃（日）

澤胡桃者。山地自生之落葉樹也。高三四丈。葉形大。為羽狀複葉。花單性。雌雄各自為穗而生於同株。果實有二翅。材可為自來火木軸。及日本人之木履等。內皮或稱為壽光皮。可製器具。

Carpinus japonica Bl.

卡阿皮奴司。加跑尼卡。(拉)　樺木科

此物產生於山地。為落葉喬木。高數十尺。葉互生。作長卵形而尖。有鋸齒。花單性。排列為穗狀花序。雌雄同株。果實小而堅。外有鱗片狀之小苞。

材為薪炭及器具之用。

Betula alba L. var. vulgaris DC.

白樺(日)　樺木科

白樺。為落葉喬木。產遼東及西北諸地。嫩江混同江間尤多。高三四丈。皮白易剝脫。葉作卵形。而末端甚尖。柄長且互生。花單性。雌雄同株。為穗狀花序。

材可為器具。樹皮為染料。又可以裹弓韘鞍鐙刀靶等物。

Corylus heterophylla *Fisch.*



Corylus rostrata *Ait.*
var. *Sieboldiana Maxim.*

角榛（日）　樺木科

角榛。山野間之落葉灌木。高六七尺。葉互生。為卵形。有重鋸齒。花作小形。單性。雌雄同株。實係堅果。位於角狀之殼內。種子可充食用。材可為薪料。

榛（漢）　樺木科

榛多生於山野。為落葉喬木。高二三丈。葉互生。為圓心臟形而尖。有重鋸齒。春日開花。如長穗。形小。性單。雌雄同株。實係堅果。外苞葉狀片之殼斗。每苞一實。味略似胡桃。種子供食用。



Alnus japonica S. et Z.

赤楊（漢）　樺木科

赤楊生於山野為落葉喬木高數十尺葉互生卵形而尖有鋸齒花小形單性排列成穗狀雌雄同株果實似松毬狀材為建築器具之料又供薪炭用果實樹皮皆可為染料

Alnus firma S. et Z.

阿魯奴司肥魯麻（拉）　樺木科

此物生於山野為落葉喬木高達丈餘葉互生卵形而尖有鋸齒花小形單性雌雄同株實係乾果為橢圓形外形畧似松毬材為造車細工及薪炭之料果實供染料可為五倍子之代用品



Quercus acuta Thunb.

血櫧（漢）赤樫（日）　殼斗科

血櫧山地自生之常綠樹高約四丈葉橢圓形而尖全邊者多幼葉有褐色之毛生長充足者平滑花單性雌雄同株實為橢圓形之乾果基部有椀狀之殼斗

其材堅牢可為車下馱之齒及船具農具等用又供薪炭之料



Quercus variabilis Bl.

考盧苦櫟（拉）　殼斗科

考盧苦櫟者山地自生之落葉樹高約六丈樹皮有厚木栓層葉雖似櫟而裡面密生灰白色之毛花及果實類於櫟

取其樹皮之木栓層供瓶類之栓及他用材為薪炭料

Fagus japonica *Maxim.*

Quercus phyllireoides *A.Gr.*

山毛櫸（漢）　殼斗科

山毛櫸者。山野自生之落葉樹。高七八丈。樹皮平滑淡灰色。葉為長卵形而尖。背有長毛。花小。單性。淡綠色。雌雄同株。實為堅果。半被包於殼斗。殼斗下之柄。比椈畧長。材可為農具家具及他器具之料。又可為薪炭。

栲芽櫧（日）　殼斗科

栲芽櫧。自生於暖地。為常綠樹。高約五丈。葉倒卵形。或橢圓形。長一寸三四分。緣邊上部有鋸齒。花小。單形。雌雄同株。實為堅果。有椀狀之殼斗。

材可為木版艪艩等之料。又可燒為木炭。此炭以火力强而著名。又栽培於庭園為觀賞用。

Quercus dentata *Thunb.*

Quercus serrata *Thunb.*

槲（漢）栢（日）　殼斗科

槲者。多生於山野。為落葉樹。高及二三丈。葉大而長。為倒卵形。有波狀鋸齒。以短葉柄而互生。花單性。雌雄同株。實為堅果。有椀狀之殼斗。

材供薪炭用。樹皮充染料及鞣皮料。種子可作糊。味雖劣。而歲荒人亦食之。

櫟（漢）　殼斗科

櫟生於山野。北方產者尤多。為落葉樹。高二三丈。葉披針形。有鋸齒。類似於栗。花黃褐色。單性。雌雄同株。實為堅果。圓而端尖。有殼斗如椀。謂之橡實。

材斜理。最適用於薪炭。樹皮及殼斗可為染料。而樹皮又為鞣皮之用。附皮之材可培植香蕈。種子可食。葉可飼野蠶。

Castanea vulgaris *Lam.* var. japonica *DC.*



Quercus glandulifera *Bl.*

殼斗科

栗（漢）

栗自生於山地為落葉喬木高四五丈葉披針形有鋸齒互生酷似於櫟花小單性雄花排列為長穗狀花序雌花每三個集生外包殼斗實為堅果位於囊狀殼斗之內殼斗外面有刺如蝟毛熟則裂開

仁淡黃色可食材可製器及建築薪炭料葉可飼野蠶樹皮為染料及鞣皮用

殼斗科

柏（漢）櫧（日）

柏者自生於山野為落葉樹高二三丈葉為倒卵形而尖有鋸齒背面白色有軟毛甚密花單性雌雄同株雄花黃白色排列為長穗狀花序雌花具杯狀之總苞實為堅果有杯狀之殼斗

材供薪炭及器具之料樹皮為染料種子供食用

Pasania cuspidata *Oerst.*

Quercus glauca *Thunb.*

殼斗科

柯樹（漢）椎子

柯樹多生於暖地。為落葉喬木。高三四丈。葉為長橢圓形而厚。背面灰褐色。花單性。雌雄同株。實為橢圓形之堅果。殼斗如囊狀。熟則裂開實出。

材可建屋製器及為薪炭。樹皮為染料。種子可食。又栽培之為觀賞用。

殼斗科

櫧（漢）白樫（日）

櫧產於暖地。為常綠喬木。高二三丈。樹皮色白。葉為廣披針形。或長橢圓形而尖。有鋸齒。面青背白。花單性。黃褐色。排列成穗狀花序。雌雄同株。實為堅果。有椀狀之殼斗。如菩提子大。

材堅實可為器具。又栽培之為觀賞用。子可食。



Fagus sylvatica *L.*
var. Sieboldi *Maxim.*

Quercus suber *L.*

椈（漢）　殼斗科

椈自生於山地。落葉喬木。高數丈。葉互生。卵形。有少數之毛。花小。單性。雌雄同株。實為堅果。位於有刺毛之殼斗內。熟則綻裂。現出果實。

材堅緻。有脂而香。古人破為臼。或供薪炭之料。子可食。或榨油為燃燈之用。

木栓樹（日）　殼斗科

木栓樹。或作木塞櫧。地中海沿岸。自生之常綠樹也。高二丈餘。葉長橢圓形而厚。緣邊有齒牙。背具軟毛。花單性。雌雄同株。雄花排列為長穗狀花序。雌花具杯狀之總苞。實為堅果。有杯狀之殼斗。

樹皮輕軟有彈性。取作木栓為用甚廣。

Ulmus pumila Jacq.



Ulmus montana Sm.
var. typica Maxim.

榆科

榔榆（漢）

榔榆者。山野自生之落葉樹也。高約三丈。葉橢圓形。有鋸齒。長一寸二三分。花開於秋季。形小而色淡綠。果實偏圓。周圍有翅。材可為車軸。其皮堅韌。剥之長數尺。古以為絙索。

榆科

厚子・阿足示（日）

厚子者。產於北部之落葉樹也。高達丈餘。葉為倒卵形。有不整齊之鋸齒。花小。色黃綠。

日本北海道土人。用此植物之內皮纖維。為造織物。又其材可供器具及薪炭之料。

Celtis sinensis Pers.

Zelkova acuminata Pl.

榆科

朴樹（漢榎曰）

朴樹自生於山野。為落葉喬木。高五六丈。葉橢圓形而尖。緣邊上部有鋸齒。花黃而小。單性。亦有兩性者。實為小球形之肉果。黃赤色。

材供器具及薪炭用。果實味甘可食。庭園多栽植之。

榆科

欅（漢）

欅者。生於山野之落葉喬木。高數丈。葉互生。為廣披針形。或長卵形。而尖。有鋸齒。花小。單性。有淡黃綠色之花被。雌雄同株。

材質固。木理美麗。可作箱篋几案之用。價值貴重。



Ulmus campestris Sm.

Ficus Wightiana Wall.

榆科

榆（漢）

榆為各地自生之落葉喬木。高八九丈。葉互生。橢圓形。有鋸齒。長約二寸。花後始出花小球形。以多數鱗片狀葉保護之。一端呈紅褐色。實為翅果。如小扇狀。舊稱榆莢。以其形扁圓垂垂成串。又謂之榆錢。

材堅。褐色。可製器具及車軸。并為薪炭之料。嫩葉及榆錢可供食用。

桑科

榕樹（漢）

榕樹。產於閩廣熱地。為常綠喬木。高四五丈。葉橢圓形。平滑。柄長。花淡紅色。果實構造類無花果。為球形而小。其樹因幹生枝。枝復生根。下垂至地。又復為幹。故其蔭極廣。

材為挽物細工。及他器具之料。

Cannabis sativa L.



Ficus carica L.

桑科

大麻（漢）

大麻。多栽於園圃。一年生草。高八九尺。葉為掌狀複葉。由五小葉或七小葉而成。花單性。雌雄異株。雄花色淡綠。多花粉。雌花甚小。色綠。

皮部纖維柔韌。可織夏布。及網織物等之料用。其粗硬不潔白者。喪服用之苴去皮則可供種種之料。實可榨取香料及油料。又產生於印度者。可作麻醉及鎮痙藥。

桑科

無花果（漢）

無花果。出揚州及雲南。今吳楚閩越人家處處栽之。為落葉樹。高丈餘。葉大而粗糙。三裂或五裂。花單性。隱於倒卵形囊狀之總花托內。實為倒卵形之肉果。其外圍為總花托之發育物。內部為多數花之發育物。生青熟紫。味如柿而無核。

實具消化蛋白質之成分。食之可助消化作用。葉為治痔聖藥。



Broussonetia Kasinoki Sieb.

Ficus Carica Thunb.

桑科

天仙果（漢）

天仙果。自生於暖地。為落葉灌木。高丈餘。葉橢圓形。互生。花單性。隱於圓形之總花托內。實球形。纍纍如櫻桃。構造等於無花果。秋熟。味至甘。

樹皮纖維。為製紙原料。實可供食。又栽培之可為觀賞用。

桑科

楮（漢）

楮。自生於山野。為落葉亞喬木。高丈餘。葉酷似於桑。而粗糙。花單性。雌雄異株。雌雄花雖同類於構。而以其形小可區別之。

樹皮有斑紋。為製紙原料。實如楊梅。密漬可食。亦可入藥。

Broussonetia papyrifera Vent.



Ficus retusa L. var. nitida Miq.

桑科

構（漢）穀樹（中俗）

構即俗所稱之穀樹。山野自生。為落葉亞喬木。高二三丈。幼莖密生剛毛。葉卵形。五裂或三裂。有毛而粗糙。葉身畧作楕狀。著於葉柄。花單性。雌雄異株。雄花列為穗狀。如桑。雌花作球形。實熟色紅。樹皮灰白色。為製紙原料。

桑科

鴿祖麻路（琉球語）

鴿祖麻路。生於琉球及他暖地。為常綠樹。葉楕圓形。平滑而厚。有光澤。花類無花果。生於囊狀球形之總花托內。但無花柄。栽培之為觀賞用。材可為器具之料。

Humulus japonicus S.et Z.



Morus alba L.

葎草（漢）　桑科

葎草自生於山野。為多年生之蔓草。以莖纏繞於他物。莖及葉柄俱有刺向下。葉分裂為掌狀。多細齒。以長葉柄而互生。花單性。無花冠。雌雄異株。雄花為圓錐形花序。有黃綠色之萼片及雄蕊各五。雌花每數箇集生。實似松毬。果實入藥為健胃劑。

桑（漢）　桑科

桑有魯桑湖桑之別。為落葉喬木。以每歲刈取故枝幹低亞。葉卵形。有鋸齒。或分裂呈種種之形。花小單性。有淡黃綠色之萼。列為穗狀花序。雌雄異株。實為長橢圓形。畧似懸鈎子類之果。此樹變種甚多。葉飼蠶。材可製器。肉皮為紙及絲料。實謂之葚。熟則紫黑。味美可食。或為釀酒用。

Humulus Lupulus *L.*
var. cordifolius *Maxim.*

Fatsia pilosa *Gaud.*
var. subcordata *Rupr.*

桑科

唐花草（日）

唐花草自生於日本山地多年生之蔓草也莖及葉柄俱有刺葉為心臟形端尖有鋸齒多三裂花單性似葎草之花實雖類於葎草而其形較大果實為忽布之代用製麥酒則宜附以苦味及香氣又為健胃劑

桑科

桑草（日）

桑草自生於原野之雜草高一二尺葉卵形端尖有長柄形狀酷似於桑花單性甚細小有綠黃色之萼雌雄同株

Ficus elastica L.

印度彈性護謨樹（日）　桑科

東印度原產之常綠樹。高二丈餘。葉互生。長橢圓形。全邊。質厚有光澤。花小。單性。隱於囊狀之總花托內。與無花果相似。實亦類於無花果。為長卵形。綠黃色。長四五分。傷其幹。採白色乳狀液。可製彈性護謨。

Galactodendron utile H. B.

乳樹（日）　桑科

乳樹。為南亞美利加原產之常綠樹。高約五丈。葉互生。為廣披針形。有全邊。花單性或兩性。實為球形之果。而畧帶肉質性。傷其莖。取流出之乳樣濃液。可供食用。



Artocarpus integrifolia *Forst.*

波羅蜜樹。曩伽結樹（漢）　桑　科

波羅蜜樹。產於嶺南及東印度等處。為常綠喬木。高約三丈。葉倒卵形。不分裂。花小。多數集生成長橢圓形。果實亦橢圓而長。大如冬瓜。肉瓣疊似橘瓤。其果黏似麵包樹。而味劣。然東印度及附近土人多食之。又以其黃色之心材。梁僧侶法衣。

Artocarpus incisa *Forst.*

麵包樹（日）　桑　科

麵包樹。栽培於熱帶地。為常綠喬木。高二三丈。葉大。分裂成羽狀。雌花集生為球形。雄花集生為長花叢。果實徑六七寸。有白色麪包質之肉。燒而食之。味亦略似麪包。熱帶土人以此為重要食物。材可建屋。樹皮纖維。為被服原料。樹液富於粘質。可作膠糊之用。



Ficus religiosa L.

Humulus Lupulus L.

菩提樹（漢）　桑科

菩提樹。多產於粵東。常綠亞喬木。高二丈餘。葉卵形。端甚尖長。具有長柄。花隱於托中。實似天仙果。而質堅不朽。

西域記云。昔佛坐其下成等正覺。因謂之菩提樹。今奉此樹如神聖。寺院中多栽培之。瓊山縣人稱其實為金剛子。可作念珠。又乳狀液可製彈性膠。誤與列入田麻科者。名同實異。

忽布（日）　桑科

忽布者。產於歐美及亞洲西部之蔓草。長約一丈五尺。葉卵形。有不分裂者。亦有三裂或五裂者。花單性。雌雄異株。實之外觀。畧似於松類之球果。

實有苦味質及揮發油。用於麥酒。故附有苦味與芳香。又可用為健胃劑。

Ulmus montana, Sm. var. typica, Maxim



Boehmeria japonica Miq. var. tricuspis Hec

山榆（漢）　蕁麻科

山榆。自生於北地之山中。為落葉喬木。高丈餘。葉倒卵形。或橢圓形。緣邊有不整齊之鋸齒。葉端通常三尖。葉柄甚短。花細小簇生。淡黃綠色。果實小而扁平。

幹皮柔韌。可用以織布。

赤苧（日）　蕁麻科

赤苧者。山野自生之多年生草也。高二三尺。莖及葉柄色赤。葉為卵形。有不整齊之鋸齒。尖端呈龜尾狀。花單性。雌雄同株。以其莖之皮部製纖維。效用畧同於麻絲。



Urtica Thunbergiana Sat Z.

Nanocnide japonica Bl.

蕁麻(漢)蠍子草(中俗)　蕁麻科

蕁麻者。山野間之多年生草也。高二三尺。莖葉俱有刺。葉呈卵形而尖。由長葉柄而對生。花小形為單性。色白。雌雄同株。由莖之表皮採取纖維。供絲織物等之用。

菱葉垣通。菱葉積雪草。(日)蕁麻科

菱葉垣通者。自生於山野之雜草。有方莖。高一尺餘。葉酷似垣通之葉。而其基部為楔形。且以其為互生而異之。花小而無花冠。

Boehmeria nivea *Bl.*

Thesium chinense *Turcz.*

蕁麻科

苧麻（漢）

苧麻者。山野自生。多年生草。莖稍具木質性。高三四尺。葉卵形而尖。有鋸齒。裡面密生白毛。由長葉柄而互生。花單性無花冠。雌雄同株。

栽養之。由莖皮部取纖維。為絲織物等之料。歐洲稱此物為支那草。於南洋稱之為 Ramie。

檀香科

卡尼比克草（日）

卡尼比克草。多生於原野。為半寄生植物。附著於他生活植物之根。莖細。高約一尺餘。葉細長而尖。互生。其花生於葉腋。為小形無花冠。萼為綠白色而四裂。

Santalum album L.

Buckleya Quadriala B. et H.

檀香科

羽子木（日）

羽子木。自生於山地。為半寄生之灌木。高五六尺。葉為長卵形而淡綠色。花單性。色與葉同。雌雄異株。果實為羽子狀（鍵子）其實供食用。

檀香科

檀香、白檀（漢）

檀香者。旃檀之一種。產於東印度及馬來隅半島。廣東雲南等處亦俱有之。為常綠樹。葉對生。呈長卵形。花無瓣而具四裂之萼。實為核果。

其木有強香氣。為薰物之料。或供藥用。或製為扇柄小匣等物。



Viscum album L.

Aristolochia debilis Sieb. Z.

槲寄生科

惟衣斯苦母、阿魯巴母、(拉)

此物寄生於朴樹、及他樹木、為常綠植物、莖為木質性、幼部呈綠色、葉長橢圓形而對生、花單性、雌雄異株、實帶白色、球形之漿果也、

為有害宿主植物、

馬兜鈴科

馬兜鈴(漢)

馬兜鈴者、山野自生、多年生之蔓草也、葉畧似薯蕷葉而厚、大端鈍、花單性、生於葉腋、有不整齊筒狀之紫綠色萼、

乾地下部、為清血藥、及通經藥、然內用過多、則消化器及泌尿器受強刺激、往往致死、



Asarum Blumei *Duch.*

Aristolochia Kaempferi *Willd.*

馬兜鈴科

大葉馬兜鈴（漢）

大葉馬兜鈴者自生於山地多年生之纏繞植物莖之下部為木質葉畧似薯蕷葉花類於馬兜鈴之花以帶黃色及大形而區別之其地下部之乾者效用與馬兜鈴同

馬兜鈴科

杜衡（漢）

杜衡常生山中陰地為多年生草有根狀莖葉為心臟形葉脚凹陷頗深有長柄花色暗紫具三裂之筒狀花被栽培之為觀賞用又根莖可入藥用於芳香劑



雙葉細辛（漢）二葉葵（曰）　馬兜鈴科

雙葉細辛者自生於山地多年生草也莖匍匐於地上每節生直立之短枝枝頂通常有二葉故有二葉葵之名葉全邊為心臟形花梗生於短枝頂著紫紅色之花鐘狀向下花柱結合為柱狀萼內面平滑

蓼　科

藍（漢）

藍為我國原產之一年生草栽培者多莖高二三尺葉呈橢圓形及廣卵形或狹卵形等而互生筒狀之托葉包莖花小形成穗有帶紅色之萼

葉可供染料即靛青也

Polygonum cuspidatum S. et Z.



Polygonum perfoliatum L.

杠板歸（漢）　蓼科

杠板歸自生於山野之蔓草也莖及葉柄生剛刺葉身稍呈三角形為楯狀而著於葉柄鞘狀托葉之緣部為葉狀花形小帶白色有八枚之雄蕊果實為小球形其堅如石

虎杖（漢）　蓼科

虎杖者自生於山野為多年生草高一二尺至四五尺葉為卵形而尖草身之基部往往成截形花序生於葉腋著多數之白色小花果實帶白色

幼莖供食用稍帶酸味虎杖之一種生淡紅色花及帶紅色之果實者稱明月草

Zanthoxylum schinnifolium S.et Z.

Polygonum Bistorta L.

馬蓼（漢）　蓼科

馬蓼者。自生於原野。為一年生之雜草。高一二尺。葉為長橢圓形而尖。鞘狀托葉之緣部。有長剛毛。初夏開花。為淡紅色。密生於花軸之上部。成穗狀。

拳參（漢）　蓼科

拳參。乃山地自生。多年生草。高一二尺。葉為廣披針形。下部之葉有長葉柄。花形小。淡紅白色。多數集生為穗狀。

根莖可為收斂藥。幼葉及莖供食用。又栽培之為觀賞用。

Polygonum nodosum *Pers.*

大馬蓼（漢） 蓼科

大馬蓼。為山野自生之雜草。高三四尺。葉呈披針形而互生。托葉變形為鞘狀。緣邊無毛。花形小。密生多數成穗狀。萼白色或帶紅色而四裂。

Polygonum orientale *L.* var. pilosum *Meisn.*

葒草（漢）葒蓼（中俗） 蓼科

葒草。或曰葒蓼。東印度原產之一年生草。高五六尺。莖葉密生淡紅色之毛。葉大而尖。呈卵形。具長柄。秋日開紅花。成穗狀。栽培之為觀賞用。煎其乾莖葉。亦可以治疝氣。

Rumex japonicus Meisn.



Polygonum japonicum Meisn.

羊蹄（漢）雞脚大黃　蓼科

羊蹄者。產於山野濕地。為越年生之雜草。高三四尺。葉互生。為長橢圓形或廣披針形。托葉成鞘狀。花小淡綠色。叢生於長花軸。內曾花被之成長者。包小形之堅果。其下面中央。生粒狀突起。

根搗汁。可治疥癬腫毒等症。

蠶繭草（漢）　蓼科

蠶繭草者。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉互生。為長披針形。有鞘狀之托葉。花色白或帶紅色。稍為穗狀。其花為蓼類中之最大而美麗者。

Fagopyrum esculentum *Moench*.

Rumex acetosa *L.*

酸模（漢）　蓼科

酸模者。自生於山野。多年生草。高達二尺餘。莖葉帶赤色。有酸味。葉為長卵形而尖。基部稍為箭形。花形小。淡綠色而畧帶赤。幼莖葉可供食用

蕎麥（漢）　蓼科

蕎麥者。為中央亞細亞及東印度原產之一年生草。我國北方產生尤多。高二三尺。葉互生。為三角狀之心臟形。有長柄。花小而白。排列成圓錐花序。實為三稜形乾果。其子可磨麵作餅。北人以之供常食。幼時莖葉亦供食用



Rheum officinale *Baill.*

Polygonum Thunbergii *S. et Z.*

蓼　科

大黃（漢）

大黃。為我國原產之多年生草。高四五尺。葉互生。為大形。淺裂呈掌狀。有長柄。花淡黃色。而形小。排列成大形之花序。根入藥。為瀉洩及健胃之劑。以四川所產紫地錦紋者為最良。每歲輸出歐洲各國頗多。

蓼　科

溝蕎麥（日）

溝蕎麥。自生於淺水或濕地。為雜草。高達二三尺。葉互生。為戟形。有鞘狀之托葉。花白色。通常帶紅色。簇生數個。

Polygonum virginianum L.

Chenopodium album L.

蓼科

金線草（漢）

金線草者。山野自生之多年生草。高二尺餘。葉呈大橢圓形或卵形。而互生。具鞘狀托葉。花小形。淡紅色或白色。排列為長穗狀花序。

栽培之為觀賞用。

藜科

藜（漢）灰菜（俗）

藜者。平地自生之一年生草也。高達五六尺。葉心色赤。呈卵形。有缺刻及鋸齒。葉面具粉狀之小體。花形小。黃綠色。

葉嫩時可供食用。莖老可作杖。古讀書燃藜。又以其光最明。可傳火徹夜。

Salsola Soda L.

撒而索拉曹達(拉)　藜科

撒而索拉曹達者乃自生於海邊之一年生草高達一尺餘葉細長為肉質而尖且互生花小形有淡黃綠色之萼幼莖及葉可供食用昔時以其灰製曹達

Beta vulgaris L.
var. Rapa Dort.

砂糖大根(日)　藜科

砂糖大根者俗謂之糖蘿蔔地中海沿岸原產之越年生草高二三尺葉為卵形而平滑花形小黃綠色集生於穗狀花序有地下莖如蘿蔔為肉質之紡錘形根具甜液可製砂糖

Beta vulgaris *L.*

菾菜（漢）不斷草（日）唐苣（日）　藜科

菾菜。一名莙達。為歐洲南部原產之越年生草。我國園圃多栽植之。高三尺餘。葉互生。厚而有光。為長卵形。色青白。花小。黃綠色。排列成穗狀花序。

葉可為蔬。供食用。

Spinacea oleracea *Mill.*

菠薐菜（漢）　藜科

菠薐菜。亦曰菠菜。多栽培而生。為一年生草。或越年生草。原係西域頗陵國產。唐時其種始入中國。高約二尺。葉互生。為三角狀之卵形而尖。基部又旁出兩尖。花小而黃綠色。單性也。雌雄異株。根色赤。味甜。

葉供食用。嫩時以之為常蔬。

Kochia scoparia *Schrad.*

Amaranthus Blitum *L.*

地膚（漢）帚木（日）掃帚（中俗）藜　科

地膚者。栽培於園圃。為一年生草。高四五尺。葉互生。為狹披針形或線形而尖。花小。帶綠色。生於葉腋。子甚繁。嫩苗及幼果實可供食用。果入藥。稱地膚子。又乾其莖枝可作帚。

犬莧（日）　莧　科

犬莧者。自生於田園之一年生草。高約一尺。葉為卵形而互生。葉端往往成凹形。花綠色。單性。形甚小。雌雄同株。幼葉可供食用。

Achyranthes bidentata Bl. var. japonica Miq.

牛膝（漢）　莧科

牛膝都自生於原野。為多年生雜草。高達三四尺。莖方形。而有膨大之節。葉長卵形或橢圓形。全邊而尖。對生也。花綠色。形小。生於莖之上部。為穗狀花序。實有小刺。常黏著人衣。

根入藥。為收斂及利尿用之劑。

Celosia cristata L.

雞冠（漢）　莧科

雞冠都東印度原產之一年生草。今隨處生之。高二三尺。莖赤。葉互生。為廣披針形。花小。有紅黃白數種。花序如雞冠狀。故名。子黑細光滑。

栽培之為觀賞用。又幼葉可供食用。



Gomphrena globosa L.

千日紅(漢)千日草(日)　莧　科

千日紅者為東印度原產之一年生草高一二尺莖似海棠葉對生為長橢圓形秋初開花色紅紫或白排列為球形之頭狀花序頗美麗經久不凋故有此名

栽培之為觀賞用

Amaranthus gangeticus L.

雁來紅(漢)葉雞頭(日)　莧　科

雁來紅俗名老少年一年生之草本植物庭園多栽植之高二尺餘葉為長橢圓形兩端尖以長葉柄而互生生長亢足呈美色類於雞冠有黃紅等色之斑並有全紅全紫者花小單性集生於葉腋

觀賞用之植物也

Mirabilis Jalapa L.

紫茉莉(漢)白粉花夜繁花(日)紫茉莉科

紫茉莉者。西印度原產之多年生草。莖高二三尺。有節。葉卵形或心臟形而尖。全邊有網狀脈。以長葉柄而對生。花為漏斗狀。有五個白色紅色或黃色等之美麗。萼無花冠。種子有白粉狀之胚乳。

栽培之為觀賞用

Phytolacca acinosa Roxb.
var. esculenta Maxim.

商陸(漢)山牛蒡(日)　商陸科

商陸者。自生於山野。為多年生草。莖高四五尺。葉互生。如卵形而大。花小而色白。夏月始開。排列成總狀花序。實為赤黑色之肉果。

葉嫩時可食。根可作藥。性有毒。



Tetragonia expansa *Ait.*



Portulaca oleracea *L.*

蕃杏科

蕃杏（漢）

蕃杏者。自生於海濱。又栽培於園圃。草本也。莖蔓延於地上。葉互生。為三角狀之卵形。花小而色黃。生於葉腋。葉及幼莖。可供食用。

馬齒莧科

馬齒莧（漢）漿板草（中俗）　馬齒莧。自生於園圃。為多汁肉質之一年生草。莖帶赤色。平卧於地上。葉為倒卵形。其質厚而柔軟。花形小。有黃色之五花瓣。莖葉嫩時。可煮曝為蔬。

馬齒莧科

松葉牡丹（日）

松葉牡丹為南亞美利加原產之一年生草。高四五寸。莖葉俱為肉質。葉互生。呈線形而厚。其基部有毛。花有紫紅黃白色等之瓣。甚美麗。

栽培之為觀賞用。

石竹科

亞美利加瞿麥（日）

亞美利加瞿麥。原產於歐洲之多年生草也。多栽培於北美。日本之庭園亦栽植之。葉為廣披針形。而對生。花酷似石竹。而形小。多數集生。花冠有淡紅深紅或白色數種。

觀賞用之植物也。

Stellaria aquatica Scop.

Dianthus superbus L.

牛繁縷（日）　石竹科

牛繁縷。自生於山野。為雜草。莖高一二尺。葉卵形。下部有葉柄。上部則無。花形小。而有白色之五花瓣及五花柱。

效用畧同於繁縷

瞿麥（漢）　石竹科

瞿麥。亦作蘧麥。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉細長而尖。對生。花通常每二朶集生。萼筒狀。下苞如鱗片。花瓣五。色淡紅或白。上部深裂為絲狀。

栽培之為觀賞用。穗及葉可作藥。

Dianthus chinensis L.

Lychnis coronata Thunb.

石竹（漢）　石竹科

石竹者原產於我國之多年生草。高一二尺。葉細長而尖。對生。花有深紅淡紅白色單瓣重瓣等數種。形狀與瞿麥花相似惟花瓣上部有淺分裂而異之。又花下之苞比瞿麥更長而尖。

栽培之為觀賞用

剪夏羅（漢）　石竹科

剪夏羅。栽培於庭園。為多年生草。高二三尺。葉卵形或廣披針形而對生。花生於莖之頂端及葉腋。形大而美麗。花瓣五。色黃赤或白。緣邊有鋸齒

栽培之為觀賞用

Saponaria officinalis *L.*

Vaccaria vulgaris *Host.*

石竹科

石鹼草（日）

石鹼草者歐洲原產之多年生草高約二尺葉卵形或披針形有三或五條之大脈花瓣有淡紅或白色之別形狀畧似蟲捕撫子之花

栽培之為觀賞用浸出其莖及葉之汁液類似石鹼水故有此名

石竹科

王不留行（漢道灌草）（日）

王不留行者歐洲原產之一年生草或越年生草高一二尺葉對生為披針形淡綠色花瓣五淡紅色萼具五稜排列為聚繖花序結實如豆大內包細子如菘

栽培之為觀賞用苗子可入藥



Sagina Linnaei *Presl.*
var. maxima *Maxim.*

漆姑草（漢）　石竹科

漆姑草。山野自生之雜草。莖高二三寸。有節。葉對生。為狹披針形。花小而白。每朵有橢圓形之五花瓣。具長花梗。



Stellaria media *Vill.*

繁縷鵞腸（漢）　石竹科

繁縷者。山野自生之一年生草或越年生草。蔓延於地上。莖細長。有向下之毛列於節間。葉呈卵形而對生。花為小形白色。有深二裂之五花瓣。具三花柱。

此植物為有名之春草。莖葉為小鳥之飼料。

Silene Armeria *L.*



Victoria regia *Lin R*

蟲捕撫子（日）　石竹科

蟲捕撫子。歐洲原產之一年生草。高二三尺。莖有節。節下分泌粘液。防止小蟲昇於花部。葉對生。為長卵形。淡綠色而平滑。花小而有紅紫或白色之瓣。排列成聚繖花序。

栽培之為觀賞用。

大鬼蓮（日）　睡蓮科

大鬼蓮者。產於南美阿瑪曾河。為水草。全部有刺。畧類於芡實。葉圓形。直徑達二尺以上。緣邊向上方圈曲。畧作盆狀。而浮於水面。花酷似芡實之花。

此植物以形態之珍奇。各地植物園多培養之。



Euriale ferox Salisb.

芡實（漢）　睡蓮科

芡實為水草。亦果類植物也。花莖及葉有刺。葉大而圓。浮於水面。面青背紫。莖伸出於水上。頂端開花。結實如栗毬。種子及根。可供食用。



Nuphar japonicum DC.

萍蓬草（漢）　睡蓮科

萍蓬草。自生於池沼河流等處。為多年生草。葉分二種。生於水中者。形大而薄。伸出於水上者。為箭形而厚。花莖挺生水上。頂著一花。黃色。

栽培之為觀賞用。

Brasenia purpurea Casp.



Nelumbo nucifera Gaertn.

睡蓮科

蓴（漢）

蓴生於池沼。為多年生草。江浙湖澤中恒產生之。幼時莖葉皆有粘液被之。葉為楯圓形楯狀。有長柄。花生於葉腋。紫紅色。幼葉可為羹。味甚美。

睡蓮科

蓮（漢）荷花（中俗）

蓮者。熱帶亞細亞原產之多年生草。生淺水中。地下莖肥大而長。有節。呈多數縱行管狀之空隙。葉圓。下面中央著長柄。花大而美麗。有紅白二色。果實分房排列於倒圓錐形之大花托內。

根曰藕。實曰蓮子。同供食用。通稱曰荷花。為觀賞用。



Nymphaea tetragona *Georg.*
var. angustata *Casp.*

睡蓮科

睡蓮（漢）

睡蓮者。生於水中。為多年生草。葉貼水面。為橢圓狀之心臟形。花白色。具多數之瓣。開於午後二時。即未時之頃。故有未草之名。

栽培之為觀賞用。



Ceratophyllum demersum *L.*

金魚藻科

金魚藻（日）

金魚藻。產於淡水中。為多年生草。有輪生葉。葉分裂為二或三之叉狀。其裂片細長而尖。有小鋸齒。花小單性。生於葉腋。

飼養金魚之器中。多安置此草。

Cercidiphyllum japonicum S. et Z.



Trochodendron aralioides S. et Z.

開阿塞敵肥路姆加波尼苦姆(拉)

雲葉科

此植物自生於山地。為落葉之喬木。高四丈餘。分雌株及雄株。葉為心臟形。或橢圓形。有鈍鋸齒。花開於出葉之先。形小而色紅。果裂即散為種子。

木淡褐色而柔軟。易施工作。故建築及器具。多取用之。

山車(日)

雲葉科

山車者。自生於山地。為常綠樹。高十尺餘。葉橢圓而尖。有鋸齒。具長柄。花小而帶綠色。排列成總狀花序。結實為乾果。

樹皮製鳥黐。及彈性護謨。

Thalictrum minus L.
var. ebtum Lecoy.

塔利苦陶盧木米奴司愛拉脫姆(拉)

毛茛科

此植物山野自生之多年生草也葉為複葉由多數小葉而成八九月時開花有小形之萼片多數之黃綠色長雄蕊及數个之無柄子房

栽培之為觀賞植物



Anemone nikoensis Maxim.

一輪草(日)

毛茛科

一輪草者山野自生之多年生草也高六七寸莖間輪生細裂之三葉由中央部挺出花梗著生一花花色白而畧帶紅其上有五花被

栽培之供觀賞用



Caltha palustris L. var. sibirica Rgl.

Anemone vernus Thunb.

猿猴草（日）

毛茛科

猿猴草自生於山中之濕地多年生草也葉呈短心臟形有長柄簇生數枚花軸多伏卧於地上端生二三朵花花黃色

栽培之為觀賞用

白頭翁（漢）

毛茛科

白頭翁者山野自生多年生草全部密生白毛高約尺許葉為羽狀複葉簇生於地下莖由其中部伸出花莖頂上著花內面呈紫黑色之美麗萼片

有刺激性毒分用之過量則致死用之適量則治氣管之病有效

Clematis patens Morr. et Decn.

轉子蓮（漢）　毛茛科

轉子蓮者。栽植於庭園。多年生之蔓生植物。莖之下部為木質。葉對生。為複葉。由三小葉而成。其柄能卷絡他物。花大而美麗。有六个以上長橢圓形青或白之萼。有毒。僅足供觀賞用。

Ranunculus pensylvanicus L. f. var japonicus Maxim.

回回蒜（漢）　毛茛科

回回蒜。生於水邊及道旁濕地。為有毛之越年生草。高二三尺。葉為複葉。由三小葉而成。春開黃花五瓣。至秋始謝。花瓣內根部有小鱗片。實為多數小乾果。為有毒植物。其汁液苛烈。有強刺激性。

Thalictrum aquilegifolium L.

Ranunculus acer L.
var. japonicus Maxim.

唐松草（日）　毛茛科

唐松草。自生於山野。為多年生草。高四五尺。葉為複葉。由多數之小葉而成。花白色。有多數雄蕊。為頂平花序。實為乾果。有柄及三稜。

有毒性。栽培之供觀賞用。

毛茛（漢）　毛茛科

毛茛者。自生於山野低濕之地。為有毛之多年生草。高二三尺。葉為單葉。分裂成掌狀。春暮開花。黃色五瓣。甚光艷。實由多數小乾果而成。

為有毒植物。有苛烈刺激性之汁液。

Clematis heracleifolia DC.



Trollius patulus Salisb.

梯老里吳司爬足盧司（拉）毛茛科

產於山地。為多年生草。高二三尺。葉深裂為五。呈掌狀而厚。且有光澤。緣邊有細齒。花單生於莖及枝之頂端。色黃。有五乃至七之萼片。花瓣數多。細長而小。短於雄蕊。

栽培之為觀賞用。

草牡丹（日）　毛茛科

草牡丹者。山地自生。多年生草。高二三尺。葉為複葉。成於三小葉。對生。花具青長萼。萼片上部向外反卷。雌蕊數多而密生毛。實為長鞭狀嘴之小乾果。果熟則毛易為風吹散。

有毒植物。



Copitis quinquefolia *Miq.*

五加葉黃蓮。梅花黃蓮(日)　毛茛科

此植物自生於山地。多年生之小草。莖匍匐於地中。葉為掌狀複葉。有五小葉。形似五加葉。故有五加葉黃蓮之名。由葉叢間出花軸著花。花有白色瓣五。形稍似於梅花。故又名為梅花黃蓮。

採其根狀莖。供於藥用。



Anemone japonica *S.et Z.*

秋牡丹(漢)　毛茛科

秋牡丹者。自生於山野。多年生草。高二三尺。葉為複葉。由三小葉而成。花淡紅色。有多數之細花被。外形類似於菊。

栽培之為觀賞用。



Cimicifuga foetida L.
var. simplex Hoth.

Paeonia albiflora Pall.

芍藥（漢）　毛茛科

芍藥者。栽培於庭園。為多年生草。高三四尺。葉為複葉。小葉往往有極深三裂。初夏開花。大而美麗。有紅白紫數種之色。根亦有赤白二色。

觀賞及藥用。治腹痛腰痛等症有效。

充米充夫吳格肥題達塞木波來苦司（拉）　毛茛科

此物自生於山地。為多年生草。高三四尺。葉為重複葉。而小葉有鋸齒。花白色。有多數雄蕊。排列為總狀花序。

有毒之植物也。只可栽培之為觀賞用。



Eranthis pinnatifida maxim.



Anemone Hepatica L.

獐耳細辛（漢）　毛茛科

獐耳細辛都自生於山地。多年生草。高三四寸。葉三裂為掌狀。有長葉柄而叢生。花莖生於葉叢之間。頂著一花。下有萼狀之總苞。花有紅紫白等色之美麗花被。栽培之為觀賞用。

菟葵（漢）　毛茛科

菟葵都生於山地。多年生草。莖高二寸餘。色紫。葉深裂為掌狀。有長葉柄。花白。單生於莖頂。結三四个之骨葵。

按骨葵為植物學名詞。離生雌蕊發育而成之果實也。狀畧如莢。熟則一邊縱裂。

Clematis paniculata *Thunb.*

大蓼（漢）　毛茛科

大蓼者。自生於山野。多年生木質性之蔓生植物也。葉對生。為羽狀複葉。由卵形或心臟形之小葉而成。以葉柄卷絡於他物。花有四被。白色。排列為聚繖花序。有毒之植物。

Ranunculus scelerratus *L.*

石龍芮（漢）　毛茛科

石龍芮。自生於水邊或淺水。一年生或越年生草。莖二三尺。綠色多肉。中空。葉互生。下部分裂呈掌狀。有光澤。花小。直徑三四分。五瓣色黃。雄蕊離生。雌蕊密生於膨大花托上。實為多數之小乾果。狀類初生桑椹。入藥。有毒。可為觀賞用。

Clematis florida Thunb.

鐵線蓮（漢）　毛茛科

鐵線蓮者。栽培於庭園。多年生之蔓生植物。以葉柄卷絡於他物。葉為複葉。通常由九小葉而成。花大。其花被有青紫色或白色之異。有毒。觀賞用。

Aconitum Fischeri Reich.

烏頭附子（漢）　毛茛科

烏頭者。自生於山野。多年生草。高二三尺。地下有多肉之根。葉互生。分裂為掌狀。有光澤。花青紫或白色。有兜狀不整齊之萼。栽培之為觀賞用。入藥。有猛毒。可用為麻醉劑。

Clematis paniculata Thunb.

Ranunculus sceleratus L.

大蓼（漢）　毛茛科

大蓼者。自生於山野。多年生木質性之蔓生植物也。葉對生。為羽狀複葉。由卵形或心臟形之小葉而成。以葉柄卷絡於他物。花有四被。白色。排列為聚繖花序。有毒之植物。

石龍芮（漢）　毛茛科

石龍芮。自生於水邊或淺水。一年生或越年生草。莖二三尺。綠色多肉。中空。葉互生。下部分裂呈掌狀。有光澤。花小。直徑三四分。五瓣。色黃。雄蕊離生。雌蕊密生於膨大花托上。實為多數之小乾果。狀類初生桑椹。入藥。有毒。可為觀賞用。

Clematis florida Thunb.

鐵線蓮（漢）　毛茛科

鐵線蓮者。栽培於庭園。多年生之蔓生植物。以葉柄卷絡於他物。葉為複葉。通常由九小葉而成。花大。其花被有青紫色或白色之異。

有毒。觀賞用。

Aconitum Fischeri Reich.

烏頭附子（漢）　毛茛科

烏頭者。自生於山野。多年生草。高二三尺。地下有多肉之根。葉互生。分裂為掌狀。有光澤。花青紫或白色。有兜狀不整齊之萼。

栽培之為觀賞用。入藥。有猛毒。可用為麻醉劑。



Adonis davurica *Ledeb.*



Glaucidium palmatum *S. et Z.*

毛茛科

白根葵（日）

白根葵者。產於深山中。多年生草。高二尺餘。葉互生。分裂成掌狀。花大。具青紫色四萼片。美麗可觀。莖有刺。為觀賞用。

側金箋花（漢）福壽草、元日草（日）毛茛科

側金箋花者。山地自生。多年生草。莖高尺餘。葉為複葉。畧似水芹之葉。花大而黃。有多數花瓣。為觀賞用。

Paeonia Moutan *Ait.*

牡丹（漢）富貴花（中俗）　毛茛科

牡丹者。為我國原產之落葉灌木。高二三尺。葉互生。為重複葉。分裂甚深。花大徑三四寸。有重瓣單瓣之別。色有紅白紫等數種。最美麗。雌蕊周圍具囊狀盤。觀賞用。根可入藥。花瓣供食用。



Anemone flaccida *Fr. Schm.*

二輪草（日）　毛茛科

二輪草。自生於山野。多年生草。高四五寸。葉深裂為掌狀。有長葉柄。花莖生於葉叢之間。通常著二花。花具白萼片。有長梗。有毒植物。

Aquilegia flabellata S. et Z.

耬斗菜（漢）　毛茛科

耬斗菜。自生於深山。多年生草。高七八寸。葉互生。為複葉。由三小葉而成。小葉分裂成掌狀。花青紫或白。各瓣有向內方曲之長距。

觀賞用

Coptis japonica Makino.

黃蓮（漢）　毛茛科

黃蓮者。自生於山地。多年生草。我國四川雅州產者最良。高自三四寸至一尺餘。葉為複葉。由少數或多數之小葉而成。由多數小葉而成者。畧似水芹葉。花小而白。生於莖之上部。結實子色黃。

根為藥用。有健胃之效。又可為黃染料。



毛茛科

牡丹蔓（日）

牡丹蔓者。山野自生。多年生之蔓草。葉細長。以葉柄而卷絡。由三小葉而成。為複葉長柄對生。花有白萼無瓣。實為閉果。密生長毛。

有毒之植物也。

木通科

通草（漢）

通草。自生於山野。為蔓狀木質植物。葉互生。由五六小葉而成。各呈橢圓形。雄花雌花同生於一軸。雄花有淡紫色之花被。雌花比雄花略大。有暗紫色之花被。果實長三四寸。熟則一方縱裂。現白瓤。白瓤甘美。供食用。果皮入藥。種子榨油可點燈。其蔓通於編籃。



Akebia lobata Decne.

三葉通草　木通科

三葉通草者。山野自生。蔓生植物。類於通草。惟三小葉為異。各小葉之緣邊有鈍鋸齒。花軸通常著數雄花及一雌花。雌雄花雖皆有暗紫色花被。然雌花之花被最大。果實為長橢圓形。有厚皮。熟則裂開現白瓤。

效用與通草同。

Stauntonia hexaphylla Decne.

野木瓜（漢）　木通科

野木瓜者。自生於山野。蔓狀木質之常綠植物也。葉由三或五或七之小葉而成。故有七五三葉之稱。小葉為橢圓形。質厚有光。花單性。雌雄同株。雄花雌花同形同大。色白。具三片大萼及白色細長之三花瓣。果實卵形。暗紫色。

果實供食用。其味甘。



Epimedium macranthum Morr. et Decne.

Diphylleia Grayi Fr. Schm.

淫羊藿（漢）

小蘖科

淫羊藿者。自生於山野。多年生草。高達一二尺。葉為二回掌狀複葉。由九小葉而成。小葉為長心臟形。中肋之左右不等形也。花紫色或白色。狀如鍬。

栽培之供觀賞用。昔時為強壯劑。

山荷葉（漢）

小蘖科

山荷葉者。深山自生。多年生草。高二三尺。一株著二葉。葉大而扁圓。二裂。花白色。數朶集生。果實為小橢圓形。黑果也。



Hydrastis canadensis L.

Nandina domestica Thunb.

南天竹 漢南天(日) 小蘗科

南天竹者產於日本南部我國庭園亦多植之常綠灌木也葉互生為羽狀複葉花軸生於幹之上部花五瓣小而色白實呈球形赤而美麗變種甚多有紅花白果或黃果及小葉彎曲圓形或掌狀等

莖葉甚雅秋冬綴赤果尤美為觀賞用幹之大者可作床柱及小器具

黑德拉斯題斯(拉) 小蘗科

北美原產之多年生草高約一尺葉為掌狀五裂乃至七裂花無瓣有綠萼片三實呈紅色似懸鈎子之果

根狀莖及根之越幾斯為胃及子宮之止血藥

Berberis nepalensis Spring

十大功勞（漢）　小蘖科

十大功勞者。多栽植於園圃。爲常綠灌木。高四五尺。葉爲奇數羽狀複葉。革質無柄。緣邊有針狀鋸齒。幹頂葉叢間生數花軸。著黃花。結小果爲卵形。長三分許。熟則呈紫黑色。供觀賞用。子可入藥。

Podophyllum peltatum L.

剝度比爾謨（拉）　小蘖科

北美自生。多年生草。根莖長。葉稍呈傘狀。有七至九裂。葉柄如楯狀而長。花瓣白色。實爲漿果。由根莖取樹脂。即剝度比爾謨脂。用於瀉下藥。

Berberis Thunbergii *DC.*

小蘖科

小蘖（漢）目木（日）

小蘖者。山野自生。落葉灌木。高五六尺。葉小。數個叢生。葉緣無凸凹。各葉叢下。具由葉變成之一針。花軸從新葉間而生。垂黃花。雄花觸他物則起運動。果實赤色。為橢圓形。

陰乾枝葉而煎之。為洗眼藥。故有目木之名。又山民剝其枝。為黃色之染料。

Cocculus Thunbergii *DC.*

防己科

木防己（漢）

木防己。自生於山野。為纏繞植物。莖色綠而細小。葉呈心臟形而互生。花色淡綠。形小。單性。雌雄異株。根外白內黃。出漢中者。內有黑紋如車輻解。

莖可造籃及葛籠等。子可入藥。



Jatrorrhiza palmata Miers.

Michelia compressa Maxim.

防己科

古倫僕（日）

古倫僕者。產於非洲東部。多年生之蔓草。以細莖纏繞於他物。葉分裂呈掌狀互生。花為小形單性。雌雄異株。

根稱古倫僕根入藥。則用為健胃劑及止瀉劑。

木蘭科

廣心樹黃心樹（漢）

廣心樹者。暖地自生。為常綠樹。高六十尺。葉呈長橢圓形。全邊而厚。花白而畧帶紅色。似木蘭花而形較小。

栽培之為觀賞用。材可供建築及器具用。

Magnolia Kobus DC.

Kadsura japonica Dun.

木蘭科

辛夷（漢）

辛夷。自生於山野。為落葉喬木。高二三丈。葉互生。為倒卵形而尖。花初出時。銳如筆。故又謂之木筆。及既開則形大如蓮。色白。通常具六花瓣。

材供器具及建築之用。又栽培之為觀賞植物。

南五味子（漢）

南五味子。自生於山野。為木質常綠之蔓生植物。含多量粘液。葉為長卵形而厚。有光澤。花帶白色。生於葉腋。果實由小球集合而成。

栽培之為觀賞用。又莖之粘液。足供製紙之糊料。或以之塗髮。

Illicium anisatum L.



Magnolia obovata Thunb.

木蘭科

莽草（漢）櫟

莽草者。暖地自生。為常綠樹。高丈餘。葉呈橢圓形。有透明之細點。互生。花開於葉腋。有黃白色及細長花瓣。實為乾果。相集而成輪狀。

枝用於佛前。乾葉製抹香。材為車類之細工料。果含猛毒。

木蘭科

木蘭木蓮（漢）

木蘭者。栽培於庭園。為落葉樹。高丈餘。葉大。互生。呈倒卵形。有三道縱文。花大且長。內白外紫。開於出葉之先。為觀賞用。又可入藥。



Magnolia conspicua Salisb.



Magnolia hypoleuca S. et Z.

玉蘭（漢）白木蓮（日）　木蘭科

玉蘭者。我國原產之落葉樹。高二丈餘。惟不易成長。葉與花瓣為倒卵形。葉全邊而互生。花九瓣。大而厚。色白有香氣。未開時裹以厚苞。密生細毛。花落後始生嫩葉。觀賞用。又可為藥料。

厚朴（漢）　木蘭科

厚朴者。山地自生。落葉喬木。高四五丈。葉互生而大。為長倒卵形。初夏開花甚大。色淡黃。氣芬烈。皮厚色紫。材製印版器具。作炭者可用於磨物。皮與花皆入藥。

Calycanthus praecox L.

Anona squamosa L.

臘梅科

臘梅（漢）

臘梅。栽培於庭園。為落葉灌木。高丈餘。葉對生。為卵形而尖。全邊也。花有香氣。其花被成於多數之片。內層帶紫色而短。外圍呈黃色。

有毒。為觀賞用。

蕃荔枝科

蕃荔枝（漢）

蕃荔枝。產於南美之常綠樹。今閩粵亦多有之。高二丈餘。葉平滑。為披針形。有多數之透明小點。果實由多數雌蕊集合體而生。色白。味甘多汁。

果品中之最珍貴者。



Myristica fragrans Houtt.

肉豆蔻科

肉豆蔻（漢）

肉豆蔻毛拉卡原產之常綠樹東西印度孚拉日魯好望角等處皆栽此物嶺南人家亦種之高三尺葉橢圓形而尖花單性實為肉果果內有紅假種皮及堅種殼殼內有仁假種皮及仁有香味供食用又為消化及驅風藥

Laudera praecox H.

樟科

林侍拉潑來考苦（拉）

此植物山野自生之落葉樹也畧似鈎樟而有香氣高約二丈葉全邊為卵形或橢圓形而尖花小而黃於未生葉時先開果實為球形帶黃色

材供器具及薪料果實榨出之油可供燃燈之用

Machilus Thunbergii Sieb. & Z.

Cinnamomum Camphora Nees.

樟科

犬樟（日）

犬樟都自生於暖地。為常綠樹。高約四丈。葉為長橢圓形而厚。其裡面有細網脉。花黃綠色。果實球形。紫黑色。材為器具木版等料。樹皮為褐色染料。種子可榨油。又庭園栽此物。亦足供觀賞。

樟科

樟（漢）

樟產於黔蜀閩廣等處。為常綠喬木。高五六丈。大者十圍。葉互生。卵形而尖。有葉脉三條。花小。黃白色。果實黑球形。大如豌豆。全部有樟腦香氣。其材聳直。肌理甚細。以之製樟腦。可為防腐興奮之劑。材供建築及器具用。



Cinnamomum Cassia Bl.

Lindera sericea Bl.

鈎樟（漢）黑文子（日）　樟科

鈎樟者。山地自生。落葉灌木。皮外有黑斑紋。高約一丈。葉互生。為長橢圓形。緣邊有毛。花小色黃。集為繖形。

桂皮桂（漢）　樟科

桂皮者。產於我國嶺南及東印度。為常綠喬木。有芳香。高約四五丈。葉為廣披針形。有三條大脈。花小色黃。樹名曰桂。其樹皮即稱為桂皮。

桂皮用為健胃藥、矯臭藥、及矯味藥。

Laurus nobilis L.



Sassafras officinale Nees.

月桂樹老利兒（日）　樟科

月桂樹者歐洲南部原產之常綠樹有芳香高一丈五尺葉廣披針形或長橢圓形質厚而互生花小色黃集生於短花軸上實為黑褐球形之核果畧大於豌豆種子葉稱老利兒為矯臭藥果實外用於僂麻質斯腫物及疥癬等裁之為觀賞用

薩沙富拉斯（拉）　樟科

薩沙富拉斯為北美原產之落葉樹高二三尺葉為卵形或倒卵形往往三列花色淡黃雄花有九雄蕊雌花有不完全之雄蕊六及雌蕊一根稱為薩沙富拉斯木用為發汗藥及利尿藥

Cinnamomum Loureiri Nees.

Litsea glauca Sieb.

里島塞阿孤拉吳卡（拉）樟科

此物生於日本暖地為常綠樹高約四丈葉為長卵形而尖下面密生白色細毛花為小形黃白色集生於葉腋果實色赤球形也

材為器具及薪炭之料果實榨油可供燃燈之用

肉桂（漢）樟科

肉桂都古稱牡桂亦名菌桂產於廣西及安南等處為常綠喬木高達數丈葉互生長橢圓形而尖質厚有光花小淡黃色排列為聚繖花序皮多脂氣味辛烈

根及皮供藥用為強壯劑及矯臭矯味之藥



Chelidonium Majus L.

白屈菜（漢）　罌粟科

白屈菜。生於山野。為多年生草。高二三尺。有黃色之汁液。葉為羽狀複葉。互生。花排列為繖形花序。有黃色之四花瓣。果實為角狀乾果而裂開。

有毒植物。地下部可用為胃癌之藥。



Papaver somniferum L.

罌子粟（漢）　罌粟科

罌子粟。為歐洲南部原產之越年生草。高達四五尺。葉為長橢圓形。或長卵形。有缺刻。或鋸齒。平滑無葉柄。花大而甚美麗。有二萼片四花瓣。及多數之雄蕊。與壺狀之雌蕊。實即壺狀之乾果也。

果實內有米如粟。及外皮。俱供藥用。

Macleya cordata R. Br.

Dicentra pusilla S.et Z.

駒草（日）　罌粟科

駒草生於高山。為多年生草。高三四寸。葉細裂為複葉。有長柄。花莖生於葉叢中央。莖之頂端開一朵或少數之花。花色紫紅。具巾著狀花冠。（巾著者日人盛錢之囊也）供觀賞用。

博落迴（漢）　罌粟科

博落迴者。自生於山野。為多年生草。含黃色汁液。高五六尺。葉大卵形。有缺刻。長柄互生。花小而白。排列為圓錐花序。有毒。莖葉煎汁。可驅除害蟲。又與竹同煮。能變竹為柔軟性。

Papaver Rhoeas L.

Corydalis incisa Pers.

麗春花（漢）　罌粟科

麗春花。歐洲原產之一年生或越年生草。今江浙俱有之。金陵更佳。高一二尺。莖葉有毛。葉互生為羽狀。花開時有脫落之萼。及紅紫白色等美麗花瓣。果實為壺狀之裂果。

草花中之妙品。最適於觀賞用。

紫堇（漢）　罌粟科

紫堇者。自生於山野。為雜草。高一二尺。葉互生。為重複葉。畧似水芹葉。故一名為旱芹。花排列為總狀花序。有紫紅色不整齊之花瓣。內一瓣生有距。

堇葉味苦。瀹之則甘而滑。可充蔬食。

Crataeva religiosa *Forst.*

魚木（日）　白花菜科

魚木。產於琉球諸島之灌木也。葉合三小葉而成。為複葉。有光澤。花白。果實橢圓形而尖。

栽於日本內地。為觀賞用。琉球以此果實為釣魚之餌。魚木之名所由起也。

Brassica campestris *L.*

蕓薹（漢）油菜（中俗）　十字花科

蕓薹。蔬菜植物。隨處有之。亦二年生雜草也。莖多肉。高三四尺。葉大。濃綠色。無柄。葉脚圍莖。花色黃。為總狀花序。萼片及花瓣各四。雄蕊六。四長二短。果實為長角狀。熟則綻裂子出。

嫩葉供食用。子可榨油。謂之菜油。可食。並燃燈及工業用。又油粕可肥田。

蓴菜（漢）　十字花科

蓴菜。多生於田野庭園等處。為雜草。高二三寸。或一二尺。葉為長橢圓形。具不整齊之缺刻及鋸齒。花黃而小。有四花瓣與四強雄蕊。果實為細長之乾果。熟則裂開。莖葉有辛味。可供食用。

葶藶（漢）　十字花科

葶藶者。原野自生。二年生草。高七八寸。葉及莖有細毛。葉為長卵形。無柄。互生。花微黃而小。排列為總狀花序。實橢圓為乾果。子扁小如黍粒。熟則裂開。可供藥用。



Nasturtium officinale L. Br.

水石龍芮（日）　十字花科

水石龍芮者。歐洲原產之多年生草。生於淺水。高一二尺。葉平滑。為奇數羽狀複葉。由卵形或橢圓形長橢圓形之小葉而成。花白。生線形之長角。

幼葉及莖有辛味。可供食用。



Brassica campestris L.

蕪菁（漢）　十字花科

蕪菁。蔬菜植物。亦一年生草。或越年生草也。根多肉。有扁圓者。有長形者。俗名大頭菜。葉大。畧成莖狀。無大缺刻。花黃。為總狀花序。絕類蕓薹花。果實成長角。

根及嫩葉供食用。





芥（漢）芥末（中俗）　十字花科

芥多栽培於田野及園圃。一年生或越年生草。實蔬類植物也。高三四尺。葉似蕓薹而有銳缺。刻葉面常皺縮粗糙。花小而黃。為總狀花序。結實成莢。

莖葉可食。並宜作虀。子研粉即芥末。味辛烈。可佐饌。并為藥用。

遏藍菜（漢）　十字花科

遏藍菜。自生於平野。為一年生草。高一尺餘。葉長橢圓形。或披針形。上部之葉無柄。花小色白。排列為總狀花序。果實類於團扇之形。



Cochlearia armoracia L.

西洋山葵（日）　十字花科

西洋山葵。為多年生草。栽培於諸國。葉長橢圓形而大。根圓柱狀。長入於地中。花為小形。具白花瓣。

根有一種芳香及辛味。可供香辛料。英國以之為藥用。內用則有利尿興奮等效。外用則有引赤發泡之效也。



Nasturtium palustre DC.

那司土魯題吳木爬魯司脫來（拉）　十字花科

田野自生之雜草。高七八寸。葉互生。往往分裂成羽狀。花小而有四黃瓣。排列為總狀花序。果實為長橢圓形之乾果。

Isatis tinctoria L.

Raphanus sativus L.

蘿蔔菜菔(漢)大根(日)白菜菔　十字花科

蘿蔔多栽培於沙土。一年生草。或越年生草。實蔬菜植物也。高一二尺。葉分裂為羽狀。花有淡紫色。或白色之四花瓣排列總狀花序。果實為細長之閉果。根長色白多肉。別有紅蘿蔔。根圓皮紅。肉白。又間有皮帶青色者。根及葉供食用。子可入藥。

大青　菘藍(漢)　十字花科

大青。歐洲原產之一年生草。或越年生草。高二三尺。下部葉為倒卵形。有葉柄。上部葉為披針形。無柄。開四瓣黃色之花。排列為總狀花序。果實扁平。類於翹果。莖葉可製藍。為染料。

Cardamine hirsuta *L.*
var. silvatica *Link.*

碎米薺（漢）　十字花科

碎米薺者。自生於濕地或淺水。一年生草。或越年生草。高六七寸。葉互生。為羽狀複葉。成於多數之小葉。花形小色白。排列為總狀花序。果實為細長裂果。

蔬類植物。可供食用。

Capsella Bursa pastoris *Moench.*

薺（漢）　十字花科

薺自生於各地。為一年生草。或越年生草。高尺餘。下部葉分裂為羽狀。上部葉有缺刻或鋸齒。花小四瓣白色。排列為總狀花序。果實扁平為三角狀之裂果。

葉供食用。春七草之一也。

Brassica oleracea L.

Alliaria Wasabi Prantl.

甘藍（漢）葉牡丹（日）　十字花科

甘藍。原產於歐羅巴之海邊。今隴西人多種之。為越年生草。實蔬類植物也。高二尺餘。葉平滑而厚。色微白。幼時層層包裹成球狀。花淡黃色。四瓣排列為總狀花序。嫩葉可作蔬。變種甚多。

山葙菜（漢）　十字花科

山葙菜。自生於山間濕地。為多年生草。高一尺餘。有特殊香味。葉圓心臟形。有長柄。花白色。具四花瓣。排列為總狀花序。根莖為香味料。葉可食。

Raphanus sp



Sarracenia purpurea L.

十字花科

野蘿蔔諸葛菜（中俗）

野蘿蔔者各地自生之一年生草也性好陰莖高二尺餘而多肉葉互生呈尖卵形有鋸齒無葉柄葉脚抱莖花為總狀花序上部特呈繖房形花四瓣與萼俱離生為十字形色淡紫上部畧帶綠色嫩葉可食救荒之植物也

瓶子草科

瓶子草（日）

瓶子草原生於北美東部之池沼為草本地上叢生數葉各葉呈瓶子狀內貯雨水瓶子口緣分泌蜜汁內面生向下之細毛小蟲舐食其蜜則轉落於瓶子內而溺死故得吸收小蟲之腐敗物以為養分花生於長花軸頂暗紫色直徑一寸五分



猪籠草科

猪籠草（漢）

猪籠草為婆羅洲原產之食蟲草高二尺餘葉大而基部扁平中呈紐狀為卷絡之用末端則變形成瓶狀為捕蟲器蟲入籠中即被消化吸收形態奇特植物園中多栽培之

茅膏菜科

茅膏菜（漢）

茅膏菜生於山野之濕地為食蟲草高尺許葉畧如新月形有長柄緣邊突起多數腺毛花小而白或帶赤色此草為著名之食蟲植物腺毛突起處分泌粘液捕獲小蟲吸收而消化之



Drosera rotundifolia L.

Dionaea muscipula L.

捕蠅草（日）　茅膏菜科

捕蠅草。產於北美卡羅里那之沼地。多年生草。葉由小形之葉身及扁平之葉柄而成。緣邊有剛毛。上面畧少。此毛具銳敏之感覺力。小蟲觸之。則葉身兩側直閉合。而捕食為養料。此亦食蟲植物之著名者。植物園中俱栽培之。

毛氈苔（日）　茅膏菜科

毛氈苔。自生於濕地。多年生草。高七八寸。葉叢生。由圓身及長柄而成。葉身上面有多數之毛狀突起。分泌粘液。花莖生於葉叢中間。上著小花。為總狀花序。白色或淡紅色。

此植物之能以葉捕小蟲者。

Aldrovanda vesiculosa L.

Sedum Lineare Thunb.

茅膏菜科

貉藻（日）

貉藻生於淡水中。草本植物。葉輪生。葉身為圓形。受刺激則直開合。花單生於葉腋。具五花瓣。

著名之食蟲草。蟲觸葉身上面。則葉合閉而捕之。

景天科

塞獨姆利你亞來（拉）

山野自生。肉質多汁之多年生草。高六七寸。葉細長。多肉而尖。呈淡綠色。花形小而色黃。

栽培之為觀賞用。

Sedum purpureum *Link.*

Sedum kamtschaticum *Fisch.*

景天科

費菜（漢）

費菜。山地自生。為多年生草。高尺許。葉互生。為倒卵形而長。質厚而畧似匙。緣邊有鋸齒。花排列於莖之頂端。為繖形。小而色黃。

栽培之於庭園。為觀賞用。

景天科

景天（漢）

景天。栽培於庭園。為多年生草。高二尺許。葉互生。為橢圓形。肉質而無柄。緣邊有粗鋸齒。秋月開花。色白而畧帶紫紅。集生於莖之頂部。為繖形花序。

供觀賞用。

Sedum Sieboldi *Sweet.*

塞獨母。喜保魯抵。(拉)　景天科

由栽培而生。為多年生草。係肉質性。莖下垂葉畧圓。每三葉輪生。花小。淡紅色。叢生於莖之頂端。

為觀賞植物。多栽之於庭圃。

Hydrangea hortensia *DC.* var. Azisai *A. Gr.*

八仙花(漢)紫陽花(日)　虎耳草科

八仙花。落葉灌木也。高約四五尺。葉橢圓形。平滑。對生。花大而美麗。為次第變色之萼。多數叢集。為圓狀花序。故又稱聚八仙。俗謂之洋繡球。

栽培於庭園。供觀賞用。乾花供藥用。

Astilbe chinensis *Maxim.* var. japonica *Maxim.*

Hydrangea Thunbergii *Sieb.*

土常山（漢）　虎耳草科

土常山。山野自生。又栽培於庭園。落葉灌木也。葉長三四寸。為廣披針形。對生。花開成叢。稍類繖形。外具大萼片四。約五六分。內形小。止二三分。花初綠後紅。又有白色。或白而帶紫斑者。子纍纍如黃粟米。

新葉蒸搓之。去綠汁。晒乾後加入湯內。可作飲料。

落新婦（日）　虎耳草科

落新婦。日本中部自生之多年生草也。高約二尺。葉為重複葉。質剛而有光澤。花通常為白色。形小。以多數集為圓堆花序。栽培於庭園中。供觀賞用。

Schizophragma hydrangeoides *Sat Z.*



Deutzia scabra *Thunb.*

岩榻（日）　虎耳草科

岩榻者。山地自生。為蔓生之木質性植物。長二丈餘。葉對生。呈卵形而尖。有銳鋸齒。花序似八仙花。外圍有不整齊之萼。萼之一片甚大。呈白團扇狀。中部小萼俱整齊。栽培之供觀賞用。

溲疏（漢）　虎耳草科

溲疏。自生於山野。為落葉灌木。高約一丈五尺。葉為長橢圓形而尖。有細鋸齒。葉面甚粗糙。花排列為圓錐花序。花冠色白。材供木釘及他用。又栽培於庭園。



Parnassia palustris L.

Deinanthe bifida Maxim.

虎耳草科

梅鉢草（日）

梅鉢草。自生於山地。為多年生草。高六七寸。下部葉為心臟形而尖。有長柄。上部葉同而無柄。花單生於莖之頂端。有五白花瓣。五雄蕊及五掌狀片。為互生。各片具黃小球（蜜腺）於末端數枚。

栽培之為觀賞用。

虎耳草科

待囊待、比肥達（拉）

此物自生於山地。為多年生草。高一二尺。葉對生。為倒卵形。頭部二裂。花集生於莖之頂端。色白。

栽培之為觀賞用。又其粘液可供製紙之糊料。

Ribes Grossularia *L.*

「古司白里」Goose berry. 鵞漿果(英)

虎耳草科

鵞漿果者。歐洲原產之落葉灌木。有刺。高三四尺。葉淺裂為掌狀。互生。花黃綠色。梗短。每一朵單生。或每二三朵叢生。果實為球形。綠黃而畧帶赤色。果可供食用。



Cardiandra alternifolia *S.et Z.*

草紫陽花(日)

虎耳草科

草紫陽花。山地自生。多年生草。高二尺餘。葉為廣披針形。或長橢圓形。有鋸齒。花紫赤色。叢生而畧似八仙花。栽培之供觀賞用。

Hydrangea involucrata Sieb

Saxifraga cortusæfolia S. et Z.

大文字草（日）　虎耳草科

大文字草。自生於山地。為多年生草。高一尺餘。葉為肉質。淺裂成掌狀。具粗毛及長柄。花有白色不整之五花瓣。簇生於花莖之上部。

栽培之為觀賞用。

玉紫陽花（日）　虎耳草科

玉紫陽花。自生於山地。為落葉灌木。高四五尺。葉對生。長橢圓形。有多數之細鋸齒。花小。青紫色。排列為聚繖花序。花序外圍有大形萼片。以其花芽為球形。故有玉紫陽花之名。

栽培之為觀賞用。

Hydrangea paniculata Sieb.

糊空木　糊木（日）　虎耳草科

糊木者。山野自生之落葉樹。高一丈餘。葉對生。長卵形。或長橢圓形。端尖。有鋸齒。花白色。排列為圓錐花序。其下部有大萼片。樹皮富有粘液。採取之為製紙糊料。材可製木釘或吸煙嘴。

Astilbe chinensis *Maxim.* var. japonica *Maxim.*

阿斯題盧彼起乃恩席斯加保尼蛤（拉）

千竹草（日）　虎耳草科

山野自生。多年生草。高二三尺。莖葉皆有毛。葉為三回羽狀複葉。由多數小葉而成。花具淡紫色或白色之細長五花瓣。栽培之為觀賞用。



Saxifraga sarmentosa L.

虎耳草科

虎耳草漢

虎耳草。產於濕地。為常綠之多年生草。高五六寸。生絲狀匐枝。卧地延長。隨處着節。葉為圓心臟形。有剛毛。背赤。花莖抽於葉叢之間。開不整齊之五花瓣。三小二大。色白。

人家多栽之於石上。為觀賞用。葉可食。

Pittosporum Tobira Ait.

海桐花科

海桐花漢

海桐花。生於南海及雷州。近海州郡亦有之。為長綠樹。高丈餘。葉倒卵形。長二寸許。質厚有光。花白如丁香。惟臭味不甚美。實大如指。秋時熟。則三裂。子赤。

材可作艠。膠皮可作繩。入水不爛。又可作藥用。

Pittosporum undulatum *Vent.*

海桐花科

唐冬青（日）

唐冬青常綠灌木。生於日本小笠原島。高丈餘。葉倒披針形。為波狀緣邊。花白。有芳香。果實似海桐。熟則裂開而現赤色種子。栽於盆內。為觀賞用。然性畏寒。冬季宜置於暖室中。

Distylium racemosum *Sieb. Z.*

金縷梅科

蚊母樹（漢）

蚊母樹。自生於暖地。常綠喬木也。高二丈餘。葉長橢圓形。全邊。互生。小蟲常聚於囊狀之膨大部。蟲去則成空殼。故有蚊母之稱。花小無冠。僅具綠萼及赤色雄蕊與有毛之雌蕊。

材可供建築。灰可製陶器。庭園栽之。可供觀賞用。

Liquidambar orientalis Mill.



Liquidambar formosanum Hance.

金縷梅科

蘇合香（漢）

蘇合香者。小亞細亞自生之落葉喬木。葉分裂為掌狀。以長葉柄而互生。花形小為單性。多數集生。而成頭狀花序。雌雄同株。由樹皮採取樹脂。稱為蘇合香。可治疥癬。

金縷梅科

楓（漢）

楓。一名香楓。多生於江南及關陝。為落葉喬木。高二三丈。葉掌狀三裂。有細鋸齒。至秋而紅。春開黃褐色花。叢集為頭狀。有總苞。結球果。

栽培之為觀賞用。皮下樹脂。可代用為蘇合香。（恩孫來路氏之說）本草。楓香脂亦入藥。

Hamamelis japonica S. et Z.

金縷梅科

金縷梅（漢）

金縷梅山地自生。為落葉樹。高丈餘。葉互生。為橢圓形。或倒卵形。花開於早春。有細長之黃花瓣。

栽培之為觀賞用。

Prunus amygdalus S. et Z.

薔薇科

扁桃（日）

扁桃者。中央亞西亞原產之落葉樹。高約一丈五尺。葉為披針形。類似桃葉。花無梗。每二朵聚生。果實雖似桃而不多汁。成熟則皮乾。裂開出核。

扁桃有甜苦二種。甜者供食。苦者入藥。我國謂之叭嗒杏。其入藥者。可作鎮痙鎮咳之劑。

Prunus Mume Sieb. Z.

杏（漢）　薔薇科

杏。蒙古原產之落葉樹也。高丈餘。我國栽培者多。葉及花酷似梅。實為核果。成熟則肉與核分離。味甘而不酸。果實供食用。種子和水蒸溜。即杏仁水。藥用功效。與苦扁桃水同。其材可供器具之料。

梅（漢）　薔薇科

梅。我國多栽培之。為落葉樹。高二三丈。早春開花。香氣最強。花瓣五出。有一重與八重二種。色有白或紅之別。白者初時微帶綠色。亦謂之綠萼梅。葉後花而出。卵形而端尖。有鋸齒。果實為核果。熟於梅雨之頃。花供觀賞用。果實供食用。材可為器具。



泡台題爾拉苦來尼亞那(拉)薔薇科

此植物為原野自生之雜草莖伏卧地上葉為掌狀複葉有鋸齒下部由五小葉而成葉柄長花黃色集多數之雄蕊及雌蕊排列為有限花序

荷蘭莓　西洋莓(日)　薔薇科

荷蘭莓為北美原產之多年生草有匍匐之長莖每葉由三小葉而成小葉形大而平滑質硬花色白有宿萼果實赤色而肥大有肉質之花托

果實供食用

Rosa indica L.

Pyrus spectabilis Ait.

海棠（漢）　薔薇科

海棠。多栽培於庭園。為落葉樹。高丈餘。葉長卵形。或長橢圓形。而尖。有鋸齒。花萼赤而畧帶黑色。花瓣為淡紅色。

種類甚多。曰貼梗海棠。曰垂絲海棠。曰西府海棠。貼梗垂絲。俱花而不實。高尺餘。專供觀賞。惟西府結實可食。名海紅。即俗所謂海棠果。

月季花　長春花（漢）　薔薇科

月季花。為常綠灌木。高五六尺。莖蔓生有刺。葉為羽狀複葉。由三或五之光滑小葉而成。並有托葉甚狹。花重瓣而紅。有壺狀花托。每月開放。故有此稱。俗呼為月月紅。



Rubus trifidus Thunb.

Photinia glabra Thunb.

薔薇科

構莓（日）

構莓。自生於日本之暖地。為落葉灌木。高五六尺。葉大而有光澤。類於械樹之葉。互生。花五瓣色白。果實為黃色之肉果。栽培之供觀賞用。果實可食。

薔薇科

赤芽（日）

赤芽。自生於暖地。為常綠樹。高丈餘。葉橢圓形。或卵形。端尖。質厚而有鋸齒。花為小形白色。排列為圓錐花序。果實赤色。為球形之小肉果。材作艫臍車軸扇軸等用。

Potentilla chinensis Ser.

委陵菜（漢）　蔷薇科

委陵菜。自生於原野。為雜草。莖伏臥於地上。葉為大形羽狀。複葉由多數小葉而成。小葉為長形。分裂為羽狀。下面具白毛。花五瓣。色黃。類於泡台恩題爾拉若拉依尼阿那（拉）之花。

Rubus palmatus Thunb

懸鈎子（漢）　蔷薇科

懸鈎子。自生於山野。為落葉灌木。莖及葉有刺。高三四尺。葉分裂為掌狀。以葉柄而互生。花大。近於棣棠花之花。有白色五花瓣。果實為黃色之肉果。由多數之小核果而成。

果實供食用。花供觀賞用。

Agrimonia pilosa *Ledeb.*

龍芽草（漢）　薔薇科

龍芽草。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉為羽狀複葉。由大小不整之小葉而成。花小形。色黃。排列為總狀花序。果實有多數刺毛。能附著於他物。

Poterium villosa *Dene.*

鎌柄（日）殺牛（日）　薔薇科

殺牛都。山野自生。為落葉樹。高二三十尺。葉倒卵形而尖。有細鋸齒。花小色白。花序為繖房狀。果實赤色。小橢圓形之肉果。供觀賞用。材可用於鎌鍬等之柄。或牛鼻木。

Cydonia japonica *Pers.* var. pygmaea *Maxim.*

Hagenia abyssinica *Willd.*

樝子　木桃（漢）　薔薇科

樝子者。山野自生。為落葉小灌木。高一二尺。葉倒卵形。有托葉。花黃色。類於 Cydonia japonica 之花。果實為圓形。有強酸味。

供觀賞用。實可食。搾取汁液。為酢之代用。或以之釀酒。

苦蘇（日）　薔薇科

苦蘇者。產於亞非利加洲「阿比西尼亞」地方之喬木。葉互生。羽狀複葉。花小。淡紅色。排列為圓錐花序。雌雄異株。

取其雌花而乾之。即苦蘇花。用為除絛蟲藥。



薔薇科

木瓜（漢）

木瓜。處處有之。以產於宣城者為佳。落葉灌木也。高六七尺。樹皮剝離之跡為鱗狀。葉互生。為卵形而尖。花有紅色。離瓣花冠。果實橢圓形。黃色。類於甜瓜。

花供觀賞用。材供床柱之用。果實有強澁味。不適於生食。蒸而蜜漬之。乃可食。

薔薇科

雉席（日）

雉席。自生於山野。多年生草。叢生帶微毛之羽狀複葉。小葉二或三。花單生於葉叢中央。開數花於頂上。有黃色花瓣五。雄蕊及雌蕊甚多。

Spiraea Thunbergii Sieb.

Spiraea cantoniensis Lour.

珍珠花　漢粉米花雪柳　日　薔薇科

珍珠花。山地自生。為灌木。叢生多數花莖。高四五尺。葉互生。為小披針形。花小色白。叢生於莖之上部。

栽培之。觀賞用。

麻葉繡毬　漢　薔薇科

麻葉繡毬。栽培於庭園。為灌木。高三四尺。葉互生。為廣披針形。或長橢圓形。花小色白。排列為繖房花序。

栽培之供觀賞用。

Potentilla fruticosa L.

爬藤題拉夫魯題考撒(拉)薔薇科

此植物自生於亞細亞歐羅巴及北亞美利加之山地。為小灌木。高三四尺。葉為羽狀複葉。以三或五或七之廣披針形小葉而成。花黃。

栽培之為觀賞用。

Prunus Pseudo-Cerasus Lindl.

櫻(日)櫻桃(漢)　薔薇科

櫻多產於日本。落葉喬木也。高二三丈。葉卵形。端尖。有鋸齒。互生。花美麗。五瓣。淡紅色。亦有重瓣者。實為核果。紫赤色。

日本以櫻為名花。花時觀賞者甚衆。又以其材供器具等用。樹皮貼用於小器具。為飾物。花為鹽漬沖湯作飲料。我國專取果實為食品。

Spiraea prunifolia S. et Z.

Mespilus cuneata Matsum.

山楂子（漢）　薔薇科

山楂子。栽培於庭園。為落葉灌木。高五六尺。莖生針狀之枝。葉楔形。有鋸齒。花白色。數朵集生。略似林檎花。果實赤色或黃色。徑六七分。其構造亦類似於林檎之果實。供觀賞用。加果實於魚類而煮之。能使其骨變為軟性。

笑靨花（漢）　薔薇科

笑靨花者。栽培於庭園。落葉灌木也。高四五尺。葉卵形。具細鋸齒。花細如豆。白色重瓣。不結實。根窠叢生。茂者數十條。劈窠分種易活。

一條千花。望之若堆雪。可供觀賞用。

Spiraea japonica L.f.

繡線菊（漢）　薔薇科

繡線菊者。自生於山地。為落葉灌木。高四五尺。葉互生。為長卵形而尖。有鋸齒。花小。有紅色或白色之花瓣。多數集生。

栽培之為觀賞用。

Stephanandra flexuosa S.et Z.

粉米空樹（日）　薔薇科

粉米空樹。山野自生。落葉灌木。高五六尺。葉互生。卵形而尖。有缺刻及鋸齒。花小。色白。雄蕊叢生。向內彎曲。

供觀賞用。

Rhaphiolepis japonica S. et Z.



Amelanchier asiatica C. Koch.

阿埋郎其阿阿塞阿題卡（拉）薔薇科

自生於山地。為落葉樹。高二三丈。葉橢圓形。有鋸齒。幼時具白毛。花瓣細長。色白。花供觀賞用。材供器具及薪炭之料用。

濱木斛（日）車輪梅（日）　薔薇科

濱木斛。自生於海濱之暖地。為灌木。高三四尺。葉互生。橢圓形。質厚。花色白。排列為圓錐花序。與梅花相似。花為觀賞用。樹皮為染料。



Prunus communis *Huds.*

Rhodotypos kerrioides *S. et Z.*

李（漢）　薔薇科

李為栽培之落葉樹。高丈餘。葉互生。為長卵形。或廣披針形。有鋸齒。花每朵五瓣。色白。有長梗。通常皆三朵集生為一顆。實為球形核果。小時色青。熟則赤色者居多。果實供食用。今桐鄉縣所產檇李。品味絕佳。

白山吹（日）　薔薇科

白山吹。栽培於庭園。為落葉灌木。高四五尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。花白色四瓣。形狀畧似棣棠之花。供觀賞用。



Rosa centifolia L.

Pirus malus L.

西洋薔薇（日）　薔薇科

西洋薔薇者。歐洲原產之落葉灌木。高約三尺。有不曲之刺。葉為羽狀複葉。由五至七卵形小葉而成。花重瓣。大形。色紫紅或白。萼及花梗。具發香氣之腺。

栽培之為觀賞用。蒸餾其花。取揮發油以製香水。或為矯臭藥及矯味藥之料。

西洋林檎（日）　薔薇科

西洋林檎者。為歐洲原產之落葉樹。高三丈餘。葉互生。為卵形。有鋸齒。花色白。有花瓣五。萼帶紅色。稍集為繖形。實乃大形之漿果也。

栽培於各地。果實可食。又為釀酒之料。





水楊梅（漢）　薔薇科

水楊梅。山野自生。多年生草。高二三丈。下部葉為不整齊之羽狀複葉。狀與萊菔葉相似。花五瓣。黃色。果實上端為鉤狀。小乾果之聚合者也。

地下莖為藥用。治瘡腫有效。又幼時莖葉可食。

西洋梨（日）　薔薇科

西洋梨。為歐洲原產之落葉喬木。高五六丈。葉互生。卵形。有長柄。初時生有軟毛。花五瓣。色白。中具紫紅色之葯。實為倒卵形漿果。

果實供食用。

Pirus sinensis *Lindl.*

Prunus japonica *Thunb.*

薔薇科

梨（漢）

梨多栽培於我國及日本。為落葉樹。高三丈餘。葉卵形而尖。長柄互生。花五瓣色白。具黑褐色之藥。實為漿果。大而圓。頂微凹。外具小斑點。

果實供食用。材為建築及器具之材。

薔薇科

郁李（漢）

郁李。即常棣。多生於山谷邱陵之間。為灌木。高四五尺。葉為廣披針形。有鋸齒。花淡紅色。五瓣。具多數雄蕊。實為核果。色紫赤。味酸。

栽培之為觀賞用。又材可為器具。仁可入藥。

Rosa multiflora *Thunb.*

Rosa rugosa *Thunb.*

薔薇科

野薔薇（漢）

野薔薇者。自生於山野。為落葉灌木。莖有刺。高四五尺。葉為奇數羽狀複葉。由橢圓形之小葉而成。花五瓣。色白。吐氣甚香。間有帶紅色之花瓣者。

薔薇科

玫瑰（漢）

玫瑰。自生於海邊。為灌木。高二三尺。莖多刺。葉為奇數羽狀複葉。由多數橢圓形小葉而成。花具紅色或白色之瓣。甚美麗。花托如壺。外面密生刺。內部藏多數雌蕊。根皮為黃褐色之染料。花供觀賞及製香水用。

Eriobotrya japonica Lindl.

枇杷（漢）　薔薇科

枇杷。栽培於庭園。為常綠樹。高二丈餘。葉大而互生。為長橢圓形。有鋸齒。背密附褐色之毛。花小色白。數朶集生。實漿果。形圓色黃。內含二三大種子。

果實供食用。及釀酒類。



Duchesnea indica Focke

蛇莓（漢）　薔薇科

蛇莓者。山野自生。多年生草。莖伏於地。葉互生為複葉。以三小葉合成。有長柄。花生於葉腋。每葉腋間只著一花。五瓣色黃。下具萼狀總苞。實細。色赤。畧似荷蘭莓之果。有毒植物。果不可啖。



Cydonia vulgaris Pers.

Rosa Wichuraiana Crep.

薔薇科

榅桲（漢）

榅桲者歐洲南部原產之落葉樹今關陝生者最多高七八尺葉互生卵形或橢圓形背有毛花淡紅色五瓣形狀畧似林檎實為黃色漿果面凹凸有細毛氣甚芳香味澀果實供食用兼可入藥能下氣消食

薔薇科

照葉野薔薇（日）

照葉野薔薇自生於海邊之灌木莖有刺蔓延於地上葉為羽狀複葉以有光澤之小葉相合而成花五瓣色白能發異香栽培之為觀賞用又花可製香水



Prunus Persica Sieb. et Z.
var. vulgaris Maxim.

Prunus laurocerasus L.

桃（漢）　薔薇科

桃。各國多栽培之。為落葉亞喬木。高丈餘。葉互生。呈披針形。花有紅紫白等色之瓣。及向內彎曲之多數雄蕊。花梗甚短。實為核果。外附毛。

果實為食用花供觀賞

拉吳羅塞拉斯司（拉）　薔薇科

原產於地中海沿岸。為常綠灌木。高約一丈二尺。葉厚有光澤。緣邊有鋸齒。花集生而小。為總狀花序。

葉蒸餾之。可製拉吳羅塞拉斯司水。供藥用



Kerria japonica *Dc.*

棣棠花（漢）山吹（日）　薔薇科

棣棠花者。山野自生。落葉灌木。高四五尺。莖綠色。中有白瓤如通草。葉互生。長卵形。端尖。有鋸齒。春暮開花。為金黃色。單瓣者結實。重瓣則否。

栽培之為觀賞用。

Prunus tomentosa *Thunb.*

山櫻桃、梅桃（漢）　薔薇科

山櫻桃者。栽培於園圃。為落葉灌木。幼莖密生毛。葉卵形或長橢圓形。有鋸齒。互生。花五瓣。色白。蕚與梅花相似。實為核果。小球形。熟時色赤。

果實供食用。

Quillaja Saponaria Mol.

石鹹樹（日）　薔薇科

石鹹樹原產於南美。為常綠亞喬木。高丈餘。葉互生。卵形。花單性。形小。綠色。雌雄同株。實為裂果。

樹皮為石鹹之代用。

Prunus cerasus L.

櫻桃（日）　薔薇科

櫻桃者。小亞細亞原產之落葉喬木。高二丈餘。葉橢圓形而尖。有重鋸齒。花瓣白色。實為核果。略呈圓形。

果實供食用。

Acacia catechu Willd.

Phaseolus Mungo L. var. subtrilobatus (Fr. et Sav.) Matsum.

阿仙藥（日）　莢科

阿仙藥。原產於前印度及東部亞非利加。常綠喬木也。高約丈餘。葉為二回羽狀複葉。合多數小葉而成。花黃色。具多數雄蕊。實為莢果。含種子數枚。

材晒乾煎汁。得褐色塊。即阿仙藥。有收斂性。為止嗽劑。又加於苦魯謨或銅可為褐色或黑色之染料。

赤小豆（漢）　莢科

赤小豆者。栽培於農地之一年生草也。高二尺餘。葉以三小葉合成。小葉有淺裂三。花黃。冠似蝶形。瓣包雌雄蕊。為龍骨瓣。呈螺旋狀。果實為細長之莢。含赤色種子。子可供食。入藥能療脚氣。

Acacia senegal Willd.

亞拉毘亞護謨樹（日）　荳科

產於亞非利加之北部。為常綠樹。高約二丈。有下向之巨刺。葉為二回羽狀複葉。花軸生於葉腋。花色黃。有多數雄蕊。實為莢果。含種子數枚。

氣候乾燥時。於莖之皮部裂孔。瀝出樹脂。可為丸藥之粘料。或刺激緩和藥等用。又加於印刷用之繪具。或為糊料用。

Lathyrus Davidii Hoe.

莊芒決明（漢）　荳科

自生於山野。為蔓草。以卷鬚上昇。葉為羽狀複葉。又有大托葉。花開如蝶形。深黃色。實類碗豆之莢。長寸許。子扁色褐。

嫩莖葉及莢。皆可食。救荒本草謂之山扁豆。即此也。

Cladrastis amurensis *Bot. H.* var. floribunda *Maxim.*

Phaseolus vulgaris *L.*

櫰槐（漢）　荳科

櫰槐。自生於山地。為落葉喬木。高約五丈。葉為羽狀複葉。密生細毛。花黃白色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實為長莢。材供輿人之細工用。及其他器具料。樹皮為染料。又栽培於庭園。足供觀賞。

菜豆（漢）　荳科

菜豆者。為一年生之蔓草。亦曰穀類植物。栽培者甚多。莖有卷鬚。葉互生。合三小葉而成為複葉。花軸生於葉腋。著數花。花冠為蝶形。白色或紫。龍骨瓣卷回成螺旋狀。果實長莢。子如腎臟形。色白或紅黑。子及幼莢。可供食用。

Medicago denticulata Willd.

苜蓿（漢）金花菜（中俗）　荳科

苜蓿自生於原野。為二年生草。莖平卧於地上。葉為三小葉合成。小葉倒卵形。頂端凹陷。葉腋出花軸。著三至五朵之花。花小色黃。成蝶形。果實為螺旋形之莢。有刺。為牧草。馬嗜食之。又為蔬菜用。

Cytisus scoparius Link.

金雀枝　荳科

金雀枝。為歐羅巴原產之灌木。高四五尺。幼莖平滑。色綠。有縱行數列稜。葉為複葉。合三小葉而成。花每一朵或每二朵。由葉腋生。花冠為蝶形。呈黃金色。

栽培之為觀賞用。

Vicia venosa *Maxim.* var. cuspidata *Maxim.*

Sophora japonica *L.*

箙藤（日）　荳科

箙藤。自生於山地。為雜草。高二三尺。葉為偶數羽狀複葉。頂端有短突起。小葉為廣披針形。花排列為總狀花序。有青紫色之蝶形花冠。

槐（漢）　荳科

槐產於亞洲東部。庭園間多栽植之。為落葉喬木。高二三丈。葉為羽狀複葉。互生。花如蝶形。黃白色。排列為大圓錐形花序。果實為長莢。各種子間縮細如連珠。材供建築及器具用。實可入藥。

Pisum sativum L.

Vicia tetrasperma Moench.

荳科

豌豆（漢）

豌豆原產於地中海沿岸今田圃多栽培之蔓生之越年生草長五六尺葉為羽狀複葉末端有卷鬚基部具大形托葉花如小蝶形白或畧帶紫色結實成莢長寸許苗及子俱可食莖葉又可為肥料及家畜飼料

荳科

卡斯麻草（日）

卡斯麻草原野自生一年生草葉為羽狀複葉通常有五對小葉頂端具卷鬚卷絡於他物花每二朶同生於一軸形小淡紫色果實為平滑之莢通常含種子四枚為牧草適於家畜之飼料

Cassia tilinosoide

Physosyma venenosum *Balf.*

山扁豆（漢）　荳科

山扁豆。自生於原野。一年生草。高一二尺。葉為羽狀複葉。形細小。由多數之小葉合成。花生於葉腋。黃色五瓣。結實成莢。長寸許。含種子數枚。

採其莖葉。可為茶之代用品。

加刺拔兒豆（日）　荳科

加刺拔兒豆。西部亞非利加原產之植物。莖下部為木質。葉為複葉。由三小葉合成。類似於菜豆。花蝶形。暗赤色。排列為總狀花序。實為莢果。含二或三之扁平種子。

種子即稱為加刺拔兒豆。供藥用。能縮小瞳孔。又鎮靜痙攣。然性猛毒。宜注意取用。

Glycyrrhiza glabra L.

Pterocarpus Marsupium Roxb.

甘草（漢）　荳科

甘草。多產於我國川陝等省及歐洲之南部。多年生草也。葉為羽狀複葉。通常有十數個之長卵形小葉。花淡紅色。具蝶形花冠。簇聚成穗。

地下莖及根。供緩和藥。有特殊甘味。

吉納（日）　荳科

吉納者。東印度原產之常綠樹。高四丈餘。葉為羽狀複葉。小葉頂端具凹形。花及果實俱類紫檀。

樹幹滲出之汁液。乾燥之即吉納。為收斂藥。

Lespedeza Bourgeri Miq.

Vigna Sesquipedalis L.

木蔌（日）　荳科

木蔌者。山地自生。為灌木。高五六尺。葉為複葉。由三小葉而成。形狀酷似胡枚子。花蝶形。白色有紫斑紋。

栽培之為觀賞用。

合萠（漢）　荳科

合萠自生於田野。為一年生草。高二三尺。葉合多數小葉而成。為羽狀複葉。互生。花黃白色。果實為細長莢。於每種子間有節。

栽培之供觀賞用。

Vicia Cracca L.
var. japonica Mor.

草藤（漢）　荳科

草藤。自生於山野。多年生草也。葉由多數小葉合成。為羽狀複葉。末端有卷鬚。卷絡他物。花青紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。供家畜之飼料。

Pueraria Thunbergiana Benth.

葛（漢）　荳科

葛。自生於山野。多年生之蔓草也。莖細長。葉以三小葉合成。為大形之複葉。互生。花赤紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實為扁莢。幼莖葉及果。俱密生褐色之毛。搗根取汁製粉。可供食用。又可製糊。澱粉中之最佳品質也。莖可代繩或編籃。纖維可織葛布。乾根可為葛根湯。

Sophora flavescens *Ait.*
var. galegoides *Hemsl.*

苦參（漢）　荳科

苦參。山野自生。河南四川產者最多。為多年生草。高三四尺。葉為羽狀複葉。由多數小葉而成。互生。花淡黃色。花冠蝶形。成長總狀序。實為細長莢。

有毒。莖葉煎汁。為農作物之驅蟲劑。根入藥。可治疥癬。及他寄生物。莖之纖維可取為織物。



Copaifera officinalis *L.*

骨湃波拔爾撒謨樹（日）　荳科

南美原產之常綠樹也。高約二丈。葉為羽狀複葉。由四或十之卵形小葉而成。花具四萼片。無花冠。實為莢果。畧成橢圓形。含種子一枚。

幹穿深洞。流出樹脂。即骨湃波拔爾撒謨。能治尿道之疾病。

Indigofera pseudo-tinctoria *Matsum.*



Trifolium repens *L.*

馬棘（漢）　荳科

馬棘都自生於山野。為多年生草。高一二尺。畧成灌木狀。葉互生。為羽狀複葉。由多數小葉而成。花有紅紫或白色。花冠蝶形。類似蕨花。排列為總狀花序。結實為莢。長六七寸。

栽培之為觀賞用。

脫里否里吳木里培恩斯（拉）　荳科

歐洲原產。多年生草。莖細。伏於地上。葉為複葉。由三小葉而成。有長柄。互生。花小色白。具蝶形花冠。集為頭狀。

供家畜飼料。又可為肥料用。近年日本亦多栽此物。



Gleditschia japonica *Miq.*

皂莢（漢）　荳科

皂莢隨處產生。落葉喬木也。高三四丈。有銳針。葉為羽狀複葉。合多數小葉而成。花小蝶形。呈黃綠色。結實為莢。長扁如刀。材供器具及薪炭之用。嫩葉可食。莢煎汁用以洗濯。最能去垢。



Vigna sinensis *Hassk.*

豇豆　漢　大角豆（日）　荳科

豇豆多栽培於園圃。為一年生草。通常蔓性。葉為羽狀複葉。以三小葉合成。花淡青帶紫色。具蝶形花冠。結實成莢。長者或至二尺。種子及嫩莢。可供食用。

Ptetocarpus Santalinus *L. f.*

紫檀（漢） 荳科

紫檀產於熱帶地。為東印度原產之常綠樹。高五六丈。葉為複葉。以三小葉合成。花為蝶形花冠。果實具翼。

材赤色質堅重入水則沈製器具甚珍貴又可為染料

Caesalpinia sepiaria *Roxb.*

雲實（漢） 荳科

雲實。自生於山野。為落葉樹。莖及葉有刺。高丈餘。葉為二回羽狀複葉。由多數小葉合成。花黃色。畧具不整齊之花瓣。排列為總狀花序。實為莢果。

有毒之植物也。

Crotalaria sessiliflora L.



Vicia hirsuta Koch.

狸荳（日）　荳科

狸豆者。原野自生。一年生草。高一二尺。葉互生。為披針形。花外圍密生淡褐色毛。花冠蝶形。淡紫色。集生於莖之上部。

栽培之為觀賞用。

小巢菜（漢）雀豌豆（日）　荳科

小巢菜者。自生於山野。蔓生之越年生草也。葉為羽狀複葉。合多數小葉而成。上端有卷鬚。花小。淡青色。具蝶形花冠。集生於花軸上部。果實為小形之莢。表面有毛。含種子二枚。

供家畜飼料。

Thermopsis fabacea DC.

Caesalpinia Sappan L.

蘇方（漢）　荳科

蘇方者。東印度原產之喬木也。高約五丈。莖有刺。葉為羽狀複葉。合多數小葉而成。花美麗。色黃。

枝去皮。即販賣之蘇方。削而煎之。為紅色染料。又根可採取黃色染料。

野決明黃華（漢）仙臺蔌（日）　荳科

野決明。自生於我國北部。今處處有之。為多年生草。高二尺餘。葉合三小葉而成。為複葉。基部有葉狀托葉。花蝶形黃色。排列為總狀花序。實為莢果。

子入藥。治目疾。

Cassia neutifolia *Del.*

旃那（日）　荳科

旃那者產生於熱帶亞非利加為灌木狀之植物葉為偶數羽狀複葉小葉長卵形而尖花黃色稍具不整齊之花瓣五實扁平為莢果葉可用為下劑



Vicia Faba *L.*

蠶豆（漢）　荳科

蠶豆多栽培於田圃越年生草莖方中空高二三尺葉為羽狀複葉以二或六之長橢圓形小葉合成基部有托葉花白帶紫色花冠蝶形有黑斑排列為短總狀花序結實為莢向上方子可供食莖葉為肥料或家畜之飼料

Glycine hispida Maxim.

大豆黃大豆（漢）　荳科

大豆。我國各省皆種之。東三省產額尤多。一年生草也。高二三尺。莖葉俱有毛。葉互生。為複葉。以三小葉合成。花小色白。或帶紫色之蝶形花冠。結莢長寸餘。有毛。子可榨油。又可為甜醬醬油豆腐等各要品。莖葉為肥料及家畜之飼料。



Abrus precatorius L.

相思子（漢）　荳科

相思子。亦名紅豆。東印度原產之蔓生木質植物。葉為偶數羽狀複葉。以多數小葉合成。花小蝶形。紅白色。排列為總狀花序。實為莢果。含鮮紅之種子。大如豌豆。亦有黑色或帶白色者。子供裝飾用。

Mimosa pudica L.



Tamarindus indica L.

含羞草（漢）　荳　科

含羞草。南美布拉日魯國原產之一年生草。莖葉有刺。葉為複葉。總葉柄之頂端生四枝。各枝有多數小葉。此葉因刺激而閉合。即下垂其葉柄。花淡紅紫色。集合為頭狀。結實為小莢。有刺。

栽培之為觀賞及實驗用。

羅望子（漢）答滿林度（日）　荳　科

羅望子者。熱帶亞非利加原產之喬木。葉互生。為偶數羽狀複葉。以多數小葉合成。花白。有赤色之線條。排列為總狀花序。實為莢果。

果實用為清涼藥。及緩下劑。

Rhynchosia volubilis *Lour*

鹿藿（漢）　荳科

鹿藿。自生於田野。多年生之蔓草也。莖細長。卷絡於他物。葉為複葉。合三小葉而成。花蝶形。淡紫色。為短總狀花序。結實成小莢。通常含種子二枚。大如花椒。扁圓而黑。俗稱野綠豆。

子可煮食。或磨麵作餅蒸食。入藥去痰有效。

Hæmatoxylon campechianum *L.*

勞孤吳島樹（日）　荳科

勞孤吳島樹者。中央亞美利加原產之常綠樹。高五丈。葉為羽狀複葉。小葉為倒心臟形。花黃色。著生於長軸。

材之中心暗赤色。即勞孤吳島。可為收斂及强壯劑之藥用。又為最佳之染料。其色素稱為黑麻陶克喜勞恩。為赤色結晶體。更適用於顯微鏡實驗之染料。

Tolulifera Balsamum L.

Canavalia ensiformis DC

篤留拔爾撒謨樹（日）　荳科

南美原產之喬木。高七八丈。葉互生。奇數羽狀複葉。花有不整齊之白花冠。排列為總狀花序。果實為莢。

樹脂即篤留拔爾撒謨。可治疥癬。又為粉粧原料。

刀豆（漢）　荳科

刀豆。多栽培於園圃。一年生之蔓草也。葉為大形複葉。以三小葉合成。花青紫色。具蝶形花冠。果實為大扁平莢。長尺許。子大如拇指頭。淡紅色。

實供食用。同猪肉雞肉煮食尤美。

Arachis hypogaea L.

Desmodium podocarpum DC. var. japonicum Maxim.

落花生（漢）南京豆（日）長生果（中俗）荳　科

落花生。原產於熱帶亞美利加。今隨處有之。一年生草也。蔓延地上。葉偶數羽狀複葉。以四小葉合成。花黃色。蝶形。子房於花後入地中。生長成果實。

種可供食。並榨油及他用。大落花生之種皮。又可為造紙原料。餅為肥料用。

山菜豆（漢）盜人萩（日）　荳　科

山菜豆。自生於山野。為雜草。高二三尺。葉互生。為複葉。合三小葉而成。小葉長卵形。端尖。花蝶形。淡紅紫色。排列為總狀花序。結實成莢。通常含種子二枚。各種子間畧細縮。

Albizzia Julibrissin *Boiv.*



Lespedeza bicolor *Turcz*

合歡（漢）夜合花（中俗）　荳科

合歡者。山野自生之落葉樹。高丈餘。葉為二回羽狀複葉。由多數小葉而成。至暮即合。花小。紅色美麗。雄蕊多數甚長。莢果亦長三四寸。子如米粒。

材可為器具之料。又為觀賞用。

胡枝子（漢）萩（中俗）　荳科

胡枝子者。自生於山野。為多年生之植物。高四五丈。下部木質。上部草質。葉合三小葉而成。為複葉。花有紅紫淡紫或白色數種。具蝶形花冠。

栽培之為觀賞用。

Kraunhia floribunda *Taub.*



Cercis chinensis *Bge*

紫荊（漢）花蘇方（日）　荳科

紫荊。栽培於園圃。為落葉灌木。高丈餘。叢生。葉圓心臟形而尖。花開於葉之先。色紫。甚細碎。具假蝶形花冠。數朶一簇。或生於木身。或附於根上枝下。無花梗。故又名為滿條紅。結實成扁平之莢。供觀賞用。

紫藤（漢）藤（俗）　荳科

紫藤。自生於山野。蔓生之木質植物也。莖卷絡於他物。葉互生。為奇數羽狀複葉。由長卵形小葉而成。花紫色。蝶形。排列為總狀花序。長一二尺下垂。結實為長莢。栽培之為觀賞用。樹皮纖維可為織物。種子及幼葉可供食。

Dolichos Lablab *L.*

Myroxylon pereirae *Klotzsch.*

扁豆。鵲豆(漢)藤豆(日)　荳科

扁豆。為亞非利加及東印度之原產。今人家多種之於籬垣。為一年生草。莖卷絡於他物。葉互生。為複葉。頗濶大。花白色或帶紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實扁平。為鐮狀之莢。有黑白二種。

嫩時可充蔬食茶料。老則收子煮食。白者可入藥。

百露拔爾撒謨(日)　荳科

百露拔爾撒謨者。中央亞美利加原產之喬木。高約五丈。葉為羽狀複葉。由七乃至十一小葉而成。花白色。為總狀花序。

由皮裏採取樹脂。稱百露拔爾撒謨。治疥癬有效。

Melilotus officinalis Desr.

Lotus corniculatus L.
var. japonicus Kyl.

百脈根（漢）　荳科

百脈根。山野自生。多年生草。高一尺餘。莖細長而傾斜。葉為羽狀複葉。由五小葉合成。基部二小葉為托葉狀。花黃金色。蝶形。實為莢果。

墨里老篤（日）　荳科

墨里老篤。歐洲原產之草本植物。有甘香氣。高二三尺。葉為複葉。合三小葉而成。花小而黃。有蝶形花冠。排列為總狀花序。採其花而乾之。即墨里老篤。草加於煙草有香氣。又為琵布劑用。

Lespedeza juncea *Pers.* var. sericea *Hemsl.*

鐵掃帚（漢）著萩（日）　荳科

鐵掃帚者。山野自生。多年生草。高二三尺。葉互生。為複葉。以三小葉合成。形似倒卵而狹小。花白色。有紫斑紋之蝶形花冠。果實為短莢。

一本凡生二三十莖。莖勁挺可為帚。

Astragalus gummifer *Labill.*

土拉格卡恩土護謨（日）　荳科

產於西里亞及小亞細亞之灌木。葉為羽狀複葉。由四至八對小葉而成。花黃色。每三朶或五朶簇生。

莖間浸出樹脂。乾燥之。即土拉格卡恩土護謨。與亞拉毘亞護謨。有同一之效用。

Robinia pseudacacia L.

洋槐樗樹（中俗）刺槐狗槐（日）荳　科

洋槐。栽培之落葉樹也。托葉變為刺。花開於四五月間。色白。有蝶形花冠。如豌豆狀。排列為總狀花序。具芳香之氣。此樹生長甚速。

材供種種之用。樹皮為染料。

Geranium rosiflorum Fisch.

牻牛兒科

郡內風露（日）

郡內風露者。高山自生之多年生草。高一二尺。葉分裂為掌狀。長柄互生。花甚美麗。呈淡紫赤色。

栽培之為觀賞用。

Geranium yezoense Fr. et Sav.

Geranium nepalense Sweet.

赤沼風露(日)　牻牛兒科

赤沼風露者。山野自生之多年生草也。葉掌狀。或三裂五裂以至七裂者有之。花帶紫色。花冠大於萼數倍。

栽培之供觀賞用。

牻牛兒苗　漢風露草(日)　牻牛兒科

牻牛兒苗。山野自生之多年生草。莖細長有節。蔓延於地上。葉對生。分裂為掌狀。具長葉柄。花五瓣。白色或紅色。每二朶集生。酷似赤沼風露。然其花小。易區別之。

莖葉乾燥之。可供藥用。治痢疾最有效。



酢漿草科

酢漿草（漢）

酢漿草自生於原野之雜草莖伏卧於地葉合三小葉而成為掌狀複葉如浮萍有長柄互生小葉倒心臟形花黃色五瓣果實為蒴熟則綻裂飛散種子

酢漿草科

五斂子羊桃（漢）

五斂子者原產於東印度今閩廣多有之常綠灌木高丈餘葉互生為羽狀複葉合多數小葉而成花完全構造似酢漿草實為漿果大如雞卵色青黃上有五稜作劍脊形果實供食用肉脆軟味酸甘蜜漬甚美

Tropaeolum majus L.

Linum usitatissimum L.

金蓮花科

金蓮花（漢）

金蓮花原產於南亞美利加。今直隸山西等省有之。蔓生草本也。葉圓形。有淺缺刻。背面中部著長柄。花美麗。黃赤色。瓣心鮮紅。萼為合片。有長距。

栽培之為觀賞用。又莖及幼果。供香味料。

亞麻科

亞麻（漢）

亞麻培養植物中之最古者。約五千年前東亞印度及埃及即栽培之。為一年生草。高三尺餘。葉細為披針形。互生。花色青。六七月時開。

莖之纖維可供織物。子可榨油。稱亞麻仁油。又可製印刷用之墨油。及油畫油布之顏料。並可入藥。

Erythroxylon Coca *Linn.*

古加科

古加古柯（拉）

古加者。產於南美毗魯之灌木。高六尺餘。葉互生。為長橢圓形。花小。淡黃色。雌雄異株。

葉稱古加葉。以之製古加乙涅。行小手術時。可注射之。使局部麻醉。



Guajacum officinale *L.*

蒺藜科

癒瘡木（日）

癒瘡木者。西印度原產之常綠樹也。葉為羽狀複葉。由二對或三對之小葉而成。花帶紫藍色。簇生於枝之頂端。

材褐綠色。緻密堅牢。稱之為癒瘡木。供藥用。可治梅毒及流麻質斯等。又其材可作細工用。

Zanthoxylum schinnifolium Sat Z.



Aegle sepiaria DC.

崖椒（漢）　芸香科

崖椒者。自生於山野。為落葉灌木。高五六尺。莖有刺。葉為羽狀複葉。類似於山椒。而小葉數較多。且有細鋸齒。花及果雖亦與山椒同。而惟發惡臭則異耳。

枸橘（漢）　芸香科

枸橘。人家多種之為籬垣。落葉灌木也。高丈餘。多刺。葉合三小葉而成。為掌狀複葉。總葉柄具翅。花五瓣。白色。果實黃色。成球形。內部構造類於柚子。

葉刺橘核及樹皮。俱入藥。

Citrus nobilis *Lour.*
var. microcarpa *Hoasle.*

Phellodendron amurense *Rupr.*

黃柏　黃蘗　蘗木（漢）　芸香科

黃柏。自生於山地。為落葉喬木。內皮色黃。高三四丈。葉為奇數羽狀複葉。小葉背面帶白色。花單性。色黃。雌雄異株。實色黑。大如黃豆。

內皮供染料及藥用。材可作器具。實亦入藥。

金橘　金柑（漢）　芸香科

金橘。一名金柑。產贛浙川廣間。為常綠樹。高六七尺。葉橢圓形或卵形。有透明之小點。葉柄末端有關節。花五瓣。色白。實球形。大如指頭。嫩時色綠。熟則如黃金。故名。

果實味酸甘而芳香。生食蜜漬皆佳。又栽培之可供觀賞用。

Citrus Aurantium L.

Orixa japonica Thunb.

芸香科

香橙（漢）九年母（日）

香橙適於暖地為常綠樹高丈許葉似柑而稍大柄端有節花亦似柑呈白色有香氣果實越歲成熟狀類柑而徑大約二寸許皮厚香烈味酸實可食並作盤中清供栽培之又為觀賞用

芸香科

常山（漢）

常山自生於山野為落葉灌木高五六尺葉橢圓形有透明小點發惡臭甚烈花小淡黃色雌雄異株結實成蒴性有毒莖葉煎汁可截瘧並能殺牛馬孔蟲

Evodia rutaecarpa Benth.

吳茱萸（漢）　芸香科

吳朱萸。處處有之。以產於吳地者為佳。落葉喬木高丈餘。葉為羽狀複葉。小葉橢圓形而厚。對生。花小淡黃色。簇生於莖之頂端。結實纍纍紫赤色。

栽培之為觀賞用。又可為藥用。



Zanthoxylum piperitum DC.

山椒秦椒（漢）花椒（中俗）　芸香科

山椒者。山野自生。落葉灌木。有異香。高丈許。葉互生。羽狀複葉。葉柄旁有二刺。花單性。雌雄異株。實為乾果。熟則色赤裂開。現黑種子。

葉實及莖之皮部。皆為香料。可供食用。材適於櫺木與杖等用。



Citrus bigaradia *Duham.*

Ruta graveolens *L.*

芸香科

臭橙（漢）代代花（中俗）

臭橙者。東印度原產之常綠樹。高丈餘。葉互生。卵形。有透明小點。葉柄具翼。花白色。五花瓣。果實球形。熟則黃赤色。翌年夏變綠色。

果實汁液。榨代醋用。果皮製油。名橙皮油。用為矯臭及矯味藥。或加於水為飲料。採花蒸餾之為橙花油。亦可作矯臭藥或香水。又栽培之為觀賞用。

芸香科

芸香（漢）

芸香。為歐洲南部原產之多年生草。下部為木質。莖高一二尺。葉互生。為羽狀複葉。花黃綠色。六月始開。全部香氣強烈。

葉置書間席下。可辟蠹蟲。樹皮或樹脂。雜諸香焚之。可薰衣祛濕。

Pilocarpus pinnatifolius *Lem.*

Citrus nobilis *Lour.*

芸香科

柑（漢）蜜橘甜橙（中俗）

柑為亞細亞東南部之原產植物。常綠灌木也。高丈餘。葉互生。長卵形。柄端具節。花白色五瓣。果實黃赤色。為扁圓漿果。具特殊香氣。閩中謂之柑。廣東稱甜橙。而以蜜橘為柑。

變種甚多。果實供食用。果皮為香料。製之入藥即陳皮。去皮內白脈曰橘紅。取實內纖維曰橘絡。

芸香科

耶僕蘭日（日）

耶僕蘭日者。南美布拉疾魯原產之灌木。互生羽狀複葉。小葉為全邊。有透明小點。花小而有柄。集生於長花軸。

葉稱為耶僕蘭日葉（Folia jaborandi）用為發汗劑。



Citrus medica L. var. acida Hook.



Citrus medica L. var. Limonum Hook.

芸香科

柚（漢）

柚產於閩廣。為長綠喬木。高丈餘。枝有刺。葉互生。長卵形。葉柄有翅。上端具節。花白色五瓣。果實黃色。為扁圓漿果。皮甚厚。不易剝脫。香氣頗烈。

果皮及花蕾。可為香料。又栽培之為觀賞用。

里木子、宜母子（漢）檸檬（日）芸香科

里木子。為前印度原產之常綠灌木。廣栽培於暖地。葉與花類柑或柚。果實橢圓形。兩端尖。色黃味酸而氣香。

果皮製揮發油。謂之里木子油。又作飲料。謂之檸檬水。肉含強酸味。取汁加石灰漿。製造而得無色結晶。入水易溶。又謂之檸檬酸。

Quassia amara L.

Picrasma quassioides Benn

苦木科

括失亞（拉）

括失亞者產於西印度之常綠樹高約二丈葉為羽狀複葉總葉柄有翅花色赤排列為總狀花序

材即稱為括失亞木入藥則用以健胃味甚苦

苦木科

苦楝子（漢）苦木（日）

苦楝子者自生於山野為落葉樹有苦味高二丈餘葉為奇數羽狀複葉由長卵形之小葉而成花為黃綠色有單性及兩性者

材供器具之用樹皮為染料枝葉煎汁可除植物之害蟲

Boswellia Carterii Bird.

Balsamodendron Myrrha Nees.

橄欖科

乳香（漢）

乳香。產於紅海沿岸。為常綠喬木。高約二丈。葉為羽狀複葉。小葉有鋸齒。花小色白。或淡赤色。

由其莖浸出樹脂而凝固之。稱乳香。為薰物料。又為藥品中最古者之一。膏藥之混和料。尚多用之。

橄欖科

密兒拉（日）

密兒拉者。南部亞拉比亞。及北部亞皮西尼亞。原產之灌木。葉為複葉。通常以三小葉而成。花萼花冠皆四片而小。子房二室或三室。結實為核果。末端尖銳。

由其莖滲出黃乳液。乾之即密兒拉。用於通經藥。健胃藥。及各含嗽料等。

Cedreja chinensis *Juss.*

Melia japonica *Don.*

楝（漢）　楝科

楝者自生於暖地。為落葉樹。高二三丈。葉為重複葉。由多數長卵形之小葉而成。花淡紫色。排列為圓錐花序。果實橢圓形。長五六分。熟則呈黃色。

材供建築及器具之料。又栽培之為觀賞用。

香椿（漢）　楝科

香椿者各地栽培之落葉樹。高三四丈。葉為大形羽狀複葉。嫩時色紅。香甘可食。因名曰香椿。花小色白。結實為蒴果。

嫩芽供食用。材供器具用。又供觀賞。

Swietenia Mahagoni ?

嗎毫蛤尼樹（拉）　楝科

嗎豪蛤尼樹者。產於美洲中央之常綠樹。高八丈餘。葉為偶數羽狀複葉。小葉四對。為卵狀披針形。花序生於葉腋。簇聚多數。與楝花相似。

材供器具之料。

Polygala Rennii *Fr.et Sav.*

柳葉草（日）　遠志科

柳葉草者。自生於山野。為多年生草。高一尺餘。葉形類於柳葉。互生。花黃而不整齊。排列為總狀花序。

地下部可入藥。其效用畧同於遠志。

Polygala japonica Houtt.

Polygala senega L.

攝涅瓦（日）　遠志科

攝涅瓦。為北亞美利加原產之多年生草。高約尺許。葉互生。為披針形。或長卵形。花小色白。排列為穗狀花序。

地下部即攝涅瓦根。供祛痰藥。

遠志（漢）　遠志科

遠志者。山野自生。陝西之綏德。河南之開封產者最多。為常綠草。高七八寸。葉卵形或橢圓形。互生於細莖。花如蝶形。色紫。有不整齊之花冠。

地下部供藥用。富有祛痰之力。



Hevea guianensis Aubl.

巴拉護謨樹（日）彈性護謨樹（日）大戟科

產於南美之熱帶地。美麗喬木也。高六七丈。葉以三小葉而合成為複葉。有長柄互生。花小無花冠。

傷其幹。流出乳液乾之。以製彈性護謨。可供種種之用。今各國所用者。大抵皆由此物採取之也。

Mallotus japonicus Müll. Arg.

赤芽槲（日）　大戟科

赤芽槲。山野自生之落葉樹。高約三丈。以芽帶赤色。故有是名。葉大。為廣卵形。端稍尖。淺裂呈微掌狀。花淡綠色。單性。雌雄異株。

此物多栽於庭園。其材供器具之料。



Aleurites cordata Muell. Arg.

Acalypha australis L

大戟科

罌子桐（漢）

罌子桐。高約二丈。為落葉樹。日本亦多栽之。葉類桐而花為淡紅色。果實球形。含三四枚之種子。由種子榨油。稱為桐油。可塗紙與布等之用。又可製為假漆番漆青等。惟有毒。不能食。材供木屐及其他器具之料。

大戟科

榎木草編笠草（日）

榎木草者。自生於平野之一年生草。高約二尺。葉酷似朴樹之葉。花小。單性。雌雄同株。苞呈編笠狀。位於花序之下。故又稱為編笠草。

Croton Eluteria *Bonn.*

加斯加利刺（日）　大戟科

加斯加利刺。產於西印度。為灌木。高五六尺。葉長卵形而尖。有葉柄。互生。花為單性而形小。雌雄同株。

樹皮即稱為加斯加利刺皮。為健胃藥。又混於煙草。有香氣。

Mallotus philippinensis *Muel. Arg.*

加麻刺（日）　大戟科

加麻刺。產於濠州非律賓東印度等處。為常綠樹。高約二丈。葉卵形。有長柄。互生。花單性。無花冠。雌雄異株。果實為圓蒴。表面有赤褐色粉狀之腺。

此腺即稱加麻刺。入藥能驅除絛蟲。又英國及印度。為赤色染料。

Ricinus communis L.

Phyllanthus Urinaria L.

葉下珠（漢）　大戟科

葉下珠。自生於平地之一年生草。莖長三四寸至六七寸。傾斜。葉互生。為小橢圓形。花細微。生於葉腋。果實形小而扁圓。

蓖麻（漢）唐胡麻（日）　大戟科

蓖麻。為亞非利加原產之一年生草。高六尺餘。葉互生。葉身大。分裂成掌狀。為橢形。著長葉柄。花單性。排列為圓錐花序。雌花位於上部。雄花位於下部。實為裂果。子有黑斑紋。

搾取種子油。稱蓖麻子油。用於緩下劑。或加於印油中。



Euphorbia [illegible]

[illegible]

大戟（漢）　大戟科

大戟者。山野自生。多年生草。高三尺餘。葉互生。呈披針形。有細微鋸齒。花小單性。雌雄皆無花被。生同處。有四片萼狀之總苞圍繞。

有毒之植物也。

彈性護謨樹（日）巴拉護謨樹（日）大戟科

彈性護謨樹者。產於南亞美利加之熱帶地。木本植物。高數十尺。葉為複葉。由三小葉而成。花小單性。

傷其幹。採白色乳樣液。可製彈性護謨。

Croton Tiglium L.



Sapium sebiferum Roxb.

烏臼（漢）　大戟科

烏臼。原產於熱帶亞細亞。我國南方多有之。為落葉喬木。高二丈許。葉廣卵形。端尖。花小。單性。黃白色。種子皮部。含多量脂肪。為肥皂及蠟燭原料。其內仁壓取清油。燃燈尤明。

巴豆（漢）　大戟科

巴豆。今多生於巴蜀。為東印度之原產常綠灌木。高丈許。葉卵形。端尖。基部有二蜜腺。花小。花叢之上部為雄花。下部為雌花。果實之外皮脫薄。乾則裂開。子出。子可榨油。謂之巴豆油。此油內用之為激烈之瀉下劑。外用之為皮膚之引赤藥。

Daphniphyllum macropodum Miq.

Empetrum nigrum L.

交讓木（漢）石呆樹（俗）　大戟科

交讓木都自生於山地。為長綠樹。高丈餘。葉長橢圓形。互生。質厚有光澤。下面綠。背具白色之蠟質。柄赤。花小。單性。為總狀花序。雌雄異株。果實橢圓形。大三分許。色黑。新葉出後。舊葉凋落。故有交讓之名。

岩高蘭（漢）　岩高蘭科

岩高蘭。自生於亞細亞歐羅巴及北美之高山。為常綠小灌木。莖卧地。葉小為線形。密生於莖。花單性。雌雄異株。果實黑色。如豌豆大。為漿果樣之核果。有甘味。

栽培之為觀賞用。又果實供食用。



Coriaria japonica A. Gr.

木本黃精葉鉤吻（漢）毒空木（日）毒空木科

木本黃精葉鉤吻。自生於山野。為落葉灌木。高四五尺。葉對生。長卵形而尖。無葉柄。有三大脈。花單性。雌雄異株。亦有同株者。果實赤色。甚美麗。其肉部即生長花瓣。

有毒植物。果實特含猛性。

Rhus vernicifera DC.

漆樹（漢）　漆樹科

漆樹。產於湘鄂皖浙諸省。為落葉樹。有雄株雌株之別。高約三丈。葉為羽狀複葉。小葉卵形或橢圓形而尖。有全邊。花小黃色。排列為圓錐花序。果實小而扁圓。無毛。

皮內樹脂即漆。可塗物。漆觸空氣酸化變黑色。實可取蠟。供蠟燭用。材可作器具。



Rhus Toxicodendron L.
var. radicans Mig.

Pistacia lentiscus L.

漆樹科

野葛（漢）蔦漆（日）

野葛者。自生於山地。蔓生之木質性植物也。莖細長。自氣根而上昇。葉互生。以三小葉合成。花及果實皆似漆樹。

植物之有毒者。

漆樹科

乳香（漢）

乳香。為歐洲南部原產之常綠樹。生於紅海沿岸。高約一丈五尺。葉偶數羽狀複葉。小葉長卵形。花小單性。色白。由莖浸出樹脂而凝固之。稱乳香。溶於酒精或松香油中。可造為假漆。以溶於強酒精者填充齒穴。又嚙乳香。則有強齒之效。又可用為薰香之料。

Rhus semi-alata *Murr.*
var. Osbeckii *DC*

鹽膚木（漢）　漆樹科

鹽膚木。山野自生。落葉樹。高丈餘。葉為奇數羽狀複葉。由長卵形之小葉而成。總葉柄具翼。花小色白。排列為圓錐花序。實為核果。密生白毛。熟則外附白粉。

材為小細工資料。樹皮為染料。葉上有蟲巢成瘤狀。謂之五倍子。亦可為染料。

Rhus succedanea *L.*

黃櫨（漢）　漆樹科

黃櫨。多產於豫蜀等省。為落葉樹。高丈餘。葉為奇數羽狀複葉。有光澤。成於長卵形之小葉。花小單性。雌雄異株。果實小而扁圓且堅。

果實可採蠟。材為小細工料。又栽培之供觀賞用。

Mangifera indica L.

Rhus trichocarpa Miq.

漆樹科

嗎恩孤樹（日）

嗎恩孤樹。為東印度原產之常綠樹。高數丈。葉互生。質厚。為廣披針形。花小黃色。排列成圓錐花序。實為核果。熟則變黃。長四五寸。

實供食用。熱帶果實中美味之一也。

漆樹科

山漆（日）

山漆。自生於日本之山地。為落葉喬木。高約三丈。葉為羽狀複葉。有毛。小葉長卵形或長橢圓形。端尖。通常有全邊。花小黃色。排列成圓錐花序。果實小而扁圓。密生硬毛。

其效用畧與漆樹同。

圓葉落霜紅（日）　冬青科

圓葉落霜紅。自生於山地。落葉喬木。高四丈。樹皮灰白色。稍帶綠。葉卵形。有鋸齒。時或叢生。花色白。集生於葉腋。實為球形漿果。色赤。

材充車物細工之用。嫩葉可食。並為茶之代用品。

犬黃楊（日）　冬青科

犬黃楊者。山野自生。為常綠樹。多灌木狀。然有高達二丈五尺者。葉橢圓形或倒卵形。而厚。長約六七分。花小色白。果實小而圓。色黑。

栽培於庭園。供觀賞用。材可為圖版梳篦及他器具料。



Ilex Sieboldi *Miq.*

Ilex pedunculosa *Miq.*

落霜紅（漢）　冬青科

落霜紅。自生於山地。為落葉灌木。高丈餘。葉為卵形。有鋸齒。花小而色白。果實小球形。赤色者多。白色者少。

栽培於庭園。供觀賞用。

冬青（漢）　冬青科

冬青者。自生於山地。為常綠樹。高二三丈。葉互生。為卵形。全邊而尖。質厚有光澤。花小色白。畧黃。為單性。雌雄異株。實如小豆大。赤色。

材為器具薪炭料。葉煎汁為褐色染料。

又栽培之為觀賞用。



Ilex latifolia *Thunb.*

Ilex paraguayensis *Lamb.*

波羅樹（漢）多羅葉（日）　冬青科

波羅樹。原植於廣州南海廟中。他處所有。皆從此分出。為常綠喬木。高二三丈。葉互生。為長橢圓形。質厚有鋸齒。花簇生而小。淡綠色。果實色赤。為橢圓形。

栽培之為觀賞用。材可為車輿等物細工。樹皮可製靠。葉可為茶之代用品。

巴拉辯阿以茶（日）　冬青科

巴拉辯阿以茶。南美巴拉辯阿以原產之常綠樹。高約三丈許。葉長橢圓形或長卵形。有鋸齒。花小色白。排列為有限花序。生於葉腋。

其葉如茶。可供飲料。亦含茶素（Theine）

Ilex integra *Thunb.*

Euonymus alatus *K. Koch.*
var. subtriflora *Prod. Sav.*

黐木（日）　冬青科

黐木者。自生於山野。為常綠樹。高二三丈。葉互生。為長橢圓形。質厚有光澤。花小。單性。有白色之花冠。雌雄異株。實球形漿果。色赤。

材為車物細工。及印版之料。莖之內皮可製鳥黐。又栽培之為觀賞用。

小桃葉衛矛（漢）　衛矛科

小桃葉衛矛者。山野自生之落葉樹。高丈許。葉對生。橢圓形。有鋸齒。花淡綠色四瓣。排列為聚繖花序。實為乾果。裂開現假種皮。子帶紅色。

栽培之為觀賞用。材可作細工。樹皮為紙料。嫩葉可食。

Celastrus articulatus *Thunb.*



Euonymus oxyphylla *Miq.*

衛矛科

釣花（日）

釣花者。山地自生之灌木。高七八尺。葉對生。橢圓形。有鋸齒。花小。淡綠色。排列為聚繖花序。果實為球形乾果。裂開現被包種子。

栽培之為觀賞用。

衛矛科

蔓梅擬（日）

蔓梅擬者。山野自生之落葉灌木。莖細長。生多數之傾斜枝。葉互生。橢圓形。有鋸齒。花小。淡綠色。實為球形乾果。色黃。裂開現黃赤色被包種子。

栽培之為觀賞用。

Euonymus japonica Thunb.
var. radicans Miq.

扶芳藤（漢）　衛矛科

扶芳藤。自生於山野。蔓生常綠之木質植物也。莖以細短之氣根。上昇於他物。葉對生。為橢圓形。有鋸齒。花小。黃綠色。排列為聚繖花序。

栽培之為觀賞用。



Euonymus alatus K. Koch.

衛矛（漢）　衛矛科

衛矛者。自生於山野。為落葉樹。高約丈許。莖有刺狀突起。葉對生。為橢圓形。有鋸齒。花小。黃綠色。排列為聚繖花序。實為裂果。現赤色被包種子。

材為小細工料。樹皮為紙料。又栽培之為觀賞用。

Euonymus japonica Thunb.

Euonymus europaeus L.

柾（中俗）　衛矛科

柾者。栽培於庭園之常綠樹。高丈餘。葉稍圓形。有光澤。對生。花小色白。觀賞用。並栽植之為藩籬。

桃葉衛矛（漢）　衛矛科

桃葉衛矛者。山地自生之落葉樹。高丈餘。葉對生。長稍圓形。或長卵形。端尖。有鋸齒。花小色白。排列為聚繖花序。材為器具料。又可為觀賞用。

Acer purpurascens *Fruit Sur.*

Acer palmatum. *Thunb.*

構槭樹（日）　槭樹科

構槭樹者。山地自生之落葉樹。高約二三丈。葉掌狀五裂。淡綠色。花序皆由側芽而生。著赤色之花。

栽培之為觀賞用。又為器具薪炭等料。

槭樹（漢）　槭樹科

槭樹。自生於山地。為落葉喬木。高數丈。葉分裂為掌狀。以葉柄對生。經霜而丹。性與楓類。花小。紫色。藥亦帶紫。實為乾果。不裂開。有二翅。

材供器具之料。又栽培之為觀賞用。

Acer saccharinum L.

Aesculus turbinata Bl.

砂糖楓（日）　槭樹科

砂糖楓。北美原產之落葉喬木。高約四丈。葉三裂或五裂。背有白色細毛。花黃綠色。無花瓣。果實與槭樹相似。

莖之汁液。可製砂糖。材可為器具料。

七葉樹（漢）　杤橡（日）　七葉樹科

七葉樹者。自生於山地。為落葉喬木。高四五丈。葉對生。掌狀複葉。小葉形大。而其數為七。花有稍不整齊之瓣。色白而畧帶淡紅。為圓錐花序。實為裂果。含大形種子。子可食。材堅緻可為器具。

Sapindus Mukurosi Gaertn.

無患子科

無患子（漢）

無患子。栽培於庭園。為落葉樹。高二丈餘。葉互生。為偶數羽狀複葉。小葉皆長卵形。花小黃色。排列為圓錐花序。實球形。有堅果皮。中含一子。色黑。

材供器具料。果皮煎汁為洗濯用。子可為念珠。日人又以其球果為鍵子。



Nephelium Longana Camb.

無患子科

龍眼（漢）桂圓（中俗）

龍眼。產於閩廣。又以出福建興化者最良。為常綠喬木。高數丈。葉為羽狀複葉。花五瓣。色白。果實圓如彈丸。外被剛毛。子具假種皮。肉白如荔枝。味甘。鮮乾皆可食。（參照荔枝圖）

Nephelium Litchi Camb.

無患子科

荔枝（漢）

荔枝。產於閩粵四川亦有之。為常綠喬木。高三四丈。葉為羽狀複葉。小葉銳頭。有透明之點。花無瓣。果實被以鱗片。種子肉質。有假種皮。色白。味甘多汁。

為果品之美味者。

（上圖係荔枝果實下圖係龍眼果實）

Melicoccus myrianthus Sol. Z.

泡吹科

泡吹（日）

泡吹者。山地自生之落葉樹也。高約四丈。此材著火則生泡。故名。葉類似於栗。而面形較廣。花小色白。集為圓錐序。

材供造車等細工之料。

泡吹科

清風藤（漢）

清風藤。生台州天台山中。木質之蔓生植物。幼莖呈綠色。葉卵形。秋至則脫落。惟葉柄宿存為針狀。花黃色。生於葉腋。

栽培之供觀賞用。又可入藥。愈風疾。

鳳仙花（漢）指甲桃（中俗）鳳仙花科

鳳仙花。原產於東印度。今人家多植之。為一年生草。高尺餘。葉長橢圓形或廣披針形。互生。花生於葉腋。不整齊。有紅紫白等色。實為裂果。熟則裂開子散。婦孺多以花染指甲。故亦稱指甲花。

花可為紅色染料。

Berchemia racemosa S. et Z.

熊柳（日）　鼠李科

熊柳。多生於山地。為落葉喬木。高丈餘。葉互生。為橢圓形或卵形。花小色白。排列為圓錐花序。

供燃薪料。

Rhamnus japonicus Maxim.
Var gemina Maxim.

鼠李（漢）　鼠李科

鼠李。自生於山野。為落葉喬木。高丈許。枝梢有針。葉互生。為橢圓形。花小。為淡黃微綠色。果實大如小豆而黑。

入藥為瀉劑。實之嫩者。取汁可染綠色。

其材為薪炭料。



Hovenia dulcis *Thunb.*

Zizyphus vulgaris *Lam.*
Var. inermis *Bge.*

鼠李科

枳椇（漢）

枳椇生於山野之落葉喬木。高三四丈。葉互生。卵形。有三大脈。花小色白。果實具肥大之肉質。柄畧如雞爪。故俗稱雞爪子。味甘如蜜。

材可為器具料。果實之柄供食用。

鼠李科

棗（漢）

棗有南北二種。北棗產於直隸山東等省。南棗產於浙江金華。為落葉喬木。高二丈餘。葉互生。卵形。花小黃綠色。實為核果。熟則呈赤褐色。

北棗南棗。俱供食用。

Parthenocissus tricuspidata Pl.



Vitis Thunbergii Sieb. & Z.

葡萄科

蘡薁（漢）

蘡薁。山野自生。為蔓生植物。以卷鬚纏絡於高樹。葉掌狀。背面密生白色之毛。花小。黃綠色。結紫黑色之球形小漿果。此物酷似山葡萄。以其葉小而異之。實可食。味酸。詩。六月食薁。即此。

地錦（漢）爬山虎（俗）爲夏爲（日）葡萄科

地錦。田野階砌間皆有之。多年生之蔓生植物。莖具吸盤之卷鬚。上絡於他物。葉互生。分裂為掌狀。花小。黃綠色。集生於葉腋。結實成球形。為黑漿果。味辛。

栽培之為觀賞用。葉至秋呈美紅色。漸乃脫落。

Ampelopsis heterophylla Sieb. et Z.



Cissus japonica Willd.

蛇葡萄（漢）　葡萄科

蛇葡萄者。山野自生。多年生之蔓草。莖以卷鬚纏絡於他物。葉分裂為掌狀。以長葉柄而互生。花小。有黃綠色五花瓣。實為球形漿果。青藍色。不可食。

烏斂莓（漢）老鴉眼（中俗）　葡萄科

烏斂莓。山野自生。蔓生之雜草。莖以卷鬚而纏絡於他物。葉互生。為掌狀複葉。以五小葉分歧而成。花小。黃綠色。四瓣。排列為聚繖花序。頂平。

根莖可入藥。



Vitis vinifera L.

葡萄科

葡萄（漢）

葡萄。原產於西域。今我國皆栽植之。而北方尤多。蔓生之木質植物也。莖以卷鬚上升於他物。葉互生。分裂成掌狀。幼時有棉狀之毛。花小。淡綠色。生於葉腋。列為圓錐花序。花瓣不開而落。實為漿果。紫綠色。果實甘美可食。又可釀酒。惟其植物變種頗多。



Corchoropsis crenata Sieb. Z.

田麻科

田麻（漢）

田麻。自生於原野。為雜草。高二三尺。葉為卵形。互生。花生於葉腋。有黃色之五花瓣。實為細長蒴果。

Tilia cordata *Mill.*
var. japonica *Miq.*

科木（日）　田麻科

科木者。自生於山地之落葉樹。高二三丈。葉為心臟形而尖。有鋸齒。以長柄互生。花黃白色。有香氣。花枝出於細葉狀苞之中央。

材為器具及薪炭料。樹皮可作繩絲等。



Corchorus capsularis *L.*

黃麻（漢）　田麻科

黃麻。多產於北地。今江浙亦有植之者。為一年生草。高五六尺。葉互生。為長卵形。端尖。花生於葉腋。黃色五瓣而小。

剝莖之皮。取其纖維。可製繩袋及地毡等用。

Tilia Miqueliana *Maxim.*

菩提樹（日）　田麻科

菩提樹產於日本者。與我國種類不同。此為落葉樹。高丈餘。葉互生。為不等邊之心臟形。有鋸齒。背面密生白色之毛。花序生於葉狀細長苞中。花淡黃白色。

栽培於庭園。為觀賞用。莖之皮部。可採取纖維。



Althaea officinalis *L.*

亞爾答亞（拉）　錦葵科

亞爾答亞。歐羅巴及亞細亞北部產之。為多年生草。全部有粗毛。葉為卵形。或心臟形。三裂。花大。淡紅色。集生於葉腋。

根可入藥內用。於呼吸器病。為鎮咳之劑。

Abutilon Theophrasti *Medic.*



Abutilon megapotamicum *St. Hilaire Nomb.*

苘麻（漢）

錦葵科

苘麻。一作蕢麻。即白麻。田園栽植之。為一年生草。高五六尺。葉圓。為心臟形。端尖。有長柄。花小。色黃。生於葉腋。果實由多數輪生之雌蕊而成。熟則乾燥裂開。子扁黑。

莖輕虛潔白。採其纖維。可作繩。亦織為布。類於麻絲。但其質脆弱。根及子俱入藥。

阿不起羅米格哀波塔米苦母（拉）

錦葵科

熱帶原產之小灌木。高三四尺。葉長卵形。端甚尖。花色紅而美麗。雄蕊及雌蕊甚長。俱突出於花冠之外。

栽培之為觀賞用。

Malva sylvestris L.

錦葵（漢）錢葵（日）　錦葵科

錦葵。為歐洲原產之越年生草。或多年生草。高二三尺。葉淺裂為掌狀。有長柄。互生。花淡紫色。瓣有深紫色線紋數條。栽培之為觀賞用。

Althaea rosea Cav.

蜀葵（漢）　錦葵科

蜀葵。自生於歐羅巴之東南部。為越年生草。高五六尺。葉互生。畧似心臟形。五裂至七裂。花大。梗短。有紅紫白等色。亦有重瓣者。頗美麗。栽培之為觀賞用。



Hibiscus Manihot L.

Hibiscus mutabilis L.

錦葵科

黃蜀葵（漢）

黃蜀葵。俗名秋葵。栽培於園圃。為越年生草。高三四尺。有肥大之長根。葉互生。深裂成掌狀。花大如盌。五瓣。黃色。結實如姆指大。長二寸許。熟則色黑。

栽培之為觀賞用。又其根之粘液。可供製紙之糊料。

錦葵科

木芙蓉（漢）

木芙蓉。我國原產之落葉灌木。高三四尺。葉淺裂成掌狀。長柄。互生。花大。生於葉腋。花冠美麗。有紅白等色。

栽培之為觀賞用。取樹皮之纖維。可作蓑衣。

Hibiscus syriacus L.

木槿（漢）　錦葵科

木槿。栽培於庭園。為落葉灌木。高七八尺。葉互生。為卵形。三裂。花開於夏秋之交。有紫紅白等色之瓣。朝開暮落。人家多種之。以為藩籬。或觀賞用。莖之內皮可取纖維。閩之汀洲人取其花拌麪煎食。因呼為麵花。

Hibiscus coccineus Walt.

紅葉葵（日）　錦葵科

紅葉葵。北美原產之多年生草。高六七尺。葉互生。深裂為掌狀。具長柄。花有紅色之大瓣五。栽培之為觀賞用。

Gossypium herbaceum L.

Adansonia digitata L.

錦葵科

草棉（漢）

草棉原產於印度唐時始入中國一年生草高二三尺葉分裂成掌狀長柄互生花黃色五瓣實為裂果種子外被白色長毛俗呼為棉花

草棉為織物之大宗子可榨油供燈及他用其渣滓搗成花餅為飼牛及肥田之料

木棉科

拔惡拔勃（日）

熱帶非洲原產之常綠樹高六丈餘幹之直徑約二丈五尺葉掌狀花大色白每葉腋生一花結實細長質似蒲蘆之果

果皮可為水及酒等之容器果實之髓末美可食樹皮纖維可作織物嫩葉可食長成之葉可葺屋樹皮入藥為解熱劑葉內服為防汗劑此樹壽命最長可經五千年之久



Ceiba pentandra Gaertn.

Sterculia platanifolia L.

木棉科

木棉（漢）

木棉產於閩廣熱地。為常綠樹。高者七八丈。莖帶刺。葉為掌狀複葉。由五小葉而成。花白色。結長形之實。中有白色軟毛。隨風飛散。狀如柳絮。

木棉可作裀褥。不能紡織。

梧桐科

梧桐（漢）青桐（日）

梧桐栽培於庭園中。為落葉喬木。高三丈許。幹枝色綠。葉濶大。掌狀。互生。背有毛。花小黃色。單性。雌雄同株。果為蓇葖。熟則裂開為葉狀。緣部附有種子。

栽培之為觀賞用。其材可製器具。子可食。樹皮可取油。含多量粘液。富於收斂性。



Theobroma Cacao L.

加加阿木（日）考考凹木（日）喬考來島木（日）梧桐科加加阿木。自生於美洲熱帶。他熱帶亦栽培之。為常綠樹高一丈餘。葉橢圓形而尖。花赤色。果實亦橢圓形長三寸餘。有肉質果皮。含多數種子。炒去種皮。碎仁為粉末。加同量砂糖。及少量瓦尼拉黃色素。稱喬考來島。以之製果子。可溶於湯為飲料。炒種子全部或仁為粉末。稱考考凹。可加白糖牛乳澱粉等。亦溶於湯為飲料。

獼猴桃（漢）

獼猴桃科

獼猴桃。山地自生。為蔓生落葉灌木。葉互生。橢圓形。或心臟形。而尖。質堅有光澤。花開於五六月。瓣色白。藥帶黑色。果實橢圓形。熟則多汁。味甘酸。

果實可生食。樹皮可編為繩。而用以繫筏。切其莖以滴出之樹液。飲之可止渴。材有多數細孔。外觀甚雅。橫斷之可為茶瓶飾物。

Eurya ochnacea Szysz.



Actinidia polygama Miq.

獼猴科

木天蓼（漢）

木天蓼。山野自生。蔓狀之落葉灌木。葉互生。橢圓形而尖。恒變為白色花。開於五六月。五瓣色白。畧似梅花。故有夏梅之名。實大如指頭而尖。

果實可生食。亦可以鹽漬之。味辛。嫩葉並供食用。材之構造及效用同獼猴桃。莖可供束物。此植物甚為猫所喜玩。亦所喜食。

山茶科

楊桐（漢）榊（日）

楊桐。自生於暖地。又栽培於庭園。為常綠樹。高三丈餘。葉全邊。質厚有光澤。互生。花色白而小。五六月始開。萼瓣俱五片。雄蕊多數。雌蕊一體。實為球形。熟則變為黑色。含濃紫色之汁液。

有細葉長葉圓葉等種類。日本古來植之於神社。採其枝以供於神前。或懸白紙於枝。稱為玉串。用以祭神。故名為榊。

Thea Sasanqua *Nois.*



Thea sinensis *L.*

山茶科

茶梅（漢）

茶梅。暖地自產之常綠樹。諸部之形。雖似山茶。而幼莖及子房。皆密生毛。且葉小。花美麗。開於十一月之間。

變種甚多。其花有淡紅白斑。及單瓣重瓣等之別。材及種子油之効用。概同於山茶。

山茶科

茶茗（漢）

茶。亦稱茗。江淮以南諸省皆產之。為常綠灌木。高五六尺。葉長橢圓形。有鋸齒。花開於九十月。色白。有梗。果實扁圓。三稜形。熟則裂開。現出種子。

葉可烹為飲料。種類不一。製法亦異。大別為紅茶綠茶兩種。本為我國特產。今則日本印度亦有種之者。其材緻密而堅。適於雕刻。可作紐飾等物。

Stewartia pseudocamellia *Maxim.*



Thea japonica *Nois.*

山茶（漢）椿（日）　山茶科

山茶。產於南方各省。雲南尤著名。常綠喬木也。高二丈餘。莖平滑無毛。葉長橢圓形。端尖。質厚有光澤。花大而美麗。自十月開至二月。子房平滑。變種甚多。花有大小紅白斑單瓣重瓣之別。日本稱為名花。輸出於歐美諸國。為觀賞用。材為挽物細工原料。及農具工具之柄。子可榨油為烹食點燈防銹理髮及製漆油等用。

夏椿（日）　山茶科

夏椿。自生於山地。為落葉樹。高約二丈。樹皮平滑。赤褐色。葉互生。為橢圓形。花開於六月。色白似山茶。故有夏椿之名。萼具細毛。存於果實基部。不隨花脫落。實如珠而頂尖。熟則裂開散布種子。

栽培於庭園為觀賞用。其材堅實。可為農具工具之柄。或為挽物細工原料。



Eurya japonica *Thunb.*

Stewartia monadelpha *S. et Z.*

山茶科

柃（日）

柃者。山野自生之常綠樹。高丈餘。葉卵形。或倒卵形。有鋸齒。緣邊不外反。花小紫白色。單性。雌雄異株。果實黑色。為球形。變種有圓葉長葉細葉斑葉及果實白色等之別。可代用為楊桐。供於神前。木灰汁為染物之媒料。日本九州名之為灰汁柴。其材可為細小工用。

山茶科

小夏椿（日）

小夏椿。山地自生之落葉喬木。高三丈。樹皮平滑。赤褐色。各部頗類夏椿。惟葉及花果皆小。其葉為橢圓形。互生。花開於五六月間。色白。花梗上部。對生二大苞。植於庭園。供觀賞。材為床柱及挽物細工原料。又製為木炭。最適於磨漆器及他物。



Taonaba japonica *Szysz.*

Hypericum erectum *Thunb.*

厚皮香（漢）　山茶科

厚皮香。自生於暖地。為常綠樹。高二三丈。葉全邊。質厚。長二寸餘。互生於枝梢。花白色。有長梗。實小。為球形。永存萼。至冬成熟。果皮甚厚。色紅。裂開則種子外露。

栽培於庭園。為觀賞用。材堅緻。可為梳櫛及文房具床柱等。或為鏇作原料。樹皮為茶褐色染料。

小連翹（漢）　金絲桃科

小連翹。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉為長卵形。無柄而對生。有黑小點。花黃色五瓣。瓣具黑色小點。雄蕊數個。分為三束。

採其上部。可為金創及打傷之藥。



Hypericum patulum Thunb.

金絲梅（海）　金絲桃科

金絲梅。山地自生。又栽培於庭園。為小灌木。高三四尺。類金絲桃。然金絲桃葉無腺點。雄蕊長。花柱末端分離。此則葉有腺點。雄蕊短。花柱離生。以此別之。其花色黃。果實裂開。散多數種子。供觀賞用。

Garcinia mœlla Desv.

藤黃海藤（漢）　金絲桃科

藤黃。即海藤。產東印度及暹羅等處。為落葉喬木。高五六丈。葉對生。橢圓形。花單性。結漿果。

以刀斫樹皮。浸水中。滲出黃色樹脂。即稱藤黃。可入藥。並用為繪具顏料。然有毒。著色於食品。足以致死。繪畫時如口吮其筆。則舌腐爛。

Mesua ferrea L.

鐵刀木（漢）　金絲桃科

鐵刀木。為東印度原產之平滑大木。有直立之幹。葉對生。為狹披針形。質厚有光澤。花大。白色。四瓣。有多數之雄蕊。材以其質堅著名。蕾以其香氣強烈而賞用之。



Hypericum Ascyron L.

巴草（日）　金絲桃科

巴草者。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉對生。廣披針形。無葉柄。花大。有黃色之五花瓣。具五色雄蕊。甚為美麗。栽培之為觀賞用。

Hypericum chinense L.

金絲桃科

金絲桃（漢）

金絲桃栽培於庭園。為小灌木。高三四尺。以一株而叢生多數。細莖葉對生。長橢圓形。全邊無柄。花濃黃色。雄蕊多數。敷散花外如金絲。然其基部合著為五體。雌蕊為一體。具五柱頭。實為裂果。裂則散出多數種子。

觀賞用之植物。

Garcinia mangostana L.

金絲桃科

嗎恩孤斯他恩（拉）

此植物為麻拉格原產之常綠樹。高約二丈。葉卵形。長約六寸許。花似薔薇。每朵單生於花軸。實為球形。徑約二寸。果肉富於汁液。有芳香味美。

此為美味果實中之一。絕無有害成分。不論如何病者。皆可食之。又形態甚美。足供觀賞。

Dryobalanops camphora Colebr.



Shorea robusta Roxb.

婆羅樹。婆羅雙樹（漢）　龍腦香科

婆羅樹。東印度原產之喬木。高十餘丈。葉平滑。長卵形。端尖。花有淡黃花瓣。排列為圓錐花序。

材為建築及器具料。在東印度為次於起苦樹之重要植物。又樹脂為瀝青之代用。

龍腦（漢）　龍腦香科

龍腦一名龍腦香。產於閩廣及婆羅洲蘇門答臘等處。為常綠喬木。高十餘丈。葉卵形。全邊而尖。有托葉。花有佳香。萼生長於花後。果實含一種子。

取龍腦之結晶。供於藥用。謂之冰片。又曰梅片。吾國甚貴重之。

Tamarix chinensis Lour.

御柳檉柳（漢）紅荊條（俗）　檉柳科

御柳。即檉柳。一名觀音柳。又俗稱西湖柳。為落葉亞喬木。高丈餘。枝細長。密生小鱗狀之葉。夏月由枝梢出花軸。著淡紅色小花。至秋又開。其特性然也。

栽培之為觀賞用。

Viola hirta L. var. japonica Maxim.

葵堇（日）　堇菜科

葵堇者。自生於山野之多年生草。葉圓。為心臟形。密生細毛。有長柄。花分二種。一紫青色。開於地上。一在地中不開。而結果實。

栽培之供觀賞用。

Viola tricolor L.

三色堇（日）蝴蝶堇（日）　堇菜科

三色堇者。歐洲原產之草本植物。高七八寸。葉有托。托復分裂為羽狀。花通常有三色之瓣。

變種甚多。栽培之為觀賞用。

Viola Patrinii DC. var. typica Maxim.

白花堇（日）　堇菜科

白花堇。自生於山野。為多年生草。高三四寸。葉長卵形。或長橢圓形。有長柄。叢生。花莖生於葉叢中間。莖端著一花。有白色不整齊之瓣五。其一瓣特生長距。近似於紫花地丁。而花色白。

栽培之供觀賞用。

Viola Patrinii DC.
var. chinensis Gray.

Viola silvestris Kit.
var. cryptocerus A. Gr.

紫花地丁（漢）堇（日）　堇菜科

紫花地丁。自生於山野。為多年生草。高三四寸。葉長卵形。或長橢圓形。有長柄叢生。花莖生於葉叢中。頂著一花。花青紫色。有不整齊之五花瓣。中一瓣有長距。人家多栽之。供觀賞用。

立壺堇（日）　堇菜科

立壺堇。自生於山野。為多年生草。莖匍匐於地上。葉為圓心臟形。有鋸齒。分裂為羽狀之托葉。花青紫色。有不整齊之五花瓣。而一瓣具細長之距。

Viola verecunda A. Gr.



Viola odorata L.

堇菜科

堇菜（漢）

堇菜。一名旱芹。山野自生之雜草。莖細長。匍匐於地上。葉為圓心臟形。有長柄。柄之基部。具細小不分裂之托葉。花白色。略帶青紫。五瓣不整齊。中一瓣有短距。莖葉味苦。瀹之則甘而滑。可充蔬食。

堇菜科

匂堇（日）

匂堇。歐洲原產之多年生草。葉呈圓心臟形。叢生於根狀之莖。花有青白等色。時吐芳香。

栽培之為觀賞用。其花可製香水。浸出之汁。又可代用於里篤麻斯液。

Idesia polycarpa *Maxim.*

Stachyurus praecox *Sieb. Z.*

椅（漢）　椅科

椅。自生於山野。又栽培於庭園。為落葉喬木。高約二丈餘。葉為心臟形。緣邊有鋸齒。花由枝頭出軸。著生數十朵。雌雄異株。實為球形。色赤。纍纍下垂。似南天竹。落葉後殊呈美觀。

材可為細巧之器。

旌節花（漢）　旌節花科

旌節花。山地自生之落葉灌木。高丈許。葉橢圓形而尖。有鋸齒。花軸二三寸。簇生短花梗。花開於未出葉之先。花瓣黃色。果實球形。熟則現黑色。

此物多移植於庭園。而山間則又多用為薪柴。

Carica papaya L.

蕃瓜樹萬壽果（漢）　蕃瓜樹科

蕃瓜樹產於熱帶之落葉喬木。高二丈餘。葉大分裂成掌狀。果實多汁。形似甜瓜。實可食用。汁葉為驅蟲及防腐劑。全部含乳狀液。有變化蛋白質為百弗頓之作用。未熟之果實中。其汁液之作用力更強。故以此汁液煮肉類能使其肉易於柔軟。



Begonia Evansiana Andr.

秋海棠（漢）　秋海棠科

秋海棠栽培於庭園。為多年生草。莖色微紅。高二尺餘。葉為心臟形。而尖中肋之兩側成不等形。花單性。色粉紅。雌雄同株。供觀賞用。莖有酸味。

Cereus multiplex *Pfeiff.*

開來吳司麻路題捕來可司(拉)仙人頭(中俗)　仙人掌科

美洲中央原產之多年生植物。莖色綠。稍圓形。通常有十三縱行稜。稜上叢生針。花淡紅色。生於莖之側面。

栽培之爲觀賞用。

Epiphyllum truncatum *Haw.*

蟹仙人掌(日)　仙人掌科

蟹仙人掌。勃拉日魯原產之多年生植物。枝扁平色綠。呈葉狀。頂開淡紅色之大花。

栽培之爲觀賞用。

Daphne pseudo-mezereum A.Gr.

Wikstroemia sikokianum Frxt Sav.

夏坊主鬼縛（日）　瑞香科

夏坊主者。山野自生之小灌木。高三尺餘。葉至冬季。著生於莖。夏至則脫落。花淡綠白色。狀似瑞香。果實橢圓形。色赤而美麗。栽培之為觀賞用。樹皮之纖維。可為紙料。又含有毒成分。

雁皮（日）　瑞香科

雁皮我國謂之密蒙花。產於日本暖地。為落葉灌木。高者一丈五尺。葉卵形有毛。互生。花小。集生於莖之頂端。有四裂之花冠狀萼。萼之裂片呈黃色。其筒部為白色。密生毛。

樹皮纖維。為製紙原料。日本之薄葉紙即考卑紙。純以此皮製之。

Aquilaria Agallocha *Roxb.*

沉香（漢）伽羅（日）　瑞香科

沉香。產於東印度。爲常綠亞喬木。高數丈。葉爲披針形。或倒披針形。互生。花色白。排裂爲繖形花序。

材可爲香料。最著名。

Wikstroemia Ganpi *Maxim.*

小雁皮。犬雁皮（日）　瑞香科

小雁皮。山野自生。落葉之小灌木。高二三尺。葉爲卵形。而互生。花小。有紅色之筒狀萼。

樹皮爲紙料。



Daphne Genkwa S. et Z.



Daphne odora Thunb.

瑞香（漢）　瑞香科

瑞香。我國原產常綠之小灌木。高四五尺。枝葉繁茂。葉長橢圓形。質厚有光澤。花紅紫色或白色。為合片萼。頗美麗。香氣清遠。栽培於庭園。供觀賞用。

芫花（漢）　瑞香科

芫花。栽培於庭園之落葉灌木。高三四尺。葉橢圓形。全邊而小。花具紫筒狀之萼。節節密生。開於葉未發之前。性有毒。漁者煮之以投水中。魚死而浮出。故又名毒魚。入藥為消痰去水之劑。

Edgeworthia chrysantha *Lindl.*

結香黃瑞香(漢)三股(日)　瑞香科

結香。自生於希馬拉亞山。我國各處亦栽培之。為落葉小灌木。高六七尺。莖通常為三叉狀分枝。葉互生。呈廣披針形。花有黃筒狀萼。排列為頭狀花序。枝柔韌可縮結。故以為名。

莖皮之纖維可製紙。



Elaeagnus umbellata *Thunb.*

秋胡頹子(日)　胡頹子科

秋胡頹子。山野自生之落葉樹。高丈餘。葉呈卵形。有淡褐銀色之細鱗。幼莖亦具此細鱗。花小。白色。集生於葉腋。果實畧成球形。色亦。其細鱗亦銀色。

實可供食用。

Elaeagnus longipes A. Gr.

Elaeagnus pungens Thunb.

胡頹子科

木半夏（漢）

木半夏。自生於山野。為落葉灌木。高八九尺。葉長橢圓形。或長卵形。密生銀色之鱗。花具白色之合片萼。每一葉腋只生一花。有長梗。實為漿果。赤色橢圓形。果實味甘酸微澀。可食。

胡頹子科

胡頹子（漢）

胡頹子。栽培於庭園。為常綠灌木。高丈餘。葉橢圓形。厚而深綠。背密生褐色及銀色之鱗。緣邊波狀。花有白色之合片萼。實為長橢圓形。色赤。栽培之供觀賞用。果實可食。

Lagerstroemia indica L.

Lythrum virgatum L.

千屈菜科

紫薇百日紅（漢）

紫薇。為東印度原產之落葉樹。高丈餘。莖皮平滑。葉對生或互生。卵形或橢圓形。花紫紅色或白色。瓣多皺襞。夏日始開。秋季方罷。故又名百日紅。

栽培之為觀賞用。

千屈菜科

千屈菜（漢）

千屈菜。自生於山野。為多年生草。生於淺水或濕地。高二三尺。葉對生。為披針形。花簇生於葉腋。有淡紅之花瓣。

栽培之為觀賞用。又用之於佛事。

Punica Granatum L.

安石榴科

安石榴（漢）

安石榴。地中海沿岸原產之落葉灌木。高八九尺。葉平滑。為長橢圓形。花有赤萼及深紅色之瓣。果實為球形。熟則裂開。現紅肉之種子。

子之肉可食。根皮為驅蟲藥。變種甚多。栽培之為觀賞用。

Rhizophora mucronata Lam.

紅樹科

嗎恩古羅布（日）

嗎恩古羅布。自生於東印度及其他熱帶之海岸。為常綠樹。葉橢圓形或卵形。有微凸頭。質厚有光澤。花瓣有毛而短於萼。列成聚繖花序。種子於果實未脫落時。即發芽而突出其幼根。

此樹生於海岸。潮流平滿時。觀之如海中森林。因此著名。

Quisqualis indica L.

Melaleuca leucadendron L.

使君子科

使君子（漢）

使君子。自生於山野及水岸。閩蜀多栽培之。為常綠木本之蔓生植物。長約二丈。葉卵形。對生。花軸出於莖之頂端及葉腋。簇生成穗狀。實長寸許。有棱。老則紫黑。為兒科聖藥。俗傳潘州郭使君療小兒。多是獨用此藥。後醫家因號為使君子也。

桃金孃科

加耶布的（日）

加耶布的。產於東印度及馬來隅等處。為常綠樹。高約一丈五尺。葉互生。為披針形。花白。排列為穗狀花序。取新葉及枝。而蒸餾之。則得油。即稱為加耶布的油。用於興奮藥及驅蟲劑。

Jambosa Caryophyllus Ndz.

Rhodomyrtus tomentosa Wight.

桃金孃科

丁香（漢）丁子（日）

此為模拉哈原產之常綠樹。高二丈餘。葉對生。呈長橢圓形。全邊。花有淡紅花瓣數朵叢生。

花芽可為芳香性調味藥。蒸餾之可製揮發油。即丁香油是也。治齒痛有特效。附於他物生芳香。

桃金孃科

桃金孃（漢）

桃金孃為栽培常綠灌木。葉對生。呈橢圓形。質厚。花有淡紅花瓣。具下生子房。觀賞用。



Psidium guajava *Rudd.*

桃金孃科

蕃石榴（漢）

蕃石榴。原產熱帶亞美利加。常綠樹也。莖對生。葉橢圓形。結黃色漿果。形如倒卵。果實味美。供食用。或栽植以作觀賞。

Jambosa vulgaris *DC.*

桃金孃科

蒲桃（漢）

蒲桃。為東印度原產常綠樹也。高二丈五尺。葉為披針形。有光澤。對生。花大而白。具長雄蕊。果類林檎。實供食用。又栽培之以為觀賞。



Epilobium pyrricholophum Fr. et Sav.

Eucalyptus globulus Lab.

桃金孃科

由加利樹（日）

此樹為濠洲東南部原產之常綠喬木高約三十丈葉有小點呈卵形或披針形全邊花生於上部葉腋具多數雄蕊此樹生長甚速吸收地中水分甚多能乾燥富於病原之潮濕地故熱地廣栽之樹皮及葉可用為間歇熱之解熱劑採新生葉蒸餾之可製揮發油用於殺菌劑及香水原料木材有堅實耐久性適於建築

柳葉菜科

柳葉菜（漢）赤花（日）

柳葉菜為山野水邊自生之多年生草高約二尺葉有鋸齒呈卵形無柄對生帶紫赤色花有甚長之下生子房及呈淡紅色之四花瓣實為乾果熟則開裂析出種子子頂有長毛易為風吹散

岩柳葉菜（日）　柳葉菜科

自生於山地濕地。為多年生草。高達二三尺。葉細長或長橢圓形。對生。花及果實。酷似柳葉菜。

月見草（日）　柳葉菜科

月見草。為北亞美利加原產之一年生草或越年生草。高達三四尺。葉互生。為長卵形。花大。有黃色四花瓣。日沒時開之。栽之以供觀賞。

Trapa natans L.



Uchsia macrostemma Ruiz. et Pav.

夫苦席阿（拉）　柳葉菜科

夫苦席阿原產智利為灌木狀植物高約三尺葉長卵形平滑緣有齒形花美麗下垂萼色白者花冠呈赤色或紫色反之萼赤色或紫色者花冠呈白色供觀賞用

菱　芰實（漢）　柳葉菜科

菱為水生植物莖及細裂根狀之葉漂流水中葉菱形有鋸齒浮於水面花白色四瓣單生於葉腋實為堅閉果具角狀突起種供食用



Oenothera odorata *Jac.*

Halorrhagis micrantha *R. Br.*

待霄草（日）　柳葉菜科

待霄草。為南美原產之草本植物。高達二三尺。葉呈披針形。有粗鋸齒。花大。有黃花冠。開於夕刻。觀賞用。

蟻塔草　蟻塔草科

蟻塔草。為山野自生之多年生草。高約五六寸。葉小。作橢圓形或卵形。有鋸齒。對生。花小。呈黃褐色。下向散生於長花軸。

Aralia cordata Thunb.

Acanthopanax spinosum Miq.

五加（漢）　五加科

自生於山地。為落葉灌木。有刺。高達六七尺。葉呈掌狀複葉。由五枚無柄小葉而成。花小而白。列為繖形花序。

幼葉供食用。栽植之用作藩籬。莖皮可供藥用。

土當歸（漢）　五加科

土當歸。山地自生。多年生草。高五六尺。葉大。為二回羽狀複葉。由橢圓形小葉而成。小葉端尖。花小而色白。列為繖形花序。由五雄蕊結合。具花柱五。

幼莖及葉。皆供食用。根入藥。



Ainsliaea apiculata *Sch. Bip.*

Dendropanax japonicum *Seem.*

隱蔽、甜醬蓋。唐三手、三手、(日)五加科

自生於日本暖地。為常綠樹。高二丈餘。葉呈卵形而厚。多三裂。花小而色綠。排列為繖形花序。

供觀賞用。

常春藤(漢)　五加科

常春藤。山野自生。蔓生之常綠樹也。常以小氣根攀緣他物而生。葉為卵形。全邊或分裂為掌狀。花小而色黃綠。排列為繖形花序。

供觀賞用。又為發汗劑。



Aralia papyrifera *Hook.*



Aralia sinensis *L.*

五加科

楤木（漢）

楤木。自生於山野。為落葉樹。高丈餘。莖葉有銳刺。葉為二回羽狀複葉。由多數卵形小葉而成。花小色白。排列為圓錐花序。幼葉供食用。木材為小器具及木筏料。

五加科

通草（漢）

通脫木。為產於暖地之木本植物。莖質軟。含白色大髓。葉分裂如掌狀。具長柄。叢生於莖之上部。花畧似土當歸。將莖髓作薄片。可代紙用。或以之製裝飾品。入藥為利尿劑。



Aralia repens Matsum.

土參（漢）　五加科

山地自生。多年生草。高二尺餘。地下有根狀莖。形與竹類之根狀莖相似。葉為掌狀複葉。似七葉樹之葉。花小而白。排列為繖形花序。

根狀莖供藥用。

Panax ginseng C. A. Mey.

人參（漢）　五加科

原產我國北部及朝鮮與北美。為多年生草。根形畧似人體。葉為掌狀複葉。與七葉樹葉相似。花小。似五加花。

根為東洋著名藥品。能回復身體及神經疲勞。且有健胃之力。但西醫謂其根於藥用上價值與甘草相同云。

Helwingia ruscifiora *Wild.*

Acanthopanax ricinifolium *S. et Z.*

五加科

青莢葉（漢）

青莢葉。自生於山野。為落葉灌木。高達七八尺。木分雌雄。葉為橢圓形。有鋸齒。花開於葉面中部。作淡綠色。雄花有四花瓣及四雄蕊。雌花亦有四花瓣。但又有四柱頭之雌蕊。花後結黑色果實。春季取幼葉以供食用。

五加科

刺楸（漢）

刺楸。自生於山野。為落葉樹。高達數十尺。莖有刺。葉互生。分裂如掌狀。有長葉柄。花呈小形。作黃白色。排列為繖形。材作小細工船具及木屐之用。幼葉可食。

Fatsia japonica Decne et Planch.

Dorema ammoniacum Don.

五加科

八角金盤（漢）

八角金盤。自生於山野暖地。為常綠灌木。高可七八尺。葉分裂成掌狀。以長葉柄而互生。質厚有光。花小色白。排列為繖形花序。

有毒。祇可觀賞。

繖形科

安母尼亞屈漢（拉）

安母尼亞屈漢。為波斯原產之多年生草。高七八尺。葉狀如羽。生於莖之上部。花小而色白。且為圓繖形花序。

從此草採得之脂。稱為安母尼亞屈漢。可作祛痰藥。並可加於藥膏中。

Seseli Libanotis *Koch.*

Ferula asa foetida *L.*

阿魏（曰）　繖形科

阿魏。為波斯「阿富漢」原產。多年生草也。高約二三尺。葉類胡蘿蔔葉。花小色黃。相聚為複繖形花序。

此草被傷時。浸出其乳液。乾燥之。可為驅風藥祛痰藥及通經藥等。

邪蒿（漢）　繖形科

邪蒿。為自生於山野之雜草。高二三尺。葉為二回羽狀複葉。下部小葉分裂為羽狀。花白而形小。排列為複繖形花序。

Foeniculum officinale All.

Sanicula sinensis Bos.

繖形科

茴香（漢）

茴香。為地中海沿岸原產之多年生草。高及五六尺。葉大。有細裂。成絲狀裂片。花小色黃。排列為複繖形花序。實為乾果。香氣甚強。

果為健胃藥。驅風藥。又為香味料。能附香氣於食物。幼莖及葉。皆可食用。

繖形科

變豆菜（漢）

變豆菜。山野自生。多年生草。高二三尺。葉深三裂。呈掌狀。兩側裂片。通常再分二裂。花小。數枚簇生。

其根與莖。皆有利尿之効。

Carum Petroselinum Benth.

荷蘭芹（日）　繖形科

荷蘭芹。為歐洲原產之二年生草。有芳香。高及二尺餘。葉為重複葉。由三裂之小葉而成。花小色白。排列為複繖形花序。幼葉及根。可供食用

Apium graveolens L.

荷蘭鴨兒芹（日）　繖形科

荷蘭鴨兒芹。歐洲原產之二年生草也。香氣甚強。高二尺餘。葉為羽狀複葉。由三裂小葉而成。花小色白。排列為複繖形花序。其幼葉及多肉之根。皆供食用

Coriandrum sativum L.

Oenanthe stolonifera DC.

繖形科

胡荽（漢）

胡荽。為地中海沿岸自生之一年生草。高二尺餘。葉為羽狀複葉。細裂且互生。花小。排列為繖形花序。周圍之花大。花瓣色白。不整齊。果圓形無翅。實可為香味料。又供藥用。

繖形科

水芹　水斳（漢）

自生於水田濕繖之多年生草。有特殊香氣。具匍匐莖。葉互生。為二回羽狀複葉。花小色白。排列為複繖形花序。無論自生者或栽培者。皆可食用。



Hydrocotyl. rotundifolia Roxb.

Chamaele tenera Miq.

卞梅累　得內拉（拉）　繖形科

此草為自生於陰地之雜草。高約一尺。葉為重複葉。畧似水芹葉。花莖生於葉叢間。莖頂著花。形小色白。排列為複繖形花序。

血止草（日）　繖形科

血止草。山野自生。為多年生草。莖細長蔓延。葉有長柄。葉身為圓心臟形。淺裂成掌狀。花小色白。排列畧為頭狀之繖形花序。



繖形科

毒芹（日）

毒芹。自生於濕地或淺水間。草本。高達三四尺。地下莖中空有節。稍類竹。葉為二回或三回之羽狀複葉。畧似水芹葉。花小色白。排列為複繖形花序。

有毒之植物也。

繖形科

毒人參（日）毒蘿蔔（日）

毒人參。原產歐洲。為越年生草。高三尺餘。葉為重複葉。由分裂如羽狀之小葉而成。花小色白。排列為複繖形花序。

為有毒植物。

Daucus carota L.

胡蘿蔔(漢)人參(日)黃蘿蔔　繖形科

胡蘿蔔。為歐羅巴原產之越年生草。高達四五尺。根赤色。為長大肉質。葉為重複葉。有長葉柄。花小色白。排列為複繖形花序。根及幼葉。皆供食用。

Phellopterus littoralis Fr. Sch.

濱防風　八百屋防風(日)繖形科

濱防風。為自生於海濱之草本。高達尺餘。葉互生。為複葉。花小色白。排列複繖形花序。

此草有特殊香氣。且具辛味。其幼葉供食用。



Cryptotaenia japonica Hassk.

Varnia japonica Thunb.

繖形科

鴨兒芹（漢）三葉芹

鴨兒芹。山野自生。多年生草。高二三尺。葉為複葉。成於三枚小葉。互生。下部之葉具長柄。花小色白。排列為繖形花序。全部供食用。

山茱萸科

桃葉珊瑚（漢）青木（日）

桃葉珊瑚。山地自生之常綠灌木也。高達五六尺。葉呈長橢圓形。先端尖銳。有鋸齒。長達五六寸。花為單性花。雌雄生於異株。實呈橢圓形。色赤而美麗。此木為觀賞用。日本及歐美諸國多栽之。其材可以作箸及杖。

Marica platanifolia S. et Z.

瓜木（日）

瓜木。山地自生。為落葉樹。高及丈餘。葉似梧桐葉。花白色。花瓣向外反卷。

山茱萸科

Cornus ignorata C. Koch.

考阿奴司依古撓拉他（拉）山茱萸科

此為自生山野之落葉樹。高達丈餘。葉為長卵形而尖。對生。花小色白。排列為聚繖花序。

材作薪炭。亦可製器具。栽之可供觀賞用。

Cornus officinalis S. et Z.

Clethra barbinervis S. et Z.

山茱萸科

山茱萸（漢）

山茱萸。常栽培於庭園。為落葉樹。高達丈餘。葉對生。為卵形而尖。未葉先花。花為黃色。小形。數朵集生。果赤色。作長橢圓形。味甘酸。為觀賞用植物。果為強壯劑。供藥用。

令法科

令法（日）

山地自生。為落葉樹。高達丈餘。葉互生。為橢圓形或倒卵形。有鋸齒。花為小形白色。排列為總狀花序。材可作床柱挽物細工及薪炭料。幼葉可食。



Pyrola elliptica *Nutt.*

Monotropa uniflora *L.*

鹿蹄草科

鹿蹄草（漢）

鹿蹄草自生於山野陰地多年生之常綠草也葉為橢圓形有長葉柄由地下部叢生花莖生自葉叢中央長七八寸上部生數花花白色向下

現供觀賞但昔時用為止血及愈創等之收斂藥

鹿蹄草科

水晶蘭（漢）

水晶蘭自生於山地為白色平滑之寄生植物高達四五寸葉為鱗片狀互生於莖花單生於莖之頂端稍稍傾斜

Gaultheria adenothrix *Maxim.*

格吳路梯里亞阿帶撓陶里茲(拉)石南科

此為山野自生之常綠小灌木。高四五寸至一尺。葉與莖皆帶赤色。葉呈卵形。互生。果實色赤。肉部由萼生成。

實供食用。

Vaccinium japonicum *Miq*

巴苦喜牛姆加波你苦謨(拉)石南科

此為山地自生之落葉灌木。高約四五尺。葉為卵形。互生。花帶赤色。有五裂花冠。花冠裂片頗長。實為漿果。

果供食用。

Andromeda japonica Thunb.

侵木（漢）　石南科

侵木。為山地自生常綠樹。高約二丈。葉長卵形而尖。花白色。呈壺狀排列為總狀花序。開於早春。

栽於庭園。供觀賞用。材作挽物細工。性劇毒。以葉煎汁可作殺蟲藥。

Epigaea asiatica Maxim.

岩梨（日）　石南科

岩梨。山地自生。為常綠小灌木。高二三寸至五六寸。葉為卵形。緣邊及中肋生褐色刺毛。花小色紅。有如筒狀之花冠。果為肉質。作小球形。有強酸味。

果供食用。

Leucothoe Keiskei *Miq*

Arctostaphylos uva urs *Spr.*

岩南天竹（日）　石南科

岩南天竹。山地自生。為常綠灌木。高一二尺。葉為長卵形而厚。有光澤。花有筒狀之白花冠。

供觀賞用。

烏華烏爾矢（日）　石南科

烏華烏爾矢。北半球自生之常綠小灌木也。莖匍匐。長及三尺餘。葉為全邊倒卵形。其質厚。花排列為短總狀花序。色白或淡紅。有壺狀花冠。

葉稱烏華烏爾矢。葉為尿道諸病收斂藥。亦可作防腐劑。

Rhododendron indicum Sw. var. obtusum Maxim.

石巖（漢）　石南科

石巖。為自生於山地之灌木。通常高四五尺。葉為長倒卵形。互生。花有紅色合瓣花冠。

供觀賞用。

Rhododendron quinquefolium Bissel Mre.

五葉山躑躅（日）　石南科

五葉山躑躅者。乃山地自生之灌木也。高八九尺。葉為橢圓形。每五枚簇生。花有白色合瓣花冠。

供觀賞用。

Vaccinium Vitis-idaea L.

越橘（漢）　石南科

自生於亞細亞歐羅巴及北美之高山或寒地。為常綠小灌木。高達五六寸。葉為橢圓形或倒卵形。形質與黃楊葉相似。花有淡紅色鐘狀合瓣花冠。排列為總狀花序。果如球形。為鮮紅漿果。直徑長二三分。果供食用。



Vaccinium Oxycoccus L.

蔓苔桃（日）　石南科

蔓苔桃。自生於高山濕地。為常綠多年生植物。莖細長蔓延。葉互生。形橢圓。其質頗厚。花小作淡紅色。有裂片外及之合瓣花冠。實為球形。乃赤色之漿果也。大如豌豆。實供食用。

Rhododendron indicum Sw.
var. macranthum Maxim.

Rhododendron Metternichii S. et Z.

杜鵑花（漢）　石南科

杜鵑花。庭園多栽之。為常綠灌木。高達三四尺。葉為橢圓形。作深綠色。有毛。花白或作紫紅。狀似山躑躅。但此開於六月中。栽培之為觀賞用。

石南（漢）　石南科

石南。為深山自生之常綠灌木。高七八尺。葉厚為長橢圓形。下面成淡褐色。花有淡紅色之合瓣花冠。狀與山躑躅花相似。觀賞用。



Enkianthus japonicus *Hook.*

And romeda nana mal.

哎克阿恩祖司。加保尼苦司。(拉)石南科為栽培於庭園之落葉灌木。高七八尺。葉橢圓而尖。數枚叢生。花有白色壺狀向下之合瓣花冠。栽之供觀賞用。葉至秋末。變為紅色。呈美觀。後乃脫落。

米葉拇櫻(日)　石南科

自生於高山。為常綠小灌木。高僅二三寸。葉小。呈橢圓形。三片輪生。花白。呈壺狀。生於枝頂。觀賞用。

Lauecthoe Grayana *Maxim.*

木藜蘆（漢）　石南科

木藜蘆。自生於山野。為落葉灌木。高達三四尺。葉互生。為卵形。花有白色壺狀合瓣花冠。排列為總狀花序。

為有毒植物。碎葉為粉。入鼻則發嚏。



Schizocodon soldanelloides *S. et Z.*

岩鏡（日）　岩梅科

岩鏡。自生於深山。為多年生草。高三四寸。其葉生於地下部。為鈍頭心臟形。有長葉柄。上面有光。緣邊具齒。花莖由葉叢中央而生。上部開數花。花多淡紅色。白色者不多見。花冠上緣。分裂為絲狀。

Ardisia crenata Sims.

Ardisia japonica Bl.

紫金牛科

硃砂根（漢）

硃砂根。為生於深山中之常綠灌木。高二三尺至七八尺。葉互生。為長橢圓形。有鈍鋸齒。花小帶白色。果為赤色球形。殆與豌豆同大。

觀賞用。根入藥。治咽喉腫痹。

紫金牛科

紫金牛（漢）　藪柑子（日）

紫金牛。自生於山野。為常綠小灌木。高自四五寸至八九寸。不等。葉互生。為長卵形。有鋸齒。花有白色。合瓣花冠。通常每二枚集生。果球形。色紅。

觀賞用。



Primula japonica A. Gr.

Lysimachia vulgaris L.

里席麻其阿夫盧格里司（拉）櫻草科

山地自生。為多年生草。高三四尺。葉為披針形。輪生或對生。花有黃色五裂合瓣花冠。排列為圓錐花序。

觀賞用。

九輪草（日）　櫻草科

九輪草。自生於山中濕地。多年生草也。高二三尺。葉為長橢圓形。長六七寸。花之構造似櫻草花。作赤紫白諸色。常數花輪生。成階梯形。

栽之以供觀賞。其汁液有刺激性。皮膚觸之即發腫。

Lysimachia japonica Thunb.

Primula cortusoides L.

小茄（日）　櫻草科

小茄。為山野自生之雜草。高六七寸。斜卧於地上。葉對生。呈卵形。上部各葉腋各生一花。有黃色合瓣花冠。實為圓形。畧似茄果。

櫻草（日）　櫻草科

此為原野自生多年生之草。高六七寸。葉橢圓形。有長葉柄。叢生。花莖生於葉叢間。多數之花開於花莖上部。花各有梗。具紅紫色或白色花冠。

供觀賞用。其汁液有毒。能使皮膚發腫。

Lysimachia clthrodies *Duby.*

珍珠菜（漢）　櫻草科

珍珠菜。山野自生。多年生草也。高二三尺。葉互生。為長卵形或廣披針形。花白色。排列為總狀花序。花序畧呈尾狀。供觀賞用。

Palaquium Gutta *Burck.*

「倔答百兒加」樹（日）　赤鐵科

「倔答百兒加」樹。為馬來半島原產之常綠喬木。有互生長倒卵形之葉。花小。每數朵叢生於葉腋間。其幹有乳狀液。取出乾之。稱倔答百兒加。可製器具。並可用以療病。



Diospyros peregrina *Gürke.*

Diospyros Kaki *L. f.*

柿

柿樹我國多栽之。為落葉樹。高達二三丈。葉為橢圓形或卵形。且互生。花有黃色合瓣花冠。果為黃赤色漿果。形狀種種不同。果供食用。由澁柿取出之汁。可塗於紙及網等。材可作器具及裝飾品。樹心黑色部。名曰黑柿。用途最廣。

柿樹科

柿（漢）

烏木

烏木。產於東印度及馬來半島。為常綠樹。高達二丈餘。葉互生。為長橢圓形。面平滑。花單性。有淡黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。果為球形。作赤黃色。直徑約一寸五分。其材色黑質堅且美麗。故器具多用之。果供食用。由未熟之果所採澁汁。可供塗網及船具之用。

柿樹科

烏木（漢）



Diospyros Lotus L.

Styrax benzoin Dryand.

君遷子（漢）圓棗（中略）書　柿樹科

君遷子。自生於山地。為落葉樹。高達二丈餘。葉互生。為長橢圓形。花有淡黃色壺狀合瓣花冠。果為球形或橢圓形漿果。徑六七分。

材可為器具。人多用之。生果可取澁汁。熟供食用。

安息香（日）　齊墩果科

產於「史襪脫而來」「暹羅」等處。落葉樹也。葉為卵形而尖。花帶赤色。排列為總狀花序。將此樹幹部浸出樹脂。乾燥之。稱安息香。為祛痰藥。又可作薰香料及香油料。

Styrax japonica S. et Z.



Halesia hispida Roxb.

齊墩果科

齊墩果（漢）

齊墩果。為山野自生之落葉樹。高約二丈。葉為卵形。互生。花白色。花梗頗長。材可為傘橋。種可榨油。亦有栽於庭園中者。

大葉白辛樹　毛白辛樹（日）齊墩果科

此為山地自生之落葉樹。高約四丈。葉大。呈長卵形。互生。花白色。與齊墩果花相似。果為細長乾果。全面密毛叢生。供觀賞用。材可製器具。兼有作薪用者。

Fraxinus longicuspis

小葉梣（漢）　木犀科

小葉梣。為山地自生之落葉樹。高達數十尺。葉為奇數羽狀複葉。通常由五枚或七枚之小葉而成。花排列為圓錐花序。色白。有倒披針形之四花瓣。

其材供器具薪炭之料。或栽培之為觀賞用。



Ligustrum Boda

水蠟樹（漢）　木犀科

水蠟樹。為自生山野之灌木。高約十四尺。葉橢圓形。全邊。對生。冬不脫葉。花色白而形小。排列為小圓錐花序。果為橢圓狀。色黑而小。

栽培之供觀賞用。由小蟲生於樹枝之白粉狀物。可製白蠟。

Ligustrum medium *Fr.et Sav.*

大葉水蠟樹（漢）　木犀科

大葉水蠟樹者。原野自生之落葉樹也。高達丈餘。葉為卵形。互生。花小色白。排列為圓錐花序。果形小色黑。果實有毒。食之致死。

Olea europaea *L.*

阿列布（日）　木犀科

阿列布。為歐洲南部原產之常綠樹。高約十五尺。葉呈披針形或長橢圓形。全邊。淡綠色。花小色白。花冠四分。實為核果。含種子一。

果供食用。又以之榨油。稱阿列布油。此油供食用藥用燈用及石鹼原料。為葯用者。即灌腸料乳劑料塗擦劑料等。又可加於膏藥。

Jasminum grandiflorum L.

Jasminum odoratissimum L.

黃素馨（漢）　木犀科

黃素馨。為麻的拉原產之常綠灌木。枝有纏繞他物之性。葉為複葉。由三个乃至五个卵形小葉而成。通常互生。花排列為有限花序。有黃色之合瓣花冠。發芳香。觀賞用。

素馨（漢）　木犀科

素馨。原產東印度常綠灌木也。高達三四尺。葉為羽狀複葉。由五個乃至九個卵形小葉而成。花有白色合瓣花冠。排列為聚繖花序。發芳香。供觀賞用。

Ligustrum japonicum *Thunb.*

Fraxinus Bungeana *DC.* var. pubinervis *Wg.*

女貞（漢）　木犀科

女貞為山野自生之常綠樹。高約丈餘。葉為卵形。其質厚。畧似山茶葉。花有四裂白色。合瓣。花冠排列為圓錐花序。果實色黑。呈長橢圓形。

炒其種子。作咖啡之代用品。又栽之以供觀賞用。

梣（漢）　木犀科

梣為山野自生之落葉樹。高二丈餘。葉為奇數羽狀複葉。由長橢圓形或長卵形大形之小葉而成。花小而有四細萼片。無花冠。實為翅果。

材可作器具。又有植於路旁者。

Osmanthus Aquifolium *B. & H.*

木犀科

枸骨（漢）柊、杠谷樹、

枸骨自生於我國暖地。為常綠樹。高達丈餘。葉對生。為卵形。有銳鋸齒。質厚有光。花為小形白色。每數朶生於葉腋。

材可為算珠櫛。又栽培之以供觀賞。

Osmanthus fragrans *Lour.*

木犀科

木犀、岩桂（漢）

木犀者。栽培於庭園之常綠樹也。高及丈餘。葉對生。呈長橢圓形而尖。花叢生於葉腋。有小形黃赤色之合瓣花冠。發特殊芳香。

觀賞用。

Forsythia suspensa Vahl.

連翹（漢）

連翹。庭園栽培之。為落葉灌木。莖及枝之上部。畧如蔓狀。葉對生。為卵形。有鋸齒。花開於早春。有黃色合瓣花冠。供觀賞用。

木犀科

Jasminum nudiflorum Lindl.

迎春花（漢）黃梅（日）

迎春花者。栽培於庭園之小灌木也。上部之莖。稍呈蔓狀。幼莖呈綠色。概垂下。長五六尺。有葉絲可愛。如柳條。莖節隆起。葉為複葉。成於三小葉。無托葉。對生。花有具光澤呈高盆狀之黃色合瓣花冠。每葉腋輪生數朵。只二朵發育為對生狀。開於早春。觀賞用。

木犀科

Syringa vulgaris L.

Buddleia japonica Hemsl.

木犀科

紫丁香（中俗）

紫丁香。各地栽培之。為落葉灌木。莖高七八尺。皮平滑。節稍隆起。葉呈心臟形。無缺刻。對生。花為圓錐花序之代表。呈紫白色四瓣狀。如高盆。萼呈褐色筒狀。雌雄離生。實為乾燥裂開之蒴。

觀賞用。又為香水料。

馬錢科

醉魚草（漢）

醉魚草。為山野自生之落葉灌木。高三四尺。莖節間有縱行翅。葉對生。為廣披針形。有鋸齒。花有帶紫色不整齊之筒狀花冠。排列為穗狀花序。

有毒。碎其枝葉。投入水中。能使魚醉。而易於捕獲。



Strychnos nux vomica L.



Swertia bimaculata Clark.

馬錢科

馬錢子番木鼈（漢）

馬錢子產東印度原產之常綠樹也。高約十五尺。葉有三至五之肋。對生。呈卵形。花為有限花序。萼小。花冠為長筒狀。實為黃漿果。大如中等西洋木檎之果。種子扁圓。有密毛。直徑約五六分。

由此種子所成之粉末。越幾斯或丁幾可用於胃加答兒神經麻痺等症。又可用以毒殺鼠類。有非常激烈性。故使用時切勿失其適量。若中其毒。速服濃厚咖啡。

龍膽科

樟牙菜（漢）

樟牙菜。自生於山野水邊。為多年生草。高達二三尺。葉為長卵形。有三條大脈。花白色五裂。有紫黑小點。

Limnanthemum nymphoides *Link.* var. japonicum *Miq.*



Limnanthemum indicum *Griseb.*

莕菜（漢）

龍膽科

莕菜者。池沼自生之多年生草也。葉呈圓心臟形。浮於水面。花生於葉腋。出水上而開。花冠五裂。呈黃金色。緣有多數毛狀突起。

供觀賞用。葉莖之幼者可食。

金銀蓮花（漢）

龍膽科

金銀蓮花。為自生於水中之植物。有細莖。葉為橢圓狀心臟形。長四五寸。浮於水面。花數朶叢生。各具長花梗。花冠白色五裂。有毛狀突起。

Gentiana lutea L.

Erythraea centaurium Pers.

健質亞那（拉）　龍膽科

健質亞那產於阿魯普斯山及歐洲南部高山為多年生草高達三四尺葉為橢圓形帶青綠色花有五裂黃色之合瓣花冠其根甚苦可用為健胃劑

慎答吳里吳木（拉）　龍膽科

此為歐洲原產之一年生草或越年生草高達一尺餘葉對生作長卵形通常有大脈五花有肉紅色或白色之合瓣花冠集生於莖之上部

其莖葉供藥用有健胃解熱之効

當藥（日）　龍膽科

自生於山野。為一年生草。高約一尺。有強苦味。葉對生。為披針形。花生於莖之上部。有淺紫色之合瓣花冠。

乾此莖葉以供藥用。有健胃之効。

當藥龍膽（日）　龍膽科

當藥龍膽。自生於高山之多年生草也。高約一尺。下部之葉。如倒披針形而長。上部之葉。如廣披針形而短。花開於莖頂。呈白色。畧帶黃色。且有綠細點。

有苦味為健胃藥。



Gentiana scabra Bge. var. Buergeri Maxim.

龍膽科

龍膽（漢）世龍膽

龍膽為山野自生之多年生草。高約一二尺。葉對生。為廣披針形或長卵形而尖。無葉柄。花有青色筒狀合瓣花冠。生於莖頂及上部葉腋。

供藥用。有健胃之効。又栽之以供觀賞。



Nerium odorum Soland

夾竹桃科

夾竹桃（漢）柳葉桃（中俗）

夾竹桃為東印度原產之常綠喬木。高及丈餘。葉為披針形。輪生。花或紅或白。似山躑躅花。

有毒。祇可觀賞。

Trachelospermum jasminoides. *Lemaire*

Strophanthus hispidus *DC.*

司脫羅芳足司（拉）　夾竹桃科

此為產於熱帶非洲之蔓生木質植物。葉對生。橢圓形或卵形。花有漏斗狀花冠。花冠外部色白。內部及基部色黃。且具紫點。種子為心臟強壯藥及利尿劑。

絡石（漢）　夾竹桃科

絡石者。自生於山野。常綠蔓生之木質植物也。莖以氣根上昇於他物。葉對生。為長橢圓形。其質強韌有光澤。花有白色合瓣花冠。排列為聚繖花序。栽培之為觀賞用。

Vinca rosea L.

Cynanchum caudatum Morren.

夾竹桃科

日日草（日）

日日草。為西印度原產之多年生草。莖直立。葉對生。為橢圓形。花冠呈淡紅紫色或白色。有細筒部。

栽之以供觀賞。

蘿摩科

牛皮消（漢）生馬（日）

牛皮消者。自生於山野。多年生之蔓草也。葉為心臟形。頂尖。對生。花序為繖形。生於葉腋。花色白而形小。雄蕊有花粉塊。果實為紡錘狀。乾果。成熟則裂出具白色長毛之種子。



Metaplexis Stauntoni R. et S.

Vincetoxicum Japonicum Morr. et Dcn.

伊預葛（漢）　蘿摩科

伊預葛。自生海邊山野之多年生蔓草。以莖卷絡於他物。葉呈卵形或橢圓形。對生。花序成於葉腋所生少數之花。花小色白。稍帶黃綠。雄蕊有花粉塊。實細長而尖。為乾果。熟則開裂。而出帶毛之種子。

蘿摩（漢）　蘿摩科

蘿摩。自生於原野。為多年生蔓草。以其莖纏繞他物。葉為長心臟形而尖。以長葉柄而對生。花小。叢生於葉腋。而生花軸之上端。花冠為合瓣五裂。外面灰白。內面淡紫。有白毛。果含生長毛之種子。

種子之毛。可為棉之代用品。莖可束物。皮富纖維。

Vinca toxicum sublanceolatum Mich.

Hoya carnosa R. Br.

鷗蔓（日）　蘿摩科

鷗蔓。自生於山野。為多年生之蔓草也。以細莖纏繞於他物。葉為廣披針形。對生。花小。有暗紫色合瓣花冠。雄蕊含花粉塊。實為蒴而長。種子一端。叢生棉狀長毛。

毬蘭（漢）　蘿摩科

毬蘭者。東印度原產多年生之蔓草也。葉呈橢圓形而厚。為肉質。花小。作淡紅色。形狀稍類櫻花。具長花梗。排列為繖形。栽培之為觀賞用。

Pharbitis hederacea L.

Pyenostelma chinensis hge

蘿摩科

徐長卿（漢）

徐長卿。為原野自生之多年生草。莖高一二尺。葉對生。而細長似柳葉。無鋸齒。七八月間葉腋開多數小花。結狹長果實。內含種子甚多。而種具長毛。

栽之以供觀賞。

旋花科

牽牛子（漢）朝顏（日）

牽牛子。我國南部及日本臺灣產之。為一年生蔓性之纏繞草。葉通常三裂。呈心臟形。有毛。互生。葉柄長。花冠呈漏斗狀。五片結合。而為整齊之合瓣花冠。彩色美麗。早朝開放。受日光則萎閉。故有朝顏之名。萼五片。綠色。有毛。花序近於總狀。實為球形。有三室。各室藏二種子。花形種種變種極多。

栽培之以供觀賞。種子有毒。

Ipomoea batatas Lam.

甘藷、紅薯（漢）山芋　旋花科

甘藷者。中央亞美利加原產之多年生草也。莖細長。常匍匐於地上。葉為卵形或心臟形。有長葉柄。互生。花有漏斗狀之合瓣花冠。酷似牽牛子花。

廣栽培於暖地。其多肉之根。可供食用。又可以之釀酒。

Cuscuta japonica Choisy.
var. thyrsoidea Engelm.

菟絲子（漢）　旋花科

菟絲子者。寄生於薔薇及他植物之蔓草也。無綠葉。莖細長。纏絡於宿主植物。葉小。呈鱗狀。帶赤色。

種子為強壯藥。

Calystegia sepium *R. Br.*

旋花（漢）　旋花科

旋花。為自生山野之多年生蔓草。葉細長。常卷絡於他物。葉如戟形。以長葉柄而互生。花作淡紅白色。有漏斗狀合瓣花冠。其形狀似牽牛子花。地下部供食用。

Exogonium purga *Benth.*

藥刺巴（日）　旋花科

藥刺巴者。墨西哥原產之蔓草。纏絡於他物。葉呈心臟形。花為漏斗狀。亦似牽牛花。其根為球形。含多量樹脂。稱為藥刺巴根。瀉劑用之。

Quamoclit vulgaris *Chois.*

旋花科

蔦蘿（漢）

蔦蘿。多栽於庭院。為一年生蔓草。莖細長而卷絡於他物。葉互生。細裂為羽狀。花有紅筒狀之合瓣花冠。觀賞用。

Phlox paniculata *L.*

花葱科

草夾竹桃（日）

草夾竹桃。為北美原產之多年生草。高達三尺餘。葉為廣披針形。全邊。對生。花作紅紫色或白色。排列為圓錐花序。栽培之為觀賞用。



Alkanna tinctoria *Tausch.*

阿路坑那（拉）　紫草科

阿路坑那者。歐洲南部所栽之多年生草也。全部有毛。高一尺五寸。花長橢圓形。而互生。形小而類紫草花。為盤旋花序。其根皮紅色。色素稱為鴨而開你音。可作染料。溶解於油及酒精。而不溶於水。



Cynoglossum furcatum *Wall.*

大瑠璃草（日）　紫草科

大瑠璃草。為自生於山地之雜草。高達二三尺。葉為廣披針形。有粗糙之毛。花青色。花冠上部有小舌。排列為總狀花序。實為小堅果。生刺甚多。

Trigonotis peduncularis Both.

雞腸草（漢）田平子（日）　紫草科

雞腸草者。乃自生於園圃之越年生草也。高僅七八寸。葉互生。呈倒卵形。其面粗糙。花有小形青色之合瓣花冠。花軸上部為旋回狀。為春季觀賞草之一種。



Lithospermum officinale L.

紫草（漢）　紫草科

紫草者。自生於山野之多年生草也。高達二尺餘。葉為長橢圓形或長卵形。互生。有粗糙之面。花為小形帶白色。生於莖之上部。

乾根可為紫色之染料。

Caryopteris divaricata *Maxim.*

Clerodendron trichotomum *Thunb.*

馬鞭草科

藸（漢）

藸。多自生於山野。一種之雜草也。有強臭氣。莖方。高達三四尺。葉為卵形而尖。有鋸齒。對生。花有唇形青紫色花冠。

馬鞭草科

海洲常山（漢）

海洲常山。乃自生於山野之落葉樹。高達一丈五尺。葉呈卵形而尖。對生。有特異臭氣。花冠為合瓣。白色。有細長筒部。萼帶赤色。雄蕊突出於花外。

栽培於庭園。幼葉供食用。

Verbena officinalis L.

馬鞭草（漢）　馬鞭草科

馬鞭草自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉分裂為羽狀。對生。花小。有淡紫色唇形花冠。排列為長穗狀花序。

此植物為著名之發汗藥。亦有栽培之以供觀賞用者。

Caryopteris Mastacanthus Schauer.

蘭菊（日）　馬鞭草科

蘭菊。多栽培於庭園。為多年生草。高達三四尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。花簇生於上部葉腋。有青紫色不整齊之合瓣花冠。

栽培之為觀賞用。

Vitex Negundo L.

Tectona grandis L.

起苦樹（日）　馬鞭草科

起苦樹都東印度原產之常綠樹也。高約百尺。幹直立。有灰白色之皮。葉長一二尺。為倒卵形對生。下面帶白色。花小色白。有香氣。

其材含硅酸。甚堅固。永不腐朽。故稱亞洲第一良材。最適於建築。兼為製船料。

牡荊（漢）　馬鞭草科

牡荊為東印度原產之灌木。高達四五尺。葉為掌狀複葉。小葉有鋸齒。花小而色青。排列為圓錐花序。

栽培之以供觀賞。其新鮮之葉供藥用。有利尿通經之效。

Lippia citriodora Kunth.

防臭木（日）　馬鞭草科

防臭木。為南美智利原產之灌木。葉輪生。呈披針形。有多數之腺。又有似於里木子之香氣。花小。帶青白色。

其乾葉有香氣。可用為食物香料。



Callicarpa japonica Thunb.

紫珠（漢）　馬鞭草科

紫珠。為山地自生之落葉樹。葉對生。為橢圓形。有鋸齒。端稍尖。花小。其唇形花冠呈淡紫色。密生於葉腋。果小而呈紫色。

其材可用以作珠。



Plectranthus longitubus *Hkf.*

Scavia japonica *Thunb.*
var. bipinnata *Fr. et Sav.*

香茶菜、秋丁子、桐壺（日）　唇形科

香茶菜。為山野自生之多年生草。高二三尺。莖作方形。葉呈橢圓形。兩端尖。對生。花冠紫青色。呈唇形筒部甚長。具四雄蕊。二長二短。

栽培之供觀賞用。

鼠尾草（漢）　唇形科

鼠尾草。乃山野自生之多年生草也。高達二三尺。莖為方形。葉為羽狀複葉。對生。花序類於紫蘇。花冠為淡紫色。呈唇形。雄蕊二个。

Mosla punctata *Maxim.*

Stachys aspera *Michx.*
var. japonica *Maxim.*

唇形科

石薺苧（漢）

石薺苧為原野自生之雜草。高達二三尺。莖為方形。生枝甚多。葉為長卵形。有鋸齒。對生。花生於莖枝上部。為總狀花序。花冠淡紅色。為唇形。具強雄蕊二。

唇形科

犬胡麻（日）

犬胡麻為自生於山野之雜草。高達二三尺。莖為方形。密生粗毛。葉為披針形。有鋸齒。以短柄對生。花叢生於莖之上部。葉腋花冠為唇形。作淡紅紫色。有二強雄蕊。為有毒植物。昔時供藥用。

Thymus Serpyllum L.
var. vulgaris Boiss.

伊吹鈴子香（日）　唇形科

此為自生於山野之多年生小草。甸畠地上。生多數之枝。葉小而為長卵形。對生。小花集生於枝之上端。有淡紅紫色或白色之唇形花冠。及二強雄蕊。

栽培之供觀賞用。或作香料加於食物。又為興奮藥及殺菌劑。

Prunella vulgaris L.

滁洲夏枯草（漢）　唇形科

滁洲夏枯草。山野自生。為多年生草。高一尺。葉呈長卵形。有葉柄。花為穗狀。排列於莖之頂端。花冠如唇形。為淡紫色或白色。雄蕊四個。二個獨長。子房四裂。

為收斂藥之最有效者。

Lamium album L.



Nepeta Glechoma Benth.

野芝麻（漢）　唇形科

野芝麻。為原野自生之多年生草。有方莖。高達一二尺。葉為卵形或心臟形而尖。有鋸齒。由長葉柄對生。花叢生於葉腋。有白色或帶紫色之唇形花冠。雄蕊四個。二長二短。子房四分。

垣通積雪草治癎草（日）　唇形科

垣通。為曠野自生之多年生草。莖作方形。匍匐於地上。葉為心臟形。有鋸齒。由葉柄對生。花生於葉腋。有青紫色之唇形花冠。雄花四個。二長二短。

小兒服其汁液。則能治癎。又為強壯劑。治慢性肺炎及泌尿器加答兒。最為有效。

Plectranthus excisus *Maxim.*

Lophanthus rugosus *Fisch.*

排草香（漢）　唇形科

排草香。自生於山野。為多年生草。有強香氣。莖為方形。高達四五尺。葉為長心臟形而尖。有鋸齒。由葉柄對生。花叢生於莖頂。有青紫色唇形花冠。雄蕊四個。二長而二短。

栽培之為觀賞用。

龜葉草（日）　唇形科

龜葉草。自生於山地。為多年生草。有方莖。高達二三尺。葉為卵形。有不整齊之鋸齒。先端作龜尾狀。花有帶紫色之唇形花冠。雄蕊四個。子房四裂。

Calamintha chinensis *Benth*



Lycopus europaeus *L.*
var. parvifolius *Miq.*

小白根（日）　唇形科

小白根。自生於濕地。為多年生草。高達二三尺。葉對生。呈長橢圓形。有鋸齒。花小。簇生於葉腋。有白色唇形花冠。具二個雄蕊。

風輪菜（漢）　唇形科

風輪菜。自生於山野。為多年生草。有方莖。高達二尺餘。葉對生。為長卵形。花有赤紫色之唇形花冠。簇生於莖上葉腋。果類紫蘇。

昔時供藥用。

Salvia nipponica Miq.

琴柱草（日）　唇形科

琴柱草自生於山地多年生草也有方莖高達二尺餘葉如戟形而尖稍類琴柱之形對生花有黃色唇形花冠具二雄蕊

幼葉供食用

其酷似琴柱草具紅紫色之唇形花冠者為秋桐

Ajuga pygmaea A. Gr.

地獄釜蓋（日）　唇形科

地獄釜蓋乃自生於山野之雜草也莖長二三寸不直立對生之葉有缺刻花生於莖之頂端及葉腋有青紫色之唇形花冠雄蕊四個

Salvia officinalis L.

撒爾維亞（拉）　唇形科

撒爾維亞。為歐洲之原產多年生草。高三尺餘。下部為木質。葉呈廣披針形。有皺襞。花生於莖之上部。呈穗狀。有青色唇形花冠。

葉作藥用。有收斂性。又有興奮性。



Calamintha gracilis Pers.

塔花（日）　唇形科

塔花。為原野自生之雜草。有方莖。高一尺餘。葉作卵形而對生。有鋸齒。花小。有帶紅色之唇形花冠。花軸開多數之花。呈階段狀。又似塔形。

Chelonopsis moschata Miq.

Perilla nankinensis Lour.

唇形科

紫蘇（漢）

紫蘇園圃多栽之。為一年生草。高達二尺餘。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。下面呈紫紅色。花小。有白色或淡紅色之唇形花冠。集為穗狀之總花序。

葉及果實可食。栽於歐美為觀賞用。其葉帶綠色者稱青紫蘇。葉及果實俱供食用。並入藥。

唇形科

鈴子香（漢）

鈴子香。自生於山地。為多年生草。有方莖。高達二三尺。葉對生。為長橢圓形。其端尖。有鋸齒。葉之基部呈凹形。花有淡紅紫色之唇形花冠。簇生於葉腋。有似於麝香之香氣。栽培之供觀賞用。



Lycopus europaeus L.

白根（日）

白根。自生於濕地。為多年生草。高達三四尺。葉對生。為長橢圓形。其端尖銳。有鋸齒。花小。有白色唇形花冠。叢生於葉腋。根狀莖之肥大部。可供食用。

唇形科

Scutellaria indica L.
var. japonica Maxim.

司苦台拉里阿、寅敵卡、加保尼卡、（拉）

唇形科

為山野自生之雜草。有方莖。高及尺餘。葉對生。呈心臟形。花有青紫色或白色之唇形花冠。排列為總狀花序。



Ajuga decumbens Thunb.

Stachys Sieboldii Miq.

草石蠶（漢）　唇形科

草石蠶。多栽培於園圃。為多年生草。有方莖。高達二尺餘。葉對生。有鋸齒。下部之葉。為長心臟形。上部之葉。為長卵形。花開於上部葉腋。有淡紅紫色之唇形花冠。地下連球狀之莖。可供食用。

筋骨草（漢）十二單（日）　唇形科

筋骨草。為山野自生之雜草。有方莖。高達六七寸。葉對生。為長橢圓形。有鋸齒。花有白質淡紫色之唇形花冠。叢生於莖上部葉腋。

Mentha arvensis L.
var. piperascens Holmes.

Leonurus amplexicaule L.

薄荷（漢）　唇形科

薄荷。自生於山野。或栽培於庭園。為多年生草。高達尺餘。有特殊芳香。葉對生。作卵形。其端尖銳。有鋸齒。花小。有紫色唇形花冠。集生於葉腋。

乾其莖葉。可製薄荷腦及薄荷油。薄荷腦用於治齒痛神經痛。又有殺菌之效。薄荷油用於健胃驅風及興奮藥。

佛座（日）　唇形科

佛座。為原野自生之一年生草。或越年生草。高及七八寸。下部之葉。為圓卵形。或心臟形。有葉柄。上部之葉。無葉柄。緊抱莖中。花有紫色細長之唇形花冠。



Lavandula vera DC.



Rosmarinus officinalis L.

迷迭香（漢）　唇形科

迷迭香都歐洲南部原產之常綠小灌木也。葉為線形，革質也。花呈淡黃色，生於莖上部葉腋。

其葉用作通經藥。又蒸溜其枝葉。可採迷迭油。供於外用及內用。但有毒性，故用過量則致死。

刺賢垤爾（日）　唇形科

刺賢垤爾為地中海沿岸原產之常綠灌木。有狹披針形之葉。開如穗狀而呈青色之小花。花冠為唇形，有四雄蕊。

蒸餾其花。可採強芳揮發油。稱刺賢垤爾油。可為藥及香水料之用。

Chamaesaracha japonica Fr. et Sav.

刺酸漿（日）　茄科

刺酸漿。為山野自生之雜草。高及二三尺。葉呈卵形而尖。全邊。花生於葉腋。帶黃白色。其形小。萼有刺毛。生長於花後。所以包果實也。

Solanum nigrum L.

狗酸漿（漢）　茄科

狗酸漿。為原野自生之一年生草。高及二三尺。葉全邊。呈卵形。花小色白。排列為繖形。果為黑色球形漿果。大畧等於碗豆之種子。

性有毒。以莖葉煎汁。可治頑癬。



Lycium chinense Mill.

Lycopersicum esculentum Mill.

茄科

赤茄、多麻斗、（日）

赤茄。為南美白露原產之一年生草。高五六尺。葉為不整齊羽狀複葉。小葉亦分裂為羽狀。花黃色。其構造似茄花。實為漿果。多赤色。

果實供食用。

茄科

枸杞（漢）

枸杞。多生於我國各地。為灌木。高及丈餘。葉為長橢圓形。互生。或叢生。花有紫色合瓣花冠。果作卵形而尖。赤漿果也。

幼葉可食。又可代茶。藥用以果為強壯劑。枸杞之變生物。有莖針者。名鬼枸杞。其効用與枸杞同。

Solanum tuberosum L.

Physalis angulata L.

馬鈴薯（漢）　茄科

馬鈴薯為南美智利原產之多年生草。高達二三尺。地中生塊狀莖。為羽狀複葉。由大小兩種之小葉而成。花有白色或青紫色之合瓣花冠。集生於莖之上部。塊狀莖可供食用。又以之取澱粉。或供酒精原料。由塊狀莖所生之幼枝有毒。不可食。

苦蘵（漢）　茄科

千成酸漿（日）

苦蘵為北美原產之多年生草。高約一尺。葉為卵形。緣邊有粗鋸齒。具長葉柄。花小。作淡綠黃色。其實為綠黃色漿果。萼生長於花後。有十稜之囊以包果實。果實為女兒玩物。同於酸漿。

Capsicum longum L.

Nicotiana tabacum L.

蕃椒（漢）秦椒、辣火、唐辛（日）茄科

蕃椒。為一年生草。多栽培者。高達二三尺。葉為卵形而尖。有長葉柄。互生。花有白色合瓣花冠。具長花梗。果細長。熟呈赤色。有辛味。

果實為辛味料。葉為食用。又栽之以供觀賞。

煙草（漢）　茄科

煙草。為南亞美利加原產之一年生草。高達四五尺。葉互生。為卵形而尖。花有淡紅紫色漏斗狀之合瓣花冠。排列為圓錐花序。

其乾葉為製煙原料。



Datura alba *Nees.*



Solanum Melongena *L.*

曼陀羅花（漢）大麻子。喇叭花（中俗）朝鮮朝顏（日）　茄科

曼陀羅。多栽培於庭園。為一年生草。高達三四尺。葉卵形。有缺刻。花大。有白色漏斗狀合瓣花冠。實為裂果。其面生刺。有毒之植物也。將其葉加於煙草。有鎮咳之効。然用之過多。足以致死。

茄（漢）　茄科

茄為一年生草。多栽培於園圃。高達二三尺。葉互生。為卵形。花有紫色合瓣花冠。實為大形漿果。呈暗紫色。果供食用。其莖可製牙籤。

Scopolia japonica Maxim.

Hyoscyamus niger L.

茛菪（漢）　茄科

茛菪自生於山地為多年生草高達尺餘葉互生為長橢圓形而尖每葉腋開一花具花梗有鍾狀淡紫色合瓣花冠此物有毒其全部可製茛菪越幾斯及茛宕丁幾鎮痙鎮痛之要藥也

菲沃斯（日）　茄科

菲沃斯為歐洲原產之越年生草全部有毛高約三尺葉緣有缺刻基部抱莖花無花梗花冠呈黃色有紫色之脈為麻醉性之毒草可用以鎮痛

Solanum lyratum *Thunb.*

Atropa belladonna *L.*

蜀羊泉（漢）鷄上戶（日）　茄科

蜀羊泉。自生於原野。多年生之蔓草也。莖細長有毛。卷絡於他物。葉為長卵形。基部有大缺刻。花小色白。其構造類茄花。實呈赤色。球形之漿果也。

為有毒植物。

別刺敦那（拉）　茄科

別刺敦那。為歐羅巴及西部亞細亞原產之多年生草。葉卵形而互生。由葉腋生暗紫色之花。實黑色漿果。

此草之葉。稱別刺敦那葉。根稱別刺敦那根。主用於亞篤羅必涅之製造。亞篤羅必涅。外用於病眼。內用於治比斯德里。痙攣癲癇等症。



Physalis Alkekengi L.

Lindernia crustacea F. v. d.

酸漿（漢）

茄科

酸漿。為歐洲南部原產之多年生草。高及二三尺。葉為卵形而尖。花有淡綠色之合瓣花冠。實為赤漿果。有囊狀帶赤色之萼片被之。

栽之以供觀賞。果為女兒玩物。又為藥用。有解熱之効。

林待路尼挨古路司塔開亞（拉）玄參科

田野自生。一年生草。高僅二三寸。葉為卵形。對生。花有淡紫色唇形花冠。具雄蕊四。二個特長。此物形狀雖與通泉草相似。而通泉草混生互生葉。

Lindernia angustifolia Wills.

Veronica agrestis L.

婆婆納（漢）

婆婆納。自生於原野。為一年或越年生草。長三四寸至七八寸。葉為卵形。有鋸齒。最下之葉對生。其餘互生。花為小形淡紅色。每由葉腋發生。果小而扁。有二淺裂。

玄參科

畦蕃椒（日）

畦蕃椒。為一年生小草。田畝之畦畔自生之。莖斜生於地上。葉為長橢圓形。對生。花生於葉腋。有長梗。花冠帶白色。呈唇形。具雄蕊四。二長二短。實細長而小。形類蕃椒。

玄參科

Linaria japonica Miq.



Veronica Beccabunga Lin.

玄參科

柳穿魚（漢）

柳穿魚。自生於海邊。為多年生草。高約一尺。葉帶白色。呈橢圓形。全邊。無葉柄。通常三葉輪生。花有黃色。假面狀。花冠下唇具距。

栽培之為觀賞用。

玄參科

大婆婆納（日）

大婆婆納。為歐洲原產之一年生草。高只四五寸。葉為卵形。有短葉柄。花作青色。每一葉腋。祇生一花。

此草日本近年亦輸入之。東京附近已有野生者。

Scrophularia kakudensis Fr.

Veronica Anagallis L.

玄參科

大山玄參（漢）

大山玄參。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉大。為長卵形而尖。有鋸齒。花有暗紫色唇形花冠。排列為圓錐花序。種子有似實芰答里斯葉之効用。葉治瘰癧最有効。

玄參科

水苦蕒（漢）

水苦蕒。自生於水田小川等處。為越年生草。高達一尺餘。莖平滑。葉為廣披針形。無柄。有鋸齒。對生。花為小形。帶紫白色。排列為總狀花序。幼莖與葉。皆供食用。

Paulownia tomentosa H. Bn.



Ambulia sessiliflora H. Bn.

菊藻（日）　玄參科

菊藻。自生於水田濕地。雜草也。葉輪生。分裂為羽狀。花生於葉腋。有帶紫色之唇形花冠。

桐白桐泡桐（漢）　玄參科

桐為落葉樹。高達三丈。葉大對生。花排列為圓錐花序。花冠為紫色或白色唇形。其材可造箏筍琴箱等類。但歐洲栽培之而為觀賞用。

Antirrhinum majus L.

Veronica virginica L.

玄參科

金魚草（日）

金魚草。為地中海沿岸原產之多年生草。高達二三尺。葉為披針形或長橢圓形。全邊。花大而美。排列為總狀花序。花冠有紫赤白三色之分。呈假面狀。無距。

栽之以供觀賞用。

草本威靈仙（漢）九蓋草、九階草（日）玄參科

草本威靈仙。自生於山地。為多年生草。高達三四尺。葉為廣披針形。輪生。花有青紫色。合瓣花冠。具二雄蕊。排列為長總狀花序。

栽培之為觀賞用。亦可以之治脚氣及僂麻質斯等症。

Euphrasia officinalis *L.*

粉米草（日）　玄參科

粉米草者。山地自生之一年生草也。高及六七寸。葉對生。為卵形。有大鋸齒。花呈白色。有紅紫色之唇形花冠。常寄生於禾本科植物之根株間。



Scrophularia Oldhami *Oliv.*

玄參（漢）　玄參科

玄參。為自生於山野之多年生草。其莖方。高達五六尺。葉對生。為長卵形而尖。有鋸齒。花有綠黃色唇形花冠。具四雄蕊。排列為細長圓錐花序。

地下部供藥用。



Phtheirospermum chinense Bge.

小鹽竈（日）　玄參科

小鹽竈者。山野自生之多年生草也。高及二三尺。葉為羽狀複葉。對生。花生於葉腋。或短花軸之頂。具紫紅色之唇形花冠。

Mazus rugosus Lour.
var. macranthus Fr. et Sav.

通泉草（漢）　玄參科

通泉草者。原野自生之小草也。互生匙狀之葉。亦有對生者。花有白色或帶紫色之唇形花冠。

栽培之為觀賞用。

Rehmannia lutea *Maxim.*

地黃（漢）佐保姬（日）　玄參科

地黃為我國之多年生草。高僅六七寸。葉呈長橢圓形。互生。花作黃白色。有帶紫色之唇形花冠。排列為總狀花序。根為强壯藥。



Pedicularis resupinata *L.*

鹽竈草（日）　玄參科

鹽竈草者。自生於山野之多年生草也。高達二三尺。葉互生或對生。為長卵形。其花有紅紫色之唇形花冠。生於莖之上部。為觀賞用之植物。



Digitalis purpurea *L.*

Tecoma grandiflora *Loisel.*

玄參科

實芝答里斯（拉）

實芝答里斯者歐洲原產之越年生草。高三四尺。下部葉為卵形或廣披針形。有長柄。上部葉無柄或有柄而短。花紅紫色或白色。有大唇形花冠。列為總狀花序。葉為著名心臟強壯藥。兼有利尿之効。又栽培之為觀賞用。

紫威科

凌霄花紫威（漢）

凌霄花多栽培於庭園。木質之蔓生植物也。莖由小形之氣根上昇於他物。葉為奇數羽狀複葉。對生。小葉為卵形而尖。有鋸齒。花有大形黃赤色。稍不整齊之合瓣花冠。有毒。為觀賞用。

Catalpa Kaempferi Sieb. Z.

紫威科

梓（漢）木角豆（日）

梓為栽於園圃之落葉樹。高約二丈。葉形似桐葉而小。花有淡黃色帶紫色斑紋之唇形花冠。果實細長形。狀畧似豇豆。材為木屐及他料。花為觀賞用。

Sesamum indicum L.

胡麻科

胡麻（漢）芝麻（俗）

胡麻。為東印度原產之一年生草。高達三四尺。葉為長橢圓形。對生或互生。花生於葉腋。有淡紫白色筒狀之唇形花冠。實為長乾果。易裂開。種子小而扁。其數多。黑者稱黑油麻。白者稱白油麻。此草人多栽之。以榨油而供食用。



Boschniakia glabra C.A. Mey.

保斯苦尼阿疾阿孫拉不拉(拉)列當科

生於高山。為寄生植物。多寄生於赤楊類之根。莖為黃褐色肉質。呈短柱狀。長尺餘。葉為黃褐色鱗狀。互生。花與葉莖同色。叢生於莖之上部。有唇形花冠。

乾之可作強壯劑。



Aeginetia indica Roxb.

野菰(漢)　列當科

野菰。屬草本。常以根寄生於他植物。高達七八寸。有鱗片狀之葉。每頂開一花。花有帶赤色唇形花冠。

Conandron ramondioides *S.et Z.*

苦苣苔（漢）　苦苣苔科

苦苣苔。常生於山中濕岩上。為多年生草。通常一株一葉。葉雖略似煙草。而有多數鋸齒。花梗長五六寸。花生於頂端。為繖形花序。作淡紫色。亦有白色者。

栽培之供觀賞用。其葉可食。

Utricularia vulgaris *L.*

狸藻（日）　狸藻科

狸藻。屬草本。生於水中。有細長之莖。葉為絲狀。有多數分枝。枝之各處具小囊。花莖抽出於水上。開數多之花。花有黃色不整齊之合瓣花冠。

其生於葉上之小囊。能捕蟲。故甚著名。



Pinguicula vulgaris *L.*

Strobilanthes japonicus *Miq.*

蟲捕堇(日)　狸藻科

蟲捕堇者。乃自生高山之食蟲草。高只三四寸。葉為長橢圓形或長卵形。而叢生。葉面分泌粘液。花單生於花莖之頂。有紫色之唇形花冠。

葉面有粘液。小蟲來時。緣邊向上反卷。蟲即為其所捕。故有此名。

司土落爾郎梯斯加波尼苦斯(拉)　爵林科

此為暖地自生之小灌木。高達一二尺。葉為長橢圓形而尖。互生。花有紫青色唇形花冠。

栽之以供觀賞用。

Plantago major L. var. asiatica Dene.

Justicia procumbens L.

爵牀（漢）　爵牀科

爵牀者。自生於山野之雜草也。高達一尺餘。葉為長橢圓形。或廣披針形。對生。花小。集為穗狀。花冠為淡紫色唇形。具二雄蕊。其莖葉液汁。治充血有効。

車前（漢）蝌蚪葉（日）　車前科

車前為自生山野之多年生草。葉為廣卵形。通常有五肋。具長葉柄。由地下部叢生。花莖由葉叢之中央而生。長約七八寸。花小。排列為穗狀花序。萼與花冠及雄蕊皆由四片而成。幼葉供食用。種子為刺激緩和藥。

Rubia cordifolia L. var. Mungista Miq.

茜草（漢）赤根（日）　茜草科

茜草者。山野自生之多年生蔓草也。葉呈長心臟形或卵形。四枚輪生。莖形方。有下向之刺。花小。呈淡黃白色。

根可作赤色染料。又昔時以此根作利尿藥及强壯劑。



Oldenlandia gambir Baill.

阿仙藥（日）　茜草科

阿仙藥。東印度、馬來、日牙巴、斯麻土拉等處產之。蔓生。為木質之常綠植物。長約十尺。葉呈長卵形。對生。花小。作淡紅色。集數个球形而成。

此物枝葉之煎汁。稱阿仙藥。供藥用及染料用。同於阿哈示阿阿仙藥。



Damnacanthus indicus *Goertn.*



Pseudopyxis longituba *Fr.et Sav.*

虎刺（漢）　茜草科

虎刺為自生於暖地之常綠灌木。生刺甚密。莖高二三尺。葉為卵形而硬。花白。有漏斗狀花冠。實為赤色漿果。

栽培之供觀賞用

浦嗽依島皮克斯羅己祖巴（拉）　茜草科

此為山地自生之雜草。高達三四寸。葉為卵形。對生。花白兼帶紅色。有漏斗狀花冠。

Uncaria rhynchophylla *Miq.*



Rubia chinensis *Regel Maack.*

盧比阿起南塞斯（拉）　茜草科

為山地自生之雜草。高及二三尺。葉為長卵形而尖。有葉柄。四葉輪生。花小。帶綠白色。排列為圓錐花序。

鉤藤（漢）　茜草科

鉤藤。自生於暖地。為蔓生植物。以葉液曲鉤攀於他物而生。葉為卵形而尖。且對生。花小。作黃褐色。花序為球形。乾其曲鉤。可作收斂藥用。

Galium verum L.
var. lacteum Maxim.

河原松葉（日）　茜草科

河原松葉。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉細長而數枚輪生。花小而色白。排列為圓錐花序。根為赤染料。昔時以此凝固牛乳。而作乾酪。



Cinchona succirubra Pav.

規那（日）　茜草科

規那者。亞美利加原產之常綠樹也。高達七八丈。葉為卵形或橢圓形而對生。其花不大。有筒狀合瓣花冠。排列為圓錐花序。其樹皮稱規那皮。用以解熱及強壯藥。其有効之成分。即規泥涅。聖古尼涅等是也。

Galium boreale L.
var. japonicum Maxim.

Gardenia florida L.

砧草（日）　茜草科

砧草。自生於山地。為多年生草。其莖方。高達一二尺。葉為長卵形而尖。無葉柄。每四葉輪生。其花不大。排列為圓錐花序。花冠白色四裂。具雄蕊四。

梔子。黃梔花（漢）　茜草科

梔子。為自生於暖地之常綠樹。高達十尺餘。葉為橢圓形。全邊。對生。花大色白。脫落之前變為淡黃色。實為黃色橢圓形。具五六縱稜。

栽培之為觀賞用。乾其果實。可作黃色染料。或藥用。有下熱清血之効。



Asperula odorata L.

車葉草（日）　茜草科

車葉草。自生於山野。為多年生草。高尺餘。葉輪生。為長橢圓形。或廣披針形。花小色白。有漏斗狀合瓣花冠。乾燥此物。即為苦馬鈴。由苦馬鈴採芳香性之物質。用之以製香水。

Coffea arabica L.

咖啡（漢）　茜草科

咖啡者。自生於東部亞非利加。又栽培於熱帶各地。為常綠樹。高約二十尺。葉長卵形而尖。花白而香。實為肉質。含二種子。將種乾之。即為咖啡。炒作粉末。以熱湯浸之。為良好飲料。



Rubia tinctorum L.

Uragoga Ipecacuanha L. Baill.

西洋赤根（日）　茜草科

西洋赤根。為歐洲原產之多年生草。高達一二尺。每六葉輪生。花為小形黃綠色。能結黑色漿果。根為肉質。作圓柱形而長。外部呈赤褐色。內部之材作黃色。研碎其根。加於稀薄亞硫酸液中。浸出其赤色素。煮沸之。蒸去亞硫酸。即得赤色素。此赤色素稱阿里撒林。可作染料。以此所染之木棉。稱赤根木棉。

吐根（日）　茜草科

吐根。為不拉日魯西部原產之小灌木。高約一尺。為橢圓形或倒卵形。花小色白。多集於總苞之上。實為漿果。作黑青色。其根稱吐根。碎為粉末。或為丁幾。可用以祛痰。

Galium aparine L

猪殃殃（漢）八重葎（日）　茜草科

猪殃殃者。山野自生之雜草也。蔓延於地上。莖細長。有刺毛。葉為倒披針形。通常每八枚輪生。花小而色白。



Lonicera gracilipes Miq.

羅尼開拉格拉克里派司（拉）忍冬科

此物自生於山地。為落葉灌木。高達四五尺。葉為卵形或橢圓形。對生。花帶紅色。有稍不整齊之花冠。實為肉果。作赤色。

栽培之供觀賞用。



Viburnum dilatatum Thunb.

Viburnum Opulus L.

莢蒾（漢）　忍冬科

莢蒾。自生於山野。為落葉樹。高約二丈。葉為廣橢圓形而尖。對生。花小而白。排列為聚繖花序。實赤色。乃小形之漿果也。

栽培之為觀賞用。其實可食。

肝木（日）　忍冬科

肝木。自生於山野。為落葉樹。高達八九尺。葉為卵形。三裂。對生。花白色。排列為聚繖花序。花序周圍之花。其形大。有雌雄蕊。

栽培之供觀賞用。其材可作牙籤。

Lonicera Morrowii *A. Gr.*

Viburnum odoratissimum *Ker.*

金銀木。瓢簞木。(日)　忍冬科

為自生於山野之落葉樹。高達六七尺。葉卵形而對生。有稍不整齊之合瓣花冠。花冠始白後黃。故有金銀木之名。實為紅色漿果。畧似瓢簞形。

栽之以供觀賞。

珊瑚樹。木珊瑚。(日)　忍冬科

珊瑚樹者。乃栽培於庭園之常綠樹也。高達二十餘尺。葉對生。為長橢圓形。質厚有光。花色白而形小。集為圓錐花序。實美麗。呈赤色。作橢圓形。

栽培之為觀賞用。

Lonicera japonica Thunb.

Sambucus nigra L.

忍冬（漢）　忍冬科

自生於山野。為多年生之纏繞植物。下部木質。葉對生。為卵形或橢圓形。凌冬不枯。故有忍冬之名。花生於葉腋。有帶紫白色不整齊之合瓣花冠。此花冠後變黃色。將其葉及花乾之。治瘡腫最有効。又乾其莖葉。可為茶之代用品。

西洋接骨木（日）　忍冬科

西洋接骨木。為歐洲原產之落葉樹。高達丈餘。葉為羽狀複葉。以大廣披針形或長卵形之小葉而成。花有小形白色之合瓣花冠。排列為繖房花序。果小色黑。花為發汗藥。

Sambucus javanica Bl.

蒴藋（漢）　忍冬科

蒴藋自生於山野。為多年生草。高達六七尺。葉對生。為羽狀複葉。由廣披針形之小葉而成。花小色白。排列為繖房花序。花間有杯狀黃色小體。有毒之植物也。

Diervilla japonica DC.

楊櫨（漢）　忍冬科

楊櫨者。自生於山地之落葉樹也。高達六七尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。下面具毛。花有帶赤色之長合瓣花冠。數朶簇生。栽培之為觀賞用。

Sambucus racemosa L.

Diervilla grandiflora S. et Z.

忍冬科

接骨木（漢）

接骨木。為山野自生之落葉樹。高達丈餘。葉對生。為奇數羽狀複葉。由長卵形之小葉而成。花小色白。排列為圓錐花序。實小色赤。其形如球。

其花與實及莖。皆供藥用。又莖心可作顯微鏡試驗用之切片。

忍冬科

錦帶花（漢）

錦帶花。自生於山地。為落葉樹。高達七八尺。葉對生。為卵形橢圓形或倒卵形而尖。有鋸齒。花有淡紅色或白色之合瓣花冠。排列為聚繖花序。花冠之筒。上部廣而下部細。

栽培之為觀賞用。



Viburnum tomentosum *Thunb.*

忍冬科

蝴蝶樹（漢）

蝴蝶樹者。乃自生於山野之落葉樹也。高達丈餘。葉對生。為卵形或橢圓形而尖。有鋸齒。花白色。多數簇生。

觀賞用

Patrinia villosa juss.

敗醬科

男郎花（日）

男郎花者。山野自生之多年生草也。莖葉俱有毛。高達四五尺。葉對生。緣邊分裂成羽狀。花小而白。

栽之以供觀賞。

Patrinia scabiosaefolia Link

敗醬（漢）　敗醬科

敗醬為多年生草。自生於山野。高達四五尺。葉為羽狀複葉。或羽狀裂葉。對生。花小而色黃。

栽培之為觀賞用。

Valeriana officinalis L.

纈草（日）　敗醬科

纈草者。亞洲之多年生草也。產於歐洲。高達一二尺。葉為羽狀複葉。對生。花形小。作淡紅色狀。似敗醬花。

根狀莖可用作治神經病之鎮痙藥。

Dipsacus Fullonum L.

敵潑撒苦司福而勞奴母(拉)山蘿蔔科

此種植物為歐洲原產之二年生草有刺高達六尺葉為廣披針形對生兩葉基部結合花帶紫色而形小排列為頭狀花序果實為橢圓形全部有鉤棘製造羅紗之際可用以搔出絲緒

Scabiosa japonica Miq

山蘿蔔(漢)輪峯菊　山蘿蔔科

山蘿蔔自生於山野為越年生草高達二三尺葉互生為羽狀複葉有細毛花生於花軸頂端排列成頭狀花叢外圍之花形稍大呈唇形作淡紫色中部之花其形小稍呈筒狀呈淡色花之外形類似菊花故有輪峯菊之名果實叢生為半球狀有紫色之刺毛栽培於庭園為觀賞用又採其嫩葉為浸物或和於飯以供食

Gynostemma pedata Bl.

絞股監（漢）　葫蘆科

絞股監。為原野自生之蔓草。有卷鬚。葉為掌狀複葉。通常成於五小葉。花為單性。雌雄生於異株。

葉可為土常山之代用品。

Trichosanthes cucumeroides Maxim.

王瓜（漢）烏瓜（日）　葫蘆科

王瓜。為蔓草。多年生。自生於平野。以卷鬚攀緣他物。葉為心臟形。淺裂而成掌狀。兩面粗糙。花單性。雌雄生於異株。花冠色白。而下部為筒狀。上部五裂。其緣邊分裂成絲狀。果實橢圓形。呈紅色。

其根可取澱粉。陰乾其實。可洗皮膚。



Cucumis sativus L.

胡瓜（漢）黃瓜（中俗）　葫蘆科

胡瓜為東印度原產之一年生草。由卷鬚而上昇。葉為三裂或五裂。呈掌狀。以葉柄而互生。花單性。有黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為漿果之一種。有多數之刺。果供食用。

Actinostemma racemosum Maxim.

合子草（漢）　葫蘆科

合子草為自生於山野之蔓草。以卷鬚卷絡他物。葉互生。為長心臟形。花單性而形小。雌雄生於同株。果實為漿果。橫裂之。上部脫落。下部為椀狀。故有合器蔓之名。

Citrullus vulgaris *Schrad.*



Citrullus colocynthis *Schrad.*

古魯聖篤草（日）　葫蘆科

古魯聖篤草者乃亞剌比亞小亞細亞及亞非利加北部所產之蔓草也以卷鬚卷絡他物其葉與花酷似西瓜實呈黃色球形同於臭橙其實乾者稱古魯聖篤果於峻下劑用之

西瓜（漢）水瓜　葫蘆科

西瓜暖地多產之為蔓生之一年生草有卷鬚葉三至七裂花單性有黃色合瓣花冠雌雄生於同株實為大形漿果果肉分黃赤白三種實供食用子亦可食

Cucumbita maxima *Duch.*

蕃南瓜（漢）唐茄（日）　葫蘆科

蕃南瓜。世多栽培者。為一年生草。有卷鬚。葉為圓心臟形。有淺五裂。具長葉柄。互生。花為單性。有黃色大形之合瓣花冠。雌雄生於同株。實為大漿果。有數個縱溝。實供食用。



Momordica Charantia *L.*

苦瓜（漢）　葫蘆科

苦瓜。園圃栽培之。一年生之蔓草也。莖細長。以卷鬚上昇。花單性。雌雄生於同株。有黃色合瓣花冠。實細長。外面有多數之疣狀突起。熟則變黃色而裂開。現其子。以紅肉被之。其被子紅肉。可供食用。



Benincasa cerifera Savi.



Lagenaria vulgaris Ser.

葫蘆科

冬瓜（漢）

冬瓜。亞細亞及亞非利加諸國多栽培之。為一年生蔓草。莖以卷鬚上昇於他物。葉為心臟形。通常五裂為掌狀。花單性。雌雄生於同株。有黃色花冠。實為大形漿果。生毛甚密。至十分成熟。其外面能分泌白蠟。實供食用。

葫蘆科

蒲盧（漢）

蒲盧。園圃栽之。為一年生之蔓草。莖細長。以卷鬚卷絡他物。葉為圓心臟形而尖。往往淺裂成掌狀。花白色。單性。雌雄生於同株。實為長漿果。中部細縮。成熟時。除去其柔肉。乾燥之。可為酒器。亦可作水勺。



Luffa cylindrica Roem.

絲瓜（漢）　葫蘆科

絲瓜。多栽培於園圃。為一年生蔓草。莖細長。以卷鬚卷絡他物。葉為圓心臟形而尖。分裂成掌狀。花單性。黃色。雌雄同株。實為細長漿果。熟則果肉內生網狀強韌纖維。幼果供食用。纖維可作帽子心及抹布等。其莖中滴出之汁液。稱絲瓜水。供化妝用。

Cucumis Melo L.

甜瓜（漢）香瓜　葫蘆科

甜瓜。自生於亞細亞及亞非利加之熱帶地方。一年生之蔓草也。莖細長。由卷鬚卷絡他物。葉為圓心臟形。分裂成掌狀。花為單性。有黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為漿果。有甘味。呈種種之形狀。果實供食用。

Lagenaria vulgaris *Ser.*

Platycodon grandiflorus *DC.*

葫蘆科

瓠壺盧（漢）

瓠。多栽培於園圃。一年生之蔓草也。莖以卷鬚卷絡他物。葉為短心臟形淺裂成掌狀。花單性。有白色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為細長漿果。

實供食用。十分成熟時。除去內部。可為容器。又一種稱圓瓠。生圓果。實其効用同瓠。又有蒲蘆。亦類似於瓠之植物也。

桔梗科

桔梗（漢）

桔梗。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉為披針形。有鋸齒。互生。花形頗大。生於莖及枝之頂端。花冠為鐘狀五裂。有青紫白色之分。

栽培之為觀賞用。幼莖及葉皆可食。其地下莖。醫者用為呼吸器病藥。

Lobelia sessilifolia *Lamb.*

山梗菜（漢）　桔梗科

山梗菜。自生於山間濕地。多年生草也。高由二三尺至四五尺。葉為披針形。有鋸齒。互生。花生於莖之上部。有青紫色不整齊之合瓣花冠。

有毒之植物也。

Phyteuma japonicum *Miq.*

肥脫依馬加波你苦木　拉　桔梗科

此種植物。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉互生。為長卵形。花有紫色或白色之細長花瓣。排列為總狀花序。

栽培之為觀賞用。

Adenophora remotiflora *Miq.*

蕣苨（漢）　桔梗科

蕣苨。自生於山野。為多年生草。高達三四尺。葉為長卵形而尖。有鋸齒。以長葉柄而互生。花有淡紫青色之鐘狀花冠。

栽培之為觀賞用。

Adenophora verticillata *Fisch.*
var. verticillata *Fr. et Sav.*

沙參（漢）　桔梗科

沙參者。自生於山野之多年生草也。高達三四尺。葉輪生。為廣披針形或長卵形而尖。花有青紫色或白色之鐘狀花冠。排列為圓錐花序。

栽培之為觀賞用。

Campanula punctata *Lam.*

Lobelia inflata *L.*

山小菜（法）　桔梗科

山小菜者。山野自生之多年生草也。高及二三尺。葉互生。為長卵形而尖。有鋸齒。花有長鐘狀合瓣花冠。此花冠作淡紫色或帶白色。具紫小點。

栽之以供觀賞。

魯別利亞（拉）　桔梗科

魯別利亞。為北亞美利加原產之一年生草。高約二尺。葉為長卵形。有不齊之鋸齒。其位於莖下部之葉。有葉柄。上部之葉無葉柄。花呈紫色。有不整齊花冠。實如膀胱狀。

此草全部。於開花時乾燥之。可為祛痰藥。

秋費菜（日）　菊科

秋費菜。為山野自生之多年生草。高二三尺。葉呈橢圓形卵形或披針形而尖。有明瞭細脈。花通常為黃色。白色者不多。實有冠毛。易為風吹散。

昔時以其花枝治腎病膀胱病等。

山苦蕒（漢）　菊科

山苦蕒。自生於山野。為大形之草本植物。有乳狀液汁。高五六尺。葉呈大披針形。多有深缺刻。花作淡黃色。聚為頭狀花序。總苞由覆瓦狀之鱗片排列而成。

為有毒植物。

Chrysanthemum indicum L.

Gnaphalium hypoleucum DC.

秋鼠麴草（日）　菊科

秋鼠麴草。為山野自生之草本植物。有白色細毛。葉細長而尖。花黃色。全部由筒狀花冠而成。

油菊（日）　菊科

油菊者。山野自生之多年生草也。生多數之枝。高達三四尺。葉似菊葉。有深缺刻。花黃色。而為頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有筒狀花冠。果實無冠毛。栽培之供觀賞用。

Arnica montana L.

Erigeron linifolius Willd

亞爾尼加（拉）　菊科

亞爾尼加。自生於歐洲中部。為多年生草。高約一尺。葉為卵形。全邊而對生。花酷似於兔菊之花。

乾燥其花。可用於切疵挫傷等症。又可為興奮藥。但不多用。

愛里格羅里尼佛里務斯（拉）　菊科

自生於山野。為一年生草。高及三四尺。莖葉有粗毛。葉為披針形。有不整齊鋸齒。花悉有筒狀花冠。具冠毛。



Arnica alpina Olin.

兎菊（日）　菊科

兎菊。自生於高山。為多年生草。高達一二尺。葉為倒披針形。數枚簇生。由其中央生花莖。花呈黃色。其花序周圍有舌狀花冠。中部有筒狀花冠。

觀賞用。乾之可作藥。其效用畧類亞爾尼亞。

Leontopodium japonicum Miq.

薄雪草（日）　菊科

薄雪草。自生於高山。為多年生草。高約一尺。葉為鈍披針形。互生。下面有白毛。生於花序下之葉兩面均為白色。花小。有筒狀花冠。

Callistephus chinensis *Nees.*



Ainsliaea dissecta *Fort Sav.*

翠菊（漢）　菊科

翠菊。原生我國。為一年生草。或越年生草。高達二尺有奇。葉為卵形。有鋸齒。具葉柄。花帶紫紅白三色。為大形之頭狀花序。花序外圍之花。呈舌狀。中部呈筒狀。總苞由葉狀之鱗片而成。

供觀賞用。

遠州鬼督郵（日）　菊科

遠州鬼督郵。自生於日本遠州之山野。高達一二尺。葉深裂為掌狀。有長葉柄。簇生於花莖下部。花有筒狀花冠。色白而畧帶紅色。

供觀賞用。

Bellis perennis L.

Inula britanica DC.

延命菊(日)雛菊(日)　菊科

延命菊。為歐洲原產之多年生草。高僅三四寸。葉呈長倒卵形或匙狀。多數簇生。由其中央出花莖。各花莖之先端。生一頭狀花序。花序周圍之花。有舌狀花冠。呈白色兼帶紅紫。中部花冠為筒狀。黃色居多。供觀賞用。

旋覆花(漢)小車　菊科

旋覆花。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉為披針形。互生。乾燥之變黑色。花色黃。排列為頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有筒狀花冠。觀賞用。並入藥。

Atractylis ovata Thunb.

Artemisia japonica Thunb.

蒼术（漢）　菊科

蒼术。自生於山野。為多年生草。莖高二三尺。下部木質。葉為單葉。作橢圓形。或深三裂。或為複葉。由三枚或五枚之小葉而成。互生。花有白色或淡紅色之筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞為葉狀。排列如覆瓦。由魚骨狀之葉圍繞而成。根供食用。乾之可薰蚊殺菌。

牡蒿（漢）　菊科

牡蒿者。山野自生之雜草也。高達二三尺。葉為楔形。上部有缺刻。互生。其花酷似於艾。但得以形小而區別之。

Xanthium strumarium L.



Crepis japonica Benth.

菊科

蒙耳（漢）

蒙耳者。原野自生之一年生草也。高達四五尺。葉為卵形而尖。有缺刻。互生。花單性。雌雄生於同株。雄花排列為小形頭狀花序。生於花軸上部。雌花亦為頭狀花序。結合而隱於囊狀總苞內。此總苞全面生刺。浸出其液。用為收斂藥。

菊科

苦來皮司加波尼卡（拉）

原野自生之雜草也。高達二尺餘。莖葉有毛。葉互生。頗似蘿蔔葉。有舌狀黃色花冠。排列為小形頭狀花序。果實具多數冠毛。易為風所吹散。



Pertya scandens *Sch. Bip.* var. ovata *Maxim.*

高野帚（日）　菊科

自生於山野。為小灌木。高達二三尺。葉為卵形。互生。花有淡紅白三色之筒狀花冠。排列為頭狀花序。

莖可製帚。

Picris hieracioides *L.* var. japonica *Rgl.*

毛蓮菜（漢）　菊科

毛蓮菜。自生於山野。為越年生草。高達二三尺。莖葉俱生硬毛。葉為披針形。有銳鋸齒。互生。花似蒲公英。花有黃色舌狀花冠。具白色冠毛。為頭狀花序。

Macroclinidium robustum *Maxim.*

麻苦羅苦利尼敵吳母羅巴司土母(拉)　菊科

山野自生。為多年生草。高達一二尺。葉為橢圓形而尖。有少數大鋸齒。葉柄長而互生。花白色。作筒狀。排列為頭狀花序。總苞以數枚覆瓦狀之片。排列而成圓柱狀。

Inula salicina *L.*

卡塞恩草(日)　菊科

卡塞恩草。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉呈廣披針形。多皺如乾燥狀。以其基部包莖。緣邊有小鋸齒。花色黃。排列為頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部則呈筒狀。

供觀賞用。

Cacalia adenostyloides *Fr. et Sav.*

蟹蝙蝠（日）　菊科

蟹蝙蝠。為自生於山地之雜草。高達二三尺。葉形類蟹甲。緣邊有不整齊齒牙。花帶白色。悉有筒狀花冠。為小形之頭狀花序。

Ammobium alatum *R. Br.*

貝細工（日）　菊科

貝細工。為濠洲原產之一年生草。有綿狀之毛。高達二三尺。上部之葉為披針形。基部延長如翼狀。密著於莖。花有黃筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞成於銀白色之片。

供觀賞用。

Anaphalis yedoensis *Matsum.*



Carpesium cernuum *L.*

荻（漢）　菊科

荻。恒自生於河邊。為多年生草。高達尺餘。葉細長而尖。其下面密生白毛。其花形小而色黃。排列為頭狀花序。總苞由多數白鱗片而成。

烟管頭草（日）　菊科

烟管頭草。自生於山野。為雜草之一種。高達一二尺。葉為橢圓形而尖。有鋸齒。莖之分枝不多。各枝頂端成彎曲形。生一個之頭狀花序。其狀頗如烟管頭。故有此名。花有黃色筒狀花冠。

Matricaria Chamomilla L.



Ainsliaea apiculata Sch. Bip.

加密兒列（日）　菊科

加密兒列者。歐洲原產之植物也。為一年生草。葉細裂。能發香氣。花無冠毛。其舌狀花冠呈白色。筒狀花冠呈黃色。

其乾花稱為加密兒列花。為發汗劑。用法與羅馬加密兒列同。

阿寅斯利挨阿、阿皮苦拉塔（拉）　菊科

自生於山野。為多年生草。高達七八寸。葉小。以淺裂成掌狀。叢生於莖之下部。花白色。有筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞狹長。

Chrysanthemum sinense Sab.

Scorzonera hispanica L.

菊（漢）　菊科

菊皆栽培而生。多年生草也。有木質性之莖。葉呈卵形。有缺刻。以葉柄互生。花為頭狀花序。周圍花為舌狀。中部花為筒狀。又因培養之結果。其頭狀花序之全花。往往變成舌狀花冠。

菊之變種甚多。栽培之為觀賞用。黃花中變種之一。其花可食。

斯可兒早奈拉席斯爬尼卡（拉）　菊科

此為歐洲原產之多年生草。高達三四尺。葉細長而尖。互生。花為黃色。有舌狀花冠。排列為頭狀花序。根黑色細長。酷似牛蒡根。

根供食料。葉可養蠶。

泥胡菜（漢）　菊科

泥胡菜。自生於山野。為雜草之一。高達二三尺。葉大。分裂為羽狀。下面密生白軟毛。花紫紅色。皆有筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞為膜質鱗狀。排列如覆瓦。



錦雞菊（日）　菊科

錦雞菊。為北美合衆國原產之一年生或二年生草。高達尺餘。葉為複葉。由三枚至七枚小葉而成。小葉為卵形。其頭狀花序具長柄。周圍之花。有黃金色之舌狀花冠。中部則成筒狀。作紫褐色。供觀賞用。

Spilanthes oleracea Jacq.

荷蘭千日(日)千日菊(日)　菊科

荷蘭千日者。乃東印度原產之一年生草也。高達一二尺。葉呈卵形。對生。花有筒狀花冠。排列為卵形之頭狀花序。其末開放時帶紅色。至十分開放。乃呈淡黃。葉有辛味。可治齒痛。又有供觀賞以栽培者。

Calendula arvensis L.

金盞草(漢)　菊科

金盞草。為一年生或二年生之栽培植物。高尺餘。葉為廣披針形。互生。花色黃赤。排列為頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。實為乾果。作彎曲形。形小多刺。

供觀賞用。

Artemisia annua L.



Arctium Lappa L.

黃花蒿（漢）　菊科

黃花蒿。自生於原野。為一年生草。高達三四尺。葉為複葉。且細裂。花小而色黃。有筒狀花冠。排列為圓形之頭狀花序。撕碎其葉。則發惡臭。

牛蒡（漢）牛房（日）　菊科

牛蒡。到處產之。為越年生草。高四五尺。葉大如心臟形。有長葉柄。下面生白毛。花有紫色之筒狀花冠。花序呈頭狀。有由針狀鱗片而成之總苞。根及幼葉柄。皆供食用。

Aster trinervius *Roxb.*
var. adustus *Maxim.*

Gynura pinnatifida *DC*

馬蘭（漢）　菊科

馬蘭。為山野自生之多年生草。高二三尺。葉為長卵形而尖。甚粗糙。有三大脈。具深鋸齒。互生。花類似雞兒腸花。因有多數冠毛。得以區別之。

供觀賞用。嫩葉可食。

三七草（漢）　菊科

三七草。多栽培於庭園中。為多年生草。高約三尺。葉互生。形大。分裂成羽狀。花有黃色。筒狀花冠。集為頭狀花序。

以其葉液塗於毒蟲所刺處。有消毒之效。

Aster tataricus L.

Chrysanthemum coronarium L.

紫菀（漢）　菊　科

紫菀。庭園栽培之。為多年生草。高達於六七尺。葉為大形。有鋸齒。葉面粗糙。花排列為頭狀花序。花序集生於莖及枝之上部。花序周圍之花。有淡紫色之舌狀花冠。中部之花。有黃色之筒狀花冠。為觀賞用之植物。

茼蒿（漢）春菊（日）蓬蒿菜（中俗）　菊　科

茼蒿。多栽培而生。一年或越年生草。高二三尺。葉互生。深裂成羽狀。花或黃或白。花序為頭狀。外圍花有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。供觀賞用。幼葉及莖可食。

Aster scaber *Thunb.*

東風菜（漢）　菊科

東風菜。山野自生。為多年生草。高四五尺。下部之葉。為大心臟形。上部之葉。為長卵形。互生。花作白色。花序為頭狀。生於莖及枝之上部。周圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。葉能生茅。

Aster trinervius *Roxb.* var. holophyllus *Maxim*

白花除蟲菊（日）　菊科

為達虜馬其阿原產之多年生草。高二三尺。葉分裂為羽狀。有長葉柄。花白色。排列為頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部則成筒狀。

供觀賞用。其花之粉末。可以除蟲。

Chrysanthemum cinerariifolium *Bocc.*

白娵菜（日）　菊科

白娵菜。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉為廣披針形。有三大脉。葉面粗糙。花色白。為頭狀花序。具冠毛。周圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有筒狀花冠。

供觀賞用。



Achillea millefolium *L.*

西洋鋸草（日）　菊科

西洋鋸草。歐美自生。為多年生草。高二尺餘。葉互生。為羽狀複葉。小葉亦分裂為羽狀。花形小色白。或淡紅色。花序為頭狀。周圍花有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。

供觀賞用。葉為藥用。治肺結核有効。

Artemisia cina *Berg.*

攝綿支奈、支奈。（日）　菊　科

支奈者。乃中央亞細亞自生之半灌木也。高二尺餘。葉互生。其數不多。分裂為羽狀。花形頗小。集為小頭狀花序。與艾花序相似。而小尤過之。

昔時以其花煎汁。為驅蟲藥。近時以其花序製成撒恩土尼內。亦用以驅蟲。

Tagetes erecta *L.*

萬壽菊（漢）金錢菊（中俗）　菊　科

萬壽菊者。為亞非利加原產之一年生草。高達三四尺。葉為羽狀複葉。由帶鋸齒之小葉而成。花黃帶赤。排列為大形頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。

栽培之為觀賞用

Bidens tripartita L.

Gerbera Anandria Sch. Bip.

大丁草（漢）千本鎗、紫蒲公英、（日）菊　科

大丁草。山野自生。為多年生草。高三四寸至一尺。葉類蒲公英。但有軟毛。花軸生於葉叢間。具一頭狀花序。於其頂。花或白或淡紫。具淡褐色冠毛。花序外圍。有舌狀花冠。中部有筒狀花冠。

狼把草（漢）田五加（日）　菊　科

狼把草。生於水田或濕地。為一年生草。高二三尺。下部之葉三裂或五裂。具粗鋸齒。上部之葉為廣披針形。亦有粗鋸齒。花有黃色筒狀花冠。排列為頭狀花序。

此草能使白髮變黑。治肺結核亦有効。



Taraxacum officinale *Wigg.*

Eclipta alba *Hassk.*

鱧腸（漢）　菊科

鱧腸。雜草也。自生於水邊。高達二尺餘。葉對生。為披針形。有鋸齒。其面粗糙。花小色白。排列為頭狀花序。外圍之花有舌狀花冠。中部之花為筒狀花冠。

蒲公英（漢）　菊科

蒲公英。山野自生。為多年生草。高七八寸。葉叢生。畧呈倒披針形。有下向之大鋸齒。花莖生於葉叢間。其頂著一頭狀花序。花有黃色舌狀花冠。具冠毛。

幼葉供食用。又有健胃之効。

Lactuca sativa L.

萵苣（漢）　菊科

萵苣。為歐羅巴原產之一年生或越年生草。高達三尺餘。上部之葉無柄而尖。且抱莖。下部之葉廣而長。花有黃色舌狀花冠。花序為頭狀。葉供食用。

Gnaphalium japonicum Thunb.

父子草（日）　菊科

父子草。為自生於山野之雜草。高達四五寸。下部之葉。為倒披針形而長。上部之葉。為披針形而短。葉面呈濃綠色。有光澤。下面帶白色。有毛。花有小形帶紅色之筒狀花冠。排列為小頭狀花序。以幼葉和餅。可為食用。

Ligularia Kaempferi S. et Z.

槖吾（漢）　菊科

槖吾者。自生於暖地海濱之草也。屬多年生。高二尺餘。葉呈圓心臟形。有長葉柄。狀類欵冬。而質特厚。且有光澤。花呈黃色。排列為頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。

供觀賞用。葉柄可食。

Dahlia variabilis Desf.

天竺牡丹（日）　菊科

天竺牡丹。為墨西哥原產之多年生草。高四五尺。葉為羽狀複葉。自卵形小葉而成。花美麗。色有種種。排列為大頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部花具筒狀花冠。間有全部具舌狀者。

供觀賞用。

Lactuca Thunbergiana *Maxim.*

黃瓜菜（漢）苦菜（日）　菊科

黃瓜菜。為山野自生之雜草。高達一二尺。葉細長。有不整齊之缺刻。花有黃色舌狀花冠。排列為頭狀花序。各花序通常成於五花。果實為小形種子。狀具冠毛。其白色乳狀液。有毒。

Artemisia absinthium *L.*

苦艾（日）　菊科

苦艾者。歐洲原產之多年生草也。芳香甚強。高約四尺。葉分裂為二回或三回羽狀。兩面密生絹絲狀白毛。花小。集為半球形之頭狀花序。葉及花序。為健胃劑。其實投於酒中。大有香味。

Gnaphalium multiceps *Wall.*



Achillea sibirica *Ledeb.*

著（漢）鋸草（曰）　菊科

自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉互生而細長。分裂為羽狀。其狀似鋸。花或白或淡紅。排列為小形之頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。供觀賞用。古以其莖用為占筮。

鼠麴草（漢）御形、母子草（曰）　菊科

鼠麴草。自生於山野。為草本。高達尺餘。葉互生。畧呈倒披針形。具白色軟毛。花有小形黃色之筒狀花冠。排列為小頭狀花序。以葉和餅。可供食用。



Coreopsis tinctoria *Nutt.*

Tragopogon porrifolius *L.*

土拉高泡個恩波路里否里吳斯（拉）　菊科

歐洲之原產二年生草。葉長而尖。根白色多肉。花作青紫色。根供食用。其味佳良。亦有栽之以觀賞者。

哥來喔布席斯提痕苦土里阿（拉）　菊科

此種植物。多栽培於庭園。為一年生草。或越年生草。高達四五尺。莖葉平滑。下部之葉。為二回羽狀複葉。由細長之小葉而成。花排列為頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有紫褐色之筒狀花冠。其舌狀花冠。上部多黃色。下部多紫褐色。供觀賞用。

Lactuca debilis *Marim.*

Helianthus annuus *L.*

向日葵（漢）日迴（日）　菊科

向日葵。為墨西哥原產之一年生草。高六七尺。葉為卵形而互生。緣邊有鋸齒。葉面粗糙。花黃色。排列為大形之頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有筒狀花冠。花托平坦。花序有向日傾斜之性。供觀賞用。或將其子榨油以點燈。

剪刀股（漢）　菊科

剪刀股者。山野自生之雜草也。莖匍匐於地上。葉橢圓或長倒卵形。有長葉柄。往往具缺刻。花有黃色舌狀花冠。排列為頭狀花序。

Zinnia elegans L.

Petasites japonicus Mcg.

百日草(日)秋羅　菊科

百日草。為墨西哥原產之一年生草。高二尺餘。葉對生。呈卵形或心臟形。花有紅紫青紫及白色之分。排列成大形頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部花具筒狀花冠。總花托呈圓錐形。

供觀賞用。

欵冬(漢)蕗　苳(日)　菊科

欵冬。山野自生。為多年生草。高二尺餘。葉為圓腎臟形。具長葉柄。花莖互生長卵形之尖葉。頂有多數之頭狀花序。花有筒狀花冠。

葉柄及幼蕾。供食用。

Eupatorium chinense L.

藤袴（日）蘭草（漢）佩蘭葉　菊科

藤袴。山野自生。為多年生草。高三四尺。全部蓄香氣。葉平滑。具鋸齒。有光澤。下部葉有三裂。上部葉呈廣披針形。或長橢圓形而尖。花淡紫色。有筒狀花冠。排列成頭狀花序。

觀賞用。

Carthamus tinctorius L.

紅花（漢）　菊科

紅花。多栽培於園圃。為越年生草。高四五尺。葉互生。為廣披針形。具銳鋸齒。略似薊類之葉。花有紅黃色之筒狀花冠。排列成頭狀花序。總苞為葉狀。其緣邊由銳鋸齒片而成。

花冠製胭脂。種子榨油。幼莖供食用。

Erigeron annuus *Pers.*

Asteromaea indica *Bl.*

噯里格羅恩喀奴司（拉）　菊　科

為北美原產之一年生草。或多年生草。高三四尺。莖葉有毛。葉為長倒卵形。有粗鋸齒。花排列為頭狀花序。周圍花有白色舌狀花冠。中部花有黃色筒狀花冠。近年日本亦產此植物。但為雜草。蔓延各地。呈日本固有植物之觀。

雞兒腸（漢）　娵萊（日）馬來豆　菊　科

雞兒腸者。山野自生之多年生草也。高二三尺。葉互生。為長橢圓形而尖。有大鋸齒。花排列為頭狀花序。周圍花有青紫色之舌狀花冠。中部花具黃色之筒狀花冠。花全部無冠毛。

幼莖供食用。又為觀賞用。

Artemisia vulgaris L.
var. indica Maxim.

Lactuca virosa L.

艾（漢）　菊科

艾。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉互生。為長卵形。分裂成羽狀。下面密生灰白色毛。花有筒狀花冠。排列為小頭狀花序。花序周圍之花為雌花。中部則兩性皆有之。

幼葉和餅或團子中。可供食用。乾葉則以之製艾。

刺苦丟葛傴謨（日）　菊科

歐洲原產之二年生草。發惡臭。形似黃瓜菜。上部葉無柄。以葉脚抱莖。莖長三尺。花有黃色舌狀花冠。

取莖中白乳狀之液而乾燥之。即為刺苦丟葛傴謨。內含麻醉性之成分。可為藥用。

Anthemis nobilis L.

羅馬加密兒列（日）　菊科

歐洲西部原產之多年生草。葉為細裂。有強香氣。花帶黃白色。無冠毛。

乾花即羅馬加密兒列。加水熱之。有發汗驅風之効。

Centaurea Cyanus L.

矢車菊（日）　菊科

矢車菊。原產歐洲。為一年生或越年生草。高二三尺。葉莖皆具綿狀之毛。葉細長而尖。互生。花有筒狀花冠。排列為頭狀花序。其周圍之花。有青紫色紅色或白色之大形花冠。供觀賞用。

A

Abies balsamea mill... 三四
Abies firma S. et Z.... 四二
Abrus precatorius L... 二七七
Abutilon theophrasti Medic ... ... 三三四
Abutilon megapotamicum St. Hil. et Naud 三三四
Acacia catechu willd. 二六〇
Acacia senegal willd. 二六一
Acanthopanax spinosum mip ... ... 三七一
Acalypha australis L. 三〇五
Acanthopanax ricinifolium S. et Z. ... 三七五
Acer palmatum Thunb 三二二
Acer saccharinum L. 三二三
Acer purpurascens Fr. et sav ... ... 三二二
Achyranthes bidentata B. l. var. japonica miq ... ... 一六七
Achillea millefolium L... ... ... 五一〇
Achillea sibirica Ledeb 五一七
Acorus calamus L. ... 一七五
Acorus gramineus Ait 一七六
Aconitum fischeri Reich ... ... 一九〇
Actinidia polygama Miq ... ... 三四一
Actinostemma racemosum Maxim ... 四八一
Actinidia arguta pl.... 三四〇
Adansonia digitata L. 三三八
Adenophora remotiflora Miq ... ... 四八八
Adenophora verticillata Fisch. var. verticillata Fr. et sav... 四八八
Adiantum pedatum L. 一八
Adonis davurica Ledeb 一九一
Aeginetia indica Roxb 四六〇
Aegle sepiaria Dc. ... 二九二
Aesculus turbinata Bl. 三二三
Aeschynomene indica L... ... ... 二六八
Agave Americana L. 一〇八
Agrimonia pilosa Ledeb ... ... 二四二
Ainsliaea dissecta Fr. et Sav ... ... 四九四

Ainsliaea apiculata Sch. Bip. ... ... 五〇三
Ajuga decumbens Thunb ... ... 四三九
Ajuga pygmaea A. Gr. 四三五
Akebia quinata Dene. 一九四
Akebia lobata Dene... 一九五
Albizzia julibrissin Boir ... ... 二八二
Aldrovanda vesiculosa L... ... ... 二二四
Aleurites Cordata Muell Arq. ... ... 三〇五
Alkanna tinctoria Tausch... ... ... 四二三
Allium ledebourianum Schult ... ... 八二
Allium Opa L... ... 九八
Allium odorum L. ... 一〇〇
Allium scorodoprasum L... ... ... 一〇一
Allium fistulosum L... 一〇一
Allium nipponicum Fr. et Sav ... ... 一〇二
Allium bakeri Rge ... 一〇四
Alliaria wasabi prante 二二〇
Alnus japonica S. et Z. 一三二
Alnus firma S. et Z... 一三二
Aloe vera L... ... 一〇五
Alopecurus fulvus L. 五七
Alpiniachinensis Roscoe ... ... 一一五
Althaea rosea Car. ... 三三五
Althaea officinalis L. 三三三
Amarantus blitum L. 一六六
Amarantus gangeticus L... ... ... 一六八
Ambulia sessiliflora H. B. n. ... ... 四五三
Amelanchier asiatica C. Kock ... ... 二四九
Ammobium alatum R. Br. ... ... 五〇〇
Ampelopsis heterophylla S. et Z. ... 三三〇
Ananas sativus Lindl. 七八
Anaphalis yedoensis Matsum ... ... 五〇一
Andromeda nana Mat. 三九四
Andropogon nardus L. Var. Goeringii Hack ... ... 五〇

Andromeda japonica Thunb ... ... 三八九
Anemone nikoensis Maxim... ... ... 一八一
Ancilema Keisak Hassk ... ... 七九
Anemone cernua Thunb ... ... 一八二
Anemone japonica S. et. Z. ... ... 一八六
Anemone Hepatica L. 一八八
Anemone Flaccida Fr. Schm ... ... 一九二
Anona squamosa L. 二〇四
Antirrhinum majus L. 四五四
Anthemis nobilis L. 五二四
Apium graveolens L. 三七九
Aquilegia flabellata S. et Z. ... ... 一九三
Aquilaria agallocha Roxb. ... ... 三五八
Aralia Cordata Thunb 三七一
Aralia sinensis L... 三七三
Aralia papyrifera Hook ... ... 三七三
Aralia repens Natsum 三七四
Arachis hypogaea L. 二八一
Arctium Lappa L. 五〇六
Arctostaphylos uva urs Spr. ... ... 三九〇
Ardisia Crenata Sims 三九六
Ardisia japonica Bl. 三九六
Arethusa japonica A. Gr. ... ... 一二〇
Arenga saccarifera Labill ... ... 七〇
Areca catechu L. ... 七二
Arisaema japonicum Bl... ... ... 七七
Aristolochia kaempferi Willd. ... ... 一五五
Arisaema Thunbergii Bl. ... ... 七三
Aristolochia debilis S. et Z. ... ... 一五四
Arnica montana L... 四九二
Arnica alpina olin... 四九三
Artemisia annua L... 五〇六
Artemisis cina Berg. 五一一
Artemisia Vulgaris L. Var. indica Maxim... ... ... 五二三

Artemisia absinthium L. 五一六
Artemisia japonica Thunb ... ... 四九六
Arthraxon Ciliare Beauv ... ... 五四
Artocarpus integrifolia. Forst... ... 一四八
Artocarpus incisa Forst ... ... 一四八
Asarum Blumei Dach 一五五
Asarum caulescens Miq ... ... 一五六
Asparagus officinals L. 八七
Asparagus lucidus Lindl. ... ... 九一
Aspergillus Oryzae Wehm ... ... 八
Asperula Odorata L. 四六九
Aspidistra elatior Bl. 一〇二
Aspidium decursive-pinnatum kze. ... 一九
Asplenium japonicum Thunb ... ... 二〇
Astilbe chinensis Maxim. Var japonica Maxim... 二二七
Aster trinervius Roxb. Var. Adustus Maxim... ... ... 五〇七
Aster tatarieus L... 五〇八
Aster scaber Thunb. 五〇九
Asteromaea indica Bl. ... ... 五二二
Aster trinervius Roxb Var. holophyllus Maxim... ... ... 五〇九
Astilbe chinensis Maxim. Var. japonica Maxim ... 二三二
Astragalus gummifer Labill ... ... 二八六
Atractylis ovata Thunb ... ... 四九六
Atropa belladonna L. 四四八
Aucuba japonica Thunb ... ... 三八四
Avena Sativa L... 五二
Averrhoa Carambola L... ... ... 二八九
Azolla pinnata R. Br. Var africana. Baker ... ... 二五

B

Bacillus vulgaris mig. 一
Balsamodendron Myrrha Nees ... ... 三〇〇
Bambusa Veitchii carr. 六四
Begonia Evansiana Andr. ... ... 三五五
Beggiatoa alba ... 一
Belamcanda punctata Moench. ... ... 一一二
Bellis perennis L... 四九五
Benincasa cerifera Savi 四八四
Berberia Thunbergii DC. ... ... 一九九
Berberis nepaleniss Spreng... ... ... 一九八
Berchemia racemosa S. et Z... ... ... 三二七
Beta vulgaris L. ... 一六五
Beta vulgaris L. Var. Rapa Dmrt... ... 一六四
Betula alba L. Var. vulgaris DC... ... 一〇三
Bidens tripartita L. 五一二
Bletilla hyacinthina Rchb f... ... ... 一二一
Blechnum Spicant Roth ... ... 二〇
Boehmeria japonica Miq. Var. tricuspis Hce ... ... 一五〇
Boehmeria nivea Bl. 一五二
Boschniakia glabra C. A. Mey ... ... 四六〇
Boswellia Carteri Bird 三〇〇
Brassica campestris L... ... ... 二一三
Brassica campestris L. 二一五
Brassica cernua (Thunb) ... ... 二一六
Brasenia purpurea Casp ... ... 一七八
Brassica oleracea L. 二二〇
Briza maxima L. 五四
Broussonetia Kasinoki Sieb... ... ... 一四三
Broussonetia papyrifera vent ... ... 一四四
Buckleya, Quadriala B. et H. ... ... 一五三
Buddlea japonica Hemse ... ... 四〇九

C

Cacalia adenostyloides Fr. et Sav. ... ... 五〇〇
Caesalpinia Sappan L. 二七五
Caesalpinia sepiaria Roxb ... ... 二七三
Calanthe discolor linde 一一八
Calamus rotang L. ... 一七〇
Calendula arvensis L. 五〇五
Callicarpa japonica Thunb ... ... 四二八
Calamintha gracilis Benth ... ... 四三六
Calamintha chinensis Benth ... ... 四三四
Callistephus chinensis Nees ... ... 四九四
Calycanthus praecox L. 二〇四
Caltha palustris L. Var sibirica Rge... ... 一八二
Calystegia Sepium R. Br. ... ... 四二一
Campanula punctata lam ... ... 四八九
Canavallia eniformis DC. ... ... 二八〇
Canna indica L. ... 一一七
Cannabis Sativa L. ... 一四二
Capsicum Longum L. 四四五
Capsella Bursa Pastoris Moench. ... 二一九
Carex dispalatha Boott 六五
Cardamine Hirsuta L. Var. Silvatica Link 二一九
Cardiandra alternifolia, S. et Z... ... ... 二三〇
Carica Papaya L. ... 三五五
Carludovica palmata R. et P. ... ... 一七三
Carpesium cernuum L... ... ... 五〇一
Carpinus japonica Bl. 一三〇
Carum petroselinum Benth ... ... 三七九
Carthamus tinctorius L... ... ... 五二一
Caryopteris Mastacanthus Schauer ... 四二六
Caryopteris divaricata Maxim... ... ... 四二五
Cassia mimosoides L... 二六六
Cassia acutifolia Del... 二七六

Castanea vulgaris Lam Var. japonica DC... 一三六
Catalpa kaempferi S. et Z. ... ... 四五九
Cedrela chinensis Juss 三〇一
Ceiba pentandra Gaertn... ... ... 三三九
Celastrus articulatus Thunb ... ... 三一九
Celosia cristata L. ... 一六七
Celtis Sinensis Pers... 一四〇
Centaurea cyanus L... 五二四
Cephalotaxus drupacea S. et Z. ... ... 三〇
Cercidiphyllum japonicum S. et Z... ... 一八〇
Cereus multiplex Pfeiff 三五六
Ceratophyllum demersum L... ... ... 一七九
Cercis chinensis Bge.. 二八三
Cetraria islandica Ach 一三
Chamaecyparis obtusa S. et Z. ... ... 四〇
Chamaecyparis pisifera S. et Z... ... 三七
Chamaele tenera Miq. 三八一
Chamaesaracha japonica Fr. et sav. ... 四四二
Chelidonium Majus L. 二一〇
Chelonopsis moschata Miq. ... ... 四三七
Chenopodium album L. 一六三
Chlorophytum comosum Bak ... ... 八七
Chloranthus serratus R. et S. ... ... 一二七
Chloranthus brachystachys Bl. ... ... 一二五
Chloranthus japonicus Sieb ... ... 一二六
Chloranthus inconspicuus Sw. ... ... 一二六
Chrysanthemum indicum L... ... ... 四九一
Chrysanthemum sinense Sab. ... ... 五〇三
Chrysanthemum coronarium L. ... ... 五〇八
Chrysanthemum cinerariifolium Bocc... 五一〇
Cimicifuga foetida L. Var. simplex Huth 一八七

Cinchona succirubra Pav ... ... 四六七
Cinnamomum Camphora Nees... ... 二〇六
Cinnamomum Cassia Bl. ... ... 二〇七
Cinnamomum Loureirii Nees ... ... 二〇九
Cissus japonica Willd 三三〇
Citrus nobilis Lour ... 二九七
Citrus nobilis Lour Var. microcarpa Hassk ... ... 二九三
Citrus Aurantium L. 二九四
Citrus medica L. Var. acida Hook... ... 二九八
Citrullus Colocynthis Schrad... ... ... 四八二
Citrullus vulgaris Schrad... ... ... 四八二
Citrus bigaradia Duham... ... ... 二九六
Citrus medica L. Var. Limonum Hook ... 二九八
Cicuta Virosa L. ... 三八二
ClavicepsPurpureaJul. .....九
Cladrastis amurensis B. et H. Var floribunda maxim ... 二六二
Clematis heracleifolia De. ... ... 一八五
Clematis Paniculata Thunb ... ... 一八九
Clematis florida Thunb 一九〇
Clematis apiifolia De. 一九四
Clematis Patens Morr. et Dene. ... ... 一八三
Clerodendron tricotomum Thunb... ... 四二五
Clethra barbinervis S. et Z. ... ... 三八六
Cocculus Thunbergii De. ... ... 一九九
CochlearíaarmoraciaL. 二一七
Cocos nucifera L. ... 七二
Coffea arabica L. ... 四六九
Coix lacryma L. ... 六一
Coix agrestis Lour... 五六
Colocasia antiquorum Schott ... ... 七五
Commelina Communis L... ... ... 七九

Colchicum autumnale L... ... ... 九三
Convallaria majalis L. 九〇
Conandron ramondioides S. et Z. ... 四六一
Conium maculatum L. 三八二
Copitis quinquefolia Miq. ... ... 一八六
Copaifera officinalis L. 二七〇
Coptis japonica Makino ... ... 一九三
Corchoropsis crenata S. et Z... ... ... 三三一
Corchorus capsularis L 三三二
Coreopsis Drummondii Torr. et Gr... ... 五〇四
Coreopsis tinctoria Nutt ... ... 五一八
Coriaria japonica A. Gr. ... ... 三一一
Coriandrum sativum L.... ... ... 三八〇
Cornus ignorata C. Kock ... ... 三八五
Cornus officinalis S. et Z. ... ... 三八六
Cortinellus shiitake Henn ... ... 一一
Cortinellus edodes Henn ... ... 一一
Corton tiglium L... 三〇九
Cortinellus edodes Henn ... ...
Corydalis incisa Pers. 二一二
Corylus Heterophylla Fisch ... ... 一三一
Corylus rostrata Ait Var. Sieboldiana Maxim... ... ... 一三一
Crataeva religiosa Forst ... ... 二一三
Crepis japonica Benth 四九七
CrotalariaSessilifloraL. 二七四
Crocus sativus L ... 一一一
Croton Eluteria Benn 三〇六
Cryptomeria japonica Don. ... ... 三八
Cryptotaenia japonica Hassk ... ... 三八四
Cucumis Sativus L... 四八一
Cucurbita maxima Duch ... ... 四八三

Cucumis nelo L. ... 四八五
Cunninghamia sinensis R. Br... ... ... 三五
Curcuma longa L. Var macrophylla Miq. ... ... 一一四
Cuscuta japonica Chois Var. thyrsoidea Enqelm... ... 四二〇
Cyathea Spinulosa Wall ... ... 一六
Cycas revoluta thunb. 二九
Cydonia vulgaris Pers. 二五六
Cydonia japonica Pers. Var. Pygmaea Maxim... ... ... 二四三
Cydonia sinensis Thouin... ... ... 二四四
Cymbidium Ensifolium Sw. ... ... 一二二
Cymbidium virens Lindl ... ... 一二三
Cynanchum caudatum Maxim... ... ... 四一六
Cynodon Dactylon Pers. ... ... 五三
Cynoglossum furcatum Wall ... ... 四二三
Cyperus amuricus Maxim Var. japonica Maxim ... ... 六六
Cyperus tegetiformis Roxb ... ... 六七
Cypripedilum japonicum Thunb ... ... 一一九
Cystophyllum fusiforme Harv ... ... 五
Cypripdilum macranthum Sw. Var. ventricosum Rchb. f... 一一七
Cytisus Scoparius Link ... ... 二六三

D

Damnacanthus indicus Gaertn... ... ... 四六五
Dahlia variabilis Desf 五一五
Daphne Genkwa S. et Z... ... ... 三五九
Daphne odora Thunb 三五九
Daphne Pseudo-meyereum A. Gr... ... 三五七

Daphniphyllum macropodum Miq. ... 三一〇
Datura alba Nees ... 四四六
Daucus carota L. ... 三八三
Davallia Bullata Wall 二一
Deinanthe bifida Maxim... ... ... 二二九
Dendrobium moniliforme Sw. ... ... 一二二
Dendropanax japonicum Seem ... ... 三七二
Desmodium Podocarpum DC. Var. japonicum Maxim 二八一
Deutzia Scabra Thunb 二二八
Dianthus Superbus L. 一七二
Dianthus chinensis L 一七三
Dianella odorata Bl. 九一
Dianthus chinensis L. 一七三
Dianthus barbatus L. 一七一
Dicentra pusilla S. et Z... ... ... 二一一
Diervilla japonica DC. 四七五
Diervilla grandiflora S. et Z... ... ... 四七六
Digitalis purpurea L. 四五八
Dionaea muscipula L. 二二三
Dioscorea japonica Thunb ... ... 一〇九
Diospyros Lotus L. ... 四〇一
Diospyros Peregrina Giirke ... . 四〇〇
Diospyros Kaki L. f. 四〇〇
Diphylleia Grayi Fr. Schm ... ... 一九六
Dipsacus Fullonum L. 四七九
Distylium racemosum S. et Z. ... ... 二三四
Disporum Smilacinum A. Gr.... ... ... 九九
Dolichos Lablab L. ... 二八四
Dorema ammoniacum Don. ... ... 三七六
Drosera rotundifolia L. 二二三
Drosera lunata Buch 二二二
Dryobalanops camphora coleb ... ... 三四九
Draba nemorosa L. var. Hebecarpa, Ledeb ... ... 二一四
Duchesnea indica Fock ... ... 二五五

E

Ecklonia bicyclis Kjellm... ... ... 四
Ecklonia cava Kjellm 四
Eclipta alba Hassk... 五一三
Edgeworthia chrysantha Lindl. ... 三六〇
Elaeagnus umbellata Thunb... ... ... 三六〇
Elaeagnus Pungens Thunb... ... ... 三六一
Elaeagnus longipes A. Gr. ... ... 三六一
Elettaria cardamomum white et maton ... ... 一一六
Eleusine indica Gaertn... ... ... 六〇
Empetrum nigrum L. 三一〇
Enkianthus japonicus Hook ... ... 三九四
Enteromorpha compressa Grev... ... 二
Ephedra vulgaris Rick var. Helvetica H. et T. ... ... 四二
Epilobium pyruicholophum Fr. et Sav. 三六七
Epilobium japonicum Hassk ... ... 三六八
Epigaea asiatica Maxim... ... ... 三六九
Epimedium macranthum Morr et Dene 一九六
Epipactis Falcata Thunb... ... ... 一一八
Epipactis erecta Thunb... ... ... 一一九
Epiphyllum truncatum Hav ... ... 三五六
Equisetum arvense L. 二五
Equisetum Hiemale L... ... ... 二六
Eragrostis Ferruginea Beauv... ... ... 五一
Erigeron annuns Pers 五二二
Erigeron Linifolius Willd ... ... 四九二
Eriocaulom nipponicum, Maxim. ... 七八
Eriobotrya japonica Lindl ... ... 二五五

Erythronium Denscanis L. ... ... 八八
Erythroxylon Coca Lam ... ... 二九一
Erythraea centaurium Pers ... ... 四一二
Eranthis Pinnatifida maiim ... ... 一八八
Eucalyptus globulus Lab. ... ... 三六七
Euonymus europaea L. 三二一
Euonymus japonica Thunb ... ... 三二一
Euonymus Alatas K. Koch ... ... 三二〇
Euonymus japonica Thunb var. radicans Miq. ... ... 三二〇
Euonymus japonica Thunb var. radicans Miq. ... ... 三二〇
Euonymus Oxyphylla Miq. ... ... 三一九
Euonymus alatas K. Koch var. subtriflora Fr. et Sav ... 三一八
Eupatoriumchinense L. 五二一
Euphrasia officinalis L. 四五五
Euphorbia Pekinensis Rupr ... ... 三〇八
Euriale Ferox Salisb 一七七
Eurya japonica Thunb 三四四
Eurya ochnacea Szysy 三四一
Evodia rutaecarpa Benth ... ... 二九五
Exoascas cerasi Sadebeck ... ... 九
Exogonium Purga Benth ... ... 四二一

F

Fagopyrum esculentum Moench... ... 一六一
Fagus Sylvatica L. Var. Sieboldi Maxim... ... ... 一三八
Fagus japonica Maxim 一三四
Fatoua Pilosa Gaud Var. subcordata Rapr ... ... 一四六
Fatsia japonica Dene. et Planc. ... ... 三七六

Ferula asa Foetida L... ... ... 三七七
Ficus Wightiana wall 一四一
Ficus carica L... ... 一四二
Ficus Erecta Thunb. 一四三
Ficus retusa L. Var. nitida Miq... ... 一四四
Ficus Elastica L. ... 一四七
Ficus Elastica L. ... 一五〇
Ficus religiosa L. ... 一四九
Foeniculum officinale All. ... ... 三七八
Formes japonicus Fr. 一二
Forsythia Suspensa Vahl ... ... 四〇八
Fragaria virginiana Ehrh ... ... 二三八
Fraxinus Longicuspis S. et Z... ... ... 四〇三
Fraxinus Bungeana De. Var. Pubinervis Wg. ... ... 四〇六
Fritillaria Camtschatensis Gaud... ... 九二
Fuchsia macrostemma Ruitz. et Par ... 三八九

G

Galactodendron utile H. B. ... ... 一四七
Galium aparine L. ... 四七一
Galium verum L. Var. Lacteum Maxim ... 四六七
Galium boreale L. var. japonicum Maxim. 四六八
Garcinia morella Desv 三四六
Garcinia Mangostana L. 三四八
Gardenia Florida L... 四六八
Gaultheria Adenothriz Maxim ... ... 三八八
Gelidium cartilagineum Grev ... ... 七
Gentiana Lutea L... 四一二
Gentiana Frigida Haenk Var. Algida Pall. ... ... 四一三
Gentiana Scabra Bqe. Var. Buergeri Maxim... ... ... 四一四
Geranium nepalense Sweet ... ... 二八八
Gerenium yezoense Fr. et Sav ... ... 二八八

Geranium Eriostemon Fisch ... ... 二八七
Gerbera Anandria Sch. Bip. ... ... 五一二
Geum japonicum Thunb ... ... 二五二
Ginkgo biloba L. ... 二九
Glaucidium Palmatum S. et Z... ... ... 一九一
Gleditschia japonica Miq. ... ... 二七二
Gleichenia Longissima Bl... ... ... 二二
Glycyrrhiza glabra L. 二六七
Glycine Hispida Maxim... ... ... 二七七
Gnaphalium multiceps Wall ... ... 五一七
Gnaphalium japonicum Thunb ... ... 五一四
Gnaphalium Hypoleucum DC. ... ... 四九一
Gomphrena globosa L... ... ... 一六八
Gossypium Herbaceum L. ... ... 三三八
Gracilaria Confervoides Grev. ... ... 六
Guajacum officinale L. 二九一
Gynostemma Pedata Bl... ... ... 四八〇
Gynura pinnatifida DC. 五〇七

H

Habenaria radiata Thunb ... ... 一二〇
Haematoxylon campechianum L. ... 二七九
Hagenia abyssinica Willd ... ... 二四三
Hamamelis japonica S. et Z. ... ... 二三六
Halorrhagis micrantha R. Br.... ... ... 三七〇
Halesia Hispida B. et H... ... ... 四〇二
Hedera Helix L. ... 三七二
Helescharis Plantaginea R. Br... ... 六六
Helianthus annuns L. 五一九
Heloniopsis brevicapsa Maxim... ... ... 九八

Helwingia ruscifiora Willd ... ... 三七五
Hevea guyanensis Aubl ... ... 三〇八
Hevea guyanensis Aubl ... ... 三〇四
Hibiscus coccineus Walt ... ... 三三七
Hibiscus syriacus L... 三三七
Hibiscus mutabilis L. 三三六
Hibiscus manihot L... 三三六
Hirneola Polytricha Fr. Schroet... ... 一〇
Hnmulus japonicus S. et Z. ... ... 一四五
Hordeum Satinum Jess 五〇
Hosta Coerulea Tratt 九〇
Hosta Sieboldiana Engl 九七
Houttuynia cordata Thunb ... ... 一二四
Hovenia dulcis Thunb 三二八
Hoya carnosa R. Br. 四一八
Humulus Lupulus L. 一四九
Humulus Lupulus L. Var. Cordifolius Maxim... ... ... 一四六
Hyacinthus orientalis L... ... ... 一〇四
Hydrangea Hortensia DC. var. Azisai A. Gr. ... ... 二二六
Hydrangea Thunbergii Sieb. ... ... 二二七
Hydnum olidum Berk ... ... 一〇
Hydrilla verticillata Casp var. Roxburghii casp. ... ... 四六
Hydrosme Rivieri Engl. ... ... 七六
Hydrangea involucrata Sieb. ... ... 二三一
Hydrocharis Asiatica Miq. ... ... 四七
Hydrangea Paniculata Sieb ... ... 二三二
Hydrastis canadensis L... ... ... 一九七
Hydrocotyle rotundifolia Roxb ... ... 三八一
Hyoscyamus niger L. 四四七
Hypericum chinense L. 三四八

Hypericum Ascyron L. 三四七
Hypericum Patulum Thunb ... ... 三四六
Hypericum erectum Thunb ... ... 三四五

I

Idesia Polycarpa Maxim... ... ... 三五四
Ilex crenata Thunb... 三一五
Ilex Sieboldi Miq ... 三一六
Ilex Pedunculosa Miq 三一六
Ilex Latifolia Thunb 三一七
Ilex macropoda Miq. 三一五
Ilex Paraguayensis Lambert. ... ... 三一七
Ilex integra Thunb... 三一八
Illicium anisatum L. 二〇二
Impatiens Balsamina L. 三二六
Imperata arundinacea Cyr. ... ... 五九
Indigofera Pseudo-tinotoria Matsum... 二七一
Inula Salicina L. ... 四九九
Inula britanica DC... 四九五
Ipomoea batatas Lam. 四二〇
Iris Laevigata Fisch. Var. Kaempferi Sieb. ... ... 一一二
Iris Sibirica L. Var. orientalis Thunb... 一〇九
Iris Laevigata Fisch 一一〇
Iris tectorum maxim 一一〇
Iris japonica Thunb... 一一一
Isatis tinctoria L. ... 二八一

J

Jambosa caryophyllus Ndz. ... ... 三六五
Jambosa vulgaris DC. 三六六
Jasminum odoratissimum L... ... ... 四〇五
Jasminum Grandiflorum L. ... ... 四〇五
Jasminum nudiflorum Lindl ... ... 四〇八
Jatrorrhiza Palmata 二〇〇
Juglans Sieboldiana Maxim... ... ... 一二九
Juniperus rigida S. et Z... ... ... 四〇
Juniperus chinensis L. 四一

Juniperus communis L... ... ... 三九
Juncus Prismatocarpus R. Br. Var. Leschenaultii F. Buch ... ... 八〇
Juncus effusus L. Var. decipiens F. Buch 八〇
Justicia Procumbens L. 四六三

K

Kadsura japonica Dun 二〇一
Kerria japonica DC. 二五八
Kochia Scoparia Schrad... ... ... 一六六
Kraunhia Floribunda Jaub ... ... 二八三

L

Lactuca brevirostris Champ... ... ... 四九〇
Lactuca sativa L. ... 五一四
Lactuca Debilis Maxim... ... ... 五一九
Lactuca Thunbergiana Maxim... ... ... 五一六
Lactuca virosa L. ... 五二三
Lagenaria vulgaris Ser 四八四
Lagenaria vulgaris Ser. ... ... 四八六
Legerstroemia indica L... ... ... 三六二
Lamium album L. ... 四三二
Lamium amplexicaule L... ... ... 四四〇
Laminaria japonica Aresch... ... ... 三
Larix Leptolepis Gord 四一
Laurus nobilis L. ... 二〇八
Lathyrus Davidii Hce 二六一
Lavandula vera DC... 四四一
Leontopodium japonicum Miq. ... ... 四九三
Lespedeza juncea pers Var. Sericea Hemsl 二八六
Lespedeza bicolor Turcy ... ... 二八二
Lespeceza Buergeri Miq. ... ... 二六八
Leucothoe keiskei Miq 三九〇
Leucothoe Grayana Maxim... ... ... 三九五

Ligularia Kaempferi S. et Z... ... ... 五一五
Ligustrum japonicum Thunb ... ... 四〇六
Ligustrum Ibota Sieb 四〇三
Ligustrum medium Fr. et Sav. ... ... 四〇四
Lilium Cordifolium Thunb ... ... 八五
Lilium japonicum Thunb ... ... 九四
Lilium tigrinum Gawl 八六
Lilium Speciosum Thunb ... ... 八九
Lilium avenaceum Fisch ... ... 九二
Lilium Maximowiczii Rql. ... ... 九三
Lilium Longiflorum Thunb ... ... 九九
Limnanthemum indicum Grisch ... ... 四一一
Limnanthemum nymphoides Link Var. japonicum Miq. ... ... 四一一
Lindernia crustacea F. V. M. ... ... 四四九
Lindera Praecox Bl... 二〇五
Lindernia angustifolia Wetts ... ... 四五〇
Lindera sericea Bl... 二〇七
Linaria japonica Miq. 四五一
Linum usitatissimum L... ... ... 二九〇
Lippia citriodora Kth 四二八
Liquidambar orientalis Mill. ... ... 二三五
Liquidambar formosanum Hee ... ... 二三五
Litsea Glauca Sieb ... 二〇九
Lithospermum officinale L... ... ... 四二四
Livistonia chinensis Br... ... ... 七一
Llium Auratum Lindl 一〇五
Lobelia inflata L. ... 四八九
Lobelia sessilifolia Lamb ... ... 四八七
Lolium temulentum L. 六三
Lonicera Gracilipes Miq. ... ... 四七一

Lonicera Morrowii A. Gr... ... ... 四七三
Lonicera japonica Thunb ... ... 四七四
Lophanthus rugosus Fisch ... ... 四三三
Dotus corniculatus L. var. japonicus Rgl. ... ... 二八五
Luffa cylindrica Roem ... ... 四八五
Luzula campestris DC. Var. capitata Miq. ... ... 八一
Lycopersicum esculentum Mill... ... 四四三
Lychnis coronata Thunb ... ... 一一七三
Lycoris Sanguinea Maxim... ... ... 一〇六
Lycium chinense Mill 四四三
Lycopus europaeus L. Var Parvifolius Miq. ... ... 四三四
Lycopus europaeus L. ... ... 四三八
Lycopodium serratum Thunb ... ... 二六
Lycopodium clavatum L... ... ... 二七
Lycoris radiata Herb 一〇八
Lygodium japonicum Sw. ... ... 二三
Lysimachia Vulgaris L... ... ... 三九七
Lysimachia japonica Thunb ... ... 三九八
Lysimachia Clthrodies Duby ... ... 三九九
Lythrum virgatum L. 三六二

M

Machilus Thunbergii S. et Z... ... ... 二〇六
Macleya cordata R. Br. ... ... 二一一
Macroclinidium Robustum Maxim ... 四九九
Magnolia hypoleuca S. et Z. ... ... 二〇三
Magnolia conspicua Salesb ... ... 二〇三

Magnolia Obovatia Thunb ... ... 二〇二
Magnolia Kobus DC. 二〇一
Mallotus Philippinensis Muel Arg ... 三〇六
Mallotus japonicus Muel Arg ... ... 三〇四
Malva sylvestris L... 三三五
Mangifera indica L. 三一四
Marchantia polymorpha L. ... ... 一四
Marlea Platanifolia S. et Z. ... ... 三八五
Marsilia quadrifolia L. 二四
Matricaria chamomilla L... ... ... 五〇二
Mazus rugosus Lour Var. macranthus Fr. et Sav ... ... 四五六
Medicago Denticulata Willd. ... ... 二六三
Melaleuca Leucadendron L... ... ... 三六四
Melia japonica Don... 三〇一
Melilotus offioinalis Desr ... ... 二八五
Meliosma myriantha S. et Z... ... ... 三二五
Mentha arvensis L. var. piperascens Holmes... ... ... 四四〇
Mespilus cuneata Matsum. ... ... 二四七
Mesua Ferrea L. ... 三四七
Metaplexis Stauntoni R. et S... ... ... 四一七
Michelia Compressa Maxim... ... ... 二〇二
Mimosa pudica L. ... 二七八
Mirabilis Jalapa L. 一六九
Miscanthus tinctorius Hack ... ... 五二
Miscanthus Sinensis Anders... ... ... 五七
Momordica Charantia L... ... ... 四八三
Monotropa unifiora L. 三八七
Morus alba L... ... 一四五
Mosla Punctata Maxim... ... ... 四三〇
Musa Basjoo sieb ... 一一三
Musa Sapientum L... 一一三

Myristica Fragrans Houtt ... ... 二〇五
Myroxylon Pereirae Klotysch. ... ... 二八四
Myrica Rubra S. et Z. 一二八

N

Najas Major All. ... 四五
Nandina Domestica Thunb ... ... 一九七
Nanocnide japonica Bl. 一五一
Narcissus Tazetta L. Var. chinensis Roem 一〇七
Narcissus jonquilla L. 一〇六
Nasturtium montanum Wall ... ... 二一四
Nasturtium officinale R. Br... ... ... 二一五
Nasturtium Palustre DC... ... ... 二一七
Nelumbo nucifera Gaertn... ... ... 一七八
Nepeta Glechoma Benth ... ... 四三二
Nepenthes Rafflesiana Jack ... ... 二二二
Nephrolepis Cordifolia Presl. ... ... 二一
Nephrodium Filix-mas Rich ... ... 二二
Nephelium Longana Camb ... ... 三二四
Nephelium Litchi Camb ... ... 三二五
Nerium odorum Soland... ... ... 四一四
Nicotiana tabacum L. 四四五
Nuphar japonicum DC. ... ... 一七七
Nymphaea tetragona Georq Var. angustata Casp ... ... 一七九

O

Oenanthe stolonifera DC... ... ... 三八〇
Oenothera biennis L. Var. Lamarckiana Ser. ... ... 三六八
Oenothera odorata Jacg ... ... 三七〇
Olea europaea L. ... 四〇四

Ophiopogon japonicus Ker. ... ... 九六
Orchis militaris L... 一二一
Oreodoxa oleracea Mart ... ... 六八
Orixa japonica Thunb 二九四
Oryza Sativa L. ... 四九
Osmanthus Aquifolium B. et H. ... ... 四〇七
Osmanthus Fragrans Lour ... ... 四〇七
Osmunda regalis L. Var. japonica Milde 二三
Oxalis corniculata L. 二八九
Ourouparia gambir Baill ... ... 四六四

P

Paeonia Albiflora Pall 一八六
Paeonia Moutan Ait. 一九二
Palaquium Gutta Burck ... ... 三九九
Panax Ginseng C. A. Mey ... ... 三七四
Pandanus Odoratissimus L... ... ... 四三
Panicum Crus Galli L. 六〇
Panicum Frumentaceum Roxb... ... 六二
Panicum miliaceum L... ... ... 五三
Papaver Somniferum L... ... ... 二一〇
Papaver Rhoeas L... 二一二
Parnassia Palustris L. 二二九
Parthenocissus tricuspidata Pl. ... ... 三二九
Pasania cuspidata Oerst ... ... 一三七
Paspalum Thunbergii Kth. ... ... 五八
Patrinia villosa Juss 四七七
Patrinia Scabiosaefolia Link ... ... 四七八
Paulownia tomentosa H. Bn ... ... 四五三
Pedicularis resupinata L... ... ... 四五七
Pennisetum japonicum Trin ... ... 五九
Penicillium Crustaceum L... ... ... 七

Perilla nankinensis Dene ... ... 四三七
Pertya Scandens Sch. Bip. Var. Jovata. Maxim... ... ... 四九八
Petasites japonicus Miq. ... . 五二〇
Phaseolus vulgaris L. 二六二
Pharbitis Bederacea L... ... ... 四一九
Phaseolus Mungo L. Var. Subtrilobata (Fr. et Sav.) Matsum 二六〇
Phellopterus Littoralis Fr. Schm ... ... 三八三
Phellodendron Amurense Rupr... ... 二九三
Phoenix Dactylifera L. 七一
Phlox Paniculata L. 四二二
Phormium tenax Forst ... ... 一〇三
Photinia Glabra Thunb 二四〇
Phragmites communis Trin ... ... 六四
Phteirospermum chinense Bge ... ... 四五六
Phyllostachys mitis Rir. ... ... 六二
Phyllostachys Puberula Munro ... ... 六一
Phyllanthus Urinaria L... ... ... 三〇七
Physalis Alkekengi L. 四四九
Physlis Angulata L... 四四四
Physosgma venenosum Balf ... ... 二六六
Phyteuma japonicum Miq ... ... 四八七
Phytelephas macrocarpa Ruiz... ... 六八
Phytolacca acinosa Roxb. Var. esculenta Maxim ... ... 一六九
Pieris Hieracioides L. Var. japonica Rgl. 四九八
Pierasma quassioides Benn ... ... 二九九
Pilocarpus pinnatifolius Lem ... ... 二九七
Pinguicula vulgaris L. 四六二
Pinus koraiensis S. et Z. ... . 三九

Pinus Pentaphylla Mayr ... ... [illegible]六
Pinus densiflora S. et Z... ... ... [illegible]二
Pinus thunbergii, Parl [illegible]
Piper nigrum L. ... 一二四
Piper cubeba L. ... 一二五
Pirola elliptica Nutt [illegible]八七
Pirus spectabilis Ait 二三九
Pirus communis L... 二五二
Pirus malus L... ... 二五一
Pirus Sinensis Lindl. 二五三
Pistacia Lentiscus L. [illegible]一二
Pisum Sativum L... 二六五
Pittosporum undulatum Vent ... [illegible]四
Pittosporum tobira Ait. ... ... [illegible]
Plantago Major L. var. Asiatica Dene 四六[illegible]
Platycodon Grandiflorus DC. ... ... 四八六
Plectranthus Longitubus Miq. ... ... 四二九
Plectranthus Excisus Maxim... ... ... 四[illegible]
Plygonum cuspidatum S. et Z... ... ... 一五七
Poa Annua L... ... 四八
Podocarpus Nageia R. Br. ... ... [illegible]一
Podophyllum peltatum L... ... ... 一九八
Podocarpus chinensis Wall. ... ... [illegible]二
Polygala Reinii Fr. et Sav... ... ... [illegible]〇二
Polygala Senega L... [illegible]〇[illegible]
Polygala japonica Houtt ... ... [illegible]〇[illegible]
Polygonum virginianum L... ... ... 一六[illegible]
Polygonum orientale L. var. Pilosum Meisn ... ... 一五九
Polygonum thunbergii S. et Z... ... ... 一六二
Polygonum japonicum Meisn ... ... 一六〇
Polygonum nodosum Pers ... ... 一五九
Polygonum Bistorta L. 一五八

Polygonum Posumbu Ham var. Blumei Matsum. ... ... 一五八
Polygonum Perfoliatum L... ... ... 一五七
Polygonatum officinale Alle ... ... 八三
Polygonum tinctorium Lour ... ... 一五六
Polypodium tricuspe Sw. ... ... 一七
Polypodium vulgare L. var. japonicum Fr. et Sav... ... 一七
Polytrichum commune L... ... ... 一五
Populus balsamifera L. var. Swaveolens Loud ... ... 一二八
Porphyra tenera Kjellm... ... ... 六
Portulaca oleracea L. 一七〇
Portulaca Grandiflora Hook ... ... 一七一
Potamogeton crispus L... ... ... 四四
Potentilla Kleiniana W. et A. ... ... 二三八
Potentilla chinensis Ser. ... ... 二四一
Potentilla Fragarioides L... ... ... 二四四
Potentilla Fruticosa L 二四六
Pourthiaea villosa Dcne ... ... 二四二
Primula japonica A. Gr. ... ... 三九七
Prinellia tuberifera Ten. ... ... 七四
Primula cortusoides L. 三九八
Prunella vulgaris L. 四三一
Prunus Amygdalus Stokes ... ... 二三六
Prunus Armeniaca L. var. Ansu Maxim 二三七
Prunus Mume S. et Z. 二三七
Prunus Pseudocerasus Lindl ... 二四六
Prunus communis Huds ... ... 二五〇
Prunus japonica Thunb ... ... 二五三

Prunus cerasus L... 二五八
Prunus Persica S. et Z. var. vulgaris Maxim... ... ... 二五七
Prunus tomentosa Thunb ... ... 二五八
Prunus Laurocerasus L... ... ... 二五七
Pseudopyxis Longituba Fr. et Sav. ... 四六五
Psidium Guajava Radd ... ... 三六六
Pteris Cretica L. ... 一八
Pteris Serrulata L. F. 一五
Pteridium Aquilinum Kuhn ... ... 一九
Pteris serrulata L. ...
Pterscarpus Marsupium Roxb... ... 二六七
Pterocarya Rhoifolia S. et Z... ... ... 一二九
Ptetocarpus Santalinus L. F. ... ... 二七三
Pueraria Thuubergiana Benth ... ... 二六九
Punica Granatum L. 三六三
Pyenostelma chinensis Bge. ... ... 四一九

Q

Quamoclit vulgaris chois ... ... 四二二
Quassia Amara L. ... 二九九
Quercus acuta Thunb 一三三
Quercus variabilis Bl. 一三三
Quercus Phyllireoides A. Gr... ... ... 一三四
Quercus Dentata Thunb ... ... 一三五
Quercus Serrata Thunb 一三五
Quercus Glandulifera Bl. ... ... 一三六
Quercus Suber L. ... 一三八
Quercus Glauca Thunb 一三七
Quillaja Saponaria Mol ... ... 二五九
Quisqualis indica L... 三六四

R

Ranunculus Pensylvanicus L. F. var. japonicus Maxim... 一八三

Ranunculus Acer L. var. japonicus Maxim... 一八四
Ranunculus Sceleratus L... ... ... 一八九
Raphanus Sp... ... 二二一
Raphanus Satinus L. 二一八
Ravenala madagascariensis Sonn... ... 一一四
Reineckia carnea kth 八九
Rehmannia Lutea Maxim... ... ... 四五七
Rhamnus japonicus Maxim var. Genuina Maxim ... ... 三二七
Rhaphiolepis japonica S. et Z... ... ... 二四九
Rhedea japonica Roth 八六
Rheum officinale Baill 一六二
Rhizopogon rubescens Tul. ... ... 一二
Rhizophora mucronata Lam ... ... 三六三
Rhus vernicifera DC. 三一一
Rhododendron indicum Sw. var. obtusum Maxim ... 三九一
Rhododendron quinquefolium Biss. et Mre ... ... 三九一
Rhododendron indicum Sw. var. macranthum maxim... 三九三
Rhododendron Metternichii S. et Z. ... 三九三
Rhodotypas Kerrioides S. et Z... ... ... 二五〇
Rhodomyrtus tomentosa Wight... ... 三六五
Rhus trichocarpa Miq 三一四
Rhus succedanea L. 三一三
Rhus toxicodendron L. var. radicans Miq. 三一二
Rhus Semi—alata Murr. var. Osbeckii DC. ... ... 三一三
Rhynchosia volubilis Lour ... ... 二七九
Ribes Grossularia L. 二三〇
Ricinus communis L. 三〇七
Robinia Pseudoacacia L... ... ... 二八七
Roccella tinctoria DC. 一四

Rosa rugosa Thunb... 二五四
Rosa multiflora Thunb 二五四
Rosa Wichuraiana Crep ... ... 二五六
Rosa centifolia L... 二五一
Rosa indica L... ... 二[illegible]九
Rosmarinus officinalis L... ... ... 四四一
Rubia tinctorum L... 四七〇
Rubia chinensis Rql. et Maack ... ... 四六六
Rubia cordifolia L. var. Mungista Miq. 四六四
Rubus trifidus Thunb 二四〇
Rubus Palmatus Thunb ... ... 二四一
Rumex japonicus Meisn ... ... 一六〇
Rumex acetosa L. ... 一六一
Ruscus aculeatus L.... 一〇〇
Ruta Graveolens L... 二九六

S

Sabia japonica Maxim [illegible]二六
Saccharomyces... ... 八
Saccharum officinarum L. 五五
Sagina Linnaei Presl. var. Maxima Maxim 一七五
Sagittaria Sagittifolia L. var. Longiloba Turcy ... ... 五四
Sagus Rumphii Willd. 六九
Sagittaia sagittifolia L. 四六
Salix babylonica L... 一二七
Salsola soda L... ... 一六四
Salvia japonica Thunb var. bitinnata Fr. et Sav. ... ... 四二九
Salvia nippoica Miq. 四[illegible]五
Salvia officinalis L... 四[illegible]六
Salvinia natnas Hoffm 二四
Sambucus racemosa L. 四七六
Sambucus javanica Bl. 四七五
Sambucus nigra L... 四七四
Sanicula Sinensis Bge. [illegible]七八
Santalum album L... 一五[illegible]
Sapindus Mukurosi Gaertn... ... ... [illegible]二四
Sapium Sebiferum Roxb ... ... [illegible]〇九
Saponaria officinalis L. 一七四
Sarracenia Purpurea L 二二一

Sassafras officinale Nees ... ... 二〇八
Saussurea Affinis Spr 五〇四
Saxifraga Cortusaefolia S. et Z... ... 二三一
Saxifraga Sarmentosa L... ... ... 二三三
Scabiosa japonica Miq. ... ... 四七九
Sciadopitys Verticillata S. et Z. ... ... 三四
Scilla maritima L. ... 八八
Scirpus Lacustris L. Var. tabernaemontani Trautv... ... 六七
Schiyocodon Soldanelloides S. et Z. ... 三九五
Schiyophragma Hydrangeoides S. et Z... ... ... 二二八
Scrophularia oldhami oliv. ... ... 四五五
Scoryonera Hispanica L... ... ... 五〇三
Scopolia japonica Maxim... ... ... 四四七
Scrophularia Kakudensis Fr. ... ... 四五二
Scutellaria indica L. Var. japonica Maxim... ... ... 四三八
Sedum Sieboldi Sweet 二二六
Sedum Purpureum Link ... ... 二二五
Sedum Lineare Thunb 二二四
Sedum kamtschaticum Fisch ... ... 二二五
Selaginella Kraussiana A. Br. ... ... 二八
Selaginella caulescens Spring ... ... 二八
Selaginella involvens Spring ... ... 二七
Seseli Libanotis Koch 三七七
Sesamum indicum L... ... ... 四五九
Setaria viridis Beauv 四九
Setaria italica Kth Var. Germanica Trin ... ... 四八
Silene Armeria L. ... 一七六
Shorea robusta Roxb 三四九

Smilax Herbacea L. Var. nipponica Maxim... ... ... 九五
Smilax medica Schlecht et cham 九四
Smilax china L. ... 九五
Solanum Lyratum Thunb ... ... 四四八
Solanum Melongena L. 四四六
Solanum tuberosum L. 四四四
Solanum nigrum L... 四四二
Solidago virgaurea L. 四九〇
Sophora Flavescens Ait Var. Galegoides Hemsl ... ... 二七〇
Sophora japonica L... 二六四
Spilanthes oleracea Jacq ... ... 五〇五
Spinacea oleracea Mill. 一六五
Spiraea Prunifolia S. et Z. ... ... 二四七
Spiraea japonica L. F. 二四八
Spiraea cantoniensis Lour ... ... 二四五
Spiraea Thunbergii Sieb ... ... 二四五
Spirodela Polyrhiza Schleid... ... ... 七七
Spirogyra arcta ... 二
Stachys Sieboldi Miq. 四三九
Stachyurus Praecox S. et Z... ... ... 三五四
Stachys Aspera Michx Var. japonica Maxim... ... ... 四三〇
Stauntonia Hexaphylla Dcne. ... ... 一九五
Stellaria media Vill... 一七五
Stellaria aquatica Scop ... ... 一七二
Stemona Sessilifolia Miq ... ... 八一
Stephanadra Flexuosa S. et Z... ... ... 二四八
Sterculia Platanifolia L... ... ... 三三九
Stewartia Pseudocamellia Maxim ... 三四三
Stewartia monadelpha S. et Z... ... ... 三四四
Strobilanthes japonicus Miq. ... ... 四六二

Strophanthus Hispidus DC. ... ... 四一五
Strychnos nux vomica L... ... ... 四一〇
Styrax benzoin Dryand 四〇一
Styrax japonica S. et Z... ... ... 四〇二
Swertia chinensis Franch... ... ... 四一三
Syringa vulgaris L... 四〇九
Swertia bimaculata Clark ... ... 四一〇
Swietenia Mahagoni L. 三〇二

T

Tagetes erecta L. ... 五一一
Tamerindus indica L. 二七八
Tamarix chinensis Lour ... ... 三五〇
Taonabo japonica Szysz ... ... 三四五
Taraxacum officinale wigg ... ... 五一三
Tarus cuspidata S. et Z. 三〇
Tecoma Grandiflora Loisel ... ... 四五八
Tectona Grandis L... 四二七
Tetragonia expansa Ait 一七〇
Thalictrum minus L. Var. elatum Lecoy 一八一
Thalictrum aquilegifolium L. ... ... 一八四
Thea japonica Nois... 三四三
Thea Sinensis L. ... 三四二
Thea Sasanqua Nois... 三四二
Thlaspi arvense L... 二一六
Theobroma cacao L... 三四〇
Themeda Forskali Hack Var. japonica Hack ... ... 六五
Thermopsis Fabacea DC. ... ... 二七五
Thesium chinense Turcy ... ... 一五二
Thuja orientalis L... 三六
Thuja japonica Maxim 三五
Thymus Serpyllum L. Var. Vulgaris Benth 四[illegible]一
Thujopsis dolabrata S. et Z. ... ... [illegible]
Tilia Miqueliana Maxim... ... ... [illegible]

Tilia cordata Mill
Var. japonica Miq. 三三二
Toluifera Balsamum L. 二八〇
Tofieldia japonica Miq 八四
Torreya nucifera S. et Z... ... ... 三一
Trachycarpus excelsa Wendl... ... ... 六九
Trachelospermum jasminoides Lemaire ... 四一五
Tragopogon porrifolius L... ... ... 五一八
Trapa natans L. ... 三六九
Trifelium repens L... 二七一
Trigonotis Peduncularis Benth.... ... 四二四
Trichosanthes cucumeroides Maxim ... 四八〇
Triticum Sativum Lam
Var. Vulgare Hack 五五
Trillium Smallii Maxim... ... ... 八五
Trisetum cernuum Trin 五一
Tricyrtis Hirta Hook 一〇三
Trochodendron AraliioidesS. et Z... ... 一八〇
Tropaeolum Maju L. 二九〇
Trollius PatulusSalisb 一八五
Tsuga Diversifolia Maxim... ... ... 三七
Tsuga Sieboldi carr... 三八
Tulipa Gesneriana L. 八四
Tulipa Edulis Bak ... 八三
Typha japonica Miq. 四三

U

Ulmus campestris Sm. 一四一
Ulmus Parvifolia Jacq 一三九
Ulmus montana Sm.
Var. typica Maxim 一三九
Ulva Lactuca le. Jol. 三
Umbilicaria esculenta Mink ... ... 一三
Uncaria rhynchophylla Miq ... ... 四六六
Undaria Pinnatifida Sur. ... ... 五
Uragoga Ipecacuanha J. Baill... ... ... 四七〇
Urtica Thunbergiana S. et Z... ... ... 一五一
Utricularia vulgaris L. 四六一

V

Vaccaria vulgaris Host 一七四
Vaccinium japonicum Miq. ... ... 三八八
Vaccinium Vitis-idaea L... ... ... 三九二
Vaccinium Oxycoccos L... ... ... 三九二
Vanilla Planifolia Andrews. ... ... 一二三
Valeriana officinalis L. 四七八
Vallisneria Spiralis L. 四七
Veratrum nigrum L... 九七
Veratrum Stamineum Maxim... ... ... 九六
Veratrum Maximowiczii Bak. ... ... 八二
Verbena officinalis L. 四二六
Veronica Virginica L. 四五四
Veronica Anagallis L. 四五二
Veronica Buxbaumii Ten. ... ... 四五一
Veronica Agrestis L. 四五〇
Viola Hirta L. Var. japonica Maxim ... 三五〇
Victoria regia Lindl. 一七六
Vincetoxicum japonicum Morr et Dene 四一七
Vicia Venosa Maxim. Var. Cuspidata Maxim... ... ... 二六四
Vicia Tetrasperma Moench ... ... 二六五
Viburnum Dilatatum Thunb ... ... 四七二
Vincetoxicum Sublanceolatum Maxim... 四一八
Vicia cracca L. Var. japonica Miq. ... 二六九
Vigna sinensis Hassk 二七二
Viburnum odoratissimum Ker. ... ... 四七三
Viola tricolor L. ... 三五一
Viola Patrinii De. Var. Typica Maxim ... 三五一
Vicia Hirsuta Koch 二七四
Viola Patrinii De. Var. chinensis Ginq. 三五二
Vicia Faba L... ... 二七六
Viola silvestris Kit. Var. Grypoceras A. Gr... ... ... 三五二

Viola verecunda A. Gr. ... ... [illegible]五[illegible]
Vinca rosea L... ... 四一六
Viola Odorata L. ... [illegible]五九
Viburnum tomentosum Thunb... ... 四七七
Viscunm album L. ... 一五四
Vitis Vinifera L. ... [illegible]一
Vitis Thunbergii S. et Z... ... ... [illegible]二九
Vitex Negundo L... 四二七
Viburnum Opilus L... 四七二

W

Wikstroemia Sikokianum Fr. et Sar ... ... [illegible]五七
Wikstrosmia Ganpi Maxim... ... ... [illegible]五八
Woodwardia radicanssm Var. Orientalis fiirs. ... ... 一五

X

Xanthium Strumarium L... ... ... 四九七

Z

Zanthoxylum Piperitum DC. ... ... 二九五
Zantedeschia Aethiopica Spr... ... ... 七四
Zanthoxylum Schinnifolium S. et Z. ... 二九二
Zea Mays L... ... 五八
Zelkowa Acuminata Pl... ... ... 一四〇
Zephyranthes candida Herb ... ... 一〇七
Zingiber officinale Rosc ... ... [illegible]五
Zingiber mioga Rosc [illegible]六
Zinnia Elegans L... 五二〇
Zizania Aquatica L... [illegible]
Zizyphus vulgaris Lam Var. inermis Bge. ... ... [illegible]二八
Zostera marina L. ... 四四
Zoysia Pungens Willd ... ... 五六