

醫方類聚卷之一百八十一

諸瘻門

論

千金方

空青商陸散 狸骨知母散

荏子桔梗圓

雄黃黃荅散 礬石防風

散 礬石白朮散

地膽甘草散 雌黃

芍藥圓 斑猫白芷圓 五白膏

聖惠方

目錄



治狼瘡諸方

空青散 蝟皮散 鮫鯉甲散

治鼠瘻諸方

蝟皮散 鮫鯉甲散 班猫散 赤小豆

散 鰻鱺魚丸 馬齒莧膏 死鼠膏

鮫鯉甲餅子 猫腦骨散 半夏膏 狐

頭散

治螻蛄瘻諸方

丹參散 亭長散 桂心丸 馬齒莧膏

治蜂瘻諸方

五香散 皂莢丸 露蜂房散 赤小豆

散

治虬蟬瘻諸方

桃白皮散 赤小豆散 藜蘆散

治蟻螬瘻諸方

玄參散 空青散 芫青散 犀角丸

治浮疽瘻諸方

犀角散 商陸散 犀角丸

治癩癬瘦諸方

班猫散 露蜂房丸 蜴蜥丸 楸葉煎

蛇床子膏 苘荬子

治轉脉瘦諸方

連翹散 班猫丸 漏蘆膏

治風癩諸方

內消櫛皮散 神效班猫丸 松脂煎

露蜂房膏 赤小豆散

治蟻瘦諸方

鯪鯉甲散 蝟皮散

治一切瘦諸方

班猫丸 伏翼糞丸 天靈蓋膏 銀落

鐵屑膏 蝮蛄膏 牛糞膏

治冷瘦諸方

丁香膏 青黛散 雄黃膏 丹砂膏

治久瘦諸方

班猫丸 五方帛膏

夫全本草

三因方

瘡漏脉例

陷脉散 桂附丸

丁衛生十全方 批黃膏 代赭

是齋醫方

瑣碎錄 平養膏

直指方

漏瘡證治

溫解散 續斷散 乳麝雲母膏 代赭

石圓 乳香圓 雄黃膏 黑靈散 血

竭散 生地黃膏 蜂房散 蛇蛻散

人牙散 平肌散 鐵屑膏

坐得效方

漏瘡 批黃膏

蠟礬圓 乳香雲母膏 安腎圓 山藥

圓 代赭石圓 黑靈散

澹軒方

漏瘡惡瘡

脇下生漏瘡

穀道漏瘡

漏瘡瘰癧

肘後方

治卒得虫鼠諸瘻方

坐肉膏

神効名方

事林廣記

新効方

外科精義

溫經丸

衛生易簡方

金匱鈎玄

漏瘡

備預百要方

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌



發之時在於頸項有根出缺盆上轉連耳本  
其根在肝 鼠瘻者飲食之時不擇蟲蛆變  
化所生也使人寒熱其根在肺 蝮蝮瘻者  
食果蓏子不避有蟲即便噉之外絕於網內  
絕於腸有毒不去變化所生也始發之時在  
於頸上狀如蝸形癰胗而出也其根在大腸  
蜂瘻者食飲勞倦渴乏多飲流水即得蜂毒  
不去變化所生也始發之時其根在頸歷歷  
三四處俱腫以潰生瘡狀如癰形瘡而復移

其根在脾 虬蟬瘻者因寒腹中臘脹所得  
寒毒不去變化所生也始發之時在其頸項  
使人壯熱若傷寒有似疥癬婁婁孔出其根  
在肺 蟻蝮瘻者恐懼愁憂思慮哭泣不止  
餘毒變化所生也治發之時在其頸項無頭  
尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿其根  
在心 浮疽瘻者因毒結馳思往反變化所  
生也始發之時在於頸亦在掖下如兩指無  
頭尾使人寒熱欲嘔吐其根在膽 瘰癧瘻

者因強力入水坐濕地或新沐浴汗入頭中  
流在頸上之所生也始發之時有其頸項恒  
有膿使人寒熱其根在腎轉脈癭者因飲  
酒大醉夜卧不安驚欲嘔轉側失枕之所生  
也始發之時在其頸項濯脈轉身如振使人  
寒熱其根在小腸復有三十六種癭方不  
可次第顯其名而有蟻蝨蚯蚓等諸癭非九  
癭之名此卽應是三十六種癭之數也但癭  
病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或

由飲食乖節狼鼠之精入於府藏毒流經脈  
變化而生皆能使血脈結聚寒熱相交久則  
成膿而潰漏也其生身體皮肉者亦有始結  
腫與石癰相似所可異者其腫之中按之累  
累有數脈喜發於頸邊或兩邊俱起便是癭  
證也亦發兩掖下及兩顛顛間初作喜不痛  
不熱若失時治卽生寒熱也所發之處而有  
輕重重者有兩種一則發口上嚙有結核大  
小無定或如桃李大此蟲之窠窟止在其中



二則發口之下無有結核而穿潰成瘡又蟲  
毒之居或府藏無定故癩發身體亦有數處  
其相應通者多死其癩形狀起發之由今辯  
於後章

鼠癩候

鼠癩者由飲食不擇蟲蛆毒變化入於府藏  
出於脉稽留脉內而不去使人寒熱其根在  
肺出於頸掖之間其浮於脉中而未內著於  
肌肉而外爲膿血者易去也決其生死者反

其目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見壹  
脉壹歲死見壹脉半壹歲半死見二脉二歲  
死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉  
而不下貫瞳子可治也

蜂癩候

蜂癩者由飲食勞倦渴乏多飲流水卽得蜂  
毒流入於藏其根在脾出發於頸項歷歷三  
四處或累累四五處蜂臺或發胷前俱腫以  
潰生瘡狀如癰形瘥而復移

蚘蜂癩候

蚘蜂癩者由飲食內有蚘蜂毒氣入於藏流於經脉使身寒似傷寒腹虛臃脹其根在肺發於頸項如疥癬婁婁孔出初生痒搔之生痕不治壹百日生蚘蜂癩

蠅癩候

此由飲食內有蠅窠子因誤食之人於腸胃流注入血脉變化生癩發於頸下初生痒而如蠅窠子狀使人寒熱久其中化生蠅也

螻蛄癩候

螻蛄癩者由食果蓏子不避有蟲即便噉之有蟲毒氣入於腹內外發於頸其根在大腸初生之時其狀如風矢亦如蝸形癰胗而痒搔之則引大如四寸更其中生道乃有數十中半螻蛄亦有十數不治二年殺人

蟻螬癩候

此由恐懼愁憂思慮哭泣不止氣毒變化所生內動藏外藏於頸項其根在心又方根在

傍脫初生之時無頭尾腫如棗核或移動皮肉使人寒熱心滿狀似蜂癩而深坎蜂癩則高而圓蟻螬癩方五寸作坑邊有唇畔而痒搔之則引大如六寸更疼痛日夜令人呻號三年生孔道乃有十數中生蟻螬乃有百數不治五年殺人

鵠鳥鶴癩候

鵠鳥鶴癩者初腫如覆手疼痛壹年生孔道數十處黃水出二年化生鶴水鳥首而生口

背是也

尸癩候

人皆有五尸在人腹內發動令心腹脹氣息喘急衝擊心胃攻刺脇肋因而寒熱頸掖之下結癭瘰膿潰成癩時還衝擊腹內則脹痛腰脊攣急是也

此由風癩候見聖惠方

鞠癩候

腫痛初生癰如大桃狀亦如瘤膿潰為瘡不

治成石瘦化生鞠作竅傍行世呼爲石鞠瘦

### 蜣螂瘦候

此由飲食居處有蜣螂毒氣入於藏府流於經脉所生也初生之時其狀如鼠竅直下腫如覆手而痒搔之疼痺至百日有十八竅深三寸中生蜣螂乃有一百數蜣螂成尾自覆刺人大如孟升至三年殺人

### 骨疽瘦候

骨疽瘦者或寒熱之氣搏經脉所成或蟲蛆

之氣因飲食入天府藏所生以其膿潰侵食於骨故名骨疽瘦也初腫後乃破破而還合邊傍更生如是或六七度中有膿血至日西痛發如有針刺

此山蟻蚋瘦候

蚯蚓瘦者由居處飲食有蚯蚓之氣或飲食

太腹內流於經脉生其核在太腸其狀腫

核潰漏其肉突出

花瘦候

花癩者風濕客於皮膚與血氣相搏因而成瘡風濕氣多其肉突出外如花開之狀世謂之反花瘡不瘥生蟲成癩故謂之花癩也

蠟癩候

此由飲食居處有蝎蟲毒氣入於府藏流於經脉或生掖下或生頸邊腫起如蝎蟲之形寒熱而潰成癩久則瘡裏生細蠟蟲也日西

蚝癩候

蚝癩者由飲食居處有蚝蟲毒氣入於府藏流於經脉變化而生著面頰邊即脫肉結腫初如蚝蟲之窠後潰成癩而蚝生是也

腦癩候

腦癩者頭頸逐氣上下疼痛而後腦癩

癰癩候

癰癩者是癰潰瘡後其不瘥膿汁不盡因變生蟲成癩故為癰癩也

槪癩候

槪癩者其瘡橫闊作頭狀如杏子形亦似癩

癰處出血是也

蟲癩候

諸癩皆有蟲而此獨以蟲為名者是諸瘡初本無蟲經久不瘥而變生蟲故以為名也

石癩候

石癩之狀初起兩頭如梅李核鞣實按之強如石而寒熱熱後潰成癩是也

蛙癩候

此由飲食居處有蛙之毒氣入於府藏流經

脉而成癩因服藥隨小便出物狀似蛙形是也

蝦蟆癩候

此由飲食有蝦蟆之毒氣入府藏流於經脉結腫寒熱因潰成癩服藥有物隨小便出如蝦蟆之狀故謂之蝦蟆癩也

蛇癩候

此癩者由居處飲食有蛇毒氣入於府藏流於經脉寒熱結腫出處無定因潰成癩服藥

有物隨小便出如蛇形狀謂之蛇癩

蝻蟄癩候

蝻蟄癩者由居處飲食有蝻蟄毒氣入府藏流於經脉所生初得之時如棗核許戾契或滿百日或滿周年走不定壹處成數而膿汁潰癩也故謂之蝻蟄癩

赤白癩候

人有患瘡色赤白分明因而成癩謂之赤白癩

內癩候

人有發瘡色黑有結內有膿久乃積生侵食筋骨謂之內癩

雀癩候

此由居處飲食有雀毒氣入於藏流於脉發無定處腫因潰成癩服藥有物隨小便出狀如雀髮故謂之雀癩

膿癩候

諸癩皆有膿汁此癩獨以膿為名者是諸瘡

久不瘥成癩而重爲熱毒氣停積生膿常不絕故謂之膿癩也

冷癩候

冷癩者亦是謂瘡得風冷久不瘥因成癩膿汁不絕故爲冷癩也

久癩候

久癩者是諸癩連滯經久不瘥或暫瘥復發或移易三兩處更相應連故爲久癩也

癩癧癩候

此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結爲癩癧或如楊李棗核等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則變膿潰成癩也

癩癧癩候

癩病之狀陰核腫大有時小歇歇時終大於常勞冷陰雨便發發則脹大使人腰背攣急身體惡寒骨節沉重此病由於損腎也足少陰之經腎之脉也其氣下通於陰陰宗脉之所聚積陰之氣由勞傷舉重傷於少陰之經



其氣不衝於陰氣脹不通故成癘也

千金方

九漏

夫九漏之為病皆寒熱癩瘰在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之下其浮於脉中而未著於肌肉而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以

予之徐往來以去之其小如麥者壹刺即三刺已決其死生奈何曰反其目視其下有赤脉從上下貫瞳子見壹脉一歲死見一脉半壹歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫瞳子可治凡項邊腋小先作癩瘰者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱食凡漏有似石癭累累然作癭子有核在兩頸及腋下不痛不熱冷者皆練石散傅其外內服五香連翹湯下之日潰

者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著  
 核結小無不瘥者何謂九漏壹曰狼漏二曰  
 鼠漏三曰螻蛄漏四曰蜂漏五曰蚰蟬漏六  
 曰蟻螬漏七曰浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉  
 脉漏  
 聖惠方  
 夫癰者皆由飲食著蟲鼠餘毒或愁憂思慮  
 恚怒氣逆變化入於藏出於筋脉稽留不去

所成也九癰者壹曰狼癰二曰鼠癰三曰螻  
 蛄癰四曰蜂癰五曰蚰蟬癰六曰蟻螬癰七  
 曰瘰癧癰八曰瘰癧癰九曰轉脉癰故謂之  
 九癰也  
 直指方  
 漏者諸癰之潰漏也狼癰鼠癰螻蛄癰蜂癰  
 蚰蟬癰蟻螬癰瘰癧癰轉脉癰古所  
 謂九癰是癰析而信之三十六種其名自又

不同焉大抵外傷四氣內窘七情與夫飲食  
乖常染觸蠢動含靈之毒未有不變爲癩瘡  
穿孔豈深膿汁不盡得冷而風邪併之於是  
涓涓而成漏矣漏喜發於項腋亦喜發於陰  
僻肛門之間療治失時卽生寒熱不特瘦能  
爲漏凡癰疽諸發隨所在處苟有宿膿敗肉  
朽骨停蓄其間皆壹切漏瘡之萌蘖也治法  
溫散風冷爲急收水次之生肌又次之藿香  
厚朴半夏吉皮蒼朮細辛川芎白芷以官桂

乾薑壹匕佐之此足以溫散風冷矣然有近  
年漏者有久年漏者近則或帶淡紅或帶微  
腫或留小核久則上而槁白內而黑爛淫虫  
惡臭生焉近者不過前藥數品而已久者復  
其元陽亦當以漏藍輩加減而用之如其不  
當用而輕用又恐熱氣乘虛變移結核旁緣  
相通而孔竅爲尤甚若夫收水壹節則有司  
存水屬腎也腎虛不能傳導而後水溢於腎  
水溢則滲漉於漏瘡行腎之水無如黑牽牛

必以牽牛取末入於猪腎慢火煨熟而溫酒  
下之則借腎入腎壹縱壹擒兩得其便惡水  
既泄不復淋漓繼以當歸黃耆川芎官桂川  
續斷胡蘆巴等修治細末佐以髮灰空心溫  
酒調下仍以安腎圓山藥圓兼而濟之度幾  
腎得所養真元凝合夫然後竈骨牡礪人齒  
犬牙加之血竭乳麝髮灰內外相維生肌必  
矣然而新肉方生又當以胥肉猪蹄米舖爲  
養不惟滋味益腎而陽明之主肌肉亦藉穀

氣以充之此則自本自根之論也雖然漏已  
息矣瘡已平矣衾幘動念可乎否乎曰始焉  
之漏者溝澮之細流也終焉之犯者江河之  
浚決也知而故作虛扁其如之何

千金方

空青商陸散治狼漏始發於頸腫無頭有根  
起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂恚  
氣上不得下其根在肝肺一作空青主之商陸  
爲之佐方

空青

蝟腦

各二分

蝟肝

壹具

芎藭

半

獨活

黃芩

鼈甲

婦人蓐草

商陸

斑猫

乾薑

地膽

當歸

茴香

礬石

各壹分

蜀椒

三拾粒

右十六味治下篩酒下方寸匕日三服十

五日服之

狸骨知母散治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐方

狸骨

知母

桂心

鯪鯉甲

山龜殼

雄黃

乾薑

各等分

右八味治下篩飲服方寸匕日三仍以蜜

和內瘡中無不瘥先灸作瘡後以藥傅之

又已作瘡不用灸

地黃膏治鼠漏瘡瘥復發及不愈出膿血不

止方以不中水猪脂攪阻生地黃內脂中

出令脂與地黃足相淹和煎六七沸其瘡先

用桑灰汁洗去惡汁次以地黃膏傅十日

奇易

治鼠漏方

得蛇蛻所吞鼠燒末服方寸七日再不過

三服此大驗似難遇耳并傳瘡中佳

又方

鼠膏枚中形者

亂髮如鷄子人膏枚

右二味以臘日猪脂煎之令消盡膏成分

作二分壹分稍稍塗瘡壹分稍稍酒服之

瘡鼠十常從瘡中出良

荏子桔梗圓治蝮蝮漏始發於頸項狀如腫

此得之食瓜菓實毒不去其根在大腸荏子主之桔梗為之佐方

荏子

龍骨

各半兩

附子

壹兩

蜀椒

百粒

桂心

桔梗

乾薑

礬石

獨活

芎藭

各壹兩

右十味為末以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆溫漿下五丸加至十丸

雄黃黃芩散治蜂漏始發於頸癩癧三四處俱相連以潰此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄黃土之芎藭為之佐

養神補氣  
養血生肌

雄黃 黃芩 各壹兩 蜂房 壹具 鼈甲 茴香

吳茱萸 乾薑 各半兩 蜀椒 二兩

右八味治下篩傅瘡口十日一度十日止

舉石防風散治蚘蜂漏始發於頸初得如傷寒此得之食中有蚘蜂毒不去其根在腎舉石主之防風為之佐

礬石 防風 知母 雌黃 桃白皮

乾地黄 獨活 青黛 斑猫 白芷

松脂 壹作柏脂 芍藥 海藻 當歸 各壹兩 白朮

蝟皮 各四分 蜀椒 百粒

右十七味治下篩飲服壹錢七日三

礬石白朮散治鱗蠃漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為之佐

礬石 白朮 空青 當歸 各三分 細辛 壹兩

蝟皮 斑猫 小枸杞 地膽 各壹兩 乾烏腦

三七 豆許

右十味治下篩以酢漿服方寸匕日三病  
在上側輪卧在下高枕卧使藥流下  
地膽甘草散治浮沮漏始發於頸如兩指使  
人寒熱欲臥此得之因思慮憂懣其根在膽  
地膽主之甘草為之佐

地膽 雄黃 乾薑 續斷 石决明

菴蘭根 龍膽 各三分 細辛 二分 大黃 半分 甘草

右十味治下篩傅瘡日四五度 古今錄驗無雄黃有

硫黃

雌黃芍藥圓治瘰癧漏始發於頸有根初苦  
痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於  
頸所致其根空腎雌黃主之芍藥為之佐

雌黃 芍藥 茯苓 續斷 乾地黄

空青 礞石 乾薑 桔梗 蜀椒 恒

山 虎腎 狸肉 烏腦 斑猫 礬石

各一分 附子 一分

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日



二

斑猫白芷圓治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉  
苦驚惕身振寒熱此得之因驚臥失枕其根  
在小腸集驗作心斑猫主之白花為之佐

斑猫 白芷 綠青 大黃各二分 升麻

鍾乳 甘草 防風 地膽 續斷 麝

香人 礬石各一分 人參 當歸 桂心各二分

白朮 麥門冬各一兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日

三勿食菜慎房室百日外臺無大黃桂心  
麥門冬白朮鍾乳

治九漏方

空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防

風 荏子 礬石 黃芩 白芷 芍藥

甘草 雌黃 白朮 礬石 地膽 斑

猫 雌黃各等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三丸  
三十日知四十日愈六十日平復百日內

月鼠灰  
半兩

右二味為末以臘月猪脂和其瘡先以暖  
泔清洗淨拭乾然後以藥傅之日三聖惠方

又方乾牛屎 乾人屎 各等分

右二味檮先用絲罽瘡上綿上著屎蟲聞  
屎香即出若癢即舉絲去之更別取屎及  
絲著其上如前蟲盡乃止

又方 聖聖方 治蟻擾 苦瓠四枚大如蓋者各穿壹孔

如指大置湯中煮十數沸取壹竹筒長壹  
尺一頭內瓠孔中疊頭注瘡孔上冷則易  
之徧止

治壹切漏方

斑猫 四十枚 豉 四拾九粒 元青 二拾枚 生大百黃

地膽 各拾枚 蜈蚣 一升 犀角 牛黃 各壹核

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須  
臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿益  
中相視如有蟲形狀又似膠汁此病出也

間日壹服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸瘥特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作食崔氏云治九漏初服藥少夜食明日服二丸至七日甚虛悶可煮食蔓菁菜羹自餘脂膩醋口味菓子之類並不得食人強隔日壹服人弱兩三日壹服瘥後仍作二十日將息不能將息便不須服又方煮鹽花以麩擁病上內鹽花麩匡中厚二寸其下以桑葉三重藉塩候冷熱得所

又河忍冷則無益熱則以肉壹日壹度候瘳瘳根株勢消則止若已作瘡者搗稜穀爲末粉之

又方槲北陰白皮三十斤剉碎以水壹石煮取壹斗去滓煎如糖又取都厠上雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡爲末內煎中又溫酒壹升投煎中合攪之羸人服五合當有蟲出○聖惠方治鼠瘦槲皮煎方槲樹根北陰白皮拾片厠屋上雌雄鼠糞各十四枚微炒用末

右件藥以水壹碩先煮槲皮取壹斗去滓  
重煎如餒使入鼠糞及酒壹升攪勻每日  
空心以溫酒調下半匙服後得瘡中蟲出  
差也

又方霜下瓠花曝乾為末傅之聖惠方同

又方擣土瓜根傅之燥則易不限時節

又方死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上大

痛以杏仁膏摩之止

又方死蛇和臘月猪脂合燒灰為末內孔中

又方燒死蟻蝦為末醋和塗又死蛇灰醋和

傅之

又方故布裏揅如彈丸大燒令赤為末酒服

聖惠方同

又方服白馬屎汁壹升聖惠方

又方水研杏仁服之○聖惠方杏仁二兩去

皮以水研取汁每服二合溫溫服之

又方猪脂壹升酒五合煎沸頓服之

又方燕麵和燒灰傅

又方正月雄狐屎陰乾擣末水和服○聖惠方治壹切惡瘻中冷瘰肉方狐糞不限多少正月者右件藥陰乾搗羅為末每於食前以新汲水調下壹錢

治漏作瘡孔方聖惠方治久瘻牛九孔者方露蜂房為末

臘月猪脂和傅孔上

治漏發心胃以下者方

松脂 武都雄黃 各三兩

右二味和為塊刀子刮為散飲服壹方寸

治漏方 七日不瘥更合

治漏方 狗頰車連齒骨 虎糞 鹿

皮各等分 布四味治下節以猪膏和內瘡中須臾即

治漏方 易日五六度

治瘻方 冷瘻方燒人所吐蛔蟲為灰先用甘

又草湯洗去瘡惡然後著灰無不瘥

新味方同

類聚

三十一

治鼠癭腫核痛未成膿者方以柏葉傅腫上  
然揔著葉上熨之令熱氣下即消方同  
治風漏及鼠漏方

赤小豆六白欬 黃耆 牡蠣各等分

在四味治下篩酒服方寸匕日三服與麻

治螻蛄癭方先以泔清煮榭葉取汁聖惠方  
以泔別

取汁清榭葉 洗瘡拭乾次以榭葉灰內瘡中後

命力

治蜂癭初生狀如桃而癢搔之則引大如鷄

子如覆手者熬揔聖惠方以熨之三宿四

日不癢至百日成癭其狀大如四五寸石

廣三寸中生蜂作孔乃有數伯以石硫黃

隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須臾間

見蜂數十蜂盡乃瘥聖惠方

治蜂癭方人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傅之全

又方鷓頭灰傅之聖惠方

又方取蜂巢燒成臘月猪膏和傅孔中全

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方蝟皮肝心

燒灰爲末酒服壹錢匕

又方死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓  
傳之

又方取大鯊鮓燒耕垡土令赤以苦酒浸垡  
土時合壁土故熟以鯊鮓著壁土上展轉

令熟傳瘡上

又方鯪鯉甲二七枚燒末以聖惠方有臘月土字猪膏

和傳瘡上

肘後方同

又方半夏膏枚擣末以鴨脂和傳瘡上

治癰瘰癧橫潤作頭狀若杏人形亦作癰癧

方用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蟻蝨瘰方牛屎燒灰臘月猪脂和傳之

又方蟻蝨丸

即蟻蝨所食屎也

爲末傳之

又方乾牛屎爲末傳之瘡即撥却更厚封瘡  
乃止

又方熱牛屎塗之數易應有蟻蝨出

治蚯蚓瘰方

鷄屎 蚯蚓屎

右二味爲末用社猪下頷髓和傅之

治蠍瘻五六孔皆相通者方擣茅根汁著孔

中聖惠  
方同

治蝦蟇瘻方五月五日蛇頭及野猪脂同水

衣封之佳○聖惠方五月蛇腦及野猪脂

傅之

治蛇瘻方蛇蛻皮燒灰臘月猪脂和封之聖惠

方同

治蛙瘻方蛇腹中蛙燒灰封之聖惠

方同

治顛當瘻方擣土瓜根傅至瘡慎口味

治雀瘻方取母猪屎燒灰臘月猪膏和傅上

當有蟲出如雀形

聖惠方同

治膿瘻方桃花末以猪脂和封之佳

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方以

大鈹針破之次用鼠粘葉二分爲末和雞

子白壹枚封之

又方擣槐子和并花水封之

灸漏法



葶藶子 合二升

右二味和搗令極熟作餅子如大錢厚二

分許取壹枚當瘡孔上作大艾炷如小指

大灸餅上三炷壹易三餅九炷隔三日復

壹灸之外臺灸癩瘡古今錄驗云不可灸

頭瘡葶藶氣入腦殺人

又方搗生商陸根捻作餅子如錢大厚三分

安漏上以艾灸上餅乾易之灸三四升艾

瘡外臺灸癩瘡

又方七月七日未出時取麻花五月五日

取艾等分合搗作炷用灸瘡上百壯外臺

灸癩瘡

五白膏治鼠漏及癩瘡方

白馬屎 白牛屎 白猪屎 白羊屎

白鷄屎 升 漏蘆 斤二

右六味各於石上燒作灰研絹篩之以猪

膏膏升三合煎亂髮壹兩半令極沸盡消

乃內諸末微火上煎五六沸藥成人瘡痂

以塩湯洗新帛拭乾然後傅膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗

聖惠方

治狼瘡諸方

夫狼瘡者由寒暑不調飲食有毒或大怒氣上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上轉連耳本其根在肝也百根必毒治狼瘡發於頸耳疼痛出膿水空青散方

空青 半兩燒 蛻腦 兩 蛻肝 一具 芎藭 半兩獨

活 三分 黃芩 兩 乾薑 壹分 炮 班 猫 一分 以糯米拌炒

米黃為度 鼈甲 三分 塗醋炙 當歸 半兩到

去頭翅足 川椒 五拾枚 去目及閉 懷香子 壹分 白礬 兩

燒 口者微炒去汗 煨 香子 壹分 白礬 兩

右件藥擣細羅為散入諸藥研勻每於食

前以煖酒調下壹錢

治狼瘡出膿水不絕寒熱肢節煩疼神効蛻

皮散方

蝟皮壹枚 川椒叁分 附子三分  
 去皮當歸 露蜂房三分 地榆叁分  
 木通叁分 班猫半兩 糯米以糯 苦參  
 到兩 鯪鯉甲四枚 桂心半兩 細辛半兩 樗鷄  
 叁分川大黃 碎微炒 蜈蚣壹枚 雄黃壹兩  
 研蛇床子 蛇蛻皮半兩 蜥蜴壹枚 薏苡  
 人叁分 蘭茹兩 牡丹叁分 龍膽叁分 雞骨兩  
 黃土瓜根 白蒺藜叁分 藿蘆叁分  
 右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下一錢以差為度

治狼瘡鯪鯉散方

鯪鯉甲兩 鳩鳥兩 蝟皮壹枚 犬牙一分 蜈蚣一分

右件藥入一瓦罐子內燒烟絕便以盆合

之勿令成灰候冷研令細以臘月猪脂鍊

過調傅瘡上日二換之

治鼠瘻諸方

夫鼠瘻者山飲食不擇蟲鼠之毒而變化入

於藏出於脈稽留脈內而不去使人寒熱其根在胃若出於頸腋之間猶浮於脈中而未內著於肌肉而外為膿血者易療之也

治鼠瘻寒熱蝟皮散方

蝟皮壹兩躑躅花三分酒拌炒乾龍骨壹兩當歸三分  
劉微王不留行分叁土瓜根分鼠姑三枚  
右件藥搗細羅為散每於食後以溫酒調下一錢

治鼠瘻鯨鯉甲散

鯨鯉甲一分炙山龜殼壹分炙甘草炙  
桂心壹分雄黃壹分乾薑壹分炮裂狸骨壹分  
黃分

右件藥搗細羅為散每於空心以溫酒調下壹錢別用蜜和散內瘡中無不愈者先灸作瘡後與藥貼更妙

治鼠瘻著頸生小者如杏大者如柀斑猫散

斑猫拾枚去頭足翅糯牡丹叁分海藻壹兩洗去

鹹味  
焙乾

右件藥搗細羅為散每日空心及夜卧時  
以葱白湯調下半錢病根當於小便中出  
如魚腴利後只得喫粥

治鼠瘦及出膿水項強頭疼四肢寒熱赤小  
豆散方

赤小豆

一合  
炒熟

白斂

一兩

露蜂房

一兩

蛇皮

二尺

燒  
灰

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下壹錢

治鼠瘦鰻魚丸方

鰻魚

四兩炙  
令焦黃

野猪皮

四兩炙  
令焦黃

蘧麥

一兩

蟾

蝮

一枚五月五日  
日者炙黃

斑猫

二拾枚去頭足翅  
糯米拌炒令黃色

臘

月猪脂

五合鍊  
成者

巴豆

十五枚去皮心  
膜紙裏壓去油

右件藥除猪脂巴豆外搗羅為末用猪脂

巴豆和搗千杵丸如梧桐子大每日空心

以米飲下二丸覺者當寒熱不覺者來日

平明更服三丸稍稍增之慎熱飲食當有

煩悶其蟲當從小便中出盛而視之乃有百數箇便差也

治鼠癩馬齒莧膏方

馬齒莧切碎一斤麝香壹分杏仁細切

半斤去皮尖油煎令黑研如泥

右件藥前二味以水二斗煮取三升澄清

次入麝香杏仁熬攪成膏瓷器中盛密封

已成瘡者以泔清洗了旋於帛上塗藥貼

日三易之未作瘡如癩瘰者以艾半升薰

黃乾漆各棗許大搗為末和艾作炷灸之

三七壯然後貼藥

治鼠癩死鼠膏方

死鼠壹枚中亂髮二兩松脂三兩黃丹六兩炒

右件藥用油壹斤以文火煎鼠髮候消以

絲濾去滓又入鐺中然後下松脂黃丹以

柳木篦攪令勻膏成於瓷器中盛每用塗

貼日二易之

治鼠癩發於頭無頭尾如鼯鼠太使人寒熱

此得之於鼠毒宜貼鯪鯉甲餅子方

鯪鯉甲壹分 龜甲壹分 甘草壹分 桂心壹分 雄黃壹分

細研 乾薑壹分

右件藥搗細羅為散入雄黃同研令勻鍊

蜜和作餅子可瘡子大小貼日二換之

又方乾死鼠壹枚中 亂髮如鷄子壹枚大

右件藥以臘月猪脂壹斤半於鍋中煎令

鼠髮都消篩濾過每取塗瘡壹分稍稍以

酒服之即愈用後方以三歲臘月猪脂煎之令鼠骨肉及髮消盡半塗

此半酒服鼠從瘡中出姚云秘不傳之法

治鼠瘻方

死蛇腹中鼠壹枚 臘月猪脂半斤

右件藥於鍋內同煎令焦去滓瓷器中盛

旋取塗於瘡上

治鼠瘻穿穴成瘡痛不可忍方

麝香壹分 雄黃兩

右件藥細研為散取蟾酥和肉瘡孔中

治鼠瘻猫腦骨散方

貓腦骨炙莽草各等分

右件藥烏細羅為散傅瘡日二度換之

治鼠瘻半夏膏方

半夏一兩鱖魚脂二兩煎羅為末

右件藥壹處謂如膏旋取傅瘡上

治鼠瘻狐頭散方同煎令熟

野狐頭壹枚炙狸頭壹枚炙

右件藥搗羅為末先用漿水洗拭乾以猪

脂調傅之

又方柞木皮細剉

右件藥以水三斗煎取二升去滓漸漸服

之令盡當有惡物出即愈

又方右取狼糞燒為灰細研傅之

又方右取瓠花曝乾搗羅為末傅之

又方右取死蛇壹條酒浸去肉只取骨微炒

以膏羅為末以生油調傅於瘡上必有大痛

以杏仁研為膏塗之即止

治蝮蛇瘻諸方



夫螻蛄瘻者由食菓蓂子不避有蟲即便噉食內傷於腸有毒不去變化所生也始發之時在於頸上狀如蝸形癭形而出其根不大腸也

治螻蛄瘻生於項間腫硬疼痛丹參散方

丹參二兩 蒴藿根二兩 甘草半兩炙 秦艽壹兩

獨活兩 牛蒡子壹兩 躑躅花兩 川椒半兩大

口者微炒去汙 牛膝壹兩 微赤剉 及閉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分上滓每日空心及晚食前服之

治螻蛄瘻亭長散方

亭長六枚去頭足翅糯 川大黃半兩剉細

辛兩 桂心分 鯨鯉甲壹兩炙 楓樹中蟲糞

撮三指

右件藥搗細羅為散每日空心溫酒調下

壹錢晚食前再服

治螻蛄瘻疼痛出膿水桂心丸方

桂心壹分 川大黃半兩剉 黃耆半兩 礬石了

者壹 烏喙 半兩炮 活獨 半兩 芎藭 壹分 川椒 百

分 去目及開口 虎脛骨 半兩塗 酥炙黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每

日空心及晚食前以溫漿水下二十九

治螻蛄癩馬齒莧膏方

馬齒莧 半兩 臘月淳麻燭燼 半兩

右件藥搗羅為末以臘月猪脂和如膏先

暖泔清洗淨拭乾塗之

治蜂癩諸方

夫蜂癩者由食飲勞倦渴乏多飲流水即蜂  
毒不去變化所生也始發之時其根在頸歷  
歷三四處俱腫潰生瘡狀如癰形差而復生  
其根在脚也  
治蜂癩發於頸項累累相連腫痛宜服五香  
散方

沉香 壹兩 丁香 壹兩 木香 壹兩 薰陸香 壹兩 川

升麻 半兩 連翹 壹兩 麝香 壹分 細研

右件藥搗細羅為散同研令勻每服二錢

以水壹中盞煎至六分每日空心及晚食前温服

治蜂癭生於項間三五相連如彈子腫赤疼痛皂莢丸方

皂莢 八兩 四兩 雜碎以新汲水二升浸壹宿揉絞取汁四兩去皮以酢壹兩塗其炙令 牛蒡子 壹兩 蝸牛 壹兩半 牽牛子 壹兩 黃焦 半微 炒

右件藥搗羅為末取前皂莢汁於銀鍋中以慢火熬至壹升已來入藥末更熬令可

丸即丸如梧桐子大每圓空心及晚食前以黃耆湯下二十九

治蜂癭有頭露蜂房散方

露蜂房 壹分 蠶甲 壹分 吳茱萸 壹分 川椒 二百粒 乾

薑 壹分 雄黃 細研

右件藥搗羅為末研入雄黃以生油調塗瘡口上日三度用之

治蜂癭赤小豆散方

赤小豆 一兩 白欬 兩 牡蠣 一兩 炒熟 燻灰

右件藥搗細羅爲散每服以溫酒調下壹錢日三服

又方蛇蛻皮

人糞各一分  
燒灰

右件藥研入麝香壹錢以臘月豬脂和塗之

又方右以死蟻蝦燒爲灰細研醋和塗之

又方右以露蜂房燒灰細研以臘月豬脂和

塗之

治蜂癭若著鼻內外結瘤膿血出方

露蜂房

一兩  
微炙

右件藥搗細羅爲散每服空心以粥飲調

下壹錢

灸蜂癭法右以硫黃隨多少細研每用如豆

許大安紙上燃燭燒令汁出著瘡口中須

臆間有氣似蜂兒出即差

治蚬蜉癭諸方

夫蚬蜉癭者因寒腹中臙脹所得寒毒不去

變化所生也始發之時在其頸項使人壯熱

若傷寒有似疥癬婁婁孔出其根在肺也

治蚬蟬癩發於頸上初得壯熱後即成瘡出

膿水疼痛宜服桃白皮散方

桃白皮半兩 川大黃半兩 知母一分 生乾

地黃兩 雌黃壹分 蝟皮壹兩 獨活兩 川

椒一百枚 去目及閉汗 青黛壹分 斑猫壹分

米并炒 米黃為 白芷壹分 松脂兩 赤芍藥壹分

海苔一分 當歸兩

右件藥擣細羅為散都研令勻每日空心

及晚食前温粥飲調下一錢

治蚬蟬癩赤小豆散方

赤小豆一合 白歛兩 露蜂房壹分 蛇蛻

皮二尺 微炙

右件藥擣細羅為散每日空心以温酒調

下壹錢晚食前再服

又方龜膽三枚 犬牙二枚 琥珀兩 虺蛇頭壹

炙令黃色 雄黃兩 猪牙三枚

右件藥擣羅為末以醋和勻傳瘡壹宿神

驗

治蚘蟬癭浮核不盡及諸息肉在肌中藜蘆散方

藜蘆青兩去蘆頭以鷄子藺茹壹兩雄黃二兩

細研

右件藥得細羅為散入雄黃末更研令勻傅瘡上不得入眼

治瘰癧諸方

夫瘰癧瘻者由恐懼愁憂思慮哭泣不止餘

毒變化所生也始發之時在其頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿其根在心也

治瘰癧瘻結核腫痛宜服玄參散方

玄參二兩川升麻二兩獨活二兩漢防已壹兩甘菊

花壹兩連翹三兩犀角屑半兩川大黃半兩剉碎微炒

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分大滓每於食前溫服

治瘰癧瘻發於頸如棗核在皮中不能消散

結腫疼痛空青散方

空青三分燒過細研當歸三分細辛三分枸杞根三分蝟

皮三分炙乾烏腦三大斑猫壹分以糯米

度去頭地膽一分以糯米拌炒米

右件藥搗細羅為散每於食前以溫漿水

調下壹錢

治蟻螬瘻久不差者芫青散方

芫青四拾枚去頭足翅糯海藻二兩洗

布二兩洗地膽二拾枚去頭足翅以糯

黃壹兩狸骨一兩炙牡蠣一兩木香半

右件藥搗細羅為散每日空心及夜卧時

以溫酒調下壹錢病當從小便出如爛筋

相似

治蟻螬瘻神驗犀角丸方

犀角屑三分麝香半甘草半兩炙生黑豆黃

兩斑猫壹分去頭足翅以糯米

右件藥搗羅為末鈔釜和丸如菘豆大每

日空心以粥飲下十丸其病根當從小便

中差

又方蝸牛殼壹兩以牛乳半川大黃三分搗

右作藥相和研令勻每日空心以溫酒調

下壹錢仰於大便中瀉出惡物

治浮疽癰諸方

夫浮疽癰者因毒結馳思往反變化所生也

始發之時在於頸亦在腋下如兩指無頭尾

使人寒熱欲嘔吐其根在膽也

治浮疽癰發於頸腋大如兩指結硬四肢寒

熱宜服犀角散方

犀角屑

壹兩

木通

壹兩

赤芍藥

壹兩

枳殼

壹兩

半錢炒微

柴胡

壹兩

桔梗

壹兩

惡實

壹兩

二兩炒連翹

兩黃芩

微赤

右作藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎取六分去滓每於食前溫服

治浮疽癰或生於頸或發於腋腫硬如指久

即穿潰有膿商陸散方

商陸

壹兩

曾青

壹分

黃芩

壹兩

防風

壹兩



早礬石壹兩燒赤 醋淬七遍 白礬壹兩燒 人參壹兩  
 頭小薊根壹兩 石膽壹分 地膽一分 去頭足  
 令米黃廿 草壹兩 赤壹兩 班貓壹兩 糯米壹兩 炒  
 夫米壹兩 黃壹兩 蘇壹兩 藥壹兩 白芷壹兩 荏枝壹兩 知  
 母壹兩 桔梗壹兩 蘆頭壹兩 去雄壹兩 狸壹兩 意壹兩 黃壹兩  
 右件藥搗細羅為散入研了藥夏研令勻  
 每日空心及夜臨睡時以淡醋調下清  
 三十日知愈七十日平復其者不可無復  
 所若及服藥寧從小起過度即令人淋瀝

淋瀝則減服之  
 治浮疽瘦犀角丸方

犀角壹分 水蛭壹分 甘草一分 黑豆壹分  
个合炒 熟大皮

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每  
 日空心以溫酒下三丸至五丸小硬內當  
 下惡物此是病出盡即自止如未止即不  
 得住藥無不神効  
 治痔疽瘦穿潰出膿水不止方

雄黃壹分 白礬壹分 龍膽三分 細辛兩

地膽半斤 糯米半斤 炒令米黃為度 川大黃兩 石決明壹分

細續斷壹分 菴藷根壹分

右件藥搗細羅為散以傅患止日四五度

用之

治癩瘰癧諸方

夫癩瘰癧者因強力入水久坐濕地或新沐浴汗入頭中流在頸上之所生也始發之時在其頸項恒有膿水使人寒熱其根在腎也

治癩瘰癧生於項上結腫有腫宜服斑猫散方

斑猫拾枚 去頭足翅以糯米拌炒 真珠半兩 細研 蛻皮

半兩炙雄黃一分 細研

右件藥搗細羅為散每日空心以温酒調

下半錢午後再服

治癩瘰癧發於項腋多頭作孔常出膿水露蜂房丸方

露蜂房壹兩 續斷壹兩 礬石壹兩 泥裹燒半日 犀角屑

兩空青半斤雄黃壹分桔梗半兩狸

頭壹枚麝香壹分川大黃壹兩斑猫

一分以糯米拌炒黃為度卡頭翅足

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗二三百杵丸如菉豆大每於食前以粥

飲下十九

治瘰癧癭蜴蜥丸方

蜴蜥壹枚羌菁五拾枚去頭足翅以糯麝

香壹分斑猫叁拾枚去頭足翅以糯犀角

脣叁分地膽三拾枚去頭足翅以糯黑豆黃

三分甘草叁分微赤剉

右件藥搗羅為末以粟米飯和丸如菉豆

大每日空心以煖酒下壹丸壹百日效

治瘰癧腫破成瘻宜用此方

麝香一分胡粉壹兩黃丹一兩微炒

右件藥都研令勻取煖漿水淨洗瘡用軟

帛拭乾以蜜調攤於故帛上貼日二換之

治瘰癧成瘻神效楸葉煎方

搨葉 十五斤秋分前後令人將袋上樹施  
摘內袋中不得令鷄犬孝子女人師  
僧等見

右用水一碩於淨釜中煎搨葉取汁三斗  
又重換鍋煎至二升已成煎矣盛於不津  
器中凡患者先取麻油半合蠟一分酥一  
栗子大同消如面脂又取杏人七粒生搗  
如膏米粉二錢同入面脂中搗令勻先塗  
瘡上經兩日已來令淨拭去以篋子勻塗  
搨葉煎滿於瘡上仍用軟帛裹之兩日一

度拭去舊藥更上新藥不過五六上已作  
頭者便生肌平復如未穴者即內消神秘  
後即不在將息

又方砒霜 半兩 粉霜 半兩

右件藥細研用麪糊和丸如大豆大安在  
瘡子頭上著麪糊紙子封著候瘡子出便  
以生肌膏貼之

治療癩癩作數孔蛇床子膏方

蛇床子 三兩末 黃蠟 二兩 亂髮灰 半兩 細研 大麻油

四兩  
右件藥以文火養油先煎蛇床子十數沸  
濾去滓次下髮灰并蠟熬成膏旋取攤於  
帛上貼之

治療瘰癧服苘蓉子方

苘蓉子 參兩海去浮者炒熟

右件藥用醇醋壹升浸壹宿曬乾再入酒  
漬膏宿又曬乾重以酒半升淨洗又曬乾  
每日空心取三指撮以井華水下之服後

食三五匙飢壓之十日差

治轉脉癭諸方

夫轉脉癭者因飲酒大醉夜卧不安多驚欲  
嘔轉側失枕之所生也始發之時在其頸項  
脉轉身如振使人寒熱其根在於小腸也

治轉脉癭發於頸項寒熱有膿宜服連翹散  
方

連翹 一兩半 玄參 一兩半 木香 壹兩 川升麻 壹兩  
枳殼 一兩半 昆布 一兩半 洗川大黃

二兩制 碎微炒 大麻人 兩

右件藥搗細羅為散每日空心以粥飲調下壹錢

治轉脉癭發於頸腫痛寒熱出膿水不止斑

斑猫 壹分以糯米拌炒米 人參 三分去當

歸 三 川升麻 三 麥門冬 壹兩去心焙 白木 三分地

膽 壹分以糯米拌炒米 川大黃 叁分制鍾

乳粉 壹分 桂心 壹分 甘草 一分炙 防風 半兩去

續斷 壹分 麝香 壹分 白礬 一分燒

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒

下十丸日三服

治轉脉癭漏蘆膏方

漏蘆 二斤 藁本 二斤 白馬糞 半斤 白牛糞 半斤 白猪

糞 半斤 白鷄糞 半斤 白羊糞 半斤

右件藥漏蘆藁本細剉諸糞等各於石上

燒作灰細研以鍊了猪脂二斤煎乱髮壹

兩半令髮消盡乃下漏蘆等煎五六沸濾去滓再煎成膏傾於瓷合內盛每用時先以掠湯洗新帛拭乾然後傅膏當以帛裹勿使冷風吹著每日兩止貼之

治風癩諸方

夫風癩者由風邪在經脈經脈結聚所成也諸瘡得風不即差變作癩也其得風者是因瘡遇冷濃汁不盡乃成也其風在經脈者初生之時其狀如腫有似覆手搔之則皮脫赤

汁出乍腫乍減漸漸生根結實附著骨間不知首尾後潰成癩若至五十日不消不潰變成石腫名為石癩久久不治令人寒熱惡氣入腹絕悶刺心及咽項皆腫不治者死也

治風癩出赤水腫痛宜服內消櫛皮散方

櫛皮

壹分

玄參

一分

苦參

壹分

斑猫

二七枚

足糯米拌炒

蠟殼

五枚

白殭蠶

四十九枚

微炒

右件藥搗細羅為散每日空心以鹽茶調

下二錢良久以鹽茶投之小便內當取下

惡物

治風癩赤腫出膿汁不止神効斑猫丸方

斑猫壹分去頭足翅糯米連翹二兩烏蛇叁分

去皮骨酒浸玄參叁分漏蘆叁分荏子叁分空青

壹宿炙令黃參一分煨一分過細研川大黃一兩微炒牛蒡子壹兩炒黑

豆黃壹分

右件藥搗羅為末入空青研令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如菉豆大每日空心及夜

卧時以溫酒下五丸漸加至十丸

治風癩松脂煎方

松脂壹兩硫黃壹兩狼毒半兩白歛壹兩猪腦

具壹

右件藥先用水二升煮猪腦取汁半升又

以水三升煎狼毒白歛取汁半濾去滓與

猪腦汁壹處煎令稠次下松脂硫黃末攪

令勻每用以絛裹如大豆大內瘡中七日

差至三七日病本悉除

治風癩消腫化膿露蜂房膏方



露蜂房

半兩

蛇蛻皮

半兩

玄參

半兩

黃耆

半兩

蛇

床人

一分

杏人

壹兩

湯浸去

皮

亂髮

半兩

黃丹

兩

五黃蠟

二兩

兩

右件藥除黃丹蠟杏人亂髮外籠搗以絲

裏用油三兩浸壹宿別用油半斤內杏人

及亂髮煎令髮消盡然下諸藥同煎十數

沸絲濾更下於鐺中然後下黃丹及蠟又

煎六七沸用柳篦子急攪令勻滴於水中

不散成珠子即傾於瓷器中盛每取帛上

塗貼日壹換之以差為度

治風癭結腫常出惡膿水宜貼赤小豆散方

赤小豆

一分

猪牙皂莢

五挺

塗

黃藥

一分

消石

一分

細研

川大黃

壹分

木鼈子

三枚

去殼

右件藥搗細羅為散以不語津調塗乾即

易之

治風癭方

露蜂房

壹枚

炙

令黃色

右件藥搗細羅為散每用壹錢以臘月猪

脂調令勻塗瘡孔上時後方同

治蟻瘦諸方

夫蟻瘦者由飲食有蟻精氣毒入五藏流出經脉多著頸項澼澼生瘡微腫核細而乃徧於身體也

治蟻瘦鯨鯉甲散方

鯨鯉甲二兩炙 礬石壹兩泥裏燒半日 赤足蜈蚣

二枚炙 雄雞膊黃皮壹具炙乾

右件藥搗細羅為散以三年醋調傅於瘡

上

治蟻瘦蝟皮散方

蝟皮壹枚炙 蝟肝壹具炙乾 蝟心六具薄切炙乾

右件藥搗細羅為散每日空心以溫酒調

下膏錢晚後再服

又方雄黃各等分 雌黃各等分

右件藥細研傅瘡上

又方右取雄雞糞燒為灰細研傅瘡日三度

用之

又方右以死鼠燒作灰細研傅瘡口上

治壹切癩諸方

夫壹切癩者謂癩病初發之由不同至於癩成於狀亦異今以壹方而治之著故名壹切癩非是諸病共成壹癩也復有三十六種經方不依次第顯其名曰也又有蝨蝨蛆等諸癩非九癩之名此卽應是三十六種癩之數也但癩病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或由飲食乖節狼鼠之精入於腑藏

毒流經脈變化而生背能使血脈結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身體皮肉者亦有始結腫與石癰相似所可異者其腫之中按之壘壘有數脈喜發於頸邊或兩邊俱起便是癩證也亦發兩腋下及兩顙顙之間初作喜不痛不熱若不時治卽生寒熱也少發之處而有輕重重者有二壹則發口上腭有結核大小無定或如桃李大此蟲之窠不在其中心則發口之下無有結核而穿潰成

瘡又蟲毒之居或腑藏無定故癩發身體亦有數處其相應湧者多死

治壹切癩斑猫丸方

斑猫三枚去頭足翅 蜥蜴三枚炙 地膽令黃

糯米并炒令米黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黑豆大每

日空心及晚食後以温酒下二丸

治一切癩瘡神驗伏翼糞丸方

伏翼糞四兩兩 班猫三分去頭足翅 皂莢以糯米并炒令米黃

子一兩炒黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每日空心以皂莢白皮塗酥炙微黃搗末

煎湯下壹丸服至三丸病根並於小便中

出

治壹切癩天靈蓋膏方

天靈蓋一分洗淨 虎下頷骨一分令 臘月

猪脂四兩 附子壹分炮裂 人參壹兩去 鐵精

壹川烏頭一兩炮裂去皮膚

右件藥擣羅為末用猪膏和令稀調得所  
可塗之四畔不得侵著瘡內

治壹切癩銀落鐵屑膏方

鍛落鐵屑半兩拘頭連齒骨二兩炙虎糞半兩

曝鹿角壹兩乾鹿角燒灰

右件藥擣羅為末用猪脂調成膏每用看

瘡大小塗日二兩度用之

又方斑猫三七枚人頭足翅糯真珠末半兩蠟

皮半兩雄黃半兩細研

右件藥擣細羅為散入研了令勻每服

食前以温酒調下半錢

又方七月七日日未出時取麻花五月五日

取艾等分合搗作炷用灸瘡百壯神効

又方右以死蛇白鱗各壹兩燒灰細研傅之

治一切癩衆方不差宜用此方

牡蒙三

右件藥擣羅為末以湯和適寒温薄塗瘡

上冷即再塗

治蚯蚓瘻方

地竜糞

雞糞

等分  
微炒

右件搗羅爲末以牡猪下頷髓和傅之

治蠟瘻半夏

壹分

右搗羅爲末以甲煎調塗之

治螻蛄瘻方右取蛇腹中蛙燒灰細研傅瘡

上

又方取甜瓜根搗羅爲末傅之至差慎口

治雀瘻方右取桃花隨多少曝乾搗羅爲末

以臘月猪脂和傅之

治蟹瘻螻蛄膏方

螻蛄

壹十四枚燒  
爲灰研如粉 蠅 壹枚研

右件藥以鍊雄猪脂和作膏著瘡中

治蛙瘻方

蛇腹中蝦蟆

壹枚

右件藥燒作灰細研少傅瘡上日二用之

治蟻蝨瘻牛糞膏方

黑牛糞

五兩燒  
灰細研

臘月猪脂

四兩鍊  
成者

右件藥相和令勻先用鹽湯洗拭乾塗膏日再換之

又方右以蜣螂曝乾搗羅為末乾摻瘡上日二用之

治冷癩諸方

夫冷癩者赤是謂得風冷久不差因成癩膿汁不絕故為冷癩也

治冷癩瘡及癩瘰癧疼痛生肌丁香膏方

丁香三分沒藥二分安息香三分麝香一分當歸一分

三乳香三分附子三分白芷三分桂心三分

雄雀糞四十粒蕪荑三分黃丹三分麻油一斤

右件藥都細剉入油以慢火煎候白芷黃焦色去滓下黃丹更微微煎攪勿住手膏

成收於不津器中頻取貼之

治冷癩及骨疽瘡壹切癩數年不差者宜用

此方

附子壹分硫黃半分膩粉壹分

右件藥都研令勻以生油調塗之甚效

治多年冷癩瘡宜傅青黛散方

青黛壹分麝香一錢葇荂一分藺茹壹分

右件藥搗羅為末都研令勻用壹捻內瘡

孔中更以後雄黃膏貼之

治積年冷癩出黃水不差者宜用雄黃膏方

雄黃半兩清油三兩亂髮半兩硫黃半兩黃蠟半兩

右先以油煎亂髮令焦盡去滓便入硫黃

雄黃及黃蠟以慢火熬攪為膏攤帛上貼

之

治冷癩及諸癩瘡丹砂膏方

丹砂三兩川大黃壹兩雄黃三兩苦參一兩

蓮壹兩莽草二分藺茹壹兩礬石三分雌黃叁分

右件藥細判入臘月猪脂壹升二合以慢

火煎大黃等黃焦絞去滓下丹砂雄黃礬

石雌黃末更煎攪令勻入堯合中盛旋取

貼之



又方蜈蚣三枚麝香壹錢細研松脂兩乾蟾壹枚

右件藥搗羅為末入少蜜和捻作餅子先

淨洗瘡上貼之以差為度

又方皂莢壹兩熬廬兩

右件藥都燒為灰細研漸漸傅之

又方朱砂一分砒黃一分

右件藥同研令細以粳米飯和丸如麻子

大填入瘡口內旬日便差

治久瘦諸方

夫久瘦者是諸癯連滯經久不差或暫差後復發或移易三兩處更相應通故為久瘦也治久瘦瘡斑猫丸方

斑猫壹兩以糯米拌炒米壹兩伏翼糞四兩微炒

又葵花壹兩微炒兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如指桐子大先用皂莢塗酥炙微黃搗羅為末用半錢煎湯每日空心下壹丸壯者二丸其瘦根

並於小便中出

治久癩移易三數處皆生瘡孔者方

蝙蝠糞壹兩 白殭蠶半兩 雄蠶蛾半兩 乳頭香兩

蜀茶末兩

右件藥搗細羅為散傅瘡上以差為度

又方烏蛇壹兩 皮骨炙令微黃 痰藜子三分 曲頭棘

針兩 馬齒莧三分 墻頭髮燒灰 雄黃細分

緋帛半兩 燒灰

右件藥都搗研為末以酒調內瘡中看乾

即更著以差為度

治積年癩瘡及壹切惡瘡救急者五方帛膏

五方帛各壹寸 亂髮二兩 洗黃芩壹兩 紫苑壹兩

洗去苗土 莨菪子壹兩 倒鈎棘針兩 乳香二兩 松脂

二兩與乳香著油同搗 石鹽壹兩 黃蠟二兩 麝

如膏○御醫嚴要壹兩 香壹兩 水銀一兩 并胡粉點 黃丹兩 胡粉

一兩○撮 生麻油壹升

右件藥各搗研訖先將油入於鑊中鍊烟

少出即下五方帛亂髮川武火煎髮帛消

盡然下黃芩等四味良久下松脂乳香二  
味又攪良久下麝香黃蠟又熟攪次下黃  
丹胡粉石鹽水銀又微用火急攪勿住手  
取壹椀冷水點看硬卽收之每用攤於故  
帛上貼日二三換之

治癩瘡多年不差出於脅前或脅肋脚脛間  
者無不効方右取江淮多年破船上泥糞  
脂灰不限多少擣羅爲末以鷄子清和作  
團用炭火燒令通赤待冷准前團燒之如

此三遍卽擣細羅成散入麝香少許以生  
油調塗以差爲度年多者不過壹月塗卽  
平復

治久癩生九孔者方右取梔子燒成灰細研  
以羊髓調塗之

大全本草

姚大夫治癩有頭山膿水不止以啄木壹隻  
燒灰酒下二錢匕

外臺秘要瘡癩鯉魚腸切作五段火上灸之

洗瘡拭乾以湯封之令即易自暮至日乾  
止覺痒開看虫出差

唐本註馬齒草主諸腫癩疔目搗搯之飲汁  
廣濟方治瘦有几種不過此方取芥子搗碎  
以水及蜜和滓傅喉上下乾易之

三因方  
瘡漏脉例

經云陷脉為漏留連肉腠脉得寒即下陷凝  
滯肌肉故曰留連肉腠肉冷亦能為膿血故

為冷漏須用溫藥方如後

陷脉散治漏瘡及二三十年癭瘤或大如杯  
盂久久不差致有漏潰令人骨消肉尽或堅  
或軟或潰令人驚惕寐卧不安體中掣痛愈  
而復作

乾姜炮 琥珀 大黃 附子炮各壹兩 丹參三

石硫黃 白石英 鍾乳粉 烏賊魚骨

各半兩

右為末貯以磁合韋囊勿令洩氣若瘡濕

卽傅無汁卽煎猪脂和傅之以乾爲度或  
死肌不消加芒硝二兩益佳壹法用胡燕  
屎壹枚外科精要同

桂附丸治氣漏冷漏諸瘡

桂心 附子炮裂米醋中浸再炮厚朴姜製

甘草炙白朮各一兩木香一分乳香二錢別研

右爲末煉蜜丸梧子大空腹米飲下二三

十九得効力外科精要同

衛生十全方

治漏瘡經年不差作寒熱如繩縛拘急痛甚  
寢食不安百方不愈者請專心用此藥神効  
無比

只是枸杞根須自採麓肥者淨洗以白麩  
瓦片削取麓褐色皮別裏再刮取細白如  
麩者碾爲細末去骨不用先以麓褐色皮  
農煎湯候溫熱得所直洗至冷軟帛裏乾  
却以小紙撚子點細白如麩者納入瘡口  
或以雞羽傅之量多少用了以小項帕之

類四五尺者纏縛訖避風就枕壹二夕便覺有效用之半月須生肉壹月可平復壹日壹洗傳藥不拘此是漏瘡中至要之藥切下可中輟此即地骨皮但市者大不堪須自採及可用

治漏瘡

蜜陸僧半兩地骨皮半兩烏賊魚骨煮去鹹味了用

一分

右為極細末洗拭後乾摻藥末極效

又方只用蛤蜊殼一味火煨紅出火毒一夜細研如粉入真麝少許再研傳瘡極妙是齋醫方

治壹切漏瘡惡瘡生肌止痛人牙不以多少燒過用輕粉麝香少許和勻濕則乾擦乾則用生油調傳

治漏瘡趙君猷撫幹云屢效

胭脂各壹錢血竭各壹錢輕粉各壹錢麝香各壹錢

右碾為細末乾傳

治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止葛邦  
美傳先以塩少許安白牛耳內然後取耳  
中垢以傅瘡上即差如不用塩即牛耳不  
痒難取垢

治漏瘡癩子右以口含塩水洗瘡口令淨次  
以塩少許同新柵葉或舊柵葉壹處爛嚼  
貼瘡口如瘡口未合再依前法用神効乾  
濕癩子皆可貼

治漏瘡

五味子

乙兩

青黛

臙茶

各半兩

麝香

隨意用

右為細末乾摻或用生油調傅入輕粉少  
許尤妙

瓊碎錄

壹切癩取成鍊松脂末填瘡孔令滿日三四

度七日差大驗

衛生易簡方每日填三次寸餘日效

直指方

漏瘡證治

濕解散濕散漏瘡風冷

霍香葉 厚朴製 半夏麴 橘皮 蒼朮

炒細辛 川芎 白芷各一分 粹桂 川白

薑生 甘草各半分

右判散薑棗煎服得効方每服三錢水

猪腎酒通行漏瘡中惡水自大腸出黑牽牛

碾細去皮取末壹分入猪腎中以線扎青

竹葉包右慢火煨熟空心溫酒嚼下得効方溫

下 薑酒

續斷散止漏活血益腎氣續筋脉

槿藤子去穢 當歸 川芎 黃耆微 川續

斷洗 葫蘆巴炒 紫金皮 生乾地黄洗 牡

蠣粉研細各半兩 木香 粹桂各三錢 甘草各二錢

右為末每二錢空心溫酒調下或加髮灰

佐之

保安炙甘草方治漏瘡內外癰方見乳

乳麝雲母膏治漏瘡効

穿山甲浸一宿去肉 真蚌粉同炒候香熟

甲為末用一百片 起泡去粉以



右入乳香末壹錢麝香半錢夾和雲母膏  
 按五貼為圓桐子大每服三十圓温酒下  
 仍以鹿角膠調塩酒服神授圓川椒方兼  
 外服之 方見諸虛門得効方  
 神授散方見癩癧門 方見癩癧門  
 代赭石圓治漏瘡膿血不止 方見癩癧門

冷漏乳香圓

白淨滴乳香

壹分牡礪粉

半分

右細末雪糕糊圓麻子大每服三十圓道  
 地川白薑生用煎湯空心下

雄黃膏治積年冷漏黃小不止

雄黃

硫黃

研細各壹分

頭髮

黃蠟

各半兩

右用麻油二兩煎蒸頭髮溶盡去滓次入  
 雄黃硫黃碎片黃蠟慢火上桑枝頻攪為  
 膏攤生絹貼用藥先以赤甘草頭煎湯洗  
 或露蜂房白芷煎湯常洗常貼 得効方同  
 黑靈散漏瘡通用

露蜂房

剉二分

牡蠣粉

號丹

硫黃

研各一分

右同炒令烟盡為細末入髮灰壹分麝少

許拌和傅患處麝能引藥透達亦殺虫得効

同方

血竭散治痔漏痛不可忍

血竭 牡礪灰 髮灰各等分

右細末入麝香少許白以津唾調傅如更

痛何杏仁膏調藥傅之得効

生地黄膏漏瘡通用

露蜂房炙黃 五倍子 木香各三錢 滴乳香二錢

輕粉一字

右細末用生地黄壹握搗細和為膏攤生絹上貼瘡

蜂房散治久年漏瘡或暫瘥復發或移於別

處凡用此散入不合處亦用

多孔露蜂房炙黃 穿山甲炙焦 龍骨各一分

右末入麝香用臘月猪脂調傅濕則搽

蛇蛻散治漏瘡血水不止

人蛇皮洗焙 五倍子 龍骨各壹分 川續斷先曬

二分

右細木入麝香少許津唾調傅

人牙散治漏瘡惡瘡生肌裏欲乾則用

油髮各燒存性雄雞內金各等分

右為末入麝香輕粉少許濕則搽乾則麻

油調傅

平肌散治漏瘡久不合露乾則用

老狗頭骨平露蜂房生髮各燒存性新桑

白皮半分

右細末入輕粉麝香少許津唾調傅乾則

搽

鐵屑膏治漏瘡露乾則用

鍛落鐵屑兩狗頭連齒骨壹兩鹿角壹兩燒灰

真輕粉壹錢

右細末用猪脂調傅

熏漏瘡方水出艾葉五倍子白膠苦練根分

右剉碎如燒香法置長桶內坐熏瘡處

洗漏瘡方漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗

淨

露蜂房取白芷煎湯洗或太腹皮苦

參煎湯洗淨右洗畢候水出拭乾先用東向石榴皮曬

為末乾摻以殺淫虫少頃傅藥得効

諸漏瘡方百口兒屎密器封五日取塗瘡

惡核漏瘡並戒怒氣不然核則大漏則水多

漏瘡方

真龍骨 蜂房炙黃各二錢 黃丹 煨 五倍子

降真香節 枯骸骨瓦煨各壹錢

行為細末傅之

久瘻方九孔蜂房炙黃為末臘月猪脂研傅

俟收汁以真龍骨降真香節細末入些乳

香硬瘡

得効方

外諸漏瘡

蠟礬圓治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛內膜

驅解諸毒自然內消神妙見癩瘡

乳香雲母膏治漏瘡效方見直

安腎圓山藥圓二藥多服調養方並見

代赭石圓治痔變為瘦膿血不止

代赭石煨醋磁石煮米醋數沸白礬煨

礪灰研龍骨研蝟皮炙皂莢刺燒猪後蹄

垂甲燒各赤石脂剉川椒炒木賊焙蜂房

入炒各等分

右為末神麴糊圓如小豆大每服五十圓

食前艾并生薑煎湯下漏血處以熟艾揉

和血竭寒日三換方見直

黑靈散漏瘡通用指方

又捷効方用信石新瓦上火煨過為末以津

液潤紙探子蘸少許推入瘡孔內如瘡孔

多不可齊上藥免使害人

久冷漏瘡用活鱗魚五六條擲地以竹針貫

之覆瘡良久當有虫出如線復之使盡用

檳榔黃連末傅明日以乾艾作湯投白礬

三錢洗不壹月全愈

澹軒方

漏瘡惡瘡

火煨人牙止漏瘡輕粉加之乾糝良或碾臘

茶津液付二方能治腎風瘡

脇下生漏瘡

脇下漏瘡牛眼大小將搵入白牛耳却將耳

又垢付其瘡不日之間濃自止

穀道漏瘡

穀道橋邊有竅通先將紙撚滌其中次著乳

香滌子塞灸三小壯自能封半兩阿膠熱

盪溶細羅黃白和其中乾摻片上如瘡掩

貼在瘡開漏自封

漏瘡瘰子

口含搵水淨煎瘡槲葉同搵爛嚼良漏瘰壹

般將此貼不過三度便如常

肘後方

治卒得虫鼠諸瘻方

姚云凡有腫皆有相主患者宜檢本方多發

頭兩邊累累有核

葛氏卒得鼠瘻有瘰癧未發瘡而速熱者速療方搗烏鷄足若車前草傅之

若已有口膿血出者以熟牛屎塗之日三

又方取白鮮皮煮服壹升當吐鼠子  
又方取猫狸壹物料理作羹如食法空心進之鼠子死出又當生吞其功彌効

劉涓子鼠瘻方以龜殼甘草炙桂心雄黃乾薑狸骨炙六物分等搗下蜜和內瘡中無

不差先灸作瘡後與藥良

又方柞木皮五升以酒壹斗合煎熟出皮煎汁令得二升服之盡有宿肉出愈

又瘻瘡坐肉膏棟樹白皮鼠肉當歸各二兩薤白三兩生地黃五兩臈月猪脂三升煎膏成傅之孔上令生肉

葛氏若瘡多而孔小是蟻瘻方燒鱸鯉甲猪膏和傅姚同

又方燒蜘蛛二七枚傅良

又癩方煎桃葉枝作煎淨洗瘡了內孔中大

驗方

葛氏若著口裏東行棟根細剉水煮取清汁含之數吐勿嚥

肉癩方槐白皮搗丸絲裏內下部中傳效

鼠癩方石南生地黃雌黃茯苓黃連各二兩

為散傅瘡上日再

又方礬石三分燒斑猫壹分炙去頭足搗下

用醋和服半匕須臾癩虫從小便中出刪

繁方

千金方治鼠癩以雞卵壹枚米下熬半日取

出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡

孔中三度仰差

神効名方

治螻蛄瘡

良薑 白芨

力青已上各

右為細末嚼芝麻水全熬為膏入冷水共

定用緋絹片火熨斗作膏藥貼瘡上衛生易簡



又方同方千年石灰二根燒灰

右同為末用小油調鷄翎塗上易簡方同

事林廣記

漏瘡嚼五倍子和血竭末塞之

新効方

治癩瘡

人參 黃芪 白朮 川芎 當歸

右五味咬咀為主隨時隨證加藥佐之作

人劑煎服更以此藥煎油入黃丹煎成膏

藥貼之另用附子末津唾調勻量癩大小

捻作薄餅置瘡口上著艾炷灸之令熱勿

令痛餅也則易之乾者再為末唾和再為餅用之病人覺

倦則止每日灸之乃妙

外科精義

溫經丸治陷脉癩

厚朴薑製 官桂去皮 白朮同 甘草炙 乾薑炮 木

香各壹兩 附子二兩醋浸焯淨 七次去皮臍

右為制木鍊蚤和丸如梧桐子大每服三十丸食後飲湯下瘡科精義同

衛生易簡方制

治漏瘡瘡濕癬痒浸淫口廣痒不可忍搔之

黃水出差後復發用羊蹄根爛搗酒調傅

上一時間以冷水洗之豈傳差或川醋

澱調黃水出者乾摻亦治白禿陰蝕疔痔

治諸癩用泔清温洗以絲拭水取葵菜微火

煖貼瘡引膿不過三二白集膿盡即肉生

忌房室魚蒜等物

治鼠癩腫核痛未成膿用栢葉杵爛傅之熬

塩熱置腫上熨令熱氣下即消

治諸般癩瘡作孔穴多年不差者用竜葵根

小蒜樓葱附子雄黃射香赤小豆各少許

為末醋和作餅可瘡大小貼瘡上以艾注

灸之餅子焦黑即差

又方用巴豆燒灰為末貼瘡孔內以膏藥封

之大妙

治蜂癭瘡用五月五日收乾死蜚蠊微燒爲末醋和傅大妙又治壹切惡瘡用油調傅治壹切癭瘡用松脂爲末填孔中滿每日填三次十餘日効

治一切惡癭瘡中有冷瘰肉用正月狐子糞爲末每服壹錢新汲水調下食前服

金匱鉤玄

漏瘡

須服先補藥以生氣血人參黃芪白朮當歸

川芎爲主大劑服之外以附子末唾和作餅如錢厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大漏小炷亦小但灸令微熱不可令痛乾則易之乾者再和再灸如困則止來日再灸直至肉平爲効亦有用附子片灸者仍用前氣血藥作膏藥貼之

備頤百要方

諸癭惡瘡等方橡葉末帖汁盡爲度又磁石末付之

又夏枯草末帖之

又蓖麻子研付之

又榆白皮和醋搗付之

又葵根為灰猪脂和付

又白鴿屎醋和付

又芭蕉根用淳醋磨丸和麵帖

諸癩食治

得効方

治漏瘡肛門周匝有孔十數諸藥不效用熟

犬肉蘸濃藍汁空心食之不食犬肉驢肉

代之七日自安

諸癩禁忌

巢氏病源

諸癩候

養生方云六月勿食自落地五果經宿蚍蜉

螻蛄蟻蝦遊上喜為九癩

又云十二月勿食狗鼠殘肉生瘡及癩出頸

項及口裏或生咽內

鼠癩候

養生方云正月勿食鼠殘食作鼠癩發於頸  
項或毒入腹下血不止或口生瘡如有虫  
食之元大凡鼠食自蓄鼠正果癩癩癩

諸癩鍼灸

千金方

九漏灸肩井二百壯 漏灸鳩尾骨下宛宛  
中七十壯 諸漏灸癩周四畔瘡 諸惡漏  
中冷息肉灸足內踝上各三壯五年六壯

寒熱胷滿頸痛四肢不舉腋腫上氣胷中  
有音喉中鳴天池主之 寒熱頸領腫後谿  
主之 寒熱酸痛四肢不舉腋腫馬刀  
癩喉痺髀膝脛骨搖酸痺不仁陽輔主之  
寒熱頸腋腫申脉主之 胷中滿腋腫  
馬刀癩善自嚙舌頰天牖中腫寒熱胷脇腰  
膝外廉痛臨泣主之 寒熱頸腫丘墟主之  
腋腫馬刀肩腫吻傷太衝主之 寒熱頸  
癩癩大迎主之

聖惠方

灸蜂癭法右以硫黃隨多少細研每用如豆  
和許大安紙上撚燭燒令汁出著瘡中須  
臾間有氣似蜂兒出即差  
諸癭導引  
巢氏病源  
養生方導引法去踣踞以兩手從曲脚大據  
地由脚加其上舉尻其可用行氣愈癩癧

乳痛

癩癭候

養生方導引法云正偃卧直兩手兩足念月  
所在令赤如油囊丹除癩少腹重不便腹  
中熱但口內氣息出之數十不須小咽氣  
即腸中不熱者七息已溫熱咽之十數

癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治... 癭瘰癧中不難治...

癭瘰癧門

論

目錄

千金方

大癭癧草

五癭圓瘰陷腫散 生肉膏

半千金月令

聖惠方

昆布治癭初結諸方

木通散 海藻散 昆布丸

治癭氣諸方

昆布散 松蘿丸

治癭氣咽喉腫塞諸方

半夏散

治癭諸方

大全本草

三因方

癭瘤證治

白膏

是齋醫方

瘤贅

直指方

癭瘤證治

海藻圓 蠟礬圓

嚴氏濟生方

癭瘤

南星膏 昆布圓

治病百法



瘰

三法六門

人參化瘰丹

通氣丸

宣明論

守瘰丸

御藥院方

玉壺丸

得効方

項瘰

破結散

衛生寶鑑

疣瘡

壹井金散

真龍膏

生肌青龍膏

做

上黃法灸瘤子法

寶金散

海帶丸

海藻潰堅丸

聖濟總錄

定血散

拔粹方

玉壺散

寶永類鈴方

瘰癧方

前經驗秘方

土醫林方

神效名方

壽域神方

瘰癧部

衛生易簡方

瘰癧

金匱鈎玄

餘藥無名者散見本方

禁忌

類身百十一

九十一

新藥類名卷之六

金匱要略

雜論

不癭瘤門 因癭或不可治者則悉入癭部

巢氏病源 癭瘤病諸候 因部癭脈血脈衣

五癭腦濕候 癭火癭火癭火癭火癭火癭火

腦濕謂頭上忽生肉如角謂之腦濕言腦濕

氣濕蒸衝擊所生也 癭癭和氣癭癭各各癭癭

鼠乳候 鼠乳候 鼠乳候 鼠乳候 鼠乳候

鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀謂之鼠乳

也此亦是風邪搏於肌肉而變生也 同前因

三因方 癭癭癭

癭癭癭

九十一

癭瘤證治

夫血氣凝滯結癭瘤者雖與癰疽不同所因  
壹也癭多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆  
年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石  
癭皮色不變即名肉癭筋脉露結者名筋癭  
赤脉交絡者名血癭隨憂愁消長者名氣癭  
五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致  
夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤亦  
不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤

破而去其脂粉則愈

神巧萬全方

癭瘤方論

癭有二種有氣癭有石癭氣癭因憂怒氣結  
而成石癭由飲沙水而成硬如石也或面或  
臆肉結成也氣癭可針石癭可破瘤者不在  
頸下初起如梅李漸長大者如桃盞治如癭  
法  
直指方

癭瘤方論

氣血凝滯結為癭瘤癭則憂恚所生多著於肩項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨氣留住初作梅李之狀皮嫩而光漸如杏卵是也其肉色不變者謂之肉癭其筋脉呈露者謂之筋癭其赤脉交絡者謂之血癭隨憂愁而消長者謂之氣癭堅硬而不可移者謂之石癭癭之名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石癭瘤

之種有六者此也癭瘤二者雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無己必至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癭隨順川藥尚庶幾焉

嚴氏濟生方

癭瘤論治

夫癭瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯疾焉大抵人之氣血循環一身常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癭為瘤癭者多

結於頸項之間瘤者隨氣凝結於皮肉之中  
 忽然腫起狀如梅李子久則滋長鑿經所謂  
 瘰有五種瘤有六證五瘰者石瘰肉瘰筋瘰  
 血瘰氣瘰是也六瘤者骨瘤脂瘤膿瘤血瘤  
 石瘤肉瘤是也治療之法五瘰不可決破破  
 則膿血崩潰多致天柱六瘤者脂瘤可破去  
 脂粉則愈外五證亦不可輕易決潰慎之慎  
 之  
 十形三療

瘤

戴人在西華眾人皆訕以為正瀉也  
 之與戴人入食肆中見一夫病壹瘤正當月  
 之上網內背色如灰李下垂覆目之睛不能  
 視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤  
 魏未之信也戴人曰吾與余取此瘤何如其  
 人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別有  
 一術焉其人從之乃引入書小室中令俛臥  
 壹床以繩束其胸刺委中大出血先令以手

揉其目瘡上亦刺出雀糞立平出尺壽之大驚戴人曰人之有技可盡窺乎

人口膠瘤不難辨戴人曰

郢城戴人之鄉也嘗女子未嫁年十八兩手

背皆有瘤壹類鷄矩壹類角丸腕不能劍向

明望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰

在手背為膠瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以

錐鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平瘤

核更不再作婚事復成非素明者不敢用此

法耳

癭

新寨壹婦年四十餘有癭三瓣戴人令以鹹

吐之三涌三汗三下癭已半消次服化癭之

藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消

息之法耳

永類鈴方

癭瘤

巢氏云諸山水黑土石中出泉流者不可久

居令人氣凝血滯為癭瘰瘰者多結於頸項之間瘰者隨氣凝結於皮膚之中當節喜怒忌食甘草鯽魚猪肉五辛生菜諸雜等物

脈病證

治

石 肉 筋 血 氣  
**五癭**

堅硬不  
可移皮  
色不變  
筋脉露  
結赤脉  
交絡隨

骨 脂 風 血 石

**六瘰**

忽然腫  
起狀如  
梅李核  
久則滋  
長皆喜  
怒憂思  
所致切  
不可決  
潰膿可  
破

濟生破  
結散  
南星膏  
昆布元  
三因白

千金方

癭瘰

憂愁消

肉

去脂粉

膏

治石癭氣癭勞癭土癭憂癭等方 三因方名

巖氏濟生方破結散治石癭氣癭筋癭血癭

肉癭等證 醫方大成永

海藻

諸方 洗

海蛤

通草

昆布

洗

舉不 壹作繫石

松蘿

各三分

鈞麥

麴

四分

鈞

半夏

湯洗

七次加貝母去



心二  
分

右九味治下篩酒服方寸匕大成鈔方日每服二錢

三禁食魚三方忌甘草鯽魚猪肉五辛生

菜諸難消之物大成鈔方忌甘草鯽魚雞

成南北經驗方珍方與大成同十日知二十日愈

又方小麥麵壹斗海藻壹斤特生礬石十兩

右三味以三年米醋漬小麥麵曝乾各搗

為散合和服壹方寸匕日四五服藥含極

乃咽之禁薑五辛猪魚生菜大吹大讀誦

大叫語等

又方昆布各三松蘿各三海藻各三桂心各三海蛤

通草各二白欬各二

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方海藻各三海蛤各三昆布各三半夏各三細辛

土瓜根各一松蘿各一通草各一白欬各一龍膽

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作

重用力

又方昆布二兩洗切如指大醋漬含咽汁盡愈

又方海藻壹斤卜小麥麩壹斤

右二味以三年醋壹升溲麩末曝乾反

醋盡合搗為散酒服方寸匕日三服思努

力崔氏云療三十年瘦瘤

五癭圓方

菖蒲二兩海蛤二兩白斂二兩續斷二兩海藻二兩松

蘿桂心二兩蜀椒二兩倒掛草二兩半夏各壹兩

神麴三兩羊鬐百枚

右十二味治下篩以牛羊髓脂為丸如梧

子日服三丸

又方取鹿鬐以佳酒浸令沒炙乾內酒中更

炙令香含咽汁味盡更易盡十具愈聖惠方同

陷腫散治二三十年癭瘤及骨瘤脂瘤石瘤

肉瘤膿瘤血瘤或息肉大如杯杆升斗十年

不瘥致有漏聖惠方潰令人骨消肉盡或堅

或軟或潰令人驚悸寤寐不安身體瘵縮愈

而復發方

今人醫科藥不效長斷與蘇愈

烏賊骨

聖惠方燒灰

石硫黃

各壹分。聖白石

英

聖惠方紫石英

聖惠方川

鍾乳

各貳分

方有粉字

丹參

三琥珀

附子

聖惠方炮

胡鷲

屎

大黃

乾薑

各肆兩

聖惠方炮裂到

右十壹味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡

濕卽傅若瘡乾猪脂和傅日三四以乾爲

度若汁不盡者至五劑十劑止藥令人不

痛若不消加芒消二兩佳

治癭瘤方

昆布

桂心

逆流水

柳鬚

各壹兩海藻

乾薑

各二兩羊靨

七枚

右六味爲末蜜丸如小彈子大含壹丸咽

津

又方礬石

芎藭

當歸

大黃

黃連

黃芩

白歛

芍藥

各二分吳茱萸

壹分

右九味治下篩雞子黃和塗故細布上隨

瘤大小厚薄帖之乾則易著藥熟當作膿

脂細州從孔中出須探膿血盡著生肉膏  
若膿不盡復起如故

生肉膏治癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

當歸 附子 甘草 白芷 芎藭 各壹兩

薤白 二兩 地黄 兩

右七味咬咀以豬脂三升半煎白芷黃去

滓稍以傅之日三

又方以狗屎燉雞子傅之去膿水如前方說

傅生肉膏取瘡

千金月令

瘡患忽生癭疾三年者 永類鈔方 極妙方右

用萬州黃藥子半斤緊重者為上如輕慢

者即是荆南山須用壹斤已來取無灰酒

壹斗以藥投於酒中固濟瓶口以糠火燒

壹復時停騰待酒冷即開令患人時時服

膏蓋不得令絕酒氣服經三五日後常須

把鏡自照覺銷即不得喫酒如飲過多即

却項細切慎之 鈔方此下云用火時不可

多惟燒酒氣香出瓶頭有

津即止火不待經宿也  
也巳驗如神忌毒食

聖惠方  
治瘰初結諸方

夫瘰初結者畜所成也又飲

沙石流水毒氣不散之所致也皆是肺脾壅

滯胃膈否塞不得宣通邪氣搏於咽頸故令

漸漸結聚成瘰宜早療之便當消散也

治頸下卒生結囊欲成瘰宜服木通散方

木通 壹兩 海藻 壹兩洗 昆布 壹兩洗 松蘿 去鹹味

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

酒調下二錢

治咽喉氣壅悶漸結成瘰宜服海藻散方

海藻 一兩洗 貝母 二兩煨 土瓜根 半兩 小麥 去鹹味

麵 半兩炒 微黃

右件藥搗細羅為散每於食後以温酒調

下壹錢

治瘰氣初結咽喉中壅悶不治即漸漸腫大

宜服昆布丸方

昆布

一兩洗去鹹味

訶梨勒皮

二兩

檳榔

壹兩

乾薑

半兩炮裂剉

桂心

半兩

海藻

壹兩洗去鹹味

木通

剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食後以溫酒下二十九

又方昆布

壹兩洗去鹹味

海藻

壹兩洗去鹹味

訶梨勒皮

壹兩

枳殼

半兩麩炒去麩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如杏核大常

含壹丸嚥津

又方檳榔

叁兩

海藻

二兩洗去鹹味

昆布

叁兩洗去鹹味

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小彈子大

常含壹丸嚥津

又方小麥

叁升以三年米醋三升浸之曝乾更浸候醋盡為度

昆布

洗去鹹味

右搗細羅為散每於食後以溫酒調下二

錢如不飲酒以水調服之服盡即差多服

彌伴不得引重及悲怒

治癭氣諸方

夫癭者由憂恚氣結所生也亦由飲沙水瘴氣入於脉搏頸下而為之也初作與癭核相似而當頸下也皮寬不急垂槌槌然是也恚氣結成癭者似垂核槌槌無脉也飲沙水成癭者有核痛痛無根浮動在皮中又云有三種癭有血癭可破之有瘰內癭可割之有氣癭可針之

治癭氣結腫胃膈不利宜服昆布散方

昆布一兩洗海藻一兩洗松蘿壹兩細辛壹兩

半夏一兩湯洗海蛤一兩甘草壹兩炙白

飲壹兩龍膽二兩去土瓜根兩楨榔兩

右件藥搗細羅為散每於食後以溫酒神

萬全方調下二錢不得用力勞動

治癭氣結硬腫大諸藥無效服之百日必得

痊差方

黃牛食系五具以猛炭火燒為灰研為末

風海藻五兩昆布五兩已上二味以水漬五日旋換清水洗去鹹味曝

乾白殭蠶 五兩 微炒

右件藥搗細羅為散入牛食系末研令勻  
每服以溫酒調下二錢日三服以差為度

治瘦腫結漸大宜服此方

海藻 洗去鹹味 海帶 海蛤 細研 昆布 洗去鹹味 木香

上已各一兩 金薄 五十片 細研 猪鬃 七枚 炙乾 羊鬃 七枚 炙乾

右件藥搗細羅為散每夜臨卧時以溫酒  
調下二錢仍不得著枕卧如是食瘦即難

治

治瘦氣神驗方

琥珀 半兩 昆布 壹兩 洗去鹹味 烏賊魚骨 壹兩 洗去鹹味 桔梗 半兩

去蘆頭 赤小豆 三分 酒煮 小麥 三分 酒煮 熟曝乾

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小彈子大

絲裹一丸常含嚙津

又方小麥 壹升 以醋壹升 浸壹夜 曝乾 海藻 三兩 洗去鹹味 昆布

三兩 洗去鹹味

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二  
錢日三服以差為度



治瘦氣結腫宜服此方

昆布一兩洗去鹹味茵芋半兩馬芥子半兩蕪荑半兩

菟醬兩

右件藥搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如小彈子大以絲裏壹丸含嚙津日四五服以差為度

治瘦氣結腫心胃不利煩滿宜服此方

海藻壹兩洗去鹹味昆布壹兩洗去鹹味木通壹兩連翹

一杏仁壹兩湯浸去皮尖麥門冬一兩半兩雙入炒微黃

赤茯苓一兩人參半兩去蘆頭陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

牛蒡子兩羊靨貳拾枚炙乾

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小彈子大

絲裏壹丸含嚙津日三四服神巧萬全方同

治瘦氣經久不消神效方

海帶壹兩海藻一兩洗去鹹味昆布一兩洗去鹹味

右件藥搗羅為末煮赤小豆并棗口口研

為丸如小粟子大以絲裏每月如大盡取

二十八日夜小盡取二十七日至月終三

夜臨卧時淨灌漱含卧嚥津不語至明別日即不得服

治癭氣結核癩癧腫硬宜服松蘿丸方

松蘿 昆布 洗去鹹味 木通 剉 柳根鬚 逆水生者洗焙

乾已上各二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如小彈子大常含壹丸細細嚥津令藥味在喉中相接為妙

又方海藻 二兩洗去鹹味搗為末 小麥麩 二兩合

右件藥以好酒浸為一劑曝乾再搗細羅為散每於食後以醋湯調下一錢以差為度

治癭氣令內消方

黃牛食系 三具乾者

右內於甕瓶子中以瓦子蓋頭鹽泥固濟候乾燒令通赤待冷取出細研為散每於食後以粥飲調下壹錢

治癭氣咽喉腫塞諸方

夫癭氣咽喉腫塞者由人憂恚之氣在於胃  
膈不能消散搏於肺肺故也咽門者胃氣之  
道路喉嚨者肺氣之往來今二經俱為邪之  
所乘則經絡否澀氣不宜通故令結聚成癭  
致咽喉腫塞也

治癭氣咽喉腫塞心胃煩悶宜服半夏散方

半夏壹兩湯洗七遍去滑射干兩牛蒡子壹兩杏仁微炒  
三分湯浸去皮尖羚羊角三分木通三分  
雙人麩炒微黃桔梗三分昆布三分洗檳榔一分枳殼兩

麩炒微黃赤茯苓三分甘草半兩炙

又右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞  
人生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服

又方琥珀兩皂莢子壹兩牛蒡子壹兩半

又右擣細羅為散每服食前以葱白湯調下  
治癭氣咽喉腫塞妨悶宜服此方

木通兩昆布壹兩洗乾薑壹分炮甜葶  
塵壹兩開紙羚羊角一分人參半兩去海

藻半兩洗射干三分檳榔三分  
右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大不

計時候以溫酒下二十九

又方半夏三分湯洗海藻參分洗龍膽參分

頭昆布三分洗土瓜根參分射干參分小麥三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以生

薑酒調下壹錢

又方羚羊角屑兩昆布壹兩洗桂心壹兩川大

黃壹兩剉木通壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以粥飲下二十九

治瘰氣胷中滿悶咽喉腫塞宜服此方

昆布三兩洗川大黃壹兩剉木通壹兩海

藻壹兩洗射干壹兩枳殼半兩麩炒杏人兩

湯浸去皮尖雙牛蒡子兩海蛤壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以粥飲下三十丸

治瘰氣咽喉腫塞宜服此方

松蘿壹兩昆布二兩洗海藻二兩洗羚羊角去鹹味  
 屑一兩木通一兩柳樹根鬚一兩檳榔一兩  
 右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
 每服不計時候以粥飲下二十九

治瘤諸方

夫瘤者為皮肉中忽有腫起如梅李子漸以  
 長大不痛不痒又不結強按之柔軟言其留  
 結不散謂之瘤也若不療之乃至椀大則不  
 復消尔然非殺人之疾亦慎不可輒破但如

瘦法療之當得差也

治瘤腫悶宜服此方

昆布壹兩洗黃耆壹兩麥門冬壹兩川木  
 黃壹兩陳橘皮半兩湯浸甘草半兩炙  
 杏仁半兩湯浸去皮尖雙人參雙炒微黃

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞  
 煎至六分去滓不計時候溫服

又方川大黃二兩昆布壹兩洗海藻壹兩  
 鹹玄參壹兩枳殼壹兩芎藭壹兩杏仁壹兩

類聚身士

百十

湯浸去皮尖雙延胡索一兩琥珀壹兩人

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後以木通湯下二十九

又方羊廐壹兩青橘皮壹兩湯浸燒銀砂鍋

兩壹

右件藥搗羅為末用糯米飯和丸如梧桐子大每於食後以溫酒下五丸至七如不喫酒煎赤小豆湯下亦得

治肉中腫起生瘤如梅李子大漸漸長大宜

用此方

芎藭 白礬 當歸 川大黃 黃連

黃芩 赤芍藥已上各半兩○神吳茱萸

青白欬兩壹

右件藥搗細羅為散每用時以雞子黃調塗於故帛上隨大小貼之

大全本草

圖經曰瘰癧酒方用海藻壹斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日壹服兩合日

癩瘰癧

癩瘰癧

三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸  
七日三不過兩劑皆差

陳藏器云如癭氣取昆布末蜜丸含化自消  
也

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆  
布海藻等分爲末蜜丸含如杏核大稍稍

嚙汁

千金翼治五癭昆布壹兩並切如指大酢漬  
含嚙汁愈良

斗門方治癭氣用黃藥子壹斤浸先淨酒干

斗浸之每日早晚常服壹盞忌壹切毒物  
及不得喜怒但以線子逐日度癭知其効  
外臺秘要療氣癭方羊廐壹具去脂含汁盡  
去之日一具七日含便差止

外臺秘要主瘤病驢鹿二種肉剖如厚脯炙  
令熱塌淹可四炙四易痛攪出膿便愈不  
除更炙新肉用之良

三因方

癭瘤證治

癭瘤證治

白膏治壹切風熱毒腫及臟氣鬱結丹石癆  
動結為癭疽瘰癧諸瘡腫未破即令消散无  
漏浸淫膿汁淋漓諸治不差者悉止之

白歛 白薇 白及 白芷 薤白 各半

洗以清油壹斤煎至半斤濾去滓入黃芪 且松 藿香

零陵香 防風 當歸 各半兩再入煎油

入洋定粉 二兩 黃蠟 兩三 寒水石 二兩 飛過

右再煎滴水成珠為度磁器盛之以腦子

少許糝其上煎時忌鐵器以柳枝攪

是齋醫家秘法

癭贅

繫瘤法兼去鼠妳痔集驗方真奇藥也芫花

根淨洗帶濕不得犯鐵器於木石器中搗

取汁用線一條浸半日或壹宿以線繫瘤

經宿即落如未落再換線不過兩次自落

後以龜骨并訶子末傅瘡即即合依土法

繫鼠妳痔累用得効繫瘤法蘇沈良方亦



類聚要方

卷五

有用蜘蛛者然費力不如此徑捷如無根  
只用枯泡濃水浸線亦得得効趙氏家姊  
嘗用以繫腰間壹瘤不半日即落亦不痛  
治身七生贅肉彭知錄若訥若以海藻為末  
傅仍煎海藻酒服之即去水不器中

直指方飛光鼠杖藥餅式其香藥出黃芬

癭瘤證治

海藻圓癭瘤通用

海藻洗晒海蛤煨松蘿各七錢半當歸川芎

官桂 白芷 細辛 藿香 白欽 明

礬煨昆布洗晒

右細末煉蜜圓彈子大每壹圓含咽下

蠟礬圓癭瘤通用常服自然縮小消磨方見

門

針沙方專治氣癭

針沙浸於水缸平日飲食皆用此水十日

壹換針沙服之半年自然消散針沙能去積也

治小瘤方先用甘草煎膏筆蘸粧瘤傍四圍

乾而復粧凡叁次後以

大戟 芫花 甘遂

右等為細末米醋調別筆粧傳其中不得  
近著甘草處次日縮小又以甘草膏粧小  
暈叁次中間仍用大戟芫花甘遂如前自  
然焦縮得効方同

又治瘡方舊牛皮鞋皮洗煎凍常食之瘡若  
破如豆腐極臭

嚴氏濟生方

瘦瘤

南星膏治皮膚頭

醫方大成南北經驗方袖  
珍方衛生易簡方作項

面生瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼  
不痛無藥可療不可輒有針灸

牛南星

大者膏枚  
去土薄切

右細研稠粘如膏滴好醋五七滴如無生  
者以乾者為末投醋研如膏先將小針刺  
病處令氣透以藥膏攤紙上象瘤大小貼  
費痒叁五易瘥得効方醫方集  
成永類鈔方同

昆布圓治壹切癭瘤不問久新  
 昆布壹兩海藻壹兩小麥壹兩好壹兩大小  
 右叁味為細末煉蜜為圓如杏核大每服  
 壹圓食後噉嚙

治病百法

癭

夫癭囊腫悶稽叔夜養生論云頸處險而癭  
 水土之使然也可以人參化癭丹服之則  
 消也又以海帶昆布三味皆海中之物但

得二味投之於水瓮中常食亦可消矣

三法六門

人參化癭丹治贅

海帶 海藻 海蛤 昆布已上四澤瀉  
 炒連翹已上並猪鬃 羊鬃各十  
 右為細末蜜丸如雞頭大臨臥噉化壹二  
 丸

通氣丸同上所治

海藻 海帶 昆布 木通 甘草已上  
 各壹

類聚

集

兩呵子 薄荷已上各半兩 杏仁少許 煮浸  
右為細末煉蜜和丸每夜嚙化壹丸忌油膩物

又方海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通

猪鬃 羊鬃各五枚 海蛤 連翹

右為細末研麝為丸如雞頭大每服一丸

臨卧嚙化

宣明論

守瘻丸治瘻瘤結硬

通草二兩 杏仁一大合去皮尖研 牛蒡子一合出油 吳射

干 昆布去鹹 阿梨勒 海藻各四兩去鹹

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下

日進三服

御藥院方

玉壺丸治三種瘻方

海藻 昆布 雷丸 海帶各等分

右件揀擇極淨搗羅為細末燒陳米飯搗

和為丸如榛子大每服九含化嚙津不拘

癭瘰癧

癭瘰癧

時候常令藥力不斷  
得效方

項癭

破絡散治五癭堅硬不可移名石癭皮色不

變名凶癭筋絡露結名筋癭赤脉交絡名血

癭隨憂愁消長名氣癭五癭皆不可妄決破

破則膿血崩潰多致夭枉服此十日知二十

日愈

海藻

洗

龍膽草

海蛤

通草

昆布

洗

礬石

枯

松蘿

各三分

麥麩

兩半夏

海帶

各三分

右為末每服方寸匕酒調日三服忌雞魚

猪肉豆辛生菜及諸毒物

衛生寶鑑

疣瘡

癩丑歲承應冬佳於瓜忽都有太醫大使顏

飛鄉傳四方用之嘗效故錄之

一井金散枯痛瘰大有神效

土黃

三錢

硃砂

雄黃

各二錢

粉霜

輕粉

各一錢 乳香 沒藥 各半錢 二錢 俱詳 辨傳

右為末假令瘤如胡桃大用藥末少許半  
錢用唾調如稀麵糊得所攤於瘤頂上如  
小錢大唾濕紙花兩重蓋之後用黃龍膏  
蓋之間日一度上藥次添藥胤的周迴大  
如韭葉如此上之無徒漸漸折之後根搖  
自然有裂疊隨後自然下來

黃龍膏方

黃藥 不以多少

右為末唾調攤在紙上

生肌青龍膏

呵子皮 龍骨 高茶 各等分

右為末乾摻上

做土黃法

砒黃 兩 木鼈子 去殼 巴豆 不去油 各等分 硃砂 二錢 研

右件砒黃一處為末後用木鼈子同石腦  
油和成一塊油紙裏埋於坑內四十九日

取出收於磁器內盛劈作小塊

灸瘤子法果報面生疣瘤

右用文九灸十壯卽用醋磨雄黃塗紙上

剪如螺螄鬚大貼灸處川骨藥重貼二日

一易候痒折出膿如豆粉愈

枯瘤方

草烏半斤川烏肆兩乾桑耳 朽木各三兩細白

石灰三碗桑柴灰二碗

右朽木等四味燒令存性同二灰研勻用

水一桶淋汁如法熬成膏用之

寶金散偏醫瘦氣無不差神效妙方

猪羊靨拾對暖水洗淨去脂海藻 海帶

各二兩琥珀研麝香研木香各一分丁香各一分真

珠半兩

右件爲末入研藥合勻再研極細重羅每

服一錢熱酒一錢調下夜臥服垂頭臥若

是在室男女不寸服必效如男子婦人患

一月見效婦人有胎不可服

海帶丸治瘰氣久不消

海藻 貝母 青皮 陳皮

右件各等分爲末煉密丸如彈子大食後

嚙化一丸大效

海藻潰堅丸治瘰氣大盛久不消散

海藻 海帶

昆布

廣茂

青塩

兩

各半

右爲末煉蜜丸如指尖大每服一丸口化食後

聖濟總錄

治諸瘡血出黃芩散貼方

黃芩

去黑心

黃蘗

去麤皮

黃連

去須

鬱金

各半

右四味搗羅爲散入寒食麵五錢匕水調

貼之

拔粹方

玉壺散

永類鈴方

瘰癧



葛命方 檳榔昆布各三兩 馬尾海早二兩 作末 蜜元 彈子大 空心 噙嚙 忌食 塩

經驗秘方

醫林方

神效名方

枯瘡方

砒 硃砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉  
已上各 班猫 生用 朱砂 錢一 乳香 三 沒藥 錢一

同研為末 粥糊為丸 捏作碁子樣 爆乾 先灸破 瘡頂 三炷 為則 上以瘡藥餅 蓋上用黃藥末 以小調貼之 數日 自然乾枯 落下 又方 以銅碌為末 草刺破 瘡摻在上 以膏藥塗之

治頭面生瘡子 用蛛絲 勒瘡子根 三二日 自然退落

壽域神方 治瘡瘡用蜘蛛絲 纏勒 五日 自然退落 自驗 若

遇七夕 纏尤効

壽域神方

癭瘤部

治癭瘤 衛生易簡方治項癭 用猪肺管上團肉壹塊將

新瓦焙乾臨臥細嚼以酒嚥下極效

一方 衛生易簡方治瘰癧子 用地膚子白礬等分爲末煎

湯洗數次即去

一方用琵琶絃纏勒癭瘤根極妙

衛生易簡方

癭瘤

治頸下卒結囊欲成癭川海藻壹斤酒二升

漬數日稍稍飲之又治頷下癭瘰

治癭氣用海藻昆布等分爲末蜜丸如杏核

大含燕津或作散絲裏壹錢醋浸含之

治骨石肉膿血五等癭瘤二三年不差大如

盃盞或破潰漏膿水令人骨消肉盡或硬

或軟寐臥驚悸體中掣縮愈而復發用烏

魚骨硫黃琥珀紫石英鍾乳石各壹錢白

石脂丹參各三錢乾姜附子大黃芒硝各

壹兩爲細末以竹筒盛勿洩氣如瘡濕摻

藥三四度乾者以猪脂和傅此藥止痛除  
惡肉火效者三錢神效用平人黃丹各  
治生癰子用砒霜礪砂黃丹雄黃粉霜輕粉  
硃砂沒藥各壹錢乳香三錢斑猫生用二  
十箇同研爲末糯米粥在如棊子樣爆乾  
先灸破癰頂三炷爲則以藥餅蓋上用黃  
藥末水調貼之數日自然枯乾落令之  
治石氣筋血肉五般癰證用海藻洗昆布洗  
凡石枯龜膽海蛤通草貝母松蘿各壹兩

麥麩半夏湯浸洗七次各壹兩三錢爲末  
每服二錢酒調臨臥徐徐嚥下忌鯽魚雞  
肉五辛生菓油膩物

治癰贅用黃丹信礪砂各二錢乳香半錢細  
研滴水爲丸如米大先用針刺破癰根內  
藥壹粒以紙丸塞住紙花封之久而自落  
忌食雜物

治項癭用海藻海帶海蝶蛸海蛤昆布各二  
錢縮砂連翹玄參甘中炙各三錢香附子

半兩共為末每服壹錢飛煑湯壹盞調臨  
 臥徐徐嚥下或以搗梅肉搗和丸如杏核  
 大每服一丸噙化海藻甘草雖相反惟此  
 劑宜用極効式漆封瓶其性之入而口  
 治瘰氣川海藻三兩海螺蛸二兩海帶兩半  
 大腹子去皮甚硝柳根各壹兩珍珠三錢  
 煉蜜丸如杏核大臨臥噙化壹丸

金匱鈎玄  
 瘰氣先須斷厚味

海藻壹兩黃藥子二兩  
 為細末每以少許置掌中時時舐之津液  
 咽下如消三分之二須止後服  
 瘰癧禁忌

巢氏病源

養生方云諸山水黑上中出泉流者不可久  
 居常食令人作瘰病動氣增患

醫方類聚卷之一百八十一

此書實令人於醫術博覽能思  
發寸式之附山水黑江中川泉流各不同人  
集及海草

藥錄林書

御下時節三合之二藥方參照

藥方本以治之者實草中則治之者亦

實草中則治之者亦