

醫聖元戒卷第二

趙州教授進之正好古案次

明醫御史東萊桂亭蔡才會粹 兩淮運副四明魯本峻重刊

兩淮運副姚江嚴昌世校正

太陽證 太陽流入陽明 故葛根次服

仲景葛根湯 主治脩製並見 活人二方同 葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

葛根升麻湯 錢氏用治小兒 痲疹傷寒

葛根 升麻 芍藥 甘草

海藏云活人言頭疼如破者連鬚葱白湯次又不
已者葛根升麻湯恐太陽流入陽明斷其路故以
此湯主之地黃湯內加犀角以升麻代之是知陽
明藥非太陽藥也人或初病太陽證便與葛根升
麻湯是遺太陽不惟遺經及引太陽邪氣入於陽
明不能解也其變可勝言哉

活人葱白例

此例當在前麻黃葛
根葱豉湯四味條下

連鬚葱白湯

治傷寒發汗已
未頭疼欲破者

葱白

連鬚
半斤

生薑

二兩

右以水二升煮取一升去滓分二三服此藥不差
者服葛根葱白湯

葛根葱白湯

葛根

葱白

生薑

芍藥

川芎

知母

右剉水三升煎一升去滓分二服

七味葱白湯

許仁云傷寒或因氣勞或因食勞其病如強力持
虛行步而發者力勞也

葱白

連鬚

葛根

鹽豉

生薑

麥門冬

乾地黄

澇水

一均揚之無數

右七味澇水煎三分去二去滓分作二服覆首出汗

王朝奉方 活人葱白例並出金匱祖方

葱薑湯

治妊娠傷寒

葱白

十莖

生薑

三片切

右二味以水三升煮取一升分作三服取汗為度

又葱豉湯

葱白

二兩半

豉

半斤

右以水三升煮取一升分作二服取汗為度

又葱白一物湯

葱白

二把

又葛根一物飲子

右以水一升煮熟服取汗食盡亦主安胎若胎疾須臾即出

葛根汁每服一小盞如人行五里地道一服若無生葛乾葛咬咀煮濃汁服至于升麻梔子前胡知

母黃芩杏仁六味共七物內加葱白三兩薑煎去

滓服

普救散

治小兒傷寒

乾葛

炒半斤

甘草

炒赤四兩

蒼朮

一升泔浸煌

右麤末每服二大錢水一鍾煎至七分去滓熱服

百解散

升麻湯

六兩

蒼朮

四兩

菖蒲

一兩

右同為末水煎服

又百解散

治太陽陽明合病

麻黃

荊芥

石膏

川芎

蒼朮

甘草

又百解散

治證同前

麻黃

菖蒲

蒼朮

甘草

不臥散

蒼朮

半兩

甘草

一兩

菖蒲

三錢

右以水同生薑棗煎服

蕩邪散

藜本

蒼朮

甘草

等分

右以水一盞煎服之

和解散

蒼木 半斤 製

藁本

桔梗 微炒

厚朴 製各二兩

陳皮 去白

甘草 炙各四兩

右為麤末每服三錢水一大盞生薑三片棗一枚

去滓服

易簡王氏生料五積散

治感冒風寒肩背拘急發熱頭疼或為寒所搏一身凜然急用此藥如服養胃湯法以被覆汗出即

愈

蒼朮

桔梗

枳殼

麻黃

陳皮 各六錢

白芷

川芎

當歸

甘草

官桂

半夏

白芍

茯苓 各二錢

乾薑

厚朴 各四錢

右以咀每服四錢水一盞半生薑三片葱白一根

煎至六分去滓食前熱服尋常被風寒濕氣交互

為病頸項強直或半身偏疼或麻痺但服此藥加

麝香末少許煎服自能平治婦人經候不調心腹

上感寒若淺
神氣非強
盛者麻黃
五國厥用

撮痛或閉塞不通加醋一合煎服 產後催生及胎死腹中亦如前法能飲者更加酒半盞 產後發熱及往來寒熱不問感冒風寒及惡露爲患均可治療腹中血塊尤宜熱醋調服 傷寒手足逆冷面青嘔吐宜加附子 或疝癰癥瘕膀胱小腸氣痛加炒茱萸半錢鹽少許 腳氣加茱萸木瓜大便秘者加大黃 腳氣下注焮然赤腫者以大便利利爲度 腳氣初發增寒壯熱者亦宜此藥利之 又一方治渾身瘡疥膿血水淋瀝經時不

愈加升麻大黃各升麻和氣飲 蓋瘡癰爲患多因內有所蘊發在皮膚若只傳以藥何由得愈不若以此藥滌之若寒濕之氣注下作瘡瘡愈則毒氣入腹爲害不淺此藥尤妙若有熱證則以敗毒飲亦加大黃煎服

海藏五積論

麻黃桂芍藥甘草卽麻黃桂枝各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴卽平胃 枳殼桔梗陳皮茯苓半夏卽枳梗半夏等湯也 又川芎當歸湯治血 又加

乾薑爲厚朴散

右此數藥相合爲解表溫中泄

熱之劑去疾消痞調經之方雖爲內寒外感表裏
之分所制實非仲景表裏麻黃桂枝薑附之的方
也至於冷積嘔吐泄痢癥瘕時疾疫氣項背拘急
加葱白豆豉厥逆加吳茱萸寒熱咳逆加棗婦人
難產加醋始知用之非一途也惟知活法者擇之
仲景五苓散

治太陽病後汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲
得飲水者少與之令胃氣和則愈若脈浮小便

不利微熱消渴者與五苓生之

猪苓

十八銖
去皮

澤瀉

兩銖

茯苓

十八銖

桂

半兩去
浮皮

白朮

十八銖

右五味爲末以白米飲調服方寸匕日三服多飲
暖水汗出卽愈 胃弱小便少亦宜少減二苓澤
瀉加白朮桂便以生薑之類 若水停心下煎生
薑三錢或半夏入煎濃調服五苓散秤三錢或半
兩亦可 太陽標病傳入標之本發渴溺不利以
此散導之邪自膀胱而出也若未渴妄用五苓散

反引邪氣入裏而不能解也。故易老云卽太陽經之一藥也。若傷寒太陽脈緊而渴者不宜用此。陽明證後有仲景五苓散一條甘露飲枳木湯梅師方一以其消痞去水故入陽明例。飲酒而泄瀉者脾胃受濕也何以知之仲景厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也故飲而瀉者五苓散甘露飲子神効飲酒若過度必作利者裏急後重者溫熱之毒浸漬腸胃也當作別治。甘露飲卽五苓散去猪苓加石膏寒水石滑石甘草是也。並用濃煎生薑湯調服食前其所加三石臨時視病寒熱輕重多少隨宜用之。

痙濕暍三證

傷寒頸強急身體反張屬太陽先因傷風又感寒濕而致然也。古人謂之痙病又作痙。痙者強直也。古人以強直爲痙外證發熱惡寒與傷寒相似其脈沉遲弦細而項背反張強硬如發癰之狀此爲異耳。新產血多汗出中風亦有此證當察其有汗無

有汗為柔
瘧無汗為
剛瘧

活以承氣加老

汗以分剛柔二瘧無汗惡寒名為剛瘧有汗不惡寒名為柔瘧無汗者葛根湯主之有汗者桂枝加葛根湯主之
分剛柔二瘧加減小續命主之審
之剛瘧腦滿口噤不卧者蕭腳掣急咬齒大承氣湯下之加羌活尤妙外臺祕要云熱而瘧者死熱病瘧者反折瘰癧齒斷噤也剛柔二瘧與陰陽二瘧何如瘧亦作瘧陽瘧屬剛瘧陰瘧屬柔瘧以附子散桂心白木湯附子防風散八物白朮散可選數藥用之

附子散

治傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止頭強搖頭

口噤

桂心 二錢
附子 一兩
白朮 一兩
川芎 三錢

獨活 半兩

右各咬咀每服三錢水一鍾棗一枚同煎至五分

去滓温服

桂心白朮湯

治傷寒陰瘧手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮

防風

甘草

桂心

附子

川芎

各等分

右剉如麻豆大水五盞薑五片棗一枚同煎七分去滓溫服

附子防風散

治傷寒陰瘕閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗出不止

白朮

防風

甘草

桂心

附子

乾薑

柴胡

茯苓

五味子

右咬咀每服三錢水一盞生薑四片煎至七分去滓溫服無時

八物白朮散

治傷寒陰瘕三日不差手足厥冷筋脉緊急汗不出陰氣內傷

白朮

茯苓

桂心

麻黃

羌活

良薑

附子

五味子

右咬咀每服四錢水一大鍾薑五片同煎至五分去滓溫服無時無論有汗無汗藥并下藥中總加

羌活

王朝奉剛柔二瘧三藥

金匱括蔞桂枝湯

有汗者弱也屬陰

太陽證其證備身體強兀兀然脉沉遲為瘧

括蔞根

三兩

桂梗

去浮皮三兩

芍藥

三兩炙二兩

每服五錢水二小盞薑七片棗二枚煎至一盞去

滓服汗不出食頃啜熱粥以發之

桂枝加葛根括蔞湯

治症如前

桂枝

芍藥各一兩

甘草

葛根

括蔞根

各二錢半

右咬咀每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至一

盞去滓服

金匱葛根湯

無汗者剛也屬陽

太陽病無汗而小便少反氣上衝脘口噤不得語

欲作剛瘧

葛根

四兩

麻黃

三兩去節

桂枝

二兩去浮皮

甘草

炙二兩

生薑

三兩切

芍藥

三兩

大棗

二十枚

右咬咀水一斗先煮麻黃葛根一二沸去上沫內

諸藥煮取三升去滓溫服取微汗王朝奉云芍藥
二兩

活人舉敗散

治新產血
虛症者

右以荊芥穗不以多少微炒爲細末好酒調五錢
服之

或云仲景瘧病無藥今王朝奉治瘧葛根湯卽桂枝
湯內加葛根麻黃是也治後有金匱芍藥三兩一
句卽是仲景有本方也叔和編次仲景言證而無
藥金匱以有也活人百合證數藥以爲活人藥而
不知本草所載皆金匱方當知仲景有本方矣金
匱玉函卽仲景之管稱也金匱要略亦出玉函故
朝奉但言金匱處便爲仲景方也故文潞公輩皆
稱仲景爲羣方之祖蓋本此也

海藏瘧濕喝別法

神木湯

治風濕惡
寒脉緊

蒼木 防風 甘草

右吹咀葱白煎去滓服

解利無汗治剛瘧加羌活獨活麻

白木湯

治風濕惡寒脉緩

白木

防風

甘草

右咬咀生薑煎去滓服

解利有汗治柔痙加

桂心

黃耆

白木

太陽陽明加川芎荆芥穗

正陽陽明加羌活酒大

黃少陽陽明加防風柴胡

熱而在表者加黃

芩

寒而在表者加桂枝黃芪附子熱而在裏者

加大黃

寒而在裏者加乾薑良薑附子以上數

經寒熱當以脉別之

汗少者加蒼朮

陽濡而弱濕溫也

先傷濕

後傷暑

脉虛名曰重暍

汗多者加白虎桂枝

陰小而急

先傷寒

後傷熱

身熱脉虛

自汗惡寒

中暑也

白虎加桂湯

身熱脉浮

自汗欲睡

風濕也

白木防已湯

先傷風

後傷熱

先飲冷後傷暑五苓散主之此必心下痞也濃煎生薑湯調服或四君子湯調中湯亦可若中和後或小便不利或莖中痛以蒲黃三錢滑石五錢甘草一錢爲細末熱水調送金華丸三五十九 太陽中熱者暍病也 中暑亦暍病也太熱中熱發熱惡寒身重反痛脉弦細訖遲小便洒洒然毛聳少

有勞忽然身熱口開齒燥此有三忌

忌發汗

忌溫針

忌大下

若犯此三忌則有三甚

發汗惡寒愈甚

濕針發熱愈甚

大下小便

淋甚

問弦細訖遲當用何藥答曰海藏黃芪湯主之

海藏黃耆湯

人參

黃耆

白朮

茯苓

芍藥

甘草

各等分

右咬咀每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去滓溫服

東垣李明之先生云如治風先浸防風二兩次煎餘藥與同例

蒼朮不以多少泔浸透刮去皮切作片子曬乾每服四兩水三大碗煎至二大盞去滓煎用下項藥

白朮

白茯苓

黃耆

白芍

右四味各等分細剉每服一兩以蒼朮水煎至一盞去滓溫服食遠可用若三焦氣弱中土不能營飲食心下痞內外三焦之氣絕也當先浸黃耆二兩水二碗煎至一碗再煎正藥黃耆湯一大服用接內外三焦元氣同東垣先生法

上浸蒼朮煎藥燥濕也下浸黃耆煎藥接氣也

易簡白朮湯

治小兒洩泄胃熱煩渴不問陰陽並宜服之

人參

白朮

木香

茯苓

甘草

黃耆

各兩

乾葛

二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞量大小與服仍用香連丸間之渴欲飲水者時時煎服任意飲之彌多彌佳白朮湯一方治嘔吐白朮人參各一兩半夏一兩半茯苓甘草乾薑各半兩薑煎服錢氏謂小兒吐瀉當溫補之每用理中丸以溫其

中五苓散以導其逆連進數服兼用四君子湯加陳皮調之若已虛損用金液丹雜以青州白丸子爲末米飲調服多服乃効若吐瀉之後發熱必作驚風二藥服之累有神効 若胃氣已生則旋減金液丹却以異功散等藥徐徐調之 若食不消脾胃虛寒嘔吐惡心者當服益黃散用陳皮半夏青皮訶子肉甘草各一分丁香一錢量大小煎服小兒暑月吐瀉其證不一宜詳審用之不可差謬

有伏暑者小便必不利且五苓散香茹散 有傷食者其吐并糞必酸臭氣宜服感應丸 有虛冷

者泄瀉必多宜以六神湯加附子服之用人參茯苓山藥白朮扁豆甘草等分薑棗煎服風證加天麻痢加罌粟殼 吐瀉初定當以天南星爲末每服加冬瓜子仁七粒煎服以防變癰 若瀉色青當用驚藥小兒之病與大人無異用藥亦同量力用之 惟風氣臍風夜啼重舌變蒸客忤驚癇解顛魘病疳氣不行數證錢氏方甚詳

消暑丹

半夏 一斤

茯苓 半斤

甘草 生半斤

右以醋五升煮半夏蓋醅乾薑汁作糊無見生水爲丸每服五十九丸熱水嚥下精意脩治用之極效 中暑爲患藥下卽甦 傷暑發熱頭疼服尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害 應是暑藥皆不及此 若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此

霍亂證夫嘔吐而利者霍亂也。三焦者水穀之道路。邪在上焦者則吐而不利。邪在下焦者則利而不

吐。邪在中焦則吐利。以飲食不節冷熱不調清

濁相干陰陽乖隔遂成霍亂。揮霍撩亂重也。吐利

而已輕也。霍亂吐瀉者風濕暍外至生冷硬內生

內外合而爲病。謂如風寒濕暑熱暍所傷各有先

後。食飲菜果各有多少。內外傳變各有輕重。以六

經脉併何經何藏以隨所應見治之。或表或下。或

和或收燥潤分利溫之屬浮弦實細遲緩宜求此

之謂也。外邪入裏傷於脾胃。上吐下利名爲霍亂

吐利止後見外證者只作外傷治之。外證不已復

傳於裏嘔利再作上下邪甚先吐利裏氣已虛傷寒再傳而又吐利是謂重虛故不可治而歿也先傷寒而為吐利既吐利而再傳傷寒傷寒卻傳吐利雖曰重虛前後亂經渾濁不已外則難解內則難溫藥餌難為功矣若飲冷過多或有所傷心下痞腹痛不能食或泄瀉不止若不嘔者化水丹嘔吐者半硫丸右二藥効後服五苓梅瓜等藥不復再飲也

化水丹

川芎

蛤粉

牡蠣粉

右為細末醋糊為丸

半硫丸

此丸古時用今時氣薄不用

硫黃

半夏

並依局方脩製服餌

三寶丹

治積冷暴瀉不止不嗜飲食

硫黃

半夏

牡蠣各等分

右為細末薑糊丸桐子大朱砂為衣生薑湯下二十九空心服此上三藥並有消暑之意

活人發斑諸藥

葛根橘皮湯 癩在肌

治冬温未即病、至春被積寒所折、不得發、至夏得熱、其寒解、冬温始發、肌中癩爛、癢疹如錦文、而欬心悶、但嘔吐清汁、服此藥即靜。

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃

甘草 各等分

右剉如麻豆大、每服五錢七水一盞、半煎去渣、温服。

陽毒身升麻湯癩在

治傷寒一二日變成陽毒、或服藥吐下之後變成

陽毒、腰背痛、煩悶不安、面赤狂言、或見鬼、或下利、脉浮大、數面赤、癩如錦文、咽喉痛、下膿血、五日可治、七日不可治。

升麻 二分

犀角

射干

黃芩

人參

甘草 各一兩

右剉如麻豆大、水三升、煎取一升半、去滓、飲一盞、頃刻再服、以衾覆手足、出汗則愈、不愈再服。

陽毒玄參升麻湯 癩在

治發汗吐下後毒不散表虛裏實熱發於外故身
癩癩如錦紋甚則煩燥譫語兼治咽閉腫痛

玄參 升麻 甘草 各等分

右剉每服五錢以水煎去滓溫服

陽毒梔子仁湯

治少陽陽明合病陽毒傷寒壯熱百節疼痛並宜
服之

升麻 黃芩 芍藥 石膏 知母

右剉末五錢 水一盞生薑五片豉百粒炙至六

分去粗溫服無時

四物解肌湯

芍藥 黃芩 升麻 葛根 等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服內傷

腹中有宿食不得大便而發熱當以食藥去其物

則可便後仍發熱者在表也亦宜解表此皆錢氏

朱氏升麻湯去甘草加黃芩尤妙

潔古老人涼膈散去大黃硝解六經中熱亦治小兒

癰欲發之則加防風荆芥二物尤妙 守真說涼

膈散亦妙大便結小便赤者宜用大小便已通者

不宜也 朱氏錢氏王氏所論皆平易老亦平守

真微涼南北之地法方宜不同也 折中湯液萬

世不易之法當以仲景為祖

金匱要略方

陽毒之為病面赤癰瘡如綿紋咽喉痛

此段後論

為病也面目青身痛如被杖咽喉痛 灸生與陽毒

同升麻驚甲湯並主之 此王朝奉治陰陽毒升麻

驚甲湯俱出 仲景祖法

千金方熱病後豌豆瘡黃連一物煮濃汁服 又好

青黛大如棗水服之差 又法木香一物煮濃汁

服

五物木香湯 治瘡 頰赤

青木香 二兩 丁香 一兩 薰陸香 白礬 各一兩 麝香

右吹咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

熱盛者加犀角一兩無則以升麻代之輕者去礬

大効

犀角大青湯

大青 三兩 梔子 四十 犀角

枚

右咬咀每服五錢入豉半合水一小盞半煎至一盞去滓服 初虞世云小兒瘡疹之候與傷寒溫疫相似疑似之間可先與解肌湯大人傷寒中風溫疫瘡子已發熱未退並可用解肌湯 小兒瘡疹出不快濃煎紫草汁服又牛蒡子炒熟為末同荆芥煎服

消毒犀角飲子 治

牛蒡子

荆芥

甘草

右麤末水煎服

錢氏消毒散

牛蒡子

荆芥

甘草

右麤末水煎服

王朝奉癰論

發癰者下之太早熱氣乘虛入胃故也下之太遲熱留胃中亦發癰或服熱藥過多亦發癰微者赤癰出五疔一生劇者黑癰出十疔一生也皆當用白虎人參湯一名化癰湯及阿膠大青湯孫兆云兼

與紫雪大妙可下者。用調胃承氣湯。暑月病陽重。常宜體後見微癰。當急治之。

阿膠大青湯

大青

兩四

甘草

兩二

右爲龕末每服四錢水一盞半入豉半合煎至一盞去粗入炙過阿膠二片再至膠消服。華佗方。又主熱病不解下利篤困者。又主傷寒熱病十餘日以上發汗吐下後熱不除利不止癰出黃疸皆可療之神効。

王朝奉議論并方

陰陽毒不可以常法治之。金匱云陽毒之爲病面赤癰癰如綿紋咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治。陰毒之爲病面目青身疼如被杖咽喉痛。炊生與陽毒同升麻鱉甲湯並主之。千金陽毒湯治傷寒一二月變成陽毒或服藥吐下後變成陽毒身重腰脊背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下利其脉浮大面赤癰癰如錦紋咽喉痛吐膿血者五日可治七日不可治。且升麻湯。陰毒湯。

治傷寒初病一二日變成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊數仲景云此陰毒之候身如被杖五六日可治七日不可治也方一百七甘草湯

又陰疽湯治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩者

陰陽毒升麻驚甲湯

升麻

當歸

甘草各二兩

蜀椒

去汗一兩

驚甲各

雄黃半兩研

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

肘後千金陽疽用升麻無驚甲有桂陰毒用甘草

無雄黃

陽毒升麻湯 此二藥與活人特異當有別議

升麻

半兩

當歸

蜀椒

雄黃

桂

各一兩

右每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服覆手

足取汗得吐亦佳

陰毒甘草湯

甘草

升麻 各半兩

當歸

蜀椒

蠶甲 一兩

右每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服不一丹

作 王朝奉陰陽二毒升麻等湯俱出金匱議論與活人同活陽毒升麻等湯特異用者當擇

陽疽湯 二疔方皆出活人大同小異

桂枝湯加黃芩二兩餘同本方加減法 自汗者

去桂加附子一枚 渴者去桂加栝萸根三兩

利者去芍藥加乾薑三兩附子一枚炮 心下悸

者去芍藥加茯苓四兩 虛勞裏急正陽疽湯主

之 若脉浮緊者不可與之

陰疽湯

芍藥 甘草 各二兩 乾薑 黃芩 各三兩 桂 四兩

右每服五錢水二盞半煎至一盞去滓服

治傷寒肢節疼內寒外熱虛煩者

甘草湯治咽痛陰陽毒未散甘草一味五錢水一盞

煎去滓服

沉香連翹散 治一切腫毒疼痛欲效者立止

青木香

沉香

升麻

麝香

乳香

丁香

獨活

桑寄生

連翹

木通

已上各一兩

川大黃

煨五兩

右爲麤末每服三錢水二盞煎至一盞空心熱服半日以上未利再服本方有竹瀝芒硝斟酌處實用之

內化丹

治腦背瘡疽初覺腫硬未有頭腦并諸腫不消始覺便服此藥微利數行其腫免致出膿

南乳香

半兩

沒藥

半兩

澤烏

大者水浸一夕炮去皮臍半兩

海浮石

臨濟七次半兩

巴豆

四十九粒去皮不出油

右爲細末將烏頭末餘藥和研勻以浮石醋打麵糊丸如桐子大量虛實加減空心五七丸溫酒下忌熱物

奪命丹

治惡瘡腦疽發背

大黃

切作塊大砂器內盛之攪丸九八十一篇如此飛過一兩

牡蠣

一兩

生薑

兩

沒藥

乳香

各一錢

右爲麤末轉作丸子用好酒一升木炭火熬一沸耗三分用碗盛之夜露一宿早晨去滓空心服之

不可亂傳

治發背瘡方

蒼耳子炒黃擦去其刺再炒深黃不見風碾細末
每服五錢好熱酒調服食前臨卧

一則用大黃牡蠣二則用蒼耳則知有內外之不同也
前有奪命丹二藥表裏不同何以然乃膏梁之變脉沉而滑地之濕氣害人皮肉筋脉脉浮而滑所以有泄之發之之異也灸法一同與前内托散論議相通

大補十全散

參芪木茯苓 芍地桂歸川 三五錢秤用

生薑棗水煎 婦人虛弱用 名美號十全

治婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損
時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃
脚膝無力一切病後氣不和失精憂愁思慮傷動
血氣喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並皆治之
此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒志止渴順
正辟邪溫暖

川芎

官桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

人參

白朮

茯苓

熟地各等分

右鹿末每服二大盞水一盞生薑三片棗二枚同煎至七分無時溫服參朮茯苓甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其血氣俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散 保命救生丹出十全例

△內托散此方在補虛明

當官人芷桔

芎耆草厚風

可治膏梁變

補托有神功

本方註云未發者消散已發者早膿兼治時氣服者當求脉之源若其人本虛脉虛宜用此若脉不虛不宜用此反此則害人多矣經云地之濕氣感則害人皮肉筋脉而生疽者宜此藥托之右膏梁之變饒生大疔者不宜用之宜以羌活連翹大黃生地黃湯下之榮氣不從逆於腠理乃生癰腫榮逆血鬱鬱則熱聚為腫正理論曰熱之為過則為

癰腫榮氣不從安有不熱者乎答曰膏粱之變芳草之美金石之過氣血太盛榮衛之氣充滿而遏不能行故閉塞血氣腐而爲癰也當泄之以奪盛熱之氣若其人飲食踈精神衰氣血弱肌肉消薄榮衛之氣促短而滯滯故寒薄腠理閉鬱而爲癰腫也當補之以接虛怯之氣亦當以脉之浮沉別之既得盛衰之異泄之則連翹大黃補之則內托散之類是也故經云膏粱之變饒生大疔陷脉爲癰留連肉腠此之謂歟瘡瘍自外而入者不

宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經云陷者灸之灸而不痛痛而後止其灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛而次及其將潰所以不痛也聖惠治腦疽發背用陽明藥如犀角麻黃石膏之類以其變在手太陰發渴或相火在中故不用太陽藥只用陽明也海藏黃耆湯與四物湯相合亦名托裏湯也內加桂沙參尤佳以

其氣血齊補也。

易簡胃風湯

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 桂 當歸

芍藥 白朮 各等分

右咬咀每服二錢水一大盞粟百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心食前小兒量力減之此方加熟地黃者甘草等分足為十味名十補湯大治虛勞

嗽加五味子 有痰者加半夏 發熱加柴胡

有汗加牡蠣 虛寒加附子 寒甚加乾薑

皆依本方等分此須脾胃壯者可服稍不喜食則

不可用往往今人只依脾胃虛停積痰飲便為勞治

才服此等藥愈傷胃氣至於不効者比比皆是不

可不知也 若骨蒸發熱飲食自若者用大補湯

柴胡各二兩分作十服之 人參治氣短茯苓小

便不利川芎脉瀦弦官桂惡寒當歸脉瀦白芍藥

腹痛白朮胃熱濕盛先便後血者血在上也便血

不喜食。恐傷食也。傷食用補。反增其病。

相襍者血在中也。先血後便者血在下也。

潔古云防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使血瘀色紫者陳血也熟地黃血鮮色紅者新血也生地黃寒熱者加柴胡肌熱者加地骨皮此證乃甲欺戊也風在胃口上濕泄不止濕既去盡而反生燥庚欺甲也本無金氣以其甲勝戊虧庚爲母復讐也故經曰亢則害承乃制是反制勝已之化也若脉洪實痛勝者加酒浸大黃人參芍藥桂川芎當歸白朮茯苓七味爲籠末薑煎服

之主胃風

人參黃耆甘草三物湯

治瘡瘍發渴

黃耆甘草二物湯治膚痛內加防已爲防已黃耆湯十全散減黃耆甘草熟地黃卽胃風湯也內經有結陰便血一條初結一升再結二升三結三升

芍藥甘草例

仲景芍藥甘草湯

白芍藥

四兩

甘草

芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以收之甘以

緩之酸甘相合同補陰血右二味㕮咀水三升煮取一升半去滓溫服

甘草乾薑湯

內經曰辛甘發散為湯
甘草乾薑以復陽氣

甘草

灸四兩

乾薑

炮二兩

右㕮咀如前煎服之

四逆湯

甘草

乾薑

附子

右三味依法煎服

芍藥甘草附子湯

芍藥甘草黃芩湯

甘草一物湯

傷寒類要又甘草一物湯

治傷寒脉代見心悸動危困者

甘草二兩水三升煮取一升半服七合日二亦治

肺癰

仲景灸甘草湯

治傷寒脉結代心悸動此湯主之屬太陽證也

甘草

生薑

人參

桂枝

大棗

麻仁

生地

麥門

阿膠

麩炒熟
各等分

右咬咀每服用五錢水一盞半酒一盞煎至八分去滓入膠盡服

東垣先生芍藥甘草例

芍藥二甘草一湯 脉弦加防風川芎脉洪加黃芩脉緩加桂枝脉滿加當歸脉遲加乾薑大便軟加白朮小便濇加茯苓 襍病痛服諸藥不効神應丸

桂苓例

桂苓丸

烏梅肉一兩 桂半兩 茯苓二兩

右焙梅乾桂苓皆忌見火三味同爲極細末煉蜜丸如雞頭子大每服十丸細嚼白湯送下津嚥亦可

荔枝煎

烏梅肉焙乾一兩 乾木瓜半兩 神麴七錢微炒

白茯苓七錢 豆粉一兩生用 桂去浮皮淨秤半兩

右麴粉別爲細末餘四味碾極細後入麴粉和勻煉蜜作挺每挺一兩可作十九津化下草豆蔻御

方思食丸同

千里漿一名水葫蘆

並見集古

木瓜

半兩

紫蘇葉

桂去皮各半兩

烏梅肉

赤茯苓

各一兩

右為細末煉蜜丸彈子大每服一九細嚼津化新

汲水亦得

烏梅散

治下痢津液少大渴引飲不休

烏梅

焙半兩

茯苓

法去皮

木瓜

一兩

法加桂三錢

右咬咀每服五錢七升一盞生薑三片煎至七分

去滓服

紫蘇湯

治煩悶口乾多渴咽膈不利手足煩熱

紫蘇葉

三兩

甘草

五兩

烏梅肉

四兩

杏仁

一兩去皮尖

右為細末每服三錢湯點服

大順散

此法出桂枝乾薑甘草例

桂

乾薑

炮各八分

甘草

炙六兩

杏仁

八兩

桂苓白朮丸

五苓散內去猪苓加薑硝半夏陳皮糊丸又加黃

連黃藥為堅中丸

又千里漿

麥門冬

紫蘇葉

木瓜

甘草

炙

白茯苓

烏梅肉

杏仁

去皮尖
各半兩

川百藥煎

一兩

右為細末酒糊為丸如櫻桃大噲化一法去牽牛

蜜丸噲固劑一九噲之亦名水葫蘆

又方

百藥煎

烏梅

紫蘇

人參

甘草

麥門冬

右各等分為末熱湯點服

荔枝湯

烏梅

甘草

各三兩

白芷

半兩

百藥煎

二兩

白檀

二錢半

右為末點服

梅葛散

百藥煎

烏梅肉

甘草

各一兩

丁香

右細末點服

桂漿出一斗料例

桂

三兩去浮皮

白茯苓

去皮三兩

麥門冬

半兩

神麴

半兩

右四味爲細末蜜三斤熟水一斗一法加烏梅

蜜酒

好蜜

二斤

水

一碗

細麴

二升

好乾酵

二兩

右先熬蜜水去華沫令絕冷下酵每日三攪三日

熟

神木湯拾遺

神木加藁本湯

神木木香湯

通治霧露之氣

菩薩散

治眼

是神木湯內加荆芥白蒺藜細末盪湯點眼酒亦可

可

仲景烏梅丸

治傷寒嘔吐後又用治下利

烏梅

三百二十箇

細辛

半兩

乾薑

二兩半

黃連

四兩

當歸

一兩

附子

二兩桂枝一兩

人參

二兩

黃蘗

二兩

右將烏梅好醋浸一宿去核蒸之五斗米下飯熟

杵成泥和藥令相得白中與蜜杵二千下丸如桐

子大食前飲下十九日二服加二十九分兩隨證

主治加減

此方當在厥陰條

錢氏芍藥藥皮丸

芍藥

黃蘗

守真藥皮丸

芍藥

黃蘗

黃連

當歸

四信散

黃連

黃蘗

芍藥

乾薑

孫用和治血痢以膩粉五錢定粉二錢同研勺水浸

蒸餅爲丸菘豆大每服七丸或十九丸艾十枝水一

大盞煎湯下湯多尤佳

古方駐車丸

黃連

六兩

乾薑

當歸

阿膠

各三兩

右以上三味搗篩以三年米醋煮阿膠令消和藥
衆手撚丸梧子大每服三十九丸飲下日三如無三
年醋只用醎醋

藥皮湯

治久血甚驗

藥皮

黃芩

各二兩

右咬咀每服四五錢水二盞煎至一盞去滓入阿

膠三片再煎膠散服腹痛甚者加梔子一兩小便不利者加茯苓六錢

活人黃連阿膠湯

治熱毒入胃下痢膿血

梔子

黃連

黃蘗

右呔咀依法煎服

活人三黃熟艾湯

治傷寒三四日大熱下利熱藥不能止

黃芩

黃連

黃蘗

熟艾

海藏云以上苦寒之藥元病不經內傷冷物者宜服

亦當察人之虛實及以脉別之

經曰脾脉外鼓沉爲腸澼久不已外鼓謂動於臂外也肝脉小緩爲腸澼易治肝脉小緩爲乘肝故易治腎脉小搏沉爲腸澼下血小爲陰氣不足搏爲陽氣乘之熱在下故下血也血溫身熱者或然血溫身熱陰氣喪亂故或心肝澼亦下血肝臟血心養血故澼皆下血也右二臟同病者可治心火肝木火相生故可治其脉小沉瀯爲腸澼心肝脉小而沉瀯者澼其身熱者是火氣內

絕去心而歸於外也。故灰火成數七，故七日灰。

仲景治痢紫參湯

紫參斤半 甘草二兩

右以水五升，煮紫參取汁二升，入甘草再煎去一分，分作三服，放溫服之。

扁鵲云：若衄血吐血，脉當沉細。若反浮大而牢者，死。叔和云：衄血吐血，沉細宜，忽然浮大，命傾危。經云：泄脫血而脉實，若遇於此，皆曰難治。又云：血溫身熱者，灰。

黃連加減例當在手少陰經下以其利在腸胃故列於此

加豆蔻木香為豆蔻香連丸 加陳皮為栢連丸

加訶子木香為小香連丸

黃連 加黃蘗為二聖丸 加木香白附子為白附香連丸 加榆仁為榆仁丸 加阿膠茯苓

為阿膠丸 加阿膠乾薑當歸為駢車丸

牛蒡子根散國醫孫用和傳

治汗不流古方罕言之。此是汗出時，蓋覆不週，汗出不勻，以致腰背手足攣搐。

牛蒡根

二十條

麻黃

二兩

牛膝

二兩

天南星

二兩

地龍

二兩

右牛蒡根去皮切并諸藥入砂盆內研細好酒一升同研爛新布取汁後用炭火燒一地坑子內通紅去炭掃盡藥汁內坑中再以火燒黑色將出於乳鉢內細研每服半錢溫酒調下日三服用和親患三年服之効

玄胡丸

海藏訂解利傷寒丸藥雜例並本方注後

玄胡

當歸

青皮

陳皮

三稜

廣茂

木香

乾薑

另研為細末各半兩

雄黃

二錢研粉入薑末同研

右醋糊丸桐子大每服三二十九白湯下解利內

外傷詩曰

玄歸三廣木

青陳薑與黃

醋糊丸桐大

偏宜內外傷

紫霜丸

治傷寒溫壯內夾冷實或已得汗身熱不除及變蒸發熱日久不解因食成痢俗呼為食迷風

代赭石

火燒醋淬

赤石脂

右未各一兩

巴豆

三十箇去皮臍炒研

杏仁

五十箇去皮尖麵炒另研

右用研勻湯浸蒸餅為丸黃米大小兒初生三十日以外可服一丸半歲一年二年可用三丸乳下米湯亦得

無名丸

解內外與四生例相似在半夏例條下

貫衆

茯苓

代赭石

各一兩醋淬

自然銅

三兩三錢醋淬九遍

寒水石

燒灰粉四兩

黑豆

去皮研細四兩

右件為細末小麥麵為丸菉豆大生薑湯送下

五十九

此藥不知來例別無解例味數止是貫衆治頭風有毒解毒大抵解疫癘毒氣則效非若古法之分經也 本草云代赭石苦甘寒主鬼疰賊風

自然銅辛平無毒療折傷散血主痛 貫衆治頭

風 半夏治傷寒寒熱巴豆辛溫主傷寒溫瘧寒

熱鼓前亦解利 此三藥雖云治傷寒止治因內

感而發出之外多效若外感一日太陽受之不宜

用此不知藥性者不可執此解利外感此藥大抵
止治內不能行經若欲行經非湯液不能也 代
赭石自然銅二味兼以醋淬煅以苦酒與火力同
能上行故解利也 若以代赭自然二石以性論
下行之體無疑更當詳紫霜丸主治傷寒溫壯內
夾冷實一句只知無名體也

天麻朱砂丸

治內
外傷

天麻

一兩

雄黃

半兩

朱砂

二錢

巴豆

去皮膜油半

兩約二百粒

右為細末蠟和作錠子旋丸如黍米大每服三五

丸溫酒白湯送下俱得食後 玄胡丸內有雄黃

乾薑苦酒與此一體 本草云雄黃味甘治百節

中大風所以解利

安先生傳易老解利二藥

狼毒

大戟

草烏頭

生用各
等分

右為細末醋糊丸桐子大每服五七丸或十九丸溫

水下

解利傷寒喘藥

乾山藥

藜蘆

連鬚
一錢

右爲細末紙燃啗之

楊氏內解丸

芫華

紅藥各等分

右爲細末生用醋糊丸如菘豆大溫水下一丸少頃以葱醋米湯投之無時

四生丸

天南星

半夏

芫華

自然銅

各等分

右爲細末醋打蕎麥麩爲丸菘豆大酒積痰飲

胞脹腹滿食飲不消五丸臨卧溫水下忌熱物

傷寒時疾豆豉湯下十五丸三服解心氣大痛溫

醋湯下



趙州教授進之王好古鑿以

明監察御史東萊桂亭蔡才僉梓

兩淮運同泗明齋本峻重刊

兩淮運副姚江嚴昌世校正

陽明證 先足經從湯液 次手經從襍例

仲景白虎湯

治身熱頭痛鼻乾不得臥尺寸脉俱浮而長又治
傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒非寒冷之寒寒邪
之寒熱也

石膏四錢

甘草半錢

知母半錢

粳米一

右麤末每服五錢七水一盞半米熟去滓溫服

白虎加人參湯治動而傷暑大渴

白虎加蒼朮湯治靜而傷暑不渴

白虎加桂湯治中暑自汗微惡寒

白虎加梔子湯治小便淋而煩

白虎加五味湯治嗽而必津液

芩葉石膏湯

治傷寒解後虛羸少氣逆欲吐

石膏二錢

人參半錢

粳米百粒

半夏二錢半

甘草一

竹葉五片

麥門冬一錢

右為麤末每服五錢七水一盞煎至米熟溫服

張仲景灸甘草湯本方在太陽門傷寒類要甘草一物湯後

此本太陽證當例於太陽條下胞者肺之府也故

入陽明例

活人五味子湯治傷寒端促脈伏而厥

人參三錢半

五味子兩半

陳皮二錢半
去白

氣足則便不
頻數

杏仁

二錢半

生薑

二錢半

棗

三枚

麥門冬

去心二錢半

右剉如麻豆大水二盞半煎至一盞去滓分二服

熬猪肚湯 益氣之源以消陰翳則便溺有節

羊肉冬瓜湯 膏癰飲水洩多 腎氣丸

胃熱消穀善食而瘦 地黃丸

消渴手太陽不止消中足陽明 消腎足少陰瘰成

消中而數少便 肉化丹 麥門冬湯

易老順氣散小承氣湯也 鳳髓丹 化水丹

此水之主以制陽光則渴飲不思

腎壯則渴不思飲

仲景諸瀉心等湯 手少陰也以其心下痞故入陽

明例又况服梔子黃芩黃連黃蘗大黃為上經之

劑安得不例陽明乎

大黃黃連瀉心湯

治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞

表裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加燒針

因胞煩面青黃膚瞶者難治若色微黃手足温者

易愈心下痞按之濡其脉關上浮者

大黃

二兩

黃連

一兩

加黃芩為伊尹三黃湯

右二味剉如麻豆沸湯二升漬之須臾絞去滓分

温再服

附子瀉心湯

治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與

瀉心湯痞不解其人瀉而口燥煩小便不利者五

苓散主之

大黃

黃連

黃芩

附子

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噎食

臭脅下水氣腹內雷鳴下利者此湯主之

生薑二兩

甘草

黃芩

人參各一兩半

半夏三兩

乾薑半兩

黃連半兩

棗六枚

右八味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半

温服半升

易老門冬飲子一名生脉散

治老弱虛人太渴

人參二錢

五味子半兩

麥門冬去心半兩

枸杞三錢

甘草三錢

白茯苓二錢

去皮

右咬咀生薑水煎此藥與內化丹相表裏手太陰

治肺腎二經方也

足少陰子母上下經也

王朝奉錄千金方 此方本意出竹葉石膏湯例以
此知仲景群方之祖也 治勞復能起死人氣欲
絕者煮之有效用麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬

兩

甘草

炙二兩

粳米

半合

右麥門冬去心爲細末水二盞煎粳米令熟去米
約得湯一小盞半入藥五錢七棗二枚去核新竹
葉十五片同煎至一盞去滓大溫服不能服者綿

滴口中

後人治小兒不能灌去者宜用之綿滴

法此方不用石膏以其三焦無大熱也兼自欲死
之人陽氣將絕也故不用石膏若加人參尤妙

玉露散

寒水石

半兩

石膏

半兩

甘草

二錢半
生半炙

右爲細末湯調服

外臺蒸病一曰骨蒸二曰脉蒸三曰皮蒸四曰肉蒸
五曰內蒸各隨藏主又二十三蒸各應見湯液主
之盡矣 五曰內蒸所以言內者必外寒熱把手

附骨而熱也其根在五臟六腑之中心

因病後得之骨肉自消飲食無味或皮毛燥而無光
澤蒸極之時四肢漸細足腫趺起石膏十兩碾如
乳粉法水和服方寸七日再以體涼爲度
類要治膏癰飲少小便多

秦椒

一分
出

瓜蒂

二分
末

右水調服方寸七日三服此方服之令人多吐宜
約量多少不可太過一升分三

伊尹甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀
不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得安
醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結
熱但以胃中虛客氣上逆故便硬也宜此湯王之

甘草

二兩

半夏

一兩

黃芩

乾薑

各三兩半

黃連

半兩

人參

半兩

棗

六枚

右七味以水五升煮取三升去滓再煎取一升半
溫服半升分三 伊尹湯液此湯也七味今監本
無人參脫落之也伊尹三黃湯無黃芩亦後人脫

落之也

半夏瀉心湯

治下利而不痛者為痞也痛即為結胞

半夏

一兩一錢半

黃芩

人參

甘草

炙兩半

乾薑

一兩半

黃連

兩半

大棗

六枚

右水五升煮取三升去滓再煎一升半溫服半升

分三

錢氏瀉心湯一物

易老亦用一物瀉心湯導赤散

瀉心

瀉心湯瀉心

導赤散

生地黃

木通

甘草

竹葉

等分

右咬咀水煎去滓服一法去甘草加黃芩為火府

用煉蜜為丸彈子大細嚼竹葉湯下

一物瀉心湯

張子脩先生為泄斑湯其法見斑論改誤

伊尹三黃湯錢氏改為丸治吐血黃疸

活人黃連解毒湯四味無大黃亦得與四物湯相

合為各半湯 守真為既濟解毒丸

活人解毒四味 海藏加防風連翹爲五黃丸亦
合防風金華丸治風熱 加柴胡治小兒潮熱
加葛根治酒毒加蘆薈青黛爲衣治小兒肝熱并
痞熱食塗上脚面黃腹大而足細久則不治

仲景茵陳蒿大黃湯

治濕熱發黃

茵陳蒿

六大黃

三梔子

梔子蘗皮湯二物

治燥熱發黃

文潞公藥準

仲景茵陳蒿大黃湯治發黃大便自利不止者加黃
連黃栢各三兩今加大黃用之多効 梔子蘗皮
湯加大黃黃連活人合而用之改名解毒湯仲景
本方無黃芩今議方復有黃芩 活人用之伊尹
湯液大黃黃芩并脫落之也 文潞公連蘗二物
湯治黃有神寒熱者加小柴胡湯

李思訓論義

發黃有陰陽然當猶爲未也 陽者大渴而不與水

炎熱而不通風是也。云陽黃有鮮之原藥過劑施之而遂冠陽和既言此二句當時本無陰候。言黃證皆陽壞而成陰。不必直指有陰證。故治黃茵陳蒿爲君。佐以大黃。梔子之屬是也。若太陰有黃不必茵陳蒿。內用乾薑。只用理中溫藥足矣。既有茵陳蒿乾薑湯。則知熱證壞而成陰也。學者要窮其源。故大病主藥內加熱以溫之也。謂如桂枝加芍藥。桂枝加大黃。皆於本藥外所可宜者加之也。大黃黃連瀉心湯。文潞公金匱要略爲三黃

丸錢氏改爲三黃湯去黃芩爲二聖丸二味等分細末猪膽湯者煎如菉豆大每服十九丸米飲下。

香連丸治泄利。橘連丸疳瘦臍煮粟米粥爲丸。襍病發黃脾虛也黃久不去者有積也補脾磨積則不可用涼瀉之藥。

活人酒煮黃連丸

治暑毒伏深久不瘥無藥可治大渴者宜此右黃連四兩無灰酒浸上一寸以重湯熬乾碾爲細末糊丸菉豆大熱水下三十丸胞中清涼不渴爲愈。

水菘

肘後治黃疸醫所不能治水菘汁頓飲一小升
平旦服食後須微汗小便出愈不爾再服

紅丸子

治大人脾積氣滯胞膈滿悶面黃腹脹四肢無力
酒積不食乾嘔不止脾連心胞及兩乳痛婦人脾
血積氣諸般血癥氣及小兒食積骨瘦面黃肚
脹氣急不嗜飲食漸或脾勞不拘老少並宜服之

京三稜

三斤水浸令
軟切作片字

蓬莪朮

五斤

陳皮

五斤
棟

胡椒

三斤

青皮

五斤

乾薑

三斤

右六味同為細末醋糊為丸桐子大

紅為衣每

服三十九丸食後薑湯吞下小兒臨時加減服之

易簡紅丸子

脩合治劑之
法並見前方

三稜

蓬朮

陳皮

青皮

胡椒

乾薑

阿魏

礬紅

右每服六十九薑湯送下大治大人小兒脾胃等

患用極有神効 但三稜蓬朮本能破癥消癖其

性猛烈人不以此為常服之劑然今之所用者以

出產之處隔絕二藥不得其具乃以紅蒲根之類

代之性雖相近而功力不同年老虛人小兒妊婦以其治病不能傷耗真氣但服之無疑 此藥須

是脩合令精細用好米醋煮陳米粉爲丸若自修合之時當去阿魏礬紅名小橘皮煎尋常飲食所

傷中脘痞滿服之應手而愈 大病之後穀食難

化及治中脘停酸並用薑湯下 脾寒瘧疾生薑

橘皮湯下 酒疸穀疸遍身皆黃大麥湯下 兩

脇引乳作痛沉香湯下 脾食積面黃腹脹時或

乾嘔煨薑湯下 婦人脾血作痛及血癥氣癥並

經血不調或過而不來並用醋湯下 寒熱往來

者尤宜服之 產後狀如癰痛者此乃敗血上攻

迷亂心神所致當以此藥用熱醋湯下其効尤速

男子婦人有癰瘤之患者未必皆由心經蓄熱

者亦因脾氣不舒遂致痰飲上迷心竅故成斯疾

若服涼藥過多則昏亂益甚當以此藥用辰砂爲

衣以橘皮煎湯下名小鎮心丸婦人惡吐嘔逆全

不納食諸藥不効惟此最妙仍佐以二陳湯服之

疑其墮胎必不信服每每易名用之特有奇功然

恐妊婦服之後偶爾傷動必歸咎於此藥故不敢
極言其妙 痰迷者紅丸子 心熱者妙香丸
小便不利煩燥喘渴加茯苓猪苓滑石當歸官桂
燥煩喘嘔不渴加陳皮白朮半夏生薑茯苓
四肢遍身冷加附子甘草

茵陳蒿治肢體逆冷腰上自汗加

附子

乾薑

甘草

茵陳附子湯未已其脉上加 吳茱萸 附子

乾薑

木通

當歸

韓氏立名雖曰茵陳茯苓湯茵陳橘皮湯小茵陳湯
茵陳四逆湯茵陳附子湯茵陳茱萸湯大抵只是
仲景治陰證加茵陳也用者要當識之此證言是
溫熱與寒濕故入陽明例謂關天五之氣也

丹砂丸 勞復後目中
及偏身黃

丹砂

馬牙硝

麥門冬

犀角

牛黃

金箔

右治下後不任承氣者宜丹砂丸膩粉一錢下之
用砂糖輕粉新汲水調下煩燥病源云陰少陽勝

也陰病亦有煩燥病 少陰病吐利煩燥四逆者
死 結胞證有煩燥者死 大青龍亦有煩燥而
燥也 金匱竹皮大丸主虛煩佳 又茯苓散猪
苓湯並主煩燥 少陰病吐利手足逆冷煩燥茯苓
苓四逆湯 發汗吐下後復煩燥不解者茯苓四
逆湯 少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者吳茱
萸湯 又八正散治煩燥佳

仲景梔子豉湯

治懊澀煩燥不得眠

梔子四箇

豉半兩

右水二盞煎梔子至一盞入豉煎至七分溫服得
快止後服 一法加甘草三錢半本非吐藥以燥
濕鬱甚以此攻之不能開通則反吐因吐則發泄
鬱結之氣及行津液而血氣宣行若少氣加甘草
以其邪在上焦而不受藥故吐之 梔子甘草豉
湯 嘔者加生薑三錢

梔子厚朴湯

治傷寒下後心腹脹滿起卧不安

梔子四兩

厚朴一兩

枳實一枚

生薑

水煎

梔子乾薑湯

治陰黃傷寒醫以丸散下之身熱不去微煩

梔子四枚

乾薑兩

右水煎服

已上五法皆汗下吐後用之以邪氣陷於胞中居
最高之分故隨證加減用之經曰其高者因而越
之

活人薤白湯治下利如爛汁

梔子

豉

薤白

右劉先煮梔子次下薤白次豉水三升煮取一升

涼膈散 此藥陽明兼少陽氣中之血藥

梔子

大黃

芒硝

黃芩

薄荷各半兩

桔梗

甘草各一兩

連翹七錢半

右咬咀每服五七錢水煎服臨臥時服加生薑亦

可若泄之劑引并下行居膈中鐵澱江非舟楫不能載

此藥大槩治左寸沉實而可下者本方無桔梗一

法加防風 治肺金邪熱嗽有痰者加半夏 易

老減大黃硝解傷寒雜病六經中熱涼膈與四物

湯各半服能益血泄熱一名雙和散

文潞公藥準註李婉方

山梔子 防風 連翹 柴胡 甘草

活人梔子連翹防風甘草湯兼少陽 錢氏去連翹

加藿香石膏為瀉黃散 內經云諸氣憤鬱皆屬

肺金凡人有此疾不可不用薄荷故劉禹錫用此

藥以治憤氣發腫利關節也 易老涼膈散去大

黃硝治六經中熱說得極有理何以知陳士良云

柴胡能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季

宜服 又云柴胡主風氣壅併攻胞膈當茶食之

以此知易老之言有自來矣

薄荷例

此藥手太陰兼厥陰故人陽明例

薄荷例

主春并見局方今用御藥院料例

薄荷葉 斤半

甘草 兩一

防風 錢三

縮砂仁 錢三

桔梗 兩一

芎 錢七

御藥院蜜料藥一斤蜜三斤煨開便和 去砂仁

加薑薤活荆芥甘菊大黃白芷人參為八風丹朱

砂為衣

局方川芎丸

即名不換金另有加減在後

川芎 錢七

細辛 錢半

防風 錢二

薄荷七錢半

桔梗一兩

甘草

右細末煉蜜丸一兩半分作五十九嚙一丸茶清

下食後 一法川芎丸如枳殼除熱痰嗽 去桔

梗加荆芥白殭蚕天麻羌活白附子川烏頭全蝎

名為不換金丹硃砂為衣

防風丸

防風

川芎

甘草

天麻已上各二兩

右為細末煉蜜丸硃砂為衣荆芥湯茶酒任下每

服作十九

生明丸

薄荷葉

川芎各七錢半

硝砂仁

甘菊華各半兩

右為細末蜜丸每兩十九

二白丸 海藏法治虛人 禁涼藥

白檀

白芷

人參

川芎

白茯苓

防風各三錢

藿香一兩

桔梗半兩

細辛

砂仁三錢

甘草三錢

薄荷葉一兩

右為細末蜜丸彈子大嚙一丸茶清下

枳殼丸

薄荷煎加蒼朮木賊甘菊枳殼荆芥

薄荷湯治風壅痰涎
精神不爽

薄荷

一兩
二錢

甘草

七錢
半

瓜蒌根

一錢
二分

荆芥

半兩

砂仁

半兩

鹽

炒四錢
八分

右細末每服一錢點服

清神散

薄荷葉

三兩

白檀

二兩

人參

一兩

荆芥穗

二兩

甘草

二兩

石膏

四兩
飛過

細辛根

五錢

羌活

一兩

防風

一兩

右細末每二錢點服

上清散

乾菊

一兩

細辛

三錢

川芎

薄荷

石膏

甘草

防風

羌活

各一兩

荆芥穗

一兩

右細末茶湯調下

香甲散

川芎

青皮

白檀

乾菊

甘草

右為細末茶調下

消風散

主治修製
并見局方

川芎

羌活

人參

茯苓

荆芥

藿香

防風

甘草

僵蚕炒

蟬殼各半兩

厚朴製

陳皮洗炒各錢三分

右為細末茶酒任下治沐浴感風寒小兒用乳香

荆芥湯調下半錢無時

神芎散

治偏正頭痛夾腦風沐浴傷風等證脫着同此

甘草半兩

薄荷

石膏

羌活

獨活

甘菊

荆芥

川芎各一兩

右細末茶清下如覺頭風兩角痛客主人是也俗

呼為之太陽穴

又點鼻方

人中白

地龍去土等分

右為細末羊胆丸芥子大用一丸新水化開點鼻

中立止

化風散

治痰厥偏正頭
痛一切傷風

荆芥

甘草各三兩

石羔四兩

薄荷

人參 羌活 細辛 防風 白檀各一兩

右水清茶調下

化風丹 太陽陽明合病

防風斤半 羌活四兩 白芷四兩 桂一兩

麻黃三兩 川芎二兩 川烏炒三兩 藁本一兩

乾薑炮一兩 甘草炙三兩 皂莢去皮子一兩

右為細末酒浸蒸餅為丸鷄頭子大嚼二丸茶酒

任下

三陽頭痛

羌活 防風 荊芥 升麻

葛根 石膏 柴胡 川芎

芍藥 細辛 白芷 蔥白

若陰證頭痛只用溫中藥足矣如理中薑附之數

本草註 桃華湯 赤石脂例當在手陽明條下

仲景桃華湯 治傷寒下利不止便膿血治證文並見本經

赤石脂 一斤半一斗全用一半米用 乾薑一兩 粳米半

右以水七升煮米熟為度去滓每服七合內石脂

末方寸七日三愈後止再服不必盡劑

烏頭赤石脂丸

生心痛 微背者

烏頭炮一錢

附子二分

炮

赤石脂

乾薑

蜀椒

各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大先服一丸不知稍增

桃華丸亦治婦人崩中漏下下痢膿血桃華湯 純

下血梔子蘘皮湯 治大冷洞利腹滑下赤白腹

痛駐車丸 孫用和治下利又血執痛蘘皮湯

若尿血可延胡索散

古方駐車丸

黃連

乾薑

當歸

阿膠

右先以醋煮膠令消入前三藥和均衆手丸桐子

大米飲下三十九

古方三黃湯後人以為蘘皮湯

黃連

黃芩

黃蘗

每服四五錢水一盞半煎至一盞去滓阿膠二斤

煎化服之 痛者加蘘子 小便不利加茯苓兼

久血利甚効

延胡索散

治尿血

延胡索

兩一

朴硝

分三

右以水煎服之

東垣二紅丸

治小腸下利夜多晝少左手寸脈弦細此從內至
壬下補丹田四肢厥冷手足心反溫是為効也

硃砂

兩

附子

乾薑

赤石脂

各二錢

右細末酒糊丸桐子大米湯下少時以物壓之急
劑不可緩也

東垣三白丸

乾薑

兩一

白石脂

寒水石

龍骨

燒各半兩

右細末生薑自然汁打糊為丸桐子大米湯下少
時以物壓之 以上六味藥東垣先生製藥性云
白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

東垣調氣方

治赤白痢黃連膠蠟者散 並見本草 宋玉徽桃飴贊云

阿膠續氣 並見阿膠條下

白石脂

乾薑 等分

右百沸湯和麪為丸搜和併手桐子大曬乾米飲

下三十九丸久痢不定加至六十九 霍亂前漿水

為便

赤石脂散

甘草 五錢

赤石脂 半兩

硝砂仁 四兩

右細末米湯點服 脉弦者加防風 脉洪者加

黃連脉滿者加當歸 脉遲者加乾薑無論寒熱

久病者只加乾薑 一法加龍骨肉豆蔻為豆蔻

固腸丸

千金翼曰治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度

遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷水

反吐不停赤石脂散主之

赤石脂 一斤

搗篩服方寸匕酒飲任服稍稍加至三服七服盡

一斤終身不吐冷水又不下利補五臟令人肥健

有人痰飲服諸藥不効服此即痊 小兒臍汗出

不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良

仲景赤石脂禹餘糧湯 此當在手太陽明條下

治不應下而下之泄不止醫與理中之類其泄益

甚此寒在下焦故以赤石脂禹餘糧湯主之

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名比金丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元虛憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小便淋漓夜多盜汗久瀉久

溫酒嚥下

腸風便血調百草霜下

若休息痢

疾烏梅湯下治療湯大槩如此

若男子應有走

失或泄瀉之後當服者以棗湯下

婦人應是虛

損或失血之後常服當用醋湯就中湯使或是服

餌不便者當斟酌易之

此藥極固秘元氣無飛

走之性服之不致僭燥但是微渴并肥偉人不宜

用此常服恐澁滯氣血爲壅節之患 若用以治

病極有功效不拘此說

桃華丸

赤石脂二 乾薑一 或加烏附炮半

右為細末稀糊為丸桐子大每服三五十九米飲下久痢便紫血者當歸湯下 治丙赤石脂乾薑

附子 治庚白石脂附子乾薑

局方赤石脂縮砂仁茯苓甘草散

活人赤石脂丸

赤石脂 乾薑 當歸 黃連

右蜜丸桐子大米湯下二十九

五物厚腸丸

赤石脂 乾薑 附子 吳茱萸 肉豆蔻

固腸丸

赤石脂 乾薑 厚朴 肉蔻 砂仁

木香各半兩 炮製蒸如法

右細末糊丸桐子大生薑米湯下空心

旋覆代赭石例

仲景旋覆代赭石湯 壞證

右傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭勒下痛氣衝咽喉眩暈經脉動惕者久而成痿

或傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者

旋覆華字三

人參半錢

半夏半錢

生薑一錢

代赭石一字

甘草三字

大棗一枚

凡言一字均一分半補正

右吹咀每服五錢七水一盞半煎至八分溫服

旋覆華湯

治風熱面生赤癩鼻頭赤面紫黑者當刺出血

人參 生薑

甘草 茯苓

旋覆花

去枝

黃芩

芍藥

柴胡

枳實

麩炒九味各一錢

右麩末以水四盞慢火煎至二盞半去滓分三服

溫飲又葛根升麻湯加黃芩枳殼

仲景治婦人有三物旋覆華湯

胡洽治痰飲在兩

脇間脹滿等證旋覆華丸

酒蘆

日華子云山茱萸暖腰膝助水藏除一切風

逐一切氣破癥治酒蘆 汗出見濕乃生瘰癧

癩為瘡癧也

勞汗當風薄為皴齮乃瘰瘞色赤

臍內有膿血

旋覆華丸

旋覆華兩三 防風 白芷 乾薑 天麻

天南星 半夏 石膏 川芎 陳皮各半兩

白附子兩半 蝎稍 僵蚕炒各三錢

右細末薑糊丸桐子大薑湯下三五丸食後服

活人金沸草散

治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋急時發寒熱

皆類傷寒

旋覆華即金沸草 荆芥 前胡各一兩 甘草

赤茯苓 細辛 半夏製各二錢

右細末每服三錢水一盞生薑十片棗一枚同煎

七分熱服

局方金沸草散

治風化痰頭項強寒熱身體疼咳嗽滿喘及時行

痰氣壯熱惡風

旋覆花去梗 荆芥穗 前胡 麻黃去節各一兩

甘草炙 赤芍藥 半夏製各三錢

右咬咀生薑棗煎無時寒邪則汗出風邪則解利

千金翼旋覆華湯

治胸喉中痰結如膠臍下膀胱留飲

旋覆花 細辛 前胡 甘草炙 茯苓

半夏一兩 生薑八兩 桂心四兩 烏頭五枚 皮去 煎

右丸味切以水九升煮取三升分為三服忌猪羊

飴及生菜等肉加澤瀉尤妙

外臺旋覆華丸

治心頭痰積宿水嘔逆不下食

人參兩半 甘草兩半 半夏三錢 旋覆花三錢

白木兩半 澤瀉三錢 枳實兩半 大黃三錢

右細末生薑糊為丸桐子大生薑湯下無時

范江旋覆白木茯苓湯

治胸中痰結臍下弦滿又治風水證

旋覆花一兩 白木一兩 陳皮一兩 茯苓一兩 桂半兩

細辛半兩 附子炮 半夏製 當歸各半兩

右丸味剉每兩分三四服水二盞生薑十片碎同

煎至七分飲清臨卧食後忌猪羊肉食飴飴生菜

滋味等物

仲景茯苓飲

治胸中停飲心下宿水吐水氣滿不飲食

茯苓

兩一

白朮

兩一

枳實

錢七

陳皮

兩半

人參

錢七半

右剉每服分四服水二盞生薑一錢同煎至七分

取清飲無時

千金翼大五飲丸

胡合方同

主一畱飲心下二漉飲脇下三爽飲胃中四溢飲

膈上五畱飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷渴飲

故有此疾

遠志

去心

藜蘆

白朮

烏魚骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗

五味子

半夏

紫苑

前胡

芒硝

括蕒

桂心

菴容

貝母

芫花

人參

當歸

茯苓

芍藥

大戟

葶藶

黃芩

巴上各一兩

常山

甘草

薯蕷

厚朴

細辛

各三分

巴豆

三十枚去皮心熬

右三十二味細末蜜丸桐子大酒下三九日三稍

加之忌肉食生物飴飴冷水等物

海藏五飲湯

人參

陳皮

枳實

旋覆花

白木

茯苓

厚朴

澤瀉

前胡

桂心

芍藥

甘草

猪苓

半夏

巴上等分

右咬咀每服分四服水二盞薑十片碎同煎至七分水清溫服無時所忌同上及滋味等物

海藏云五飲雖胸膈心下脇間膀胱胃中腸藏府不

同俱在身以前故入陽明例 五飲湯若因飲酒

有飲者加葛花縮砂仁

醫壘元戒卷第二