



醫略六書雜病目錄卷之二十二

欬嗽

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

死證

用藥

胸痺附

欬嗽方目

參蘇飲

越脾加半夏湯

門冬清肝飲

潤肝丸

加味二冬湯

肺癰方

葶立大棗瀉肺湯

粉黛方

團參飲子

千金五味子湯

枳殼煮散

參胡三白湯

括蕞薤白白酒湯



喘病

內因

外證

辨證

脉法

用藥

喘病方目

麻黃定喘湯

三拗湯

五味子湯

參蘇溫

華蓋散

哮病

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

哮病方目

白果湯

五虎湯

溫肺湯

鍾乳丸

冷哮丸

越脾湯

捷徑法

吐血

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

危證

用藥

吐血方目

千金當歸湯

花藥石散

十灰散

新定紫菀茸湯

黃耆六一湯

柴胡疎肝湯

黃連瀉心湯

門冬飲子

生地黃散

天門冬丸

三黃補血湯

清唾湯

桂苓甘露飲

參蘇飲

小安腎丸

保元湯

呃逆

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

危證

用藥

呃逆方目

丁香柿葉湯

橘皮竹茹湯

丁香煮散

橘皮湯

柿錢散

木香調氣散

附子粳米湯

捷徑法

嘔吐噦

內因

外證

辨證



脉法

治法

辨治

死證

用藥

嘔吐噦方目

橘皮半夏湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾姜湯

竹茹湯

千金麥冬理中湯

千金人參湯

安虬薤

小半夏湯

大半夏湯

半夏生姜大黃湯

紅豆丸

二陳逍遙散

痞滿

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

痞滿方目

連理湯

丁沉透膈湯

指迷七氣湯

厚朴溫中湯

黃連瀉心湯

東垣失笑散

木香順氣湯

消痞丸

噎膈

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

死證

用藥

噎膈方目

五汁飲

七聖湯

湧痰湯

開關利膈丸

五噎丸

五隔丸

局方七氣湯

代抵當丸

蜜煎導法

捷徑法

反胃

內因

外證

辨證

脈法

治法

辨治

用藥

反胃方目

木香調氣散

滋血潤腸湯

滋血清膈散

藿香安胃散

茯苓澤瀉湯

桂苓丸

人參固本丸

附子散

九伯餅

小半夏湯

大半夏湯

金桃酒



醫略六書雜病證治卷之二十二

欬嗽 胸痺附

五藏六府皆令人欬非獨肺也其要則皆歸於肺以肺主氣而聲從此出故欬嗽之原聚於口而關於肺

內因

肺爲嬌藏清虛之體惡熱畏寒外因六慾內因七情肺金受傷而欬嗽之病從此作矣

外體

欬者無痰有聲肺氣傷而不清也嗽者無聲有痰脾濕動而生痰也有痰有聲謂之欬嗽凡傷風欬嗽鼻塞聲重痰多白沫傷寒欬嗽胸緊怯寒痰必稠執傷暑乾欬口燥汗多心煩面垢傷濕痰嗽身重煩疼溺澇自汗火鬱喘欬欬必連聲痰多堅老傷燥乾咳咽痛聲嘶得痰咳止食積痰嗽面色青黃痰出如膠瘀血咳嗽窒塞氣腥或兼脇痛胃火咳嗽善渴善饑日晡尤甚肝火咳嗽面青多怒甚於午前陰虛咳嗽五心煩熱氣從下起勞傷咳嗽欬必氣怯痰涎帶血勞倦欬嗽欬必困倦涎痰清稀停飲欬嗽腸鳴漉漉水逆不入肺脹欬嗽喘急氣釐右側不眠欬久成瘡必雲門中府引痛咯吐膿血腥穢異常

辨證

肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺肝  
欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胛下滿脾欬之狀欬則右脇下痛隱隱引肩背  
甚則不可以動動則欬劇腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎藏欬不已傳於六府胃欬  
之狀欬而嘔嘔甚則長虫出膽欬之狀欬嘔膽汁大腸欬狀欬而遺糞小腸欬狀欬而失氣氣  
與欬俱失膀胱欬狀欬而遺溺三焦欬狀欬而腹滿不欲飲食面浮腫氣逆也

脉法

浮爲風緊爲寒洪數爲熱濡細爲濕寸關濇難尺內弦緊爲房勞陰虛右關濇大飲食傷脾左  
關弦數疲極傷肝右寸浮短爲傷肺遲濇爲肺寒洪滑痰火弦濇少血肺脈微急欬而吐血脉  
沉或浮聲音清朗者可治脉來洪數形瘦面赤腎衰氣不上朝聲啞者難法暴病欬嗽睡臥不  
下爲肺脹形氣未衰者可治久病喘嗽左側不臥爲肝傷精氣未衰者可治右側不臥形氣衰  
甚欬吐白沫爲肺痿難痊久嗽脉弱者生實大弦強急疾者死

治法

因欬有痰治在肺因痰致嗽治在脾表證藥不宜靜靜則留連不解變生他病宜辛甘發散

寒涼收斂裏證藥不宜動動則火熱不甯燥痒愈甚宜甘寒潤養忌辛香燥熱春宜抑肝潤肺夏宜降火清金秋宜清熱瀉濕冬宜解表行痰新欬宜散久欬宜清氣虛宜補陰陰虛宜潤

辨治

肺欬千金五味子湯去續斷地黃赤小豆加麥門冬葳蕤細辛心咳涼膈散去硝黃加黃連竹葉天竺黃肝咳枳殼煮散去芎防加肉桂橘紅蘇子脾咳六君子湯加枳殼桔梗腎咳都氣丸加麥冬人參胃欬異攻散加蜀椒黃連烏梅膽欬小柴胡湯加蘆根汁大腸欬補中益氣湯去升麻加桔梗小腸桔梗湯加人參茯苓五味子膀胱欬五苓散加人參三焦欬局方七氣湯加黃連枳實腎虛喘欬腎氣丸加麥冬五味脾虛涎欬六君子湯加五味麥冬

死證

上氣面浮腫喘息擡肩咽瘡失音身熱不眠者均危喘欬腹滿嘔瀉不止者必死欬而脫形身熱不止者亦死

用藥

外邪欬嗽二陳湯風加前胡防風寒加細辛羌活熱加黃芩山梔濕加蒼朮防已食積加山查麥芽氣滯加枳殼桔梗內傷欬嗽二冬湯加桑皮黃芩痰多加瓜蒌貝母肺鬱加欬冬紫苑肺



虛加人參黃耆見血加阿膠紫苑陰虛加龜板知母脾虛異攻散加石斛五味腎虛地黃湯加五味麥冬寒飲喘欬小青龍湯水寒射肺欬嗽五苓散痰火薰肺欬嗽面浮粉黛散肺中有虫欬嗽潤肺丸肺痿吐沫二地二冬湯以滋陰門冬清肺飲以善後肺癰吐膿初以小青龍湯徹越其邪二冬二母湯以清潤其肺葶歷大棗湯排膿團參飲子善後肺脹不眠越脾加半夏湯以徹邪四物湯加桃仁枳殼以活血四苓湯加葶歷桔梗以崇土肅金六味丸加麥冬五味以納氣歸原胸痺引背作痛括婁薤白白酒湯

選方

參蘇飲 治氣虛傷風欬嗽脉浮濡者

人參

八分

蘇葉

錢半

桔梗

八分

前胡

錢半

半夏

錢半

橘紅

錢半

杏仁

二錢 去皮

茯苓

錢半

甘草

五分

水煎去渣溫服

風邪久戀肺氣內虛不能隨時解散故欬嗽嘔惡發熱憎寒焉人參扶元補氣以托邪蘇葉理血疎風以解表桔梗清咽利膈前胡疎肺消痰半夏化濕痰橘紅利氣痰杏仁散痰降逆氣茯苓滲濕清肺氣甘草緩中協諸藥以攘外也水煎熱服使風邪外解則肺氣內充而肺絡清和發熱憎寒無不退欬嗽嘔惡無不除矣此疎肺內托之劑爲傷風欬嗽氣虛之方

越脾加半夏湯 治肺脹不眠脉浮數弦大者

麻黃 錢半 石羔 五錢 半夏 錢半 甘草 五分 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣熱服

風寒外束肺氣不能分布而遏熱於中胃火蒸騰故肺脹不得眠焉麻黃疎肺逐邪於外石羔清胃泄熱於裡半夏醒脾胃以通陽姜棗調營衛以解外甘草協和諸藥以調和表裡也水煎熱服使風寒外解則內熱頓泄而肺胃清和安有肺脹不眠之患乎此分解之劑為外邪遏熱肺脹之端方

門冬清肺飲 治氣虛火炎欬嗽脉軟數者

人參 錢半 黃耆 三錢 麥冬 三錢 五味 八分 當歸 二錢 白芍 錢半 紫苑 二錢 甘草 八分

水煎去渣溫服

元氣虛衰不能攝火歸經故肺受火燦欬嗽不止焉人參扶元補肺氣黃耆補氣攝火邪麥冬潤燥清心火五味斂肺止欬嗽當歸養血營經白芍收陰安肺紫苑分化肺氣以肅金灸草調和脾胃以壯氣也使元氣內充則虛火潛藏而肺金清肅欬嗽無不退矣此扶元欬肺之劑為氣不攝火欬嗽之端方

潤肺丸 治濕熱生虫蝕肺欬嗽脉數者

百部 二兩 黃連 一兩 明礬 一兩 桑皮 一兩 史君 三兩 鶴虱 二兩 棟根 二兩 甘草 五錢

為末白芨膏糊丸每服三錢滾水下

濕熱不消變化生虫而侵蝕肺葉故欬嗽不止煩心惡熱焉黃連清熱燥濕百部溫肺殺虫明礬却濕以杜生虫之本鶴虱殺虫以絕化虫之源桑皮清肺氣以肅金甘草緩中州以和胃史君子健脾氣化積棟根皮瀉濕熱殺虫白芨膏潤補肺之殘缺也糊丸滾水下使濕熱頓消則虫積自化而肺損復完安有欬嗽成癆之患乎此殺虫化濕熱之劑為虫蝕肺葉欬嗽之端方

加味二冬湯 治欬嗽痰腥脉虛數者

天冬 三錢 麥冬 三錢 生地 五錢 熟地 五錢 沙參 三錢 款冬 三錢 川貝 二錢 桔梗 六分

萸霜 三錢 紫苑 二錢 茯苓 錢半 甘草 五分

水煎去渣溫服

真水不足虛火上形肺金肺氣不能宣通故肺燥咳嗽而痰涎腥穢將成肺癰焉麥冬清心

潤肺燥天冬潤肺燥益陰生地滋陰壯水以制火熟地補陰益腎以填精沙參泄熱補肺川



貝清肺化痰蕪霜搜滌燥痰桔梗清利咽膈紫苑泄肺以肅金欵冬潤肺以散結茯苓清肺和脾生草瀉火緩中也俾水旺火平則肺金自潤而肺氣宣通無不痰消欵止安有肺癰將成之患乎此壯水肅金之劑為燥欵將成肺癰之尚方

肺癰方 治肺癰已成即潰未成即消脉數者

黃耆 三錢 蜜炙 桔梗 錢半 葶歷 錢半 甜炒 川貝 二錢 去心 白皮 三錢 米仁 五錢 銀花 三錢 陳皮 錢半 甘草 錢半

水煎去渣溫服 初起去黃耆加防風已潰加人參久不斂加合歡皮

肺邪鬱伏肺氣不能宣通故濁痰滯血壅塞肺竅而成肺癰為黃芪壯肺氣以排膿葶歷瀉濕熱以清肺桔梗清肺利咽膈米仁健脾滲濕熱白菴潤肺補虛川貝清肺解鬱陳皮利氣除痰銀花清肺解毒甘草緩中瀉火以和胃氣也初起去黃芪之壅滯加防風以散邪已潰加人參以扶元久不斂加合歡皮以收口此壯氣排膿之劑為統治肺癰之尚方

葶歷大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得臥脉數者

葶歷子 二錢 甜炒 黑大棗 十二枚

水煎去渣溫服

濕熱傷肺肺氣不得通調而失降下之令故喘不得臥將成肺癰為葶歷瀉濕熱肅清肺氣

大棗益脾元培補肺母二味成方氣專力工俾土能生金則濕熱自化而壅結頓開肺金肅清安有肺癰將成之患乎此培土瀉濕熱之劑爲肺癰喘不得臥之劑方

粉黛散 治喘嗽面浮脉濇數者

青黛 二兩 蛤粉 三兩

爲散米飲下三錢

火鬱不伸濕溢上甚故肺受蒸灼喘嗽面浮焉青黛清火解鬱蛤粉利水益陰二味成方能使治火平濕化而肺得青肅之令安有喘嗽面浮之患乎此清利之劑爲濕火逆上之劑方

團參飲子 治肺虛久欬脉弱者

紫團參 三兩 紫宛茸 二兩 款冬花 二兩 烏梅肉 一兩

爲散每服三錢水煎去渣溫服

肺虛氣逆失降下之令故邪伏不解欬久不止焉紫團參耑補肺虛烏梅肉耑收津液紫宛泄逆氣以達邪欬冬潤肺氣以流通也爲散水煎使肺氣內充則逆氣自降而伏邪外泄肺金肅清欬無不止矣此泄逆欬氣之劑爲肺虛久欬之劑方

脉法

千金五味子湯 治傷燥欬唾有血牽引胸脇痛脈濇微數者

五味

五分

桔梗

三分

甘草

五分

生地

三錢

赤小豆

三錢

桑皮

一錢

續斷

一錢

紫苑

一錢

竹茹

一錢

水煎去渣空心服秘旨加白蜜一匙

肺金傷燥肺氣不能分布而經絡阻塞津液無以流通故肺陰暗耗欬唾有血胸脇牽引作痛焉五味收津斂液續斷徹絡通經桑皮瀉濕熱以清肺桔梗清肺氣以利膈紫苑開泄肺氣竹茹善解胃鬱甘草緩中氣小豆滲濕熱生地滋陰以充潤百骸白蜜潤肝燥以通行治節也使經絡流通則津液四布可無傷燥之虞安有胸脇引痛欬唾有血之患乎此通經潤燥之劑為傷燥欬血引痛之端方

枳殼煮散 治欬引脇下痛脈弦者

桔梗

八錢

枳殼

兩半

細辛

五錢

川芎

一兩

防風

兩半

甘草

五錢

葛根

兩半

生姜

十片

紅棗

三兩

為散水煎三錢去渣溫服

燥金受風木之邪肺氣失清肅之令故木反侮金欬引脇下痛焉防風散風肅金川芎活血

潤燥葛根散陽明之邪細辛散少陰之邪枳殼化滯氣以快胸脇桔梗清咽膈以利肺氣甘  
草緩欬痛生姜散痰涎紅棗益心胃以緩肝也爲散水煎使肺氣內順則清肅令行而肝邪  
外解絡脉融和何欬引脇痛之不除哉此利膈疎邪之劑爲欬引脅痛之劑方

參胡三白湯 治肺虛感邪咳嗽脉浮數者

人參 錢半 前胡 錢半 白芍 錢半 炒 白苓 錢半 白朮 錢半 炒

水煎去渣溫服 虛其加玉竹黃芪血虛加當歸熟地痰多加川貝喘急加桑皮

結氣內虛清肅之令不行不能分布營衛面邪乘虛襲故咳嗽寒熱不止焉人參扶元補氣  
以禦邪前胡疎肺散邪以止咳白朮健脾土壯肺母白芍斂營血蜜腠理茯苓滲痰濕以安  
脾肺也虛甚加玉竹加黃耆均是壯氣實衛血虛加當歸加熟地並可補血資營痰多加川  
貝以清之喘急加桑皮以利之水煎溫服使肺氣內充則虛邪外解而肺絡清和何寒熱咳  
嗽之不痊而有喘急之患哉此補肺疎邪之劑爲肝虛邪戀之劑方

括蕒薤白白酒湯 治胸痺喘急咳唾胸背痛脉弦者

蕒實 一枚 薤白 三兩 白酒 七升

三味合煮二升分溫三服



胸中陽氣不化濁陰乘間窒塞故倚息喘促茲唾引胸背痛焉謂之胸痺括婁實搜滌胸中痰垢之痺結薤白頭解散胸中滯氣之閉散白酒溫行煖胃以壯清陽之布獲正如離照常空陰霾自滅也俾痺結頓開則陽氣化而窒塞通何患胸痺喘息之不去咳嗽引痛之不去哉此搜滌垢膩之劑為胸痺咳嗽引痛之劑方

涼膈散

見火症

都氣丸

見中風

四苓湯

六君子湯

金匱腎氣丸

俱見濕症

異攻散

俱見唇

小柴胡湯

見發熱

二冬二母湯

見虛損

局方四七湯

見氣症

五苓散

小青龍湯

並見傷寒太陽

桔梗湯

見咽喉

二陳湯

四物湯

地黃湯

補中益氣湯

俱見中風

喘病

諸病喘滿皆屬於熱病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息粗盛則為喘減則為枯盛乃肺中之火邪盛減乃肺中之元氣虛

內因

肺主氣居五藏之上升降往來無過不及或六淫外侵七情內傷則呼吸之氣不得宣暢而病

喘

外證

氣喘呼吸急促無痰有聲痰喘動有痰痰鳴喘急氣喘乍進乍退食已大發水喘漉漉有聲  
怔忡浮腫氣虛喘乏呼吸急促不能接續胃虛發喘擷腹擡肩飲食不入陰虛發喘汗多煩熱  
氣從臍下上沖陽虛發喘水水金寒手足不能溫暖

辨證

虛喘氣乏身涼痰稠化水實喘氣粗胸滿身熱使堅少氣不能接續出多入少曰短氣非若喘  
症之氣粗奔迫也

脉法

脉宜浮遲不宜急數脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死上氣脉數身熱不得臥者死上氣面  
浮脉浮大者亦死右寸脉緊實爲寒邪傷肺有六派沉伏而宜發越者

治法

外邪散之氣鬱開之痰則豁之火則清之停飲宜吐之脾虛當溫之氣虛火入肺者補氣爲先  
陰虛火乘金者壯水爲亟腎虛火不歸原者導龍入海腎虛水邪泛溢者逐水下流

辨治

氣虛火入肺者生脉散虛甚合保元湯陰虛火乘金者六味丸虛乘甚合生脉散風寒盛者華

蓋散濕氣勝者滲濕湯火邪盛者白虎湯痰壅導痰湯氣鬱喘促四七湯肺脹脉浮大越脾加  
半夏湯脉浮弦小青龍加白朮湯腎虛火不歸原八味丸腎虛水邪泛溢濟生腎氣丸

用藥

二陳湯加枳桔蘇子寒鬱加前胡蘇黃風痰加南星杏仁火痰加黃連括蕪水氣加茯苓澤瀉  
氣逆蘇子降氣湯胃虛四君子湯虛陰虛六味丸陽虛安腎丸跌撲及婦人新產瘀血入肺喘  
急六味參蘇飲脾肺虛喘補中益氣湯去升麻加麥冬五味腎氣虛喘觀音應夢散

選方

麻黃定喘湯 治寒滯鬱熱逆滿喘急脉浮緊數者

麻黃

一錢

黃芩

錢半

厚朴

一錢

蘇子

二錢

杏仁

二錢

半夏

錢半

桑皮

錢半

欬冬

三錢

甘草

五分

水煎去渣搗生銀杏七枚入藥絞汁溫服

寒邪外束熱壅於內升降失其常度故咽膈逆滿喘急不已焉焉麻黃開發肺邪黃芩清降  
肺熱蘇子散痰解鬱杏仁降氣疎痰厚朴寬中散逆滿半夏醒脾燥濕痰桑白皮瀉濕熱清  
肺欬冬花潤肺燥散結生甘草以和中緩急也水煎絞銀杏汁服俾痰熱內消則寒邪外解  
而經府清和逆滿無不退喘急無不除矣此疎邪降氣之劑爲寒滯鬱熱喘滿之端方

麥蘇飲 治瘀血入肺喘急脉軟澀者

人參 錢半 蘇木 半錢

水煎去渣溫服

瘀血入肺阻遏清道而肺失降下之令故呼吸不利喘急不休焉人參扶元氣以逐瘀血蘇木破血瘀以調氣化二味成方水煎溫服使瘀化氣調則肺金清肅而呼吸有權何喘急之不退哉此破瘀扶元之劑為血瘀喘急之端方

保元湯 治肺虛喘乏脉軟者

人參 錢半 黃耆 三錢 炙草 錢半

水煎去渣溫服

肺氣大虛不能操呼吸之權故困乏無力氣喘不相接續謂之虛喘人參扶元補氣肺氣黃耆補氣壯脾胃炙草緩急以益胃氣也俾肺氣內充則三焦布濩有權而呼吸如其常度安有困乏不退氣喘不平乎此扶元補氣之劑為肺虛喘乏之端方

三拗湯 治風寒抑遏肺氣喘不得息脉浮緊者

麻黃 一錢 杏仁 二錢 甘草 五分

去皮

水煎去渣熱服取汗

風寒抑遏肺氣不得宣通呼吸失其常度故喘不得息焉麻黃開發肺氣以逐邪杏仁疎豁寒涎以降氣甘草和胃以緩喘急也熱服取汗使風寒外解則肺氣清和而行降下之令自然呼吸有權安有喘不得息之患乎此開表逐邪之劑為風寒鬱遏喘逆之劑方

五味子湯 治肺虛喘促脉軟數者

人參 錢半 麥冬 三錢 五味 八錢 杏仁 二錢 生地 五錢 陳皮 錢半 大棗 三枚

水煎去渣溫服

肺氣大虛呼吸不相接續失其分布之權故喘促不止焉人參扶元補肺虛麥冬潤心肺生脈五味收耗散之氣杏仁降逆上之痰生地滋腎養心以吸虛陽之不歸陳皮利氣和中以調肝胃之虛逆大棗緩中益土以生金也使肺氣內充則清肅令行而呼吸有權安有喘促之患哉此補肺納氣之劑為肺虛氣促之劑方

參蘇溫肺飲 治肺虛寒滯喘促脉緊細者

人參 錢半 蘇葉 錢半 肉桂 錢半 茯苓 錢半 白朮 錢半 五味 八分 半夏 錢半 陳皮 錢半 甘草 五分

水煎去渣溫服

寒束肺虛阻遏肺氣失其升降之權故呼吸不利喘促不甯焉人參扶元氣補肺蘇葉疎肺絡散邪肉桂溫營暖血專祛寒邪遏伏半夏燥濕化痰兼理脾胃真元白朮培肺母以生金五味收耗散以保肺茯苓滲濕理痰生之源陳皮利氣杜生痰之因更以甘草緩中和藥也水煎溫服使寒邪外解則則肺藏內充而肺氣清呼吸利何有喘促之不痊哉此補肺散寒之劑爲肺虛寒伏喘促之劑方

華蓋散 治風寒喘促脉浮者

麻黃 錢半 杏仁 二錢 去皮 蘇子 二錢 炒 桑皮 錢半 橘紅 錢半 茯苓 錢半 甘草 五分 生姜 一片 紅棗 四枚

水煎去渣溫服

風寒傷肺遏熱於經失其分布之常故呼吸不利喘促不止焉麻黃開發肺氣以散風寒杏仁疎降肺氣以散痰逆蘇子散痰解鬱桑皮清肺肅金橘紅利氣除痰茯苓滲濕清肺甘草緩中氣以和胃姜棗益心脾以散寒也使風寒外解則遏熱頓化而肺絡清和奚有呼吸不利喘促不止之患哉此發散之劑爲邪遏喘促之劑方

生脉散 見暑症 滲濕湯 濟生腎氣丸 並見濕症 白虎湯 見傷寒陽明 導痰湯 見痰症 四七湯 見氣症

越脾加半夏湯 見欬嗽 小青龍湯 見傷寒太陽 蘇子降氣湯 觀音應夢散 並見氣症 安腎丸 見痺症



二陳湯 四君湯 六味丸 八味丸 補中益氣湯

俱見中風

哮喘

哮喘即痰鳴氣喘之常發者膈內有滯塞之氣肺中有膠固之痰肺絡又有風寒之感三者閉拒氣道搏擊有聲發為哮喘

內因

皮毛為肺之合肺素有火毫竅常疎風寒易入謂之寒包熱以痰火鬱於內風寒束於外或坐臥風涼或酸醎過度鬱熱薰蒸病根深固難以猝除

外證

哮喘與喘相類但不似喘開口出氣之多而有呀呷之音呷者口開呀者口閉開口閉口盡有痰聲呷呀二字合成哮喘字以痰繫喉間與邪與氣相搏故也

辨證

哮喘以聲嚮言喘以氣息言喘急而喉中如水雞聲者謂之哮喘氣促而呼吸不相接續者謂之喘

脉法

脉浮為風滑則為痰洪數火熱沉瀯酸醎

治法

溫散肺寒疎利膈熱發汗祛邪以治其標探吐痰涎以療其本禁用涼劑恐風寒難解禁用熱劑恐痰火易升理氣疏邪勿忘根本爲治

辨治

邪實爲哮固當隨時祛散若體弱之人曾經發散屢用攻劫轉致脉虛形減者法當調補之中兼以清肺利氣然哮雖肺病實本于脾以肺中濁痰蓋是脾家濕熱故理脾之法尤要於清肺也哮多寒包熱邪喉中水雞聲者是痰積肺中肺之絡氣不利小青龍湯探吐最妙老弱人忌之宜越婢湯越婢加半夏湯麻黃定喘湯如中外皆寒溫肺湯鍾乳丸冷哮丸若遇厚味發哮者炒葶子一兩皂角灰三錢共爲末姜汁蒸餅丸沸湯下一二錢鹹哮白麵二兩砂糖二兩飴糖汁捏餅煨熱加輕粉二錢令病人食盡吐出病根卽愈醋噲哮甘草二兩中半劈開豬膽汁五枚浸五日炙末蜜丸臨臥茶清吞二三錢哮至胸凸背駝爲肺壞不治

用藥

二陳湯加前胡枳桔蘇杏桑皮溫散加細辛清火加石羔發散加麻黃探吐用瓜蒂發汗用華蓋散中外皆寒參蘇溫肺湯寒包熱邪越婢加半夏湯然先於八九月未寒之時用滾痰丸下

去痰熱至冬無熱可包而哮不復作下後見虛證者六君子湯加桑皮桔梗

選方

白果湯 治風熱痰哮脉滑數者

麻黃

錢半

黃芩

錢半

杏仁

二錢 去皮

桑皮

錢半

蘇子

錢半 炒

甘草

五分

半夏

錢半 製

欵冬

三錢 去梗

粟殼

三錢 炒

白果

三錢去壳與心

水煎去渣溫服

熱壅風閉痰氣滯於肺竅不能行降下之令故呼吸不利呀呷有聲謂之哮病麻黃發散肺邪子外黃芩清解肺熱于內蘇子散痰解鬱杏仁降氣疎痰半夏燥濕痰桑皮清肺氣欵冬潤肺散結甘草和胃緩中更以粟殼澀肺氣以下降白果豁痰氣以肅金也水煎溫服使風熱兩解則痰氣自化而肺絡清和呼吸如其常度哮病無不瘳矣此散邪清肺之劑為風熱發哮之尚方

五虎湯 治痰熱哮證脉洪濇者

麻黃

錢半

石膏

五錢

桑皮

錢半

杏仁

一錢 去皮

細辛

五分

甘草

五分

生姜

二片

水煎去渣溫服

痰熱召風肺氣鬱伏故呼吸不利呀呷有聲而哮發焉麻黃開發肺邪細辛搜滌肺氣石膏  
泄肺胃之熱杏仁降逆上之痰桑皮瀉濕熱清肺甘草緩氣急和藥生姜豁痰涎以散外邪  
也水煎溫服使痰熱分化則風自外解而肺氣清肅呼吸自利哮病無不除矣此搜滌肺邪  
之劑為痰熱召風哮病之端方

溫肺湯 治虛寒哮喘嘔逆便溏脉細者

鍾乳 三錢 人參 錢半 乾姜 錢半 炒 半夏 錢半 木香 八分 橘紅 錢半 肉桂 錢半 去皮

水煎去渣溫服

肺胃兩虛寒痰內滯而哮發嘔逆大便溏泄是虛寒從下上也人參扶元氣補肺乾姜溫胃  
氣散寒肉桂煖血溫肺鍾乳溫肺鎮逆半夏燥濕化痰橘紅利氣除痰木香調中氣以和肺  
胃也俾寒散氣充則肺胃不虛而春回寒谷何慮哮病不除嘔泄不退乎此溫肺調胃之劑  
為虛寒哮喘病之端方

鍾乳丸 治冷哮喘脉浮滑者

鍾乳 三兩溫研七口水飛七次甘草水煮一伏時 麻黃 一兩醋焙 杏仁 二兩去皮 炙草 一兩

為末煉白蜜丸五更臨臥各噉一丸

冷痰窒塞肺竅肺氣鬱伏而不得宣通故呼吸不利呀呷有聲爲哮病焉鍾乳溫肺竅以宣通麻黃散<sub>送</sub>塞以開肺杏仁疎痰降氣甘草緩逆和中蜜丸早暮各噙俾津津入肺則肺氣開發而冷痰解散肺竅宣通安有呼吸不利冷哮病發不痊乎此溫肺散寒之劑爲冷哮病發之端方

冷哮丸 治冷哮痰結痞滿倚息不得臥脈緊者

麻黃

一兩

川烏

一兩

細辛

五錢

蜀椒

一兩

白礬

二兩

牙皂

兩半

半夏

兩半

膽星

二兩

杏仁

二兩

紫苑

二兩

欬冬

三兩

甘草

五錢

爲末姜汁丸生姜湯下二三錢數服後補脾肺藥調之哮發再服

冷痰結滯閉塞肺竅肺氣不能宣通而失分布之權故哮發痞滿倚息不得臥焉按此少變麻黃附子細湯之法而合稀涎散以湧泄其痰乃開發肺氣之剛劑但氣虛食少及痰中見血營氣受傷者俱禁用以其專司開泄而無溫養之功也數服後以補脾肺藥調之候哮發如前再服擒縱緩急之妙盡在乎此

捷徑法

生菜菔生水梨生地藕鮮生姜各取汁入鍋煮熟煉膏不時噙化

小青龍湯

見傷寒太陽

越婢湯

見外科前序

越婢加半夏湯

見欬嗽

麻黃定喘湯

華蓋散

參蘇溫肺飲

逆見喘症

六君湯

見濕症

瓜蒂散

見傷寒陽明

一陳湯

見中風

滾痰丸

見痰症

吐血

心主血而不能藏夜則復歸於肝肝藏血而不能主書則聽命於心心為君肝為相君火一動相火隨之相火一動六經之火從之火動則血隨以動火升則血隨以升

內因

四氣傷於外七情動於中嗜飲食辛房榮閃墜乃致經絡受傷血液流併聚於胸臆兩脇之間乘火而升從肺胃而越出傷重者夾脊而上如潮湧至勢不可遏

外證

肺胃積熱血必紫肝腎虛炎血必鮮大怒氣逆血必凝灸燔傷胃血必濃 勞心不能主血必煩心躁悶勞力不能攝血必自汗倦怠鬱結傷脾憂悲少食勞傷肺氣久欬無痰氣虛不統血必散漫血虛不歸血必淡白陽虛血外走必虛冷怯寒陰虛火上亢必喘欬闐熱積痰停蓄血必成塊肺生癰疽血必兼膿先痰後血是痰火積熱先血夾痰乃陰火內熾飲食飽悶吐血必食傷胃脘而不運飲酒過醉吐血必酒清道而妄行



辨證

血浮水爲肺血沉水爲肝血不浮不沉爲心血赤如太陽爲腎血白如痰涎爲脫血下行爲順上行爲逆身涼脉靜不渴爲順身熱脉大多渴爲逆吐行濁道出於胃衄行清道出於經嘔血出於肝欬血出於肺咯血出於心唾血出於腎痰涎血出於脾舌衄出於心包齒衄出於陽明少陰肌衄出於脾肺腫衄出于膀胱耳衄出於少陽目衄出於厥陰

脉法

脉虛爲血虛芤爲失血濇爲少血牢爲蓄血沉弱滑小者生實大弦強者死關尺弦細如循刀刃者亦死

治法

血越上竅爲陽盛陰虛有升無降但當補陰抑陽使陽氣降而血自歸經

辨治

醉飽勞怒陡然吐血宜降氣不宜降火宜行血不宜止血宜抑肝不宜補肝勞傷積損吐血宜甘寒涼血辛平行氣酸寒斂澁以塞其源醇甘溫養以復其本若過服寒涼百不一生頻飲洩溺百不一死蓋血得溫則行熱則逆冷則凝黑則止瘀血不可單行單止必先消化而佐以潤

下之品使敗血下行然後服止血藥以固其根補血藥以復其元如血出脉空又當溫補以健理脾胃參朮扶陽則陰血自復而血脫益氣乃陽生陰長之理吐血暴甚勢難止遏者必須大黃以潤下之此火性急速釜底抽薪之法也瘀蓄於脾大腹膨脹漸成鼓滿名曰血鼓宜破血以逐下之

危證

心肺脉破血如泉湧口鼻俱流氣促汗冷者不治

用藥

四物湯去川芎加丹皮山茶花萸汁童便清熱加黃芩山梔麥冬元參降氣加蘇子枇杷葉破血加牛膝五靈脂止澁加藕節蒲黃灰通導加大黃桃仁泥暴吐驟虛氣隨血脫獨參湯追復元陽真陰失守血隨火沸地黃湯滋其化源腎中陽虛下寒上熱八味丸以引火歸原內虛寒而外假熱千金當歸湯不應十灰散遏之若血色瘀晦如汚泥爲陽不制陰花蕊石散溫以行之吐血初起脉洪數身熱屬外因參蘇飲加歸身倍茯苓脉數退而洪不退六味丸加沉香納氣歸原洪脉退而弱極者四君子湯加橘紅補脾生肺上膈壅熱胸腹滿痛吐血紫黑成塊脈洪大弦長有力者荊芥灰丹皮灰當歸阿膠滑石酒大黃元明粉桃仁泥下導之暑傷吐血口

渴面垢五苓散桂苓甘露飲並加麥冬五味滑石藕節汗酒醉吐血新定紫苑苈湯飲復傷胃  
吐血六君子湯加香砂乾葛食傷胃口吐血腹中絞痛脉細數者難治枳實理中湯加丹皮卷  
栝灰勞心太過吐血不止歸脾湯去木香加麥冬阿膠珠婦人倒經血溢蒸熱欬嗽男子精未  
充而御女致成虛勞失血者宜並主烏骨雞丸異順丸胃中熱甚迫血上行犀角地黃湯加木  
香桃仁大黃灰血色如硃光亮如漆吐出卽乾指甲剔起成片此爲守藏眞血不治血中見似  
肉似肺如爛魚腸是胃中脂膜爲邪火灼燥凝結而成方書咸謂必死然吐後凝結旣去能飲  
食不發熱小劑異功大劑六味都氣多有得生者 嘔血有三一屬暴怒火逆傷肝胸脇痛甚  
必厥逆柴胡疎肝散加酒大黃一屬極勞奔馳傷肝遍身疼痛或時發熱犀角地黃湯加當歸  
肉桂桃仁泥一屬竭力房勞傷腎疲肝面赤足冷煩躁口渴生脉散合加減八味丸更有房室  
勞憊氣竭肝傷而有乾血者四烏鯁骨一蘆茹丸童便藕汁調服 唾血如絲浮散者屬腎六  
味丸加肉桂五味乾欬見血或痰中見紅絲血點六味丸加麥冬五味清金壯水兼阿膠百合  
天冬川貝款冬紫苑潤肺止咳咳血久而成勞或勞旣成而咳血均宜異功散加麥冬阿膠或  
四君子湯加黃芪白芍麥冬五味陰虛火動咳血痰中有血星如珠者生料六味丸加茜根童  
便烏鯁骨咳血不止吐痰或帶血絲六味丸並加蛤粉童便肥盛酒客冀痰中有血滾痰丸搜

滌之咯血不咳嗽喉中常咯二三口此房勞傷腎心包火迫血不能藏亦有兼痰而出者是腎  
虛水泛火炎不歸二者病最重而勢甚微宜天冬麥冬款冬桑葉柴苑茯苓山藥白芍丹皮生  
地童便肅金涼血隨以六味丸加阿膠牛膝奠安營氣以攝心包之火而血不復從咯出矣九  
竅出血非中毒卽扑損中毒生羊血調血竭末灌之扑損以熱童便頻灌若兼血水爲五藏內  
崩真氣已竭必死舌衄舌上出血如線蒲黃三溫煎傷漱之槐花炒研摻之黃芪六一湯合生  
脉散內服熱壅舌脹出血如泉川文蛤爲末摻之黃連瀉心湯內服虛熱舌挺出血乾姜蒲黃  
炒灰爲末摻之六味丸合生脉散內服齒衄血從齒縫或齒斷中出名曰牙宣風熱消風散加  
犀角連翹胃火清胃散加石羔黃芩外擦食鹽石羔末陰虛六味加黃栢知母外擦青鹽秋石  
末腎虛齒浮作痛淡鹽湯下小安腎丸不痛六味丸加骨碎補外擦青鹽香附末胃熱口臭清  
胃散大實調胃承氣湯耳衄乃耳中出血是膽火上干龍膽瀉肝湯陰虛耳衄生料六味丸加  
五味子龍骨燒灰外吹眼衄血從目出乃積鬱熱結傷肝梔子豉湯加犀角秦艽丹皮赤芍虛  
者加味歸脾湯加白芍生地肌衄當歸補血湯黃芪建中湯保元湯當歸六黃湯臍衄涼八味  
丸阿膠白芍益陰制火生地牛膝降氣歸腎蘇子橘紅降氣化痰沉香童便降血歸經藕汁涼  
血化滯有行瘀之力兼止澁之功至腹中滿痛吐紫黑血塊爲瘀血蓄血當歸赤芍桃仁大黃

潤以下之怒傷肝木血苑於上沉香青皮白芍丹皮降以平之勞心失血棗仁蓮肉茯神薯蕷紫苑丹參柏仁瀉以歸之房勞失血熟地枸杞牛膝杜仲人參鹿茸補以填之血熱而動犀角丹皮地骨涼以攝之血寒而泣桂心附子溫以行之血熱不止山梔灰黃連灰血瘀不止乾漆灰大黃灰血寒不止乾姜灰血滑不止棕櫚灰血虛不止地黃灰參三七行血中之滯川鬱金行血中之氣側柏葉涼以瀉血之溢大小劔涼以止血之逆茅根涼血熱以下行也

選方

千金當歸湯 治吐血衄血脉緊數軟瀉者

當歸 三錢 黃芩 錢半 白芍 錢半 炮姜 五分 阿膠 三錢

水煎去渣溫服

裡寒格熱血不歸經故吐血衄血經久不止焉當歸養血歸經白芍斂陰止血黃芩炮姜一寒一熱所以溫裏寒而解格熱協濟阿膠以滋九地之陰而制九天之浮熱也水煎溫服使裏寒既化則格熱自解而肺胃清和血無不歸安有吐血衄血之患乎此寒熱兼施之劑爲裡寒格熱吐衄之端方中當用生地麥冬以濟格熱傷陰之治庶於經久失血有濟

花蕊石散 治陽虛血瘀胸膈疼痛吐血成升斗脈緊細者



花 磁石

五兩煨過置血上  
血即化水為真

石硫黃

一兩豆豉  
煮一伏時

二味入煬成罐內鹽泥固濟煨三伏時研無聲為度每服一錢童便調下

婦人產後血逆血暈胞衣不下子死腹中俱宜服之瘀血化為黃水然後以獨參湯調之此  
回陽滌瘀之劑為陰邪固結瘀凝血逆之劑方不特治吐血證也

十灰散 治吐血勢甚脉數有力者

大黃

茜根

大薊

小薊

山梔

薄荷

丹皮

栝葉

茅根

棕皮

十味各等分燒灰研細童便調下三錢

花蕊石散為破血之峻劑功消化血為水而世畏其峻罕能用之葛可久言暴血成升斗者  
宜花蕊石散若病久涉虛及肝腎二家之血大非所宜但與十灰散對舉不分寒熱主治以  
致後世不能無誤用之失當知十灰散專主火炎上湧之血倘誤用以治陰邪固結之證為  
害猶輕若誤用花蕊石散治血熱妄行之病為患莫測况血熱妄行十常八九陰邪固結十  
無一二舉世醫者病者俱畏之加蠲遂致置而不論乃使一切陰邪暴逆之血悉皆委之莫  
救豈其命耶



新定紫苑茸湯·治酒傷欬痰血脉數者

紫苑

三錢

薇荷

二錢

於朮

錢半

澤瀉

一錢

丹皮

錢半

麥冬

三錢

犀角

一錢

甘草

炙三分

藕汁

一盞

水煎去渣溫服

濕熱溱肺營陰暗傷故痰中見血發欬不止謂之傷酒紫苑開泄肺氣以清痰血澤瀉通利膀胱以降濁陰薇荷去營中濕熱生朮利胃中濕熱犀角清心胃之熱麥冬潤心肺之陰牡丹皮涼血解熱生甘草緩中瀉火水煎冲池藕汁涼血化痰以清痰中之血也使濕熱頓去則肺氣清肅而發欬無不除瘀血無不化矣此理中清營之劑為濕熱傷肺欬痰血之端方黃耆六一湯 治煩熱自汗鼻衄經久不止脉軟數者

黃耆

六錢

甘草

一錢

大棗

三枚

水煎去渣溫服

衛氣虛衰虛陽失統而煩熱自汗氣不攝血故鼻衄經久不止焉黃耆補中氣以實衛陽陽密則漏汗自止甘草瀉虛火以緩中氣氣調則煩熱自解水煎溫服使氣壯衛充則營血自斂而煩熱自汗無不解安有鼻衄經久不痊乎此壯氣實衛之劑為氣不足失血鼻衄自汗

之端方

柴胡疎肝散 治怒火傷肝脇痛嘔血脈弦數者

柴胡 三錢 監 血炒黑 白芍 兩半 醋炒 川芎 八兩 山梔 兩半 炒 枳殼 一兩 醋炒 香附 兩半 醋炒 橘皮 兩半 薄荷 兩半 水焙

甘草 五錢

為散水煎三錢去渣冲童便一杯服

怒傷肝木用火內鬱而脇痛不能藏血故暴嘔紫黑凝血焉柴胡疎肝木以解鬱山梔清鬱火以涼血白芍斂肝陰以止血川芎化凝血以歸肝枳殼破滯氣陳皮利中氣香附調氣解氣鬱薄荷解鬱疎肝甘草緩中以瀉肝火也童便降火以滌瘀結為散煎冲生者力銳而熟者性醇務使怒火頓平則肝鬱自解而肝絡清和安有脇痛嘔血之患乎此解鬱調肝之劑為怒火嘔血之端方

黃連瀉心湯 治火壅舌脹出血脈數者

黃連 三錢

水煎濃汁去渣頓漱嚥下

火熱內壅經脈不利而舌本脹大迫血迫妄行故舌上出血不止焉黃連一味性極苦寒力

能瀉心火以存陰燥脾濕以安腎使脾濕既化則心火自降而經脉清利安有舌脹不退舌  
衄不止者乎濃汁先漱後嚥急需清上之功不欲寒中之効此清火瀉心之劑爲火壅舌脹  
出血之劑方

門冬飲子 治吐血衄血自汗脉虛者

麥冬

二錢  
去心

人參

錢半

五味

八分

生地

五錢

當歸

二錢

黃芪

三錢

蜜炙

水煎去渣溫服

衛氣虛衰不能統攝營氣而血得妄行故吐血衄血必兼自汗焉麥冬清心潤肺以寧營人  
參補肺扶元以壯衛五味收耗散之氣兼能攝血生地滋九地之陰力能止血當歸養血歸  
經黃耆壯氣實衛水煎溫服使氣壯血攝則血自歸經而汗無不斂血無不藏何吐血自汗  
之不痊哉此斂補之劑爲氣虛吐衄自汗之劑方

生地黃散 治衄血不止脉軟數者

生地

五兩

熟地

五兩

天冬

三兩

黃芪

二兩

黃芩

兩半

甘草

五錢

枸杞

三兩

白芍

兩半

地骨皮

兩半

爲散水煎五錢去渣溫服

肺虛挾熱迫血妄行故上出於鼻謂之衄血焉黃耆補氣雄肺黃芩清熱止衄生地滋陰壯水以制火熟地滋血補陰以配天陽天冬潤肺益陰白芍斂陰止血枸杞子填精益髓地骨皮退熱清肌甘草緩中以瀉火也使火降水充則肺熱自退肺氣清肅何患衄血之不止哉此清肺填陰之劑為肺虛衄血之端方

天門冬丸 治衄血多痰脉浮數者

天冬

三兩 去心

阿膠

二兩 蛤粉炒

茯苓

一兩

杏仁

二兩 去皮

川貝

二兩 去心

甘草

五錢

為末煉蜜丸茅根湯下三錢

虛熱刑金肺氣不利不能通調水道而營陰暗耗故衄血不止欬吐痰多焉天冬潤肺燥以益陰阿膠益營陰以補肝杏仁降痰兼疎肺氣川貝清痰兼涼肺氣茯苓滲濕以治痰之源甘草瀉火以緩肺之逆更以煉蜜為丸潤其燥茅根湯下涼其血使痰化火平則肺虛自復而肺熱自清何衄血痰多之不退哉此化痰補肺之劑為肺虛衄血痰多之端方

三黃補血湯 治衄血不止脉軟數者

生地

五錢

熟地

五錢

黃耆

二錢 蜜炙

丹皮

錢半

白芍

錢半 炒

當歸

二錢

水煎去渣溫服

血氣兩虛虛陽迫肺不能攝血而從鼻上溢故衄血久不止焉黃芪補肺氣以攝血白芍斂肺陰以止衄生地滋陰涼血熟地滋腎補陰當歸養血歸經丹皮涼血止血也俾血氣完復則虛陽自斂而肺氣清寧焉有衄久不止之患乎此補虛涼血之劑為血氣虛人衄久不止之劑方

清唾湯 治唾中見血脉數者

熟地

五錢

遠志

錢半

天冬

三錢 去心

麥冬

三錢 去心

知母

錢半

桔梗

三分

川貝

二錢 去心

黃柏

錢半 炒

水煎去渣溫服

腎虛火炎津液不能收攝血分有傷故唾中帶血焉熟地補陰壯水以配火遠志通腎交心以寧志麥冬清心潤肺天冬潤肺益陰黃柏清相火存陰知母潤腎燥壯水元參清浮游之火桔梗利唾中之津貝母清心肺以豁痰炮姜攝津液以止血也水煎溫服使腎氣收攝則相火自甯而津液無上溢之患其唾中帶血無不自清矣此清唾交心之劑為腎虛火動唾中帶血之劑方

桂苓甘露飲

治濕熱動血從口溢出脉洪緩者

醫略六書雜病證治

卷之二十一

選方

十七

趙翰香居藏板

肉桂 三分鹽 茯苓 錢半 白朮 錢半 澤瀉 錢半 滑石 三錢 石羔 三錢 寒石 二錢 猪苓 錢半

水煎去渣冲童便一杯溫服

濕熱內淫脾不能制故迫血上溢而血出於口乃為吐血焉白朮培脾土之卑監澤瀉瀉濁陰之上溢石羔寒水清上甚之熱猪苓茯苓降內淫之濕滑石清徹濕熱以下泄肉桂導引真陽以下蟄也水煎冲童便導熱散瘀以下行使濕熱頓化則龍火潛藏而血無妄行之患何吐血之不止哉此清降濕熱之劑為濕熱上甚吐血之方

參蘇飲 治吐血脈軟濇者

人參 錢半 蘇木 錢半

水煎去渣微溫服

元氣大虛不能鼓運其血致血積絡中乃為瘀血又不能統攝其血而血出於口為吐血焉人參扶元氣以攝血蘇木破瘀血以止血二味成方氣專力銳使元氣內充則瘀血自化而血自歸經何吐血之不止哉此扶元破血之劑為氣虛血瘀吐血之方

小安腎丸 治腎虛積冷迫血上出脉沉緊者

熟地 六兩 藁香 兩半鹽 川棟子 兩半 川椒 兩半鹽 烏頭 二錢姜 香附 兩半

汁炒黑 醋炒



爲末白蜜搗丸淡鹽湯下三錢

腎氣不足風冷深入迫血上行而齒縫出血謂之牙宣亦謂之齒衄熱地補腎藏之精血烏頭逐腎家之風冷藿香卽小茴溫氣化以下行棟子卽金鈴瀉濕氣以下泄川椒溫中散冷香附調氣和血爲末糊丸淡鹽湯下使腎藏內充則風冷外散而經絡清和血行脉中焉有齒衄牙宣之患乎此補腎逐冷之劑爲腎冷迫血齒衄之端方

保元湯 治氣不攝血脉軟者

人參 錢半 黃耆 三錢 炙草 錢半

水煎去渣溫服

元氣大虛不能統攝其血故血得妄行出於口爲吐血焉人參扶元氣以攝血黃耆壯衛氣以固經炙草緩中以益氣也水煎溫服使元氣內充則血行脉中而無妄行之患何吐血之有此補氣扶元之劑爲氣不統攝吐血者立一補氣法門

四物湯 六味丸 八味丸 四君子 歸脾湯 都氣丸 並見中風 黃芪建中湯 烏骨雞丸

異順丸 並見虛損 異功散 見口唇 四烏鱧骨一蘆如丸 見指 滾痰丸 見痰症 消風散 見頭痛 清胃散 龍

膽瀉肝湯 當歸六黃湯 並見火症 加味歸脾湯 見女科胎前中風 調胃承氣湯 見傷寒陽明 當歸補血湯 見勞倦

涼八味丸

見女科  
聖綱

六君子湯

見濕  
症

枳實理中湯

見傷  
食

五苓散

見傷寒  
太陽

### 呃逆

呃由中氣虛寒閉於上火逆於下直冲清道而呃或作聲也有寒熱陰陽虛實之辨要知胃實氣逆則呃胃虛氣不下順則亦呃

### 內因

寒閉於上火逆於下及久病胃虛傷寒失下痰火相搏肝氣滯逆更有胃弱陰虛木火內凌中土或寒滯熱結或水停食鬱或悲怒遏熱或體弱中寒總因胃氣虛衰邪氣逆上不論寒熱虛實皆能發呃

### 外證

火呃乍發乍止躁渴便難冷呃綿綿不已手足清冷痰呃呼吸不利呃有痰聲虛呃氣不接續呃聲低怯氣呃呃聲滯逆胸滿脇疼痰呃心胸刺痛水下即呃肝呃聲小氣長氣急心痛腎呃呃聲低小氣促息微

### 辨證

病深者其聲噦噦即呃逆之無轉聲者也呃出中焦聲大而短噦由下焦聲細而長內傷脾胃

爲不足邪鬱內熱爲有餘邪滯氣逆屬肝精空氣促屬腎

### 脉法

脉浮緩爲易治數大爲難療結促者危代澹者絕左關弦爲木乘土右寸數爲火乘金俱不可治

### 治法

當溫中化痰調和胃氣隨所感而治氣逆者疎導之食停者消化之痰滯宜湧吐血瘀宜破滌熱鬱宜清寒滯宜溫汗吐下後過服寒涼宜溫補虛而熱迫宜涼補陰火上冲宜導引陰虛氣逆宜歸納

### 辨治

近世不辨寒熱虛實概用丁香附子姜桂非損不足卽益有餘如胃虛而呃木挾相火直冲清道者異功散加肉桂柿蒂甚加黃柏附子送六味丸吐利後胃氣虛寒理中湯加附子丁香胃虛挾熱橘皮竹茹湯呃兼嘔吐胃虛有痰也半夏茯苓生姜人參煎服食積鬱久發呃枳朮丸加半夏茯苓生姜飲熱湯食姜椒卽呃者胃中有寒痰死血拒格不入宜姜汁韭汁下越鞠丸痰甚理中湯加蓬朮桃仁寒甚呃逆兼嘔丁香煮散或附子梗米湯加川椒丁香產後發呃最

危四逆加人參湯加丁香肉桂寒鬱熱邪發呃連理湯加半夏生姜

危證

頭汗淋漓呃逆連聲不止者死

用藥

二陳湯加丁香柿蒂氣呃加沉香枳殼食呃加山查神麩痰呃倍半夏加瓜蒌火呃加黃連竹茹水呃加豬苓通草胃虛加人參白朮胃虛倍丁香加炮姜傷寒失下發呃承氣湯加丁香頑痰可吐瓜蒂散加丁香氣不歸元八味丸加沉香

選方

丁香柿蒂湯 治胃寒氣滯呃逆脈緊細者

丁香

兩半

柿蒂

三枚

青皮

兩半

陳皮

兩半

爲末水煎三錢去渣溫服

胃中寒滯胃氣不化清陽抑遏而升降失常故呃逆不止焉母丁香溫中散滯甜柿蒂降逆止呃青皮破肝氣以疎邪陳皮理胃氣以和中爲末水煎使寒滯既消則肝胃調和而升降有權安有呃逆之患乎此溫中降逆之劑爲寒滯呃逆之方

橘皮竹茹湯 治胃虛熱迫呃逆脉虛數者

橘皮

錢半

竹茹

三錢

人參

八分

甘草

五分

生姜

三片

大棗

三枚

水煎去渣溫服

胃氣虛弱虛熱內迫不能發育而輸納無權故呃逆不止焉人參扶元補胃虛竹茹清熱解胃鬱橘皮利氣和甘草緩中和胃生姜溫胃口大棗緩脾元也俾脾胃調和則虛熱自解而輸納有權呃逆無不止矣此補虛解熱之劑為胃虛熱呃之端方

丁香煮散 治呃逆脉弦濡者

丁香

三七粒

蓮肉

二七粒

生姜

七片

秫米

半合

水煮蓮肉去渣入米姜再煎去姜食粥

胃氣虛衰寒邪內伏不能轉運而納化無權故呃逆不止謂之寒呃焉此做附子粳米湯之制彼用粳米此用秫米皆取其直達胃中雖其勢稍平亦是突圍之將局方無蓮肉秫米而多川烏紅豆青皮陳皮甘草乾姜良姜益智胡椒等味為散煮湯入鹽一字調服尤為彼烈于此膏梁禁用

橘皮湯 治痰氣呃逆脉弦者

橘皮

四錢

生姜

八錢

水煎去渣溫服

痰凝氣滯阻遏胃口不能運化而輸納無權升降失職故呃忒不已橘皮利氣兼能除痰生  
姜散痰又能溫胃也俾胃溫氣化則輸運有權而納化無不如度焉有呃忒不止者乎此溫  
胃散痰之劑為痰氣呃逆之劑方

柿錢散

治虛寒呃忒脉細者

柿錢

一兩即柿蒂

丁香

二兩

人參

一兩

為散水煎三錢去渣溫服

胃氣虛寒陽和之令頓失故胃氣不化呃忒不止焉丁香溫中散寒滯人參扶元補胃虛柿  
錢能降逆氣以止呃忒也為散水煎使胃氣內充則虛回寒化而輸納有權呃逆無不止矣  
此補虛溫降之劑為胃虛寒呃之劑

木香調氣

治氣鬱呃逆脉沉者

木香

三兩

白蔻

二兩去壳炒

丁香

二兩

檀香

兩半

藿香

三兩

甘草

五錢

砂仁

三兩炒

為散鹽點沸湯調下三錢



氣鬱於中胃氣不化無以敷布津氣而升降失常故呃逆不止焉木香溫中化氣丁香散滯  
溫中檀香開胃解鬱白蔻快膈寬中藿香調胃甘草和中砂仁醒脾以化胃氣也爲散鹽點  
沸湯使鬱結解散則脾胃調和而氣無滯逆何呃逆之不退哉此調中快膈之劑爲氣鬱發  
呃之端方

附子梗米湯 治胃虛寒呃脉沉者

附子

錢半

梗米

一合

甘草

八分

半夏

錢半

大棗

五枚

水煎去渣溫服

火不生土胃氣不化失其輸納之權而升降失常故呃逆不止焉附子補火生土梗米益胃  
和脾半夏燥濕以醒脾胃甘草緩中以和氣化更以大棗之甘先入脾以益胃氣也水煎溫  
服使火旺土強則敷化有權而升降如常何有呃逆之患哉此補火生土之劑爲火虛土弱  
呃逆之端方

捷徑法

紙燃刺鼻得嚏則呃止嗅香味則氣通而呃亦止食香物則膈爽而呃亦止 乳香硫黃艾  
葉各三錢好酒煎沸令病人嗅受其氣而呃亦止

異功散

見昏

理中湯

見中

枳朮丸

連理湯

並見

承氣湯

瓜蒂散

並見傷

越鞠丸

見鬱

四逆加人參湯

見傷寒少陰

羌活附子散

見頭

一陳湯

六味丸

八味丸

並見

嘔吐噦

胃虛脾弱寒暑交侵飲食不節則胃氣逆上脾氣不能運化則食不得下而或嘔或吐或噦有

寒熱表裡虛實之異上中下三焦淺深之殊

內因

暴傷飲食填塞於中胃氣逆上必吐病久胃虛不能納穀乍聞食氣則嘔熱鬱胃因食入則吐

虛寒胃弱食久方出風干胃府翻翻吐食暑傷陽明嘔吐煩渴蟲蝕胃府腹痛吐蚘痰格胃口

嘔吐眩暈水停腸胃嘔吐怔忡病勢入深窮必發噦要知嘔出上焦從乎氣化當分表裡吐出

中焦必傷脾胃當辨寒熱噦屬下焦必傷腎肝當辨水火其虛實陰陽當在表裡寒熱水火中

分

外證

胃寒喜熱厥冷惡寒胃熱喜冷惡熱躁渴氣滯必脹滿不通痰飲則遇冷即發嘔苦知邪在膽

吐酸知火入肝嘔涎水澀屬痰飲須防蟲證吐酸腐無非食滯更慮火燔吐清水是土之卑隘

吐綠水乃木之發生黑水從胃底翻出臭水是腸中逆來

辨證

上焦吐者從乎氣氣上冲胸食已卽吐中焦吐者從乎積氣食相假胸中痞悶下焦吐者從乎寒朝食暮吐四肢清冷嘔屬陽明有聲無物乾嘔屬少陽亦有聲無物吐屬太陰有物無聲噦屬少陰無物有聲故木敷者其葉落病深者其聲噦

脉法

跌陽脉微爲胃寒浮爲胃虛陽緊陰數爲吐陽浮陰數亦爲吐寸緊尺數爲吐緊而滑者吐逆緊而濇者難治嘔吐至甚天氣不降尺脈不至者亦難治

治法

古以半夏生姜橘皮爲嘔家聖藥獨東垣云生姜止嘔但治表實氣壅若胃虛穀氣不行惟當調補脾胃推揚穀氣而已肝氣浮越必藉重墜以鎮墜之胃氣久虛必假穀氣以調和之

辨治

嘔吐忌下氣逆故也諸陽氣浮嘔逆上氣此陰虛成嘔地黃湯加石斛沉香寒吐理中湯加附子益智仁或二陳湯加丁香炮姜熱吐二陳湯加梔連茹葛怒傷飲食嘔吐二陳湯加丁香沉朴

麴香砂痰厥嘔吐二陳湯加乾姜白芥子瘀積胃口嘔吐二陳湯合失笑散加青皮鬱金嘔吐傷胃胸膈脹悶二陳湯合枳朮丸加砂朴姜汁虛加人參白朮火氣內鬱嘔吐佐金丸後以二陳逍遙調理之胃虛痰飲嘔吐六君子湯加姜汁噦乃腎虛胃冷或停水飲溫胃理中湯滌飲橘皮半夏湯加桂心茯苓若實鬱發熱承氣湯虛熱發噦橘皮竹茹湯虛寒發熱噦橘皮乾姜湯寒甚去通草加丁香附子寒熱錯雜丁香柿蒂湯腹滿不尿頭汗目瞪發噦者不治乾嘔橘皮煎湯入姜汁白蜜少許飲 漏氣千金麥冬理中湯走哺人參湯嘔苦佐金丸加生姜茯苓澤瀉嘔酸佐金丸加茯苓半夏嘔水五苓散加生姜吐沫理中湯加益智吐蚘有寒有熱寒者理中湯加烏梅熱者安蚘散加楝根皮寒熱交錯烏梅丸隨症加減

### 死證

吐如青菜汁者死肝氣實久吐不止者亦死嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者必死

### 用藥

二陳湯加藿香木香食加查肉神麴氣加厚朴枳殼胃熱加黃連竹茹胃寒加炮姜益智濕痰加蒼朮白朮虫加雷丸蕪荑氣虛熱動合四君子陽氣虛寒伏合理中湯或入糯米煎或伏龍肝水煎或入代赭末服如血瘀胃口嘔吐者熱飲生鵝血最効

選方

橘皮半夏湯 治積痰嘔吐噦脈弦滑者

橘皮 五錢 半夏 五錢 生姜 搗汁半合沖

水煎去渣入生姜汁分三服

痰積於中不能運化故中氣上逆嘔吐發噦不已半夏燥脾濕以化積痰陳皮利中氣以散滯逆姜汁溫胃氣以散痰積也俾積痰運化則中氣調和而脾胃復其健運之常嘔吐發噦無不自止矣此散痰利氣之劑為積痰嘔吐發噦之崙方

橘皮竹茹湯 治胃虛熱噦脈濡數者

橘皮 錢半 竹茹 三錢 人參 八分 甘草 三分 生姜 八分 大棗 二枚

水煎去渣溫服

胃氣虛弱虛熱內迫而中氣喘爭失其化育之常故發噦不已人參扶元補胃虛竹茹清熱解胃鬱甘草緩中和胃陳皮利氣調中也更以生姜溫胃散逆大棗益脾緩急水煎熱服使虛回熱化則胃氣調和而輸納有權何發噦之不退哉此扶元化熱之劑為胃虛熱迫發噦之崙方



橘皮乾姜湯 治胃虛寒噦脉細者

橘皮 錢半 乾姜 錢半 人參 錢半 甘草 五分 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服

胃氣虛衰寒邪內伏胃弱不能發育而輸納無權升降失職故發噦不已焉治以橘皮乾姜湯同是發噦彼用竹茹此用乾姜均屬胃虛同是治噦虛實雖同而寒熱天淵矣此溫補祛寒之劑為胃虛寒噦之端方

竹茹湯 治胃熱嘔吐噦脉數者

竹茹 三錢 姜 錢半 半夏 錢半 山梔 三錢 橘皮 錢半 甘草 五分 枇杷葉 三錢 大棗 三枚 生姜 三片

水煎去渣溫服

熱鬱胃脘肝氣上逆侮膈凌中不能輸納而胃氣不化故嘔吐噦不止焉竹茹清胃解熱姜汁焙以兼散陽明之鬱山梔清肝降逆姜汁炒以專降屈曲之火半夏化痰涎醒脾胃橘皮利中氣調肝胃甘草緩中和胃大棗益脾和胃鮮生姜溫胃散痰枇杷葉平肝降逆也俾氣平熱化則肝胃調和而輸納有權嘔吐發噦無不止矣此清熱平逆之劑為熱鬱氣逆嘔吐噦之端方



千金麥冬理中湯 治漏氣身熱痞悶脉虛數者

麥冬 三錢 去心 白朮 三錢 炒 人參 錢半 茯苓 二錢 橘皮 錢半 蓴菜 錢半 歲麩 三錢 蘆根 二根 絞汁

竹茹 三錢 姜汁炒 甘草 五分 生姜 三片 陳米 一合

水煎去渣溫服

胃虛濕熱中氣不能轉輸而納化無權故身熱痞悶先吐後瀉乃為漏氣也白朮健脾除痞  
悶甘草緩中退身熱人參扶元補胃氣茯苓滲濕清治節麥冬潤心肺預防其渴陳皮利胃  
氣舒暢其中蓴菜充腸潤胃蘆根清胃解熱三竹潤虛補氣竹茹解鬱清熱生姜溫胃散滿  
悶陳米益脾固倉廩也水煎溫服使腸胃內充則濕熱外達而中氣清和吐瀉無不退痞熱  
無不除安有漏氣之足患乎此補胃充腸之劑為胃虛腸餒漏氣之專方

人參湯 治走哺嘔逆便閉脉數者

人參 錢半 歲麩 三錢 白朮 三錢 炒 黃芩 錢半 山梔 錢半 知母 錢半 茯苓 錢半 陳皮 錢半

石羔 五錢 蘆根 三錢

水煎去渣溫服

熱鬱陽明脾不能為胃行津氣以四達故嘔逆不禁二便不通謂之走哺人參扶元補氣歲

澁潤虛補中白朮健脾土止嘔逆石羔清胃熱存陰津黃芩清肺腸之熱知母潤腎膀之燥  
蘆根滋養胃汁山梔清利三焦茯苓滲濕和脾陳皮利氣和胃水煎溫服使熱化氣調則二  
便通利而嘔逆自止安有走哺之足慮乎此清熱補虛之劑爲走哺便閉之端方

安虻散 治伏熱吐虻脉數者

烏梅 二兩 黃連 兩半 蜀椒 一兩 檳榔 兩半 藿香 三兩 胡粉 一兩 白礬 兩半

爲散每服三錢水煎去渣溫服

濕熱生虫胃氣不化故虻不能安乃從口越出謂之吐虻黃連瀉濕熱以治虫之生長烏梅  
欽津液以安虫之動作蜀椒溫胃殺虫檳榔破滯殺虫胡粉墜熱殺虫白礬却濕殺虫藿香  
寬胃快膈以靜虫之生源也爲散水煎使濕熱並化則虫勿滋繁而胃府清肅虻自內伏何  
吐虻之不已哉此殺虫化熱之劑爲虫動吐虻之端方

小半夏湯 治痰積嘔噦脈弦滑者

半夏 一兩 姜汁 一合

水煎半夏去渣沖姜汁分溫三服

痰濕滯膈胃氣不化而痰氣上逆故輸納無權或嘔或噦焉半夏以燥之姜汁以散之俾痰

原书缺页

原书缺页

原书缺页

原书缺页



丁沉透膈湯 治痞滿脉沉緊瀆者

丁香 一錢 厚朴 半錢 木香 一錢 白蔻 一錢殼炒 草果 一錢炒 白朮 錢半炒 香附 二錢醋炒 人參 八分

半夏 錢半製 砂仁 一錢炒 甘草 五分 沉香 一錢炒 生姜 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服

脾氣虛弱寒邪凝滯不能運化於中故痞滿不舒焉厚朴散滿寬中氣丁香溫中散滯氣木香調氣化以醒脾胃白蔻開結氣以快胸膈香附調氣解鬱草果散寒消滯白朮健脾元運化人參補元氣健中甘草緩中和胃砂仁開胃醒脾半夏化痰涎沉香降逆氣生薑溫胃散痞滿大棗益脾和中氣也水煎溫服使脾胃調和則健運有權而虛回寒散痞滿無不除矣此溫中散滯調補之劑為脾虛寒滯痞滿之端方

指迷七氣湯 治七情鬱結痞滿脉沉者

香附 三錢醋炒 官桂 錢半 蓬朮 錢半醋炒 藿香 錢半 青皮 錢半炒 桔梗 一錢 陳皮 錢半製 半夏 錢半製

益智 錢半炒 甘草 五分 生薑 三片 大棗 三枚

水煎去渣溫服

七情鬱結肝胃受病不能輸化而中氣不運故痞結滿悶焉香附調氣解肝鬱官桂暖血平

肝木蓬朮攻痞消結藿香開胃和中青皮破逆氣以平肝陳皮理滯氣以和胃桔梗清咽利膈甘草緩中和藥半夏化痰涎生姜溫胃氣益智開心志大棗益脾元也使肝胃調和則鬱結自解而中氣無不運痞滿無不除矣此消痞化結之劑爲七情鬱結痞滿之端方

厚朴溫中湯 治心腹痞滿脉沉弦者

厚朴錢半 乾姜一錢 草薢一錢 木香一錢 茯苓錢半 陳皮錢半 甘草五分

水煎去渣不應加參朮

寒滯於中中氣不能輸化故心腹疼痛痞滿不消焉厚朴散痞除滿乾姜溫中散寒草薢消寒滯以開胃木香調中氣以醒脾茯苓滲濕氣陳皮利滯氣甘草緩中氣也加以參朮助脾扶元使寒滯消化則脾胃調和而中氣健運痞滿無不消矣此溫中散滯之劑爲寒滯痞滿之端方

黃連瀉心湯 治痞滿脈弦數者

黃連八分 厚朴錢半 乾姜八分 人參八分 半夏錢半 甘草錢半 生姜七片

水煎去渣溫服

胃寒膈熱氣滯于中不能運化痰涎故痞滿不消焉黃連清膈熱以消痞厚朴瀉中滿以除

痞乾姜溫胃散寒滯人參扶元鼓胃氣甘草和中氣半夏燥痰濕更以生姜溫氣散寒滯也  
水煎溫服使膈熱頓化則胃氣調和而寒滯無不消焉有痞滿之不除乎此寒熱並用鼓舞  
胃氣之劑為胃虛膈熱痞滿不消之劑方

東垣失笑散 治痞滿脉弦虛沉瀼者

黃連 五錢

厚朴 一兩

白朮 兩半

人參 五錢

乾姜 一兩

枳實 一兩

茯苓 兩半

半夏 兩半

甘草 五分

製為散每服三服滾湯下

胃虛寒滯膈熱不化故心氣不降脾胃不磨乃成痞滿焉黃連清膈熱厚朴瀉中滿白朮助  
脾運化人參益胃扶元乾姜溫中散寒枳實消痞除滿茯苓滲濕氣甘草和中氣半夏化痰  
涎以醒脾氣也俾寒化氣調則膈熱自解而胃氣溫暖脾元健運何痞滿之不除哉此疎補  
兼行寒熱並施之劑為胃寒膈熱痞滿之劑方

木香順氣散 治心腹痞滿脉沉者

木香 兩半

厚朴 兩半

蒼朮 兩半

青皮 兩半

澤瀉 兩半

乾薑 八錢

吳茱 八錢

草薢 一兩

半夏 兩半

益智 兩半

製爲散白滾湯下三錢

寒滯於中胃陽不能輸化濁陰窒塞而清陽倒置故心腹痞滿焉蒼朮燥濕強脾厚朴散滿除濕木香調中氣醒脾胃草薤消寒滯快胸膈青皮破逆氣以平肝澤瀉瀉濁陰以利濕吳茱調中降逆乾姜煖胃散寒半夏燥濕化痰益智開心添志意也俾寒涎滯氣消散則脾胃溫煖調和而健運有常濁陰自化痞滿無不消矣此溫中調氣之劑爲寒滯痞滿之劑方

消痞丸 治心下痞滿或痛或脹脈沉實者

蒼朮

兩半炒

厚朴

兩半製

山稜

兩半醋炒

蓬朮

兩半醋炒

檳榔

兩半

草果

兩半炒

枳實

兩半炒

木香

兩半

小茴

三兩炒

澤瀉

兩半

青皮

兩半炒

針砂

三兩醋炒

爲末糊麩糊丸姜湯下三錢

心下痞滿或痛或脹乃氣滯夾積非尋常痞滿之只在氣分者可比擬焉蒼朮燥濕強脾厚朴寬中散滿山稜消血積蓬朮削氣積檳榔破滯氣以攻堅枳實消宿積以寬脹草果祛滯散寒針砂磨堅削積木香調氣化以醒脾胃小茴溫膀胱以調氣化青皮破逆氣澤瀉瀉濁陰丸以麩糊之消下以姜湯之散俾積化痞消則胸膈廓清而或痛或脹無不並退矣此消痞劑積之劑爲心下痞滿或痛或脹之劑方

六君湯

見濕症

龍膽瀉肝湯

見面症

知柏地黃湯

見婦科鼻衄

八味丸

二陳湯

補中益氣湯

俱見中風

二陳二朮湯

見脾胃

枳朮丸

見傷食

小柴胡湯

見發熱

噎膈

三陽結謂之膈三陽者乃大小腸膀胱也膀胱熱結則津液涸小腸熱結則血脉燥大腸熱結大便閉三陽結便閉不通則火反上行而噎與膈俱飲食不得下

內因

虛鬱失志醇酒膏粱或惱怒動其肝火或淫慾傷其精血血液衰耗胃脘枯槁則飲食難下而隔所由成思慮傷神三焦閉塞則咽噎不利飲食難入而噎成焉

外證

噎有閉塞意隔有拒格意噎枯在上咽噎壅塞飲雖可入食不得下隔枯在下胸膈痞塞食雖可入至胃復出或食下而眼白口開氣不能順或食入而心胸刺痛帶痰吐出

辨證

食不得入是謂有火此噎症也食不得下拒格而出謂之隔症氣膈胸脇疼滿血膈心胸刺痛火膈口舌乾燥痰隔惡心胸滿食隔惡食拒按若咽中結核咯吐不出謂之梅核氣噎乃陰氣

不降五藏所生隔乃陽氣不升六府所出

### 脉法

脉數無力爲血虛脉緩無力爲氣虛弦滑有力爲痰阻脉數有力爲熱結血虛者左脉無力氣虛者右脉無力痰凝者沉滑而大氣滯者沉伏而濇火氣冲逆脉來數大痰血積滯脉來澀濇

### 治法

順氣調脾以舒其意清痰降火以安其神養血生津以培其本抑肝解鬱以治其標

### 辨治

健脾理痰防燥劑有妨津液養血生津恐潤劑碍於中州但當審其陰傷火旺以養血爲亟脾傷陰盛以溫補爲先憂志盤礴火鬱閉結神不大衰脉猶有力可以倉公河間法下之則關扃自通膈間痰盛又當微微湧吐然後治下或蜜鹽下導亦可俾大便一通則痰消火降而陰潤血滋自然津液上奉噎膈無不自通膈塞咽閉似乎氣滯然中氣不運法當健脾補氣糞結如羊屎似乎血熱然血液衰耗又當滋腎養血若反用香燥助火重耗津液噎膈恐反轉甚或遽投滋潤養血恐資痰氣必致轉增滯悶惟黑瘦之人確見陰虛內熱方可血枯治之如脾胃虛而胸膈不利者六君子湯加丁沉二香噎膈嘔吐異功散加芎歸胃火內膈四君湯加酒炒苓



連胃寒嘔吐六君湯加木香炮姜實積內膈指迷七氣湯汚血阻膈局方七氣湯加桃仁乾漆  
拌炒去漆用大便秘結六君湯加當歸白芍火逆拒格六君湯加黃連山梔痰滯阻膈六君湯  
加水香胆星正氣不升膈氣閉塞四君湯送開關利膈丸吐涎沫如雞子白非人參白朮訶子  
益智不能收攝其關津氣逆阻膈六君子湯加檳榔沉香陽虛寒膈六君湯加肉桂附子熱結  
內膈橘皮竹茹湯加枳實黃連噎證聲不出加竹茹五味子噎中有塊是痰氣阻結六君湯加  
枳殼南星膈間刺痛是瘀血歸尾桃仁煎沖韭汁童便痛甚便閉加大黃結氣嘔逆五噎丸欬  
嘔上氣五膈丸血枯噎食地黃麥冬煎膏入藕汁人乳童便蘆根汁酥蜜桃仁泥和勻細細呷  
下火逆噎食梨汁藕汁煎膏蜜收不時噉化噎下有痰加竹瀝噎食氣不和諸七氣湯食物下  
噎屈曲自膈而下此汚血在胃脘四物湯加韭汁姜汁竹瀝童便驢尿牛羊乳蜂蜜煎膏潤利  
之後以代抵當丸下其瘀冷積阻結理中湯加川烏蜀椒川連巴霜皂莢末蜜丸涼水送必下  
後以四君子湯加黃耆橘紅砂仁調理大便秘結時進開關利膈丸更以啄木鳥去毛搗骨熬  
膏入射一錢蜜收貯有有嘴磁器勿令泄氣病人時時嗅之

死證

年滿六十者難治糞如羊屎者不治大吐白沫者不治胸腹嘈痛如刀割者死不絕酒色不戒

憂恚者皆不治

用藥

二陳湯加白朮枳殼清痰加竹瀝姜汁降火加竹茹山梔開鬱加香附無芎抑肝加青皮白芍  
咽噎阻格爲血少加當歸韭汁胸臆滿悶爲氣逆加訶子沉香食下心痛吐出方止爲瘀血加  
韭汁薑汁腹硬便結食反上奔此下焦實熱加大黃桃仁泥虫加白驢溺火加熱童便血枯合  
四物湯氣虛合四君湯俱加竹瀝薑汁童便乳酪膈病初起血液未枯可用沉香豆蔻檀香不  
可遽投膩補病久津枯可用當歸白芍白蜜蘆汁不可徒事辛香燥熱諸藥

選方

五汁飲 治噎症脉澹濡數者

沉香汁

生姜汁

韭根汁

蘆根汁

甜竹瀝

上俱一杯

和勻重湯煮服

氣鬱血滯痰涎不清阻遏清陽之氣故成噎塞焉蘆根汁清胃解熱生姜汁散痰豁涎韭汁  
活血化血滯沉香汁順氣調氣滯甜竹瀝化痰滋液以除噎也和勻煮服使痰化氣行則血  
液濡潤而咽噎肅清氤氳之氣無不分布何患噎塞之不痊哉此降火行痰化氣活血之劑

爲痰瘀噎塞已成噎症之專方

七聖湯 治膈症脉弦濡數者

川連 八分 人參 八分 白蔻 八分去殼炒 半夏 錢半 茯苓 錢半 生薑 七片 竹茹 三錢

水煎去渣溫服

胃脘之陽爲濕熱所傷胸中大氣不能周流分布故成膈症焉黃連清熱燥濕以清膈氣人參補氣扶元以鼓胃氣白蔻流動胸中大氣半夏消化痰滯濕氣茯苓滲濕清脾竹茹清胃解鬱生薑散鬱痰涎以開膈塞也水煎溫服使熱化氣調則痰涎自散而胸宇廓然膈塞無不開通矣此清膈扶元之劑爲濕熱痰膈之專方

湧痰湯 治噎塞脉沉濇者

梗桔蘆 錢半 江枳殼 錢半炒 新會皮 錢半 粉甘草 八分 恬瓜蒂 五枚

水煎去渣服畢探吐

痰伏氣滯宗氣納於胸中不能流行分布而清陽之氣亦不能升此噎塞成於氣結焉桔梗蘆清咽利膈善湧伏結之氣江枳殼破滯寬胸能開滯伏之結會皮理氣化痰甘草緩中和藥瓜蒂發越胸中之實結也一吐而胸中之痰結無遺何患噎塞之不開哉此開結湧痰之

劑爲痰伏氣結噎塞之端方

開關利膈丸 治膈塞脈沉實者

大黃

三兩

厚朴

兩半

檳榔

兩半

人參

兩半

枳實

兩半

當歸

三兩

藿香

三兩

木香

兩半

甘草

八分

爲末水酒丸米飲下三錢

熱實壅結腸胃傳化不行而清陽分布失職津液無由下潤故大便燥結膈塞不通氣反上迫焉大黃蕩滌熱壅之結枳實消化痞滿之氣厚朴散滿寬中檳榔破滯攻實藿香開胃氣木香調中氣人參扶元鼓胃氣當歸養血榮胃口甘草緩中和諸藥也水酒丸米飲下使脾胃輸化有權則熱實壅結自開而津氣四沍大便無不通膈塞無不痊矣此推蕩之劑爲熱實塞膈之端方

五噎丸 治噎嘔脉緊細者

附子

一兩

人參

兩半

乾薑

一兩

白朮

二兩

桂心

一兩

細辛

五錢

蜀椒

一兩

茯苓

兩半

吳茱

一兩

橘皮

兩半

爲末煉蜜丸每服二三錢滾湯下

胃虛寒滯胸中陽氣蘊結不開不能分布而肝氣上逆故噎塞嘔逆焉附子補火扶陽以禦寒人參扶元補氣以鼓運白朮健脾燥濕乾薑溫胃散寒陳皮利氣茯苓滲濕細辛散少陰之寒蜀椒逐中州之冷肉桂暖血散寒吳茱萸平肝降逆也蜜丸湯下使陽氣漸回則寒滯自散而肝逆無不平結氣無不開何噎嘔之不痊哉此溫補散寒之劑爲胃寒噎嘔之端方

五膈丸

治肢冷飲食不下脉緊細數者

麥冬

三兩  
去心

附子

一兩  
炮

人參

一兩

乾姜

一兩  
炒

遠志

一兩

桂心

一兩

細辛

五錢

蜀椒

一兩  
炒

甘草

五錢

爲末煉蜜丸食前含一丸細細嚼下

火土兩虧寒邪深襲清陽不能上奉故飲食不下謂之噎食焉五噎五膈二丸同用參附椒辛姜桂之屬一以肝氣上逆胃氣不下而噎嘔故用茱萸以疎肝降逆蒼朮以健胃通津一以腎氣不蒸肺胃枯槁而不納故用冬草以滋肺和胃桂附以補火生土又噎嘔而藥食可進者頻與小丸調之膈塞而飲食不納者時用大丸噙之其立法之詳如此

局方七氣湯

治噎食脉濇者

人參

錢半

肉桂

錢半

半夏

錢半  
製

甘草

八分

生姜

七片

水煎去渣溫服

七情過度志念不伸痰氣不化而鬱結於胸故噎食不下焉人參扶元以助氣化肉桂暖血以舒鬱結甘草緩中和胃半夏燥濕化痰生薑散痰涎以開噎塞焉使鬱結解散則心志和平而七情之氣無不伸何噎塞之不瘳哉此扶元解鬱之劑為七情鬱結噎塞之端方

代抵當丸 治血瘀膈塞脉濇數大者

大黃

三兩 醋煮

桃仁

三兩

芒硝

兩半

蓬朮

兩半 醋炒

甲片

兩半

歸尾

三兩

生地

三兩

肉桂

七錢 去皮

為末煉蜜丸上部噎化中部食遠下部空心日以百勞水煎湯調下以下黑血為度

血瘀胃口胃氣不化阻遏清陽之氣故膈塞於中食入反出焉大黃蕩滌醋煮入血以通幽桃仁破血生用功力更銳利蓬朮攻堅削結甲片透絡通經歸尾通經破瘀血生地涼血生新血反佐肉桂走血分以開瘀結也蜜丸噎化使瘀血既消則胃口清和而清陽無阻遏之虞大便一通何膈氣之不順哉此破瘀攻下之劑為瘀阻膈塞之端方

蜜煎導法 治大便不通上冲吸門脉濡濇者

白蜜 一斤

入鹽少許煎至稠韌可捻挺子以導之



大便不通清氣閉塞濁氣上冲吸門故咽噎不利噎食不下焉白蜜甘以潤燥食鹽鹹以下結煎以導之使燥潤結開則大便自通而濁降清升咽噎順利噎塞無不痊矣此潤燥通閉之法爲血虛人下閉上噎之端方

捷徑法 白馬溺一通白蘿葡汁一斤生薑汁半斤煎膏每服三匙入礪砂青黛沉香研和細末六厘白湯調化溫服噎膈無不漸開

二陳湯 四物湯 四君湯 並見中風 六君湯 見濕症 理中湯 見中寒 異攻散 見唇口 指迷七氣湯 見瘧滿

橘皮竹茹湯 見嘔吐噦門

### 反胃

下焦吐者從乎寒食入反出是謂無火合兩說而並衡之其爲真火衰微寒邪內伏而胃氣不化不能熟腐水穀則一

### 內因

男子精未充而御女女子經未通而交接或富後貧之失精先貴後賤之脫營抑鬱無聊而寄情詩酒艷冶當前而縱飲高歌皆能釀成痰火消燦真陰則火不歸原而食入反出

### 外證

朝食暮吐暮食朝吐或食色卽吐或再食則吐必心胸痞悶大便溏薄往來寒熱噤腐吞酸

辨證

損傷胃氣則吐脾不運化亦吐中焦積熱而吐下焦虛寒而吐色黃白枯萇爲虛寒色紅赤潤澤爲實熱

脉法

跌陽脉浮而濇虛而微弦而遲小而滑均爲反胃右尺濡弱亦成反胃

治法

宜開胃順氣以調其上培脾扶土以和其中更當壯火祛寒回陽溫下他如化痰開鬱抑肝鎮墜諸法

辨治

反胃熱微見厥四逆湯嘔吐穀不得下小半夏湯反胃嘔吐大半夏湯吐而渴飲茯苓澤瀉湯吐出原物不化理中湯加丁附川連邪熱不殺穀異攻散加沉香川連歸芍生地冷涎反出心疼藿香安胃散或六君子湯加丁香藿香咽噎阻塞胸悶香砂枳朴暫開結滯破氣過外不運異攻散加木香砂仁氣滯痞塞實痛平胃散加藿香砂仁胃虛中氣不運四君子湯加黃耆橘

紅砂仁小便不利桂苓丸加半夏澤瀉甘草生姜虛人反胃多渴七味白朮散食入一日半日  
吐出如故二陳湯加丁香藿香雞內金虛加白朮炮姜燥結便閉開關利膈丸血液枯耗人參  
固本丸胃反上氣食入卽吐蘆根荈根煎服不應加竹茹生姜反胃困極垂死人參一二兩濃  
煎加姜汁頓服寒加桂附虛寒不能生土食反出附子一枚切開去上一片鏤空入丁香四十  
九粒仍將一片掩上扎定生薑自然汁煮熟焙乾爲末每用一匙置舌上津唾徐徐嚥下虛甚  
加人參一兩駕馭之若孤寡悒鬱之人初宜逍遙散久宜歸脾湯火衰不能生土八味丸加丁  
香間進黑錫丹精衰不能蒸騰清氣於上咽噎閉塞強食卽吐六味丸加肉桂五味不應再加  
附子陽虛不能統運嘔逆便閉人參附子同大黃攻之瘀血在膈阻滯代抵當丸陳年反胃虎  
肚酥炙爲末獨參湯送或貓胞炙末加腦射陳酒調服胃寒痰滯食不納狗寶爲末酒調服後  
皆以理中四君八味調理陳香員一枚去穢入姜汁拌生附子末一兩薑渣濕紙裹煨焙末每  
服五七分至一錢陽虛氣滯人反胃効若反胃大吐白沫糞如羊屎者不治

用藥

二陳湯加藿香豆蔻木香砂仁蘇梗香附食滯加神曲麥芽助脾加人參白朮抑肝加白芍沉  
香溫中加丁香益智壯火加肉桂炮姜甚者附子理中湯水中補火八味丸伏龍肝煎湯扶土

糯米汁煮藥淨脾代頰鎮逆烏鉛抑肝初愈切不可驟與淡粥恐動胃氣當以人參五錢陳皮一錢陳倉米一兩煎湯細啜旬日之後方進稀糊軟飯不然恐倉廩未固每至輒復難治

選方

木香調氣散

治氣滯反胃脉沉者

方見 呃逆

滋血潤腸湯

治血死血枯反胃脉濇滯者

大黃

錢半

生地

三錢

桃仁

三錢

白芍

錢半

當歸

三錢

紅花

六分

枳殼

一錢

水煎去渣溫服

乾血內結血死而枯阻遏胃氣胃口不能清和故食入反出焉大黃蕩熱通幽當歸養血潤燥桃仁破瘀血以化結生地涼血熱以滋陰枳殼破氣化滯白芍斂陰生血紅花活血以行死血也使血結頓開則乾血自化而胃口肅清血枯自潤何反胃之不痊哉此養血破瘀之劑為血結血枯反胃之端方

滋血清肺散

治反胃火熱上冲脉數者

生地

五兩

黃連

兩半

白芍

兩半

黃芩

兩半

當歸

三兩

山梔

兩半

甘草

一兩

黃柏

兩半

為散水煎三錢去渣溫服

火熱上冲心氣不降而胃氣不化故食入反出謂之火逆反胃焉黃連清心脾之火生地滋九地之陰黃芩清肺腸之火黃柏清腎膀之火山梔清三焦之火當歸養胃脘之血白芍斂陰和肝甘草緩中瀉火也爲散水煎使陰血得滋則火熱自降而胃氣肅清納化如其常度安有食入反出之患乎此清熱滋陰之劑爲火逆反胃之端方

藿香安胃散 治反胃食不化脉細者

藿香 三兩 人參 兩半 丁香 兩半 橘紅 兩半

爲散每服三錢生姜三片水煎和渣服 火虛加熱附子

胃虛寒滯胃氣不化不能熟腐水穀故食入反出原物焉人參扶元補胃虛丁香溫中散寒滯橘紅利氣除痰藿香開胃快膈更以生姜溫胃散寒滯焉俾寒滯消散則胃氣調和而水穀腐熟何患嘔吐原物之不除哉火虛加熱附子乃補火生土之法此溫補和胃之劑爲胃虛寒吐原物之端方

茯苓澤瀉湯 治反胃欲飲水脉沉者

茯苓 三錢 白朮 錢半 澤瀉 錢半 肉桂 八分 甘草 五分 生姜 七片

水煎去渣溫服

水飲內停胃氣不化而津液不能上奉故渴欲飲水食入反出爲水逆反胃焉茯苓清肺氣以分布津液澤瀉瀉膀胱以搜滌停飲白朮健脾制水甘草和胃緩中肉桂溫經化氣生姜溫胃散飲也俾飲化土強則胃氣雄健而納腐有欲水精四布渴飲吐逆自痊矣此利水回津之劑爲飲停吐逆之端方

桂苓丸 治寒飲不化反胃脉緊細者

肉桂

三兩  
去皮 茯苓 三兩

爲末米飲糊丸每服三錢沸湯下

寒飲不化胃氣逆上不能熟腐水穀而輸納無權故胃反嘔吐焉肉桂溫經暖血力能補火散寒以平逆氣茯苓清肺和脾性善滲濕條飲以清胃府也飲丸湯下使胃煖氣行則寒飲自化而反胃自平嘔吐無不止矣此溫中滌非之劑爲停飲不化反胃之端方

人參固本丸 治反胃洞枯便燥脉澹者

人參

六兩  
生地 八兩  
天冬 四兩  
去心 熟地 八兩  
麥冬 四兩  
去心

爲末蜜丸酒煎四五錢和渣服

津枯胃燥大便乾結不通致清陽倒置濁陰上壅故胃氣不化食入反出焉固本丸雖主扶



陰抑陽然四味純陰之性僅用少許人參已覺味勝於氣矣而世本此方二冬二地各用八兩人參二兩幾乎羣陰剝陽之象况舉世醫流削去人參蓋知陰柔之味不得湯和之力每致奪食作瀉內經所遺無陽則陰無以生安望其有補益之驗歟

附子散 治火衰胃反脉細者

大附子 一枚

坐附子磚上四面着火逼碎生姜一斤搗自然汁浸附再炙再浸炙至姜汁盡爲末米飲下一二錢

命門火衰不能生土而納化無權故食入反出食不消化焉附子補火壯陽大能生土熟腐水穀變化精微姜汁浸炙更銳溫培之力此一味成方單刀直入使土溫胃厚則納化有權而胃氣蒸騰水穀自熟安有吐食不化之患乎此補火崇土之劑爲火衰不能生土吐食不化之端方

九伯餅 治反胃食下下卽吐涎沫脉弦滑者

南星

三兩

厚朴

兩半

人參

三兩

枳實

兩半

淡豉

兩半

半夏

兩半

木香

兩半

桔礬

三兩

甘草 八錢

爲末老米三兩打糊作餅瓦上炙熟露一宿日乾細嚼以薑煎平胃散送下

痰涎內滯胃氣不能消化故食不得下食下卽吐必帶痰涎而出焉南星燥濕薑汁製以散痰半夏消痰薑汁製以燥濕厚朴散痞滿枳實降逆氣木香調胃氣以醒脾甘草緩中州以和胃枯礬搜滌痰涎痰發越胃氣爲末作餅細嚼薑煎平胃散送下總以散痰涎平吐逆也使痰涎消化則脾胃清和而輸納如常何有胃反吐痰食之患哉此燥濕豁痰之劑爲反胃反吐逆之端方

小半夏湯 治反胃脉弦滑者

半夏 五錢 薑汁 一合

水煎半夏去渣冲姜汁溫服

濕痰內滯胃氣不化不能熟腐水穀故帶痰吐出焉半夏燥濕化痰能醒脾胃姜汁散痰開胃發越清陽也水煎溫服使痰涎消化則脾胃清和而納化如常安有食入帶痰吐出之患乎此開胃消痰之劑爲反胃吐痰食之端方

大半夏湯 治反胃脉虛弦者

半夏 一兩 人參 三錢 白蜜 一合

水煎去渣溫服

脾胃兩虛痰涎內滯不能運化精微而津液暗耗故食入於胃必夾痰上湧吐盡始已人參扶元補脾胃之虛白蜜潤燥滋津液之耗半夏開豁痰涎以醒脾胃也入蜜水煎使痰涎消化則脾健胃潤而納化如常何有胃反嘔吐之患哉此豁痰扶元之劑為元虛夾痰胃反之端方

金桃酒 治反胃吐酸脉弦者

古銅錢

四文碎 核桃肉 一斤研

浸燒酒六七斤封口隔水煮一時埋地一二時空心溫飲一杯

肝氣上逆胃土受制胃陽不能敷化精微故胃反吐酸焉金能制木以平肝逆桃能補腎以益胃虛酒性通行以雄胃氣也空心溫飲使肝逆頓平而胃氣自化安有胃反吐酸之患乎此益腎平肝之劑為肝木乘土反胃之端方

四逆湯

附子理中湯

理中湯

並見中寒

異功散

見口唇

六君湯

見濕症

平胃散

見暑症

代抵當丸

開關利膈丸

並見噎膈

七味白朮散

見傷食

二陳湯

四君湯

六味丸

八味丸

逍遙散

歸脾湯

俱見中風

黑錫丹

見眩暈

吞酸

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

吞酸方目

菜連丸

嘈噯

內因

外證

脉法

治法

辨治

用藥

嘈噯方目

越鞠丸見鬱症

佐金丸見火證一名回令丸

惡心噯氣附

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

惡心方目

理陰煎

消渴

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

死證

用藥

消渴方目

人參竹葉湯

宣明麥門冬飲子

易老門冬飲

麥冬飲子

生津甘露飲

錢氏白朮散

生地黃飲子

慈石薺苳丸

加味地黃湯

生料固本丸

甘露飲子

瀉黃散

捷徑法

癲狂

內因

外證

辨證

脈法

治法

辨治

死證

用藥

癲狂方目

清心牛黃丸

生鐵落飲

定志丸湯

千金防己地黃湯

半夏茯神散

妙功丸

天地膏

牛黃瀉心丸

靈苑方

神應丹



苦參丸

大黃一物湯

降龍丹

安神滾痰丸

抱龍丸

三黃石羔湯

大劑獨參湯

癩證

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

死證

用藥

癩證方目

戴人三聖散

清神湯

硃砂安神丸

靈妙丹

礬石丸

粉代散

五癩丸

三癩丸

驚悸怔忡

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

驚悸怔忡方目

平補正心丹

鎮心丸

琥珀養心丹

補膽防風湯

獨活湯

珍珠母丸

千金茯神湯

龍齒清魂散

千金定志丸

半夏麻黃丸

健忘

內因

外證

辨證

脉法

治法

辨治

用藥

健忘方目

寧志膏

壽星丸

朱雀丸

栝子養心湯

大聖枕中方

即孔聖枕中丹

二丹丸

代抵當丸

吞酸

諸嘔吐酸皆屬於火酸乃木之味由火盛制金不能平木肝火乘胃則濕熱鬱遏而作吞酸

內因

胃家濕熱素盛飲食不能遽化清不升而濁不降鬱成酸味上逆欲吐復入謂之吞酸

外證

酸味刺心欲吐不吐覺胸中無奈是為吞酸吐出酸水上下齒酸澀不能相對乃為吞酸

辨證

吐酸乃津液上升凝滯清道吞酸是津液內蘊鬱遏胃脘略不得出嚥不得下總是濕熱內鬱寒邪外束河間言熱言其本東垣言寒言其標當知鬱熱在胃木從火化為酸之熱客寒犯胃

頃刻成酸爲酸之寒口吐清水乃水飲停蓄或虫攻藏府動濕或胃虛寒滯不化

### 脉法

弦滑爲痰滯於內浮緊爲寒束於外沉遲爲中氣寒洪數爲火熱盛

### 治法

初宜辛溫散其標寒久宜辛涼解其鬱熱結散熱去則胃氣清和而酸味自已

### 辨治

吞酸爲中氣不舒痰涎鬱滯先須開提疎發然後調中和胃吐酸是中氣虛弱痰涎不化先宜調中州然後扶陽崇土吐清水宜溫和中焦或虫或飲當隨證搜滌吐酸吞酸似爲小恙不知日久淹纏實爲疴隔反胃之漸

### 用藥

二陳湯加吳茱萸黃連以抑肝火山梔蒼朮以行濕熱食不消化平胃散加香附神麴朝食肥甘美好之物至晚心腹刺酸吐出者是爲血虛火旺宜加歸芍以協濟之若勞役過度病後胃虛食入輒酸少頃即止者此胃弱難化宜加參朮以健運之

### 選方

茱連丸 治肝火乘胃吞酸脈弦數者

黃連

三兩

吳茱

兩半

黃芩

三兩

蒼朮

三兩

陳皮

三兩

為末神麩糊丸白湯下一錢

肝火乘胃濕熱遏鬱不化故酸味刺心是為吞酸黃連清心肝之火兼能燥濕黃芩清肺腸之火力主降熱吳茱降逆氣以疎肝蒼朮燥脾濕以舒鬱陳皮利氣以除痰和胃也丸以曲糊下以白湯使肝鬱解而肝火平則濕熱化而胃氣清和安有吞酸之不痊乎此平肝解鬱之劑為濕熱內鬱吞酸之端方

二陳湯

見中風

平胃散

六君湯

並見濕症

藿香溫胃散

見反胃

越鞠丸

見鬱症

理中湯

見中寒

嘈噉

嘈噉者痰因火動乃噎膈反胃之漸

內因

恣食厚味嗜飲酒酪使濕中生熱痰火內熾發為嘈噉夜分心嘈難忍者是血少陰虛陽氣陷入陰中也陰火沸騰故亦令嘈噉

外證

嘈噉乃似饑非饑似痛非痛有若熱辣不寧之狀若五更心嘈是愁謀思慮傷其血勞心虧損耗其神

脉法

脉緊數滑痰火內熾沉弦細滑膈有留飲右關弦急木乘土位終歲心嘈脉必細數此火能燬物其壽必夭

治法

宜開鬱行氣降火清痰若陰分血分稍虛又當滋陰以制其火養血以潤其痰不可泛用苦寒辛燥有傷真氣

辨治

痰因火動治痰須兼治火食鬱發熱散熱還當消導濕熱者豁之氣鬱者開之脾虛嘈噉六君子湯合佐金丸食後心嘈保和丸濕痰氣鬱保和丸二錢越鞠丸一錢嘈噉多火二陳湯如薑汁炒黃連痰多導痰湯加木香黃連薑汁炒山梔亦可解鬱火嘈噉倦怠六君子湯如撫芎蒼朮炒山梔不應須各佐金丸饑多食少四君湯加白芍陳皮薑汁炒川連婦人悒鬱心嘈逍遙散合佐金丸陰虛心嘈六味丸加麥冬五味



用藥

二陳湯加香附山梔黃連蒼朮陰虛地黃湯加麥冬川貝血少四物湯去川芎加麥冬氣虛保元湯加麥冬五味心血虛少心嘈歸脾湯加麥冬栝子仁胃寒心嘈理中湯加烏梅五味脾虛嘈囉異功散加白芍烏梅虫症心嘈烏梅丸加白蜜樞子肉

選方

二陳湯 四君湯 四物湯 逍遙散 歸脾湯 六味丸 俱見中風 六君湯 見濕症 導痰湯 見疾症

左金丸 見火症 越鞠丸 見鬱症 保和丸 見傷食 保元湯 見吐血 理中湯 見中寒 異功散 見口唇 烏梅丸 見傷寒厥陰

惡心 噯氣附

一見飲食便發畏惡謂之惡心

內因

惡心非心經病乃胃虛有火有痰噯氣是胃中氣鬱不化胃氣不能宣通而噯發大聲

外證

惡心聲短無物心下欲吐不吐兀兀不甯如畏舟車之狀噯氣聲大無物食罷噯出腐氣為實不因飲食常噯空氣為虛

辨證

胃寒惡心必嘔吐清水痰火惡心必煩渴嘔酸

脉法

弦滑多痰飲滑數多痰火緊細者胃寒不化遲微者胃弱陽虛

治法

調中開胃為主寒宜溫散熱宜清降痰宜開導湧泄虛宜培補調中

辨治

實邪惡心邪去則止其來速其去亦速虛邪惡心其來漸其去亦緩必胃氣大復方可全愈

用藥

二陳湯加黃連山梔藿香竹茹傷食加山查麥芽氣滯加枳殼白蔻胃弱異功散挾痰六君湯

胃寒理中湯加烏梅肉桂陰虛寒滯理陰煎加丁香沉香

選方

理陰煎 治陰虛寒滯惡心脉遲濇者

熟地 五錢 歸身 三錢 肉桂 錢半 炮姜 錢半 炙草 八分

水煎去渣溫服

陰血內虛寒邪滯遏陰氣上逆而肝胃不調故惡心不止焉熟地填補陰精以資血歸身滋養營血以榮經肉桂暖血分散寒灸草緩中氣益虛炮姜煖中氣以逐冷也水煎溫服使陰血充足則寒邪自解而胃氣調和惡心無不瘳矣此補陰逐冷之劑為陰血虛寒惡心之方

二陳湯

見中風

異功散

見口唇

六君湯

見濕症

理中湯

見中寒

消渴

二陽結謂之消二陽乃手陽明大腸主津液足陽明胃經主血氣津血不足發為消渴

內因

水之本在腎源在肺真水不竭何渴之有人惟酒色是耽辛熱太過或肥甘炙燻適其口丹砂玉石濟其私真水內竭虛火炎灼則津液乾枯而消渴生焉

外證

上消屬心多飲善渴溺濇而頻中消屬胃善食善消溺赤便閉下消屬腎飲隨溺出稠濁如膏

辨證

上消於心移熱於肺中消於胃移熱於脾下消於腎稀移熱於膀胱藏府合消五液枯槁上輕中重下危消病日久津傷火燦能食者未傳腦疽背癰不能食者未傳噎膈反胃

脉法

胃脉洪數消穀善饑寸脉滑數消散善渴尺脉細數消腎洩濁大率數大者生細微者死沉軟者生堅強者死

治法

滋腎水降心火滌腸胃燥熱濟身中真陰使脉絡舒散不結津液資生不枯氣血順利不滯則三消無不自痊

辨治

外感傳裏過食辛燥善渴喜冷當寒涼以直清其熱內傷真氣法後亡津善渴喜熱當甘溫以耑濟其陰初宜清心潤肺久宜滋腎養脾蓋津液皆統於腎腎暖則上朝而肺潤腎冷則下陷而肺枯故八味腎氣丸爲消渴良藥精華悉運於脾健則精微敷布脾旺則心腎交通故參苓白朮散爲收功神劑

死證

上消心火亢極肺金受囚不能分布津液而飲一澀工者死中消胃火消燦脾陰困敗食已善  
饑下利厥冷者死下消腎陰枯涸邪火煎熬精溺時泄如油如脂者死

### 用藥

上消初宜人參竹葉湯久宜麥冬飲子中消初宜生津甘露飲久宜錢氏白朮散下消初宜生  
地黃飲子久宜七味地黃湯心腎不交水下火上不能蒸氣而消渴不止者桂附八味丸加麥  
冬五味脾胃虛衰不能交媾水火變化精微而渴者參苓白朮散心包伏暑消渴香薷飲合益  
元散心虛火熾消渴小便赤澀清心蓮子飲心膈蘊熱消渴宣明麥冬飲子老人津枯大渴易  
老門冬飲消中善食溺澀便閉蘭香飲子煩熱大渴甘露飲子口臭煩渴瀉黃散食已如饑面  
黃消渴七味白朮散面赤消渴生料固本丸加黃耆甘草石斛澤瀉枇杷葉渴飲水停小便不  
利五苓散加人參三消小便不臭反甜是脾氣下陷而津液失守七味白朮散溺浮桶面如猪  
脂溺澀桶邊如柏油此皆脾腎兩敗膏液下脫亟以腎氣丸白朮散合投可救十中一二

### 選方

人參竹葉湯 治上消熱盛脉數者

人參

錢半

黃連

錢半

麥冬

三錢 去心

黃芩

錢半

炙草

七分

山梔

錢半 炒

竹葉

三錢

水煎去渣熱服

心火刑金元津暗耗不能分布上朝故消渴不止焉黃連清心火以存陰黃芩清肺火以生水麥冬滋熱傷之津液人參補熱傷之元氣炙草緩中和胃竹葉清膈涼心山梔降火下行從小便而出俾熱降氣布則肺金清肅而津液得全消渴無不止矣此降火回津之劑為上消熱傷元津之端方

宣明麥冬飲子 治心移熱傳為膈消脉濡浮數者

人參

兩半

生地

五兩

麥冬

三兩 去心

五味

八錢

茯神

兩半 去木

花粉

三兩

知母

兩半

葛粉

七錢

竹葉

三兩

為末水煎五錢去渣溫服

移熱燥肺肺金不能清肅而生水之源乏竭於上故膈熱不解遂成消渴焉人參扶元補氣麥冬潤肺清心五味斂移熱以生津液葛粉解膈熱以舒清陽更以生地壯水之主知母滋腎之燥花粉清肺胃之火竹葉清心肝之火茯神安神定志以清水之源流也為末水煎使膈熱外解則肺金清肅而水得生源移熱自化何膈熱之不痊哉此疎熱生津之劑為移熱膈熱之端方



易老門冬飲 治老人津枯大渴脉濇弱者

人參

錢半

麥冬

三錢 去心

五味

錢半

茯神

錢半 去木

枸杞

三錢

甘草

五分

生姜

一片 蜜煮

水煎去渣溫服

元津兩虛不能滋榮百脉肺失清潤之體肺陰大虧故大渴不止焉宣明易老門冬二飲一散一飲均本生脈而易老差勝蓋明知重在旺氣易老專滋血氣治得其本矣

麥冬飲子 治上消屬虛熱脉虛浮數者

人參

錢半

麥冬

三錢 去心

五味

八分

茯神

錢半 去木

生地

五錢

花粉

三錢

知母

錢半

葛根

八分

炙草

五分

竹葉

錢半

水煎去渣溫服

虛陽內鬱灼燥肺金不能生腎水以上朝故消渴不止矣人參扶元補肺虛生地壯水滋真陰花粉清熱潤燥知母滋腎退熱五味收肺氣之虛耗茯神安心神之虛煩乾葛升清陽以解鬱竹葉療膈熱以涼心炙草緩中和胃也水煎溫服使金水相生則津液上奉而肺氣自雄水精四布何患上消之不瘳哉此保肺生津之劑為虛陽內鬱上消之專方

生津甘露飲 治中消伏熱脉數實者

石羔

五兩

知母

兩半

升麻

五錢

人參

兩半

桔梗

八錢

麥冬

三兩  
去心

山梔

兩半

蘭葉

三兩

白蔻

八錢去殼炒

當歸

二兩

白芷

八錢

黃連

兩半

木香

八錢

藿香

兩半

柴胡

五錢

連翹

兩半

甘草

五錢

爲末水煎三錢去渣溫服

肥甘過度蘊積於中不能分解而胃熱中消故善食善饑焉石羔清胃瀉火以存陰液知母清熱潤燥以益腎水人參扶元補虛甘草瀉火緩急桔梗清全解熱升麻散熱升清黃連清心脾之火山梔清三焦之火連翹清熱散結白蔻調氣和中柴胡疎鬱解熱當歸養血榮身木香調中氣白芷散胃熱藿香快胃和中麥冬清心潤肺蘭葉滌濕熱以除陳積之氣也使積熱頓化則真陰暗復而胃氣清和中消無不自解矣此清胃解熱之劑爲伏熱中消之方

錢氏白朮散 治胃虛中消脉弱者

白朮

二兩

人參

兩半

茯苓

一兩

藿香

兩半

葛根

一兩

桔梗

五錢

甘草

一兩

白蜜

三兩

熬

搗晒爲散每服五錢去渣溫服

胃氣虛衰求食以救故善食而肢體倦怠亦曰中消白朮補脾土以充飢人參扶元氣以充

胃甘草緩中和胃茯苓清肺和脾蜜香調胃氣葛根升津液白蜜資胃液潤燥桔梗利咽噎  
清金使金土相生則津液充潤而倉廩完復虛消無不自寧矣此補中潤燥之劑爲胃虛善  
食之端方

生地黃飲子 治下焦虛炎消渴脉虛數者

生地 五錢 人參 錢半 熟地 五錢 麥冬 三錢 去心 五味 八分 天冬 三錢 去心 石斛 三錢 甘草 五分

枇杷葉 三錢 剝盡

水煎去渣溫服 小便不利加茯苓

下焦虛炎肺金受燥不能分布津液上朝故消渴不止焉生地滋陰壯水以制虛炎熟地滋  
腎補陰以濟心陽天冬益陰潤肺麥冬潤肺凉心人參扶元生水甘草瀉火生金五味子收  
肺氣之耗散枇杷葉平肝氣之上逆石斛益陰以除虛熱也水煎溫服使腎水內充則虛陽  
自潛而陰精無不上奉何消渴之不瘳哉小便不利加茯苓乃水出高源源流並澤以上朝  
也何消渴之有此滋培潤燥之劑爲陰虛消渴之端方

慈石薺苳丸 治強中消渴不交精泄脉虛數細滑者

磁石 二兩 煨 熟地 四兩 人參 兩半 鹿茸 一兩 薺苳 二兩 茯苓 兩半 木豆 三兩 元參 兩半 地骨 兩半

石斛 兩半 花粉 兩半 沉香 三錢 豬腎 一對

爲末煮爛豬腎搗蜜丸空心沸湯下五錢

陽虛熱熾陽強不能統運津液以上敷下蟄故消渴於上精泄於下焉磁石引金入水熟地滋腎補陰鹽茸壯陽補腎以充督脉人參補氣扶元以益肺虛薺菀清肺金肅肺氣茯苓滲脾濕利肺氣大黑豆補腎虛潤燥潤元參清浮熱存陰金石斛平熱益陰天花粉清胃瀉熱地骨皮清肌退熱貢沉香降氣歸腎更用豬腎補腎藏乃血肉之味足以滋補形軀也俾腎陰充足則腎陽無不潛藏而陰自柔和安有強中精洩消渴不止之患乎此扶陽滌熱之劑爲強中消渴精洩之劑方

加味黃地黃湯 治腎虛消渴脈虛數者

生地 五錢 萸肉 三錢 澤瀉 錢半 茯神 錢半 山藥 三錢 丹皮 錢半 麥冬 三錢 五味 錢半

水煎去渣溫服

腎水有虧濕熱不化陰精不能上奉故消渴不止焉生地滋陰壯水萸肉秘氣滯精澤瀉利濕安腎勝茯神滲濕膏神志山藥補脾陰丹皮涼血熱五味斂津液以滋腎麥冬生津液以歸心二味加入地黃中得以交通心腎兼滋金水也水煎溫服俾濕熱頓化則腎水自充而

津液無不上奉安有消渴之患乎此滋腎水滌濕熱之劑為腎虛消渴濕熱不化之謂方  
生料固本丸 治津枯消渴脉瀦數者

生地 四兩 天冬 三兩 熟地 四兩 麥冬 三兩 人參 三兩

為末蜜丸米飲下三五錢

金水兩虧元陰暗耗津液不能上奉故消渴不止焉生地滋陰壯水天冬潤燥益陰熟地補  
陰滋腎水麥冬潤燥生津液人參扶元補氣以生腎水也蜜丸飲下俾濕熱既去則腎水自  
充而元陰完復經氣潤澤何消渴之不止哉此扶元潤燥之劑為金水不足消渴之謂方

甘露飲子 治胃熱消渴脉瀦數者

生地 三錢 天冬 三錢 熟地 三兩 麥冬 三兩 黃芩 半兩 枳殼 一兩 石斛 三兩 茵陳 兩半

甘草 五錢 枇杷葉 二兩 刷淨

為末水煎三錢去渣溫服

濕熱傷陰胃氣不化胃液不能上輸口舌故消渴不止焉黃芩清裡泄熱枳殼破滯化氣生

地壯腎水以滋陰天冬潤肺燥以生水熱地補陰滋腎麥冬潤肺清心茵陳瀉濕熱以清水

源石斛平胃熱以清胃氣生甘草緩中瀉火枇杷葉清肺抑肝為散水煎使濕既化則胃氣

清和而津液無不上奉何消渴之不已哉此清熱化氣之劑為濕熱傷胃消渴之劑方

瀉黃散 治胃熱消渴脉浮洪數者

石膏 五兩 防風 兩半 梔子 兩半 藿香 三兩 甘草 五錢

為散水煎三錢去渣入蜜少許服

火伏陽明胃府熱熾津液不能上榮故口舌乾燥消渴不已焉石膏清胃火之內熾防風疎

火伏之外淫藿香快胃氣以和中山梔子三焦以降火甘草瀉胃火緩中氣也水煎藥末入

蜜以潤之使經府兩解則肺胃肅清而津液得全何消渴口燥之足患哉此分解經府之劑

為胃火鬱伏消渴之劑方

捷徑法 水梨取汁入蜜熬膠不時嚙化二三匙

八味丸 七味地黃湯 並見中風 參苓白朮散 見脾胃 香薷飲 益元散 並見暑症 清心蓮子飲 見產後中風虛煩

蘭香飲子 見口唇 五苓散 見太陽 金匱腎氣丸 見濕症

癩狂

重陰者癩重陽者狂多喜為癩多怒為狂喜屬心怒屬肝二經皆火有餘之地凡謀為不遂抑鬱不得志者恒多癩證在府痰迷包絡時發時止狂證在藏痰伏心肝發時難禁



內因

痰火膠結陽亢心胸猖熾莫制如有靈神靈附體曰狂心血不足謀望高遠抑鬱不遂時當多言多笑曰癩

外證

狂病少臥不饑妄行不休甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋殺不畏水火罵詈不避親疎癩病意不樂語言有頭無尾穢潔不知獨有所見經年不已有狂之意不若狂之甚

辨證

用火乘心一時發越飛奔疾走涉水如平陸名之曰狂痰迷心竅言語失倫左盼右顧止發無恒時名之曰癩喜傷心以怒解之恐勝之憂傷肺以恐解之喜勝之

脈法

洪數堅實爲狂洪緩滑實爲癩緩滑濡浮者自愈沉小急疾者必死滑濡可治濇實難痊

治法

狂宜滋陰降火抑肝鎮心癩宜豁痰利肺鎮心安神

辨治

醉飽發狂宜鹽湯探吐金石過劑發狂三黃石羔湯加青黛板藍根傷寒胃熱便閉發狂調胃承氣湯怒火氣逆發狂生鐵落飲并奪其食氣食鬱久發狂保和越鞠二丸和服癩證不時舉發清心牛黃丸婦人崩產發狂清魂散去川芎隨證調治或舉卿古拜散按證制方癩狂似祟導痰湯加菖蒲竹瀝案本調治神虛崇乘燒蠶灰入硃砂酒下方寸匙灸鬼哭穴心風昏亂定志湯加竹瀝菖蒲汁痰迷心竅控涎丹續進定志湯言語戲笑失諭定志湯加姜汗竹瀝膈間疼痛是瘀血加琥珀鬱金思慮傷神歸脾湯加硃砂半夏心經蓄熱定志丸加牛黃苓連麥冬實者涼膈散加川連麥冬菖蒲根癩病昏亂千金防已地黃湯神不守舍半夏茯苓散神出舍空大劑獨參湯加竹瀝硃砂氣結痰閉神志不清四七湯虫積攻心癩狂吐沫妙功丸

### 死證

癩發如狂者不治真氣下泄者不治神脫目瞪者不治

### 用藥

二陳湯加苓連膽星瓜蒌枳實便閉加大黃痰閉控涎丹加白蜜牙皂癩加當歸生地棗仁遠志天麻風痰加全蠍白附心經熱盛牛黃清心丸驚怖病癩抱龍丸思慮傷神病癩歸腸湯兼服天地膏七情鬱結川鬱金七兩明礬三兩爲細末薄荷湯泛丸菖蒲根汁姜湯任下一二錢

選方

清心牛黃丸 治癩病脉滑數者

牛黃 三兩 膽星 六兩 黃連 三兩姜汁炒 當歸 三兩 甘草 三兩姜汁炒 辰砂 三兩

爲極細末蒸餅搗和蜜丸金箔爲衣生姜薄荷人參湯隨證任下

痰火內熾閉遏心包致神明失指遂成癩病焉牛黃清心豁痰當歸養血通絡黃連直折心火以甯心豨星清化熱痰以定志甘草瀉火緩中辰砂鎮心安神也丸以蒸餅之化白蜜之潤金箔爲衣助金平木以安神明生姜人參薄荷湯任下者審其宜涼宜溫宜散宜補隨病制宜無往不利俾痰化火平則心氣甯靜而心神無擾攘之慮何癩病之不愈哉此清心豁痰之劑爲痰火病癩之商方

生鐵落飲 治狂妄脉洪數弦急者

生鐵落 一斤砧上鉄花入水二斗煮至一斗 生石羔 五錢 生地黃 一兩 羚羊角 錢半 青防風 錢半 白茯神 二錢去木

白龍齒 三錢 黑元參 三錢 真金箔 一帖

爲末入鉄落飲中煮至二升去渣沖竹瀝一升分溫三服

肝火乘心心神鬱胃故狂妄不畏水火罵詈不避親疎焉生地滋陰壯水以濟上乘之火矜

羊清肝涼肺以安狂妄之神龍齒安魂定魄元參清熱存陰防風散鬱胃之邪石羔瀉陽明之火茯神安神定志金箔鎮心平肝生鉄落以墜熱平肝也冲竹瀝溫服使肝火頓平則心神順利而志意甯靜何狂妄之不痊哉此墜熱平肝之劑爲火逆狂妄之崩方

定志丸湯 治癩病脉沉濇者

人參 三兩 遠志 兩半 茯神 三兩 菖蒲 一兩

爲末煉蜜丸飲服三錢亦可作湯血虛加當歸挾痰加橘半生姜甘草

謀望不遂心氣抑鬱神明不能主宰故言語倫失時帶喜笑而病癩焉人參扶元以助心氣菖蒲通竅以慧心神遠志通腎交心茯神安神定志丸以煉蜜之滋養心液下以米飲之調和胃氣血虛加當歸養血榮心痰擾加橘半姜草以和胃散痰也洵爲扶元通氣開鬱抑鬱之劑或湯或丸挾痰挾氣並宜之

防已地黃湯 金 治癩病脉弦浮數者

生地 四錢 防已 錢半 甘草 錢半 防風 錢半 桂心 八分 姜汁 一杯

二防桂草酒浸絞汁地黃另咀蒸之亦絞汁并入姜汁和勻分三服

濕熱傷陰風乘火勢濕假風威故擾亂心包以病癩焉防風疎風勝濕生地壯水滋陰桂心

溫營血以平厥陰之邪防已瀉濕熱以理血分之邪甘草緩中調和脾氣姜汁散邪清理神明絞汁服之使風邪外解則濕熱自化而心包肅清焉有病癩之患此濕熱召風之劑爲肝風病癩之劑方

半夏茯苓散 治癩妄脉弦滑者

半夏

二兩

茯苓

兩半

棗仁

三兩

遠志

兩半

膽星

二兩

天麻

二兩

陳皮

兩半

木香

一兩

磁石

三兩

烏梅 三兩

爲散水一盞煎數沸入姜汁一匙調服三錢

心虛痰擾神明不能安於神舍故癩妄失倫語言無緒焉棗仁養心甯神茯苓安神定志半夏燥濕痰醒脾膽星清熱痰快膈遠志通腎交心磁石鎮虛墜熱天麻祛風化痰木香調和氣化陳皮利中氣以化痰也更以生姜散豁痰涎烏梅收斂耗散之氣而安神明也爲散煎服使痰化氣清則神志得養而癩妄無不甯語言無不清矣此豁痰養心之劑爲心虛痰擾癩妄之劑方

妙功丸 治癩病狐惑脉沉者

丁香

兩半

沉香

兩半

木香

兩半

乳香

兩半

射香

三錢

熊膽

一兩

白丁香

三百粒

雄者上

鶴虱

一兩

雷丸 二兩 陳皮 兩半 巴霜 五錢 赤小豆 三百粒 大黃 二兩 輕分 三錢 硃砂 一兩半

爲末簷麥麵一兩糊丸每兩十九丸硃砂爲衣溫水化服一丸小兒量減

虫積攻心神志惑亂故癩妄無知腹痛吐沫焉大黃下熱積以通腸巴霜下寒積以啓閉鶴虱祛濕殺虫雷丸化熱殺虫丁香溫中散滯力能止痛沉香順氣降逆性善寬胸木香調中氣乳香活血脉射香通竅殺虫雀糞降濁殺虫陳皮利中氣熊膽清府熱小豆利濕熱清血脉輕粉透絡脉通經氣更用蕎麥麵糊丸以祛濕熱辰砂爲衣以鎮心神使濕熱頓化則心神肅清而虫積自消腹痛吐沫無不止何狐惑癩病之不瘳哉此殺虫化積之劑爲虫積癩惑之端方

天地膏 治癩病脉滯者

生地 一斤 天冬 八兩 麥冬 八兩  
去心

二味煎汁入白蜜四兩煉膏白湯化服三匙

思慮傷神心液暗耗故心神失養癩妄失倫焉生地滋陰壯水上資津液以養心天冬益陰潤肺更滋津液以甯心麥冬潤肺清心以涵養心氣也入蜜煉膏使津液內充則心氣和平而心神得神化之用何癩妄之不瘳哉此涵養心液之劑爲心虛病癩之端方



牛黃瀉心丸 治邪實癩妄脉盛者

牛黃 五兩 大黃 五兩 腦片 一兩 硃砂 三兩

為末蜜糊丸生姜湯調化三錢溫服

邪實於裏膈熱壅塞不通故心竅閉遏神明失指乃成癩病焉大黃蕩滌熱實以通壅塞牛黃清利熱痰以開心竅冰片散熱辟邪硃砂鎮心安神蜜丸以潤之姜湯以散之使熱壅頓化則心氣廓然而神明得其主宰何病之不痊哉此下熱清心之劑為癩壅病癩之謂方

靈苑方 治癩妄失志脉濇者

棗仁 五兩 硃砂 兩半 乳香 五錢

為末蜜糊丸溫酒化下三錢

心血失榮心氣不能宰神明之用故志意惶惑無定癩妄失其倫序焉乳香活血脉以榮心硃砂鎮心神以定志棗仁涵養心神以安癩妄也丸以白蜜潤心液化以溫酒和營血使心血融和則心液充足而心神得養癩妄自甯何失志之有哉此養心安神之劑為心虛失志病癩之謂方

神應丹 治虛癩脉數者

硃砂 六兩

研極細猪心血六枚和蒸餅丸參湯下三錢

心血內虛心氣失所榮養故虛陽浮越而心神不寧故癩妄失倫焉生人參補心氣以生心血猪心血補心血以養心神獨硃砂一味體重色赤內含真永鎮墜心神之飛揚以安定神志之浮越乃單刀直入之將以治虛妄癩癩之病更以心血參湯協濟其成功也俾心血內充則心氣雄而心神得養虛妄自寧何痴癩之不痊哉此安神定志之劑爲心虛病癩之方

苦參丸 治狂痴大叫脉洪濇者

苦參

一斤蜜  
蒸拌

爲末蜜丸薄荷湯下三錢

濕熱傷陰火熾莫制神明被擾主宰少權故狂妄失倫大叫不止焉苦參性寒降火味苦燥濕蜜拌蒸過苦寒之性變爲和平庶無傷胃奪食之虞丸以白蜜散以薄荷使濕熱頓化則心火降而心神志甯何狂妄大叫之莫制哉此清降濕熱之劑爲濕火擾神狂叫之方

大黃一物湯 治狂妄無制脉數實者

大黃 三兩

酒浸一宿日乾水煎去渣溫服

火壅內實三焦不能清利故神志不寧狂妄莫制焉非大黃蕩滌熱實之品何以迅掃三焦壅熱搜滌腸胃燥結而治狂妄之莫制此蕩滌之品為熱壅狂叫之端方

降龍丹 治肝火乘心志狂脉浮者

黑鉛 一兩鎔開入水銀三錢攪至成粉為銀粉 硃砂 五錢 金箔 五錢 銀箔 五錢 蛇含石 五錢

為細末米飲糊丸茯神湯下一錢弱人量減

肝火乘心心氣不降心神被擾故神明失旨狂妄不休焉銀粉本是火銀入黑鉛煨煉而成性能速降龍火歸入坎中蛇含石乃石中之黃粉質重性降力能鎮攝虛陽潛歸海底俾肝火速降則心氣自平而金銀箔更能鎮心抑肝木火既平神志無不自寧也米飲糊丸以和胃茯神湯下以安神靡不火降氣平則心志自然甯靜而主宰有權何狂妄之不退哉此鎮墜浮越之劑為火逆心氣不降狂妄之端方

安神滾痰丸 治痰熱癩妄脉數滑者

礞石 三兩 風化石 三兩 沉香 一兩 硃砂 一兩 珍珠 一兩

爲末天麻一兩煎膏丸姜汁竹瀝下一二錢

痰熱內壅心包之陽不能清利故神志失養癩妄無倫焉青礞石善化頑痰之固結風化硝  
耑瀉熱結之壅痰沉香順氣以降逆硃砂鎮心以安神珍珠乃水精之所結力能壯水制火  
以安定神志焉更用天麻膏糊丸豁痰散結姜瀝汁送乃潤液散痰使痰化熱降則心包肅  
清神明有主癩妄有不退者乎此安神下痰之劑爲痰熱病癩之耑方

抱龍丸 治狂妄不止脉浮者

銀粉 三兩 硃砂 三兩 乳香 兩半

爲細末蜜丸井華水下一錢

虛陽浮越心氣不降心神失其運用之權故狂妄不能自安焉銀粉降離歸坎硃砂鎮心安  
神乳香活血脉以榮心血也丸以白蜜益虛潤燥下以井華化熱歸原使虛陽下蟄則心氣  
自寧而神志得安安有狂妄不退者乎此鎮墜浮越之劑爲虛陽狂妄之耑方

三黃石羔湯 治蘊熱發狂脉洪大浮數者

石羔 五錢 麻黃 錢半 黃連 錢半 淡豉 三錢 黃芩 錢半 生姜 三片 黃柏 錢半 葱白 三枚

山梔 三錢

水煎去渣溫服

傷寒失汗表裡熱極心包之陽不得發越而神明失其主宰故狂妄不休焉按此即黃連解毒湯兼通聖散梔子豉湯之製而加麻黃石膏羌蔥姜以徹外內熱毒也如脉實便閉上氣喘急舌囊縮則去麻豉而易硝黃又全用伊尹三黃湯矣

大劑獨參湯 治氣脫發狂脉軟數者

人參 一兩

水煎去渣溫服

元氣大虛元神大脫故虛躁如狂莫能制禦焉非大劑獨參速進何能挽元神於萬一此急方峻劑為虛狂氣脫之出方

調胃承氣湯 見傷寒 陽明 保和丸 見傷食 越鞠丸 見鬱症 清魂散 見產後 舉輕古拜散 見瘧症 導痰湯 見痰症

控涎丹 見飲症 涼膈散 見火症 四七湯 見氣症 二陳湯 歸脾湯 牛黃清心丸 俱見中風

痢證

痢證有陰有陽陰痢屬痰陽痢屬熱雖有虛寔之分無不因驚而得不必鑿分五種

內因

肥人多痰瘦人多火是身中已有痰火卒聞驚恐或母腹受驚驚則神出舍空恐則神慄氣卑痰涎盡得乘間歸之故心包受侮神明失其主宰均能病癇而乃發作有時

外證

眩仆卒倒昏不知人手足搐搦目瞪上視叫吼吐沫食頃乃醒

辨證

在肺聲如羊叫入心彷彿馬鳴入脾宛如牛吼入肝好似鷄鳴入腎猶如猪叫身熱爲陽在府易治身冷爲陰在藏難痊癇必屢發身軟吐沫出聲瘳發亦頻身硬強直如角弓至中風中寒中暑之卒倒不能遽醒醒則不復再發中痰較癇證吐痰吐沫有別中氣身冷非陰中食內實非陽均當細細分別

脉法

浮滑爲風癇洪大爲熱癇弦細爲飲微緩爲虛浮爲陽癇沉爲陰癇虛弦驚恐沉數火伏沉實弦急者不治

治法

清心降火化氣行痰尋痰尋火分多少治之頑痰膠固非辛溫無以佐其開導之力虛痰固結



非甘寒何以助其歸原之績

辨治

痰熱內擾心包星半苓連遠志熱盛壅閉三焦涼膈散加川連麥冬痰多三聖散吐之因驚硃砂安神丸因恐左歸飲加磁石麥冬心熱痰迷清神湯日久生虫妙功丸行痰滌熱後十全大補湯加棗仁麥冬遠志陰虛六味丸加鹿膠遠志龜膠沉香肝經風熱瀉青丸合導赤散鬱結四七湯加木香南星發時兼下靈砂丹不得臥養正丹多嘔黑錫丹痰盛導痰湯加木香竹瀝書發補中益氣湯加益智仁夜發六味丸加鹿膠下礬石丸

死證

病後發痲者難治神脫目瞪者危發時遺溺者死

由藥

二陳湯加瓜蒌南星熱盛加黃連山梔吐痰後硃砂安神丸瀉南方之火當歸龍薈丸平東方之木六味地黃丸壯北方之水八味地黃丸攝水中之火

選方

戴人三聖散 治風痰壅盛脉滑者

醫略六書雜病證治

卷之二十一

內因門

五十四

趙翰香居藏板

瓜蒂 一兩 防風 一兩 藜蘆 五錢

爲散每服三錢蠶汁三盞下

風痰內盛壅塞膈間心包之陽不能布瀆故神明失旨病癇時發焉防風疎風散濕瓜蒂湧吐實痰藜蘆湧吐風痰一吐而迅掃無遺則胸中陽氣廓然而神明得其主宰如離照當空陰霾自滅何患癇病不痊耶此湧吐之劑爲癇病痰盛探吐之劑方

清神湯 治虛熱痰迷病癇脉數者

黃連

錢半

茯神

錢半

棗仁

三錢

柏仁

二錢

遠志

錢半

甘草

五分

菖蒲

三錢

竹瀝

三匙

薑汁

一匙

水煎去渣冲二汁服 肺虛加人參肺熱加沙參痰多加星半

心肺虛熱痰迷膈上故神明昏昧病癇時發焉黃連清心瀉熱棗仁養心寧神菖蒲發痰通竅茯神定心安神柏子仁養心神遠志肉交心腎甘草緩虛熱薑汁散痰涎竹瀝化痰潤液以安神清膈也肺虛加人參以扶元肺熱加沙參以清肺痰多加半夏南星以豁之端不外清熱存陰扶元益虛之治何虛熱痰迷病癇卒仆不除乎

硃砂安神丸 治癇病熱傷心包脈虛數者

硃砂 一兩 黃連 一兩 生地 五兩 當歸 兩半 甘草 五錢

硃砂另研共末湯浸蒸餅丸硃砂爲衣人參湯送下三錢

熱傷心包心陰暗耗心神失養而昏味不清故病癩時發焉凡言心經藥都屬心包硃砂外稟離明內含真水故能交合水火直入心藏但其性徐緩無迅掃陽焰之速効是以更需黃連之苦寒以直折其勢甘草之甘緩以欵啓其微俾膈上之實火虛火悉從小腸而降泄之尤爲勞心傷神動作傷氣擾亂虛陽而病癩的的方豈特治熱傷心包而已哉然其奧又在當歸之辛溫走血地黃之濡潤滋陰以杜火氣復熾之路其動靜之機多寡之制各有至理存也讀者味之

靈砂丹 治癩病上盛下虛脈沉者

水銀 四兩 硫黃 二兩

新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉爲末糯米糊丸如麻子大每服三丸空心棗湯米湯井花水人參湯任下量虛實可增至六七丸忌猪羊血菘豆粉冷清之物

下虛上盛者乃虛陽浮越焉神明失其指歸故時時病癩卒仆也水銀爲水之精硫黃是火之精此一水一火煅煉合氣足以交媾水火鎮墜浮越洵爲下虛上盛病癩之謂方

礬石丸 治癩病痰氣上逆脉滑者

礬石 三兩 煨 杏仁 三兩 去皮

爲末米飲丸白湯下三錢

痰氣上逆阻遏心包膈中之陽氣不宣而神明失旨故病癩時發焉礬石爲石中之精性湧質降以墜逆上之痰杏仁乃核中之仁性降質疎以開壅閉之寒丸以米飲和胃下以白湯潤下洵爲寒氣上逆病癩之端方

粉代散 治氣逆痰壅病癩脉弦者

輕粉 三錢 代赭 三兩 煨 白礬 三兩

爲散米飲調下三錢

氣逆不化痰涎上壅閉遏心包而神明失指故病壅時發焉輕粉劫痰搜滌經絡之伏結代赭鎮墜下平逆氣之有餘白礬化濕却水治痰生之源以杜絕其根俾痰化氣平則膈中無逆上之氣而神明得主宰之權焉有癩病不瘳乎此劫痰鎮墜之劑爲痰逆病癩之端方

楊氏五癩丸 治癩病發作有時脉弦滑者

白附 五錢 半夏 一兩 製 皂角 五錢 白礬 一兩 烏蛇 五錢 僵蠶 一兩 炒 全蠍 三錢 蜈蚣 三錢 炙

雄黃 三錢 射香 一錢 硃砂 三錢

爲末姜汁麩糊丸每服三錢姜湯下

風痰堵塞經絡遏成風毒而膈氣不化臆中之陽不能宣通故癰病時時舉發焉白附子善祛頭面之風烏稍蛇善竄經絡之風蜈蚣祛風活絡全蝎定癰却風皂角豁痰涎射香通毫竅白礬却濕祛痰半夏化痰燥濕雄黃燥濕氣以解毒風嘉蠶化風痰以通經絡硃砂鎮心安神以定志也糶丸以化之姜汁以散之更以薑湯送下總取散風豁痰之力使痰化毒解則膈氣通暢而神用昭然癰病可不復發矣此攻毒搜風之劑爲風毒病癰之謂方

三癰丸 治驚癰脉弦浮者

白礬 二兩 荆芥 兩半 硃砂 一兩

爲末姜汁竹瀝丸每服三錢空心米飲下

驚氣心入風癰內擾經絡不能宣通故癰病時發發時搐搦不已焉荆芥疎血中之風白礬却沃腫之涎硃砂鎮心寧神以定驚搐也竹瀝姜汁爲丸空心米飲送下使風痰分解則膈氣調和而驚氣自平癰病無不瘳矣此疎痰定驚之劑爲驚痰病癰之謂方

涼膈散 導赤散 瀉青丸 當歸龍薈丸 黑錫丹 俱見火症 妙功丸 見癩病 四七湯

養正丹

前見氣症

導痰湯

見痰症

左歸丸

六味丸

八味丸

二陳湯

補中益氣湯

十全大補湯

俱見中風

驚悸怔忡

驚入心膽必應之悸乃心中惕惕心自爲之雖有心膽分經無不各挾痰火而後作若心虛火迫必發怔忡

內因

心血虛少心神失養則神舍空虛痰涎伏火乘間歸之而發驚悸驚則外觸怪異悸則心氣內怯怔忡乃陰虛於下陽亢於上則相搏而成

外證

驚則倏然小怖恐懼不甯其驚無時悸則惕然心動惶惶不甯其動有時怔忡乃忪忪動動靡有寧時上自心胸下至臍腹虛甚者動亦甚虛微者動亦微

辨證

怒傷肝動氣見於左驚入膽惶惶得於心遇險臨危鬱痰內結忽然心跳水停心下心火畏水築築悸動氣虛中餒心下動悸陰虛氣餒臍下悸動血虛心悸煩熱心嘈氣鬱心悸鬱挹吐涎



陰火心悸耳鳴鬪熱陽衰心悸足冷肢寒卑慄心悸神志怯然失志心悸言語咨嗟

脉法

寸口脉動弱動則爲驚弱則爲悸弦數怔忡沉細屬飲氣虛挾飲脉必結伏尺中弦緊爲腎氣凌心

治法

痰宜豁痰定志飲當逐飲安神血虛者安神養血氣虛者補氣調神交通心腎陽虛導火歸原氣鬱開之發之火炎降之清之驚恐者習熟之浮越者鎮墜之

辨治

觸事易驚生涎生火睡多異夢隨即驚覺並宜溫膽湯加熟棗仁或遠志丸妙香散平補正心丹龍齒清魂散臥多驚歷溫膽湯下遠志丸驚歷遺洩補膽防風湯加羌活桂枝氣鬱生痰四七湯加茯神遠志菖蒲肝虛風襲獨活湯魂夢飛揚夜多驚歷用獨活湯後珍珠母丸肥人心下悸半夏麻黃圓嘔吐悸眩半夏茯苓湯臍下悸吐涎沫五苓散心氣不足千金定志丸千金茯神湯血虛火動歸脾湯加梔丹白芍麥冬心火畏水半夏茯苓湯茯苓甘草湯表邪挾飲半夏麻黃丸小青龍湯瘦人心悸多火天王補心丹陰虛六味丸加麥冬五味遠志棗仁衛衰營

竭涸流心悸炙甘湯痰飲心悸導痰湯加棗仁栝仁痰因火動心悸溫膽湯加川黃連暗室躄居見人驚避此卑悸之病藿香正氣散虛人人參養榮湯陰虛怔忡左歸飲火亢加吳茱汁煮川連陽虛怔忡右歸飲寒迫加吳茱乾姜胡蘆巴小茴香

用藥

硃砂安神丸心氣虛加人參棗仁茯苓遠志神不寧加麥仁栝仁珍珠牛黃痰加星菖貝在上可吐瓜蒂散痰結宜攻滾痰丸飲當二陳湯加黑丑白丑虛人六君湯五苓散金匱腎氣丸氣虛加參耆血虛加歸地陰虛六味丸陽虛八味丸

選方

平補正心丹 治驚氣夜臥不寧脉弦者

窗龍

一兩煨紅醋淬

人參

一兩

遠志

一兩草甘泡

茯神

一兩去木

棗仁

一兩

歸身

一兩

栝仁

一兩去油

生地

三兩

山藥

二兩炒

肉桂

五錢去皮

麥冬

兩半去心

五味

五錢

硃砂

五錢

菖蒲

一兩

為末煉蜜丸砂硃為衣米湯參湯龍眼湯醇酒任下三錢

心血虛少心氣內餒肝陽得以上乘心氣不能下達故惕然驚悸魂夢不甯焉龍齒安魂定魄人參補氣扶元遠志交通心腎棗仁滋養心神栝仁養心悅脾茯神定志寧神歸身養心

生地壯心陰山藥補脾益陰交媾水火菖蒲通心開竅爽利神明麥冬清心潤燥五味欬液生津硃砂鎮心寧神肉桂平肝導火也使火降氣平則心血充足而心氣自降肝陽得平驚悸無不退夜臥無不寧矣丸以煉蜜之潤湯用米飲之和參湯之補益龍眼之甘養醉酒之溫行隨病制宜無不絲絲入扣

鎮心丸 治怔忡不寧脉弦數疾者

熟地

八兩

棗仁

四兩

茯神

三兩

人參

四兩

麥冬

四兩

五味

二兩

天冬

四兩

山藥

四兩

遠志

二兩

龍齒

三兩

肉桂

三兩

硃砂

一兩

爲末蜜九米飲下五錢

怔忡乃陰虛爲假熱所迫氣不歸原而怱怱動動或左或右晨夕不寧焉熟地補陰滋腎以吸九天之氣人參補氣扶元以生九地之陰棗仁養心氣以下達茯神清精府以定志麥冬清心潤肺天冬潤肺益陰五味生津欬液遠志通腎交心山藥補脾陰以媾水火龍齒鎮浮越以安魂魄肉桂導火平肝硃砂定心安神也丸以白蜜之甘潤湯以米飲之和胃使脾胃調和則金水並益而心氣自降假熱潛藏心陰充足何患怔忡之不退哉此滋補鎮心之劑爲心虛怔忡之崩方

琥珀養心丹 治心跳善驚脉瀯數者

生地 三兩 人參 兩半 黃連 六錢 龍齒 三兩 棗仁 二兩 遠志 一兩 茯神 兩半 歸身 兩半

柏仁 兩半 琥珀 六錢 菖蒲 一兩 牛黃 六錢

為末猪心血為錠金箔為衣燈心湯下三錢

心虛熱熾心神失養則心氣不寧故心跳不已觸事易驚焉生地養心陰以制火人參補心氣以寧心黃連清心火之妄動龍齒定魂魄之飛揚棗仁滋養心神遠志交通心腎歸身養血榮心茯神安神定志栝仁養心氣琥珀利心營菖蒲開心氣以通竅牛黃凉心熱以定驚硃砂鎮墜心氣安心神更以心血引之入心金箔肝制墜熱燈心泄熱從小便去也蓋熱從下泄則心火自降而心氣和平安有心跳善驚之患乎此清補鎮心之劑為心跳善驚之方

補膽防風湯 治膽虛風襲善驚脉弦者

人參 錢半 防風 錢半 甘草 八分 川芎 一錢 細辛 五分 獨活 錢半 前胡 錢半 茯神 錢半

生薑 二片 紅棗 四枚

水煎去渣溫服

膽府虛弱風邪乘間襲之失其清淨之德而膽氣不振心氣亦不能雄故觸事多驚焉人參補膽虛防風散風邪細辛搜伏匿之邪獨活清諸經之絡前胡疎太陰之邪川芎活厥陰之血茯神安心氣甘草緩中氣更以紅棗益心脾生薑散表邪也使風邪外解則膽府清和而心陽自壯安有邪襲善警之患乎此補膽散風之劑爲膽虛風襲善警之劑方

獨活湯 治肝虛召風如驚悸狀脈弦浮濡者

獨活

錢半

羌活

錢半

柴胡

八分

細辛

五分

茯苓

錢半

人參

錢半

沙參

錢半

五味

一錢

半夏

錢半

棗仁

三錢

甘草

錢半

烏梅

三錢

生姜

三片

水煎去渣溫服

肝虛召風魂魄不安故夢寐不甯如驚悸狀焉棗仁涵養肝虛烏梅收斂肝液人參補五藏之陽沙參益五藏之陰羌活散游風獨活祛伏風前胡散太陰之邪細辛搜少陰之邪茯苓滲濕和脾半夏豁痰醒脾甘草和中氣生薑散外邪五味斂津液以防諸藥之耗散也水煎溫服使肝虛完復則內召之風無不外解而經藏肅清驚悸自甯何魂夢不安之有此補肝疎風之劑爲外風內入驚悸之劑方

珍珠母丸

治驚悸不寐脉濡數者

珠母 一兩 龍齒 二兩 茯神 一兩 人參 一兩 棗仁 三兩 犀角 一兩 柏仁 二兩 熟地 三兩

當歸 二兩 沉香 五錢 硃砂 一兩

為末蜜丸薄荷湯下三錢

用虛熱熾熱盛生風心氣不降不能藏魂而夢寐不安故驚悸不寐焉珠母益陰潛熱龍骨定魄安魂人參扶元氣以生熟地補肝陰以濟火栢仁養心氣棗仁養心神當歸養血榮肝茯神安神定志犀角清血分之風沉香降九天之氣砂硃鎮心安神以甯夢也密丸薄荷湯下使肝虛頓復則鬼魄自安而夢寐亦甯何驚悸之不痊哉此清補寧神之劑為肝虛熱熾驚悸之岌方

茯神湯 金 治心虛驚悸脉濡澹者

茯神 二兩 人參 二兩 茯苓 二兩 菖蒲 三兩 赤小豆 六十粒

分十劑水煎去渣溫服

心虛濕滯心氣被遏故心神不寧驚煩悸動不已焉茯神滲濕安心神伏苓滲濕清心氣菖蒲開通心竅小豆滲濕利營人參大補心氣以安驚悸也小劑煎服使心氣漸充則濕邪漸化而心血日以滋榮心神得榮養何患驚悸不去耶此滲濕安神之劑為心虛濕滯驚悸之



耑方

龍齒清魂散 治驚悸脉弦細澹者

龍齒 三兩 人參 兩半 歸身 三兩 遠志 兩半 麥冬 三兩 去心 桂心 五錢 茯神 二兩 去木 細辛 三錢

為散生薑一片紅棗三枚煎湯調服三錢

心氣大虛寒涎內沃而心血不足不能榮心故驚悸不已焉人參大補心氣當歸營養心血以雄心麥冬清心潤肺以甯心細辛通心氣搜滌伏涎茯神滲濕氣清徹神明遠志交通心腎龍齒定魄安魂為散姜棗湯下使心血內充則心氣雄壯而寒涎自化神志並甯何驚悸之不瘳哉此補養溫經之劑為心寒驚悸易驚之耑方

千金定志丸 治驚悸脉濡澹者

人參 三兩 遠志 兩半 茯神 二兩 菖蒲 兩半

為末蜜丸硃砂為衣金箔湯下三錢

心氣大虛心竅閉塞不能下通於腎而神志不甯故驚悸不已焉人參大補心氣菖蒲開通心竅遠志通腎氣以交心茯神清心氣以定志丸以白蜜衣以硃砂湯以金箔下只三錢乃重可鎮怯補可益虛也此扶元定志之劑為心腎不交驚悸之耑方

半夏麻黃丸 治驚悸脉弦浮緊者

半夏三兩 麻黃兩半

爲末姜汁丸生姜湯下一二錢

寒飲積結不散而膈中之陽氣亦不宜通故築築然動悸惕惕然易驚焉半夏大消心下之積水麻黃開發胸中之伏陽姜汁丸薑湯下是搜滌寒飲以發越膈中之陽也使寒飲外散則胸宇廓然而清陽煥發心氣甯靜何驚悸之不瘳哉此開滌之劑爲寒飲固結驚悸之方

半夏茯苓湯見傷酒 溫膽湯見鬱症 妙香散見胎前血症 遠志丸見產後中風 四七湯見氣症 瓜蒂散 滾痰丸

導痰湯俱見痰症 炙甘草湯見傷寒脉結代心動悸 藿香正氣散見暑症 茯苓甘草湯 小青龍湯 五苓散俱見寒症

太陽砂安神丸見癩症 六君湯 金匱腎氣丸並見濕症 六味丸 八味丸 左歸飲 右歸飲

人參養營湯 天王補心丹 歸脾湯俱見中風

健忘

心腎兩虧精神短少故神志不能交通而臨事忽忘謂之健忘

內因

求望高遠思想無窮致心神耗散神舍空虛或天稟不足早年劉喪心包痰飲擾亂神明皆令腦髓消乏轉盼遺忘

外證

健忘是徒然而忘其事作事有始無終言談有頭無尾

辨證

心不下交於腎則濁火亂神明臨事動輒遺忘腎不上交於心則精氣伏而不用不能記憶前事

脉法

寸脉弦濇爲傷神尺脉軟濇爲傷精弦數芤濇乃心神不足精血空虛

治法

當滋養心神填補精血使陰精上奉以安其神陽氣下藏以定其志

辨治

健忘當填精補血恐懼宜定志安神健忘心跳千金茯神湯腎傷恐懼六味丸加枸杞遠志肝虛六味加棗仁龍齒陽明虛四君子加木香砂仁山藥心包虛遠志丸加犀角琥珀砂膽虛

六君子加當歸柴防兼進加減八味丸膽虛目暗補膽防風湯勞傷思慮傷魂鹿角膠酒溶多服陽虛善恐八味丸思慮傷神健忘歸脾湯挾痰加竹瀝薑汁精神短少人參養營湯送遠志丸痰迷心竅導痰湯加菖蒲木香上虛下熱天王補心丹水火不交六味丸加五味遠志硃砂蜜丸服盜汗健忘辰砂妙香散瘀積健忘代抵當丸

用藥

思慮傷心脾歸脾湯爲主挾痰加竹瀝薑汁精神短少人參養營湯痰迷心竅導痰湯送壽星丸心腎不交朱雀丸稟弱神揚大聖枕中方

選方

寧志膏 治健忘脉軟澹者

人參 三兩 棗仁 三兩 乳香 三錢 硃砂 一兩

爲末蜜丸荷葉湯下三錢

心氣大虛心血失養神不歸舍而神舍常空故健忘不能記憶焉人參補心氣棗仁養心血硃砂鎮離宮之浮越乳香活心血以榮神舍也蜜丸以潤之荷葉湯以楊之使心氣內充則心血得養而神歸故舍何患健忘之不瘳哉此扶元養心之劑爲心虛健忘之端方

壽星丸 治健忘脉滑促者

南星

一斤酒拌焙

琥珀

四兩

硃砂

一兩

為末猪心血三個和姜汁搗糊丸人參湯下三錢

痰迷心竅堵塞神明失其主宰之權故健忘不能記憶焉南星散痰豁涎琥珀安神散瘀硃砂鎮心氣安神明更用猪心血引之入心生姜汁散瘀通徹神明人參湯扶元補氣以鼓藥力也使痰散瘀消則心無堵碍而心竅自通神明得旨何健忘之不瘳哉此豁痰安神之劑為痰閉健忘之端方

朱雀丸 治健忘脉弱者

沉香

一兩

茯苓

四兩

為末蜜丸參湯下一二錢

心氣不降腎水不能上朝而心腎不交神志失所指歸故健忘不能記憶焉沉香降氣以歸腎茯苓通腎以交心丸以白蜜之潤下以參湯之補使心腎交通則神明得其主宰而健忘之患無不自痊矣此歸腎交心之劑為心腎不交健忘之端方

柏子養心丹 治健忘脉濇微數者

栢仁

二兩 炒

熟地

三兩

茯神

兩半 去木

麥冬

三兩 去心

當歸

二兩

枸杞

三兩

元參

兩半

甘草

五錢

菖蒲

一兩

爲末蜜丸白湯下三錢

心腎兩虧精血不足無以涵養神志故不能記憶往事而健忘焉熟地補陰滋腎枸杞益髓填精柏子仁養心神當歸身養心血元參清浮游之火麥冬滋心肺之陰茯神通心氣甘草緩中氣菖蒲通心竅以交腎白蜜潤腎燥以交心使心腎交通則精血自足而神志得養健忘無不自痊矣此補血養心之劑爲心虛健忘之端方

大聖枕中方 治健忘脉濇者

龜板

三兩 鹽 水炙

龍骨

三兩 煨

遠志

一兩

菖蒲

一兩

爲末蜜丸酒下一二錢

心竅閉塞氣不能上通故神志失其聰慧無以記事憶前而健忘焉龜板滋陰壯水以益腎志龍骨雄腎壯骨以固精髓遠志交通心腎菖蒲開豁神明蜜以潤之酒以行之使小竅內通則腎志上達而聰慧煥發健忘無不霍然矣此通腎交心之劑爲心腎不交健忘之端方

二丹丸 治健忘脉虛濇者

丹參

兩半

熟地

三兩

天冬

三兩 去心

麥冬

三兩 去心

遠志

三兩 去心

茯神

兩半 去木

硃砂

一兩

甘草

五錢



菖蒲 六錢

為末蜜丸酒下三錢

心虛血燥腎志無以上達故聰明頓昧健忘不能記憶前事焉丹參養心血以通血脉熟地補腎水以達腎志麥冬清心潤肺天冬潤肺益陰茯神安神滲濕甘草和胃緩中菖蒲開心竅通達神明硃砂鎮心陽安神定志更需遠志交通心腎也蜜丸酒下使心竅內通則腎氣上達而聰明無蔽何健忘之有此通腎清硃之劑為心腎虛閉健忘之劑方

代抵當丸 治健忘脉濇大者

大黃

三兩 醋煮

桃仁

六兩

芒硝

三兩

蓬朮

三兩 醋炒

肉桂

三兩 去皮

當歸

六兩

生地

十兩

甲片

三兩 炒

為末蜜丸紅花湯下三錢

血蓄陽明堵塞心竅而障閉神明不能記憶前事亦謂之健忘與精血不足者迥異大黃蕩熱通幽醋煮滌除瘀結芒硝瀉實軟堅生用力更銳利桃仁破瘀積蓬朮削結硬肉桂溫經行血當歸養血和血生地滋陰以生新血甲片走竄以通經絡也蜜丸紅花湯下使瘀熱下行則心胸廓然而神明無堵塞之害何健忘不痊哉此破瘀攻熱之劑為瘀熱健忘之劑方

千金茯神湯

補胆防風湯

並見

遠志丸

見產後

加減八味丸

見女科

辰砂妙香散

即妙香散加辰砂見胎前血症

導

痰湯

見痰症

六味丸

八味丸

四君湯

歸脾湯

人參養營湯

天王補心丹

俱見中風