

包氏醫宗

第二集 第二卷

雜病方法



▲內科學 瘟科婦人科學附

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第二集目錄

卷之一

雜病論章節

一冊

卷之二

雜病方法 附歌括

一冊

卷之三

雜病表 附表式

一冊

卷之四

雜病論講義

二冊

雜病方講義

一冊

(第二集售銀伍圓)

包氏醫宗第二集第二卷

雜病方法一冊

著作者

閩杭包桃初

出版者

包氏醫宗出版部

總發行

包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新開路
口鴻祥里二一四五號

代售處

各大書局



▲內科傳染病學

卷之一

傷寒論章節

卷之二

傷寒方法 附歌括

卷之三

傷寒表 附表式

卷之四

傷寒論講義

卷之五

傷寒方講義

(第一集售銀陸圓)

包氏醫宗第三集

診斷學

包氏醫宗第四集

解剖學附圖

包氏醫宗第五集

生理學

包氏醫宗第六集

病理學

包氏醫宗第七集

治療學

包氏醫宗第八集

藥物學

一冊

編輯中

▲函索樣本附郵票二十分

四冊

印刷中

編輯中

編輯中

編輯中



包氏醫宗第一集目錄

雜病方法目錄

方歌同

- 「一」括樓桂枝湯
「參」麻杏薏甘湯
「伍」一物瓜蒂湯
「柒」百合滑石代赭石湯
「玖」百合地黃湯
「拾壹」括樓牡蠣散
「拾叁」甘草瀉心加人蔘湯
「拾伍」雄黃熏法
「拾柒」升麻鼈甲湯
「貳拾壹」蜀漆散
「貳拾叁」風引湯
「貳拾伍」頭風摩散
「貳拾柒」烏頭湯

「一」防己黃耆湯
「肆」百合知母湯
「陸」百合洗方
「捌」苦蔞湯
「拾」赤小豆當歸散
「拾陸」升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯
「拾捌」白虎加桂枝湯
「貳拾貳」侯氏黑散
「貳拾肆」防己地黃湯
「貳拾陸」桂枝芍藥知母湯

- 「一」麻黃加朮湯
「肆」防己黃耆湯
「陸」百合知母湯
「捌」苦蔞湯
「拾」百合洗方
「拾肆」苦蔞湯
「拾陸」赤小豆當歸散
「拾捌」升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯
「貳拾貳」白虎加桂枝湯
「貳拾肆」侯氏黑散
「貳拾肆」防己地黃湯
「貳拾陸」桂枝芍藥知母湯



南京中医药大学图书馆版权所有

〔貳拾玖〕黃耆桂枝五物湯

〔參拾壹〕天雄散

〔參拾叁〕薯蕷丸

〔參拾伍〕大黃麌蟲丸

〔參拾柒〕皂莢丸

〔參拾玖〕澤漆湯

〔肆拾壹〕葶苈大棗瀉肺湯

〔肆拾叁〕小青龍加石膏湯

〔肆拾伍〕括樓薤白白酒湯

〔肆拾柒〕枳實薤白桂枝湯

〔肆拾玖〕橘枳生薑湯

〔伍拾壹〕桂枝生薑枳實湯

〔伍拾叁〕厚樸七物湯

〔伍拾伍〕厚樸三物湯

〔伍拾柒〕大黃附子湯

〔參拾桂枝加龍骨牡蠣湯〕

〔參拾貳〕黃耆建中湯

〔參拾肆〕酸棗仁湯

〔參拾陸〕射干麻黃湯

〔參拾捌〕厚樸麻黃湯

〔肆拾麥門冬湯〕

〔肆拾貳〕越婢加半夏湯

〔肆拾肆〕奔豚湯

〔肆拾陸〕括樓薤白半夏湯

〔肆拾捌〕茯苓杏仁甘草湯

〔伍拾壹〕薏苡附子散

〔伍拾貳〕烏頭赤石脂丸

〔伍拾肆〕附子粳米湯

〔伍拾陸〕大建中湯

〔伍拾捌〕赤丸

〔伍拾玖〕大烏頭煎

〔陸拾壹〕烏頭桂枝湯

〔陸拾叁〕甘草乾薑茯苓白朮湯

〔陸拾伍〕木防己湯

〔陸拾柒〕澤瀉湯

〔陸拾玖〕小半夏湯

〔柒拾壹〕小半夏加茯苓湯

〔柒拾叁〕荅桂五味甘草去桂加

細辛
乾薑

湯

〔柒拾伍〕荅甘五味薑辛夏加杏仁湯

〔柒拾柒〕括樓瞿麥丸

〔柒拾玖〕滑石白魚散

〔捌拾壹〕越婢加朮湯

〔捌拾伍〕杏子湯

〔捌拾柒〕桂枝加黃耆湯

〔陸拾當〕歸生薑羊肉湯

〔陸拾貳〕旋覆花湯

〔陸拾肆〕甘遂半夏湯

〔陸拾陸〕木防己去石膏加芒硝湯

〔陸拾捌〕厚樸大黃湯

〔柒拾〕己椒蘚黃丸

〔柒拾貳〕茯苓桂枝五味甘草湯

〔柒拾肆〕荅甘五味薑辛加半夏湯

〔柒拾捌〕蒲灰散

〔捌拾伍〕越婢湯

〔捌拾肆〕甘草麻黃湯

〔捌拾陸〕耆芍桂酒湯

〔捌拾捌〕桂甘薑棗麻辛附子湯



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine
1951

「捌拾玖」枳术湯
「玖拾壹」梔子大黃湯
「玖拾叁」茵陳五苓散
「玖拾伍」半夏麻黃丸
「玖拾柒」黃土湯
「玖拾玖」猪苓散
「百零壹」大黃甘草湯
「百零叁」文蛤湯
「百零伍」生薑半夏湯
「百零柒」橘皮竹茹湯
「百零玖」訶黎勒散
「百拾壹」大黃牡丹湯
「百拾伍」黃連粉
「百拾柒」雞屎白散

「玖拾」消石礬石散
「玖拾貳」豬膏髮煎
「玖拾肆」大黃硝石湯
「玖拾陸」柏葉湯
「玖拾捌」瀉心湯
「壹百」大半夏湯
「百零貳」茯苓澤瀉湯
「百零肆」半夏乾薑散
「百零陸」橘皮湯
「百零捌」紫荊湯
「壹百拾」薏苡附子敗醬散
「百拾貳」王不留行散
「百拾肆」排膿湯
「百拾陸」藜蘆甘草湯
「百拾捌」蜘蛛散



〔百拾玖〕甘草粉蜜湯

〔百貳壹〕膠艾湯

〔百貳叁〕乾薑人蔫半夏丸

〔百貳伍〕葵子茯苓散

〔百貳柒〕白朮散

〔百貳玖〕下瘀血湯

〔百參壹〕竹皮大丸

〔百參叁〕半夏厚樸湯

〔百參伍〕溫經湯

〔百參柒〕膠薑湯

〔百參玖〕礬石丸

〔百肆壹〕腎氣丸

〔百肆叁〕狼牙湯

▲附加減歌

防己黃耆湯

〔百貳拾〕桂枝茯苓丸

〔百貳肆〕當歸貝母苦蔴丸

〔百貳陸〕當歸散

〔百貳捌〕枳實芍藥散

〔百參拾〕竹葉湯

〔百參捌〕白頭翁加甘草阿膠湯

〔百參貳〕甘麥大棗湯

〔百參陸〕土瓜根散

〔百參捌〕大黃甘遂湯

〔百參拾〕紅藍花酒

〔百肆貳〕蛇床子散

黃耆建中湯



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

雜病方目錄終

厚樸七物湯

己椒蘚黃丸

白朮散

竹皮大丸

當歸生薑羊肉湯

越婢湯

竹葉湯



南京中医药大学图书馆版权所有

仲景全書方法

閩杭包育華桃初氏編

雜病論原方

計一百四十三方

男識生參校

孫天白校字

「壹」括樓桂枝湯

括樓根

桂枝
各二兩

芍藥
各三兩

甘草
二兩

南京中医药大学图书馆版权所有



右六味。以水九升。微火煮。取三升。溫分三服。微汗。汗不出。食頃。
啜熱粥發。

「貳」麻黃加朮湯

麻黃
三兩去節

桂枝
二兩

甘草
一兩炙

白朮
四兩

杏仁
七十枚去皮尖

右五味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微汗。

「參」麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃 半兩

杏仁 十枚去皮尖

薏苡 半兩

甘草 一兩
炙

右剉麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎八分。去滓。溫服。有微汗避風。

「肆」防己黃耆湯

防己 一兩

甘草 半兩
炙

白朮 七錢
半兩

黃耆 本用一兩一分一

右剉麻豆大。每抄五錢匕。生薑四片。大棗一枚。水盞半。煎八分。去滓。溫服。喘者。加麻黃半兩。胃中不和者。加芍藥三分。氣上衝。加桂枝三分。下有陳寒者。加細辛三分。服後。當如蟲行皮中。從腰下如水。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗。差。

「伍」一物瓜蒂湯

瓜蒂 二十七



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

右剉。以水一升。煮取五合。去滓。頓服。

〔陸〕百合知母湯

百合七枚 知母三兩

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出去。其水別以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。取一升。後合煎取一升五合。分溫再服。

〔柴〕百合滑石代赭石湯

百合七枚

滑石三兩
綿裹碎

代赭石如彈丸大一
枚碎綿裹

右先煎百合如前法。別以泉水二升。煎滑石代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升五合。分溫再服。

〔捌〕百合雞子黃湯

百合

七枚

雞子黃一枚

「玖」百合地黃湯

百合
擘七枚

生地黃汁
一升

右先煎百合如前法了。內雞子黃攪勻。煎五分。溫服。
右先煎百合如前法了。內地黃汁。煎取一升五合。溫分再服。
病勿更服。大便當如漆。

「拾」百合洗方

百合一升。以水一斗漬之。一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿以鹽豉也。

「拾壹」括樓牡蠣散

括樓根

牡蠣

等分

右爲細末。飲服方寸匕。日三服。

「拾貳」百合滑石散



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1951

百合

一兩
炙

滑石

三兩

右爲散。飲服方寸匕。日三服。當微利。止服。熱則除。

「拾叁」甘草瀉心加人蔴湯

甘草

四兩
炙

黃芩

三兩

乾薑

三兩

人蔴

三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

枚十二

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

「拾肆」苦蘆湯

苦蘆一升。以水一斗。煎取七升。去滓。熏洗。日三次。

「拾伍」雄黃熏法

雄黃一味。爲末。筒瓦二枚合之。燒。向肛熏之。

「拾陸」赤小豆當歸散



南京中医药大学图书馆版权所有
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
1951

赤小豆

三升
芽出
浸令
乾

當歸 十分

右二味。杵爲散。漿水服方寸匕。日三服。

〔拾柒〕升麻鼈甲湯

升麻

二兩

當歸

二兩

甘草

蜀椒

一炒去汗
兩

鼈甲

手指大
一片炙

雄黃

研半兩

右六味。以水四升。煮取一升。頓服。老小再服。取汗。
〔拾捌〕升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

〔拾玖〕鼈甲煎丸

升麻

二兩

當歸

二兩

甘草

鼈甲

手指大
一枚炙

右四味。以水四升。煮取一升。頓服之。老小再服。取汗。

〔二十〕烏扇

千金方用
草湯無雄黃甘

〔拾玖〕鼈甲煎丸

赤硝

十二分

鼈甲

十二分
炙

柴胡

蟻蟬

六分
熬

黃芩

三分

鼠婦

熬三分

乾薑

大黃

桂枝

三分
即射干燒

石葦

去毛

芍藥

瞿麥

二分

厚樸
牡丹皮

紫葳
即凌

半夏

阿膠

一分

葶藶子
一分

人薑

一分

麷蟲

各五分

蟬窠

四分

右二十三味爲末。取蝦籠下灰一斗。清酒一斛五升。浸灰。俟酒盡一半。著鼈甲於中。煮令泛爛如膠漆。絞取汁。內諸藥。煎爲丸。如梧子大。空心服七丸。日三服。千金方用鼈甲十二片有海藻三分。大戟一分。無鼠婦赤礎二味。

「貳拾壹」白虎加桂枝湯

知母

六兩

石膏
一觔

甘草
二兩

粳米
六合

桂枝
三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

「貳拾壹」蜀漆散

蜀漆
燒去腥

雲母
日燒二夜

龍骨
分各等

右三味。杵爲散。未發前以漿水服半錢匕。

[貳拾貳] 侯氏黑散

菊花

四分十

白朮

十分

防風

十分

桔梗

八分

黃芩

五分

細辛

乾薑

人薑

茯苓

當歸

芎藭

牡蠣

礬石

桂枝

各三分

[貳拾叁] 風引湯

大黃

乾薑

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏

各六兩

右十二味。杵龜篩。以葦囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三沸。

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日一服。初服二十日。溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食自能助藥力。



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆
1951

溫服一升。

陳註乾薑桂枝減半升之

〔貳拾肆〕防己地黃湯

防己

甘草各一

桂枝

防風各三

右四味。以酒一杯漬之。絞取汁。生地黃二觔。咬咀蒸之。如斗米飯久。以銅器盛藥汁。更絞地黃汁和。分再服。

〔貳拾伍〕頭風摩散

大附子一枚

鹽等分

右二味爲散。沐了。以方寸匕。摩疾上。令藥力行。

〔貳拾陸〕桂枝芍藥知母湯

桂枝四兩

芍藥三兩

甘草

麻黃

附子各二兩

白朮

知母

防風各四兩

生薑五兩

右九味。以水七升煮取二升。溫服七合。日三服。

〔貳拾柒〕烏頭湯

麻黃 芍藥

黃耆

甘草

各三
兩 炙

烏頭

五枚

右將烏頭咬咀。以蜜二升。煎取一升。卽出烏頭。另四味。以水升。煮取一升。去滓。內蜜煎中。更煎之。服七合。不知。盡服之。

〔貳拾捌〕礬石湯

礬石 二兩

右一味。以漿水一斗五升。煎三五沸。浸脚良。

〔貳拾玖〕黃耆桂枝五物湯

黃耆 芍藥

桂枝

各三
兩

生薑

六兩

大棗

枚十二

右五味。以水六升。煮取二升。溫服七合。日三服。

〔參 挑〕桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝 芍藥

生薑

各三
兩

甘草

二兩

大棗

枚十二



南京中医药大学图书馆版权所有

龍骨

牡蠣

各三兩

右七味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

〔參拾壹〕天雄散

天雄

三兩
炮

白朮

八兩

桂枝

六兩

龍骨

三兩

右四味。杵爲散。酒服半錢匕。日三服。不知。稍增之。

〔參拾貳〕黃耆建中湯

卽小建中湯原方加黃耆一兩半。氣短胸滿者。加生薑。腹中滿者去棗。加茯苓一兩半。及療肺虛損不足。補氣。加半夏三兩。

〔參拾叁〕薯蕷丸

薯蕷

三十
分

人蔫

七分

阿膠

七分

白朮

六分

芍藥

六分

芎藭

六分

麥冬

六分

杏仁

六分

防風

六分

茯苓

五分



南京中医药大学图书馆版权所有

桔梗 五分

柴胡 五分

甘草 分二十

當歸 十分

乾地黃 十分

桂枝 十分

神曲 十分

豆黃卷 十分

乾薑 三分

白蘚 二分

大棗 百枚
爲膏

右二十一味。末之。煉蜜和丸。如彈子大。空腹酒服一丸。一百丸。
爲劑。

〔參拾肆〕酸棗仁湯

酸棗仁 二升

甘草 一兩

知母 二兩

茯苓 二兩

芎藭 一兩

右五味。以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。

〔參拾伍〕大黃麨蟲丸

大黃 十分

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 一升

蟲蟲 一升

芍藥 四兩

乾漆 一兩

乾地黃 十兩

水蛭 百枚

蟾蜍

百枚

塵蟲

半升

右十二味。末之。煉蜜和丸。小豆大。酒服五丸。日三服。

〔參拾陸〕射干麻黃湯

射干

三兩

麻黃

兩

生薑

各四

細辛

三兩

紫苑

三兩

款冬花

三兩

大棗

七枚

半夏

半升

五味子

半升

右九味。以水一斗二升。先煮麻黃二沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫再服。

〔參拾柒〕皂莢丸

皂莢

八兩
皮酥炙刮去

右一味。末之。蜜丸。梧子大。以棗膏和湯。服三丸。日三。夜一服。

〔參拾捌〕厚樸麻黃湯

厚樸

五兩

麻黃

四兩

石膏

子如大雞

杏仁

半升

半夏

半升



乾薑

二兩

細辛

二兩

小麥

一升

五味

半升

右九味。以水一斗二升。先煮小麥熟。去滓。內諸藥。煮取三升。溫服一升。日三服。

一本半
夏六升

〔卷拾玖〕澤漆湯

半夏

半升

澤漆

三升

以東流水五斗煮取一斗五升

白前

五兩

甘草

三兩

黃芩

三兩

紫蘆

五兩

作紫苑

桂枝

三兩

生薑

五兩

人蔞

三兩

〔肆拾壹〕麥門冬湯

麥門冬

七升

半夏

一升

人蔞

一升

甘草

各二兩

粳米

三合

大棗

枚十二

右六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

〔肆拾壹〕葶藶大棗瀉肺湯

葶苈

然如彈子大搗

大棗

枚十二

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶苈煮取一升頓服。

肆拾貳越婢加半夏湯

麻黃

六兩半升

石膏

半斤

生薑

三兩

大棗

枚十二

甘草

二兩

肆拾叁小青龍加石膏湯
右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服。

肆拾叁小青龍加石膏湯

卽小青龍湯原方加石膏

研末兩陳按生用之

右九味以水一斗先煮麻黃減一升去上沫內諸藥煮取三升去滓強人服一升羸者減之日三服小兒服四合。

肆拾肆奔豚湯



甘草

芎藾

黃芩

芍藥

半夏

生薑

各四兩

生葛

五兩

甘李根白皮

一升

右九味。以水二斗。煮取五升。溫服一升。日三夜一服。

〔肆拾伍〕括樓薤白白酒湯

括樓實

一枚

薤白

半升

白酒

七升

右三味同煮。取二升。分溫再服。

〔肆拾陸〕括樓薤白半夏湯

括樓實

一枚

薤白

三兩

半夏

半升

白酒

一斗

右四味同煮。取三升。溫服一升。日三服。

〔肆拾柒〕枳實薤白桂枝湯

枳實

四枚

薤白

半升

桂枝

一兩

厚樸

四兩

括樓實

一枚

右五味以水五升。先煮枳樸取二升。去滓。內諸藥。再煮數沸。分

溫再服。

〔肆拾捌〕 茯苓杏仁甘草湯

茯苓

三兩

杏仁

伍十個

甘草

一兩

〔肆拾玖〕 橘枳生薑湯

橘皮

一觔

枳實

三兩

生薑

半觔

右三味。以水一斗。煮取五升。溫服一升。日三服。不差。更服。

〔伍拾壹〕 蒼朮附子散

蒼朮

十五兩

大附子

炮十枚

右二味。杵爲散。服方寸匕。日三服。

〔伍拾壹〕 桂枝生薑枳實湯

桂枝

生薑

各三兩

枳實

五兩



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

右三味。以水六升。煮取三升。分溫三服。

〔伍拾貳〕烏頭赤石脂丸

烏頭一分
炮

蜀椒一兩

乾薑一兩

附子半兩
炮

赤石脂

〔伍拾叁〕厚樸七物湯

厚樸半觔

甘草

大黃各三
兩

大棗十枚

枳實五枚

桂枝二兩

生薑五兩

右五味。末之。蜜丸。如梧子大。先食服一丸。日三服。不知。稍加服。右七味。以水一斗。煮取四升。溫服八合。日三服。嘔者。加半夏五合。下利去大黃。寒多者。加生薑至半觔。

〔伍拾肆〕附子粳米湯

附子一枚
炮

半夏

粳米各半
升

甘草一兩

大棗十枚

右五味。以水八升。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

〔伍拾伍〕厚樸三物湯

厚樸

八兩

大黃

四兩

枳實

五枚

右三味。以水一斗二升。先煮二味。取五升。內大黃。煮取三升。溫服一升。以利爲度。

〔伍拾陸〕大建中湯

蜀椒

二合
去汗炒

乾薑

四兩

人蔘

二兩

右三味。以水四升。煮取二升。去滓。內膠飴一升。微火煮取二升。分溫再服。如一炊頃。可飲粥二升。後更服。當一日食糜粥。溫覆之。

〔伍拾柒〕大黃附子湯

大黃

三兩

附子

三兩

細辛

二兩

右三味。以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人。煮取二升半。分

溫三服。服後如人行四五里。進一服。

〔伍拾捌〕赤丸

烏頭

炮二兩

茯苓

四兩

細辛

一兩

半夏

四兩

右四味末之。內真朱爲色。煉蜜爲丸。加麻子大。先食。飲酒下丸。日再夜一服。不知稍增以知爲度。

〔伍拾玖〕大烏頭煎

烏頭

去皮者五枚
不必咀熬

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差明日更服。不可一日更服。

〔陸拾〕當歸生薑羊肉湯

當歸

三兩

生薑

五兩

羊肉

一斤

右三味。以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多。加生薑



成一劖。痛多而嘔者。加橘皮二兩。白朮一兩。加生薑者。亦加水五升。煮取三升。二合服之。

〔陸拾壹〕烏頭桂枝湯

烏頭

五枚

右一味。以蜜二升。煎減半。去滓。以桂枝湯五合。合解之。令得一升餘。初服五合。不知。卽服三合。又不知。復加至五合。其知者。如醉狀。得吐者。爲中病。

〔陸拾貳〕旋覆花湯

旋覆花

三兩

葱

莖十四

新絳

少許。今云。薑草卽新絳也。

右三味。以水三升。煮取一升。頓服。

〔陸拾叁〕甘薑荅朮湯

一著湯。腎

甘草

二兩

白朮

二兩

乾薑

四兩

茯苓

四兩

右四味。以水五升。煮取三升。分溫三服。腰中即溫。

〔陸拾肆〕甘遂半夏湯

甘遂

大者
三枚

半夏

十二枚以水一升
煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

一如
枚指
大

右四味。以水二升。煮取半升。去滓。以蜜半升。和藥汁。煎取八合。頓服之。

〔陸拾伍〕木防己湯

木防己

三兩

石膏

如鷄子
大二枚

桂枝

二兩

人蔘

四兩

右四味。以水六升。煮取二升。分溫再服。

〔陸拾陸〕木防己去石膏加茯苓芒硝湯

木防己

三兩

桂枝

二兩

桂枝

四兩

人蔘

四兩

芒硝

三合

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。

〔陸拾柒〕澤瀉湯

澤瀉

五兩

白朮 二兩

〔陸拾捌〕厚樸大黃湯

厚樸

一尺

大黃 六兩

枳實 四枚

右二味。以水二升。煮取一升。分溫再服。

〔陸拾玖〕小半夏湯

半夏

一升

生薑 半觔

右三味。以水五升。煮取二升。分溫再服。

右二味。以水七升。煮取一升半。分溫再服。

〔柒拾〕己椒蘚黃丸

防己

椒目

葶藶

大黃

各一兩

右四味。末之。蜜丸。如梧子大。先食飲服一丸。日三服。稍增。口中

有津液渴者加芒硝半兩。

〔柒拾壹〕小半夏加茯苓湯

半夏

一升

生薑

半觔

茯苓

四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服。

〔柒拾貳〕荳桂五味甘草湯

桂枝

四兩

茯苓

四兩

五味

半升

甘草

炙三兩

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服。

〔柒拾叁〕荳桂五味甘草去桂加薑辛湯

茯苓

四兩

甘草

三兩

乾薑

三兩

細辛

三兩

五味子

半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三。

〔柒拾肆〕荳甘五味薑辛加半夏湯

茯苓

四兩

甘草

三兩

細辛

三兩

乾薑

三兩

五味子

半升

半夏 半升

右六味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服半升。日三服。

〔柒拾伍〕荅甘五味薑辛夏加杏仁湯

茯苓

四兩

甘草 三兩

乾薑 三兩

五味子 半升

半夏 半升

杏仁

半升

細辛 三兩

〔柒拾陸〕荅甘五味薑辛夏杏加大黃湯

茯苓

四兩

甘草 三兩

乾薑 三兩

細辛 三兩

五味子 半升

半夏

半升

杏仁 半升

大黃 三兩

右七味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服半升。日三服。

〔柒拾柒〕括樓瞿麥丸

薯蕷 三兩

茯苓 三兩

括樓根 二兩

附子 炮一枚

瞿麥 一兩

右八味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

右五味末之。煉蜜丸。如梧子大。飲服二丸。日三服。不知。增至七八丸。以小便利。腹中溫。爲知。

〔柒拾捌〕蒲灰散

蒲灰 半分

滑石 三分

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

〔柒拾玖〕滑石白魚散

滑石 二分

亂髮 燒二分

白魚 二分

右三味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

〔捌拾壹〕茯苓戎鹽湯

茯苓 半兩

白朮 二兩

戎鹽 一枚 大

右三味。先將茯苓白朮煎成。內戎鹽。再煎。分溫三服。

〔捌拾壹〕越婢加朮湯

麻黃

六兩

石膏

半觔

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

白朮

四兩

右六味。以水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。惡風加附子一枚。

〔捌拾貳〕越婢湯

麻黃

六兩

石膏

半觔

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

右五味。以水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。惡風加附子一枚。風水加朮四兩。

〔捌拾叁〕防己茯苓湯

防己

三兩

黃耆

三兩

桂枝

三兩

茯苓

六兩

甘草

二兩

右五味。以水六升。煮取二升。分溫三服。

〔捌拾肆〕甘草麻黃湯

甘草 二兩

麻黃 四兩

右二味。以水五升。先煮麻黃。去上沫。內甘草。煮取三升。溫服升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。

〔捌拾伍〕杏子湯 從金鑑補

麻黃

四兩

杏仁 五個

甘草 二兩

右三味。以水六升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。得汗止服。

〔捌拾陸〕黃耆芍藥桂枝苦酒湯

黃耆

五兩

芍藥 三兩

桂枝 三兩

右三味。以苦酒一升。水七升。相合。煮取三升。溫服一升。當心煩。服至六七日。乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。

〔捌拾柒〕桂枝加黃耆湯



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

桂枝

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩

甘草

二兩

黃耆

二兩

大棗

十枚

〔捌拾捌〕桂甘薑棗麻辛附子湯

桂枝

三兩

生薑

三兩

細辛

二兩

甘草

二兩

麻黃

二兩

附子

一枚

大棗

一枚十二

右六味。以水八升。煮取三升。溫服一升。須臾啜熱稀粥一升。以助藥力。溫覆取微汗。若不汗更服。

〔捌拾玖〕枳朮湯

枳實

七枚

白朮

二兩

右二味。以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中悶。卽當散也。



南京中医药大学图书馆版权所有

〔玖拾〕硝石礬石散

硝石

熬黃

礬石

分燒等

右二味爲散。大麥粥汁和服方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

〔玖拾壹〕梔子大黃湯

梔子

十四枚

大黃

二兩

枳實

五枚

豉

一升

右四味以水六升。煮取二升。分溫三服。

〔玖拾貳〕猪膏髮煎

猪膏

半觔

亂髮

如鶴子
大三枚

右二味和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

〔玖拾叁〕茵陳五苓散

茵陳

十分

五苓散

五分



南京中医药大学图书馆版权所有

右二味。和先食飲服方寸匕。日三服。

〔玖拾肆〕大黃硝石湯

大黃

四兩

黃藥

四兩

硝石

四兩

梔子

十五枚

右四味。以水六升。煮取二升。去滓。內硝更煮取一升。頓服。

〔玖拾伍〕半夏麻黃丸

半夏

麻黃

各等分

右二味。末之。煉蜜爲丸。小豆大。飲服三丸。日三服。

〔玖拾陸〕柏葉湯

柏葉

三兩

乾薑

三兩

艾

三把

右三味。以水五升。取馬通汁一升合煮。取一升。分溫再服。千金加阿膠亦佳

〔玖拾柒〕黃土湯

甘草

乾地黃

白朮

附子

炮

阿膠



南京中医药大学图书馆版权所有

雜病方治

黃芩

各三兩

竈中黃土

半觔

右七味。以水八升。煮取三升。分溫三服。

〔玖拾玖〕瀉心湯

大黃

二兩

黃連

一兩

黃芩

一兩

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。

〔玖拾玖〕猪苓散

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右三味。杵爲散。飲服方寸匕。日三服。

〔壹百〕大半夏湯

半夏

二升

人蔘

三兩

白蜜

一升

右三味。以水一斗二升。和蜜搗之二百四十遍。煮藥取二升半。溫服一升。餘分再服。



南京中医药大学图书馆版权所有
NanJing University of Chinese Medicine Library

〔百零壹〕大黃甘草湯

大黃

四兩

甘草

二兩

〔百零貳〕茯苓澤瀉湯

茯苓

半觔

澤瀉

四兩

甘草

二兩

桂枝

二兩

白朮

三兩

生薑

四兩

右二味以水三升。煮取一升。分溫再服。

日三服

外臺治消渴脈絕胃
反者有小麥一升

〔百零叁〕文蛤湯

文蛤

五兩

石膏

五兩

麻黃

三兩

甘草

三兩

生薑

三兩

〔百零肆〕杏仁湯

杏仁

五十粒

大棗

十二枚

右七味。以水六升。煮取二升。溫服一升。汗出即愈。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

卷之三

〔百零肆〕半夏乾薑散

半夏

乾薑

各等分

右二味。杵爲散。取方寸匕。漿水一升半。煮取七合。頓服之。

〔百零伍〕生薑半夏湯

半夏

半升

生薑

一升

右二味。以水三升。煮半夏。取二升。內生薑汁。煮取一升半。小冷。分四服。日三夜一。嘔止停後服。

〔百零陸〕橘皮湯

橘皮

四兩

生薑

半觔

右二味。以水七升。煮取三升。溫服一升。下咽卽愈。

〔百零柒〕橘皮竹茹湯

橘皮

二觔

竹茹

二升

大棗

三十枚

生薑

半觔

甘草

五兩

人蔞

一兩

右六味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日三服。

〔百零捌〕紫蔞湯

紫蔞

半觔

甘草 三兩

右二味。以水五升。先煮紫蔞。取二升。內甘草。煮取一升半。分溫三服。

〔百零玖〕訶黎勒散

訶黎勒 十枚

右一味。爲散。粥飲和。頓服。

〔百壹拾〕薏苡附子敗醬散

薏苡仁 十分 附子 二分

敗醬 五分

右三味。杵爲散。取方寸匕。以水二升。煎減半。頓服。小便當下。

〔百拾壹〕大黃牡丹湯

大黃

四兩

牡丹

一兩

桃仁

個五
十

冬瓜仁

半升

芒硝

三合

右五味以水六升。煮取一升。去滓。內芒硝再煎沸。頓服之。有膿當下。如無膿當下血。

〔百拾二〕王不留行散

王不留行

八十
分八
月採

蒴藋細葉

七十
分七
月採

甘草

十八
分

桑東南根白皮

三十
分三
月採

黃芩

二分

蜀椒

三分

厚樸

二分

乾薑

二分

芍藥

二分

右九味。王不留行。蒴藋。桑皮。三味燒灰存性。各別杵篩合治之。爲散。服方寸匕。小瘡卽粉之。大瘡但服之。產後亦可服。

〔百拾三〕排膿散

枳實

十六分

芍藥

六分

桔梗

二分



北京中医药大学图书馆版权所有

右三味杵爲散。取雞子黃一枚。以藥散與雞子黃相等。揉和
相得。飲和服之。日一服。

〔百拾肆〕排膿湯

甘草 二兩

桔梗 三兩

生薑 一兩

大棗 十枚

右四味以水三升。煮取一升。溫服五合。日再服。

〔百拾伍〕黃連粉

黃連

右味以水

〔百拾陸〕藜蘆甘草湯

藜蘆

右味以水

〔百拾柒〕雞屎白散

雞屎白

方寸末取

右一味。以水六合和。溫服。

〔百拾捌〕蜘蛛散

蜘蛛

十四枚
熬焦

桂枝

半兩

右二味爲散。取八分一匕。飲和服。日再服。蜜丸亦可。

〔百拾玖〕甘草粉蜜湯

甘草

二兩

白粉

一兩

白蜜

四兩

右三味。以水三升。先煮甘草取二升。去滓。內粉蜜攪令和。煎如薄粥。溫服一升。差即止。

〔百貳拾〕桂枝茯苓丸

桂枝

茯苓

丹皮

桃仁

尖去皮
熬

芍藥

各等
分

右五味末之。煉蜜丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知加至三



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

丸。

〔百貳壹〕膠艾湯

乾地黃 六兩

芍藥 二兩

阿膠 二兩

甘草 二兩

芍藥 四兩

艾葉 三兩

當歸 三兩

當歸 三兩

當歸 三兩

〔百貳貳〕當歸芍藥散

當歸 三兩

芍藥 三兩

芍藥 一兩

茯苓 四兩

白朮 四兩

澤瀉 半觔

右六味。杵爲散。取方寸匕。酒和。日三服。

〔百貳叁〕乾薑人蔫半夏丸

乾薑 一兩

人蔫 一兩

半夏 二兩

右三味。末之。以生薑汁糊爲丸。梧子大。飲服十九丸。日三服。

〔百貳肆〕當歸貝母苦棗丸

當歸
貝母

苦棗各四兩

右三味。末之。煉蜜丸。如小豆大。飲服三丸。加至十九丸。陳按。男兩人滑石半兩加

〔百貳伍〕葵子茯苓散

葵子一升
茯苓三兩

〔百貳陸〕當歸散

右二味。杵爲散。飲服方寸匕。日二服。小便利。則愈。

當歸

黃芩

芍藥

芎藺各一兩

白朮

半兩

右五味。杵爲散。酒服方寸匕。日再服。妊娠常服。卽易產。胎無疾苦。產後百病悉主之。

〔百貳柒〕白朮散

白朮

芎藭

蜀椒

各三分

牡蠣 一分

右四味。杵爲散。酒服一錢匕。日三服。夜一服。但苦痛。加芍藥。心下毒痛。倍加芎藭。心煩吐痛。不能食飲。加細辛一兩。半夏大者二十枚。服之後。更以醋漿水服之。若嘔以醋漿水服之。復不解者。小麥汁服之。已後渴者。大麥粥服之。病雖愈。服之勿置。

〔百貳捌〕枳實芍藥散

枳實

燒令黑
久太過

芍藥

等分

〔百貳玖〕下瘀血湯

右二味。杵爲散。服方寸匕。日三服。并主癰膿。大麥粥下之。

大黃

三兩

桃仁

個二十

麨蟲

去足十粒

新血下如豚肝。

張按加蜜以緩大黃之急

右三味。末之。煉蜜和爲四丸。以酒一升煮一丸。取八合。頓服之。

〔百參拾〕竹葉湯

竹葉 一把

人蔘 一兩

葛根 三兩

防風 一兩

桔梗 一兩

桂枝 一兩

甘草 一兩

附子 一枚

生薑 五兩

大棗 十枚

〔百參壹〕竹皮大丸

生竹茹 二分

石膏 二分

桂枝 一分

白薇 一分

甘草 七分

右五味。末之。棗肉和丸。彈子大。飲服一丸。日三夜二服。有熱倍
白薇。煩喘者。加柏實一分。

〔百參貳〕白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁 二兩

阿膠 二兩

甘草 二兩

黃連 三兩

黃柏 三兩

秦皮 三兩

右六味。以水七升。煮取二升半。內膠令消盡。分溫三服。

〔百參卷〕半夏厚樸湯

半夏

一升

厚樸

三兩

茯苓

四兩

生薑

五兩

蘇葉

二兩

〔百參肆〕甘麥大棗湯

甘草

三兩

小麥

一升

大棗

十枚

右五味。以水一斗。煮取四升。分溫四服。日三夜一服。

〔百參伍〕溫經湯

吳茱萸

三兩

當歸

二兩

芎藺

二兩

芍藥

二兩

人蔫

二兩

桂枝

二兩

阿膠

二兩

丹皮

二兩

甘草

二兩

半夏

半升

麥冬

一升

生薑

三兩

右十二味。以水一斗。煮取三升。分溫三服。亦主婦人少腹寒。久

不受胎。兼治崩中去血。或月水來多。及至期不來。

〔百參陸〕土瓜根散

土瓜根 芍藥

桂枝

麝蟲
分各三

右四味。杵爲散。酒服方寸匕。日三服。

〔百參柒〕膠薑湯

阿膠 乾薑

右 味以水

〔百參捌〕大黃甘遂湯

大黃 甘遂 阿膠
四兩 二兩 二兩

右三味。以水三升。煮取一升。頓服。其血當下。

〔百參玖〕礬石丸

礬石 烧三分 杏仁一分

右二味。末之。煉蜜丸。棗核大。內臟中劇者。再內之。

〔百肆拾〕紅藍花酒

紅藍花 一兩

右一味酒。一大升。煎減半。頓服一半。未止再服。

〔百肆壹〕腎氣丸 八味丸崔氏

乾地黃 八兩

薯蕷 四兩

山茱萸 四兩

茯苓 三錢

丹皮 三兩

澤瀉 三兩

附子 炮一枚

桂枝 一兩

右八味。末之。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。加至二十九丸。日再服。

〔百肆貳〕蛇床子散

蛇床子

右一味。末之。以白粉少許。和合相得。如棗大。綿裹內之。自然溫。

〔百肆卷〕狼牙湯

狼牙 三兩

右一味。以水四升。煮取半升。以綿纏筋如繭。浸湯瀝陰中。日四遍。

雜病方法終



經方歌括

閩杭包育華桃初氏著

長男識生參校

雜病方

長孫天白校字

〔一〕括樓桂枝柔痉方。

陽旦加參兩括鑊。

以水玖升微火煮。

取參升度作參嘗。

〔二〕麻黃加朮溼家方。

身痛疼煩以此良。

原劑麻黃加朮朮。

水煎服法效麻黃。

用麻黃經用麻黃先煮者次先煮者次

〔三〕麻杏薏甘拾杏充。

薏仁半兩與麻同。和同壹草皆當剉。

每服四錢匕自工。

蓋半水煎成八分。去渣服出汗防風。

〔肆〕防己黃耆風溼宜。

黃耆五分古之規。貳甘參朮肆防己。

肆片生薑壹棗施。

蓋半水煎成八分。去渣溫服盡傾卮。

右抄到麻豆大

在卷末
加減歌

痛按原文有腹
加芍藥也

此方俱是
古之份數

取微汗汗不出
食頃微熱粥發



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library

「伍」壹物瓜蒂湯。甜瓜蒂最良。本文言貳柒。拾肆個尤詳。

剉散需升水。煎成伍合嘗。太陽傷渴病。身重熱疼方。

頓服

「陸」百合知母參兩知。柒枚百浸壹宵宜。各需甘合泉煎半

兩汁除渣更煮之。

「柒」百合滑石赭石湯。赭如彈子一枚良。柒枚百與滑參兩

別煮同煎照上方。

「捌」百合鷄黃貳種全。柒枚百照首方煎。鷄黃壹個調勻煮。

取半升嘗壹服妍。

「玖」百合地黃湯。柒枚百合良。先煎如上法。地汁壹升量。

煮取成升半。溫分貳服嘗。服之如中病。糞似漆而溏。

「拾」百合洗方水斗量。壹升百漬壹宵良。去渣藥汁洗身已。

百合水洗漬壹宿當白
沫出去其水乃可取用

煎取半升
分溫再服

照上取服法
俱用綿裹石碎

煮熟服法不同

食餅勿將鹽豉嘗。

「拾壹」括樓牡蠣散。貳種稱勻商。研末抄方匕。日參飲服嘗。

「拾貳」百合滑石滑參匡。百須壹兩炙來嘗。取方寸匕日參服。

微利藥停熱卽康。

「拾叁」甘草瀉心加薑方。

服飲和

方原甘草瀉心湯。原方加入薑參兩。

瀉心湯法
加甘草

拾合苦薑斗水肺。

煮取柒升熏洗法。

「拾肆」苦薑湯是水熏規。去渣一日洗三時。

瀉心湯法
加甘草

壹味雄黃杵末焚。

筒瓦合之烟出處。

「拾伍」雄黃熏法火熏云。

肛門正對藥烟熏。

火熏按此方
法也

「拾陸」赤豆當歸近血嘉。

參升赤豆浸令芽。當歸拾分同椿散。

漿水和來寸匕加。

服日參



南京中医药大学图书馆版权所有

「拾柒」升麻鼈甲半兩雄。

歸草升麻貳兩同。

壹兩蜀椒炒去汗。

鼈如指大壹枚充。

肆升水煮壹升服。

老小再嘗取汗通。

千金方有桂無
鼈甲此類服方

「拾捌」升麻鼈甲去雄椒。

歸草升麻貳兩調。

鼈甲壹枚如指大。

水煎服法照前條。

千金方用黃草湯無雄黃

「拾玖」鼈甲煎丸瘡母方。

參芩鼠扇肆蜂房。

柴胡陸分蟻螂等。

拾貳赤硝鼈甲鑊。

伍分丹膠凌桂芍。

葦黃麝夏樸乾薑。

瞿桃貳分蘢夢壹。

共貳拾參杵末良。

取鍛竈中灰壹斗。

酒需壹斛伍升量。

浸灰俟酒盡成半。

納鼈煎膠絞汁漿。

和藥末煎至鞭。

丸如梧子日參嘗。

壹回柒個空心服。

送下未詳某種湯。

千金方用鼈甲拾貳片有海藻
卷分大戟壹分無鼠婦赤硝

「貳拾」白虎加桂枝參兩。

治溫瘡脈如平象。無寒但熱嘔煩疼。

病本陰孤陽獨長。

[貳拾壹]蜀漆散治牡瘡瘻。

乘瘡未來服在先。

此方洗字訛燒字。

[貳拾貳]侯氏黑散大風方。

牡桂乾薑參分匡。

共成拾肆味椿散。

禁魚肉蒜切毋忘。

熱食卽通冷則止。

[貳拾叁]風引除熱癱瘓方。

參桂貳甘牡蠣鑲。

井泉卅合煎參沸。

雲龍蜀漆秤勻研。

雲母宜燒兩日夜。

考李時珍本亦然。

菊花肆拾分爲強。

拾分尤風和捌桔。

寸匕酒調日壹嘗。

常宜冷食陸旬止。

自能取藥力非常。

乾薑肆兩并龍黃。

共杵麩篩而後用。

溫服一升病日康。

半錢匕散調漿水。

漆當水洗去腥妍。

歸芎藎茯苓辛礬蠣。

黃芩伍分獨寒涼。

初服貳旬溫酒下。

藥積腹中不下良。

此諸方蜀漆燒可知其訛惟

蓋陳氏註桂枝
半同用之

〔貳拾肆〕防己地黃治狂方。

血中風症亦能攘。

桂風參分已甘壹。

杯酒漬之取汁漿。

生地貳觔宜咬咀。

蒸之斗米飯成良。

以銅器貯藥之汁。

再絞地黃汁共鑊。

附子和鹽等分研。

附子和鹽等分研。

沐了散需方寸匕。

服分再

按摩疾上病當痊。

附草麻黃貳兩詳。

桂朮知風俱肆兩。

生薑伍兩芍參匡。

分作參回壹日嘗。

柒升水煮貳升度。

另用參麻耆芍草。

蜜貳升煎減半裁。

取柒合湯壹服該。

參升水煮一升來。

兩湯去渣再和煮。

兩湯去渣再和煮。

知之如醉且停杯。

若不知之宜盡服。

白礬貳兩獨煎湯。

煎需斗伍清漿水。

〔貳拾捌〕礬石湯治腳氣方。

參伍沸兮浸脚良。

更
升
烏
頭
宜
晚
服

未
詳
幾
多
可

〔貳拾玖〕黃耆桂枝五物湯。

參兩耆和陽旦方。加倍生薑除去草。

陸升水煮貳升良。

日三服七合

〔參拾壹〕桂枝方加龍蠣湯。

參兩蠣龍陽旦鑊。陽旦扶營精自暖。

蠣龍納衛火潛藏。

日三服七合

〔參拾貳〕天雄散治冷精方。

陸兩桂枝捌尤強。參兩天雄龍共杵。

半錢匕散酒調嘗。

日三服七合

此方氣味最
知稍增之
雄用之量少

〔參拾貳〕黃耆建中藥。卽小建中湯。

兩半耆加入。扶營氣弱方。

〔參拾叁〕
照小建中湯未詳可

加減歌
在卷末

〔參拾肆〕薯蕷丸治百疾良。

棗膠柒分秤母忘。甘須廿分薯參拾。

伍桔柴苓貳錢匡。

朮杏冬風芎芍陸。仍須參分北乾薑。

豆黃麴地桂歸拾。

百棗爲膏鍊蜜鑊。廿壹種研丸彈大。

空心酒送一丸嘗。

百丸爲劑治風氣。

并主虛勞諸損方。

〔參拾肆〕酸棗仁湯水捌升。

貳升棗煮陸升應。

茯知貳兩芎甘壹。

共煮參升參服繩。

〔參拾伍〕大黃麌蟲治七傷。

桃杏蟲蟲拾合量。

螬蛭百枚麌伍合。

地黃拾兩草參匡。

貳芩肆芍壹乾漆。

拾分大黃製熟良。

鍊蜜和丸小豆大。

酒吞伍個日參嘗。

〔參拾陸〕射干麻黃主肺邪。

肆兩生薑肆兩麻。

夏味半升棗七個。

參辛紫射款冬花。

水需斗貳麻先煮。

貳沸沫除諸藥加。

煮取參升分再服。

壹回升半恐防差。

規按經方無服升半
疑二升訛作三升

〔參拾柒〕皂莢丸攻實濁痰。

莢須肥潤半斤堪。

去皮酥炙研爲末。

以蜜丸如梧子潭。

泔水棗膏烊化服。

日參夜壹每回參。

〔參拾捌〕厚樸麻黃貳細薑。

膏如鷄子肆麻黃。

半升五味杏仁夏。

小麥壹升樸伍強。

熟而去滓藥和鑲。

煎參升度先嘗壹。

日服參餐咳自康。

用壹本半夏

桂蔞參兩并甘芩。

參升澤漆半升夏。

前紫生薑伍兩任。

煎成壹斗伍升箴

藥當咬咀後和入。

溫服半升至夜盡。

日嘗拾次藥功深。

煮取伍升少少斟。

貳兩人蔞炙草從。

棗須拾貳枚參合米。

溫水壹斗兩升煮取陸升

斟此方餘薑

貳拾壹夢熬搗取彈丸良。

棗須拾貳枚參合米。

再納夢煎取拾合。

將湯頓服肺癰康。

原方加夏半升量。

欬而上氣肺爲脹。

目脫脈浮大者良。

越婢服法如

卽小青龍八種方。

再入生膏原貳兩。

〔肆拾叁〕小青龍加石膏湯。

〔卷拾玖〕澤漆湯治咳脈沉。

澤用東流水伍斗。

煎成壹斗伍升箴

藥當咬咀後和入。

煮取伍升少少斟。

作紫薺或

可以

千金子少些代之

按澤漆今時藥鋪無有

斟此方餘薑

酌用之

修園註曰倍加商。

〔肆拾肆〕奔狥生葛伍兩丞。

生薑肆兩夏平稱。

〔肆拾伍〕括樓薤白白酒湯。

柒升白酒煮來嘗。

〔肆拾陸〕括樓薤白半夏湯。

心疼徹背不眠方。

〔肆拾柒〕枳實薤白桂枝湯。

薤白半升伍種鑊。

納諸藥煮貳參沸。

〔肆拾捌〕茯苓杏仁甘草湯。

拾升水煮五升良。

升煮法如小青龍湯但此多強人服一
升羸者減之日三服小兒服肆合

甘李根白皮壹升。芍草歸芎芩貳兩。

水貳斗煮取伍升先溫
服壹升日參夜壹服

喘咳胸疼徹背方。

薤白半升樓壹個。

半夏半升酒斗量。

壹個括樓三兩薤。

肆枚枳實壹樓匡。

水伍升先煎枳樸。

去滓溫分再服嘗。

虛痺胸中氣塞方。

壹草參苓伍拾杏。

服溫不差更服
量升日三

治胸滿下
逆搶心方



北京中医药大学图书馆版权所有

〔肆拾玖〕橘皮枳實生薑湯。

實痺胸中氣塞方。

橘壹觔和參兩枳。

驅寒捌兩老生薑。

升水五升煮取二升分溫再服

〔伍拾〕薏苡附子散最良。

薏仁拾伍兩和鑊。

拾枚炮附同椿散。

胸痺兼之緩急方。

升水六升煮取二升分溫再服

〔伍拾壹〕桂枝生薑枳實湯。

參兩桂薑伍枳匡。

心內痞而諸逆上。

心懸痛者此方良。

升水六升煮取二升分溫再服

心背往來互痛良。

壹分烏頭半兩附。

〔伍拾貳〕烏頭赤石脂丸方。

升水六升煮取二升分溫再服

脂椒壹兩等乾薑。

參兩烏頭赤石脂丸。

〔伍拾叁〕厚樸七物滿潮方。

升水六升煮取二升分溫再服

參兩甘黃貳桂匡。

湯中捌樸伍生薑。

〔伍拾肆〕附子梗米腹寒該。

津水八升煮米熟湯成去

壹兩甘和附壹枚。

雷鳴脅滿吐同來。

半升粳米拾枚棗。

蜜丸爲丸如梧子大飯前服

此丸似

溫服八合日三服不知稍加服

在卷末歌



〔伍拾伍〕厚樸三物閉疼方。

方如大承氣除芒。肆黃捌樸伍枚枳。

枳撲先煎後大黃。

〔伍拾陸〕大建中名意義深。

肆乾薑配貳人蔘。膠飴拾合蜀椒貳

水肆升煎廿合箴。

去滓入飴微火煮。煮成廿合貳回斟。

一炊頃飲貳升粥。

當日食糜再覆衾。

〔伍拾柒〕大黃附子溫通方。

參兩附黃貳細匡。分作參回藥頗強。

分溫參服法如常。

強人煮取貳升半。再需壹服力尤剛。

服後如人行五里。

此款痧丸倣此規。壹兩細辛肆茯夏。

〔伍拾捌〕赤丸寒氣厥逆宜。

烏頭貳兩炮來施。先食酒吞三粒治。

日上二回夜一度。

不知稍益使其知。卅合水煎拾合裁。

〔伍拾玖〕大烏頭煎烏伍枚。

去滓蜜和貳拾合。

黃水壹斗兩升先煮貳味取五升內大
煮取三升溫服一升以利爲度。

初服後飲粥加覆被再服

爲之鍊蜜

煎令水盡貳升來。

強人服柒合湯度。

弱者祇宜伍合該。

不瘥明天可再服。

不當一日服雙回。

烏頭熬去皮廻口
力薄故云不必咀

〔陸拾壹〕搶當歸生薑羊肉湯。

參兩當歸伍老薑。

羊肉壹觔治裏急。

腹中寒疝脅疼良。

蜜貳升煎減半收。

伍合桂枝湯解化。

調勻升許半升投。

半升不醉再參合。又不知加伍合優。

知醉吐時爲中病。

藥令瞑眩病初瘳。

〔陸拾貳〕旋覆花湯肝着方。

其人常欲蹈胸良。覆花參兩絳微許。

葱拾肆莖共煮嘗。

肆北薑茶貳朮甘。腹重腰疼如水冷。

〔陸拾叁〕甘遂半夏水升量。

水寒暖土法當諳。

先煎夏拾貳枚良。

煎成減半除渣後。

〔陸拾肆〕甘遂半夏水升量。

溫水五升煮取三升分

水八升煮取三升溫服七合日三服

當作二升加減歌在卷末

微許少許也

降絳音

甘遂參枳伍匱。

炙草壹枚如指大。

貳升水與夏湯鑊。

煎成伍合再除滓。

入蜜半升再煮將。

煮捌合湯來頓服。

此除留飲病堅強。

〔陸拾伍〕木防己湯支飲方。

膈部飲虛以此良。

參己肆蕘貳兩桂。

膏如鷄子兩枚商。

加入茯苓芒硝湯。

前劑加硝參茯肆。

〔陸拾陸〕木防己去石膏方。

其人冒眩水爲殃。

澤需伍兩朮需貳。

膈間飲實此方良。

澤需伍兩朮需貳。

〔陸拾柒〕澤瀉湯治支飲方。

水貳升煎減半良。

水貳升煎減半良。

其人冒眩水爲殃。

澤需伍兩朮需貳。

〔陸拾捌〕厚樸大黃支飲湯。

飲成胸滿此湯良。

肆枚枳實炙來用。

壹尺樸根陸兩黃。

再分溫再服二升水

升水五升煎取二

〔陸拾玖〕小半夏湯飲嘔方。

生薑捌兩夏升量。

柒升水煮成升半。

確水六升煮取二升水
微煮分溫再服微利則愈

升水六升煮取二升水
微煮分溫再服微利則愈



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

須記分溫再服良。

〔柒拾壹〕已椒蘡黃壹兩般。

蜜作如梧子大丸。未飯服之飲送下。

壹回壹個日參餐。

在加減歌
卷末
用一味各

〔柒拾壹〕小半夏加茯苓湯。

卒然嘔吐痞宜詳。

膈間有水眩而悸。

小半夏加肆茯良。

小半夏湯
煮服法如

〔柒拾貳〕桂苓味草氣衝良。

因服青龍水厥方。

肆兩桂苓伍合味。

炙甘參兩補中央。

自此至第十四方皆水八升煮三升皆三服但此服一升後兩升減半升

〔柒拾叁〕苓味草薑細辛湯。

前方去桂入辛薑。

辛薑參兩原除咳。

咳止渴衝熱藥殃。

前方加夏半升量。

其人冒嘔爲支飲。

此主飲家不渴方。

〔柒拾肆〕苓味草薑辛夏湯。

前方加夏半升量。

〔柒拾伍〕苓味草乾薑。

辛夏杏仁湯。前劑仍原稱。杏加伍合量。

其人形腫者。論症要麻黃。只爲其人痺。麻黃不敢嘗。

水一斗煮取三升
溫服半升日三服

〔柒拾陸〕荅味草乾薑。辛夏杏黃湯。前劑仍原秤。加參兩大黃。

薑辛寒飲藥。

瀉熱大黃良。辛夏杏黃湯。

前劑仍原秤。加參兩大黃。

〔柒拾柒〕括樓瞿麥丸蜜爲。溺閉其人若渴宜。炮附壹枚瞿壹兩。

貳樓參蘋茯苓施。

丸如梧子日參服。

貳個不知再倍之。

至柒捌丸如溺利。

腹中溫緩是爲知。

下飲調

〔柒拾捌〕蒲灰散用香蒲黃。

肝氣繫營血分方。

半分蒲黃參分滑。

服參寸匕日參嘗。

下飲調

〔柒拾玖〕滑石白魚散最良。

飲調寸匕日參服。

肝氣繫於衛分方。

〔捌拾〕茯苓戎鹽湯閉方。

肝氣繫脾以此攘。壹個戎鹽如彈子。

捌苓貳朮另煎湯。

後分內戎鹽再

按此用多水煮取未詳

溺通亡液渴宜詳。

渴生裏水身黃腫

藥水六升先煮麻去沫內諸

在加減歌

更除桂芍爲營強。

加膏捌兩麻黃陸

陽旦如男越婢女。

陽男陰女不同行

陰兼陽象婢名越。

陽尙含陰象旦陽。

貳甘參桂已耆鑲。

四肢發腫皮膚水。

〔捌拾叁〕防己茯苓陸茯強。

上烹服詳 在加減歌

升水六升先煮麻去沫內諸

在卷末

聶聶動兮以此方。

肆麻先煮貳甘鑲。

治同越婢湯加朮。

水六升先煮麻去沫內諸

在卷末

〔捌拾肆〕甘草麻黃裏水方。

惟此方須發汗良。

服水五升先煮麻如法納草煮三升溫

重覆汗出再服慎風寒

〔捌拾伍〕杏子湯杏伍拾枚。

肆麻貳草秤來陪。脈浮水病此方妙。

沉者麻黃附子推。

但此方邈金鑑補按其煮法如越婢湯一升得汗止服無分溫再服字

〔捌拾陸〕耆芍桂枝苦酒湯。

伍耆參芍桂枝匡。壹升苦酒柒升水。

煮取參升取壹嘗。

服後心煩六七日。

此因醋阻不須惶。

主治黃汗而身腫。

發熱渴而汗出黃。

〔捌拾柒〕桂枝加黃耆湯方。

加入黃耆貳兩鑲。

亦照桂枝湯服法。

〔捌拾捌〕桂甘薑棗麻辛附。

即是桂枝去芍度。

再用麻黃附細辛。

兩方合劑無庸註。

桂枝湯但此方用水加一升與

〔捌拾玖〕枳朮湯中枳柒枚。

即是桂枝去芍度。

再用麻黃附細辛。

服後腹中積即開。

溫三升先煮麻如法煮取二升分

〔玖拾〕硝石礬石黃家宜。

硝礬火製秤勻施。

麥煎粥汁調方匕。

服至溺黃便黑時。

〔玖拾壹〕梔子大黃貳兩黃。

生梔拾肆個和鑲。

伍枚枳實壹升豉。

服日三

酒 潤 慢 慢 热 痛 方。

升水六升
分溫三服

捌兩猪膏切片煬。

納髮參枚雞子大。

小服後病從
便出

〔玖拾貳〕猪膏髮煎瘀燥方。膏 炙 髮 化 貳 回 評。

〔玖拾叁〕茵陳五苓散。拾分茵陳研。伍分五苓散。飲和寸匕妍。

參餐空腹服。黃癰病當痊。

〔玖拾肆〕大黃硝石癰家方。拾伍枚梔肆兩黃。

硝石蘡皮仍肆兩。去渣硝石再重煮。

陸升水煮兩升湯。

煮取壹升頓服良。

觀此重煎硝石法。芒硝之性不同行。

按硝石得火則成砂

夏麻等分蜜丸良。

丸如小豆吞參個。

壹日參回飲送嘗。

乾薑柏葉艾參匡。馬通取汁壹升度。

〔玖拾伍〕柏葉湯治吐血方。

和水伍升煮壹良。

再分溫
服

阿膠
千金
方加

浸水
取汁
也
果

〔玖拾柒〕黃土湯治已土虧。

離經之血不時遺。

參甘朮附膠芩地。

黃土半觔竈內宜。

水八升煮取三升分溫三服

按黃土臨用時燒一升頓服之

〔玖拾捌〕瀉心湯主吐衄良。

壹兩芩連貳大黃。

火息瘀行心氣足。

不消時法用滋方。

水三升煮取一升頓服之

〔玖拾玖〕猪苓散主嘔渴方。

猪朮茯苓等分商。

研末飲和方寸匕。

日須參服病安康。

〔壹〕大半夏湯胃反方。

水需斗貳蜜升量。

揚之貳百肆完畢。

貳夏參棗量秤當。

煮取貳升半藥汁。

先嘗拾合剩分嘗。

〔百零壹〕大黃甘草湯。

貳草肆黃良。

食已當時吐。

火衝胃反方。

升水三分
升溫再服

〔百零貳〕茯苓澤瀉胃反繩。

肆兩生薑澤瀉承。

茯朮朮參桂草貳。

水需壹斗煮參升。

始和澤煮貳升半。

壹日參回捌合應。



南京中医药大学图书馆版权所有

消渴脈亡胃反者。

外臺小麥壹升增。

〔百零參〕文蛤湯輸越婢功。

加增杏蛤性寬沖。

文蛤石膏伍兩工。

棗拾貳枚杏伍拾。

微風脈緊頭疼者。

借用此方療亦工。

〔百零肆〕半夏乾薑散。

秤勻取寸匙。清漿升半煮。

取柒合嘗之。

等分味

〔百零伍〕生薑半夏冷服方。

薑汁壹升夏半量。

以水叁升先煮夏。

煎成廿合法母忘。

再和薑汁煎升半。

嘔者湯宜少冷嘗。

服作日參惟夜壹。

嘔停慎勿服餘湯。

肆兩橘皮捌老薑。

水柒升煎叁拾合。

〔百零陸〕橘皮湯主嘔噦方。

橘皮兩橘皮捌老薑。

水柒升煎叁拾合。

先嘗拾合下咽康。

此方治嘔噦而手足厥者可

〔百零柒〕橘皮竹茹嚥逆方。

伍草壹箇捌老薑。

橘貳斤和叁拾棗。

溫服一升汗出愈升

能治吐後渴無窮。



南京中医药大学图书馆版权所有

竹茹生刮貳升量。

溫水一斗煮取三升

〔百零捌〕紫蘆下利肺痛方。 挑紫參甘貳種良。

先煮紫蘆後內草。

主治煮法兩微茫。

甘水五升草煮取一升半分溫三服內

〔百零玖〕訶黎勒煨拾枚研。

粥飲和來頓服研。

師立此方治氣利

局方倣作四神圓。

如無腹痛當下血

〔百零拾〕薏苡附子敗醬方。

腸癰膿現此能攘。

敗需伍分薏加倍。

貳分附同杵散良。

減取方寸七以水二升煎

〔百拾壹〕大黃牡丹湯。 壹兩丹皮良。

伍拾桃仁效。 參硝肆大黃。

冬瓜仁伍合。 癰結在腸方。

水陸升煎壹。 除滓再入芒。

如無腹痛當下血

〔百拾貳〕王不留行療金瘡。

貳芩樸芍并乾薑。 生甘拾捌椒參分。

拾分不留蒴蕘桑。

參味燒灰存性用。 別椿節合治之商。

服方寸匕大瘡法。

以粉散之療小瘡。

可服
產後亦

〔百拾叁〕排膿散主陽症瘡。

壹拾陸枚枳實強。

陸分芍和貳分桔。

排膿全仗壹雞黃。

散和雞子黃相等。

攪合飲和日壹嘗。

〔百拾肆〕排膿湯主陰症瘡。

壹兩生薑貳草商。

拾個棗和參兩桔。

辛甘扶衛托膿良。

溫水三升煮取一升
水分五合日再服

〔百拾伍〕黃連粉藥本方亡。

壹味黃連杵末良。

此是後人揆度意。

苦寒大瀉火淫瘡。

貳味煎來也可嘗。

指臂腫而搖動者。

〔百拾陸〕藜蘆甘草本方亡。

其人臂脚直如僵。

經筋上下微弦者。

其身瞶瞶此方良。

屎白研成寸匕嘗。

片大小兮上下遷。

拾肆蜘蛛熬半兩桂。

水六合
溫服

捌分壹匕飲和妍。

日再服蜜丸亦可

高音部九畫

「百拾玖」甘草粉蜜主蛇蟲。

烏梅丸症不相同。

吐涎心痛有時發。

壹粉貳甘肆蜜攻。

水三升先煎桂枝茯苓丸性純。

蜜提和煎如薄粥溫服一升去滓即止。

食前服壹個如神。桂芍丹桃茯秤勻。

日吞壹個不知者。桂芍丹桃茯秤勻。

煉蜜爲丸兔屎大加至參丸不害娠。

此治妊娠漏下。宿癥除去保雙身。

「百武壹」膠艾湯治經漏方。水伍酒參升共煮。

有無懷妊兩相當。方中肆芍參歸艾。煎參升度日參嘗。

貳草芎膠陸地黃。

不
膠
如
法
煮
阿

「百武貳」當歸芍藥疔痛該。

以芍壹觔澤半開。參兩歸芎專利血。

朮苓肆兩善安胎。

杵散取方寸七
酒和日三服

「百武叁」乾薑人蔘半夏丸。

壹兩薑蔘貳夏完。

薑汁糊丸梧子大。

拾丸飲服日參餐。

〔百貳肆〕當歸貝母苦棗圓。

飲吞參個漸加妍。

〔百貳伍〕葵子茯苓入太陽。

寸匕飲調日再嘗。

〔百貳陸〕當歸散主熱胎方。

朮須捌兩共椿良。

〔百貳柒〕白朮散主冷胎方。

錢匕酒調日夜嘗。

芍須生用枳須燒。平研寸匕日參服。

〔百貳捌〕枳實芍藥散方超。

瘀痛癰膿麥粥調。

腹中瘀血實疼良。麌桃甘個黃參兩。

參味各需肆兩研。

煉蜜丸如小豆大

可加至十丸。

陳註治男人加滑石半兩。

圓與丸義同韻異。

妊娠水氣患膀胱。

冬葵拾合芩參兩。

則小便利。

身重溺不利酒漸惡寒頭眩皆太陽之經氣病寒。

瘦赤脈洪胎太陽。

芩芍歸芎拾陸兩。

酒調方匕日雙服。

產後胎前亦可嘗。

脈虛肥白胎無陽。

參椒芎朮壹生蠣。

日三服夜一服在卷末。

鍊蜜肆丸煮壹嘗。

頓服一升煮一丸取八合

緩按加蠻以

〔百參拾〕竹葉湯中伍老薑。

壹風桔桂草葛鑲。

竹需壹把葛參兩。

棗拾伍枚附壹匡。

水一斗煮取二升半

加減歌
分溫三服覆取汗出
在卷末

〔百參壹〕竹皮大丸柒草依。

貳分膏茹壹桂薇。

棗肉和丸如彈子。

壹回壹個莫嫌稀。

日參夜貳飲和服。

加減宜從卷末睇。

〔百參貳〕白頭翁加草膠湯。

主產後虛下利方。

甘草膠翁宜貳兩。

秦皮連柏各參鑲。

水七升煮取二升半

黃氏本白
內膠如法分溫三服

〔百參叁〕半夏厚樸湯。

壹升半夏量。

貳蘇參厚樸。

肆茯伍生薑。

斗水煎成肆。

分溫肆服嘗。

日參而夜壹。

每次壹升良。

治婦咽癰症。

同梅核氣方。

〔百參肆〕甘麥大棗湯。

拾枚大棗良。

炙甘參兩切。

小麥壹升良。

水陸升煎半。

分參次服嘗。

能治脾氣弱。

治臟躁悲傷。

〔百參伍〕溫經湯芍草歸芎。

葛桂膠丹貳兩充。

拾合麥冬伍合夏。

吳萸參兩老薑同。

水需壹斗煎參分。

分作參回不可憮。

亦主婦人少腹冷。

多年不妊此方工。

崩中去血能兼治。

月水來多及緩通。

帶下經凝月再來。

少腹滿疼疝作怪。

〔百參柒〕土瓜根散破凝疝。

各三分杵散酒服

麌瓜桂芍稱同裁。

遍索諸書悉杳然。

此法失傳真可惜。

或云貳種取同煎。

貳兩遂膠肆兩黃。

少腹敦形難小便。

〔百參捌〕大黃甘遂辛寒方。

此爲水血結成殃。

丸如棗核納前陰。

症強再納方知效。

〔百參玖〕礬石參礬壹杏箴。

此爲水血結成殃。

納法勝於服藥憎。

經閉臟堅癖不止。

其乾血變白淫淋。

水三升煮取一升
頓服其血當下一升



男人內痔成乾血。

愚按新增以此斟。

爲鍊蜜

「百肆拾」紅藍花酒壹紅花。

酒大升煎減半差。

能治陸拾貳風家。

未止卽服
紅花一大升準今二合半

「百肆壹」腎氣丸名八味該。

地黃捌兩附全枚。

茱薯肆兩桂枝壹

澤瀉丹苓參兩裁。

煉蜜和丸梧子大。

酒吞拾伍日雙回。

「百肆貳」蛇床散暖女陰寒。

研末蛇床白粉搏。

綿裹納之如棗大。

溫陰坐藥自然安。

「百肆叁」狼牙湯療陰中瘡。

參兩狼牙煮取湯。

用筋纏綿如繭樣。

浸湯日瀝肆回良。

取水四升
半升
煮

附加減歌

「壹」防已黃耆有肆加。
喘須加拾貳銖麻。胃中不好芍加入。
氣上衝加桂最嘉。

下有陳寒辛可入。悉加參分稱休差。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

藥湯服後如蟲走。

腰冷被纏取汗些。

讀分字
去聲俱

此治虛勞第一規。

氣短胸中飲滿者

黃耆建中加減推。
生薑加重助陽施。

及療肺虛損不足。
腹中飲滿須除棗。

半夏加參兩更奇。
加入茯苓兩半宜。

半夏加參兩更奇。

水除肺氣自無虧。

厚樸七物貳加方。

嘔加半夏半升量。

寒甚加成捌老薑。

假如下利黃除去。

加法貳條獨異常。

若係寒多薑重用。

當歸生薑羊肉湯。

生薑加至壹觔強。

加重生薑加水伍。

斗參煮卅貳分嘗。

已椒藤黃丸壹加。

原症口乾不渴邪。

已服藥丸口有液。

至斗水八升煮卅二合加

渴加半兩芒硝嘉。

渴加半兩芒硝嘉。

〔陸〕越婢湯加貳法良。

惡風炮附壹枚商。

風兼裏水朮加肆。

越婢原治風水方。

〔柒〕白朮散加伍法詳。

腹中苦痛芍加鑲。

芍無兩數如何用

原劑類推參分商。

心下毒疼芎倍重。

適當不痛是芎長

心煩吐痛不能食。

半夏廿枚細壹匡。

服後醋漿難止嘔。

須煎小麥汁來嘗。

服之已後其人渴。

此渴原來血不昌。

大麥粥能生血液。

病痊仍服也無妨。

〔捌〕竹葉湯加貳法詳。

嘔加半夏半升量。

產家項強加枚附。

破似豆兮去沫良。

煩喘柏仁壹分宜。

藥論曰入前
揚去沫

有熱白薇加壹倍。

〔玖〕竹皮大丸貳加規。

乳中虛熱此能治。

經方歌括雜病方終



北京中医药大学图书馆版权所有