

酉 13

842

淮陰吳鞠通先生醫案

陶氏六十八歲

淮陰吳鞠通先生醫案

中風

左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏 四兩

防己 五錢

杏仁 四錢

薑半夏 五錢

茯苓塊 五錢

桑枝 五錢

陳皮 三錢

白通草 錢半

服一帖而飲下咽。服七帖而舌腫消。服二十帖。諸病雖漸

減而無大效。左肢拘攣如故。舌雖消腫而語言不清。脉兼

結。余曰。此絡中痰堵塞。皆誤補致壅之故。非鍼不可。於是

延郝七兄鍼之。舌上中泉穴一鍼。出紫黑血。半茶碗。隨後



有物如蚯蚓令伊子以手探出即使鍼孔中拉出膠痰一條如勻粉長七八寸左手支溝穴一鍼透關左手背三陽之絡用小針十數針以後用藥日日見效前方止滅石膏之半服至七十餘帖自行出堂上轎矣

中風溼口歪臂不舉腿腫脉洪數口渴胃不開與涼開水道法

桂枝 三錢

防己 二錢

飛滑石 一兩

通草 二錢

半夏 五錢

桑葉 五錢

石膏 四錢

茯苓皮 一兩

晚蠶砂 三錢

二帖而效十四帖全愈後以補脾胃收全功

中風神呆不語前能語時自云頭暈左肢麻口大歪不食六脉

弦數。此痲中也。與柔肝法。

生白芍 三錢

麥冬 二錢

生鼈甲 五錢

左牡蠣 五錢

炙甘草 三錢

生地黃 八錢

一帖而神有清意。人語之。言能點頭也。又於前方加生阿

膠三錢。丹皮四錢。三帖而半語。七帖而愈。能食。十二三帖

而如故。

李氏 七十二歲

伏暑挾痰。飲肝鬱。又加中風。頭痛。舌厚白苔。言蹇。畏寒。脉洪數。而弦。先與辛涼清上。

苦桔梗 三錢

桑葉 三錢

連翹 三錢

蒺藜 二錢

甘草 一錢

茶菊花 三錢

銀花 三錢

薄荷 錢半

四帖而頭痛畏寒止舌漸消苔不退繼以通宣三焦兼開

肝鬱

^{連皮}茯苓 五錢 杏仁泥 五錢 半夏 四錢 白蔻仁 二錢

飛滑石 六錢 香附 二錢 通草 一錢 廣鬱金 二錢

薏仁 五錢

服二十餘帖而大安一切復元

淮陰吳鞠通先生醫案

少陽瘕癥

某氏

己卯七月

其人本有肝風頭痛病根。少陽鬱勃。眞水不能上濟。可知。又現伏暑內發。新涼外加。金來尅木。木愈病矣。少陽所致。爲瘕癥。理固然也。勉與清膽絡。兼清心包。

犀角 三錢

丹皮 五錢去蒂

鮮荷葉 一張

羚羊角 三錢

細生地 五錢

籐鈎 二錢

茶菊花 三錢

桔梗 二錢

甘草 錢半

桑葉 三錢

間服紫雪丹一二錢

此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑。而燒退。是外邪已解。現在

又 又 又

六脉弦細。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜參入開心包之絡。為是。倘一。二天不醒。便難挽回矣。

丹皮 五錢

茶菊花 三錢

細生地 五錢

羚羊角 三錢

嫩桑枝 二十寸

刺蒺藜 二錢

石菖蒲 一錢

生甘草 一錢

生牡蠣 三錢

沙參 二錢

生阿膠 一錢

生龍甲 二錢

間服紫雪丹及牛黃丸。

用玉女煎加犀角丹皮。

用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母。

少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏 一兩

生甘草 二錢

炒知母 二錢

桑葉 三錢

丹皮 五錢

天冬 二錢

菊花 三錢

鉤藤 二錢

銀花 三錢

羚羊角 三錢

左牡蠣 五錢連心

連翹 三錢

細生地 五錢連心

麥冬 五錢

間服紫雪丹三分。

開張藥書

補血丸 正身藥 麥 分

藥 湯 三 雞 饌 羊 魚 三

法 抄 翻 正 身 藥 煎

藥 三 雞

代 文 天 分 二 雞

藥 淋 三 雞

肉 雞 二 雞

淮陰吳鞠通先生醫案

肝風

章氏 七十二歲

癸丑正月二十八日

三十日

老年下虛上盛。又當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以致少陽風動。頭偏右痛。目系引急。最有壞眼之慮。刻下先與清上。

羚羊角 三錢

刺蒺藜 一錢

連肉翹 一錢

桑葉 二錢

茶菊花 二錢

生甘草 八分

桔梗 錢半

蘇薄荷 八分

日二帖服二日。

少陽頭痛已止。現在胸痞脇脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼與宣行經絡。

桂枝尖 二錢

子青皮 一錢

製半夏 五錢

廣鬱金 二錢

三月初二日

初四日

廣皮 錢半

製香附 二錢

杏仁泥 三錢

生薑汁 三匙

服二帖

因食冷物晝寐中焦停滯。腹不和泄瀉。與開太陽闔陽明法。

桂枝 五錢

茯苓塊 五錢

炮薑 錢半

蒼朮 三錢

半夏 三錢

木香 錢半

猪苓 三錢

廣陳皮 錢半

澤瀉 三錢

藿香梗 三錢

煨肉果 錢半

頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

諸症向安。惟餘晨泄。左手脉緊。宜補腎陽。

煨肉果 三錢

五味子 一錢

蓮子 五錢

補骨脂 三錢

生於朮 三錢

芡實 三錢

兔絲子 二錢

茯苓塊 五錢

錢連皮去心

初七日

初十日

十一日

水五碗。煮成兩碗。分二次服。渣再煮一碗。明早服。

即於前方內去兔絲子。加牡蠣粉三錢。

太陽微風。以桂枝法小和之。

桂枝 二錢

廣陳皮 二錢

白芍 二錢

茯苓塊 三錢

炙甘草 八分

半夏 三錢

生薑 二片

棗 一枚

水三杯。煮取二杯。分二次服。

右目澀小。酉刻後眼前如有黑霧。議清肝絡。熄肝風。益肝陰法。

桔梗 錢半

青箱子 二錢

沙棧 三錢

生甘草 八分

茶菊花 錢半

沙蒺藜 二錢

何首烏 三錢

三帖後。了然如故。

陶氏

癸亥二月十五日

右脉洪大。尺部更甚。左脉弦細。上盛下虛。卒中不能語。如中風狀。乃肝風內動。絡熱竅閉之故。證勢甚重。

羚羊角 一錢

桔梗 一錢

麥冬 二錢

桑葉 一錢

沙參 錢半

生鼈甲 三錢

茶菊花 錢半

甘草 八分

刺蒺藜 一錢

細生地 錢半

日二帖。服三日。

上盛下虛。竅閉不能言。用清輕合芳香開上。今稍能言。但虛煩不眠。心悸頭暈。仍係厥陽未熄。用補心肝之體。兼實下法。

炒白芍 六錢

沙參 三錢

阿膠 二錢

蓮子 五錢

大生地 五錢

炒棗仁 五錢

龜板 四錢

硃砂 五錢

黃三十歲

連心麥 冬 五錢 炙甘草 三錢 茯苓塊 三錢

水五碗。煮取兩碗。分三服。再煮一杯服。

肝風內動。脉弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木直強而上行。頭暈甚。卽巔厥也。久不治爲痺中。醫云痰者。妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。

羚羊角 三錢

茶菊花 三錢 研

桑葉 三錢

生甘草 一錢

丹皮 二錢

苦桔梗 二錢

鈎藤 二錢

薄荷 七分

丸方。

定風珠。

...

...

...

...

...

...

...

...

淮陰吳鞠通先生醫案

肝厥

高氏四十五歲

乙丑十一月十一日

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再
肝厥之症。亦有寒熱之不同。此症脉沉而弦細。其為寒也無疑。
大凡寒厥必死。今不死者。以其為腑厥而非臟絕也。現在脇下
有塊有聲。經色紫黑。擬先用溫通絡脉法。

新絳紗

三錢

旋覆花

三錢

黑炒

川

椒

二錢

降香末

三錢

歸鬚

二錢

製半夏

五錢

桂枝尖

三錢

生香附

三錢

桃仁炭

三錢

煮二杯。二次服。

額三兄夫人

二十二歲

除夕日亥時

先是產後受寒痺痛醫用桂附等極剛極熱之品服之大效醫見其效也以為此人非此不可用之一年有餘不知溫燥與溫養不同可以治病不可以養生以致少陰津液被劫無餘厥陰頭痛單巔頂一點痛不可忍畏明至於窗間有豆大微光即大叫必室如黑漆而後少安一日厥去四五次脉弦細數按之無力危急已極勉與定風珠潛育陰陽以熄肝風

直大生地 八錢

麻仁 四錢

生白芍 四錢

帶心

麥冬 四錢

海參 二條

生阿膠 四錢

生龜板 六錢

炙甘草 五錢

生牡蠣 六錢

生鼈甲 六錢

雞子黃 二枚去渣後化入攪勻

煮成八杯去渣上火煎成四杯不時頻服

正月初一日

初四日

初五日

初七日

初八日

微見小效。加鮑魚片一兩。

煑成十杯。去渣。煎至五杯。頻服。

腰以上發熱。腰以下冰涼。上下渾如兩截。身左半有汗。身右半無汗。左右渾如兩畔。自古方書未見是證。竊思古人云琴瑟不調。必改弦而更張之。此症當令其復厥。厥後再安。則愈。照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。照前方定風珠原分量一帖。服後厥止神安。仍照前方。

方皆如前。漸不畏明。至正月二十外。撤去幃帳。湯藥服至二月春分後。與專翁大生膏一料全愈。

楊室女四十九歲

甲申十二月
初二日

初因肝鬱脇痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着與絡痛治法。無非滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯止一二口。食炒米粉。止一酒杯。稍聞響聲。卽瘈厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脉弦緊而長。經閉二年。周身疼痛。痰飲咳嗽。終年無已。骨瘦如柴。奄奄一息。此症內犯陽明。故不食。木尅脾土。故飲聚。陽明空虛。故無主聞聲而驚。外犯太陽。故身痛而瘈。本臟致病。故厥。經謂治病必求其本。仍從肝絡論治。

新絳紗

歸鬚

川椒炭

桂枝

鬱金

旋覆花

青皮

蘇子霜

半夏

降香末

十四日

服前方七帖。脇痛雖輕。痰飲特甚。喘咳頻仍。夜臥不安。暫停絡

藥。專與和胃蠲飲。

半夏 八錢

廣陳皮 四錢

生苡仁 五錢

茯苓 六錢

枳實 二錢

淡乾薑 三錢

桂枝 三錢

胃稍開。能食稀粥。半碗。脇仍痛。仍服前活絡方。去川椒。加廣陳

皮。

脇痛平。咳嗽未除。又服前蠲飲方。

因余有紹興之行。令其常服和胃方。脇痛發時。暫服新絳旋覆

花湯。此時已能食爛飯半盃矣。

脈稍和平。雖茲而有胃氣。乾飯能吃一碗。有半。經亦復通。仍間

十七日

三日

十二月
初四日
十一日

西乙二月

二十八日

十八日

四月初三日

服前二方。夜間偶感燥症。欲起不得起。欲坐不得坐。欲臥不得臥。煩躁無奈。不可當約二時。服霹靂散三兩許始安。次日仍與和胃。

能食乾飯兩小碗矣。六脉又和一等。仍間服前二方。

余復由淮至紹。初八日至蘇州。不放心此病。作書一封令其調適性情。五月間又作書一封。痛以大道理開導之。十月間始得回書。據云竟以余書作座右銘。每日諷誦一過。飲食又進。精神

大長。闔家歡樂。

謝文

正

六

藥

服前二方。神氣漸振。精神漸爽。始知真功。不交。聖醫。餘

淮陰吳鞠通先生醫案

脇痛

伊氏二十歲

肝鬱脇痛病名肝著亦婦科之常證無足怪者奈醫者不識見其有寒熱也誤以爲風寒而用風藥夫肝主風同氣相求以風從風致令肝風鳴張肝主筋致令一身筋脹肝開竅於目致令晝夜目不合不得臥者七八日肝主疏泄肝病則有升無降失其疏泄之職故不大便小溲僅通而短赤特甚醫者又不識誤以爲腸胃之病而以大黃通之麻仁潤之致令不食不饑不便不寐六脉洪大無倫身熱且坐不得臥時時欲嘔煩燥欲怒是兩犯逆也金匱論一逆尙引日再逆促命期不待智者而知其

難愈也。議宣通經脈法。肝藏血。絡主血。故也。必加苦寒泄熱。脈沈洪有力。且膽居肝內。肝病膽即相隨。故也。

旋覆花 五錢

炒黃連 二錢

桃仁 四錢

歸身鬚 四錢

鬱金 三錢

川楝皮 五錢

新絳 四錢

降香末 四錢

蘇子 四錢

急流水八碗

服前方見小效。即於前方內加

^{炒黑}丹皮 三錢

生香附 二錢

^減川楝皮 二錢

脇痛減其大半。但不得寐。時時欲嘔。擬兩和陽明厥陰。仍兼宣

絡。吳鞠通

半醋炒 夏五錢 青皮錢半 降香末三錢 新絳三錢

歸鬚三錢 蘇子霜三錢 秫米一撮 桃仁三錢

川楝皮二錢 廣鬱金二錢 黃芩二錢

煮三盃日二夜一

昨方業已效。今日複苦藥。卽苦與辛合。能降能通之意。卽於前

方內加

薑汁炒 古勇黃連二錢

昨用苦辛法。脉減便通。今日腹中覺痛。將近經期。一以宣絡爲

主。

新絳紗五錢 蘇子霜二錢 炒丹皮二錢 製香附二錢

又

又

又

兩頭尖 二兩

旋覆花 五錢

元胡索 二錢酒炒

條芩 錢半

桃仁泥 四錢

降香末 三錢

歸鬚 三錢

鬱金 三錢

水八盃。煮取三杯。日二夜一。

昨日一味通絡。已得大便通利。腹中痛止。但不成寐。今日用胃不和則臥不安。飲以半夏湯。覆杯則寐。法仍兼宣絡。此仲景先師所謂衝脉累及陽明。先治衝脉。後治陽明也。

半夏 一兩

旋覆花 五錢

降香末 二錢

秫米 二兩

新絳 四錢

水十杯。煮成四杯。日三夜一。

昨與半夏湯和胃。業已得寐。但脉沈數。澁赤短。議加苦藥泄肝。

又

熱而通小腸火府。

半夏 六錢

降香末 三錢 鹽水炒

黃蘗 二錢

秫米 一兩

新絳 四錢

旋覆花 五錢

生香附 三錢 炒

黃連 二錢

煎法如前。

昨日和胃宣絡兼用苦通火府。今日得寐。溲色稍淡。口亦知味。是陽明有漸和之機矣。惟胸中微痛。背亦掣痛。按肝脉絡胸背。則太陽經也。是由厥陰而累及少陽。肝膽為夫妻也。由少陽而累及太陽。少太為兄弟也。今日仍用前法。加通太陽絡法。

半夏 五錢

降香末 三錢 鹽水炒

黃蘗 錢半

川楝皮 二錢

旋覆花 三錢

古勇黃連 一錢

桂枝尖 三錢

新絳 三錢

又

又

秫米 六錢

生香附 三錢

煎法如前。

繞臍痛者。瘦也。亦衝脉肝經之病。

桂枝尖 三錢

新絳 三錢

半夏 五錢

炒雲連 一錢

^{炒黑}當歸 三錢

生香附 三錢

^炒淡吳萸 三錢

^{炒黑}小茴 三錢

秫米 八錢

川楝子 三錢

兩和肝胃兼治瘦痛。

半夏 八錢

青皮 二錢 ^{炒黑}

吳萸 三錢

新絳紗 三錢

^{炒黑}小茴香 三錢

生香附 三錢

旋覆花 三錢

桂枝尖 三錢

^{炒黑}雲連 錢半

淡乾薑 二錢

烏藥 三錢

秫米 一兩

降香末 三錢

^{炒黑}

全當歸 三錢

又
煑成四碗。日三夜一。

腹中拘急而痛。小溲短赤。皆陰絡阻塞。濁陰凝聚之象。與宣通

陰絡降濁法。

桂枝尖 三錢

降香末 三錢

琥 珀 三分 炒

小茴香 三錢

川棟皮 三錢

原麝香 五分

新 絳 三錢

兩頭尖 二錢

元胡索 二錢

吳 萸 錢半

歸 鬚 三錢

桃仁泥 二錢

水六杯。煑成二杯。每服半杯。冲韭白汁兩小茶匙。日二杯。

夜一杯。明早一杯。

仍用前方。但昨日未用半夏。今徹夜不寐。酉刻再服靈樞半夏

湯一帖。

又

因肝病不得疏泄兼有痺痛擬兩疏氣血法

桂枝尖 三錢

川棟子 三錢炒黑

小茴香 三錢

牛膝 二錢

防己 二錢

降香末 三錢

新絳 三錢

歸鬚 三錢

蠶砂 三錢

桃仁泥 三錢吳黃汁炒

黃連 一錢

諸証悉減而未盡左脉已和右脉弦大是土中有木於兩疏氣血之中兼泄木安土法

桂枝尖 三錢

牛膝 二錢

鬱金 二錢

歸鬚 三錢

酒炒白芍 三錢

杏仁 三錢

蠶砂 三錢

降香末 三錢

半夏 五錢

青皮 二錢

川棟子 三錢

防己 二錢

新絳 三錢

小茴香 三錢

茯苓皮 三錢

又

右脉弦剛。土中木盛。

酒炒

白芍 六錢

茯苓塊 四錢

鬱金 三錢

桂枝 四錢

降香末 三錢

新絳 三錢

薑半夏 六錢

歸鬚 三錢

廣皮 二錢

小茴香 三錢

川棟子 三錢

脉弦數。頭痛時止時甚。向來時發時止。已非一日。此乃少陽絡痛。虛風內動也。今日且與清膽絡法。勿犯中焦。

桑葉 二錢

甘菊花 二錢

刺蒺藜 一錢

丹皮 錢半

羚羊角 八分

苦桔梗 一錢

炒白芍 二錢

鉤藤 一錢

生甘草 八分

治下焦絡法。

桂枝興 二錢

澤蘭 錢半

新絳 二錢

整當歸 五錢

生香附 三錢

小茴香 三錢酒炒

芍 六錢研細

縮砂蜜 二錢

鬱金 三錢

煑成三杯。日二夜一。

八脉麗於肝腎。肝病久。未有不累及八脉者。用通補陰絡兼走

八脉法。

桂枝興

一錢炒黑

杞

子 二錢

小茴香

二錢

杭白芍

六錢

歸身

三錢

縮砂仁

錢半

新

絳

錢半

桂圓肉

二錢

法同前。

桂枝尖

一錢

全當歸

三錢

桂圓肉

二錢

廣木香

一錢

又

又

炒白芍 六錢

降香末 三錢

生香附 三錢

新絳 三錢

川芎 二錢

澤蘭 一錢

尹氏三十二歲

誤服大辛大溫致傷心陽使下焦濁陰來攻過提致少陽無忌有升無降上愈盛下愈虛且與鎮固法非治病也特醫藥耳

新絳

三錢炒黑

梔子

三錢

半夏

六錢

旋覆花

三錢

古勇黃

連

錢半

煨

代赭石

一兩

降香末

五錢

焦白芍

三錢

研細紫石英

一兩

炙龜板

五錢

煮成三大茶杯分三次服渣再煎一杯服

鎮衝脉泄膽陽業已得效仍宗其法其血絡之鬱痛未能卒治

蓋事有緩急也

蘇氏三十二歲

癸亥十月二十八日

初二日

紫石英 一兩

代赭石 一兩

焦白芍 五錢

新絳紗 四錢

古勇黃連 一錢

山梔 三錢

炙龜板 八錢

旋覆花 三錢

半夏 六錢

脉弦數左尺獨大。癥居右脇。發則攻心痛。躍不止。病名肝着。先

宜宣絡後補八脉。

新絳紗 三錢

歸鬚 二錢

廣鬱金 二錢

旋覆花 三錢

炒桃仁 三錢

揀淨兩頭兩頭尖 三錢

降香末 三錢

丹皮 三錢

元胡索 二錢

肝着用通絡法。業已見效。仍宗前法。但必須用化癥丹間服為

妙。取其治病而不傷正耳。

初三日

初六日

新絳紗 三錢

歸鬚 二錢

元胡索 二錢

旋覆花 三錢

桃仁 三錢

生香附 三錢

蘇子淨霜 三錢

降香末 三錢

半夏 三錢

廣鬱金 三錢

烏藥 二錢

二帖。

於前方內加

兩頭興 三錢

炒丹皮 三錢

白芍 三錢

韭白汁 三小匙

藥力不及且用進法。

新絳紗 三錢

桃仁泥 三錢

藏紅花 二錢

旋覆花 三錢

歸鬚 錢半

生香附 三錢

焦白芍 六錢

丹皮 五錢

川棟子 三錢

三帖。

十四日

仍宗前法。

新絳紗 三錢

桃仁泥 五錢

歸鬚 二錢

旋覆花 三錢

藏紅花 三錢

降香末 三錢

梔子 五錢

生香附 三錢

元胡索 二錢

廣鬱金 二錢

蘇子霜 三錢

川棟子 三錢

三帖。

十六日

業已見效。照前方。口服半帖。丸藥減三分之二。

經來五日。顏色已正。不得過行。傷正其癥氣。留為丸藥化可也。

甲子正月十九日

茲擬寧心止汗。

炒白芍 六錢

粉丹皮 三錢

洋葎 二錢

茯苓塊 五錢

製五味 一錢

牡蠣 五錢

整珠砂 三錢

冬麥 五錢

甘氏五十歲

大生地 五錢

炙龜板 八錢 核去

大棗 二枚

小麥 三錢

水八碗。煮取三碗。分三服。三帖。

凡兩畔不同者。皆肝病也。此證氣至丑寅則上升。暮卒復。左脉沈弦。右脉浮弦。升降失司。痰飲斯聚。

薑半夏 五錢

降香末 三錢

旋覆花 三錢

小枳實 三錢

廣陳皮 三錢

杏仁泥 三錢

蘇子霜 三錢

黃芩炭 八分

生薑 三片

淮陰吳鞠通先生醫案

肝癰

謝四十四歲

辛巳三月二十四日

病起肝鬱脇痛。痰中帶血。病名肝着。醫者不識絡病。因由與絡病治法。非見血投涼。卽見血補陰。無惟乎愈。治愈窮也。大凡血症之脉。左脉堅搏。治在下焦血分。右堅搏。治在上焦氣分。茲左手脉浮取。弦沈取。洪大而數。重按即芤。前曾痰有氣味。現在痰挾癰滯。黑色唇舌皓白。其爲肝經絡痰挾痰飲。咳血無疑。勢已憊極。勉與宣絡止血。兼之兩和肝胃。以逐痰定咳。此方未服。

新絳紗 三錢

旋覆花 三錢

歸鬚 錢半

桃仁泥 三錢

半夏 三錢

廣皮炭 二錢

蘇子霜 一錢

降香末 錢半



四月初三日

廣鬱金 二錢

煮兩茶杯分四次服二帖

血家左手脉堅搏治在下焦血分此症先因肝絡瘀滯以致血不歸經日久不治由陰經損及陽氣自汗溺變痿弱陽虛也左脉洪數而芤陰傷也如是陰陽兩傷之極而瘀滯仍然未淨通絡則虛急補虛又絡滯兩難措手不得已用新絳一方緩通其絡其補藥則用陰陽兩攝法聊盡人力而已從此服起

遼

蓼

一錢連心

麥

冬

四錢

海

參

二錢

五味子

一錢

沙苑蒺藜

三錢

茯

神

五錢

枸杞子

三錢

龜

板

五錢

牡

蠣

六錢

初四日

病起於脇痛。瘀血致壅。久咳成勞。至骨痠不能起床。仍有瘀滯不化之象。且痰有臭味。卽係肝着成癰。前日脉雖芤大而濇。昨日大見瘀血後。今日則純然芤矣。豈非瘀血之明徵乎。若一味貪補。斷難再起。兼之宣絡萬一得甦。妄誕之診。高明酌之。

新絳紗 三錢

旋覆花 二錢

歸橫鬚 八分

半

夏錢半

廣皮炭 一錢

桃仁泥 三錢

丹皮炭 五錢

此方金匱載在婦人虛勞門。有識其悟之。上半日服此方。完。下半日服前補方。

初五日

痰中臭味太甚。黑痰未淨。是活絡之方不能除。脉芤自汗甚。是補攝之方又不可緩。痰稀純白。內有支飲。於補方中去牡蠣。海

初七日

參鹹味之碍飲者。此症極虛極實。時人但知其虛而不知其實。所以日誤一日。以致於此。治實碍虛。治虛碍實。焉望成功。一通二補俱每日照前服法未改

脉較前斂戢。於新絳方內半夏加錢半。作三錢。餘仍舊服法亦

如之。

初八日

今日左尺脉獨大。加封固腎氣法。餘有原案二方。每日間服如

前。

人參 一錢
炙龜板 八錢
蓮子 五錢
炙甘草 三錢

製五味 一錢炒黑
杞子 三錢
沙蒺藜 二錢
左牡蠣 六錢

雲茯苓 五錢連心
麥冬 三錢
炒白芍 三錢

於前方內加遼參五分作錢半。又加海參一條。淡菴蓉三錢。四

初十日

帖。餘悉如前。

仍照前服。每日間服一通一補方。

左脉空大未斂。精神較前雖好。猶宜收攝下焦。於前方內去龜版。五味子。白芍。海參。菘蓉。餘如舊間服法。煮好去渣。再上火煎成二杯。分二次服。

同日

痰色猶不能清白。氣味亦不淨。仍須宣絡。

新絳紗 三錢 旋覆花 二錢 薑製 半 夏 五錢 廣皮炭 錢半

廣鬱金 錢半 當歸鬚 一錢

上半日服。四帖。

脉少斂。通補二方間服如前。四帖。

二十一日

十三日
十七日

痰濁未變。脉象少斂。午後微熱不寐。飲食由漸而加。不可太過不及。

人

參

錢半連心皮

蓮

肉

五錢

炙甘草

三錢炒黑

枸

杞

三錢

沙蒺藜

三錢

雲茯苓

五錢

左牡蠣

五錢連心

麥

冬

三錢

熟五味子

一錢

炒棗仁

三錢洗去砂

海

參

二條

大蛋菜

三錢

午後服此。

又方。

新絳紗

二錢

旋覆花

二錢薑製

半

夏

三錢

廣鬱金

二錢

歸

鬚 一錢

桃仁泥

二錢

廣陳皮

八分

香

附

二錢

煮兩小茶杯。午前服。

初九日
十三日

復診於補方去牡蠣五味子。餘仍二方間服如前。

痰已漸清。肝亦漸平。精神漸旺。擬去搜逐而補中。與外臺茯苓

飲意。專用一方。

雲茯苓塊

六錢人

茯苓二錢

香附三錢

生於朮五錢

炙甘草二錢

半

夏五錢

生苡仁五錢

小枳實二錢

淮陰吳鞠通先生醫案

癲狂

隄五十九歲

病由情志而傷。中年下焦精氣不固。上年露癱中之萌。近因情志重傷。又在相火主令。君火司天。君火客氣。內與本身君火相火相應。以致肝風鳴張。初起如狂。醫者仍然攻風劫痰。大用辛溫剛燥。復以苦寒直下。是助賊為虐也。現在左脉實大堅牢。大非吉兆。勉以紫雪定癩。癱肢厥而泄有餘之客熱。再以定風珠濟不足之真陰。而息內風之震動。如果病有回機。神色稍清。再擬後法。

紫雪丹 二兩

每服二錢。二時許。一服。以神清為度。牙關緊閉。用烏梅醮醋擦牙根。其牙即開。

二十日

大生地 一兩
生白芍 一兩
生鼈甲 一兩
炙甘草 六錢

真阿膠 四錢
麻仁 四錢連心
麥冬 八錢
左牡蠣 八錢

冷開水沖入 蚌 水 半酒杯
雞子黃 二枚
藥煮成去渣和入上火三沸

煮成三盃。渣再煮兩盃。共四盃。四刻服半碗。盡劑再作服。
左脉仍然牢固。較昨日諸證俱減。舌苔黃黑。尺膚熱。陽明絡現。
昨謂不止。本身虛熱。且有客氣加臨。非虛語也。湯藥仍照前方。
再以清宮湯。化牛黃紫雪輩。二時一次。

連心連翹 三錢
元參心 五錢連心
麥冬 五錢
蓮子心 錢半

捲心 鮮竹葉 三錢

服牛黃丸紫雪丹。即以此湯化服。

瘕癰肢厥雖止其狂如故會厭不利脉仍牢固數大按陽盛并於上則狂的係陽火有餘非極苦之藥直折其上盛之威其勢未必得減况小腸火腑非苦不降痰亦因之而降其會厭庶可得利矣。

洋蘆薈 三錢

眞雅連 三錢

龍膽草 三錢

生白芍 六錢

知母 六錢

細生地 六錢

丹皮 八錢

麥冬 八錢

元參 五錢

犀角 八錢

先煎代水

頭煎三碗今日服二煎兩碗明早服一二帖半

脉氣大減但陽升阻絡機不靈擬兼清會厭膽絡之熱

羚羊角 三錢

龍膽草 錢半

知母 三錢

鈎藤 二錢

連翹 錢半
桑葉 錢半
洋蘆薈 錢半
大生地 三錢

連心麥冬 三錢

米醋三杯。每藥一茶杯。冲入半酒杯。今晚一帖。明早一帖。

於前方內加石膏 二兩

稍進糜粥。覺勇力培常。舌紅黑。脉亦較昨日實大。猶為陽火有

餘

蘆薈 四錢
龍膽草 三錢
雅連 四錢
犀角 六錢

丹皮 五錢
細生地 四錢
麥冬 五錢
知母 五錢

米醋 每一杯藥和入半杯冲

濃煎三杯。分三次服。渣再煮一杯。明早服。

二十五日
二十六日

二十七日

初二日

於前方內加鐵落代一兩水

諸證與脈俱減。然未能淨。苦藥猶不能除也。頰腫係客氣。擬加

辛涼。

苦寒 蘆薈 三錢 龍膽草 三錢 眞犀角 五錢 丹皮 五錢

連心 麥冬 六錢 雅連 三錢 知母 三錢 羚羊角 三錢

連翹 三錢 鈎藤 三錢 銀花 三錢 鎮鐵落水煎

頭煎三杯。二煎三杯。六次服。明日午令盡。間服牛黃紫雪

輩。日三次。

於前方內加生地 八錢。

脈弦數而勁。初因肝鬱久升無降。以致陽并於上。則狂。心體之

齊四十二歲

初三日

己巳二月
初二日

初六日

虛以用勝而更虛。心用之強。因體虛而更強。間日舉發。氣伏最深。已難調治。况現在卯中乙木盛時。今歲又係風木司天。有木火相煽之象。勉與補心。體瀉心用兩法。

洋 葎 三錢

大生地 一兩

蓮子心 一錢

黃 蘗 三錢

白 芍 六錢

丹 皮 四錢

麥 冬 六錢

生龜板 一兩

丹 葎 三錢

真山連 三錢

外用 紫雪丹 六錢 每次一錢。與此方間服。

操持太過。致傷心氣之狂疾。前用補心體瀉心用攝心神。已見大效。脉勢亦減。經謂脉小則病退是也。

洋 葎 三錢

白 芍 六錢

丹 皮 五錢

真山連 二錢

某

二十七日

生龜板 一兩

黃蘗炭 二錢

麥冬 三錢

女貞子 四錢

蓮子 五錢

龍膽草 二錢

沖米 醋 一酒杯

鐵落水煎

左脉弦勁。經謂單弦飲澀。前五日因觀戲後病惡夢病狂肢厥。經謂陽並於上則狂。兩陰交盡之厥。靈樞有淫發夢一卷。大意以五臟偏勝。非因夢而後病也。前人諸般怪症。皆屬於痰之診。雖不盡然。但此症現在咳嗽塊痰。左脉單弦。應作痰治。

半夏 五錢

丹皮 三錢

石菖蒲 二錢

天竺黃 二錢

茯苓塊 五錢

白附子 二錢

先服陳李濟牛黃清心丸一二丸。溫開水調服。

狂而厥。左脉單弦。咳嗽塊痰。昨議應作痰治。今日左脉漸有和。

二十八日

平之象。證於外者亦效。但形貌怯弱。色白而嫩。脉亦不壯。此症之痰。究因驚起。凡神氣壯者不驚。况驚後惡夢發後大汗。其為陽虛神怯顯然。此症將來必大而後收功。現在不得以攻痰見效。而忘其虛壯。與化痰之中。微加益氣。

半夏 五錢

茯苓塊 五錢

秋小麥 八錢

石菖蒲 一錢

連心 麥冬 五錢

大棗 二枚

體虛有痰之症。不能純治一邊。今日脉微滑數。於昨日法中。少

加逐痰。

半夏 五錢

白附子 二錢

秋小麥 一合

陳膽星 一錢

石菖蒲 錢半

茯神塊 五錢 連心

麥冬 三錢

初一日

先服牛黃清心丸半丸。

昨日稍加逐痰。痰出如許。大勢安靜。但多怒耳。右脉仍滑。痰未淨也。

半夏 六錢

秋小麥 八錢

白附子 二錢

石菖蒲 一錢

旋覆花 三錢

茯神塊 三錢
飛

代赭石 五錢

炙甘草 一錢

其後痰去。以大補心脾而安。

大狂七年。先因功名不遂而病。本京先醫市醫儒醫已歷不少。既徽州醫。杭州醫。蘇州醫。湖北醫。所閱之醫不下數百矣。大概補虛者多。攻實者少。間有已時。不旋踵而發。余初診時。見其蓬首垢面。下體俱赤。衣不遮身。隨作隨毀。門牕分碎。隨釘隨拆。鏢

鮑三十二歲

十月初二日

靠手足。外有鐵索數根。錮鎖於大石盤上。言語之亂。形體之羸。更不待言。細詢其情。每日非見婦人不可。婦人不願見。彼盡鬧。不可叫號聲嘶。哀鳴令人不可聞。只得令伊姬妾強侍之。然後少安。次日仍然無一日之空。診其脉六脉弦長而勁。余曰。此實症。非虛症也。於是用極苦以瀉心膽。二經之火。瀉心者必瀉小腸。病在臟治其腑也。但無出路。亦必瀉小腸也。

龍胆草 三錢

胡黃連 三錢

天門冬 三錢

細生地 三錢

丹皮

三錢連心

大麥冬 三錢

服二帖而大效。妄語少而舉動安靜。初三日見其效也。以爲久病體虛。恐過剛則折。用病減者減其製例。於原方減

苦藥加補陰之甘潤。初五日病家來告云。昨服政方二帖。病勢大重。較前之叫哮妄語。加數倍之多。無一刻靜。此症想不能治。諒其必死。先生可不診矣。余曰。不然。初用重劑而大效。繼用輕劑加補陰而大重。吾知進退矣。復診其脉。弦長而數。於是重用苦藥。

龍胆草 六錢

洋薈蘆 六錢

天

冬

五錢 連心麥

冬

五錢

胡黃連 五錢

秋石 二錢

烏梅肉 五錢

一氣六帖。一日較一日大效。至十一日大為明白。於是將

其得病之由。因伊念頭之差。其念頭之差。因未識文章至高之境。即欲至高。尚有命在。非人力所能為。何怒之有人。

章氏
四十二
歲

生以體親心爲孝。痛乎責之。俯首無辭。以後漸去苦藥。加補陰半月而後。去刑具。着衣冠。同跪拜。神識與好人無異。服專翁大生膏一料而大壯。下科竟中矣。

先是二月間病。神識恍惚。悞服肉桂熟地等補藥。因而大狂。余於三月間用極苦以折其上盛之威。間服芳香開心包。治三十日而愈。但脉仍洪數。余囑其戒酒肉。服專翁大生膏補陰配陽。彼不惟不服丸藥。至午節大開酒肉。於是狂不可當。足臭至隣。不時脫淨衣褲。上大街。一二男子不能搏之使回。五月十四日。又延余視。余再用前法隨效。二三日仍然如故。蓋少陽相火極。挾制君主行令。藥隨暫開其閉。暫折其威。相火一動而仍然如

景 扑

故延至六月十六日。午刻復自撕其褲。人不防而出大門矣。余坐視不忍。復自慚無術以已其病。因謂其胞弟曰。此症非打之極痛。令其自着衣褲也不可。蓋羞惡之心亦統於仁。能仁則不忍。忍則不仁。不仁之至。羞惡全喪。打之極痛。則不能忍。不忍而仁心復。仁心復而羞惡之心亦復矣。此古聖王樸作教刑之義也。伊弟見其乃姊如是。竟况羞而成怒。以保父母體面爲義。於是以小竹板責其腿。令着褲。彼知痛而後自作衣着。衣稍明。次月十七日立秋。余以大劑苦藥一帖而全愈。蓋打之功與天時秋金之氣藥之力相須而成功也。後以專翁大生膏而收全功。

將金之... 民十... 是以... 此... 自... 心... 怒... 願... 坐... 好...

淮陰吳鞠通先生醫案

虛勞

伊二十歲

勞傷急怒吐血二者皆治在肝絡醫者不識見血投涼以致胃
口為苦寒所傷殘脾陽腎陽亦為苦寒滑潤伐其生發健運之
常此腹痛晨泄不食脉沈弦細之所由來也按三焦俱損先健
中焦補土可以生金腎關之虛亦可仰賴於胃關矣

去心
蓮

子五錢

芡

實三錢

白扁豆

錢半

冰

糖三錢

茯苓塊

三錢

廣皮炭

一錢

人

蔞

一錢

緩緩多服為宜

左脉搏大下焦肝腎吐血上焦咳嗽中焦不食謂之三焦俱損

陳二十三歲



例在不治。勉擬三焦俱損。先建中焦法。

桑葉 二錢
白扁豆 三錢
茯苓塊 一錢
蓮子 三錢

芡實 三錢
冰糖 三錢
桂枝 二錢
焦白芍 錢半

沙參 三錢
胡桃肉 三錢
服四帖後能食。

脈弦細失音。謂之金碎不鳴。暮熱不食。食則嘔。亦係俱損為難

治。

胡桃肉 三錢
甜杏仁 三錢
冰糖 三錢
白扁豆 五錢

茯苓塊 二錢
桑葉 二錢
洋葎 二錢
沙參 三錢

柏子霜 三錢

另含鮑魚片。洋葎片。

陳氏 三十二歲

甲子四月初五日

施二十歲

十三日

十四日

十八日

初五日

姚三十歲

乙酉五月

初五日

形寒而六脉弦細時而身熱先天不足與諸虛不足之小建中

法

芍藥六錢

中生薑

四錢去核

大棗

四枚

桂枝

四錢

炙甘草

三錢去渣
化入

膠

糖

一兩

前方服過六十劑諸皆見效陽雖轉而虛未復於前方內減薑

桂之半加柔藥兼與護陰法

大生地

五錢

五味子

二錢連心

麥冬

四錢

六脉弦細而緊勞傷吐血諸虛不足小建中湯主之

小建中湯加茯神四錢

共服二十一帖全愈

李二十四歲

乙酉五月

初三日

十四日

傅十八歲

乙酉五月
十三日

每日五更胃痛欲飲得食少安胃痛則背冷如冰六脉弦細陽微是太陽之陽虛累及陽明之陽虛陽明之陽虛現症則太陽之陽更覺其虛此等陽虛只宜通補不宜守補

半夏 六錢

廣和皮 四錢

川椒炭 五錢

乾薑 四錢

桂枝 八錢

背寒減腹痛下移減桂枝加吳萸良薑

六脉弦細而緊吐血遺精陽氣不攝胃口不開法當與建中復其陽奈係酒客中焦濕熱壅聚不可與甘改用辛淡微甘以和胃胃旺得食而後諸可復也

半夏 五錢

白芍 五錢

薑汁 每杯點三小茶匙

廣皮炭 三錢

桂枝木 三錢

生苡仁 五錢

雲苓塊 五錢

麥冬 三錢

炒神麩 五錢

七帖

業已見效。胃開得食。脉尚弦緊。多服為宜。

幼孩脉雙弦而細緊。瘰癧結核。胃陽不開。色白食少。且嘔。形體

羸瘦。與通補胃陽。

半夏 四錢

雲苓塊 四錢

炒廣皮 二錢

白扁豆 四錢

生薑 三錢

前藥已服十二帖。嘔止胃開。腹微脹。脉有回陽之氣。於前方加

厚樸。杉皮。消脹。脹消後。接服前方。化核。於前方內去生薑。廣皮。

沈十五歲

二十二日

乙酉年五月十五日

六月十二日

錢二十七歲

乙酉五月二十八日

日十正

酉半正

日十正

日 八月十九

加香附。土貝母。冬藤青。橘葉。海藻。以化瘰癧痰核。

六脉弦緊。胃痛久痛在絡。當與和絡。

公丁香 八分

小茴香炭 二錢

生薑 二錢

歸鬚 二錢

桂枝 三錢

降香末 三錢

烏藥 二錢

良薑 一錢

夏 三錢

此方服七帖後痛止。以二十帖神麩為丸。服過一料。

六脉弦細而緊。臟氣之沈寒可知。食難用飽。稍飽則腹脹。食何

物則暖。何氣間有胃痛時。皆腑陽之衰也。陽虛損症。與通補臟

腑之陽法。大抵勞陽者十之八九。勞陰者十之二三。不然經何

云。勞者溫之。世人僉以六味八味治虛損。人命其何堪哉。

暫戒猪肉介屬

半夏六錢

川椒炭三錢

白蔻仁三錢

益智仁四錢

小枳實二錢

良薑三錢

茯苓塊三錢

生薑五錢

丁香二錢

廣陳皮五錢

經謂必先歲氣。毋伐天和。今年陽明燥金。太乙天符。故用

益藥如右。他年溫熱宜減。

二十四日

前藥已服五帖。脉之緊無胃氣者。和痛處已止。頗能加餐。神氣亦旺。照前方減川椒一錢。丁香一錢。再服七帖。可定丸方。

三十日

前因脉中之陽氣已回。頗有活潑之神。恐剛燥太過。減去川椒丁香各一錢。今日診脉。雖不似初診之脉緊。亦不是念四日之脉和肢涼。陽微不及四末之故。與前方內加桂枝五錢。再服七

虛勞

帖。...

丸方。...

諸症向安。惟六脉尚弦。與通補脾胃兩陽。

赤茯苓塊八兩。小枳實二兩。生苡仁八兩。白蔻仁一兩。

前半日夏八兩。於四兩。廣陳皮四兩。人參二兩。

益智仁四兩。

共為細末。神麴八兩煎湯法。丸梧子大。每服三二錢。再服。

三服自行斟酌。

備用方。...

陽虛之體質。如冬日畏寒。四肢冷。有陽微不及四末之象。服此。

乙酉九月
三十日

二十四日

八月十九日

方五七帖以充陽氣。而效驗以天賦且益膏一。整律二十四示。

白芍 六錢
生薑 五錢
炙甘草 三錢
桂枝 四錢

去核 大棗 三枚 化冲 膠 一兩
薄批黃 麥 冬

三煎兩杯分二次服。 主升調 坐白卷

三甲此方亦可加棉黃薯人參茯苓白朮廣橘皮。

病後六脈弦細而緊絕少陽和之氣形體羸瘦幸喜胃旺可以

守補與形不足者補之以氣法。 益用專食大主營四示外也。

白芍 六錢
雲茯苓塊 四錢
生白薑 三錢
桂枝 四錢

人甘葎 三錢 去核
大麥棗 二枚
炙甘草 三錢
桂圓肉 三錢

和炙黃芪 四錢
膠 二兩
食減少而心將其良吸時藥

譚四十七歲

乙酉八月二十八日

刺十式

陳十九歲

二十八日
五酉八月

李四十歲

脉虛數。頭目眩胃。暮有微熱。飲食減少。面似桃花。身如柳葉。

炙甘草

六錢連心

大麥冬

五錢

生牡蠣

五錢

乾地黃

六錢

阿膠

三錢

生鼈甲

八錢

生白芍

六錢

麻仁

三錢

守齋服二十帖紅退暈止。食進。後用專翁大生膏四斤收功。

面赤舌絳。脉虛陽而數。聞婦聲則遺。令其移居夫廟深處。可以

三甲復脉湯。可吐。黃蒼人參。蒼苔。白朮。黃連。黃芩。

炙甘艸

生牡蠣

生白芍

阿膠

乾地黃

麥冬

生龜板

六錢

土

薑

正錢

炙甘草

三錢

封

四錢

服四十帖由漸而效。後以天根月窟膏一整料二十四斤

收功。

粉紅色。虛數脉。頭時暈。身微熱。心悸氣短不寐。食少與補心腎之陰。

洋 蓂

丹 皮

連心蓮 子

連心
殊拌麥 冬

丹 蓂

地 黃

五 味 子

雲 苓 塊

炒 棗 仁

冰 糖

服五帖漸安。後以專翁大生硃砂為衣。一料收功。

張正而... 大... 一... 科...

效... 水...

八... 正... 雲...

者... 八... 雲...

之...

傳... 湖... 頭... 量... 長... 辨... 樣... 似... 對... 展... 賦... 不... 來... 食... 少... 與... 諸... 心... 實...

如...

淮陰吳鞠通先生醫案

吐血

脉弦如刃。吐血後左脇微痛。喉中如有物阻。治在肝絡。使血不瘀。則吐可止。止後當與補陰。

新絳紗 三錢

歸鬚 二錢

元胡索 二錢

旋覆花 三錢

炒桃仁 三錢

降香末 三錢

丹皮 三錢

蘇子霜 二錢

鬱金 二錢

如刃之脉。已漸平減。但虛數如故。

新絳紗 三錢

製香附 錢半

焦白芍 三錢

旋覆花 三錢

炒丹皮 五錢

細生地 三錢

降香末 三錢

歸鬚 二錢

廣鬱金 二錢

肝為剛藏。勁氣初平。未便膩補。取鬆靈之解。肝絡者宜之。

遼沙蔘 三錢

細生地 三錢

炒丹

皮 五錢

桑葉 錢半

焦白芍 六錢

整石斛 三錢

白蒺藜 三錢

連心麥冬 五錢

生甘草 一錢

廣鬱金 二錢

歸鬚 錢半

昨日仍有瘀血吐出。今尙未可呆補。

沙 蓂 三錢

細生地 三錢

沙苑蒺藜 二錢

桑葉 錢年

丹 皮 五錢

茶菊花 二錢

連心麥冬 五錢

焦白芍 三錢

釵石斛 五錢

當歸 錢半

生甘草 一錢

羚羊片 二錢

外另服新絳三錢。

大凡吐血。左脉堅搏。治在下焦血分。右脉堅搏。治在上焦氣分。又有心血。肝血。大腸血。小腸血。胃血。衝脉血。各種不同。豈一概見血投涼所可治哉。無恠乎室女童。男勞瘵乾血甚數。體厚色白。少腹痛。小便短赤。咳吐痰紫。繼見鮮紅血。喉中鹹。此衝脉襲受寒邪。致經不得行。倒送而吐耳。大忌柔潤寒涼。議温鎮衝脉。行至陰之瘀濁。使經得行而血症愈矣。苦辛通法。

小茴香 二錢

兩頭尖 二錢

桃仁 三錢

降香末 三錢

韭白汁 三茶匙

紫石英 三錢

歸鬚 二錢

川棟子 三錢

研細冲 琥珀 三分

右脉浮洪。咳痰吐血。唇絳。治在上焦氣分。

初三日

桑葉 二錢

生苡仁 五錢

杏仁 三錢

茯苓塊 五錢

沙 三錢

連 翹 八分

生扁豆 五錢

三帖

血後咳不止。進食不香。右脉不浮而仍洪。兼與養陽明之陰。

桑葉 錢半

茯苓塊 三錢

百合 二錢

生扁豆 三錢

生苡仁 三錢

玉竹 二錢 連心

麥冬 二錢

沙參 三錢

甜杏仁 二錢

諸症俱退。惟進食不旺。右脉大垂尺澤。先與甘寒養胃陰。

連心大麥冬 六錢

桑葉 一錢

生扁豆 三錢 錢五妙

玉竹 三錢

甜杏仁 三錢

細生地 三錢

沖秋梨汁 一酒杯

沙參 三錢

甘潤養陰。

初九日

初五日

伊二十四歲

癸酉七月

二十五日

乙丑三月

十七日

連心麥

冬 六錢

桑

葉 一錢

生扁豆 三錢

甜杏仁 二錢

大生地

三錢

炒

玉

竹 二錢

沙

參 三錢

柏子霜 二錢

火麻仁

二錢

白

芍 三錢

冰

糖 三錢

四帖

六脉弦數。兩關獨浮。左更甚。右脇痛。胸中痞塞。肝鬱吐血。先理

肝絡。

新絳紗

三錢

廣鬱金

二錢

旋覆花

二錢

歸

鬚 二錢

降香末

二錢

炒

丹

皮 三錢

蘇子霜

三錢

三帖。

細生地

五錢

丹

皮 五錢

白

芍 四錢

甘

草 錢半

阿膠

二錢

麻

仁 三錢

沙

棧 二錢

天

冬 三錢

麥冬

四錢炒黑

真雲連

一錢

黃柏炭

三錢

三七

一錢

水八碗。煮取三杯。分三次服。

二十二日

左脉仍弦。細數鋒鋼如刃。吐血左手脉堅搏。治在下焦血分。

細生地 五錢

丹皮 五錢

白芍 四錢

甘草 錢半

霍石斛 五錢

阿膠 二錢

麻仁 三錢

沙棗 三錢

天冬 三錢連心

麥冬 四錢

元參 三錢

茯苓塊 三錢

黃芩炭 二錢

煮四杯。分四次服。

二十六日

脉數減。弦剛甚。

大生地 五錢

炒白芍 四錢

炙甘草 錢半

丹皮 五錢

阿膠 二錢

麻仁 二錢

洋棗 三錢

麥冬 四錢

丙寅二月
初九日

茯苓塊 三錢

生牡蠣 三錢

勞傷吐血。脉雙弦。金匱謂大則為虛。弦則為減。虛弦相搏。其名曰革。男子失精。亡血諸不足。小建中湯主之。

白芍 六錢

桂枝 四錢

炙甘草 三錢

大棗 二枚

生薑 四錢

去渣後入上火二三沸

膠飴 一兩

水五碗。煮取兩碗。渣再煮一碗。分三次服。病輕者日一帖。

重則日再作服。

右脉空大。左脉弦。血後咳吐。濁痰腥臭。真液不守。陰火上冲。尅

金。非純補純清之症。然而憊矣。

沙 二錢

麥 二錢

冬 三錢

生扁豆 三錢

枇杷葉 錢半

章

丙寅二月
二十四日

二十八日

霜桑葉 三錢

生阿膠 三錢

密炙研去皮尖

甜杏仁 二錢

白花百合 二錢

研五味子 錢半

天門冬 三錢

藿石斛五錢煎湯代水濃煎兩杯分二次服

脉少歛痰咳亦減切戒用心

沙參 三錢連心

麥冬 三錢

天門冬 三錢

百合 三錢

生阿膠 三錢

生牡蠣 三錢

桑葉 二錢

生白扁豆 三錢

生西洋參 錢半

五味子 三錢

水五碗煮取兩碗渣再煮一杯分三次服日二帖

脉大歛戢古所謂脉小則病退是也頗有起色若得舌苔化去

則更妙矣

初三日

胡三十一歲

乙酉年四月二十八日

五月初

六日

十五日

沈二十四歲

沙參 三錢

桑葉 三錢

白扁豆 三錢連心

麥冬 三錢

洋葎 錢半

天門冬 三錢

五味子 三錢鮮沖

蘆根汁 五杯

沖梨汁 一小杯

生苡仁 五錢

四帖

勞傷吐血汗多足麻六脉弦細不數小建中湯主之

白芍 六錢

桂枝 四錢

炙甘草 三錢

生薑 五錢

去核大棗 三枚 去渣後入上火二三沸膠飴 一兩

汗減足麻愈食少加再服

前藥已服十四帖諸症皆愈惟咳嗽未止於前原方加雲苓半

夏

六脉弦數勞傷

乙酉五月
初十日

十二日

十四日

二十六日
二十八日
三十日

十五日

炒白芍 六錢 冲生薑汁 三匙 桂枝 三錢去核 大棗 三枚

炙甘草 三錢 膠飴 一兩

加麥冬 五錢 丹皮 三錢 煮三杯分三次服 四帖

肝鬱脇痛病名肝着治在肝經之絡經藥弗愈也

新絳紗 三錢 歸橫鬚 二錢 吳萸 一錢 旋覆花 三錢

廣鬱金 二錢 青皮 二錢 蘇子霜 三錢 廣皮炭 二錢

降香末 三錢 半夏 三錢

煮三杯分三次服

六脉弦勁前用建中現脉已和左手仍勁胸前咳甚則痛間有一二日紫色之血按肝脉絡胸是肝絡中尚有瘀滯且與宣絡

二十一日

新絳紗 三錢

歸鬚 二錢

廣皮炭 二錢

旋覆花 三錢

丹皮炭 三錢

桃仁泥 三錢

蘇子霜 二錢

鬱金 二錢

降香末 三錢

薑半夏 五錢

四帖

六脉弦數。以清氣在頭之故。受微風。右寸獨浮大。而衄血。暫與清。清道之風熱。

白茅根 五錢

甜杏仁 三錢

炒黑山梔 一錢

桑葉 三錢

炒側柏葉 三錢

茶菊花 三錢

鮮蘆根 三錢

周身癢不可當。脉洪。狂吐血。與大黃黃連瀉心湯。以後永不發。酒客大吐狂血。盛益。六脉洪數。面赤。三陽實火為病。與大黃黃連瀉心湯。一帖而止。二帖脉平。後七日又復發。脉如故。又二帖。

吳七十歲

史五十歲

吳二十五歲

庚子十月

壽二十歲

乙酉十一月十二日

二十二日

每日飽食就床脾陽致困因失其統血之職此為傷食吐血脉
弦與竈中黃土每日一斤分二次煎服將盡半月而愈戒其夜
食遠不發

怒傷吐血兩脇俱痛六脉弦緊誤補難愈凡怒傷肝鬱必有瘀
血故症現脇痛一以活肝絡為主俟瘀血去淨而後可以補虛

新絳紗 三錢

桃仁 三錢

丹皮炭 三錢

歸鬚 三錢

降香末 三錢

蘇子霜 二錢

旋覆花 三錢

廣鬱金 二錢

煮三杯分三次服 四帖

復診脉之弦緊雖減而未和緩脇痛雖大減而未淨除與原方

去桃仁加細生地五錢 四帖

十二月
初五日

初九日
十八日

金三十歲

六脉弦細而緊。金匱謂脉雙弦者寒也。弦則為減。男子失精亡血。小建中湯主之。怒傷吐血愈後。以小建中復陽生陰。

焦白芍 六錢

生

薑 三錢

桂

枝 三錢

大棗 二枚

炙甘草

三錢

後化入膠

飴

一兩

加丹皮

三錢

麥冬

三錢

服八帖。

諸症全愈。胃口大開。虛未全復。於原方加麥冬二錢。使分佈津液於十二經臟。則虛從飲食中復矣。

肝鬱脇痛吐血。病名肝着。且有妊娠。一以宣肝絡為要。與新絳旋覆花湯法切戒。惱怒介屬。

新絳紗

三錢

包

旋覆花

三錢

丹

皮

五錢

降香末

三錢

歸鬚 三錢

桃仁 二錢

香附 三錢

廣鬱金 二錢

蘇子霜 二錢

以脇痛止爲度。

十八日
十八日

十二日
十二日

六神... 金... 附... 蘇... 桃... 歸... 蘇子霜... 以脇痛止爲度。

淮陰吳鞠通先生醫案

便血

糞後便紅。責之小腸寒溼。不與糞前為大腸熱溼。同科舉世業

醫者不知有此。無怪乎十數年不愈也。用古法黃土湯。

黃土二兩 生地黄三錢 製蒼朮三錢 熟附子三錢

阿膠三錢 炒黃芩二錢 炙甘草三錢

加酒炒白芍全 歸錢半

水八碗。煮成三碗。分三次服。

小兒脉當數而反緩。糞後便血。前用黃土湯。業已見效。仍照前

法加剛藥。即於前方內去白芍全當歸。加附子一錢。蒼朮二錢。

毛十二歲

癸亥十二月初二日

初七日

癸亥十二月初二日

孫男三十八歲

戊寅七月初一日

福二十九歲

湖州孝廉其人素有便紅之症自十八歲起至今不絕現面色

痿黃失血太多急宜用古法有病則病受雖暑月無碍也

方法分兩同前服一帖即止次日停後服半月復發再服

一帖全愈

初因恣飲冰振黃酒冰浸水果又受外風致成風水頭面與身

腫大難狀腫起自頭先與越婢湯發其汗頭面腫消繼與利小

便下截腫消脹減後與調理脾胃自上年十月間服藥至次年

三月方止共計湯一百四十三帖其病始安囑其戒酒肉生冷

不意夏月暑熱甚時仍恣吃冰冷水果自八月後糞後大下狂

血每次有升數之多余用黃土湯去柔藥加剛藥每劑黃土用

胡三十歲

乙酉年九月十七日

陳三十五歲

乙酉四月二十一日

一斤附子用六錢。或止復來。伊本人見其血之不止也。加附子至八錢。或一兩。他藥接是服至九十餘帖始大愈。

木係酒客。溼中生熱。久而發黃。顏色暗滯。六脉俱弦。其來也漸。此非陽黃。况糞後見紅。非又為小腸寒濕乎。

竈中黃土先煎八兩

熟附子三錢

茵陳五錢

蒼朮炭三錢

炒黃蘗三錢

猪苓三錢

澤瀉三錢

雲茯苓三錢

煮三杯。分三次服。五帖全愈。

糞後便紅。寒溼為病。誤補誤涼。胃口傷殘。氣從溺管而出。若女

子陰吹之屬。瘕氣者。然左脇肝部臥不着席。得油膩則寒戰發

雜無倫。幾於無處下手。議治病必求其本。仍從寒溼診治。令能

安食再商。與黃土湯中去柔藥。加剛藥。

川椒炭 三錢

廣陳皮 三錢

生薑 二錢 竈中

黃土 四兩

雲茯苓 五錢

生茅朮 三錢

香附 三錢

熟附子 三錢

益智仁 三錢

煮三杯。分三次服。服三帖。

五月初二日。又服二帖。

心悸短氣。加小枳實四錢。乾薑二錢。已服四帖。

去川椒三錢。已服三帖。

諸症皆效。大勢未退。左脉緊甚。加附子一錢。降香末三錢。乾薑

一錢。已服三帖。

諸症向安。惟糞後便血。又發。與黃土湯法。糞後便血。乃小腸寒

初三日

十一日

二十一日

二十七日

溼不與糞前為大腸熱溼同科。

籠中黃土八兩廣皮炭三錢熟附子四錢益智仁二錢

黃芩炭四錢雲茯苓五錢炒蒼朮四錢

煮三杯分三次服以血不來為度。

面色青黃滯暗六脉弦細無陽胃口不振慙與和胃其黃土湯

俟便紅發時再服。

薑半夏六錢雲苓塊五錢廣陳皮三錢生苡仁五錢

益智仁三錢川椒炭一錢白蔻仁一錢

煮三杯分三次服。

加桂枝五錢。

七月十四日

十七日

十一月十五日

十二月十日

肝鬱挾痰飲寒溼為病前與黃土湯治糞後便血之寒溼茲便紅已止繼與通補胃陽現在飲食大進諸證漸安惟六脉細弦右手有胃氣左手弦緊痰多畏寒脇下仍有伏飲與通補胃陽兼逐痰飲。

桂枝 六錢

小枳實 三錢

川椒炭 三錢

旋覆花 三錢

香附 四錢

廣皮 五錢

炒白芍 三錢

乾薑 三錢

雲苓 五錢

薑半夏 八錢

煮三杯分三次服。

脉弦緊痰多畏寒衝氣上動與桂枝茯苓甘草湯合桂枝加桂

湯法。

桂枝

一兩連皮

茯苓塊

二兩

炙甘草

五錢

全當歸

三錢

川芎

二錢去粗皮

桂

五錢

服一帖。衝氣已止。當服藥後。吐頑痰二口。

衝氣已止。六脉緊退而弦未除。可將初十日方。再服半帖。以後

再服二十九日。改定方。以不畏寒為度。

服十一月十五日。疎肝藥二帖。

背畏寒。脉仍弦緊。再服十二月初十日。桂枝加桂湯二帖。以峻

補充陽。服藥後吐頑痰二口。

脉仍弦緊。背猶畏寒。陽未全復。照原方再服二帖。分四日服。

前之畏寒。至今雖減而未全愈。脉之弦緊亦未冲和。衝氣微有

十一日

十三日

十四日

十七日

二十九日

丙午正月
初五日

上動之象。可取初十日桂枝加桂湯法。再服二帖。分四日立春以後故也。

六脉俱弦。左脉更緊。糞後便紅。小腸寒溼。黃土湯爲主方。議黃土湯去柔藥。加淡滲通陽。雖自覺胸中熱。背心如熱水燒。所云熱非熱也。况又惡寒乎。

竈中黃

土 八兩

生苡米 五錢

雲苓塊 六錢

熟附子 四錢

蒼朮炭 四錢

桂枝 五錢

黃芩炭 四錢

廣皮炭 四錢

煮四碗。分四次服。血多則多服。萬一血來甚湧。附子加至八錢。以血止爲度。再發再服。切勿聽淺學者妄轉一方也。

丸方。

初十日

陽虛脉弦。素有寒溼痰飲。與蠲飲丸方。通陽滲溼而補脾陽。

桂枝 八兩

蒼朮炭 四兩

生苡仁 八兩

雲苓塊 八兩

乾薑炭 四兩

炙甘草 三兩

益智仁 四兩

半夏 八兩

廣皮 六兩

神麴糊丸。小梧子大。每服三錢。日三服。忌生冷猪肉介屬。

糞後便紅雖止。寒溼未盡。脉之緊者亦減。當退剛藥。背惡寒未罷。行溼之中。兼與調和營衛。

蒼朮炭 三錢

黃芩炭 錢半 籠中

土 一兩

焦白芍 四錢

生苡仁 三錢

煮三杯。分二次服。以背不惡寒為度。戒生冷介屬猪肉。

為三... 不... 肉

坐... 三...

... 三... 上... 白...

... 中... 餘...

... 地... 未... 梨... 當... 想...

... 小... 三... 三... 合...

... 三...

... 甘... 三... 半...

... 封... 八... 蒼... 八...

... 封... 八... 蒼... 八...

淮陰吳鞠通先生醫案

腫脹

陳三十二歲

甲寅年二

月初四日

太陰所至。發爲臌脹者。脾主散津液。脾病不能散津。土日敦阜。斯臌脹矣。厥陰所至。發爲臌脹者。肝主疏泄。肝病不能疏泄。木穿土位。亦臌脹矣。此症起於肝經鬱勃。從頭面腫起。腹因脹大。的係蠱脹。而非水腫。何以知之。滿腹青筋暴起。如蟲紋。並非本身筋骨之筋。故知之。治法行太陽之陽。泄厥陰之陰。爲要。醫用八味丸誤治。反攝少陰之陰。又加牡蠣潛陰戀陽。使陽不得行。而陰凝日甚。六脉沉弦而細。耳無所聞。目無所見。口中血塊。累累續出。經所謂血脉凝泣者是也。勢太危極。不敢驟然用藥。思

初五日

至陽而極靈者莫如龍。非龍不足以行水。而聞介屬之翁。惟鯉魚三十六鱗能化龍。孫真人曾用之矣。但孫真人千金原方去鱗甲用醋煮。茲改用活鯉魚大者一尾。得六斤。不去鱗甲。不破肚。加葱一斤。薑一斤。水煮熟透。加醋一斤。任服之。

服鯉魚湯一晝夜。耳聞如舊。目視如舊。口中血塊全無。神氣清爽。但腫脹未除。

經謂病始於下而盛於上者。先治其下。後治其上。病始於上而盛於下者。先治其上。後治其下。此病始於上。腫當發其汗。與金匱麻黃附子甘草湯。

去節
麻

黃 二兩

熟附子

一兩六錢

炙甘草

一兩二錢

煑成五飯碗。先服半盃。得汗止。後服不汗。再服。以得汗爲

度。

此方甫立。未分量。陳頌箒先生一見。云斷然無效。予問曰。何以不效。陳先生云。吾曾用來。予曰。此在先生用。誠然不效。予用。或可效耳。王先生名謨。忘其字云。吾甚不解。同一方也。藥止三味。並

無增減。何以爲吳用。則利。陳用。則否。豈無知之草木。獨聽吾兄使令哉。予曰。蓋有故也。陳先生性情忠厚。其膽最小。伊恐麻發。陽必用八分。附子護陽。用至一錢。以監制。又恐麻黃附子。皆慄悍藥也。甘草平緩。遂用一錢二分。又監制麻黃附子。服一帖。無汗。改用八味丸矣。八味陰柔藥多。乃敢大用。如何能效。病者乃

兄陳蔭山先生入內室取二十八日陳頌箒所用原方分量一毫不差。在座者六七人皆譁然笑曰：何先生之神也。予曰：余常與頌箒先生一同醫病，故知之深矣。於是麻黃去淨，節用二兩。附子大者一枚，得一兩六錢。少麻黃四錢，讓麻黃出頭。甘草一兩二錢。又少附子四錢，讓麻黃附子出頭。甘草但鎮中州而已。衆見分量又大，譁曰：麻黃可如是用乎？頌箒先生云：不妨。如有過差，吾敢當之。衆云：君用八分，未敢足錢。反敢保二兩之多乎？頌箒云：吾在鞠溪先生處治產後鬱冒，用當歸二錢。吳君痛責謂當歸血中氣藥，最能竄陽。產後陰虛陽越，例在禁條，豈可用乎？夫麻黃之去當歸，奚啻十百。吾用當歸，伊責之甚。豈伊用麻

初六日

黃又如是之多。竟無定見乎。予曰人之畏麻黃如虎者。爲其能
大汗亡陽。未有汗不出而陽亡於內者。湯雖多。但服一杯。或半
杯。得汗即止。不汗再服。不可使汗淋漓。何畏其亡陽哉。但此症
閉錮已久。陰霾太重。雖盡劑。未必有汗。予明日再來發汗。病家
始敢買藥。而仙芝堂藥舖竟不賣。謂想是錢字。先生誤寫兩字。
主人親自去買。方得藥服。盡劑。竟無汗。

衆人見汗不出。僉謂汗不出者死。此症不可爲矣。余曰不然。若
竟死症。鯉魚湯不見效矣。予化裁仲景先師桂枝湯用粥發胃
家汗法。竟用原方分量一帖。再備用一帖。又用活鯉魚一尾。得
重四斤。煮如前法。服麻黃湯一飯碗。卽接服鯉魚湯一碗。汗至

初七日

眉上。又一次汗至上眼皮。又一次汗出下眼皮。又一次汗至鼻。又一次汗至上唇。大約每一次汗出三寸許。二帖俱服完。鯉魚湯一鍋。喝一晝夜。亦服盡。汗至伏兔而已。未過膝也。臍以上腫俱消。腹仍大。

經謂汗出不止足者死。此症尙未全活。雖腰以上腫消。而腹仍大。腰以下其腫如故。因用腰以下腫當利小便例。與五苓散服至二十一日。共十五天不效。病亦不增不減。陳蔭山先生云。前用麻黃。其效如神。茲小便滴不下。奈何。祈轉方。予曰。病之所以不效者。藥不精良耳。今日先生去求好肉桂。若仍係前所用之桂。明日予不能立方。固無可轉也。

陳蔭山搆得新鮮紫油邊青花桂一枝重八錢。乞予視之。予曰：得此桂必有小便。但恐脫耳。膀胱爲州都之官。氣化則能出焉。氣虛亦不能化。於是用五苓二兩。加桂四錢。頂高遼參三錢。服之盡劑。病者所睡係棕床。予囑備大盆二三枚。置之床下。溺完被溼不可動。俟明日予親視挪床。其溺自子正始通。至卯正方完。共得溺大盆有半。子辰正至其家。視其週身如空布袋。又加腐皮。於是用調理脾胃全愈。

孀居三十餘年。體厚憂鬱太多。肝經鬱勃久矣。又因暴怒重憂。

致成厥陰太陰兩經膈脹並發。水不得行。腫從跗起。先與腰以下腫。當利小便。例之五苓散法。但陰氣太重。六脉沈細如絲。斷

非輕劑所能了。

桂枝 五錢

生蒼朮 五錢

猪苓 五錢

澤瀉 五錢

茯苓皮 六錢

肉桂 四錢

廣皮 五錢

厚樸 四錢

前方服三五帖不效。亦無壞處。小便總不見長。肉桂加至二三兩。桂枝加至四五兩。他藥稱是。每劑近一斤之多。作五六碗服。五七帖後。六脉絲毫不起。腫不消。便亦不長。所以然之故。肉桂不佳。陰氣太重。憂鬱多年。暴怒傷肝。必有陳菟。仍用原方加雞矢醴。熬淨烟六錢。又加附子八錢。服之。小便稍通。一連七帖。腫漸消。飲食漸進。形色漸喜。於是漸減前方分量。服至十四帖。腫脹全消。後以補脾陽。疎肝鬱收功。

先是郭氏喪夫於二百里外其祖墓之側。郭携子奔喪。饑不欲食。寒不欲衣。悲痛太過。葬後廬墓百日。席地而臥。哭泣不休。食少衣薄。回家後致成單單腹脹。六脉弦無胃氣。氣喘不能食。唇舌刮白。面色淡黃。身體羸瘦。余思無情之草木不能治有情之病。必得開其愚蒙。使情志暢遂。方可冀見效於萬一。因問曰。汝之痛心疾首。十倍於常人者何故。伊答曰。夫死不可復生。所遺二子恐難成立耳。余曰。汝何不明之甚也。大凡婦人夫死曰未亡人。言將待死也。汝如思夫愈切。即死基側。得遂同穴之情。則亦已矣。雖有病何必醫。醫者求其更甦也。其所以不死者。仍係相夫之事業也。汝子之父已死。汝子已失其蔭。汝再死。汝子豈

不更無所賴乎。汝之死。汝之病。不惟無益於夫。而反重害其子。害其子。不惟無益於子。而且大失夫心。汝此刻欲盡婦人之道。必體亡夫之心。盡教子之職。汝必不可死也。不可死。且不可病。不可病。必得開懷暢遂。而後可愈。單腹脹。死症也。脉無胃氣。死脉也。以死症而見死脉。必得心火旺。折泄肝鬱之陰氣。而後血脉通。血脉通。臟氣遂。死証亦有可生之道。詩云。見睨曰消者。是也。伊聞余言。大笑。余曰。笑則生矣。伊云。自此以後。吾不惟不哭。並不敢憂。思一味以喜樂從事。但求得生以育吾兒而已。余曰。汝自欲生則生矣。於是爲之立開鬱方十數劑。而收全功。

新絳
紗布包

旋覆花 三錢

降香末 三錢

歸鬚 二錢

蘇子霜 三錢

吳氏
二十八歲

鬱金 三錢
香附 三錢
川厚樸 三錢
薑半夏 四錢

廣皮 三錢
結青皮 二錢

春夏間乘舟由南而北途間溫毒愈後感受風濕內脹外腫又有肝鬱之過時當季夏左手勞宮穴忽起勞宮毒如桃大此症治熱凝溼治濕凝熱之弊選用幼科痘後餘毒歸肺喘促咳逆之實脾利水法加極苦合爲苦淡法俾熱毒由小腸下入膀胱隨溼熱一齊泄出也蓋勞宮毒屬心火瀉心者必泄小腸小腸火府非苦不通腰以下腫當利小便利小便者亦用苦淡也

猪苓 一兩
茯苓皮 一兩
白通草 三錢
澤瀉 一兩

晚蠶砂 二兩
雅連 四錢
黃柏 四錢
飛滑石 四錢

黃芩四錢

煮成五碗分五次服。以小便長者為度。此方服七帖。分量不增減。腫脹與勞宮毒俱消。以後補脾收功。

脈弦細而緊。不知饑。內脹外腫。小便不利。與腰以下腫。當利小便。法陽欲滅絕。重加熱以通陽。况今年燥金太乙。天苻經謂必先歲氣。毋伐天和。

陳二十六歲

乙酉年五月十五日

桂枝六錢 猪苓五錢 生茅朮三錢 澤瀉五錢

廣橘皮三錢 川椒炭五錢 厚樸四錢 茯苓皮六錢

公丁香二錢 杉木皮一兩

煮四杯分四次服

二十五日

單氏四十二歲

二十六日

諸症皆效。知饑。腫脹消。其大半。惟少腹有疝。竟如有一根筋吊

痛於原方內減丁香一錢。加小茴香三錢。

腫脹六年之久。時發時止。由於肝鬱。應照厥陰臍脹例治。

降香末 三錢

木通 二錢

香附 三錢

旋覆花 三錢

歸鬚 三錢

鬱金 二錢

青皮 二錢

厚樸 三錢

大腹皮 三錢

雲苓 六錢

半夏 四錢

煮成三杯。分三次服。不能寬懷。消怒。不必服藥。

眼前方八帖。腫脹稍退。惟陽脉微弱。加以椒炭三錢。大便不通。

加兩頭尖三錢。去陳菴。

淮陰吳鞠通先生醫案

單腹脹

毛四十四歲

病起肝鬱。木鬱則剋土。剋陽土則不寐。剋陰土則臏脹。自鬱則脇痛。肝主疎泄。肝病則不能疎泄。故二便亦不宣通。肝主血絡。亦主血。故治肝者必治絡。

新絳紗 三錢

半夏 八錢

香附 二錢

旋覆花 三錢

青皮 三錢

小茴香 三錢

歸鬚 三錢

降香末 三錢

廣鬱金 三錢

蘇子霜 三錢

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。三帖。

服肝絡藥。脹滿脇痛不寐少減。惟覺胸痛。按肝脈絡。胸亦是肝

初七日

鬱之故。再小便赤濁氣溼也。

桂枝嫩興 三錢

晚蠶砂 三錢

歸鬚 二錢

川棟子 三錢

半夏 六錢

降香末 三錢

白通草 三錢

青橘皮 三錢

茯苓皮 三錢

新絳紗包旋覆花 三錢炒黑

小茴香 三錢

兩頭尖 三錢

服二帖。

初十日

驅濁陰而和陽明。現在得寐。小便少清。但肝鬱必尅土。陰土鬱則脹。陽土鬱則食少而無以生陽。故清陽虛而成胸痺。暫與開痺。

薤白頭 三錢

半夏 一兩

廣鬱金 三錢
連皮仁研括萹實 三錢

生苡仁 五錢

桂枝興 五錢

茯苓皮 五錢

厚朴 三錢

小枳實 二錢

服三帖。

十四日

脉緩太陽已開。而小便清通。陽明已闔。而得寐能食。但臏脹不除。病起肝鬱。與行溼之中。必兼開鬱。

降香末 三錢

生苡仁 五錢

白通草 八錢

厚樸 三錢

煨肉果 錢半

茯苓皮 五錢

半夏 五錢

徐三十歲

腹脹且痛。脉弦細。大便詳。小便短。身不熱。此屬寒溼傷足太陰。

猪苓 三錢

黃芩炭 一錢

澤瀉 三錢

桂枝 三錢

厚樸 三錢

廣皮 二錢

乾薑 錢半

生苡仁 五錢

通草 二錢

脈草二錢

草對三錢

龍一丈二錢

薛薑半

坐枝寸正錢

龍登三錢

黃蒼一錢

對三錢

對三錢

翁三十翁

與龍具滋潤玄樞大與育小與致良不熱其風寒者皆以木劍

獸肉果

荊芥丈正錢

半夏正錢

刺香末三錢

坐枝寸正錢

白磁半人錢

以對三錢

刺味味平藥與骨蒸之中必無開變清氣之味也

刺味太刺已開而小刺者酸刺即已固而骨刺者金甲刺不

刺三寸

牛夏

刺三錢

刺三錢

心財寶二錢

刺三錢

刺三錢

刺三錢

十四日

淮陰吳鞠通先生醫案

滯下 俗名痢疾又曰積紅色屬熱屬血白色屬寒屬氣

滯下白積欲便先痛便後痛減責之積重脉遲而弦甚痛蓋冷

積也非溫下不可

丁氏 五十八歲

熟附子片 五錢

廣木香 三錢

小枳實 三錢

生大黃片 五錢

廣陳皮 五錢

南查肉 三錢

厚樸 五錢

炒白芍 三錢

良薑炭 二錢

黃芩炭 三錢

堅檳榔 三錢

滯下白積欲便先痛便後痛減者責之有積用溫下法

炒白芍 二錢

廣皮 二錢

枳實 錢半

炒黃芩 二錢

木香 一錢

檳榔 錢半

炒雲連 一錢

酒炒黑錦紋軍 三錢

梁二十八歲

二十八歲

張三十八歲

藥
甲子十一
月十八日

二十日

厚樸 三錢
熟附子 三錢

五杯水。煮成兩杯。分二次服。

先泄而後滯下。脾傳腎為難治。

大白芍

二錢吳黃炒

真雅連

一錢二分

黃芩炭

一錢二分

生茅朮

三錢

豬苓

三錢

澤瀉

三錢

生苡仁

二錢

廣木香

錢半

老厚樸

二錢

川椒目

五錢

良薑

二錢

廣皮

錢半

水六杯。煮取二杯。渣後再煎一杯。二次服。

先泄後滯下。古云難治。非一時可了。且喜脉弱。尚有生機。

炒白芍

三錢

南檳榔

錢半

木香

錢半

當歸尾

一錢

地榆炭

三錢

廣陳皮

二錢搗碎

小枳實

二錢

紅花

二錢

煎法如前。

脈沉有力。滯下。脹痛太甚。便後少減。片時其痛仍然。議網開一

面用溫下法。

白芍 酒炒 三錢 酒炒 黃芩 三錢 酒炒 黃芩 三錢 酒炒 黃真山連 二錢 酒炒 大黃 五錢

枳實 三錢 厚樸 三錢 廣木香 二錢 去粗皮 安邊桂 二錢

廣皮炭 二錢 紅花 二錢 歸尾 錢半

水五杯。煮成三杯。分三次服。一帖。

於二十日方內。加兩頭尖三錢。

腎症復歸於脾。用四苓合苓芍湯法。

猪苓 五錢 澤瀉 五錢 生苡仁 五錢 茯苓皮 五錢

二十三日

二十三日

二十四日

焦白芍 二錢 炒黃芩 錢半 廣木香 錢半 生白朮 五錢

廣陳皮 錢半 厚樸 二錢 炒真山連 錢半

水八杯。煮取三杯。分三次服。

於前方內加白通草二錢。

肝鬱則小便亦不能通。此徒用四苓不效。議開陰絡法。

降香末 三錢 冲麝香 五厘 桃仁 三錢 歸鬚 二錢

冲琥珀 三分 猪苓 三錢 兩頭尖 一錢 澤泄 三錢

小茴香 三錢 川棟子 三錢

已效。於前方內加

安邊桂 三分 生香附 三錢 鬱金 六錢

二十七日

二十六日

二十五日

二十四日

二十三日

二十八日

九竅不和皆屬胃病。用開太陽闔陽明兼瀉心法。

半夏 六錢 青皮 二錢 廣陳皮 二錢連皮 茯苓 三錢

豬苓 三錢 澤瀉 三錢 黃芩 二錢 生苡仁 三錢

薑汁炒厚樸 一錢 乾薑 二錢 炒山連 錢半 廣木香 一錢

水五杯。煮成二杯。再煮一杯。三次服。

二十九日

開太陽闔陽明兼去濕中之熱。

半夏 六錢 茯苓皮 三錢 生苡仁 三錢 廣皮 二錢

白芍 二錢 白通草 二錢 廣木香 一錢 茯苓 三錢

澤瀉 三錢 黃芩炭 二錢 真山連 錢半 葶藶 二錢

三十日

糞後便血。加黃土湯法。

半夏五錢 廣木香一錢竈中 黃土六錢 黃芩炭二錢

葶藶三錢 炒白芍三錢 茯苓皮三錢 廣皮二錢

全當歸錢半 老厚朴二錢 炒蒼朮三錢

水五杯。煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

舌絳甚。胸中嘈雜無奈。喉且痛。糞中猶帶血跡。議酸苦泄熱法。

烏梅九枚竈中 黃土八錢 黃芩二錢

四苓合芩芍法。以小便短。口糜。猶有滯下也。

炒白芍二錢 半夏三錢 真山連錢半 澤瀉三錢

炒黃芩錢半 猪苓三錢 烏梅肉三錢 茯苓皮三錢

赤朮炭錢半 當歸一錢竈中 黃土三錢

初一日

初二日

初三日

頭煎一杯。二煎一杯。分三次服。

少腹脹痛。不小便。仍係肝鬱。不主疏泄之故。

^炒真雲連 二錢

黃芩炭 二錢

桃仁泥 三錢

生香附 三錢

韭白汁 三滴

兩頭火 三錢

降香末 三錢

麝香末 五厘

^{炒黑}小茴香 三錢

歸鬚 二錢全冲

琥珀末 五分

於前方內加廣鬱金 二錢

苦辛淡。開下焦溼熱。兼瀉肝火法。

草薢 五錢炒黑

雲連 二錢炒黑

小茴香 三錢

白通草 二錢

川棟子 三錢炒黑

吳萸 錢半

黃蘗炭 二錢

生香附 三錢

某

初四日
初五日

小兒滯下紅積。欲便先痛。便後痛減。積滯太重。非溫下不可為。

張二十七歲

甲子三月
十三日

淮陰吳鞠通先生醫案

積聚

臍右有積氣以故右脉沈細弦伏陽微之極濁陰太甚克之也。溯其初原從左脇注痛而起其為肝着之咳無疑此症不必治咳。但宣通肝之陰絡。久病在絡故也。使濁陰得有出路病可自已。所謂治病必求其本者也。如不識綱領而妄冀速愈必致剝削陽氣殆盡而亡。

桂枝 三錢

小茴香 三錢

降香末 三錢

桃仁 三錢

川棟子 二錢

青皮絡 二錢

炒廣皮 一錢

歸鬚 三錢

烏藥 三錢

蘇子霜 三錢
新絲紗包

旋覆花 三錢

十九日

二十三日

張二十八歲

服通絡藥已見小效。脉氣大為回轉。但右脇着席則咳甚。脇下

支飲故也。議於前方內去桃仁川棟小茴加生香附三錢半夏

六錢杏仁三錢肉桂八分再服四帖

先痛後便而見血。議通陰絡法。

蘇子霜三錢

歸木鬚二錢

降香末三錢

桃仁二錢

兩頭尖三錢

丹皮三錢

藏紅花一錢

半夏五錢

小茴香三錢

香附二錢

廣木香一錢

廣陳皮一錢

臍左癥瘕面黃肢倦食少不能作文看書亦不能久宛如虛損

與。蘇榮

化癥回生丹緩緩通絡法。每日空心服一丸亦有早晚服

吳三十一歲

白一丸時服之二年有餘計服化癥回生丹六百丸之多癥始化淨氣體復原看書作文始舉進士

臍右結癥逕廣五寸。翠如鵝卵大。以受重涼。又加暴怒而得。痛不可忍。不能立。不能坐。並不能臥。服辛香流氣飲。三日服五帖。重加附子肉桂。至五七錢之多。絲毫無效。因服天台烏藥散。初服二錢。滿腹如火燒。明知藥至臍右患處。如搏物然。痛加十倍。少時腹中起蓓蕾無數。凡一蓓蕾下濁氣一次。如是者二三十次。腹中痛楚鬆快。少時痛又大作。服藥如前。腹中熱痛起蓓蕾。下濁氣亦如前。但少輕耳。自己初服藥起。至亥正共服五次。每次輕一等。次日腹微痛。再服烏藥散。則腹中不知熱矣。以後每

葉四十五歲

乙酉四月二十八日

六月初九日

吳三十一歲

日服二三次。七日後腫痛全消。後以習射助陽而體壯。

無論癰瘕。雖有氣血之分。然皆係陰病結於陰部。豈有用陰藥

之理。維日已久。沈寒痼冷疾。非巴豆不能除根。用

天台烏藥散。

業已見效。未能除根。照常服前藥。早晚各五分。癰瘕痛發時服

二錢。舌苔厚白。面色淡黃而暗。左脉沈細陽微。再與湯藥行溼

通陽。

雲茯苓塊

五錢 益智仁 錢半

草

薛 四錢 連皮

白蔻仁 一錢

生苡仁

五錢

半

夏

五錢

廣陳皮

二錢

桂

枝

二錢

白通草

一錢

廿二十九歲

乙酉年五月初一日

初九日

王氏四十歲

乙酉五月二十一日

服至舌苔退為度。

十年瘕氣六脉弦細而緊。

淡吳萸 三錢

烏藥 三錢

川椒炭 五錢

歸鬚 二錢

良薑 二錢炒黑

小茴香 五錢

煮三杯分三次服。已服五帖。

病減者減其製。每日服半帖。

六脉弦緊心下伏梁。非易化之症。一生憂泣。肝之鬱也。又當燥

金太乙天苻之年。金來尅木。痛愈甚矣。與溫絡法。其吐血亦絡

中寒也。

降香末 三錢

川椒炭 二錢

香附 三錢

半夏 三錢

枳實 三錢

歸 鬚 三錢

公丁香 八分

廣 皮 三錢

服四帖

諸症皆效。自覺氣上阻咽。加旋覆花五錢。

效不更方。再服。

加吳萸三錢。

癥結臍左。經來必痛。六脉沉細。陽微。

吳茱萸 三錢

川棟子 三錢

公丁香 一錢

良 薑 二錢

全當歸 三錢

降香末 三錢

小茴香 三錢

艾 炭 三錢

十 煮三杯。分三次服。服七帖後。接服丸藥。

業已見效。每日服半帖。再服十天。

二十五日

二十九日

六月初

二日

余氏三十歲

乙酉五月

二十四日

六月初

二日

廿二日

每行經前二日。腹微痛時。空心服化癥回生丹一丸。服至經盡後。腹中絲毫不痛為止。下月經行。腹痛發時。再如此服法。癥瘕痛亦服回生。空心服一丸。化淨為度。

鬚髮已白大半。臍左堅大如盤。隱隱微痛。不大便十數日。先延外科治之。外科謂腸癰。以大承氣下之。三四次終不通。延余診視。按之堅冷如石。面色青黃。脉短澀而遲。先尚能食。屢下之後。糜粥不進。不大便已四十九日。余曰。此癥也。金氣之所結也。以肝木抑鬱。又感秋金燥氣。邪中入裏。久而結成。愈久愈堅。非下不可。然寒下非其治也。以天台烏藥散二錢。加巴豆一分。薑湯

和服。設三服以待之。如不通。第二次加巴豆霜分半。再不通。第

乙酉年

三次加巴豆霜二分。服三次後始下黑亮球四十九枚。堅莫能破。繼以苦溫甘辛之法調理。漸次能食。又十五日不大便。余如前法。下至第二次而通。下黑亮球十五枚。雖亦堅結。然破之能碎。但燥極耳。外以香油熬川椒熨其堅處。內服芳香透絡月餘。化淨。於此證方知燥金之氣傷人如此。而溫下之法斷不容紊也。

治通廷尉久疝不愈。時六十八歲。先是通廷外任時。每發疝。醫者必用人葠。故留邪在久不得愈。至乙丑季夏。受涼復發。堅結肛門。坐臥不得。脹痛不可忍。汗如雨下。七日不大便。余曰。疝本寒邪。凡堅結牢固。皆屬金象。况現在勢甚危急。非溫下不可。亦

用天台烏藥散一錢。巴豆霜分許。下至三次始通。通後痛漸定。
調以倭硫黃丸。兼用金匱蜘蛛散。漸次化淨。

淮陰吳鞠通先生醫案

淋濁

便泄帶血既有膀胱之溼又有小腸之熱用導赤合四苓湯法。

猪苓 三錢

茯苓皮 五錢

萆薢 五錢

澤瀉 三錢

次生地 五錢

甘草梢 一錢

淡竹葉 二錢

木通 三錢

飛滑石 五錢

少腹痛於前方內加

川棟子 三錢 小茴香炭 三錢

濕土司天濕熱下注致成淋症莖腫。

萆薢 三錢

白通草 一錢

甘草梢 三錢

茯苓皮 五錢

王十七歲

十二月 初一日

郎五十六歲

滑石二錢
生苡仁五錢
車前子二錢
澤瀉三錢

蘆根三錢

於前方內加

黃柏炭三錢

龔五十八歲

先是大小便俱閉。自用大黃八錢。大便雖通而小便點滴全無。續用五苓仍不通。診其六脉弦緊。病因肝鬱而成。開陰絡法。

降香末三錢

歸鬚三錢

兩頭尖三錢

琥珀三分

丹皮三錢

冲韭白汁三匙全研

麝香五厘

一帖而通。二帖而暢。

小便淋濁。莖管痛不可忍。自用五苓八正。草薺分清飲等。滲濕。

普三十八歲

愈利愈痛。細詢病情。由房事不遂而成。余曰。溺管與精管異途。

此症當治精管為是。用虎杖散法。現無虎杖草。以杜牛膝代之。

杜牛膝 五錢
歸鬚 三錢
降香末 三錢
麝香 五厘

桃仁泥 三錢
兩頭尖 三錢
琥珀 六分
丹皮 三錢

一帖而痛減。五帖而痛止。七帖而濁淨。後以補經而愈。

血淋太多。先與導赤不應。繼以脉弦。細詢由怒鬱而起。轉方與

活肝絡。

新絳紗 三錢
蘇子霜 一錢
丹皮炭 五錢
旋覆花 三錢

桃仁 三錢
紅花 二錢
片薑黃 三錢
香附 三錢

歸鬚 三錢
鬱金 二錢
降香末 三錢

珍四十五歲

王四十五歲

王四十五歲

四帖而安。

小便狂血脉弦數。病因肝鬱。

新絳紗 三錢

細生地 五錢

青皮 二錢

旋覆花 三錢

丹皮炭 五錢

桃仁 三錢

降香木 三錢

香附 三錢

歸大鬚 三錢

服四帖而血止。止後兩月。又因生氣而發。仍與前方七帖

而愈。

范二十八歲

因怒鬱而大小便閉。與極苦而通小腸。借火腑通膽腑法。

黃芩 三錢

歸鬚 三錢

桃仁泥 三錢

胡黃連 三錢

龍膽草 三錢

廣鬱金 二錢

保女十八歲

二帖而大小皆通。

怒鬱少腹脹大如斗。小便點滴全無。已三日矣。急不可耐。仰臥

不能轉側起立。與開經絡。

降香末 三錢

香附米 三錢

廣鬱金 二錢

龍膽草 三錢

青皮 二錢

沖 韭白汁 三匙

歸鬚 三錢

琥珀 五分

兩頭興 三錢

麝香 五厘

一帖而通。二帖而暢。

夏日痘後受暑。小便不通。脉洪數。玉莖腫亮。蜷曲如勾。與涼利

膀胱。

白通草 錢半

蠶砂 三錢

滑石 六錢

雲苓皮 五錢

保五歲

藥四十五錢

葉四十五歲

乙酉年七月初一日

十四日

九月初三日

苡仁 五錢

杏仁 三錢

一帖而通。三帖而玉莖復元。

金實無聲。六脉俱弦。痰飲兼之。溼痺。小便白濁。先與行溼。

茯苓皮 五錢

川草薺 五錢

通艸 一錢

桂枝 五錢

防己 三錢

蠶砂 五錢

半夏 五錢

杏仁泥 四錢

生苡仁 五錢

甘草 一錢

滑石 六錢

服七帖。

復診加 猪苓 三錢

澤瀉 三錢

伏飲溼痺便濁。前與淡滲通陽。已服三十帖。因停藥二十餘日。

現在飲又上泛。胸滿短氣。腰酸淋濁未除。且與行心下之飲。脉

弦細陽不復。

薑半夏 五錢

杏仁 四錢

雲苓皮 五錢

廣陳皮 三錢

防己 四錢

桂枝 三錢

枳實 四錢

草薺 五錢

通草 錢半

晚蠶砂 三錢

服九帖。

去杏仁防己加薏苡五錢。又服三十餘帖。

痰飲痺症淋濁皆寒濕為病。誤與補陰以致溼邪膠痼沉着。急難清楚。前與開痺和胃。現今雖見效不少。究竟溼邪為患。陰柔之邪。久為呆補所困。難以旦夕奏功也。

桂枝 四錢

川草薺 五錢

澤瀉 三錢

薑半夏 六錢

滑石 六錢

雲苓皮 五錢

廣皮 五錢

蠶砂 三錢

十月二十五日

十一月十八日

車前子 三錢

枳實 三錢

猪苓 三錢

生苡仁 五錢

煮三杯。分三次服。

溼濁誤補久留。與開太陽闔陽明法。數十帖之多。雖見大效。究未清楚。小便仍間有濁時。腿仍未有酸痛。

薑半夏 一兩

桂枝 四錢

片薑黃 二錢

廣陳皮 五錢

通草 一錢

川草薢 五錢

晚蠶砂 三錢

川椒炭 三錢

生苡仁 五錢

防己 三錢

猪苓 三錢

小枳實 二錢

茯苓皮 五錢

痺症挾痰飲。小便濁。喉啞。先開上焦。後行中下之溼。餘有原案。

苦桔梗 五錢

甘草 三錢

杏仁 五錢

半夏 一兩

雲苓皮 五錢

生苡仁 五錢

喉啞服此。

備用方

桂枝 四錢

廣皮 三錢

生苡仁 五錢

雲苓皮 六錢

半夏 六錢

蠶砂 三錢

川草薺 五錢

車前子 四錢

滑石 一兩鹽水炒

川黃柏 三錢

便濁服此。

淮陰吳鞠通先生醫案

泄瀉

久泄脉弦自春令而來古謂之木泄侮其所勝也

柴胡 三錢

猪苓 三錢

生薑 五錢

薑半夏 五錢

炙甘草 二錢去核

大棗 三枚

澤瀉 三錢

廣陳皮 三錢

茯苓塊 五錢

桂枝 三錢

泄瀉已減前數加

蒼朮 三錢 前後共計服十三帖全愈

前曾木泄與小柴胡湯十三帖而愈向有糞後便紅乃小腸寒

溼之症現在脉雖弦而不勁且兼緩象大便復溏不必用柴胡

陶四十五歲

乙酉年四月十五日

十九日

五月初六日

湯矣。轉用黃土湯法。

黃土四兩 黃芩炭二錢 熟附子三錢連皮 茯苓塊五錢

炒蒼朮五錢 廣皮炭二錢

煮三杯。分三次服。

溼溫成五泄。先與行溼止泄。其糞後便紅。少停再擬。

猪苓五錢 蒼朮四錢 澤瀉五錢連皮 茯苓六錢

桂枝五錢 苡仁五錢 廣皮四錢 廣木香二錢

煮三杯。分三次服。以泄止為度。

胃不開。大便溏。小便不暢。脉弦。

猪苓三錢 白蔻仁二錢 澤瀉三錢 生苡仁五錢

六日

十八日

十二日

十五日

廿四日

四十五日

八月初六日

陸二十七歲

乙酉年五月十九日

二十八日

茯苓皮 五錢

廣皮 二錢

薑半夏 三錢

柴胡 一錢

煮三杯分三次服

六脉弦細。面色淡黃。泄則脾虛。少食則胃虛。中焦不能建立。安

望行經。議先與強土。

藿香梗 二錢 廣皮炭 錢半

廣木香 錢半

白蔻仁 一錢

雲苓塊 三錢 蘇梗 錢半

苡仁 二錢

薑半夏 三錢

益智仁 一錢

煮三杯分三次服七帖

右脉寬泛。緩也。胃口稍開。泄則加添。小便不通。加實脾利水。

猪苓 三錢

澤瀉 三錢

茯苓 五錢

苡仁 五錢

六月十八日

二十八日

王三十五歲

前方服十四帖。泄止。胃稍醒。腕中悶。舌苔滑。周身痺痛。六脉弦細而沈。先與和中。治痺在後。

桂枝 三錢

防己 三錢

益智仁 錢半

藿香梗 三錢

杏仁 三錢

苡仁 五錢

薑半夏 五錢

白蔻仁 二錢

廣皮 三錢

煮三杯。分三次服。

渴而小便後淋濁。此溼家渴也。况舌苔黑滑乎。議金匱渴者猪苓湯法。但前醫大劑地黃五味麥冬龜膠等。純柔粘膩。補陰封固日久。恐難速愈。戒猪肉介屬滑膩。

猪苓 六錢

草薢 六錢

澤瀉 五錢

初五日

渴而小便短。便後淋濁。與猪苓湯法。小便長而淋濁大減。渴止。舌黑苔退。惟肩背微有麻木痠楚之象。是臟腑之溼熱已行。而經絡之邪未化也。與經腑同治法。

生石膏

八錢連皮

雲苓塊

五錢

晚蠶砂

三錢

杏

仁

四錢

廣皮

錢半

通

草

一錢

防

己

二錢

萆

薢

四錢

生苡仁

四錢

桂

枝

三錢

黃柏炭

錢半