

幼  
子  
集  
成

陳飛霞道人輯

幼幼集成

英德堂藏版

序

余讀太史公書而歎越人之善乎方也  
邯鄲貴婦人則治婦人周賢老人則治  
老人秦人愛小兒亦即治小兒其施屢  
變然其所奏亦並效何哉蓋古者卜筮  
醫藥皆有專官世授其業不遷而為良  
苟能專其傳精其意通知其理而無所  
惑則婦孺老幼之各得其治吾以  
為雖不必越人可也後世專業既失凡

其治方術者又不能精而多通由此婦人丈夫之與小兒始各為科分而小兒之中又有所為疹者痘者驚風者瘡瘍者與夫他疾多端之分部莊子所云道為天下裂者非耶然世之為小兒醫者雖習其書用其方往往無所效豈其傳於古者法猶有未備而道或猶有所未至也乎嶺南陳君飛霞自少知醫以治小兒者多所乘誤而弊實中於驚風家

言不憚大聲疾呼以闢其謬乃取前代  
之說存其精要辨其是非訂為一書名  
之曰幼幼集成其間以搗字易鼈字標  
出誤搗類搗非搗三條既可使天下習  
驚風之教者廢然自返而又俾從書中  
所載病因證治循塗守轍以庶幾於動  
無不當投無不宜君之心勤而語懇如  
此此蓋欲舉天下之幼者扶持而安全  
之令一無夭折而後快也君學仙好道

瓢笠洒然吾聞道家者流以老氏為宗  
老氏言三寶其一曰慈夫慈之為道大  
矣固不獨幼幼然幼幼則所以為慈君  
本此意行之而將託是書以為嬰兒孺  
子之福豈非仁人長者所樂與哉乃因其  
請而為之序云

賜進士出身通奉大夫  
日講起居注官內閣學士兼禮部侍郎  
加二級西昌裘曰修謨

凡例

一幼科之書幾於汗牛其醫風之傳誠多謬誤喻嘉言陳遠公程鳳雛采已闢之指出病癥惜未申明病癥之由與治癥之法仍無著落不足服人予茲徹底揭破以傷寒病癥雜病致搐併竭絕脫證分爲三則以搐字槩之曰誤搐曰類搐曰非搐條分縷晰證治判然名目既正庶治療不惑周虛中曰開此三大法門可濟無窮矣

一幼科論證恐以陽有餘陰不足立說乖誤相承流禍千古後人誤以嬰兒爲一團陽火肆用寒涼傷脾敗胃古之初果家敷龐貽害猶淺今非昔比怯弱者衆古方今病每多虛羸是故聊爲刪訂非敢輕前人而執已見蓋亦因時制宜之用也

一胎嬰柔嫩之姿乍離母腹如水上風前燭防護稍疎立見  
疽癰而幼科所用毒劣之方令其暗損真元陰陽傷藥衛即僥  
倖得生而精神已耗一生虛怯莫可補救況復不生者多茲  
於劫奪之方毒劣之味槩行刪去而易以反正逆從之治無  
辜赤子或可免含冤於九地

顛顛肇於東漢衛沈而成於宋人錢仲陽其能用仲景增黃  
湯治賦票不足以七味白朮散治鴻利作湯豈不卓然有見  
追門人某隱其名假托其名輒用霸方劫奪致人夭枉遂致  
貽譏後世茲爲用其所長去其所短非敢好爲節略嘗所以  
成仲陽之初志

一幼科惟從驚風暮凝而傷寒門類疾遺棄醫學者但知有

驚風不知有傷寒毫草里晝勝言獨程鳳翔能見及此  
茲併纂入以備酌用

一痘疹爲幼科切要諸家多不經意或另立一門學人以爲源  
流各別不復留意討論今併纂入使知痘實幼科本有不敢  
不經心體察

一痘科之書如馮氏陳氏董氏翟氏萬氏雖皆不爲無見而實  
繁簡不侔又惟萬氏明顯可以齊急惜原板燬於明末康熙  
二年復梓者則亥豕盈篇譽病過半詩歌黏韻全在證論先  
後重複識者鄙之至甚惜焉因爲詳悉刪擗纂入以成全璧  
一火功爲幼科第二要務濟急無捷於此奈從前所傳悉犯陽  
門逐陰之戒不惟無濟而又有害令以異授神火繪圖作歌

公諸同志急道之濟可以回春填刻

一治療自有正方其未盡者復以經驗簡方併納之法附於旁  
後病有起死回生之訣若能留心記覽隨宜酌用其利無窮  
一是書不但爲知醫者設卽不知醫者亦能用之蓋理路通暢  
用方簡切並無幽渺難明之說家置一冊可以對證調治自  
利利人不無小補

一是書雖云編輯而幼科家言又未盡信以爲確其理明義  
暢石裡實用者取之浮泛不妨者去之間有未妥之處節取  
以鄙見併察所經驗者成全之故難分某段爲尙今之言非  
敢掩人之功爲已有也蓋幼科非方脈之比以其病因殊甚  
莫能定人一七下咽腫生立判故不敢不爲詳述是書對

志取頗爲得宜

一星書文義荒疎由丁幼時未嘗學而祇以舞弄美札不以奉  
視所以忘其固陋矣禁革意旨之語雖不倫理改非訛  
明府幸毋以是見薄原其忠愛之心而賜之規正是亦鑒  
之幸也

復正再識

雖不倫理改非訛

集成小引

稽目三墳啓秘神聖迭興本草內經昭垂星日蓋聖人繼天立極位育爲功念天地之明陰陽代謝運氣推遷至之先後已無成規應之早遲靡有定律其閒六淫勝復醞爲宏微哀此蒼黎能無因是而夭折者此岐演十世之傳帝啟九章之間而有醫民之厚也伏讀竇帝之謂岐伯自至哉聖人之道天地大化非夫子孰能通之請藏之靈龜之室非爲戒不敢示夫聖如軒皇而於醫事宗尚若此豈非痼疾一體胞與爲懷欲盡萬物斯人於仁壽者歟素問而下如伊尹湯液皇甫謐甲乙秦越人問難張仲景金匱王叔和脉經陶弘景射後此數公者雖曰祖述實以

作爲述首而徑醫事家之著作者代不乏人求其無  
偏無取實難多覩惟明末李時珍張景岳喻嘉言遁出闕  
明金匱發洩內經補無移而返清純有功於醫事者不小  
然數人雖產明代而其書始盛行於康熙初年大爲世用

蓋由

聖天子臨御德孚中外仁協萬方近纂皇金鑑遍周海宇將  
見民無疵痼物遂生成故預旌明良以勳位育之功非偶  
然矣惟幼科一門不無遺憾雖症言微啟其端而其言未  
竟示每讀醫風之書未嘗不三歎而流涕也予幼慕少  
病於醫家色脈之要頗嘗究心長際仙師授金鼎外仔細  
命之秘嗣是遨遊海上耽吟賦詩偶竹杖芒鞋行踪幾半生

內凡紳衿士庶名公鉅卿以及士販至微者喜嘗造錄而  
方便之其臨證救治之多有悲

集者所能醫弟念驚風之

說在在訛傳莫獲辭而止之坐使無事與症枉受貽悞前

後相仍迄無底止茲將驚風之論

既爲刪訂而附以一得

之愚自稟元胎元火功脉爻以及確證時痘湯火瘡瘍瘍

不周備彙爲六卷計數十萬言

散存梓編即幼幼集成

其中診治權衡一道經高問惑

未暇取石當於理無害

於人而後已非敢妄議則人或止

一隅之見第念保赤誠

求不中不遠此書不無當之局勿狃慘而固不解狂

瞽皇政

大方是曰并海幾立言篤朴而無

古聖仁民愛物之心欲自茲養此之烟雲爾

肖維

大清乾隆十五年歲次庚午春月鑄印復正飛霞良書於  
遂陽之種蒼堂



婦幼集成總目

第一卷目錄

序

幼幼集成序

集成小引

凡例

總目

賦累

護胎

指紋晰義圖附

三關部候歌

浮沉表裏歌

紅紫辨寒熱歌

燄滯定虛實歌

紋形主病歌

小兒脈法

四脈主病

總括脈歌

脈證寃歌

保產論

難產七因

產要

附嘔氣脫案

小產論

集成三合保胎丸

附論

保產方

附簡方

熟料五積散

附論

初延救護

調焗

臍風證論

用火口訣

集成神火圖

集成神人歌

用火宜忌

附夏氏臍風火圖

回生艾火

臍風諸方

初生護持

勿輕服藥

附馮楚瞻論

藥餌之誤

看病訣

壽天辨

面部圖

面部形色賦 分註附

審形色苗駁

問切辨證

五臟所屬之證

變裁辨附景岳說

第二卷目錄

胎病論

集成亢瀆冊 附論

六味地黃湯

附論

驚風圖

喻言論四段  
集成卷三段

錄諸家驚風論

辨註附

辨明致妄之由

易六醫掌

新立誤搐類搐非搐分門辨證

誤搐二條

論併方附周虛中先生  
太陽血虛筋急治案二

類搐十條

論併方附

非搐二條

論併方附

附小兒時疫證治

癆疾證治

集成定癆九附論

幼科預宜修製應用丸藥七方

孔子傷寒證治

小兒傷寒類治

傷風證治

傷暑證治

傷溼證治

霍亂證治

第三卷目錄

咳嗽證治

百啐嗽論附案

哮喘證治

諸症類治附方

嘔吐證治

泄瀉證治

傷食類治方附

食積證治

發熱證治

神奇外治法九條

治病至要口訣二段

痢疾證治

集成至聖丹論

瘧疾證治

消渴證治

諸血證治

第四卷目錄

腫滿證治

脹滿證治

黃疸證治

腹痛證治

癰積證治

蟲癰證治

諸汗證治

疝氣證治

啼哭證治

夜啼證治

二便證治

小便證治

大便證治

頭頸證治

眼目證治

耳病證治

蟲病證治

口病證治

舌病證治

齒病證治

咽喉證治

龜胸證治

鶴膝證治

五轉五轉

丹毒證治

水痘露丹

破傷風證

癰瘍癰瘍

諸瘡證治

瘻瘍證治

梅毒證治附案

湯火諸方

第五卷目錄

痘疹大元賦二十三段

痘疹西江月四十九首

痘疹順陰逆五善七惡

痘疹總略歌一十一首

發熱證治歌二十五首二十六方

見形證治歌一十八首十八方

起發證治歌二十六首共五十方

## 第六卷目錄

成實證治歌二十一首二十六方

燭醫證治歌一十六首一十六方

落疝證治歌五首三方

餘毒證治歌三十一首四十六方

婦女痘證治歌一十三首十一方麻疹骨龍賦四段

升證西江月二十首

麻疹證治歌

後跋

鼎鑄幼幼集成卷之一

羅浮陳復正飛民

輯訂

盧陵劉勸家義

校正

遂陽周宗頤盧中氏

叅定

○賦稟

金谿周光霽頤堂

重校

夫大之生也。秉兩大以成。名諸陰陽而賦命。是故頭圓象天。足方象地。五行運於內。一曜明於外。乃至精神魂魄。知覺靈明。何者。非陰陽之造就。與氣化相盛衰。然天地之氣化。有古今。斯賦稟由之分厚薄。上古元氣渾龍。太和洋溢。八風正而寒暑調。六氣匀而雨暘。若人情敦茂。物類昌明。當是之時。有情無情。悉歸於厚。非物之厚。由氣厚也。及開闢既久。人物繁極。

發洩過傷。天元雕殘太樸。世風漸下。人性澆漓。故水旱  
有不時之擾。流火有比戶之侵。生物不審。民用日促。值此之  
際。有知無知咸歸於薄。非物之薄。由氣薄也。然則今之受氣  
於父母者。其不能不薄也可知矣。况有膏藜異養。貴賤殊形。  
醫術稱仁。顧可視為不經之務。夫膏梁者。形慙氣散。心蕩神  
浮。日厭甘肥。身安華屋。唯養過厚。體質嬌柔。而且珠翠盈前。  
嬈妍列侍。縱能寧之。豈難桂柏以安人。復有癡明負起。利  
令志昏者。有雪案螢牕。列心噴血者。有檠陳貲。握筭持籌。  
不覺形衰氣匱者。有志高命蹇。妄營錯營。以致心倦神疲者。  
凡此耗本傷元。胚胎之植。安保其深根固蒂也。乃若藜藿之  
家。形勞志逸。願足心安。守益廩瓶。對升釵裙。乃其神志

無傷。受得胎體自固。以此較彼得失。判然矣。若夫怒傷元氣。  
勞役形骸。迅雷烈風。嚴寒酷暑。日月薄蝕。病體初安。醉飽傷  
神。落紅未淨。胎孕之由斯愈薄。實又成於人所不覺者。故今  
之稟受。十有九虛。究其所因。多半率由於是。業斯道者。當知  
氣化厚薄。人事澆醇。因以察其胎元之受於父時者之盛衰。  
堅脆。庶幾近焉。若但以上古成方。而沿今時薄弱膠丸鼓瑟。  
究歸無當。泥而不通。未可以言達於理也。

○護胎

易曰。天地氤氳。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。蓋天地生生之  
道終。古爲然矣。顧顓經曰。成胎之後。一月爲胞胎。精氣凝也。  
二月爲胎形。始成胚也。三月陽神爲三魂。四月陰靈爲七魄。

五月應五行分五臟也。六月應六律定六腑也。七月精開竅  
通光明也。八月元神具降真靈也。九月宮室羅布以禦外侮。  
十月受氣足萬象成也。此胎元長養造化自然非人力也。第  
姪母臟氣護胎仍若四時之有序。足厥陰肝足少陽膽屬木  
主春養胎在一月二月。手心主包絡手少陽三焦屬火旺夏  
養胎在三月四月。足太陰脾足陽明胃屬土旺長夏養胎在  
五月六月。手太陰肺手陽明大腸屬金旺秋養胎在七月八  
月足少陰腎屬水旺冬養胎在九月至十月。兒氣已足待時  
而生。惟手少陰心君主之官神明之臟雖不育月而無月不  
在其胎。長養臟氣茂持可謂至矣。而人事恣縱敗壞能保  
其衝任有恒乎。蓋德錄曰。世人無不急於生子。要知生子之

道精氣變成胎故少欲之人恒多子且易育氣固而  
精凝也多慾之人常艱子且易夭氣洩而精薄也譬之釀酒  
然斗米下斗水則釀酸且耐久其質全也斗米倍下水則淡  
三倍四倍則酒非酒水非水矣甚其元少也今人夜夜淫縱  
精氣妄洩邪火上升真陽益精安能成胎則傷脾生子又安  
能必其有成所以年少生子者或多羸弱慾勤而精薄也老  
年生子者反見強盛慾少而精全也且凡嗜於飲者酒亂其  
性精半莊無非溼熱勤於慾者孕後不節溢洩母陰耗其  
胎氣所謂恣縱收壞者殆以是歟然父天母地古人嘗言之  
亥父主陽施猶天雨露母主陰受若地資生胎成之後陽精  
之凝尤仗陰氣護養故胎與母在腹與母同呼吸共安危而母

之餓飽勞逸喜怒，飲食寒溫起居憚肆莫不相爲休戚。  
古人胎教今實難言，但願妊娠之母能節飲食，適寒暑，戒嗔  
恚，嗜慾則善矣。此尤切於胞胎之急務。幸毋視爲沉常而  
忽之。

○指紋晰義

幼科指紋總無正論，且游移不定，莫可稽駁。有謂不必用者，有  
用而至於怪誕不經誣民惑世者，是皆未明紋中之理。所以  
有用、不用之殊議，請以一得之愚，聊發其要。蓋此指紋與寸  
腳，同一脈也。按內經十一經絡，始於手太陰（即肺）其支者，  
從腕後出少指之端，而交於手陽明。支者，謂旁支也。從手腕後出食指之端，而交通  
榮，南於手陽明也。此指又是也。明大腸之經，自此指出。

浮經不知手太陰經起於中府而終於大拇指商陽而  
經起於食指之商陽而不相值若無此旁支交連繆衡不無  
令太陰陽明表裏斷絕乎况此脈可診人所不知其通於太陰也  
促與太淵一毫無異但脈體差小由旁支也指紋之法起於  
宋人錢仲陽以食指分爲三關黃曰風關卯曰氣關辰曰命  
關其訣謂風輕氣重命危雖未必其言恐驗而其義可取蓋  
位則自下而上邪則自淺而深證則自靜而動人皆可信祇  
恨復出說異之說謬擇驚風門類致後賢多岐亡羊反成逐  
案予意仲陽宋之明人以芋見稱豈嘗爲此誤世大抵後之  
俗子假托其名而爲之者惟有識者知其語言鄙俚論譏荒  
廢領能棄置不用如張景岳夏禹齋皆謂可不必用詳

不用實驗妄誕不經而無可用耳近世醫家不知真僞不  
辨是非習而行之乃致惑世誣民禍害嬰幼夫醫事動關生  
命乃聽無稽之言流傳貽殃是豈其可予雖不敢苟失經脈  
每覓幼科指紋之說不勝憂懼欲爲規正恨非其人知而不  
言此心未慊今幸餘閒請言其要蓋此指紋卽太淵脈之旁  
支也則紋之變易亦卽太淵之變易不必另立說眩心  
目但當以浮沉分表裏五指辨寒熱淡滯定虛實則用之不  
盡矣倘舍此不圖妄執僞說以爲是臨證不察病源認指爲  
人驚者驚誰惑愚昧乎恐盲人駕馬終墮重淵莫之能出  
周虛中曰指紋晰義之精自仲陽以來七百餘年無人道及  
讀至此如夢初覺如醉初醒足以快人神智真子言特識也

蓋世人乍聞此言未能深信姑就其舛謬之偏障其大要以正之其略曰指上辨青紋認是四足驚虎口脈青色是猪大馬驚黑色因水樸赤色火人驚紫色多成鴉黃即是雷驚又曰青驚者是猪黃卽脾端青色大小畊人驚辨四足云凡此等之言斷非錢氏所出實齊東野語妄君子不屑刊於齒頰者然不明指其非人或以予言不實舉驗其最無理者以博一笑其曰指上辨青紋認是四足驚虎口脈青色是猪大馬驚黑色因水樸赤色火人驚紫色多成鴉黃即是雷驚是指紋之青赤黑黃皆驚之所致然則小兒之賦累而胎元寒熱以及內傷外感難證麻痘數百之證悉當以驚風稱之以驚風治之矣不然除去青黃赤黑之紋又將何者辨

其卦驚風平謬誤之傳莫此爲最既云黃即四脚端是謂指紋裏色脾土受傷不足之證又曰黃即是驚驚似謂即驚有餘之候假令小兒指紋見黃不知此時應斷爲脾虛乎抑應斷爲胃驚乎治之者不知應治脾乎應治其胃乎或將合一爲治乎抑亦分晰其方乎且脾因爲虛而驚爲實治虛遺實治實礙虛兼治不能分治不可乎亦莫知何所適從乎至謂青色大小曲人驚也四足夫人與四足靈蠢天淵清濁冰炭氣化純雜不侔斷無益列之理今既曰人驚並四足矣則是臨證時凡指紋青者謂之人驚等也卽謂之四足驚亦可也是人與四足竟可以通補而四足與人不幾同類耶卽以紋曲之本小別之原其意必謂大曲爲人驚小曲四足

驚者安知人驚不爲小曲奇驚不爲大曲乎何所據而確知其人驚之曲必應大笛驚之曲必應小設使大曲之中仍有小曲小曲之旁兼見大曲得無由此人驚謂之笛驚者驚之入驚耶無稽之談不堪寓目再究其治療更無是處若謂人驚者當總爲一驚不必論證不須要沾則今之分大分小指人指奇者得非譖妄乎若謂人驚者當爲一驚亦可同論正不知人驚爲何病奇驚爲何證宜以何物治人驚何物治四足驚既有已上之驚名應立已上之證治何以並無一法而徒設此無稽虛言以誑俗在庸妄固不足責而立言謂公不之規正反爲編次於書過悞後世吾恐有目者未必不爲之啞裂也

再曰舌醫曰是疳舌醫謂已前諸說不必增贅至於自是而誠爲妄誕大疳證卽方脈之虛勞在幼稚謂之疳積本脚腎兩傷之候久之五臟俱損中氣敗極則面目肌膚俱見見白形如枯骨之象故曰白是疳此以形色言也今以指紋當之謬之甚矣蓋氣血兩傷精神久虧之證其紋必淡凡虛證皆然不特疳證已也然止可言其色淡不可謂之色白蓋指上從無白徵予臨證四十餘載未嘗一遇後人勿謂古人之言一定不易必俟其指紋白色始可稱之爲疳若然則疳證之兒無幸矣故知按圖索驥終非解人神而明之始稱匠手指紋辨證詳列於左

○指紋切要

小兒自彌月而至於三歲猶未可以診切非無脈可診蓋診之難而虛實不易定也小兒初怯生人初見不無啼叫呼吸先亂神志倉忙而遲數大小已失本來之象矣診之何益不若以指紋之可見者與面色病候相印證此亦醫中望切兩兼之意也

指

三關紋圖



補註脉圖卷之三  
附註三關圖說

辰卯酉

李商隱太陰經此

令人抱兒對立於向光之處以左手握兒食指以我右手拇指推兒三關察其形色細心體認亦惟辨其表裏寒熱虛實足之矣世人好異不從實地用功以此爲淺近之談不屑留意

不知臨證能辨此六者便爲至高之手蓋表裏清則知病之  
在經在府而汗下無悞矣熱明則知用寒遠熱用熱遠寒或  
寒因寒用熱因熱用因事制宜用無不當虛實辨則知大虛  
有盛候大實有羸狀不爲假證眩惑凡真虛真實易知假虛  
假實難辨真假既明則無虛虛實實之患於此切要關頭不知體會但以不經之言欺世誑俗謂何者爲人驚何者爲奇  
驚不特欺人而且自欺不特無益治療而且誤入生命是誰  
之咎哉

○三關部位歌

部位未可以定輕重安危由古有三關之說姑有之耳

初起風關證未央氣關紋現急須防乍臨命位誠危急射甲通  
關病勢彰見風關爲病邪初入之象證尚輕微體亦未固治之誠易○紋現氣關邪氣正盛病已沉重治之

宜速。倘三關通度紋出命關則邪氣游漫充塞經絡爲手重之候設透關射甲則邪氣無所容高而不能降爲亢龍有悔之象治之者切宜留心慎毋輕視

○浮沉分表裏歌

指紋何故乍然浮邪在皮膚未足愁勝理不通名表證急行疏解汗之投此紋與太淵脈相通凡有外邪入淵脈浮此紋亦浮邪在皮毛腠理之間故指紋亦顯露於外謂之表證速宜疏解其皮毛開其腠理使邪隨微汗而解一七成功何嫌而不投哉

忽爾關紋漸漸沉已知人裏病力深莫將風寒輕相試須向陽明裏證指紋見沉知邪入裏但有淺深之別若往來寒熱不已指紋極沉已入陽明胃火速宜攻下虛妄見其身熱憎以風藥治之蓋病在內治其外非其治也不特病邪不服適足以增其困耳

○紅紫辨寒熱歌

身安定見紅黃色紅艷多從寒裏得淡紅隱隱本虛寒莫將深

紅化爲

正神氣泰寧榮衛靜謐定見大平景象蓋黃爲中和之氣紅乃文明之色紅黃隱隱景物既已焉有不和

安之理○寒邪初入皮毛經絡乍滯所以紋見紅鮮由血赤也無論內寒外寒初病久病一見此紋總皆寒證○凡人中氣怯弱榮衛不充痏必淡望淡而兼紅虛寒之應○至謂深紅化爲其理安在紅木寒因豈能化熱由其寒閉皮毛腠理不通蓋人身內臟之氣時與皮毛之氣相通貫無一息之暫停今寒閉汗孔內出之氣無所洩越於毛皮之間漸積漸厚而化爲熱矣此內出之氣爲執井外受之寒能變熱也

關紋見紫丸之徵青色爲風言所稱傷食紫青瘀氣逆三關青

黑禍在胸

榮行脈中衛行脈外熱壅經絡阻其陰榮之道所

黑禍在腹

榮行脈中衛行脈外熱壅經絡阻其陰榮之道所

本青肝膽受邪紋見青色此傷風候也但可以風熱稍之不

可稱驚風以悞世大考者木之色內經有在天爲風在地爲

木之言所以風木同氣肝受風邪致必見青此理最明最顯

而幼科偏不言青爲風偏言青爲熱據幼科所論驚出於心

然青非心之色何以青爲乎第此等牽強之說最爲謬誤予有驚風闢妄詳列二卷○紫而兼青食傷之候蓋飲食有形

之物阻抑中焦壅遏脾氣不能宣布故屬木乘其函而陽之  
所以痰氣上逆也疏通壅滯令其流利可也○山翁曰久  
脾氣愈不運榮衛俞見濡則風疾食娛固縮中焦所以青而  
兼黑此抑制之至也○自以下庶有生識誤驚風百無一收

灸治定虛實歌

指紋淡亦堪 問 爲先天賦稟脾胃本虛中氣弱切防攻

伐損胎嬰

小兒緊受陽虛肌膚見白唇舌淡色者指紋曰暗  
寒淡青虛風淡紫虛熱此等之兒根本不堅中氣怯弱無論  
新病久病總歸於虛一毫攻伐不敢輕用倘誤投刃覆水

雖收解  
之遲矣

關絡濶滯甚因由邪退陰榮衛氣飲食少無加不行推

蕩更何求

病邪阻鬱榮衛不行運滯升降焉所以精神推  
之轉滿全無活陰流利之象由食飲風熱相搏提  
爲實證急宜推瀉去其勢革其愈亦易  
若三關純黑惟之不動死證也不治

○絞形主病歌

腹脣紋入掌中心轉內屈寒大第侵紋向外營於食指水移

肺兩傷

會掌心包絡所主按入掌中則侵內臟由中氣乘也故爲腹痛○紋若赤青內外有別其效之兩頭青也

向中指爲內爲順逆爲外感風寒治之應易其效否人指

臂內爲逆認爲內傷飲食治之猶難○形如水字脾肺不延

食塞太陰中氣怯弱脾不運化故也或問指破惟止一線安

能有水字之形曰不觀太淵之脈亦止一線安

陽蹻陰蹻皆左右彈石豈非水字之形乎脈有左右安知

枝無左右但能觸頸旁通無在非理豈特指腋爲然哉

凡看指紋以我之大拇指側面推兒食指三關切不可覆指而推蓋螺紋有火就制肺金紋必變色又只可從命關推上風關切不可從風關推出命關此紋愈推愈出其紋在先原未透闕今疾堆而出之歟肺氣積之戒之

以上表裏寒熱虛實繫有據但能於臨證時認得此二字分明胸中自有主宰雖不中不遠至善但以醫證寒熱雖無

對第辰鐘首問未免懷懶凡我同人互爲研礪矣

小兒脈法

小兒二五歲可以診視趺坐腕短促三部莫分惟以一指候之誠非易易內經診視小兒以大小緩急四脈爲準不避僭越體其意竟易爲乎遲數而以有力無力定其虛實似比大小緩急更爲明悉後督其體認之

○內經脈要

華言孔子而病熱脈懸小者何

如孔子病熱脈見懸小者

小而緩者利之微其愈易小而緩者邪之甚爲可慮故以爲門岐伯曰手足溫則生寒則死夫小兒以陽之休而加疾熱脈不當小若脈休離小手足溫者以四肢爲諸陽之本陽猶在也苦四肢寒冷者則邪勝其正元陽去矣故曰死也

帝曰乳子中風喘鳴肩息者脈何如岐伯曰喘鳴肩息者脈  
實大也緩則生急則死此言小兒之外感也風熱中於陽分則胃氣存邪氣退故生實而急則真氣見病日進則死也此內經之旨聖人立言簡切而總括無餘世人不悟視爲沉常能於此等處看取則診視之要思過半矣之歸證診視每論言凶而多中者亦不外此第意之所至口莫能宣寫詳經所謂大小緩急者亦發而不露之意蓋大即浮洪類也小即沉細類也急即數也緩即遲也何若竟易以浮沉遲數之爲得于再以節補之有力無力辨其表裏虛實誠診視小兒天然不易之妙訣大節者力常人而能以有力無力辨其陰陽表裏寒熱虛實雖至顯淺至平易却至確當孰謂古今人不相及耶

○四脈主病

浮脈主表

病在外

沉脈主裏

病在內

遲脈主藏

病爲寒

數脈主病

病爲熱

五至四至爲遲

五至爲緩

有外寒，內遲，無力，虛寒。

有力，實寒，無力，虛熱。

六至七至爲數

六至爲急

有力，實熱，無力，虛熱。

有力，實熱，無力，虛熱。

○王證

浮而有力爲熱

無力陰虛

沉而有力爲食

無力氣滿

遲而有力爲痛

無力虛寒

數而有力爲實

無力瘡瘍

○總括脈要歌

太淵一指定安危

六至中和五至衝

七八執多三四冷浮沉遲

數音詳推

有力爲陽爲實熱

虛寒無力裏疴疑

若能留意於

中取可致亡洋泣遠岐

浮而有力實兼風

無力陰虛汗雨蒙

表之虛也

有力而沉痰食害

結於裏也

沉沉無力氣凝拘

氣滯於中不運化也

遲而有力多爲痛

浮遲外痛

無力虛寒氣血窮

氣弱血衰至虛之候

數脈熱多終有力

數而有力

瘡病無力熱虛岐

陰白受傷虛熱所致

○脈證宣忌歌

脈浮身熱汗之多

陽邪居表而從汗解

沉細身涼莫強攻

無論表裏不堪攻伐

咳嗽正嫌浮帶數

浮為宜浮數大忌

細沉腫脹定知生

脾胃虛寒水氣不運化

沉遲下痢方爲

最嫌洪數

洪大偏宜痘疹逢

陰陽充足毒不能留

腹痛不堪浮右有

火三陰受病浮則反常

浮洪吐衄總無功

陽火太盛陰血氣傷

陶節庵曰診脈之要

無論浮沉遲數但於有力無力中分有

力者爲陽爲實爲熱無力者爲陰爲虛爲寒至哉斯言也後  
醫無忽

○保產論

生產一道天地自然之理不待勉強而無難者也然今之世往往以難產間者得無以人事之失而損其天耶保產之術可不詳乎世風不古胎教久廢爲母者既不能保於平時而徒臨產措置猶覺其遲謹將難產之由詳列於左庶知預爲調攝也

○難產七因

一因安逸蓋婦人懷胎血以養之氣以護之宜常時微勞令氣血周流胞胎活動如久坐久臥以致氣不運行血不流通胎

亦沉滯不活動故令難產常見田野勞苦之婦忽然途中腹痛立便生產可知

二因奉養蓋胎之肥瘦氣通於母母之所嗜胎之所養如恣養厚味不知減節故致胎肥而難產常見藜藿之家容易生產可知

三因淫慾古者婦人懷孕卽居側室與夫異寢以淫慾最所當禁蓋胎在胞中全賴氣血育養靜則神藏若情慾一動必擾於中血氣沸騰三月已前犯之則易動胎小產三月已後犯之一則胞衣太厚而難產一則胎元漏洩子多胞白而不善且不觀之物乎人與物均稟血氣以生然人之生子不能胎胎順個個存而牛馬犬豕胎胎俱易個個無損何也蓋牛馬

大家一受胎後則牝牡絕不相交而人受孕不能禁絕知有  
縱而無度者乎

四因憂疑令人求子之心雖切保胎之計甚疎或問卜禱神或  
聞道有產變者常懷憂懼心懸意怯因之產亦艱難

五因軟怯如少婦初產神氣怯弱子戶未舒更腰曲不伸展轉  
傾側兒不得出又中年婦人生育既多氣虛血少產亦艱難

六因倉皇

有等愚魯信迷不審正產弄產但見腹痛遽令努力

產婦無主只得聽從以致橫生倒生子母不保

七因虛乏孕婦當產時兒未欲生用力太早及兒欲出母力已  
乏令兒停住因而產戶乾澇產亦艱難惟大補氣血助之也可

○產要

產婦臨盆必須聽其自然勿宜催逼妄其神志勿使驚懼直待  
瓜熟蒂圓自當落矣所以凡用穩婆必擇老成忠厚者預先  
囑之及至臨盆務令從容鎮靜不得用法催逼嘗有穩婆  
忙冗性急者恐顧此失彼強勉試湯分之指之逼之使下多  
致頭身未順而手足先出或橫或倒爲害不小故未有駕陣  
不可令其動手切記要緊又嘗見奸詭之婦故爲哼許之聲  
或輕事報重以顯已能以圖酬謝因致產婦驚疑害无非細  
極當慎也

孕婦將產不可占卜問神如巫覡之徒噓嚇謀利妄言吉凶  
產婦聞之倍生疑惑因令氣血結滯多致難產所宜戒也  
懷孕六七個月或八九個月偶略曲身胎忽亂動三日間或

痛或止或有水下惟腰不甚痛胎未離經名曰弄產又有臨產一月前忽然腰痛却又不產此是轉胞名曰試月胞水有無俱不妨但宜直身坐臥行立自然無事又有伸手高處取物忽然子鳴腹中但令鞠躬片時即安

臨產陣痛有二三日有五七日者原非正產驚動卒子未出胞非難產也但聽其坐臥任意不得扶坐努力而令其夢疑氣餒惟勸其飲食以藥餌滋補之

臨產有七候臍腹急痛腰間重墜眼中出火黃門逆急瘡腫癟手中指筋脈跳動胞水或血俱下方是子出胞時始可用力如數證未備卽一二日切不可使其督掙又有胞水已下兒頭已至產門三四日仍不下者因母氣先餒此時惟人參

爲專功力不能若大劑八珍湯補其元氣調其飲食時至臨產婦飲食減少最爲可慮則宜以獨參湯常服不可使其精力衰乏若委骨不開由血氣衰不能運達宜十全大補助之自開加味育歸湯亦可

臨產時驚動太早血先下而胎元乾涸殼在腹中不必驚惶惟令產母上牀穩臥切勿用力督掙徒傷神氣第宜勉進飲食勿令氣乏子治極多十可全十惟以脫花煎加芒硝三五錢水煎熱服其胎化水而不矣古方以平胃散加芒硝下死胎下胞衣功雖最捷而暗中有損子見數人用此者胞胎雖下而產婦過一二年皆死無一免者大都平胃散克伐胃氣而芒硝鹹寒傷血所以臟腑暗中受損今易用脫花煎藥味甘

溫而歸。育生血活血肉桂暖血。更加附子一二錢。雖芒硝之  
寒不能爲害矣。此等之事。非臨證久者。莫知其弊也。予嘗治  
一少婦。年二十四。原係初產。純由慌忙急促。產不如法。乃至  
久不能下延。予至而胎已死矣。問產婦臍內動否。曰不動。小  
腹陰冷。知其胎死無疑。欲用前藥。慮其初產門戶未舒。因與  
主家商酌。肯聽予言。則萬無一失。今死胎僵硬。以藥下之恐  
交骨未開。必損其母。莫若以十全大補。倍參桂。一以扶產母  
精力。二可以緩其下元。使胎自爛。始能保全無恙。產家以予  
言爲是。依此行之。以十全大補倍參桂服一劑。後腹中溫。緩  
不痛。不急。子曰得之矣。所慮者腹痛作墜。今不痛不墜。可以  
耐之。更幸。產婦年力本強。脾胃素健。每食乾飯三孟。肥雞牛

隻予見更喜以其中氣不衰自堪承任仍每日如是調理至  
五日而死胎自下糜爛臭穢不堪產母精神如舊毫無傷損  
可見死胎不忙不亂尚能保全况生胎乎第人不肯安靜必  
欲強爲奈之何哉

產時子有出戶之勢轉身差緩母力一逼或手或足或橫或倒  
又有生路未順兒頭偏柱柱左右腿畔名曰偏產又有兒頭偏  
柱柱設直名曰棖後此等數言穩婆精巧者則不須服藥若穩  
婆無用者急扶產母上牀正身仰臥厚被覆之令老成穩婆  
徐徐往上推之內服補中益氣湯升提之須臾提上重新轉  
身兒頭已對產門急扶即下

產時門戶俱正兒已露頂而不下此轉身時脣帶絆其肩也扶

母正身仰臥輕輕推兒向上以手指輕按兒肩去其臍帶然後用力送下

胎衣來遲氣虛弱也急取脫花前碧血流入衣中服悶疼痛脫花前加芒硝下之或有能事者以手循臍帶而上以中指頂其衣脣覆衣中之血從容俟之亦可此良法也

產時用力太早水衣先破被風所吹產戶腫脹乾澀狹小者以紫蘇煎湯重洗以香油和蜜潤之從容俟之無不下者

產時腸先出用淨盆盛溫水少入香油養潤待兒與胞衣下時母略仰臥自己吸氣上升穩妥以香油塗手徐徐送入或濃前黃芪湯浸之內服補中益氣湯卽上又有兒併胞衣下後膀胱壅出產戶首用前法送入仍服補中益氣湯若穩妥不

謹膀胱扯破者八珍湯加豬肝爲引服之可復

矣

產畢產門不閉血氣大虛十全大補湯若因胎大而擦傷產門

者斷艾益母草煎湯洗之

產時胞胎既下氣血俱去忽爾眼黑頭眩神昏口禁昏不知人  
古人多云惡露乘虛上攻故致血暈不知此證有二一曰血  
暈一曰氣脫若以氣脫作血暈而用辛香逐血化瘀之劑則  
立刻斃矣不可不慎

一氣脫證產時血既大下則血去氣亦去故昏暈不省微虛者  
少刻卽死大虛者竭脫卽死但察其面目如眼閉口開手撒  
手冷六脉微細之甚或浮而散亂此卽氣脫證也速用人參  
多則五七錢少則三三錢加入炒米煨葛紅棗煎湯徐徐灌

之但得下咽即可救活若延則無及矣無力備參者以

大劑當歸補血湯加炒薑紫草紅棗煎湯灌下亦能救之

○附氣脫案

州左遂陽高君夫人梁氏嘗梁之賢質最怯產育多  
戊午分娩未見過難產下精神猶健至翁不以爲意與閑  
話中庭殊因一時下血過多忽倒仆於地急視之則口張  
手散面唇俱黑薄吸已寂然矣幸人參有便前之不及卽以  
一枝咬嚼納產婦口中以滾湯潑之方得下咽一吐頓覺而  
出苦冒氣已不納受矣又嚼又灌連嚼五枝雖吐而未盡出  
良久嘆氣一聲而呼吸漸回仍大進參木而愈自後分娩不  
復爲難客歲復妊娠偶患微症予曰孕中患痔難於用藥姑緩

圖之雲翳深以爲是而夫人必欲速愈予知其不可不敢承任勸其更醫連易數手分毫無效復延外科安用毒劣胎雖未墮而瘡愈墮而不收以致晝夜呼號窘迫萬狀精神形質困憊已極及至臨月見其面唇兒白聲息至微六脈空浮而無根當夜用參三錢服十全大補一劑次早胞水已下煎參七錢以雞湯中服登時卽產一男產婦精神勝舊不意三朝偶沾外感頭疼身痛惡寒發熱按以熟料五積散而愈未數日忽因惱怒陡然上氣喘急咳嗽連聲胸前脹痛喉內痰鳴水米不入略啜茶湯則上下阻截氣不相續數人扶坐莫能伏枕不時昏絕與室惶惶因診其脈則細數無倫將近十至二寸知爲無根脫氣上衝乃以八味地黃湯莫納其氣一劑毫

不爲動。予曰：此等之證非大補真元莫能挽也。乃以六味回  
陽飲參附桂薑歸地各三錢加鹿茸五錢一劑下咽而氣平。  
能臥。四劑全安。曩之天臟乾枯，業曰滋潤而殊瘡痛苦，亦不  
復言矣。此等脈在常俗之輩必疑臨產服參過多，非用寬  
胸下氣不可。清降一投下咽卽甦，仍歸罪於從前之參。羣  
起而吠之矣。不知臨產之日非猛進參木，則已脫於當產之  
際。何能至今之氣喘貫由於參力已過虛證復現？子午不交  
竭絕立至。非大力之方安可挽回此證？得生實由雲翁學識  
超邁，胸中有主。惟予言是聽，所以效捷桴鼓。稍循俗見者，萬  
無生理矣。

凡閉脫二證不特產後宜辨，即中風中瘀氣厥，暑風及卒然倒

仁昏暎不省咸宜辨之如牙關緊閉兩手握拳謂之閉證有  
餘之候卽疎風化瘀亦可用之如口張手撒眼閉遺尿鼾聲  
謂之脫證蓋口張心絕手撒脾絕眼閉肝絕遺尿腎絕肺聲  
肺絕皆元氣竭絕之候惟大進參附或可十中救一

予見產後脫證不敢服參而斂者不知其幾嘗聞人曰某產後  
無病忽頭暗一暈而絕者又某產後忽一呵欠卽口張氣  
絕者卽此脫證是也復有妄人不知脫證爲何事不識入參  
爲何物而從中咀嚼不令服參而斂者亦不知凡幾犯者有  
知能無抱九京之慟乎

一血量證本由氣虛一時昏暎然血壅痰盛者亦或有之如果  
形氣脈氣俱有餘胸腹脹痛氣粗外證兩手握拳牙關緊閉

此血逆證也。神散無眠無痛者屬氣虛大劑葛歸湯加

肉桂

突然暈倒或有未及者燒紅秤鉗用瓦盆盛水前以醋沃之令酸氣入鼻收神即醒

產後百脈空虛洗拭太早令中風口噤手足搐搦角弓反張或因怒氣發熱迷悶用荆芥穗酒炒至黑大茴薑各三錢用水半杯酒半杯便半杯前至一杯灌之牙關緊以絆快開灌之仍捻其鼻以手摩其喉使得下喉即活矣○此即產後筋痙而幼科稱爲驚風者是也

孕時觸損臟氣胞破裂斷忽然胎墜名曰小產虧敗子官較大產爲尤甚然治此亦不同大產惟以滋補爲上計

馮楚瞻曰小產不可輕視將養宜十倍於正產大產如果孰首  
脫小產如生探之破其皮殼斷其根蒂也忽略成病者不少  
因而致死者恒多然此證始因斂血以成胎體因精血以長  
養終因精血不足而萎墮故瘀血甚少倘有腹痛成塊有形  
多屬血虛氣逆惟大用溫補則新者生而瘀者去若行消導  
破滯則逆氣愈發而愈并多致不救更有血虛腹痛復有陰  
虧不能納氣以致瘕痞爲患者當以八味地黃丸加牛膝五  
味早晚服之自愈

張景岳曰凡小產有遠近其在二三月者謂之近五月六月謂  
之遠新受而產者其勢輕懷人而產者其勢重此皆人之所  
知也至若尤有近者則隨孕隨產矣凡今觀嗣之家犯此者

十居五六其爲故也總曰縱然而然第皇宋人所不知亦所不信茲謹以筆代燈用指迷者倘濟後人實深願此請試言之蓋胎元始肇一月如露珠二月如桃花三月四月而後血脈形體具五月六月而後筋骨毛髮生方其初受不過一滴之立津耳此其橐籥正無依根荄尚無地肇之則固決之則流故凡受胎之後極宜節慾以防泛溢而少年縱情罔知忌憚雖胎固慾輕者保全亦多其有兼人之男者或恃強而不敗或旣敗而復戰當此時也妄方欲靜客不肯休狂徒敲門撞戶顧彼水性執腸有不啓扉而從隨流而逝者乎斯時也落花與粉蝶齊飛火裏共交梨並逆合汚同流已莫知其昨日孕而今日產矣朔月孕而望日產矣隨孕隨產本無形迹

在明產者胎已成形小產必覺暗產者胎仍似小直溜何知  
故凡今之術術家多無大產以小產之多也娶娼妓者多少  
子息以其子宮滑而慣於小產也又嘗見艱嗣之人而求方  
者問其陽事則曰能戰問其功夫則曰儘通問其意況則怨  
嘆曰人皆有子我獨無亦豈知人之明產而爾之暗產耶此  
外如受胎三月五月而每有墮者雖衰薄之婦常有之然必  
由縱慾不節致傷母氣而墮者爲尤多也故凡恃強過勇者  
多無子以強弱之自相殘也縱肆不節者多不育以盜損胎  
元之氣也豈悉由婦人之罪哉

此景岳見道之言古人每曰寡慾多身此卽其註脚也世人每  
恨不孕孰知既受而暗損之屢孕而屢損之終身無子不亦

宜乎。惟有婦人由於氣弱或陰陽偏勝墮胎。至於數次而醫者竟無一策以保固之。亦可哀矣。予有至聖至神保孕之方。屢效驗。但信而行之。斷不相誤。

○集成三合保胎丸

此爲素慣墮胎者設也。蓋孕之屢墮。雖由於衝任虛脾腎弱。若德性幽閑。內臟無火者。決不墮也。能清心節慳。起居有恒者。決不墮也。凡屢墮者。皆偏陂之性。暴怒之人。以致於肝氣有餘。肝血不足。血虛生熱。火燥子宮。又或恣縱不節。其胎必漏。而墮矣。而世之安胎者。無非執泥古法。以香砂。呂茶。保孕良圖。不知熟藥安胎。猶抱薪救火。不惟無濟。而反速之。予甚不慊。因以古之丙補丸。杜仲丸。白朮散三方。合名三合。

保胎丸以條芩清肝火而涼血白朮扶中氣以健脾當歸養  
血寧心熟地滋陰補腎續斷填損傷而堅胞蟬杜仲益腰膝  
而暖子宮至怯者加以人參力不能者不用亦可藥雖平易  
功勝神丹誠所謂鍼斧相投捷如影嚮凡屢墮者服之無不  
保全寶亦婦科保孕安胎之聖藥也再有叮嚀凡屢墮者受  
娠一月卽製此丸服之蓋墮胎必在三月五月七月之間此  
三月內切忌房勞慳怒犯之必墮七月已過萬無一失

○方

大懷地

一十二兩用砂仁三兩老薑三兩同地黃入砂鍋內先

以淨水煮藥候地黃將爛始人井酒者之提以地黃換爛爲瘦將酒者乾取起挾去砂仁薑片不用將地黃拂骨曬候

大當歸

去頭尾取身切片一十二兩以好酒洗過晒乾聽用

漂白水

取薄乾片一十二兩以黃上研碎拌炒極  
甚取起篩去土孕婦肥白者氣虛加二兩

寶砂芩

枯誤者不用取小寶者切片六兩酒炒  
三次孕婦黑變者加一兩性燥者二兩

柏枝伸

切片一十二兩鹽水  
拌炒以絲頭爲度

川續斷

切片一兩酒炒

右將後五味和爲一處火焙乾燥石磨磨爲細末篩過以前

地黃膏和勻少加煉蜜入石白內鳩千餘杵爲丸茶豆大每早鹽湯送三錢晚臨臥酒送三錢每日如此不可間斷孕婦素懷者須兩料方可自一月服起過七個月方保無虞此方至補至聖幸勿輕視

凡臨產時有六字真言一曰睡二曰忍痛三曰慢臨盆子復有二字寶白未離經較六字真言更爲親切蓋六字真言出於常人之口產婦未能深信三字寶爲醫者之言不容不

信誠保產金丹回生上藥予以此法救人莫可勝紀凡臨產  
家診視無論脈之滑濶痛之緊緩但曰未離經仍囑產婦曰  
脈未離經尚非正產且脈氣舒徐定然安吉惟宜加令穩臥  
俟其時至可也此何意蓋產育全賴母氣爲主產婦聞其脈  
未離經知時未到不敢望其速丁惟安心耐之而已產婦一  
安舉室皆安庶無倉皇擾攘之患天下原無難產之事凡難  
產而致死者總由時候未至倉皇逼迫害之也始則家長驚  
張不能鎮定繼則產婦矯怯不肯忍痛或弄產或轉胞稍有  
腹痛隨卽聲揚無知穩妥便稱是產而試水坐草一任胡爲  
豈知七候未臨胎氣未足子在胞中安然不動欲令其產焉  
可得乎因其久而不下產婦則驚懼憂是飲食不納漸至氣

怯神昏。常有未睡而覺。自夢臨是證。但曰未離經。惟以大  
劑甘溫之藥與之。如八珍十全之類。助其產母之元氣。若爲  
正方。則腹痛陣緊。一陣痛急。首下倘非正產。則腹痛漸減漸  
緩。胎元得暖而安矣。予之所經。穩婆謂頭已平門子。診得脈  
未離經。用固胎暖藥而安之。有遲至一月半月十月而產者。  
已經十數人矣。豈有頭已平門而能倒懸一月半月之理。卽  
此可知。穩婆之不足信。不觀立齋行曰。凡邪淫之婦。私胎並  
無難產。總因胎起於私。怕人知。貿只得極力忍痛。痛到極點  
之時。則脫然而出。此真有穩婆分担妙藥。催生。凡產育能  
耐心忍痛聽耳。自然則萬舉萬全者。謂藥能催生。則未敢  
許也。至催生之法。謂產時胞藥已下。二時辰不生。方可用。

之蓋藥乃養兒之物藥訖不產必胎益力愈遲則愈耗  
必愈之不得不以大補氣血之藥助其母力又惟人參爲至  
聖其次則脫花煎芎歸湯皆可然亦須子已出胞交骨旣開  
門戶已正方爲有益若止遇產婦腹痛之言穩安頭至之說  
妄用催生方藥不惟無濟反逆其斂悶之戒之

○入方

全大補湯

揀人參 炒白朮 白茯苓 慢虢地 當歸身 正川芎  
杭白芍 紫草 肉桂 多首草 生薑蜜爲引

八珍湯

揀參 炒白朮 白茯苓 大當歸 正川芎 白芍藥

懷丸地 生薑大棗爲引

加味歸陽湯 治新產交骨不開

金匱歸

正川芎

油髮灰

敗龜板

水煎熱服

聖盧申曰陽開而陰固自然之理也今交骨不開陰極矣必  
加肉桂以宣佈陽和庶爲有濟若龜板髮灰之純陰僅可爲  
任脈之導導耳

脫花前 凡生產臨盆此方最確并治產難經日不下并死胎  
胞衣不下俱妙

金匱歸

正川芎

上青桂

淮牛膝

淫羊藿

一錢

水煎加酒對服若胎死不下及胞衣不來再加芒硝五錢氣  
虛固崩者加入參三錢萸附子一錢無不下者此方此

平胃散加芒硝功勝百倍以其藥味甘溫不傷元氣故也

補中益氣湯

揀人參 炒白朮 炙黃耆 罂粟麻 北柴胡 全當歸  
廣陳皮 炙甘草 生薑大棗引

當歸補鴻湯

治產時去血過多心內怔忡頭暉眼黑暗不醒

炙黃耆

當歸身錢五錢

加炒米一兩生薑五斤大棗五枚

水煎服

黑神散 治產後虛胸腹脹痛氣粗牙關緊閉兩手握拳血

逆之證

上青桂 全當歸

杭白芍 黑炮薑

懷牛膝

大歸豆錢

炒五

水煎酒對服

生化湯 此方去舊生新凡產後無論有病無病能服數劑使  
惡露盡去新血速生誠產後之要藥也世俗每以紅糖下瘀  
反致損胃戒之

大歸身

五錢 正川芎

二錢五分 光桃仁

二十粒一錢 黑炮薑

炙甘草

二錢 每日一劑水煎熱服四五劑爲度

清魂散 治產後瘀血攻心數日神昏不醒瘀化爲膿流臭  
穢而不知者神效

白當歸

三錢正川芎二錢 鱼澤蘭

三錢荆芥穗一錢 魚益母

二錢

揀參

一錢炙甘草五分

生薑大棗水煎服

加味芎歸湯 催生及產後最爲穩當功亦鉅大

當歸身

一大川芎二錢上青桂枝一錢

催生但用此三味水煎酒對

服立下預防血量以本方加酒炒荆芥一錢先將此藥煎好  
俟胞衣已下隨卽服之不無血量之患效經千百斷不悞人  
八味地黃湯 產後氣浮喘促不甚虛著以此納氣歸元至虛  
者不能

懷熟地五錢正懷山四錢淨棗皮三錢白茯苓二錢宣澤瀉一錢

粉丹皮一錢川附片二錢青桂枝二錢水煎極濃空心服

六味回陽飲 凡真元已敗氣血既亡陰陽將脫非此莫能挽  
回誠回天贊化第一之功此景岳新方知者尚少

大熟地五錢大當歸三錢黑炮晉一九錢附子二錢青化桂二錢上燥參  
三五錢加鹿茸數錢功更捷生薑大棗爲引水煎溫服此方不  
剛猛能回散失之元陽能斂亂離之陰血濟急扶無出

其右名

催生簡便方

人能鎮定耐痛待時必無難產之患或因倉皇急迫不幸遇此而催生之法不可不知又或窮鄉僻壤醫藥不便誠爲困苦故附單方於此以備急需

一治橫生逆產胞衣不下併墮死胎用茺蔚子四十九粒去殼研爛於產婦頭頂心剗去少髮以茺蔚膏塗之須臾腹中挺上卽宜除下却急於是心安之自然順生生下卽速去藥遲則恐防腸出如胞衣不下貼足心卽下

二卿村僻壤無藥之處不幸遇此卽覓花椒葉香圓葉柚子葉茱萸葉生薑生葱紫蘇濃湯一盆俟可下手卽令產婦以

小櫈坐盆上廁湯淋洗其膍腹陰戶久久淋洗氣溫血行登時卽產已上諸藥全者更妙若少一二味亦不妨

一治死胎不下及胞衣來遲用黑豆一升炒香熟入醋一大碗煎至六七分去豆取湯分三次服之以熱手順摩小腹其胞胎俱下

又方用冬蜜一大杯以百沸湯調服之立下如胞衣來遲再服一碗卽下

一治產難及橫生逆流或血海乾枯以致胎死不下惶惶無措死在須臾急用皮硝五錢熟附子一錢五分好酒半杯童便牛柳同煎三沸服立下百發百中

一方治產婦元氣弱乏胞衣來遲者用真青化桂三錢當歸川

芎各錢半酒煎熱服之下

下死胎 用麥芽牛角搗碎水二大碗煎至一碗服之即下

又方 天花粉四錢

上肉桂 淮牛膝 淡豆豉錢三

用水一碗煎至一碗熟服即下

丸料五種散 此方專治婦人產後外感內傷瘀血不行發癢

氣滯頭疼身痛惡寒發熱心腹疼痛其熱往來似疟非熱小

腹脹滿傷風咳嗽嘔吐痰水不思飲食胸膈氣急手足拘攣

狀類中風四肢酸疼遍身麻痺凡產後一切無名怪證

夫產後百節俱困氣血兩敗外則腠理不定易感風寒內則臟

腑空虛易傷飲食稍有不慎諸證叢生古書有產後以大補

氣血爲主雜病以未治之之戒後世莫不遵之惟事滋補不

知風寒未痊食飲未消滋補一投反成大害昧者固以爲藥  
力未到愈補愈深而後已天下之通弊莫此爲甚昔於  
潭州遇師指授此方按法治之往輒裕如不敢自秘遂人口  
授併曾刊板印送於茲四十餘載活人不可勝紀但庸世人  
不悟以爲淺近之方安能神應若是故古人謂半金易得一  
訣難求予今訣破庶孤疑頓釋方名五積者謂此方能去寒  
積血積氣積痰積食積也今產後之病性正犯此五積以五  
積之證投五積之方。其非藥病相值乎猶慮藥味辛散而以  
醋水拌炒名熟料五積散俾藥性和緩表不發消而不攻  
方內所用肉桂解表逐寒白芍和榮調衛蒼朮厚樸走陽明  
而散滿陳皮牛夏疏逆氣以除痞歸薑芷入血分而祛寒

酒炒設舌便寬。胸膈而利咽喉。茯苓去飲寧心。甘草和中補土。大虛大怯者。加入參微虛者可不用。其爲溫中散寒之妙。用於壅後無往非宜。五積散本方原有參。因世人不敢輕用。故方中未載。

香白芷錢上青桂一錢此二味不必少川厚樸 正川芎 芎桔梗

陳枳殼

白雲苓

炒蒼朮

杭白芍

法半夏

黑枳實

炙甘草

廣陳皮

以上各一錢

全宮

歸脾湯加人參

石藥味

皆宜秤過除白芷肉桂在外不炒餘藥合爲一劑。用好醋小

半杯淨水一杯與合。將藥潤溼入鍋內炒至黃色爲度。

取起撒地上去火毒候冷入白芷肉桂在內生薑三片紅棗

三枚。淨水二碗煎至一碗熱服。此方至乎穩見效之後。依血

服之不拘劑數以愈爲度惟產後大汗泄瀉或虛脫之證居之蓋此方但能去病不能補虛虛證有方在前並宜參用  
產後簡便方 產時母腸先出然後覓生產後其腸不收甚爲  
危迫 用醋半杯新汲水半杯調勻噀產婦面每噀一縮三  
噀收盡直養法也

又方 以蓖麻子四十九粒去殼研爛塗產婦頭頂心腸即收  
入急藥以溫水洗淨倘其腸乾燥難收用磨刀水溫潤其  
口一磁石煎湯服之其腸自收

又如平居偶因用力太過督傷致子腸不收用艾丸裹豆  
大灸頭心百會穴三五壯即收

又方 先以鹽湯洗淨後用五靈脂燒烟於桶內令患者坐桶

上惠之自上

又方 用清酒五觔煉熟以益盛之候溫涼令產婦坐油盆內  
約一頓飯久仍以皂角爲細末微以一厘吹入鼻中令作唾  
立上

產後玉門腫痛 用蛇牀子三兩煎湯頻洗卽愈又以葱白和  
乳香搗成膏貼腫上效

產後乳汁不通 用天花粉炒黃爲細末每用二錢以紅飯豆  
煎濃湯調服每曰服二次其乳流溢

產婦氣血大虛無乳者用 全當歸錢正川芎錢 穿山甲  
王不留行各一錢 川木通五分 猪蹄二隻煮藥以猪蹄爛爲度  
去藥服湯並蹄立通

產後陽氣虛寒玉門不閉用 石硫黃 海螵蛸 北五味  
各等分共爲末擦患處日三易

產後玉門不閉陰戶突出

石硫黃

免絲子

吳茱萸

錢

蛇牀子

一錢  
五分

水一大碗

煎至半碗頻洗自收

產後擦破膀胱不能小便而淋瀝

黃絲絹

一尺

牡丹皮

鮮白芨

錢

將丹皮白芨研爲末同黃絹用水一碗煮至

絹燭空心服之

服時不可作聲

則不效

○初誕救護

小兒初生或不能發聲謂之夢生多不知救深爲可憫切勿斷臍帶速用明火將胞衣炙煖使煖氣入兒腹更以熱湯盃洗臍帶却取猫一隻以布袋裹其頭足使伶俐婦人拿住猫頭

向兒耳邊以口噏。笛耳猶必大叫一聲兒節醒而開聲方可

### 剪斷臍帶

又有因難產或冒風寒舉之遲。兒氣欲絕不能啼者亦以前法溫暖之令暖氣入腹氣回卽甦更令父母之真氣呵而接之。凡斷臍帶。世俗皆以刀剪斷之最爲不妥。但以大紙燃薺香油燃火於臍帶上燒之令斷蓋所以補接其陽氣不但爲回生起死之良法且後日無傷寒泄漏之患。

初生腎縮乃受寒氣所致用硫黃吳茱萸各三錢研極細末搗蕊取汁調藥塗臍腹另以蛇床子燒烟熏之卽伸。

悶脣生者見糞門有一膜悶住兒氣故不能出聲拍之則膜破而叫矣。又有用輕巧婦人以銀簪輕輕挑破爲甚便或不

能挑急以暖衣緊包勿令散放以熱水浸其胞衣寒天則以  
火炙之久則熱氣入腹而氣內鼓其膜自破聲自出

又有生下無穀道者為肺熱閉於肛門急以金銀或玉簪着其  
端的刺穿之或以火針刺穿但不可深以油紙捲套住免其  
再合

兒初生下遍身如魚脬或如水晶破則流水以密它參研細  
擗之

初生遍身無皮俱紅肉急以草米粉乾撲之候其皮生全則止  
初生大小便不通腹脹危急者急令婦人口含熱水吮兒之前  
後心井臍下手足心共七處每一處吮吸七口以肉色紅赤  
爲止須臾即通

又一方以生葱汁人乳各半調勻抹兒口中須臾即通

初生不尿以葱一根切碎人乳半杯同煎五葱取乳分作四次服卽尿不吮乳者服此卽吮乳

○調燮

小兒初生飲食未開胃氣未動廓然清虛之府宜乘此時加意

調燮於兒未啼之時

精巧婦女輕指探兒口挖去污血隨

以甘草湯角軸

指蘸甘草湯拭去口中涎沫然後看兒面

色若身面俱紅唇舌赤方知其必有胎毒每日用鹽茶水

可太鹹以皂礬洗其口去其胎涎日須五六次此法至神至

異世所不知蓋兒之胎毒藏於脾胃口中多有精涎其馬牙

稱謂重舌本舌皆從此起每日洗拭則毒隨涎去勿從側

而且至簡至易何忽視而不爲倘胎毒重直須先過週歲  
得此有毒者之調變也倘兒面脣淡紅此爲胎寒不可用茶  
惟以公實湯先去每曰一二次足安蓋草龍門胃而且和中  
最切時用不主於古方之用黃連大黃硃少輕砂輕粉開口之法  
此時斷不可用今時娶十有九虛苦寒尅卽最不相宜况  
嬰兒初誕如蟄虫出戶草木胡芽卒遇寒氣未有不爲  
其彊折者以苦寒而入初誕之口亦若是也見三朝七日  
必有肚疼嘔吐泄瀉夜啼之證是皆苦寒傷胃之害其孰能

知之

或曰子昇寒不可用於初誕之口何以後之亢熱丹及寫  
青丸有云大苦得無无病乎曰彼胎毒已現外證可憑有

病病當何人責之。足畏令初誕。開口未辨。毒之有無。即使有毒。尚然未發。深藏潛伏。與俱泯。程鳳淵有言。止如閭閻。無事時。未可執平人而誅之。曰爾將爲寇也。以苦寒而開口。是誅平人也。毒發而畏苦寒。是有寇不誅。鄉原之仁烏乎可也。

○臍風論症

臍爲督風總數五臟寒門。道家謂之下丹田爲人身之命蒂兒。在胎時。口鼻未通呼吸。惟胞閒真息隨母之呼吸爲呼吸。及其下地。圓底一聲。氣通口鼻。而胎元之一息。不復爲用矣。遂寄於臍內。一寸三分中虛二穴。左青右白。上赤下黑。中央黃色。八脈九竅。逕絡爲真息往來之路。坎離交會之鄉。凡修鍊仙胎。皆從此處立基。所以謂之命蒂故。少兒初生。惟臍

之千係最重。斷脣之時不可不慎。或剪脣帶太短。或結取不緊。致外風侵入脣中。或卒見時。發動脣帶水入生瘡。客風來虛而入內。傷於腎。傳於肝。肝傳心。心傳脾。脾傳肺。肺蓄其毒。發爲脣風。其證面亦啼。啼者心病。手足微搐者。肝病。唇青口撮。痰壅塞者。脾病。牙關緊急者。腎病。啼哭不止者。肺病。五臟之證。略見一二者。酒可治。悉見者。不治。

小兒初生。惟脣風爲惡候。宜有三。一曰脣風。二曰噤口。三皆脣瘡。而寒熱自別。治者宜詳。

一曰脣風。由鬱脣後爲水濕風寒所乘。入於脣而流於心肺。令肚腹脹滿。吮乳口鬆。多溢不乳。此初起之時。速用火攻散之。若至氣息喘急。啼聲不出。或肚上青筋吊瘤作痛。此胎毒夾

風邪入臟外用火功內服指迷七氣湯

方則

卷之二

十一

主

病

青

睡撮口不開牙關緊閉口吐白沫爪甲青黑者皆不治  
二曰禁口其證眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀。凡孔  
不得口吐白沫大小便不通遇此先看其上腭有點子即以  
指甲輕刮破以木香白芷各五分煎湯化下流瀝利  
動臟腑氣順自愈。

一曰鎖胸山胎中熱毒壅盛結於胸門大便不通急參婦女溫  
水漱口吮兒之前後心併臍下及足心共七處凡四五次  
外以輕粉五分研末蜂蜜少許溫水調服以通爲度如更不  
通以薑首三四寸長用油抹潤輕透竅道納入二寸許以通  
爲快若至七日不通者死。

古入之論臘風皆謂由於水溼風冷所致予則以爲古論猶未  
盡也蓋臘風有內外二因。有可治不可治之別外因者風溼  
所傷。內因者稟父之真陽不足也。予嘗覓一士產育十數胎  
皆勇盡傷於七月內之臘風無一存者若謂外邪所傷何以  
獨傷此家之兒又豈無一兒能避之者此內因之顯而易覓  
也。凡男子之命門真陽不足者右尺脈必細澀無神生子必  
有臘風此子察之詳見之確非耳聞者比也其外因者病發  
於三四五日之間病生於六腑故可治內因者必發於六  
七日之間病生於五臟故不可治曩者夏月鋤有預防臘風  
之訣謂三朝一七看見兩眼角黃必有臘風不知裏受厚者  
生下即滿面紅黃乃爲吉色誤認臘風其害不小此法不確

惟令乳防。每曰摸見兩乳乳內有一小核是其候也。然乳內有核發脾風者固多而復有不發脾風者此法十有七八亦有三分不確。但看小兒不時噴嚏更多啼哭吮乳口鬆是真候也。急宜治之。第脾風之治無一成法可遵。雖有疏風攻下之法。莫能濟急。獨予與授燈火無論脾風癰瘤以及內危險證用藥不能挽回者此火可以生之外經效驗未肯輕傳。因見幼科不知火穴往往錯謬用之反致引動風邪。蔽隔火毒。燙兒身熱不退。火毒內攻。每多不救。故不忍隱秘。盡行吐露。以公諸世。世之幼科治病輒曰剪風曰截風。夫剪者。遺棄之謂也。截者堵塞之謂也。以火功用於中宮任脉所行之地。豈非堵遏其邪而犯闕門逐盜之戒乎。不知風邪之在人身。

善行數變無形無聲欲除其害無如疏散條達而去之不使久羈於樂衛經絡則善矣如仲景之治傷寒而立汗吐下三法邪之在表者汗而散之邪之在上者吐而越之邪之深入者下而奪之總欲其邪盡而後已未聞有邀截之爲也今幼科不但不爲逐邪而反閉關絕險阻其去路使邪氣進不可退不能猖狂躡躅欲其不倒刃相攻斬闕逆犯者不得也此皆爲治者釀成之禍於邪何尤凡邪之傷人未有不從三陽而入驅邪之法乃必使其從三陽而出故此火穴亦惟三陽有之蓋欲引其出裏斷使之入裏也故爲圖說詳後並

請跋

大方

○用火口訣


夫頭見全身燈火，誠幼科第一捷法。實有起死回生之功。火共六十四樵陰符易數，能疏風散表，行氣利痰，解鬱開胸，醒昏定搐。一切凶危之候，火到病除。用火之時，倘值寒冬，必於房中燃燒明火，使兒不致受寒。燈草大小適中，以麻油染用。令老練婦人抱兒解衣去帽，從左耳角孫起，總依後之歌訣用之。凡用火不可姑息，勿謂火數太多，憚其難愛。蓋小兒受病，由其經絡凝滯，臟氣不舒，以火散之，正欲使其大叫大哭，方得臟氣流通，渾身得汗，柴衛宣暢，立時見功。此火暗合周天，不可減少，少則不效。若救臍風，非此不可。火穴圖歌並列於後。

集成神火圖

銅人正面



銅人背面



○集成神火歌

仙傳神火天然理。始自角孫。子孫脈起聽宮曲。醫本神旁。次及天容。仍右取。頤會承浆。左肩井曲池合谷諸。邪屏氣關已過至神門右亦如之。昏可醒左孔根中七燁始。右亦如之。何待齒臍下陰交續命關。平平三點凶危止。春中身柱至長強肺俞陽陵承山當。崑崙解谿邱墟穴。湧泉右亦效之良。愈音

○指明火穴

仙傳神火天然理。始自角孫。子孫脈起。凡用燈火無論明暝夕。照。眼。耳。皆從東邊用。起角孫。在目。尖上惠脈。聽宮曲。醫本神旁。次及天容。仍右取。聽宮在耳門。輪根下。左邊已完。右亦如此。頤會承浆。左肩井曲池合谷諸。前曲池在腕。邪解。脣。脣門。承浆。在下唇宛宛中。肩井在肩上。宛宛中牙角。從左起故曰左肩井。曲池在肘溝上。廉屈縫處合谷在。

虎口近氣關已過至神門右亦如之。晉可醒氣關在食指角

二節神門在掌

後下廉鍊骨之第

左完右亦如之。

左乳根中七燄始右亦如之。何待齒自全

下走從上至下七

節肺下陰交續命關平平三點引冠上陰

止右乳根下亦如之

在肚臍下半寸用大三指

寸

用大三指者中身柱至長強肺俞陽陵承山當身柱在頭

從上至下九

推至長強穴止肺俞在兩腋肚臍後

中陽陵泉在膝外邊下三寸承山在腰肚盡處

足少陽經谷

邱墟穴湧泉右亦效之貞

邱墟在外踝骨後解剖在繫絆帶足太陰經谷

中心左脚卒

完右亦如之

## ○宜用火者

平素產子有臍風則胎胎不爽於產下第二日勿待其發先以此火散之百不失一。

一胎嬰生下多暗不乳噴嚏呵欠吹乳口鬆是即臍風作矣急

以此火散之、

一凡兒病面青面黑扭項搖頭仰身擦面或眼青怒視或左右斜視或上下覩視或兩目連劄或頭項牽強蹬舌露筋噓風撮口啼哭咬人或手如數物或兩手牽引或兩足跳掣忽擾忽亂失張失志但覺神情與常有異者由從前表裏不淸將欲作痘此火至妙

一傷寒已癰角弓反張眼目斜視左右搖擺并中惡客忤癟證與食墳太陰及一切風門火門痰閉氣閉乍然卒死者此火最神

一食傷脾胃大青筋於端午日午時用全身燈火復子青筋開火處以火截之一火一點其肚自消

一風寒痰氣閉塞之證此火實有神功凡用燈火既完候兒啼哭已定卽用金粟丹半丸當湯化服服後以衣裹之蒙其頭面令之安臥片時以復其神志其病如失

切忌火者

一小兒四時傷風感冒身熱出汗大小便調唇舌如常口不作渴此表病輕證也疎解之則愈愚人妄用是謂輕病重治反爲不祥

小兒邪已入裡身熱而赤口渴太小便閉唇焦舌紫眼紅或手足心熱夜熱焦煩舌上黃胎揭手擦足微衣揭覆此裡症內熱也情利口自愈不可用火強用之不善不能使熱邪從裡以達表通足以助熱而耗陰致身熱不退在夏秋發令尤爲大忌

一小兒大病久病身體怯弱面目青黃唇舌白疎搖頭鉗視晝

睡露眼形骸消瘦聲息輕微自汗盜汗或一切嘔吐瀉利痘  
麻瘡癰久瘡久嗽失血之後精神疲倦乳食減少指紋沉細  
六脈無動此皆虛極之證切忌火攻慮其升故也

一切久熱消渴有證形骸黑瘦毛髮雀結由陰虧血弱虛熱所  
爲誤用燈火愈增其病慎之

一燈火爲兒科切要今醫家不特不明火穴而併不辨寒熱虛  
實不當用而用之反爲大害惟依以前辦法則之無不當矣

附夏禹鑄



夏禹鑄。脣風初發，吮乳必口鬆，兩眼角按肩心處，忽有黃色，宜急治之。治之最易，黃色到鼻治之仍易，到人中承漿治之。

稍難口不撮微有吹噓猶可治也至唇口收束鎖緊舌頭強直不必治矣一見眉心鼻准有黃色卽用燈火於顫門一焦人中承浆兩手大拇指端少商各一焦脣輪邊脣六焦腮帶未落於帶口一焦既落於落處一焦共一十三焦風便止而黃即退矣○予按古今燈火惟上全身火有經有府有理有法無有出其右者第火穴多恐卒卒之際在嫋熟者不難倘素未經練者一時不能用故附夏氏暗風火於此庶忙迫之時可以濟急此火亦曾經驗第不及全身燈火耳

○回生艾火

以前全身燈火皆爲實邪升散之用併一切怪證莫可名狀者無不奏功倘涉久病體虛忽然精神潰亂人事昏沉前火則

爲不當。須用回生艾火燒之。蓋此火能回散失之元陽。以歸氣血。以其根蒂免致離散。其法以生薑切爲紙厚薄片。大如指頭貼尾間。八在督骨命門穴。在腰脊間。正對脐以艾絞接緊。如棗豆大。蓋片上用火灸之。每穴以三炷爲度。灸完。另以薑片貼膀胱陰交穴。如則炎之。此火不特小兒可用。凡男婦一切中

風中寒。氣厥陰證。虛寒竭脫凶危之候。咸宜用之。有起死回生之功。幸毋輕視。

凡小兒中惡。客忤。以及痰閉火閉。風明乍然至死。卽以全身燈火醒之。倘一時未有其人。卽以大指掐其人中穴。病輕者一掐而啼哭而醒。倘不應。捐食。又不應。掐中衝。若再不應。其病至重。則以艾丸如雞冠子大。於中衝穴灸之。火到即活。蓋

中衝一穴爲厥陰心包經之脈所出其經與少陰心臟相通  
此火燃則心中惕然而驚而此火全然不知則百中不能  
一救一矣



○人方

辰砂散治最勝風鎖肚

鏡辰砂水飛直用炒  
五錢  
天竺黃三分  
珍珠三分  
麝香一分  
爲末每用少許蜜調抹見口內

龍膽湯治身熱膀風最口

龍膽草

鈎藤鈎

北柴胡

厚黃芩炒京赤芍

炙甘草

芽桔梗

白茯苓

川大黃

紙包煨一分

大棗一枚水煎溫服

治撮口

用生黃一分研末

竹鹽調滴入口中

又方取蝎虎

一個細鹽裝瓶內用硃砂細末亦入瓶內封其口月餘令食砂取出其身赤色陰乾爲末每二分酒調下

秀治撮口

用穿山甲

用尾上甲三片搗屑七  
竿汕名種黃色虫和箇

共爲細末

入乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣裹包須臾汗出即愈

保生湯 治胎風鎖肚口噤

北防風

七陳枳殼五分

小橘紅四分

白茯神三分

荆芥穗三分

甘草三分

焰芯引

遠志

四分製南星五分

芽桔梗三分

炙甘草二分

焰芯引

二豆散

治膿腫突

紅飯豆

淡豆豉

天南星

鮮白芍

各一錢

共爲末用芭

蕉自然汁少加香油調藥敷臍四傍得小便自下卽愈

龍骨散 治瘡瘍

石龍骨

煅二兩

川黃連

錢枯白箬

錢

共爲末乾摻

方用大

紅羊絨燒灰爲末

敷之效

○瘖證簡便方

小兒初生犯撮口瘖風荷包風等項并齒根邊生白點  
名馬牙啼哭不吮乳卽看口內堅硬之處或牙根邊有白點將  
針挑破出血濃煎沸荷湯磨墨調勻以指攬過再以產母  
亂髮蘸墨滿口擦之仍用劫盡布蘸溫水展口卽愈

小兒瘖風撮口用完全生葱一根搗爛取汁又以直殼蟹三個

炒去絲研極細末以葱汁調勻塗乳頭上令兒吮之或摩  
兒口內亦可

小兒脣風撮口以艾葉燒灰塗脣上以帛縛之若脣帶口瘡  
蒜切薄片貼脣上以艾火炙之候口中有艾氣立愈

小兒噤風初生口噤不乳蟬蛻十四枚全蝎去尾毒洗去鹽泥  
十四枚炒乾爲細末入輕粉三分每用一匙乳汁調勻即愈

小兒撮口但看舌上有瘡如粟米者是也以蜈蚣炙焦研末敷  
瘡上

撮口噤風面黃色氣喘聲不出由肺氣挾熱流毒心脾熱令舌  
強脣青聚口發紫角直僵蠶炒去嘴略炒爲末蜜調納兒  
口中

小兒十日內口噤不乳取大蜘蛛一枚去足炙焦研細末入猪  
乳一小杯和勻分作三次徐灌之神效無比

小兒脣瘡出血及膿用海螵蛸胭脂共爲末以油潤脣乃搽藥

○初生護持

嬰兒初生肌膚未實宜用葛葉護其背亦不可太煖更宜數見  
風日則血氣剛強肌肉微密若藏於幃幕密室或厚衣過暖  
則筋骨軟弱不任風寒多易致病衣衫當隨寒熱加減但令  
皆暖爲佳亦勿令其汗出恐致表虛風邪易入乳哺亦不宜  
過飽所謂三分饑七分飽頻採吐少洗澡皆至害也又  
須令乳母謹慎六淫七情蓋兒初生藉乳爲命善爲乳母者  
夏不欲熱熱則致兒吐逆冬不欲寒寒則致兒欬嗽久乳則

上氣直狂醉乳則身熱腹痛新房而乳則瘦倦又脰不能行  
新浴而乳則發口傷神冷熱不調停積胸膈爲痰飲遂成  
壯熱壯熱不已乃成風癇兒啼未定劇以乳噴氣逆不消因  
成乳癥有瘡而乳致兒黃瘦肚大腳小名曰凹音病總之乳  
母能慎寒暑恚怒厚味炙燒麻乳十清和兒不致疾否則陰  
陽偏勝氣血沸騰乳汁敗壞必生諸病若屢服藥餌則臟腑  
陰損多變敗證均不可不知

初誕之時有於頭額之前髮際之間灸之又有以燈火遍身燎  
之彼以爲能截風路不知適足以大開風門蓋火功由兒有  
病不得已而用之無故而用伐及無量諸病自茲始矣戒之  
戒之

禁

凡浴時須調和湯水試看冷熱若不得所令兒怖畏况冬久浴則傷寒夏浴久則傷熱其浴兒當護兒背恐風寒從背入凡浣兒衣不可露於星月之下易惹邪祟如偶失收當用醋炭熏過方可衣之有鳥名天地女又名鳴飛鳥最喜陰雨夜過飛鳴徘徊其鳥純雌無雄著落羽毛於兒衣中令兒作病不可不謹

凡當春夏月閒宜令其地臥使不逆生長之氣如遇秋冬宜就溫和使不逆收藏之令凡在春天勿與護頂裹疋以致陽氣不舒因多發熱卽至年長下體勿令過暖蓋十六歲前血氣方盛如日方升惟真陰未足下體主陰得清涼則陰易養溫暖則陰易消故曲禮云童子不衣裘裳

夫人以脾胃爲主，故乳哺須節則調養，脾胃過則損傷脾胃。  
夏天忌熱，冬月忌寒。乳，宜埋去之而後與之。凡食後不可  
與乳，乳後不可與食。小兒脾胃怯弱，乳食並進，難於消化。  
初得成積，久則成癆。成癆比乳母不順之過。

凡寒則加衣，在則減衣。過寒則氣滯而血凝滯，過熱則汗出而  
腠理疎，以致風寒易入，疾病乃生。更忌解脫當風，易於感冒。  
然風和日暖，又當抱出遊戲，如陰地草木，不見風日，未有能  
堅持者。又不可日置地閒，令肚着地，以致脾宮受寒，腹痛泄  
瀉，慎之慎之。

○勿輕服藥

初誕之兒，未可輕藥。蓋無情草木氣味不純，原非嬌嫩，若暨

且問切無因惟憑望色粗疎之輩棄熟二字且不能辦而欲  
其識證無差不易得也凡有微疾不用分程但令乳母嚴戒  
油膩葷酒能得乳汁清和一二日閒不藥自愈所謂不藥爲  
中醫至哉言也每見愚人飽稍不快卽忙貪服極速者或不  
致悞疎者惟以通身驚風藥治之此無事之中生出有事  
伐及無辜病反致重父母見其無效是必更醫卒無善果相  
與任意揣度曰風曰火曰驚曰熱前藥後藥繼至甚至曰  
易數醫各爲臆說湯丸膏延刻不容緩嗟乎藥性不同見識  
各異嬌嫩脾胃當填此無情惡味擾攘於中不必病能傷人  
而藥色可以知之矣丁每見不聽勸戒雜藥妄投者百無一

宣

馮楚瞻曰凡爲幼科猶宜審看方脈諸書蓋幼科名曰「幼科疾  
病」而考能告人全賴治者細心詳察况幼科諸書理淺言  
略難明病源惟以小兒不節飲食爲執見最重消磨更以純  
陽之子爲宗論恣投寒苦孰知易停滯者脾氣必虛若圖見  
小效於目前則便遺大害於日後况小兒易虛易實言虛者  
正氣易於虛也言實者邪氣易於實也然邪湊之實必乘正  
氣之虛若不顧正氣之虛惟逐邪氣之實其有不敗者哉希  
如寒傷榮也但溫養榮陰風傷衛也惟辛調衛氣但使榮衛  
和平而宣行則客邪不攻而自散使正氣自行逐賊則邪退  
而正氣安然如浮雲一過天日昭明也若耑投與氣血無情  
之猛劑客邪雖散正氣亦傷乘虛之邪將接踵而至安知

正氣不至空虛邪必不能乘而爲害。至於云純陽者以無陰  
而謂乃稊陽耳。其陽幾何。陰氣未全而復敗。其陽將何以望  
其生長耶。況天地之氣化日薄。男女之情性日濶。幼稚之稟  
受日弱。有稟父之陽氣不足者多犯氣虛中滿。有稟母之陰  
血不足者多犯陰虛發熱。患痘則多犯腎虛內瀆之證。此皆  
先天不足所致。近來比比皆然。若徒效上古冠倒寒涼如肥  
兒。左廬晉元之類。則子中千死。莫能挽也。至云小兒陽火有  
餘。不知火之有餘。實由水之不足。壯水以制陽光。先賢至論  
服寒涼真不一毫。古格言以不生之藥。投欲生之兒心。何  
忍哉。凡小兒脾胃自非消穀。偶有停滯。則脾胃受傷。健  
其脾胃而穀自化矣。故方有助脾消化推盤穀氣。有益稟命

明火安生火補十者有消一補者有以補爲消者誠恐寬一分卽耗一分元氣也夫人有生惟此一氣易虧復何可輕耗元力肆之原尤<sub>尤</sub>易虧惟必根究先天之源而從方脈諸書裏源探本以爲治斯能補救當代赤子元氣於後天便亦培植後代赤子元氣於先天而壽世於無疆矣昔徒示上古幼科淺略方論則猶灌慨樹木者不顧根本而惟洒潤枝葉欲望其生長未之有也而况復加剗削者乎

○藥餌之誤張學岳

小兒氣血未充一生盛衰之基金在幼時此飲食之宜調而藥餌尤當慎也今舉世幼科既不知此大本又無的確明見而惟苟完目前故凡遇一病則無論虛實寒熱但用海底兜法

而悉以散風消食清痰降火行滯利水之劑總不出二十餘味一毫混用謬稱穩當何其誕也夫有是病而用是藥則病受之無莫病而用是藥則元氣受之小兒元氣幾何能無陰受其損而變生不測此當令幼科之大病而醫之不可輕任者正以此也又見有愛子者因其清瘦每以爲慮而詢之庸流則不云痰火必云食積動以肥兒丸保和丸之類使之常服不知肥兒丸以苦寒之品最敗元陽保和丸以消導之物極損胃氣謂其肥兒也適足以瘦兒謂其保和也適足以達和耳卽如抱龍丸之類亦不可輕易應用予嘗見一富翁之子每多疾或時驚罰凡遇疾作輒用此丸一投而愈彼時以爲神丹如此者不啻十餘次及其長也則一無所知凝然

一癒而已豈非暗損元神所致耶凡此寇伐之劑最當慎用故必有真正火證疳熱乃宜肥兒丸及寒涼等劑真正食積、脹滿乃宜保和丸及消導等劑真正痰火喘急乃宜抱龍丸及化痰等劑創用此者亦不過中病則其非可過也倘不知此而徒以肥兒保和等名乃欲藉爲保障不知小兒之元氣無多病已傷之而醫復伐之其有不妄敗者鮮矣

○看病訣

小兒初生欲知其有病無病以手捻其頭摸其頸頤不作聲者爲無病以手指探其口雖發聲而從容咂指者有病亦輕若卽發聲不咂指者面色青紅帶紫或牙關緊急不納乳汁此落地受寒之甚風邪入足太陽及足陽明而然也須急治之

庶可平復。初生之兒肥胖色嫩曰聾好看者此其根本不  
堅也非佳兆。且最易感冒風寒邪入腑者近在第二三日見  
之其證吐乳夜啼腹鳴此皆胎風之類然。蓋猶淺而易治。嘗  
用全真燈火十不失一。若邪之入臟遠在六七日見之此  
卽脾風。噤風撮口風之候。若口噤舌大瘻壅者皆不治。蓋病  
傳入臟係心脾肺三經也。此風氣甚盛無所發洩便形見於  
喉口牙關聲音也。凡生下時身破裂者死陰囊自者死陰  
不起者死無糞門者死股間無生肉者死開口如鴉聲者死  
粉白花色者死皮肉不光者死泣不出聲者死舌如豬肝色  
者死面無彩色者死臍帶短大紫色者天生下渾身銀白色  
者天生下有齒者大凶主傷父母不然必傷自身。生下未裹

卽撒尿者殺父母蕩家產在世終身勞苦、

○壽夭辨

頭者諸陽之會髓之海也凡兒頭角豐隆髓海足也背者五臟六腑俞穴皆附於背脊背平滿臟腑實也腹者水穀之海腹皮寬厚水穀盈也目爲肝竅耳爲腎竅鼻爲肺竅口爲脾竅七竅無闕形象全矣故知肉實者脾足筋強者肝足骨堅者腎足不妄言笑者心足不多啼哭者肺足哭聲連續者肺實不久眠睡者脾實兼之脚健而壯項長而肥囊小而黑根株固也肌肉溫潤榮衛和也而更肥妍如桃鬚黑如漆表氣實也小便清長大便滋潤裏氣實也已上皆爲壽相其兒無病

諸陽皆起於頭顱破項軟者陽衰於上諸陰皆起於足腨小腳  
蹉者陰衰於下鼻孔乾燥肺枯唇縮流津脾冷髮稀者血衰  
項軟者柱折青紫之筋散見於面者多病風熱兼之形枯色  
灰者表虛瀉利無時者裏虛瘡疥啼哭及多笑語者皆陽火  
妄動之候已上皆爲天相其見多病者難養

凡聲音清亮者壽有回首者壽哭聲濁者病散而無聲者夭

○面部部位圖

五臟所屬

○面部形色賦

察兒形色先分部位左頰青龍屬肝右頰白虎屬肺天庭高面



離陽心火地角低而坎陰腎水星在面中脾應脣際紅色見  
而熱疹壅盛青色露而肝風旺悸如燒之黑爲痛中惡逆傳  
似橘之黃食傷脾虛吐利白乃疳癆紫爲熱燄青遮日角難  
醫黑掩太陽不治年壽赤光多生膿血山根青黑頻逢反異  
朱雀貫於雙瞳火入水鄉青龍達於四白肝乘肺位汎痢而  
帶陽須防咳嗽而掩藍可忌疼痛方殷面白青而唇口最肝風  
欲發面赤而且歲視火光焰焰外感風寒金氣浮浮中藏積  
滯乍黃乍白疳積連繩又赤又青風邪癰熱氣乏頭門成坑  
血衰頭毛作穗肝氣眼生眵混脾冷流延滯頤面目虛浮定  
腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹痛而多嘔左右兩頰似善驚知  
爲客忤風氣二池如黃土無方傷脾風門黑主病青爲風方

驚恐骨舌昏暗危手如數物分肝風將分面若塗硯分心火  
燃眉坐臥愛燎風寒之人伸縮就冷煩熱何疑肚大腳小腹  
欲困而成瘧目瞪口張勢似危而必斃噫五體以頭爲尊一

面惟神可恃兒聲之輕重不同常之乾溼顙異呵欠通編知  
病之欲作乍然驚叫識火之將燒此察證之規繩幸全幸而不

不誣此賦不出幼科之手蓋六朝時高陽生所作臨診辨  
證頗爲得理予經驗旣久所以知其不誣今於子句未治處  
特爲之更定並加以小註非敢妄添蛇足實爲初學之助云

○辨色分註

察見形色先分部位

欲辨形之強弱堅脆色之天澤枯榮必先分上下左右之部位定五行四聚之位然後

按部察色以定證之安危

左頰青龍屬肝右頰白虎屬

帝經曰左右首陰陽之道路也

五行之位本在卯未在酉天門之魂陽從左升陰從右  
無過以生殺之理龍木全龍虎天庭高主陽心火地角低

而坎陰腎小

周易以東震西兌南離北坎定子午卯酉之四

正蓋後天之用有形者無不由之故以心配離

南之午火於天其皆配坎北之子水於地角亦陽上陰下之義

據其理而言之非謂顙上卽心唇下卽口齧牙幼科未

識瑞源刻舟求劍未可向癡人說夢也

鼻在面中肺應唇口以其位居至中內

通呼吸生死死之所以謂之中也肺為中土經曰中央黃色

入通於肺開竅於口又曰肺胃者倉廩之土其華在唇四

故曰脾應唇際亦中州受納之地也或問旣五臟之經脈未

行於面何以又從而部而察五臟之證能無幻解曰望色察

証內經之傳蕭軒岐大聖天人之學後世莫能效法所以據

五行四象列以部位庶望色者有所憑依耳又曰布列雖按

五行悉內臟之氣不應奈之何哉曰五臟之脉實不行於面

而藏象論曰十二經脈三百六十五絡其氣血皆上於面而

走空竅蓋人上下九竅而七竅在面目二耳二鼻二口故

自爲肝竅耳爲腎竅鼻爲肺竅口爲脾竅舌爲心竅有此諸

竅而後三百六十五絡之氣皆通於面故曰氣血走空竅而

是按面部色以赤其吉凶亦猶方脈之两手六部分左小腸

肝膽督右驅大膽脾腎命火兩手推一肺脈耳血脈何涉亦  
前空接八卦方位以手太陰一經巧分六部以候十二經脉  
氣之盛衰然則脈之隱微莫覩者尚可候其成敗而色之一  
望顯然者獨不可推其吉凶乎醫理至微後之賢聖罕忽不

紅色見而丸瘡舊盛青色露而肝風正

此繫言逆而之色

經所主胃經砂劫而必淡紅熱搏津液定化爲火而

寒而風邪衝併而必見青心神不安則爲吐衄營陰加火之

黑爲痛中惡逆傳似橘之黃食傷脾虛吐利

而見黑色至日

乍目黃爲中惡之徵偶因惡毒之氣從鼻而入肺先受之則

退正氣隨迫不通所以腹扁形盛不能自止反致子乘則位

而逆傳如肺傳脾脾傳心者是也肺黃言其深黃也脾司運

化乳食不停何黃之有由是運化失職所以食墮太陽脾氣

凝滯故深黃上面

必致有吐瀉之虞白乃疳瘦紫爲瘀血母所以脾必困而爲

自屬肺氣虛子屬脾氣虛

疳紫爲屬熱感經絡受青遮白角難醫

黑掩太陽不治逐下

分言之諸皆皆誤爲口角不知面部無口角之位不但無此部

位避亦全不符蓋小兒中氣強名唇不變色中氣虛寒名

邪定化爲壯然而不足

此下

有九青此爲常候非難醫之疾今證之口角左鶴也猶口

東升而爲青色也此爲木藏陽光厥則必有疑惑之處太陽

力力集卷二

左右兩額也太陽爲衆陽之宗屬火耶夏氣色宜紅今黑色掩蔽猶有水來就火之象定見傷殘故不治年壽亦光多生膿山根青黑每多火甚赤尤侵位肺必受傷氣不流行則血必凝滯將有膿血之災山根足陽明胃脈所起人凡小兒脾胃無傷則山根之脈不塊倘且食過度則氣郁壅則青黑之紋橫截於山根之脉必有延綿唧唧曰大異口達於四白肝乘肺位朱雀赤脈也雙肺腎水也赤脈貫腫穴乘水位治宜瀉心補腎青龍肝木也白肺金也白珠見青肝寅病而戴陽須防咳嗽而拖藍可已風侵肺治宜保肺平肝瀉病而戴陽須防咳嗽而拖藍可已瀉屬脾病痢屬腎病肺腎兩臟既傷先後二天並弱面宜憔悴今反面白者肝色也由其肺氣已虛肝無所畏木乘金位恐其生火以耗全故曰忌

### 口最肝風欲辨面赤而曰鼠

見反痛腹痛也寒氣侵脾而頭面青而唇燥也試視目直視也幼科指爲肝病耳舊大陽經本證蓋太陽之脈繫目上網血虛受寒則上網熱急試目直視今指爲肝風必用風藥耗其津液反成不耗能知養血其病自瘳火光焰火感風寒氣

浮浮中藏毒帶通而穴光風氣傷胃陽明燥結未解也

不得滯黃色汙面食傷脾也運化無力久成積也

黃乍白疳積連紗又赤又青風邪發

害爲脾虛白爲肺弱乳食難消輕則爲積久則爲疳赤爲火色青爲風色之頭

風火相乘榮血枯燥筋脈牽張甚則痛癰而爲症矣氣之頭

不足者平日羸虛水

門成坑血衰頭毛作禿

小兒粟疫精絕不定者平日羸虛水充賴氣以充之今大病之後中氣

陷安保其頭不成坑耶髮乃血之餘血榮則

髮黑令頭毛如艸之類知其榮血枯魚也

月氣眼生眵淚

脾冷流涎帶貞胆屬肝肝氣實則咳乾

嘔肝氣虛則咳渴枯

帶於頭開誤爲脾熱蛔不旋踵

面目虛浮定腹脹而上喘肩

毛頻蹙必腹痛而多呃

脾肺商虛中宮寒肅以致氣不歸而

固知其內必腹脹小兒知識未開於七情六欲毫不如陽何

熱覺之有升因腹寒腹痛所以不呻吟而煩躁不寐也

左右兩頰似青塗知爲客忤風氣二池如黃土無乃傷脾左

兩頰但青客忤之證由小兒神氣怯弱陽和未外邪客承

得以乘之從鼻面人忤其正氣則口吐青黃白沫面色變異

不消腹痛喘急者是也風池氣池屬上眼下也感也屬肝病也屬胃如黃土之色由木勝土復所以真陰色見而門爲燥爲風方羸肩背亦少陽所主光亮則吉昏暗則危子如數物分于風門耳前也少陽經所

# 黑生病青爲風方廣光滑言昏暗忘

風門耳前也少陽經所云黓則言其爲病青則

# 朱兮心火燃眉

邪熱傷神手如數物

謂十指屈伸不定如數物之狀連宜疏解無邪氣無肝風之發深紅

爲陽明胃經表熱深紅爲少陰心經裏熱而若逢朱色則知爲心熱心不可窺惟渴小腸而火一清丁人自息坐臥受寒風寒之入伸縮就令煩惱荷是凡小兒假入母懷藏頭面揭發楊手露面僵拘仰臥口渴燥煩由其內外皆熱所以欲

虛清肚大脚小脾欲困而成疳目瞪口張勢已危而必耗脾生之頭口五體以頭爲尊一面惟神可恃况聲之輕重不同啼之乾溼頓異呵欠連綿知病之欲作忽失警識火之將運化而肚大肌肉消削而脚小蓋脾毛膜內出其孔食失節所以脾困而成疳膀胱絕而口脹此勢已危必無可意五體以頭爲尊一面惟神可恃况聲之輕重不同

燐此察言之規細夫拳掌而不詳

頭手口首故以爲昏而分五位惟神是順神存則生

神亡則死言指眼光而言也况聲有輕重喘有乾坤安得無  
識凡聲微者知其氣不足聲壯者知其氣有餘哭而無展首  
實哭而多淚者虛呵欠連綿爲陰陽交引升降不前知其病  
之將至忽然大叫則是火熱擾神必有壯熱之證倘能依此

辨證亦猶工之有現症樂之有六征是則是效是究是圖自不致有望洋之慨矣

○二審顏色苗敎知表裏之寒熱而質

夏禹鑄曰望聞問切固醫家之不可少一者也。在人左脈則然  
而小兒科惟以望爲主。問細之問則久而切則無矣。經云切  
而知之之謂巧。大小兒以脉未全切之無可切而巧亦無所  
用其巧問而知之之謂示兒於未言時間之無可問即於  
能言者問之多不以實對是問不如問而工亦無所用其工  
聞而知之之謂聖。小兒初病時聲音或不失其常至病久而

氣喪而聲失聞之無可聞而聖又何所見其聖況晝曰  
哭聲不嚮赴陰君而亦有不赴陰君者何無非疑其聲而不  
得肺之絕與不絕故也吾故曰以望爲主曰五臟之屬體隱  
而理微望從何處曰體固隱矣而發見於苗叢顏色之間者  
用無不周理固微矣而昭著於四大五官之外者無一不顯  
中庸所謂費而隱微之顯者不可引之相發明哉故小兒病  
於內必形於外外者內之著也望形審察自知其病按病用  
藥見效之速未有不如嚮之應聲者內有臟曰心曰脾曰肺  
曰腎曰肝五臟不可望惟望五臟之苗與竅舌乃心之苗紅  
紫心熱也腎黑心火極也淡白虛也鼻隼與牙牀乃脾之竅  
鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙牀紅肺熱也破爛胃火也唇

乃脾之竅紅紫熱也淡白虛也黑者脾將絕也口右扯肝風  
也左扯脾之痰也鼻孔肺之竅乾燥熱也流清涕寒也耳與  
齒乃腎之竅耳鳴氣不和也耳流膿腎熱也齒如黃豆腎氣  
絕也目乃肝之竅直視而睛轉者風也直視而睛不轉者肝  
氣將絕也以目分言之又屬五臟之竅黑珠屬肝純見黃色  
凶證也白珠屬肺色青肝風侮肺也淡黃色肺有積滯也老  
黃色乃肺受溼熱證也瞳人屬腎無光彩又赤髮者腎氣虛  
也大角屬大腸破爛肺有風也小角屬小腸破爛心有熱也  
上胞屬脾腫則脾傷也下胞屬胃青色胃有風也睡而露睛  
者脾胃虛極也面有五位五臟各有所屬顏屬心離火也左  
腮屬肝震木也右腮屬肺兌金也口下屬腎坎水也鼻雀屬

脾坤土也。五臟裏也。六腑表也。小腸心之表。少便短黃澁膿。  
心熱也。清長而利。心虛也。胃乃脾之表。寒紅而吐。胃熱也。唇  
慄白而吐。胃虛也。唇色平常而吐。作傷寒論。大腸肺之表。明  
結。肺有火也。肺無熱而便秘。血枯並不可攻。丁脫肛。肺虛膀  
乃肝之表。口苦膽火也。聞聲作驚。肝虛也。膀胱腎之表。筋腫  
筋痛。腎之寒氣入膀胱也。面有五色。一曰紅。紅病在心。面紅  
者熱。一曰青。青病在肝。面青者病。一曰黃。黃病在脾。面黃者  
脾傷。一曰白白病在肺。面白者中寒。一曰黑。黑病在腎。面黑  
而無闇色。腎氣敗也。望其色若異於平日。而苗穀之色與面  
色不相符。則臟腑虛實無有不驗者矣。

○簡切辨證

小兒熱證有七

面腮紅。大便秘。小便黃。渴不止。上氣急。

足心熱。眼紅赤。此皆暑熱證。忌用溫補。

小兒寒證有七

面㿠白。鬢青白。肚虛脹。眼珠青。吐瀉無熱。  
足脛冷。睡露睛。此皆寒。忌用寒涼。

五臟所屬之證

肝者足厥陰木也。實則目赤。大呼。呵欠。頭暉。臨期而作。久安而有  
風則目連劄。有熱則目直視。成疳則白睛遮睛。主怒則性急。  
大呼哭甚則卵腫。熱則大小便難。手足衣領手執念物甚剝  
撮空摸物。此寒熱病也。兒病時。目睛視物不轉。口合不開。

或口開不合。或哭而無淚。或不哭而淚出。皆心絕也。

心者。少陰火也。實則叫喞。渴欲飲水。虛則呻吟悸動。不安。心血足則面色紅潤易養。心血虧則面色晝白。晝黃則津液乾而病渴。血虧而臥不安。喜欵欵。舌破成瘡。多爲重舌。舌舌出不收之病。凡病丹瘤。斑疹。龍纏虎晉。蟲蛇瘡瘍。皆心之證也。如心病久。汗出多。或舌出不收。暴瘡不語。或神昏。潰爛。或瘡癰。此皆心絕也。

肝者。足太陰土也。爲水穀之海。胃則困。身熱飲水虛則吐。氣上逆。則爲暎。爲脹。爲嘔。爲吐。故曰。痛則腹痛。脾痛則小便不利。則口角流涎。謂之滯。體氣不和。則口煩撮。虛則內削。

而瘦不喜飲食。傷食則成積，積久則成癥。久病內消，壯大青筋，或遍身虛腫，或吐瀉不止，飲食不入，或食而瘦，或蟲出於口，或脣塞而縮，皆肺絕也。

肺者，手太陰金也。實而悶亂，喘促，吸氣長出，經戶，其傷肺由兒之衣薄受寒也。經曰：「熱傷肺，由兒之衣厚，受寒也。」寒凝傷肺，則氣逆而爲喘，爲咳。肺受風，則噴嚏而流清涕。受寒，則鼻塞，呼吸不利。受熱，則鼻乾，或爲衄血。成疳，則鼻下有瘡。喘不正，則面腫。咳不正，則胸脅高聳。謂之膈。肺燥則渴，不好飲水。謂之膈。泊如肺入病，咳嗽連綿，喘息不休，或肩息，或齦脰，或欬血，或鼻孔黑燥，或鼻孔開張而喘，或瀉痢不休，大孔如筒，或面目虛浮，上喘氣逆，皆肺絕也。

賢者是少陰水也虛則目畏明目中白睛多其顏色㿠白骨髓不滿兒必畏寒多爲五軟之證尻骨不成則坐僵腰骨不成則行遲真陽不足則齒遲血脈不榮則髮稀心氣不足則語遲熱則耳中出曇生瘡腎病久身下竄目中如見鬼狀或骨痿弱臥不能起或二便遺失此腎敗也

○變蒸辨

幼科謂嬰兒生下三十二日爲一變六十四日爲二蒸變者變幼科謂嬰兒生下三十二日爲一變六十四日爲二蒸變者變生五臟恭者恭養六腑長氣血而生精神益智慧也積五百七十六日而畢凡遇蒸者身有熱或有驚惕而口面唇舌俱不變色身熱或重輕而精神尚常無異口中氣出溫和三四日間自愈或有熱不退者宜服小柴胡加玄參散

科中傑出者之言也。乃致其變蒸方中。有用硫銀丸之。巴豆水銀黑船京墨麝香之類。而安下之者。夫既曰長氣血。生精  
神益智。惟宜助其升。生可也。顧宜用毒劣滅其化元。不幾於非徒無益而又害之耶。據其說以周天三百六十五度。應人身三百六十五骨節。內除手足四十五餘骨。外止三百二十數。以生下一日主十段。十日百段。三十二日則三百二十段爲一變。而以天一生水。地二生火爲次序。則一變督。二變膀胱。三變心。四變小腸。五變肝。六變膽。七變肺。八變大腸。九變脾。十變胃。雖無實據。而理有可曉。卽令以此爲准。亦見確然不易之法。乃又以木火相生爲言者。則似爲一肝二膽三心四小腸五脾六胃七肺八大腸九腎十膀胱。復有以水

金相尅爲言者則又爲一肝三膽三肺四太陽五心六小腸  
七脾八胃九腎十膀胱矣夫小兒臟腑肯度生來已至毫不  
可以移易者則變蒸應有定理今則各逞己見各爲臆說然  
則臟腑竟可以倒置肯度亦可以更張是乖真僞從何究言  
謂天一生水者爲是則木火相生木金相尅者非矣謂木火  
相生木金相尅者爲是則天一生水者非矣徒滋葛藤迄無  
定論將使來早何所適從近來<sub>醫學</sub>茲非病可任其顛倒錯亂  
假使變然爲病率宜依經用藥者豈不以脾病而治腎膀胱  
病而治胃乎總之此等固執之言不可爲訓蓋天地陰陽之  
理數可限而不可限如五運六氣爲一定不易之規而有應  
至不至不應至而至往來安復玉客加臨有應不應之殊天

地尚且如斯而況兒之生風土不任賦累者異計令有  
膏肓非一而以此等定局以限其時應變其時固一臨  
證四十餘載從未見一兒依期作難而變者有自生自長未  
嘗一執者有生下十朝半月而常發作執者豈變服之謂乎  
凡小兒作熱總無一定不必拘泥後督母執以爲實而以之  
病作變蓋遷延時日誤事不小但依證治療自可全

張景岳曰小兒變蒸之說古所無也至西晉王叔和始一言之  
自隋唐顏氏以來則曰相傳滿其說益繁然以予觀之則似  
有未必外者何也蓋兒胎月足離懷氣質雖未成實而臨曉  
已皆完備及既生之後凡長養之癢則如月加苗一息不寐  
有閼百骸齊到自當時異而曰不同豈復有此先微後如一  
變而二變鴨狀及卯交以三十二日之理乎又如小兒之病  
與不病余所見者治者蓋亦不少凡屬溼和則不因外感以  
內傷初未聞有無因而病者豈真變蒸之謂耶又見保護  
亦不能信然系恐晦孟名有誤斂之誤故痛其愚成告此

明達者以  
爲然否

幼幼集成卷之一終