

傷寒論二

注解傷寒論卷第二

仲景述 王叔和撰次

成無巳注解

傷景以傷寒例第三

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷
冽此則四時正氣之序也春夏爲陽春溫夏熱者以
陽之動始於溫盛於暑故也秋冬爲陰秋涼而冬寒者以
陰之動始於清盛於寒故也冬時嚴寒萬類深藏
君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳冬三
月純陰用事陽乃伏藏水水地坼寒氣嚴凝當是之時善
攝生者出處固密去寒就溫則不傷於寒其涉寒令
觸冒霜雪爲病者謂之傷寒也其傷於四時之氣皆能爲病春風夏
暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷寒爲毒者以其最成殺厲之氣也爲熱

陽陽主生寒爲陰陰主殺陰中寒爲病最爲肅殺毒厲之氣

不卽病者寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲

暑病暑病者熱極重於溫也

內經曰先夏至日爲溫病後夏至日爲暑病溫

暑之病本傷於寒而得之故大暑均謂之傷寒也

是以辛苦之人春夏多溫

熱病皆由冬時觸寒所致非時行之氣也凡時行者

春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋時應

涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其

氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之

氣也

四時氣候不正爲病謂之時行之氣時氣所行

爲病非暴厲之氣感受必同是以一歲之中長

幼之病多相似也

夫欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之

法皆當按斗曆占之

四時正氣者春風夏暑秋濕
寒是也時行者時行之氣且延之

溫者冬時感寒至春發者是也疫者暴厲之氣是也
占前斗建審其時候之寒溫察其邪氣之輕重而治
之故下文曰

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨

水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而爲雨

水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋

便涼

冬寒春溫夏熱秋涼爲四時之正氣也

從霜降以後至春分以前

凡有解冒霜露體中寒卽病者謂之傷寒也

九月十月寒氣

尚微爲病則輕十一月十二月寒烈已嚴爲病則重
正月二月寒漸將解爲病亦輕此以冬時不調適有
傷寒之人卽爲病也此爲四時正氣中而卽病者也

其冬有非節之暖者名曰

冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重

亦有輕重爲治不同證如後章此爲時行之氣前
云冬時應寒而反
大溫者從立秋節後其中無暴大寒又不冰雪而有
人壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲
溫病此爲溫病也內經曰從春分以後至秋分節前
冬傷於寒春必病溫從春分以後至秋分節前
天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒
其時陽氣尙弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣
已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒
所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳
此爲疫氣也是數者以明前半曆之法
占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳十五日得一
氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也

節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲然氣

候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而太過者皆成病氣也凝漏或有至而不去此一句按而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此爲未至而至也以得甲子而天未溫和此爲至而不至以得甲子而天大寒不解此爲至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此爲至而太過也內經日至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者病卽是觀之說漏明矣但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳內經曰陰陽者天地之道清靜而不移天地陰陽之氣鼓擊而生是以彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒春暖爲夏暑從生而春秋冬寒熱溫涼各正一氣也陽爲天動而不息濁陰爲地

從肅而至殺也是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至

之後一陽氣下一陰氣上也

十月六爻皆陰坤卦爲用陰極陽來陽生於子

冬至之後一陽爻升一陰爻降於卦爲復言陽氣得

復也四月六爻皆陽乾卦爲用陽極陰來陰生於午

夏至之後一陽氣下一陰氣上於卦爲姤言陰得遇

陽也內經曰冬至四十五日陰氣

至四十五日陽氣微上陰氣微下夏

微上陽氣微下

斯則冬夏二至陰陽合也春秋二

微上陽氣微下

分陰陽離也

陽生於子陰生於午是陰陽相接故曰合陽退於酉陰退於卯是陰陽相背故

日離內經曰氣至之謂至氣分異

之謂分至則氣同分則氣異

天地陰陽之氣既交錯而不正人所以

變病內經曰陰陽相錯而變由生也

此君子春夏

以涼以寒秋冬養陰以溫以熱所以然者從其根故也

養陽秋冬養陰順天地之剛柔也內經曰養生者必

順於時春夏養陽

養陽秋冬養陰順天地之剛柔也內經曰養生者必順於時春夏養陽

養陽秋冬養陰順天地之剛柔也內經曰養生者必順於時春夏養陽

知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之

不能順四時調

養觸冒寒溫者必成暴病醫者當在意審詳而治之

是以春傷於風夏必飧泄

夏傷於暑秋必痃瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷於寒

春必病溫此必然之道可不審明之

當春之時風氣大行春傷於風

風氣通於肝肝以春適王風雖人之不能卽發至夏肝衰然後始動風淫未疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風不能外發故攻內而爲飧泄飧泄者下利米穀不化而色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則平於肺肺以秋適王濕雖人之不能卽發至冬肺衰然後濕始動也雨淫腹疾則當發爲下利冬以陽氣內固濕氣不能下行故上逆而爲咳嗽當夏之時暑氣大行夏傷於暑夏以陰爲主內暑雖入之勢未能動及秋陰出而陽爲內主然後暑動傳陰而爲痃瘧疾者二日一發瘧者一日一發當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽爲主內寒雖入之勢未能動及春陽出而陰爲內主然後寒動傳陽而爲溫病是感冒

四時正氣爲病必然之道傷寒之病逐日淺深以施方治未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨時消息制方無不効也今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方有神驗者擬防世急也仲景之書遠今千年而顯用於世者王叔和之力也又土地溫涼高下不同物性剛柔食居亦異是黃帝與四方之間岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟者臨病之工宜須兩審也東方地氣溫南方地氣熱西方地氣涼北方地氣寒東方地氣溫南方地氣熱西方地氣涼是土地溫涼高下不同也東方安食魚南方陵居華食南方濕處而嗜酸北方野處而食乳是食居之

異也東方治宜砭石西方治宜毒藥南方治宜微針
北方治宜灸焫是四方醫治不同也醫之治病當審
其土地所宜凡傷於寒則爲病熱熱雖甚不死內經曰風

使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱是傷寒爲病熱也若

鍼經曰多熱者易已多寒者難已是熱雖甚不死若

兩感於寒而病者必死表裏俱病者謂之兩感尺寸俱浮者太

陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛

腰脊強太陽爲三陽之長其氣浮於外故尺寸俱浮

腰脊強是邪氣初八皮膚外在表也當一二日發風

府穴名也項中央太陽之脉從巔入絡腦還出別下

項是以上連風府其經循肩膊內俠脊抵腰中故病

頭項痛

腰脊強尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其

脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥

陽明血氣俱多尺寸

俱長者邪併陽明而血氣淖溢也太陽受邪不已傳
於陽明是當二三日發其脈俠鼻者陽明脉起於鼻

交頸中絡於目陽明之脈正上頸還出繫目系身
熱者陽明主身之肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以前
皆熱目疼鼻乾者經中客邪也不得臥者胃氣
逆不得從其道也內經曰胃不和則臥不安 尺寸

俱弦者少陽受病也當三四日發以其脉循脇絡於

耳故胃脇痛而耳聾

內經曰陽中之少陽通於春氣
春脉弦尺寸俱弦者知少陽受

邪也

二三日陽明之邪不已傳於少陽是當
三四日發胃脇痛而耳聾者經壅而不利也此三經

皆受病未入於府者可汗而已

三陽受邪爲病在表
法當汗解然三陽亦

有便入府者入府則宜下故
云未入於府者可汗而已

尺寸俱沉細者太陰受

病也當四五日發以其脉布胃中絡於嗌故腹滿而

嗌乾

陽極則陰受之邪傳三陽既遍次乃傳於陰經
在陽爲在表在陰爲在裏邪在表則見陽脉邪

在裏則見陰脉陽邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而
脉尺寸俱沉細也自三陽傳於太陰是當四五日發

也邪入於陰則漸成熱腹滿而益乾者脾經壅而成熱也尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴少陰腎水也性趣下少陰受病脉尺寸俱傳於少陰也是少陰之邪不已至五六日則病熱謂始爲寒而終成熱也少陰爲病口燥舌乾而渴邪傳入裏熱氣漸深也尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮緩者風脉微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於風也當六七日發以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也此三經皆受病已入於腑可下而已三陰受邪爲病於府者可下而已經曰臨病之工宜須兩審在裏於法當下然三陰亦有在經者在經則宜汗故云已入於府者可下而已經曰臨病之工宜須兩審若兩感於寒者一日太陽受之卽與少陰俱病則頭痛口乾

煩滿而渴二日陽明受之卽與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讞語三日少陽受之卽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受病則榮衛不行府藏不通則死矣

陰陽俱病表裏俱傷者爲兩感以其陰陽兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽兩經俱傳也始得一日頭痛者太陽口乾煩滿而渴者少陰至二日則太陽傳於陽明而少陰亦傳於太陰身熱讞語者陽明腹滿不欲食者太陰至三日陽明傳於少陽而太陰又傳於厥陰耳聾者少陽囊縮而厥者厥陰水漿不入不知人者胃氣不通也內經曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故云不知人三日其氣乃盡故死矣謂三日六經俱病榮衛之氣不得行於內外府藏之氣不得通於上下至六日其不兩感府藏之氣俱盡榮衛之氣俱絕則死矣

於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛

少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰

耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十

一日少陰病衰渴止舌乾已而噫也十二日厥陰病

裏裹囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也六日傳遍

三陰三陽之氣皆和大邪之若過十三日以上不問

尺寸陷者大危間者瘳也十二日傳經盡則當瘳愈若過十三日已士不瘳尺寸之脉沉

陷者卽正氣內衰邪氣獨勝故云大危

若更感異氣變爲他病者當依舊壞證病而治之若脈陰陽俱盛重感於寒者變爲

溫瘡異氣者爲先病未已又感別異之氣也兩邪相合變爲他病據陰陽俱盛者傷寒之脉也難經

曰傷寒之脉陰陽俱盛而緊濶經曰脈盛身寒得之傷寒則爲前病熱未已再感於寒寒熱相傳變爲溫瘡陽脈浮滑陰脈濡弱者更遇於風變爲風溫此前熱未

歇又感於風者也難經曰中風之脉陽浮而滑陰濡而弱風來乘熱故變風溫陽脈洪數陰

脈實大者遇溫熱變爲溫毒溫毒爲病最重也此前熱未

已又感溫熱者也陽主表陰主裏洪數實大皆熱也兩熱相合變爲溫毒以其表裏俱熱故爲病最重

陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變爲溫疫以此冬

傷於寒發爲溫病脉之變證方治如說此前熱未已

也溫熱相合變爲溫疫凡人有疾不時卽治隱忍冀差以成痼

疾凡覺不佳急須求治苟延時日則邪氣入深難可復制于金曰凡有少苦似不如平常卽須早道若

隱忍不治冀望自差須臾之間以成痼疾此之謂也小兒女子益以滋甚小兒氣血

未全女子血室多病
凡所受邪易於滋蔓時氣不和便當早言尋其邪由
及在腠理以時治之罕有不愈者

腠理者津液腠泄之所文理縫會之

中也金匱要畧曰腠者是三焦通會元真之處爲血氣所注理者是皮膚藏府之文理也邪客於皮膚則邪氣浮淺易爲散發若以時治之罕有不愈者矣金匱玉函曰生候長存形色未病未入腠理針藥及時服將調節委以良醫病無不愈

患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制此爲家有患備慮之要

邪在皮膚則外屬陽而易治邪傳入裏則內屬

陰而難治內經曰善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也皆桓侯怠於皮膚之微疾以至骨髓之病家有患者不可備慮

凡作湯藥不可避晨夜覺病須臾卽宜便治不等早晚則易愈矣千金始覺不佳卽須治療迄至於病湯食競進折其毒勢自然而差

雖欲除治必難爲力傳有常也變無常也傳爲循經而傳如太陽傳陽明是也變爲本草曰病勢已成可得半愈病勢已過命將難全

服藥正如方法縱意違師不須治之內經曰拘於鬼至德惡於針石者不可與言至巧病不許治者病必不治治之無功矣

凡傷寒之病多從風寒得之凡中風與傷寒爲病自古通謂之傷寒于金曰夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛偏隅周身不通而病始

皮膚八於經絡傳於藏府是也未有溫覆而當不消散者風寒初客於皮膚便投湯藥溫暖發散而當不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之先解表而後下之則無復傳之邪也

若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不除表證雖罷裏不至大満者亦未可下之

是邪未收斂成實下之則裏虛而邪復不除猶生寒熱也若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎自可除下之雖四五日不能爲禍

也外無表證裏有堅滿爲下證悉具外臺云表和若裏病下之則愈下證既具則不必拘於日數若

不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利煩躁諸變不

可勝數輕者困篤重者必死矣

下之不當病輕者證猶變易而難治又矧

平重者夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗

之則愈下之則死

表爲陽裏爲陰陰虛者陽必湊之陽盛之邪乘其裏虛而入於府者

爲陽盛陰虛也經曰尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷

八陰中則發熱者是矣下之除其內熱而愈若反汗

之則竭其津液而死陰脈不足陽往從之陽脈不足

陰往乘之陰邪乘其表虛客於榮衛之中者爲陽虛

陰盛也經曰假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上八

陽中則酒漸惡寒者是矣汗之散其表寒則愈若反

下之則脫其正氣而死經曰本發汗而復下之此爲逆也本先下之而反汗之爲逆夫如是則

神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背

千里吉凶之機應若影響豈容易哉

神丹者發汗之藥也甘遂者下

藥也若汗下當則吉汗下不當則凶其應如影隨形如響應聲

況桂枝下咽陽盛則

斃承氣入胃陰盛以亡

桂枝湯者發汗藥也承氣湯下藥也金匱玉函曰不當

汗而強與汗之者令人奪其津液枯槁而死不當死下而強與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死死

生之要在乎須臾視身之盡不暇計日

投湯不當則日數哉災禍立見豈

暇計其日數哉此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之

相反其禍至速而醫術淺狹懵然不知病源爲治乃

悞使病者殞歿自謂其分至令冤魂塞於冥路死屍

盈於曠野仁者鑒此豈不痛歎凡兩感病俱作治有
先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹
甘遂合而飲之且解其表又除其裏言巧似是其理
實違夫智者之舉錯也常審以慎愚者之動作也必
果而速安危之變豈可詭哉世上之士但務彼翕習
之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能護其本近
取諸身夫何遠之有焉兩感病俱作欲成不治之疾
醫者大宜消息審其先後次第而治之若妄意攻治以求速効者必致傾危之敗凡發汗溫服湯藥其方雖
言日三服若病劇不解當促其間可半日中盡三服
若與病相阻卽便有所覺重病者一日一夜當猝時

觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至有
不肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也

發汗藥須溫暖

服者易爲發散也日三服者藥勢續也病勢稍重當促急服之以折盛熱不可拘於本方設藥病不相對湯八卽便知之如陰多者投以涼藥卽寒逆隨生陽多者飲以溫劑則熱毒卽起是便有所覺時者周時也一日一夜服湯藥盡劑更看其傳如病證猶在當復作本湯以發其汗若服三劑不解汗不出者邪氣大甚陽不能勝必成大疾千金曰熱病脈躁盛而不得汗者此陽脉之極也死

凡得時氣

病至五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中熱尙少不能消之便更與人作病也至七八日大渴欲飲水者猶當依證與之與之常令不足勿極意也言欲飲一斗與五升若飲而腹滿小便不利

若喘若嘔不可與之忽然大汗出是爲自愈也

熱在上焦

則爲消渴言熱消津液而上焦乾燥則生渴也大熱則能消水熱少不能消之若強飲則停飲變爲諸病至七八日陽勝氣溫向解之時多向生大渴亦須少少與之以潤胃氣不可極意飲也若飲而腹滿小便不利若喘若嘔者爲水飲內停而不散不可更與凡之忽然陽氣通水氣散先發於外作大汗而解凡得病反能飲水此爲欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自愈小渴者乃強與飲之因成其禍不可復數小渴者爲腹中熱少若強與水水飲不消復爲諸飲病也凡得病厥脈動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈證也

動數之脉邪在

陽也湯入而變遲者陽邪愈也浮大之脉邪在表也而復減小者表邪散也病初躁亂者邪所煩也湯入而安靜者藥勝病也是皆爲愈證

九治溫病可刺五十九穴

五十九穴者以

寫諸經之溫熱鍼經曰熱病取之諸陽五十九穴刺以寫其熱而出其汗實其陰而補其不足所謂五十刺兩手內外側各三凡十二瘡五指間各一凡八痛足亦如是頭入髮際一寸旁三分各三凡六瘡更八髮三十邊五凡十瘡耳前後口下各一項中一穴凡六瘡顴上一顎會一髮際一廉泉一風池二天柱二又內經曰熱俞五十九頭上五行行五者以寫諸陽之熱逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者以寫胃中之熱也氣衝三里巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱也雲門鶻骨委中髓空此八者以寫四支之熱也五藏俞旁五此十者以寫五藏之熱也凡此五十九穴者皆熱之左右也人身之穴三百六十有五其三十九穴灸之有害七十九穴刺之爲災并中髓也穴有三百六十五以應一歲其灸刺之禁皆肉薄骨解之處血脉虛少之分鍼灸并中凡脉四損三日死平人四息病人脉一至名髓也

曰四損脈五損一日死平人五息病人脉至名曰

五損脈六損一時死平人六息病人脈一至名曰六

損

四藏氣絕者脈四損五藏氣絕者脈五損

六府俱絕者

脈六損

脉盛身寒得之

傷寒

脈虛身熱得之傷暑

內經曰

脈者血之府也

脈

盛而身寒

血邪併於血則血盛而氣虛故傷寒者脈盛而身寒

熱則傷氣

邪併於氣則氣盛而血虛故傷暑者脈虛

而身熱

而出不熱

則傷氣內勝正氣外脫故死

內經曰

汗出而解若汗

出不解則

邪氣內勝正氣外脫故死

內經曰

汗出而

脉尚躁盛者死

千金曰熱病已得汗脉尚躁盛此陽

脉之極

脉陰陽俱虛者真

死也

脉陰陽俱盛大汗出不解者死

脈陰陽俱盛當

而出而解若汗

出不解則

邪氣內勝正氣外脫故死

內經曰汗出而

脉尚躁盛者死

千金曰熱病已得汗脉尚躁盛此陽

脉之極

脉陰陽俱虛者真

死也

脉陰陽俱虛者死

脉至乍疎乍數者死

爲天

真榮衛

病溫虛甚者死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

脉至如轉索者其日死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

妄語身微熱脉浮大手足溫者生逆冷脉沉細者不

邪氣勝也內經曰

脉至乍疎乍數者死

爲天

真榮衛

病溫虛甚者死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

脉至如轉索者其日死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

妄語身微熱脉浮大手足溫者生逆冷脉沉細者不

脉至如轉索者其日死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

妄語身微熱脉浮大手足溫者生逆冷脉沉細者不

脉至如轉索者其日死

爲緊急而不軟是中無

氣斷絕也

妄語身微熱脉浮大手足溫者生逆冷脉沉細者不

脉至如轉索者其日死

過一日死矣

讞言妄語陽病也身微熱脈浮大手足溫爲脈病相應若身逆冷脈沉細爲陽

病見陰脉脉病不相應故不過一日而死

難經曰脉不應病病不應脉是爲死病

此以前是

傷寒、熱病證候也

辨痓濕暍脉證第四

傷寒所致太陽痓濕暍三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之

痓當作痓傳寫之誤也痓者惡也非強也內經曰肺移熱於腎傳爲柔痓柔爲筋柔而無力痓謂骨痙而不隨痓者強也千金以強直爲痓經曰頸項強急口噤背反張者痓卽是

觀之痓爲痓字明矣太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓千金

曰太陽中風重感寒濕則變痓太陽病發熱無汗爲表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感於寒爲痓病也以表實感寒故名剛痓

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰

柔症

太陽病發熱汗出爲表虛則當惡寒其不惡寒者爲陽明證

證則是太陽中風重感於濕爲

柔症也表虛感濕故曰柔症

太陽病發熱脉沉而

細者名曰症

太陽主表太陽病發熱爲表病脉當浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重

感於濕而爲症也金匱要畧曰太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此爲症括葛桂枝湯主之

陽病發汗太多因致症

太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔則

筋脈緊急不能養筋則病身熱足寒頸項強急惡寒

時頭熱面赤目脉赤獨頭面搖卒口噤背反張者症

病也

太陽中風爲純中風也太陽傷寒爲純傷寒也皆不作症惟是太陽中風重感寒濕乃變爲症

也身熱足寒者寒濕傷下也時頭熱面赤目脉赤風傷於上也頭搖者風主動也獨頭搖者頭爲諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦爲之動搖手足爲之

搐搦此者內挾寒濕故頭搖也口噤者寒主急也卒

口噤皆不常噤也。有時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此者加之風濕故卒口噤也。足太陽之脈起於目內，背上額交顛上其支別者從顛入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客於經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也。太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候其人小便不利大便

反快但當利其小便

金匱要略曰霧傷皮腠濕流關節疼痛而煩者濕氣內流也

同水也。脈沉而細者水性趣下也。痺痛也。因其關節煩疼而名曰濕痺非陽氣之痺也。內經曰濕勝則濡泄小便不利大便反快者濕氣內勝也。但當利其小便以宣泄腹中濕氣古云治濕之病不利小便非其

治也。濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃

身黃如橘

子色者陽明瘀熱也。此身色如似熏黃卽非陽明瘀熱身黃發熱者梔子藥皮湯主之爲表裏有熱則身不疼痛此一身盡疼非傷寒客熱也。知濕邪在經而使之脾惡濕濕傷則脾病而色見是以身發黃者爲

其黃如煙重
非正黃色也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向

火若下之早則嘔胃滿小便不利舌上如脂者以丹

田有熱胷中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也

濕家有風濕有寒濕此寒濕相搏者也濕勝則多汗

傷寒則無汗寒濕相搏雖有汗而不能周身故但頭

不出也皆陽也腹陰也太陽之脈夾脊抵腎太陽客

寒濕表氣不利而背強也裏有邪者外不惡寒表有

邪者則惡寒欲得被覆向火者寒濕在表而惡寒也

若下之早則傷動胃氣損其津液故致嘔而胷滿小

便不利下後裏虛上焦陽氣因虛而陷於下焦爲丹

田有熱表中寒乘而入於胷中爲胷上有寒使舌上

生白胎滑也藏燥則欲飲水以胷上

濕家下之額上

客寒濕故不能飲而但口燥煩也

汙出微喘小便利者死若下利不止者亦死

濕家發汗則愈

金匱要畧曰濕家身煩疼可與麻黃加术四兩發其

汗爲宜若妄下則大逆額上汗出而微喘者乃陽氣

上逆也小便自利或下利者陰氣下流也陰陽相離故云死矣內經曰陰陽離決精氣乃絕風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也荅曰發其汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也值天陰明其濕勝也內經曰陽受風氣陰受濕氣又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之風濕相搏則風在外而濕在內汗大出者其氣暴暴則外邪出而裏邪不能出故風去而濕在汗微微而出者其氣緩緩則內外之邪皆出故風濕俱去也濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈病有淺深證有中外此則濕氣淺者

也何以言之濕家不云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣不施關節而外客肌表也不云發熱身微熏黃復云發熱面黃而喘是濕不干於脾而薄於上焦也陰受濕氣則濕邪爲深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脈當沉細爲濕氣內流脈大者陽也則濕不內流而外在表也又以自能飲食胃腹別無滿痞爲腹中和無病知其濕氣微淡內藥鼻中以宣泄頭中寒濕病者一身盡

疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風

或久傷取冷所致也

一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之

者則先客濕而後感風若久傷取冷得之者則先傷風而後中濕可與麻黃杏仁薏苡仁甘草湯見金匱要略

中太陽中熱者暯是也其人汗出惡寒身熱而渴也

汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡寒身熱而渴者中暯也白虎加人參湯主之見金匱要略

中太陽中暯者身熱疼重而脉微弱此亦夏月傷冷方

水水行皮中所致也

經曰

脈虛身熱得之傷暑身熱

也夏時暑熱以水灌洗而得之一物爪帶散主之見金匱要略中方

大陽中暎者發熱

惡寒身重而疼痛其脈弦細芤遲小便已洒洒然毛

聳手足逆冷小有勞身卽熱口開前板齒燥若發汗

則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

病有在表有在裏者

有表裏俱病者此則表裏俱病者也發熱惡寒

身重疼痛者表中暎也脈弦細芤遲者中暑脈虛也

小便已洒洒然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足也

小有勞身卽熱者謂勞動其陽而暎卽發也口開前

板齒燥者裏有熱也內經曰因於暑汗煩則喘喝口開謂喘喝也以喘喝不止故前板齒乾燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫針助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內虛而膀胱

燥故

淋甚

辨太陽病脈證并治法上第五

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮者太陽受病大

陽受病太陽主表爲諸陽主氣脈浮頭項強痛而惡寒者太陽表病也

太陽病發熱汗

出惡風脈緩者名爲中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風

也榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以衛爲陽衛外者也病則不能衛固其外而皮腠踈故汗出而惡風也傷寒脈緊

傷風脉緩者寒性勁急而風性解緩故也

太陽病

或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊

者名曰傷寒

經曰凡傷於寒則爲病熱爲寒氣客於經中陽經怫結而成熱也中風卽發熱

者風爲陽也及傷寒云或已發熱或未發熱以寒爲陰邪不能卽熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣病者則麻血病者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆

者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒脈陰陽俱緊者知其傷寒也傷寒一日太陽受

之脉若靜者爲不傳頗欲吐若燥煩脈數急者爲傳

也

太陽主表一日則太陽受邪至二日當傳陽明若

脉氣微而不傳陽明胃經受邪則喜吐寒邪傳裏

者則變熱如顛欲吐若煩燥脉急數

傷寒二三日陽

陽經

者爲太陽寒邪變熱傳於陽明也

傷寒二三日陽明少陽證知邪不傳止在太

陽明少陽證不見者爲不傳也傷寒二三日無陽明少

陽證知邪不傳止在太

陽經

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病

發熱而渴

不惡寒者

陽明也此太陽受邪知爲溫病非傷寒也積溫成熱所以發熱而渴不惡寒也

若發汗已身

灼熱者名曰風溫風溫爲病脉陰陽俱浮自汗出身

重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利

直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘧癰

直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘧癰

若火熏之一逆尙引日再逆促命期

傷寒發汗已則身涼若發汗已

身灼熱者非傷寒爲風溫也風傷於上而陽受風氣
風與溫相合則傷衛脈陰陽俱浮自汗出者衛受邪
也衛者氣也風則傷衛溫則傷氣身重多眠瞞者衛
受風溫而氣昏也鼻息必鼾語言難出者風溫外甚
而氣擁不利也若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也
內經曰膀胱不利爲癃不約爲遺溺癃者小便不利
也太陽之脉起目內眞內經曰瞳子高者太陽不足
眼者太陽已絕小便不利直視失溲爲下後渴津
液損滿氣風溫外勝經曰欲絕也爲難治若被火者
則火助風溫成熱微者熱瘀而發黃劇者熱甚生風
如驚癇而時瘻瘍也先曾被火爲一逆若更以火熏
之是再逆也一逆尙猶延引時日而不愈其再逆者
必致危殆故病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒
云促命期

者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以
陽數七陰數六故也

陽爲熱也陰爲寒也發熱而惡寒寒傷寒寒傷陽也無熱而惡寒寒傷

陰也陽法火陰法水火成數七水成數六陽病七日愈者火數足也陰病六日愈者水數足也太陽病頭痛至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明使經不傳則愈傷寒自一日至六日傳三陽三陰經盡至七日當愈經日七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽之邪再傳陽明對足陽明爲迎而奪之使經不傳則愈太陽病欲解時從巳至未土巳爲正陽則陽氣得以復也始於太陽終於厥陰六經各以三時爲解而太陽從巳至未陽明從申至戌少陽從寅至辰至於太陰從亥至丑少陰從子至寅厥陰從丑至卯者以陽行也速陰行也緩陽生於晝陰生於夜陽三經解時從寅至戌以陽道常饒也陰三經解時從亥至卯以陰道常乏也內經曰陽中之太陽通於夏氣則巳午未太陽風家表解而不了了者十二日愈中風家乘主也後未全快暢者十二日大病人身大熱反欲得近衣邪皆去六經悉和則愈

者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒
在皮膚熱在骨髓也皮膚言淺骨髓言深皮膚言外
裏寒也身寒不欲衣者表寒裏熱也太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱

自發陰弱者汗自出嗌嗌惡寒淅淅惡風翕翕發熱
鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之陽以候衛陰以候榮陽脈
榮氣弱也風弁於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出
也經曰太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛强者是也
嗌嗌者不足也惡寒之貌也淅淅者洒淅也惡風之
貌也衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡
風者以自汗出則皮膚緩腠理疎是亦惡風也翕翕
者熇熇然而熱也若合羽所覆言熱在表也鼻鳴乾
嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風邪也

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮味辛熱

芍藥

三兩味酸微寒

甘草

二兩炙味甘平

生薑

三兩切味辛溫

大棗

十二枚擘味甘溫

內經曰辛甘發散爲陽桂枝湯辛甘之劑也所以
風邪內經曰風淫所勝平以辛佐以苦甘以
甘緩之以酸收之是以桂枝爲主芍藥甘草爲佐
也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之是以生
薑大棗爲使也

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒
溫覆令一時許遍身漸漸微似有汗者益佳不可
令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服
不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促

役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

頭痛者太陽也

發熱汗出惡風者中風也與桂枝湯解散風邪

太陽病項背強几几反汗出

惡風者桂枝加葛根湯主之

則伸頸搖身而行項背

強者動則如之頸背几几者當須汗反汗出惡風者

中風表虛也與桂枝湯以和表加麻黃葛根以祛風

且麻黃主表實後葛根湯證云太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之藥味正與此方同其無汗者

當用麻黃今日汗出恐不加麻黃但加葛根也

太陽病下之後其氣上衝者

可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

病屬太陽

表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳裏若氣上衝者
裏不受邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復
與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪
爭邪氣已傳裏也故不可更與桂枝湯攻表

太陽

病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此爲壞

病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之

太陽

病三日中曾經發汗吐下溫針虛其正氣病仍不解
者謂之壞病言爲醫所壞病也不可復與桂枝湯審
觀脈證知犯何逆而治桂枝本爲解肌若其人脉浮
之逆者隨所逆而救之

緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也

脉浮

發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脉浮
發熱汗不出者傷寒也可與麻黃湯常須識此勿妄
治

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜

甘故也

酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘酒客得之則中滿而嘔

喘家作桂枝湯

加厚朴杏子仁

太陽病爲諸陽主氣風甚氣擁則生喘也與桂枝湯以散風加厚朴杏仁

以降

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

內熱者服桂枝湯則

吐如酒客之類也既亡津液又爲熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺痿金匱要略曰熱在上焦爲肺痿謂或從汗或從嘔

太陽病發汗遂漏不止其人惡吐重亡津液故得之

風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主

之大陽病因發汗遂汗漏不止而惡風者爲陽氣不足因發汗陽氣益虛而皮腠不固也內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則出小便難者汗出亡津液陽氣虛弱不能施化四肢者諸陽之本也四肢

微急難以屈伸者亡陽而脫液也針經曰液脫者骨屬屈伸不利與桂枝加附子湯以溫經復陽

陽病下之後脉促腎滿者桂枝去芍藥湯主之若微

惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

脈來數時一止復來者名曰促

促爲陽盛則不因下後而脉促者也此下後脉促不得爲陽盛也

太陽病下之其脉促不結胷者此爲欲解此下後脉促而復胷滿則不得爲欲解由下後陽

虛表邪漸入而客於胷中也與桂枝湯以散客邪通

行陽氣芍藥益陰陽虛者非所宜故去之陽氣已虛

若更加之微惡寒則必當溫刺以散之故加附子

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其

人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者爲欲

愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下

更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小

汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

傷寒八九日則邪傳再經又遍三陽

欲傳三陰之時也傳經次第前三日傳遍三陽至四日陽去入陰不入陰者爲欲解其傳陰經第六日傳

遍三陰爲傳經盡而當解其不解傳爲再經者至九
日又遍三陽陽不傳陰則解如瘡發作有時也寒多
者爲病進熱多者爲病退經曰厥少熱多其病爲愈
寒多熱少陽氣退故爲進也今雖發熱惡寒而熱多
寒少爲陽氣進而邪氣少也裏不和者嘔而利今不
嘔清便自調者裏和也寒熱間日發者邪氣深也日
一發者邪氣復常也日再發者邪氣淺也日二三發
者邪氣微也內經曰大則邪至小則平言邪甚則脉
大邪少則脉微今日數多而脈微緩者是邪氣微緩
也故云微愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表也陰
裏也脉微爲裏虛寒爲表虛以表裏俱虛故不可
更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱
色者表未解也熱色爲赤色也得小汗則和不得汗
則得邪氣外散皮膚而爲痒也與桂枝麻黃各半湯
小發其汗以除表邪

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風

池風府却與桂枝湯則愈煩者熱也服桂枝湯後當
解者風甚而未能散也先刺風池風府以通大陽之經而泄風氣却與桂枝湯解散則愈服桂枝

湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯經曰如服一劑病證猶在也與桂枝二麻黃一湯解散榮衛之邪服桂枝湯大汗出後大煩渴不

解脉洪大者白虎加人參湯主之

大汗出脈洪大而不渴邪氣猶在表

也可更與桂枝湯若大汗出脈洪大而煩渴不解者表裏有熱不可更與桂枝湯可與白虎加人參湯生津止渴和太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此表散熱

無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯方

桂枝二越婢一湯方

桂枝皮

芍藥

甘草

各十
八錢

生薑一兩
三錢

大棗

四枚
寧

麻黃

十八錢
秦絲

石膏

二十四錢
碎綿裹

桂枝

二十一錢
蜜丸

胃爲十二經之主脾治水穀爲卑臟若脾內經曰
脾主爲胃行其津液是湯所以謂之越婢者以發
越脾氣通行津液外臺方
一名越脾湯卽此義也

右七味㕮咀以五升水煮麻黃一二沸去上沫內
諸藥煮取二升去滓溫服一升本方當歲爲越婢
湯桂枝湯合飲一升今合爲一方桂枝二越婢一
服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下
滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

頭項強痛翕翕發熱雖經汗下爲邪氣仍在表也心
下滿微痛小便利者則欲成結胷今外證未罷無汗
小便不利則心下滿微痛爲停飲也與桂枝湯以解外
加茯苓白朮利小便行留飲傷寒脈浮

自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

脈浮自汗

出小便數而惡寒者陽氣不足也心煩腳攣急者陰氣不足也陰陽血氣俱虛則不可發汗若與桂枝湯攻表則又損陽氣故爲誤也得之便厥咽中乾煩燥

吐逆者先作甘草乾薑湯復其陽氣得厥愈足溫乃

與芍藥甘草湯益其陰血則腳脰得伸陰陽雖復其有胃燥讐語少與調胃承氣湯微溏以和其胃重發汗爲亡陽加燒鍼則損陰內經曰榮氣微者加燒鍼則血不流行重發汗復燒鍼是陰陽之氣大虛四逆

陽以復陰

甘草乾薑湯方

甘草

四兩炙
味甘平

乾薑

二兩炮
味辛熱

內經曰辛甘發散爲陽甘
草乾薑相合以復陽氣

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯方

白芍藥

四兩苦
酸微寒

甘草

四兩炙
味甘平

芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以
收之甘以緩之酸甘相合用補陰血

右二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分溫再

服之

調胃承氣湯方

大黃

四兩去皮清酒浸

甘草

二兩炙味甘平

芒硝

半升味鹹苦大寒

內經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒

以除熱大黃苦寒以蕩實甘草苦平助二物推陳

而緩

中

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服之

四逆湯方

甘草

二兩炙味甘平

乾薑

一兩半味辛熱

附子

一枚生用去皮破八片辛大熱

內經曰寒淫於內治以甘熱又曰寒淫所勝平以

辛熱甘草薑附相合爲甘辛大熱之劑乃可發散

陰陽

之氣

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服強人可大附子一枚乾薑三兩

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而讞語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則爲風大則爲虛風則生微熱虛則兩脰攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩燥陽明內結讞語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足當熱脰尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脰伸以承氣湯微溏則止其讞語故知病可愈

陽旦桂枝湯別名也前證脈微自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急與桂枝湯證相似是證象陽旦也與

桂枝湯而增劇得寸口脈浮大浮爲風邪大爲血虛
卽於桂枝湯加附子溫經以補虛增桂令汗出以祛
風其有治之之逆而增厥者與甘草乾薑湯陽復而
足溫更與芍藥甘草湯陰和而脛伸表邪已解陰陽
已復而有陽明內結讝語煩亂少與調胃承氣湯微
溏泄以和其胃則陰陽之氣皆和內外之邪悉去故
知病可愈

釋音

清涼上七正切疫音忿孕吻切疹之忍切
正切役切食泄上音孫顚頤音薛顚
信音疚音皆瘡也顚頤上音拙面骨也逮音代悲廉切
焮如劣中病土音之長音益徒合石針也
下計瘳音抽病痼音益沓切俱見琨
嚏切愈也固迄計訖切狹憎上戶甲切
疽羽粉眸祖對切痛羽軌膺於陵切
疽周歲也痛切腫也鶻音偶又音
疽腫也腫也鶻虞有前也

痘

充至切惡也

瘡

巨井切

瘧

音謁傷

瘧

巨井切

瘧

一 日 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

几 几 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

几 几 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

瘧

汗 出 路 恒 風 痘

瘧

暑 也

瘧

強 急 也

瘧

羽 鳥 飛

同人

卷三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

燒

升山

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

腎

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

脾

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

注解傷寒論卷第三

漢張仲景述

王叔和撰次

成無巳注解

辨太陽病脈證并治法中第六

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

太陽病項背強

凡汗出惡風者中風表虛也項背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也

葛根湯方

葛根肆兩麻黃三兩桂二兩芍藥三兩

去節去皮

甘草二兩生薑三兩大棗十二枚擘

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也

右柒味咬咀以水壹斗先煮麻黃葛根減貳升去沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

傷寒、有合病

併病本太陽病不解併於陽明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽少陽合病陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中其邪太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

但不利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不下利與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣

葛根加半夏湯

葛根

肆兩

麻黃

三兩去節湯泡

生薑

三兩切

甘草

二兩炙

芍藥

二兩

桂枝

二兩去皮

大棗

十二枚擘

半夏

半升洗

右捌味以水壹斗先煮葛根麻黃減貳升去白沫
內諸藥煮取參升去滓溫服壹升覆取微似汗
太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解
也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之經曰不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利桂枝證者邪在表也而反下之虛其腸胃爲熱所乘遂利不止邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉不利脈遲微邪在裏也促爲陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者爲自汗

出而喘也卽邪氣外甚所致喘而汗出者爲因喘而出也卽裏熱氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表裏熱邪除

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤

甘草二兩

炙黃芩二兩

苦寒黃連三兩

味甘苦寒

內經曰甘發散爲陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

右肆味以水捌升先煮葛根減貳升內諸藥煮取貳升去滓分溫再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而

喘者麻黃湯主之

此太陽傷寒也寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者太

陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱者寒在表也風并於衛衛實而榮

虛者自汗出而惡風寒也。非於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也。以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗。

麻黃湯方

麻黃

三兩味甘溫去節

桂枝

三兩去皮味辛熱

甘草

一兩炙味甘平

杏仁

七枚尖皮去核湯去

杏仁

味辛溫

內經曰

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

右肆味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

太陽與陽明合病喘而胷滿者不可下宜麻黃湯主

之陽受氣於腎中喘而腎滿者陽氣不宣發壅而逆也心下滿腹滿皆爲實當下之此以爲腎滿非裏實故不可下雖有陽明然與太陽合病爲屬表是與麻黃湯發汗太陽病十日已去

脈浮細而嗜臥者外已解也設腎滿脇痛者與小柴

胡湯脉但浮者與麻黃湯

十日以去向解之時也脈浮細而嗜臥者表邪已罷

也病雖已和解之若脈但浮而不細者則邪氣但在表也與麻黃湯發散之

太陽中風脉

浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞶此爲逆也大青龍湯主之

此中風見寒脉也浮則爲風風則傷

衛緊則爲寒寒則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛者爲榮弱衛強寒并於榮者爲榮強衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不出汗而煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若脈微弱汗出惡

風者爲榮衛俱虛反服青龍湯則必亡
陽或生厥逆筋惕肉瞶此治之逆也

大青龍湯方

麻黃

六兩去節
味甘溫

桂枝

貳兩去皮
味辛熱

甘草

貳兩炙
味甘平

杏仁

肆拾箇剉
味甘溫

生薑

參兩切
味辛溫

大棗

拾貳枚擘
味甘溫

石膏

如雞子大碎
味甘微寒

辛甘均爲發散然風宜辛散寒宜甘發以辛甘相合乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發散榮中之寒桂枝薑棗以解除衛中之風

右藥味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升取微似汗汗出多者溫粉粉之壹服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風

煩躁不得眠也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大

青龍湯發之

此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故身不疼中風者身重此以兼風故

乍有輕時不久厥吐利無少陰裏證者爲風寒外甚也與大青龍湯以發散表中風寒

傷寒表

不解心下有水氣乾嘔發熱而渴或渴或利或噎或

小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之

傷寒表不解心下有

水飲則水寒相搏肺寒氣逆故乾嘔發熱而咳針經曰形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行此之謂也與小青龍湯發汗散水水氣內瀆則所傳不一故有或爲之證隨證增損以解化之

小青龍湯方

麻黃參兩去節

味甘溫

芍藥參兩味

酸微寒

五味子

半升味酸溫

乾薑

參兩味
辛熱

甘草

參兩炙
味甘平

細辛

參兩味
辛溫

桂枝

參兩去皮
味辛熱

半夏

半升湯洗
味辛微溫

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛
甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經
曰腎苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以
行水氣而潤腎欬逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲
收急食酸以收之芍藥五味
子之酸以收逆氣而安肺

右捌味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內諸
藥煮取參升去滓溫服壹升

加減法若微利者去麻黃加蕓花如雞子熬令
赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其

陽水

瀆八胃必作利蕓花下十二水去利則止

若渴者去半夏加栝蔞根參兩辛燥而苦潤半

夏辛而燥津液非渴者所宜故去之括蔞味苦而
生津液故加之若噎者去麻黃加附子一枚炮

經曰水得寒氣冷必相搏其人卽渴加附子溫散
水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐或去麻黃惡
發汗若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩
水畜下焦不行爲小便不利少腹滿麻黃發津液
於外非所宜也茯苓泄畜水於下加所當也若
喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其
人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也
喘呼形腫水氣標本之疾

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者

此寒去欲解也小青龍湯主之

欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表

證未罷也與小青龍湯發表散水服

渴已渴者裏氣溫水氣散爲欲解也

太陽病外證未

解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

脈浮弱者榮弱衛強也

太陽

病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主

之下後大喘則爲裏氣太虛邪氣傳裏正氣將脫也
微喘則爲裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也

與桂枝湯以解外加厚朴杏仁以下逆氣

太陽病外證未解者不可下也

下之爲逆欲解外者宜桂枝湯主之

經曰本發汗而復下之爲逆也

若先發汗治不爲逆

太陽病先發汗不解而復下之脉浮者不

愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外

當須解外則愈宜桂枝湯主之

經曰柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證

仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆則其類矣

太陽病脉浮緊無汗發熱

身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已

微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽

氣重故也麻黃湯主之

脉浮緊無汗發熱身疼痛太陽傷寒也雖至八九日而表

證仍在亦當發其汗既服溫暖發散湯藥雖未作大汗亦微除也

頗者身熱也邪氣不爲汗解鬱而變熱

蒸於經絡發於肌表故生熱煩肝受血而能視始者寒氣傷榮寒既變熱則血爲熱搏肝氣不治故目瞑也劇者熱甚於經迫血妄行而爲衄得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃陽以解前太陽傷寒之邪也太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈在經不得汗解鬱而變熱衄則熱隨血散故云自衄者愈二陽併病太陽初得病時二陽俱發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何

以知汗出不徹以脉濇故知也

太陽病未解傳併人陽明而太陽證未罷

者名曰併病續自微汗出不惡寒者爲太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未罷者爲表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明之經循面色緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從出擁甚於經故躁煩也邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更發汗則愈內經曰諸過者一切之濇者陽氣有餘爲身熱無汗是以脉濇知陽氣擁鬱而汗出不徹脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈經曰諸脈浮數當發熱而灑淅惡寒言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脉實者則下後裏虛邪氣乘虛傳裏也今尺脉微身

重心悸者知下後裏虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏氣實津液足便自汗脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不足血少故也針經曰奪血者無汗尺脈遲脉浮者病在表可發者爲榮血不足故不可發汗脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯浮爲輕手得之以候皮膚之氣內經曰其在皮者汗而發之脉浮而數者可發汗宜麻黃湯浮則傷衛數則傷榮榮衛病受邪爲病在表故當汗散病常自汗出者此爲榮氣和者外不諧以衛氣不其榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯風邪而榮不病者爲榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮腠是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則

愈病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣

不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

藏無他病
裏和也衛

氣不和表病也外臺云裏和表病汗之則愈所謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈

傷寒

脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

傷寒脉浮緊邪在表也當

與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出權甚於經迫血妄行因致衄也

傷寒不大便六

七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏

仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

不大便六

七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經日小便數者大便必鞶不更衣十日無

所苦也况此不大便六七日小便清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已爲表

不罷鬱甚於經迫血妄行上爲衄也傷寒發汗解半日許復煩脈浮數

者可更發汗宜桂枝湯主之

煩者熱也發汗身涼爲已解至半日許身復熱

脈浮數者邪不盡也

可更發汗與桂枝湯凡病若發汗若吐若下若亡津

液陰陽自和者必自愈

重亡津液則不能作汗必待陰陽自和乃自愈矣

大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得

小便利必自愈

因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津液足小便利必自愈也

下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱

虛故也

發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血下振寒者陽氣微也脈微細者陰血弱也

之後復發汗晝日煩躁不得眼夜而安靜不嘔不渴

無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

下之虛其

裏汗之虛其表裏申又汗則表裏俱虛陽主於晝陽欲復虛不勝邪正邪交爭故晝日煩躁不得眼夜陰

王陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴者裏無
熱也身無大熱者表無熱也又無表證而脉沉微知
陽氣大虛陰寒氣勝與
乾薑附子湯退陰復陽

乾薑附子湯方

乾薑

壹兩味辛熱

附子

壹枚生用去皮破搘片味辛熱

內經曰寒淫所勝平以辛熱劑勝之也

右貳味以水叁升煮取壹升去滓頓服

發汗後身疼痛脈沉遲者桂枝芍藥生薑各一兩

人參三兩新加湯主之

汗後身疼痛邪氣未盡也脈沉遲榮血不足也經曰其脈

沉者榮氣微也又曰遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可

與麻黃杏仁甘草石膏湯主之

發汗後喘當作桂枝
加厚朴杏仁湯汗出

則喘愈今汗出而喘爲邪氣擁甚桂枝湯不能發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣甚也無大熱者表邪必甚也與麻

黃杏仁甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃

肆兩去節味甘溫

杏仁

伍拾箇去皮尖味甘溫

甘草

貳兩炙味甘平

石膏

半斤碎綿裹味甘寒

內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以純甘之劑發之

右肆味以水柒升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升

發汗過多其人久手自胃心心下悸欲得按者桂枝

甘草湯主之

發汗過多亡陽也陽受氣於腎中腎中

陽氣不足故病以手自胃心心下悸欲

得按者與桂枝甘草

湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方

桂枝

肆兩去皮

甘草

貳兩炙

桂枝之辛走肺而益氣
甘草之甘入脾而緩中

右貳味以水參升煮取壹升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大

棗湯主之

汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而
腎氣發動也腎之積名曰奔豚發則從少

腹上至心下爲腎氣逆欲上凌心今臍下悸爲腎氣
發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降

氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓

半斤味
甘平

甘草

貳兩炙
味甘平

大棗

拾伍枚擘
味甘平

桂枝

肆兩
去皮

茯苓以伐腎邪
助脾土以平腎氣
桂枝能泄奔豚
煎用甘瀉水者
甘草大棗之甘滋
氣也

右肆味以甘瀉水壹斗先煮茯苓減貳升內諸藥
煮取叁升去滓溫服壹升日叁服作甘瀉水法取
水貳斗置大盆內以杓揚之水上有珠子伍陸千
顆相逐取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

吐後腹脹與下後腹滿皆爲實言邪氣乘虛入裏爲實發汗後外已解也腹脹滿知非裏實由脾胃津液不足氣滯不通壅而爲滿與此湯和脾胃而降氣

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴半斤去皮炙味苦溫

生薑半斤切味辛溫

半夏半斤洗味辛平

人參

壹兩甘溫

甘草

貳兩炙味甘平

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑之辛以散滯氣

右伍味以水壹斗煮取叁升去滓溫服壹升日三

服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脈

沉緊發汗則動經身爲振振搖者茯苓桂枝白朮甘

草湯主之

吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝表虛陽不足起則頭眩脈浮緊爲邪在

表

當

發

汗

脈

沉

緊

爲

邪

在

裏

則

不

可

發

汗

發

汗

則

外

動

經

絡

損

傷

陽

氣

陽

氣

外

虛

則

不

能

主

持

諸

脈

身

爲

振

振

搖

也

與

此

湯

以

和

經

益

陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓

肆兩

味

甘平

桂枝

參兩去皮

味辛熱

甘平

白朮

貳兩味

苦甘溫

甘平

甘草

貳兩

炙

甘平

陽不足者補之以甘茯苓白朮生津液而益陽
也裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣
右肆味以水陸升煮取三升去滓分溫參服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主

之發汗病解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥

參兩味酸微寒

甘草

參兩炙附子

壹枚炮去皮破

捌片味辛熱

芍藥之酸收斂津液而益

陽氣而補衛甘草之甘調和辛酸

附子之辛溫固

和辛酸而安正氣

已上三味以水五升煮取壹升伍合去滓分溫服
疑非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

汗

若下病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以復

陰陽之氣

茯苓四逆湯方

茯苓

陸兩味

人參

壹兩味

附子

壹枚生

用去皮

破搘片

味辛熟

甘草

貳兩炙

乾薑

壹兩半

味辛熟

四逆湯以補陽加

茯苓人參以益陰

右五味以水伍升煮取叁升去滓溫服柒合日三

服

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出不與調胃承氣湯和胃氣太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和

汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出不

惡寒者此表解裏未和

太陽病發汗後大汗出胃中

則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之
發汗已解胃中乾煩燥不得眠欲飲水者少少與之
胃氣得潤則愈若脉浮者表未解也飲水多而小便
少者謂之消渴裏熱甚實也微熱消渴者熱
未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏

五苓散方

猪苓

拾捌銖味甘平去皮

澤瀉

一兩六錢

茯苓

拾捌銖半味酸

桂枝

拾捌銖味甘平半兩去皮

白术

拾捌銖味甘平

桂枝

半兩去皮味辛熟

白术

拾捌銖味甘平

淡者一也口入一而爲甘甘甚而反淡甘緩而淡
滲猪苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液鹹
味下泄爲陰擇瀉之鹹以泄伏水辛
甘發散爲陽桂枝之辛甘以和肌表

右伍味爲末以白飲和服方寸七日參服多飲暖
水汗出愈

發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

發汗已脈浮數者表邪未盡也

煩渴亡津液胃燥也傷寒汗出而渴者五苓散主之

與五苓散和表潤燥

傷寒汗出而渴者亡津液

不渴者茯苓甘草湯主之

傷寒汗出而渴者邪氣漸傳裏也

五苓散以和表裏若汗出不渴者邪氣不傳裏但

在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合衛

茯苓甘草湯方

茯苓

貳兩味甘平

桂枝

貳兩去皮味辛熱

生薑

參兩切味辛溫

甘草

壹兩炙味甘平

茯苓

甘草之甘益津液而和衛

桂枝

生薑之辛助陽氣而解表

右肆味以水肆升煮取貳升去滓分溫參服

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水

入則吐者名曰水逆五苓散主之

中風發熱至六七日則當解若不解

煩者邪在表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能消水

水八則不吐裏熱少則不能消水停積不散飲而

吐水也以其因水而吐故名水逆與五苓散和表裏散停飲

未持脉時病人手足

自冒心師因教試令欬而不欬者此必兩耳聾無聞

也所以然者以重發汗虛故如此發汗多亡陽腎中

陽氣不足者病人

手又自冒心師見外證知陽氣不足也又試令欬而不

即欬者耳聾也知陽氣虛明矣耳聾者陽氣虛精

氣不得上通於耳故也

陽氣虛明矣耳聾者陽氣虛精

疾飲水多喘者飲冷傷肺也以發汗後水藥不得入

令水灌洗而喘者形寒傷肺也

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

喘肺

口爲逆若更發汗必吐下不止

發汗後水藥不得入口爲之吐逆發汗亡

陽胃中虛冷也若更發汗則愈發汗吐下不止

發汗吐下後虛煩不

得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之
發汗吐下後邪熱乘虛客於胃中謂之虛煩者熱也
胃中煩熱鬱悶而不得發散者是也無氣伏於裏者
則喜曠今熱氣浮於上煩擾陽氣故不得眠心惡熱
熱甚則必神昏是以劇者反覆顛倒而不安心中懊
憹而憤悶懊憹者俗謂鵠突是也內經曰其
高者因而越之與梔子豉湯以吐胃中之邪

梔子豉湯方

梔子

十四枚擘
味苦寒

香豉

四合綿裹
味苦寒

自酸苦湧泄爲陰苦以湧吐寒以
勝熱梔子豉湯相合吐劑宜矣

右貳味以水肆升先煮梔子得貳升半內豉煮取
壹升半去滓分爲貳服溫進壹服得吐者止後服
若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉

湯主之

少氣者熱傷氣也加甘草以益氣嘔者熱煩而氣逆也加生薑以散氣少氣則氣爲熱搏

散而不收者甘以補之可也嘔則氣爲熱搏爲熱搏逆而不散者辛以散之可也

發汗若下之而

煩熱胷中窒者梔子豉湯主之

陽受氣於胷中發汗若下使陽氣不足邪

熱客於胷中結而不散故煩熱而胷中塞與梔子豉湯以吐胷中之邪傷寒五六日大

下之後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯

主之

傷寒五六日邪氣在裏之時若大下後身熱去心胷空者爲欲解若大下後身熱去而心結痛

者結胷也身熱不去心中結痛者虛煩也結胷爲熱客胷中爲實是熱氣已收歛於內則外身熱去虛煩

爲熱客胷中未結爲實散漫爲煩是以身熱不去六七日爲欲解之時以熱爲虛煩故云未欲解也與梔

子豉湯以下除之傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚

朴湯主之

下後但腹滿而不心煩卽邪氣入裏爲裏實但心煩而不腹滿卽邪氣在胷中爲虛

煩既煩且滿則邪氣壅於胃腹之間也滿則不能坐煩則不能卧故令卧起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿

梔子厚朴湯方

梔子十四枚擘

厚朴四兩薑

枳實四枚水浸去

炙苦溫炒味苦寒

酸苦湧泄梔子之苦以泄腹滿

已上參味以水三升半煮取壹升半去滓分貳服
溫進壹服得吐者止後服

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑

湯主之丸藥不能除熱但損正氣邪氣乘虛留於胃中而未入深者則身熱不去而微煩與梔子

乾薑湯叶

煩正氣

梔子乾薑湯方

梔子

十四枚擘
味苦寒

乾薑

二兩
味辛熱

苦以湧之梔子之苦以吐煩
辛以潤之乾薑之辛以益氣

右貳味以水三升半煮取壹升半去滓分二服溫

進壹服得吐者止後服

凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之

病人舊微溏者裏虛

而寒在下也雖煩則非蘊熱故不可與梔子湯內經曰先泄而後生他病者治其本必且調之後乃治其他太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩

身瞶動振振欲擗地者真武湯主之

發汗不解仍發熱邪氣未解也

心下悸頭眩身瞶動振振欲擗地者汗出亡陽也裏虛爲悸上虛爲眩經虛爲身瞶振振搖與真武湯主

之溫經 復陽 咽喉乾燥者不可發汗 津液不足也

汗發汗必便血

膀胱裏熱則淋 反以湯藥發汗亡耗津液增損客熱膀胱虛

燥必小便血

瘡家雖身疼痛不可發汗 發汗則症

表虛聚熱則生瘡家身疼如

傷寒不可發汗 發汗則表氣愈虛熱勢愈甚生風故變症也

衄家不可發汗 汗出

必額上陷脈急緊直視不能睂不得眠

衄者上焦亡血也若發汗

則上焦津液枯竭經絡乾澀故額上陷脈急緊諸脉者皆屬於目筋脈緊急則牽引其目故直視不能睂瞬合目也針經曰陰氣虛則目不瞑亡血爲陰虛是以不得眠也

亡血家不可發汗

發汗則寒慄而振

針經曰奪血者無汗奪汗者無血亡血發汗則陰陽俱虛故寒慄而

振汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧

圓闕

汗者心之液汗家重發汗則心虛恍惚心亂奪汗則無水故小便已陰中疼

病人有

寒復發汗 胃中冷必吐衄

病人有寒則當溫散反發汗 振陽氣胃中冷必吐衄

木發汗而復下之此爲逆也若先發汗治不爲逆

本先下之而反汗之爲逆若先下之治不爲逆

病在表者

汗之爲宜下之爲逆病在裏者下之爲宜汗之爲逆經曰陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛陰盛汗之

則愈下傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者之則死

急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜

四逆湯救表宜桂枝湯

傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏者以

裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內

經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒爲本也

病發熱頭痛脈反

沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

發熱頭痛表病也脉

反沉者裏脈也經曰表有病者脈當浮大今脉反沉遲故知愈也見表病而得裏脈則當差若不差爲內虛寒甚也與四逆湯救其裏

太陽病先下之而不愈因復發汗以

此表裏俱虛其人因致冒冒家汗出自愈所以然者

汗出表和故也得裏未和然後復下之

冒者鬱也下之則裏虛而

亡血汗之則表虛而亡陽表裏俱虛寒氣怫鬱其人

因致冒金匱要畧曰亡血復汗寒多故令鬱冒汗出

則怫鬱之邪得解則冒愈金匱要畧曰冒家欲解太

必大汗出汗出表和而裏未和者然後復下之

太

陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脉

微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下之

宜調胃承氣湯主之

脉陰陽俱停無偏勝者陰陽氣和也經曰寸口關上尺中三處

大小浮沉遲數同等此脉陰陽爲和平雖劇當愈今脉陰陽既和必先振慄汗出而解但陽脉微者陽不

足而陰有餘也 經曰陽虛陰盛汗之則愈 陰脈微者陰不足而陽有餘也 經曰陽盛陰虛下之則愈 太陽病發熱汗出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪

風者宜桂枝湯

太陽中風風併於衛則衛實而榮虛
榮者陰也衛者陽也發熱汗出陰弱

陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時
熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛

傷寒五

六日中風往來寒熱冒脇苦滿默默不欲飲食心煩
喜嘔或冒中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞕

或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小

柴胡主之

病有在表者有在裏者有在表裏之間者

此邪氣在表裏之間謂之半表半裏證五六日邪氣自表傳裏之中風者或傷寒至五六日
也王叔曰中風五六日傷寒往來寒熱即是或中風
或傷寒非是傷寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒
中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者正是謂

或中風或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿今止言胸脇苦滿知邪氣在表裏之間未至於心腹滿言胃脅苦滿知邪氣在表裏也默默靜也邪在表則呻吟不安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則靜默默者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏則不能食不欲食者邪在表裏之間未至於必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔心煩喜嘔一故有或爲之證有柴胡證但見一證便是即是此或爲之證

小柴胡湯方

柴胡

半斤味苦微寒

黃芩

三兩味苦寒

人參

三兩味甘溫

甘草

三兩味甘平

半夏

半升味辛溫

生薑

三兩切味辛溫

大棗

十二枚擘味甘溫

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱裏不足者以甘緩之人參甘草之甘以緩中和之氣邪半八裏則裏氣逆辛以散之半夏以除煩嘔邪在半表則榮衛爭之辛甘解之薑棗以和榮衛

右柴味以水壹斗二升煮取陸升去滓再煎取三升溫服壹升日三服後加減法

若胃中煩而不嘔去半夏人參加括藺實壹枚
煩而
不嘔熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用
人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛溫熱宜
寒療聚宜苦括藺實苦寒以泄胃中蘊熱若渴者去半夏加人參合前成
肆兩半括藺根肆兩半夏燥津液非渴者所宜人參
津二物若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩惡
爲當甘而潤括藺根苦而涼徹熟生

藥以通壅若脇下痞鞭去大棗加牡蠣肆兩

甘令人中滿
痛者去大棗

之甘鹹以禹之痞
鞭者加牡蠣之鹹

若心下悸小便不利者去黃芩加

茯苓肆兩

飲而水畜不行爲悸小便不利內經曰腎欲堅急食苦以堅腎則水益堅故去黃芩

淡味滲泄爲陽茯苓甘淡以泄伏水

若不渴外有微熱者去人參加桂

三兩溫覆取微汗愈

不渴者裏和也故去人參外有微熱表未解也加桂以發汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

欬者氣逆也甘則壅氣故去人參大棗內經曰肺欲收急食酸以收之五味子之酸以收逆氣肺寒則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正

氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默不欲飲食臟府相連其痛必下邪高痛下故使嘔

也小柴胡湯主之

人之氣血隨時盛衰當月郭空之時則爲血弱氣盡腠理開踈之時

也邪氣乘虛傷人則深針經日月郭空則海水東盛

人血氣虛衛氣去形獨居肌內減皮膚緩腠理開毛

髮殘瞧理薄烟垢落當是時遇賊風則其入深者是

矣邪因正虛自表之裏而結於陽下與正分爭作往

來寒熱默默不欲飲食下爲自外之內經終與藏府

相連氣隨經必傳於裏故曰其痛下痛一作病邪在

上焦爲邪高邪漸傳裏爲痛下裏氣與邪氣相搏逆

而上行故使嘔也與小柴胡湯以解半表半裏之邪

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

服小柴胡湯表邪已而渴

裏邪傳於陽明也以陽明治之得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足

溫醫二三下之不能食而脇下滿痛回目及身黃頭

項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔

者柴胡湯不中與也食穀者嘔

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫則

邪氣在半表半裏未爲實反二三下之虛其胃氣損其津液邪蘊於裏故不能食而脇下滿痛胃虛爲熱蒸之熏發於外面目及身悉黃也頸項強者表仍未解也小便難者內亡津液雖本柴胡湯證然以裏虛下焦氣滯而小便難若與柴胡湯又走津液後必下重也不因飲水而嘔者柴胡湯證若本因飲而嘔者水停心下也金匱要略曰先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食穀者物聚而嘔皆非小柴胡湯所宜二者皆柴胡湯之戒不可不識也

傷寒四五日身熱惡風頸

項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

身熱惡風頸項

強者表未解也脇下滿而渴者裏不和也邪在表則手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足溫者知邪在表裏之間也與小柴胡湯以解表裏之邪傷寒陽脈澁陰脈弦法當腹中

急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

脉陽

澁陰弦而腹中急痛者當作裏有虛寒治之與小建中湯溫中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣自表

之裏裏氣不利所致與小柴胡湯
去黃芩加芍藥以除傳裏之邪

小建中湯方

桂枝

三兩去皮味辛熱

甘草

三兩炙味甘平

大棗

十二枚擘味甘溫

芍藥

六兩味酸微寒

生薑

三兩切味辛溫

膠飴

一升味甘溫

建中者建脾也內經曰脾欲緩急食甘以緩之膠
飴大棗甘草之甘以緩中也辛潤散也榮衛不足
潤而散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收也泄
也正氣虛弱收而行之芍藥之酸以收正氣

右陸味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微

火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以

甜故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

柴胡證是

邪氣在表裏之間也或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或厥但見一證便宜與柴胡湯治之不必待其證候全具也凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熟汗出而解邪在半表半裏之間爲柴胡證卽未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不爲逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也正氣勝陽氣生却復發熟汗出而解也

傷寒

二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒二三日邪氣在表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣搏所致心悸者氣虛也煩者血虛也以太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴

胡下之則愈日數過多累經攻下而柴胡證不罷者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯是也嘔止者表裏和也若嘔不止鬱鬱微煩者裏熱已甚結於胃中也與大柴胡湯下其裏熱則愈

大柴胡湯方

柴胡

半斤味甘平

黃芩

參兩味苦寒

芍藥

參兩味酸微寒

半夏

半斤味辛溫洗

生薑

五兩切味辛溫

枳實

四枚炙味苦寒

大棗

十貳枚擘味甘溫

大黃

貳兩味苦寒

柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣辛甘和也薑棗之辛甘以和榮衛

右柴味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎溫服

壹升日參服一方用大黃貳兩若不加大黃恐不爲大柴胡湯也

傷寒十三日不解胃脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之傷寒十三日再傳經盡當解之時也若不證若以柴胡湯下之則更無潮熱自利醫反以丸藥下之虛其陽胃邪熱乘虛入府日晡所發潮熱已而利也潮熱雖爲熱實然胃脅之邪未已故先與小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝以下胃熱傷寒十三日不解過經讖語

者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當硬而

反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自

下利者脈當微厥今反和者此爲內實也調胃承氣

湯主之

傷寒十三日再傳經盡謂之過經譖語者陽明胃熱也當以諸承氣湯下之若小便利者陽

津液偏滲大便當鞭

反下利者知醫以丸藥下之也

下利脉微而厥者虛寒也

今脈調和則非虛寒由腸

虛胃熱協熱而利也

與太陽病不解熱結膀胱其人

如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解

外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

方太陽膀胱經也太陽經邪熱不解隨經入府爲熱

方結膀胱其人如狂者爲未至於狂但不寧爾經曰

其人如狂者以熱在下焦太陽多熱熱在膀胱必與

血相搏若血不爲畜爲熱迫之則血自下血下則熱

隨血出而愈若血不下者則血爲熱搏畜積於下而

少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下熱散血內經

曰從外之內而盛於內者先治其外後調其內此之謂也

桃核承氣湯方

桃仁

伍拾箇去皮

桂枝

二兩去皮

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下焦血散以桂枝之辛大熱之氣寒以取之熱甚
搏血故加二物於調胃承氣湯中也

右伍味以水七升煮取貳升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服伍合日參服當微利

傷寒八九日下之脣滿煩驚小便不利讝語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒八九日邪氣已

成熟而復傳陽經之時不之虛其裏而熱不除胃滿而煩者陽熱客於胃中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏虛津液不行也讞語者胃熱也一身盡重不可轉側者陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯以除胃滿而煩加龍骨牡蠣鉛丹收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液利小便加大黃以逐胃熱止讞語加桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪斯悉愈矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏二合大棗陸枚柴胡四兩生薑一兩
人參一兩龍骨一兩鉛丹一兩桂枝一兩半
茯苓一兩大黃二兩牡蠣一兩半熬

右拾壹味以水八升煮取肆升內大黃切如碁子更煮壹貳沸去滓溫服壹升

傷寒腹滿讝語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱

刺期門

腹滿讝語者脾胃疾也浮而緊者肝脉也脾病見肝脉太行乘土也經日水行乘火木行

乘土名曰縱此其類矣期門者肝之募刺之以寫肝經盛氣

傷寒發熱嘔嘔惡寒

大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此

肝乘肺也名曰橫刺期門

傷寒發熱嘔嘔惡寒肺病也大渴欲飲水肝氣勝也

王國曰作大渴欲飲酢漿是知肝氣勝也傷寒欲飲水者愈若不愈而腹滿者此肝行乘肺水不得行也經曰木行乘金名橫刺期門以寫肝之盛氣肝肺氣平水散而津液得通外作自汗出內爲小便利而解也

太陽病二日反躁反癲其背而大汗出大熱入胃

胃中水竭躁煩必發讐語十餘日振慄自下利者此爲欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小便不得反

嘔欲失溲足下惡風大便輒小便當數而反不數及

多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故

也太陽病二日則邪在表不當發躁而反躁者熱氣行於裏也反震其背而發汗大汗出則胃中乾燥火熱入胃胃中燥熱躁煩而讞語至十餘日振慄自

不利者火邪勢微陰氣復生津液得復也故爲欲解火邪去大汗出則愈若從腰以下不得汗則津液不得下通故欲小便不得熱氣上逆而反嘔也欲失溲

足下惡風者氣不得通於下而虛也津液偏滲令大使便者小便當數經日小便數者大便必輒也此以火熱內燥津液不得下通故小便不數及不多也若火熱消津液和則結輒之便得潤因自大便也便已

頭卓然而痛者先大便輒則陽氣不得下通既得大便則陽氣降下頭中陽虛故卓然而痛穀氣者陽氣也先陽氣不通於下之時足下惡風今陽氣得下故足心熱也

太陽病中風以火劫

發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼

其身發黃陽盛則欲動陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譏語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治風爲陽邪因火熱之氣則邪溢失其常度風與火氣謂之兩陽兩陽相熏灼熱發於外必發身黃若熱搏於經絡爲陽盛外熱迫血上行必動熱搏於內者爲陰虛內熱必小便難若熱消血氣血氣少爲陰陽俱虛血氣虛少不能榮於身體爲之枯燥三陽經絡至蹻三陰主胃中而還但頭汗出轉躅而還者熱氣炎上搏陽而不搏於陰也內經曰諸脹腹大皆屬於熱腹滿微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內發上爲口乾咽爛者火熱上熏也熱氣上而不下者則大便不轉若熱氣下入胃消耗津液則大便鞭故云或不大便久則胃中燥熱必發譏語內經曰病深者其聲囁火氣大甚正氣逆亂則噦內經曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實火熱大甚

故手足躁擾捻衣摸牀擾亂也小便利者爲火未劇津液未渴而稍可治也

傷寒脈浮醫

以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥

加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

傷寒脈浮責邪在表醫以火劫發汗汗出

大出者亡其陽汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內迫則心神浮越故驚狂起卧不安與桂枝湯解未盡表邪去芍藥以芍藥益陰非亡陽所宜也火邪錯逆加蜀漆之辛以散之陽氣亡脫加龍骨牡蠣之滯以固之木草云滯可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝

參兩

桂枝

去皮四兩味

桂枝

參兩

桂枝

參兩

桂枝

伍兩

桂枝

貳兩

桂枝

炙

桂枝

參兩

桂枝

伍兩

桂枝

甘草

貳兩

甘草

炙

甘草

參兩

甘草

伍兩

生薑

參兩

生薑

切

生薑

參兩

生薑

伍兩

生薑

牡蠣

伍兩

牡蠣

伍兩

牡蠣

伍兩

牡蠣

伍兩

龍骨

四兩味

龍骨

四兩味

龍骨

四兩味

龍骨

四兩味

龍骨

四兩味

大棗

拾貳

大棗

拾貳

大棗

拾貳

大棗

拾貳

右爲末以水壹斗貳升先煮蜀漆減貳升內諸藥

煮取參升去滓溫服壹升

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必讞

語弱者發熱脈浮解之當汗出愈

形作傷寒謂頭痛身熱也脈不弦緊

則無傷寒表脈也經曰諸弱發熱則脈弱爲裏熱故云弱者心渴若被火氣兩熱相合搏於胃中胃中躁

煩必發譴語脈弱發熱者得脈浮爲邪氣還表當汗出而解矣

太陽病以火熏之不

得汗其人必躁到經不解必清血名爲火邪

此火邪迫血而

血下行者也太陽病用火熏之不得汗則熱無從出

陰虛被火必發躁也六日傳經盡至七日再到太陽

經則熱氣當解若不解熱氣追血下行必清血清廁也

脈浮熱甚反炙之此爲

實實以虛治因火而動必咽燥唾血

此火邪迫血而血上行者也脈

浮熱甚爲表實醫以脉浮爲虛用火炙之因火氣動血迫血上行故咽燥唾血微數之脈慎

不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脈中火

氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

微數之脈則爲熱也灸則

除寒不能散熱是與不可灸也若反灸之熱因火則甚遂爲煩逆灸木以追虛而復逐熱爲實熱則傷血

又加火氣使血散脈中氣主响之血主濡之氣血消散不能濡潤筋骨致骨焦筋傷血散而難復也

浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從腰

以下必重而痺名火逆也

脈浮在表宜以汗解之醫以火灸取汗而不得汗邪

無從出又加火氣相助則熱愈甚身半以上同天之陽半身以下同地之陰火性炎上則腰已下陰氣獨治故從腰以下必重而痺也

欲自解者必當先煩乃有汗而解何

以知之脈浮故知汗出解也

煩熱也邪氣還表則爲

故爲邪還表也燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔

豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝加

桂湯更加桂二兩

燒針到發汗則損陰血而驚動心氣
針處被寒氣聚而成核心氣因驚

而虛腎氣乘寒氣而動發爲奔豚金匱要略曰病有

奔豚從驚發得之腎氣欲上乘心故其氣從少腹上

衝心也先灸核上以散其寒與桂枝加桂湯以泄奔豚之氣

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

先火爲逆復以下除之裏氣因虛又

加燒針裏虛而爲火熱所煩故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝 壹兩

甘草 貳兩

牡蠣

兩

龍骨

貳兩

熬

水

煎

辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪
滯可去脫龍骨牡蠣之滯以收斂浮越之正氣

右爲末以水伍升煮取貳升半去滓溫服八合日

參服

太陽傷寒者加溫針必驚也

寒則傷榮榮氣微者加燒針則血留不行驚者

溫針損榮血而動心氣金匱要略曰血氣少者屬臥心

太陽病當惡寒發熱今

自汗出不惡寒發熱明曉上脉細數者以醫吐之過也

一二日吐之者腹中饑口不能食三四日吐之者不

喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲

小逆

惡寒發熱爲太陽表病自汗出不惡寒發熱者陽明證木太陽表病反吐之傷動胃氣表邪

乘虛傳於陽明也以關脈細數知醫吐之所致病一

二日爲表邪尙寒而未成熟吐之則表寒傳於胃中

胃中虛寒故腹中飢而口不能食病三四日則表邪已傳成熱

吐之則表熱乘虛入胃胃中虛熱故不喜

糜粥欲食冷食朝食暮吐也朝食暮吐者晨食入胃

胃虛不能克化卽知至暮胃氣行裏與邪氣相搏則

胃氣反逆而以胃氣尚在故止云小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒

今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也

太陽表病
醫反吐之

傷於胃氣邪熱乘虛入胃胃爲邪

熱內類故不惡寒不欲近衣也

病人脈數數爲熱

當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微虧氣虛

脈乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也

陽受氣於胃中發汗外虛陽氣是令陽氣微虧氣虛
也數爲熱本熱則合消穀客熱則不能消穀因發汗
外損陽氣致胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐

而胃中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極
吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胃
中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也

心下溫溫

欲吐
溏嘔微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐
下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上中二焦
之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃爲實
非柴胡湯所能去與調胃承氣湯
下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也

太陽病六七日表

證仍在脈微而沉反不結胷其人發狂者以熱在下

焦少腹當鞢滿小便自利者下血乃愈所以然者以

太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之

太陽經也膀胱府也此太

陽隨經八府者也六七日邪氣傳裏之時脉微而沉邪氣在裏之脉也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胷中若不結於胷中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞢滿小便不利者爲無血也小便自利者血證諦也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

水蛭

三十箇熬
味鹹苦寒

蟲蟲

三十箇熬去廻
足味苦微寒

桃仁

二十箇去皮
尖味苦甘平

大黃

三兩酒浸
味苦寒

苦走血

鹹勝血蟲蟲水蛭之鹹苦以除畜血

甘緩結苦泄熟桃仁大黃之苦以下結熱

右肆味爲末以水伍升煮取叁升去滓溫服壹升
不下再服

太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者爲無血也
小便自利其人如狂者血證誦也抵當湯主之

結少腹鞭小便不利者胃熱發黃也可與茵陳湯身黃脈沉結少腹鞭小便自利其人如狂者非胃中瘀熱爲熱結下焦而爲畜血傷寒有熱少腹滿應小便也與抵當湯以下畜血

不利今反利者爲有血也當下之不可餘藥宜抵當

圓傷寒有熱少腹滿是蓄血於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液而蓄血不行小便自利者乃爲畜血當與桃仁承氣湯抵當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故不可餘駁峻之藥也可與抵當丸小可下之也

抵當丸方

水蛭

貳拾箇味苦寒

蟲蠶

貳拾伍箇味苦微寒

桃仁

貳拾箇去皮尖

大黃

三兩

右肆味杵分爲肆丸以水壹升煮壹丸取柒合服之時當下血若不下者更服

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也飲水多而小便自利者則水不內畜但腹中水多令心下悸金匱要略曰食少飲多

水停心下甚者則悸飲水多而小便不利則水畜於內而不行必苦裏急也

釋音

內諸藥

上音

啜粥

上音

飲水

也音

協熱

上音

見風脈

上音

利

音

現

漬

疾智切

蛻

音回人腹

茈

音冥

眞

音冥視

其季

也

動

人參

下音

咬

咀

咀嚼

也如麻可也

更衣

音更

改也

沫

音未

懊

音江

憮

音心亂

懊惱

音悔聲

窒

音栗切

僻

音僻也

懼

音懼也

蘊

音糾問切

嘿

音墨

靜也

但見

音下

切

肺

音入

胸

音縣目

慄

音栗

驚

音糾問切

懼

音懼也

蘊

音蘊積也

嘿

音墨

靜也

但見

音下

切

餚

音餚也

炁

音煑

諸

仍切

火

音火

募

音墓

滲

音色蔭

蓄

音蓄

蓄

音蓄審也

水蛭

音水蛭

音質

蟲

音駃

峻

音峻切

險

音險也

思