

景元刻本濟生拔粹

醫學發明藥目錄

吳茱萸丸 氣不交通

利膈丸 痰喘效嗽

消痞丸 心下痞

黃耆補中湯

本草十劑

傷元活血湯 墜墮

乳香神應散 止痛

當歸導滯散 墜馬

紫金丹 接骨

聖靈丹 止痛

調中順氣丸 痞滯

沉香導氣丸 痞痛

木香順氣湯 腹脹

沉香交泰丸 腹脹

加減瀉白散 喘嗽

神祕湯 喘嗽

三奇湯 痰嗽

補中益氣湯 勞倦

朱砂安神丸 鎮固

用藥加減法

人參益肺散 氣鬱

通氣防風湯 太陽氣鬱



草豆蔻丸 心痛

白木附子湯 寒中

丁香練實丸 癩疝

天台烏藥散 疝

茴香練實丸 疝

川練子散 疝

托裏榮衛湯 瘡

沉香海金沙丸 服腫

續隨子丸 虛腫

海金沙散 脾濕

木香榻氣丸 腹脹

廣茂潰堅湯 積

導滯通經湯 脾濕

赤茯苓丸 脾濕

薑附湯 寒濕

沉香桂附丸

十全大補湯 補弱

中滿分消丸 熱服

中滿分消湯 寒服

藿香安胃散 嘔吐

加減二陳湯 吐

人參平肺散 肺痿

參蘇溫肺湯 寒嗽

滋腎丸 熱閉不渴

清肺飲子 渴小便閉

还少丹 補

補益腎肝丸 困乏

水芝丸 補

地黄丸 腎虛

三才封髓丹 益腎水

离珠丹 虛冷

天真丹 下焦虛

八味丸 腎氣虛

通幽湯 幽門不通

潤腸湯 燥結

當歸拈痛湯 脚氣疼

羌活導滯湯 脚氣

開結導飲丸 痞悶

除濕丹 濕腫

除風湯 淋瀝

枳實大黃湯 脚腫

小續命湯 中風

疎風湯 中風

三化湯 治風燥

大羌活愈風湯 風

大秦朮湯 中風

半夏溫肺湯 痰冷嗽

丁香半夏丸 停飲

紫蘇飲子 脾寒

双和散 補血氣

五邪相干

巴戟丸 腎虛

附子温中丸 温胃

醫學發明藥目錄

人未水 腎虛靈  
南棗丹 温心  
少黃水 腎虛  
補益腎丸 因多  
清而文子 温心腎開

天真丸 不熱靈  
三才丸 益腎水  
外受丸 補腎  
五心丸 補

醫學發明濟生拔粹方卷第六

萬咽不通并四時換氣用藥法

黃帝絨經云胃病者腹臞脹胃脘當心而痛上支兩脇萬咽不通  
通食飲不下取三里夫咽者嚥物之門戶也萬者上焦胃中心  
肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生飧  
泄黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生臞脹腹中臞滿  
不得大便或大便難或先結後溏皆是也濁氣在上當降而不  
降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而反在上也胃氣逆上或爲  
嘔或爲吐或爲噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故  
食不下也此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在下  
則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失  
節勞役形體心火乘於土位胃氣弱而下陷於陰中故米穀入

而不得升反降而爲殄泄也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脉上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相干亂於膏中是爲大惋悞者惑也氣不交通最爲急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脉去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有噎有塞塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立四氣用藥并治法于后

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助



其令故病者善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡  
風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不調夜寒無寐  
甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白沫以至口開目瞪氣不交  
通欲絕者**吳茱萸丸**主之

吳茱萸

草豆蔻仁

橘皮

益智仁

人參

黃耆

升麻

白殭蚕

姜黃

柴胡

當歸身

炙甘草

木香

青皮

大麥蘖

半夏

右件為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大細嚼三十九白湯送下

無時夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天

助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰

氣極盛正氣不能伸故耳且如噤咽不通咽中如梗甚者前證

俱作治法當從時利膈丸泄肺火以黃耆補中湯送下如兩足  
痿厥行步恆然欹側欲倒臂臑如折及作痛而無力或氣短氣  
促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯  
苓橘皮等作湯送下滋腎丸一百五十九六七月之間濕熱之  
令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不  
下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五七十九更當審而用  
之

**利膈丸** 主膏中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香 七分

檳榔 半

厚朴 姜製

人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實

麩炒各一兩

大黃

酒發焙  
秤式兩

右爲細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如桐子大每服二五  
十九食後諸飲下



**消痞丸** 治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連去須揀淨 炒陸分

黃芩刮黃色 陸分

姜黃

白朮各壹兩

人參肆分

炙甘草式分

縮砂仁叁分

枳實麸炒黃色伍分

橘皮肆分

乾生薑式分

半夏湯洗柒次肆分

麴炒黃色式分

一方加澤瀉厚朴各叁分

猪苓式分半

右為極細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十九至

百丸白湯送下食後

**黃耆補中湯**

黃耆壹分

人參捌分

炙甘草

白朮

蒼朮

橘皮各伍分

澤瀉

猪苓

茯苓各叁分

右咬咀都作一服水一盞煎至一盞去滓大溫送下上件丸

藥

本草十劑

宣可以去壅姜橘之屬是也此大略言之蓋外感六淫之邪欲傳入裏二陰尚實而不受逆邪氣于膏中窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也仲景云嘔多雖有陽明證不可攻之况乾噦者乎二陰者脾也故單用生姜宣散必愈若嘔者有聲而有物邪在胃系未深入胃中以生姜橘皮治之或以藿香丁香半夏亦此之類投之必愈此天分氣分虛無處一無所受今乃窒塞仲景謂藟之上屬上焦悉屬於表或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可越之者吐也亦無下之理破氣藥也辛鴻氣若陰

虛穢氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤血兼用甘藥以補其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則氣逆嘔噦自不見矣

復有胃中虛熱穀氣久虛發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之五穀皆屬陰或食或飲白湯皆止嘔噦則嘔噦自止且如小

兒班後餘熱不退痲不收斂大便不行是謂血燥則當以陰藥治血因而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也索古云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風徹熱之劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲譫語燥狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所傷以承氣湯瀉其土實元氣乃得周流承氣之名於此見矣今衰世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉火非徒無益而反害之故諄諄及此至如孫真人言生姜嘔家之聖藥謂上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也

若脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上膏中閉塞惟益胃

推陽穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣瀉血藥下之則轉  
增閉寒疼痛或變作結胸復下其毒由此致危者多矣鍼經說  
呵欠噦唏振寒噫噦涕淚出大息涎下耳中鳴自齧舌頰唇  
視生病者補之此十二邪者皆音邪之走空竅者也凡邪之所  
在皆爲不足宜補而不宜瀉空竅者胃之清氣能通也胃既虛  
則穀氣不上行是氣路不利經云廉泉玉英者津液之道路也  
津液不上膏中氣路不開亦令人噦勿作外實以辛藥生姜之  
類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其氣必膏中如刀  
剗之痛與正結胸無異亦聲聞于外用藥之際可不慎哉  
通可以去滯通草防己之屬是也防己大苦寒能瀉血中大熱  
之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者皆可瀉血滯豈止防己  
而已通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便



氣化若熱絕津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕  
熱津液癃閉約縮小便不通宜以此治之其脈右寸洪緩而數  
左尺亦然其證胸中煩熱口燥舌乾咽噎亦乾大渴引飲小便  
淋瀝或閉塞不通脛脰脚熱此通草主之凡與通草同者茯苓  
澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲泄利其滯也  
此雖泄氣滯小便不利於肺中有所未盡尔予昔寓長安有王  
善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅  
脹破裂出黃水双睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦不可名  
狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治中滿利小  
便之藥甚多細思素問云無陽者陰無以生無陰者陽無以化  
膀胱津液之府氣化乃能出矣此病小便癃閉是無陰陽氣不  
化者也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂稟西方

燥金之化自天降地是陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此蓋奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非膈病也潔古曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今病者內關外格之證悉具死在旦夕但治下焦乃可愈遂處以稟北方之寒水所化大苦寒氣味者

黃蘗

知母各三兩

酒洗之以肉桂為之引用所謂冬

因熱用者也同為極細末煎熟水為丸如桐子大焙乾空腹令以沸湯下二百丸少時來報藥之須臾如刀刺前陰火燒之痛溺如瀑泉湧出卧具尺濕牀下成流顧盼之間腫脹消散故因記之或曰防己之性若何曰防己大苦寒能泄血中之濕熱通血中之滯塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏藥也比之於人則險而

健者也險健之小人幸災樂禍遇風塵之警則首爲亂階然而見善亦喜逢惡亦怒如善用之亦可以敵兇暴之人保嶮固之地此瞑眩之藥聖人有所存而不廢耳大抵聞其真則可惡下咽則令人身心爲之煩亂飲食爲之減少至於十二經有濕熱壅塞不通及治下疰脚氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不可真行經之仙藥無可代之者復有不可用者數事若遇飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧之病以防已泄大便則重亡其血此不可用一也如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不可用二也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫用苦寒之劑則速危此不可用三也若下焦有濕熱流入十二經致一陰不通然後可審而用之耳補可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能補氣之虛



羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之物也能補有形肌肉之氣凡氣味與人參羊肉同者皆可以補之故云屬也人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也以大言之具天地兩儀者也以小言之則人之陰陽氣血也以此養生則莫重於斯以天地物類論之則形者坤土也人之脾胃也乃生長萬物也地欲靜靜則萬物安坤元一正之土亘古不遷者也耕種之土乃五行運用者也動之有時春耕是也若冬時動之令天氣閉藏者泄地氣凝聚者散精氣竭絕萬化不安亦如人之勞役形体則大病生焉故曰不妄作勞則明當靜之時若勞後妄作則百脉爭張血脉沸騰精氣竭絕則九竅閉塞衛氣散解夫以人參甘草之類治其已病昌若救其未病爲按本塞源之計哉內經云志閑少欲飲食有節起居有常減其思慮省語養氣庶幾於道何病

之有如或不慎病形已彰若能調其脾胃使營氣旺清氣上升則四藏各得其所所以氣論之天地人三焦之氣各異損其脾者益其氣損其脾胃調其飲食適其寒溫黃耆之甘溫能補皮毛之氣人參之甘溫能補肺之氣甘草之甘溫能補脾胃之中經營之氣肺主諸氣氣旺則精自生形自盛血氣以平故曰陽生則陰長此之謂也血不自生須得生陽氣之藥血自旺矣是陽主生也若陰虛單補血血無由而生無陽故也仲景以人參爲補血藥其以此款乃補氣補血之大略也

洩可以去閉葶藶大黃之屬是也此二味皆大苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉也亦能洩大便爲體輕象陽故也大黃之苦寒能走而不守洩血閉也血閉者謂胃中粗穢有形之物閉塞者也陽明病胃家實是也日晡潮

熱大渴躁作有形之熱故洩其大便使通和汗出而愈矣一則  
治血病洩大便一則洩氣閉利小便若經絡中及皮毛分肉間  
但有疼痛一槩用牽牛大黃下之垂戾甚矣通則不痛痛作不  
通痛隨利減當通其經絡則疼痛去矣如輕可以去實麻黃葛  
根之屬是也謂如頭痛當以細辛川芎之類通之則無所凝滯  
即痛隨利減也臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之閉以行  
本經行其氣血氣血通利則愈矣若表上諸疼痛便下之則不  
可當詳細而辨之也

輕可以去實麻黃葛根之屬是也夫六淫有餘之邪客於陽分  
皮毛之間腠理閉拒謂之實也實者榮衛氣血不行之謂也宜  
以輕利開腠理致津液通氣也皮毛經絡寒邪之實去矣故二  
藥之體輕清成象象氣之輕浮也寒邪爲實輕可以去之然大同

而小異蓋麻黃微苦爲陰之陽可入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而又受外寒汗出乃愈當以發之葛根味甘溫可以發足陽明燥火之經身已前所受寒邪也非止發汗之藥謂陽明禁發汗利小便但解去經絡肌肉間寒邪其氣和汗自出矣麻黃專發汗去皮毛氣分寒邪葛根和解血分寒邪乃一陰一陽能瀉表實不能瀉裏實若飲食勞倦雜病自汗表虛之證認作有餘便用麻黃發之汗大出則表益虛此蓋不知表虛宜補其亡陽閉其自汗秋冬用桂枝春夏用黃耆代之黃耆者能治虛勞自汗陽明標病者也陽明胃主自汗小便數若以人參甘草之類補之脾胃實脾胃實則衛氣行衛氣行則表自實表既實自汗何由而出清氣上行雖飧泄亦止矣此治其本也葛根雖爲和解之藥亦不可用用之則重虛其表仲景所論內外



不足自汗之證大禁發汗利小便若已經發汗寒邪未去雖發汗數多不可禁也寒邪已去重發其汗則脫人元氣若多汗小便赤澁不得利小便為汗奪津液故也汗家不得重發汗小便多不得發汗汗多不得利小便小便多不得重利小便聖人所以切禁此者為津液乃氣血之基本也一云亡陽一云脫血病人重發汗重利小便必脫元氣七神無依則必危困矣因辨麻黃葛根之宜禁故兼及之

### 中風同從高墜下

夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留於脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝木既敗血凝沍從其屬入於

肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷風無汗既自汗必是化也以破血行經之藥治之

**傷元活血湯**治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡 伍分 瓜蒌根 當歸 各三分 紅花 甘草 各三分

大黃 酒浸 乙兩 川山甲 炮 式分 桃仁 酒浸 去皮尖研 如泥 伍拾个

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下干脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血 甘生血 陽生陰長故也為臣川山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血各有所歸痛自去矣

右件除桃仁外挫如麻豆大每服一兩水一盞半酒半盞同

煮至七分去滓大温服之食前以利爲度得利痛或不盡服

乳香神應散

乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科栗子酪乙

破故布

式兩炒香

右爲細末每服五錢醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香

少許去粗温服

當歸道滯散

治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通洪腫暗香

疼痛昏悶畜血內壅欲死

川大黃

配川當歸

分麝香少許

右三味除麝香另研外爲極細末研勻每服二錢熱酒一盞

調下食前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨



紫金丹治之

紫金丹

川烏頭炮

草烏頭炮各乙兩

五靈脂

木鼈去殼

骨碎補

威靈仙

金毛狗脊

自然銅醋碎七次

防風各半分

地龍去土

烏藥

青皮去白

陳皮去白

茴香各半分

乳香

沒藥

紅娘子

麝香各二分

黑牽牛半分

禹餘糧石醋炒四兩

右為細末醋麵糊為丸如桐子大每服十九至二十九温酒送下病在上食後病在下食前

聖靈丹

治打撲損傷及傷折疼痛不可忍者

乳香伍分

烏梅去核伍个

白朮乙捻

藜蘆子乙大盞炒黃取式兩分

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼熱酒送下喫

了一伏時不痛如痛再服

衛氣留於腹中積穢不行脉眩急及腹皮急苑蘊不得常所  
支脇胃中滿喘呼逆息者

**調中順氣丸** 治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陳皮去白 京三稜炮各

大腹子 半夏湯洗七次式兩 縮砂仁 檳榔 沉香各半兩

右為細末水糊為丸如桐子大每服三十九丸漸加至五十九

煎陳皮湯下

**沉香導氣散** 治一切氣不升降脇肋刺痛曾腫痞塞

沉香式分半 人參半兩 檳榔式分半 烏藥乙兩劉 呵子肉半兩

麥蘖炒兩 白朮乙兩 神麴炒兩 香附子乙兩 紫蘇葉乙兩

姜黃 紅皮各四兩 京三稜炮 廣茂炮 益智仁各式兩

炙甘草 四兩 大腹皮 剉炒 半兩 厚朴 姜製 一兩

右為極細末每服一錢食前沸湯點服

清氣在下則生飧泄濁氣在上則生臌脹此陰陽反作病之逆從也飲食失節則為脹又濕熱亦為脹右關脈洪緩而沉弦脈浮於上是風濕熱三脈合而為病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘於脾胃故噎咽不通致濁陰之氣不得下降而大便乾燥不行胃之濕與客陰之火俱在其中則脹作使幽門通利泄其陰火潤其燥血生益新血則大便不閉吸門亦不受邪濁陰得下歸地也經云中滿者泄之於內此法是也

**木香順氣湯**治濁氣在上則生臌脹

木香 叁分 厚朴 姜製 四分 青皮 去白 陳皮 益智仁

白茯苓 去澤瀉 乾生姜 半夏 湯洗 吳茱萸 湯洗 各五分

當歸 伍分 升麻

柴胡 各壹分

草豆蔻 起裹燒去皮叁分

蒼朮 出侵叁分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓大温服食前忌  
生冷硬物及怒經云留者行之結者散之以柴胡升麻苦平  
行少陽陽明二經發散清氣運行陽分為君 以生姜半夏  
草豆蔻仁益智仁辛甘大熱消散中寒為臣 厚朴木香蒼  
朮青皮苦辛大温通順滯 當歸人參陳皮辛甘温調香榮  
衛滋養中氣濁氣不降以苦泄之 吳茱萸苦熱泄之者也  
氣之薄者陽中之陰茯苓甘平澤瀉鹹平氣薄引導濁陰之  
氣自天而下故以為佐氣味相合散之泄之上之下之使清  
濁之氣各安其位也 范天駭夫人先因勞役飲食失節加  
之憂思氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛證其



脉弦而細至夜濁陰之氣當降而不降臍脹尤甚大抵陽主  
運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故  
為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行陽道  
又以前藥助之使濁陰之氣自此而降矣

**沉香交泰丸** 治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸以為臍脹

沉香

白朮

陳皮

去白各  
叁分

枳實

麸炒  
去穢

吳茱萸

湯洗

白茯苓去澤瀉

當歸

洗

木香

青皮

去白各  
貳分

大黃

酒浸  
乙兩厚朴

姜製伍分

右件各揀淨同為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五十  
丸至七八十九丸溫白湯下食前微利即止

嘔效氣喘

所謂嘔效上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從

故嘔欬上氣喘也

**加減瀉白散**治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮配地骨皮升甘草

陳皮

青皮去白

五味子

人參去芦各伍分

白茯苓叁

右件咬咀每服四錢水一盞半入粳米十粒同煎至一盞去

滓大溫服食後

**神祕湯**治病人不得卧卧則喘者水氣逆上乘於肺肺得水而

浮而使氣不通流其脉沉大宜此治之

橘皮洗

生姜

紫蘇葉

人參

桑白皮

劉炒各半兩

木香

白茯苓

去皮各叁分

右咬咀以水三升煎至一升去滓大溫分三服

**加減三奇湯**治咳嗽上氣痰涎喘促胃膈不利

桔梗

去聲 半兩

半夏

湯洗 七分

陳皮

去白

甘草

青皮

去白 各 伍分

人參

去蘆 伍分

杏仁

去皮 伍分

研

參分

五味子

肆分

加紫蘇葉

桑白皮

各 伍分

右吹咀每服四錢水二大盞生姜二片煎至一盞去粗大温

服食後

飲食勞倦論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內經悉言人以胃氣為本人受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃為水穀之海飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通滌水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四經五藏陰陽揆度以為常也苟飲食失節寒温不適則脾胃乃傷喜怒憂恐而損耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不



主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不  
兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎肝陰火得乘其土位  
故脾胃之證始得之則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛  
或渴不止其皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘  
而煩熱為頭痛為渴而脉洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮  
是春生之令不行則無陽以護其榮衛則不任風寒乃生寒熱  
此皆脾胃之氣不足所致也然而外感風寒所得之證頗同而  
實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘  
有餘者瀉之傷其內為不足不足者補之汗之下之吐之剋之  
之類皆瀉也溫之和之調之養之之類皆補也內傷不足之病  
苟悞認作外感有餘之病而反瀉之則虛其虛也實實虛虛損  
不足而補有餘如此死者醫殺之耳然則奈何曰惟當以辛甘

温之劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣勞者温之損者温之温能除大热大忌苦寒之藥瀉其土耳今立補中益氣湯主之

黄耆

半斤病甚勞役热者壹分

當歸身

式分酒焙乾或日乾以和血脉

人參

去芦叁分有嗽去之

白朮

叁分以調中氣

柴胡

式分引清氣上少陽之經

炙甘草

半斤

升麻

貳分引胃氣上騰而復其本位便是行春升之令

橘皮

叁分以導滯氣又能益元氣得諸甘藥可

一方加白芍藥黃蘗紅花

右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗大温服食遠

夫脾胃虚者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受

邪須用黄耆最多甘草人參次之脾始一虚肺氣先絕故用黄

耆以益皮毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以

補之心火乘脾須炙甘草之甘以瀉火热而補脾胃中元氣若

脾胃急痛并大虛腹皮急縮者最宜多用急者緩之胃中清氣  
在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草上升能補衛氣之散  
解以緩帶脉之縮急二味苦平味薄者陰中之陽而引清氣上  
升也黃耆人參甘草三味皆甘溫爲主用脾胃虛乃必用之藥  
氣亂於胃爲清濁相干用去白橘皮以理之又能助陽氣之升  
以散滯氣助諸甘辛爲用也口乾嗑乾者加葛根脾胃氣虛不  
能升浮爲陰火傷其生發之氣榮血大虧營氣不營陰火熾盛  
是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包與心主血血減則心無  
所養致使心亂而煩病名曰惓惓者心惑而煩悶不安也故加  
辛溫甘溫之劑生陽陽生則陰長或曰甘溫何能生血云仲景  
之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更加當歸和之又宜  
加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加生地黃

補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈

朱砂

伍分另研水飛陰乾秤

黃連

去須揀淨酒洗秤陸分

炙甘草

伍分半

生地黃

貳分半

當歸

去芦貳分半

右件四味為細末另研朱砂水飛如塵陰乾為衣湯浸餗餅為丸如黍米大每服一十五丸津唾嚥之食後熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血為臣以當歸補其血不足朱砂納浮溜之火而安神明也

四時用藥加減法

長夏濕土客邪大旺加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀味則加麴以消之加五味



子麥門冬助人參瀉火益肺氣助秋損也在二伏中為聖藥

堵塞咽喉陽氣不得出病名曰塞陰氣不得降病名曰噎噎塞

迎逆於咽喉膏膈之間令諸經周身陽氣不行令人口開目瞪

氣欲絕者何也清氣在陰濁氣在陽清濁相干亂於膏中是為

大惋夏月加青皮陳皮益智黃蘗泄陰火之上逆或以消痞丸

滋腎丸各七八十九則愈冬月加吳茱萸大熱大辛苦之味以

瀉陰寒之氣則愈食不消則加炒麴空心約宿食消尽服之待

少時以美饌啜之不令胃中停留也食不下乃胃中有寒胃上

有寒或氣寒澀滯加青皮陳皮木香此三味為定法冬月加益

智仁草豆蔻仁夏月少加黃芩黃連秋更加檳榔草豆蔻仁

縮砂仁白豆蔻仁如春初猶寒更少加辛熱之劑以補春氣

之不足為風藥之佐益智草豆蔻可也

冬月咳嗽者加不去節麻黃半錢如秋涼亦加如春月天溫只加佛耳草欵冬花各二分若痰嗽久病肺中伏火者去人參防痰嗽增益耳然調和陰陽血氣之際甘溫爲必用之藥

脉洪大兼見熱證少加黃芩黃連生地黄甘草

脉緩顯沉困怠惰無力者濕勝也加蒼朮澤瀉人參白朮苓五味子

脉澀氣滯澀者加當歸身木香天門冬青陳皮覺寒者加桂枝

黃耆

不足病雖見熱證須加忌熱藥不宜多以從權

頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半錢生姜二分若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血滯不足加當歸身脇下急或痛甚俱加柴胡甘草人參

腹中氣上逆者衝脉逆也加黃蘗二分黃連一分以瀉之

多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁如少氣不足以息服  
正藥二三服猶氣短促此膈上及皮表間有寒所遏當引陽  
氣上升則愈多加羌活獨活升麻柴胡藁本次之黃耆倍之  
捫之而肌熱者表證也只服正藥一二服得微汗則已

躁熱作蒸蒸而熱者腎間伏火上騰也加黃蘗生地黄各二分  
脚膝痠軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱少加黃蘗空心服如不  
愈更加漢防己半錢則愈使脚膝中氣力湧出矣

脈緩有痰而痞加半夏黃連

脈弦四肢滿悶便難而心下痞加黃連柴胡甘草

大便秘燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身

心下痞券悶者加白芍藥黃連

心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁如天寒少加乾姜或中桂

心下痞覺中寒加附子黃連

心下痞加黃連生姜橘皮冬月加黃連木香藿葉

能食而心下痞加黃連半錢枳實三分

膏中氣滯加去白青皮

噎痛頷腫脉洪大面赤者加黃芩桔梗甘草

耳鳴目黃頰頷腫頭有臙肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌

活防風甘草藁本以通其經血加黃芩黃連消其腫人參黃

耆益元氣而瀉火邪如脉緊面白喜噦或面色惡者皆寒也

亦羌活等四味中加之當瀉足太陽也不用寒藥

小便遺失肺金虛也宜安卧養氣以黃耆人參之類補之不愈

是有熱也加黃蘗生地黄切禁勞役

卧而多驚小便淋澀者邪在少陽厥陰亦宜太陽經所加之藥



更添柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒合病也腎肝  
之病同一治爲俱在下焦非風藥行經則不可乃受客邪之  
濕熱也宜升率發散以除之

頭痛加蔓荊子半分痛甚加川芎一分頂痛腦痛加藁本二分  
若苦頭痛加細辛二分諸頭痛併用此四味足矣

臍下痛者加熟地黃三分不已者大寒也其寒從傳變中來加  
肉桂三分徧閱內經少腹痛皆寒非傷寒厥陰之證也仲景  
以抵當湯丸主之乃血結下焦膀胱

身有疼痛及身重者濕也以五苓散主之如風濕相搏一身盡  
痛加羌活防風各半錢升麻柴胡各半錢藁本蒼朮各一錢  
所以然者爲風藥也能勝濕故另作一服與之

肩背痛汗出小便數而欠者風熱乘脾胃氣鬱長也當瀉風熱

則愈以人參益肺散主之

柴胡

升麻

黃耆各壹分

羌活

防風

人參

甘草各半

藁本各三分

陳皮半

青皮分

黃芩

白豆蔻仁

各三分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後如面色

白脫色氣短者不可服

肩背痛不可迴顧者此手太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛

項強腰似折項似拔者此足太陽經不通行以**通氣防風湯**

主之

羌活

獨活各壹分

藁本

防風

甘草

各半分

川芎

蔓荊子

各三分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服空心如身重

腰沉沉然經中有寒濕也更加酒洗漢防已半錢輕者附子重者川烏頭

腹中痛不惡寒加黃芩芍藥

腹中痛惡寒而脉弦者小建中湯如脉沉細者理中湯之類主之

腹痛在寒涼時加半夏益智草豆蔻之類

胃脘當心而痛氣欲絕者胃虛之極也俗言心以草豆蔻丸主

草豆蔻

壹分四分麩裹燒熟去皮臍研

吳茱萸

湯洗去苦焙研

益智仁

橘皮

白殭蚕

黃耆

人參各八分

生甘草

炙甘草

當歸身

青皮各陸分

神麴末

姜黃

各肆分

桃仁

去皮尖湯浸柒个

澤瀉

壹分小便數減半

半夏

湯洗柒次壹分

大麥蘖

炒黃分半

柴胡

肆分詳脇下痛多少用之

右一十八味除桃仁另研如泥外為極細末同研勻湯浸飪

餅為丸如桐子大每服三十九丸熱白湯送下食遠旋斟酌多  
少用之

夫脾胃之證始則熱中終則寒中陰盛生內寒厥氣上逆寒氣  
積於胃中是腎水反來侮土此謂所勝者亡支行也作中滿腹  
脹作涎作清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜睡  
兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼狀夢亡人腰背脾眼腰脊  
皆痛而不渴不瀉不瀉則溫氣去矣獨留寒獨留則血凝  
涎血凝涎則脉不通故其脉盛大以瀉曰寒中當以**白朮附子**  
**湯**主之

白朮

附子

炮去皮臍

蒼朮

陳皮

厚朴

姜製

半夏

湯洗七次

茯苓

澤瀉

各一兩

猪苓

去皮半兩

肉桂

四分

右件剉如麻豆大每服五錢水三盞生姜二片同煎至一盞



去滓食前温服之量病人虚实加減多少

滑脉生癩疝

**丁香練實丸**

治男子七疝痛不可忍婦人瘦聚帶下皆任脉所

主陰經也乃腎肝受病治法同歸於一

當歸

去芦剉碎

附子

炮製去皮臍剉

川練子

剉碎

茴香

炒

右四味各一两剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙乾作細末每秤藥末一两再入下項藥

丁香

木香

各二分

全蝎

三叶

玄胡

一两

右四味同為細末入在前項當歸等藥末內拌和酒糊為丸如桐子大每服二十九至一百丸温酒送下空心食前凡疝氣帶下皆皆屬於風全蝎治風之聖藥茴香川練子皆入小腸經當歸玄胡和血止痛疝氣帶下皆積寒邪入小腸之間

故以附子佐之丁香木香為引導也

**天台烏藥散**

天台烏藥

木香

茴香炒

青皮去白

良薑炒各

半兩

檳榔剉二一个

川練子十个

巴豆七十一个

右八味先以巴豆微打破同練实用麩炒候黑色豆麩不用外為細末每服一錢温酒送下疼甚者炒生姜熱酒下亦得

**茴香總寶丸**

川練子炒

茴香

山茱萸

食茱萸

吳茱萸

湯洗

青橘皮去白

陳橘皮

馬薺花炒醋

芫花各一两

右為極細末醋糊為丸如桐子大每服二十九温酒送下食前量人虚实加減丸數以利為驗

**川苦練散**

木香

一兩另

茴香

揀淨一兩鹽一匙一處炒  
茴香黃色去鹽不用

川練子

一兩剉碎用巴豆一十個微破皮  
與川練子一處炒黃不用巴豆

右件為極細末每服二錢溫酒一盞調下空腹大抵此疾因  
虛得之不可以虛而驟用補藥邪之所湊其氣必虛留而不  
去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之是以諸方多借  
巴豆氣者蓋謂此

瀉之則脹已汗之則瘡已

東南二方者在人則為丙小腸熱甲膽風小腸與膽皆居其下  
其性炎上其瘡外有六經之形證內無便溺之阻隔飲食如故  
清便自調知不在裏非疽瘡也止癰癰也小則為癰大則為癰  
其邪所受於下風濕之地氣自外而來侵加於身者也經云營  
氣不從逆於肉理乃生癰腫諸痛痒瘡皆屬心火此瘡自外而

入是丙小腸左迂入於膽作痛而非痒也此一方皆主血血爲病必痛此元氣不足營氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌肉之上皮毛之間只於風熱六經所行經絡地分出矣宜瀉其風濕熱醫者只知陰覆其陽則汗也此宜發汗者乃濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使營衛周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赫赤而腫微黯色東方青埋沒之色也風木之性上衝顏必忿色其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色其瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛也其脉止在左手左手主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪氣去矣以**托裏榮**

**衛湯**主之

黃耆 半兩

柴胡 一分  
羌活

防風

當歸身 各一分半



連翹二分 炙甘草 人參各一分 蒼朮二分 生黃芩一分半

紅花 桂枝各五分

右咬咀都作一服水酒各一大盞同煎至一盞去滓大温服

**沉香海金沙丸** 治一切積聚脾湿腫脹肚大青筋羸瘦惡證

沉香一分 海金沙一分半 輕粉一分 牽牛頭末一两

右各秤分兩同為細末研獨科蒜如泥為丸如桐子大每服三十九或五十九煎百沸灯心通草湯送下空腹食前量天

小虛實加減丸數取利為驗

**續隨子丸** 治通身虛腫喘悶不快

人參 漢防已 赤茯苓麩飴 木香 檳榔各半兩

續隨子 海金沙五分另炒 苦葶藶四兩帶隔炒

右件為細末棗肉為丸如桐子大每服二二十九煎桑根白

皮湯送下

**海金沙散**

治脾濕太過通身腫滿喘不得卧腹脹如鼓

牽牛一两半半生

甘遂半两

海金沙

右為細末每服二錢煎倒流水一盞調下食前得宣利止後

服

太陰所至為播蒲中蒲霍乱吐下

**木香撮氣丸**

治中滿腹脹下虛虛損者

陳皮

去白

蘿蔔子

炒各半两

胡椒

木香

去毒二分半

草豆蔻

面裹燒去皮

青皮

去白各三分

蝎尾

去毒二分半

右為細末水糊為丸桐子大每服二十九溫米飲送下食後忌服白粥百日重者一年小兒麻子大桑白皮湯送下十九日三服大人桐子大四十九如陰囊洪腫水冷次用滄鹽乾

姜白面各三分水和交攤紙上塗用

**廣茂潰堅湯** 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不能

大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

厚朴 黃芩 草豆蔻 益智仁 當歸各半分

黃連六分 半夏七分 廣茂 紅花 吳茱萸

升麻各一分 生甘草 柴胡 澤瀉 神麴

青皮 橘皮各二分 如渴加葛根四分

右咬咀都作一服水二盞先浸少時煎至一盞去滓大温服

食前

**導滯通經湯** 治脾湿有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮 桑白皮 白朮 木香 茯苓去皮各一两

霖雨時加澤瀉半兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗大溫服食前

**赤茯苓丸**

治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤

澀

葶藶四兩防己二兩赤茯苓一兩木香半兩

右件為細末棗肉為丸如桐子大每服二十九煎桑白皮湯

送下食前

諸脉按之無力所生病證并治法

六脉中之下得弦細而瀦按之無力腹中時痛心胃控嗵陰陰而痛或大便泄洩鼻不聞香臭清濁涕不止目中泣出喘喝痰嗽唾出白沫腰沉沉苦痛項背曾皆時作痛目中流火口鼻惡寒時頭痛目眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發躁蒸二而熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則便過其振寒復至氣短促膏中滿悶而痛必有膈咽不通欲絕之狀甚則目瞪



聲聞於外而淚涕涎痰大作方過其發躁須臾而已振寤復至  
或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘二意悲二健忘或善  
嚏間出此風熱大損元水燥金之復也如六脉細弦而瀆按之  
空虛此大寒證亦傷精氣以辛甘溫甘熱滑潤之劑大瀉西方  
北方則愈

**姜附湯**

治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎

沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁兼治陰證傷寒大便自利

而發熱者

乾姜

熟附各二兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去粗溫服或慮此藥  
大燥即以附子理中湯相繼服餌姜附本治傷寒經下之後  
又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩燥夜則安靜不嘔不  
渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更須審之兼治中脘虛寒

人積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆 一方附子湯以  
 生用者名曰通湯加白朮倍之甘草減半名生附白朮湯治  
 中風濕昏悶恍惚腹滿身重手足緩縱熱熱自汗失音不語  
 便利不禁 一方用姜附湯加麻黃白朮人參甘草等分名  
 附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰背強急口眼喎斜語聲  
 渾濁心腹脹氣上喘急不能動轉更宜審而用之

**沉香桂附丸**

沉香

附子

炮去皮 乾姜

良姜 剉炒 官桂 去皮

茴香 炒

川烏頭

炮去皮 臍 剉作小塊 子

吳茱萸 湯浸洗 去苦炒

右各一两為細末用好醋煮麩糊為丸如桐子大每服五七  
 十九熟米飲送下空腹食前日進二服忌生冷硬物

**十全大補湯**

人參

肉桂

川芎

熟地黄

茯苓

去皮

白朮

甘草

黃耆

當歸

去芦

白芍藥

右件一十一味剉爲麤末每服二錢水一盞入生姜二片棗二枚同煎至七分去滓溫服不拘時候

諸脹腹大皆屬於熱

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪傳裏寒變爲熱作胃實日晡潮熱大渴引飲讖語是太陽陽明并大實大滿者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之泄之則脹已此之謂也假令痲瘡爲脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘡病作矣知其寒也局方用交解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五藏六府俱有脹滿更以脈家寒熱多少較之胃

中寒則脹滿濁氣在上則生脹臌脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水爲脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿臌脹支鬲肱脇下厥上胃過在太陰陽明胃中寒溫鬱遏也太陰臌脹後不利不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀆氣血自然分化不待泔滓穢如或大實太滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏粱之人或食已便卧使溫熱之氣不得施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或藏寒生滿病以治寒脹中滿分消湯主之病勢大小用藥輕重臨時加減不敢少越耳



**中滿分消丸** 治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

黃芩去腐剉炒半兩 姜黃 白朮 人參去芦 炙甘草

豬苓去黑皮各一分 黃連去須剉炒半兩 白茯苓去皮 縮砂仁

乾生薑各二分 枳實麸炒 半夏湯浸七次各伍分 厚朴姜製一兩

知母剉炒四分 澤瀉三分 陳皮

右細碾茯苓澤瀉生薑各為末另秤外共為極細末秤入上三味和勻水浸蒸餅為丸如桐子大每服一百丸焙熟白湯送下寒因熱用故焙熱服之 食遠量病人虛實加減

**中滿分消湯** 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢

厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞下焦躁寒沉厥奔

豚不收並宜服之

益智仁 半夏 茯苓 木香 升麻各二分

川烏頭 澤瀉 人參 青皮 當歸

生薑 麻黃 柴胡 乾姜 萹澄茄

黃連各一分 黃耆 吳茱萸 草豆蔻 厚朴各半分

黃蘗半分使藥又為熱因寒用

右件判如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓大温服食前大忌房勞酒温麪生冷硬物

諸嘔吐酸皆屬於熱

**養胃安胃散** 治胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟

藿香 丁香 人參各一分 橘皮半兩

右件四味為細末每服一錢水一盞生薑二片同煎至七分

和滓冷服食前

**加減一陳湯** 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不

快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和並宜服之

丁香壹兩半夏

橘紅各伍兩

茯苓三兩

炙甘草一兩半

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片烏梅一个煎至六分去粗熱服不拘時候治痞疾加草豆蔻一两半麩裹燒熟用

諸痿喘嘔今立熱喘寒喘一方

**人參平肺散**治心火形肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛脅膈

痞滿咽嗑不利

桑白皮

一兩

知母

七分

炙甘草

半兩

地骨皮

伍分

五味子二百个

茯苓

青皮

人參

各四

陳皮

伍分

天門冬

去心四分

右件咬咀水二盞煎至一盞去滓溫服食後如熱甚加

黃芩

四分

紫蘇葉

伍半夏

五分洗

**參蘇溫肺湯**

治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心背滿氣不得動暢

人參

紫蘇葉

甘草

各伍分

肉桂

五味子

木香

各四分

陳皮

去白

白朮

各陸分

半夏

姜製

白茯苓

去皮各半兩

桑白皮

壹兩

右件為鹿末每服五錢水一盞半生姜二片同煎至八分去

滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半錢先洗去

沫下諸藥

諸脉有閉有格有覆有溢

**發丸**

治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃蘗

參兩細剉酒拌陰乾秤

知母

式兩酒浸陰乾秤

肉桂

壹分半

右上一二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂

与火邪同体故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熟水

為丸百沸湯送下



**清肺飲子** 治渴而小便閉邪熱在氣分也

茯苓

去皮

豬苓

去皮

白朮

各一分

澤瀉

琥珀

藜蘆

桂

各半分

灯心

壹分

木通

七分

車前子

炮五分

通草

五分

蒹蓄

七分

右為極細末每服五錢水一盞半煎至一盞帶熱服或剉如麻豆大作湯煎服亦可局方中八正散仲景五苓散亦宜用

損其腎者益其精

賢有兩枚右為命門相火左為腎水同質而異事也夫損者當損何藏而治之形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛而瀉其火邪以封髓丹滋腎丸地黄丸之類是也陰本既固陽氣自生化成精髓若相火陽精不足宜用辛溫之劑世之用辛熱之

藥者治寒甚之病非補腎精也

**還少丹**

大補心腎脾胃

一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉

重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥

牛膝酒浸一宿焙乾

遠志

山茱萸

白茯苓

五味子

巴戟酒浸去心

石菖蒲

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙乾

楮實

枸杞各壹兩

杜仲

去皮姜汁并酒合塗炙熱

舶上茴香

各壹兩

熟地黄

壹兩半

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服三十九溫酒或鹽湯送下日二服食前五日覺有力十日精神爽半月氣力頗壯二十日日明一月夜思飲食冬月手足常暖筋骨壯盛加減熱加山梔子一两心氣不寧加麥門冬一两少精神加五味子一两陽弱加續斷一两常服齒勞永無瘡瘻婦人服

之暖子宮姿容悅懌

**補益腎肝丸**

治目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢汗

憎風行步不正兩足軟側卧而多驚脚膝無力腰已下消瘦

柴胡

羌活

生地黃

炒苦參

防已

炒各半兩

附子

炮

肉桂

各壹分

當歸身

叁分

右件為細末熟水為丸如鷄頭大每服四十九丸溫水下食前

**水芝丸**

蓮實去皮不以多少用好酒浸一宿猪肚幾個將酒浸蓮

實切碎焙乾

右為極細末酒糊為丸如鷄頭實大每服五七十九丸溫酒送

下食前

上部有脉下部無脉其人當吐食傷大陰也

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆

各等分

右二味為細末每服二錢匕溫漿水調下取吐為度

地黃丸

治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五藏齊損瘦弱虛煩骨

蒸痿弱下血

乾山藥

山茱萸

各肆分

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各叁分

熟地黃

捌分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服五十丸溫水送下空心

三才封髓丹

降心火益腎水

天門冬法熟地黃

人參

去芦各半兩

黃蘗

叁兩

縮砂仁

壹兩半

右件為細末水糊為丸如桐子大每服五十丸用茯苓半兩切作片子酒一大盞浸一宿次日煎三四沸去滓送下空心

甘草

茶分半炙



**离珠丹**

又名神珠丹

治下焦陽虛臍腹冷痛足胫寒而逆

杜仲

參兩 去絲

草薢

式兩 訶子 伍个

童骨

壹兩

破故布

炒叁兩

朱砂

壹分 半研

胡桃

壹佰式拾个 去隔皮

縮砂仁

半兩

巴戟

酒浸去心式兩

右件為細末酒糊為丸如桐子大朱砂為衣每服二十九空

心鹽湯溫酒下

**天真丹**

治下焦陽虛

沉香

去心

巴戟

酒浸去心

茴香

鹽炒香去鹽用

草薢

酒浸炒

胡芦巴

炒香

破故紙

炒香去

杜仲

絲去

牽牛

鹽炒香去鹽

琥珀

各壹兩

桂

半兩

右件一十味為細末用元浸藥酒打麵糊為丸如桐子大每

服五十九至七十九空溫酒下

**八味丸**

治腎氣虛之下元冷備臍腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱

肢躄倦怠面色痿黃或鰲黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼

痛少腹急痛小便不利並宜服之

熟地黄八兩山藥

山茱萸

各四兩

桂去皮

牡丹皮

澤瀉

各參兩

附子

炮式

白茯苓

去皮

參兩

右件為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九至七十九溫酒送下鹽湯亦得空腹食前婦人淡醋湯下

陽事多痿不振依全方然夏減桂附一半春秋三停減一疾

去精走全減桂附只服六味地黄丸

血虛陰衰熟地黄為君

精滑山茱萸為君小便或多或少或赤黃白茯苓為君小便

淋瀝澤瀉為君心虛腸胃間積熱心火盛心氣不足牡丹皮

為君皮膚燥澀乾山藥為君已上但言為君者其分兩用乾

地黄分兩其乾地黄却依立為君分兩同

幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘

通幽湯

當歸身 升麻

桃仁泥子 各壹分

生地黄

熟地黄 各伍分

紅花

炙甘草 各壹分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前

潤腸湯治大腸燥結不通

升麻

當歸尾

生甘草

煨大黃

桃仁

麻仁

熟地黄 各壹分

生地黄 各壹分

紅花 叁分

右件剉如麻豆大都作一服水三盞先拌藥濕煎至一盞去

滓帶熱服食前

脚氣論

夫脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致其治法自應不

同南方之疾北方之疾自內而致者也南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始北方之人常食漣乳又飲之無節且漣乳之爲物其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰其氣與味宣之於經絡化之爲氣血苟元氣不充胃氣本弱飲食自倍脾胃乃傷其氣與味不得宣暢旁通水濕之性潤下而致之也

**當歸拈痛湯** 治濕熱爲病肢節煩疼肩背沉重脅膈不利及遍身疼痛下痊於足脛腫痛不可忍

羌活 半兩 人參 去苦 苦參 酒洗 升麻 葛根

蒼朮 各式 炙甘草 黃芩 酒洗 茵陳葉 酒炒各伍分

防風 去苦 當歸身 知母 酒洗 黃芩 炒 澤瀉

猪苓 各參 白朮 壹分



右咬咀如麻豆大每服一兩水二大盞半先以水拌濕候少時煎至一大盞去滓溫服空心食前待少時以美饌壓之臨卧一服不須飯壓

**羌活導滯湯** 治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便溺阻隔以此藥導之後以當歸拈痛湯除之

羌活 獨活各半兩 大黃酒煨壹兩 防己 當歸各叁分

枳實 麸炒貳分

右件咬咀如麻豆大每服秤五錢或七錢水二盞煎至一盞去滓溫服以微利則已量虛實加減

**開結導引丸** 治飲食不消心下痞悶

橘皮 白朮 澤瀉 茯苓 麥蘗麩

炒麴各壹兩 乾生姜 青皮各半兩 枳實麸炒兩半 半夏湯洗七次壹兩

如有積塊加巴豆霜一錢半

右件為細末湯浸餗餅為丸如桐子大每服三五丸至七

十九溫水下食遠

**除濕丹**治諸濕客傳腰膝重痛足脛浮腫

檳榔

甘遂

威靈仙

赤芍藥

苧藤

各式兩

乳香

沒藥

各壹兩另研

牽牛

半兩

大戟

炒叁兩

陳皮

去白肆兩

右為末麩糊為丸如桐子大每服五十九至七十九溫水下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒二日藥後亦忌濕

麩三兩日食溫淡粥補胃尤佳

**淋瀝脚氣除濕湯**內受濕氣不能外達淋瀝開導泄越其邪

葳靈仙

防風

去土戶

荊芥穗

當歸

去土戶

地骨皮

崩龍葉 升麻 去腐 白芍藥 去皮已上

右件各剉細末水二斗煮至一斗五升去滓執泔洗無時

**枳實大黃湯** 治脚氣腫痛

羌活 乙分 當歸身 乙分 枳實 大黃 各半分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞半煎至一盞去滓大温

服空心下利一两行痛止

中風有二

内經曰人之氣以天地之疾風名之故中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰者多有此疾壯歲之際無有也若肥盛則間有之亦形盛氣衰如此治法和藏府通經絡便是治風然輕重有三中血脉則口眼喎邪亦有賊風襲虛傷之者也中府則肢廢中藏則性命危急此三者治各不同如中血脉

外有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治之中府內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦羌湯羌活愈風湯治之中藏痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脈中府之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治脾入肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麪莫之能出又不可一槩用大戟芫花甘遂瀉大便損其陰血真氣愈虛方列于后

**小續命湯**

麻黃 去節

人參 去芦

黃芩 去腐

芍藥

炙甘草

川芎

杏仁

麩炒去皮尖

防已

官桂

各壹兩

防風

壹兩

附子

炮去皮臍細剉半兩

右除附子杏仁外搗為麩末後入二味令勻每服五錢水一



盞半入生姜五片煎至一盞去滓稍熱服食前

始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異也開則洒

然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之

中風無汗惡寒 **麻黃續命湯**

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍宜鍼太陽經至陰出血崑崙舉蹠

中風有汗惡風 **桂枝續命湯**

桂枝 芍藥 杏仁

依本方加一倍宜鍼風府此二證太陽中風也

中風身熱無汗不惡寒 **白虎續命湯**

石膏 知母 一料中各加式兩 甘草

依本方加一倍

中風身熱有汗不惡風葛根續命湯

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

中風無汗身涼附子續命湯

附子

加壹倍

乾姜

加貳兩

甘草

加參兩

宜鍼隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

中風有汗無執桂枝續命湯

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜鍼太谿此一證少陰經中風也

無此四證六經混看繫於少陽厥陰或肢節痠痛或麻木不仁

宜羌活連翹續命湯

小續命 捌兩 羌活 肆兩 連翹 陸兩

右古之續命混肴無經今立分經治療又分各經鍼刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是鍼灸同象治法之大躰也

**疎風湯** 治半身不遂或肢躄麻痺筋骨疼痛

麻黃 去節 參兩 益智仁

杏仁 炒去皮 各壹兩 炙甘草 升麻 各伍兩

右件咬咀每服一兩水一小盞煎至六分去滓熱服脚登熱水葫芦以大汗出去葫芦冬月不可

中風外有六經之形證先以加減續命隨證治之內有便溺之阻隔復以**三化湯**導之

厚朴 姜製 大黃 枳實 羌活

右剉麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微

利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服  
大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不  
可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之  
法也久之清濁自分榮衛自和矣

**羌活愈風湯**

療腎肝虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風濕內  
弱者是風熱躰重也或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂或  
恐而健忘喜已多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病  
生靜則萬病息是以此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草

防風

黃耆

蔓荊子

川芎

細辛

枳殼

人參

地骨皮

麻黃

知母

甘菊

薄荷

枸杞

當歸

獨活

白芷

杜仲

秦艽

去芦

去苗

去芦

去骨

去芦

去芦



柴胡去苗半夏湯洗姜製厚朴姜製熟地黄防已已上各

芍藥去皮黃芩去腐白茯苓去皮各參兩石膏肆兩

生地黃各肆兩蒼朮壹兩前胡貳兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生

姜三片煎服空心一服臨卧再煎滓服俱要食遠空心一服

喫下二丹丸為之重劑臨卧喫下四白丸為之輕劑立其法

是動以安神靜以清肺

假令一氣而微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每

服加生薑五七片空心服之以粥投之得微汗則佳

如一旬之通利用愈風湯三兩大黃一兩亦勻作四服如前

煎臨卧服之得利為妙

常服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏二兩

柴胡二兩通四兩人參二兩通四兩謂迎而奪少陽之氣也  
望夏之月半加石膏二兩通六兩黃芩二兩通五兩知母二  
兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也

季夏之月加防已二兩通四兩白朮二兩茯苓二兩通五兩  
謂勝脾土之濕也

初秋大暑之後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂一兩通二  
兩謂迎而奪太陰之氣也

霜降之後望冬加附子一兩官桂一兩當歸二兩通四兩謂  
勝少陰之氣也

二丹丸四白丸方在後衛生寶鑑內附

得春減冬所加藥四時加減類此此藥具七情六慾四氣無  
使五藏偏勝反不動於榮衛如風秘則服之永不燥結如父

瀉則服之能自調適初覺風氣便能服此藥及新方中天麻  
丸一料相為表裏治未病之聖藥也及已病者更宜常服無  
問男子婦人小兒風癩急慢驚風等病服之神効如解利四  
時傷寒隨四時加減法服之

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於  
筋故手足不能運化舌強不能言宜養血而筋自榮也當以大  
**秦朮湯**主之

秦朮

石膏

各貳兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黃

熟地黃

白茯苓

各壹兩

細辛

半兩

右剉每服一兩水一盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰

加生薑七八片如心下痞每服一兩內加枳實一錢同煎

肺寒則面白生痰喘咳噎唾

**半夏溫肺湯** 治心腹中脘痰水冷氣心下注洋嘈雜腸鳴多唾

口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉

絃細遲

細辛

橘皮

桂心

人參

旋覆花

甘草

桔梗

芍藥

半夏

赤茯苓

右為麤末每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓温

服食後

**丁香半夏丸** 治心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口中多涎

檳榔

丁香

半夏

細辛

乾姜

人參 各半兩

參分

各壹兩

參分



右為細末生薑麩糊為丸如桐子大每服三十九生薑湯下  
日三

**紫蘇飲子** 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉 桑白皮 青皮 五味子 杏仁

麻黃 甘草 陳皮各伍 人參 半夏湯洗各

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎至七分去滓溫服

肺病面白而不澤則為脫氣脫血脫津脫液脫精脫神

**巴戟丸** 治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充越肌膚進美飲食

五味子 川巴戟法 肉苁蓉 人參 兔絲子

熟地黄 覆盆子 白朮 益智仁炒 骨碎補洗去

白龍骨 茴香 牡礪各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九空心食前米飲

送下此藥補精氣止汗

**雙和散** 補益血氣治虛勞少力

黃耆

熟地黄 當歸

川芎 各壹兩

白芍藥 參兩半

官桂

甘草 各參分 人參 參分

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片肥棗一枚同煎至八分

去滓溫服大疾之後虛勞氣乏者以此調治皆驗溫而有補

**附子溫中丸** 治脾胃順氣化痰嘔吐噎隔留飲腸鳴溫冷泄注

辟寒養正氣

附子

乾姜

白朮 各壹兩

肉桂

炙甘草 各伍分

良姜 柒分

右為細末煉蜜為丸一兩作十九每服一九細嚼生姜搗皮

湯送下米飲亦得食前

五邪相干 謂賊實微虛正也

假令肝病 實邪風熱相合風性急火搖動焰而旋轉其脉弦而緊洪風熱發狂宜黃湯

羌活 川芎 大黃 各壹兩 甘草 半兩

右咬咀每服半兩水二盞煎至六分去粗濕服

虛邪風寒相合木慮腎恐拘急自汗其脉弦緊而沉仲景云風感太陽移證在太陽經中桂枝加附子湯主之

賊邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脉弦浮而濇仲景云血虛筋急桂枝加栝蒌湯主之

微邪風濕相合躄重節痛藏府洞泄脉弦長而緩仲景云身體疼痛下痢清穀急當救裏四逆湯主之

正邪中風目眩頭重叫怒不吐脉弦緊而長仲景云甚則如癰

爲瘧真羌活湯本草云羌活主瘧主癩防風黃芩爲佐小兒爲癩大人爲瘧

假令心病 實邪熱濕相合憤憤心煩熱蒸不眠脾經終於心  
心經起於心二經相接故爲濕熱脈浮大而緩足太陰寄  
證在手太陽宜梔豉湯若痞加厚朴枳實

虛邪熱風相合妄聽妄聞耳簫聲膽與三焦之經同出於耳  
銅人云刺關衝出血瀉支溝脈浮大而弦初小柴胡湯後  
大柴胡湯此證是太陽與少陽爲病前客後主也

賊邪熱寒相合膽惕心懸如飢神怯恐怖足少陰與手厥陰  
相接水中心經守邪故神怯怖耳脈大而沉濡亦在太陽  
經中內經曰心虛則熱收於內黃連附子瀉心湯主之法  
云謂熱多寒少以爲佐矣如寒多熱少加附子乾姜佐之



微邪熱燥相合過飲歌樂實為熱燥俗言暢飲也病人曰快活快活是有聲於歌樂也以意思疑是無聲歌樂也脉洪大而瀉白虎湯主之喘則加人參

正邪熱也脫陽見鬼躁擾狂起脉洪實一呼四至是八至脉也小承氣湯主之謂復不堅大也

假令脾病實邪濕燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其脉緩而長瀉是正陽陽明證也調胃承氣湯主之

虛邪濕熱相合熱陷胃中腸癖下血脉中緩大黃黃連解毒湯主之

賊邪濕風相合嘔逆脇痛往來寒熱脉緩而弦長小柴胡湯主之

微邪濕寒相合濕與寒交寒來求濕身黃而不熱体重而不

渴謂之寒濕其脉緩沉而滑木附湯主之如小便不利者  
加茯苓

正邪濕自病腹滿時痛手足自溫其脉沉澹而長虛痛桂枝  
加芍藥湯主之實痛桂枝加大黃湯

假令肺病 實邪燥寒相合毛聳皮涼澀多而清其脉短澹而  
沉此證如秋冬宜八味丸若春夏宜地黃丸

虛邪燥濕相合微喘而痞便難而痰其脉浮澹而緩枳實理  
中丸主之如喘甚加人參若便難加木香檳榔各半錢爲  
極細末煎下理中丸

賊邪燥熱相合鼻塞翹衄血溢血泄其脉澹而浮大甚者桃  
仁承氣湯微者犀角地黃湯極者抵當湯微極抵當丸

微邪燥風相合皮著甲枯血虛氣虛二藏俱虛先血後氣其

脉浮瀋而弦久養氣血藥主之

正邪燥自病其氣奔鬱皆屬於肺諸燥有聲其脉浮瀋而短  
列諸嗽藥選而用之

假令腎病 實邪寒風相合藏不藏散下利純清其脉沉滑而  
弦仲景云少陰證口燥咽乾下利純清大承氣湯主之脉  
沉弦而遲四支逆冷者宜四逆湯等

虛邪寒清相合昏唾多呻洒淅寒清無寐經言燥化清其脉  
沉實而瀋酸棗仁湯主之

賊邪寒濕相合腎爲胃閉閉水溢閉閉不利水在胃爲腫  
水在肺爲喘及變諸證其脉沉緩而大仲景云大病差後  
腰下有水氣者牡蠣澤瀉湯主之

微邪寒熱相合膀胱熱鬱津液枯少其脉沉濡而大內經曰

水少乾涸也猪苓湯主之

正邪寒自病寒忽用藏黑痺經沉其脉沉濡而滑黑痺天麻丸如證同脉異微者府病也甚者藏病也

### 淹疾瘧病

肝病 面青脉弦皮急多青則痛形盛骨脇痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔以上是形盛 當和之以小柴胡湯也如形衰骨搖而不能安於地此乃膝筋治之以羌活湯本草云羌活為君也瘧證取以少陽如久者發為痺瘧宜以鏡針刺絕骨穴復以小柴胡湯治之

心病 面赤脉洪身熱赤多則熱暴病壯熱惡寒麻黃加知母石膏黃芩湯主之此證如不發汗久不愈為瘧也淹疾頰腫面赤身熱脉洪緊而消瘦婦人則亡血男子則失精



脾病面黃脉緩皮膚亦緩黃多則熱形盛依傷寒說是爲溫溫其脉陽浮而弱陰小而急治在太陰溫溫自汗白虎湯加蒼朮主之如久不愈爲濕瘧重暍白虎加桂枝主之淹疾肉消食少無力故曰熱消肌肉宜以養血涼藥內經曰血生肉

肺病面白皮濇脉亦濇多白則寒暴病濇痒氣虛麻黃加桂枝令少汗則出也傷寒論云夏傷於暑汗不得出爲痒若久不痊爲風瘧形表面白脉濇皮膚亦濇形羸氣弱形淹衛氣不足

腎病面黑身涼脉沉而滑多黑則痺暴病形冷惡寒三焦傷也治之以姜附湯或四逆湯久不愈爲瘧暴氣衝上吐食夜發俗呼爲之夜瘧太陽經桂枝證形衰淹疾黑痺羸瘦風痺痿厥不能行也

百病在氣在血

夫百病晝則增劇遇夜安靜是陽病有餘乃氣病而血不病也  
百病夜則增劇晝則安靜是陰病有餘乃血病而氣不病也  
晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也

晝則安然夜則發熱煩燥是陽氣下陷入陰中也名曰熱入  
血室

晝則發熱煩燥夜則發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其陽  
峻補其陰

夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺於陰分也

夜則惡寒晝則惡寒是重陰無陽也當亟瀉其陰峻補其陽  
夜則安靜晝則惡寒是陰氣上溢於陽中也

夫五藏有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有二法以輕手捫

之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脈也重按之至筋骨  
之分則熱蒸手極甚輕手則不熱是邪在筋骨之間也輕手  
捫之不熱重加力以按之不熱不輕不重按之而熱是在筋  
骨之上皮毛血脈之下乃熱在肌肉也此爲三法以三黃丸  
通治之細分之爲五等

肺熱者輕手乃得但微按全無是瞥瞥然見於皮毛之上日  
西尤甚乃皮毛之熱其證必見喘咳洒淅寒熱輕者瀉白  
散重者涼膈散白虎湯地骨皮散

心熱者心主血脈微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微  
按至皮毛之下則熱少加力按之則全不熱是熱在血脈  
也日中大甚乃心之熱也其證煩心心痛掌中熱而噦以  
黃連瀉心湯導赤散朱砂安神丸清涼飲子

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕  
手重手其間熱在肌肉遇夜尤甚證必怠惰嗜卧四肢不  
收無氣以動瀉黃散

肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱寅卯間尤甚  
其脉弦四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋痿不  
能起于床瀉青丸柴胡飲子

腎熱者輕手重手俱不熱如重手按手骨分其熱蒸手如火  
其人骨蘇蘇如虫蝕其骨困熱不任亦不能起于床滋腎  
丸六味地黃丸

治病必須求責

假令治病無問傷寒畜血衄血發黃等諸證并一切雜證等各  
當於六經中求責之謂如黃證或頭痛腰脊強惡寒即有太



