

類證治裁卷之八

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

調經論治

婦科首重孕育。孕育先在調經。素問曰。女子二七天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。言天一之真精至。月信亦通。乃能孕子。謂之月事者。女子屬陰。其血如潮。應月之盈虧。有常期者也。故謂之經。儻一愆期。則失其常度。而諸病生焉。夫任主胞胎。衝爲血海。二脈流通。臟腑之血。皆滙注於此。衝任皆奇經。而血之生化。由脾胃。若七情內損。六淫外侵。兼之過食勞倦。致脾胃日虧。化源日薄。衝

任日衰神色日奪所重尤在調肝蓋婦女善鬱木失條暢枝葉萎  
悴肝不藏血經之所由不調也然不調之中有先期有後期有錯  
亂有痛經有倒經有居經有淋瀝不斷有枯閉不通經不準必不  
受孕然參前數日受孕者有之當經行食禁生冷藥忌寒涼以血  
得寒則凝滯不行不慎禁忌則腹痛瘦泄亦致不調且血隨氣行  
經不調多由於氣丹溪謂經來成塊者氣之凝也將行作痛者氣  
之滯也行後作痛者氣血虛也先期而來者血熱後期乃至者血  
虛亦無不由氣也錯經妄行者氣之亂也色淡者虛而挾水也紫  
者氣之熱黑者熱甚也乍少乍多淋瀝不斷者氣不攝血也故調  
經必兼氣藥更若臟損經閉則由悲傷肺憂傷心思傷脾怒傷肝

房勞傷腎。肺傷則氣陷血脫。心傷則驚悸盜汗。脾傷則食減肌瘦。肝傷則髮焦筋痿。腎傷則淋帶骨蒸。甚至嗽熱泄瀉。衝任虧敗。源涸流竭。如素問云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。其在女子爲不月。夫心主血。脾統血。因思慮過度。所願不遂。鬱而成損。則先經閉。而後乾嗽。累月經年。遂成乾血勞瘵。治難措手矣。古謂經前勿補。經後勿瀉。此爲經期腹痛者言之。其實調經之要務。令血氣和平。自然經準。受孕如陽太過。則先期。原因有火。然虛而生火。仍當養營攝血。亦有無火而先期。或補中氣。或固腎關。不宜過用寒涼也。陰不及。則後期。本屬血虛。然有血熱而燥瘀者。宜清補。亦有血逆而留滯者。宜疏利。毋庸預執溫補也。其陰陽乖亂。錯經妄行。或由

火邪搏營遲早互見或由經氣舛逆口鼻上衝務審其虛實寒熱

而調之至於經期前後腹痛虛實懸殊經未行而先痛者血為氣

滯經通則痛自除經已行而猶痛者衝脈本虛血去則痛益甚滯

者理其氣溫而行之虛者培其營峻以填之設淋瀝不止必固以

攝之亦有腹愈痛經愈多至痛欲死者係火搏於血治宜行血如芎

歸等斂血如芎芎等理脾如芎芎等以益母破氣中之血以延胡破血中之氣

以香附開其鬱虛者加人參理脾則血有統破結則火痛悉除故

調經莫如入珍湯加益母延胡其經閉不行肥人多痰塞導痰湯加川芎川連瘦人多

鬱火四物湯加丹皮山梔澤蘭因脾胃虧而食少者旺其運納之權歸芍異功散因

肝腎虧而骨蒸者壯其營陰之本地黃湯去萸澤加龜板五味子因思慮鬱損心

脾者歸脾丸因勞嗽傷肺氣者枳勞散或溫養下焦熟地沙苑

眼芡實小營煎或宣通奇脈杞子牛膝當歸若枯閉日久輕用破血通經紫苑湯

鹿角膠澤蘭茯神香附則愈枯其枯矣又有經後發熱倦怠兩目如帛蔽不明此脾腎精

華不能上注於目也朝用補中益氣湯夕用地黃丸至於七七數盡當

斷不斷或因氣血有餘若已斷復來者即為崩漏宜固攝衝脈大補

元煎加續斷阿膠海螵蛸兔絲年高經或大行腹痛不止者危

經閉論治

經閉論治

潔古曰經言月事不來者胞脈閉也胞脈屬於心絡於胞中今氣

上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑加苓連四

湯去後服局方五補後以衛生治脾養血也李氏論經閉有二曰

硝黃五補後以衛生治脾養血也李氏論經閉有二曰

頁登台哉 卷之八 上 調經 三

血滯血枯如經行時餘血一點未淨或外感風寒內傷生冷七情

鬱結為痰為瘀凝窒經絡為血滯或經盡後勞傷衝任欬嗽骨蒸

火逼水涸為血枯血滯經閉如當歸散元歸散以破瘀加味導痰湯以滌痰滯

去則經通若血枯經閉多主傷肝素問云有病胸脇支滿妨於食

病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病

名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月

事衰少不來也治以四烏鯽骨一蘆茹二物并合以五丸為後飯

飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也蓋胸脇支滿肝病也妨食肝病傳脾也

故聞腥臊臭出清液肝病肺乘也故唾血四支清目眩肝血傷矣蘆茹即茜根能散血後飯先藥有因飲

也鮑魚汁利腸垢和肝傷取臭穢以佐烏鯽骨辟宿瘀也食勞倦損傷脾胃者節齋云只宜補養脾胃  
白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃耆甘草

陳皮。麥芽。川芎。當歸。柴胡。脾能生血。經自行矣。有因思鬱致損心血者。寇宗奭

云。童男室女。積想在心。思慮過度。男則神色消散。女則月水先閉。

蓋憂愁思慮多傷心脾。故神衰食減。火炎燼金。肺金燥。腎水絕。木

氣失榮。四肢乾痿。五臟傳遍。死矣。能改易心志。用藥扶持。宜柏子

蘭湯。益陰制火。忌青蒿 蚩蟲等涼血行血。凡經閉因血滯者。多凝瘀積痰。

牛膝散。若胃熱消渴。津液燥竭。玉燭 歸脾潮熱骨蒸。

加味逍遙散。室女經行復閉。羸熱成勞。肝脈弦出寸口。上魚際者。

加熟地龜板。宜加味小 柴胡湯。若乾嗽。地黃湯。去丹澤。加甜 杏仁。五味。白芍。貝母。婦人經少漸閉。

急與婚配。五心煩熱。肌削脈數。乃陰虛陽乘。當養血益陰。人參固 本丸。下利而經

斷者。利止經自來。若脈微濇。雖經止二三月不行。亦非胎。養血經

自行也。

經早先期至者主血熱。加味四物湯。立齋分肝經血燥者。加味逍脾

經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火者。加味小柴胡湯。血分有熱者。加味四物湯。勞役

動火者。補中益氣湯。景岳分血赤濃紫。脈洪多火而經早者。清化微

火陰虛內熱動血者。保陰煎。脈症無火。心脾不攝。經亦早者。小營

福飲。加杜仲五味子。若一月二三至者。乃氣血敗亂。當調其寒熱虛實。不

得以經早血熱概之。大約血熱者。腹多不痛。其來必多。固經丸

黃芍藥。

經遲後期至者主血虛。加味八珍湯。立齋分脾經血虛者。人參養營湯。肝經血

少者。地黃湯。氣血俱弱者。八珍湯。景岳分血淡不鮮。脈微遲無火而

後期者。大營煎。亦有陰火內燦。血本熱而仍後期者。乃水虧血少。

加味四物湯。地黃丸。過期作痛者。氣血兩虛。入珍湯。加木香。肥人過期色淡為痰。

二陳湯。加芎歸貝母。大約血虛者。腹多空痛。脈大無力。或濡細。入物湯。加香附。

經亂遲早無定。午前午後。多因心肺虛損。滋血湯。或因受驚氣亂。經亦

亂者。茯神。棗仁。柏子仁。麥冬。下歸附丸。或氣盛於血。不受孕者。抑氣散。景岳分三

陰虧兼陽虛者。大營煎。去牛膝。憂思損心脾者。歸脾湯。七福飲。食少脾不健運。

宜溫燥者。理中湯。六君湯。脾虛不攝為淋漏者。保元湯。加杜仲。芡實。牡蠣。肝虛不藏。

多驚惕者。補肝散。去獨活。木瓜。加茯神。情志不遂。肝脾氣結。經期亂者。逍遙飲。

經痛有經前身痛拘急者。散其風。越痛散。加秦艽。有經前腹痛畏冷者。溫其

寒。調經飲。加薑。桂。茴香。氣滯者行其滯。加味烏藥湯。血瘀者逐其瘀。通瘀煎。氣血

疝結者理其絡。失笑散。癥瘕痞脹者調其氣血。交加地黃丸。虛寒急痛

者溫其裏。煎五物。痛在經後者補其虛。八珍湯。一切心腹攻築脇

肋刺痛。月水失調者和其肝。元胡索散。經滯臍腹痛不可忍者。

導其壅。琥珀散。從本事方改訂并治產後惡露不快。血上搶心迷悶不醒氣絕欲死。金匱云婦人腹

中痛。當歸芍藥湯主之。此補中瀉木。又云婦人腹痛。小建中湯主之。此亦補脾

伐肝之意。

經色

凡經以色紅為正。其紫者風也。四物湯加荆防白芷。黑者熱甚也。四物湯加芩連。

紫黑兼腹痛者氣血併也。四烏湯加蓬朮川連。不痛者。但加川連。淡白者虛而

兼帶也。芎歸湯加參耆朮芍。赤白兼臍腹冷痛者虛寒也。伏龍肝湯。如米泔水

如屋漏水。或帶黃混濁模糊者淫痰也。六君湯加蒼朮香附。如豆汁者熱

也。四物湯加丹參丹皮。成塊成片者。血隨氣凝。或風冷乘之也。通瘀煎。去澤泄。風

入胞門。忽崩鮮血。一味防風丸。旋覆花湯下。

經倒

經期氣逆直犯清道。而為吐衄。宜折其逆勢而調之。用山梔丹。皮生地丹。

參白芍蘇子鬱金童便。或用四物湯和韭汁童便服。因怒火傷肝致逆者。龍膽丹皮青皮。黃芩白芍山梔。

因心氣不足。衄血面黃者。茯苓補心湯。

居經

三月一行為居經。俗名按季。或由脈微氣血俱虛。或由寸口脈微而

濇。少陰脈微而遲。或由陽脈浮大陰脈反弱。又一歲一行者為

避年。此因稟受不齊。勿與經閉同治。

淋瀝

不止。症多氣不攝血。止經湯。子宮虛寒淋瀝。膠艾四物湯。血分有熱不

斷。蒲黃散。

乍多經水過多當歸過多淋瀝膠艾四物湯經水濇少四物加

調經脈候

尺脈滑血氣實婦人經脈不利。少陰脈弱而微則少血。寸口脈浮而弱浮則為虛弱則無血。脈來狀如琴絃苦少腹痛主月水不利孔竅生瘡。肝脈沈主月水不利腰腹痛。尺脈來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆。腎脈微濇為不月。

附方

八珍湯 見一卷中風

導痰湯 見一卷中風

氣血痰阻

補血 四物湯 見一卷中風

補脾 歸芍異功散 異功散見中風 此加 歸 芍各二錢

補腎 六味地黃湯 見一卷中風

心脾 歸脾湯 見二卷勞瘵

心脾 小營煎 歸地各二錢半 白芍 杞子 山藥各二錢

勞嗽 劫勞散 見二卷勞瘵 炙草一錢 茯神

傷 紫苑湯 見二卷肺癰

升 補中益氣湯 見一卷中風

固 大補元煎 見一卷中風

降 芩連四物湯 四物湯加 芩 連

燥肝熱瀉瘀通補通補通瘀破瘀破血氣血氣火心

三和湯

地芎歸芎芎  
薄荷等分水煎  
地骨皮等分蜜丸  
酒下

五補丸

參芎各二兩  
黃耆三兩  
炙草一兩  
每服半

衛生湯

歸水煎  
芎各二兩  
黃耆三兩  
炙草一兩  
每服半

當歸散

歸末酒下二錢  
芎劉寄奴  
枳壳延胡  
沒藥等分爲

元歸散

元胡索當歸  
每服三錢  
加薑煎

柏子仁丸

柏子仁牛膝  
卷柏各五錢  
澤蘭葉續斷

澤蘭湯

澤蘭葉三兩  
歸芎各一兩  
甘草五錢  
每服

牛膝散

牛膝一兩  
歸芎  
枳丹  
桃仁延胡  
木

玉燭散

香各七錢五分  
爲末每服三錢  
酒調

加味道遙散

見一卷火

肝怒益陰血熱火熱內熱心脾經多

加味小柴胡湯小柴胡湯見一卷溫 此加 麥冬 生地

固本丸 見一卷中風

加味四物湯 四物湯加 丹 梔 柴

清化飲 地 芍 丹 芩 苓 麥各二錢 石斛一錢  
如小水赤熱怒火動血加黑山梔 夜熱加地骨皮

保陰煎 見五卷瘧

七福飲 見三卷鬱

固經丸 黃藥 白芍各三兩 黃芩二兩 炙龜版四兩  
檉根皮 便製香附各一兩半 酒糊丸桐子大每

服五七十九

白湯下  
加味八珍湯 八珍湯加 柴胡 黃耆各五分 香附 丹

養營湯 見二卷勞瘵

經遲

大營煎 見三卷關格

痰阻

二陳湯 見一卷中風

痛虛

八物湯 地芎歸 芎 延胡 香棟各一錢 木香

亂經

滋血湯 參耆苓 山藥各一錢 芎 芎 地各八分

亂氣

歸附丸 當歸四兩 香附八兩 童便浸透晒乾再加酒醋鹽 薑汁製 為末醋糊丸 空心砂仁湯下三錢 血

氣盛

寒加桂附 抑氣散 香附四兩 陳皮一兩 茯苓 甘草各五錢 為

脾虛

理中湯 見一卷中風

補脾

六君子湯 見一卷中風

脾虛

保元湯 見一卷火

虛

...

肝虛

補肝散

地

水各一兩  
山藥

棗仁

獨活各四兩  
木瓜各五錢

歸芎  
為末每服

五錢  
棗煎

加

情志

逍遙飲

熟地三錢  
陳皮八分

當歸

棗仁各二錢  
遠志五分

茯神

白芍各  
氣虛

加人

參

越痛散

虎骨

歸

芍

木

苓

草

防

芷

續斷

風痛寒痛

調經飲

當歸  
各錢半

牛膝各三錢  
山查炒二錢

製香附二錢

水煎

脹悶

加厚樸

青皮

砂

仁  
氣滯

加烏藥

行滯

加味烏藥湯

烏藥

砂仁

木香

元胡索各一兩  
為末每服七錢

香附  
薑三

片  
水煎

逐瘀

通瘀煎

見五卷厥

理絡氣血

溫裏和肝導壅

腹痛腹痛紫黑

失笑散

見六卷胃脘疼

交加地黃丸

生地一觔搗汁浸生薑渣  
香附八兩

生薑一觔搗汁浸  
人參一兩五錢  
桃仁

二兩

延胡索

當歸

川芎

白芍

沒藥

木香各一兩五錢

糊丸

五物煎

熟地

當歸各二錢

白芍錢半

川芎

肉桂各

延胡索散

延胡索

歸

芍

乳

沒

蒲黃

桂心各一

琥珀散

三稜

莪朮

延胡索

赤芍

劉寄奴

丹皮

熟地

當

薑半觔切醋焙乾入後藥研

每服二錢

溫酒下

一方有琥珀

當歸芍藥湯

當歸

白芍

川芎

茯苓

澤泄各一錢

小建中湯

見一卷傷風

四烏湯

四物湯加

烏藥

香附

甘草

五錢

各四兩

各

各

各

經淡腹痛風襲通絡血

芎歸湯 川芎 當歸

伏龍肝湯 見四卷痢

一味防風湯 防風 研醋丸 每服二錢半 葱白湯下

旋覆花湯 見二卷痰飲

茯苓補心湯 茯苓六錢 桂枝三錢 甘草二錢 紫石英 一兩 麥冬 人參各五錢 大棗四枚 赤

小豆一合 水煎 日三服

止經湯 四物湯各一錢 白朮 黃芩 阿膠 蒲黃 柏 葉鹽水炒各七分 香附一錢 砂仁 甘草各五

分 薑三片 水煎

膠艾四物湯 熟地 白芍各一錢 當歸 艾葉各七分半 阿膠 川芎 甘草各五分 水煎

蒲黃散 黃芩五分 當歸 柏葉 蒲黃各四分 生地 伏龍肝一錢二分 艾葉各一分

瀝血瀝淋

頁登台

卷之八上

調經

經多

研末水煎服

當歸飲

地芎  
崩者加

阿膠 芎

黃芩 山梔

地榆 白朮

荆芥 如久不止

甘草 成血水

經少

煎服

四物加葵花湯

地芎  
加紅花

歸芎  
血見愁

紅葵花各二錢

一方

調經

李氏月事兼旬再至小腹痛脹面黃食減手足心熱口微渴脈虛

促此脾肝腎陰液虧損症也延成勞熱則難治暫用阿膠四物

湯潞參熟地

砂仁末炒各三錢

當歸白芍

酒炒各二錢

川芎

八分

阿膠

水煨二錢

冬山梔續斷

俱炒各錢半

香附

童便炒二錢

四服諸症俱減改用八珍湯

去白朮仍加阿膠麥冬脈較和食較進後需用潞參

五錢龍眼肉

二錢煎服味甘生液又用歸脾丸加白芍香附常服經始調

殷氏年少脈勻主無病尺中虛必月信後期溺後白淫非不孕之

體據述經前不痛但遲後色淡平時白帶耳治宜補氣以培營

之源攝下以固腎之滑用秘元煎人參茯苓白朮炙草棗仁山

藥芡實加當歸白芍杜仲何首烏服之可孕

沈氏按月倒經血出鼻口此由肝火上迫不循常道宜抑肝火導

歸衝任可使下行此即搏躍過顙之理擬四物湯去川芎其當

歸用醋製加生熟山梔各二錢丹皮二錢黃芩枳壳各錢二分降香甘草

各一錢鬱金五分每月經前服四劑後得轉逆為順

蕭氏經前腹痛經後淋瀝脹滿食減脈虛小係衝任血滯而主治

宜在脾用香附薑製砂仁茯苓白朮炙草當歸白芍桂木炒木香延

胡酒炒杜仲薑汁炒續斷神麴糊丸薑湯下一料宿疴愈而獲孕

徐氏積年痛經屬血中氣滯用調經飲當歸牛膝製香附茯苓山

查肉加烏藥小茴香痛止後因挾虛遲早不調用芎歸六君湯

加益母膏白芍香附紅棗而經調

李氏妾年二十以來天癸未通其夫懼不能孕育予謂此稟受陰氣不足也但多服六味地黃丸陰氣充經脈自行後生數子

陳氏性褊不育脈沈滯氣急痰悶經閉三載當先調暢肝鬱三因七氣湯半樸苓蘇加當歸香附鬱金合歡玫瑰二花煎隨用平調肝腎甘杞子沙苑子補骨脂牛膝當歸製首烏益母霜意取溫行不十服經行矣

吳氏結禱數載經閉年餘入夏氣泄脈微弦少力肌削神疲平昔胃納不多而衝脈隸於陽明謂之血海因陽明生化不足故月事不以時下也症成下損竝無瘀阻切忌通經治先調補胃陰

以生液潞參三錢山藥炒茯神棗仁白芍當歸杞子俱炒各二錢五味

焙五分麥冬一錢湘蓮南棗各十枚十服食味頗甘精神較爽前劑去

麥味參入澤蘭湯用潞參山藥茯神各三錢熟地炒一錢白芍當歸

各二錢澤蘭甘草各一錢牛膝酒蒸六分益母膏三錢冲服甚適所慮節交

夏至症必變重耳

此方治諸不香泄瀉諸症急開餘閉三薄當去隔即服之而  
除不以此山山參煎六水煎實其對症之藥強自以於於於  
辛丑安中二十日來天突未即其夫雖不謂平育子醫也真矣  
賦益世膏白芍香制珠裝而致隨

崩漏論治

崩者血暴下成塊如山豕。崩漏者經繇延不止。如漏卮難塞。素問曰陰虛陽搏謂之崩。又曰陰絡傷則血內溢。蓋血行絡中。滙於衝脈。衝為血海。非陽盛搏陰致損內絡。則不至橫決而下。且心主血。脾統血。肝藏血。凡憂思怒勞。激動五志之火。皆能損絡。使衝任胞胎失守。致經血暴注。久而不止。謂之崩中。良方亦謂婦人崩中。由臟腑虛。衝任亦虛。不能約制其經血。或陽搏陰熱。傷衝任。血得熱則流溢。甚至昏仆。其脈疾小為順。洪大為逆。大法當調補脾胃。濟陰綱。目曰崩漏屬氣虛。不能約制。則宜補氣。其為熱所乘者。則宜涼血。不當混言調補脾胃。嘗析而言之。有臟腑及衝任陽虛者。有臟

腑○及○衝○任○陰○虛○者○有○陰○虛○兼○陽○亢○者○有○初○損○臟○腑○久○崩○久○漏○屢○傷○衝○任○以○致○絡○虛○不○能○攝○血○者○概○言○調○脾○胃○尚○未○切○中○竅○要○昔○東○垣

治○崩○亦○言○大○補○脾○胃○升○降○氣○血○以○氣○血○為○脾○胃○所○生○且○衝○脈○隸○在

陽○明○耳○經○既○明○言○絡○傷○血○溢○得○不○隄○防○約○束○為○之○彌○縫○其○隙○乎○如

膠○雞○血○藤○膏○赤○石○脂○紫○石○英○等○惟○血○中○有○滯○氣○臍○腹○隱○痛○者○不○宜○驟○用○固○瀉○變○成

腫○脹○須○參○經○旨○通○因○通○用○用益母香附澤蘭白芍延胡索海螵蛸歸尾等和○其○氣○而○血○自

調○按○產○寶○分○陰○崩○陽○崩○受○熱○而○赤○謂○之○陽○崩○受○冷○而○白○謂○之○陰○崩

赤○屬○血○熱○白○屬○氣○虛○然○崩○中○日○久○則○為○白○帶○如○此○直○須○補○攝○仲杜

斷○芡○實○牡○蠣○沙○苑○子○兔○絲○子○等○勿○令○延○至○髓○枯○精○竭○宜人參熟地黃杞子茯神鹿膠五味菴蓉當歸等藥

用○大○劑○填○塞○下○元○

東垣論氣陷血脫法當升舉

立齊論崩之為患或因脾虛不能攝血或因肝火迫血妄行或暴

怒傷肝血熱沸騰或脾經鬱火血不歸經或悲傷心包血乃下脫

治法脾經虧損者六君湯加芎歸柴胡脾氣虛陷者補中益氣湯加酒炒白芍肝經有火

者四物湯加柴胡怒火傷肝者小柴胡湯加山梔丹芍肝經風熱者加味逍遙散思

鬱傷脾者歸脾湯悲傷心包者四君湯加柴梔升麻故先哲論下血須用四

湯收功所謂血脫益氣也凡大脫血後急用獨參湯其發熱欬嗽脈

數乃元氣虛弱假熱之象尤當加用人參調補脾元以無形之氣

所謂陰從陽長也若脈虛大察其有胃氣受補則可救不可誤投寒涼復

傷生氣其治因怒血崩面青黃或赤為肝木制脾土以小柴胡湯合四物湯

頭登台我 卷之八 上 崩漏

治肝脾鬱火。血崩乳腫脇痛。逍遙散。加酒炒龍膽山梔。再用歸脾湯。加山梔貝母。治崩症。身

熱頭暈食少吐痰。用八味丸而愈。後因勞役復發。脈洪大按之微弱。此無

根之火。內虛寒外假熱。用十全大補湯。一劑漸減。又服八味丸愈。其崩久脾胃虛寒

肢冷腹痛。先用附子理中湯。再用歸脾湯。補中益氣湯愈。過服寒涼。腹悶煩躁。脈洪而虛

急用八珍湯。加炮薑。以溫補之。緩則不救。

元禮論崩中。或清或濁。或純下瘀血。甚則頭目昏暈。四肢厥冷。宜竝

膠艾湯。明震靈丹。佐以三灰散。或以童便煎理中湯。血崩腹痛。人疑惡血未淨。及見血色瘀

晦。愈信惡血不敢止截。豈知經血出絡一停。即成黯色。未必盡為

瘀熱。又焉知瘀之不為虛冷乎。且瘀而腹痛。血行則痛止。崩而腹

痛。血住則痛止。宜芎歸湯。加熟附乾薑各五分。止其血而痛自止。武叔卿以此非

崩久氣脫者不可用。

千金治崩淋帶下。用小牛角腮散。若積冷崩中去血不止腰背痛四肢重。

虛極者。大牛角腮散。本經云牛角腮下瘀血閉血女人帶下血崩。燔之酒服寇宗奭疏云燒灰主婦人血崩便血血利。虛

人以獨參湯。崩中去血不斷。用角腮散。崩中赤白或如豆汁。伏龍保元湯送下。

醫通治崩漏過多補瀉不應者。用牛角腮煨存性酒服二三錢。虛寒血色稀淡者。

牛角腮同鹿茸煨服尤妙。崩漏經年不止者。用蓮房五枚燒存性香附二兩炒黑為細末空心陳酒下二錢。風

入胞門忽下鮮血者。一味防風丸。崩漏初起不問虛實。荆芥四物湯。肝

經虛熱。奇效四物湯。因怒動血。養血平肝散。勞心過度。柏子仁湯。漏血傷胎。膠艾

湯脾虛惡食。當歸芍藥湯。血脫氣陷。益胃升陽湯。赤白崩帶。艾附虛寒崩漏

不止。丁香膠艾湯。崩漏漸成虛羸。鹿茸散。崩中諸藥不愈。牡蠣丸。年高而崩

崩漏

者法在不治凡崩症多用醋炒荆芥升麻醋能收斂故也五灰十藥用

煨者紅見黑則止也紅為火象黑為水色血症或用鹿茸

景岳治血熱妄行係陰煎或加減一陰煎火盛迫血徒薪飲加續斷丹參脾腎虛寒兼

嘔兼溏瀉而畏寒理陰煎或理中湯脾腎陰氣不固固陰煎或秘元煎陽虛脫陷

四維血脫氣竭獨參湯或當歸補血湯血滑不禁龍骨散加人參血臭脈滑者多火

宜從清涼若血腥清寒脈細者多虛必須溫補

景岳又云血崩來如潮湧明是熱勢妄行然又不可用寒治蓋寒

則血凝而熱鬱於內治宜清補兼為升提血自循經經自攝血而

又不可驟止也宜地黃阿膠白芍麥冬桑耳灰木耳灰之屬久則多虛寒又宜溫補脾

胃

女科纂要云。崩宜理氣降火升提。漏宜養氣補火。或兼制火。凡崩漏不可多用寒涼。致傷脾胃。不能攝血歸源。是速其危也。

### 崩漏脈候

漏下赤白不止。脈小虛滑者生。數盛者死。漏下赤白。日下血數升。許脈急疾者死。遲者生。尺脈急而弦。大風邪入少陰經。女子漏下赤白。脈浮者死。凡五臟俱虛。五色雜下。謂之五崩。肺虛色白如涕。心虛色赤如絳。脾虛色黃如爛瓜。肝虛色青如藍。腎虛色黑如肝血。

### 附方

脾虛。六君子湯。見一卷中風。

燥煩寒虛寒虛火補氣益鬱思熱血火怒虛血虛氣

補中益氣湯 見一卷中風

四物湯 見一卷中風

小柴胡湯 見一卷溫

加味道遙散 見一卷火

歸脾湯 見二卷勞瘵

四君湯 見一卷中風

八味丸 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

附子理中湯 見一卷中風

八珍湯 見一卷中風

類書卷之八

二

崩中肢厥

膠艾四物湯

見本卷調經

震靈丹

禹餘糧

赤石脂

紫石英

代赭石各四兩

入

淨鍋中鹽泥封固煨研

入乳香

沒藥

辰砂各

一兩  
米糊丸

三灰散

棕灰

絹灰

血餘灰

理中湯

見一卷中風

芎歸散

川芎

當歸

止瀉厥冷補血寒崩

小牛角腮散

牛角腮一枚燒赤

鹿茸

禹餘糧

當歸

龍骨各一兩

乾薑 續斷各二兩

阿膠三兩

烏鰂骨

為末

溫酒調服方寸匕

大牛角腮散

牛角腮

乾薑

當歸

續斷

龍骨

禹餘

人參

附子

生地

桑耳

白朮

赤石脂

礬石

蒲黃

防風

止不  
 角腮鹿茸散 牛角腮 鹿茸 當歸 續斷 阿膠 甘草  
 地榆 丹參 地黃 川芎 赤石脂 龜甲

柏子仁

伏龍肝湯 見四卷痢

旋覆花湯 見二卷痰飲

荆芥四物湯 即四物加 荆芥 條芩 香附各一錢

奇效四物湯 四物湯加阿膠 名婦寶丹 此再加 艾葉

養血平肝湯 歸芍 香附各二錢 青 柴 芎 地各

柏子仁湯 柏子仁 香附 川芎 鹿茸酒蒸焙 茯神

炙草五分 當歸各錢半 續斷二錢 阿膠 遠志各一錢

當歸芍藥湯 黃耆 錢半 陳皮 白朮 蒼朮 當歸 白芍各一

虛脾

心勞怒因熱虛崩初血鮮痛嘔

分 柴胡二分  
水煎

升陽益胃湯 見七卷便血

艾附湯 艾葉 製香附

丁香膠艾湯 當歸錢二分 芍 地各三分 川芎 丁香  
各四分 艾葉一錢 阿膠六分 水煎

鹿茸散 鹿茸酥炙一兩 龍骨 鼈甲酥炙 熟地 白芍  
白石脂 烏鰂骨炙黃 續斷各二兩 菴蓉一兩

鹿茸丸 鹿茸燎去毛酥炙 赤石脂 禹餘糧各一兩 當  
歸 地黃 續斷各二兩 附子 艾葉 柏葉各

五錢 為末

酒糊丸

牡蠣丸 牡蠣火煨研細醋調丸再煨紅研細 用醋調艾末  
熬成膏和丸桐子大 每服五十九

五灰散 蓮蓬壳 黃絹 血餘 百草霜 棕皮俱燒灰  
山梔 蒲黃俱炒 黑墨 血竭 為細末調粥或

煉蜜為丸 飲下五十九

飲下五十九

固濟

十灰散

黃絹蓬壳

馬尾油髮

藕節棕閩

艾葉

赤松皮

蒲黃

蓮

米汁為丸

保陰煎

見五卷瘞

加減一陰煎

見四卷怔忡

徒薪飲

見七卷淋濁

理陰煎

見二卷欬嗽

固陰煎

見二卷脫

秘元煎

見四卷三消

四維散

見三卷飲食

獨參湯

人參一味煎

血熱血熱火盛脾腎滑洩不固陽虛氣虛

氣血滑

當歸補血湯

黃耆炙一兩

當歸酒洗二錢

水煎服

龍骨散

龍骨煨為細末

當歸每服四錢

製香附各一兩  
空心米湯下

棕毛灰五錢

血

諸君請

飲味末

每瓶四錢

空心米飲下

許手太正錢

普濟清血散

黃香參一兩

薔薇酢棗二錢

水煎服

崩漏

杭氏崩漏日久近添腹痛醫疑孀居氣悒失調用失笑散破血中

氣滯加阿膠歸芍熄風和營究竟腹痛未止淋瀝益加血如豆

汁晡時神倦火升陰絡既傷奇脈不固虛陽易炎左部虛不受

按右部浮大少力治宜固攝衝任兼鎮虛陽赤石脂二錢五味五分

龍骨煨丹皮錢二分杜仲鹽水炒熟地砂仁蒸白芍山藥俱炒各二錢釵石

斛茯神各三錢蓮子十五粒雞血藤膏二錢四服淋痛已止去石脂龍

骨加杞子焙錢五分龜甲心炙三錢虛火亦除衝任為奇經崩久不止

必固奇經之藥雞血藤膏用以引入陰絡也

鄒氏五旬外暴崩成塊暈絕而甦脈虛芤此虛風擾動陰絡也用

阿膠三錢水煨服血止仍用熟地茯神白芍荆芥醋炒續斷杞子

甘草炙烏梅取甘酸化陰熄風之旨尋愈

貢氏小水閉澀服導赤散加歸尾赤芍赤苓牛膝得利尺脈猶堅  
搏知必經閉血瘀為患踰旬寒熱腹痛暴崩紫黑成塊繼而鮮  
紅如注後則淡紅如木或紅白相間淋漓匝月不止頭暈腕痞  
粥飲不入神憊肢冷脈細欲絕此陽衰不能攝陰滑而將脫也  
急用四維散加半夏砂仁茯神脈症乃定後用大補湯而安

吳氏胎漏半產已匝月崩帶未止用補氣攝血之劑猶淋瀝不斷  
延至怔忡不安腰腿痠痛脈訣所謂崩中日久為白帶漏下多  
時骨髓枯也急須攝固奇經倣徐之才澀以止脫意用金鎖匙

丹龍骨研 牡蠣醋煨 茯神遠志炒 赤石脂研 杞子酒 焙加杜仲棗

仁俱炒 烏梅一服漏比怔忡亦減又加減前方而安

王氏七七之期經斷半載忽又崩淋不已雖血海虧虛但宜續杜

攝血兼艾附調氣足矣醫輒以棕灰黑蒲黃止瀉乃至小腹脹

滿硬痛拒按頭疼腕痞熱渴心煩小水短瀆脈左弦右數此絡

瘀阻痺攻痛宜主理瘀佐通絡乃奇經治法非失笑散決津煎

之比五靈脂鬱金汁各八分 牛膝栝蓐橘絡各錢半 延胡桃仁赤芍

木通各一錢 當歸鬚降香末各二錢 三服瘀行腹輒但口乾微渴頭

仍不清必由液虛風動改用阿膠甘菊炒 麥冬石斛荆芥醋炒 棗

仁茯神白芍蓮子龍眼肉血止諸症亦退又下白帶為氣虛陷

用黨參玉竹茯苓續斷杜仲鹽水炒生地炭芡實杞子俱焙三服全愈

許氏中年血脫延為帶濁必衝任脈虛夫衝為血海任主擔受而

衝脈隸於陽明陽明先衰胃納不旺致血海不固擔任失司此

淋漏根由也近則食後脫腹不爽或愛腐宵脹必由脾腎陽虛

治法攝陰先在益陽以崇生氣以納穀味且脈來左右緩弱溫

通為宜製附子三分益智仁煨八分沙苑子白芍歸身製半夏各二錢

破故紙杞子俱焙烏鰂骨醋續斷酒炒各一錢半胡桃肉二枚煨薑三錢三服

漏止食進去附子故紙半夏加芡實杜仲兔絲子俱炒又數服乃

固

包氏經閉疑胎血下每謂胎漏忽然崩注雜下脂膜甚多身熱頭  
 暈面赤心煩欬嘔綠沫上欬則下漏嘔作則暈頻湯飲不納急  
 用煨薑汁止嘔欬逆定神漸甦脈虛小而數沈候如無兩尺空  
 空顯非胎象良由起居不時生冷失節氣血阻滯一時暴下陰  
 虛陽失依附變化內風眩冒嘔逆如風翔浪翻當知陰虛陽搏  
 崩漏乃成血海空乏虛陽升逆乃氣不攝血之咎况陰從陽長  
 宜宗立齋景岳兩先生治法斂陽以攝陰用洋參焙 茯神白芍  
 炒各 三錢 炮薑一錢 五味五分 製半夏焦白朮甘草炙 續斷杜仲鹽水炒  
 二服漏止熱退稍惡寒陽氣尙虛前劑加製川附五分 遂愈

謝氏天癸當斷之年屢患崩漏近兼利血白帶頭震耳鳴項麻面

赤症由任帶兩虧火升風煽致心神浮越怔忡不安治以鎮陽  
 攝陰務使陽下交陰陰上戀陽震麻暫已再血海存貯陰絡不  
 傷下元重振端在靜攝勿以操持擾動厥陽則宵寤汗泄漸安  
 矣熟地山藥五味焙杞子焙龜板龍骨阿膠牡蠣煨杜仲鹽水  
 龍眼肉數服甚適去龍骨牡蠣杜仲加羚羊角丹皮白芍茯神  
 蓮子芡實續斷等熬膏即用阿膠收小麥煎湯和服漸愈

王氏崩漏成帶至小洩如泔如涕脾骨痛腰膝痠從未餌藥勢必

瀝枯髓液延成不治近又春溫氣泄身熱食少口渴頰紅液涸

陽升脈右弦左弱急攝陰固下熟地炒阿膠烱石斛各二錢洋參

三錢麥冬茯神赤石脂各錢半白芍杜仲青鹽炒甘杞子續斷各三錢加

蓮棗煎數服症漸減去石脂再服又去阿膠加芡實山藥俱炒各三

錢又數十服得效

魏氏經阻暴崩疑為胎漏按脈無孕象乃聚瘀日久致患曾經調

治得安今暑溼令行頭暈嘔惡晡後骨蒸寤不成寐忽又暴崩

脈虛疾症屬內因必由陽明脈虧木火乘侮是以貫膈犯巔震

及血海血海一空則骨骭生熱治宜和陽安胃佐以鎮絡嫩桑

葉甘菊炒天麻白芍釵斛棗仁茯神牡蠣煨研海螵蛸醋炙橘紅半

夏麴炒續斷數服諸症悉平惟左關尺芤弱乃肝腎陰傷用熟

地黃肉山藥白芍俱炒茯苓杜仲鹽水炒海螵蛸鼈甲俱炙阿膠烱數

十服得痊又接服雞血藤膏而經固

藥甘茶

妙天

文血甜血甜一交明...

煎甜藥甜甜內因必...

甜甜定个甜甜个竹...

甜甜甜甜甜甜甜甜甜...

甜甜甜甜甜甜甜甜甜...

甜甜甜甜甜甜甜甜甜...

胎前論治

婦人受孕則月事不行診其脈足少陰腎脈動甚者妊子也經云

陰搏陽別謂之有子王註陰謂尺中搏謂觸搏於指與寸脈俱別則為孕故胎脈微滑若經

候三月不行欲驗之用探胎飲腹中微動者胎也否則是經滯金匱云

妊娠下血腹中痛為胞阻膠艾湯主之腹中疝痛此木邪克土當歸芍藥湯主之嘔吐

不止此為惡阻參薑半夏湯主之常服易產當歸散主之徐之才曰受孕一月名胎

胚足厥陰肝脈養之二月名始膏足少陽膽脈養之三月名始胞手少

陰心脈養之四月形體成手少陽三焦脈養之五月男女分足太陰脾脈

養之六月筋骨具足陽明胃脈養之七月毛髮生手太陰肺脈養之八

月臟腑具手陽明大腸脈養之九月穀氣入胃足少陰腎脈養之十月

頁登台戈 卷之八上 胎前 音

足太陽膀胱脈。養之。臟腑齊通。納天地氣於丹田。俟時而生。亦有未

及期而產。或過期而產者。凡懷孕則血留氣聚。脈多滑數。其殞胎多在三月。是血熱故胎前症治率以清熱涼血為主。蓋胎得涼則安。其有外邪則邪去胎自安。若妊婦稟弱。脈微。症屬虛寒。法當溫補者。又當別論也。

女科纂要云。產前當補脾清熱養血。如金匱當歸散之類。蓋補脾則中氣固。而無半產胎動之虞。清熱則火不妄動。而無胎漏煩淋之患。養血則胎有所資。而無坐草艱難之苦。至八九月仍加順氣之劑。俾氣順而骨自開。血足而胎自滑。

惡阻受孕二三月間。衝任上壅。氣不下行。嘔吐痰水。頭重目眩。懶動。

嗜臥惡食喜酸或偏嗜一物間作寒熱為阻病千金用半夏茯苓湯及茯苓

苓今人以半夏動胎鮮用通用白朮湯二香散竹茹然實未動

胎也脾虛食少者六君湯胃虛多痰者橘皮湯飲食停滯者香砂湯

穀脹滿不安者小和中飲肝氣致逆者解肝煎氣滯兼痰者七氣湯

中寒吐逆者溫胃飲

胎漏妊娠血下衝任經虛不能約制也通治安胎當歸湯絡虛者膠艾四

氣虛者四君湯去茯苓漏血腹痛者鉤藤湯漏血發熱者加味逍遙散

入房致損者八珍湯亦有妊後按月經至而胎不損者係陰血

有餘不必強止但與涼血○胎漏黃漿或如豆汁炙者六兩糯

膏分四服或芋根二兩若肝脾溼熱升陽除溼湯肝脾鬱結加味歸脾湯肝

經風熱防風黃芩丸。妊娠溺血胎漏血自人門出。尿血血自溺門出。熱乘血分滲入

脬中續斷湯。兼痛導赤散。怒動肝火小柴胡湯。膀胱血熱四物湯。加

因暑渴煩益元散。稍虛者膠艾四物湯。症久用龍骨一錢蒲黃末五錢酒調服。

胎動。此胎氣熱動而不安也。通治安胎散。風熱傷絡失安者鈞藤湯。胎

氣逆上喘急者紫蘇飲加桑皮杏仁。飲酒房室損動者四君湯。觸損胞宮

者血下腰痛膠艾湯立安。有微熱去艾葉甘草加續斷葱白。若負重跌墜凝瘀作痛用黑糖熬膏入

紅酒童便調服。痛即止。如未止必血下胎傷益母地黃湯。若因

嚼連皮胡桃肉。母病致胎不安。但治母病胎自安。暴下水胎必墮急用補氣安胎藥救之。

凡胎漏胎動皆下血。而胎動有腹痛胎漏無腹痛。故胎動宜行。

氣胎漏宜清熱。

長胎不  
胎之長養全賴母氣其精血雖由肝腎輸運尚恃乎脾脾衰

食減者異功散心脾不足者歸脾湯元氣不足者大劑保增助

母氣則兒受蔭自無乾萎之患若氣虛兼衰者八珍湯

大胎  
大孕至七八月胎大宜布束之則腰健內服達生散如膏粱安逸身

肥胎大須防難產宜瘦胎飲

墮胎  
胎動不安勢必下墮多由妊母衰病或觸損顛仆所致然墮在

三五七單月居多且前次三月墮後次至期必墮乘其虛也須

早服養氣血護胎元之劑加減八珍湯添續蓋氣虛則提攝不

固血虛則灌溉不周胎元飲加減或孕後最忌腰痛胞繫於腎

而腰為腎府腰痛則防墮千金保必察所傷之由預培其損若

待臨期則無及矣。

半產俗名小產由衝任氣虛不能攝養或因閃動及熱病溫瘧之類。

其險甚於大產凡孕未足月痛而欲產八珍湯去茯苓熟地加阿膠艾葉炙甘草黃耆

若胎下血不止用參耆朮草膠艾歸杜等虛熱加炮薑五味子寒熱腹痛手按益痛

者宜散瘀芎歸延胡桃仁香附丹皮澤蘭童便選用按之痛緩為血虛宜溫補八珍湯去

芍加炮薑痛而嘔瀉為胃虛六君湯加炮薑去血多發熱聖愈湯汗不止係元湯

發熱煩躁筋惕肉瞤十全大補湯大渴面赤脈洪而虛當歸補血湯身熱

面赤脈沈而微四君湯加薑附東垣曰正產及半產漏下昏冒不省瞑

目無知由心血暴亡心神失養包絡火升故令昏冒火勝其肺

故令目瞑不可用寒涼瀉火之藥蓋瞑目之病悉屬陰即如傷

寒鬱冒得汗乃解必補而升舉之。如補中益氣湯加麥冬五味或大劑獨參湯尤妥。助

其陽則目張而神甦矣。

子煩出於肺躁出於腎妊娠心驚膽怯終日煩悶係心肺虛熱。竹葉

湯。夏令心火乘肺胎動心煩。宜生脈散或麥冬湯。心脾壅熱。犀角散。肝火致

煩。加味道遙散。肺胃燥熱。竹茹湯。腎虧火躁。加味地黃湯。煩躁口乾。知母丸。

子懸胎氣。上胸膈滿悶必素多鬱悶痰氣壅塞致胎氣乘鬱火升

自心下急以。童便灌之次以紫蘇飲四五服。若胎上逼心煩悶脈浮滑者。葱白

莖煮濃汁飲胎立安。胎上衝心悶痛欲死者。當歸湯。痛立止。

子腫因土不制水小便閉濇致面目肢體浮腫然有水氣有胎氣其

胎中挾水水血相搏浸漬肌肉令腫者為水氣立齋云胸腹急

脹脇肋不分溺閉者。千金鯉魚湯。脾虛者。佐以四君湯。水溢肢體而目虛

浮者。全生白朮散。六君湯。脾虛溼熱下部腫者。補中益氣湯。加半夏茯苓。飲食失節嘔

瀉者。六君湯加神麴砂仁炮薑。若胎至七八月脛膝漸腫足趾出黃水者為

胎氣非水也至分娩方消。宜天仙藤散。鄭虛庵云身半以上腫者發

汗身以下腫者利小便上下俱腫者汗利分消其溼

子嗽。妊娠欬嗽胸膈不利者。百合散。風邪傷肺者。香蘇散。寒邪傷肺者。小建

中湯。火邪傷肺者。紫菀湯。脾胃氣虛者。異功散。脾肺氣虛者。六君湯。加當歸。

子瘡。岐伯曰人有重身九月而瘡此胞絡脈絕也胞絡脈繫於腎少

陰脈貫腎繫舌本當十月復石頑口不語者多痰蔽心竅。濃煎生脈

散服地黃丸。助肺腎之氣以養胎若與通聲開發之藥則誤矣

子癰。妊娠受風。痰湧發搐。口噤身強。冒昧不醒。須臾自甦。此陰火鼓

動其痰。宜清熱化痰理氣。仍以安胎為主。勿過用風藥。血虛膽

火。加味逍遙散。加羌活羚羊。肝膽風熱。鈎藤湯。氣逆痰滯。紫蘇脾

鬱痰滯。二陳湯加竹瀝薑汁。中風口噤。目弔。角弓反張。羚羊角散。

子暈。此症屬氣與痰虛陽上升。則痰動。古謂無痰不作眩暈也。目昏

發厥。用紫蘇飲。去葱薑。加炒甘菊。羚羊角。若口噤不能言。用白朮三錢。荆芥穗二

服得汗。即愈。錢黑豆三合炒。淋酒煎。

子淋。此小腸膀胱虛熱。虛則不能制水。熱則不能通利。故溺頻澇而

成淋。本事安。然胞繫於腎。若腎經虛。移熱於膀胱。溺數而痛。宜

料六味丸。加麥冬。膀胱陽虛。陰無以化。腎氣。肺氣虛。而頻數短

少。生脈散。加山藥澤泄。小腸熱而赤瀝。導赤散。肺虛膀胱熱而氣化不行。生脈

合導。肺經蘊熱。黃芩清肺飲。肝經溼熱。加味道遙散。頭眩溺不利。葵子茯苓湯。

遺溺。妊婦遺溺不知胎滿故也。千金白立齋以胞中有熱。加味道遙散。脾

肺氣虛。補中益氣湯。加益智仁。肝腎虛熱。六味丸。

轉胞。胎逼及脬壓在一邊。脬繫轉振臍下急痛。溺數或閉也。若舉起

其胎。如補中益氣湯。服後探吐以提其氣。溺自出矣。丹溪用參朮飲。服後探

吐八次而效。

傷風。頭重鼻塞。發熱惡風。香蘇散去香附。如葱豉。熱服。取微汗。若欬嗽多痰。加桔

梗。或紫蘇飲。加葱豉。本草葱能通陽安胎。豆豉能解肌取汗。

傷寒。身背拘急發熱惡寒。千金用葱白十莖。熱服取汗。或葱豉湯。汗出即

安或量加薄若妊婦熱病亦用葱豉加薄忌用發表諸藥若溫熱

時行邪氣內犯熱毒迫胎宜千金石膏大青湯

瘧孕寒熱有時感六淫食滯之邪而發熱邪甚則損胎故以安胎為

主初起頭痛喜嘔胸滿脇痛而寒熱者小柴胡湯主之寒多熱少者參

養胃湯寒少熱多者清脾飲寒嘔多痰者二陳湯或柴脾虛食減

者六君湯不應久瘧正氣衰或間二日發者必扶正如異功散

仁鼈甲首烏山嘗見胎前陰瘧不愈產後延成蓐損者多矣

瘧孕張氏醫通曰孕瘧有三禁五審一禁蕩滌腸胃使胎氣下墜二

禁滲利膀胱使陰液脫亡三禁兜瀦滯氣使後重轉加故治先

調氣以陳皮煨木香厚樸之屬開通壅滯則後重除矣一審飲食之進不進

清理積滯。如梔連砂。枳麴半等。則飲食進矣。二審溲之通不通。升清降濁。

補中加茯苓之類。則水道通矣。三審腹之痛不痛。紅痢急痛者為火。宜茶。

連梔。白痢虛痛者為寒。宜丁香。肉果。煨薑等。四審後之重不重。初痢後重。

宜開通其滯。即香朴。陳枳等。久痢後重。宜升舉其陽。舉元煎。五審身之熱。

不熱。如人迎浮數。先用和營透表。宜當歸。紫蘇。薄荷。白芍。生薑等。疏解後再行。

清理。若初起未發熱。痢久衛虛。因感冒而發熱者。左三部必浮。

緩。須理中湯。表裏合治。若痢久身熱。脈來漸小。或虛大少力。此。

真陰內亡。虛陽外露。平人。或可辛溫峻補以斂之。妊娠又難輕。

用。桂附。惟藉。參。朮。薑。黃。膠。艾之屬。大劑煎服。庶可挽回。五審既明。三禁勿犯。

再察其積之稠不稠。色之鮮不鮮。儻粘稠如糊。暫與清理。若汁。

沫如水色晦如塵急須溫理其氣故凡沫之清稀不稠色之瘀

晦不鮮者皆係虛寒急投參苓薑艾或可保全嘗治妊娠腹脹後重

白痢粘稠用厚樸湯去乾薑妊娠腹痛食少白沫清稀用甘草乾薑湯或理中湯腹

脹後重痢兼赤白樸薑參甘半夏湯能食後重血痢稠粘用芩芍湯送香連丸少

腹重痛痢血或鮮或瘀用連理湯合干金三物膠艾湯發熱後重陰虛血痢用

車丸熱毒內攻噤口不食腹脹後重膿血稠粘用白頭翁湯加甘草阿膠膿血

清稀久痢胎動用千金膠艾榴皮湯瘡痢氣虛胎墜溺數用補中益氣湯以上皆

孕痢方內竝加砂仁烏梅以調氣未嘗不隨手輒效也

傷暑妊娠感暑煩渴悶亂黃連香薷飲熱甚而渴香薷飲加麥冬五味子石膏黃芩知

母花粉之屬

諸痛胎前頭痛川芎茶調散宿有偏正頭風前散加甘菊花心氣痛火龍散心痛悶

絕產寶丸胃脘痛養胃湯脇痛解肝煎背痛氣滯紫蘇飲腹痛因寒因

食竝正氣散腰痛通氣散腎虛腰痛大補元煎小腹痛絡虛為風寒所襲蘇

飲加香附小茴等寒氣滯痛溫而散之腰腹痛胎不安當歸阿膠甘草葱白湯

胎動血下腰腹急痛苧根湯

孕瘕小腹近下腫痛皮薄光亮者瘕也千金托裏散若急痛煩悶胎氣上

衝面青汗冷血下不止者不治

乳泣未產乳汁先下名乳泣生子多不育兒在腹中啼哭者因

妊婦登高舉臂兒口脫出臍帶以此致啼若令妊婦曲腰就地

如拾物狀或令掃地臍帶血管仍入兒口即止亦有胎熱不安

致啼者。濃煎黃連汁。常呷之。即上。又妊婦腹內鐘鳴。用空房下鼠穴中土一塊。令妊婦口噙之。即上。

鬼胎鬼胎脈多沈細弦濇。大小不調。或由經行飲冷血蓄衝任而成。

者。或由停痰蓄水與絡中瘀積互結而成。皆內因之病。實非外

感之邪。其腹雖漸大。亦且微動。究與真胎各別。治以理氣行血

為主。加菝朮。蘇木。牛膝。南星。桃仁。桂心。麝等味。虛人用十全大補湯。緩圖收效。不可峻用。川烏。

巴豆厲劑。急迫取咎。嘗見孕過期產出水胎異形。其後必費調理。

死胎產母舌青。腹中冷而重墜。是胎死矣。宜速用脫花煎。後察虛實調補。若

舌與爪甲俱青。腹脹氣喘。口中臭穢者危。速令穩婆以古法。用童

便調朴硝五錢。或平。虛寒。用理中湯。倍人。冬月胎死。腹覺冷。用香

胃散。水酒煎。調朴硝。桂散。加烏頭。或黑神散。黑龍丹。惡血上逆。嘔搐昏暈。用童便乘熱灌之。唇青吐沫不洽。

凡面赤舌青母活子死而青舌赤母死子存而舌俱青母子兩亡。

過期不產因氣虛者補氣因血漏者培血氣血不足者益其氣血若過

期脈沈細者非胎也亦有胎已萎而在腹不腐服補劑以和其氣血而自下者。

胎前脈候

婦人經停二三月脈微滑而數尺中按之不絕者妊娠。凡妊娠宜滑利數實不濇不弦不伏大忌遲濇浮緩。辨男女脈法左大為男右大為女然多素稟偏大者惟寸口滑實為男尺中滑實為女又如兩寸俱滑實為雙男兩尺俱滑實為二女左寸右尺俱滑

實爲一男一女。此最驗者。通妊脈初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脈滑疾。重以手按之散者。胎三月。脈重手按之不散。但疾不滑者。五月也。經脈若脈沈細。按之冰冷。或兩尺乍大乍小。乍有乍無。鬼胎也。脈來急如風雨。少停復來如初者。夜父胎也。寸微關滑。尺帶數。流利往來并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷耽猶未覺。脈訣欲產之脈必離經。其來大小不勻。停或如雀啄。屋漏。應腰痛腹痛。眼生花。產在須臾。卻非病。

附方

驗胎

探胎飲

川芎爲末。空心煎艾湯調下。

腹動者胎也。臍下動

者痕也不動者血凝也。

胞阻

膠艾四物湯

見本卷調經

腹痛 當歸芍藥湯 見本卷調經

參薑半夏湯 參 薑 半夏

當歸飲 見本卷調經

半夏茯苓湯 半夏 陳皮 砂仁各一錢 茯苓二錢 炙  
無陰則嘔用烏梅 烏梅二个 薑 棗 水煎 經謂

以斂陰也

茯苓丸 赤苓五錢 人參 桂心 乾薑各一錢 半夏  
陳皮各一兩 白朮 炙草 枳壳 葛根各五錢

煉蜜為丸

白朮湯 炒白朮一兩 人參五錢 丁香二錢半 甘草一  
每服二錢 加生薑水煎 治胃虛吐水十餘

日水漿不  
得下者

惡阻 二香散 香附一兩 藿香葉 甘草各二錢 為末每服二  
錢 開水調下

嘔脹

竹茹湯 參 橘 麥 朮各一兩 厚樸 赤苓各五錢 竹茹

五錢 水煎

人參丁香散 人參五錢 丁香 藿香各二錢半 每服五

縮砂散 砂仁研二錢 薑汁調米飲下

六君湯 見一卷中風

橘皮湯 橘皮 竹茹 人參 白朮各二錢 厚樸錢半

香砂湯 木香 砂仁

小和中飲 山查 扁豆各二錢 陳皮 茯苓 厚樸各錢

香壳散 香附 枳壳俱炒 每服二錢白湯調下

解肝煎 見三卷諸氣

胃寒氣逆脾虛胃虛停滯食滯脹滿肝氣

七氣湯 見二卷欬嗽

溫胃飲 見一卷中風

安胎當歸湯 歸芎 人參 阿膠各二兩 艾葉一把

四君湯 參 苓 朮 草

鉤藤湯 鉤藤 當歸 茯神 人參 桔梗 桑寄生各一

加味逍遙散 見一卷火

八珍湯 見一卷中風

升陽除溼湯 見一卷溼

加味歸脾湯 歸脾見二卷勞瘵 此再加 山梔 柴胡

防風黃芩湯 防風 條芩 酒糊丸 酒下三五十九丸  
或防風一味白湯調下

痰 氣 中 寒 胎 漏 氣 虛 胎 動 發 熱 傷 損 除 溼 肝 脾 風 熱

脾補損胎胎安喘氣動胎渴暑熱血火肝熱滲血尿

續斷湯

當歸 二錢

生地各一兩 葱白湯調下

續斷

黃芩各五錢

每服

導赤散

見一卷溫

小柴胡湯

見一卷溫

四物湯

地芎 歸 芎

益元散

見一卷溫

安胎散

地芎 歸 地榆各一錢

芎各一錢 加薑 棗

阿膠

艾葉 耆

草

紫蘇飲

蘇葉二錢 參 草各五分

大腹皮 加薑

歸 芎 葱白

芎 水煎

陳各一錢

十聖散

地芎 歸 五分

芎各一錢 甘草各八分

參

耆

木

砂仁各

益母地黃湯

生地 續斷

益母各二錢

歸 耆各一錢

異功散

見一卷中風

氣虛

保元湯

見一卷火

安胎飲

芩 蘇 木 砂仁

歸各一錢

芎

芎各八分

陳皮

達生散

大腹皮 三錢 砂仁 枳殼 各五分

歸 芎 芍 炙草 二錢

歸 芎 芍 炙草 二錢

水煎

蘇各一錢

瘦胎飲

血餘錢半 歸 枳殼 另研五分

芎 芍 枳 為末白湯調下

木香各一錢

枳殼散

枳殼 麩炒四兩

炙草二兩

為末白湯調下

胎固

胎元飲

參 歸 芍 陳 草 各一錢

杜仲各二錢

熟地三錢

白朮錢

寒加 炮薑

胎固

太山磐石散

參 耆 歸 芍 各八分

白朮二錢

炙草

砂仁各五分

糯米 二撮

千金保孕丸

杜仲四兩糯米炒斷絲 山藥粉糊丸桐子大

續斷二兩酒洗

以 每服八九十九 空心

米飲下  
忌酒醋

聖愈湯 見二卷勞瘵

十全大補湯 見一卷中風

當歸補血湯 見本卷崩漏

補中益氣湯 見一卷中風

竹葉湯 茯苓 麥冬 防風 黃芩各二錢 竹葉十片  
水煎 一方有人參 山梔 無黃芩 張石頭加

人參一錢  
粳米一合

生脈散 見一卷暑

麥冬湯 見一卷暑

煩心乘火躁煩  
犀角散 犀角尖磨汁 地骨 條芩 麥冬 甘草各五分  
赤苓二錢 入竹瀝一合 溫服

竹茹湯 淡竹茹一兩 水煎

加減地黃湯 生地 山藥 丹皮 黃肉 茯苓 杜仲 續斷 五味 阿膠 水煎

知母丸 知母炒二兩 為末 棗肉丸彈子大 每一丸人參湯下

當歸湯 人參 當歸各二錢 阿膠 炙草各一錢 加蓮鬚 葱白 水煎

千金鯉魚湯 苓 朮各五錢 歸 芍各三錢 陳皮二錢 分兩服 以鯉魚一個去鱗腸水煮熟取鯉魚

汁盞許 加薑同煎 溫服四五次

金生白朮散 白朮一錢 薑皮 陳皮 茯苓皮 大腹皮 各五分 為末 米飲下

天仙藤散 天仙藤即青木香藤微炒 香附 烏藥 陳皮 炙草 蘇葉 木瓜 生薑 等分水煎

百合散 百合 紫苑 麥冬 桔梗 桑皮各一兩 甘草 五錢 竹茹一團 為末 每服八錢 入蜜煎服

香蘇飲 香附 紫蘇各三錢 陳皮一錢 甘草七分 煎服 欬加杏仁 桑皮 傷風自汗加桂枝

嗽風嗽子氣子腫子 腫水懸子躁煩躁腎熱躁

寒嗽

小建中湯

見一卷傷風

火嗽

紫苑湯

紫苑 天冬各一錢  
各三分 竹茹一分

桔梗 炙草 和蜜溫服

桑皮

杏仁

化痰

二陳湯

見一卷中風

子癇

羚羊角散

見五卷厥

子淋

本事安營散

人參 滑石

細辛

當歸 為末

甘草

燈草

木通

麥冬湯下

陰虛

六味丸

見一卷中風

陽虛

腎氣丸

見二卷虛損

瀉

導赤散

見一卷溫

肺熱

黃芩清肺飲

見一卷火

利瀉

葵子茯苓湯

冬葵子五兩五錢  
服三錢 米湯下

白茯苓二兩

為末

每

遺溺轉胞熱病溫熱 孕瘧瘵瘧升陽久痢

千金白薇散 白薇 白芍 等分為末 酒服方寸七

參朮飲 見七卷轉胞

葱豉湯 見一卷溫

干金石膏大青湯 石膏八錢 大青 黃芩各三錢 前胡 知母 梔子仁各四錢 葱白四條 水

煎溫服

養胃湯 見三卷脾胃

清脾飲 見四卷陰瘧

柴陳煎 小柴胡湯合二陳湯

舉元煎 見三卷飲食

理中湯 見一卷中風

厚樸湯 見七卷便秘

甘草乾薑湯 甘草四兩 乾薑二兩

樸薑參甘半夏湯 樸 薑 參 草 夏 薑 棗

苓芍湯 苓 芍 草

香連丸 見四卷痢

連理湯 見一卷暑

三物膠艾湯 阿膠 艾葉 石榴皮 等分水煎

駐車丸 見四卷痢

白頭翁湯 見四卷痢

千金膠艾榴皮湯 卽三物膠艾湯

痢久 痢熱 虛陰 痢血 痢血 重後 痢熱 白赤 痢白 服痢

頁登各哉 卷之九 上 胎前 尾

中暑 黃連香薷飲 見一卷中風

傷暑 十味香薷飲 五物香薷飲加木瓜參耆陳木

暑 五物香薷飲 見一卷中風

頭痛 川芎茶調散 見一卷傷風

心痛 火龍散 川楝子 茴香各炒三錢 艾葉鹽炒錢半 水煎

心痛 產寶丸 芎 歸 苓 樸各一兩 分二服

寒食 正氣散 見一卷中風

腰痛 通氣散 故紙瓦上炒香研末 先嚼核桃肉一个 溫酒調

腎虛 大補元煎 見一卷中風

血 苧根湯 生地 苧根各二兩 歸 芍 草 阿膠各二兩 分三服 水煎

死胎瘕孕

難產冷腹冷腹死胎

千金托裏散 參 耆 草 芎 歸 桂 防 芷 桔

脫花煎 當歸七錢 川芎 牛膝各二錢 車前子錢半

桂心 紅花各一錢 水煎 如胎死不下加樸硝

三錢

平胃散 見一卷中風

香桂散 麝香五分 桂心二錢 酒下

黑神散 見二卷血

黑龍丹 五靈脂 當歸 生地 川芎 良薑各二兩 以

乳香 硫黃 琥珀 花蕊石 煅各研三錢 入百草霜三錢 共和糊丸 彈

子大 臨服煅紅入薑浸服酒下

經書

經書

子大 網眼歌 摩人 薑 薑 薑 薑 不

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇 其時 蘇 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇 其時 蘇 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇 其時 蘇 蘇

其香 蘇黃 刺甲 蘇黃 百 蘇 谷 荷 三 蘇 其時 蘇 蘇

胎前

石氏灑淅惡寒嘔吐絕穀湯飲不下者四旬餘奄奄沈困身冷而陽垂絕診之脈伏沈候似無子斷爲胎其家疑未信子謂此惡阻之重者胎無疑也夫胞宮血聚氣不下行必至濁陰上犯阻塞陽和嘔逆厥冷非薑附無以通陽洩濁其翁懼熱藥胎墮子曰經云有故無殞係無憂也先與熱薑汁繼和以米汁嘔吐止進附子理中湯加製半夏二劑身溫嗣用異功散加砂仁煨薑五服而安至期產一女

鄭氏寒熱嗽痰食減經阻醫謂損怯進補劑中滿嘔噦惡聞食氣煩暈善驚更醫以爲肝風用和營鎮驚延及神色困憊時或暈

絕舉家惶惑請臨診一決予曰此胎脈右尺已動滑勿藥可也  
經云陰搏陽別謂之有子言陰搏於下陽別於上氣血調和即  
胎脈也脈訣云尺內不止真胎婦言尺脈綿綿不絕為胎結也  
無已姑用益陰和陽白芍柏子仁茯神甘菊炒棗仁炙草小麥

桑葉南棗四服漸安後生一子

某氏經閉成塊疑為瘀腹痛猝崩醫云瘀滯未淨用攻消藥淋脹  
日甚予謂瘀血既行理無作脹診脈陽虛而陰搏知妊娠血漏  
用七味阿膠散加白芍木香杜仲續斷血止脹消後果孕產○  
此安胎止漏兼暢脾攝血脹痛自除蓋妊娠下血名曰胎漏多  
由閃挫損傷胞絡致之若轉用攻伐再動新血益加虛痛作脹  
直至墮胎方悔耳

魏氏經止兩月腹痛脹食減夜熱醫謂經閉用通利藥血下不止

更醫見亦同用牛膝紅花炮薑枳壳漏益甚腹加痛脹頭暈腰

疼煩熱不寐予診之覺尺脈搏指兩寸獨別胎脈也但熱久攻

伐藥多恐損動胎元且致胞系不固耳用香附童便製白芍炒行

氣和血以除痛脹蒲黃炒黑荆芥醋製止血而除暈杜仲酒炒阿膠水化

熟地炒固腎以攝下茯神麥冬棗仁炒安神以止煩一服症減

而思食胎如指墮前方去白芍阿膠蒲黃麥冬加查肉當歸醋炒

炙草蓮子數服乃安

謝氏孕踰三月男女分形病者漫謂血癥治者誤行攻伐致血下

注胎墮身熱汗煩眩暈不寐索方乃桃仁牛膝莪朮紅花等劑

明晨更加生查肉子見駭甚詢之則曰胎墮未便告知婉云瘀

血已行耳醫尙未知所下男胎也因歎庸手殺人殊堪髮指急

以參耆茯神固攝元氣佐以炙草荊芥醋炒阿膠烱麥冬五味牡

蠣醋烱龍眼肉紅棗數服汗收血止

湯氏孕四月胎漏鮮紅係傷胞絡輒用芩芍苧根湯轉致腹痛泄

瀉據脈候虛緩本非火迫絡傷致漏宜溫補彌隙自安倣膠艾

湯海螵蛸阿膠杜仲茯苓杞子艾絨續斷炙草砂仁數服而安

睦氏孕五月屢墮翁商之子謂孕逢五月足太陰脈養胎想脾血

素虧耳若獲孕先二三月預服固攝之劑用胎元飲參苓朮草

地芍歸陳杜仲續斷砂仁兔絲芡實薑棗水煎每月服五七劑

胎遂固生一子僅綿一綫後竟不孕

薛氏孕六月因勞便紅頭微眩此腸風宿恙因熱傷陰分而成用

白芍地榆

俱酒炒

當歸荆芥

俱醋炒

山梔

炒

茯神炙草阿膠

酒化

側柏

葉搗

水煎三服而瘳

姪女孕七月久泄瀉肛墜足腫吐欬腹微痛晡寒熱如瘧脈弦右

尺滑大此中氣下陷土衰木乘以補中益氣湯減歸耆加砂仁

製半夏茯苓煨薑數服痛墜寒熱俱減因其腸胃久滑不戒葷

茹泄瀉仍作加穀芽

炒

茴香炮薑等味而安

鄧氏孕七月餘與夫口角為麪杖所傷左脇大痛下部如裂胎氣

上逼撐拒欲死服婦科藥八咽格格不下喘吼待斃而已診之

脈洪數無倫體如烙面如赭察其唇舌未變青紫知胎未損慰  
之曰幸母子俱無恙也用牛膝蘇梗栝萸紅花各二錢歸尾枳壳  
各錢銚三錢丹皮一錢煎服喘止痛定熱退進粥盃許隨用順  
氣安胎之劑而平

族女孕八月因勞吐紅鮮紫成盆火升則噎欬顛赤少寐口不知  
味服童便阿膠不止診脈左寸關大兩尺俱伏此君相之火逼  
傷陽絡必得火降噎欬平紅自止用生地山梔連翹白芍杏仁  
貝母百合茯神甘草蓮子燈心阿膠烱三服欬稀血止安寐矣  
後用熟地當歸白芍杜仲鹽水炒杞子焙以實下元尺脈亦起

呂氏將產腹痛血下脈短滑左虛芤予謂脈未離經決非正產右

關短滑係食滯腹痛見紅由觸損但須行氣補血用紅米麴陳皮查肉利氣消滯以當歸白芍和血定痛逾兩旬乃產

某氏過期不產按月經行事所或有今述孕已兩載兼見乳汁腹大不產計欲攻墮然細診卻非產脈須知漏卮不塞孕何由成且萬無攻墜之理雖屬怪症應以常法主治惟明理者知之方用熟地潞參當歸白芍白朮炙草杜仲杞子續斷砂仁廣皮蓮棗此以氣攝血之劑多服則漏止胎長接服二十劑又逾八九月而產

凡四

...

...

且萬無...

大不...

某升...

丸查...

...

臨產治要

臨產將護良方條列備已。

陳自明編婦人良方。薛立齋附訂醫按。

茲竝考綱目醫通

諸家。

張石頑老人著醫通。武之望編濟陰綱目。周頌作產寶。張介賓景岳全書。

撮舉其要。凡孕至八九

月。服達生散數劑。

則易產。至臨月胞漿未破而血先下者。或是傷胎。尚非

正產。

宜大劑保元湯。加當歸阿膠。

如胎氣上逆。

急服熱童便。或用紫蘇飲。

若正產時氣血動

盪脈必滑疾異常。如脈尚安和。腹雖痛而未緊。猶試痛也。必腹連

腰陣痛益緊。兒欲轉身順產。自然胞破水下。如瓜熟蒂落。不用催

生。太早只須產前補血降氣。

用滑胎煎。

繼則活血行氣。

用保生無憂散。

亦有胎

衣不固。或用力太早。隨觸而破。至胞漿下而仍不產。恐其水涸路

瀦。兒難轉身。但服

八珍湯。或大劑五物湯。加葵子枳殼。

助其氣血。則胎滑易產。若持

久力乏。用獨參湯補接元氣。雖逾數日旬日而產者有之。男胎向內。女胎向外。皆首

居上。足居下。臨產時必倒轉順出。須再三緩。丹溪云。催生只用佛

手散。最穩而效。或三合濟。生湯亦佳。更有兒頭正抵產戶而交骨不開。此陰

氣虛。用加味芎歸湯。不聖散如意散。其兒手先出為

橫生。足先出為倒產。由產母用力太早。當令仰臥。以鹽少許。擦兒

摩其肩。候其身正。方可用力。更有兒頭偏注。左腿者為偏產。由產

母力逼致之。亦令仰臥。輕輕用力送下。若兒頭已正。不能即產。因

臍帶絆其肩者為礙產。亦令仰臥。推兒向上。若兒未出。產母腸先

出者為盤腸生。待兒并胎衣下後。用香油抹手。徐徐送入。或用醋

盡收。其葶麻子研塗頂心。然後半坐以軟布抵之。內服舉。若胎死

腸可吸。入法殊不效驗。

腹中須驗產母舌青黑爪青紫口沫腹陰寒而氣穢急用平胃散加朴硝若

胎死久乾著背者葵子阿膠滑之胎衣不下先用輭帛繫住臍帶乃斷兒臍帶勿令血入衣中脹而難

下內服回生丹或牛膝湯可下如久不下血入衣中上衝心胸喘急痛脹急宜

逐瘀用牛膝散或失笑散溫酒調服胎衣立下景岳云胞在腹中形如荷葉上仰則聚血而脹礙難出當令穩婆以指攀其上

口令惡露傾瀉則如氣虛腹不脹痛只宜無憂散或黑豆二合炒

腹空胞自落矣酒化益母丹二丸既產陰氣虛產門不閉或陰火下流陰挺突出其氣血

虛而不閉者十全大補湯加五味子補而斂之其憂思傷脾熱痛者加味歸脾湯

腫而熯痛者逍遙散加丹皮山梔荆芥暴怒傷肝動火者龍膽瀉肝湯元氣虛子宮

不收補中益氣湯加桂心醋炒白芍補而舉之產時氣隨血去忽頭眩眼黑神昏

口噤其症有二一為氣脫一為血暈氣脫者面白眼閉口開手冷

脈細欲絕。速用人參一二兩濃煎徐灌。但得下咽即甦。稍遲則無救矣。血暈者。

臨產元氣已損。惡露乘虛上攻。頭暈眼花。心胸悶絕。速用熱車厘灌服清魂散。

如下血多而暈。神昏煩亂者。芎歸湯加人參三五錢澤蘭葉一握煎。童便半盞和服。補而兼

散之下血少而上搶心者。童便煎失笑散加鬱金汁。痰壅氣粗者。二陳湯加薑汁。并用

燒紅秤錘以醋沃之使產母嗅其氣則暈可止。若狂亂失志為敗血衝心多死。花蕊石散或奪命散。

嘔惡腹滿為惡露衝胃。平胃散加薑桂。面赤嘔逆為氣血衝肺。人參蘇木煎。其

惡露不行腹痛拒按。用桃仁歸尾延胡赤芍等逐瘀。惡露不止淋瀝太多。血熱者係陰煎

絡傷者。固陰煎。肝脾氣虛者。補中湯。氣血虛。色淡者。十全大補湯。忤火傷肝者。加味四物湯。兒枕作痛。用生熟山查肉。

沙糖煎服。或腹痛連腰。按之痛緩為虛。宜當歸香附炙草杜仲小茴香等。或用當歸建中湯

用延胡散。此皆臨產成法。撮舉之為因心化裁者鑒焉。

婦人論血暈

產後血暈。因陰血暴虛。孤陽上冒。忽然頭旋眼黑。昏悶不醒。急用清魂

散或以童便熱服。然有血下過多而暈者。有血下少而暈者。暈雖同治法。

則異。如血下多而暈。神昏煩亂而已。治宜補血清心。如生地白芍當歸茯神麥

冬阿膠人參。龍齒棗仁等。渴煩汗熱。加烏梅山梔丹。煩熱。去當歸。加童便。血下少而暈。

乃惡露不下。上搶心。心下滿急。神昏口噤。治宜行血破瘀。如生杏肉桃仁。

牛膝桂心歸尾。或用四味散黑神散。若痰火上壅。用導痰湯加

蘇木。合失笑散。鹿角散鬱金散。降治之。有一產婦暴死。但胸微熱。陸巖診之曰。血悶也。以紅花

沸入木桶。寢婦於上。熏之。湯冷加之。遂指動而甦。

論產後諸禁

頁... 卷之八上 臨產

一禁臥恐血氣未定。遽臥則惡血上升也。二禁酒恐助火升動其陽致眩暈也。三禁浴恐水溼沁竅致喘滿腫重也。四禁寒恐血氣凝滯腹痛吐瀉諸變叢生也。五禁汗恐風藥性升開泄傷陽也。六禁下恐腸腑津液傷也。七禁利小便恐傷腎氣蟄藏也。八禁寒涼藥恐傷胃或滋瘀痛也。白芍地黃黃芩等皆慎用。九禁交合早恐百脈開張頭眩少腹急滿也。十禁起早作勞不避風寒不謹食忌致滋疾也。

臨產脈候

胎前脈宜實。胎後脈宜虛。產後寸口脈洪疾不調者死。沈微附骨不絕者生。沈微而滑者生。實大弦急者死。胎前脈當洪數。產後仍洪數者死。胎前脈細小。產後脈洪大者多死。

附方

胎順

達生散

大腹皮三錢  
白朮各一錢

人參 陳皮 紫蘇各五分  
歸身 炙草二錢 葱五条

黃楊葉梢七个  
水煎

保元湯

見一卷火

紫蘇飲

見本卷胎前

滑胎煎

歸地各三錢  
壳各七分

山藥 杜仲各二錢 川芎 枳

保產無憂散

歸芎 枳 草 木香各一錢半  
水煎 再入乳香研 血餘燒存性研各五分

和勻服

八珍湯

見一卷中風

五物湯

四物湯加 肉桂

生催血氣助

生催氣降逆上胎傷

催生

三合濟生湯

當歸三錢 大腹皮各錢半

川芎 蘇葉八分

枳壳各二錢 甘草七分

製香附

水煎 待腰痛腹痛時服之立產

開骨難產

加味芎歸湯

當歸一兩 婦人頭髮一握

川芎五錢 燒灰 每服一兩

水煎

敗龜板一个 酥炙

兔腦丸

兔腦研如膏一个 麝香一字

乳香二錢半 共研細以兔腦髓和丸

艾實大 每服一丸

溫水下 陰乾

難產

如聖散

紫蘇

當歸

等分每服三五錢

難產

如意散

人參 乳香各一錢 雞旦清一个 調藥末

辰砂五分 再用薑汁調服

為末臨產時用

佛手散

當歸三兩 和服

川芎四錢

研末分四服

加酒半盃

催生

如神散

百草霜 和

白芷 加沸湯調服

各等分每服二錢

以童便米醋

血免血

潤也

治橫生逆產血得黑則止能固

難產

立應散

當歸 車前子 大腹皮 枳壳

冬葵子 白芷各三錢 牛膝 川芎各二錢 白芍一錢 水煎

治橫生 逆產

舉元煎

見三卷飲食

平胃散

見一卷中風

葵子阿膠湯

葵子一升 阿膠二兩 水煎

回生丹

蘇木三兩 煮去渣 紅花三兩 酒煮去渣 黑豆三升 水煮去豆 大黃一觔 為末 煮 熬成膏 次下

上三汁

再熬 人參 白朮 青皮 木瓜各三錢 當歸 延胡 香附 蒼朮 蒲黃 赤茯苓 桃仁 熟地

各一兩

牛膝 三稜 山萸 五靈脂 地榆 甘草 查肉 陳皮 白芍各五錢 良薑四錢 烏藥二兩半

木香

沒藥 乳香各一錢 共為細末 用前膏拌丸 彈子 大金箔為衣 隨症酌用 每一丸白湯下

牛膝湯

牛膝 瞿麥各四兩 歸尾 通草各六兩 滑石 八兩 葵子五兩 分五六服 水煎 一方有桂心

同上

頁登台表

卷之八

上臨產

四

逐瘀

牛膝散 牛膝兩半

川芎 朴硝 桂心五錢

蒲黃各七錢五分 當歸一為未每服五錢 各加薑二片

生地五錢 水煎服

失笑散

見六卷胃脘痛

十全大補湯

見一卷中風

加味歸脾湯

見本卷胎前

逍遙散

見一卷火

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

補中益氣湯

見一卷中風

清魂散

澤蘭二錢

人參各二錢半 川芎八分

荊芥穗醋炒

二陳湯

見一卷中風

甘草一錢

童便一杯和服

消痰 峻補 脾傷 腫痛 火傷 升提 昏暈 痰暈

冲心 花蕊石散 見一卷血

冲心 奪命散 血竭 沒藥 等分研細 每服一錢白湯下

肺 參蘇煎 人參 蘇木各二兩

血熱 保陰煎 見五卷瘕

傷絡 固陰煎 見二卷脫

怒火 加味四物湯 四物湯 香附炒 五靈脂炒另研各一錢

腹痛 延胡索散 見本卷調經

腹痛 建中湯 見一卷傷風

血暈 四味散 當歸 延胡 血竭 沒藥 童便煎

血暈 黑神散 見二卷血



產後論治

新產營血大損。陰脩虧於下。陽易冒於上。其甚者。氣脫血暈。遲則不救。稍輕則頭汗目眩。爲鬱。胃風入筋。急爲發。瘧陰虛。陽浮爲發。熱火炎。燦金爲喘。嗽氣促爲虛。煩不眠爲驚。悸盜汗而蓐勞成焉。皆陰虛。陽亢之咎徵也。金匱論新產三症。一血虛多汗出。善中風。故病瘧。二亡血復汗。寒多。故病鬱。胃三亡津液。胃燥。故大便難。心典云。血虛汗出。筋脉失養。風入而益其瘧。此筋病也。亡陰血虛。陽氣遂厥。而寒復鬱之。則頭眩而目瞽。此神病也。胃藏津液。以滲灌諸陽。亡津液。胃燥。則大腸失潤。而大便難。此液病也。三症不同。其亡血傷津。則一。故用藥忌辛熱。再劫其陰。卽有外因。亦忌風藥。升

舉其陽致汗脫血暈而斃

產後陰傷下焦必損而奇經多麗於下衝任督帶皆失所司最多

厥逆上攻腰脊腹痛紅白自下等症香巖先生案中於衝脉為病

每用紫石鎮逆任脉為病用龜板靜攝督脉為病用鹿角膠溫煎帶

脉為病用當歸宣補陽維為病苦寒用當歸桂枝湯和營陰維為病苦心

用生化湯溫寒此產後症所當審而用之者

診新產先問腹之痛否以驗惡露有無如小腹脹痛者惡露未淨

也鬱金桃仁牛膝行之手摩臍腹成塊者兒枕未消也失笑散或查肉沙糖之屬

消導之腹痛喜熱手按者虛寒氣滯也砂仁木香香附溫而通之

再詢頭身痛否及會否寒熱有汗無汗以辨外因內因如外感頭

痛脉必浮。芎芷防芥辛散之。血虛頭痛脉近數。四物湯白芍用酒炒。主之。產

後感冒不可輕汗。如頭痛發熱脉浮傷風也。香蘇飲加芎歸薑葱。輕解之。身

痛拘急惡寒脉緊寒邪也。芎蘇飲加生薑。溫散之。初起頭暈發熱即煩渴

脉右大溫熱症也。葱豉湯。微汗之。若脉遲身痛營分虛也。當歸建中湯。和

之汗出身痛者營衛俱虛也。歸耆建中湯。兩和之。自汗屬陽虛汗多亡

陽輕則參耆地芎五補而斂之。重則耆附固其陽。盜汗屬陰虛汗

本陰液。六味湯加麥冬五味牡蠣。固其陰。產後頭汗暈厥陽上冒也。生地阿膠

茯苓棗仁烏梅白芍小麥。養陰以鎮陽。產後惡寒陽不足也。寸脉微。補中益氣湯加薑棗

發越之。產後發熱陰不足也。尺部弦。六味湯加肉桂。收攝之。陰陽相乘憎

寒發熱。八珍十全諸湯。調補之。其惡露未淨者。大調經散。消補之。若血去多不

頁登合或 卷之八 上 產後 五

時發熱孤陽無所依附也。四物湯。益其陰。必以炮薑苦溫收其浮越。其

肌灼面赤渴飲脉虛大者。當歸補血湯。以無形之氣生有形之血也。寒

熱欬嗽肌羸色悴者。蓐勞也。母雞湯猪腰湯。或用參耆茶草。五味山藥棗仁當歸白芍蓮子。以扶

脾其臟寒腹痛者。下焦虛也。歸薑羊肉湯。溫養之。白帶多。腰脊痛者。督

帶空也。鹿角膠杞子杜仲沙苑子兔絲餅芡實等。填補之。蓐勞寒熱食減泄瀉者。損及

脾陽也。異功散加砂仁蓮子。山藥益智肉果訶子。溫攝之。吐逆泄瀉肢寒者。胃陽虛也。

附子理中湯。溫胃飲。急溫之。嘔痞痰多者。脾氣滯也。香砂六君子湯。健運之外。感欬

嗽聲重鼻塞者。腠理疏也。杏桔蘇前生薑。先散之。再用異功散去白朮加生黃耆。以實之。

內傷嗽脾肺氣虛有痰者。六君湯加蜜炙桑皮。主之火炎燦金嗆嗽者。六味去黃

澤加麥冬五味。主之。乾欬無痰。火鬱於肺也。甘桔湯加玉竹貝母杏仁百合。開潤之。產後

冬五味。主之。乾欬無痰。火鬱於肺也。貝母杏仁百合。開潤之。產後

血脫氣喘為孤陽絕陰危候也。貞元主之吸氣促自汗肢冷虛陽

欲脫也。參附湯急救之若風寒外邪入肺而喘急者必氣粗嗽痰與

吸促氣短不侔。以金水六君煎主之。或去熟地加杏桔蘇疏痰利氣若敗血衝肺致

喘者。人參蘇木煎奪命散。主之產後腹滿悶嘔吐腕間有敗血者。抵聖湯宜之。

傷飲食者。和中飲消導之脾氣虛寒者。六君湯加炮薑木香溫補之胃虛氣逆

者。橘紅半夏湯加萸杏苦降之肝木侮土者。六君湯加升柴疏暢之胃虛呃逆危症

也。理中湯古法。用丁香散如不應。急加參附遲則難救其因寒者。丁香柿蒂散因

痰者。橘皮竹茹湯產後身面浮腫者氣虛水濕不行也須辨表裏如因

浴早水漬入竅身重肌浮者濕腫也。羌防芎蘇汗之因水穀聚濕

小便不爽者水腫也。荅夏澤蘭利之如四肢浮脇腿刺痛者敗血

流入經絡也。

小調經散。或牛膝山甲。歸尾琥珀紅花蘇木等。

消其瘀如氣不化水腫脹溺。

瀉者腎陽虛也。

腎氣湯。去丹莢。

以化氣而利水產後因驚發狂者血虛神

不守舍也。

加味入珍湯。

主之敗血干心狂言見鬼者心包受邪也。

茯苓散。琥

珀散。加

鎮理之驚悸恍惚者心神不安也。

歸脾湯。

補之產後不語者

或因敗血上閉心胞。

以清魂散。加牛黃丹參蘇木。

理之因痰涎上干心竅。

用瀉膽湯。

加昔

豁之。因心腎氣虛不能上通於舌。

用七珍散。

補而開之產後汗多

必發痙牙關緊急口噤肢搐者血虛風勁也。

十全大補湯。加製附子。

峻補之。

若攻風則死。然古法用

小續命湯。及大豆。此系湯。獨活湯。最效。

朱奉議云無汗惡寒為

剛痙。

小續命湯。主之。

有汗不惡寒為柔痙。

上湯去麻黃。加葛根。

產後汗出頭暈欲成

痙厥者肝陰虛風陽動也。

阿膠生地黃茯神。小麥牡蠣粉棗仁。

以生液產後類中風。

口眼喎斜。腰背反折者。血虛兼挾風火痰也。芎歸湯。加荆芥穗。以炒黑豆淋酒煎服。

行血祛風。或川芎散。清理痰火。凡筋脉挾寒則急。挾溼則縱。血虛風火

入絡則狀類中風。產後若作真中風。用小續命等湯。治則誤矣。類中痿廢

不起。氣血虧筋緩弛也。宜滋陰大補丸。以壯養肝腎。瘈瘲者筋脉拘急為

瘈弛。縱為瘈。產後脫血風火熾而筋失榮養也。八珍湯。加丹皮鉤藤。以生陰

而退陽。如不應。用四君芎歸。以補脾土。如左脉弦。血虛火灼也。加

逍遙散。以清肝火。滋陰血。古法。用愈風湯。交加散效。產後麻脊。氣血虛而挾

痰也。右半身麻而暈。經脉空而痰飲襲入也。六君湯。加歸耆肉桂。左半身麻

而暈。營血虧而風火襲入也。十全大補湯。產後顫振。氣血虛而生風也

急用。十全大補湯。手足拘攣。掣動者。風客經絡也。舒筋湯。主之。挾風熱。加味逍遙

散如虛寒。十全大補湯。產後鼻衄。及口鼻黑氣。胃絕肺敗也。如血虛滯。

用參蘇煎。如虛火上炎舌黑。犀角地黃湯。瘀血逆升鼻衄。益母丸。童便化服。經

加製附子。用緋線一條。并產婦頂心髮二條。緊繫中指節。即止。產後泄瀉。脾土虛寒也。六君湯。溫

撮之。脾腎虛寒。補中湯。合四神丸。升攝之。命門火弱。以八補其母。若傷食

瀉。六君湯。加查肉神麩穀芽。消運之。完穀不化。陽火虛也。理中合四神丸。瀉白沫如腸

垢。元氣陷也。補中湯。加桂苓炮薑。升舉之。滑泄不止。參香散。收瀉之。產後痢疾

青白屬寒。紫赤屬熱。寒熱相搏。赤白雜下。寒熱生冷。傷腸胃也。虛寒腹痛。理中湯。加木香白芍。主

之。胃虛嘔痢。六君湯。調補之。熱痢後重。白頭翁湯。加甘草阿膠。清理之。赤白雜

下腹絞痛。救急散。調之。久痢後重。補中益氣湯。升舉之。瀉痢脈濡緩胃

溼也。湯藥愈滋其溼。宜參苓白朮散。加肉豆蔻煎薑棗湯調服。久瀉久痢。肉蔻理中丸。溫攝

之瘧邪由感犯風暑日發間日發者小柴胡湯減黃芩補中益氣湯去黃耆選用風

加紫蘇薄荷暑加厚樸香薷若產前陰瘧延及產後歸者建中湯加參朮首烏和其陰陽

寒多加黃耆熱重加鱉甲產後暑熱傷陰狀如瘧發治法忌表散劫液

以鼈甲烏梅棗仁甘酸生津以退熱且產後收受時邪尤宜審治

如暑傷肺氣必嘔悶以川貝母杏仁通草栝蒌鬱金肅降之燥傷肺津必欬渴以花

粉天冬杏仁玉竹百合貝母蜜潤之熱陷心營必昏譫少寐以竹葉麥冬犀角生地連翹菖蒲汁涼

沁之溼阻三焦必頭脹舌白不渴胸滿身痛溺少便澹以茯苓皮半夏桂枝

厚樸栝蒌滑石上下分消之風溫犯上焦必灼熱頭蒙脘痞昏睡以山梔豆豉栝

母桑葉貝母辛涼以宣通微苦以清降溼溫化熱阻氣必頭重身熱

痛咽痛脛冷以元參銀花杏仁栝蒌石斛薏苡滑石甘淡微苦輕解之寒暄失正痰

飲上干。必脇痛背冷。欬逆不得卧。或腸中漉漉有聲。兼溺短足腫。

以桂枝牛夏乾薑薤白。辛酸淡滲泄之。產後霍亂吐瀉停食者。香

五朱子茯苓白芍甘草。正氣主之。虛寒者。理中溫之。吐瀉逆冷者。附子散溫通之。產後虛

散。煩氣短者。竹葉清補之。產後積聚風冷與血氣相搏而成也。積為

陰在臟聚為陽在腑。痛有常處。四神痛無定處。芍藥選用血痕氣

血壅結。因氣病而成血病也。痛無定處。失笑散加後必扶正。歸脾

大便閉結津液涸也。四物加潤之。或五行丸麻蘇粥皆效。小便淋瀝膀胱虛

熱也。六味湯或四物補而分利之遺溺頻數者氣虛不能約制也。

補中湯加益智仁覆盆子黃肉佐以桑螵蛸散升而攝之小水不禁脬損也。桑螵蛸攝之

手傷脬破者。歸耆湯加黃固補之氣虛。補中湯加腎虛去丹泄小

絲絹猪羊脬。

便血熱乘血虛滲入脬中也。髮灰滑石甘草。止之大便血鬱結傷脾也。加

歸脾湯。若因思慮傷心者。妙香散。膏梁積熱者。加味清胃散。醇酒溼毒者。葛花

解醒湯。怒動肝火者。加味小柴胡湯。大腸風熱者。四物湯。大腸血熱者。四

湯。加芩。腸胃虛弱者。六君湯。元氣下陷者。補中湯。氣血虛者。物

連槐花。入珍湯。產後諸淋虛則頻數肺虛。補中益氣湯。腎虛。六味丸。熱則瀉痛。石

散。血淋。加味四物湯。產後帶下元虛滑也。金鎖匙丹。或產後經行太

早者乳必少。年壯不自乳者不在此例。脾虛不能攝血。補中益氣湯。心脾不能統血

加味歸脾湯。肝火迫血妄行。加味逍遙散。氣血兼虛。八珍湯。小便出糞大小腸

交也。先用六君湯。產後陰脫努力所傷也。以當歸人參湯升之。生

腸不收虛而滑也。內服芎歸參耆升麻等。或以燈草搐鼻。產門不

閉陰氣失斂也。十全大補湯。峻補之。腫熱、厥痛、肝經虛熱注也。加味逍遙散。

若因憂怒肝脾鬱傷也。加味歸脾湯。因暴怒肝火血傷也。龍膽瀉肝湯。有產

後產戶下一物如手帕丹溪云是肝痿。以參耆歸升麻。升舉之。有產後

水道中出肉線一條長三四尺動之則痛絕。先服失笑散。次以帶皮薑二

觔研爛入清油二觔煎油乾為度。用絹兜起肉線屈曲於水道邊以薑渣薰浴則熨之。乃縮上再服失笑散。芎歸湯。如肉線斷者不

治。諸凡產後症不一端而危莫危於血暈氣喘呃逆風痙難莫難

於蓐勞虛嗽泄瀉積聚所尤要者產後下焦陰虛為傷其肝腎也

而衝任督帶多隸肝腎用藥宜溫養固攝切勿重虛其虛致成下

損不能復元前所條列大約根據良方薛按粗舉梗概其治法不

盡於此云。

產後脉候

新產之脉。緩滑吉。實大弦急者死。沈小吉。堅牢凶。寸口瀦疾不調死。沈細附骨不絕生。

附方

當歸桂枝湯 見一卷傷風

生化湯 當歸三錢 三粒 水煎 川芎 炮薑 炙草各一錢 桃仁十

失笑散 見六卷胃脘痛

四物湯 見一卷中風

香蘇飲 見本卷胎前

芎蘇飲 見二卷欬嗽

寒熱通治塊痛和血傷風傷寒

溫熱營衛營衛固陽補陰補中調補調補惡露補血

葱豉湯

見一卷溫

當歸建中湯

見一卷傷風

歸耆建中湯

見二卷欬嗽

再加四物

參

附

桂

苓

耆附湯

耆一兩  
各參附湯

附五錢

名耆附湯

參一兩

附五錢

六味湯

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

八珍湯

見一卷中風

十全大補湯

見一卷中風

大調經散

見三卷腫脹

當歸補血湯

見本卷崩漏

勞蓐

母雞湯 黃雌雞一隻 歸地者 朮 桂心各三錢 煮雞汁至三鍾 每用汁一鍾 煮

藥每服四錢 日服三次

勞蓐

豬腰湯 豬腰一對 歸芍各酒炒一兩 先將歸芍煮去渣 將腰子切如骰子大同晚米一合 香豉一錢

加葱 椒 鹽 煮食

虛羸

補虛湯 參 朮各一錢 者 陳芎 草各五分 薑三片 熱輕加茯苓 熱甚加炮薑

虛痛

歸薑羊肉湯 羊肉一斤 當歸五兩 生薑六兩 黃耆四兩 先以水煮羊肉取汁下後三味分四服

煮食 有惡露 加桂心三兩

補脾

異功散 見一卷中風

補陽

附子理中湯 見一卷中風

吐泄

溫胃飲 見一卷中風

嘔痞火鬱

香砂六君湯

見三卷嘔吐

甘桔湯

甘草二兩 半夏

桔梗一兩 貝母

失音加訶子 嘔加半夏

聲不出加生薑 吐

血加紫菀 少氣加人參

肺痿加阿膠

貞元飲

熟地八錢 寒加桂

當歸

炙草各三錢

水煎 嘔加薑

金水六君煎

見二卷欬嗽

人參蘇木煎

見本卷臨產

奪命散

見本卷臨產

抵聖湯

參 草 陳 夏 芍 澤蘭

每服四錢

加薑

和中飲

陳 枳 各一錢 仁 各八分

查肉

麥芽各二錢

厚樸

砂

橘紅半夏湯

橘紅一兩 加薑五片

水煎

炙草各五錢

藿香三兩

喘急風喘冲肺血暈滿嘔傷食虛逆

呃逆 丁香散 見三卷呃

寒呃 丁香柿蒂散 見三卷呃

痰呃 橘皮竹茹湯 見三卷嘔吐

經絡 小調經散 見三卷腫脹

陽虛 腎氣湯 見二卷虛損

發狂 加味八珍湯 八珍湯加 茯神 遠志各三錢 水煎

狂悸 茯苓散 苓 參各一錢 耆 芎 牛膝 琥珀 龍齒各 七錢半 生地一兩 桂心二錢 每服三錢

驚狂 琥珀散 辰砂另研 沒藥 琥珀 當歸並研末 等分 每服二錢 白湯下 日二次

心脾 歸脾湯 見二卷勞瘵

不語 清魂散 見本卷臨產



肝

祛風

癰

瘰癧

風

痺

拘攣

黑舌

鼻

泄

瀉

加味道遙散

見一卷火

愈風丹

荆芥穗焙研三錢

黑豆滓酒服

治風暈

交加散

見本卷調經

當歸散

歸 荆 等分爲末每用二錢水酒各半煎

治產

舒筋湯

羌活 薑黃 炙草各二錢

木瓜二錢 海桐皮 歸 芍

服

服

犀角地黃湯

見一卷溫

益母丸

參 朮 芩 草 芎 芎 桂 丹 益母

四神丸

見三卷飲食

參香散

人參 木香各二錢 肉蔻煨 茯苓 扁豆各四

錢 陳皮 罌粟壳 醋炒各一兩 爲末每服一錢

熱。利下。利。調。理。虛。滑。虛。滑。痢。渴。痢。渴。瘧。疾。吐。瀉。

七分米  
飲下

白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁 炙草 阿膠各一錢 黃連 黃蘗 秦皮各三錢 分二服

救急散

地芍 歸草 阿膠 艾葉 炮薑

參苓白朮散

見三卷脾胃

肉蔻理中丸

理中丸加 肉蔻七錢 蜜丸

加味四君湯

四君子加 黃耆 粟壳

必効方

麥冬 烏梅

七味白朮散

四君子加 藿香 木香 乾葛各一錢

小柴胡湯

見一卷溫

藿香正氣散

見一卷中風

逆冷痞膈虛煩積聚熱血痕便燥通燥閉便溺頻

附子散 參 朮 歸 桂 附 陳 草 吳 萸 丁香 各

來復丹 五錢 為末 每服二錢 米湯下 見三卷嘔吐

竹葉湯 竹葉 麥冬 小麥 各二兩 甘草 一兩 生薑 二兩 大棗 十二枚 虛悸 加參 少氣 加糯米 五合

四神散 歸 芎 芎 薑 每服二錢 酒下

芍藥湯 芍 苓 芎 水煎

血竭散 歸 芍 桂 心 血 竭 蒲 黃 各 兩 半 延 胡 一 兩 為 末 每 服 二 錢 酒 下

五仁丸 見七卷二便不通

蘇麻粥 見七卷二便不通

通氣散 陳 蘇 枳 木 通 等 分 為 末 服 四 錢 立 通

螺蛳丸 見七卷閉癰

遺溺縮溺 損脬傷脬 傷脬便血 傷心積熱 酒傷肝火

益智仁散 益智 覆盆子 茯神 遠志 龍骨 五味

桑螵蛸龍骨散 每服四錢 米飲下 龍骨一兩 研末每服二錢米

歸耆湯 歸耆 芍 參 朮 陳 草

固脬散 黃絲絹三尺 黃蠟五錢 蜜二兩 白茅根 馬

補脬飲 見七卷胞痺

加味歸脾湯 見本卷胎前

妙香散 見二卷衄

加味清胃散 清胃散見二卷衄 此加犀角 甘草 連翹

葛花解醒湯 見一卷溼

加味小柴胡湯 小柴胡湯見一卷溫 此加歸 芍 山梔 膽草

熱淋血淋

滑石散

滑石一兩三錢半  
為未漿水調服方寸匕  
通草

車前子

葵子各一兩

加味四物湯

生地 川芎 白芍  
各一錢 桃仁五个

當歸 杜牛膝 木通  
滑石一錢半 木香五分

分煎

金鎖匙丹

茯苓 茯神各二兩  
蠟粉四兩 酒糊丸

遠志 龍骨各三兩

牡

苓朮兔絲丸

茯苓 白朮 蓮子  
杜仲各三兩 各四兩

兔絲子十兩 五味二兩 山  
蜜丸 炙草二兩

五苓散

見一卷溫

當歸人參湯

參 耆 歸 芍各二錢  
外用五倍子泡湯洗又敷之

升麻五分 水煎

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

利溼 陰脫 肝火 去痰

金黃散

延胡 上沖

蒲黃各一錢

桂心二分

酒調服治惡血

塊痛

延胡散

延胡 桂心 當歸 酒調服治惡血上冲

當歸

見三才圖會

當歸

用酒洗去其土

延胡

見一途圖

不可作聲

火

延胡

延胡散三兩

延胡

延胡

延胡散二兩

延胡

延胡

延胡散

延胡

延胡

延胡散

延胡

延胡

延胡散

延胡

延胡

延胡散

延胡

延胡

產後

包氏嚴寒坐蓐腸出不收身熱面赤思被冷無溫腸必乾澹難上  
如草麻子搗塗髮頂法必不驗卽冷水喫面亦慮滋病令煎芎  
歸湯入淨桶著人扶坐桶上以舊絹托腸乘熱熏之腸得熱氣  
自潤而升且托且送待其將盡趁手托入如法而收再服補劑  
熱退

陳氏產數日浮腫身重不能轉側不食不語脉虛緩當由產後浴  
早水溼乘虛襲入子宮下部先腫漸至通體重著殆傷溼之見  
症也開發腠理逐去溼邪宜羌活滲溼湯加陳皮半夏防已茨  
苓皮一啜溼從汗解身可轉側浮腫漸退再爲健脾利溼飲食

亦進以婦體素肥氣鬱生涎時或昏冒用溫膽湯調理而痊

某氏露產冒暑煩熱汗出直視不語脉軟數醫謂惡露未行治宜逐瘀予曰直視者足太陽經血虛筋急牽引直上也不語者暑先入心手少陰脉繫舌本絡舌旁邪入營分舌系縮也煩熱則易鬱冒汗多亦慮液亡失治必變昏瘖危疴用生脉散加生地當歸石斛連翹丹皮木瓜甘草藕汁冲服諸症退能言又加減前方數十服得安

張氏中年產育旬日外鮮紅下注自汗身熱此陰虛陽無所附也用十全大補湯去桂加炮薑小麥煎湯二服汗收血止○是症血去則亡陰汗多則亡陽產後危症也

徐氏產前夜熱煩渴脉促數因決其胎必下當夜遂產惡露甚少

逾日鮮血暴注暈絕用潞參茯神熟地炮薑荆芥醋炒山梔甘草

俱炒黑石斛阿膠神甦血止

楊氏產後鮮血足膝熱乳少脉芤宜攝固下元兼升舉中氣桑螵

蛸炙研熟地杞子杜仲鹽水炒黃耆蜜炙升麻二服血止去桑螵蛸加

生黃耆甘草當歸紅棗而乳倍常

李氏產後鬱冒昏睡不語慮其痙厥用鮮石菖蒲根汁熱服漸次

甦醒能言詢所苦但云目暗咽塞心系下引遂悶絕不知人此

為風火痰阻竅也因用桔梗荆芥甘菊炒連翹貝母茯神山梔

菖蒲汁冲二服而安

張氏官署坐蓐輒動鄉思經旬宵熱如烙脉虛疾插髻銀簪一夕  
色黑以紙拭去明晨如漆駭極予云此產後血虛火炎汗澤所  
蒸耳宜滋陰退熱以熟地白芍丹皮當歸丹參石斛茯神杞子  
甘草四服熱退簪色不變矣去丹皮丹參加棗仁山藥蓮子蜜  
丸服愈○此前取甘涼除熱後取酸濇安神

吳氏蓐損不復寒熱往來自汗欬嘔吐沫心悸耳鳴脉虛數經言  
陽維爲病苦寒熱陽失維護奇脉已損况中宮少鎮致欬嘔悸  
眩肝陽升逆面色忽青忽赤延爲難治惟大便未澹腎關未撤  
尙堪借箸擬晨服黃耆建中湯去薑加參苓山藥橘白衛外扶  
中晚服熟地杞子俱炒牡蠣醋棗仁白芍茯神五味蓮子小麥煎

服攝陰斂陽症減背時凜寒晨服方中再加鹿角膠外以白胡椒末摻布膏藥貼背脊第三椎至第七節仍照前分早晚各服五七劑乃安

巢氏初春小產寒熱頭痛煩嘔汗後復熱血下如豆汁篡間糜損脈右洪大左沈數此溫邪化熱乘虛襲入下焦也以豆豉山梔萸仁鮮生地石斛知母麥冬丹參阿膠血稀熱減去知母阿膠加丹皮竹葉心元參汗透身涼而脈和

鄒氏冬寒當產艱難損動元氣嗣以月內便泄交春寒熱往來痰嗽汗泄晡時火升頰紅唇燥食入嘔滿小腹痛墜瀉利稀白無度支離委頓所服丸劑一味混補不顧滋膩豈胃弱火衰食已

不化小腹重墜氣更下陷尚堪滑膩增瀉浸至蓐勞莫挽矣急  
用溫中運脾痛利可減嘔滿可除炮薑小茴益智仁茯苓白朮  
半夏麴穀芽俱炒橘白數劑利止寒熱減食亦知味去炮薑小茴  
穀芽半夏麴白朮橘白等加砂仁熟地炭潞參五味丹皮山藥  
蓮子欒斛虛陽漸退併去益智茯苓加甜杏仁茯苓神白芍百合  
嗽止調理而康