000412

云南中医学院
藏书之章
图书馆

京都中央圖書館藏書

自敘

余性素拘凡所著述皆言其所明弗明者弗敢言也夫明非徒喻其理之謂謂必得所傳授親習其事有以證其理之不差而後曉然於心者亦曉然於手與目斯之謂明也如是言之則皆確鑿可據非浮光掠影之談非臆測傅會之語耳余於醫傳自孫慶曾先生凡男婦大小爲脉爲症皆得之親受故試之診視罔弗取效前著傷寒綱目雜病源流婦科玉尺皆曉然于心與手目一一筆之于書者也幼科中獨痘瘡一症其旨微其候險其變化百出尤必臨症指示而後能悉其精微知其蘊奧孫先生與前輩葉天士同出一門固精於痘而余于受業時非專屬行醫弗獲相隨痘家親聆教誨故獨於痘弗敢言也雖古痘醫首推錢仲陽陳文中後如曾氏萬氏湯氏魏氏皆接兩家宗派而翟氏聶氏尤能闡明錢陳

底蘊其書具在未嘗不深切究明曉然于理之所在然未得臨症指示所謂已明而妄有言乎故輯幼科釋謎六卷共分二十四目其致自謂曉然于心未能曉然于手與目也既不能曉然于手與口也既不能曉然于口與門獨闕痘症非竟闕也庸有待也孫先生雖已捐世或得一精其業者受其傳焉則闕者未嘗不可補矣釋謎既成因書其故以冠于首時

乾隆三十九年甲午十二月上澣無錫沈金鰲莘綠氏自書

凡例

一是書獨闕痘症。已詳明自敘中。其餘共分二十四門。雖症變多端。或有不盡于此者。更當臨症消息。然大段備具。已足該幼科綱領。

一二十四門症候。各著四言韻語。闡明義理。不列散文者。便誦習也。但韻語中探源析流。義尚簡括。閱者當求意旨之所在。勿以爲略而忽之。

一韻語後。各採前人議論。以相發明。要皆擇其至精至當。歸於一是。足爲幼醫科律者。故書中所登。無錯雜無重疊無支離無牽扯。

一是書刪繁就簡。雖卷帙無多。實足發明病旨。遵守斯法。已大概無誤。若更神而明之。則存乎其人矣。

一芽兒臟氣未全。不勝藥力。周歲內。非重症勿輕易投藥。須酌法治之。卽兩三歲內。形氣畢竟嫩弱。用藥亦不可太猛。峻攻驟補。反受藥累。

一兒病多由食積。固是要語。醫家不可不知。然亦有稟受薄弱。或病後虛怯。其所生病。有全無食積者。不得以此語橫亘心中。仍爲消導。卽或有之。亦當扶正而使積自消。消息甚微。當意會毋執。

一古人治幼兒。或專攻。或專補。或專涼。或專熱。皆有偏處。是書宗旨。一以中和。當病爲歸。不敢偏于攻補涼熱。

一病家怕驚不怕瀉。醫家怕瀉不怕驚。要知驚瀉俱爲重候。在病家固無足怪。醫家旣怕瀉又怕驚。耶若存不怕之念。恐有輕心妄治。以致害者。不可不愼思之也。

一古人製幼方必使藥品與幼兒相得本與大方有別醫者固不可執古方以治今病亦不可妄作方劑有背古人之意此旨亦甚微明者自領之

一嬰兒兩三歲內全屬天眞痛癢不能自達其時脉雖不可憑而觀色察形或視三關指紋醫者反得依據有一種嬌養小兒至四五歲六七歲知識略開便生詐僞不饑爲饑不渴爲渴不癢爲癢不疼爲疼父母溺愛不知諄諄告醫醫若不察使爾多詭此又當觀色于色之外察形于形之表以辨其情僞者也切勿爲他瞞過

卷一
總論　初生諸疾
驚風
卷二
癇癎　諸疳
發熱煩躁
卷三
傷寒　麻疹
瘧疾
黃疸　水腫
腹痛腹脹
痞結積癖　食積
吐瀉單吐單瀉
痢疾　痰涎
咳嗽哮喘

啼哭　汗
卷五
二便　脫肛肛痒
應用方
卷六　耳目鼻口舌齒咽喉
應用方　丹毒

幼科釋謎

總論

沈金鰲輯

運合陰陽。胚胎在腹。五行相參。乃成孕育。逐月成形。男女攸屬。九竅既分。肢體隨畜。臟區以五。腑部以六。內伏筋骨。外弸肌肉。至于經脉。無不聯屬。至于毛髮。無不攢簇。氣通于母。呼吸盈縮。母息是同。如璞孕玉。母熱熱侵。母寒寒促。母怒脉興。母驚陰觸。母思氣拘。凡此諸因。皆能停毒。而毒之停。更甚淫慾。毒停先天。後母憂神。踰月元具。足一旦臨盆。帶脫瓜熟。此後哺乳。更須周篤。易虛易實。疢病惟速。疾痛莫知。疴瘵誰天。斯酷古人。胎教所由諄諄。千月涵濡。胎元具足。一旦臨盆。帶脫瓜熟。此後哺乳。更須周篤。易虛易實。疢病惟速。疾痛莫知。疴瘵誰告。如啞不言。如謎難卜。保赤維艱。常憂手束。遍攷方書。廣搜秘錄。識取其精。論採其卓。爰輯斯編。釋謎標牘。既分門類。更詳款目。欲

幼幼者。當爲三復。

察色　錢乙曰、兒醫號爲啞科。脉來駛疾難憑。故以察色爲要。形色若不相應。然後聽聲切脉。如面、上、症。左顴爲肝。右顴爲肺。額上爲心。鼻爲脾。頦爲腎。赤者。熱也。黃者。積也。白者寒也。青黑者。痛也。隨症治之。又如、目、內、症。赤者心熱。導赤散。淡紅者心虛熱。生犀散。青者肝熱。瀉青丸。淺淡者。補之。黃者脾熱。瀉黃散。無精光者。腎虛。地黃丸。若見面目浮腫。主久咳嗽。乃脾受疳。積也。又如、唇、上、症。白主吐涎。嘔逆、吐白、便血。紅主渴飲煩躁。若久咳瀉唇紅者是虛症也。勿用涼藥。黃主脾受積。後發腫紫色。及吐涎。主蟲痛。不吐涎。是積痛。唇口四畔黃如橘。主口臭。乃脾之積熱也。青主血虛脾寒。爲冷所乘。蓋唇主脾土。未來剋土。知脾弱不能食也。又如、舌、上、症。凡小兒舌乾舌白。舌燥舌胎。舌黃舌赤腫。

皆主大便不通或通利必赤色焦黃如舌裂舌上芒刺舌上出血皆熱極陽毒也舌上生瘡心脾有熱舌捲主驚久患瀉利舌黑而潤不可認爲熱蓋久病上焦虛熱故也久瀉利舌黑者必死

李仲南曰面上青色爲驚積不散欲發風候紅赤色爲熱爲痰積壅盛驚悸煩躁增進黃色亦爲熱爲食積癥傷欲作疳候或作痞癖若神思昏沉其候潮熱氣粗困倦或嘔噦或瀉痢白色爲寒爲肺氣不利大腸滑洩欲作吐利黑色爲痛所傳不煩變症卽爲逆候榮衛失序爲疾危惡

虞博面上形症歌曰痢疾青脉生于左太陽須驚一度見推詳赤是傷寒微燥熱黑青知痕青此病明知兩度驚赤黑困疲時吐瀉色紅啼夜不曾停

山根若見脉眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤毒熱眼朦朧

是乳多傷。右邊青脉不須多。有則頻驚待奈何。紅赤爲風抽眼目。黑青三日見閻羅。

李梴曰、小兒諸病。但見兩眼無精光。黑睛無運轉。目睫無芒鋒。如魚猫眼狀。或兩眼閉而黑睛朦朧者死。或外若昏困。而神藏于內不脫者生。黑珠滿輪。睛明者少病。眼白多。睛珠或黃。或小者。稟弱多病。

聽聲

危亦材曰、睡中驚啼。聲浮者易治。聲沉不響者難痊。或聲如鴉中彈者不治。

李梴曰、聲輕者。氣也。弱也。重濁者。痛也。風也。高喊者。熱欲狂也。聲急者。神驚也。聲塞者。痰也。聲戰者。寒也。聲噎者。氣不順也。喘者。氣促也。噴嚏者。傷風也。驚哭身沉不響者。重也。聲濁沉靜者。

疳積也。如生來不大啼哭。聲啾唧者。必
驚叫。乃火盛氣虛。必死。夜半發者多有口瘡宜看之。直聲往
來而無淚者。痛也。迚聲不絕而多淚者。驚也。噁煎聲煩躁者難
愈。躁促聲音者。感寒也。

李仲南曰、小兒有疾。既見于色。必應于聲。其聲不一。必細審之。
有重、實聲者。歌曰、重實聲雄體熱爲。二焦氣壅在心脾。傷風咳
嗽咽喉痛。結澁腸中糞出遲。有悲、焦聲者。歌曰、聲悲焦有燥。恐
怖欲生風。重濁聲沉靜。疳攻必耳聾。有疳、啼、哭、聲者。歌曰、但哭無
啼只有驚多啼不哭痛分明。聲輕顫嗄風癇病。速緩聲頻吐瀉
氣微尿主澁長遲聲細痢多般。有遲、緩、聲者。歌曰、噁煎聲煩躁病難安。
腸鳴洩瀉頻。嗄聲多不響。風熱肺虛因。燥促聲音爲感寒。語短

脉法

錢乙曰、候兒脉。當以大指按三部。一息六七至爲平和。八九至爲發熱。五至爲內寒。訣曰、小兒脉緊風癎候。沉緩食傷多嘔吐。弦急因知氣不和。急促急驚神不守。冷則沉細風則浮。牢實大便應秘。久腹痛之候緊而弦。脉亂不治安可救。變蒸之時脉必亂。不治自然無過謬。單細疳癆洪有蟲。大小不勻爲惡候。脉沉而遲有潮熱。此必胃寒來內寇。瀉痢脉大不可醫。仔細酌量宜審究。

王肯堂曰、張雲岐云。未及五歲不能視聽者。不可別脉。五歲以上。方可以脉別浮沉遲數。按前錢氏論則不拘五歲上下也。水鏡訣又云三歲以內。看虎口三關。若三歲以下。更用一指按高骨乃分三關。定其息數。呼吸八至爲平脉。九至不安。十至危困。

四歲以下用一指衰轉尋三部以關爲準七八歲移指少許九歲次第依三關部取十一二歲後依大方脉部位診視按此又與前二說不同醫者臨時參酌用之可耳

脉應雜病

王肯堂曰諸脉數爲熱屬腑諸遲脉爲冷屬臟陽數脉主吐逆不吐必發熱陰微脉主洩瀉不瀉必益汗沉數脉寒熱寒多熱少亦主骨蒸熱緊數脉寒熱熱多寒少又主骨蒸急則驚癇沉細脉乳食不化亦主腹痛下緊脉心腹痛短數同亦主咳嗽沉細脉乳不化泄瀉沉緩亦同微痢沉伏脉爲積聚亦主霍亂微緩脉乳不化泄瀉沉緩亦同微澁脉痰癖筋攣微急脉寒熱唾血浮滑脉宿食不消亦主咳嗽浮緊脉痛氣耳聾浮洪脉頭疼身熱緊滑脉吐血惡心心脉急數驚癇否則疝淋肝脉急癇癇風癇痰涎流液肺脉浮實鼻塞

弁大小便不通。關脉緊滑主蛔蟲。尺脉沉同。尺脉微細。溏洩冷利。乳食不化。尺脉微澁。便血。否必盜汗。脉入魚際主遺尿。

看虎口三關法

滑伯仁曰、小兒三歲以內。看男左女右虎口三節。曰三關。紋色紫熱。紅傷寒。青驚風。白疳病。黃色淡紅乃平常小恙。其筋紋宜藏。不宜暴露。若黑色則爲危險。再脉紋見下截風關爲輕。中截氣關爲重。上截命關爲尤重。直透三關爲大危。熬按從前言看三關法雖大同小異總不如滑氏之直截明簡

王肯堂曰、全幼心鑑十三種脉紋云流、珠。只一點紅色。環、珠差大。長、珠圓長。以上非謂圈子。總皆紅脉貫氣如此。來、蛇即是長頭大。一頭尖。去、蛇亦如此。分上下向。故曰來去。角弓、珠散出。一頭長。張。向裡爲順。向外爲逆。鎗、矛直上魚骨分開。水字、即三脉並

形針形即過一二粒米許射甲命脉向外透指命脉向裡雖然
余嘗治之亦有不專執其形脉而投劑者蓋但有是症即投是
藥而亦多驗　流珠形主飲食所傷內熱欲吐或腸鳴自利煩
躁啼哭用助胃膏環珠形主脾虛停食胸膈脹滿煩渴發熱五
味異功散來蛇形主脾胃溼熱中脘不利乾嘔不食此痧邪
安丸異功散來蛇形主脾傷飲食腹痛寒熱不食大
丙作四味肥兒丸去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急不
食七味白术散弓反裡形主感寒驚悸哽氣出氣四肢稍
冷倦怠小便赤咳嗽吐涎惺惺散弓反外形主痰熱心神恍惚
夾驚夾食風癇痰盛天麻防風丸鎗形主風熱生痰驚抱龍丸
魚骨形主驚痰發熱抱龍丸抑青丸水字形主驚風食積胸膈
煩躁頓悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦大安丸針形主心肝熱

極生風驚悸頓悶困倦痰盛搐搦抱龍丸射指形主驚風痰食
聚腸牛黃清心丸射甲形主驚風及一切木尅土之敗症六君
子湯加木香鉤藤鉤官桂末應卽加附子

小兒指形圖



流珠形



來蛇形



長珠形

去蛇形

環珠形



弓反外形

弓反裏形

針形

透關射甲形

鎗形

水字形

魚骨形

透關射指形

嬰兒墮地一聲啞啞形體雖具猶是血茄肌膚脆嫩骨肉么麼如水中泡如樹上葩八風之賊六淫之邪豈能速害從外而加由在母腹感受淫汙或傷冷熱或被驚譁烹煞煩燔炙酒醴紛奢亂氣狡僞陰血周遮釀災蘊毒貽害嬰芽降生之後調護多差綳抱恐嚇乳哺擎叉致令疾作一一堪嗟胎黃撮口驚癇搐拏臍風鎖肚逼凡茲種種難與搔爬坐視其斃誰之咎耶昔黃帝言憫彼呀呀啞啞吾不能察幼小如麻善爲調理別是一家誠哉斯語千古堪嘉敢告醫士存心勿遐

胎驚胎癇胎風胎黃

錢乙曰百日內發搐眞者不過兩三次必死假者頻發不爲重百內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐

也。欲知假者口中氣出熱。治之可發散大青膏主之。

王汝言曰小兒未滿月驚搐似中風。欲死者用辰砂以新汲水濃磨汁。塗五心最效。

曾氏曰胎癇者因未產前腹中破驚。或母食酸鹹過多。或爲七情所汨。致傷胎氣。兒生百日內有者是也。發時心不寧。面微黃。氣逆痰作。目上視。身反張。啼聲不出。先用參蘇飲次用琥珀抱龍丸。輕者可愈。重者難全。

李梴曰胎驚癇風者乃孕婦嗜慾忿怒驚撲。或傷風邪。兒初生下。卽嘔吐搐掣。口眼喎斜。聲啼氣短。腮縮顧開。或頰赤。或面青。嘴口咬牙。眼合涎潮。筋骨拘攣。身腰强直。臍腹腫起。與嘴口撮口同症。視其眉間氣色。紅赤者生。青黑者死。辰砂膏最妙。

王肯堂曰胎驚者初生月內壯熱吐哯。心神不寧。手足抽掣。身

體強直。眼目反張是胎驚。皆由妊婦調攝乖常。飲酒嗜慾。忿怒驚撲。母有所觸。胎必感之。或外挾風邪。有傷于胎。故子乘母氣。生下即病也。其候月內壯熱。眼翻握拳。噤口咬牙。強直涎潮嘔吐。搐掣驚啼。腮縮顎開。或頰赤。或面青。但胎驚。眼合不可誤作慢脾。妄用溫藥。其有搭眼噤口之類。亦此一種之所發也。虎口指紋曲入裡者可治。反出外者不治。先宜解散風邪。利驚化痰及貼顖法。甚則以朱銀丸利之。若面青拳搐。保命丹鉤藤散。全蝎散之類。大抵芽兒臟腑脆弱。不可輒用鉛粉鎮墜之劑。如遇此候。急用豬乳細磨牛黃麝香各少許。調抹入口中。仍服導赤散以瀉肝之子。即愈矣。

胎風者。小兒初生。其身有如湯潑火傷者。此皆乳母過食膏粱所致。其母宜服清胃散。及逍遙散以清氣血。兒亦時飲數滴。有身無皮膚而不燃赤者。由產母

脾氣不足也粳米粉傅之焮赤發熱者產母胃火熾也石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也未滿月而撮口握拳腰軟如隨者此肝腎之中邪勝正弱也三日內必不治如男指向裡女指向外尚可治宜全蝎散鈎藤散眉紅者不可治

胎黃者小兒生下遍身面目皆黃狀如金色壯熱大便不通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因母受溼熱而傳于胎也凡有此症母子皆宜服地黃湯地黃飲子有生下百日及半周不因病後身微黃者胃熱也若自生而身黃者胎疸也經云諸疸皆熱色深黃者是也犀角散若淡黃兼白者胃怯也白朮散

胎寒胎熱

虞塼曰何謂胎寒芽兒百日內覺口冷腹痛身起寒粟時發戰

慄曲足握拳日夜啼哭不已或口噤不開名曰胎寒其症在胎時母因腹痛而致亦有產婦喜啖甘肥生冷或胎前外感風寒暑溼治以涼藥內傷胎氣則生後昏昏多睡間或哯乳瀉白不勻氣散調補次參苓白朮散養胃白芍藥湯去寒溼　何謂胎早治必成慢驚慢脾風宜沖和飲合當歸散加煨薑微溏次用熱兒在胎中母多驚恐或食熱毒物生後旬日間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目胞浮腫神困呵欠吸吸作聲遍身壯熱小便赤大便秘時驚煩由胎中受熱或誤服溫劑致令熱畜于內熏蒸胎氣故有此症不早治則鶩曰重舌木舌赤紫丹瘤自此而生母宜先服木通散亦與兒服次以四聖散溫洗兒兩目開進地黃膏天竺黃散當歸散牛蒡湯亦令母服藥使藥過乳漸次解之百無一失如以涼藥攻之

必生他病乳母尤必忌口

撮口

孫思邈曰小兒初出腹筋骨未斂肌肉未成血凝乃堅成肌肉耳其氣血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉口聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂此多不育宜龍胆湯

李仲南曰外症舌強唇青聚口撮面面目黃赤氣息喘急啼聲不出飲乳有妨若曰出白沫而四肢冷者不可救療其或肚脹筋青吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴疏利宜辰砂膏　初生七日後此症可免

鵝口　一名噤口風又名雪口

巢元方曰兒初生口裡白屑滿舌上如鵝之口故名由在胎時

受穀氣盛心脾熱氣薰發于口治法用髮纏指頭醮井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣摻舌上如用此法不效傅保命散

李梴曰嚥口風者眼閉啼聲漸少舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐血沫二便皆通此胎中熱毒流于心脾也　此症亦初生七八日內患之鷰按鵞口瘡用硼砂細研敷之立效

王肯堂曰茅先生論兒喉中塞一塊肉瘤閉郤爲喉痺身大熱舌硬不轉爲木舌口閉滿口黃如膏名穢毒至此爲實熱先用三解牛黃散微與通利次用天竺黃散共牛黃膏與服如喉響似鋸及眼直視面青黑不乳食者死

臍風臍溼腫臍瘡臍突

孫思邈曰臍風者斷臍之後被水溼風冷所乘風溼之氣入于

臍。而流。入心脾。遂令肚腹脹滿。臍腫身體重著。四肢柔直。日夜多啼。不能食乳。甚則發爲驚搐。若臍邊青黑撮口不開。是爲內搐。不治。爪甲黑者。卽死。

朱震亨云。初生七日內。見噤口撮口風三症者。危。百日內見足跨者。亦不治。

此症。手足微黑。白飲溫蜜湯。空心調下。微洩似茶褐色。二三行。進白芍藥湯加姜棗。常用此法。亦妙。

曾氏曰。如禀賦充實。發熱有痰。驚搐投黑一症。又非臍風。此亦因初生洗浴。繫臍不緊。穢水浸入。

臍突

于內。產後旬日外。臍忽光浮如吹。捻動微攣。間或驚悸作啼。治

用白芍藥湯加芎仁。次以外消散塗貼。自然平復。

陳無擇曰。小兒初生一七日內。忽患臍風撮口。百無一效。坐視其死。良可憫也。有一法。世罕知者。凡患此症。看兒齒齦上有小

泡子加粟米以溫水醮熟帛裹指輕輕擦破卽開口便安不藥
神效
李梴曰、斷臍後爲風溼所乘或尿溼褯裙遂成臍風面赤喘急
口噤口宜調氣益黃散甚者金烏散或宣風散亦有熱在胸堂
啼聲不出其症臍腫凸腹脹滿日夜多啼不能乳甚則發搐撮
伸引努氣亦令臍腫發風千金龍胆湯
錢乙曰臍溼腫者斷臍後爲水溼所傷或八風冷致令四肢不
和臍腫多啼不能乳哺宜栢墨散五通膏
滑伯仁曰嬰兒臍中腫溼經久不差若至百日卽死宜速治之
用枯礬龍骨爲末入麝少許拭臍乾摻之須避風
巢元方曰、臍瘡者水入臍中或受尿溼腫爛成瘡或解脫爲風
所襲入于經絡則成風癎若臍腫不乾久則發搐宜金黃散

王漢東曰、斷臍作瘡枯攣龍骨煅當歸末皆可摻或油調敷之
李仲南曰、臍突者芽兒有熱在胸堂則頻頻伸引呃呃作聲努
脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏無識之人將
謂斷臍不利而使然者非也此由胎中母多驚悸或恣食熱毒
之物所致宜對症與藥其熱自散其臍自歸本不必敷藥恐反爲
害

小兒之病最重惟驚驚必發搐驚必窩睛驚必牙緊驚必面青驚必弓形心經熱積肝部風生肝風心火二臟交爭血亂氣壅痰涎與并百脉凝滯關竅不靈或急或慢隨其所攖急由陽盛慢屬陰凝急緣實病慢自虛成急驚之症暴疾難名種種惡候一一並呈追其發定了了神清揆厥所原調護失情晝抱當風夜多食辛辣偶觸鼓鉦跌撲嚷叫人物雷霆凡諸驚恐動魄亂經一旦疾作詎比尋恒慢驚之症睡卧靡寧乍發乍靜神思昏瞑大抵久病逐漸勢增吐瀉瘧痢消耗匪輕脾虛胃弱陽常不升虛邪火旺肝木來乘淹延困頓遂致命傾有慢脾風症更堪憎慢驚之後虛極難勝病全歸脾故慢脾家稱脾家痰飲凝聚胸膺脾家虛熱來往相仍脾困氣乏肢冷目瞪頻嘔腥臭微搐焦聲無風可

逐無驚可平。十不救一。魂魄歸冥。又有天吊、狀若祟憑頭目仰視。身熱不停爪青肢瘛是眞病情邪熱毒氣壅遏心精頗難調治醫藥速營諸驚疾發診視察聽表裡虛實尤貴詳明驚風之屬癎瘛易醒更多兼症一一細評毋輕心掉毋蹤等行方治無誤醫始稱能

驚搐由臟腑

錢乙曰因潮熱發搐在寅卯辰時者此脾用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口內生瘡涎頂頸强急此肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當補肝治心補肝地黃丸治心導赤散涼驚丸因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也不甚搐而喘

目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大便淡黃水此肺旺也當補脾治肝治心補脾益黃散治肝瀉青丸治心導赤散因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不甚搐而卧不穩身體溫目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不省此腎旺也當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚丸

驚搐癇瘛不同

婁全善曰驚搐一也而有晨夕之分表裡之異身熱力大者爲急驚身冷力小者爲慢驚仆地作聲醒時吐沫者爲癇頭目仰視者爲天吊角弓反張者爲瘛各不同也

傷風傷食發搐

錢乙曰傷風搐者因傷風得之口中熱氣出呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏小兒生來怯弱者多此病也傷食搐者因傷

食後得之身溫多唾多睡或吐不思乳食而發搐當先定搐如
羌活防風煎湯下瀉青丸搐退白餅子下之後服安神丸
驚風先見見之症
危亦材曰驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸
而生風也
楊士瀛曰驚郁大心則面紅臉赤惕惕夜啼大肝則面目俱青
大脾則面淡黃嘔吐不食凡乳兒欲發驚風者先神志不
定恍惚懶大劄眼上視左顧右盼伸手握拳悶鬱努氣情態不
眼睛窟視大腎則面黑惡叫咬乳咬牙大肺則面淡白喘息氣
乏大脾則面淡黃嘔吐不食凡乳兒欲發驚風者先神志不
如尋常皆驚風先症也
錢乙曰咬牙甚者發驚目直視面色青身反折者生驚呵欠面
青者驚風呵欠面黃者脾虛驚目赤兼青者發搐肝臟實熱手

急驚風

尋衣領亂捻物目直視者必發驚肝有風目連劄不搐有熱則目直視亦不搐得心熱者則搐肝主風風動而上行頭目屬肝風入于目上下左右如風吹不定兒不任故目連劄也若熱入于目牽其筋脉兩眥皆繫不能轉動故目直視也若得心熱則搐其子毋俱有實熱風火相搏故也虞博曰王氏云木能勝土熱動心忡而生驚也

慢驚風

錢乙曰驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也　男反右視女反左視亦皆有聲李泉曰男爲木故左視木位無聲右視金故右視金位無聲左視木位相擊則有聲女爲金位相擊亦有聲

錢乙曰、急驚本因熱生于心身熱面赤引飲口中熱氣出二便
黃赤劇則發搐蓋熱盛陽虛也利驚先主
兒熱痰客于心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不
之以除熱痰不可用巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小
聞聲及驚亦自發搐
張元素曰急驚者陽症也俱腑受病熱痰客于心肺是少陽相
火旺經云熱則生風因聞人聲而作若謂東方震卦得火氣而
發搐火本不動發得風而動當用利驚先導赤散瀉青先搐止
宜服安神先
危亦材曰驚風形症不明若言陰症則渾身又溫若作陽症則
又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫胆湯下大驚元小驚元
楊士瀛曰急驚先當定搐搐由風也風由熱也搐已定方可下

熱退驚。熱若不退。驚亦不散。　急驚、截風定搐爲要。風搐既定。次與下熱。熱去則無風。風散則不搐。

朱震亨曰、老醫常言小兒驚搐。多是熱症。若先便用驚風藥。若白附子全蝎姜蚕川烏之類。便成壞症。後有醫幼科者。只用導（此法甚是）赤散加地黃防風進三服。導去心經邪熱。其搐便止。次服寧神膏。神效。

曾氏曰、急驚之論。前代書所不載。惟曰陽癇。大概失所愛護。或抱于當風。或近于熱地。晝則食多辛辣。夜則衾蓋太厚。鬱蒸邪熱。積于心傳于肝。再受人物驚觸。或跌撲叫呼。雷聲鼓樂。鷄鳴犬吠。一切所驚。未發之時。夜卧不穩。睡中或哭或笑。咬牙咬乳。鼻頞有汗。氣喘痰喘。忽爾悶絕。目直上視。牙關緊急。口噤不開。手足搐掣。此熱甚而然。況兼面紅脉數可辨。（認急驚要法）蓋心有熱而肝有

風。二臟。乃。陽。中。之陽。心火也。肝、風也。風火、陽物也。風主乎動。火
得風則烟焰起。此五行之造化。二陽相鼓。風火相搏。肝藏魂。心
藏神。熱則。神魂易動。故發驚也。心主乎神。獨不受觸。遇有驚則
發熱。熱極。生風。故能成搐。名曰急驚。治之之法。先發表。次通心
氣。疏滌肝經。安魂退熱。驚風既除。與之去痰。免成癇疾。但不可
用大寒涼藥。恐引痰熱
李仲南曰。大要急驚用藥有次第。有輕重。開關以後。且與截風
定搐。風搐既定。卻下痰熱。理爲至當。若慮在痰熱。未有驚風只
可退熱化痰。不可妄投驚風藥。蓋藥中多用寒涼。恐引痰熱入
經絡。凡病、在熱。不可妄治痰。止當解表。病在驚。不可妄治風。蓋
驚由痰熱。只可退熱化痰而驚自止。病、在痰。不可便治驚。急須
退熱化痰、病在風。不可便治搐。蓋風由驚作。只可利驚化痰。其

風自散若驚亦有搐須用截風散至妙之道若治驚而痰不化
熱亦不退驚安得自止化其痰熱若不退風亦不散痰安得去
是知不治之治所以治之也急驚初傳風搐得定而痰熱一洩
又須急與和胃定心之劑若搐定而痰熱無多則但用輕藥消
痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒涼致成慢驚且如
痰熱不必太驟但酌處只用大黃一味足矣且急驚症
原在于去肝風降心火幼幼書以爲至要之說也

薛己曰急驚之候牙關緊急壯熱涎湧窻視反張搐搦顫動口
中氣熱頰赤唇紅脈浮洪數者此肝經血虛火動生風蓋風
則陰血愈散陰火愈熾火動則肺金愈虧肝木愈旺宜滋肝血
養脾氣

風發搐肝風心火二臟交爭風氣壅盛無可發洩故暴烈也又有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎而氣熱未可直指爲驚風恐是傷風傷寒夾食夾驚疹痘等症此卽錢氏假搐之說又各依本症施治又急驚搐搦不可把捉但扶持之否則風痰逆入經絡遂使手足拘攣或成廢疾

小兒急慢驚風古謂陰陽癇急者屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陰盛而陽虧陽動而躁疾陰靜而遲緩皆因臟腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以風生于肝痰生于脾驚出于心熱發于肝而心亦熱以驚風痰熱合爲四症搐搦掣顫反引竄視爲八候凡貶眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面眼唇青及瀉皆青髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風候也大抵肝風心火二者交爭必挾心熱而後發始于搐故熱必論虛實症先分順逆治則有後先蓋實

熱爲急驚虛熱爲慢驚慢驚當無熱其發熱者虛也急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫然又必明淺深輕重進退疾徐之機故曰熱必論虛實男搐左視左女搐右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外女握拇指入裡男引手挽左而後雙搐女引手挽右而左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐則無聲搖逆則有聲其指紋彎弓入裡者順反外者逆出入相半者難痊故曰症必分順逆陽病陰脉陰病陽脉亦爲反熱甚生痰痰甚生驚驚甚生風風甚發搐治搐先于截風治風先于利驚治驚先于豁痰治痰先于解熱其若四症俱有又當兼施並理一或有遺必生他症故曰治有先後綱領如此若分三者言之暴烈者爲急驚沉重者爲慢驚至重者肝風木之尅脾土爲慢脾風丹溪云忽驚用降火下痰先養血藥作湯下

之。慢驚當補脾。兼用硃砂安神丸。清米湯下。更于血藥中求之。
如四物四君東垣黃芪益黃散之類。世以一藥通治。甚妄。薛氏于急慢驚癇之外。又出驚風一症。其候虛惕怔忡。氣怯神散。痰涎來去。洩瀉色青。蓋驚之輕而虛者也。若驚入心則面赤夜啼。用梔子清肝湯加黃連。若入肝則面青眼窩。用柴胡清肝湯。若入脾則面黃嘔吐虛汗嗜臥。用六君子湯加柴胡山梔。若入腎則面黑齒乳咬牙。用六味地黃丸。

肺則面白喘急。用異功散加柴胡桔梗。若入小兒倉猝驟然驚搐。古曰陽癇。從熱症治。古人用涼膈散爲主方。按急驚屬陽熱病。用涼膈以清膈間無形之熱。膈上邪熱逼近膻中。絡閉則危殆矣。此宣通乃一定之法。然必詢病因。察時候治之。

幼科以痰熱風驚四治猶可說也。吾鄉有崙

科立方。鈎藤連喬木通薄荷前胡枳殼桔梗加入表散消食多
不效驗。驚爲七情內應乎肝。肝病發驚駭。木强火熾其病動
不能靜且火內寄肝胆。火病來必迅速。後世龍薈芩連必加冰
麝硝黃取其苦寒直降。鹹苦走下。辛香通裡竅之閉也。如牛黃
丸至寶丹紫雪皆可選用。凡熱邪壅塞竅神迷昏憒者倣此。鈎
藤丹皮之屬僅洩少陽胆熱。與急驚暴熱內閉之症無益。若火
熱劫爍血液。苦寒鹹寒。不中與也。宜犀角地黃湯之屬。方書
有鎮墜金石之藥。有攻風劫痰之藥。雖非常用。要不可不攷。
驚與厥。皆逆亂之象。仲景云。蛔厥都從驚恐得之。凡吐蛔腹痛
嘔惡。明是肝木犯胃。幼醫亂治。束手告斃。余宗仲景法每效。
慢驚風

錢乙曰。慢驚因大病後。或吐瀉。或只吐不瀉。變成脾胃虛損。遍

身冷。口鼻氣出亦冷。手足時瘈瘲。昏睡露睛。此無陽也。宜瓜蔞湯主之。

湯主之。

張元素曰、慢驚者。陰症也。俱臟受病。

曾氏曰、治慢驚者。攻之古書亦無所據。惟載陰癇而已。蓋慢驚屬陰。陰主靜而搐緩。故曰慢。其候皆因外感風寒。內作吐瀉。或得于大病之後。或傳誤轉之候。目慢神昏。手足偏動。口角流涎。身微溫。眼上視。或斜轉。或兩手握拳而搐。或兼兩足動掣。各辨男左女右。搐者爲順。反此爲逆。口氣冷緩。或顏門陷。此虛熱也。脉沉無力。睡則揚睛。謂兩目半開半合。此眞陽衰耗而陰邪獨盛。生寒。寒爲水。化水生肝。木爲風。化木尅脾土。胃爲脾之腑。故胃中有風。痰瘀漸生。其瘈瘲狀。兩肩微聳。兩手垂下。時復動搖不已者。名曰慢驚。宜以青州白元子蘇合丸入姜汁杵

勻。米飲調下。虛極者。加金液丹。

虞塼曰、慢驚者。因吐瀉日久。中氣大虛而得。蓋脾虛則生風。風盛則筋急。宜用溫白丸。鰲按脾虛則生風者。非風。自脾生。以脾虛則肝。木必強。乃風生于肝也。故風盛則筋急。以肝主筋故耳。觀溫白丸中姜蚕全蝎白附天麻等。皆治肝藥可見。

李梴曰、陰症慢驚。自陽症急驚傳來。纔經吐瀉便是慢驚。男子以瀉得之爲重。女子以吐得之爲重。　慢驚因吐瀉得者。宜醒脾散。加味朮附湯。虛風痰多者。宜八仙散。慢驚純陰症。宜烏蝎散。或陽症尚在。宜蟬蝎散。若有急驚方傳慢候而尚有陽症。八侯尚在。不必回陽。但與截風調胃。用蟬蝎散醒脾散。若手足冰冷。方可回陽。用硫黃附子。　瀉滑青者。宜防慢驚。蓋瀉青色乃夾驚。木尅土也。

李杲曰、小兒慢驚。或吐利不止。變成虛風搐搦者。非風也。胃氣

欲。絕也。用來復丹五粒研碎。米飲調下。卽效。

又有吐利不止而成者。有氣虛暴吐瀉而成者。有夏月脾胃伏

史演山曰、慢驚之候。蓋由急驚過用寒涼。或轉太驟。傳變成之。

熱。大吐瀉。當解暑熱。不可喘曰、固陽。

从嗽作癇者。有得之發癇不已者。有得之蟲積沖心者。惟吐瀉

積痢成虛致之。則症變甚速。凡纔經吐瀉。便是慢驚。須用溫中

扶裡。或搐來緊急。乃慢驚初傳尚有陽症。不可誤作急驚。世言

搐慢爲慢驚。非也。若泥此。往往指慢脾爲慢驚矣。凡慢驚男子

以瀉得之爲重。女子以吐得之爲重。又吐有五症。瀉有五症。各

明所因主治。古云病家怕驚不怕瀉。醫家怕瀉不怕驚。如因洩

瀉不止。且先治瀉。若更治風。則驚風愈甚。如因他症。則當循原

施治也。其慢驚候。若從急驚傳來。只可截風調胃。均平陰陽。不

可全用陽藥使陽歸陽復作急驚之症。
張渙曰、急驚以關竅不通。略用冰麝開通。定其搐搦尚可。慢驚陰重。陽虛。諸經已虛。不宜開通。又涼其臟。易作慢脾風。致不易療。
閻人槐曰。慢驚危急。如眼睛昏定。而砭。雖砭不左右顧。或窺視。四肢厥冷。汗出如流。口面黯暗。指甲黑。四體垂斃。至重。慢驚症。虛眼半開半合。似睡不睡。是也。其脈或浮或沉。身或熱或涼。或吐或瀉。或不吐不瀉。或食乳或阻乳。名半陰半陽合病。卽如傷寒半表半裡也。
葉桂曰、慢驚古稱陰癎。其治法急培脾胃。理中湯爲主方。有痰嘔。用南星白附子六君子湯。聲音不出。開竅加竹瀝姜汁。首蒲根鬱金之屬。是病皆他病致變。其因非一。有過饑禁食氣

傷。有峻藥強灌傷胃。有暴吐暴瀉脾胃兩敗。其症面青皎白。身無熱。雖熱不甚。短氣骨疎。昏倦如寐。皆溫補治之。惟嘔逆不受乳食。溫補反佐姜連。連理湯。錢氏異功散。

慢脾風

楊士瀛曰。慢脾風由慢驚後吐瀉損脾病傳已極。總歸虛處。惟脾受故曰脾風。風無可逐。驚無可療。但脾間痰涎凝滯。虛熱所盛。傳入臟間。陽氣已虧。往來其眼合者。乃脾困氣乏神迷也。若見眼合便是脾風。

脾經屬陰。次第入脾。故言慢脾風候。

慢驚眼在半開半合之間。乃知陰氣所盛。傳入臟間。陽氣已虧。

則當預作慢脾風調理。

慢脾風之候。面青頷汗。舌短頭低。眼合。不開。睡中搖頭吐舌。頻嘔腥臭。噤口咬牙。手足微搐而不收。或身冷。或身溫而四肢冷。其脉沉微。陰氣極。盛胃氣極。虛。十救

散皆可。慢脾風用藥乃不得已也。其危如燈無油。漸見昏滅。
錢氏用金液丹與青州白元子各半研勻。米飲薄荷湯下一錢。
或錢半。此截風回陽也。
張雲岐曰。小兒頭雖熱。眼珠青白而足冷。頭雖熱。或嘔吐而足冷。頭雖熱。或瀉而足冷。頭雖熱。或腹脹而足冷。已上五症作搐者。名曰慢脾風。速與補脾益眞湯加全蝎一枚。或全蝎勾音散。
譚殊聖曰。慢脾風。又名虛風。小兒或吐或瀉後。面色虛黃。因虛發熱。繼見搖頭斜視。昏困額汗。身亦黏汗。聲沉小而焦。卽是脾風之症。不必定因急慢驚傳次而至。慢脾惟吐與瀉。積與痢傳次乎。和無令速。愈之理。調

脾養胃。不可過劑也。鰲按湯氏法凡因吐瀉成虛風慢脾者。先用奪命散青州白元子末。煎如稀糊。入蜜調。控下涎後服醒脾散。

天吊 內吊附內

李梴曰。小兒瘈瘲不定。翻眼戴睛狀若神祟。頭目仰視。手足抽掣。如魚之上釣。故曰天釣。甚者爪甲亦青。此由乳母過食熱毒。心肺生熱。加以外感風邪所致。宜用九龍控涎散。鈎藤散。熱勝則保命丹。痰盛則抱龍丸。 又有驚風內釣之症。腹痛多啼。面青唇黑。傴僂反張。外腎腫。尿如米泔。眼有紅筋血點。乃寒氣壅結也。宜鈎藤膏。

閻孝忠曰。天吊亦驚風症也。但天吊發時。頭目必仰視。驚風則無此症狀。

張渙曰。小兒心膈壅滯邪熱。痰涎蘊積。不得宣通。或乳母飲酒

食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱毒氣乘于心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休痰癖病名天釣甚者爪甲皆青狀如神祟宜一字散牛黃散

薛已曰內釣者腹痛多喘唇黑囊腫傴僂反張眼尾赤此胎中受風及外驚所致若內藏抽掣作痛狂叫或泄瀉縮腳內症一作外症亦然極難調理內症服聚寶丹外症服鉤藤飲進乳食者可治若因乳母厚味宜加味清胃湯若因乳母鬱怒積熱加味逍遙散加減諸惡候

急慢驚諸惡候

曾氏曰急驚天吊之後有變作潮熱似瘧者手足逆冷蓋因病愈時不善將護風邪乘虛而入經絡所致此症所用藥品可間使苦寒之味務在消陽盛之火肺金得勝肝木自平而風邪亦

散。斯爲良法。

閻孝忠曰、驚風或洩瀉等症。有煩、渴者。皆津液內耗也。不問陰陽。宜錢氏白朮散。使滿意取足飲之。愈多愈好。

薛己曰、諸驚有目、睛瞤、動者。蓋目者肝之竅。肝胆屬風木。二經兼爲相火。肝藏血。血不足則風火內生。故目瞤動。宜用四物湯益其血。柴胡山梔清其肝陰。血內榮則虛風自息矣。有唇、口、蠕、動者。唇爲脾之華。口乃脾之竅。又陽明之脈。環唇口而交人中。是以脾胃虛者多有此症。不獨病後而已。夫脾主涎。脾虛不能收攝。多兼流涎或誤認爲痰。而祛逐之。則津液益枯。不能滋養筋脈。遂致四肢拘搐。病勢愈甚。原其治法與慢脾風相同。當大補脾胃。加升柴。切勿用青皮龍胆之類。有忽然驚搐。目直者。肝之風熱也。若肝虛生風。則目連劄而不搐。及多欠咬牙

若肝經風實則目直大叫呵欠項急頓悶若肝經有熱則目直視不轉搐搦得心熱則搐氣熱則外生氣溫則內生其症手尋衣領及亂捻物宜瀉青丸壯熱喘悶宜瀉白散　有睡中驚動者由心腎不足也蓋心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與志小兒臟腑脆弱易于驚恐恐則氣下驚則心無所依神無所歸且人之神氣寤則行于目寐則棲于腎今心腎既虛則不能攝精神故睡中驚動治宜清心安神用茯苓補心湯加茯神棗仁五味亦有驚嚇而作者因觸擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定魄用安神鎮驚丸　有驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脈也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之　有驚泄者肝屬木盛則必傳剋于脾脾土既衰則乳食不化水道不調故洩瀉色青或兼發搐者蓋青乃

肝。色搐乃肝之症也。亦有因乳母脾虛受驚。及怒動肝火而致者。法當平肝補脾。若用峻攻之藥。脾氣益虛。肝邪彌甚。甚至抽搐反張者。亦肝火熾盛。中州虧損之變症也。凡見驚症。卽宜用四君六君異功等方。加白附子定風。柴胡平肝。引經以杜漸。則必不至瀉搐而自安矣。今已見瀉吐驚搐。尚不知補脾平肝。以保命丹抱龍丸鎭驚丸等治之。其亦去生遠矣。

驚風諸變症　驚癱鶴膝　搖頭

曾氏曰。肝屬木。其動則應風。病則主驚駭。諸熱引肝風。風生痰。痰作搐。小兒驚風之際。手足動掣。當聽其自定。然後療之。免生異症。或父母見病勢可畏。從而按伏之。豈知筋者肝之合也。臨發病時。若按束其手足。則筋不舒伸。遂至經絡爲風所閉。致成驚癱。膝變爲廢人。

凡小兒心悸不常。及遍身腫痛。或手足

不隨此爲驚癱候也若治之稍遲至臂腕膝脛骨節之間流結
頑核或膝大而脛肉消脛骨露如鶴膝之狀或爲瘤爲癰此名
鶴膝候也並宜發汗爲先使腠理開通則風熱可除有溼亦去
用百解散和五苓散料倍加麻黃加姜葱煎服微汗爲度次用
防己湯獨活湯加桑寄生或黑虎丹作少丸子間服使風不生
而痰不作則易愈若爲瘤爲癰爲疼重者用黑牽牛半生半炒研
煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒溼則腫毒自消如入腑
閉而不通是風熱內蘊其右腮紅紫及右手三部脉浮而滑實
宜五和湯或當歸散其加減尤在臨機若泥一方非良醫也前
薛己曰鶴膝風者其腿漸細其膝愈粗狀如鶴之膝是以名之
此因腎經不足外邪乘之初則膝內作痛外色不變伸屈艱難

若一二月間。瘍腫色赤而作膿者。可治。腫硬色白而不作膿者。難治。初起以大防風湯爲主。而佐以益氣養榮湯。乃爲正治。婁全善曰、肝風搖頭者。乃肝血液盛。外有風熱乘之。故相引動搖而不定也。

王肯堂曰、猶憶少時聞友人孫彭山云、嘗見一小兒患驚搐。醫治之諸症悉退。獨頭搖不止。後一老醫。于常服藥中加入紫河車草。即時愈。按此草神農本經名蚤休。唐本名金線重樓。錢氏方名白甘遂。主治驚癇搖頭弄舌。乃本經正文。古人謂遵白文療病多效。不虛也。

諸驚不治症

龔信曰、眼睛翻轉。口中出血。兩足擺跳。肚腹搐動。摸體尋衣。神昏氣促。噴藥不下。通關不嚏。心中熱忽大叫者。皆急驚不治之

症也。四肢厥冷。吐瀉咳噦。面黯神慘。胃痛鴉聲。兩脇動氣。口生白瘡。髮直搖頭。眼睛不轉。涎鳴喘噎。項軟二便不禁。手足一邊牽引。皆慢驚不治之症也。

羅謙甫曰、患慢驚者。若似搐而不甚搐。似睡而精神散慢。四肢與口中氣皆冷。睡中露睛。或胃痛而啼哭。如鴉聲。此症已危。蓋脾胃虛損故也。

楊士瀛曰、慢驚欲絕之候。虛痰上攻。咽喉引氣。呼吸粗大。脉來浮數。是謂陰盛强陽錯認以爲陽氣已復。與藥下痰。痰隨藥下。氣隨痰爽。絕殊不知覆燈將絕之時。雖不下藥亦無生意矣。慢脾風身冷粘汗。直卧尸喘。噦頭軟。背面口噤。頭搖二便不禁。唇縮氣粗。痰如牽鋸之聲者。不治。慢脾風若一臟絕。即不可下藥。如眼無光。指甲黑。四肢垂縳。五體俱冷。並不須下藥。

滑伯仁曰諸驚搐而不休。休而再搐。驚叫發搐。汗出足冷。爽滿胸喉。口開目直者。皆不治。

沈氏尊生書卷二

幼科釋謎

癇痙　沈金鰲輯

仆地作聲醒吐瀺涎異于驚病命之曰癇小兒惡候癇其一焉所以然者氣骨不堅臟腑尚弱血脉未全乳哺失節客氣相干惟風驚食乃癇之原風屬外感驚屬內緣不內不外食所是專蓋此三因三癇各纏別其經絡脾與心肝然古癇症稱有五端五臟配合六畜殊看一曰馬癇馬叫連連此其所屬心火熬煎二曰羊癇羊叫綿綿此其所屬肝風作愆三曰鷄癇鷄鳴關關此其所屬肺部邪干四曰豬癇豬叫慢慢此其所屬右腎病傳五曰牛癇牛吼嘽嘽此其所屬脾土溼湮應聲而發俱各仆顛心則面赤吐囓舌尖肝則面青手足掣攣腎則面黑體直尸眠肺則面白驚跳頭旋脾

則面黃四肢緩癱古人分辨若是班班然諸癇症莫不有痰咽喉梗塞聲出多般致疾之由驚食風寒血滯心竅邪犯心官隨聲所發輕重斷聯雖似六畜詎竟確然奚分五臟附會戔戔耑通心主血脉調宣豁痰順氣治法眞詮醫者識此愼毋改遷癇爲心病痙乃肝瘨風邪所襲太陽最先肝風內煽相與招延內外風合强直難扳角弓反張發則如弦不搐不搦目惟上觀有剛有柔悉心以探大約氣虛病根內拴兼痰挾火病勢難安治痙之法其旨甚元搖頭噤口相類爲緣乘脾合胆區別其間

癇痙之分

張元素曰身軟時醒者爲癇身反張强直如弓不時醒者爲痓十無一生　痓與痙亦驚風之屬

陳藏器曰驚癇卽急驚之症但驚癇發時仆地作聲醒時吐涎

沫急慢驚俱不作聲不吐沫也

楊士瀛曰痓者手足冰冷痙者舉身强直痓痙本一病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗其症肢體强直腰身反張甚于風癇大抵不治　癇者卒然暈倒目瞪流涎神氣鬱勃四肢搐搦沉默昏憒似死似生其聲惡叫過後惺惺治法惟以驚風食三種陰陽二症別而治之如驚癇者恐怖積驚而發啼叫恍惚宜定魄丸沉香天麻湯風癇者風邪外襲先屈手指如數物乃發宜追風祛痰丸食癇者乳食時遇驚停積或成癖或大便酸臭宜紫霜丸始也身熱抽搐啼叫是爲陽癇易治宜龍腦安神丸始也身無熱手足清冷不抽掣不啼叫是爲陰癇難治宜引神歸舍丹因急驚成癇宜三癇丹因慢驚成癇宜來復丹取利胎中受驚成癇宜燒丹丸　癇病方萌耳後高骨間必有青

紋紛紛如線見之急用爪破須令血出啼叫尤得氣通更易效也。

薛已曰錢云角弓反張者由風邪客太陽經也足太陽主周身之氣其脉起于目內眥而行肝屬木主風所以風邪易侵也夫皮膚未密外邪易傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者風傳太陽也宜人參羌活湯丹溪云痙比痾爲虛小兒皮膚未密外邪易傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者風傳太陽也宜人參羌活湯丹溪云痙比痾爲虛宜帶疑補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不用兼風之藥此論實發前人所未發前輩雖云十無一生蓋未嘗有此法施于人也。

陰陽二痾

史演山曰陽痾者因感驚風三次發搐不爲去風下痰則再發。旦三次者或一月或一季一發驚搐必經過三度故曰三次非

一日三次也所謂驚風三發即爲癇者是也其候身熱自汗目上視嚼沫咬牙手足掣搐面紅紫脉皆浮數以百解散加五和湯疎解下痰用水晶丹半夏丸陰癇者因慢驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭嚼沫牙關緊閉不甚驚搐作啼面色或白或青脉沉微治以固眞湯調寬氣飲和解

王汝言曰癇小兒之惡候也蓋小兒血脉不斂氣骨不聚爲風邪所觸爲乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪目直視面目牽引口噤流涎肚腹膨脹手足掣搐似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊强直但四體柔弱發而時醒者爲癇若一身强硬終日不醒者則爲痙症不可不辨

風驚食三癇

王肯堂曰全嬰方云風癇因將養失度血氣不和或厚衣汗出

腠理開舒。風邪入之。其病在肝。主風。其症目赤面青。發搐宜琥珀散驅風。膏大青膏。有熱。四順飲退後。與利驚丸下其痰涎。驚癎因血氣盛實。臟腑生熱。或驚怖大啼。精神傷動。外邪入之。其病在心。心主驚。其症驚忽然叫聲。發搐宜琥珀散鎮心丸。有熱。四順飲利驚丸下之。不生別病。食癎其病在脾。脾納食。其症噯吐酸氣。即發搐。此症或大便酸臭。紫丸子下之。以上三症大同小異。並屬陽也。各目睛翻斜。手足潮搐。或作豬聲。發過即差。皆五臟癎

十生一死。

薛己曰、面赤目瞪。吐舌齧舌。心煩氣短。其聲如羊曰、心癎。面青兩眼上竄。手足攣掣。反折。其聲如犬曰、肝癎。面黑目振。吐沫。形如尸。其聲如豬曰、腎癎。面如枯骨。目白反視。驚跳反折。搖

頭吐沫其聲如鷄曰肺癇面痿黃目直腹滿四肢不收自利其聲如牛曰脾癇五癇逼用五色丸爲主參以各經之藥

王肯堂曰按千金敘六畜癇無五臟之分錢氏始分之而無馬牛痰所梗聲自如此其理既無所據而治法亦未有五者之分所以不必分五也

癇症治法

劉完素曰太抵血滯心竅邪氣在心積驚成癇逼行心經調平常常驚悸此皆發癇之漸即以紫霜丸導之時間量與此血脈順氣豁痰乃其要也假如小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癇之漸即以紫霜丸導之時間量與此丸減其盛氣則無驚風癇鈞之患　諸癇發不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯于心心

竅不通所致耳南星炮爲末豬胆汁調和少許啖之極效若錢氏五癇丸治五癇尤南星散以菖蒲湯調下治癇之要藥也

諸癇不治症

錢乙曰、五癇甚者死病後甚者亦死不轉眼生白障唇黑眼慢婁全善曰、小兒癇病目直無聲目覩不動目間青黑面青指黑口出涎沫如白膿口噤肚脹不喑人瞬動目間青黑面青指黑口出涎沫如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿軟不醒腹乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿軟不醒腹內虛鳴痙逆而痛吐利不止汗出悉赫熱不休卧久不寢身體反張大人脊下容一手小兒脊下容一指並不治

痙必拘攣

張潢曰、小兒痙病所受肝風怯弱致筋脉攣縮兩手拳伸展無力是名拘攣宜薏苡丹

古稱兒病驚疳最大驚得心肝疳得脾胃臟腑因由各不相蔽童稚之時病則爲疳弱冠而後病成癆瘵同出異名惟年齒計元氣虧傷氣血虛憊其原則一非有他癘曰惟小兒臟腑嬌脆飽固易傷饑亦爲害熱則熏蒸冷則凝滯故疳之來必有伊始或幼闕乳耗傷形氣此疳之根積漸生蒂或兩三歲乳食無制此疳由脾過飽反疼或喜生冷甘肥粘膩此疳由積腸胃氣閉或母自養一切無忌喜怒淫勞卽與乳吮此疳由母傳氣爲戾或因病餘妄行轉洩胃枯液亡虛熱漸熾此疳由醫言昧錯治大抵疳病緣此等弊然而古人五臟分隸俱各有症形各有方劑肝心腎肺脾總多累二十四候更宜體會莊氏家傳最爲詳備總之疳候必先貪嗜鹽酸炭米好喫泥堀口渴且饞形體憔悴潮熱腸鳴面黃腹穢漸漸

腹脹。牙乾目眛。揉鼻掃眉。脊高項細。甚至縮腮。頭皮光異。肚大筋青。髮焦毛萃。齦爛腿枯。周身疥癩。種種惡候。詎必齊逮。約略形神。實惟危殆。爲語病家。毋徒嗟嘆。失治于前。今亦無奈。

病由症治

錢乙曰、大抵疳病。當辨寒熱肥瘦。其初病者爲肥熱疳。久病者爲瘦冷疳。冷熱交作者爲冷熱疳。當分治之。

諸疳皆當補其母。假令日中發潮熱。是心虛熱也。肝爲心母。法當先補肝母。肝實而後瀉心。心得母氣。則內平而潮熱自愈矣。

危亦材曰、疳者乾也。瘦瘁少血也。皆由氣血虛憊。臟腑受傷。故有五臟疳。外有蛔疳。脊疳。腦疳。疳乾。疳渴。疳瀉。疳痢。疳腫。疳瘡。不節腸胃。積滯而得之。惟腎疳害人最速。蓋腎虛受邪。疳奔上。勞無窒疳。丁奚哺露。治之各有方。其病多因乳哺失常。肥甘

焦。故以走馬爲喻。初作口臭。次傳齒黑齦爛。熱血迸出。甚則齒脫。宜急治之。纔得全活。然齒不復生矣。

張元素曰、疳者小兒受癖。或久吐瀉。醫者妄投轉過之藥。小兒虛熱。外消肌肉。一臟虛則一臟實。致令胃虛而亡津液。內發虛熱。外消肌肉。一臟虛則一臟弱。其病目胞腫。腹脹利色無常。漸加瘦瘠。久不瘥可是腸胃有風。宜宣風散導之。後則各依本臟補其母

聖惠方曰、凡小兒疳在內。眼澁腹脹。利色無常。或如泔淀。日漸羸瘦。此候可療。若鼻下赤爛。自揉鼻。鼻頭上有瘡生。痂痛痒。漸漸流引。遠于兩耳。時時目赤。頭髮稀疎。腦皮光緊。頭大項細。肌體瘦羸。亦可治也。若唇口被蝕。齒齦五色。或盡峭黑。舌下有白瘡。上腭有竅子。口中時有臭氣。齒齦漸染欲爛。亦可治也。若下部開張。有時赤爛。痒不可忍。下利無常。亦可治也。若疳蝕肴膿。十

指皆痒自咬指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時腹脹有時下痢若急治之無不差也惟五疳有絕候皆不可治一襯着腳中指疵不覺疼二抱着手足垂軃無力三病未退遍身不煖四臟腑瀉青涎及沫不止五項筋舒展無力如此之候皆不可治也

初虞世曰有熱疳有冷疳有冷熱疳此其要也熱疳者病多在外鼻下赤爛頭痒溼痒五心煩熱掀衣氣粗渴引冷水煩躁卧地肚熱腳冷潮熱往來皆熱疳也冷疳者病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面黧又一症躁渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑洩無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可竣溫驟補故曰小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤

曾氏曰大抵疳之爲病。皆因過餐飲食。于脾家。一臟有積不治。傳之。餘臟而成五疳之疾。若脾家病去。則餘臟皆安。苟失其治。日久必有傳變。脾家病宜沉香槟榔丸烏犀丸更察虛實療之。有蟲者。史君子丸。心腹痛吐清水蟲自下者。二聖丸。諸疳症皆宜用五疳保童丸萬應丸。常服化積治疳。仍各投本臟調理之劑。寧心茯神湯調肝。芪歸湯調脾。參苓白术散補肺。補肺散補腎。調元散庶各得其宜。前症不致再作。

葉桂曰、幼兒斷乳納食。值夏月脾胃主氣易于肚膨泄瀉頭及手足心熱。形體日瘦或煩渴善食。漸成五疳積聚。當審體之強弱。佐消導清熱若淫熱內鬱蟲積腹痛。道滯駐蟲。微下之。緩調用肥兒丸之屬。

稗年五疳。猶大方書有五臟之分。是

症夏令爲多固從脾胃蓋小兒乳食雜進運化不及初斷乳後果腥雜進氣傷滯聚致熱蒸于裡肌肉消瘦腹大肢細名曰丁奚或善食或不嗜食或渴飲無度或便瀉白色久延不已多致凶危宜忌食生冷腥肥凝滯治法初用清熱和中分利次則疎補化運一定之理

五臟疳

錢乙曰肝疳亦名風疳白膜遮睛亦名筋疳瀉血而瘦　心疳亦名驚疳面黃頰赤身壯熱　脾疳亦名食疳面黃腹大食泥土又名肥疳身瘦虛黃乾而有瘡其候不一今略舉之目澁或生白膜唇赤身乾黃或黑喜卧冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水利色變易腹滿髮髩作穗頭大項細極瘦飲水　肺疳亦名氣疳氣喘口鼻生瘡　腎疳亦名急疳極瘦瘡疥亦名

骨疳喜卧冷地。

曾氏曰、肝疳生眵。髮際左臉多青。或白睛微黃。瀉利夾水。或如苔色。心疳咬牙舒舌。愛飲冷水。喜伏眠于地。脾疳愛食冷物。引飲無度。身面俱黃。髮稀作穗。頭大項小。腹脹腳弱。或瀉。肌瘦目慢。晝涼夜熱不思乳食。肺疳鼻下赤爛。手足枯細口腥。右腮皎白。腎疳兩耳內外生瘡。腳如鶴膝。頭縫不合。或未能行。牙齒生遲。其縫臭爛。傳作走馬疳之類。

王漢東曰、凡治疳。不必細分五疳。但虛則補之。熱則清之。冷則溫之。吐則治吐。利則治利。積則治積。蟲則治蟲。不出集聖丸一。要。旨。

無辜疳

聖惠方曰、小兒無辜疳。腦後有杉如彈丸。揑之反下轉是也。若

不速去。當損其命。此核初生軟而不痛。中有蟲如米粉。得熱氣漸長大。大則筋結定。定卽蟲隨血氣流散。所有停音亍母相生。侵蝕臟腑。肌肉作瘡。或大便洩膿血。致漸黃瘦。頭大髮直。手足細弱。從茲夭折。

王漢東曰、小兒無辜疾者。蓋是饑飽勞役風驚暑積。入邪所傷。久漸黃瘦。與瘦吃食不長肌肉。夜間多哭。身上或發微熱。多渴。不知饑飽。或生瘡癬是也。

疳病二十四候

莊氏家傳曰、第一候。瀉膿血。日漸瘦。是冷、熱疳。　第二候。腳細肚高。胸前骨生。愛吃泥土酸鹹。曰久通身黃。時時吐逆。下利。腹內疼痛。是脾疳。　第三候。鼻下赤爛。愛揉眼。兼血痢。是肺疳。乃因吃熱物。或病乳所傷。心肺加之。咳嗽更服涼冷藥過多。便上

熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭第四候燥痒心煩第五候毛髮稀疎鼻內生瘡是肺疳第六候頭生瘡髮稀焦黃是肝疳第七候牙變黃赤不定是腎疳第八候皮虛皺面無顏色身上乾燥疼痛口中臭氣牙根有鮮紅血是肝肺疳第九候髮焦乾鼻下生瘡是脯疳第十候齒蟲蝕肚上筋青是脾疳第十一候咬指甲毛髮作穗四肢沉重是心疳第十二候牙齦臭爛面無顏色不思食是脾疳又名口疳第十三候愛合面卧多睡如醉腹脹氣急因曾吃生肉腹內有蟲是心脾疳又名奶疳第十四候鼻內細肚高弁青筋是脾疳第十五候腳乾燥疼痛口中臭氣牙根有鮮紅血是肝肺疳第十六候非時生瘡愛吃冷水是熱候第十七候皮膚上生粟子糞中米出是脾冷疳第十八候氣滿腹脹及口乾是心胃疳

瓦。是脾胃疳。　第二十候。揉鼻揩眼咬指甲。愛飲水。是肝渴疳。

第二十一候。多寒熱愛卧不起。是骨蒸疳。　第二十二候愛飲水。是急疳。　第二十三候。不開是肝疳　第二十四候。牙根黑。昏懶開開則赤。是心疳積熱

丁奚哺露

李梴曰、丁奚者。腹大頸細黃瘦是也。丁者。手足與項極小伶仃也。奚者。腹大也。甚者尻高肉削。臍突胸滿。或生穀癥。愛吃生米土炭等物。宜十全丹布袋丸。哺露者。虛熱往來頭骨分解。反食吐蟲。煩渴嘔噦。骨瘦稜嶒露形。蓋丁奚哺露皆因脾胃久虛。形體瘦削。亦由胎稟所成。盡皆無辜。種類並難治。大體相似。宜十全丹布袋丸。

史演山曰積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒泄瀉無時作渴虛熱煩躁下利腫滿喘急皆疳候虛症古云疳虛用補是知疳之爲疾不可更利動臟腑發作之初名曰疳氣肚大脹急名曰肝虛瀉利頻併名曰疳積五心煩熱名曰疳熱吃異物名曰疳極熱發往來形體枯槁面無神采名曰疳癖手足細小項長骨露尻臀無肉腹脹臍突名曰丁奚食加嘔噦頭骨分開作渴引飲蟲從口出名曰哺露總皆疳候

五疳出蟲法

聖惠方曰五疳久而不差則腹內必有蟲肌體黃瘦下利不止宜服藥出之用聖惠乾蟾丸則疳氣漸退其蟲狀如絲髮或如馬尾多出于腹背及頭項上若蟲色黃白赤者可治青色者不

可療也。又有積疳蟲。蟲蝕脊膂。身熱羸瘦。黃色。積中生熱煩渴下利。拍背如鼓鳴。脊骨如鋸齒。或十指皆瘡。頻咬爪甲是也。宜聖惠金蟾散。

走馬疳

王好古曰。走馬疳。疳蝕之極也。乃五臟蒸熱上攻。甚即徧沿作崩沙候。牙邊肉腫爛。口內氣臭。身微潮熱。吃食不得。牙縫出鮮血。常動搖似欲脫。肉爛自漏落。治之先以淡鹽湯洗口。即下紫金散摻之。日三次。揩殺牙邊肉內蟲。如大段甚。即下秋霜散摻之。然後以天竺黃散夾地黃膏調理。即安。如不退。先落齒一兩三個。即死不治。相次面光發腮漏。見骨而殂。按曾氏治法先去積熱用當歸散合三稜散加姜棗煎服。次投蘆薈丸玉露飲。及以鹽溫水灌漱。或以軟鷄翎醮鹽水拂洗拭乾。以蜜陀僧散傅之。若經久不愈。傳于唇之上下成崩瘡症。腮穿齒落而死。

疳病不治症
危亦材曰如疳痨疳瀉面槁色天齒張骨露腹硬不食皆危篤
症也
李梴曰肝疳目帶青左脇下硬多吐沫眼頭黑者不治心疳耳
邊有青脉舌上有焦點者不治脾疳肚大青筋唇口無血色人
中平下利不止者不治肺疳嗽逆氣急瀉白水身上黑斑者不
治腎疳要吃鹹酸飲水不住小便如粉汁齒黑有瘡骨出耳乾
腦焦不治　疳渴飲水不止舌黑者死疳痨氣促者死疳瀉痢
哎逆脫肛者不治

病自輕重無不熱歟熱不一端內外久暴陰虛內燒陽盛外燥病
兼症均宜詳校而此諸熱五臟分攬額赤咬牙掌中若燎渴飲或
久骨蒸病暴液耗驚食風寒疳痰癖懶皆令發熱昏迷顛倒各有
嘔心熱可料左頰先赤便難筋掉多怒多驚肝熱如告鼻赤嗜卧
肢體惰傲遇夜益甚脾熱堪道喘嗽氣粗右頰紅盲手掐眉目肺
熱宜悼足不喜覆頸赤聲噪骨酥如蟲腎熱與較更參虛實理無
或拗熱必發煩熱必發躁症異原同俱非易療如何謂煩火入肺
竅如何謂躁火入腎節其火維何心君獨耀金燔水涸病曰以越
噁煩不安心經熱鬧噁唾不定心經風鉸皆足生驚急慢天釣發
熱煩躁往往齊到尋源溯流全憑性巧對症立方病根是掃

錢乙曰面上左腮爲肝右腮爲肺額上爲心鼻爲脾頦爲腎赤色者熱也隨症治之　身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在內也　小兒熱病六一散妙藥也寒水石散亦佳　凡熱症疎利後或和解後無虛症勿溫補熱必隨生也諸熱通用小兒清心丸

李梴曰肝熱手尋衣領亂捻物瀉青丸壯熱飲水喘悶瀉白散心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙導赤散脾熱目黃肚大怠惰嗜卧身熱飲水四肢不收瀉黃散肺熱手招眉目鼻面甘桔湯腎熱兩足不喜衣覆地黃丸

薛己曰肝熱者左頰先赤便難筋急多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚瀉青丸柴胡飲子心熱者額上先赤心煩心痛掌中熱而噦或壯熱飲水巳午時益甚導赤散瀉心湯脾熱者鼻上先

赤其熱在肌肉遇夜益甚瀉黃散肺熱者右頰先赤日西熱甚
輕則瀉白散重則地骨皮散腎熱者顴下先赤兩足熱甚骨酥
酥如蟲蝕熱盛不能起于牀夜間益盛滋腎丸
熱有虛實表裡
譚殊聖曰虛熱者因病後發熱無時一日三五次者此客熱乘
虛而作其必氣血未勻四體羸弱治宜調氣補虛其熱自退宜
自朮散或未退人參犀角散
薛己曰虛則喜熱惡寒乍涼乍溫怫鬱驚惕上盛下洩屈體而
卧睡而露睛面色青白恍惚神緩噓氣軟弱手足指冷宜惺惺
散實則仰體而卧睡不露睛面赤氣粗口熱燥渴二便難煩啼
暴叫手足指熱宜四順清涼飲加柴胡壯熱惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱
充表之虛熱也壯熱不惡風寒爲外邪所客表之實熱也壯熱

欲飲湯爲津液短少裡之虛熱也壯熱飲水爲內火煽爍裡之實熱也熱而二便調和風邪蘊結于裡而發者此表熱惺惺散加麻黃汗之熱而頰赤作渴睡眠不安四肢驚掣者此裡熱四順清涼飲

熱辨溫壯煩

王肯堂曰溫熱與壯熱相類而異一向熱不止由氣血壅實五藏生熱蒸熏于內則眠卧不安精神恍惚熏發于外則表裡俱熱煩躁喘粗甚則發驚癇也輕則火府丹金蓮飲子重則梔子仁湯若但溫溫然不甚盛是溫熱也大便臭而黃者此腹內有熱也四順飲子糞白而酸臭則挾宿食不消也紫霜充輕者時欲露出小便赤澁謂之煩熱七寶散少服重者多服節哺乳當取微利至五心熱盛煩躁不安手足伏熱煩躁喘粗甚則發驚癇也輕則火府丹金蓮飲子重則梔子仁湯若但溫溫然不甚盛是溫熱也大便臭而黃者此腹內有熱煩躁喘粗甚則發驚癇也輕則火府丹金蓮飲子重則梔子仁湯若但溫溫然不甚盛是溫熱也大便臭而黃者此腹內有王肯堂曰溫熱與壯熱相類而異一向熱不止由氣血壅實五藏生熱蒸熏于內則眠卧不安精神恍惚熏發于外則表裡俱熱煩躁喘粗甚則發驚癇也輕則火府丹金蓮飲子重則梔子仁湯若但溫溫然不甚盛是溫熱也大便臭而黃者此腹內有熱辨溫壯煩

順清涼飲

加麻黃汗之熱而頰赤作渴睡眠不安四肢驚掣者此裡熱四順清涼飲

實熱也熱而二便調和風邪蘊結于裡而發者此表熱惺惺散欲飲湯爲津液短少裡之虛熱也壯熱飲水爲內火煽爍裡之

葉石齋湯。

熱分驚積

閻孝忠曰、驚熱者。偏身發熱。或熱而不甚。面青白汗。睡夢虛驚。顛叫恍惚。有因驚而生熱者。有因熱而生驚者。錢氏導赤散涼驚丸。皆其治也。

曾氏曰、積熱者。腹中有癖而發熱也。必眼胞浮腫。面黃足冷。發熱有晝夜久暫之分

萬全曰、按鄭氏全要方所云、血熱者。已午發熱。夜則涼。指小兒血盛實而言也。蓋謂已午者。心火用事之時也。心主血。血氣行則陽氣盛。陽氣與正氣相搏。故至期而發熱。非其時者。非血熱也。宜龍胆丸地黃膏之類。海藏云。夜熱屬陰。四順飲之

發熱煩躁

類此言血熱在夜也脈經云小兒有宿食嘗暮發熱明日復止此言宿食夜熱也積熱者久熱也疳熱亦久但兼面黃吃炭土鼻下爛也三因云小兒積熱者表裡俱赤大便焦黃先以四順飲利動臟腑則熱去既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺惺散表熱乃去表熱去後又發熱者此表裡俱虛氣不歸元而陽浮于外所以發熱非熱極也只用六神散入粳米煎和其胃氣則陽收歸內身體便涼重寒熱並作者用六神散入銀白散暫時發熱者或由感冒而得也

薛己曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒寒熱往來此乃陰陽相勝也夫陰氣弁于陰則發寒陽氣弁于陽則發熱寸口脈微爲陽不足陰氣上入陽中則惡寒尺脈弱爲

陰不足陽氣下入陰中則發熱陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也又上盛則發熱下盛則發寒陽勝則乍熱陰勝則乍寒陰陽相勝虛實不調故邪氣更作而寒熱往來或乍寒乍熱也少陽胆者肝之腑界于表裡之間陰陽之氣易乘故寒熱多主肝胆經症以小柴胡湯加減治之若祇見寒熱起居如常从而不愈及大病後元氣未復悉屬陰虛生熱陽虛生寒宜八珍湯甚者十全大補湯有宿食爲病亦令寒熱保和丸食積既消而寒熱尚作者肝邪乘脾所勝不勝也異功散加柴胡山梔張漁曰寒熱症有頭疼汗出者有嘔吐不食者有憎寒而反飲水者有壯熱而反飲湯者有筋骨疼痛者有腹中鳴者鯊按此寒熱並作乃自爲一症故有一日兩三度發或五六度發者非如瘧之休止有時

也。其瘧症寒熱另詳瘧門。

骨蒸熱潮熱餘熱

曾氏曰、骨蒸熱者。身體虛羸。遇晚而發。有熱無寒。醒時渴汗方止。此乃疳病之餘毒。傳作骨蒸。或腹內有癖塊。有時微痛。用化癖丸。先治脾虛宿滯。次以柴胡飲爲治。仍忌鷄酒羊麵毒物。鰲灰湯熱。用生犀散地骨皮散七寶散金蓮飲子。殊爲妥協。存參。

有小兒熱症。用表裡藥後。其熱俱退。既乃復熱者。爲餘熱也。推其原。乃表裡俱虛而陽浮于外。陰伏于內。所以又發熱。宜用溫平藥和其裡。則體熱自除。錢氏白朮散去木香加扁豆水煎。及黃芪六一湯安神散。自然平復。

龔信曰、熱有作止。每日應時而發。謂之潮熱。如潮信之不失其期也。錢氏云、假如潮熱是一臟實一臟虛。而內發虛熱也。法當

補母而瀉本臟則愈。且如日中發潮熱者心虛也肝爲心之母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣。則內平而潮熱愈也。醫見潮熱症。先以百解散發表。次以當歸散治之。脉實者。以大柴胡和解下之。既多矣。不能禁約。而津液內竭。縱取一時之瘥。鮮不成疳病而身瘦也。曾氏法遇潮熱而嘔者。小柴胡和解下之。虛浮數者。以百解散微汗之。若潮熱而嘔者。小柴胡和解之。

王肯堂曰。餘熱者。謂寒邪未盡。傳經之遺熱也。仁齋曰。傷寒汗下後而熱又來。乃表裡俱虛。氣不歸元。陽浮于外。不可再用涼藥。蓋散熱去則寒起。古人戒之。法當和胃使陽氣收斂。其熱自止。宜參苓白朮散

煩躁原由症治

薛己曰、仲景云火入肺則煩。入腎則躁。夫心者。君火也。火旺則金燔水虧。而火獨存。故肺腎合而爲躁也。活人云、但煩熱者。虛煩也。諸虛煩熱。與傷寒相似。但不惡寒。鼻不疼。故知非傷寒也。頭不疼。脉不緊。故知非裡寒也。不可發汗攻下。當與竹葉湯。兼嘔。橘皮湯。又心虛則先煩而後渴。翕翕發熱。其脉浮緊而大是也。蓋煩者。心中煩擾。爲內熱。故屬陽躁者。肢體躁動。或倮身。爲外熱。故屬陰。外熱者。無根之火也。是以爲虛。在小兒當辨其噁煎不安是煩。噁哇不定是躁。噁煎者。心經有熱。精神恍惚。煩滿生驚。噁哇者。心經有風。煩躁驚搐也。熱甚者。黃連解毒湯。輕者。導赤散。風熱者。至寶丹。脉數而實。便閉者。神芎丸。此皆實熱之治法也。若煩而頭痛短氣。口乾咽燥。不渴者。虛也。四君加芎歸。煩不得眠。酸棗仁湯。面戴陽。目內赤。六脉洪大按之全無者。血

虛發躁當歸補血湯若躁而倮體欲入井中脉沉細或浮大按之如無者此皆陰盛發躁宜參附湯有回生之功也

傷寒

沈金鰲輯

漢張仲景創論傷寒六經分治陰陽並觀傳變不一貴探其原表則易治裏豈易痊三陽爲表裏症常兼三陰爲裏表症亦繁病機叠出不一其端合併兩感欲辨難言汗吐下法不誤則安男婦大小大概皆然然而小兒還須另看臟腑嬌嫩六氣未完外邪易犯乳食多愆一旦病至身熱如煎頭疼骨痛合眼赤顴或汗無汗發渴咽乾種種形症病則相牽謂爲傷寒寧曰否焉然而幼稚雜病多般驚疳痰食痘疹煩冤總皆發熱躁擾相干設若誤認時日遷延如大人法治之必偏百十三方立斃下咽如是死者良屬可憐如是死者醫罪曷寬審音察色詳辨爲先內傷外感務究其根脉或罔據三關細研毋俾病勢變幻纏綿再參疫癘夏熱春溫中風中溼暑暍彌漫認病毋錯方治求全庶幾是兒壽保彭籛

傷寒原由症治

張元素曰凡小兒傷寒表症有惡風惡寒者當發表食不大便無表症者可攻裏春主溫屬木身溫當發汗夏主長屬火身熱而煩躁合大發散長夏主化屬土四季月同當調其飲食秋主收屬金身涼內溫合微下冬主藏屬水身熱而惡寒是熱在外而寒在內身涼而惡熱是熱在內而寒在外熱在內者調中湯九凡小兒傷寒宜依四時陰陽升降順逆剛柔而施治氣升浮則發之收藏則下之有汗發熱惡風脈浮緩者風傷衛桂枝湯無汗自憎寒脈浮緊者寒傷榮麻黃湯有汗發熱惡風脈浮緊無汗發熱惡寒脈浮緩謂之榮衛俱傷桂枝麻黃合半湯無汗發熱不惡風寒脈沉洪者可下之更詳其厥與不厥量寒熱淺深而

治之有汗四肢厥脉沉微者名陰厥四逆湯無汗四肢厥脉沉
微者名陽厥大承氣湯如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦
宜涼藥三五服下之黃芩甘草湯黃芩白朮湯黃芩蒼朮湯黃
芩梔子湯連翹飲子小柴胡湯八正散涼膈散白虎湯五黃散
此上中下三焦藥宜選用　中暑脉虛背惡寒自汗而渴者白
虎湯身涼脉緊熱在內者急下之口燥咽乾不大便是也無汗
身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏有汗身大熱者惺惺
散桂枝湯解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用　發汗者量
四時暄暑燥溼風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之　如身
表無大熱而小便不利是有溼熱結膀胱仍用勝溼藥白朮白
茯苓之類以利小便則其熱自退　傷寒
出氣是肺不足也阿膠散面白如枯骨者死不治身熱咳嗽吐

痰者福銀丸若有表症惡風寒而嗽者惺惺散加減鼠粘子湯
身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯大吐者當下之消積丸潮熱
有時胸胸滿短氣嘔吐者桃奴丸
張雲岐曰小兒有寒邪及瘟氣時疫瘡疹身疼頭痛壯熱多眠
不語潮熱頻渴痰實咳嗽人參羌活湯時氣頭昏體熱七寶散
小兒同乳母服大人亦可用　小兒表傷寒則皮膚閉而爲熱
盛卽生風欲爲驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依
度口中氣熱當發之宜大青膏肺盛復有風冷則胸滿短氣氣
急喘嗽上氣當先散肺瀉白散後發散大青膏若止傷寒則不
胸滿　設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣熱
爲斑疹也與傷寒表症相似此胎氣始發自內之外若與傷寒
表症同治者誤也當作斑疹治之

王好古曰小兒傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和者四君子湯加細辛瓜蔞桔梗薄荷生姜或加防風川芎內有寒或遇天寒欲發散者則去瓜蔞虛汗夜啼加麥冬

楊士瀛曰小兒頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連喬飲三黃丸身體潮熱頭目昏痛心神煩躁小便赤大便秘此熱劇也調胃承氣湯頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積也雙聖丸

虞埻曰小兒傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散大青膏表症也尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散有風熱裏熱口中氣熱小便秘赤飲水不止有下症者大黃丸大熱飲水不止而善食者可微下如清便自調不可下也恐外熱逐于內而變結胸危症

張兼善曰小兒傷風兼臟者兼心則驚悸兼肺則悶亂喘息嗄氣長出氣咳嗽兼腎則畏明各隨母臟虛見故也如傷風手足冷脾臟怯也當先和脾益黃散而後發散大青膏未瘥調中亦有下症大黃丸後服溫驚丸傷風腹脹亦脾臟虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也去脹塌氣丸發散大青膏傷風吐瀉白朮散後夾驚傷寒熱極生風薄荷散龐安常曰小兒傷寒六經治例皆同但有胎熱驚熱血熱客熱寒疫熱食熱變蒸熱傷風熱痘疹熱一皆發作狀似傷寒吳綬曰小兒傷寒六經治例皆同但有胎熱驚熱血熱客熱寒疫熱、潮熱熱食熱、變蒸熱、傷風熱、痘疹熱、一皆發作。狀似傷寒。要在明辨之耳。況肌體嫩弱。血氣未定。脈法不同。藥劑輕小之別。故略具節要于後。凡小兒病。詳察面色爲先。傷寒尤宜加

意。凡食熱傷乳則吐哯奶瓣不消口中醋氣傷食則心下滿鞕噯氣作酸惡食右手氣口脉盛手心熱手背不熱肚背先熱以此別之　凡治小兒傷寒發熱必以六君子湯爲主或加神麥芽山查砂仁香附之類內實者加枳實青皮熱不解者加柴胡黃連黃芩之類如無熱香砂保和丸。

凡變者氣上蒸者體熱也輕者發熱虛驚耳冷微汗唇中白泡如珠子是也三日而愈重者寒熱脉亂腹痛啼叫不食。（不必藥。）

凡乳食卽吐哯五日愈也　凡傷寒發熱則貪睡眼澁呵欠煩鼻塞噴嚏或流清涕口中氣熱咳嗽聲重或自汗怕風人參活散其餘治例宜同傷寒表症例也要在詳辨而治之耳

凡傷寒則怕寒拘急發熱翕翕然在表晝夜不止直待汗出方解。錢氏曰男子則面黃體重女子則面赤喘急憎寒口中氣熱。

阿欠煩悶項急也。大抵傷寒則手背熱。手心不熱。左手人迎脉緊盛也。其餘六經治法。同大人傷寒。但藥宜輕小耳。亦有夾驚夾食傷寒。要在詳審。　凡痘疹發熱。錢氏曰。腮赤多躁。噴嚏。眼濇。呵欠煩悶。時發驚悸。身重發熱。耳尖鼻尖。手足梢冷。乍涼乍熱。睡中驚惕。起卧不安。乃其候也。切不可認作傷寒。發汗。蓋覆取汗。則大誤。須仔細辨之。

鰲按小兒傷寒。雖云六經治例。與大人無異。然畢竟有別。小兒多一切雜症。如前輩所云。固當一一分辨施治。即眞屬傷寒。而小兒必夾驚夾食之症爲多。故即用六經分治之劑。其中必兼去驚消食之品。方可奏功。至小兒傷寒形症。亦屬有定。如頭痛。體重。鼻塞。流涕。喘息。頰赤。眼濇。或眼赤黃。口乾。咳嗽。噴嚏。或口鼻出水。山根青色。身上寒毛起。或畏人或惡寒。兩手脉必洪數。凡此等症。皆屬傷寒之候。必明辨之。方不與一切之症相混。而可以傷寒之治爲治。而即此等症。亦不必悉具。隨見數症便是。　如吳氏詳列諸症。本與傷寒無涉。今特錄之者。所以別于傷寒。欲醫者知一切諸症之各有形症。便當各隨症治。而可不混于傷寒也。

麻疹

沈金鰲輯

麻疹浮小而有頭粒非如發斑成片一色方其初起必先發熱都似傷寒而有分別鼻流清涕咳嗽嚏洩眼胞微腫淚汪盈睫或嘔或利紅及腮頰此麻疹候汗下不必按此諸症乃爲肺疾亦屬天行傳染而得身熱之後其出最捷一擁而來六時漸沒其沒貴遲期兩三日熱清毒退乃爲上吉亦有出遲三日始滅亦有沒早頃刻無迹皆由熱毒膚厚而合恐生他變至不可測及其既退調護宜密切須忌口風寒莫及疹後變生最易咳逆毒流肺竅氣喘吸吸或成癆瘵骨蒸羸怯毒淫脾腎漸至骨立或頻瀉利青黃夾雜毒流腸胃氣虛難接或口生瘡牙齦爛黑毒深入肝奄奄命絕此四大症疹後易涉愼勿輕視致令危急按症尋求治之以法

麻疹原由症治

錢乙曰、麻疹形症亦同。有如發風癍疹瘡擁起如雲。頭色赤成斑。隨見隨沒者。有如粟米頭粒。三番俱見而不沒。至三日後方收漸沒者。然皆謂麻疹。其于欲出未出之際。當用發表藥發之則易出易愈也。有發熱至十餘日始見者。大抵主在發散肺經之熱。兼食。隨宜加對症藥。

萬全曰、疹小而碎。少陰心火也。心肺位乎上。心火旺。則肺受之。治疹專以肺爲主。觀咳嗽者。火炎則肺葉焦舉也。鼻流清涕者。鼻爲肺竅。以火爍金而液自流也。目中淚出者。肺熱症也。疹子只肝之竅在目也。或手搐眉目唇鼻及面者。肺熱症也。疹者發熱時。當察時令寒暄。以藥發之。如時大寒。以桂枝葛根湯發之。大熱。以升麻葛根

湯合人參白虎湯發之不寒不熱以荆防敗毒散發之如兼疫癘時行之氣則以人參敗毒散發之

閭人槐曰麻疹初出全類傷寒發熱咳嗽鼻塞面腫涕唾稠粘是肺經之症有未傳洩利者有一起卽兼洩利者肺與大腸表裏表裏俱病也惟不可觸冒風寒及於正蒸熱時嗽食能變輕爲重不可不愼

朱震亨曰斑駁疹毒之病是肺胃熱毒熏發于皮膚狀如蚊蚤所咬也

李梴曰疹者如粟米微紅隱隱皮膚不出作痒全無痛處麻子最小隱隱如麻子頂平軟不礙指卽有清水痘多挾疹同出麻疹多挾疹同出故曰痘疹麻疹　麻疹以升麻葛根湯加葱白紫蘇乃麻疹初起之神方或蘇葛湯亦佳或以加味敗毒散表

之汗後身涼紅痕自滅　麻不出而喘者死變成黑斑者死麻
疹後餘毒內攻循衣摸床譫語神昏者死
史演山曰疹喜清涼痘喜溫煖人皆知之然疹子初出亦須和
煖則易出所以發苗之初只要發出得盡則其毒便解　大抵
疹欲出已出之際雖寒（要法）勿用桂枝雖虛勿用參朮雖嘔而有痰
勿用半夏南星
王肯堂曰發熱六七日知是疹子卻不見出此皮膚堅厚腠理
閉密又或爲風寒襲之曾有吐利乃伏也急用托裏發表之劑
麻黃湯調柏墨散發之外用胡荽酒麻蘸遍身刮之　疹子發
熱或自汗或鼻衄者不須止之亦發散之義　疹子發熱吐利
乃火邪（要言）內逼純是熱症不可作寒論上焦多吐黃芩湯加茅根
蘆根枇杷葉下焦多利黃芩湯送香連丸中焦吐利俱多黃芩

湯多加茅根蘆根調六一散滯下加味黃芩湯調六一散　疹出之時咽喉腫痛乃毒火上熏勿作喉痺治甘桔湯加元參牛蒡連喬或射干鼠粘子湯　疹色喜通紅若淡白者心血不足養血化斑湯色太紅或紫殷者血熱也或出太暴者並宜大青湯黑者死　疹既出熱盛不減此毒壅遏大青湯解其表便澁者黃連解毒湯合白虎湯解其裏大便不通四順清涼飲疹後熱不除忽發搐不可與急驚同論用導赤散加人參麥冬送安神丸　大熱未退不可與食與傷寒同　要旨

龔信曰當以葱白湯飲之其麻自出如渴只宜葱白湯以滋其渴使毛竅中常微潤可也過三日不沒者內有實熱犀角地黃湯解之

翁仲仁曰麻疹與痘瘡始似終殊原同症異痘瘡發于五臟麻

疹出于六腑然麻疹一症先動陽分而後歸于陰經故標屬陰而本屬陽其熱也氣與血分相搏故血多虛耗其治也先發散行氣而後滋陰補血凡動氣燥悍之藥皆不可下也鰲按翁氏此說已舉麻疹之原由症治包括詳盡名論也

凡看麻疹之法多于耳後頂上腰眼先見其頂大而不長其形小而勻淨既出色紫紅乾燥暗晦乃火盛毒熾宜大一散解之四物湯換生地加柴芩翹葛牛蒡紅花等滋陰涼血而熱似除所謂養陰退陽之義也如疹出見風早沒不清爽者宜消毒飲加發散之藥雖不復出亦尋愈矣

葉桂曰疹屬陽腑經邪初起必從表治症見頭痛喘咳氣粗嘔逆一二日即發者輕三五日者重陽病七日外隱伏不透邪反內攻喘不止必腹痛脹秘悶危矣治宜苦辛清熱涼膈去硝黃方書謂足陽明胃疹如雲佈密或大顆如痘但無根盤又謂

手太陰肺。疹但有點粒。無片片者。用辛散解肌。冬月無汗。壯熱喘急。用麻杏。如華蓋散。三拗湯。夏月無汗。用辛涼解肌。葛根前胡薄荷防風香茹牛蒡枳殼桔梗木通之屬。古人以表邪口渴。即加葛根。以其升胃津。熱甚煩渴。用石膏辛涼解肌。無汗忌用。連喬辛涼。翹出眾草。能升能清。最利幼科。治小兒六經諸熱。疹宜通泄。泄瀉爲順。下痢五色者。亦無妨。惟二便不利。最多凶症。治法大忌止瀉。痧本六氣客邪。風寒暑溼。必從火化。痧既外發。世人皆云邪透。孰謂出沒之際。升必有降。勝必有復。常有痧外發。身熱不除。致咽啞齦腐。喘急腹脹。下痢不食。煩躁昏沉。竟以告斃者。皆屬裏症。不清致變。須分三焦受邪孰多。或兼別病累瘁。須細體認。上焦藥用辛涼。中焦苦辛寒。下焦鹹寒。春令發痧。從風溫。夏季從暑風。暑必兼溼。秋令從熱爍燥

氣。冬月從風寒。痧疳溼盛熱蒸口舌咽喉疳蝕若不速治有穿腮破頰咽閉喘促告斃矣治之宜早外治另用耑方若湯藥方法必輕淡能解上病或清散亦可

痧痢乃熱毒內陷與傷寒協熱邪盡則痢止同法忌升提忌補濇輕則分利宣通重則宜用苦寒解毒

鰲按方書名麻疹者北人單謂之疹吳人謂之痧子浙人謂之瘖子名各不同其實則一也痧疹雖由肺胃間毒畢竟是肺經所發之疾故方書言手太陰肺疹但有點粒無片片者今時所患皆是點粒分明者也至方書言足陽明胃疹如雲佈密恐是斑毒故一片如雲密佈且斑毒之發亦由陽明鬱熱毒蒸所致痧不發于胃而耑發于肺也即使痧毒內陷或亦入胃入脾入肝入腎各有變症然此是痧發不透後其毒轉注之臟腑經絡非初發之經也方書謂胃疹者古人每斑疹二字連用其謂胃疹當即是斑其謂肺疹乃是痧子即麻疹也

葉氏以痧宜通洩洩瀉爲順云云夫痧固宜通泄然太洩痢又恐毒之下注者未盡而毒之外發者復因下洩而多阻滯以致毒陷益深瀉痢愈不止正氣遂日益虛此際正難措手然葉氏忌升提忌補澁二語又爲痧痢金科玉律切不可犯則于此而斟酌求治惟以解毒爲主兼散腸間鬱積而肺大腸表裏腸間之鬱積清肺經之毒自解卻不可犯胃氣以絕生氣

瘧疾寒熱往來附

夏傷于暑。秋必痎瘧。又云瘧病。必由風着。內經之言。宜爲細度。夏月盛暑。腠理開發。汗出當風。浴後磅礴。衛氣不守。邪氣內薄。舍于膜原。應時而劇。暑日得風。根因是托。然而小兒多由食。搏脾弱胃衰。乳食停積。諸邪悉附。與正相角。壅遏陰陽。二氣交錯。陰盛陽虛。先寒而慄。陽勝陰虛。先熱如烙。邪與衛併。故曰揮霍。邪深入裏。故間日作。瘧必有痰停滯胸膈。瘧必有溼痰手腳癉。牝溫寒。鬼瘴名各爲。症不同。而可約略。冷起毫毛。伸欠蕭索。戰慄鼓頷。頭痛如鑿。及其熱時。內外火鑠。渴欲引飲。身疼筋縛。或先寒侵。或先熱灼。陰陽偏勝。如酬如酢。故以往來。寒熱如約。丹溪有言。最爲精確。無汗、汗發、汗散、邪爲主。有汗、止汗、固正、宜速。務期邪盡。陰陽和協。無奈世醫。不知用藥。小柴胡湯。以爲定法。不知前賢。再四叮嚀。早服柴

胡淹纏難卻邪由外散正無內削用和陰陽纔可下噱莫慢輕疎切宜斟酌久瘧不愈瘧母內托胸脇之間可按可摸治應消散毋俾正弱

瘧疾原由症治

曾氏曰、內經瘧論云、夏傷于暑秋必痎瘧謂腠理開而汗出遇風或得于澡浴水氣舍于皮膚間因衞氣不守邪氣幷居其疾始作仲欠寒慄腰背俱痛骨節煩疼寒生則內外皆熱頭疼而渴乃陰陽二氣交爭虛實更作而然陰氣獨盛則陽虛故先寒戰慄腰背頭項骨節皆痛陽氣獨勝則陰虛故先熱發時不嗜食喜嘔頭疼腰痛小便不利陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰虛則內外皆熱此外感六淫或內傷七情蘊積痰飲病氣與衞氣併居故病日作衞氣晝行于陽夜行于陰得陽而外出得陰而

內薄五臟病氣深入不能與衛氣俱出則間日而作當衛氣
至病氣所在則發在陽則熱在陰則寒俟陰陽各衰衛氣與病
氣相離則病休陰陽相搏衛氣與病氣相集則復作各隨其衛
氣之所在與所中邪氣相合而然也先寒後熱者先傷寒而後
傷風名寒瘧先熱後寒者先傷風而後傷寒名瘧但熱不寒
者名癉瘧身重寒熱骨節痛腹脹滿自汗善嘔名溼瘧但寒不
熱者名牝瘧其病不一故治當隨其陰陽虛實汗吐下溫對症
施治以平爲期然必因正氣虛感受邪氣留而不去其病爲實
自表傳裏先汗後下古今不易故治瘧必須先表用百解散加
姜葱次小柴胡加桂枝姜棗以和解表裏之邪自然作效若表
裏實用當歸散五和湯烏犀丸下之勻氣散止補後以藿香飲
加草果良姜姜棗正胃氣去寒邪則自平復如表解後寒熱往

來。以二仙飲截之。寒熱既除。用平胃散鹽湯空心調服。溫胃健脾。則外邪自清。此爲明論。有寒多熱少。經久不愈。致脾胃弱。飲食少。神色變。二姜丸及清脾湯爲治。

婁全善曰。治小兒瘧疾。多與大人同法。以出汗爲瘥。宜桂枝柴胡參芩輩。其病食病痰。以意消息之。小兒多由食積得之。必兼消藥爲先也。

葉桂曰。瘧因暑發居多。方書雖有痰食寒熱瘴癘之互異。幼穉之瘧。都因脾胃受病。然氣怯神弱。初病驚癇厥逆爲多。在夏秋之時。斷不可認爲驚癇。大方瘧症。須分十二經。與欬症相等。若幼醫庸俗。但以小柴胡去參。或香茹葛根之屬。不知柴胡動肝。陰葛根竭胃汁。致變屢矣。幼科純陽。暑爲熱氣。症必熱多煩渴。邪自肺受者。桂枝白虎湯。二進必愈。其有冷食不運。有足太陰

脾病見症。初用正氣或用辛溫如草果生姜半夏之屬方書謂草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之熱瘧久色奪唇白汗多餒弱。必用四獸飲。陰虛內熱。必用鼈甲首烏知母。便溏病暑風溼熱瘧藥兼脫痞悶用桔梗枳殼杏仁厚朴二味喘最宜瓜蔞皮山梔香豉頭痛宜辛涼輕劑。連翹薄荷赤芍羚羊角蔓荊子滑石。此方淡滲清上。重則用石膏口渴用花粉。煩渴用竹葉石膏湯。熱甚則用芩連山梔。夏季身痛屬溼。羌防辛溫宜忌。宜用木防已蚕沙。暑熱邪傷。初在氣分。日久不解。漸入血分。反渴不多飲。唇舌絳赤。芩連膏如不應。必用血藥。諒佐清氣熱一味足矣。輕發汗淡竹葉。若熱久痞結。瀉心湯選用。又夏月熱久入血。最多畜則用丹皮。汗多忌青蒿犀角竹葉心元參鮮生地細生地木通能亦

血一症。詑語昏狂。看法以小便清長者。大便必黑爲是。桃仁承氣湯爲要藥。幼稚瘧久。面腫腹膨。洩瀉不欲食。或囊腫。或跗腫。必用東垣益氣以升陽。倘脾陽消憊。前方不應。用理中湯或錢氏益黃散得效二三日。須投五苓散。一二日再與異功參苓白朮散之類。必全好。

徐忠可註金匱有云。幼兒未進穀食者。患瘧多用烏梅以酸泄木安土之意。用常山草果。乃劫其太陰之藥。以常山極走。使二邪不相併之謂。用人參生姜曰露姜飲一以固元。一以散邪。取通神明去穢惡之氣。總之久瘧氣餒。凡壯胆氣。皆可止瘧。未必眞有瘧鬼。又瘧邪既久。深入血分。或結瘧母。癥甲煎丸。設用煎方。活寒熱往來可矣。

巢元方曰風邪外客于皮膚而爽飲內漬于臟腑致令血
和陰陽更相乘尅陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣爲邪所
正相干陰陽交爭時發時止則寒熱更相往來也
人翕翕如熱淅淅如寒無有時度支節如解手足酸疼頭目昏
吳綬曰凡寒熱往來是無定期瘧也全所云若其
暈此由營衛虛弱外爲風邪相乘搏于陽則發熱搏于陰則發
寒久不治成癆宜荊芥散又曰如苦寒熱如瘧不以時度腸滿
膨脝起則頭暈大便不通或時腹痛胸膈痞悶此由宿穀停留
不化結于腸間氣道不舒陰陽交亂宜備急丸
起居如常久而不愈乃大病後元氣未復惡屬陰虛生熱陽虛
生寒宜八珍湯食積爲病亦令寒熱保和丸消之兼嘔吐泄瀉
六君子湯厥冷飲熱人參理中丸作湯不止七味白朮散食積

消而寒熱尚作者。肝邪乘脾也。異功散加梔柴。然此皆非瘧症也。切不可混。

龐安常曰。小兒食積。寒熱如瘧。渴瀉氣急。要合地卧。此候當先取下積。只用平胃散。次常服進食丸。

沈氏尊生書卷三

幼科釋謎

黃疸

沈金鰲輯

脾土色黃病則成疸其病緣何先因虛損復感溼熱風寒外犍停鬱腠理浸淫肢脘內熱蒸蒸外熏色變此其大凡脉必濡緩傷寒無汗瘀熱不散身必發黃尿濇腹滿暑邪挾溼經絡俱燀淪膚浹髓臟氣莫展黃如橘色筋骨痿輭或由疳瀉肌肉消剗肚大筋青皮黃髮捲胎疸之疾得于初產生下卽黃遍身梔染原雖不同陰陽必辨陽黃體熱二便鞕短脾與心搏胸膈必懣先利小便下法莫遠陰黃肢冷清便滋泫大便清黃腹痛而喘面目爪齒黃色闇慘脾虛失制腎水脹衍約此二端疸病斯顯再詳兼症身疼體懶强直其髆枯澁其眼溺如屋漏浮腫若繭或渴或嘔或寒或煖按

症求之有此款款淡黃兼白乃胃怯懦或胃不和其病稍淺

疸病原由症治

錢乙曰諸黃皆相似如身皮目皆黃者黃病也身痛髓背強大小便澁一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴者難治此黃疸也其症多患于大病後別有一症不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土而渴者脾疸也又有自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱也深黃者是也若淡黃兼白者胃怯胃不和也難知云色如熏黃乃溼病也則一身盡痛若色如橘子黃者黃病也身不痛有乾黃者燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲宜梔子柏皮湯有溼黃者脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲宜大茵陳湯如大便自利而黃者小柴胡陳梔子黃連三物湯或往來寒熱一身盡黃者

加梔子湯。

曾氏曰、黃病不可一概論標本不同症治亦異。乃脾胃氣虛感受溼熱。鬱于腠理。淫于皮膚。蘊積成黃。熏發于外。故有是症。或脾胃虛弱。內因癥癖攻之。而成然。疳瀉亦主皮黃。肚大髮直。筋青。肌肉消瘦。外無色澤。身必發黃。治法感溼熱者。以吸咀五苓散加麻黃姜汗之。即愈。或茵陳蒿湯調下五苓散亦可。若得于疳癖者。形如黃土。宜醒脾。或化癖丸。

羅謙甫曰。予治一小兒。季夏身體蒸熱。胸膈煩滿。皮膚如橘黃。眼白亦黃。筋骨瘦弱。不能行立。此由熱加以溼而蒸搏于經絡。入于骨髓。使臟氣不生。故脾遂乘心。溼熱相合而成此疾也。蓋心火實則身體蒸熱。胸膈煩滿。脾溼勝則皮膚如橘色。有餘之氣已所勝而侮所不勝。是腎肝受邪。而筋骨痿弱。不能行

立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言溼熱成痿是也所謂子能令母實實則瀉其子也蓋脾土退其本位腎水得復心火自平矣加減瀉黃散

疸分陰陽

張元素曰陽黃者大小便赤澁身熱是脾土與心火相搏爲陽病法當先利小便後下大便陰黃者清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制腎水宜益黃散下史君子丸

水腫 諸腫脹附

沈金鰲輯

少陰腎水太陰肺金金本生水水融兩陰腎邪相傳膀胱是侵逆于脾土反被水沉脾虛失制隨水所淫脾既受尅不能生心水激心火與肺相臨肺又受害化原失憑以致水溢腎邪縱橫脾易受溼水乃與幷脾主四肢流走駸駸滲于脉絡皮膚是尋血亦化水停積日深乃作水腫腹飽筋青手足面目悉屬水停或氣喘逆或口呻吟或發煩渴或寒熱乘或小便秘溺出如針胸滿脇脹減食失音背平臍凸命乃將傾須潔淨府亦開鬼門去菀陳莝內經是箴當須識此急早治懲根由症狀仔細詳明嗟嗟水腫病豈尋恆時俗謬妄河白是稱遍攷方書古無此名

水腫原由症治

曾氏曰原腫病之由標本之疾腎主元氣天一之水生焉肺主

沖化地四之金屬焉腎爲本而肺爲標皆至陰以積水其爲病也腎者胃之關鍵關鍵不利則樞機不轉水乃不行滲于脉絡皮膚爲浮腫當推究內外所因爲治兒大者憑脉以明虛實古方有十種論症短氣不得卧爲心水雨脇緊痛爲肝水大便鴨溏爲肺水四肢苦重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲胆水午虛午實爲大腸水腹急肢瘦爲膀胱水小便閉澁爲胃水少腹急滿爲小腸水然脉浮爲風爲虛沉伏爲水病沉則脉絡虛蓋脾屬土喜燥而惡溼常感溼氣溼又喜傷脾血化爲水水土敗不能制水則停畜不行留滯皮膚故作浮腫初得病時見眼胞早晨浮突午後稍消急以羌活散疏解次醒脾散及間投南星腹皮散其脾冷困則燥以草果縮砂之類然此症夏秋

冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢兼肝木旺而脾土受尅不能受水所以難療須徐徐調理取效若脾熱而困人投燥熱藥雖不能生土亦可勝水奈殺之太過土不敵

敗手足背腫臍凸皆脾之外候有未經發表遽用下藥一瀉腫火則曰瀉之力不知脾愈瀉而愈虛不旬月其腫如初此世人消乃已瀉腫爲最不求十補而一瀉之論法當隨四時用藥解表通利小便春以七寶丹加麻黃桂枝赤苓姜葱夏以五苓散加麻黃苡仁車前子姜葱秋以清肺飲加羌活細辛商陸姜葱冬以沖和飲加白朮生川烏赤小豆姜葱次投滋潤救脾導水湯劑滲洩之乃爲良法更以香陸胃苓九頓服自安有初中便覺瘀嗽氣喘小水不通正屬肺腎所主先服解表散次投三白

散。凡得此病非一朝夕之故。不可求速效以致虛脫。如愈後、再感外風。風滿面虛浮。用排風散和解。仍服救脾湯劑。免致反覆。劉氏曰、治腫非易。補養尤難。忌食物。切須詳審。有久不消者。下之即效。

滑川先生曰、腫脹二症。此由虛中有積。久患失治。日漸傳變。症候多端。隨輕重察盛衰。審表裏。以主治。先固其本。後治其標。斯無患矣。

受溼腫。食毒氣腫。傷寒虛氣入腹腫。腫瀉痢虛氣入腹腫。此四種所患病不相同。皆由虛得之。受溼謂脾胃受溼。冷氣浮四肢頭面皆腫。食毒氣腫由脾胃傷冷。積毒氣停留胃腕。致氣入腹蠱。腫急傷寒由下之太早。乘虛入腹作腫。瀉痢胃氣補。臟充實。方可去。腫。先服四味理中湯。減半乾姜加白朮桑皮。傷寒虛腫加枳實。

作喘加淡豉瀉痢虛脹宜正氣調胃胃氣既壯救生丹利之腫即退再用觀音散調補臟腑即平復矣

王履曰氣虛腫亦名氣蠱血虛腫亦名血蠱小兒所患腫脹一門最爲要急前人少有究竟然腫脹之作皆曰榮衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正相亂以致四肢浮盛肚腹膨滿多由食毒得之飲食得之癥傷得之饑飽得之積久不化故成斯病病由虛得或妄亂通下因虛致虛根不得去疾加益甚是謂壞症危症先投榮衛飲子次服分氣飲子以散滯斯病去矣

葉桂曰夏季溼熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運溼着內蘊爲熱漸至浮腫腹脹小水不利治之非法水溼久積逆行犯肺必生咳嗽喘促甚則坐不得卧俯不能仰危期速矣大凡喘必生

脹。脹必生喘。方書以先喘。後脹者。治在肺。先脹。後喘者。治在脾。亦定論也。金匱有風水。皮水。石水。正水。黃汗。以分表裏之治。河間有三焦分消。子和有磨積逐水。皆有奧義。學者不可不潛心體認。難以概述。閱近代世俗論。水溼喘脹之症。以內經開鬼門取汗爲表治。分利小便、潔淨府、爲裏治。經旨病能篇。謂諸溼腫滿。皆屬于脾。以健脾燥溼爲穩治。治之不效。技窮束手矣。不知凡病皆本乎陰陽。通表利小便。乃宣經氣。利腑氣。是陽病治法。暖水臟。溫脾腎。補後方以駈水。是陰病治法。治肺以輕開上。治脾必佐溫通。若陰陽表裏乘違。臟眞日漓。陰陽不運。亦必作脹。治以通陽。乃可奏績。如局方禹餘糧丸。甚至三焦交阻。必用分消。腸胃窒塞。必用下奪。然不得與傷寒實熱同例。擅投硝黃枳朴。擾動陰血。若太陰脾臟飲溼阻氣。溫之補之不應。欲用下法。

少少甘遂爲丸可也其治實症選用方法備採葶藶大棗湯牡蠣澤瀉散甘遂半夏湯子和桂苓湯中滿分消飲五子五皮湯茯苓防已湯小青龍湯木防已湯瀉白散五苓散控涎丹禹功丸大順散越婢湯徐姓小兒單脹數月服肥兒丸萬安丸磨積丹綠礬丸鷄肫藥俱不效余謂氣分不效宜治血絡所謂絡瘀則脹也用歸鬚桃仁延胡山甲蜣螂䗪蟲靈脂山查之類爲丸十日全愈

腹痛腹脹

沈金鰲輯

腹痛腹脹病屬中宮臟氣相擊邪正交攻挾寒挾熱症見不同日食日積壅滯于胸有虛有實其故難窮二病之因各以類從先詳腹痛勢若攻衝脾虛氣冷胃虛嘔恍虛熱面黃實熱面紅食積便臭蠱積沫瀜肝木乘脾兩脇恫恫寒水侮土瀉利重重脾氣下陷重墜如鐘脾來尅腎少腹如舂盤腸內吊腰曲猶弓啼乾唇黑由于肝風亦有鎖肚硬如石碹撮口面青初生屯蒙此二症者患之實凶以上種種務通其中次詳腹脹痞氣塡衷悶亂喘滿下則倥侗不喘虛痞誤下疲癃土虛及肺金氣銷鎔目胞腮腫內及喉嚨或緣病後脉細朦朧或緣痰食膈滿肚壅叶平聲或緣熱結壯熱若烘或緣寒積肢冷涎汛丁奚哺露無辜病叢頭小腹大黃瘦其躬乃脹之重病氣日充審其根原毋俾病隆爲補爲瀉當可病鬆莫

作等閒。用拯幼童。

腹痛原由症治

錢乙曰、小兒積痛食痛虛痛蟲痛。大同小異。惟蟲痛當口淡而沫自出。治之隨其症用藥。蟲與痾相似。小兒本怯。故胃虛冷則蟲動而心痛。與痾略相似。但目不斜手不搐也。宜安蟲散。又有胃受極寒極熱。亦令蟲病。或微痛。或不痛。遽然吐蟲。法當安蟲爲主。若因治蟲反傷胃氣。固不可。因寒而動者。理中湯加烏梅。因熱而動者。五苓散加烏梅。川椒。因熱蟲痛。小兒多有之。其症心腹痛叫哭。倒身撲手。嘔吐清水涎沫。面青黃時作時止。口唇紫黑色者是。蚘厥也。宜安蟲散。

謂殊聖曰、小兒腹痛多因邪正交攻。與臟氣相擊而作。桔梗枳

売湯加青皮陳皮木香當歸爲妙。挾熱而痛。煩手足心熱。四順清涼飲加青皮枳売。挾冷而痛者。必面色或白或青。手足冷。七氣湯加桂調蘇合丸。冷甚變症。則面黯。唇口俱黑。爪甲皆青矣。若內吊痛。則鉤藤散。其餘則芍藥甘草湯皆要藥也。

盤腸內吊痛

盤腸內吊痛。面皎白不思食。爲曲腰乾哭無淚者。爲盤腸內吊痛。面赤唇焦便黃。爲熱痛。面黃胃冷痛。面青白。大便酸臭。爲積痛。口瘃而沫自出。爲蟲痛。然皆不如內吊之甚也。

吳綬曰。小兒腹痛曲腰乾啼。面青白。唇黑胅冷。大便色青不實。名盤腸內吊痛。急煎蔥湯淋洗其腹。揉蔥白熨臍腹間良久。尿自出。痛立止。續用乳香散。

鎖肚痛

曾氏曰、有鎖肚痛者。嬰兒一月後。忽乳不下咽。肚硬如石。赤如硃。撮口而哭。面青唇黑。手足口氣俱冷。是也。始因斷臍帶不緊。爲冷風所乘。症甚危急。以白芍藥湯烏梅散投之。久則難治。更參攷臍風症。

腹脹原由症治

錢乙曰、腹脹。由脾胃氣虛攻作也。實者、悶亂喘滿。可下之。用紫霜丸。不喘者。虛也。不可下。誤下則脾虛氣上附肺而行。肺與脾子母皆虛。肺主目胞腮之類。脾主四肢。母氣虛甚。卽目胞腮腫。四肢黃色。宜塌氣丸漸消之。未愈。漸加丸數。不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之。何以然。脾虛氣未出。故雖腹脹而不喘。可以溫散藥治之。使上下分消其氣。則愈。若氣已出附肺而

行。卽脾胃內弱。每生虛氣。入於四肢面目矣。小兒易爲虛實脾虛則不受寒。溫服寒則生冷。服溫則生熱。當識此勿誤也。胃火盛病。或引飲不止。脾虛不能勝腎隨肺氣上行于四肢面目。若水狀。腎氣漫淫于肺。卽大喘也。宜塌氣。久病愈面未紅者。虛衰未復故也。治小兒虛腹脹。先服塌氣。久不愈。腹中有食積結糞。小便黃。時微喘。脉伏而實。時飲水。能食者。下之。蓋脾初虛而後有積。所治宜先補脾。然後下之。後又補脾。卽愈也。

不可補肺。恐生虛喘。

張雲岐曰。小兒熱結于內。腹脹壯熱。大便赤黃。躁悶煩亂者。宜用瀉青丸。

腹脹有虛實

張元素曰。凡久病吐瀉後。虛。則脉微細。若色淡黃。目胞腮虛腫。

手足冷。先塌氣丸。後異功散和中丸益黃散四君之類。用諸溫藥養其元氣。實則脉洪實。不因吐瀉痢下後腹脹而喘急悶亂更有熱有痰有食而腹脹者。白餅子大黃丸解毒丸下之。兼須認二便。如都不通。先利小便。

李杲曰、大約寒脹多熱脹少。皆主于脾。

龐安常曰、東垣治脹不犯上下二焦。用素問中滿者瀉之于內之法。實者分氣消積。虛者升陽滋血。治者當師其意而活用之。不可排擊。宜中滿分消丸。消痞丸。丹腹脹方。升陽滋血湯。

痞結積癖

沈金鰲輯

痞義爲閉結則實哉始由痰飲熱蘊如煨耑留腹脇似盆似杯營衛氣塞不能往來非心下痞易于宣開故時脹滿按則哭哀飲食減少寒熱相催原其所由脾臟虛羸久必土敗變難預推當須養正勿但結摧然痞雖結未成硬胚積且致癖堅實難鎚積因乳哺節度多乖膩滯生冷停聚難裁風寒外襲溼熱中懷老痰堅結或係血衃皆能成積腹內爲災始同鷄卵逐漸如胎腹脹且痛足冷面灰亦由脾病虛實兼該實則宜攻虛則宜培未可概論未可狐猜漢東王氏論積最佳可治不治分辨無差虛中之積症更難諧因驚傷食吐瀉與偕其脾愈弱其病難排取轉不着積反隱埋驚疳之候最易根荄嬰兒乳積面色莓苔口瘡吐哯腹中塊轠皆由乳後偏卧不迴乳滯脇下結塊而隤痃癖一症更屬奇侅蘊結在

腹。成塊如梅。時常叫痛。骨瘦如柴。左脇下痛。痞氣相偎。俗名龜痨。左右脇又。此亦脾病。冷氣沉霾。致成是疾。寒熱侵骸。至于傷暑。秋必病痎。寒熱來往。脾胃氣衰。血膜包水。瘧癖可摩。可揩。詳核方治。愼保嬰孩。

癖結

癖結原由症治既久。飲食減少。脾氣必虛。久而不愈。必先以固胃。如蛙。古人成法。可正則積自除。若欲直攻其結。不惟不能善消。抑亦薛己曰。癖結參差類以治之。

氣爲主。使養正則積自除。若欲直攻其結。不惟不能善消。抑亦損其脾土。脾土既虧。必變症百出。當詳參差類以治之。

陳藏器曰。癖者。塞也。熱氣蘊于胸膈之內。留飲聚于腹脇之內。于是營衛不能流行。臟腑不能宣通。由脹滿而致癖結。勢使然耳。此熱實之症也。時或發爲壯熱。宜聖惠破結散。此方治小兒癖結。雖服湯藥時暫得利。而滯實不消。心下堅脹。按之卽哭。內

有伏熱併成。宜利大便。破結散氣。

積癖原由症治

李仲南曰、積症有傷乳傷食而身體熱者。惟肚熱爲甚。耳夜間有熱者。傷積之明驗也。

錢乙曰、小兒病癖。由乳食不消。伏在腹中。乍涼乍熱。飲水不止。或喘而嗽。與潮食相類。若不早治。必成癆瘵。寒熱飲水。脇下有癥癖。故令兒不食。脾胃形硬痛。法當用藥漸消漸磨之。以其有癖故引飲也。

虛而發熱。故引飲也。

曾氏曰、嬰孩積症。皆乳哺不節。過餐生冷堅硬之物。脾胃不能剋化。積停中脘。外爲風寒所襲。或夜卧失蓋。致頭疼面黃身熱。眼胞微腫。腹痛膨脹。足冷肚熱。喜睡神昏。飲食不思。或嘔或噦。口噫酸氣。大便酸臭。此爲陳積所傷。如覺一二日。先用百傷飲

發表。次當歸散。蕩動積滯。方下烏犀丸六聖丸。重與寬利。後用
勻氣散調補。

陳無擇曰、小兒五積爲臟氣不行。畜積一處不動。故曰積如伏
梁息賁奔豚痞氣肥氣是也。六聚謂六腑之氣留聚也。腑屬陽。
陽氣流轉不停。故其聚不定一處。發而腹痛。積聚之候。皆面黃
瘦劣。嗞唾不生肌肉。髮立或肌體浮腫。腹急多困。多爲水氣。
凡虛中有積者。因傷食而瀉。又吐如此、漸處其病未差。故曰虛
積也。又虛中之積。有積而頻頻戢轉。卻取轉不着。致其積尚伏。
故亦曰虛中積。若驚積取下則屎青。食積屎成塊子。凡疳中虛
積者。因疳病轉瀉。虛而疳不退。故虛中兼所取下糞裏白色也。
龔信曰、癖堀者。僻于兩脇。痞結者。痞于中脘。皆乳哺失節。飲食
停滯。邪氣相搏而成也。

諸積分辨

王肯堂曰乳積者其候但是吐下乳來有酸臭氣因啼叫未已遽與乳吃停滯不化而得兼面青黃發熱作渴多睡口瘡漸漸黃瘦腹內結塊不散茅先生用丁香散開胃後用牛黃丸取下乳積常服健脾散即愈食過飽飽後即睡而得茅先生用牛黃丸取積後用勻氣散常服萬靈丸即愈氣積者面色黃白不進食腹痛啼嘔因飲食調理驚積者時時洩清水如米泔是受傷而復氣散調理常服萬靈丸勻氣散醒脾散相來調理驚積者時時洩清水如米泔是受傷而復叫利如蠍潮此因營衛不和日久而得茅先生用萬靈丸勻氣有積煩悶啾唧常以生嗔先解散用百解散後理積烏犀丸三散醒脾散相來調理驚積者時時洩清水如米泔是受傷而復稜散醒脾散寧驚化積壯氣和胃仍節冷乳自愈熱積者大便不通風毒瘡癤喉閉疼腮咽中涎響茅先生用奪命散吐下熱

涎。後用匀氣散醒脾散調理常服鎮心丸天竺黃散愈。

積痛

錢乙曰、積痛。口中氣溫。面色黃白。目無睛光。或白睛多。及多睡。畏食。或大便酸臭者。當磨積而痛自除。宜下積丸。甚者白餅子下之。後和胃氣用白朮散。又有食積肚痛。有熱者。芍藥甘草湯加葛根。吐者加生薑半夏。或加枳實亦效。其有積而潮熱寒熱心腹脹滿疼痛者。良方妙香丸。

李杲曰凡小兒失乳。以食餉之。未有食。腸不能。尅化。致成食積。腹脹而痛。利色無常。日久瘦弱。鬱按有寒積腹痛者。由日漸經。遂致作痛。始猶數日一發。繼則一二日發。或日日發。發則面青白。吐清水。喜人手按。或將物抵住。方得稍可。宜用寒兼吃冷物涼飲。寒邪結于脾兩炒。令烟盡。加枳殼炒。烏藥炒各一兩。木香生研五錢。神曲糊丸。空心淡姜湯下。數日當下白物。漸愈。

積病有治不治

王漢東曰小兒積病可醫者九面上虛腫是積積者脾之所係脾主身之肌肉故應于面故知是脾積其脾係土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮其睡則脾不磨上面作腫若病後此症則是虛中積宜用補脾消積行氣等藥又面合地卧是積何以合地其受積在脾是冷積何以知之其脾好土故知在脾其冷者屬陰故知傷冷硬物得之宜下熱藥耳又腹脹是積其積在肺何以知之其肺主于氣纔受積其氣便冷腹脹滿氣急故知在肺如腹脹先宜調氣後用轉轉後更宜調氣又小便如油是積其積在小腸何以知之積受于脾脾當傳心心不受觸則入小腸小腸是心之腑故知在小腸則積其水道小便如米泔油相似也又髮黃是積是積氣傷心心主血脉潤遍身毛髮被積氣所干則髮黃故知是積傷心宜下空心散及取積藥此人

必時復發熱也。又赤白痢、是積。其積、在肺。受傳大腸。及有外傷而得。何以知之。肺主金。色白。後赤。則是外邪。故知肺傳大腸。則爲赤痢也。宜取後調氣。又兩眼黃赤晴青是、積。在肝。何以知之。肝主木。色青。邵被氣所干。卽黃赤晴青者。眼屬肝。若受積。故令晴青。是肝受積。若傳胆。必口苦。不要吃物。宜涼藥退之。又遍身虛腫。是、積。其積不在臟。只在腑。何以知之。爲其積曾取後。被藥發動。卽不在臟。故出皮膚之間。爲腫也。只宜下取。虛中積藥後補之。又多瀉白糞、是、積。是受冷積在脾。何以知之。脾主化。受冷積在脾。宜先轉後熱藥補之。以上皆可治者也。

積病不可治者六。喘急是肺積。肺主氣。喘急則肺絕。當面白全無血色。故不可醫。又面黑是腎積。蓋面黑者。腎紳也。當不辨好惡。眼直無光。只一日而死。又吐熱氣是榮積。其不

可醫者是血絕也血主于心心不能管故出熱氣不止耳又手腳心生瘡是衛積衛者氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絕則氣不回只半日死也又惡心吐乾嘔是胃絕何以不醫胃主化食熱則惡吐故不治當食乳不化不食亦乾嘔吐面色青黃無血色也又瀉久住了又瀉是積咬脾爛何以知其脾爛當瀉白糞而食不消住了卻放糞赤黑而死故知脾爛以上皆不可治也

疙癖原由症治

疙癖安常曰癖者血膜包水側僻于脇旁時時作痛也惟癖爲能發熱爲能生寒熱故瘧家中脘多畜黃水日久而腹結癖寒熱不已有是疾者由乳哺失調三焦關格以致水飲停滯腸胃如冷氣搏之則結聚成癖輕者積滯木香丸重者取癖丸

王肯堂曰。茅先生論、兒生五月至七歲。有結癖在腹。成塊如椀
核大。來去或似卵大。常叫痛者。左、脇下名疳氣。右脇下名癖氣。
用蓬莪朮散夾健脾飲服卽愈。如面黑目直視。瀉黑血、口鼻手
足冷。不進食者死。

食積

太陰脾臟。莫安一身。論其職掌。化宿消陳。滋榮臟腑。灌液布津。上承胃納。表裏相循。下輸大腸。傳送頻頻。土爲物母。乃見其眞。本臟氣虛。虛則寒因。虛寒相搏。或又溼屯。水穀所入。莫與磨磷。久則成積。腹痛脹膨。吞酸嘔吐。昏冒其神。夜必發熱。肚熱眉顰。當須識此。食積是論。若有外感。益覺遑迫。夾食傷寒。寒熱吟呻。先消其食。發汗湊湊。寒熱自止。寧至經旬。脾腎虛敗。瀉必侵晨。脾胃窒熱。渴咽燥脣。此皆食積脾病。災親或則傷飽。脾氣不伸。積留日久。潰敗濡泄。淪變成食利膿積。維均微痛。微脹。肚腹內堙。法從積滯。調理是遵。夫然後愈。病得回春。鰲按小兒之病多由乳食未化。即或六淫相干。成疾。亦必兼宿食故另出食積一門。不混于積癖條內。

王履曰仲景云寸口脈浮而大按之反濇故知有宿食下之宜大承氣湯然同一發熱而陽食者惟壯腹之熱爲甚且糞極酸臭夜間潮熱尤傷食之明驗也小兒宿食不消者胃納水穀而脾氣不足以勝之故不消而脾化之兒初不知撙節胃之所納脾盖黃散主之是也

（要法）

也錢氏論食不消由脾胃冷當補脾乳食不化久而成積其症初虞世曰小兒食積者因脾胃虛冷至夜發熱天明復涼腹痛膨脹嘔吐吞酸足冷肚熱喜睡神昏大便酸臭是也有前症而兼寒熱者名曰食積寒熱若食在胃之上口者吐之在胃之下口者消之腹痛痞脹按之痛按之則止者補之夾食傷寒者先散之用參蘇飲熱甚便秘者先利之大柴胡湯如無外感只傷食不至于甚保和丸調之蓋脾爲至陰之藏故凡脾病者至夜必熱熱而兼寒

則又見所勝者侮所不勝者矣食未消者消之則寒熱自止既
皆溫之大便欲去不去脾氣下陷也宜升之若夜間或清晨洩
瀉者脾腎俱虛也四神丸手足熱作渴飲水者脾胃實熱也瀉
黃散手足雖熱不渴大便不實者白朮散仍參腹痛腹脹積痛
積滯治之

食積痢

閭人槐曰有食飽傷脾脾氣稍虛物難消化留而成積積敗爲
痢肚腹微痛先調胃氣次理積卻止痢則病根自除和中散理
虛養胃三稜散烏犀丸助脾化積沉香枳橘丸守中湯進食止
食積吐瀉

張漁曰吐乳瀉黃是傷熱乳吐乳瀉青是傷冷乳皆當下之此迎而奪之之法也不若傷熱者用五苓散以導其逆傷冷者用理中湯以溫其中自然平復也　脾經積滯未除再爲飲食所傷不吐則瀉不瀉則吐宜以三稜散化積守胃散和中　鰲按痢與吐瀉各有當門二條列于此以當由食積也

吐瀉單吐單瀉

沈金鰲輯

吐病傷胃瀉病傷脾吐上焦鬱瀉下焦衰臟腑部分各不相移論吐之原病非一機或由胃虛噁必露皆或由胃冷其脉沉微或由胃熱涼飲是怡或胃虛熱渴而溺稀或胃有積肚熱面黧或胃有痰嗽逆聲嘶挾驚挾毒吐亦相隨和中助胃止吐之基論瀉之原五臟兼推脾受木尅面黃神疲脾爲水侮洞洩如篩心脾氣虛瀉黃多噫肺脾氣拂沫出多啼脾氣虛寒冷及四肢脾家積熱心煩口糜脾爲溼滯浮腫脉遲脾氣下陷腹墜如遺脾中虛痞脹滿難支清神益氣止瀉應施吐瀉交作霍亂維危或心先痛吐難自持或腹先痛瀉必淋漓中焦閉隔上下氣睽揮霍撩亂方書愼之曰攪腸痧俗名甚奇開通疏利乃是正治吐瀉之故調護多非兒生幼穉六氣尚虧乳食不節外感侵欺清濁相干蘊作創痍先瀉後

吐由虛冷分先吐後瀉其實熱治詳其輕重審厥參差維吐之屬嘔則類痙齊維瀉之屬痢則同歸其分別處未可或迷再參歲氣更辨四時勿輕心掉纔可言醫

吐由症治

吐瀉原由小兒吐瀉洩黃傷熱乳也吐瀉洩青傷冷乳也皆用白虎博曰、小兒吐瀉併作、即名霍亂有心痛而先吐者有腹痛而先瀉者莫不由中焦主納而不出中焦主腐化水穀主出而不納脾居中州下後傷熱乳者益黃散

餅子王汝言曰、小兒吐瀉併作、即名霍亂有心痛而先吐者有腹痛而先瀉者莫不由中焦主納而不出中焦主腐化水穀主出而不納脾居中州胃爲水穀之海乳哺入胃脾能尅化然後水穀傳變得宜豈有吐瀉之患凡小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失宜食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而然有先瀉而後

吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐亦不多口氣緩而神色慢
額前有汗六脉沉濡此爲冷也有先吐而後瀉者乃脾胃有熱
氣促唇紅吐來面赤脉洪而數渴飲水漿此爲熱也冷熱宜辨
婁全善曰吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也錢氏白朮散吐瀉昏睡
不露睛者胃實熱也錢氏玉露散
張兼善曰初生吐瀉大便色白停乳也紫霜丸下後用香橘餅
初生吐驟或瀉完穀者傷風甚也
三月丙吐瀉宜朱砂丸　如吐多作吐瀉者風木好侵脾土故也宜大青膏
凡傷風多吐瀉久將成慢驚風宜和胃丸雙金丸　一五歲兒吐
王履曰、嬰兒暑月吐瀉身熱宜玉露散或益元散寒月吐瀉身
冷宜益黃散
錢乙曰、吐瀉不思乳飲錢見曰、此兒目中黑睛少而白睛多面色皎

白。必多病。夫面色㿠白者。神怯也。黑睛少者。腎虛也。黑睛屬水。本怯而虛。故多病也。縱長成。必肌膚不壯。不耐寒暑。易虛易實。脾胃亦弱。更不可縱恣酒色。若不保養。不過壯年也。面上常無精神光澤者。如婦人之失血也。今吐利不食。壯熱者。傷食也。又虛怯不可下。下之虛入肺則嗽。入心則驚。入脾則瀉不止。入腎則小兒吐瀉手足指冷者。脾氣虛寒也。異功散加木香瀉薛己曰。而腹中重墜者。脾氣下陷也。補中益氣湯。服訖滯藥而腹中窄狹者。脾家虛痞也。六君子湯面黃瀉青者。脾虛而肝乘之也。六君加柴木香。多噫瀉黃者。六君加炮姜升麻。生下半月內吐瀉。治分表裏者。只調其母。兒不勝藥也。

四時吐瀉

錢乙曰、春冬之治宜從表。如傷寒吐瀉身溫、乍涼乍熱、睡多氣粗、大便青白、嘔吐乳下不消、時咳嗽。更有五臟兼現症。當煎入臟君臣藥。先服大青膏。後服益黃散。如先曾下。或無下症。愼不可下。此乃脾肺受寒也。若傷風吐瀉、身熱多睡、能食乳、飲水不止、吐痰、大便黃水。此爲胃虛熱渴吐瀉也。當生胃中津液。以止其渴。白朮散。後用發散大青膏。傷風吐瀉、身涼、吐沫瀉青白、悶亂不渴、哽氣、長出氣、睡露睛。此傷風荏苒輕怯。因成吐瀉。專先補脾益黃散。後用發散大青膏。此傷風二症。多病於春冬也。夏秋之治宜從裏。兒生三日內。壯熱、不思乳食、大便乳食不消、或白色。是傷寒。當下之。白餅子幷和胃益黃散。兒生三日至十日。吐瀉、身溫涼、不思乳食、大便青白、乳食不消。上實下虛也。更有五臟兼見症。肺則睡露睛喘氣。心則驚悸飲水。脾則困倦多睡。

肝則呵欠煩悶腎則不語畏明。當視其兼藏症。先瀉其所實而補其虛。如脾虛益黃散主之。此二症。多病于夏秋也。再如五月夏至後。吐瀉。身壯熱者。此熱也。蓋小兒臟腑十分中九分熱也。或因傷熱乳食不消。瀉深黃色。玉露飲六七服。大暑後。吐瀉黃白色。溫而似熱。臟腑中六分熱四分冷也。吐嘔乳食不消。瀉深黃色。玉露飲。立秋後多服玉露飲。或乳或不乳。食前少服益黃散。食後多服玉露飲。立秋後。吐瀉身溫。臟腑中三分熱七分冷也。不能食乳。多似睡悶亂哽氣長出氣。睡露睛。唇白多噦。欲大便。不渴。食前多服益黃散。食後少服玉露飲。八月秋分後。吐瀉身冷。無陽也。不能食乳。乾嘔噦。瀉青褐水。當補脾益黃散。不可下也。凡治小兒吐瀉大法。五月內。九分下而一分補。八月內。九分補而一分下。切勿混治。萬全曰。小兒盛暑吐瀉。邪熱在下焦則瀉。在上焦則吐。亡津必

渴。用玉露散。雖吐時與啜之。過三日必愈。如身熱脉大溺黃。
五苓益元各半湯調溫服。如身涼脉細尿清。早晨益黃散。午後
玉露散。如過四五日困弱異功散。或用和中散。
曾氏曰、小兒盛夏初秋。遇夜乘涼。湯而飲水。過食生冷。攻擊腸
胃。遂乃暴吐暴瀉。傳作手足俱痺。筋攣而痛。痛則神志不寧。甚
以驚搐治之誤矣。
張元素曰、如有風而瀉。用防風羌活。謂吐瀉兼肝病。風搐拘急。
如有熱而瀉。用大黃黃連。謂吐瀉兼心病。身熱也。有寒而瀉。用
附子。謂吐瀉兼腎病。身冷。或足脛寒而逆也。有溼而瀉。用白朮
茯苓。謂吐瀉兼本臟脾病。多睡。體重昏倦也。有肺病而瀉。用白
芍桂心。定喘。麥冬人參。甚者用枳橘。大便不通。加大黃。謂吐瀉
兼肺病。咳嗽也。

吐瀉心腹痛

聖惠方曰、小兒冷熱不調。乳哺不節。使陰陽清濁之氣相干而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷熱與正氣相擊或上攻心下攻腹故痛

單吐

吐病原由症治

巢元方曰、毒氣吐者。春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢逆吐不止。藥熏臟腑煩懊頓乏爲中毒氣吐下。千金藿香湯

曾氏曰、論吐之原。難以枚舉。有冷吐熱吐。積吐傷風嗽吐傷乳吐。吐則異。冷吐者乳片不消多吐而少出。脉沉微面白眼慢氣緩神昏額汗此因風寒入胃或食生冷或傷宿乳胃虛不納而出宜當歸散加煨姜陳皮或間投沖和飲理中湯不

效參香飲熱吐者面赤唇紅吐次少而出多乳片消面色黃遍
體熱甚或因暑氣在胃或食熱物精神不慢而多煩躁此熱吐
也宜大順飲香茹飲誤服熱藥先投蔴豆飲解之次止吐藥積
吐者眼胞浮面微黃足冷肚熱日輕夜重兒大者脉沉緩此宿
滯脾故吐黃酸水或有清痰脉實而渴爲食積所傷吐酸醎
氣或宿食併出兒小者唄乳不化是也先五苓散和解次烏犀
丸最小者三稜散傷風嗽吐者熱生風風生痰痰結胸中肺氣
不順連嗽不止和痰吐出此爲嗽吐痰壅而作乃爲實症先投
清肺飲小柴胡湯若嗽久肺虛土不生金面白唇燥乾嗽乾嘔
而無痰可溫補爲主茯苓厚朴湯惺惺散傷乳吐者變乳哺後
即吐或少停而吐此因乳飲無度脾弱不運故也三稜散此外
又有風痰吐乃是傷寒不解吐乳痰若多時必要生風青州

白圓子半夏散挾驚吐張漁三杏丹痘積吐本事方　凡霍亂吐不止者伏龍肝細末二錢白扁豆炒煎湯調下立止若扁豆嫩苗更好

錢乙曰小兒經年吐乳眼慢糞穢有筋膜者乃父母交感時吃乳所致名曰交精吐妙宜益黃散五疳保童丸

譚殊聖曰小兒驚膈吐還頻日夜連連不暫停涤水槐黃泔淀汁和蟲乳食一時噴丁香研共生犀服五膽牛黃主有動若有得逢如此藥直饒危困卻還魂此名歸命丹

瀉病原由症治

單瀉

瀉病原由小兒暴瀉者由腸胃虛卒爲冷熱之氣所傷而成熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則變爲赤白滯痢也宜龍

骨散。小兒久瀉者。大法補虛消積。宜華佗久利神驗方。

張元素曰、乳食不消初病。忽然氣出冷。四肢亦冷。面白無光澤。精神不定。乃胃氣不和。可以大溫藥治之。史君子丸益黃散。若病洩瀉日久不瘥。乳食不化。是脾胃有風冷。先服益黃散二帖。後用宣風散導之。再大補胃。

曾氏曰、論瀉之原有冷瀉熱瀉。傷食瀉水瀉。積瀉。驚瀉。風瀉。臟寒瀉。瘧積臌瀉。種種不同。冷瀉多是白水。瀉密而出少。腹痛而鳴。眉皺目慢面帶白色。額有汗。沖和飲當歸散參苓白朮散。熱瀉者。大便黃色。如筒弔水。瀉過即止。半日復然。心煩口渴。小便黃少。乳食必粗。先用五苓散或大順飲次錢氏白朮散香茹散。傷食瀉者。乃脾胃素弱。復傷生冷。故大便不聚而瀉。或因母餐生冷肥膩。亦能作瀉。面唇俱白。瀉稀而少。或如敗卵臭。身形黃

瘦。宜固脾和中散醒脾散。水瀉者。即洞洩。乃陰陽不順。水穀不分。瀉黃水而小便少。次多無度。夏秋之際。晝則解衣取涼。夜則失蓋感冷。冷熱相激。清濁混亂。或因母熱與乳。令兒脾胃不和。水穀交雜而下。宜五苓散加茯苓仁車前半夏分正陰陽。或白术散。六和湯。積瀉者。脾氣虛弱。乳食入胃不消。久又傷冷食。傳之大腸。遂成洩瀉。諸藥無效。蓋以積在脾胃未除。何由得愈。先三稜散除積。次沉香檳榔丸參苓白术散。再和中散。驚瀉者。糞青如苔。稠粘如膠。不可便止。但鎮心抑肝。和脾胃。消乳食。先五苓散。次三稜散。風瀉者。慢驚大病後有之。糞稀黃褐色。或夾食而下。因脾虛所致。或夾黑褐色者。屬脾虛而腎。水乘之也。若久則驚搐。先五苓散加茯苓仁以疏腎水。次瀉黃散以去脾風。再參苓白术散以補脾氣。藏寒瀉者。糞青不稀不稠。或下清水。未瀉腹

痛而鳴啼哭方瀉生三五月內有此周歲則無因斷臍風冷外
逼而成先沖和飲加葱白次當歸散加煨姜及勻氣散理中湯
痞積膿瀉者面黃肚脹腳弱頭大項小髮稀而豎肌瘦不食朝
涼夜熱腹有癥癖瀉無定色惡臭自瀉自止先三稜散加陳皮
灰烏犀丸蘆薈丸快腸湯凡瀉痢色青甚而淡黃夾白寒多
熱少此陰邪勝陽宜守中湯胃苓湯扶表救裏方進當歸散加
陳皮紫蘇生姜糯米寒甚者理中湯加附子姜棗次南星腹皮
飲若瀉洩色青淡有沫黃稠熱多寒少亦致黃瘦煩躁宜五
苓加芍仁車前生姜解散餘邪仍用茵陳山梔湯送五苓散退
黃色或萬安飲四神丸鬱按痞積膿瀉者脹也其症必目胞
腫腹脹喜飲水利色無常日見消瘦

東垣有言。凡發痢疾。白則傷氣。赤則傷血。赤白相兼。氣血都怫。東垣此言。至于古無匹。請申論之。昭昭若揭。惟肺主氣。氣傷肺。邊白由肺來。暑溼所折。惟心主血。血傷心熱。赤自心來。暑溼是結。至若痢黃乃脾胃浪暑溼傷。士飲食無節。黃中赤穢。心脾氣奪。五臟俱傷。五色痢溢。治必求本。審之貴悉。因熱因寒。斯言恍惚。痢必腹痛。後重裏急。乃氣不宣。津液凝澁。痢如刮大腸既瘀。小腸亦室。陰陽不分。虛實更叠。內經之言。其因不一。春傷于風。夏生飧洩。少陽在泉。火淫如蒸。民病注瀉。赤白俱出。此皆病因。非病。從發至于噤口。至于休息。痢至于赤白痢原由症治

巢元方曰小兒痢如膏血者名赤痢腸氣虛極腸間脂與血俱下也蟲毒痢者寒暑不調小兒解脫爲毒毒癘之氣所傷邪與氣搏毒蘊腸胃飧大腸氣虛則其痢狀如中蟲故名　脾毒痢歌云痢本爲醫藥傷致使大腸多結澁多饒滴血在枯腸如風腹閉難開眼身熱頭溫腳轉涼舌赤胸高爲此候多啼喘急更如狂先須解熱并開胃便是明醫用藥良此脾受熱積失治則毒伏治先涼脾次去積若胸骨忽高更加喘急不治宜金華散香連丸

邪熱胃敗鷄肝片片全加赤不須先下積閉脾絕食不堪看若歸白痢還須下臟腑頻溫得本源

聖惠方曰小兒血痢者由熱毒於大腸也血隨氣循

環經絡通行臟腑常無停滯若爲毒熱所乘遇腸虛血滲入腸則成血痢　小兒腸熱則痢下鮮血如腸風一般　小兒膿血痢者由熱毒在臟血得熱則流滲入大腸與腸間津液相搏積熱蘊結血化爲膿腹虛則泄故成膿血痢　有渴痢兼症者小兒利兼渴候此是水穀痢津液枯渴臟腑虛燥則引飲若小便快者利斷渴則止小便澁者水不行于小腸滲入腸胃渴亦不止利亦不斷凡如此者皆身體浮腫脾氣弱不能尅水故也亦必眼痛生障小兒上焦本熱今又利下焦虛上焦熱氣轉盛熱氣熏肝故也先醒脾散勻氣散調一二日後用調中飲自愈

有痢後羸瘦小兒腸胃虛弱受風冷或挾疳氣則下痢痢斷後腸胃尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦桔梗丸　痢後浮腫歌曰冷痢日久失醫治遍身浮腫卻如吹脉洪是氣化爲水沉

實還因積有之。順氣腫消爲上法。氣平兩日定多尿。莫教食飽還憂滯。此疾先因積損脾。用止渴聖效散。小兒赤白久痢不止。腹痛瘦弱不思飲食。宜黃連散肉豆蔻散

曾氏曰、赤白之痢。世人無不曰赤爲陽爲熱。白爲陰爲冷。或曰無積、不成痢。至于調治。若冷熱藥更迭進。或單投去積藥。必難效。蓋風木尅胃土。不爲暴下。則成痢疾。赤白交雜爲陰陽不分。法當分正陰陽。若既分仍赤白同下。則當究所因。若先白後赤。乃內傷生冷失于蓋覆。又元氣感于暑熱。宜先救裏。次解暑毒。若先赤後白。乃先傷熱而後感冷。先宜解熱。後治痢。有灸、熱痢者。則純下鮮血。此風能動血。宜冷服黃連香茹散。及當歸散加醋炒蒸柏葉。有灸、冷痢者。則下純白凍或白上有粉紅色。或似豬肝瘀血。皆爲陰症。蓋血得寒則凝也。先五苓散加守中湯。次固

眞湯。倘不辨虛實冷熱妄治。必脾胃愈虛或成噤口。又有裏急爲陽。後重爲陰。未圊前腹痛爲後重裏急。已圊後腹痛爲後重裏急。大。腸澁也。先大順飲加寬氣散。利解寬腸丸。後重爲氣虛五苓散。

散加人參送香連丸。若二症俱作雙金飲。然瀉痢二字。自是兩症。糞夾水來多而順者。曰瀉。帶血純白凍來三五點而疼者。曰痢。或曰有膿血交雜。經久不止。曰輕重陰陽。于此而分。斯爲治法有膿血之不化。熏腐臟腑。神氣昏沉。日久不散。此候已危。最苦是腹中利痛。兒小者無治法。蓋五色者。乃五臟之色。皆見于外。兒大者可用局方三神丸。或小來復丹。煎五苓散送下。或可療。又有風痢。多是黃褐色。與疳瀉頗同。但不臭爲異。此風毒停滯于脾。瀉黃散。若赤白同下不禁。小便少澁。

痛熱並作唇裂眼赤氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道傾陷飲食不進者難治

薛己曰、海藏用四君芎歸、治虛弱之痢四君乾姜、治虛寒之痢愚嘗治手足指熱飲冷者爲實熱用香連丸手足指冷飲熱者爲虛寒用異功散送香連丸若兼體重肢痛瀉熱、傷脾、也升陽益胃湯小便不利陰陽不分也五苓散若瀉熱退而久痢不止者脾氣下陷也補中益氣湯倍升柴加木香炮姜或變爲瘧者肝、尅脾也六君加升柴寒也異功散加木香炮姜或變爲瘧者肝、尅脾也六君加升柴鉤藤若積去仍痢脾、氣虛也四君送香連丸若因母膏粱六淫七情致兒爲患者當兼治其母

葉桂曰、膿血痢疙痛後重初用宣通驅熱如芩連大黃必加甘草緩之非如傷寒屎堅須用芒硝鹹以耎堅直走破洩至陰此

不過苦能勝溼寒以逐熱足可卻病　噤口痢都因熱升濁攻必用大苦如芩連石蓮清熱人參輔胃益氣熱氣一開卽能進食藥宜頻頻進二三口　小兒休息久痢變爲蓐後下血最難速愈有因氣弱下陷補中益氣虛寒若飲食不化益黃散溼熱未淨氣分延虛清暑益氣湯胃強善食者苦寒清熱更節飲食須善調經月　久瀉久痢必傷腎司二便也必肛門後墜與初病溼熱裏急下重不同治以攝陰液或佐疎補久則純與攝納