



32103

/B









Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30537307>

DE SUBITANEIS  
MORTIBUS.

MORITZ  
DE SUDITAMERIS



55350

JO: MARIÆ LANCISII

Intimi Cubicularij, & Archiatri Pontificij

DE

SUBITANEIS MORTIBUS

LIBRI DUO.



ROMÆ, Typis Io: Francisci Buagni. MDCCVII.

SVPERIORVM PERMISSV.

*Luigi Langi*

*Do Di*

THE HISTORY OF THE  
ROYAL SOCIETY OF LONDON  
AND THE  
SUBSTITUTION OF THE

1660-1700



Printed by R. Clarendon, 15, Abchurch Lane, London, E.C. 4.

1660-1700

# CLEMENTI XI.

PONT. OPT. MAX.

IO: MARIA LANCIUS

FELICITATEM.



*M*aius, ac iustius obsequij  
genus, quàm simplicem  
libri nuncupationem,  
sisto ad SANCTITATIS  
TVÆ PEDES, B.P., dum  
hos qualescumq; labores meos, in pu-  
blicam salubritatem Tuo Iussu, quâ  
debet

debet veneratione , susceptos , Tibi  
nunc humiliter offero . Hoc enim ,  
quantumvis tenuissimo munere , non  
solum gratum animum erga benefi-  
centissimum Principem ; sed prom-  
ptam etiam , ac sollicitam erga supre-  
ma Tua Mandata voluntatem profi-  
teor , & obedientiam . Siquidem , hoc  
ineunte anno , quo repentinorum mor-  
tium strages in Vrbe multis iam men-  
sibus grassabatur , nihil , post diuinam  
imploratam opem , habuisti prius ,  
quam , detectis causis , ipsas morborum  
radices euellere . Hinc , vt sollicitudi-  
ne , curaque mea vigilantissimæ Pro-  
uidentiae Tuæ , Principibus alijs ad  
populorum salutem imitandæ , res-  
ponderem ; suspensio tantisper studio ,  
Tibi iam debito , Tibique a me plu-

res annos elucubrato, de Motu Cor-  
dis, & Aneurysmatibus, me totum  
ad ista conuerti. Quare Pindari du-  
ctu, qui, cum promissum Agefi-  
damo hymnum distulisset, adiecit  
alium breuiorem, ut sorti persoluen-  
dæ usuram adiungeret; nos, hasce  
inter moras, præsentis libros, tan-  
quàm fœnus maioris operis, Tibi de-  
pendimus; hoc certè Pindaro dili-  
gentiores, quòd sortem fœnore præ-  
curramus. Utinam hæc, PONTIFEX  
SANCTISSIME, id unicè assequantur,  
ut Tuo uiuersos apud homines admi-  
rabili iudicio comprobentur: quo sa-  
nè iudicio, insigniumque operum, a  
Te iam absolutorum, luce, & exem-  
plis in spem erigimur, ut Reli-  
gionem quoque ad extrema terra-  
rum

Ode 10.  
& 11.

rum propagatam, reliquas sacras  
Ædes, ac vetera Urbis Monumen-  
ta restituta, nouaque in priscorum  
æmulationem Cæsarum sublimiùs  
euecta publicè gratulemur; & ma-  
gnifica inter hæc naturalibus etiam  
Scientijs latiore viam per tuta,  
ac solida experimenta patefactam  
prospiciamus: ne quid sub tanto  
Principe ipsa Roma vel Atticæ  
Academiæ, vel exterorum nostræ  
ætatis inuentis habeat inuidendum;  
quorum profectò Consiliorum magni-  
tudinem nemo cogitatione rectiùs me-  
tiatur, quàm nos, qui SANCTITATI  
TVÆ propiùs adstantes, famam de Iu-  
stitia, de Celsitudine Animi Tui, cum  
admirabili moderatione coniuncta,  
deque cæteris Virtutibus uniuersis la-  
tis-

tissimè diffusam, veritate ipsâ longè  
minorem animaduertimus; atq; Tuis  
in Actibus cunctis ea, quæ rarò in eun-  
dem conueniunt, unà concurrere ad-  
miramur, summam nempe doctrinam  
cum incredibili humanitate, gravita-  
temq; veteris discipline, quam crebris  
ieiunijs, & austerâ pietatis exercita-  
tione profiteris, mirâ cum sermonis,  
morumque suauitate conspirantem;  
vt qui tam sublimi fastigio potestatis,  
ac meritorum, præclarisq; operibus  
antecellis, tamèn alijs Te fœdere cha-  
ritatis, ac sensu Christianæ humilita-  
tis exæques. Ita Deus Te diù sospitem  
ad Ecclesiæ, & populorum felicitatem  
seruet, ac cœptis tuis, votisq; nostris  
benignus adspiret. Ex Quirinali Tuo  
Kal. Nou. MDCCVI.

*Imprimatur,*

Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatij  
Apostolici,


*Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus  
Vicesgerens.*



**L**ibrum Illustrissimi Domini Io. Mariæ Lancisij perle-  
gi, & gustavi meo non sine lucro, quo in libro  
multam quidem doctrinam, & elegantiam, nihil verò  
Religioni, & moribus Catholicis contrarium deprehen-  
di; propterea, si Reuerendissimo Patri placuerit, in lu-  
cem dari posse arbitror.

Romæ IV. Kal. Febr. MDCC VII.

*Jacobus Sinibaldus Protomedicus Generalis.*



*Imprimatur,*

Fr. Pauli nus Bernardinius Ordinis Prædicatorum Sacri  
Apostolici Palatij Magister.

OR-



# ORDO, ET INDEX

Capitum, Historiarum, & Scholiorum,  
quæ in duobus ijs Libris  
continentur.

**O**ccasio scribendi.

## LIBER PRIMVS.

- CAP. I. *Vita in quo consistat præsertim apud animalia perfecta.* pag. 1.
- CAP. II. *Ostenditur mortem esse individuan, & subitanæam, sed ex hominum opinione variè dispertiri.* pag. 5.
- CAP. III. *Quæ vera sit in hominibus Mortis idea, & undè discrimina petenda sint.* pag. 8.
- CAP. IV. *De Natura, & differentijs repentinæ mortis.* pag. 11.
- CAP. V. *Agitur in genere de causis mortis, quam vocant repentinam.* pag. 13.
- CAP. VI. *De causis subitanææ mortis ex parte fluidorum maioris usus, & primò ex parte aeris.* pag. 16.
- CAP. VII. *De causis subitanæarum mortium, ex parte sanguinis.* pag. 19.
- CAP.

- CAP. VIII. De causis subitaneorum mortium ex parte fluidi neruorum, seu spirituum animalium. pag. 21.
- CAP. IX. De causis subitaneae mortis ex parte solidorum maioris usus, & primò ex parte instrumentorum, respirationi famulantium. p. 25.
- CAP. X. De causis improuisarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum. pag 28.
- CAP. XI. De causis improuisarum mortium ex parte cerebri, & neruorum. pag. 33.
- CAP. XII. Subitanei morbi haëtenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quae et simul plerunque concurrunt. pag 43.
- CAP. XIII. Recensitæ causæ subitaneorum mortium inuincibiles, aut vincibiles existunt. p 46.
- CAP. XIV. De signis improuisæ mortis, & primò de simulatis, ac suppositis, seu supplantatis mortibus. pag. 50.
- CAP. XV. Exponitur difficultas inueniendi certa signa, quibus dignoscantur qui natura, non arte pseudo-mortui occurrunt. pag. 52.
- CAP. XVI. De signis, quibus pseudo-mortui a verè mortuis distingui possunt. pag 55.
- CAP. XVII. De signis medicis, quibus repen-
- tina

- tina mors prænoscī potest.* pag. 61.
- CAP. XVIII. *Agitur de signis futurae mortis  
repentinae, petitis ex lesione instrumentorum,  
respirationi famulantium,* pag. 65.
- CAP. XIX. *De signis futurae subitaneae mor-  
tis a Corde, Magnis Vasis, & Sanguine.* p. 70.
- CAP. XX. *De signis improuise mortis a cere-  
bro, nervis, & liquido animali.* pag. 83.
- CAP. XXI. *Agitur in genere de methodo præ-  
seruandi a subitaneis mortibus.* pag. 87.
- CAP. XXII. *Qua methodo præseruanda sunt  
corpora aspectu sana.* pag. 90.
- CAP. XXIII. *De methodo præseruandi a subi-  
taneo interitu corpora valetudinaria.* pag. 95.

## LIBER SECVNDVS.

De subitaneis mortibus, illarumque  
causis, quæ decursu annorum  
1705. & 1706. Romæ  
contigerunt.

- CAP. I. *Queritur, an causa repentinarum  
mortium, quæ Romæ per hæc tempora grassatæ  
sunt, fuerit vniuersalis, & simplex, an verò  
particularis, & mixta.* pag. III.  
CAP.

CAP. II. *Demonstratur, inaequalem aeris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinorum mortium.* pag. 115.

CAP. III. *Adducuntur quaedam argumenta ad confirmandum, non ex uniuersali solum causa tot hominum discrimina Romae contigisse, sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones, ac potissimum intemperantiam.* pag. 118.

CAP. IV. *Numerus morientium in Vrbe forsitan hoc tempore minor extitit, licet maior visus sit, ex quo consueti, & exitiales Romae morbi nequaquam vagati sunt.* pag. 123.

CAP. V. *Quae remedia hoc anno ijs maxime profuerint, qui a subitaneis morbis repentinis mortes minitantibus, euaserunt.* pag. 126.

## OBSERVATIONES.

*Physico-Medica nonnullorum, qui, cum primum istiusmodi repentinis morbis tentati fuerint, feliciter euaserunt.* pag. 138.

OBSERVATIO I. *Apoplexia cum aphonia, & paralyse dexterae corporis medietatis, phlebotomia, chatarticis, ac diaphoreticis soluta.* pag. 139.

OBSERVATIO II. *Fortis Apoplexia cum*  
reli-

*relicta paralyſi feliciter curata in Matrona  
ſexagenaria.*

pag. 142.

**OBSERVATIO III.** *Subita capitis occupa-  
tio cum aſtonia ex affectione cerebri par-  
tim idiopathica, partim ſympathica, proſperè ce-  
dens.*

pag. 146.

**OBSERVATIO IV.** *Apoplexia cum affe-  
ctione epileptica, & ſyncopali in paralyſim  
dexteræ medietatis corporis, ſalva tunc Aegri  
vita, concedens.*

pag. 149.

*Aetiologia huius morbi, & Aegri mors.*

pag. 156.

*Diſſectio cadaueris.*

pag. 160.

*Scholium diſſectionis.*

pag. 163.

## OBSERVATIONES.

*Phyſico-Anatomica nonnullorum qui primo impetu  
morbi repente per hæc tempora perierunt. p 172*

**OBSERVATIO I.** *Repentina mors ex apo-  
plexia ſyncopali in Viro obeso, & cachochy-  
mo.*

pag. 175.

*Cadaueris diſſectio.*

pag. 176.

*Scholium.*

pag. 179.

**OBSERVATIO II.** *Subita mors ex ſynco-  
pe ob cordis magnitudinem, prolapſum, atque*

c

aneu-

<i>aneurysma .</i>	pag. 185.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 186.
<i>Scholium .</i>	pag. 188.
<b>OBSERVATIO III.</b> <i>Cita mors ob interceptum motum aeris, &amp; sanguinis in præcordijs, unà cum cerebri consensu .</i>	pag. 197.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 198.
<i>Scholium .</i>	pag. 199.
<b>OBSERVATIO IV.</b> <i>Repentina mors ex conuulsione thoracis, præcordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiam ocysimè desinente .</i>	pag. 207.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 208.
<i>Scholium .</i>	pag. 210.
<b>OBSERVATIO V.</b> <i>Improuisa mors ex subita Caua intrà pericardium disruptione cum aneurysmate arterie magna .</i>	pag. 218.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 219.
<i>Scholium .</i>	pag. 221.

# OCCASIO SCRIBENDI

## *De subitaneis Mortibus.*



VM in Vrbe Roma impro-  
uisæ hominum mortes, de-  
cursu æstatis, autumnî, & hÿe-  
mis anni 1705. vsque ad  
æquinoctium vernum curren-  
tis anni 1706. frequentiùs acciderint; atque  
hinc vulgus, tacito perculsum timore, ac  
metu errabundum, in diuersa, vt affolet,  
scinderetur, nunc prauam tabaci qualita-  
tem, nunc putidos ex præteritis terræ moti-  
bus excussos halitus, nunc abusum chocola-  
tæ, nunc ignotum ambientis virus imperitè  
non minùs, quàm temerè incusans; meritò  
Sanctissimus, ac vigilantissimus Pontifex  
CLEMENS XI. primò Animum ad spiritualia  
Remedia conuertit, feruidis ad Deum fufis  
Precibus, nouâque in Ecclesia vniuersali, ad  
implorandam benè, pièque moriendi gra-  
tiam, institutâ Liturgiâ: subindè prudentiam  
cum pietate coniunxit, & verè sapiens pu-  
blicâ vsus fuit prouidentiâ, quæ in tanti

*Qualis esse  
debeat Prin-  
cipum vigi-  
lantia in his  
casibus.*

mali causas diligenter inquirens, eidem  
opportuna, si quæ forent necessaria, præ-  
sidia porrigeret, vel saltem bonâ spe timi-  
das, ancipitesque populi mentes firmaret.  
Iussit propterea mense Ianuario labentis  
anni, vt Protomedicus, & Consiliarij Me-  
dicorum Almæ Urbis Collegij, dissectis  
aliquorum, qui repente decesserint, cada-  
ueribus, veras grassantis libitinæ causas per-  
quirent; quibus sanè extispicijs mē idcir-  
cò præesse mandauit, vt, re penitus obser-  
uatâ, si quæ magis spectanda occurrissent,  
SANCTITATI SVÆ illicò referrem.

Omnem interea facturis periculum mu-  
nificam præbuit opem Eminentiss. Card.  
Pallauicinus, Gubernator tunc Urbis meri-  
tissimus. Qua de re, selecto ad cadauerum  
sectiones publico Romani Archilycei  
Theatro, cœpta fuerunt experimenta.

Postulat itaque suspicienda, admiran-  
daq̄ue sollicitudo Pontificis, vt, cum om-  
nia, quâ publica, totius nempè Christiani  
Orbis, quâ priuata subiectarum prouinci-  
arum studia diuino quodam animi robore  
ipse regat, ac moderetur, faciatque vnus,  
& so-



& solus, quæ præsens stupeat ætas, & miratura sit postera, postulat, inquam, vt nos quoque in partem etsi minimam suarum curarum scribendi celeritate, atque alacritate veniamus. Et quoniam in causas vagantium repentinorum mortium supremo Principis iussu satis per cadauera, perque alias obseruationes inquisitum fuit, consentaneum rationi ducimus, peracta, fideliterque descripta experimenta ad rationis lancem diligenter expendere; quæ quidem eò nunc liberiùs in manus hominum prodire sinimus, quòd plures viderimus de subitis istius anni casibus sparsim editas hetrusco, ac latino sermone dissertationes, quæ, vtcumque argumentum egregiè attingant, integrum tamen, propter obseruationum paucitatem, perstrictumque nimis causarum examen, minimè completuntur.

At verò, vt opus hoc nec inutilis, nec indecora doctrinæ varietas commendaret, e re putauimus in primo libro agere de subitaneis mortibus in vniuersum, idque eò libentiùs, quò nemo Recentiorum magnum ali-

quid

*Operis distributione.*

quid conferre huc videatur. Multi enim  
particulatim, & obiter, nullus, quòd sciam,  
post detectam circulationem, generatim,  
discretè, atque ex instituto de hoc argu-  
mento scripserunt; visuri deinde in secun-  
do libro veluti in hypothesi, an vniuersale,  
vel particulare, an verò, vt putamus, mix-  
tum fuerit principium, ex quo supremi hoc  
anno fati causa tot Romanis Ciuibus, &  
Incolis impenderit. Quod varijs insuper  
obseruationibus anatomicis ostendere, ac  
demonstrare curabimus. Iis fruere Lector,  
& vale.



οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐκ τῶν φανερῶν τὰ ἀφανῆ σκέπτεσθαι ἔκ' ὀπίστανται, τέχνησιν γὰρ χρεόμενοι, ὁμοίωσιν ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἔ' γνώσκουσιν. Θεῶν γὰρ νόθ' ἐδίδαξε μιμέεσθαι τὰ ἑαυτῶν, γνώσκοντας αἱ ποιέουσι, καὶ ἔ' γνώσκοντας αἱ μιμείονται.

At verò homines ex manifestis obscura considerare non nouerunt: quum enim artibus utantur similibus humanæ naturæ, id ipsum ignorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorum imitari; ita ut cognoscant, quæ faciunt, & non cognoscant, quæ imitantur.

*Hippocrates lib. 1. de Dieta num. 13.*

I  
DE SVBITANEIS  
MORTIBVS

In genere

LIBER PRIMVS

---

*Vita in quo consistat, praesertim apud  
animalia perfecta.*

CAPUT I.



V M nemo veram, ac per-  
spicua[m] vllius mortis ide-  
am fingere sibi possit, quin  
claram prius, atque ve-  
ram vitæ rationem diligen-  
tè expendat; profectò  
necesse in præsens erit, vt,  
naturam, & causas subita-  
nearum mortium inuestigaturi, genuinas vitæ  
notiones præmittamus. Longas itaque reijcien-  
tes disputationum tricas, quibus peripatetici  
se suis aculeis compungunt; illud vnicè ad-  
uertendum ducimus, proprias, atque indiuidu-

*Ex vite notione  
vera mortis idea  
desumenda.*

*Singularium na-  
tura per ideas ab-  
stractas raro elu-  
cescit.*

as rerum naturas per complexum multarum abstractarum idearum rarò perspicuas haberi posse. Quo fit, vt prisci physiologi, dum vniuersalem quandam vitæ rationem quærunt, quæ cum plant--animalibus, insectis, & monstris, cum piscibus, brutis, & hominibus adamussim congruat, nihil præter confusionem & ambiguitatem nostris mentibus ingerant. Exemplo sint quæ sparsim de vitæ conceptibus obscurè tradidit Aristoteles, & collegit intèr alios Licetus.

*Aristoteles de Vita conceptus tradidit obscuros.*

*lib. de ijs qui viu. sine alim.*

*Res rerumq. modi vocum numerum superant.*

II. Cum enim vocum numerus a rebus, rerumque modis longè superetur; cumque nomina a maioribus nostris aliquandò perperam rebus imposita fuerint; exindè sæpè oritur, vt, cupientes vna sub voce multas res comprehendere, incauti aut falsas, aut saltem obscuras ideas nostris cogitationibus infundamus, atquè admisceamus.

III. Qua de re pauca de vita hîc præfaturi, non de quacunque fluidorum motione intrà quæcunque resistantium, & cohærentium corporum organa, ex principio feminali proficiscentia, nobis agendum proponimus: (etiãsi sciamus notionem istam vniuersales quasdam vitæ regulas, ac rationes in nobis vtcunque posse ingenerare) sed consilium est nostram mentem, spontè alioquin sua, per omnia viuentium regna vagaturam, ad perfectorum, vt aiunt, solummodò animalium

lium vitam inquirendam figere, ac seriò de-terminare.

IV. Quod fanè, vt assequamur, memoria repetendum est, ex Anatomicis & Chymicis, vitam in perfectis animalibus, ( vt consultò de illorum sensationibus taceamus ) non vni duntaxat, sed complexui plurimorum principiorum, ac duorum potissimùm deberi, organicæ nimirùm structuræ solidarum partium maioris vsus, simulque congruæ mixturæ, fluiditati, ac moli partium liquidarum similis vsus, quæ tùm intestino nixu, tùm etiàm externa continentium pressione perennitèr eâ methodo agitantur in nobis, vt, animâ præside, liquida cum solidis mutuò sibi opitulentur, vicissimque manus præbeant ad motum. Scilicèt quemadmodùm ars, naturæ operum imitatrix, vt aduertit Hippocrates, qui primus mechanicam in medicinam inuexit, quemadmodum, inquam, ars hydraulicas machinas compaginavit, quas eadem aqua mota, dum relabatur, ad certum tempus mouet, iterumque mouetur: ita multiplici, ac nunquam satis admirando diuino artificio, idem Sanguis, chylo renutritus, qui in iam natis ab alterno cordis, pulmonum, ac thoracis motu pellitur, & quaquauerfum per arterias mouetur, cum partim immutatus per venas, partim sub fluidi animalis crasi per neruos recurrat, ac relabatur in thoracem, pulmones,

*Vita in animalibus perfectis solidorum ac liquidorum maioris vsus structuræ ac motui debetur.*

*Ars naturæ operum imitatrix*

*Hippocr. primus mechanicam in medicinam inuexit*

& Cor, hæc rursùs viscera mouet, a quibus fuerat dimotus, eritque in posterum per singulas ætates mouendus. Similiter cerebrum suis cum membranis, quod liquidum animale, proprijs è glandulis secretum, pro sua parte ad mouendum Cor, & thoracem per neruos vndatim pellit, accepto vicissim a corde, ac thorace Sanguine pro illius viribus mouetur.

*Vita continuus est fluxus refluxusq. aeris sanguinis & liquidi neruorum per organa maioris vsus*

Vita igitur perfectorum animalium nihil aliud esse videtur, quàm continuus, præside ac mouente animâ, fluxus, ac refluxus, plùs, minùsue sensibilis aeris, sanguinis, & liquidi neruorum per organa, & ex organis maioris vsus, satis probè constitutis, & mutuò, atque alternè plùs minùsue sensibilibiter agitatis, & agitantibus; ad quorum deinde motuum conseruationem mirâ profectò energiâ, miroq: inter se ordine concurrunt innumera alia organa sub glandularum, tubulorum, muscutorumq. specie, per viscera, artusq. dispersa; scilicet vt fluida partim renouentur, partim defœcentur, ac perficiantur.





5

*Ostenditur mortem esse individuum &  
subitaneam, sed ex hominum opi-  
nione variè dispertiri.*

C A P U T II.



Væ per compendium in præcedenti cap. de vitæ ratione posuimus nos facilè ducent ad ea intelligenda, quæ mortis subitaneæ præsertim naturam, & discrimina, non omnibus obuia, possunt ostendere.

II. Is porrò non sum, qui mortem repentinam, vt vulgò fertur, rarò censeam aduenire. Nullam enim noui mortem, nisi repentinam, siuè puncto temporis contingentem: scilicèt, vt vitæ principium in puncto saliente, cum omnia concurrunt, subitò excitatur: ita vitæ finis, cum aliquid ad vitæ necessitatem constantissimè deficit, repentè semper, hoc est puncto temporis, accidit. Iter vtique ad mortem, quod ægritudinem, atque agonem appellamus, nunc tardum ac longum, nunc plùs minùsue concitatũ, ac breue fecit, vt vulgus hominum mortem, suaptè natura individuum, distingueret in longam, breuem, ac subitaneam. Illud verò nunquam non maximâ admiratione me perculit, quî nimirum

*Qualibet mors est repentina.*

*Vita & mors puncto temporis accidunt.*

*Cur Vulgo mors, etsi individua, in plures tamen distingatur.*

rùm fiat, vt delicata, ac perexilis hæc, affabrèque contexta, ac dimota fluidorum, solidorumque compago, quam vitam in animalibus dicimus, non semper citissimo, atque improviso morbo, sed tam sæpè naturali confecta senio, paulatim contabescat, ac dissoluatur.

III. At enim verò quanquam vniuersæ mortes puncto temporis naturâ contingant; earum tamen aliquæ nobis metu, ac dolore præuisæ, ac diù, quasi dixerim, præsensæ, aliquæ verò tacitè veluti subrepentes, tanquam inopinatæ nobis offeruntur, quæ quidem varix mortium species varias, corrigendi mores hominum in præceptis labentium, occasiones, & causas moralibus potissimùm Philosophis exhibuerunt; varias itidem Iurisperitis, Canonistis, ac Theologis rationes præbere solent iudicandi, decernendique circa ea, quæ dicuntur, aut fiunt ab hominibus in extrèmo vitæ termino constitutis. Qua de re fusè differit Paulus Zacchia. Physicis verò non tam morum, rerumque ciuiliùm, quàm valetudinis curam gerentibus, illud præcipuè huiusmodi moriendi discrimina suggerunt, vt diuersas illorum causas diligenter perquirant, quibus detectis, & cognitis, ipsi iudicent, num præuisas necesse aliquo excogitato, vel experimentis comprobato remedio auertere queant; & num quæ inopinatè nobis adueniunt

*Varia mortium  
species quot modis  
viuentibus utiles.*

*Quæst. Med. leg.  
lib. 2. tit. p. quæ-  
st. 19.*

niunt, ipsæ quoque occulto aliquo, & peculiari prævideri signo, atque exhibito pharmaco, saltem ad animæ salutem, aliquantisper prorogari possint. Quòd si nec prævideri, nec prorogari vllâ arte valeant, id Medici assequantur, vt philosophiam experimentalem plenius illustrent. *Pulchrum est enim, vt scripsit Hippocrates, ea quoque addiscere, quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, Et cur successum non habuerunt.*

IV. Itaque huiusmodi rationibus ducti vtemur nos etiam cum vulgo ijs differentijs, & nomenclaturis mortium, quæ inter se distinguuntur non ex variâ ipsius necis naturâ, cuius vna semper, eademque proprietas est subito inuadendi, atq. occupandi, sed solummodò ratione causæ, ac modi, nimirum morbi, qui mortem infert; vel ratione nostræ mentis, quæ de futuro interitu filet, aut cogitat: idcirco nonnullas subnectemus definitiones, ac diuisiones, quas ituris per obscuros lethi libros lumen aliquod prælaturas non dubitamus.

*Philosophia experimentalis illustratur etiam ijs, quæ successu caruerunt.*

Lib. de articul. n. 46.

*Hippocrat. testimonium.*

*Mortis differentia vnde petendæ.*



*Quæ*

*Qua vera sit in hominibus Mortis  
idea, & undè discrimina pe-  
tenda sint.*

C A P V T III.



*Mors est totalis  
cessatio motus aë-  
ris, sanguinis, &  
liquidi nervorum  
in organis, & per  
organa maioris v-  
sus.*

Ors in hominibus, qui per-  
fectorum animalium sunt  
omnium opinione perfectis-  
simi, quacunque ex causa,  
& quomodolibet contingat,  
est vera, & omnimoda ces-  
satio motus aëris, sanguinis, & fluidi ner-  
uorum in organis, & per organa maioris usus,  
quæ naturales suas motiones verè, ac om-  
ninò amiserunt; ita tamèn firma, & con-  
stans, vt per naturæ vires resuscitari non  
possit, quam vtiquè animalium motuum ces-  
sationem, seu dissolutionem nexus naturæ, vt  
cum Aretæo loquar, necessariò comitatur, &  
constituit discessus animæ, quæ, vt momen-  
to temporis infunditur, ità momento tem-  
poris, planè imperceptibili, seiungitur à corpo-  
re, ac separatur.

*Varie mortis dif-  
ferentiæ.*

II. Huiusmodi verò absoluta cessatio mo-  
tuum animalium, ac discessus animæ à cor-  
pore, quanquàm cogitatione citiùs perpetuò  
contingat; nihilominus tamen, vulgaris  
consuetudinis, clariorisque doctrinæ gratia,  
distinguitur.

distinguitur in mortem naturalem ; immaturam , & violentam ; singulæ verò in lentas , & subitaneas ; in præuifas , ac præfensas ; deniquè in improuifas , infenfes , atque inopinatas .

III. Mors naturalis non ea folummodò dicenda eft , quæ decrepitis , fed quæ , vel ijs accidit , quos , etfi annorum numero metientes , paffim vocemus pueros , adolefcentes , ac iuuenes , adeò tamèn languidam fuorum corporum constitutionem , nascendo , fortitos fuiffe videmus , vt breuiori temporis decurfu , fed pari cum fenibus fato , hebefcentibus membris , vt Fabius loquitur , fimiles fenectæ pigrefcant , ac necem ipfam incurrant ; fcilicet quod vtrobique fenfim , ac fine fenfu fubtile illud , atque oleofo--uolatile , fluida , folidaque peruadens , ac dimouens , partim tranfpiratum deficit , partim non extricatum defideratur ; vnàque fimul prompta fibrarum diftractilitas , & contractilitas , lento tabo deficiens , fluida viciffim excipere , & contra eadem opportunè oscillare non potefl .

*Mors naturalis  
quænam .*

*Etiã in iuueni-  
bus .*

IV. Mors immatura illa effe videtur , quæ ex interno morbo proueniens , homines , cæteroqui fanos , & vegetos , de medio vitæ tollit .

*Mors immatura  
qualis .*

V. Mors deniquè violenta ea firmanda eft , quæ ab externâ , & cum fenfibili , magnâque vi agente causâ , hominibus obuénit .


*Violenta unde  
dicatur .*

B

De

VI. De cæteris verò indicatis mortium  
discriminibus ita procul dubio decernendum  
putamus, vt eadem oriri dicantur à varijs  
fentiendi, cogitandique modis, quibus ho-  
mines diuturno, aut celeri, sensibili, aut in-  
sensibili morbo, atque agone confectos,  
cum signis lethaliibus, vel sine illis subla-  
tos videmus. De subitanea siqui-  
dè, atque improuisa morte,  
quippe quæ nostri scopus  
est laboris, accura-  
tiùs proximo  
capite  
agendum esse arbitra-  
mur.

\*\*\*



*De Natura, & differentijs repen-  
tinae mortis.*

C A P U T IV.



**S**ubitanea, seu repentina mors, vltro hodie, vel ipsi vulgo innotescit, quominus longo sermone sit pertractanda: illa siquidem appellari solet, quæ per morbum celerrimi motus homines vt plurimum, sanos, vel morbis inducias permittentibus detentos, absque vilo, vel certè breuiori agone de viuentium numero tollit; & cum plerunque inopinato imperitis adueniat, terribile facit moriendi compendium.

*Repentinae mortis idea.*

II. In subitanea verò nece diligenter notandum est, morbi celeritatem, ex qua ipsa constituitur, aliquando esse nobis insensilem, & improuisam, vt occurrit. e. g. in syncope ex præcordiorum, vasorumq. sanguineorum paralyti, quæ, nihil nobis de illa cogitantibus, aut sentientibus, in mortem transire solet, si perseueret; aliquando verò ægrotis esse sensibilem, & curantibus præuisam; quemadmodum obseruamus in eademmet lethali syncope ex obstructione, & corrosione magnorum vasorum, hanc enim præcedere solent anhelitus, dolores circa cor, & animi deli-

*Mors ex præcordiorum paralyti insensibilis.*

*Synopem lethalem ex obstructione & corrosione magnorum vasorum quænam præcedant.*

quia, quæ vltro præfentiuntur, mortemque reddunt Medicis non modò præuifam, fed præcautam. Vt nihil penitùs dicamus de vulneribus fummorum vaforum, de magnis cerebri contufionibus, de fulminum ic̄tu, de carbonis empyreumate, de peste, fimilibufque veneficis caufis, quæ nunc præfentæ, nunc clanculùm, fæpe tamen repentè folent occidere.





*Agitur in genere de causis mortis, quam  
vocant repentinam*

C A P U T V.



Hic statim notandum, nullam esse causam, seu ægritudinem, celerrimè occidere potentem, quæ vires suas per diuisibilia temporis momenta non exerceat; & licèt acutissimorum, atque maximè exitialium tempora morborum, quos (a) Ranchinus meritò subitaneos vocat, velocissimo cursu compleri aduertamus, nunquàm tamen in syncope, e. g., aut apoplexia, quantumuis ocyssimè plerumque soleant interimere, aliqua temporis momenta non excurrunt, priusquàm ad illud perueniatur momentum, in quo talis fluidorum, solidorumque quies inducta sit, quam post animæ discessum, mortem appellamus. Hoc autèm propterea hïc aduertimus, ne lector in posterum quærat, si nos acturi de subitanæ, quam vocant, mortis causis, nonnullarum meminerimus, quæ clàm, aut palàm, semper tamèn cum tempore, nostrorum etiam sensuum iudicio operari solent.

II. Præterea monendum ducimus, quædam pro veris subitanearum mortium causis sæpe sapiùs accusari, quæ potiùs occasiones

*Subitanæ mortis  
causæ semper cum  
tempore operari  
solent.*

*a In suo Tract.  
de morb. subit.*

*Occasiones sæpe  
confunduntur cum  
causis subitanæ  
mortis.*

b.Lib.9.cap.12. videntur habendæ. (b) *Fine namque vitæ nostræ, ut ait Val. Max., varijs, & occultis causis exposito, interdum quædam immerentia supremi fati titulum occupant: cum magis in tempus mortis incidant, quàm ipsam mortem accersant.*

*Mortis subitaneæ causæ duplicis sunt generis.*

III. Quanquam verò innumeræ sint causæ, quæ subitaneas mortes valent inducere, eæque variè inter se misceri, & complicari soleant, ut rarò simplicem inuenias; duobus tamè generibus, ad doctrinæ claritatem, aptè distingui posse videntur, quorum alterum est vitium solidorum, alterum fluidorum maioris vsus, dummodò vitium sit constans, & maximum. Etenim cum vitam posuerimus in motu liquidorum, ac solidorum prædicti vsus; certè quidquid citissimè, ac pertinaciter enunciata fluida, aut solida maximè lædere, vel alternos illorum motus, qui nullo artis, vel naturæ auxilio restituantur, tollere potest, repentinam mortem inducet.

*Solida & fluida maioris vsus vtraque tria; & qualia.*

IV. Et quoniàm tria sunt fluida, totidemque solida maioris vsus, quæ vitæ machinam potissimùm librant, scilicèt ex parte liquidorù primò aër, secundò sanguis, tertio fluidum nervorum; ex parte solidorum, primò aspera arteria cum pulmonibus, cæterisque partibus respirationi inferuentibus; secundò cor cum appensis sanguiferis vasis; tertio cerebrum cum nervis, præsertim splanchnicis: eaproptè ab horum altero, pluribus, aut omnibus, seorsim, aut

aut simul, modò maximè, & constantissimè læsis, improuisa mors impendere potest: vt enim singula hæc, integra cum sunt, in vitæ beneficium, ita, si vitientur, in maleficium, vicissim conspirant, viresque consociant.

V. Cæterùm causas ab animo pendentès idèò peculiari capite à corporeis non distingui-  
mus, quia idcirco improuisam mortem interdum accerfunt, quòd solidas corporis partes, apud illos, quos interimunt, præcordia scilicet, & cerebrum, admodum imbecilla, penèq; effracta, aut inueniant, aut efficiant.

*Animi passiones  
quomodo mortem  
improuisam accer-  
fant.*

Vndè promiscuè de  
vtrouque cau-  
sarum  
genere scribere constitui-  
mus.



*De causis subitaneæ mortis ex parte  
fluidorum maioris usus, & pri-  
mò ex parte aëris.*

C A P U T VI.



Idimus hætenus in vniuer-  
sùm ex quibus fontibus im-  
prouisarum, quas dicunt,  
necium causæ fluere soleant;  
nunc agendum, vt, saltem,  
obiter, internoscamus mo-

dos, quibus aliquæ ex vnoquoque genere vi-  
res suas validissimas exerunt.

*Aer multifariam  
ad necem subitam  
conspirat.*

II. Et quidem ex parte aeris celerrimus  
animalium interitus potest contingere, cum  
vel moles eius, vel pondus insigni diminu-  
tione, aut excessu laborant; vel id, quod sub-  
tilissimum in aere ad vitæ necessitatem na-  
tat, & intercurrit, magno aliquo vitio letha-  
liter afficitur.

III. Diminuitur primò aeris moles in va-  
cuo, per Boylii anthliam factò, vbi anima-  
lia statim deficiunt, & mox emoriuntur.  
Minuitur verò pondus in atmosphæra, pre-  
mendis pulmonibus, & sanguine respectiuè  
leuiori reddita; vt in conclauis nimis calido,  
& quorundam montium cacuminibus, vbi,  
vt fertur, celerem homines interitum subeunt,  
nisi citò illinc reducantur;

E con-

IV. E contrario adaugetur pondus aeris, eiusque compactior euadit elater in quibusdam metallicis fodinis . Narrat etiam Boyleus, ex peculiari flante apud septentrionales vento, homines repente interire: tanta enim eius est densandi vis, vt vel hispanicum vinum congelat .

V. Tandem magno aliquo vitio noxius, ac lethalis fit aer, vt ex fumo carbonum in conclauis clauso, ex constitutionibus pestiferis, ex veneficis odoramentis, aut sæua quadam, ac naturali mephiti; vt etiam ex sepulchris, aut frumenti puteis diu clausis, cum primo aperiuntur; quæ omnia solent inopinato animalia suffocare, & interficere, densatâ scilicet, aut vitiatâ illâ, quæ per cranij meatus, & pulmonum porulos permeare deberet, particularum mixturâ, quæq; subtilis alioquin, & nescia quietis, sanguini fluiditatem, & nervis spirituofum vitæ igniculum erat conciliatura.

VI. Sed quoniam non vna, eademque omnibus in animalibus, aut pulmonum laxitas, aut fluidorum mixtura inuenitur; hinc non omnibus eadem nocent inquinamenta aeris, ex quo euenit, vt particulares narrentur pestes, quæ nunc solos homines, nunc hoc, vel illud pecudum genus interficiunt . Quinimò, cum vna, eademque minima solidorum textura, ac particularum sanguinem integrantium proportio, nec semper, nec singulis

*Aer iuxta corporum dispositionem apparet noxius .*

gulis hominibus accidat . Hoc fanè in causa  
 est, cur, sæuiente peste, in eadem vrbe, ac etiam  
 domo, alij pereant, alij feruentur. Adeò verum  
 est, ad labem, ex aere potissimùm con-  
 trahendam, eousque vale re corporis  
 dispositionem ( quam vt pluri-  
 mùm intemperans, atque  
 incontinens vitæ ge-  
 nus infert )  
 vt propterea nonnullis  
 in medio Tiburi,  
 Sardinia  
 fit .



*De Causis subitaneorum mortium ex  
parte sanguinis.*

C A P V T VII.



X parte sanguinis improuisi-  
sam mortem intentant qua-  
tuor præcipuæ eiusdem af-  
fectiones. Primò præceps ac  
talis diminutio molis eiu-  
dem, quæ, cordi, & cerebro  
subtracta, alternum horum viscerum motum,  
& circuli continuationem penitus tollat. Hinc  
sanguis a maioribus venæ cauæ, & pulmo-  
nicæ truncis, vel a corde, summisque arterijs,  
pulmonicâ scilicet, & aortâ, affatim erumpens,  
improuisè vitam intercludit.

*Sanguis quadru-  
pliciter mortem in-  
tentat repentinam.*

II. Secundò celerrima pariter, nimisque  
abundans eiusdem sanguinis, præsertim effer-  
uescentis, ad cor, atque ad cerebrum con-  
fluxio, & quâuis ex causâ, mora pertinax,  
vbi languescenti vi circumpulsiuæ horum  
viscerum validè renitatur, & vitæ cursum,  
quem in motu posuimus, continuò suspendat;  
vt in ijs obseruatur, qui, subito timore, mæ-  
rore, vel gaudio perculsi, repentè concidunt;  
aut qui nimiâ plethorâ saginati, vel qui post  
corporis excalesationem, siue præsentè aliqua  
euacuatione, frigido potu, vel balneo vtun-  
tur. Non enim capacitas ad continendum

dum, & vis ad pellendum sanguinem in corde, & appensis vasis sunt indefinitæ, atque immensæ; verùm proportionē respondent certæ, ac determinatæ moli, & grauitati eiusdem sanguinis, quem nonnisi citra violentam distractionem, ac resistantiam capere, atque vrgere possunt.

III. Tertiò, vitam sæpè confestim adimit illud sanguinis vitium, quod ab hypochondrijs, ab vtero, vel aliundè, ac præsertim à ventriculo communicatū, propter summam acridinem, vel aliam externis sensibus non fati expōsitam qualitatem, præcordia, et cerebrum conuellit, & valde efficax est ad fluida, vel coagulanda, vel dissoluenda; quibus in casibus magna interdum feri copia, ex coactō intrà pulmonum, ac cerebri vasa sanguine, violentè extruduntur, & in thoracis, vel cerebri cavitatibus colligitur; hinc frequens erroris anfa apud minùs in arte peritos, qui, lympham in sinibus cerebri inuenientes, illam apoplexiæ causam, cum plerunque fuerit duntaxat effectus, accusare solent.

*Lympha in cavitatibus collecta iniuste pro morbi causa plerunq. ab imperitis accusatur.*

IV. Postremò pestiferum quid, ac planè veneficum in sanguine vitium, haustum ex aere, ex ingestis per os, aut aliundè, recondi posse experimur, quod dato tempore, vires suas in spiritus, cordisque, ac cerebri fibras exerat, ignoto sanè, tacitoque molimine, ac veluti syderatione.



*De causis subitaneorum mortium ex parte fluidi neruorum, seu spirituum animalium.*

C A P V T VIII.



Quod deniquè ad tertium maximi vsus fluidum, nempe ad liquidum neruorum, seu spiritus animales, attinet, ijs profectò, vtpote a sanguine deriuatis, eadem vitia congruè aptari possunt, quæ mox ipsi sanguini attribuimus. Etenim primo loco subtractâ, vel interceptâ contumaciter tantâ sanguinis copiâ, quanta per carotides, & ceruicales arterias, earundemque plexus ad cerebri, & cerebelli cortices naturalitèr fluxura est, vt liquidum neruorum separetur, statim debent et ipsi spiritus, qui ex solo sanguine feceruntur, deficere. Hoc sanè contingit in magnis sanguiferorum circa iugulum vulneribus, vel intrâ cerebrum rupturis, in quibus postremis, si fuerit ingens copia effusi sanguinis, eiusdem procul dubio defectum mortifera cerebri, ac cerebelli compressio sequatur necesse est. Possunt paritèr ijdem spiritus deficere, cum eorum excursus per neruos ad præcordia, aliasque maximi vsus partes, penitùs intercluditur

*Multiplex spirituum defectus improuisæ mortis causa.*

ditur vi conuulsionis, compressionis, vel obstructionis, e solo corporis vitio, aut simul animi motibus pendentium. Possunt quoque deesse spiritus ob inediam, ob motuum violentiam, ob nimias euacuationes, ob intemperantem veneris vsum, præsertim in senibus, quos factis iam ætas spiritibus destituerat. Quod genus exempla inuenientur abundè apud Authores, quibus hic repetendis frustrà non immoramur.

II. Secundò, nimia etiam eorundem copia, quæ semper sanguinis vbertatem comitatur, nimiam præsuram, & inflationem glandularum corticalium cerebri, neruorum vias ita potest aliquando comprimere, vt fluxuro animali liquido omne spatium adimatur, fiatque propterea, vt, vel in cerebro spiritus non separentur, vel à cerebro ( infirmatis villis extrudentibus, & aucta resistantia extrudendi liquidi ) in præcordia non dimittantur; quod interdum contingit in ebriosis, alijsque, qui cibis, et potibus, plurimo sale, ac sulphure narcotico referatis, sese ingurgitant.

III. Tertiò, summa spirituum acrimonia ex eodem sanguinis vitio, atque ex lentis animi pathematibus, studijsque intensioribus induta, conuellendis pertinaciter præcordijs, & cerebro, homines, alioquin valetudinarios, ad idem repentinae mortis genus potest adducere; vt olim in amplissimo Card. vidimus, & passim in exitialibus epilepsijs, quæ dicto citius,

in

*Ipsorum acrimonia æquè noxia.*

*Epilepsie transitus in apoplexiam ex Hipp.*

in fortes desinunt apoplexias, de quibus agit etiam <sup>(a)</sup> Hippocrates.

IV. Sed quoniam ætiologiam epilepsiarum, quæ in apoplexias, mortemq; desinunt improvifam, hîc scitu summopere necessariam putamus, idcirco attentè considerandum, conuulsionem membranarum, ac sinuum, nec non fibrillarum cerebri, in qua penè tota ratio idiopathicæ epilepsie posita est, multifariam, sed duplici potissimùm modo contingere; altero scilicet, cum acre, ac ferè arsenicale, vel aliud quoduis liquidum, conuellendis nervis idoneum, non omnia simul cerebri segmenta, sed eadem successivo quodam, atq; inæquali ordine, ac tempore irritat, & crispat; vndè nonnisi inæquales, inordinatæ, atq; inæqualiter contingentes conuulsiui artuum, ac thoracis motus, per totum ferè paroxysmum, respondent, ac obseruantur. Quod sanè quotidianum, ac vulgare huius morbi exemplum se prodit. Altero verò modo, cum eodem penè tempore, æqualibusq; viribus irritans causa, quaquaversum per cerebrum diffusa, æqualiter, eodemq; tempore anteriores cum posterioribus partibus, dextras cum sinistris, immò fortè etiam ipsum cerebellum, adeò vehementer conuellit, vt, indè animale liquidum simul, & æqualiter in omnes contranitentes musculos validè expressum, post breuissimas artuum contorsiones, vniuersum corpus tensum, rigidum

a lib. de gland.  
n. 9.

Quaratione huiusmodi transitus fiat.

dum, atq; immobile reddat. Hæc autem, posterior epilepsiæ differentia, ea præsertim existit, quæ si plùs iustò perseueret, frequenter in apoplexiam transiens, subitum vitæ discrimen solet afferre: quia scilicet, non solùm vasa cerebri, si a lenta priùs ægritudine fuerint debilitata, et in varices dilatata, ex illo forti, & vniuersali nixu conuulsionis, ac strangulationis, sanguinem prementis, atque intercipientis, & renixu eiusdem contenti sanguinis, mole, & acie suâ extrorsum vrgentis, sæpè diffiliunt; sed, vel maximè, quia idem sanguis, propter inæqualem suarum partium indolem, vno in loco volatili oleoso spiritu expers, viscidulus ex mora concrefcit; alio autem fluxilior, & acrior, suos extra limites, per glandularum orificia, neruorumque tubulos exprimitur: propterea, quanquàm ipsa denique conuulsio deficiat, attamen, perturbatâ iam spirituum materie, & in alienam naturam conuersâ, ipsdemq; cerebri, neruorumq; vijs, quâ dilatatis, ac discissis, quâ compressis, & obstructis; fortissima inducitur apoplexia, quæ plerunque subitam mortem accersit.

V. Tandem ignotum illud virus, quod in aere, ac sanguine superiùs notauimus, potest in ipsos animales spiritus deriuari, eundemque lethalem, ac repentinum effectum producere; vt in peste, & venenis, infusis, vel ingenitis frequenter offendimus.

De causis subitanea mortis ex parte solidorum maioris usus, & primò ex parte instrumentorum respirationi famulantium.

C A P U T IX:



Liquidorum vitijs iam explicatis, ad ea solidorum mala progredimur, quæ sunt mortalis huius exitus principia; illud iterum, iterumque monentes, quòd vtriusque ordinis causæ mutuam sibi opem, ad subitum inferendum interitum, necessariò præbent; vt pròindè non inuenias vitium solidorum, repentè aptum occidere, quod motui saltem liquidorum non officiat; & vicissim fluidorum vitium lethale absque solidorum læsione.

*Solida, & liquida mutuo concursu mortem inferunt improvisam.*

II. Sed ad mortiferas causas, ex ipsis solidis ortas, propiùs accessuri, illud etiam accuratè aduertendum, solida maioris usus duabus conditionibus naturalitèr instructa esse oportere, vt ad vitæ conseruationem conspiciant, nimirum, vt sint integra, seù organicâ naturali structurâ donentur; deindè, vt in alterno constrictionis, ac distensionis motu perpetuò versentur. Quidquid propterea stru-

*Ex parte solidorum maioris usus, quomodo subitanea mors.*

D

cturam

aturam, vel motum prædictarum partium maxime, ocysfime, & pertinaciter lædet, mortem quoque celerrimam, quam subitam dicunt, poterit inferre.

*Varia tracheæ,  
& bronchiorum  
mala repente in-  
terficiunt*

III. Sequentes itaque præfatam initio solidorum distinctionem, asserimus primò, ex parte instrumentorum, respirationi inferuentium, animalia repente posse interire, si aspera arteria, eiusque bronchia obstructa, conuulsa, vel compressa, citissime, ac penitus iter aeri per pulmones intercludant, ut in laqueo suspensis passim animaduertitur, vel in ijs, quibus solidum corpus inter deglutendum laryngis foramen occludat, vel pus, ruptâ vomica, vel aqua in demersis, per bronchia, loco aeris diffusa, non reuomantur; vel serum, aut sanguis in repentino pectoris hydrope pulmones, quominus ab aere impleri possint, subito impediat. Tanta enim est hominibus spiritus necessitas, ut ad rem scripsit (2) Hippocrates, *ut siquidem omnibus alijs abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum, possit tamen plures dies ducere. Si cui verò spiritus in corpore intercipiatur, vel exigua diei parte pereundum sit.*

(a) lib. de flat.  
n. 6.

IV. Deindè, si omnia simul inspirationis, atque expirationis instrumenta suis ab officijs citò, ac pertinaciter vacauerint, ob eundem impeditum aeri alternum intrà pulmones ingressum, atque egressum, illicò extremi fati dies

dies est in procinctu; ob quam sanè rationem feruus ille barbarus apud (b) Galenum, coacto spontè spiritu, citam sibi mortem consciuisse, fertur; cuius profectò voluntarij, si verus est, effectus, multæ etiàm morbosæ, ex necessitate operantes, numerantur causæ, quæ scilicet aptæ sunt diaphragmatis, sterni, costarumque structuram, continuitatem, vel motum ita firmitè lædere, vt alternè supra pulmones concidere, vel à pulmonibus recedere nequeant. Ita magna e. g. vulnera, quæ vtrunq; thoracis latus, septumque simul transversum confodiunt, si aperta detinerentur, celerrimam mortem possent accersire: aer enim, per dehiscencia vulnera ingrediens, & forinfecus pulmones premens, æquilibrium cum aere, qui per tracheam intrà pulmones labitur, ipsosque pulmones, veluti quandam immobilem stateram, cum totius circulantis sanguinis mora, vitæque pernicie, suspenderet, ac libraret; & sic de quacunque aliâ consimili prædictorum læsione organorum, respirationi famulantium, paralyfinempe, aut conuulsione (dummodò subita, magna, ac pertinax fuerit) erit sentiendum.

*Spiritus sponte cohibitus mortis causa apud Galenum.*

(b) 2. de Mot. muscul. cap. 6.

*Huius effectus causæ exponuntur.*

*Quenam thoracis vulnera, externum cum interno pulmonum aerem æquilibrando, lethalia.*

*De causis improvisarum mortium ex parte cordis, & magnorum vasorum.*

*C A P U T X.*



Roximè dicendum venit de cordis, magnorumq; sanguiferorum vitijs, homines celerimè interimentibus; & quanquam omnia, quotquot dari possunt, ad id vnicè colliment, vt cordis motum penitus tollant, & lethiferam syncopem inducant; nihilominus tamen, cum ad vitæ necessitatem, ex parte cordis, tria considerari debeant; primò congrua structura tam cordis, quàm magnorum vasorum; secundò viarum libertas; tertio vis mouens, quam facultatem pulsivam dicunt; certè ex vnoquoque fonte maximi oriri possunt morbi, qui confertim perimant.

II. Primò, quòd attinet ad structuram, cum ad eam constituendam integritas, & continuitas fibrarum, villorum, & membranarum potissimùm exigatur; quotiescunque aut inflicto vulnere, aut lentâ exesione, in aneurysmatibus, eò tandèm peruenitur, vt continuitas parietum cordis, & magnorum sanguiferorum auferatur, illicò, prosiliente vberimè sanguine, mors vrget, vt historia V. eorum

*Tria ex parte cordis, & vasorum ad vitam necessaria.*



rum, qui hâc temporum constitutione repente interierunt, publico patuit in theatro.

III. Quòd verò spectat ad viarum libertatem, quæcunque causa venam cauam, vel pulmonicam, & aortam, aut arterias carotides eousque constantissimè, atque integrè potest conuellere, comprimere, vel obstruere, vt sanguis ad auriculas, & ventriculos peruenire, aut ab auriculis, & ventriculis in maiores arteriarum ramos, atq; in cerebrum fluere prohibeatur, subitum minitari potest interitum, vt de magnis sanguiferorum polypis, ac de tumoribus, vel ossibus, maiora vasa comprimantibus, vel obstruentibus, memorant Obseruatores.

IV. Denique, quia vis mouens cor non solum pendet a congrua fibrarum structura, sed etiã a fluidis nerueo, et sanguineo, idcirco labefactari potest, vt hominem celerrimè interficiat, si vtrunque liquidorum contumaciter deficiat; (vndè syncope ex cordis, & arteriarum paralyfi) aut quoduis aliud lethale vitium contrahat, quod sanè accidit non in peste solum, sed vbi os ventriculi, vel ipsum etiã cor a vermibus mordetur, vt proindè (a) Tralianus, (b) Mesue, & (c) Schenchius referant, aliquos ex huiusmodi causis repente decessisse. Vermes enim cuiusdam speciei, non erodendo duntaxat, sed veneficum fortè liquidum sanguini, ac fluido animali penitus hostile,

*Cordis vasorūq; conuulsio, compressio, & obstructio, mortis causæ.*

*Vis mouens cor a fluidorum defectu, & vitio lethallyter labefactatur.*

*Oris ventriculi, & cordis morsus à vermibus.*

a Lib. 7. cap. 11.

b De ægrit. cord cap. 1.

c Lib. 2. obs. 194.

*Cur lethalis.*

vul-

*Systole, & diastole cordis &c. v. traq. ad vitam necessaria.*

*Ex inflicto sub xiphoides pugno, ob mirabilem partium cohesionem, subita mors.*

*a lib. 7. cont. cap. I.*

vulneribus inspergendo, interimere solent. Quod sanè adeò ex antedictis per se clarum est, vt summam indicasse satis fore duxerimus. Illud solummodò memorandum hìc arbitramur, cordis, magnorumque vasorum motum diuidi in systolem, ac diastolem; & licèt alter duntaxat ex ijs motibus sit agens, vterque tamen ad vitam est necessarius: idcirco fieri potest, vt æger repente moriatur, tum si cor alternè constringi non possit (quod vel eneruatâ penitus structurâ, vel prædictorum maximo vitio liquidorum, solet contingere) tum si alternè dilatari nequeat, quod, vel pertinaci eiusdem spasmo, vel ex causis illud validissimè comprimantibus, contractione nempe, vel tumore cordis, pericardij, aut adiacentium partium, facilè oriretur. Sic olim vidimus, inflicto vehementèr pugno sub cartilagine mucronata, vitæ nodum ex tempore solutum; nimirum quòd eò loci vnâ conueniunt, validèque per nerueam, ac tendineam cohesionem iunguntur sinistrum ventriculi orificium, diaphragmatis centrum, arteria magna, vena caua, & pericardium; excitatâ idcirco repente, ob fortem percussiois vim, prædictarum simul omnium partium conuulsione, subitò pariter, apud imbecillum alioqui hominem, tum respiratio, cum sanguinis motus lethaliter potuit subsistere. Sic <sup>(a)</sup> Rasis affirmat, repentinas mortes ex cordis apo-

ste-

stematibus euenire . Quamobrem , & cordis dolor, vt in coacis scripsit <sup>(2)</sup> Hippocrates, *seniori* a lib. 3. sect. 2. n. 17. *sæpius consuescens*, *repentinam mortem significat.* Præcordiorum enim conuulsio, si pertinax fuerit, atque per id temporis sanguis, qui intercurrere deberet, necessariam fluxilitatem, et crasim amitteret, ( vt de cerebri conuulsionibus diximus ) etiamsi postea spasmus ille cessaret, non ideo tamen cruor sublatae resistentiæ obsecundaret, cursumque suum repereret; idcirco subitam necem facillimè induceret. Interim verò, indicatas alibi causas omninò veneficas, ex ventriculo, vel alio quouis viscere deriuatas, consultò tacemus.

Vide latiùs tractatam de cordis dolore materiem cap. XIX. n. 2.

V. Sed, cum studium detegendæ veritatis nihil nos vel præterire, vel dissimulare patiatur, aduertendum, istiusmodi veneficos succos, motum cordis subitò eneruantes, intrà nostra corpora cumulari, non vitio duntaxat fermentorum, animi pathematum, aliarumque etiam causarum, a cibis, potibus, atque aere deductarum; sed interdum ( vt reticeam quæ palàm venena dicuntur ) culpa *arcanorum*, vt iactant, remediorum, per quæ ignauum vulgus magnos morbos proffigatum iri confidit. Quamquam enim in vnaquaque Ciuitate, iustissimis constitutâ legibus, pseudo-chymici, & agyrtae, ne medicinam faciant, semper vetentur, & tamen semper retineantur; sanè accidit non rarò, vt aliquis, siue lue venerea, siue hy-

*Mors ex Agyr-  
tarum arcanis.*

pochochondriorum ægritudine vexatus, postquam rectam medendi viam, ob mali contumaciam, vel suos ob errores, prorsus inutilem expertus est, ijs tandem agyrtis, celerem salutem perfrictâ fronte pollicentibus, faciliè credit. At, cum miser homo, antimoniale, mercuriale, aliudue huius farinae medicamentum acceperit, proprio (vtinam pœnitentiâ delendo) discit experimento, se non ad salutem, sed ad necem pseudo-medici vsu fuisse. Etenim, huiusmodi remedia, si malè parata fuerint, veneni naturam induunt; si verò extra dosim, aut sine methodo valetudinarijs corporibus propinentur, variâ subinde cum prauis hypochondriorum succis initâ miscelâ, & fœdere, in toxicum conuertuntur, & hominem repente plerunque perimunt. Quod fanè vbique locorum, sed in Romana maximè Ciuitate, vsu venire dolendum, in qua multos proinde vidimus, sumptis, per aliquot dies, huiusmodi *arcanis*, tandem stomachi, ac præcordiorum doloribus correptos, citissimè sublato fuisse. Vndè

a In lex. Med.  
verb. agyrt.

(a) Brunonianis vocibus exclamare compellimur. O deplorandam Magistratum lenitatem, quâ impunè de corio humano ludere concessum, quâ datur ita temerè sæuire in humana viscera! O inexcusabilem dissimulationem!

*De causis improvisarum mortium ex  
parte cerebri, & nervorum.*

C A P U T. XI.



Vanquàm ex antedictis de vitio sanguinis, & liquidi nervorum abundè colligi possit, quales causæ ex parte cerebri, & nervorum, ad subitum producendum interitum, concurrant: ne tamen hæc nostra elucubratio alicubi manca videatur, præcipuo capite perstringimus eas causas, quæ cerebri, tanquàm solidæ partis, culpâ, homines citissimè de medio tollere possunt.

II. Cum verò, vt superiùs de corde monuimus, tria quoque in cerebro, suisque membranis, ac nervis, ad vitam summoperè necessaria, considerari debeant; scilicet primò congrua structura; secundò viarum libertas; tertio motus alternus membranarum, & corticis eiusdem: sanè ex maxima, constantique prædictorum læsione, citissima mors, sub specie fortis apoplexiæ, potest accidere; mutuò scilicèt inter se conspirantibus prædictis vitijs; ita vt maxima structuræ læsio alternum motum, vasorumque libertatem tollat; quemadmodùm cessatio motus supponit, vel infert impedimentum viarum; denique

*Tria in Cerebro, meningibus, & nervis ad vitam necessaria; & qualia.*

què maximum viarum impedimentum statim naturalem cerebro motum aufert, & aliquale structuræ vitium inducit.

*Spirituum descensum ad præcordia inhibitus rep: mortis causa.*

III. Primò itaque, si capitis, ac cerebri structuram spectemus, quotiescunque eadem ob magnum, profundumque vulnus, vel contritionem ita vitietur, vt inde tollatur membranarum motus, viarum, & fluidorum continuïtas, ad spirituum præsertim animalium, vsque in præcordia, descensum, illicò animal corruit, ac moritur,

*Magna capitis lesio, & parua interdum æquè lethifera.*

IV. Neque solùm ex magna cranij, cerebrique dedolatione, aut contritione, quæ contentis partibus motum, & vasis continuïtatem auferat, homines breuè moriuntur; sed interdùm ex leuibus quantumuis creditis capitis contusionibus, & concussionibus, ob occultam vasorum rupturam, cum ægri maximè conualuisse videntur, tunc subito perunt, rigore correpti. Ichor enim, aut sanies intrà membranarum, aut cerebri cuniculos colligi solet, acerrimamque, & planè veneficam, ex mora indolem nancisci, ob quam vniuersa cerebri, ac neruorum æconomia subuertitur; nimirùm, crispatis, aut syderatis neruis, & ruptis quandoque sanguiferis, vitale illud commercium cerebri cum corde, & cordis cum cerebro e vestigio intercipitur. Ita (a) Magnus narrat, nonnullos sternutantes, agitato violenter capite, disruptisque eo impetu me-

nin-

<sup>a</sup> Exerc. 8. de Tabac.  
*Quomodo ex sternutatione, mors subita.*

ningum vasis, subitò interijisse. Quod fanè à (a) Famiano Strada exemplo pistoris subur-rani confirmatur, qui, cum tèr, ac vicies sternuisset, vigesimo quarto sternutamento ani-mam efflauit. Qua de causa, nempe ob vitæ periculum, euenisse putat (b) Sigonius, (quan-quam à Famiano redargutus) vt, consueto iam diù more, salutem sternuentibus a Deo præ-cemur; scilicet, quòd multi tempore D. Gre-gorij Magni, cum sternutarent, repentè spi-ritum emittebant.

a lib. 3. prælect.  
4. cui titul. cur  
sternuentes salu-  
tentur.

Ex Famiano Stra-  
da exemplum.

b lib. 1. de re-  
gn. Ital.

Mos præcandi sa-  
lutem sternuenti-  
bus vnde.

V. Ab internis quoque causis lentæ in- cerebro congestiones fieri solent, quæ post-quàm diù ægros, nunc hemicraniâ, & so-pore, nunc mærore, & epilepsiâ, iuxta va-riam pressionis momentum, variamue inter-ceptorum succorum indolem, diuexarunt; de-nique, fortissimâ inductâ apoplexiâ, repentè iugulant.

Lentæ in cerebro  
congestiones tan-  
dem repentè iugu-  
lant.

VI. Nouimus Equitem Commendatarium ex familia de Puteo, qui floridioribus annis he-micraniâ, atque hæmorrhoidibus obnoxius, post quinquagesimum ætatis suæ annum in-certis animi motibus, mærore præfertim, exagitari cæpit, & paulatim ferè ad triennium suppressis identidem mariscis, iugi grauatuo circa tempus sinistrum dolore infixio, varias vices ex medentium auxilijs expertus fuit. Verùm, cum ex Lauretana Domo rediret, ( præcedente grauiore sincipitis dolore, ad si-

Historia mirabili  
confirmatur.

nistrum oculum protenso , vnâ cum animi  
 luctu ) Fulginei repente in leuem apoplexi-  
 am incidit , facie subpallidâ , tumentibus  
 palpebris, respiratione liberâ , nisi illam sicca  
 tussis frequenter interturbasset, quibus feбри-  
 cula per aliquot dies accessit ; a quo sanè  
 paroxyfmo , propter opportunam opem ei-  
 dem præstitam a Clarissimo Physico Nucca-  
 rino, antiquæ probitatis Viro, eoque nomi-  
 ne mihi coniunctissimo, vindicatus fuit. Ro-  
 mam deinde repetens occurrit nobis cum  
 siccâ tussi, meticulosior, taciturnus, obliuio-  
 sus ; quinimò decursu autumnii, & hyemis  
 1694. recurrentibus semel, vel bis in vno-  
 quoque mense apoplecticis insultibus, infeli-  
 cem planè vitam duxit. Tandem die 26. Ia-  
 nuarij 1695. cum se meliùs habere videretur,  
 fortissimâ correptus syderatione, subito inte-  
 rijt. In cuius cadauere præcipuum fuit ob-  
 seruare in posteriori hepatis parte, quâ dia-  
 phragmati adnectitur, tumorem folliculatum,  
 æruginosâ veluti argillâ plenum. Vndè se-  
 ptum transuersum eo loci subrufam coloris  
 labem contraxerat ; atque indè siccam tussim,  
 quâ æger tenebatur, profectam existimauim-  
 us. In Cerebro autem omnia piæ matris  
 sanguifera, ac lymphatica vasa penè in vari-  
 ces abierant. In ventriculis copiosa serositas  
 continebatur. Sed malorum summa latebat  
 sub dextera parte ossis frontis ; vbi dura, &

*Tussis sicca ex di-  
 aaphragmatis labe  
 ab hepate contra-  
 cta.*

*Lymphatica Piæ  
 matris varicosa:*

pia



pia mater in multam crassitiem euaserant, & finitimus cerebri cortex concreuerat in crudum abscessum substantiæ ferè polypeæ, & magnitudinis æqualis illi pomo, quod apium redolens appellatur. Interim profundior cerebri cortex, eiusque medullæ pars, quæ tumori substernebatur, adeò difflebat, vt puris crasim æmularetur.

*Ingens abscessus polypeus meningum et corticis cerebri.*

VII. Hoc fanè extispicium non tantum admirationem excitat, propter ipsam tumoris in cerebro collecti conditionem, quantum propter situm; vt, cum æger de grauiusculo sincipitis, & oculi sinistri dolore perpetuò quereretur, morbi causa in dextero meningum, cerebrique latere inuenta fuerit. De cuius phænomeni ratione plura differemus in scholio dissectionis cadaueris Illustrissimi Præfulis Spadæ.

*Doloris sincipitis et oculi sinistri in opposita parte delitescens causa.*

VIII. Nouimus item Eminentissimum Sacchettum nostræ, ac doctissimi iuxta, atque humanissimi Ioh: Trulli curæ traditum, simili congestione laborasse, cuius breuem tum historiam, cum extispicij descriptionem, a nobis exhibitam diligentiss. (a) Pacchiono (Iuueni virtutis, & ingenij meritis mihi iucundissimo) huc congruè transferemus. Vir igitur Eminentissimus sexagenario maior, a suppressa podagrâ melancholicus, immemor, atque epilepticus euaserat; sedulâ tamen curandi methodo, præsertim vini abstinentiâ,

*a Quam inferuit suæ dissertationi epist. de gland. et lymph: mening.*

hinc

*Hydatis insignis  
supra cerebrum.*

hinc sex supra annos vixerat; Tandem repente sublato, in eius dextera corticali cerebri parte versùs occiput, insignis hydatis, oui columbini molem adæquans, inuenta est, laxa, & lacera, quæ construi videbatur ex ipsamet pia meninge, suis potissimùm dilatatis, scissisque lymphaticis, interceptoque liquido. Quod sanè, vel nudis occurrebat oculis ex fluido intus contento. Erat enim lympham partim subtilis, & flava, partim in crassam veluti gelatinam conuersa. Vbi, quod mirabiliùs apparuit, id certè fuit, vt istius folliculi basis, cortex nempe cerebri, ad talem resistantem consistentiam deueniret, quæ planè scirrhusa videretur.

*Quid ex addu-  
ctis historijs dedu-  
catur.*

IX. Ex his verò duobus exemplis satis patet, obstructis paulatim sanguiferis, ac lymphaticis, posse in cerebro congeri tumores, intercipientes liquida, maximopere viscosa, simulque acria, vel quouis alio modo capiti, & nervis hostilia, quæ, ruptis tandem alicubi repagulis, per proxima vasa diffluant, & quaquauersum subitò diffusa, tum animalium spirituum crasim penitus inuertant, tum eorundem vias intercludant, & meningum, minimumq; cerebri motum, vnà cum vita penitus tollant.

X. Secundò, quanquam de viarum libertate satis dicat, qui de structuræ vitio agit; adhuc tamen monendum censemus, aliquando,

do, etiãsi vasorum in cerebro structura, nusquam appareat vitiata, fieri posse, vt celerimè mors inuadat, ratione solius repentinæ totalis pressiois, & obstructionis vasorum inferentium, ac referentium, nec non minimarum glandularum cerebri, ac cerebelli, quod præsertim obesis interdum accidere videmus, in quibus ob celerrimam sanguinis stagnationem non modò subita vasorum obstructio, sed subita quoque paralyfis membranarum, sinuum, totiusque cerebri corticis proficiscitur, cuius exemplum dabimus hist. I. illorum, qui hoc anno repentinè interierunt, de quibus etiam habitus est sermo superiùs cap. VII.

*Obesis repentina totalis vasorum intra cranium obstructio, facilis.*

XI. Facit pariter ad viarum interceptionem quidquid neruos, qui ad præcordia, & ad meninges feruntur, ita comprimere potest, vt animalium spirituum ad eas partes cursum penitus intercludat. Ita mulierem, quam aponia, & brachij paralyfis diù detinuerat, repentinè mortuam aperuimus, in qua nihil conspicuum inuentum fuit, præter scirrhosam glandulam, quæ sub cerebello, ad internum principium spinalis medullæ, prædictos neruos validissimè compresserat. Quid non etiam iidem nerui extra cranium obstructi, aut compressi, post aliquas præcordiorum passiones illatas, repentinam mortem inferre valent, quamuis nulla sensi-

*Nervorum ad præcordia, & meninges tendentium cõpressio mortifera.*

bi-

a De auris part.  
vfu cap. 5.  
Nobile Valsalvæ  
experimentum.

bilis causa in ipsis cadaueribus postmodum inueniatur? Constat enim per diligentissimum (a) Valsaluam, cordis nervos ad iugulum canis arctè constrictos, & illicò solutos, adeò in structura infensibili labefactari, vt canis intrà aliquot dies, eodem modo, ac si nerui illi amputati essent, indè moriatur, licèt ijdem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant. Quod sanè multò faciliùs potest contingere, si sanguis, per cor deuoluendus, ob minorem, quàm par est, fluxilitatem, ac volatilitatem, motui renitatur, quod hisce in casibus plerunque contingit,

Meningum, &  
cerebri motus mul-  
tipliciter ablati.

XII. Postremò, membranarum, & cerebri motus, vt de corde diximus, tolli potest, vel ob recens inductum structuræ vitium, quod ex magnis vulneribus, magnâue ossis depressione accidit; vel ob repentinam meningum, totiusque neruosi generis paralytim, quæ ex narcoticis, alijsque cerebrum afficientibus venenis oritur; vel si præhendat fortis, & pertinax conuulsio, quæ, omnia cerebri vasa strangulando, cursum sanguinis, lymphæ, ac spirituum illicò, & pertinaciter intercipiat; vt contingit in mortiferis epilepsijs, ac potissimum in magnis, ac subitis animi pathematibus, de quibus egimus cap. VI I. quæque in ipso statim cerebro vires suas lethaliter interdum exercent. Etenim,

Animi passiones  
cur lethales.

cum

cum huiusmodi animorum affectiones, per externos sensus a cerebro suscipiantur, si viscus hoc naturâ, morbo, vel ætate languidulum, simulque fluidum, acie, ac mole, intrâ cerebri vasa redundans, inueniatur, facilè, propter subitam vasorum omnium strangu- lationem, epilepticam apoplexiam inducunt, hominemque ex tempore tollunt; cuius pro- fectò rei euidens ante plures annos habuimus experimentum in Optimate quodam sene, ac valetudinario, qui, dum tranquillè alioquin cœnaret, improuisò accipiens nuncium de aduentu sibi neque grato, neque honorifico consanguinei sui, repentina syderatione sub- latus est. In huius verò dissecti cadaueris ce- rebro vasa vndique tumida ex intercepto, pro- pter subitum animi pathema, sanguinis, lym- phæque cursu, indeque cavitates tum sul- corum, cum ventriculorum vsque ad spina- lem medullam, exundante sero, repletæ oc- currerunt.

*Exemplo res illu- stratur.*

XIII. Ad eundem postremò censum spas- modicarum passionum cerebri, & neruorum splanchnicorum referri possunt dolores im- manes, qui ex artuum, sphacelo correpto- rum, amputatione oriuntur, si eâ, quâ non- dum mortui sunt, parte ( præsertim si de- biles fuerint ) resercentur; de quibus apud (a) Hipp. scriptum legimus, *Magnum periculum est, ne præ dolore in animi deliquium incidant.*

*Artuum sphace- latorum amputa- tiones interdum subitæ mortis cau- sa ex Hip.*

*a lib. de artic. m. 8.*

*Talia verò animi deliquia multos iam e vestigio peremerunt.*

XIV. Hæc de subitanearum mortium causis attulisse fatis duximus, ne liber in magnum volumen euaderet. Qui ad curiositatem explendam longiorem exemplorum feriem petierit, penum habebit paratam inter veteres quidem in vna Dominici Tirilli Tractatione de causis repentinæ mortis, qui sane Auctor fuit cum rebus philosophicis, tum Medicis ( vt temporibus illis ) fatis eruditus. Inter nostros verò in miscellaneis naturæ Curiosorum Germaniæ, in Boneti sepulcreto, & medicina septentrionali, alijsque compilatorum libris, qui priorum, recentiorumque observationes breui, & concinnâ methodo ad nos traduxerunt.

*Tirillus inter priscos egit de mortibus repentinis.*

\* \*

\*



*Subitanei morbi hactenus expositi ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem, ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quæ et simul plerumque concurrunt.*

*C A P U T XII.*



**V**T consulamus ijs, quos facile tædet multitudinis idearum, quæ veniunt concipiendæ, ad intelligendas posibles subitanearum mortium causas, earundemque operandi modos, opportunum censemus hoc loco tribus tantum malorum speciebus uniuersam hanc, penèque immensam rem solertè complecti, quæ quidè species sub genere morbi attoniti, & sensuum, respirationis, pulsusque officia plus, minusue tollentis comprehenduntur. Cum enim repentinæ mortes ex certis tantummodo repentinis morbis oriantur, horum sanè interimere potentes sunt.

II. Primò quidè, morbi omnes, qui, ex aeris vitijs, aut læsionibus instrumentorum, respirationi inferuentium, producti, con-

*Sub genere morbi attoniti tota res ista cõprehenditur.*

festim interficiunt; id fanè faciunt, quia vitam alterno aeris, & illius, quod in aere natat, corporis pabulo defraudant, ac proinde ad præcipitem suffocationem, aut præfocationem tutò referri debent.

*Aer sanguinem  
fecundat.*

*Prohibita respi-  
ratione, quomodo  
cor, & cerebrum  
ledantur.*

*Corde etc. affecto  
(in ijs scilt. qui su-  
bitò moriuntur) cur  
cerebri et pulmo-  
num motus sistan-  
tur.*

III. Cum verò aer reciprocâ inspirationis, atque expirationis lege, sanguinem obscuro, ac penè ignoto mouente fæcundet, eundemque clarâ nobis pulsione per venam pulmonicam versùs læuum cordis ventriculum vrgeat; idcirco, prohibitâ respiratione, statim vniuersa sistitur circulatio, indèque cor, & cerebrum, proprijs motibus destituta, necessariò in syncopem, atque apoplexiam incurrunt.

IV. Secundò, morbi omnes, ex sanguinis, aut cordis, magnorumque sanguiferorum vitio exorti, si ægros ex tempore interimant, id moliuntur, quia alternum cordi motum celeritè auferunt, ac propterea syncopem inducunt, ex qua facilè est concipere, quomodo cum cerebri, tum pulmonum motus continuò sistatur, seu quomodo apoplexia, & suffocatio ex necessitate succedant.

*Cerebro lesò, idè  
cordi et pulmonibus  
accidit.*

V. Postremò, maxima illa spirituum animalium, & cerebri mala, quæ subitam necem accersire posse probauimus, non aliò tendunt, quàm vt motum, ac sensum internis visceribus, externisque organis, & artubus non illicò solùm, sed omninò tollant, seu fortissimas apoplexias inducant. At

ve-



verò , positis huiusmodi apoplexijs , e vestigio motus cordis , atque pulmonum extinguitur , ac proinde syncope , & suffocatio necessariò suboriuntur.

VI. Sed non ipsa solùm infelix prædictorum trium successio malorum ; quin lethifera etiam eorundem complicatio ut plurimum , tanquam subitarum mortium causa , vno , eodemque tempore concurrit , tunc præcipuè , cum ab interno , fluidoque principio ijdem morbi dependent. Non enim humoralis causa , quæ , cum mouetur , e. g. potens est in cerebro inducere conuulsionem , aut paralysem eorum neruorum , qui ad viscera maioris vsus feruntur , hominem subito interimeret , nisi per eadem viscera cum sanguine diffusa , in corde syncopem , in pulmonibus præfocationem , in cerebro apoplexiam eodem ferè momento temporis plerunque machinaretur : Hoc sanè præcipuè apparebit ex ijs , quæ in obseruationibus trademus . Magna siquidem vitia fluidorum , statim cum solidis partibus communicantur , & vicissim solida , magnoperè labefactata , fluidas partes diù incolumes superesse non sinunt. Vndè scitè , prudenterque aiebat (a) Hippocrates , *Consensus vnus , conspiratio vna , consentientia omnia* . Quod certè non pro seruandâ solùm , sed pro destruendâ animalium œconomia intelligendum esse putamus.

*Magna liquidorum vitia solidis exitialia , & contra.*

a de alim. n. 4.

Re-

*Recensitæ Causæ subitanearum mortium  
inuincibiles, aut vincibiles  
existunt.*

C A P U T XIII.



*Præfocati etc.  
ad vitam natura-  
liter quãdoquẽ re-  
suscitantur.*

*Subitæ mortis ca-  
usæ non omnes in-  
uincibiles.*

*Inuincibiles quæ.*

Vemadmodum sæpè factum est, vt morbi, qui ad suffocationem, ad syncopem, vel ad apoplexiam referuntur, hominem inopinatò occiderint; ità non dubitamus, quin aliquis suffocatus, aut præfocatus, syncopè grauissimâ, vel fortissimâ apoplexiâ correptus; etiamsi pro mortuo habeatur, ac prædicetur; ad vitæ tamen officia, naturali interdum viâ, redire possit. Quare inter morbos, inopinatam subitamque mortem inducere potentes, alij penitus inuincibiles, alij verò, vel ipso negligentia, ac temporis beneficio, vel medicamentorum ope, vincibiles sint oportet.

II. Inuincibiles, hoc est omninò insuperabiles, ac verè, subitòque interimentes, sunt omnes morbi, qui, ex insigni aliquo intrâ præcordia, cerebrum, vel abdomen sanguifero vase, spontè, aut violenter disrupto, originem habuerunt; quique ex discissâ quomodolibet in iugulo, vel in artubus arteriâ, per quam vniuersus sanguis iam effluxerit, dependent.

In-

III. Inuincibiles quoque sunt, qui ex ablata continuatione cerebri cum neruis, praesertim cum scissio neruorum iungitur vulnere, ac discissioni arteriarum, & viscerum. Undè inter genera mortium expeditissimum aequè, ac certissimum illud est, à quo nemo vnquam euasit, capitis nimirum, vel trunci dissectio; nisi per lusum excipere velimus illum, quem lepidissimus inter etruscos Poetas fabulatur, medium ense acutissimo diffusum, morte nondum cognitâ, quippe partibus adhuc hærentibus, arma tractare non destitisse.

(2) *Così colui del colpo non accorto  
Andaua combattendo, & era morto.*

a Bern. in suo Poemat. ital. Orlando. innam. lib. 2. cant. 24. octau. 60.

IV. Inter subitaneos morbos, qui itidem sunt inuincibiles, numeratur quoque fortis apoplexia, quæ decrepitis accidit ob concursum duarum simul causarum, hebetudinem scilicet solidorum ad circumpellendum, ac defectum partium oleoso -- volatilium, quæ ipsa solida, fluidaque mobilia reddunt.

*Fortis senum apoplexia inuincibilis.*

V. Simile de illa syncope iudicium ferendum erit, quæ ab inductis paulatim erosione, polypo, tuberculo, lapide, & consimilibus, in corde, eiusque vasis, motum sanguinis inhibentibus, proficiscitur; de quibus aliqua etiam dicemus cap. XIX.

*Syncope pariter quæ ab erosione etc. inducitur.*

De-

*In genere, qui-  
nam morbi insupe-  
rabiles,*

VI. Denique paucis concludendo, causæ insuperabiles repentinæ mortis intrâ vires naturæ, vel artis, sunt omnes ij morbi, qui valent inducere integrum defectum sanguinis, vel tollere continuitatem cerebri cum nervis, aut cordis, & insignium sanguiferorum cum cerebro, alijsque magni usus visceribus, aut aliæ huius generis maximæ affectiones, quas sigillatim piget enarrare.

*Vincibiles a me-  
dentium Audacia,  
& naturæ vi, qui-  
nam.*

VII. Vincibiles verò appellamus improvifarum mortium causas, quæ, etiamsi plerunque viæ sint ad interitum, aliquando tamen, vel extrâ humanam spem, ipsâ curantium audaciâ, sed non planè temeritate, imò ipsius, (quod frequentius accidit) intromuentis naturæ energiâ, mirabiliter fugantur. Ad huiusmodi autem morbos ij præcipuè referuntur, qui à simplici, celeriterque facta obstructione, pressione, aut conuulsione instrumentorum, motui aeris, sanguinis, ac liquidi animalis inferuentium, dependent. Ita correptos apoplexiâ ex solo infarctu vasorum, vt Timocratem in Helide, apud (a) Hippocratem, interdum simplex curavit inedia, cuius beneficio, obstructo cerebro, non solum nihil additur; imò verò per validiorem inductam sanguinis subtiliationem, & motum, aliquid perpetuò detrahitur. Ita hystericas, & præfocatas, mortuis quantumvis adscriptas, per ipsam, quæ necem intulisse visa est, pa-

*Apoplexiam per  
inediam Curata a  
pud Hippo.  
a v. epid. hist. 2.*

*Rei ratio assigna-  
tur.*

*Hystericarum pa-  
roxysmi cur solæ  
temporis usuræ  
quandoq: superen-  
sur.*

roxyfmi diuturnitatem, aliquandò reuixisse comperimus; scilicet vsurâ temporis (cum cætera sana sunt) subtilissimum illud miasma, quod intrâ neruorum texturam interceptum, enormitèr conuellebat, sensim oleosis halitibus læuigatum, subtiliatum, ac circumpulsam effluit, liberumque reddit corpus, quod mortali tensione riguerat. Vndè prudens Medicus rarò tam abiectam de istiusmodi improuisò mortuis habere debet spem, vt sit omninò desperatissimus: nimirùm boni Medici erit ( dummodò internorum vasorum rupturæ, aut contumacissimæ obstructions, pressiones, aliæque prorsùs inuincibiles viscerum, neruorumque affectiones abfuerint ) subito fateri, quàm maximus timor, quàm minima sit spes, vt omnem absque famæ suæ detrimento mouere lapidem, ægrumque, si adhuc uiuit, ab orci faucibus possit eripere. Ita enim homo fit homini Deus, vt pulchrè aduertit <sup>(a)</sup> Tiraquellus, cum Medicus morti proximos, ac veluti adiudicatos, atque etiam quosdam, qui mortui putabantur, reddidit sanitati.

*Medici spes his in casibus qualis.*

<sup>a</sup> De Nobil. cap. 3 l. n. 434, & 597.



*De signis improvise mortis, & primò  
de simulatis, ac suppositis, seu  
supplantatis mortibus.*

C A P V T XIV.



Voniàm hætenùs qualesim-  
prouifarum sint causæ mor-  
tium ostendimus, exempla-  
q; ex parte tum fluidorum, cum  
solidorum, de quibus dice-  
re oportebat, subiecimus :  
iàm hinc, quibus signis non tam præfens, quàm  
imminens, ac futurus inopinatus interitus sit  
cognoscendus, breuiter inquiramus.

*Fictorum mortu-  
orum calliditas de-  
tegitur.*

II. Principio itaque non sum ignarus, va-  
ferimos inueniri homines, qui, vt faciliùs  
ex commeritis euadant supplicijs, macerato  
priùs per inediam corpore, eique inducto  
per sulphuris halitum squallore, iniectis itidem  
validis ad brachia vinculis, tandemque, blan-  
do epoto narcotico, aut spontè parumpèr  
coacta respiratione, subito mortuos se fin-  
gunt; quod, vt expeditiùs patrent, custodem,  
amicum, vel feruum, quo ex pacto, & con-  
uentu rem agant, sibi adsciscunt. Sed istos,  
planè irridendos, ac peiori deinceps pœna  
mulctandos, promptum est deprehendere, si  
eorundem denudata, atque excussa corpora,  
flagris, ferro, igneque, si opus est, tra-  
cten-

Etentur. Arterias enim, solutis vinculis, rursus in carpis micare; & respirationem, violentè coactam, in libertatem redire sentiemus. Quod Iudicum causâ monendum duximus, ut sint posthac, aduersus huiusmodi fallacias, cautiore.

III. Deindè improbi scelerum machinatores proprios sæpè hostes, vel alios, lucri causa, quantumuis planè innoxios, veneno, strangulatione, vel exili intrâ præcordia vulnerare perimunt; & mox ad veram necis causam occultandam, eosdem in flumen, aut puteum demergunt, vel per scalam præcipientes agunt; quò nimirum sponte, vel casu mortui palam iudicentur. Nunc, si quis particularia signa ad has, vel illas effictas, aut veras subitaneas neces detegendas, pro relationibus, præsertim in fori vsum, sedulus atquè curiosus exoptet, adeat <sup>(a)</sup> Fortunat. Fidel., & Quæstiones med. legal. Pauli Zacchiæ.

a lib. 4. de relat. medicorum per totum.

Nos enim hîc causas, & signa potissimum naturalium affectionum quærimus, non forenses coniecturas.



*Exponitur difficultas inueniendi certa  
signa, quibus dignoscantur qui  
natura, non arte pseu-  
do-mortui occur-  
runt.*

C A P U T XV.



Illa utique nec præterire volumus, nec debemus, quibus non hominum docemur calliditatem, sed vitia, dixerim, an suetos naturæ motus, quæ finit aliquandò, ut ij, qui nondùm mortui sunt, pro talibus habeantur.

II. Profectò non ex aliorum duntaxat historijs nobis innotuit, multos, qui decessisse credebantur, vel propè sepulcra euigilasse; sed nostro etiàm experimento id ipsum comprobatum recordamur in Viro nobili, adhuc viuente, qui viginti ante annos, cum ei iusta persoluerentur in Templo, ad motuum, sensuumque munia omnium cum terrore magis, quàm admiratione rediuit. Meritò idcirco exclamat (a) Fabius -- *Vndè putatis inuentos tardos funerum apparatus? Vndè quòd exequias planctibus, ploratus, magnoque sem-*



semper inquietamus ululatu? quàm quòd vidi-  
mus frequenter post conclamata suprema redeun-  
tes -- . Prudentèr igitur lege vetitum est  
quoscunque mortuos, & eos præfertim,  
qui repentè decesserunt, statim sepelire.

III. Horret meminisse <sup>(a)</sup> Vesalium, negle-  
ctæ olim Anatomes parentem, ad mulierem  
hystericam, quæ mortua credebatur, dissecan-  
dam accersitum, eò negligentia sua fuisse  
perductum, ut vix alteram nouaculæ impres-  
sionem adegerit, cum illa motu, & clamore  
se uiuam ostendit, quæ sanè res Virum odio-  
sum, ac detestabilem reddidit; idcirco nil  
prius sibi esse duxit, quàm se fugâ subtrahe-  
re. Sed ne sic quidem intestinum terrorem;  
ac carnificem, quo iudice, nemo nocens ab-  
soluitur, fugere potuit; mæstitiâ enim con-  
fectus non multò post, magno rei, et publicæ,  
& medicæ detrimento, interijt,

<sup>a</sup> Ex Parço lib.  
23. cap. 46.  
Turpis Vesalii ca-  
lamitas.

IV. Difficultas autem noscendi illos, qui,  
etiamsi mortui nondum sint, mortui tamèn  
apparent, exindè oritur, quòd motus alter-  
nus aeris, sanguinis, & succi neruorum per  
organa maioris vsus ( in quo sanè motu  
omnem vitæ rationem consistere dictum est )  
nostros aliquandò sensus propè fugit, ut ferè  
soli naturæ innotescat. Vicissitudo nanque  
motionis pectoris, docente potissimùm <sup>(b)</sup> Ga-  
leno, tam minima esse potest, ut, dum costæ,  
ad sternum pertingentes, non mouentur, sed  
so.

Cur pseudomor-  
tui difficulter  
mortuis distinguã-  
tur.

<sup>b</sup> 8. De admi-  
nistr. anat., & 4.  
de loc. affect.  
Illorum thoracis,  
& diaphragmatis  
motus, qualis.

*Cordis motus, qui-  
nam.*

*Pulsus cur habe-  
ant tactui imper-  
ceptibilem.*

*Eorum liquidi  
nervei motus.*

*Menti, & sen-  
sibus non omnia  
innotescunt.*

*a Quæst. Med. le-  
gal. præsertim  
conf. 79. n. 21.*

*Inter signa mor-  
tis certissima ca-  
daveris fetor, ex  
Zacchia.*

solum diaphragmatis centrum tantisper tre-  
trepidat, inermes oculos plerunque fallat.  
Sanguis itidè, (integris cæteroquin existen-  
tibus vasis, proprioque oleoso-volatili sale  
fluens) ob solam contractionem summarum  
venarum, & auricularum, nudamque cordis,  
quasi dixerim, iectigationem, tacitè interdum  
per ventriculos vrgeri, & per arterias, vt  
passim per venas, adeò lenitèr deuolui potest,  
vt vitalis hic motus pulsus in solis carpis  
exploranti penitèr abscondatur. Idem planè  
de neruorum liquido sentiendum, quod,  
cum fluidissimum suapte natura sit, exiguis  
adeò vndis per neruos præcordiorum non-  
nunquam agitari potest, vt reliquum illud  
minimum animalis vitæ igniculum, ferè nobis  
ignotum, conseruet. Vt enim non omnia in-  
corporea mentibus, ita nec semper sensibus  
omnia corporea manifestò patent; quibus  
fanè factum est, vt (a) Paul. Zacch. nullum,  
quod aliquando non fefellerit, præsentis mor-  
tis inuenerit indicium, præter cadaueris liuo-  
rem, æstuationem, ac fœtorem.

V. Sed quanquam qui de pseudo-mor-  
tuis iudicare debet, obscuram prouinciam su-  
scipere cogatur, & quotidianum, ac fre-  
quentissimum sit, creditum vulgo mortuum,  
re ipsa decessisse: nihilominus tamen non-  
nulla indicia speculari operæ pretium erit,  
quibus eos discernamus, qui syncope, aut  
for-

fortissimâ apoplexiâ detenti, occubuisse videntur.

*De signis, quibus pseudo-mortui a verè mortuis distingui possunt.*

C A P U T XVI.



Hoc antè omnia maximè aduertendum censemus, non semper Artis defectui; sed artificum, atque assidentium incuriæ plerunque adscribi debuisse, quòd ægri, nondum verè mortui, derelicti fuerint, ac vespillonibus traditi, idque potissimùm pestis tempore. Rogo itaque ne dum Medicos, sed etiam pios illos Religiosos, qui Romæ, atque alibi, ex instituto animam agentibus adsistunt, vt sequentibus indicatijs diligenter vtantur.

II. Porrò, vt Medicus faciliùs iudicet, an reuerà quis vitâ functus fuerit, omnium primò necis causas exploret, quæ si extiterint inuincibiles, de quibus egimus cap. XIII., liberè decernat, ægrum iam e viuis exemptum fuisse, cum vocem, respirationem, ac pulsum, breui etiamsi tempore, amiserit.

Quòd

*Authoris monitum.*

*Mortuus a pseudo-mortuo distinguitur primo ex prægressis causis.*

Quòd si contra causæ occurrant per se vincibiles, tunc acriori sensuum, rationisque criterio sibi opus erit.

*Secundò a sepulto  
respirationis, &  
cordis motu.*

III. Et quoniam absque voce, vsuque internorum, externorumque sensuum, ac motuum, a voluntate pendentium, vitam aliquandiu protrahere possumus; sine sepulta tamen, atque exili saltem respiratione, cordisque trepidatione non possumus; hinc iure meritò scriptores, daturi notas, quibus viventem a mortuo distinguamus, in superioribus hisce duobus maximè versantur.

<sup>a</sup> Loco cit. n.5. Quidquid in contrarium scribat Paul. <sup>(a)</sup> Zacch. qui exemplum adducit cuiusdam, quem grassante peste, dum vespillones, vt mortuum, ad destinatum locum asportabant, vitæ signa dedisse viderunt. Etenim quis ignorat, pestis tempore omnem rem nonnisi tumultuariè peragi; ac proinde leue duntaxat studium, ad discernendum veros a pseudo-mortuis, adhiberi.

*Respiratio sepulta  
quomodo exci-  
tanda.*

<sup>b</sup> Primo de morb. inter. cap. 58.

<sup>c</sup> De relat. med. lib. 4. cap. 1.

<sup>d</sup> Tertio de diff. resp. cap. 10.

*Lana ægri naribus  
ad mouenda.*

IV. Respirationem itaque sepultam, atq; inconspicua tentabimus, primò sternutatorijs acribus, ac vehementibus, quibus maximè fidentes inuenio <sup>(b)</sup> Hollerium, & <sup>(c)</sup> Fort. Fidelem. Secundò ipsius <sup>(d)</sup> Galeni consilio, paleam, tenuemque lanam ægri naribus suspendendo. Si nanque viuit homo, vicissitudine motus aeris, quantumuis lentissimi, lana mouebitur. Quod profectò experimentum

me-

memorat (a) D. Gregor. olim susceptum fu-  
 isse in Presbytero Ursino, cui, solutis mem-  
 bris, atque in morte distento, cum Presbytera  
 sua, si quid vitale spiramen inesset, naribus  
 appositâ curasset arte dignoscere, (magno cer-  
 tē ad honestatem tuendam argumento) fen-  
 sit, se ab ægro, collectâ voce, vehementer  
 obiurgari, *discede a me mulier; adhuc igniculus  
 vivit; paleam tolle*. Tertio, alij cereum,  
 exiguumque lumen ori, ac naribus moribun-  
 di applicant, cuius flamma si a recto fursum  
 tramite deflectat, ac tremula fiat, homo  
 etiamnum vivit. Quarto, absterfum specu-  
 lum ori apponunt, quod si paulò post ma-  
 culis fœdetur, de vita spes est. Quo fanè  
 speculo feliciter usus fuit (b) Albertinus Bot-  
 ton. ad explorandam superstitem vitam in  
 muliere patauina, quæ, hysterico strangulatu  
 correpta, adstantium omnium consensu mor-  
 tua existimabatur.

V. Tandem, cum ad ipsius motum dia-  
 phagramatis, quantumvis minimum, efficien-  
 dum, costas spurias, quibus illud alligatur,  
 moueri aliquo modo necesse sit; iure a pra-  
 cticis proponitur, vt, supino firmiter locato  
 ægro, cyathus aquâ plenus ad ima pectoris,  
 supra cartilagine[m] ensiformem ad perpendi-  
 culum ponatur. Tunc si cyathus, conten-  
 tumq; fluidum, vel minimum dimoueantur, in  
 viuis est, si secus, iam mortuus æger.

H

At

a Dial. lib. 4.  
 cap. 11.

b Lib. 1. de  
 morb. mul. cap.  
 45.

Cyathus supra  
 xiphoidem cartila-  
 ginem locandus.

VI. At enim verò huiusmodi superstitis respirationis indicia non obiter, atque oscitanter, sed consultò, ac repetito periculo adamussim sunt expendenda, ut prudentes de vita, vel morte ægri, nunquam pœnitendum, iudicium adhibeamus; contingit enim aliquando, ut certus motus tum abdominis, cum pectoris, etiam apud vitâ functos, excitari possit a naturali solidarum partium coincidentia, vel a præternaturali contentorum fluidorum fermentatione, flatuumque præsertim elatere: quibus forsitan factum est, ut minùs in arte periti, vitam cadaueribus attribuentes, non solùm falsi, atquè certè ridiculi interdum euaserint. Sed hæc omnia non tantùm præceptis, quantum usu, ac diligentia docentur.

*Motus etiam non vitales aliquando in mortuis.*

VII. Deindè ad lenem motum deprehendendum summarum venarum, auricularum, & cordis in pseudo-mortuis, longè maiori afficimur difficultate, quàm sit ea, in qua versatur quisquis notas exilis, ac sepultæ respirationis inquirat. Etenim thoracis machina, & circumfusus aer, qui alternè per tracheam in animalibus ducitur, reduciturque, nostris certè sensibus propinquiora sunt ipso corde, eidemque appensis arterijs, quæ, nonnisi tenuatæ, ad extrema corporis pertinent. Accedit, ad rei momentum, consuetudo explorandi pulsum in solis carpis; exin-

dè

*Cordis motus in Pseudo-mortuis quot modis sit perquirendus.*

dè nanque fit, vt, deficiente arteriarum ic̄tu priùs in carpis, quàm in corde, aut in aorta, maioribusque illius ramis, sæpè nonnulli de omnimoda cessatione motus cordis iudicium ferant, cum primùm in carpis pulsum desiderari cognouerint. Qua de re, vbi locus erit dubitationi, tunc motum cordis, & arteriarum non tantummodò in artubus quæremus, sed, inclinato languentis corpore in sinistrum latus, calidam manum regioni cordis admouebimus, exquisituri, an motus aliquis in corde supersit. Deindè validâ etiàm digitorum pressione tentabimus arterias carotides, quæ, cum diametro maiores sint ijs, quæ ad manus sparguntur, nec obliquè, & per angulum in axillis, sed rectâ ferantur ab arcu arteriæ magnæ versùs caput, gradum impetus sanguinis, etiamsi tenuissimum, a corde acceptum, faciliùs excipere, & explorantibus ostendere, possunt. Interim verò superstites apud præcordia vitæ scintillulæ omni arte, admotis quâ intrâ, quâ extrâ corpus cardiacis volatilibus, ac suaueolentibus, fouendæ, atque excitandæ erunt, vt in arteriarum pulsibus clariùs erumpant.

VIII. Enim verò, quemadmodum cauendum nobis est, ne occultò viuentem, propter imperitiam explorandæ reliquæ illius, quantumuis tenuissimæ, arteriarum pulsationis, inter mortuos reponamus; ita diligen-

*Carotides arteriæ  
ad superstitem  
pulsus exploran-  
dum cur aptiores.*

ter prouidendum, ne, vanâ opinione inuen-  
 ti pulsus, artem nostram in contemptum ad-  
 ducamus. Siquidem exemplum habemus cu-  
 iusdam, quem prudens reticeo, qui, cum  
 vni ex summis romanæ Aulæ Proceribus,  
 repente mortuo, & a nobis iam derelicto,  
 adsisteret, totâ strepente domo, nobisque sto-  
 liditatem illius mirantibus, Procerem etiam-  
 num viuere contendebat. Cumque nos cre-  
 dulitatis suæ causam sciscitaremur, pro signo  
 adduxit superstitem adhuc pulsus. Neque  
 sentiebat homo excors, pulsus, quem mor-  
 tuo attribuebat, sensum esse arteriarum pro-  
 priorum digitorum (erat enim feruidâ flui-  
 dorum crasi donatus) quibus cum arctissimè  
 premeret cadaueris carpum, cæteroquin ex-  
 carnem, & aridum, refluxum liberum ad  
 venas proprij sanguinis impediēbat, ideo-  
 que, suis arterijs validiùs ad extrema pulsan-  
 tibus, sibi, & domesticis errorem hunc ine-  
 ptissimè obiecerat.

*Quæ vitanda ne  
 quis pulsus mor-  
 tuo perperam at-  
 tribuat.*

*Sopitas nervorum  
 motiones excitantia.*

IX. Porro, vt redeamus ad pensum, nul-  
 lus sapiens, sedulusque Medicus curam ne-  
 gliget animalium spirituum, ac nervorum,  
 saltem splanchnicorum, medijs clamoribus  
 in aures, stimulis ad magis sensiles partes,  
 odoramentis, & acris volatilibus ori, ac  
 naribus adhibitis, alijsque, quorum syluam  
 nemo practicum non nouit, & de quibus  
 plura dicemus in secundo libro, vbi de me-  
 di-



dicamentis, quæ hoc anno ijs maximè profuisse visa sunt, qui, subitaneis morbis tentati, feliciter euaserunt.

*De signis medicis, quibus repentina mors prænosci potest.*

C A P U T. XVII.



NON utilis modò, sed maximè necessaria Medicis videtur scientia præcognitionis repentinæ mortium, cum nostræ (a) Præceptor Artis

a Hipp. in vestib. lib. progn.

clarè ostendat, eum non solum culpam vacaturum, verum etiam boni Medici nomen, atque admirationem consecuturum, qui, cum omnes sanos facere non possit, futura saltem præsentiat, atque prædicat. Hanc itaque spartam ornaturi, illud in primis cauendum ducimus, ne quis tanti putet notas, quas subnectimus, ut eas vel omninò certas, & ut aiunt, pathognomonicas credat, vel sine delectu, ac singillatim accipiat. Si quod enim in vniuersa medicina difficile, arduumque negocium, hoc procul dubio in ferendis futurorum iudicijs locatum est. Multa siquidem varijs anni tempestatibus, ægro-

*Summa prudentia in arte medica est necessaria.*

a Lib. 2. predic. n. 3.

ægrorum continentia, vel incontinentia, lætis, aut tristibus animi pathematibus mutantur in melius, aut in deterius; ut proinde etiam ad rem medicam pertinere putauerim, quod in Iuris doctrina passim usurpatur, nempe vel totam esse prudentiam, vel sine prudentia exerceri non posse. Atque, hinc <sup>(a)</sup> Hip. voluit Medicum tum in cætera arte, tum in prædictionibus consultissime se gerentem, ac probe intelligentem, eum, qui prædictionis successum consecutus sit, apud prudentem ægrum admirationi fore, qui verò deerrauerit, præterquamquod odio grauabitur, eum ne insaniam quidem suspicionem effugere posse.

*Prudentia quomodo aquirenda.*

II. Ut igitur Medicus, præfagiturus inopinatas mortes, in ipsamet coniecturali arte verax, ac propè securus euadat, primò, multis aliorum, & proprijs obseruationibus diligenter studeat; deindè ex tota signorum messe manipulos quasi colligat, & ad suas quosq; classes reducat, ut postmodum, cum occasio postulat, maturè, ac studiosè recogitando, & cogitata cum rebus conferendo, cautus, ac prudens pronunciet.

*Internæ varices cognitu difficiles.*

III. Nemo autem interea in spem erigatur, dari signa, quibus omne genus improuisæ mortis præsentiri, ac prænunciari possit. Etenim, quæ ab internis, sed cæcis, nullaque indicia producentibus, principijs veniunt, ut inter alia sepultæ in ventribus venarum

varices existunt, eæ quidè m Medicis rarò innotescunt. Illæ duntaxat nobis aliquatenùs patuerint, quæ fluunt a morbofis dispositionibus partium tum solidarum, cum fluidarum maioris usus, a quibus, vt munus ritè suum peragentibus vita, & salus, ita, deerrantibus, morbi paulatim inducuntur, primo quidè m aspectu leuiore, sed qui tandem, aceruatim erumpendo, inopinatò solent interficere.

IV. De singulis suo tempore, nunc dicimus de vniuersis; vnum postremò summæ necessitatis huic loco adijcientes, scilicet non quemcunque ægrum, cui subitanæ mortis periculum imminet, de eodem esse commonefaciendum. Etenim omnes quidè m homines, etsi seuerioris virtutis, animi tamen affectionibus sunt obnoxij, eisdemque aliquatenùs perturbantur; ast ij maximè, qui vehementèr timidi, atque imbecilles existunt, quos ipsamet mortis opinio, aut in mortem, aut in mortis discrimen adducit. Hinc rectè

(a) Galenus alitèr cum sapientibus, alitèr cum timidis, & stultis agendum esse consuluit; & (b) Hippocrates multò priùs scriptum reliquit, pleraque futurorum ægroto occultanda esse. Sed interdum fit, vt, contrariâ penitùs ratione, generosis Viris subitanæ mortis periculum sit enunciandum; vt timore ad ea flectantur vsurpanda remedia, quæ aliàs nimis fiden-

*Cuilibet egrotanti  
mortis periculum  
non est aperiendum.*

a 6. epid. sect. 2.  
comm. 43.

b de decent. ornat. n. 9.

fidenter spernere consueuerunt.

*Mors repentina  
quibus potissimum  
accidat.*

V. Quoniam verò repentinæ mortes ijs potissimum solent accidere, qui morbos aliquos, vel propter symptomatum leuitatem, vel propter assuetudinem, sibi familiares redditos, facile despiciunt, sperantes, se aut sola naturæ ope conualituros, aut nonnisi præuiâ longi agonis admonitione fore decessuros: idcirco vnumquodque futuræ mortis indicium, ex vnoquoque genere huiusmodi malorum erit depromendum.

*Eius signa ex quibus  
fontibus haurienda.*

VI. Itaque eodem planè ordine, quo repentinæ mortis causas persecuti fuimus, utemur etiam in examine signorum, quæ eadem neces nobis portendunt, distinguentes huiusmodi notas; primò in eas, quæ colliguntur ex læsis instrumentis respirationis, & aere; secundò in illas, quæ veniunt ex affecto corde, magnis vasis, & contento sanguine; tertio in reliquas, quæ proficiscuntur ex morbis cerebri, neruorum, atque liquidi eorundem.



*Agitur de signis futurae mortis repentinae,  
petitis ex laesione instrumentorum,  
respirationi famulantium.*

C A P U T XVIII.



Inter notas, quibus repente  
futurus indicatur interitus,  
non vltimum locum tenent  
illae, quae ex laesione pecto-  
ris, & pulmonum deducun-  
tur.

II. Primò sanè ortophnæa cum tussi apud  
Senes, si diù humida persistens, statim mu-  
tetur in siccam, morbo interim de sua vi  
nihil remittente, improuisam necem, vt plu-  
rimùm, præfagit: scilicet quòd lymphæ co-  
pia, quæ, suppressâ anacatharsi, in pulmo-  
ne, iam languido, atque obstructo subsistit,  
facilè parit suffocationem, præsertim, si  
æger intemperantiùs, aut incontinentiùs vi-  
xerit.

*Diuturna tussis  
humida in siccam  
conuersa, quando  
exitialis.*

III. Secundò tussis molesta, & suffocatiua  
ex acri latice, per glandulas arytænoideas, tra-  
cheæ, & bronchiorum affatim secreto, si  
magno cum impetu identidem recurrat, mor-  
tem subitam portendit, præcipuè si æger,  
vel senex, vel languidus, atque etiam in-  
vitæ regimine sit aliquantò liberior: apople-  
xia nanque pulmonum, quam suffocatiuum

*Suffocatiua quo-  
modo.*

*Pulmonum apo-  
plexia mortifera.*

a 2. De morb. n.  
52.

catarrhum dicunt, ab irritantium ferofitatum confluxu, & articulorum pulmonum conuulsione, vt cum <sup>(a)</sup> Hippocrate loquamur, producitur. Quod fanè mortis genus nos frequenter vidimus, & primùm quidem, supra viginti annos, in Carolo Petrazzino aromatario ad Capitolij radices; is enim, cum senex effet, atque huiusmodi tuffim sperneret, mediâ tandem nocte, vt eidem prædictum fuit, suffocatus interijt.

Interni pectoris  
dolores quinam,  
lethales.

Ex ijs, qualis mor-  
bus latens argua-  
tur.

IV. Tertiò interni pectoris dolores, qui modò spirandi difficultatem, præsertim per accliuia, modò cordis angorem, sæpè pulsus inæqualitatem comites habent, quique non sinunt ægrum in vtrumque latus æquali facilitate decumbere, & corporis gracilitatem inducunt, ex tempore solent interficere, præcipuè si ægri subeant violentos aliquos corporis motus, parùmque laudabili cibo sese ingurgitent. Gerunt enim sepultum plerunque in altero pulmonum lobo tuberculum, vel aliam congestionem, aut venæ pulmonicæ dilatationem, quorum, propter repentinam rupturam, aut propter inductam quaquauerfum validissimam conuulsionem, liber transitus per cor, & pulmones tam sanguini, quàm aeri ocyssimè tollitur. Quam certè moriendi viam non pauci inierunt ex ijs, quos nouimus; atque horum numero adscribendus videtur Doctor Medicus Vinciguerra,  
qui

qui elapso anno, cum diù leui anhelitu, sepul-  
tisque in pectore doloribus vexatus fuisset,  
tandem intempesta nocte, domesticis, ac Sa-  
cerdote vix accersitis, e viuis sublatus fuit.  
Vide quæ scripsit experientissimus (a) P. Po-  
teri de ijs, qui illicò moriuntur ob ru-  
pturam venæ pulmonicæ iuxta sinistrum cor-  
dis ventriculum; illi enim respirandi quâdam  
difficultate, deambulantes, corripuntur, & ob  
præcipitem virium lapsum, propinquis tenen-  
tur niti adminiculis.

V. Quartò magis adhuc repentina mors  
prædici potest in consimilibus casibus, si id,  
quod in pulmone congeritur, fuerit de natu-  
ra vomicæ, quæ potissimùm cognoscitur ex  
sicca tussi cum fætore quasi cadauerico, quem  
ægri, aerem educendo, identidèm sentiunt.  
Rumpitur enim incerto alicubi tempore, cum  
erosus, vel nimium distractus fuerit follicu-  
lus, & plerunque occiditur, dictum factum,  
homo, vt scripsit (b) Tulpius. At enim ve-  
rò, si huiusmodi morbus hominem corripit,  
qui se in cibo, potuque contineat, noxium-  
que aerem præcaueat, tunc neque magnam  
in molem augetur, neque semper ex tem-  
pore diffilit, aut si diffiliat, subitam ne-  
cem afferre solet. Quinimò nonnullos super-  
stites, atque sanos, vt (c) Willisio contigit,  
nos etiam vidimus. Secus atquè, si æger  
bacco, & genio indulgeat, tunc Medicus,

a Cent. 3. obs.  
cap. 22.

*Venæ pulmonicæ  
rupturam quænam  
præcedant ex Pote-  
rio.*

*Ex pulmonum vo-  
mica repent: mor-  
tis prædictio.*

b Lib. 2. obser-  
cap. 10.

*Quinam supersti-  
tes.*

c De morb. pect.  
sect. I. cap. 11.

ratione contrariâ , securius iudicium de subitaneo interitu pronunciare poterit .

*Asthma conuulsiuum aliquando mortiferum .*

VI. Quintò cum ad motum thoracis tan-  
tooperè nerui concurrant , fit aliquandò , vt  
conuulsiua asthmata ad repentinam necem  
deducant ægros , qui , antiquato iam malo ,  
putant se miserè viuere , si medicè uiuant ,  
morbumque propterea nouo morbo cumulan-  
tes , externâ plerunque accedente causâ , re-  
pentè moriuntur .

*Ex anni tempesta-  
tibus, quæ ad subiti-  
tam mortem du-  
cant .*

VII. Tandèm cum in respirationis ma-  
teriem veniat aer , & quidquid in aere la-  
titat , non immeritò intèr subitanæ mortis  
signa reponendas esse putauerim particulares  
quasdam tempestatum , aerisque affectiones ,  
quippè quæ multos , lentè cæteroquin ægro-  
tantes , repentè solent occidere , & quidèm  
non vi primarum tantùm , vt aiunt , qualita-  
tum , sed pulsu , & variâ mixturâ particula-  
rum , quæ miris modis nostrarum partium  
officia variant , atque perturbant . Sagax ita-  
què , & peritus Medicus vtatur consilio  
Hippocr. , qui sparsim docet , ex magnis tem-  
porum mutationibus mala præaffectis iam cor-  
poribus euenire . Sed clariùs de subitanis  
mortibus loqui videtur (a) in libro de  
aere , locis , & aquis , cuius sanè integrum  
hîc textum , vtpotè plura docentem , tran-  
scribimus -- *Præcipuè verò maxime anni tem-  
porum mutationes obseruandæ sunt , vt neque me-  
di-*

a n. 3.

Locus Hipp:



dicamentum purgans iubentè exhibeamus, neque partes circa ventrem uramus, aut secemus, ante dies decem, aut etiam plures. Maximè tamen sufficient decem. Ac maximi periculi plena sunt ambo solstitia, præcipueque æstium. Periculosissima etiã ambo æquinoctia existimantur, maximè verò autumnale. Syderum quoque ortus obseruandi, præcipueque canicula, deinde arcturi, & vergiliarum occasus. His enim potissimùm diebus morbi iudicationem subeunt, & alij quidè perimunt, alij verò desinunt, alijque omnes in aliam formam, & statum transeunt. -- Et reuerà multos ordinario etiam rerum cursu in æquinoctijs, & mediã potissimùm æstate, summoque hyeme repentè mori obseruamus.

VIII. Qua de re Medicus, iunctis causarum, & signorum ideis, non admodùm difficultè aliquem inopinatò moriturum poterit diuinare, si illum, fractis viribus, ex diuturno morbo partium maioris vsus, circa prædictas magnas temporum mutationes, deterius affici animaduernerit. Nequè profectò aliter iudicet de ijs, qui salubre cœlum mutant in pestiferum, cum potissimùm ipsi valetudine non admodùm prosperã freti fuerint.

*Probi aeris in deleterium mutatio mortis causa.*

IX. Sed quoniã multa symptomata, quæ ad respirationem pertinere viderentur, radicem omninò morbosam habent in ipso corde, eique appensis vasis; idcirco sequen-

ti capite, acturi de signis, desumendis à corde, & sanguiferis, perstringemus nonnulla etiam indicia, quæ subitanam mortem præfagiunt, læsâ etiam respiratione.

*De signis futuræ subitanæ mortis  
à Corde, Magnis Vasis, &  
Sanguine.*

C A P U T XIX.

*Ex cordis &c. affectionibus, plura  
subitæ mortis præ-  
ludia.*



T latam hanc, confusamque materiem certis capitibus distinguamus, placet hujusmodi notas deducere, primò ex pulsum vitiis, secundò ex palpitatione, aut dolore cordis, tertio ex animi deliquiis, quartò ex hæmorrhagiâ, atque aneurysmate, quintò ex habitu plethorico, & obeso, tandem ex quarundam suppressione euacuationum.

II. Illud verò antè omnia hîc aduertimus, recensitas passiones tam cordis, & magnorum vasorum, quàm sanguinis, & omnium fluidorum, quæ cum sanguine circumferuntur, vel à sanguine separantur, subitanum interitum vix unquam indicare posse, cum eadem seorsum, & singulæ ægros diue-  
xauc-

xauerint. Experimento enim docemur, has notas tunc improvisò morituros præmonstrare, cum inter se variè permixtæ fuerint. Undè diligens Medicus, rectè diuinaturus, ne utique quam celeritèr pronuntiabit, sed maturè signa coniunget, vt nos cap. xvii. jam ostendimus, id quod pluriès in lib. de progn. inculcavit Hippocrates, quandò signum aliquod lethale esse decernit, sæpè repetendo, *sed oportet alia signa contemplari.*

III. Et quidem primò quantùm spectat ad pulsuum vitia, etiamsi apud aliquos inæqualitas, atque intermittentia tanti fiat, ut indè (a) Gal. subitam mortem Antipatro prædixerit. Nos tamen signum hoc non solum in pueris, & senibus, ut idem asseruit Galenus, sed etiam in iuuenibus, & robustis frequenter nullo modo funestum obseruauimus, cum scilicèt ex levi connutrito organorum vitio, vel ex hypochondriorum irritatione procedit, cuius forsitan indolis extitit intermittentia pulsus illius Oeconomi, quem ipse (b) Gal. tanquam sanum ad consueta negotia ingenuè remisit. Etenim si sola pulsus intermittentia hominem, benè cæteroquin valentem, detineat, adeò optimos Medicos à subitaneæ mortis præfagio dehortatur, ut potiùs eos in spem adducat, leve illud malum, antequam grauius euaserit, opportunâ medelâ fore tollendum. Huius veritatis ex me met ipso experimen-

*Signis non seorsim sed collectim sumptis tutius repentina mors prædicatur.*

a 4. De loc. affect. cap. vlt. & 3. de præfag: ex puls. cap. 4.

*Pulsus intermittens non semper funestus.*

b De præfag. ad posth. cap. vlt.

*Proprium experimentum.*

*Quando periculofus.*

rimentum promam, qui, cum tria ante Iustra pertinaci, mihiq; sensibili cordis contractione, indeq; ortâ pulsus intermittentiâ, ex hypochondriorum consensu, per sexennium laboraverim, plûs aliis, quàm mihi officiosus, & cautus, usu tandem rhabarbari, chalybis, & juris viperati, perfectè convalui. Ut igitur intermittencia pulsus improuisæ necis certius omen esse possit, necesse est, ut jungatur omni inæqualitatum generi, palpitationi, anhelitui, aliisque similibus pectoris passionibus, de quibus infra.

*Pulsus tarditas quando exitialis.*

*Indicium futurae cordis paralysis.*

*a Deflat. n. 20.*

IV. Pulsus utique tarditas, si eadem, singulis ictibus languidè recurrens, alterius pulsationis intermedium tempus ferè totum pertinacitè absumat, probabilius exhibet inopinatæ mortis indicium; præsertim si patiens debilis, ac senex fuerit, ut sæpè nos experti sumus. Etenim quæcumque sit causa, scilicet vel simplex (quod rarò evenit) ex defectu animalium spirituum, in præcordia descendentium, vel mixta ex fœculento, minùsque mobili, per cordis ventriculos, sanguine, semper talis pulsus integram, firmamque eiusdem cordis paralyfim, aliquando futuram, præmonstrare solet, maximè tempore somni, quo, instrumentis languidiùs pellentibus, idem sanguis (etiam subobscurè agnoscente (a) Hippocr.) tardiùs mouetur.

V. Secundò palpitatio cordis, ipsa quoque

que subitæ mortis fit prænuncia, si fuerit frequens, si magna, si cum anhelitu, animi deliquiis, omni genere inæqualitatum pulsus, tandem si æger congruâ vitæ ratione minimè utatur: Etenim, si hæc symptomata magnâ ex parte simul conspiraverint, significatur, magnum quoque dari vitium in corde, aut summis vasis, cui accedente aliquâ causâ procatarticâ, nullo labore motus ipsius cordis, & sanguinis ex tempore lethaliter sistitur. Quemadmodum verosimile est, Galenum, iis admonitum indiciis, toties decantato Antipatro improvisam, quam postea subiit, mortem prædixisse.

*Cordis palpitatio  
perniciosa, quæ.*

VI. E contrario autem, si palpitatio oriatur ex causa, cordi obstinatè nequaquam adjunctâ, sed cum fluidis circulante, ut plerunque esse solet acerrimus ichor, vel quidquid aliud, quod, ad irritandas cordis fibras, planè fugitivum, pertingit; rarò abrumpendam illicò vitam minuitur. Multos proptereâ novimus, qui à recurrentibus palpitationibus, evacuata copiâ stranguriosæ urinæ, penitus liberati fuerunt; e quibus Illustrissimus Præsul Bonaventura, Sanctiss. Domini Nostri intimus Cubicularius, & Eleemosynarius, splendore generis, & propriis virtutibus, laudatissimus: Latex porrò salino-acer ab hypochondriis maximè redux, ità interdum cordis musculos convellit, ut stranguriosum veluti tran-

*Quoniam minime  
periculosa.*

*In his Urina  
stranguriosa salu-  
taris.*

fitum sanguinis per eiusdem ventriculos cum palpitatione producat .

*Diuturnus cordis dolor in senibus subitam mortem significat ex Hipp.*

VII. Dolor similiter cordis, præsertim in senibus, sæpiùs recurrens, inopinatam necem solet indicare, juxtà illud Hippocratis in *Coacis, Cordis dolor, seniori sæpiùs consuescens, repentinam mortem significat*. Vel enim sumatur hæc passio pro molestâ ipsius cordis, & orificiorum eius sensatione, vel pro affectione ventriculi, quæ secum trahat ipsum cor, & græcis cardiogmos vocatur: utroque sanè modo res est subitanei periculi plena, præsertim apud senes. Inuisimus olim Virum, cui, cedente iam podagrâ, atrox cordis dolor identidem recurrebat; is repenti, oborta suffocatione, circa Æquinoctium, sublatus est. Similem offendimus historiam apud (a) Hollerium cuiusdam septuagenarji, cui dolor iste cœpit esse frequens cum angustia spiritus, & suffocationis periculo, is etiam, domum rediens, repenti obijt .

a In Comm. I. lib. 3. coac. sect. 2. coac. 17.

*Idem portendit cardiogmos.*

b Lib. I. prædict. n. 9.

*Hipp. autoritas & rationes adducuntur.*

VIII. Nequè dubitandum, quin dolor ventriculi, cardiogmos dictus, sæpèque rediens, si ex summoperè pravis humoribus, in ægro delitescantibus, oriatur, inopinatae mortis unà simul causa, & signum esse possit: rectè siquidem admonebat (b) Hippocrates ijs verbis, *Oris ventriculi dolor cum præcordio distento, & capitis dolore, malignum, & quidpiam anhelosum. Nam ij repenti moriuntur, velut*

*lut in Dysode*. Significatur enim in eo corpore liquida eoufque acria redundare, ut veneficam naturam induerint. Etenim, quemadmodum arfenicum, sublimatum, aliaque hujus generis venena, villos, & fibras erodendo, convellunt ventriculum, & cor, ac propterea citam necem inferre solent; ita multò faciliùs, ac celeriùs ingenita ista venena aliquando interimunt; nimirùm quia interiùs collecta, & naturalibus fluidis recenter admixta, expeditiùs per canales quaquaversum feruntur. Quorum fanè veneficorum succorum prænuncia signa existunt dolor ventriculi, ad præcordia propagatus, cum distensione, & anhelitu, pertinacitèr atque identidem recurrens. Confer huc quæ scripsimus cap. v. hujus libri versus finem.

IX. Tertiò, inter signa futuræ mortis improvise, illud nostris, aliorumque experimentis magis certum, comprobatumque est præfagium, quod <sup>(a)</sup> Hippocrates in hanc sententiam exponit. *Qui frequenter, ac fortiter sine causa manifesta delinquant animo, repente moriuntur.* Vbi vna est omnium Commentatorum, ad usque clarissimum Lucam Tozzium, sententia, vt, pro veraci hujus prognoseos exitu, tria simul conjungantur; primò, vt frequenter; non enim fati est, aliquem semel duntaxat in anno viribus cecidisse; secundò vt fortiter, nempè usque ad syncopis confi-

a 2.Aph.41.

In animi deliquio, vt subita mortis sit præfagium, tria requiruntur.

a 6. De cord. n. 4.

*Cordis robur, aut  
imbecillitas sæpè  
timoris, aut auda-  
ciæ causa.*

nium; denique, ut id absque causâ manifestâ, hoc est obuiâ, & externâ contingat. Ità enim significatur, magnum, fixumque aut cordi, aut finitimis partibus hæere malum, quod, motum præcordiorum, & sanguinis penitus tollens, subitam necem aliquando sit illaturum. Etenim non rarò in corde, quod passim, etiam in reliquis muscularibus partibus, accidit, ut modò pauciores, & laxæ, modò numero, ac vi maiores fibræ, vasaque influentia, & refluentia cum congrua proportione, aut sine ea ad suam integrandam structuram concurrant; profectò in istis casibus, fortissimus musculorum (ut cor ab <sup>(a)</sup> Hippocrate appellatur) ad naturales systoles minori, vel maiori, quàm par est, vi erigitur: undè talis orta imbecillitas, vel extraordinarium robur, non solùm tempore contrahit morbos, quibus ad frequentes, fortesque animi defectiones, subitæ mortis prænuncias, deducitur; sed homines vel nimium timidos, vel nimium audaces potissimum constituit, quorum sanè priores, utpote maximè pusillanimes, improuisum, ac vehemens pathema sæpè deicit, ac prosternit; eò quidem faciliùs, quò animi passio inceptum, occultumque in præcordjis malum, veluti pessimam interitus radicem, inueniat.

X. Quartò cum nulla frequentior sit via, per quam repentè de medio tolluntur homines,



nes, quàm larga profusio sanguinis intrò, vel extra corpus: idcirco secura etiam, & certa repentinæ mortis indicia à Medico peti poterunt ex signis, quibus docemur imminere rupturam summorum vasorum in thorace, utero, intestinis, hæmorrhoidibus, alijsque internis sedibus. Sed inter signa non dubia properæ mortis in hæmorrhagijs, illud sanè est, quod tradidit <sup>(a)</sup> Hippocrates in Coacis, inquiens; *Si quibus sanguis effluxit, rigor superveniat, & ulcera maligna sint, ij, vel loquentes, inopinanter moriuntur;* Hoc passim in vulneribus capitis, in carcinomatibus sanguifluis, aut malignis alijs ulceribus usu venit, scilicet, ut, cum ægri, post hæmorrhagias, rigore corripuntur, (dissipata dulci ac volatili sanguinis parte, & fermento quodam acri, ac penè venefico ad præcordia, & cerebrum reassumpto) subito vitam deserant.

XI. Enim verò, postquam frequentiora reddita sunt humanorum corporum extispicia, quibus antiqui, præ horrore, parcius utebantur, nobis clarè innotuit, multos, qui ex tempore moriuntur, internis aneurysmatibus, aut varicibus laborasse. Certissimum propterea sollicitæ necis signum deducemus ex semeiotica varicum, atque aneurysmatum, quæ paulatim ad talem, tantamque exilitatem sanguinea vasa redigunt, ut aliquando, momento temporis, disrumpant. Et quidem hîc  
loci

*In hæmorrhagijs mors inopinata, quando, ex Hip: a Iuxtà diuision. Holler. lib. 4. sect. 2. coac. 3.*

*Frequens cadauerum sectio ignotas aliquot subitæ mortis causas detexit.*

*Interna aneurysmata ut incontinentes subito, ita sobrios lentè interficiunt.*

loci dissimulare non possum, sæpè experimentis comperjisse, aneurysmata illos potissimum ægros inopinatò interficere, qui minùs continentem, frugalemque vitam ducunt; eos verò, qui parcè, sobriè, continenterque vivunt, aliud morbi genus, ac lentus, ut plurimum, subortus hydrops, longo cum agone, solet interimere. Quare Medicus, etiam, iuxtà ægrorum mores, ac vivendi consuetudines, judicia sua prudenter disponat, & proferat.

*Athletis quando idem eueniat.*

a p. aph. 3.

b Lib. 2. cap. 2.

*Duplex mali euentus causa.*

c Lib. de flat. n.

17.

XII. Quintò, ex habitu athletico nulli dubium erit, quin repentinæ quoque mortis indicia desumi debeant, quoties athletæ, non solùm bonum habitum sine mora, juxtà (a) Hippocratis præceptum, minimè solverint, anticipantes humorum diminutione discrimen; verùm etiam lautâ mensâ, somno, atque otio pleniùs saginentur; quem sanè pleniorum, & coloratiorem corporis habitum, iure suspectum bonum appellauit (b) Celsus: etenim athletarum plenitudo, cum ad summum devenerit bonitatis, duplici via citam mortem minatur, tum quia vasa intùs, forisque infarcit, ac premit, spatiumque propterea fluidorum motui, ac miscelæ aliquando penitùs aufert; tum vel maximè quia eadem sanguinea vasa disrumpit, ubi minor illorum resistentia, vel major sanguinis impetus occurrit. Vndè ad rem scripsit (c) Hippocrates

com-

*compressus sanguis sua copia, quâ maxime compressionem fecerit, venas perumpit.*

XIII. Ad hoc ipsum genus signorum refertur etiam obesus, ac nimium pinguis habitus, de quo sane idem locutus est (a) Hipp. dum inquit, *qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quam graciles; ij enim vasa omnia, propter nimiam pinguedinem, ita habent compressa, atque exilia, sanguinemque, propter volatilium spirituum penuriam, adeo lentescentem, ut eiusdem circulationis, minimo interdum negotio, repente intercipiatur.* Quorum exempla nemo medicorum proprijs experimentis plura non congeffit, præter innumera, quæ passim a nostris collectoribus referuntur; ut in ijs commemorandis tempus terendum non sit. Illud tamen prætereundum nobis minimè videtur, in huiusmodi athleticorum, pinguiumque habitu, tunc præcipuè subitam mortem a sedulo, docto que Medico diuinari posse, cum apparuerint faciei, & oculorum color mutatus in liuidum, respirationis difficultas, cordis angor, motuumque impotentia, venter, aut vertigo.

a 2. aphor. 44.  
*Obesi cur repente nam mortem præ gracilibus incurrant.*

*His imminens mors unde dignoscatur.*

XIV. Tandem non aspernanda venturæ ex abrupto mortis indicia colliguntur ex suppressis criticis euacuationibus, aut decubibus tum sanguinis, tum fluidorum quorumcumque a sanguine secedentium. Etenim sæpè accidit, ut vitiosa fluida, vel reassumpta, vel

*Crisis suppressa, ubi subitæ mortis prænuncia.*

vel non vltra propulsa lethalitèr subsistant in cerebro, & præcordijs. Pauca hîc sub exemplo fumamus.

XV. Puerperam improvise decessuram, penè tutò poteris pronunciare, si pravis humoribus redundans, interdum præfocetur, lochiaque, odorum olfactu, continuò introrsum reuocentur; ad cor enim subito resiliunt, & ad cerebrum ascendunt; atque utrobique lethiferam stationem inducunt.

*Hæmorrhoides  
item senum sup-  
pressa.*

XVI. Simili prognosi uti poteris in suppressis hæmorrhoidibus apud senes, qui illorum fluxui assueverunt, si capitis gravitate, ac vertigine, vel cordis oppressione, aut lipothymijs post siccitas mariscas diù tentati fuerint, eoque maximè si vini, lactisque abusus ad necis causam accedat.

*Phyficis quale  
æquinoctiû lethi-  
ferum.  
a 3.aph. 10.*

XVII. Improvisè paritèr moriuntur phyfici, quoties circà æquinoctium, præsertim (a) autumnale, pus per anacatharsim non ampliùs excernant.

*Variolarum retro-  
cessio quando mor-  
talis.*

XVIII. Si variolæ, ac morbilli, cum inter secundum, ac tertium stadium versantur, pertinacitèr retrocedant, ægerque in lecto iacetur, illum inespectatò moriturum poteris prædicere. Non absimili quidè m præfagio vtere, cum in ægro, cæteroquin languido, & cholera humidâ laborante, spontè, vel arte excretiones atrabiliaria, vel alterius exoticæ indolis immaturè subsistunt. Neque a

verò deerrabis, improuisam necem folertèr diuinans in fenibus potiffimùm, apud quos anifistulæ, crurum vlcera, nares, vel aures, acri fanie manare consueta, ab eo opere penitùs vacauerint, præcipuè si in cerebro, aut in præcordijs inceptæ iam stagnationis, atq; irritationis indicia se proderint.

*Emisarijs occlusis vnde subitæ ne eis præludium.*

XIX. Hæc autèm satis fore arbitramur prudenti æquè, ac perito Medico; ex ijs enim in reliquas prognoses, a suppressis euacuationibus ventriculi, cutis, aliarumque partium deducendas, ipse ex se argumenta desumet. Illud tamèn sedulò, ac semper aduertimus, suppressas euacuationes aliquandò esse tantùm signa, aliquandò etiam causas improuisæ mortis. Sunt quidèm ferè nulla signa, cum ea liquida, quæ solebant excerni, nec multa, nec prauæ admodùm indolis extiterunt. Exemplum habemus cauterij exiccationem in fenibus, quæ illorum interitum præcurrit, eò quia apud eosdem vniuersa iam fluidorum, solidorumque machina, de suo sensim robore remittens, omnia œconomix animalis, ac potiffimùm secretionum munera languidè exercet, quibus penitùs deficientibus, tandèm mors obrepit. Vndè non ineptè (a) Roder. Castren. -- *Clauditur fonticulus, quia homo est morti proximus; non est homo morti proximus, quia fonticulus clauditur.*

*Suppressæ euacuationes modò signa, modò inopinatæ mortis causæ.*

a In suo syntag. prædict: part. I. cap. 6. particul. 4.

L

Sunt

*Interdum sunt  
causæ simul, &  
signum.*

XX. Sunt verò causa simul, & signum  
 properæ necis suppressæ illæ euacuationes,  
 quæ non copiâ tantùm, sed deleteriâ mixtu-  
 râ egerebantur: cæ nanque, cum intrâ cor-  
 pus subsistunt, in aliquam iam ante debili-  
 tatam partem maioris vsus decumbunt, ocys-  
 simumque exitium plerunque portendunt.  
 Neque interim Lectores tædeat nos adeò in-  
 culcare, ne Medici ex tempore præfagia sua  
 effutiant; non enim semper, vbi consuetæ  
 restiterint euacuationes, subitus mor-  
 bus ingruit; interdum lentus indu-  
 citur, qui longo etiam cum  
 agone viam sternit  
 ad interitum.



*De signis improuisa mortis à cerebro ,  
neruis , & liquido animali .*

C A P U T XX.



Si iam si supra meminimus multorum signorum , quæ ex perperam operantibus instrumentis facultatis animalis improuisam mortem præmonstrant , de ijs tamen

plura nunc , & apertiùs dicere constituimus , cum clariùs ea doceri , atque intelligi soleant , quæ suo stant ordine distributa , quo confuso , etiam disciplinarum peritura sint omnia.

*Ordo est anima  
disciplinarum .*

II. Primùm itaque capitis , & neruorum affectiones , quæ fortem apoplexiam minantur , clandestinam etiàm necem plerunquè prænunciant . Hæc tamèn præfagia , vt exitu comprobentur , non quibuslibet leuissimis etiam cerebri symptomatibus niti debent , sed validè fundari in cumulo , & congestu causarum , passionum , & circumstantiarum , quæ omnia syndromen signorum constituunt . Aggregatur verò ista syndrome primò ex ætate ipsius ægri , quæ a quadragesimo quinto per totum (a) senium excipiendis syderationibus aptior esse solet . Secundò ex suppressa euacuatione hæmorrhoidum , (b) fistularum , herpetis , mucis narium , & consimi-

*Ad improuisam mortem ex cerebro præfagiendam signorum syndrome requiritur .*

*1. ex Ætate .*

*a 3. aph. 31. &  
6. aph. 57.*

*b 6. epid. sect. 3.  
2. ex Alicuius euacuationis suppressione .*

3. Ex præuijs ca-  
pitis &c. affectio-  
nibus.

lium, quæ quidè̄m euacuationes, ac decubi-  
tus, sicuti cum vigent, multorum sunt me-  
delæ morborum, ita cum spontè, vel arte in  
senibus potissimùm sanantur, facili negotio  
fortem inducunt apoplexiam, quoties in cere-  
bro talem vaforum, ac fibrarum imbecillitatem  
inueniant, per quam plus sanguinis accipia-  
tur, quàm remittatur. Tertio ex præuijs ca-  
pitis, & neruorum affectionibus; raro enim  
forti apoplexiâ quis præhenditur, nisi horum  
prælua symptomatum præcesserint. Hæc  
autèm sunt dolor, grauitas, atque imbecilli-  
tas capitis, memoriæ iactura, in somnum  
procliuitas, vertigo, cæcitas, membrorum tor-  
por, & præ omnibus, leues, quæ anteuenerint,  
apoplexiæ: eæ nanque in fortem, ac subito  
interimentem tandèm desinunt.

Exitiosæ apople-  
xiæ quo tempore  
potissimùm contin-  
gant.

III. Et quoniam Hippocrates vult Medi-  
cum adeò in diuinando peritum, vt non so-  
lùm ipsam mortem, sed illius etiam tempus  
præfagire nouerit: idcirco sciamus, oportet,  
apoplexias, ocyssimè interimentes, non tan-  
tùm circa æquinoctia, sed etiam circa sol-  
stitia frequentissimè contingere, vt aliàs mo-  
nuimus. Quarè per hæc tempora eas di-  
uinare poterimus, vbi signa præcurrant; &  
constitutio aeris fuerit inæqualis, pluuia,  
aquilonaris, & australis; aut æger vtatur  
parùm laudabili viuendi normâ, ac præcipuè  
insalubrium ciborum, & vini sit appetentior.

Atque



Atque hinc senes vtriusque sexus, quoties ex cerebri, neruorumque decubitu cæci euaserint, & post hyemale solstitium inter ipsas noctis tenebras, se ignem, aut splendorem identidem videre videantur; ij quidem facilè, cum sol in taurum ingreditur, forti apoplexiâ correpti, repenti decedunt: significatur enim magnum iam tremorem, pressio- nemque ad thalamos neruorum opticorum, & partem medullæ cerebri post illud solsti- tium inductos fuisse, quibus ob responden- tem quadraturam, longè maior, immò ma- xima, & violentissima distractio, & pres- sio succedere solent, quæ, præsertim ad ce- rebri circumferentiam simul, & centrum in fe- nibus factæ, breuissimè necant. Huiusmodi verò prædictiones, ex obseruationibus medi- co-astronomicis deductæ, non Artem modò, sed ipsos etiam Artifices illustrent.

IV. Secundò, qui iam diù epilepticis re- cursibus tentati fuerunt, indèque immemo- rem, languidam, ac melancholicam ducunt vitam, hanc sanè repentinâ morte claudere solent, rupto plerunque intrâ cranium vase san- guifero, post inductam supra cerebrum conge- stionem. Quare prudens, & sciens Medicus in ijs casibus tutò fatalem improuisò diem prædi- dicere poterit.

V. Tertiò qui ex capitis vulneribus, aut contusionibus laborant (etiã in tuto esse

*Quinam senes fa- cile euadant apo- plectici.*

*Medico-astrono- mica obseruatio ad præfagiendum pro- ficua.*

*Ex epilepticis qui repenti pere- ant.*

*Capitis vulnera &c. inopinatò ene- cantia, quæ.*

esse imprudentioribus viderentur) si rigore corripiantur, breui tempore decedunt. Significatur enim factam fuisse sub cranio vasculorum rupturam, vndè effusa liquida, dissipato per moram volatili, eaque ratione euersâ crasi, in acerrimam, & veneno similem naturam abjerunt, quæ tandem quaquaversum in neruorum principium, ac fines repente diffunduntur, mortiferamque convulsionem inducunt, in quorum cadaveribus ferè semper inuenitur abscessus in hepate, cuius ætiologiam exhibemus in nostro ad Hip. lib. de vulner. capitis commentario.

VI. Hæc sanè, quæ tribus capitibus improvisæ mortis signa perstringimus, cæterorum indiciorum, etiam illorum, quæ ex animo veniunt, exemplar esse possunt, ac documentum, rati oportere Medicum ita prudenter in hoc negotio se gerere, vt, si non semper verè diuinet, saltem non sæpè fallat. *Certitudinem nanque exactam in Medico, vt ait (a) Hipp., rarò videre contingit.* Vndè laudauerim, vt quis potius à prædicendo se abstineat, quàm imperitiam suam palàm ostendat.

Turpe siquidem est illum, quem  
 improvisò moriturum pro-  
 nunciauimus, vel eua-  
 sisse, vel lento  
 morbo deces-  
 sisse:

*Medici prudentia  
 in ferenda prognosi*

a De vet. med.  
 n. 16.

*Agi-*

*Agitur in genere de methodo præ-  
servandi a subitaneis  
Mortibus.*

C A P U T XXI.



**D**OST signa proximum cen-  
semus de præservativa me-  
thodo subitanæ mortis ver-  
ba facere. Etenim, vt ho-  
mo graviùs, ac frequentiùs  
brutis animalibus ægrotat,  
atque idcirco, pluribus inventis, excogitatif-  
que pharmacis, huic infortunio medetur; ita,  
cum crebriùs quoque improvisæ neci, ex in-  
ternis causis ortæ, sit obnoxius, rationi  
consonum est, vt subitaneum diem, aut pe-  
nitùs declinare, aut saltèm pro viribus studeat  
retardare.

II. Scio apud ethnicos antiquissimum  
fuisse problema, quodnam genus mortis, lentæ  
ne, an verò subitæ hominibus fuerit exop-  
tandum? ac proindè (a) Iul. Cæsarem pridie  
antè mortem, cum apud Marcum Lepidum  
cœnaret, hoc moto sermone, omnes antiver-  
tisse exclamantem, *inopinatum*. Sed o fallacia  
hominum desideria! o votum inane, & puni-  
tum! Ipse siquidem Cæsar proprio didicit ex-  
peri-

a Apud Plut. in  
Cæsare.

*Inopinata Mors a  
probo, & pruden-  
ti viro haud ex-  
optanda.*

*a Ex Gratian. in  
eius vita lib. 4.  
cap. vlt.*

perimento, omnium pessimam esse necem inopinatam, quippè quæ nequè ipsi cum indolentiâ contigit, vt fortè putabat, nequè sinè contumelia. Nos verò, quorum mentibus in tanta causarum obscuritate Deus Opt. Max. altum, æternumque fidei lumen immisit, illam multò magis mortem, tum optimam opinari, tum salutarem optare debemus, in qua (vt insignis pietate, ac iudicio Vir Cardinalis Commendonus <sup>(a)</sup> ex D. Augustini Sententia, dicere solebat) animum sensibus integrum morti componere, & Deum nobis per Christianæ disciplinæ sacra, piaculæque possumus propitiare.

III. Quid? quòd si de solis humanis foret consulendum, nobis certè nunquam subitum, atque inconsideratum e vita discessum concupiscere oporteret. Quis nanquè adeò ferox inter commercia hominum adoleuit, qui acerbè, penitusquè, & suos, & sua oderit, vt antè mortem testamenta conscribere, mutare, obsignare, dicere aliquid, aut reddere, si cui debet, ad patriæ, ad affinium, ad sui denique tranquillitatem pertinacitèr nolit? Qui liberis consilia, amicis, vt fecit Socrates, dare oscula negligat? Timeamus itaque, quantùm humana, quantùm sunt æterna æstimanda, timeamus inquam inopinatam, subitamque mortem, Deumque propterea vniversalis Ecclesiæ vocibus enixè præcæmur,

cemur, vt nos ab eadem pro immensa sua benignitate tueatur.

IV. At nostri suscepti memores instituti, partem esse putamus, diligenter expendere, quâ methodo a causis huiusmodi interitus solertè declinemus.

V. Enim verò daturi methodum præseruandis improuisis mortibus, quæ ab internis causis dependent, initio admonemus, hanc normam per Medicos vnicè deriuandam esse ab hygiene, & therapeia illarum affectionum, quæ in aliquem ex subitaneis morbis possunt transire, vndè ægri repente decedant: propterea quicumque studiosè legerit capita superiora de signis, certè non obscurum tenebit principium, a quo huiusmodi præcautionis discrimina desumenda veniunt. At, quoniam innumeræ, vt exposuimus, existunt nostrorum corporum affectiones, quæ subitam mortem inferre valent, idcirco sapiens, oportet, expertusque sit Medicus, vt consilium, vnicuique congruum, adhibeat. Sed cum adhuc nonnulla in genere demonstrari possint, ea nunc summatim exponere non omitteremus.

VI. Corpora, improuisis hisce casibus subiecta, vel sunt aspectu sana, vel euidentè ægra. Ab hac verò vniuersalissima diuisione mihi petenda videtur præcipua partitio methodi præseruatiuæ. Et quidè, vt de

*Corpora impro-  
uiso fato subiecta  
nunc tanquam sa-  
na; nunc velut æ-  
gra consideranda:*

utroque membro diuisionis absque vlla confusione differamus. Sit.

*Qua methodo præseruanda sunt corpora aspectu sana.*

C A P U T XXII.

*Corpora aspectu sana tripliciter expenduntur.*



Corpora, quæ tanquàm sana nostros incurrunt in oculos, & summa nihilominus cautione egent, ne inopinatò diem suum obeant, tripliciter considerari possunt; primò cum nimia plethora, seu cum athletico habitu; secundò cum nimia obesitate, & corpulentia; tertio cum nimia animi imbecillitate.

II. Primò corpora athletica, cum ad summum bonitatis deuenerint, iuxta <sup>(a)</sup> Hippocr. effatum, statim soluenda sunt, celeri adhibitâ phlebotomiâ, diætâ, vini abstinentiâ, atque corporis exercitatione. Etenim athletæ (vt Plinius aiebat de Luna, quæ orbe pleno repentè per eclipsem est nulla) propter nimiam partium foris, intusque canales plenitudinem, repentinâ interdùm morte eclipsantur; ac proindè solâ iuuantur diminutio-

a p. aphor. 3.

*Athletica quomodo præseruentur.*

ne

ne quantitatis sanguinis, ac subtractione molis, qualitatifque alimentorum, & potuum, vt hâc ratione, si quid reliquum extremis vasis hæret impactum, motu corporis dissoluatur, remisceatur, atque, in gyrum actum, maiori deniquè parte transpiret. Nequè porò apud istos exercitatio procuranda est, priùs quàm vasa depleta sint, & diminutum alimentum, ne illud idem, quod in præcautionis auxilium inducitur, improuisam mortem disruptione vasorum acceleret.

*His quando imperanda exercitatio.*

III. Sed omnis certè prophylaxis hisce, in corporibus inutilis euadet, nisi altior quædam plethoræ radix optimè cognoscatur, & parumper debilitetur. Hæc autem illa est, quâ sani homines tantoperè gaudent, stomachi nimirum validitas; vndè non leuis apud eosdem peccandi in ratione victus fiducia, atque incitatio proficiscitur. Ij enim cibos non modò nimios, sed absque vllò delectu ingerunt, citòque in chylum conuersos intrâ sanguifera transducunt. Sed, cum non æquali proportione transpirent, necesse est, vt illorum vasa impleantur, dissilitura plethoræ, cum plus æquo distracta fuerint. Sciant igitur qui bono, validoque sunt stomacho, præsertim si, extrâ adolescentiam positi, studijs incumbant, hostem intrâ se gerere, qui, nisi accuratè cauerint, improuisæ morti causam aliquando præbebit. Etenim,

*Stomachus validus morbosæ plethoræ fomes.*

*Ab exercitio, & etate cibi indigentia definienda.*

*Quenam partes, & cur minus perspirent in sessilem vitam ducentibus.*

*a In sua statica sect. 3. aph. 35. Saluberrimū Sanctorij præceptum.*

*Debiliores stomacho cur plerunque longævi.*

*b In eius vita a semetipso descripta.*

ij, quoties se motibus non exercent ( hoc autem diligentèr notandum ) modico egent cibo, tanto scilicèt, quanto duntaxat opus est ad reparanda fluidorum dispendia, quæ non multa impenduntur in illorum transpiratu solidorum, quæ motui aeris, sanguinis, & liquidi neruorum tantummodò inserviunt: minimum enim est, quod à penè quiescentibus istorum artuum musculis, & succutaneo organo insensibilitèr perspirat.

IV. Nequè verò in alimentorum, potuumque genere vlla vnquàm securior, pro tuenda valetudine, inueniri potest via, quàm quæ indicatur à (a) Sanctorio, & sequenti aphorismo perstringitur -- *Ille cibi quantitas est saluberrima, dum a cibo corpus suis negocijs eadem agilitate vacat, ac si esset ieiunium* -- Hoc autem consilium opportunum est non pro solis plethoricis, sed pro alio quouis habitu, qui sanus, atque incolumis seruari cupiat. Falsò propterea homines de natura sua vulgò queruntur, quòd ventriculi languore, atque imbecillitate afficiantur. Ijs enim ipsemet morbus tum peccandi, tum se se interficiendi facultatem adimit; cum, si semel horum quis cibo, siue prauo, siue copiosiori, usus fuerit, statim erroris admoneatur. Hinc stomacho debiliores plerunque euadunt longæui. Vt præ cæteris insigne, ac vulgatum habemus exemplum in celeberrimo (b) Ludou. Cor-

Cor-



Cornaro, qui folius ad miniculo sobrietatis prosperâ valetudine vixit vltra sæculum. Verùm longiùs fortasse progredimur, fallente nos cupiditate plethoricos habitus præferuandi.

V. Deindè, obesa nimiùm, & pinguia corpora a repentino mortis periculo tuentur primò ea omnia, quæ tollunt plenitudinem lymphatico-pinguem viscerum, vasorum, & carniùm; cuiusmodi sunt epicraticæ purgationes cum pillul: tartar:, aloeticis, de ammoniaco, & similibus; secundò, quæ benignè dissoluunt residuam mucosam, viscidulamque fluidorum partem, eamque potissimùm per vrinam deriuant; nimirùm terebinthinata, oximel: scill:, acidulæ etiàm aluminosæ; dummodò tamen homo ætate sit vigenti, ac iuuenili, quem in sensum accipiendus est (a) Timæus, cum in obeso nimiùm corpore huiusmodi aquam proficua obseruauit; tertio parca victus ratio, quæ partem detrahat ciborum præsertim humidorum, eisque substituat mediocriter exiccantia, atq; aromatica; quartò ea, quæ ab ipsis carnibus perpetuò demulcent ichores viscidulos, vt frictions, & fonticuli; tandem accurata, & nunquàm intermissa corporis exercitatio, per quam fibræ musculares supra vasa, & supra glandulas validè nitentes, humoresurgent, comminuunt, volatilizant, aptosque reddunt ad diuresim, ac diaphoresim, quæ  
qui-

*Epicratica purgatio quam plenitudinem adimat.*

*Plura Obesis proficua remedia.*

a cas. med. lib.  
6. cas. 3.

quidem sunt viæ , per quas fanis in corporibus ea recrementa secedunt , quibus collectis, præcoces morbi , mortesque sæpè accersuntur .

*Timidi quomodo  
præcauendi.*

VI. Denique illi homines , qui quantumuis corpore fani videantur , animo tamèn ægrotant, cuiusmodi sunt extra modum timidi , ac pusillanimes , saluberrimum præcautionis consilium inuenient , si ipsi se , & alij illos tueantur a subitis , atque improuisis gaudij , aut timoris occasionibus . Etenim cum huiusmodi corpora fortita sint cerebri , & præcordiorum fibras cum tono minimè resistenti , seù maximè languido , idcirco prudenter fugere debent ea omnia pathemata , quæ improuisam , validamque in cerebro excitant ideam lætitiæ , vel timoris , propter quam alterantur diametri vasorum , perturbatur motus sanguinis , nec non rithmus vndarum fluidi animalis per neruos , præsertim in præcordia ; ac proindè subuertitur motus cordis , & totius sanguinis non sine euidenti discrimine integræ dissolutionis ipsius vitæ , quæ cum perenni , ac regulari motu istorum præcipuè fluidorum per corpus circumagitur .

*De methodo præseruandi a subitaneo in-  
teritu corpora valetudinaria.*

C A P U T XXIII.



NON arbitror in id mihi stu-  
dium incumbendum, vt sub  
isto capite exponam singu-  
las præseruandi rationes, pe-  
titas ab omnibus singillatim,  
morbis, qui ægros in subi-  
tas neces possunt adducere; immensam enim  
ac penè infinitam rem imprudens tentarem:  
cum quilibet Medicus ex particulari vniuf-  
cuiusque morbi pathologia, ac therapeia ( vt  
cap. XXI. inuimus ) methodum, ac remedia  
præseruatiua ex se ipso copiosè ducere valeat.  
Quæ enim factum iam morbum tollunt, ple-  
runque antefacta prohibent. Dicemus itaq;  
breuitè, ac veluti per genera, vt, signatis  
quibusdam quasi sedibus, Practicorum me-  
moriæ iuuemus.

II. Et quidè, vt hîc etiàm loci con-  
gruum ordinem sequamur, considerabimus  
ex huiusmodi valetudinarijs corporibus alia  
interiùs, alia exteriùs ægrotare, iuxtà quam  
diuisionem prophylacticas medelas apertius in-  
ueniemus.

III. Inchoantes verò ab internis morbis, quan-  
quàm isti varijs modis inuicè permiscean-  
tur;

*Ex valetudinarijs  
alij interiùs, alij  
exteriùs ægrotant.*

tur; immò rarò malum vllum sine complicatione prorogetur; attamen quò clariùs, ac firmiùs medelarum notiones Curantium animis hæreant, operæ pretium censemus in re præfenti generales tum ipsarum ægritudinum, cum remediorum ideas omninò distinctas tradere, quas Medicus pro sua deindè prudentia in particularibus casibus facilè componet.

*Triples affectio-  
num genus valetu-  
dinarios ad subitum  
interitum disponit.*

IV. Præternaturales affectiones partium maioris usus, quæ homines valetudinarios detinent, tandemque repente possunt occidere, ad tria præfertim genera reducuntur; primò ad lentas corrosiones; secundò ad pertinaces conuulsiones; tertio ad congestiones. De singulis seorsum agemus, etiamsi corrosio spasmus, spasmus congestionem, & e contrario, vel perturbato ordine, singulæ singulas inducant.

*Primum est internorum sanguiferorum lenta corrosio.*

V. Lenta corrosio internorum sanguiferorum, siuè aneurysma sit, siuè varix, utpotè frequens causa inopinatæ mortis, meritò omnium prima se nobis offert perpendenda: vtra enim sit, cum alicubi integrum tollit membranarum repagulum, illicò transversam, deterrimamque sanguini viam intrà cavitates aperit, morteque perimit improvisâ.

*a Lib. I. de morb. n. 10.*

VI. At verò, ut plura simul completamur, illud, præ omnibus, hisce in casibus valere censemus, quod proponit (a) Hipp. in

in pectoris , ac pulmonum varicibus , quarum sub nomine aneurysmata comprehendere videtur ; inquit sanè . *His confert , si circa exordia curandos susceperis , ut manuum venæ relaxentur , & victus ratione utatur , ex qua siccissimus , & maximè exanguis evadat .* Neque certè diuturna praxis ullam tutiorem præservandi methodum nos edocuit , quàm si huiusmodi ægri , post parcas inter initia phlebotomias , in viuendo sint continentes , abstinentesque . Plures idcirco nouimus religiosos Viros , qui præcordiorum aneurysmatibus correpti ( <sup>a</sup> ) vt superiùs obscure indicauimus ) propter accuratum vitæ regimen ad vltimum vsque senium peruenerunt , ac non nisi ex lenta tabe , vel hydrope paulatim decesserunt . Contra verò quotquot istiusmodi mali genere diuexati , genio , & gulæ indulserunt , vel immoderatis motibus corpus exercuerunt , omnes repentina morte ad sepulcrum festinasse recordamur .

VII. Nostris porrò experimentis ratio non dubia suffragatur . Etenim is , qui varietate utitur , ac multitudine ciborum , potuumque , necesse est , vt multum indè sanguinem , varijs etiàm acredine pollentibus particulis refertum , ingerat . Is paritèr , qui vehementibus tam aeris , quàm exercitiorum motibus sese obijcit ( quoniam solida

*Varices pro aneurysmatibus accipiunt Hipp.*

*Horum prophylaxis ex eodem .*

*Authoris exempla .*

*a Cap. 19. n. 4.  
Sobrietas, & moderatum exercitium iisdem prodest .*

*Experimenta ratione comprobantur .*

a De Fract. n. 29.

da maiori nisu impellit, & vrget) necessariò inceptam iam vasorum corrosionem; ac distractionem promptiùs auget, ac perrumpit, quàm qui rectâ vtitur, ac moderatissimâ ratione sex rerum nonnaturalium, & præfertim diætâ, quam tan-  
 toperè laudat <sup>(a)</sup> Hipp. in vlceribus. Euidens fanè, si ab animantibus etiam discedamus, exemplum præbent flumina, quæ, licèt ripam pluribus locis perruptam habeant, tamèn extra illam non diffluunt, neque in vicinos campos euagantur, nisi cum noua, magnaue accedat recentium aquarum copia, vel aduersus ventus profluentibus vndis vehementissimè obsistat, ac renitatur.

*Quomodò lymphatica in præcordijs vel cerebro debilitata, ne breui dirumpantur, præcauenda.*

VIII. Quod de solis sanguineis vasis hucusque protulimus, ad lymphaticorum quoque texturam debilitatam referri posse non dubitamus. Etenim, si huiusmodi lymphaticorum vitium, in præcordijs, vel cerebro existens, teneat hominem, qui modicum cibum, & parciozem potum vnà cum benignis vnlnerarijs vsurpet, is plerunque consenescit, ac lentè quoque cum ipsa vasorum ægritudine commoritur. Contra verò, si homo iste helluo fuerit, & bibax, magnâ ocysimâque subortâ feri intrà ventres effusione, alijs etiàm concurrentibus causis, interdùm occidit inopinatò.

IX. Pauca nunc addenda putamus de vnlnerarijs decoctionibus, quæ, cum satis superque apud Medicos innotescant, longo ser-

fermone non indigent . Dicemus duntaxat ,  
 illas , si temperatæ , nec admodum resinofæ  
 fuerint , acre , quod in fluidis dominatur ,  
 facilè abfumere , talemque sanguini crasim  
 conciliare posse , per quam fibræ discissæ , aut  
 planè coalescunt , aut saltèm ab vltiori ple-  
 runque vindicantur erosione . Quinimò  
 quoties impendit periculum effluxuri e vasis  
 magnâ copiâ sanguinis , ad fauciatorum , vt  
 aiunt , anchoram erit confugiendum , scilicet ad  
 opium vltum , ad fungum melitensem , ad medi-  
 camenta ex vitriolo præparata , aliaque huius ge-  
 neris , quæ , & sanguinis impetum , & vasorum la-  
 xitatem coercendo , futuram ex nimia hæmor-  
 rhagia improuisam mortem saltèm suspendunt .

X. Rationem deindè præseruandi a sub-  
 ita nece illos homines , qui pertinacibus con-  
 uulsionibus detinentur , ( quam secundo loco  
 tradendam posuimus ) nemo proximè attingere ,  
 multò minùs complecti poterit , nisi priùs loca ,  
 & causas conuulsionum accuratè distinguat . Ete-  
 nim , si spasmodicæ passiones fuerint in stoma-  
 cho , hypochondrijs , vel vtero , pendeantque a  
 succis adsubtile , & sulphureum acre exaltatis ,  
 eo in casu conducunt aquea , subacida , empla-  
 sti- ca , balnea , duciæ , serum , & lac . Quinimò ad  
 antidota etiam recurrendum erit , vbi vene-  
 norum sit metus ; quemadmodum , si dolo-  
 res vrgeant , ad moderata quoquè narcotica ,  
 sulphur vitrioli , ens veneris , aut bezoar-

*Ex vulnerarijs de-  
 coctionibus quales  
 ad vsum reuocan-  
 da .*

*Ratio præseruan-  
 di in spasms a ma-  
 teria subtili pro-  
 ductis .*

*Ex materia viscida aliter tractandi.*

ticum iouiale. Si verò viscidulum sit fermentum, sed absque suppuratione, tunc oleosa cum fluidis, martialia, amara myrrhata, & præsertim rhabarbarum, & cortex peruuianus, cum specificis anthystericis, & antispasmodicis, mirè conferunt; eoque magis si vermes in discriminis causam venire cognoscantur; quo in casu etiam ad mercurialia tutò deuenimus.

*In pectoris conuulsionibus pars affecta diligèter perquirenda.*

*His phlebotomia quando conueniat.*

*Cardiaca præscribendi ratio.*

XI. Si conuulsiones obseruentur in pectore, videndum, vtrum in pulmonibus, an etiam in corde, & magnis vasis; & tunc maximè ad causas respicere oportebit, & potissimùm cognoscere, vtrum de sepulto tuberculo, vel aneurysmate sit dubitandum, ad quorum malorum discrimina prophylaxis quoque erit dirigenda. Porrò, si solitarius fuerit, aut cum simplici lymphæ congestione thoracis spasmus, tunc vsurpanda erunt, iudicio Curantis, oleosa, sulphurata, terebinthinata, succinata, camphorata, emulsiones, aliaque multi generis aquea, & diluta. Si, præter spasmodicas contractiones, dolores, & febres vrgeant, laudantur iuxtà doloris gradum, ægrique vires, etiàm phlebotomiæ, & mitissima paregorica, de quibus prudens, ac sciens Medicus opportunè decernet.

XII. In reliquis, vbi malum hæret præcordijs, & erosionis metus longissimè fuerit, identidèm sunt præscribenda cardiaca, atque



atque etiam, si opus fuerit, quæ ex stibio, vipera, mumia, & myrrha conflantur.

XIII. Deindè si conuulsiones existant epilepticæ, vel ad epilepticam indolem tendentes, perpendendum erit, num affectio sympathica sit, ex infernorum scilicet viscerum, totiusque corporis consensu, an idiopathica ex peculiari cerebri passione. Etenim iuxtà hanc diuisionem præseruatorias curationes inter se admodum diuersas instituemus. Siquidem, si fuerit vitio stomachi, & succorum intestinalium, omni alio pharmaco melior est vomitio, & alui deiectio, per epicrasim instituta. Hinc passim Romæ occurrunt multi, qui, licet scotomijs, alijsque capitis affectionibus, fortes apoplexias, subitasque neces minitantibus, iamdiù tentati fuerint, senes adhuc decrepiti, ope Pill. de Succin. Craton., de spuma chalybis, vel alterius benigni soluentis, identidem intrà annum repetitorum, seruantur incolumes.

*Sympathicæ epilepsie vomitus et epicratica purgatio proficua.*

*Hæc Romæ præsertim ab apoplexia præseruat.*

XIV. Si verò huiusmodi affectiones a recurrente vasorum sanguineorum plenitudine, aut suppressis hæmorrhagijs dependeant, tunc phlebotomiæ interdum instituendæ, ac fonticuli etiam admouendi erunt.

*Phlebotomia quædo celebranda.*

XV. Quòd si tandem eadem mala, ob inductam in cerebro labem, idiopathica etiam euaserint, nullo certius remedio extra limites inferendæ subitæ mortis contineri possunt, quàm

*In epilepsia idiopathica abstinere a uino magnum remedium.*

a Lib. de in somn:  
n. vlt.

quàm, si æger abstemius spontè factus, specifica antepileptica, ac laudabile vitæ regimen perpetuò adhibuerit. Nec meditata solum, sed diù etiam experta in præsens referimus; quibus fanè obseruationibus ipsius quoque (a) Hippocratis consilium accedit; is enim agens de infomnijs, comitiales morbum, aut insaniam significantibus, monet, vt *agri cibus paucis utantur; ita namque integram valetudinem sibi tota vita comparabunt.*

In congestionibus  
curandis Medicus  
sit prudens.

b 1. epid. sect. 2.

XVI. Denique circa congestiones nonnulla breuiter differemus; hæc nanque, cum nimio, varioque inter se discriminentur interuallo, Medentium ingenia, vsu firmata, ad capiendum consilium in arena duntaxat mouere possunt. Prudens itaque Medicus in horum morborum curatione ita se exercent iuxta (b) Hippocratis oraculum, *vt proficit, aut non noceat.*

Iuxta congestæ  
materiei indolem  
prophylaxis dirigenda.

XVII. Cum verò congestiones modò imò in ventre, modò medio, modò in capite fieri contingat; nunc ab humoribus lentis, & crassis, nunc a salinis, & acris, nunc demùm a mixtis, & sulphureis, siuè cum suppuratione, siuè sine ea; equidèm arbitror summo Curantium iudicio, atque experimento opus esse, vt hisce in casibus recta præseruandi ratio instituat. Illud solummodò in genere admonemus, scilicèt vbi viscidum, ac salinum phlegma in aliquo ventre peccauerit,

con-

conducere rhabarbarata , aloetica , chalybeata , stibiata , potum Thè , vel Coffè , therebinthinata , aliaque gummofa , tenacitatem foluentia : vbi falinum , & acre , iuuare aquea , succos herbarum epicerausticarum , diluta , lactiginofa , oleofa , & alcalica , partim fixa , vt stibium diaph. , partim benignè volatilia ; vbi tandèm vitium est in sulphureis , mixtisque principijs , mixta remedia vtilia fore , præfertim si de occulta dubitetur suppuratione , quo in casu , post phlebotomiam , initio morbi , si res postulat , institutam , ea vsurpanda , quæ pus , ac faniem dulcificare , quæ sphacelum arcere , quæ demùm , rupto abscessu , vlcus abstergere , & consolidare valent . Eligat itaque peritus Medicus ex omnibus optima , & vnicuique adhibeat in re tunc præfenti , quæ magis congruunt , illius apud

(a) Celsum consilij perpetuò memor , nempè  
*-- nulla re magis laborantem iuari , quàm tempestiua abstinentia , semper querentes non quid Medico liceat , sed quid agro salutare sit , cui vehementer nocet , quoties in eius , quod assumitur , vel tempore , vel modo , vel genere peccatur .*

a Lib. 2. cap. 17.

Opportunum Celsi consilium .

XVIII. Sed , stante eâ diuisione , quam circa initia huius capituli posuimus , superest , vt agamus etiàm de methodo prophylacticâ dirigendâ ad homines externis morbis valetudinarios . Cum verò certum sit apud ista corpora idcirco fartam , tectamque interno-

rum

Externi morbi diu-  
 turni valetudina-  
 rius potissimum uti-  
 les , & cur .

*Quomodo tractan-  
di ne subito peri-  
mant.*

rum viscerum texturam seruari, quia praui humores ad artus cum podagra, aut quouis tumore, vel ad superficiem corporis cum vlcere, fistulâ, scabie, vel alio morbo decumbunt; profectò vniuersa ratio praeseruationis a subitis malis, subitas neces inferre valentibus, versari videtur circa auxilia, quæ primò seruare possunt firmum, validumque fibrosum rete internorum viscerum, & vasorum, vnâque simul congruam fluxilitatem, dulcedinem, & crasim liquidis conciliare; vndè quidquid intùs redundat incongruum, atque impermiscibile, excitato confestim stimulo, foràs vtilitèr propellatur, ac veluti despumetur; deindè, quæ simul tollere valent in affectis externis locis ea impedimenta, quæ aliquando obijci possunt ipsis salutaribus fluidorum propulsionibus, remoris, ac secretionibus.

*Methodus generalis praeseruatina.*

XIX. In genere itaque iuuabunt alimenta optimi succi, iura interdum viperata, ferum cum infusione rad. chinæ, & alia eiusmodi, quæ robur solidis partibus, benignamque volatilitatem, ac fluxilitatem humoribus tribuunt; simulque ea omnia, quæ partes externas ita tuentur, ac disponunt, vt nullo callo, nullâue, etsi minimâ, constipatione laborent, per quam internis nisibus renitantur. Nunc ad Artis Magistros, non ad solos Candidatos scribimus; eâ proptèr non pudet breuia tantum

me-

medendi monstrare compendia : Illud tamen docuisse nunquam fatis contenti erimus, frustra nempè præferuandi rationes a subito interitu illum foris quærere ex medicaminibus, qui domi spreuerit diætam. Cætera Medicinæ præfidia interdùm fallunt, vnum nullo vnquam tempore fefellisse comperimus, rectum scilicet vitæ regimen, ac tranquillum, infractumque in benè, vel malè valentibus animum : ijs enim duobus veluti axibus vniuersus ferè præseruationis orbis a subitanea morte circumagitur. Nequè profectò hâc super re decipi nos patitur Diuinum illud monitum apud (a) Marcum, vbi Christus Discipulos admonet, vt sobriè viuant, & a grauibus temperent Mundi curis, ne subitis mortibus causas exhibeant -- *Attendite vobis, ne fortè grauentur corda vestra in crapula, & ebrietate, & curis huius vitæ, & superueniat in vos repentina illa dies : tanquam laqueus enim superueniet in omnes, qui sedent super faciem omnis terræ.* Sileat igitur Medicus, vbi Deus ipse loquitur ; & quidem sine parabolis certiores prophylaxis rationes nos edocet, quas certè annuâ calamitate docti, vt mox videbimus, viuâ deinceps memoriâ retinere debemus.

*Diaeta cæteris remedijs præstantior.*

a cap. 21.

*Recto viuendi regimini animorum tranquillitas iungenda, ex diuino etiam Oraculo.*

*Finis Primi Libri.*

O De



DE SVBITANEIS  
MORTIBVS

In particulari

LIBER SECVNDVS.





# DE SVBITANEIS MORTIBVS

ILLARVMQVE CAVSIS

Quæ decursu annorum  
1705. & 1706.

ROMÆ CONTIGERVNT.

## LIBER SECVNDVS.



*V*oniàm Libro præce-  
denti quæsitum est in  
genere quid subita  
mors? quales sint eius  
causæ? quæ etiam si-  
gna, quæque ad il-  
lam auertendam remedia, ut vires  
nostræ tulerunt, ostendimus. Iam hinc  
supereſt, ut ſecundo Libro agamus in  
particulari de ijs ſubitaneis interitibus,  
qui Romæ per hæc tempora crudeliter  
deſæuierunt; daturi etiam exempla  
tùm ſubitarum ægitudinum, quæ va-  
ga-

gabantur, tum nonnullorum, qui eisdem correpti vel euaserint, vel decesserint. Admonentes interea, ut ad memoriam reuocentur ea, qua in limine prioris Libri Benigno Lectori proposuimus circa rationem, propter quam de *Subitaneis Mortibus* scribere decreuimus.



*Quaritur, an causa repentinorum mor-  
tium, quæ Romæ per hæc tempo-  
ra grassata sunt, fuerit uniuersa-  
lis, & simplex, an verò particula-  
ris, & mixta.*

C A P U T I.



Acturi nunc de mortibus, qui-  
bus hoc anno tot Romani  
Ciues, atque Incolæ repen-  
tè sublati sunt; inuestigabi-  
mus primo loco, commu-  
nis ne, an particularis earun-  
dem causa latuerit in singulis.

II Nos minimè fugit, libitinam certis  
annis, annorumue tempestatibus, non modò  
in hominibus, ex pestilenti aeris constitutio-  
ne proficiscentem, sed vel in brutis animalibus,  
pecudibus nempe, capris, aliisque ex  
certa aeris labe, vel aquarum, & pascuo-  
rum defectu, vitioque natam, improuisò de-  
baccari. Vndè aureis versibus cecinit (a) Fra-  
castorius noster.

*Mors repentina  
quandoque grassa-  
tur in homines &  
bruta ex causis vni-  
uersalibus.*

a In siphil.

*Inter*

*Interdum pœnas animalia sola dedere ,  
 Aut multa , aut certa ex ipsis : memini ipse  
 malignam  
 Luxuriam vidisse anni , multoque madentem  
 Autumnum , perflatum austro , quo protinus  
 omne  
 Caprigenū pecus è cunctis animantibus unum  
 Corruit :*

*Repentinæ mortis  
 Romæ nunc gras-  
 santis causa non  
 fuit vniuersalis ;  
 sed cuiusq; mo-  
 rienti particula-  
 ris , et propria .*

*a I. de diæt. n. 3.*

*Huius discrimi-  
 nis causa non fuit  
 vsus tabaci .*

III. In nostra tamen hypothese probabilius ducimus , causam improuifarum mortium non vnam omnibus absolutè communem , sed singulis morientibus maiori ex parte propriam extitisse . Quod fanè , tametsi præ me ratiocinando ex signis facilè fuerim assecutus ; tum verò mihi tandem placui , cum internum animi sensum externo ipsius rei testimonio , atque certâ experimentorum fide comprobatum intellexi . Ex sequentibus enim apparebit , peculiare , suasque præcipuas cuique causas , seu immaturæ dissolutionis , vt ita dicam , femina paulatim genita , denique confestim ad actum fuisse reuocata , iuxta illud <sup>(2)</sup> Hippocratis , *non enim repente morbi hominibus accidunt , sed , paulatim collecti , acceruatim apparent .*

IV. Quid enim tabacum incusabimus ; cum nonnulli , quorum nares nunquam puluis iste inquinauerat , ex tempore viderint

occafum ? Quid veneficas ex terræ motibus exhalationes ; cum ij præcipuè a fubitaneis tum morbis , tum mortibus fe feliciter vindicauerint , qui diruta ex foli conuulfionibus loca potiffimum incoluerunt ? Quid cuculatae abufum ; cum qui a triginta iam annis nunquam non femel , fæpè bis in die ( quos inter Cl. D. Placentius Med. Urbis Senior , & octogenario maior , vt & ipfe ego , cæterà cauti , numeramur ) hoc potu vfi funt , nullo , vel minimo per hæc tempora fymptomate laborauerint . Contra inter eos , qui nunquam illam deguftarunt , multi fubitò interierunt ? Quid tandem ignotum aeris venenum culpabimus ; cum extispicia varias , notiffimasque caufas rerum naturam diligenter quærentibus apertiffimè detexerint ?

*Non exhalationes ex tremotibus .*

*Non Cuculata .*

*Neque venefica vis aeris .*

V. Firmant verò fententiam de particulari in fingulis caufarum concurfu præteriti etiam euentus illorum , quos vitam cum improuifa morte commutaffe nouimus , priufquam à SUMMO PONTIFICE imperatum nobis fuiffet , vt anatomico cultro fepulta veritas erueretur . Etenim nonnulli fublati fuerunt cum indicijs fubitò difrupti fanguiferi canalis , quem iam varix , aut aneurysma intrà thoracem , vel abdomen debilitauerat . Multi per fortiffimam apoplexiam , ob interceptum , effufumque fanguinem intrà cerebrum . Alii demum ex magno , ac pertinaci præcordio-

*Authoris experimenta de caufa particulari in fingulis morientibus*

*Nemo nisi vale-  
tudinarius, & in-  
temperans repen-  
tè periit.*

*Subita mors in-  
iis ad malam cri-  
sim referenda.*

diorum spafmo , aut paralyfi , vel ex obftru-  
ctione viarum cordis , magnorumque vafò-  
rum ; vndè , impeditâ fanguinis traiectione  
à corde tùm in pulmones , cùm in cerebrum ,  
vitale illud , ac reciprocum iftorum viscerum  
commercium ex tempore interciderit . Hoc  
verò perpetuò est obferuatum , vltimum nem-  
pe diem repentè a nemine , quod fciam , vi-  
fum fuiffe , qui labe aliqua fluidorum , vi-  
fcerum , aut faltem canalium a multo tem-  
pore non laborauerit , quique fimul non fue-  
rit ftationarius miles in castris bacchi , aut  
veneris . Quibus fit , vt ipfe crediderim , re-  
pentinis hofce casus non fanorum plerun-  
que mortes , fed quandam veluti humanæ  
naturæ defpumptionem , feu malam crifim,  
extitiffe apud illos , qui iamdiù palàm , vel  
secretò , infirmâ , atque ægrâ valetudi-  
ne fuerunt : crifis enim apud theo-  
ricos definitur , fubita mu-  
tatio in morbis ad falu-  
tem , vel ad mor-  
tem .



*Demonstratur, inaequalem aeris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinarum mortium.*

C A P V T II.



**L**icet dubitationi non sit locus, quin celeres interitus, Romæ hoc præsertim tempore contingentes, magnâ ex parte prædispositis vitio aliquo corporibus debeantur: negare tamen non ausim vniuersalem aliquem cœlestium, terrestriumque causarum concursum ad hunc producendum effectum conuenire potuisse, sine quo forsitan, nec adeò numerosa, nec adeò subita morientium clades contigisset. Hic autem concursus, vt mea fert opinio, acceptus potissimum referendus esse videtur præteritarum indoli tempestatum, quas nemo, vel lippus, non vidit excessu quodam intemperierum insidias ægris iam corporibus facilè parauisse. Præcessit enim æstas feruida, atque admodum sicca; deinceps Autumnus, austro plerunque comitante, pluuiosus; tandem hyems viguit inæqualiter borealis, & australis. Vndè nil mi-

*Constitutiones aeris quomodo subitam mortem sollicitauerint.*

*Impetus liquidi  
auctus intra solidū  
minus resistēs sepe  
funestissimus .*

rum , si tūm solida fuerint eneruata, tūm fa-  
les acres , partesque sulphureæ a præferuida  
elapsi anni æstate ( balsamico-oleosa , aquosa-  
que, & dulcia sanguinis componentia plus iustò  
dissipante ) intrā Romanorum corpora præ-  
dominium acceperint ; indèque propter no-  
uos motus , & aculeos , periculum valetudi-  
narijs struxerint improuisum . Nihil enim  
tām promptè subitanam mortem solet infer-  
re , quàm si momentum impetus , adauctum  
in fluidis , debilitatam alicubi resistantiam soli-  
darum partium maioris vsus constanter vr-  
geat , superetque .

*a De morb. sacr.  
n. 15.*

*Auster & Aquilone  
noxij ex Hipp.*

II. Quæ autem , & quot sint mala , quæ  
nobis obueniunt ex austro , & aquilone , cla-  
rè , ac sapienter edixit <sup>(a)</sup> Hippocrates per  
hæc verba -- *Cerebrum ab austris quidè m solui,  
& humectari , & venas laxiores reddi . Ab  
Aquilonis verò flatibus , quod sanissimum est in  
cerebro , compingi , quod verò morbosissimum , ac  
humidissimum est , excerni , & forinsecus circum-  
alluere .*

*Roma Auster  
deterior .*

III. Cum verò , experiamur fermentati-  
uas particulas , ex Africa per austrum adue-  
ctas , deteriores reddi exoticorum quorun-  
dam miscellâ principiorum , quæ ex romano  
solo passim eleuantur ; exinde facile est cau-  
sam inuenire , cur multigeni, intrā prædispo-  
sita ciuium corpora collecti, erodentes humo-  
res , certo quodam tempore delitescere , sen-  
sim-



simque vires, per aeris pabula captare potuerint; vt denique, accedente nouissimâ quâcumque causâ, necem subitò intulerint, inductâ post nouum, extraneumque motum, sanguinis plerunque coagulatione, quam serositatum defluxio, atque exundatio consequitur, & de qua, coacti exemplo lactis, egregiè idem locutus est (a) Hippocrates, cum modum exponit, quo ea operantur, quæ ex coelo nobis obueniunt, si ad ea, quæ in corpore genita sunt, corrigenda inepta fiant. Sales enim acres, ab autumnii pluuijs influorem nostris in corporibus euecti, nunc per aquilonares ventos perspirare impediuntur, nunc verò ab austro vlteriùs fusi, transfuersim aguntur.

IV. Interim, si cupis modum, quo aer extraneis, atque humanæ naturæ infensis particulis imbuitur, & quomodò interdum per ventos huc illucquè transferatur, plenè id ha-

bebis a (b) Franc. de  
la Boè Sylu.

*Sanguinis coagulationem serositatum exundantia consequitur.*

*Hipp. de lacte coacto exemplum. a 4. De morb. n. 26.*

*bIn append. ad prax. tract. 10. n. 124. & seq.*



*Ad-*

*Adducuntur quedam argumenta ad confirmandum non ex vniuersali solum causa tot hominum discrimina Romæ contigisse, sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones, ac potissimum intemperantiam.*

C A P U T III.



*Nobiles, & temperati repentinam mortem non subierunt.*

*a Loc. sup. cit.*

*Contrarium accidit vbi ex causa vniuersali, testante Syluio.*

Ria hinc obseruatione digna ulterius occurrunt, quæ veris, obscurisque detegendis subitaneorum interituum huius anni causis nouam lucem afferre possunt. Primum illud esse videtur, quod nemo fortè Nobilium, aut eorum, qui frugi vitâ vtuntur, vtcumque subitaneis morbis correptus, vitam subito deseruerit: certissimo quidem argumento, non a solo aeris vitio vagantes Romæ morbos, mortesque ortum habuisse; cum affectus olim apud Leidenses epidemicus, quem tantâ sedulitate describit <sup>(a)</sup> Syluius, & cuius omnem causam ex aere, tunc plurimum a statu naturali recedente, deriuandam putat, prius & grauius in opulentiores, ac delictiores; ferius, & quodammodo

dò leuiùs in plebem sæuierit .

II. Et quanquàm hisce temporibus nonnulli ex diuitibus apoplexiâ tentati fuerint, adhibitâ tamen opportunâ medelâ, vel ipsi vtcumque conualuerunt, vel syderationes in paralyfes concesserunt. Scilicet quia illi, qui euchymis cibis nutriuntur, qui ab aeris inclementia se se tueri magis valent, quique tandèm, quoties morborum prodromis pulsantur, statim ad remedia confugiunt, vel certè cautiùs deinceps in viuendo se gerunt, talem vitiosorum fluidorum cumulum in se minimè congerunt, qui subitam necem afferre possit. Contra verò pauperes, quemadmodum facultate destituuntur deligendi cibum, & potum, cæteraque ad valetudinis tutelam necessaria, ita passim ad vulgaria, minùsque plerùnque salubria, sunt incontinentiores diuitibus; quinimò, quoties alicuius morbi præludijs tentari incipiunt, curationes, vel nullas suscipere, vel prorogare solent; idcirco in ijs tùm solida, præcordia præsertim, ac cerebrum, sensim labefactantur, tùm fluida ad morbos inferendos, ac prædictis in partibus manifestandos, magis exacuuntur.

III. Alterum deindè, quod accuratè paritèr, diligenterque considerandum venit, versatur circa sexum, in quem istarum decursu tempestatum mors furere visa est; hæc enim, vt contrà masculinum hostilitèr agere, ita

*Diuites vtcumq;  
repentinis morbis  
correpti præ pau-  
peribus feliciùs li-  
berati sunt, et cur.*

*Lethalis hæc la-  
bes Mares potius  
inuasit quàm sæ-  
minas.*

se-

sequiorem sexum ferè intactum relinquere, consuevit; vt vix paucas foeminas subito mortuas ad hunc vsq; diem numerare potuerimus. Conditio sanè morbosæ constitutionis, persimilis alteri, quæ Iustiniani tempore obseruata fuit Constantinopolis, vbi popularis quidam morbus mares magis, quàm foeminas absumebat. An quia mulieres, catamenijs repurgatæ, morbificum apparatus ad irritatiuam, ac suffocatiuam plenitudinem colligere, vt plurimum prohibentur? An satiùs quia foeminæ, etiàm plebeia, temperantiùs vitam plerunque ducentes, minùs prauorum succorum solent congerere?

Apud Sigonium de occident. imper. lib. 20.

Vnde hoc.

IV. At illud certè ex duabus hisce obseruationibus præcipuè constare videtur, continentiores in cibo, potu, ac venere a subitaneis mortibus se huc vsque opportunè vindicasse; incautos verò, luxuriosos, vinososque improuisis facilè mortibus concidisse.

Non unicum signorum genus improuisè morientibus præiuit.

V. Postremum sedulò animaduertendum illud sanè est, quod morbi, vndè subitæ mortes ortæ sunt, non semper iisdem signis, ac symptomatibus stipabantur. Etenim aliquibus, per aliquot ante mortem dies, efflorescentia ad cutem apparuit, quâ repulsâ fortissima superuenit apoplexia: vt contigit in primo casu illorum, quos post repentinam mortem dissecuimus. Nonnulli verò, diù ante necem, anhelitu, palpitatione, vertigine, atque animi deliquio sæpiùs correpti, morte

tan-

tandem occubuerunt , vt in V. casu obseruatum . Vidimus etiam non paucos , qui , præcurrente thoracis , totiusque corporis conuulsione , sublati fuerunt , quorum numero quartus casus accensendus . Nec defuerunt qui , ex affectione ferè scorbuticâ diù valetudinarij degentes , propter improuifam tandem choleram , subito conciderunt : quemadmodum accidit cuidam Sacerdoti Societ. Iesu . Denique , vt paucis concludamus , non eadem omnibus communia signa mortem præcesserunt , & comitata sunt : vt iure merito fateri possimus , libitinam ex peculiari vniuscuiusque corporis dispositione magnâ ex parte in Romanos grassatam fuisse . Contra verò fit , cum ex principio duntaxat vniuersali frequentes interitus in genus aliquot animalium debacchantur ; tunc enim eadem semper indicia , actionumque læsiones , mortem præcurrunt . Hinc legitur apud (a) Sylu. anxietates , nauseam , ac vomitum suos in primis ægros inuasisse , & apud (b) Fracast. , de caprigena clade canentem , signa futuræ mortis tussiculam semper præcessisse .

*Si ab vniuersali causa, eadem continuò signa adsunt -*

*a Loc. sup. cit. n. 4., et seq.*

*b in Siphil.*

VI. Accedit etiam , morbos , qui elapsis mensibus ad mortem iter fecerunt , nullâ contagione in affines , necessarios , aut in cadauerum sectores migrare obseruatos fuisse ; indicio fanè non obscuro , nullum in ijs viguisse virus , per quod de vlllo epidemico ,

Q

aut

aut pestilenti morbo fuerit metuendum.

VII. Nouum fanè non est per interualla, incertis reeditibus, hîc illîc subitaneas mortes ex sporadicis morbis in terris apparere. Etenim non solùm Venetijs, sed & Romæ, alijsque Italiæ Ciuitatibus id contigit circa initium præteriti sæculi, vt narrat <sup>(a)</sup> Dom. Tirillus in tractatu, quem de hoc eodem argumento illâ occasione satis diligenter conscripsit. Pariter Romæ sub Alexandto VII. cadauera quamplurima repentè mortuorum adaperita fuerunt a Ioh: Trullio Chirurgo Pontificio, qui, ferè in omnibus, vasorum vel intrâ pectus, vel intrâ cranium rupturas, comperijt. Nouimus etiam ante multos annos in Heturia crebrò homines ex tempore mortuos, quorum causæ modò in cerebro, modò in thorace deprehendebantur, de quorum fanè casibus locutum fuisse arbitramur doctissimum Carolum <sup>(b)</sup> Fracassati. Vt proinde seridè quidem de ipsa morte cogitare, sed mirari minimè debeamus, eandem non rarò clanculum, ac festinanter ad nos venire.

*Plures Italiæ Vrbes hac peste aliàs correptæ.*

<sup>a</sup> De caus. sub. mort. cap. I.

<sup>b</sup> In dissert. epist. de cereb.



*Numerus morientium in Vrbe forsitan  
hoc tempore minor extitit, licet  
maior visus sit, ex quo con-  
sueti, & exitiales Ro-  
mæ morbi nequa-  
quàm vaga-  
ti sunt.*

C A P U T IV.



**N** admirationem certè nul-  
lam peritiores Medici hoc  
anno duci deberent ex pau-  
lò frequentiori subitò mo-  
rientium numero in Vrbe, si  
aduerterint decursu superio-

rum tempestatum, æstatis nempè, autumnii,  
atque hyemis, in quibus crebrò repentini ho-  
minum interitus contigerunt, morbos Romæ  
consuetos, malignas nimirum febres, pecto-  
ris inflammationes, aut prauas dysenterias,  
ex quibus multi solent decedere, rarissimè  
inualuisse; ita vt in hanc nostram temporis  
constitutionem illud aptè quadrare videatur,  
quod (a) Hippocrates ætate sua obseruauit

-- Resolutiones, nimirum, cœpisse ex syderatione,  
& quidem multos ex ipsis subitò mortuos fuisse,

*Grassantibus re-  
pentinis moribus  
ceteri morbi, et  
mortes Romæ mi-  
nùs frequentes.*

a 1. epid. con-  
stit. 3.

Q 2

cum

*Ratio adducitur.*

a De vet. Med.

*cum morbus esset satis popularis. Ceterà incolu-  
mes degebant. Vndè, si subitanæ huius anni  
mortes, quæ ferè solæ contigerunt, confe-  
rantur cum vulgaribus mortibus singulorum  
ex superioribus annis, credimus, hosce interi-  
tus longè minores inuentum iri. Quid igitur  
erit causæ, cur nunc miremur, ploremusque,  
(animarum excepto periculo) fortè non  
adeò magnum numerum acutissimorum mor-  
borum, repentè interimentium, cum plures  
mortes ex alijs, ac potissimùm acutis ægri-  
tudinibus, elapsis annis, impaudi siccisque  
oculis spectauerimus? Ille siquidè prauro-  
rum humorum apparatus, qui aliàs ex æsta-  
te pluuia, ac prauitate fructuum nostris in  
corporibus paulatim colligi, & vi cuiusdam  
fermentationis, ac penè putrescentis liqui-  
di, ægros longiori viâ de medio tollere con-  
suevit; hoc anno in se ipso magis existens,  
vt <sup>(a)</sup> Hip. dicto vtar, promptior ad motum,  
& potentior hîc ad solida irritandum, scinden-  
dumque, illic verò ad fluida coagulandum, aut  
dissoluendum, redditus fuit, proindèque adeò  
præcipites mortes valuit inducere. Exinde ani-  
mos ad spem ereximus, transacto verno æquino-  
ctio currentis anni 1706., per nouam aeris, ac ter-  
raquei orbis reformationem, perq; ventorum  
permutationem, morbosum istum particularum  
concursum, & commixtionem variatum iri: vn-  
dè lethalis, ac mortifera constitutio, de sua*

re-



remitteret fœuitie , Deoque omnium bono-  
rum largitori debitas laudes sospites , hilares-  
que redderemus . Quod fanè præfagium exi-  
tu maximè comprobatum nunc cernimus ,  
cum opus hoc , in lucem edituri , expolimus .  
Sed quoniàm nullum in terris bonum absque  
mixturâ mali hominibus accidit , indè fit ,  
vt , dùm de felici , faustâque repentinarum  
cessatione mortium iure gaudemus , & gratu-  
lamur , sub fœnore beneficium nos accepisse  
præsentiamus . Nunc enim , vel decursu  
æstatis , acutas febres , lethalesque  
peripneumonias fœuire pas-  
sùm intuemur , dole-  
musque .

*Cessatis repentinis  
mortibus consu-  
ti morbi , et let-  
hales recrudesce.*



*Quæ remedia hoc anno ijs maximè profuerint, qui a subitaneis morbis, repentinas mortes minitantibus, euaserunt.*

C A P U T V.



Vm fatis pateat ex antedictis, Nobiles, ac diuites, immò, vt postea resciuimus, nonnullos etiàm pauperes, subitaneis morbis tentatos, hoc anno conualuisse, non dubitamus, quin pius, vtilisque noster futurus sit labor in ijs diligentèr recensendis, quibus iisdem ex repentinis mortibus euaserunt. Ita Medici, recurrentibus aliquandò consimilibus anni constitutionibus, firmata nouis experimentis inuenient præsidia, quorum ministerio ægri vel a morte penitèr vindicari, vel saltem tantum temporis lucrari valeant, vt antea cræ crimina vitæ ( quod cardo rei est ) sacrâ exomologesi expiare, seque Numini commendare possint.

II. Et quoniàm ægri, qui morbi vim superarunt, quantum nobis innotuit, apoplexijs cum epilepticis, vel syncopalibus affectionibus, absque vllâ tamen vasorum scissione,  
aut

aut rupturâ, potissimùm tentati fuerunt; idcirco rationi consonum ducimus, ea nunc remedia indicare, quæ in hac temporis constitutione plerunque vtilia deprehendimus.

III. Inter ea verò, quæ maximè proficere visa sunt, primas tenuit sanguinis missio ab ijs, vel illis venis, iuxtà ægrorum vires, consuetudines, aut suppressas euacuationes celebrata, & præsertim in Viris plethoricis, nunc ex brachio, nunc ex pede.

*Sanguinis missio variè administrata vtilis fuit.*

Vbi aduertimus in affectionibus apoplecticis, cum resolutione alterius cruris, nos proficuum expertos fuisse venæ sectionem ex syderato

*Eadem in syderata parte proficua.*

talo institutam; fluente enim ex affecto membro sanguine (quemadmodum in coxendicis doloribus apertâ sub eodem poplite, vel in crure, quam ischiadem vocant, venâ, feliciter contingere obseruamus) faciliùs, ac fortiùs dimoueri possunt obstacula conuulsionum, & obstructionum, quæ in vasis læsæ partis spinalis medullæ, vel cerebri basis pertinacitè hærent. Quibus autè hæmorrhoides, aut menstrua restitissent, iuuat ex pede, atque ex podice. Tandem ijs, in quos, vel ob prouectiorem ætatem nulla inferiorum venarum sectio cadebat, vel post alias phlebotomias contumax adhuc strangulatio arteriarum carotidum, & sinuum duræ matris perseverabat, miram opem tulit aperire venas frontis, nasi, & præsertim iugulares, ex quarum

*Iugulares, nasi  
&c. venæ quando  
aperiendæ*

rum profectò sectione, quanquam serò, & citrà præuias dispositiones tentata, aliquam tamen vtilitatem repositauit Illustrissimus Præful Rota, qui, cum acutâ feбри, & suffocatiuâ pulmonum plenitudine correptus esset, indicatæ missioni sanguinis ex cubiti flexura (dolente nobiscum D. D. Bernabeo diligenti eiusdem Physico) omninò repugnauit: perperam enim hâc de re astra sibi familiaria consuluerat: factâ postmodum ad cerebrum metastasi, in apoplexiam incidit, & cum minùs speraretur, vt resiperet, incisâ iugulari, statim ad sensuum officia redijt, & suæ compos mentis multas horas pro salute animæ consecutus fuit; licèt eâdem pulmonû affectione redeunte, tandem decesserit.

*Quare vtile sit per  
hæc vasa sanguinem  
mittere.*

IV. Rationes verò, ob quas phlebotomia venarum frontis, nasi, ac potissimùm iugularium in calidis, & sanguineis cerebri affectionibus iuuare plurimùm solet, petendæ forent ex prodromo nostro, quem Antepaxim morborum cerebri inscribimus; vbi solidè agimus de peculiari sanguinis itu, redituq; per cerebri vasa, ac de sublimi artificio, quo instrumenta respirationis, iuxtâ indigentias œconomix animalis, augent, vel minuunt impetum, ac proinde molem eiusdem sanguinis, tum propellendi per arterias carotides, quæ non rectâ, sed obliquâ, atque inflexâ viâ cranium perforant, cum reducendi a iugularibus, quæ non sparguntur per cerebri  
sup-

superficiem, sed medijs duræ matris sinibus sanguinem hauriunt. At enim verò, cum hîc versemur intrâ limites propositi thematis, factis erit indicare, prædictas venas, cum per lanceolam scinduntur, affatim illum, vel illi proximum sanguinem profundere, quo intercepto, sinus tument, cerebrum, ac nervi irritantur, ac premuntur; & quo expeditè recirculante, cor, & pulmo vltro grauarentur. Vndè nil mirum, si, hoc particulari detracto cruore, liberior redditur sanguinis fluxus in cerebro, & præcordijs, ac pro ratione virium causæ morbificæ, atque ægrorum tollerantiæ, istorum viscerum conuulsiones, ac sanguinis quoque moræ impediuntur.

V. Similitè incisio venarum sublingualium in aphonis, detrahens ex affecta parte sanguinem, ea vasorum tollit impedimenta, quæ nervos, inductâ pressione, aut conuulsione, suo priuabant officio.

VI. Sed, redeundo ad hypothèsim, contulit porrò meâ sententiâ in constitutione istâ repentinorum morborum sanguinis missio, quia ægri, quorum mala inducias pro tentandis remedijs Medico præbuerunt, inter illos numerabantur, qui vtplurimum probis alimentis, vino, & cuculatâ vfi fuerunt. Deinde verò, quia illorum non aspernanda, inter externas, causa fuit præferuida, & sicca æstatis constitutio, quâ sales sulphurei, maximè-

R

que

*Jugularium incisio cerebri, et præcordiorum leuamen.*

*Sublingualium in aphonis utilis.*

*Bene nutrita corpora feliciorè sanguinis missionè sunt experta; et cur.*

que acres intrà optimè faginatam sanguinis massam exaltari solent, qui sales, cum solito maiori momento motus quaquaversùm per corpus ferantur, minimo negotio intrà tendineo-musculares membranas sinuum duræ matris, ac magnorum vasorum cerebri, aut præcordiorum impingunt, easque rigidas faciunt, & crispant; exinde, angustatis sanguiferorum finibus, & caudicibus, libera tollitur, apud huiusmodi viscera, ipsius sanguinis circulatio, quam, vasorum interceptionem, vocavit Hippocrates, qui sanè primus hinc in casibus phlebotomiam laudavit. Et quidem huiusmodi affectiones si rupturâ vasis caruerint, remittunt missio sanguine, quia nempe scissâ venâ simul cum ipso cruore, quâ datâ portâ, illud effluit acro-volatile, quo detracto, statim eneruatur, ac debilitatur excessus momenti eiusdem sanguinis contra vasa, quæ propterea excessu tensionis, & crispaturæ contra sanguinem nitebantur. Insuper, inducto per phlebotomiam novo in sanguiferis spatio, fluidorum motus, & remixtio liberior redditur, indèque, si quæ alicubi vrget canalium conuulsio, vel obstructio, rapiditate introfluentis liquidi remittit, ac cedit.

*Hippocratica vasorum interceptionis modus exponitur.*

*Hanc phlebotomia tollit teste Hippocrate.*

*Sanguinis missio Romæ non semper proficua.*

VII. Hic seriò aduertendum putamus, nos missionem sanguinis non semper in epilepticis, apoplecticis, ac suffocatiuis affectionibus Romæ proficua expertos fuisse; idcirco, cum

in

in subitis casibus nostræ confusio mentis pronum faciat iter ad errorem, caueant Medici, ne ad huiusmodi, quod tantoperè apud aliquos laudatum, expeditumque est remedium, inconsultò descendant; cupientes enim sanare ægrum, vt Celsi dicto vtamur, ex tempore iugulabunt. Sedulò itaque videant, quæ scripsit <sup>(a)</sup> Hippocrates, circa indicationes, ac signa pro mittendo in ijs casibus sanguine; & de tempore quoque, in quo conuenit, (quod circa mali principia esse solet) consulant doctissimos Viros <sup>(b)</sup> Ballonium, & <sup>(c)</sup> Martianum.

a De vict. rat. in morb. acut. n. 37. et seq.

b Lib. 2. consil. in com. ad histor. 1.

c In com. ad suprad. Hip. textu.

VIII. Quid? quòd Romæ rariùs, quàm in montanis regionibus venas incidere conuenit, præfertim cum vel corpora ingluuiei multigenæ, & impuræ sunt assueta, vel æstas viget pluuia, fructusque ad perfectam maturitatem non peruenerint; quibus de causis incolæ, ac Ciues apparatus cumulant humorum, ex quibus plus impuri, quàm balsamici sulphuris, plus fixorum, quàm volatilium salium redundat, & proindè laxata fluidorum compages ad eam prona fit crasim, quam scholæ satis barbarè putredinosam, ac malignam appellant, in qua quidè, propter volatilium partium penuriam, instar toxici esse solet Phlebotomi lanceola. E contrariò, cum optima præcessit victus ratio, atque æstas pertinacitè feruet, ac sicca permanet, fructus-

*In' male nutritis corporibus sanguinis missio cur perniciosa.*

*In bene partis quã  
uis senibus ea-  
dem salutaris.*

*Mira ad hanc rem  
historia.*

que abundant maturi, Romanorum in corpo-  
ribus sulphur, salesque, etiãmsi acres, vo-  
latiles tamèn, vt superiùs monuimus, eue-  
huntur, & subseruiunt vtilitati, ex ipsa san-  
guinis missione capiundæ; quemadmodum  
contigit hoc anno, quo etiam in senibus be-  
nè nutritis mirum, vel ipsã docente naturã,  
habuimus experimentum. Dominicus Vec-  
chiottus septuagenario minor, habitus ple-  
thorici, ac pinguis, fessili vitæ deditus, &  
carniuorus, cum per mensem circiter capitis  
grauitate, ac somnolentiã adeò premeretur,  
vt in ipso telonio, pecunias numerando, ce-  
dulasque scribendo, dormitaret; vndè iam  
in limine apparens timebatur apoplexia: no-  
cte quadam improuisò largã e naribus corre-  
ptus fuit hæmorrhagiã vndecim librarum pon-  
dere, quã sanè non modò nullam ipse pas-  
sus est sensibilem virium iacturam, sed ab  
illo capitis veterno, se valde leuatum sensit;  
immò post 15. dies, alijs quatuor libris ef-  
fluentibus, omninò vindicatum. Magnum  
profectò docilibus Erasistrateis lumen, atque  
exemplum; ita vt Clarissimus, parique do-  
ctrinã, & facundiã præditus, Iacobus Sini-  
baldus in consilium vocatus, visã integrã  
iudicatione, nihil innouandum censuerit,  
solã admonitione contentus in diætæ regimi-  
ne, & præmaturã deinceps phlebotomiã, cum  
primùm turgentia signa fuerint apparitura.

Se-



IX. Secundò, ea paritèr omnia in corporibus benè nutritis iuuamen attulerunt, quæ ad superficiem, atquè ad extremas corporis partes illam reuellere potuerunt irritationem, quam in præcordijs, aut cerebro, sub forma strangulationis canalium, tanto cum ægrorum discrimine incuneatus subtilis ichor moliebatur. Immò hoc remedij genus eò securiùs opem tulit, quò magis irritatio euacuationi ferofitatum falino-acrium tanquàm causæ morbificæ iungebatur. Idcirco ex vsu fuerunt non solùm frictions, & cucurbitulæ, sed phœnygmi quoque, & vesicantia plantis pedum, artubus, & occipiti, statim admota.

*Laudantur Reuellentia.*

X. Neque porrò dubitamus, quin vesicantibus opus sit in curatione huiusmodi subitaneorum morborum, dummodò a vasorum rupturis non proficiscantur. Etenim, cum istorum plerunquè causæ malorum sint succi, ex omninò præternaturalibus particulis coalescentes, motuque penitùs inordinato præditi, qui non continuò congruunt cum fecer- niculis naturalibus, ad naturales, & consuetos recrementitios humores excipiendos comparatis; necesse profectò est in repentinis hisce affectionibus ad artificialia, & morbosa emissaria recurrere; vt ægri, apertâ per artem viâ, statim id assequantur, quod vix serò, & difficulter naturæ beneficio impetrarent, quæ & ipsa, vbi viribus magis valet, nixu suo, non-

*Vesicantia opportuna si vasorum ruptura non adsit.*

*Eadem sunt emissaria artificialia ad supplementum naturæ, et imitationem.*

nonnisi nouis patefactis vijs , nempè per ab-  
fcessus , laboranti succurrit .

XI. Silentio deindè minimè prætereun-  
dum videtur , quod a D. Doctore Misti-  
chello non aspernandum accepimus , nimi-  
rùm a se obseruatum fuisse in Xenodochio  
Insulæ Tyberinæ , vbi curandis ægrotis præpo-  
situs est , aliquos de plebe , quos nullum  
quantumuis validum , atroxque remedium a  
fortibus apoplexijs excitauerat , per admota  
plantis pedum ignita ferramenta ad vitæ of-  
ficia subitò reuocatos . Scilicet , quemadmo-  
dùm (a) Claudinus consulit in apoplexia , &  
syncope punctiones volis manuum , & post  
(b) Fort. Fidel. , (c) Henricus ab Heers nar-  
rat , se aciculam prælongam inter pollicem pe-  
dis sub vngue cuiusdam apoplecticæ , nullum  
vitæ signum præbentis , adegisse , illamque  
momento citiùs excitasse ; ita certò credimus  
multò efficacius præsentem ignem , validissi-  
mè irritando fines neruorum , maximum in  
ijsdem tremorem , & subtilissimarum partium  
excursum per eorundem filamenta inducere  
posse , qui , ad vsque principium propagatus ,  
fortitèr etiam excutiat quidquid cerebro , &  
neruorum ostiolis pertinacitèr hæret , & per  
talem duntaxat maximam neruorum succuf-  
sionem , & particularum ignearum penetra-  
tionem amoueri potest . Quo fit , vt omnes  
ferè Practici in curatione fortis apoplexiæ me-  
mi-

*Ignita ferramen-  
ta plantis pedum  
admota .*

*a Empyric. Ra-  
tion. lib. 3. cap.  
17.*

*Punctiones item  
volis manuum .*

*b De relat. Med.  
lib. 4. cap. 1.*

*c Obs. 21.*

*Acicula sub pol-  
lice pedis adacta .*

*Ignis vis quando a  
cerebro, neruisq.  
impactum excu-  
tiat .*

minerint, non tantum fonticulorum occipiti, sed etiam laminarum ignitarum, ipsis futuris admouendarum. Ac propterea anilem censeamus metum nonnullorum, qui, ne morbi causam, forsitan igneam, exacuant, a vesicantium, ignisque usu, in huiusmodi malis, omnino abhorrent. Aliud enim est methodicas, regulares, aut praeferuatiuas, aliud coactas ac repentinas morborum curationes instituire.

*Laminae ignitae in forti apoplexia commendatae.*

*In curatione coacta valida non damnanda remedia.*

XII. Tertio, leuamen pariter non leuè porrexerunt ijs, qui, post sanguinis missionem, vel sine illa, deglutiendi potestatem recuperarunt, ea, quae aluum laxare, ac mox validius mouere potuerunt. Atque hinc, si quando infimi tensio, ac renixus ventris (quod saepe accidit) occurrebat, statim exhibuimus oleum amygd. dulcium, & iniicienda curauimus clysmata emollientia, simulque irritantia. Vbi verò ventris durities aut minimè deprehendebatur, aut mox per oleosa cedebat, maximè etiam profuit pul. Cornacchini, vel aliud validissimum soluens, cum superhaustu copiosi diluti ex iure, vel aqua hordei, ad tollendam scilicet siccitatem, ac stimulum, qui a forti cathartico induci solet. Neque sanè de huius quoque pharmaci utilitate ambigendum nobis fuisse, visum est per hæc tempora, in quibus non massa duntaxat sanguinis, sed ipsa quoque hypochondria apud ægros multitudine bilioso-acrium,

*In abdominis tensione emollientia irritantibus miscenda.*

par-

*Vomitus aliquibus proficiunt.*

particularum redundabant. Quinimò profecit etiàm vomitus apud illos, qui vel huic affueti fuerunt egestioni, vel ex crudioris adhuc cœnæ pondere laborabant.

a 7 epid. n. 83.

*Diluentia temperata etc. ab Hipp. etiam laudata.*

b In com. præd. hist.

*Martiani præceptum in apoplecticis curandis.*

c Vers. 64.

XIII. Quartò, non leuitèr iuuarunt in curationum progressu ea omnia, quæ aquoso fluido laxante, ac temperato redundant, cuius generis extiterunt potus aquæ, iura simplicia, distillata magistralia, succi herbarum epicerausticarum, emulsiones amygd. dulc., gelat. C.C., & similia, quæ nimirum tum sales acres, & sulphureos temperare, diluere, atque irretire, tum vel maximè conuulsas alicubi vasorum fibras laxare valent. Hæc quidèr apprimè congruunt cum ijs, quæ tanquàm salutaria experta proponit (a) Hippocrates in curatione Androthali, qui cum *aphonia*, rerum obliuione, ac delirio per interualla detineretur, leuabat post sanguinis missionem aquæ potus, & aqua mulsæ; nimirum quia causa morbi erat humor biliosus, & atrabilarius, qui temperantibus mitescit, vt exponit (b) Vallesius. Quâ fanè in re laudarem, vt Clinici sæpè manibus tererent notationes Prosperi Martiani ad Hipp. textum 2. de (c) morbis, vbi per hæc verba aduersus eos, qui in apoplexiæ curatione calefacientibus vtuntur, exclamat. -- Videant posteriores, quantum a Præceptoris doctrina, & ex consequenti a veritate recedant, dum cuiuslibet apoplexiæ causam, aut saltèr

pro

pro maiori parte in pituitam frigidam, & humidam referentes, curationem perpetuò calefacientibus, & exiccantibus instituunt; quandoquidè, facta totius corporis purgatione, si morbus præbet inducias, ad vulgata sua decocta ex guaiaco, saffras, alijsque similibus, tanquam ad columnas Herculis, confugiunt; cum animaduertere deberent ex tribus apoplexiæ speciebus unicam tantum, & de rarò contingentem, in frigidos succos, Hippocratis consilio, referendam esse.

*Apoplexia in frigidos succos rarò referenda ex Hippocr.*

XIV. Tandem non tenuem opem tulerunt ea, quæ benignè discutunt, mitesque spiritus refocillant, & expediunt, cuius ordinis sunt tincturæ ex confect. de Hyac., & Alchermes; guttulæ aliquot spiritus ceras. nigr., vel mannae; quem vitæ appellant; itidem tinctura auri absque menstruo corrosiuo parata; ut etiam sales volatiles cornu cerui, cranij humani, succini, & similibus, quæ sanè largo sempèr haustu fluidi aquei miscebantur. Proferunt pariter theriaca, castor., & spirit. salis armoniac. naribus, ac temporibus admota;

*Multi generis volatilia, et cordialia in vsum vocanda.*

ita tamen, ut perpetuò cauerimus a volatilibus vinosis, alijsque sincerè, hoc est absque copiosi fluidi admixtione, per os exhibitis.

*Non tamen vinosa.*

## OBSERVATIONES

*Physico-Medicæ*

NONNULLORVM,

Qui, cum primùm istiusmodi re-  
pentinis morbis tentati fue-  
rint, feliciter euaserunt.



*ED* iam obseruatio-  
nes aliquot adij-  
ciamus, & sum-  
matim describamus  
historias nonnullo-  
rum, qui *Medicæ*  
*Artis* ministerio a  
grauissimis huiusmodi morbis vindica-  
ti fuerunt, quorum curationibus unà  
cum præstantissimis *Vrbis* *Physicis* in-  
terfuimus, & ex quibus ad consimiles  
casus exempla, & documenta petan-  
tur.

## OBSERVATIO I.

*Apoplexia cum aponia , & paralyfi  
dexteræ corporis medietatis , phle-  
botomia , catharticis , ac  
diaphoreticis soluta .*



Rimus , vel certè dignior ,  
maximèque suspiciendus , qui  
inter Nobiles , elapso anno ,  
vim mortis euasit , fuit Il-  
lustrissimus , ac Reuerendif-  
simus Archiepiscopus Botti-

nus , Vir octogenario maior , probitate , ac  
doctrinâ insignis , habitus sanguineo-carnosi ,  
miræque morum suauitatis . Hic , post gra-  
uia animi pathemata , quæ in sublimioribus  
ingenijs non rarò efferuescunt , mediâ æstate  
anni 1705. subiit intensiora quædam studia ,  
indèque passus fuit capitis excalesfactionem ,  
& suppressionem consuetæ per os matutinæ  
euacuationis viscidulæ lymphæ .

II. Tandèm circa initium Augusti , post  
capitis grauitatem cum leui manuum tremo-  
re , apoplexiâ correptus fuit , a qua euasit , suc-  
cedente paralyfi totius dexteræ medietatis , ac  
persistente aponiâ , quam sanè , cum injecti  
clysteres , exhibiti sales volatiles , admota-

*Aphoni sublingualium a venarū incisione curata.*

*Oris collutiones in aphonis.*

*Muris mōtani adeps ad paralyfim.*

que femoribus, brachijs, & nuchæ vesicantia tollere nequirent, profectò mirabiliter, quod repentè acciderit, vna soluere potuit missio sanguinis ex sublingualibus venis. Et quoniàm superuenit ab initio febris, plura exhibita fuerunt pharmaca partim aluum mouentia, partim diluentia, ac benignè dissoluentia, inter quæ postrema primas tenuerunt stibium diaphoreticum, ad viginti dies continuatum cum iure ex herbis alchalicis; nec non guttulæ spiritus, quem vocant vitæ, ex manna sublimatum; & quædam oris ablutiones actu calidæ ex decocto emollienti, & cephalico, additis nunc sale prunellæ, nunc spiritu salis armoniaci. Quibus remedijs, & multa per aluum biliosa recrementa, & copiosi sudores eruperunt. Sed, quod maximi interfuit, antiqua reuocata est tenacis lymphæ per os excretio; sicque Æger, qui nunc sextum suprâ octogesimum implet annum, simplici falsæ infusione tractatus, eousquè meliùs paulatim processit, vt spatio quinquaginta dierum e lecto surrexerit, illo etiam crure, quod syderatum ab initio fuerat, ad ambulandum soluto. Deinceps verò, cum affectum brachium fricari cœpisset manibus, inunctis adipe muris montani, quem Matthiolus italicè vocat *marmontana*, tantum profecit, vt modò epistolas suâ manu subscribere, & Missæ Sacrificium ritè possit celebrare.

Si-



III. Simile commodum per hæc tempora ex eodem montani muris adipe ( quantum ex aliorum relatione nouimus ) reportauit Diues etiam in Vrbe Senex , qui post præteritam apoplexiam , atque aphoniam , contumacissimâ paralyfi detinebatur . Hic enim adeps mirè valet ad soluendum quidquid extremis tubulis , ac villorum poris hæret impactum , simulque ad emolliendas musculares artuum fibras .

IV. In hac verò Præfulis medelâ , quam in vltimo senio fuisset constitutus , diligenter obseruauimus vtilitatem ex phlebectomia , & prodigio similis nobis occurrit linguæ ad loquendum solutio , eo ferè momento temporis contingens , quo sanguis ex venis raninis affatim fluebat ; indicio certè admodum euidenti , morbum ex interceptione vasorum sanguinis ad cerebri potissimum basim , & ad linguæ radicem , adglutinante muco , ortum habuisse , quâ solutâ interceptione , contiguorum , & continuorum neruorum libertas emicuit , quam ex earundem sectione venarum videtur spondere <sup>(a)</sup> Simon Paulli in quodam Consilio ad aphoniam .

*Raninis incisis cur  
statim loquela re-  
dierit .*

*a Adnex. ad cal-  
cem tract. de feb-  
maling.*

V. Huic verò curationi interfuerunt Viri Clarissimi DD. DD. Placentius , Manfredus , Bernardini , & ipse ego , iussu CLEMENTISSIMI PONTIFICIS , qui egregij huius Præfulis iacturam grauissimè ferebat .

## OBSERVATIO II.

*Fortis Apoplexia cum relicta paralyfi  
feliciter curata in Matro-  
na sexagenaria.*



*Suppressis hæmor-  
rhoidibus fortis a-  
poplexia.*

Matrona quædam nomine Cherubina Leopardi, corpore subpingui, sexaginta annos nata, ob suorum probitatem morum, eximiaque virtutes, annis profectò digna nestoreis. Hæc diù spasmodicis circa col- lum, & pectus doloribus, leuique vertigi- ne diuexata, meliùs interdùm se habebat, cum sanguis flueret ex hæmorrhoidibus, qui- bus restitautibus, & præcurrentibus alui tor- minibus, ac fluxu, deindè verò sinistrorum artuum contractionibus, pridie Kalendas De- cembris 1705. in subitam incurrit apople- xiam, quæ externos, internosque sensus proprio vsu, partesque omnes motu priua- uit; sed, adhibitis illicò cucurbitulis, vstione, suppositorijs, vesicantibus dexteris artibus, & ceruici, admotoque naribus spiritu salis armoniaci, balbutiens resipuit Matrona, quæ sequenti mane, hausto syrupo persico, lauda- bilitèr purgata est. At verò, cum adhuc gra-  
ui

ui sopore detineretur, etiam post paralyseos decubitus ad sinistras corporis partes, accersor ipse, & facti conscius, non dubitavi cum solertibus Physicis curantibus D.D. Pierleono, & de Rubeis, quin ex hæmorrhoidali restitente hæmorrhagia, atque ex acri, sulphureâque hypochondriorum saburrâ atrox malum magna ex parte penderet. Quoniam verò sales volatiles viper., succin., cornu cervi, cranij humani, aliaque cephalica calida minimè conducerent, propterea mariscas aperiri iussimus, quæ phlebothomia utilitatem attulit, cum indè, a motis imi ventris repagulis, sanguis liberiùs per vasa moveri cœperit, vndè febris non sinè magno leuamine excitata fuit. Ægra enim, quæ priùs ferè muta, obtusa, inersque sensibus fuerat, loquacissima euasit: sed cum facilè in soporem recideret, idcirco syderatis etiàm artubus, noua admota sunt vesicantia, quæ affluenter, & commodè viscidulâ lymphâ per octiduum manarunt. Interea temporis, cum nondùm cerebrum integrè extranea sibi fluida remisisset, iuuit præbere pillulas de succino Cratonis, atque adijcere frequentes clysteres: cumque sitis vrgeret, largas potiones hausit ex iure cornuceruino, & aquis cephalicis. Demùm transactâ trigestimâ die, & repetitis pillulis de succino cum flor. cassiæ, tantùm solâ infusione eboris, & salsæ processit, vt mitiori super-

*Iisdem arte reuocatis morbi diminutio.*

*Vesicantium utilitas.*

*Salsæ infusio.*

ue-

ueniente veris tempestate, ac proindè, libe-  
riore succedente transpiratione, ad confue-  
tum ciuilibus vitæ vsum, proprijs innixa pedi-  
bus, redierit.

II. In hac profectò Matronâ vim humoris  
penè furentis, quem Prisci vocant melan-  
cholicum, atque atrabilarium, apertè obser-  
uauimus; acre enim, ac sulphureum fermen-  
tum, ab hypochondrijs per venas ad præcor-  
dia, & cerebrum exaltatum, loca omnia,  
per quæ gradiebatur, & in quæ decumbe-  
bat, miris modis, doloribus videlicèt, ver-  
tiginè, conuulsionibus, apoplexiâ, sopore, &  
febris affecit; vt nullum fuerit dubium,  
quin Oraculum <sup>(a)</sup> Hippocratis nouam fem-  
per veritatis lucem ab experimentis mutue-  
tur, *morborum nempe omnium vnum, eundem-  
que modum esse, ipsum verò locum illorum diffe-  
rentiam facere.* Etenim, quanquàm colli, &  
pectoris dolores, vertigines, alui fluxus, mo-  
tus conuulsiui, apoplexia, & paralysis, pro-  
ptèr locorum diuersitatem, nihil inter se si-  
mile habere videantur, vna tamèn sæpè, ea-  
demque est, vt idem subdit Hippocrates, il-  
lorum species, & causa.

III. Illud insuper circa vesicantia ad me-  
moriâ hîc reuocandum censemus, quod po-  
stremo huius lib. cap. monuimus, scilicet magnâ  
ex ijs vtilitatem euacuatione viscidulæ acer-  
rimæque lymphæ in huiusmodi casibus præ-  
sta-


a Lib. de flat.  
n.4.

Morbi ex locotân-  
tium differunt iu-  
xia Hip.

stari posse ; quia nimirum validius est remedium , ad omnino præternaturalem humorem extrahendum , morbofa emissaria subito artificio aperire , quàm inani spe illius concredere euacuationem ordinarijs fecerniculis, quæ, cum consueta sint nonnisi sensim congruere cum fluidis , mixturâ , ac motu naturali gaudentibus , nec subito , nec tuto præternaturalibus excipiendis liquidis aptari possunt : parcendumque propterea est ijs Cl. Viris , qui , in factitanda medicina nunquam vesicantibus vtentes , illorum vim experiri , ac suspicere non possunt . Vndè in subitaneis morbis sæpè accidit , vt , dum Medici folius consopitæ naturalis œconomia munerera formidolosè promouere student , ægri properent ad interitum .

*Vesicantia fecerniculũ excitant liquido præternaturali expurgando idoneum .*

*Solis fecerniculis naturalibus cur nõ semper morbofi liquidi repurgatio concredenda .*



## OBSERVATIO III.

*Subita capitis occupatio cum aphoniam ex affectione cerebri partim idiopathica, partim sympathica, prosperè cedens.*



*Victus plenus Romæ quibus præsertim noxius.*

Reuerendissimus Pater Alderanus Malaspina, Abbas S. Pauli ex Benedictina familia, sexagenario maior, corporis habitus mediocris, ingenio constanti, serioque, cum ex varijs per Italiam itineribus, curisque animi, malignam febrim Cæsenæ, ni fallor, ante annum contraxisset; indèque valedudinarius de hypochondriorum plenitudine, de stomachi cruditatibus, deque capitis dolore, Mutinam profectus, quereretur. Tandem summâ hyeme anni 1706. Romam venit, vbi, cum fortè paulò largiori vteretur victus ratione (quæ, tametsi plerisque Flaminia, & Gallia Cispina incolis ita sit innoxia, vt, proptèr subtilissimum illius cœli temperamentum, potius sit necessaria, in Vrbe tamen, potissimum apud illos, qui sessilem vitam in studijs plerunque ducunt, semper est periculosa) accedentibus etiam prin-

ci-

cipio sui ministerij pluribus, tediōque plenis laboribus, incidit in comatis speciem cum aphonia, ad quam curandam accitus eruditissimus Ioh. Trullus, vnā cum alijs Cœnobij Physicis, statim catharticum, variaq; cephalica, prudenter exhibuit. Cumq; postridie, ob mali momentum, ipse quoque in consilium adhibitus fuerim, non dubitavi, quin morbus partim esset sympathicus ex stomacho, & hypochondrijs, partim idiopathicus ex languidiori reddito membranarum, vasorumque capitis tono, hærentēque crassiori lymphâ ad cerebri præsertim basim. Vndè tria potissimum, pro abigendâ ægritudine, omnium consensu, decreta fuerunt remedia, scilicet primò citissima phœnygmarum admotio femoribus, brachijs, & ceruici, secundò epicratica purgatio cum pillul. ex rhab., pulu. stomach. Quercet., & granis scam. sulphur., succini, & casto: tertio omnimoda vini subductio; quibus sanè auxilijs, intra triginta dies conualuit. Sed, cum post vernū æquinoctium ad Monasterij curas properè, atq; adhuc impotens redisset, improuisò in aphoniam recidit, quæ, licet comati non iungeretur, adhuc tamen futuræ apoplexiæ metum assidentibus incussit. Sed propinato statim puluere Cornacchini, nouissime admotis femoribus, & occipiti vesicantibus feliciter, citiusque reualuit. Et quoniam languor stomachi pertinacius vrgebat, idcirco plus viginti dies hausit magno cum

*Curatio Comatis  
ex consensu stomachi,  
et capitis.*

*Ad stomachi languorem ius appropriatum.*

fructu ius pipionis turratil. in cuius ventre parum lignorum sassafra, & Visci Quercini, cum rad: , & herbis deobstruentibus , stomachicis , & cephalicis inclusum fuerat .

*Phlebotomia cur  
omissa fuerit .*

II. In hoc sanè Præsule cum subitus capitis morbus vitio tum primæ digestionis, cum collectæ in vniuerso corpore , sed in cerebro præsertim lentæ, ac viscidulæ lymphæ ortum habuerit, nulla mentio de mittendo sanguine facta fuit, ac solerter utilitatem , ex aluum soluentibus , atque ex vesicantibus reportandam , loco phlebotomiæ, constituimus , vt de Ægro nobis pollicebatur . Et quoniàm religiosissimus

Vir, congruâ deinceps corporis exercitatione, diætâ , atque purgatione per epicrasim.

vsus fuit ; idcirco  
firmiùs sanatus est.





## OBSERVATIO IV.

*Apoplexia cum affectione epileptica, &  
 Syncopali in paralyfim dexteræ  
 medietatis corporis, salua  
 tunc Aegri vita,  
 concedens.*



Illustrissimus, & Reueren-  
 diffimus Bartholomæus Spa-  
 da, Cam. Apost. Clericus,  
 & Basilicæ Vaticanæ Vica-  
 rius, annorum 50., statu-  
 ræ proceræ, habitus ad gra-  
 cilem tendentis, moribus serijs, ac religio-  
 sis, linguâ ab infantia paululum tardus, ster-  
 no admodum depresso, conuulsiuoque asth-  
 mati per interualla obnoxius, cui fluida  
 sempèr profuerunt, cum ferè antè an-  
 num ex duabus sibi diù consuetis euacuationi-  
 bus, sanguinis nimirum hæmorrhoidalis, nec-  
 non acris narium mucis, illam haberet, si  
 non valdè diminutam, saltèm non largè fluen-  
 tem, hanc verò penitùs suppressam (forsitan  
 ob inspirata recentis effluuia calcis, ex nouo,  
 iuxtà quem incautè dormiuit, muro) pau-  
 latim, præterito autumno, fluxionem rheuma-  
 ticam, erraticamque febrim incurrit; inde-  
 que

*Suppressio nari-  
 um mucis ex recentis  
 calcis effluuijs.*

que, collectis apud hypocondria, & præsertim læuum, tenuis obstructionibus, res eò deuenit, vt febris, ac dolores contumacissimè redierint. Sed Medici antiquæ memores vtilitatis, ex fluidis reportatæ, illum varijs temperantibus curarunt; quinimò vsu etiàm chinæ chinæ tum febris, cum dolores penitus exularunt. At, cum Æger pietate, ac lege sui muneris impulsus, integram Sanctissimi Natalis noctem anni 1705. in Basilica Diui Petri, frigore, atque inediâ tortus, peruigilasset, postero die graui febris, cum acutissimo in coli flexura dolore corripitur, cui licèt oleum amygdalinum, externaque fomenta, & clysteres opportunè profuissent; attamen vix hebdomadâ morbus quieuit, quâ transactâ, atrox sub poplite dolor subito inuasit, qui paritèr laxantibus cessit. Post hæc, secundo Februarij 1706., dum, flante boreâ, Valetudinarius publicè Sacris adesset, ob inopinatum animi deliquium, domum reducitur, & sequenti nocte immani tentatur dolore circum dexteræ mandibulæ articulationem cum faucium phlogosi, a quo malo exemptus fuit cucurbitulis scarificatis, fomentis anodynis, iniectisque clysteribus.

II. Sed, cum Æger fortasse nunquam se meliùs, quàm die 18. eiusdem mensis, habuisse videretur, proximè cœnaturus, apoplexiâ repente corripitur, post irregularem totius cor-

*Vagi externarum  
partium dolores  
tandem in apople-  
xiam cedentes.*

poris motum , cui dexteri brachij sydera-  
 tio , oris tortura , auctaque linguæ hæsitatio  
 illicò successerunt . Accurrunt Medici , &  
 prætumidam , ac subrubram illius faciem ,  
 consuetumque hæmorrhoidum fluxum perpen-  
 dentes , iubent mitti sanguinem ex talo ; cum-  
 que constaret fluidum acre , olim per nares  
 excerni solitum , hæc illac pererrasse , con-  
 sultò admouerunt vesicantia femoribus , &  
 cruribus , nihilque omiserunt , quod succo-  
 rum acredinem mulcere , tonumque cerebri  
 firmare potuisset . Nequè verò vllum de ex-  
 hibendo statim cathartico consilium fuit , cum  
 hypochondria subtenfa , atque irritata , beni-  
 gnam laxantis pharmaci facultatem subito  
 postularent . Hinc exhibitum oleum amyg-  
 dalinum cum syrupo violato , indeque iniectis  
 fortibus clysteribus , copiosè fluxit aluus .  
 Sed cum omnia feliciter progredi videbantur ,  
 postridiè prætumida , ac subrubra recurrit  
 facies , turbatur mens , conuelluntur labia ,  
 atque artus ; mox in syncopem recidit Ægro-  
 tus quem propterea sine pulsu , respiratione ,  
 ac voce , lugent vt mortuum . Recens hoc  
 mali augmentum docuit ex hypochondrijs ,  
 per albas , rubrasque venas , liquida fibras irri-  
 tare , & conuellere apta , in præcordia , atq;  
 in cerebrum , indeque per neruos in vniuer-  
 sum corpus erroneo motu transduci : vndè ,  
 excitato priùs Ægro a paroxysmo cum spiritu  
 sa-

*Hypochondrioriæ  
 tensio sublata .*

*Syncopis , et con-  
 uulsionum recur-  
 sus vndè .*

salis armoniaci , & oleo Matthioli , omnium consensu Curantium propinatum fuit pharmacum ex infusione fennæ , & tartaricum syrupo violato , præmisso bolo ex stybio diaphor. , cui accesserunt antepileptica , ex cinnabari natiua , & succino , atque , ob gracilem Præfulis habitum , copiosa , ac temperata diluta .

III. Cum verò in hac morbi recrudescentia oculi subtensi , ipsaque taciturnitas satis admonerent , cerebrum minùs per venas refudisse , quàm accepisse per arterias ; idcirco nouum occipiti vesicans admouendum iudicauimus , quibus remedijs Æger circa mentis operationes meliùs se habuit , vrinis redditis circa septimum copiosis , atque interdum etiàm stranguriosis .

*Morbi ad exteriora conuersio .*

IV. Sed , quanquam serositates acres , ex vesicantibus largè fluentes , vnà cum rubicundis quibusdam herpetibus sub affecta scapula , & circa dexteram dorsi partem spontè obortis , multum de præcordiorum , & cerebri infarctu extra corpus deriuasse visæ fuerint ; nihilominus tamen recurrentes pulsus inæqualitates , vrinæ stranguriosæ , rubor faciei , circumfensius capitis dolor , oculorum immobilitas , splendor , ac strabismus , deniq; taciturnitas , ac subobscuræ motiones mentis non mediocrem incutiebant metum , ne acerrimi succi , qui in cerebro , & hypochondrijs pertinacitèr adhuc

in-

intercipiebantur, mortiferas syncopes, & epilepsias aliquandò renouarent. Qua de re ad istam causam magis diminuendam purgans benignum, duodecima die, repetitum fuit, & hirudines mariscis, præter solitum tumidi-  
dioribus, ante 14. admotæ sunt; non omis-  
sis frictionibus, pediluijs, & laxantibus, sub-  
tenso abdomini adhibitis.

*Syncopis, & epi-  
lepsiæ periculum  
detractum.*

V. At verò, licèt omnia sensibili fructu ad vsum venerint, nondum tamèn sæuitia morbi pelli omninò potuit; etenim a die 13. vsque ad 20. non semèl syncopes, vaniloquia, & conuulsiui motus redierunt; quorum sanè potior malorum causa, superatis tandèm præcordiorum anfractibus, cerebrique flexi-  
bus, per neruos extra cranium fuit paulatim detrusa, atque in femore, & crure dextero intercepta, quibus in locis paralyfim, tan-  
quàm opportunum decubitus, induxit.

*Ab his opportu-  
nus transitus in  
paralyfim.*

VI. Intereà temporis nulli non Curantium perspicuum erat, mixtum hunc morbum ex apoplectica, epileptica, & syncopali affectione in Viro graui, & melancholico, a sanguine, miscellâ salium lixiuialium, & impuri sulphuris imbuto, atque infecto potissimùm produci, ideòque locum habere illud (a) Tral-  
liani, quo monitos vult Medicos, ne in curatione paralyseos decipiantur, fumentes (lo-  
quitur enim iuxtà vulgarem sui temporis hypothesim) calidam causam pro frigida. Id-

a Lib. I. cap. 16.

*Hirudines nari-  
bus applicitæ salu-  
tares.*

*Seto Cervici uti-  
liter admotus.*

*Medici labor  
in solidorum mor-  
bis.*

circò vnicè studuerunt diluere huiusmodi pe-  
nè igneos sales , exhibitâ aquâ Nucér. , nunc  
simplici , nunc in speciem iuris , aut emul-  
sionis , nec non tentatis Balneis aquæ dul-  
cis . Sed profectus nonnisi incerti , ac diarij  
vsque ad 27. extiterunt . Quaproptèr ad de-  
plenda cerebri vasa , quæ splendidis , rubenti-  
busque ex oculis tumentia perspiciebantur ,  
applicitæ fuerunt hirudines ad venas narium ;  
indèque vaniloquium , atque insomnium ma-  
gna parte remisit . Cumque persistens capitis  
grauitas , dolor , ac taciturnitas arguerent hæren-  
tem in membranis , & intrâ cerebrum acerrimam  
lympham , quâ olim illius nares manabant ,  
eâ ratione tunc noua dedimus antepileptica ,  
partim ex crystall. mont. , corall. , & rad.  
valer. , partim ex pane , & croco metallor. ,  
iuxtâ Quercet. normam , parata ; & præcipuè  
setonem cervici admouimus , cuius ex vlce-  
ribus crassa , copiosa , & acris fluere cœpit fa-  
nies , vt breuè , depleto cerebro , grauiora  
eiusdem symptomata mirabiliter cesserint .

VII. His certè auxilijs , & omnimodâ  
vini abstinentiâ compesci , non planè profligari morbus passus est . Cum enim fluida  
iunguntur solidis ad maleficia , oporteret  
Medicum permutare posse totum hominem ,  
vt prudenter scripsit Aretæus , quod nèc Dijs  
suis facile fore putauit . Itum igitur nunc  
arescentibus , nunc reuifcentibus sympto-  
ma-

matibus vsq; ad 50. diem, quo tempore præcordiorum, & cerebri mala, aperto etiàm spontè in coccyge tuberculo maiori parte sedata sunt.

VIII. At enim verò, post factas cum morbo multorum mensium inducias, vrgebant tamen Ægrum, primò inuincibilis paralysis dexteræ corporis medietatis; secundò summa gracilitas cum lenta feбри, & pulsu frequentèr inæquali, ad tabem festinans; tertio animi angor, in vna præsertim cogitatione reassumendi publica sua officia defixus; quartò alui stypticitas; quintò recurrentes interdum præcordiorum contractiones cum anhelitu; sextò voracitas, & impatentia ciborum, quibus, etiamsi affatim deuoratis, Ægrotus nihil proficiebat: Alimenta enim, etsi copiosa, quæ ab ore in ventriculum, acris irritatione fermenti iucundè descendebant, a ventriculo tamèn, atque intestinis minùs defæcata, immò vitiatâ mixturâ, minori, quàm par est, mole per galaxiam, ad marasmm auertendum, ascendebant. Tandem ea etiam vlcerosa lassitudo, viriumque imbecillitas vexabat, quæ nullum corporis motum, nullam vel minimùm actuosam medicamentorum facultatem sustinere poterat.

IX. Quarè, cum mecum optimi Romæ Medici rursùm in consilium vocati fuerint, DD. DD. Placentius, Sinibaldus, Saxus, & Gattuccius, quorum vnanimi consensu, om-

*Superstes in Ægroti symptomatum cumulus.*

nia etiam initio morbi decreta fuerunt, statuimus, medicam artem vehementes istius mali impetus obtundere potuisse, morbum tamen prorsus tollere nequiuisse; atque idcirco Nobilem Virum ijs adscripsimus, qui morbo succubuerunt, quorum integram curationem nemo sciens, ac prudens citra immaturum Ægri periculum, artisque dedecus tentare audeat; Propitio interim Numini tribuētes, subitaneum, semperq; atrocius recurrens malum, quod Romæ tot, tantisque repente sustulerat, nostro adhuc Præsuli pepercisse.

## ÆTIOLOGIA.

**N**emo inuoluti huius morbi ætiologiam apprimè poterit intelligere, quin attentè perpenderit, apud (a) Hip., morbos in ijs corporis partibus statui, atque firmari, quæ antea laborauerint; simulque aduerterit eiusdem (b) Hippocratis monitum, occasiones nimirum, vnde quis ægrotare cœpit, considerandas esse. Etenim cum illustrissimus Præsul ab incunabulis linguâ parumper hæsitauerit, sternoque depressus, conuulsivo asthmatis fuerit obnoxius, proculdubio cerebri simul, & præcordiorum infito, atque innato structuræ vitio ipsum laborare necesse fuit. Nil igitur mirum, si prædictis visceribus,

a ex aph. 33. lib. 4.

b 2. de morb. popul. sect. 1.  
Morborum occasiones perpendendæ ex Hipp.

Ingenitum organorum vitium in Aegrotante.



ijfque appensis vasis nouiffimè incubuerint morbi, quorum fanè caufa petenda maximè videtur ab occasione fuppreffionis narium, fluoris, qui, cum copiâ, atque acredine fuâ (a) cerebrum, & maffam fanguineam perpetuò defæcaret, ftatim atque ob hauflos recentis calcis vapores fubftitit, eafdem partes cœpit inquinare. Et quoniam ab initio quodcumq; vigebat robur in vafculari, ac mufculari texturâ præcordiorum, & cerebri, fimulque morbida fluida nondum ad fummam plenitudinem, fummamq; acredinem euecta erant, decubitus ad artus, atque ad imi viscera ventris folummodò contigerunt. Sed poftquàm præcordia, ac neruorum principium paulatim languidiora reddita, fluida verò copiofiora, & vitiata magis fuerunt, repente epilepfia, atque apoplexia, deindè etiàm fyncope fubortæ funt, quarum certè affectionum genefeos modos is digito quafi tetigerit, qui magni textum Hippocratis lib. de (b) flatibus, tacitâ circulationis lege ibidèm vtentis, diligenter expenderit; dummodò quod ipfe aeri, tanquam iftorum caufæ morborum, adfcribit, acribus liquidis tribuendum didicerit. Sanguis enim, acerrimorum mifcellâ falium fœdatus, natiuam volatilitatem, fuamq; dulcedinem amittit, & confidentiâ, ac fuperficie euadit inæqualis, vt demùm vafa ipfa irritare, & corrugare fit potens; atque ita duabus de cau-

a Huc confer que fcribit D. Val falua de foraminibus expellentibus morbosa fluida ex cranij cauitate per aures, nares, et os, in lib. de Aur. part. vfu cap. 5.

*Vigentibus Cerebro et præcordijs morbi ad artus et abdomen detrusio.*

*Iisdem languentibus morbosa materia retrocessio.*

b n. 21.

*Sanguine vitio quomodo circulationis inæqualitas succedat.*

*Hippocratis testi-  
monium.*

causis sua nempe , ac vaforum , in præaffectis partibus sibi cursum perturbat. Vndè *alio quidè loco* ( sunt verba Hippocratis ) *sanguis consistit, alio lentius penetrat, alicubi autem citius* . Quâ sanè factâ inæqualitate transitus sanguinis per cerebrum , & præcordia , omnigenæ inæqualitates , & ægriitudines artuum , pulsuum , respirationis , atque animorum in hominibus contingunt .


*Quomodo para-  
lysis in his contin-  
gat.*

II. Verùm , vbi contumax est inæqualitas motus sanguinis in cerebro , ac medullâ oblongatâ , sæpè partes aliquæ fluidorum minoris motus intrâ , & iuxtâ horum , aut illorum neruorum texturam , aut motricium fibrarum vtriculos , atquè intermedia spatia , vel vrgentur , vel subsident , & impingunt , & tanquàm capita mortua ferè indissolubilitèr figuntur ; indè , iuxtâ neruorum discrimina , varias paralysis species inducunt , quæ , in nostro casu , primùm brachij dexteri , deindè etiàm femoris , & cruris eiusdem lateris extiterunt .

*Aegri huius in-  
teritum quænam  
præcesserint .*

III. Sed , dum hæc scribebamus , quasi gratulantes , metum dissimulare minimè potuimus , ne aliquandò syncopis , vel epilepsiæ simul , atque apoplexiæ insultu correptus Æger , diem suum obiret ex tempore . Quod sanè prognosticum impletum vidimus die VI. Kal. Octob. 1706. Etenim Patiens post crescentem vlcerosam lassitudinem , ac sæpè recurren-  
tem

tem syncopem, vehementissimâ vexatus sinistra medietatis epilepsiâ, non sine Amicorum lacrymis decessit. Vbi notandum, per octiduum ante mortem intenso crurum frigore, ab aliquali œdemate tumidorum, fuisse detentum; quo tempore lotium turbidum, crassiusculum, nec magnâ copiâ reddebatur; aderat inapetentia; & spirandi quædam difficultas identidem vexabat cum laryngis, & præcordiorum sensibili strangulatione. Quare, ne ad plenam istius ægritudinis cognitionem quidquam desiderari possit, ea, quæ in cadauere obseruatu dignora comperimus, breuiter subnectemus.



## DISSECTIO CADAVERIS

Sub die 26. Septembris 1706.

*Coram Excellentissimis DD. Doctoribus  
Sinibaldo, & Saxo, me quoque  
præsente, ac omnia dili-  
genter adnotante.*

*Morbosa duræ ma-  
tris contractio.*



*Glandularum ra-  
cemi ad eiusdem  
sinus -*

*Dexterum corti-  
cis cerebri hemi-  
sphaerium sinistro  
minus et flaccidius*

Nchoatâ itaque sectione a ca-  
pite, quod malorum po-  
tissimum theatrum habeba-  
tur, vidimus duram ma-  
trem albam, contractam,  
atque in anteriori parte cor-  
rugatam, quâ deindè amotâ, occurrit pia-  
folitò crassior, flauoque hìc illic muco fœ-  
data, cuius è vasis plùs iustò dilatatis, sub-  
obscurus magnâ copiâ exundauerat sanguis,  
qui, in grumos concretus, hærebat sulcis dex-  
teri præsertim cerebri hemisphærij vsque ad  
corpus callosum. Sinus interim duræ matris  
omninò vacui, multisque sparsim racemis  
glandularum miliarium referti conspicieban-  
tur. Substantia tam corticis, quàm medullæ ce-  
rebri fluidior, & dexterâ præsertim, atque  
anteriori parte minor, ac depressior erat.  
Diametri ventriculorum anteriorum aliquan-  
tò

tò naturali statu maiores occurrerunt. In dextero ventriculorum cruenta serositas continebatur. Nerui optici paulò graciliores. Cerebellum mollius paritèr, ac flaccidius, in cuius, atque in cerebri basi venulas aliquot varicosas offendimus.

II. Ad ventres mox inferiores descendentes animaduertimus vniuersum corpus insigni tabo consumptum cum pedibus oedemate affectis, & referatâ per cultrum intrâ abdomen viâ, gracilem, ac nigram quandam membranam omenti vicem gerere; stomachum, atque intestina optimi coloris, & substantiæ. Hepar neque mole, neque consistentiâ, aut colore a naturæ lege admodum deuium; bilis tamèn cystica fluidissima, & subuiridis occurrit. Pancreatis glandula mole maior, ac durior. Lien parte, quâ maximè lymphatica excurrunt, duobus cinereis steatomatibus erat induratum, cæterâ sanus. Renes omnium iudicio incolumes, excepto cortice, qui subobscuricoloris euaserat.

III. Denique, secto, atque eleuato ster-  
no, vtraque thoracis cauitas cruento latice re-  
dundabat. Pulmones quædam subnigræ macu-  
læ variegabant, quas, cum attentius ob-  
seruarem, figurâ serpentinâ præditas aspe-  
ximus; ac proindè non dubitauimus, quin illæ  
extrema essent vasa sanguinea, quæ in exi-

*Pulmonum vari-  
ces =*

vndequaque superficiem cordis adhæserat, omni penitus lymphâ exinanitum; in cuius sanè internâ facie, a corde per vim auulsâ, inæqualia, atque alicui nostrum duriuscula etiâ corpora, obstructarum glandularum speciem referentia, visa sunt. Cor, quanquam exteriùs nihil spectabile patefaceret præter aridiusculas, & fulcis quibusdam per longum exaratas fibras; interiùs tamèn, ( etiamsi sanguine, ac polypis omninò vacuum ) raram certè, ac memoriâ hominum æternùm duraturam rem nobis exhibuit; scilicèt ad ostium arteriæ magnæ in singulis valuulis semilunaribus aderant inæqualia quædam, ac exigua sarcomata, quæ in fimbrias, ac lacinias, instâr condylomatum protensa, intrâ aortam inclinabant; neque interim a valuulis, citra scissuram se auelli patiebantur; vt nullum propterea fuerit dubium, quin ex productis valuularum, fibris, vasisque nata, non verò per simplicem adhæsiõnem compacta, corpora illa penderent. Deniquè intrâ aortam descendente substantia inæqualis, ac rotunda, naturæ verò polypeæ, cauitatem ferè totam opplens inuenta fuit.

*Cordis sarcomata in semilunaribus valuulis.*

IV. Hæc sanè omnia clarè nos docuerunt, sedes, & causas atrocium tum præcordiorum, cum cerebri malorum, quæ Nobilem Ægrum lento tabo ad tumulum perduxerunt, omni humanâ ope fuisse maiores.

SCHO-

SCHOLIUM.

**P**orrò, si quis diligentè ire cuperet per singulas præternaturales res, quæ in hoc extispicio obseruatae fuerunt, prouinciam fanè longè grauissimam, & simplici commentario maiorem susciperet. Attamèn, vt specimen aliquod nostrarum tradamus annotationum, censemus, non omnia, vt plerunq; contingit, quæ hîc rara, & præternaturæ ordinem detecta sunt, ab initio morbi extitisse; sed alia præcessisse, alia sensim, alia tandèm excitata, præuisæ huius mortis causam habenda esse.

*Non omne morbosum in cadauere repertum morbo synchronon fuit.*

II. Vitia, quæ præcesserunt epilepticam, apoplecticam, & paralyticam affectionem, nonnulla existimamus latuisse in fluidis, nonnulla in solidis. Fluidorum præexistens labes in lymphâ certè constituenda præ cæteris videbatur, quæ scilicèt falsa, & acris, ex lixiuiali plus iustò bilis mixturâ orta, per nares olim utilitèr excernebatur, quæque sanguini admixta, ferè menstruum hæmorrhoidum fluxum promotebat.

*Vitia morbo præeuntia.*

III. Nonnulla paritèr solidorum vitia cognata, indèque adulta fuisse arbitramur. Hæc autem extiterunt sterni depressio, pericardium minùs, quàm par est, amplum, extremorum vasorum in corde, pulmone, ac

*Cognata.*

cerebro talis laxitas , per quam in varices  
facilè dilatari potuerunt .

*Succedentia.*

IV. Vitia verò , quæ decursu morbi ac-  
cesserunt , putamus fuisse in fluidis crasim ,  
seù mixturam longè magis acrem , pungen-  
tem, ac ferè veneficam, ex ipsa suppressione mu-  
ci narium, simulq; ex influxu particularum recen-  
tis calcis inductam , quæ fieri non potuit , quin  
cum liquido etiàm neruorum, alijsq; fluidis se-  
cundarijs paulatim communicaretur . Etenim  
posthac febres , dolores , & vigiliæ , tandem  
epilepsia , paralysis , ac syncopes ingruerunt.  
Hæc autem fluidorum labes in præaffectis po-  
tissimum structurâ locis , cerebro nimirum ,  
& præcordijs , morbosos tandem decubitus in-  
duxit : interceptâ enim, ob recurrentes iden-  
tidem conuulsiones , circulatione sanguinis ,  
necessariò ichores erofui, vtpotè perniciores,  
subterfugiendi tempus , ac modum ipsâ ex  
morâ huc illuc inuenerunt ; itaut minima  
vasa, villorumque extremitates elimare potue-  
rint . Vndè postmodum cætera intercurrentia  
liquida , pro varietate suorum motuum , &  
mixturarum, alteri parti aliquid affinxerunt, de  
altera verò aliquid sempèr detraxerunt ; af-  
finxerunt quidè m lieni , valuulis semilunari-  
bus , pericardio , renum cortici , pedum in-  
tercapedinibus , alijsque membris , in qui-  
bus , vel propter pororum angustias , vel  
proptèr exilitatem impetus , semel interclu-  
sa

*Ichorum vis pe-  
netrativa .*



sa viscidula fluida pertinacitèr adhæferunt. Detraxerunt verò de dextero cerebri cortice, de omento, de vniuerso corporis habitu, deque alijs locis, a quibus intercurrentes corrosiui ichores, non modò nouam non addidere, immò compactam iam pinguedinem eliquare, atque abradere, corpusque tabidum reddere potuerunt.

V. Tandem eò ventum fuit, vt sanguinea tùm piæ matris, tùm pulmonum vasa, ad extremum exilitatis attenuata, propter diurnam introfluentis liquidi acredinem, distrahentemque vim, ob circuli interceptionem, ex conuulsionibus ortam, postremâ excitatâ epilepsiâ dissilirent, sanguinemque supra, & intrâ cerebrum, necnon cruentum serum intrâ thoracem effuderint. Vnde subita mors; ad quam tamen inferendam suspicor vnâ simul conspirasse interruptam sanguinis continuationem per ipsa vasa cordis; inuenta quippe ventriculorum exinanitio certè arguit a violentissimis præcordiorum strangulationibus præcisum fuisse vitæ tramitem, qui cum sanguine per cor in pulmones, & a pulmonibus per cor in arterias, ac venas circumducitur.

VI. Quod verò spectat ad duplex cordis vitium, adhæSIONEM nempè pericardij, & sarcomata valuularum, non admodùm in prioris examine immorabor; vt enim illud frequentius est malum apud tabidos, ac præ-

*Vnde subita mors  
in hoc Aegrotante.*

*Pericardij cum  
corde adhæSio cur  
tabidis, et asthma-  
ticis familiaris.*

fertim aſthmate vexatos ; ita longâ diſquiſitione non indiget ; nam ſatis eſt notare , obſtructis oſtiolis , vndè intrâ pericardium liquor depluit , ac deficiente prorsùs omni humiditate , quæ ambas cordis , eiufq; capſulæ ſuperficies ab adhæſione diſiungit , illas inter ſe neceſſariò cohærere , atque coniungi ; præcipuè ſi pericardium breuiori orbe ( naturâ , vel ſæpiuſculis contractionibus factum ) contineatur , ex quo fiat , vt ſit cordi propinquius .

*Valvularum cordis ſarcomata a nemine indicata.*

VII. Igitur , ad poſterioris animaduerſionem tranſeuntes , ingenuè fatemur , hoc ſarcomatum vitium in tot obſeruatis cadaueribus nunquàm aliàs nobis fuiſſe compertum , nec adhuc ex aliorum lectione cognitum ; vtcumque viderimus huiuſmodi valvulas cartilagineas , oſſeas , exeſas , phlogoſi affectas , aut cum ſanguiferis varicoſis .

<sup>a</sup> Exerc. 52. de gen. animalium .

VIII. Nota pluribus eſt illa per <sup>(a)</sup> Harueum memorata obſeruatio de carne fungoſâ , externo cordis cono accretâ . Nec ignoramus aliam Ioh. Iacob. <sup>(b)</sup> Martini de exiccato corde , quod centum tuberculis totâ externâ ſuperficie obſitum erat . Similiter notatu dignam cenſemus eam , quam refert Ioh. Conrad. <sup>(c)</sup> Peyer. de corde , cuius inæqualem ſuperficiem carnei veluti lemnifci externè cingebant . Sed qualis huiuſmodi interna , nulla , quòd ſciam , refertur ; ex quo

<sup>b</sup> Apud Miſcell. n.c. decad. 2. obs. 204.

<sup>c</sup> Meth. histor. Anat. Med. in ſchol. cap. 6.

fa-

fanè euenit , vt apertè doceamur , quidquid in phycis possibile est , aliquandò contingere . Atque in hoc (a) Plinius erroris non temerè redarguitur , cum scriptum reliquerit *solum cor vitijs non macerari , nec supplicia vite trahere , lasumque mortem illicò afferre .*

a Lib. II. cap.

42.

IX. Excitata verò iuxta cor putamus sarcomata ista ex eâdem causâ , eodemque modo , quo ea fiunt , quæ exterius , ac præcipuè in podice apparent ; scilicèt ab inductis omnium primò leuibus vlcusculis , aut rhagadibus , paulatim discissa valuularum vasa ob viscidulorum liquidorum interceptionem elongari , ac luxuriare cœpisse , varièque inuicem complicata in morbosa tubera adoleuisse . Nequè forsitàn ambigendum de tempore , quo vlcuscula , ac rhagades excitari eo loco potuerint , cum principio morbi cor , diu humiliter , atque inæqualiter , pulsans , facultatem facilè dederit sanguini , erodentibus particulis referto , vt morâ suâ labia valuularum exederet . Quid ? quòd ipsæ quoquè viscerum , artuumque conuulsiones , decursu morbi sæpè recurrentes , liberum sanguinis fluxum a sinistro cordis ventriculo per aortam ( præcipue descendentem , polypo ferè obstructam ) in singulas partes adeò interturbare potuerunt , vt , validiùs repercussis cruoris undis contra prædictas valuulas , fortè suapte naturâ graciliores , istæ tandèm alicubi findi coactæ fuerint.

*Horum sarcomatum geneseos modus .*

Quod

*Durantibus valvularum sarcomatibus cur pulsus plerunque aequales perstiterint.*

X. Quòd verò pulsus , vel cum enormi vitio prædictarum valvularum , vt plurimùm in Ægro æquales obseruati fuerint , hoc factum puto , quia istiusmodi sarcomata , vtpote mollia , tunc facilè locum sanguini cedebant , cum pleno impetu a corde propellebatur : vnde minùs resistentes mediam viam omninò liberam aperiebant in aorta . Secùs atque accidit , vbi cartilagineæ , & multò magis vbi ossæ occurrunt valuulæ , quæ , cum ordinarijs impetibus sanguinis validè plerunque renitantur ( non enim semper , scilicèt cum maior viget in sanguine vis , vt in acuta febris , non renituntur ) illius per arteriam cursum cum pulsus inæqualitate retardant .

*Quomodo sarcomata producendæ syncopi conspirauerint.*

XI. Illud vtique huiusmodi spongiocarnei valvularum lemnisci , mole aucti , patrare in Ægroto forsitàn potuerunt , vt postremis vitæ diebus , dum propter expositam strangulationem præcordia contrahebantur , mutuò admoti , atquè implicati , quasi aggerem excitarent contra cominùs locata orificia articularum coronalium , sanguinemque ad cordis fibras per id temporis deriuari prohibuerint . Vnde lipothymias , ac syncopes , si non primùm , ac principaliter inducere , saltèm eoufque producere valuerunt , donèc , cessante spasmò recenter excussa sarcomata , ad factum spatium , proprio potissimùm pondere a prædictis orificijs recederent , liberumque sangu-

guini iter per cordis substantiam rursus permitterent, atque ad syncopis cessationem, contrariâ prorsus ratione conferrent.

XII. Nequè hîc tacebimus, polypeam substantiam, quæ intrâ descendentis aortæ cavitatem ex sæpiusculis illius tubi contractionibus, & morâ sanguinis concreuerat, pedum frigiditatem, atque œdemata, diminuto sanguinis ad extremas partes influxu, peperisse.

XIII. Dicendum aliquid superesset de dextero cerebri cortice, qui flaccidior, depressior, ac, sanguine etiâ exundante, & concreto, grauatus occurrit; nimirum epilepticæ ne, an paralyticæ medietati corporis responderet? Et quanquam res, sub caluaria latens, summam obscuritatem, ac difficultatem inuoluat; tamen, cum, præter Hippocratis, Ballonij, Martiani, Malpighij, Valsalvæ, aliorumque eximiorum Virorum auctoritatem, nostra quoque succurrant experimenta, meam sententiam interponam; probabile scilicet fuisse, dexterum cerebri hemisphærium sinistræ corporis medietati, & sinistrum dexteræ respondisse: itaut ea corticis pars, quæ gracilior, quæque, effuso pressa sanguine, inuenta fuit, commercium habuerit cum sinistris artubus, motu, sensuque præditis; altera verò, quæ penè nullam, oculorum iudicio, labem in se continere vi-

*Dexterum cerebri hemisphærium sinistræ, et sinistrum dexteræ corporis medietati respondit.*

debatur , cum paralyfi iam tentatis .

XIV. Ad huius verò afferti probabilitatem duo præcipuè argumenta nos adducunt . Prius est , quod passim experimento docemur , percussos , nempe , vulneratos , vel abscessu aliquo tentatos in dextero , aut sinistro cerebri cortice , plerunque conuulsionem , aut paralyfim in oppositis artubus perpeti . Posterius verò ex hâc eâdemmet hypohtesi deduci posse videtur . Etenim , cùm Æger diù lassitudine quâdam vlcerosâ , ac postremò epilepticis quoque artuum medietatis sinistra succussionibus affectus fuerit , verosimile est , illam cerebri partem , quæ principium , ac fons erat istorum neruorum , tempore mortis , magis in eodem laceffitam fuisse , quàm alteram , a qua nerui penè mortui propagantur in dexteram , paralyfi detentam . Atquè dexterum cerebri hemisphærium pessimè affectum , ac laceffitum , sinistrum verò nudis oculis ferè incolume inuentum est . Idcirco dexterum cerebri hemisphærium dolentibus , & conuulsis , sinistrum verò paralyfi tentatis artubus conuenisse , ac respondisse , dicendum est .

XV. Nec mouet , quòd dexterum cerebri hemisphærium , tabo consumptum , cum dexterâ medietate , paralyfi affectâ , congruere magis videretur , quàm cum sinistra , alioquin sensu , motuque præditâ . Etenim , præterquamquod in præsentî casu ( utcumque

ab.

*Huius experimento ægri confirmatur .*

ab initio discrimen aliquod gracilitatis dexteris inter, ac sinistros artus interfuerit ) membra omnia pari tabo paulatim aruerant; illud maximè aduertendum in glandulis, ad quarum ordinem cerebrum refertur, eas graciliores euadere, atque inueniri solere, per quas fluida vberius fecernuntur; eas e contrario pleniores, saturatioresque seruari, quæ diù a secretionis officio vacauerint. Exemplo sint ( præter thymum, & hepar in foetu ) mammæ, & renes, quarum sanè adenarum, si altera ab usu defecerit, maior, & crassior non minor, & gracilior deprehenditur. Cum igitur dexterum cerebri hemisphærium sinistro magis depressum, seù gracilius offenderimus, perspicuum nobis præbuit indicium ad probandum, illius glandulas semel admissam secretionem liquidi neruorum alioquinacris, vsque ad extremum vitæ diem, quâ sinistrum longo iam tempore caruerat, constanter retinuisse.

*Glandula vberius liquidum fecernentes cur euadant graciliores, et e conuerso.*



## OBSERVATIONES

*Physico - Anatomica*

NONNULLORVM,

Qui primo impetu morbi repente  
per hæc tempora perierunt.



*OST* capita preli-  
minaria de impro-  
visis mortibus, eius-  
que causis, quæ isto-  
rum potissimum de-  
cursu annorum no-  
biscum adeò sævitè  
egerunt, & post descriptos casus aliquo-  
rum, qui subitaneis cerebri, ac præcordia-  
rum morbis tentati, per hæc tempora eva-  
serunt; opportunum certè erit, ut ae-  
scendamus ad observationes illorum,  
qui primo impetu morbi vitam repente  
cum morte commutarunt.

In ijs autè commemorandis, illud  
in primis studebimus, ut historia me-  
di-



dica singulorum, qui decesserunt, ea lege præfigantur extispicijs, ut non solum naturalis, sed præternaturalis quoque illorum hominum status legentibus præluceat. Mala enim, quæ mortem præcesserunt, manum quasi porrigunt ad illam inueniendam in cadaueribus causam, quæ, disrupto vitæ filo, animam diuulsit e corpore. Quo fit, ut merito

(<sup>a</sup>) Fortunat. Fidel. scripserit illud etiam præstat nouisse, cum quisquam repente moritur, quanam scilicet ægritudine ille correptus fuerit.

Quo morbo repente decedens laborauerit maxime sciendum.

<sup>a</sup> De relat. Med. lib. 4, cap. 7.

Deinde verò dabit spero veniam ingenuus Lector, si, quanquam ex defunctorum Medicis, Amicis, ac Necessarijs integras tum naturalis, cum præternaturalis eorundem status historias haurire studuerimus, adhuc tamèn alicubi mancas inuenerit, præsertim circa pulsuum anomalias; ad eos enim, qui improvisò de medio tolluntur, neque Medici accersiri, neque si accersiti fuerint, tempestiuè solent accurrere.

Supereſt, ut aliquid circa ſcholorum methodum admoneamus. In ijs itaque, quemadmodum curabimus, ut particularis cuiusque ſubitaneæ mortis cauſa extricetur, atque reluceat; ita non omnium ſymptomatum, quæ ſingulos morientes vexarunt, rationes reddemus in ſingulis; ne ſcilicet, cum eadem ipſiſſima phænomena in pluribus ægris obſervata fuerint, recoctam cum nauſea crambem Lectoribus exhibeamus. Symptomatum idcirco Aetiologias hæc illæc noſtris aſpergemus in ſcholijs, ut, quæ de induſtria deficiunt in ſingulis, deſiderari vix poſſint in omnibus.

## OBSERVATIO I.

*Repentina mors ex apoplexia syncopali  
in Viro obeso, & cachochymo.*

## HISTORIA.



Antonius Maria Brillii Romanus, quinquagenario maior, famulorum Eminentiss. Cardinalis Sacripantis decanus, obesi admodum habitus, vini, & conjugalis veneris intemperans; cum antè annum vagis circa pectus, ac diaphragma doloribus tentaretur, graui anhelitu, & omnigenâ pulsus inæqualitate vrgeri cœpit. Deindè verò vrinarum sensim inopiâ, ac pedum tumore laborans, futuræ speciem hydropis exhibuit; varijs propterea pharmacis, & præsertim oxymellite scillit., ac stomachicis refermentantibus curatus, rursus lotij copiam obtinuit, apertoque in crure fonticulo, meliùs se habuit.

II. Sed quanquam ad Aulæ officia, post multos menses rediisset, prauo tamen colore fœdatus per accliuia anhelabat, atque iisdem pulsuum anomalijs perpetuò detinebatur. Tandem die 15. Ianuarij 1706., nocte mediâ, ex-

pergefactus, purpurinam quandam totius cor-

*Funestissima esse-  
rarum ad interio-  
ra repulsio.*

poris efflorescentiam, instar morbi, qui à Me-  
dicis appellatur, *effere*, ingenti cum pruritu,  
& calore, summoperè molestant perferens, a-  
qua, ut alleuiaretur, e lecto surgens, fene-  
stram, sese frigidissimo expositurus aeri, im-  
prudenter aperuit; exindè decubitus, qui vti-  
liter exteriùs factus erat, pessimo fato inte-  
riùs repulsus, e vestigio brachij sinistri torpo-  
rem induxit. Neque interim æger, ijs auscul-  
tans morbi vocibus, ullam sibi medelam adhi-  
beri curavit; sed postridiè Aulam adiuit, &  
Eminentissimi Purpurati currum pedibus cum  
cætero famulatu sequutus fuit, ut tandèm vi-  
ribus fractus, horâ 23. cum dimidiâ diei 17.  
Ianuarij, repente mortuus fuerit in via, quæ  
Parionis dicitur.

### *CADAVERIS DISSECTIO.*

**T**Ransactis viginti quatuor horis,  
cadauer in Theatro Romani Ar-  
chilycei, coràm Excellentissimis  
Viris, ac Doctõribus Lucâ To-  
massino Prothomedico Generali, tribus Con-  
siliarijs, scilicèt Iacobo Sinibaldo, Anto-  
nio Placentio, & Ioh: Trullo, duobus Me-  
dicis Sacri Palatij Apostolici Michaelè Ange-  
lo Pauli, & Gasparo Reali, & publico Ana-  
tomes Professore Alexandro Pascolo, vnàcum  
Physico, & Chirurgo Carcerum Ioh: Latino,  
& Bar-

& Bartholomæo Simoncello, qui publicus alioquin est Anatomes Minister, a quo, adstantibus etiã Curiaë Iudicibus, & Scribis, multoque concurrente Studioforum numero, dissectum fuit.

II. Et quoniã externa quoque Cadauerum facies nos aliquandò erudire solet; idcirco in primis aduertimus, vniuersum corpus mirè obesum, & pallidum, vultum autem obscure adhuc ingenti cum tumiditate, rubentem occurrisse; ex quo factum est, vt, antequã, detractâ caluariã, ipsius cerebri status nobis innotesceret, rumoris nescio quid afflauerit in Theatro, aliquibus sanguinem, e vasis largè effusum, sub cranio inuentum, iri augurantibus. Sed o vana, & incerta iudicia hominum, quorum lingua oculos, mentemque præcurrit!

*Ex cadauerum facie quandoque Medicus eruditur.*

*Effusus sub Cranio sanguis pro mortis causa perperam hic accusatur.*

III. At verò, vt rem consueto perficeremus ordine, abdomen principio secuimus, quod multo adipe refertum erat. Zirbus, obstructis suis glandulis, crassiusculus. Intestina tenuia, venis sanguine tumentibus aliquantulum rubentia. Ventriculus prægrandis, & laxus. Lien naturali mole maior. Hepar paulò auctius, sed colore propè naturali, cuius interim Cystis, cum forinsecus albicans obseruaretur, exactiori locum fecit examini; postquã verò illam aperuimus, non bilem, sed verum pus continere, atque internâ sui

*Pus, & vlcera in Cysti fellea depressa.*

superficie varijs vlcusculis laceram, raro quidè exemplo, deprehendimus.

IV. Ab ipso deindè abdomine in thoracem per amotum sternum referatâ viâ, statim multa circâ pericardium flavescentis adipis copia, (qua cordis quoque basis grauebatur) se obtulit. Pulmo solitò depressior. Cor verò prægrande inuentum est. Dextera auricula cum appensa vena caua, quæ modicam nigri sanguinis quantitatem continebat, duplò certè naturali diametro amplior apparuit.

*Summa cordis  
amplitudo.*

V. In sinistro ventriculo maxima picei cruoris moles claudebatur. Arteriæ pulmonica, & aorta, finitimæque cordi tracheales partes multo adipe refertæ, glandulisque quibusdam obsessæ, mutuum nisum, & compressionem ostendebant.

VI. Tandèm, cùm ad Cranij sectionem Chirurgus accederet, scissis, diductisque tegumentis, super dexterum latus ossis sincipitis offendit in Cranio foramen, per quod, (cùm pericranium duntaxat aditum intercluderet) maius specillum ad vsque duram Meningem, alioquin laxam, facilè intulit; atque, eleuatâ caluariâ, cuniculum illum intrâ ossis lamellas à generationis fortè primordijs fuisse referatum, indè iudicauimus, quòd orbiculus non asper, sed læuigatus inuentus fuit. Cæterùm in superficie cerebri subobscura va-  
so-

*Dura Meningis  
laxitas.*

*Cranij foramen  
forsan innatum.*

forū sanguineorum turgescētia , & modica quantitas turbidi feri in ventriculis spectabatur . Sinus longitudinalis , & laterales , atque ij etiā , qui ad cerebri basim positi sunt , nigro sanguine tūebant , vt non fuerit dubitandum , quā solitō maior cruoris quantitas intrā cranium intercepta fuisset .

S C H O L I V M .

**I**N huius vestibulo scholij opportunè occurrit consilium , verè sapiens , ac re-  
ctum, quo Gulielmus <sup>(a)</sup> Ballonius Me-  
dicos admonet , vt caueant prædicere ,  
se deprehensuros aliquid in capitibus illorum,  
qui ex cerebri morbis interierunt . Etenim ,  
cū vna , eademque affectio à varijs , atque  
inter se non diuersis modò , sed sæpè contra-  
rijs , diuersèque operantibus causis oriri pos-  
sit , rarò fit , vt Medicus illam , quam incautè  
præcinerat causam , in dissectione cadaueris  
inueniat . Quod sanè extispiciij huius testimo-  
nio omnium cum admiratione comprobatum  
fuit ; nullum enim effusum in cerebro san-  
guinem offendimus , quem aliqui adeò confi-  
denter prædixerant . Igitur , vt nos cauti fui-  
mus in prænunciando , similiter in huiusce-  
subitanæ mortis causis euoluendis ab erroris  
periculo longiùs abeamus , e re arbitramur  
annua istius Ægri mala diligenter inuestiga-

*a In comment.  
& annot. ad hi-  
stor. I. l. 2. consil.*

*Medico cur multa  
opus sit cautela  
in prædicendis in-  
terioribus cadaue-  
rum læsionibus.*

*Mala , quæ mor-  
tem præcedunt , di-  
ligenter inuestigā-  
da .*

*In extispicijs , et si  
minima offendan-  
tur , magni æsti-  
manda .*

*Series Morborum  
subitam necē præ-  
cedentium .*

re : quo nanque remotiores ab obseruan-  
tium oculis repentinorum mortium causæ in-  
diffectis cadaueribus esse videntur; ita curio-  
siorem diligentiam postulant, vt eruantur, &  
patefiant. Porrò nonnulla inuenta, etsi non  
rarò in extispicijs nihili fiant, ex quo apud  
minùs versatos in rebus anatomicis minima  
putantur; ea tamen magni æstimanda sunt,  
quoties cum languidulis viscerum fibris lueta-  
ri, minimisque vasorum angustijs intercipi po-  
tuerunt.

II. Primò itaque extrà omnem dubita-  
tionis aleam positum per historiam censeo,  
hominem hunc ab anno ex cachexia valetu-  
dinariam vitam duxisse, cum labefactato fi-  
brarum tono, & cum degeneribus a naturali  
crasi fluidis, quæ ad viscido-acrem naturam  
euecta erant.

III. Secundò ex cadaueris dissectione con-  
stitit, Ægrum loco cysticæ bilis, quæ balsa-  
mico-amaricans esse debet, acro-putridum,  
pus multò priùs, quàm diem suum obiret,  
fouisse; non enim vlcera momento temporis  
ab erodente liquido visceribus insculpuntur.  
Hoc autem pus facere non poterat, quòd,  
euerfo naturæ ordine, chylum non modò non  
defæcaret, sed exoticis particulis imbueret,  
nouamque labem sanguini iugiter communi-  
caret.

IV. Tertiò his addamus ex historia,  
Ægrum



Ægrum eò tandèm peruenisse, vt acria corpuscula, ijsque commixtam sulphuream lympham (erat enim vinofus) plenè cumulauerit, quæ profectò corpuscula ab vniuerso suorum vasorum, ac viscerum fibroso genere, inductâ irritatione, ad externa corporis sub forma esserarum propulsa fuerunt; cui fanè propulsioni, nisi Ægrotus intempestæ noctis frigore imprudens fuisset obnixus, proculdubiò indè leuamen accepisset. Sed, cùm istius critici decubitus materies intrà vasa repulsa, atque in cerebro, & spinalis medullæ principio intercepta fuerit, sinistri torporem brachij produxit, qui, ex tempore solutus, indicium præbuit, ignem non extinctum, sed doloso in cinere latuisse sepultum; causam nempe morbificam e corpore nequaquam eductam, sed partim sanguini confusam, partim viscerum folliculis interceptam delituisse.

*Ex repulsis esseris  
brachij torpor.*

V. His verò positis, facile est conijcere, causam subitanæ huius mortis fuisse copiam crassescentis sanguinis, & serositatis, quæ quidem fluida oleoso-volatilibus partibus destituta, & fixis salibus redundantia, propriæ fluxilitatis inopiâ per meningum arteriolas, per sinus, ac per reliqua cerebri vasa hæere cœperunt: vbi, debilitatis, ob spirituum paucitatem in violento etiàm corporis motu erogatorum, fibris muscularibus duræ matris, ac villis omnibus corticem cerebri, ac cerebelli

belli intertextentibus; &, inductâ ob sanguinis remoram tam pressione supra fibras, & glandulas eiusdem corticis, quam obstructione intra oscilla secretoria liquidi neruorum, repentina suborta est syderatio liquidorum, & solidorum in cerebro, quam fortissimam dicimus apoplexiam cum mortifera syncope, quæ nostro in casu corripuit, non solum propter deficientem descensum spirituum a cerebro, & cerebello in cor; sed propter concurrentem renitentiam ad motum crassi, & resinosi sanguinis, per cavitates cordis tunc temporis deuoluti.

*Vndenam syncopes mortifera in hoc Egrotante.*

VI. Hoc autem indè arguitur, quòd isto in homine lymphâ viscidulo-acris, quæ per duos dies ante obitum *esseras* produxit, cum a succutaneo organo intempestiuè repulsa fuerit, nullam excitauerit febrim, quâ aut cum cæteris massæ principijs exactè, atque impunè rursus commisceri, aut per alia secernicula utiliter trudi potuisset. Factum proindè esse videtur, vt fluida, dissipatis postridiè per laboriosum pedestre iter volatilibus particulis, quibus vtcunque, in cerebro præsertim, fluxilia reddebantur, ex tempore substiterint, inductâque paralyti in meningibus, ac totâ cerebri superficie, inuincibilem, quam fortissimam dicunt apoplexiam, <sup>(a)</sup> Senibus aliò-qui familiarem, pepererint.

*Paralytis membranarum & corticis cerebri, ac cerebelli.*  
a 6. aph. 57.

VII. Firmant deindè nostras a priori con-

nie-

niecturas ea, quæ in cadauere palàm occurrerunt. Quid enim aliud tumida, & subrufa vultus, & meningum species? Quid sanguineorum vasorum in vniuersâ cerebri superficie turgescencia? Quid sinus omnes, nigro sanguine oppleti, demonstraerunt, nisi maximam fuisse austeri, minùsq; mobilis humoris quantitatem, quæ intrâ cranium intercepta, tum circumpellentium fibrarum tonum enervare, cum vel maximè secretrices cerebri glandulas oppidò premere, ac validè obstruere potuit; yndè lethalis spirituum animalium inopia inducta fuit; præsertim cum apertissimè constiterit, plus acrium ferositatum, & viscidorum humorum, quàm oleoso-volatilem particularum diù ægro in corpore redundauisse?

VIII. Hoc tandèm breuiter admonemus, non frustrâ aliquem suspicari posse, nùm repertum in cranio foramen, ad infirmandum robur duræ matris conferre aliquid potuerit. Etenim apud hominem, qui ferè semper pro suo munere ad obsequia, nudato capite, incedebat, cuniculus iste aeri, aerique innatantibus corporibus fortè minùs, quàm natura, postulat, obnitebatur. Si quis enim ab Ægro, dum adhuc erat inter viuos, sciscitatus fuisset, an aliquam sub perforato cranio in magnis temporum mutationibus molestiam persensisset, eam probabiliter fassurum fuisse; indè

*Cranij foramen  
an duræ matris in-  
firmandæ contule-  
rit?*

*Cranio ob siphillydem desquamato, Cerebrum facile afficitur.*

indè arbitramur, quòd, qui ex siphillydè cranij desquamationem passi sunt, ferè semper de læsione ab externo frigore conqueruntur, cerebrique mala facillimè subeunt.

IX. De cætero viderint alij, quænam extiterit origo raræ illius exulcerationis, quæ in cysti felleæ inuenta est. Nos enim, qui huius primordia ægritudinis penitùs ignoramus, illud hìc pro coronide tantummodò adijcimus, sæpè detexisse morbidam quasi radicem, vel saltem coniunctam propaginem earum spirandi difficultatum, quæ, ex hypochondrijs ortæ, ad hydropem tendunt, in ipso fellis folliculo altè implantatam; modò nimirum in lixiuiali, fluidâque nimis, modò in tenaciori, atque in lapides conuersâ bile, vt non sit dubitandum, quòd vitium tam enorme ipsius cystis felleæ ad morbos istius Ægri maximè conspirauerit.

*Cystis felleæ vitia multorum pectoris morborum radix.*

X. Neque similiter immoramur in persequendo impedimenta præcordiorum, ac præsertim arteriarum pulmonicæ, & aortæ, partiumque trachealium, multo adipe, auctisque glandulis obfessarum: non enim causas inquirimus annui anhelitus, pulsusque inæqualitatis, quæ a præternaturali, mutuoque vasorum nisu pendere potuerunt.

## OBSERVATIO II.

*Subita Mors ex syncope ob cordis  
magnitudinem, prolapsum,  
atque aneurysma.*

## HISTORIA.



Amulus olim cursor Illustrif-  
simi Marchionis Spadæ iu-  
nioris, nomine Philippus Tur-  
ci Romanus, annorum circi-  
tèr viginti quinque, habitûs  
gracilis, staturæ mediocris,  
pallidi coloris, anhelitu in leuibus etiàm cor-  
poris motibus detineri solitus, ante annum  
laborauit suffocatiuâ anginâ, a qua, ter misso  
intrâ diei spatium sanguine, liberatus fuit,  
superstitibus tamen maiori semper spirandi  
difficultate, & recurrente interdùm cordis pal-  
pitatione, præsertim cum citato gressu ambu-  
laret, vnâ cum sepulto præcordiorum angore,  
& quodam pulsatili pondere suprâ diaphra-  
gmatis centrum. Quæ quidè m mala eò usque  
adaugebantur, vt illum, vel inter comeden-  
dum, atque ab assumpto potissimùm cibo,  
deteriùs haberent. Hic, die 4. Februarij ineun-  
tis huius anni 1706. tametsi manè faucium  
phlogosi, & quibusdam ad vsque collum,

*Series symptomatum, quæ cordis  
magnitudinem, &  
prolapsum ostendit.*

& iugulum exporrectis contractionibus detine-  
retur, pedibus nihilominus Herum suum per  
quingentos circiter passus prosequutus fuit.  
Domino verò alicubi diutiùs fortè morante,  
ipse cum socio in caupona largè, ac sinè de-  
lectu comedit, ac bibit; deindè domum re-  
uersus post horam, cum frigore corriperetur,  
apud foeminam se recepit, calefaciendi causâ  
ad ignem, qui semi accensis carbonibus me-  
dio ardebat in cubiculo, vbi paulò post (for-  
tè an etiam ex œstro venereo?) leui primùm  
capitis debilitate, deindè frontis, totiusque  
corporis madore cum vehementissimo anhe-  
litu, cordisque angore, tandèm syncope, in  
mortem statim desinente, correptus fuit.

### *CADAVERIS DISSECTIO.*

**A** Perto abdomine, intestina tenuia  
aliquantulùm subrufa; cætera verò  
naturalia viscera a nativo statu pa-  
rùm recessisse, præterquam paulò  
turgidiora, ac veluti murice subtincta visa  
fuerunt.

II. Morborum, & ipsius necis sedes ap-  
paruit potissimùm in thorace, quo resecato,  
pulmones subalbidi, & dexter eorum costis le-  
gitimis tenaciter adhærescens, oculis adstantium  
sefe obiecerunt.

III. Fauces rubore perfusas, asperam ar-  
te-

teriam substantiâ gelatinæ non absimili, fuligineo tamen, ac subnigro interiùs colore refertam, cernimus. Rami bronchiales phlogosi paritèr, ac veluti asperitate quâdam laborabant.

IV. Cor mole triplò naturali maius, vacuum certè superabat, cùm, ablato pericardio, & expresso omni cruore, pependerit in lance libras duas & semis. Hoc sanè viscus suprâ diaphragma ceciderat, ac proindè œsophagum, aortam, ac ventriculum facilè premebat.

*Cordis moles au-  
cta, & prolapsus  
in diaphragma.*

V. Deindè, etiamsi externâ facie naturalem seruare videretur figuram; sectum tamen nouam philosophandi materiem solertioribus naturæ Vestigatoribus præbuit; auricula enim, & ventriculus dexter, sanguine vacui, sed ordinariæ diametri, contra verò sinistræ cauitates nigro plenæ cruore, & duplò dexteris latiores occurrerunt. Arteria magna iuxtâ cor paritèr perampla.

*Sinister cordis si-  
nus duplò maior  
dextero.*

VI. Secto cranio, pia mater cum vasis solitò tumidioribus se nobis præbuit. Cortex cerebri in superficie vtriusque hemisphærij versùs posticam partem calloso quodam glutine tenacitèr duræ matri adhærebat. Plexus denique constabant ex vasis sanguine plenioribus.

## S C H O L I V M .

**N**E prolixitas morosa, neuè breuitas in hâc attingendâ ætiologiâ euadat obscura; sedulus Lector primò distinctè, mox verò promiscuè animaduertat, primò natiuum Ægri temperamentum, & grauissimos morbos, quibus miser homo per annum ante mortem torquebatur; secundò proximas necis occasiones; tertio ea omnia, quæ in illius cadauere obseruata fuerunt. Hæc enim, spero, satis luminis accendent, vt claras subiti huius interitus rationes videre possit.

II. Quanquàm verò singulæ affectiones, & causæ, quæ Ægrotum hunc detinuerunt, diuisis suarum virium momentis præcocem, subitamque necem afferre vix potuissent; vniuersæ tamen, momento composito, eandem facillimè induxerunt: Quod sanè minimè arduum videbitur, si quot, & quomodò istiusmodi causæ ad supremam, atque inopinatam Ægri perniciem conspirauerint, diligentèr expendamus. Non enim vna, eaque simplex, aut interna solùm causa, sed multiplex, & tum externa, cum interna, vetus, ac recens ad improuifum illius interitum coniurauit.

*Multiplices huius  
improvisa necis  
causæ.*

III. Hoc sanè euidentèr constabit, si duo  
ante



ante omnia, quippe quæ admodum probabilia, aduersam istius valetudinem præcessisse intelligamus; alterum natiuum eiusdem temperamentum acro-biliofum, vnàcum solito grandiori corde, ac paulò debiliori textura sinistri ventriculi, atque aortæ, quæ fanè res hominibus, præ cæteris animalibus, non rarò contingunt; alterum verò aduentitium, nimirum intemperans, atque intempestiuè exagitatum Cursorum vitæ genus, per quod non tantum fluida ad acro-volatilem naturam in gracilibus præsertim corporibus euehuntur; sed aeris quoque viæ, & pendulum intrà thoracem, cor perpetuâ concussione, ac diuulsione labefactantur. Ità certè clara habebimus principia, vndè causas deriuemus non modò suffocatiuæ anginæ, sed, quod caput rei est, lethalis prolapsûs, & aneurysmatis cordis. Cùm enim præcordia per arterias clauiculis, axillis, & collo, perque reliqua vasa pulmonibus alligentur; cùmque pulmones per asperam arteriam, ac per laryngem, veluti per funem, a iugulo, & faucibus propendeant; facile est concipere, infirmiora ex angina, & magis adhuc ex fluidorum acredine, & cursorio vitæ genere reddita huiusmodi suspensoria, ægriùs postmodum valuisse ad renitendum descensui præcordiorum, quæ, solito magis ex mole grauitantia, suis etiam relaxatis, exesisque proximioribus membranarum funiculis, necessariò ex lege

*Ipsarum enumerationis ratio.*

*Præcordia in Cursoribus cur facile labefactentur.*

*Mechanicus cordis prolapsus modus.*

lege grauium suprâ diaphragma lapsarunt,

IV. Cùm verò multarum officia partium apud animalia regantur, aut offendantur mutuo contactu, ac nisu, vel diuisione, ac dissociatione; vtique fieri non potuit, quin, grauitante corde præter naturæ ordinem suprâ diaphragma, & diaphragmate suprâ stomachum, indè non solummodò respiratio læsa, sed, tumente ex cibus ventriculo, arteria magna descendens (quæ septum transfuersum sub corde perforat, & stomacho substernitur) validè compressa fuerit. Hinc fiebat, vt sanguis, impeditâ liberâ suâ traiectione, ac deuolutione per inferiores arterias, necessariò quoquo modo alternè repelleretur versùs superiores arterias, atq; ineundem sinistrum cordis ventriculum, a quo vicissim fuerat extrusus: ibique arietatio quædam nixûs trudendi, ac renixûs trusi iam cruoris ab assumpto potissimùm cibo (quo sanè tempore ventriculus aortam valentiùs premit) sub angoris, ac palpitationis specie proficiscebatur.

V. Et quoniàm ex hac vna radice præpediti motus liberi sanguinis per descendentes arterias sexcenti malorum frutices germinare potuerunt; mirum sanè haud erit, si nos indè principium deriuemus dilatationis tum arteriæ magnæ, tum vel maximè sinistri cordis ventriculi (quas quidem partes natiuâ debiliori texturâ laborare posuimus) nec non  
adhæ-

*Cur maximè ab assumpto cibo respiratio, & cordis palpitatio ingravescerent.*

adhæſionum pulmonis , congeſtionis lymphæ in cerebri ſuperficie , tandèmque , concurren- tibus externis cauſis , etiàm ſubitæ mortis .

VI. Etenim , cum clarè conſtet ex hydro- metricis principijs , impedito , vel diminuto ex communi aliquo alueo per vnam , vel alteram fiſtulam aquarum excuſſu , illicò in proxi- mos canales lymphas maiori copiâ deriuari , atque confluere ; immò eaſdem lymphas , ad rationem impediti liberi excuſſûs , ad ipſum quoquè alueum reflecti ; vt , quæ ſucceſſiuè fluxuræ eſſent , in eodem parumpèr ſubſiſtant ; fatiſ dilucidè apparet , cur in homine iſto cruoris excuſſus , per inferiores arterias ob expoſitas compreſſiones alternè diminutus , alternè pariter maiori copiâ , & vi verſùs cor , & in superiores arterias fuerit deriuatus ; fa- cilèque propterea non ſolùm faucium phlo- goſes , & capitiſ congeſtiones induxerit ; ſed etiã in ſiniſtro cordiſ alueo dilatationem , ſi non primùm producere , ſaltèm adaugere potuerit .

*Morbosa præcor- diorum dilatatio- nis origo principijs hydrometricis illu- ſtratur .*

VII. Porrò cum fluida , præſertim in- compreſſilia ferè induant naturam ſolidi , quo- tieſcunque in anguſtum alicubi tubum vio- lentèr , ac pertinacitèr vrgentur : idcirco pla- num eſt intelligere , ſanguinem , cum a cor- de violenter intrâ compreſſam arteriam tru- ditur , vectiſ , cunei que potentiam induere , tantò quidem maiorem , quantò magis locali eiufdem motui acutæ durorum ſalium figuræ

*Sanguis intrâ cõ- preſſam arteriam violenter truſus , cunei potentiam induit .*

copulantur . Nihil igitur mirum , si apud huic Ægrum , ex impulso sanguine intrâ impeditam aortam , eoque reuerberato versùs femilunares valuulas , idem truncus , & sinister cordis ventriculus ( texturâ aliòqui debiles ) dilatati fuerint ; distractiuæ nanquè percussionis , ac repercussionis vi adiuncta fuit in sanguine energia cunei erodentium salium , qui fibrosum earundem cavitatum contextum , repetitâ totiès extrusione ulterius debilitatum , paulatim diloricare potuerunt ; quibus factum puto , vt , viscus hoc , ( remorante etiam sanguine in minimis coronarijs , proximisque distentiarum fibrarum spatiolis ) grauius semper , ac maius euaserit , sui que idcirco prolapsus , & septi transuersi , aortæque compressionis causam longè magis adauxerit .

a Bened. Castell.  
in *demonf. mens.  
aquar. current.  
prop. 3.*

*Coniectura de tardiori sanguinis motu per aneurysmaticum læuum cordis sinum .*

VIII. At verò , cum ex hydrometricis sectiones inæquales vasorum , per quæ fluida mouentur , eorundem fluidorum velocitatibus sint reciproæ , sequitur , vt , eneruatis fibris impellentibus , si læuæ cordis cavitates duplò maiores dexteris detectæ fuerunt , duplò etiam tardior extiterit motus sanguinis in sinistris , quàm in dexteris ; eòque magis , quò distracta , & ampliata sinistri ventriculi latera in qualibet systole ad mutuum peruenire contactum , omnemque a se cruorem in aortam expellere , atque elutriare nequiuerint , quo,  
sa-

fanè copiosè subsistente liberis tùm ipsius cordis motibus , tùm influentium a pulmone liquidorum vndis , noua semper augebatur renitentia . Exinde maxima eruitur causa tùm sepultæ præcordiorum angustiae , & grauitatis , quâ postremò æger deceffit , cùm inuentæ in cadauere stagnationis sanguinis intrâ sinistrum duntaxat ventriculum . Etenim cùm eò res in cursore isto deuenit , vt simul conspirauerint minor animalium virium potentia ad constringendum cor , & maior cordis ob adauctum suum pondus renitentia ad motum , tunc hercle vires circumpulsiuæ in cordis ventriculis ad eam rationem , & inter se , & cum contentis cruoris molibus peruenire debuerunt , quam inuicem habebant sectiones cavitatum , & resistentiæ vasorum . Sed quoniam dexter ventriculus naturali diametro donabatur , & pulmonum vasa nullo apparenti vitio afficiebantur : sinister verò sinus duplâ diametro laborabat , & arteria magna perampla ab ipso corde , & stomaco validè premebatur . Idcirco aqud Ægrum superstes maior vis in dextero cordis ventriculo minorem sanguinis quantitatem liberè , maiorique velocitatis gradu in pulmonica vasa impellere potuit . Contra verò sinister ventriculus propter minorem ex dilatatione vim maiorem sanguinis molem in præpeditam aortam expedire trudere prohibebatur ; quæ certè cruoris re-

*Exposita coniectura nouis rationibus confirmatur.*

mora præcordiorum angustiam, tandemq; mortiferam suffocationem, ac syncopem induxit.

IX. Nequè verò hîc animus est longiùs persequi rationes diuersarum lymphæ concretionum, quæ a salino-acrium cum oleosis miscellâ particularum in locis minoris motus, aut maioris impedimenti apud valetudinaria corpora, & nostrum præsertim Ægrum, tum in pulmone dextero, cum in supremo cerebri cortice contigerunt. Etenim satis ex Chymicis tentaminibus innotescit, acria, sulphureis admixta, inuicem coalescere, præsertim apud vinosos: vndè spiritum vini cum urinæ spiritu in tenax corpus facillimè abire videmus.

*Lymphæ concretionum causa ex chymicis.*

X. Cæterùm, vt omnes huius necis causas breuiter perstringamus, repetere cogimur ex cerebri vitio minùs spirituum, quàm naturalis huius hominis postulabat œconomia, aliquantò priùs tempore mortis secretum fuisse; vndè virium debilitas, ex præcordiis orta, maior adhuc reddebatur ex diminuta per cerebri corticem liquidi animalis separatione, quæ ob callosum inuentum eiusdem glutinem vltro se nobis obtulit. Factum proinde fuit, vt ad repentinum interitum Ægri simul conspirauerint primò noua partium salino-acrium in fluidis exaltatio, quæ ex postrema faucium phlogosi apertissimè innotuit; secundò motus corporis, dum quiete indigebat; tertio ingluuies, & vini abusus, cum diætâ opus erat;

*Causarum ad hanc subitam necem conspirantium epilogus.*

quar-

quartò suffocatiua bronchiorum irritatio ex carbonum fumo ; qui in cadauere per fuliginem tracheæ colorem in apertum se dedit ; tandèm ( si fortè accesserit ) veneris cœstrum , quod spiritus maximoperè impuros , ac perturbatos in nouum , atque omninò impropportionatum motum circà præcordia agere potuit . Vndè cor ipsum , suapte natura magnum , & , sanguine subsistente , grauius redditum , ob exiguas animalium spirituum vires ab omni penitùs motu constantissimè defecit .

*Fuliginus tracheæ color ex fumo carbonum .*

XI. Sed , ne hîc longè de scholij cancellis abire vererer ; profectò exemplis etiam ostendere possem , quàm facilis via sit ad præcocem , inopinatamque mortem nimis aucta cordis moles , eiusque prolapsus . Vnum tamen casum , nostro quippe simillimum , a (a) P. Marchetto descriptum , coronidis loco afferre liceat . Venetus quadragenarius , crapulæ deditus , anhelitu , & hypochondriorum angustia detentus , multis frustra adhibitis remedijs , Patauium petijt , vbi postera nocte repentè obiit , in cuius cadauere nihil præternaturam intrà abdomen se prodidit ; verùm in thorace cor adeò amplum obseruatum fuit , vt tria naturalis magnitudinis æquaret ; ventriculis itidem amplissimis , cuius capsulæ vbique pressius adhærebat ; superioribus , ac lateralibus partibus pleuræ etiam adnexum ;

a Obser. 49.

inferiori verò eidem diaphragmāti. Scilicet, ut minimè sit hæsitandum, adauctam cordis molem, situmque ex prolapsu vitiatum, ad repentinam denique mortem conducere.

*Cordis prolapsus  
quandoq: hydropis  
speciem induit.*

XII. Quòd si verò malum hoc corripiat hominem, in victu, ac motu fatis temperatum, tandem hydropis speciem induit, pedum œdemate, nocturnâ ortophnæâ, carotidum palpitatione, vrinarum paucitate, atque angore paulatim inductis. Nec interim deerunt fortè Medici, qui, huius ignoratâ morbi radice, non hydragogis modò, sed multis vesicantium, vstionumque tormentis Ægros extorqueant. Verùm de ijs fusè in nostro de Aneurysmatibus Tractatu.





## OBSERVATIO III.

*Cita mors ob interceptum motum aeris,  
& sanguinis in præcordijs, unâ  
cum cerebri consensu.*

## HISTORIA.



Iohannes Baptista Auanzius, octodecim annos natus, D. Cæcilie de Nobilibus famulus ex ora maritima romanæ ditionis malam circa præteritum autumnum reportavit valetudinem; hinc pravo vultus colore cum anhelitu laboriosam vitam Romæ ducebat, improbâque victus ratione usus, cum planè imbecillis esset, tamen adhuc serviebat; præcedenti suum interitum vesperi largâ castanearum copiâ se ingurgitavit, noctemque proindè valdè molestam ex spirandi præsertim difficultate transegit; & in ea quidem, post vomitum viscidorum humorum cum meliùs habere crederetur, manè tamen, quæ fuit 3. Febr. 1706. mortuus repertus est, e cuius ore spumosa lymphæ, ut ex naribus filamenta sanguinis pendeant.

## CADAVERIS DISSECTIO.

**C**Adaver post 24. horas inuentum est cum latice sanguineo, ex sinistra nare profluente, & cum thorace solito elatiori, ac tumidiori. Scissis tegumentis, occurrerunt intestina tenuia aliquantulum rubicunda, & intrà abdomen modica quantitas feri sanguinei. Lien prægrandis, ac plumbeus, ponderis exactè librarum quatuor cum dimidiâ. Hepar sanum dixisses, si bilem subviridem sua in cystide contentam excipias; cætera naturalia viscera vix cum notabili labe inuenta.

II. Eleuato sternò, ferum in vtraque pectoris cauitate magnâ copiâ offendimus, & pulmones, costis colligatos, non ordinariâ quidè̄m superficialium cohæsione, sed per albas quasdam, teretes, ac verè nerueas fibras, quas, oculo iudice, tendines putauisses. E cordis vasis, & cauitatibus sanguis nigerrimus extractus est, grumis non in vnum tenacitè̄r coagulatis, sed atrâ cum tincturâ diffusentibus. Dexterum cordis sinum insignes polypi, certè plus vnciâ pendentes, ferè vniuersum opplebant; sinistrum verò exiguus occupabat. Cordis, pulmonumque parenchymata summoperè flaccida tractabantur.

III. Digni quoque animaduersione fuerunt

*Tendineæ fibræ  
pulmones Costis  
colligantes.*

runt pulmones, qui, manu pressi, ut a colligatione cum costis diuellerentur, cruento lactice per dehiscentes quosdam in superficie meatus facilè manabant.

*Latex a compressa pulmonis superficie manans.*

IV. Circumsecto cranio, & durâ matre, pia occurrit, solitò rubentior, turgidis sanguine vasis. Quinimò cerebri superficies, ductis duobus hemisphærijs, vsque ad corpus callosum eâdem tincturâ laborabat. Apertis ventriculis anterioribus, serum limpidum effluxit, & plexus, qui intùs serpunt, ex vasis solitò tumentioribus constabant. Transuersales quoque duræ matris sinus nigro sanguine opplebantur.

### S C H O L I V M.

**D**Vbium sanè in primis oriri posset, an mors ista purè subitanea dicenda fuerit, quippè quam longus integræ ferè noctis agon præcessit; sed, cùm dissectum cadauer quædam animaduersione nostrâ ostenderit non indigna; idcirco promiscuè citum hunc cum alijs improuisis interitibus vsurpabimus.

II. Illud utique non dubium est, huius mortis causam fuisse interclusam penitùs circulationem sanguinis in præcordijs, & cerebro, quam magnus Hippocrates sub genere fortis apoplexiæ comprehensam quoque voluit,

a In com. ad  
tex. 2. de morb.

*Apoplexia ob va-  
forum thoracis in-  
terceptionem ex  
Martiano, & Fra-  
cassato.*

luit, vt optimè philosophatur egregius ille Hippocraticæ doctrinæ assertor (a) Martianus vbi ostendit, aliquandò apoplexiam fieri interceptis vasis in Thorace; quia scilicèt animaduertit ijs in partibus maximè apparere effectus interclusionis, difficultatem scilicèt respirationis, & angustiam. Hinc aliàs citatus eruditissimus Fracassatus apoplexiam, impedito motu sanguinis in pectore, sæpius per anatomen ostendit. In casu siquidèm nostro mortem præcessit anhelitus, & non minùs intrà cerebrum, quàm intrà pectus clara indicia moræ sanguinis, quam Hippocratis Interpretes *stationem* vertunt, detecta fuerunt. Quid enim cordis polypi? Quid sanguis effusus per intestinorum substantiam, & remoratus in meningum vasis? Quid tandèm exundans cùm intrà pectus, tùm intrà cerebrum ferocitas ostendit, nisi, oppilatis, conuulsisque pulmonum, cordis, ac cerebri tubulis, lymphatica præsertim vasa hàc illàc diffilijisse, & ipsa quoque sanguiferorum extrema eòusque diducta fuisse, vt fecernendo sero vitiosè dehiscerent?

*Morbi, & mortis  
huius ætiologia.*

III. Quoniam verò res quærimus, non verba, breuem idcirco, dilucidamque ætiologiam tùm morbi, cùm mortis exponi posse arbitramur, si nobis proponamus Adolescentem, qui ex mala victus ratione, & maximè ex diutina mora autumnali tempestate  
in

in huius maris littore (vbi autumnali tempe-  
state summoperè noxius est aer) vitia fermento-  
rum, ac sanguinis abundè contraxit, indè-  
que labefactato viscerum, vasorumque tono,  
illud (a) Luciani scomma aduersùs Romanos  
tantò iustiùs promeruit, quòd non solùm  
Æger ambulauerit, sed quòd Æger fanis, &  
valentibus famularetur: eò propterea deue-  
nit, vt, contumacioribus semper redditis in  
liene obstructionibus, inductâque sensim po-  
lyporum congestione in cavitatibus cordis,  
ille non asthma duntaxat detentus fuerit,  
sed ad pectoris hydropem properauerit. In  
hoc autem rerum statu constitutus, cum die  
ante sui interitûs noctem insalubri castanea-  
rum cibo largiùs vsus esset, facilè indè, acidâ  
contractâ stomachi cruditate, excitatoque vo-  
mitu, hypochondriorum subijt conuulsionem,  
quæ acres eodem tempore ichores, diù intrâ  
prægrandis lienis loculos, aliarumque glan-  
dularum folliculos fortè detentos, validè per  
sanguifluas, lymphaticasque venas, perindè  
quasi per totidè siphones, versùs cor, &  
pulmones, (diù iam semi obstructa, atque  
eneruata) circumpulit, & iniecit. Hi autem  
acerrimi ichores duplici ratione circulationem  
sanguinis apud præcordia intercipere potue-  
runt, scilicèt tum contentum fluidum coagu-  
lando, cum continentes canales conuellendo.  
Etenim primo loco fermenta ista salino-acria,

a De merced.  
conduct.

Præcordiorum la-  
bes a liene com-  
municata.

Circulatio in is-  
dè duplici ex causa  
intercepta.

ex hypocondrijs repentè sanguini affusa, eiusdem compagem, ac mixtionem maximè perturbarunt; vndè, variatis cohæfionibus particularum fluida componentium, earundem æquilibrium, atque indè fluxilitas, quæ vbi-que ferè æqualis esse debet, vitiata fuerunt; coactisque proinde mutuo sanguinis fibris, hîc grumi occurrerunt, & polypi; illîc verò serofitas intrà cavitates copiosius exundauit. Deindè verò huiusmodi etiam acerrimi ichores moram iniicere sanguini cœperunt, inquantùm scilicèt canalium conuulsionem, quam Hippocrates interceptionem definiuit, induxerunt. Cum enim sanguineorum textura ductuum tota fibrosa sit, ac muscularis, quotiès particulæ præter naturam fluxiliores, & acutæ, a sanguinis miscellâ secedentes, intrà fibrosum rete magnorum vasorum penetrant, necessariò tanquàm extranei cunei eorundem crispaturam producunt, & conuulsionem, per quam, minoribus factis vasorum diametris, fluxus necessariæ molis sanguinis, deuoluendi tum a corde in cerebrum, cum a cerebro in cor, impeditur; vndè idem sanguis ob crassiores fibrosarum partium acquisitam consistentiam, atque ob viarum interceptionem tandem circuire desistit. Et quoniam ex eodem <sup>(a)</sup> Hippocr., cum sanguis non mouetur, fieri non potest, quin uniuersum corpus quiescat. In hoc sanè vera syncopis, atque

Vasorum conuulsio  
quomodo contin-  
gat.

a 2. de morb.

atque apoplexiæ , quinimò celeris huius interitus ratio elucescit.

IV. In exposito verò casu , vt concretio fibrosarum sanguinis partium ex polypis euidentè innotuit ; ita ipsam interceptionem vasorum cruenta filamenta , quæ de naribus , dum æger interiit , pendebant , clarè demonstrarunt ; nimirum venas iugulares , & superiorem cauam ita fuisse conuulsas , vt sanguinem , quem a supernis venis exhaurire minimè potuerunt , per exiliores venarum nasi extremitates transfuersim erumpere coegerint.

*Cruenta ex naribus filamenta vasorum interceptionis indicium .*

V. Quòd si simplex cauæ ligatura , doctibus primùm Lowero , ac Willisio , ascitem sex horarum spatio in cane , alioquin sano , inducere potest ; quantò sanè celerius in nostro casu tot complicatæ causæ hydropem producere , atque hominem diù ægotantem perdere valuerunt ; vnà enim coniurarunt fusæ , atque exuperantes ex coacto sanguine serositates , pulmonum tunicæ dehiscentes , & sanguifera vasa partim obstructa , partim strangulata , itaut hæc simul omnia inchoatum iam pectoris hydropem ( quem sanè euentum sæpè vidimus ) momento temporis compleuerint : hinc ferum præ sui copia thoracis machinam extrudendo , solitò elatiorem reddidit , intusque pulmones premendo spatium ademit , in quod iidem , cum nihil renititur , ob vim incumbentis per tra-

*Hydrops ex Cauæ ligatura .*

cheam aeris dilatari solent; cuiusmodi sanè inspirationis renixum mechanicè, exemplo phialæ, demonstraui (a) Hippocrates.

a 4. de Morb.  
n. 33.

VI. Patet igitur, præpeditâ in præcordijs liberâ ipsius sanguinis traiectione, atquè etiâ prohibitâ respiratione, Ægrum hunc citò fuisse peremptum; & quidè conspirantibus præfocatione, syncope, ac neruorum syderatione. Neque enim a censu causarum celestis huius interitus excludendus venit defectus motus sanguinis, & separatio spirituum in cerebro, vbi adeò clara indicia coacti sanguinis intrâ meningum vasa apparuerunt. Etenim, cum ichores malefici apud miserrimum Iuuenem ex hypochondrijs celerrimè in præcordia ponantur transducti, dubitari non potest, quin iuxta citissimæ circulationis legem aliqua eorundem portio etiam ex præcordijs in caput, agonis principio, ocysimè deriuata fuerit. Vndè patet, quomodo ipsa quoque cerebri apoplexia in Ægri perniciem denique conspirauerit.

*Ab hypochondrijs ad cerebrum citissima infensi liquoris deriuatio.*

VII. Hæc profectò fati nobis esse videntur ad morbi, mortisque causam rimandam; nisi pro coronide velimus addere nonnullas annotationes ab ipso extispicio deducendas, &

VIII. Primò quidem perpendenda venit singularis illa per albas, teretesque fibras pulmonum cum costis colligatio, quam sanè nobis rarò obseruare contigit. Adglutinatio siquidem



dem pulmonum cum costis, quæ fit a valida, & ubiq; æquali superficie pulmonum, & pleuræ cohæfione, frequentè occurrit; illa verò, quam in cadauere isto offendimus, fortè maiori ex parte congenita, non tota per morbum induc-ta aliquibus videbitur. Egregiè porrò hâc de re Malpighius in oper. posthum. in respons. ad D. Placit. vbi istorum natiuorum meminit vincu-lorum, quippè quos, sicubi inueniuntur, inspira-tioni admodum famulari arbitratur.

*Pulmonum cum pleura per liga-menta cohæfio ali-quibus fortè con-genita.*

IX. Secundò rarum quoquè se nobis præ-buit curiositatis argumentum, quod, com-pressis pulmonibus, serositates veluti ex im-bibita spongia per dilatatos poros fuerint ex-trusæ. Hoc sanè nequaquam contigisset, ni-si duo in pulmonibus mala, colluies nempe serosa, atque extremorum vasorum hiatus, ex salinis ichoribus, tanquam excuneis amplio-res redditi, simul concurrissent. Hinc claro experimento doceri possumus, in quem la-xitatis statum veniant vasorum tunicæ, cum in obscuris, abditisque abdominis locis ad ascitis productionem dehiscunt.

*Vasorum dehiscen-tia in ascite.*


X. Tertiò negligi certè a doctis Viris non po-terit examen causæ, cur sanguis in cordis ven-triculis non quidè conuetâ tenaci densitate, sed friabili, ac diffluente consistentiâ inuentus fuerit. Hoc sanè phœnomenon ex defectu mix-tionis rubræ cum fibrosa, & alba sanguinis par-te, quæ intrâ cordis sinus in polypos coalue-rat

*Morbosa sangui-nis in corde fluxi-litas, vnde.*

rat deduci posse censemus : reliquum enim sanguinis facilè diffluit fibrarum retinaculo solutum ; vt passim contingere videmus etiàm in extracto per venæ sectionem cruore , in quo , cum superior pars in albam concrefcit gelatinam , inferior , quæ nigra apparet , semper solitò fluidior occurrit .

XI. Differendum aliquid superesset de causis , ac modo , quibus polypi intrà cordis , & sanguiferorum cauitates concrefcunt , deque menstruo acido , quo extrà corpus dissolui solent , quando alchalicis fixis , aut volatilibus nequaquam superantur ; sed opus hoc , studio , experimentisque plenum , reijcimus ad tractatum longè maioris laboris , atque vtilitatis , quem de Corde , & Aneurysmatibus adornamus .

*Polypi acidis, non  
alkalicis dissoluntur.*



# OBSERVATIO IV.

*Repentina mors ex conuulsione thoracis, præcordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiamocyssimè desinente.*

## HISTORIA.



Oseph Sali Pistoriensis ann. 54. habitûs mediocris, olîm hæmorrhoidibus, & biliosis diarrhæis vexabatur, quibus tempore deficientibus, sepulti in pectore dolores, ac recurrens incertis diebus spirandi difficultas absque vllâ quidè anacatharsi, sed cum faciei squallore, rigentique artuum frigore illum vrgerere cœperunt. Ante mensem identidem in asthmatis paroxismissis penè animo linquebatur, atque ob grauia quædam pathemata miserè, & cum mœrore viuebat. Tandèm pridiè ante mortem a Monialibus B. M. Assumptionis ad famulatum vocatus, laboriosam, sedulamque operam, huc illuc festinando, proprias vltra vires locauit. Denique, suffocatiuo correptus anhelitu, aphonus repentè factus est, & vniuerso corpore conuulsus, animam effla-

flauit , facie admodum tumidâ , oculis intrâ orbitam retractis , & spumâ ad os , ac nares confluente . Obijt autem die 13. Martij 1706. horâ 23. in publica via , quæ ducit ad Templum S. Mariæ in Porticu .

## CADAVERIS DISSECTIO .

**V**Niuerfa corporis superficies excolor , facies verò rubicundoliescens apparuit vnâ cum spumâ intrâ os , & nares , quæ , amoto sterno , alioquin valdè depresso , per solam pulmonum compressionem copiosius redundabat . Virga , elapsis viginti quatuor horis ab interitu , adhuc subrigida cernebatur .

*Virga subrigida  
in cadauere .*

*Summa sanguinis  
fluxilitas in eodem .*

II. Vniuersalia integumenta , cum primùm cultro inciderentur , statim fluidissimo , sed atrii coloris sanguine , perindè quasi adhuc inter viuos versaretur æger , affluenter manabant .

III. Reserato abdomine , omentum , intestina gracilia , & mesenterium rubebant , diffuso , ac remorato per minima illarum spatia sanguine .

*Pancreatis mol-  
lities excedens .*

IV. Pancreas ob morbidam substantiæ mollitiem ferè ductile deprehensum fuit .

V. Hepar , quanquàm neque mole , neque colore , aut substantiæ ratione a naturali

li statu recedere videretur , in cystide tamen bilem fluidissimam , ac subobscuri coloris continebat . Cætera in abdomine viscera prorsus illæsa , & integra inuenimus .

VI. Aperto thorace , lerna malorum venit in conspectum : etenim pulmones utroque in latere pleuræ , diaphragmati , & pericardio ita adhærebant , ut nec digitis euelli , nec cultro æqualitèr ab imo ad summum separari potuerint . Et quanquam in pulmonibus neque pus , neque ferum occurrisset , contractio tamèn quædam , & renitentia , seu diminuta flexibilitas obseruabatur .

*Fortis pulmonum ad singulas in thorace partes adhæsio .*

*Eorundem rigiditas .*

VII. Cor , licèt mole non magnum , adeò tamen tumidum , tensum , & orbiculatum deprehendimus , ut in systole adhuc positum dixisses . Vena caua , & auricula dextera naturali diametro aliquantulum ampliores , fluidoque Sanguine tumebant ; quo sanè cruore , & quidèm multò fluidiori , scatebant sinistrae cordis cauitates , in quibus nullus polypus , aut grumus latitabat .

*Ita & Cordis .*

VIII. Secto cranio , dura mater excolor , & suprà cerebri corticem admodum contracta ; pia verò , suis tumentibus ex fluido sanguine vasis , occurrit . Cumque amputarem portionem corticalis , & medullaris cerebri partium , vidimus ( ut apud strangulatos ) puncta sanguinea spisso agmine candidam medullæ substantiam variegare . Pallidam

*Valida duræ matris Contractio .*

*Serum a cerebri  
ventriculis ad vsq.  
spinalem medullā  
effusum.*

dam ferositatem non apertis solūm ventriculis profilijsse, sed ad vsque spinalem medullam redundasse, deprehensum fuit.

## S C H O L I U M.

**V**Nicam nascendi, innumeras verò moriendi hominibus esse vias, nihil est, quod nos doceat apertius, quàm ipsa cadauerum sectio, quæ occultas necis causas ad Solis lucem euidenter exponit. Vidimus in præcedentibus extispicijs, quàm variæ moriendi rationes fuerint detectæ: nunc rara interitus causa se offert in descripto Ægro, eiusque dissecto cadauere. Etenim, quanquàm morbus, quo decessit, vulgaris, ac notissimus videri possit alicui, qui solidarum vitia partium considerare solummodò velit, fuit siquidem vehemens, atquè contumax conuulsio præcordiorum, quæ, cerebro, & vniuerso corpori communicata, aeris, sanguinis, & liquidi neruei alternum fluxum, ac refluxum lethalitèr præpediuit; vndè fortissima tandè apoplexiæ species exorta est; attamèn si sedulò aduertamus per dissectionem cadaueris singularem sanguinis crasim innotuisse, vberiore certè materiem admirandi simul, ac philosophandi offendemus: inuentus quippè fuit post integrum a morte diem cruor adeò solutus, & fluens,

*Morbi huius natura qualis.*

fluens, ut, si homo iste funeri superstes fuisset, fluidior esse non potuerit. Hæc profectò sanguinis in cadaueribus conditio ita rarò existit, ut, si quandò euenerit, portenti, ac prodigij simile numeretur; & quemadmodum ab insolenti causa id proficiscitur, ita vires, effectusque nonnisi insolentes nostris in corporibus producere valet. Sed iam utraqùe tam solidorum, quàm fluidorum mala seorsim, diligentèrque perpendamus.

*Sanguinis fluxilitas in cadaueribus rara.*

II. De mortifero præcordiorum, cerebrique spasmo clara occurrerunt indicia ante, & post mortem, videlicet sepulti in pectore dolores, difficultas respirationis absque vllâ anacatharsi, angor suffocatiuus, spuma ex naribus, & ore, quæ, præssis pulmonibus, affluentior fiebat, sternum depressum, oculorum retractio, totius denique corporis, atque ipsius etiam penis conuulsio; quibus adiuncta fuit elegans obseruatio rotunditatis, ac tensionis in corde, quæ probabiliter nos docuit vitale hunc muscolum, dum æger interijt, pertinaci conuulsuâ systole fuisse correptum; cui sanè cum ingens accesserit quantitas cruoris intrà suas cavitates reperti, nostrum subit animum dubitatio de insuperabili renixu sanguinis, qui, cum ob pulmonum, totiusque corporis conuulsiones liberum in arterijs spatium inuenire non posset, ut cordis pulsioni obsecundaret, necessariò intrà ventriculos

*Signa spasmus in præcordijs, et cerebro indicantia.*

diastolis tempore admissus, a quantacunque cordis contractione vrgeretur ad egressum, subsistere tamen, tandemque validissimè re-niti coactus fuit. Vndè postremus ille ortus est præcordiorum angor, penitusque, & ex tempore disruptus vitalis ille circulus a corde in cerebrum, & a cerebro in cor. Qui sæpè viuorum sectionibus interfuerunt, ignorare nequeunt sanguinem, arteriâ magnâ casu, vel arte compressâ, non inuenire spatium, per quod liberè excurrere possit; vnde cor manet plenum, immobile, ac rotundum, citiòque animal moritur.

*Ex aortæ compres-  
sione cordis immo-  
bilitas, rotunditas  
&c.*

III. Status deinde duræ matris clarè paritèr nobis ostendit pertinacem conuulsionem, in quam ipsa paulò antè Ægri mortem venerat; inuenta enim est excolor, simulque contracta, vt non sit hæsitandum, quin idem meningum spasmus, qui cerebrum obsidebat, ac circumcingebat, vniuersæ radix extiterit conuulsionis.

*Spasmus menin-  
gum vniuersæ con-  
uulsionis origo.*

IV. Sed hæc notiora sunt, quàm vt longius examen mereantur. Pergamus igitur ad particularem illam, & raram conditionem fluiditatis, quâ sanguis non in præcordijs modò, & cerebro, sed in toto etiàm succutaneo corpore donabatur. Hoc fanè phænomenon pro causa habuisse suspicamur non solum violentiam motûs corporis, quam æger postremo suæ vitæ die sustinuit, & per quam

*Sanguis in Cada-  
uere cur fluxilis  
adhuc perstiterit.*

id



id contingere cruori suo potuit, quod euenit in recentèr effuso, & diu in vase agitato sanguine, qui eum ob motum in fibras coalescere nequit; sed potissimùm exaltationem salium acrium, maximè ad vrinofam naturam accedentium in homine, cæteroquin hæmorrhoidibus, ac biliosis diarrhæis olim detento; qui profectò sales, cum per vehementem, crebròq; repetitam corporis exercitationem, oleosis spiritibus, & aqueis partibus, quorum miscellâ cicurabantur, exausti fuerint, nil mirum, si intimè cum sanguine agitati, ac permixti eam fluxilitatem, eidem conciliare potuerunt, quam inducipassim videmus in extracto recenter e vena sanguine per additionem salis vrinosi, & præcipuè spiritûs salis armoniaci.

*Salis vrinosi vis ad Sanguinem dissoluendum.*

V. Cum verò infusiones liquidorum acrium intrâ viuentium brutorum venas nobis non semel ostenderint, easdem præcordiorum, totiusque corporis immanes conuulsiones, quas illicò mors sequitur, inducere, nihil est, cur dubitemus, quin vera causa conuulsionum, quæ nostrum ægrum ad necem perduxerunt, extiterit copia huiusmodi liquidorum salino-acrium, quæ, cum nimiùm exaltata, & acutissima reddita, ex hypochondrijs intrâ sanguineos canales magnâ copiâ transducuntur, veneni naturam induunt: tunc enim propriæ excessu molis naturalem reliquarum in sanguine particularum superant pro-

*Coniectura de conuulsionum causa experimentis confirmatur.*

*Mali fomes in hypochondrijs.*

proportionem , ac proindè ratione propriæ indolis cruorem non tantùm fluidiorem , ac mobiliorem , sed , quod magis est , procliuiorem efficiunt , vt ex naturalibus vasorum cancellis facilè se proripiat , atque intrà strictissimam compagem fibrarum muscularium vasorum , & glandularum vtrò se insinuet , ac penetret ; hinc neruorum , musculorum , vasorumque conuulsiones , vnàque simul incongruæ contentorum fluidorum separationes , ac moræ , vt in præfenti casu , solent contingere .

VI. Mouet autèm nos ad credendum, scatebram prædicti liquidi salino-acris , & armoniacalis in hypochondriorum folliculis latitasse, quòd obseruauerimus non solùm cysticam bilem fluidissimam , ac subobscuri coloris ( cuiusmodi euadere solet artificiali admixtione salium acrium ) sed ipsum quoque pancreas lentorem plicabilem , ac ferè ductilem adeptum fuisse , qui planè oriri poterat ex diuturna , & copiosa secretionem fluidi acerrimi , ac dissoluentis , quod strictam illius glandulæ fibrarum cohæsiõnem elimare , debilitare , ac ferè tollere valuerit ; vndè resistentia minor , seu mollities maior eo in viscere producta fuit : quemadmodùm sanè in cadaueribus illorum , qui ex diabete perierunt , renes omninò flaccidi , plicabiles , ac ductiles ob eandem rationem inueniri solent .

*Diabeticorum renes ductiles .*

Si-

VII. Similitèr non aliundè petenda esse videtur causa tam profundæ intrusionis sanguinis intrâ strictissimam cerebri medullam, quàm ex conuulsione continentium, simulque dissolutâ nimium compage contenti liquidi, cuius maior fluiditas, vt e succutaneis vasculis ad simplicem integumentorum scissionem, erumpendo, prodijt; ità in cerebro vltiorem penetrandi vim naçta fuit a meningibus, sinubusq; conuulsis, perindè quasia confociatis ad circumpellendum manibus. Vndè cruor, ad vsque medullarem cerebri substantiam expressus, rubentibus illam punctis variegauit.

*Sanguinis intrusio ad cerebri medullam vnde.*

VIII. Ipsa quoquè perseuerans post mortem penis tensio (quæ rarò in strangulatis non inuenitur) præteritæ vniuersalis conuulsionis testis adfuit. Cum enim virile membrum sit musculus mirabilis contexturæ, cæterorum instar muscutorum spasmodicas affectiones pati potest. Modum verò, quo penis iuxtâ naturæ ordinem tenditur, egregiè tradidit (a) Malpighius. Illud tantummodo ad rem nostram hìc perstringimus, quòd, sicuti spuria quædam colis erectio in cadaueribus excitari potest per solam iniectionem tepentis cuiuslibet liquidi intrâ eiusdem arterias, dummodò venulæ filo strangulatæ, ne refluat, impediant; ità profectò non dubitamus, quin eiusdem erectio, quæ ob neruorum, fibrarumque conuulsionem, fluida in si-

*Penis musculus*

a In cons. de impot. vener. apud Bibl. Med. Manget.

*Eiusdem notha erectio in cadaueribus, quomodò excitetur.*

nu-

nubus fistulosorum corporum intercipientem, antè huius ægri mortem cœpit, persistente eodem fibrarum spasmò, vel post mortem perseverauerit.

*Sanguine fluxili  
existente quomodo  
facies pallida, &  
extrema frigida  
perdurauerint,*

IX. Cæterùm non adeò laborandum in ea dubitatione, quomodò scilicèt stare simul potuerint summa fluiditas sanguinis, & facies excolor, atque artuum illud frigus, quibus æger iteratis in præfocationibus detinebatur. Etenim, eadem vasorum strangulatio circà præcordia, quæ suffocatiuum asthma sæpè intulit, liberum sanguinis per extremas arterias excursum, & ignearum particularum per minima carniùm diffusionem præpediebat. Vndè caloris, ac viuidi coloris priuatio exoriebatur; quam sanè priuationem consequitur sensus frigoris, quemadmodum apud hystericas mechanicâ istâ vasorum lege accedere, ac recedere passim obseruamus. Quo fit, vt magnus ille Medicorum Romulus, vt rectè (a) Hipp. solertissimus Bagliuus noster, post Sydenhamium, appellauit, scripserit ad rem -- *Colorum mutationes, corde adstringente venas, (intellige etiam arterias) ac laxante, fiunt; laxante quidè rubicundi, ac benè colorati; constringente verò cum pallore liuidi &c.*

a Lib. de off. nat.  
n. 28.

*Iuxtà varias cordis affectiones colorum in facie mutatio, ex Hipp.*

b Aph. 41.

X. Mortuus itaque improuisò miserrimus homo iuxtà magni Senis (b) effatum, cum tam frequentèr, ac fortitèr absque manifestâ, scilicèt externâ, causâ animo defecisset; & de-

na-

natus est ob complicationem trium malorum, suffocationis, syncopis, & apoplexiæ, quam sub voce syderationis, ab acri humore pendens, idem (a) Hippocr. per hæc verba, oraculorum loco habenda, accuratissime descripsit. -- *Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed, siquidem radatur, (en modus conuulsionis) turbationem multam sustinet, & cerebrum conuellit, ac distrahit totum hominem, (en conuulsio vniuersalis) qui in se ipso vocem non edit, (en aponia) & suffocatur, (en suprema complicatio malorum, præfocationis scilicet, syncopis, & apoplexiæ) demum concludit -- & hæc affectio syderatio, & apoplexia appellatur: -- quæ quidem non semper in solo cerebro quærenda est. Aliquando in vasis, aut cauitatibus cordis obstructis, compressis, atque conuulsis, intercepto cruore, delitescit. Sæpè in vno ægro multæ partes, immò omnes obseruantur affectæ, vitio vel primario, vel secundario, vt scitè aduertit Thomas (b) Bartholinus, & nos in præsentī casu notauimus.*

*Triplicem ob morbum hic æger periit.*

a Lib. de gland. n. 9.

Hippocratis oraculum.

*Syderatio interdum a corde eiusque vasis deriuatur.*

b conf. de Anat. pract.



## OBSERVATIO V.

*Improuisa mors ex subita Caua intrâ  
pericardium disrptione cum aneu-  
rysmate arteriæ magnæ .*

## HISTORIA.



Tephanus Ascieri tutor Ia-  
nuensis , sexagenario maior ,  
habitus carnosî , octo ab hinc  
annis podagrâ , & chiragrâ  
circa æquinoctia grauitè ve-  
xatus ; ante biennium tussi

cum spirandi difficultate detineri cœpit ; dein-  
dè cordis palpitationem , & sepultum quen-  
dam sub dextero sterni latere grauatium ,  
atque interdum acutum dolorem , ad vsque  
humerum propagatum , pectoris angustiam , ac  
profundam pulsationem passus fuit .

II. Decursu proximè præteritæ hyemis  
non rarò corripiebatur etiam vertigine cum  
sensibili capitis excalesfactione , ac præcipiti  
virium lapsu . Quare sæpè ad suendum ine-  
ptus reddebatur . Dimidium quadragesimæ  
salsamentis transegit . Tandem die 14. Martij  
1706. hora 17. cum a prandio merum ingur-  
gitasset , statim aphoniam , atque angore ceci-  
dit exanimis .

*Sepultus sub dex-  
tero sterni latere  
dolor cum palpita-  
tione cordis .*

*Vertigo tenebri-  
cosa .*

CADAVERIS DISSECTIO.

**M**irabile profectò nobis visum fuit, quòd nullum in abdomine contentum viscus a naturalis œconomix legibus recessisset; adeò singula colore, mole, ac substantix ratione optimè constituta occurrerunt. Sola cystica bilis subobscurum quid referebat.

II. Horrendum e contrariò spectaculum thorax nobis exhibuit; detractò enim sterno, (quod parte sui dexterâ elatius erat finistrâ) dexter pulmo rubicundior, & pleuræ admodum adglutinatus, cum adnato duro, & magno corpore apparens, curiositatem nostram lactavit, vt diligentius rei nouitatem detegeremus. Latebat enim statim extra pericardium aortæ aneurysma; deinde adacto cultro, illicò lamellam osseam deprehendimus figuræ oualis, quæ externam dilatatæ arteriæ partem, quâ sternum, costasque dexteras respicit, occupauerat. Sub ea lamina, & circum externam aortæ cavitatem, quæ anteriùs posita est, polypeam substantiam instar lardi in fornicem adeò concinnè incrustatam inuenimus, vt nunquam aliàs in aneurysmatum cystide similem detegere datum fuerit; hoc siquidè corpus igne priùs liquatum, & mox frigore integrè concretum videbatur; non

*Dextera Sterni pars elatior.*

*Aortæ aneurysma.*

*Lamella ossea in aneurysmate.*

*Rara polypi constructio in aneurysmate.*

enim in multiplices laminas, ac veluti in folia distrahi ( vt passim solet ) patiebatur. Undè constitit, validum aggerem pulsioni sanguinis versùs externas partes positum fuisse. Facie verò, quâ pulmones tanguntur, minori polypeo repagulo obfessam, tectamque aortam, deprehendimus. Aneurysmatis intereà cavitas tam ampla occurrit, vt pugnum facilè admisisset, tamque grumoso plena sanguine, vt nihil fluidi amplius capere posse videretur; nusquam tamen magno aliquo foramine dehiscebat, licèt ad cordis basim intrà pericardium, & ad inferum latus aneurysmatis nigra quædam striæ maiorum fortè futurorum hyatum indicia, obseruatæ fuerint. Longitudo ipsius aneurysmatis non excedebat longitudinis aortæ, quâ curua est, dimidium, quæ proindè aorta tum supra, cum iuxtà cornatiuum diametrum, ac fibrarum validitatem fartam, tectamque elegantè seruabat.

*Striæ ad latus aneurysmatis quid indicarent.*

III. Sed non hîc malorum finis; etenim cum ipsum pericardium maximè tumidum, molle tamen, animaduverteremus, suspicati fuimus de latente aliquo præternaturali fluido. Sectum proinde ingentem dedit, quantam scilicet capere poterat, effusi, atq; in grumos conuersi cruoris quãtitatem, quæ certè duarum librarum pondus excedebat. Sanguis verò effluxerat, aperto intrà vestibulum venæ cauæ iuxtà dexteram auriculâ foramine diametri vnciæ circiter vnus, quod pau-

*Concreti sanguinis copia intrà pericardium.*

*Venæ cauæ rupturâ.*



paulatim ab erodente liquido factum fuisse in musculari eiusdem textura planè indicabant ipsius oræ , quæ non in fimbrias , ac laciniâs solutæ , sed veluti per limam omninò expolitæ obseruabantur . Quominùs autem sanguis multò priùs intrâ pericardium exundaerit , impediuit forsitan subtilis illa , in quam muscularis definit, tunica, quæ, hiatui super extensa, egressum claudebat , cuius tunicæ tenuata fragmenta ad vlceris extrema videbantur pendere .

IV. Secto tandèm cranio niger sanguis ex vulnerato fortè fortunâ posteriori sinu duræ meningis largè profluxit; quod genus magnâ pariter copiâ in lateralibus sinubus continebatur . Ventriculi cerebri limpidò tumebant fero , quod ad principium spinalis medullæ redundauerat .

*S C H O L I V M .*

**A** Deò perspicuè patet natura , & vis lethalis mali , quo hic homo subitò decessit , vt nullo penè commentario indigere videatur . Etenim , cum integritas , & continuitas magnorum sanguiferorû ad vitæ conseruationẽ omniû maximè sit necessaria; mirum proculdubio videri non debet, si, adeò enormitèr dilatatâ arteriâ magnâ , & abruptâ repentè continuitate, & integritate summi caudicis venæ cauæ , fluxus sangu-

guinis a venis in cor , atque a corde quaquauerfum vnâ cum vitâ illicò in exposito fene defecerit.

II. Possem hîc de ortu , ac discriminibus aneurysmatum plura differere ; sed , quia nunc scholiorum breuitati studendum , aptiorem illis locum , volente Deo , tribuemus . Id verò crebra experientia nos edocuit , aneurysmata præcordiorum apud Ægros , erodentibus ichoribus refertos , plerunque incipere ab vniuersali quâdam spasmodica arteriarum affectione , quæ postremò in corde , aut summis vasis determinatur . Quo fit , vt primùm de vaga , atque huc illuc per collum , & artus errante arteriarum palpitatione conquerrantur . Deindè intrâ pectus malum sistitur , sæpè tussis vrget , cor salit , & grauiùs pulsatur , mòx sepultus , ac breui fugitiuus corripit dolor , qui postea pertinaciùs hæret , & modò ad alteram scapulam , clauiculamue , modò per brachium , quandoque vsque ad cubitum propagatur . Tandèm profunda perferentur pulsatio ; eleuantur alicubi costæ , aut sternum ; cæteraque succrescunt grauia , & prorsùs miseranda atrocis huius mali phænomena , quæ vt plurimùm subitâ morte finiuntur .

*Præcordiorum aneurysmata sæpè ab vniuersali arteriarum spasmò incipiunt .*

*Clariora præfati morbi indicia .*

III. At verò , quanquam omnia , & singula symptomata , quibus hîc homo suorum initio malorum tentatus fuit , & an eadem

ve-

vexauerint, quæ superius exposuimus, noscere minimè potuerimus: attamen qualiscumque morbi progressus, quem ab illius familiaribus sedulâ inquisitione comperimus, atq; extispicio præfiximus, satis ostendit, eiusdem corpus, podagrâ obsessum, acribus, pungentibusque ichoribus (vt vel cystica bilis argumento fuit) redundauisse; qui sanè ichores, cum per biennium ante illius mortem subsistere cœperint in præcordijs, tussim excitarunt, & paulatim, comitantibus doloribus, pondere, atque anhelitu, intrâ substantiam tendineam aortæ, simulque muscularem venæ cauæ intercepti fuerunt, quibus in locis verosimile est primùm irritationem, & conuulsionem cum cordis palpitatione, deindè verò istorum etiam canalium exesione, tandèmq; productam fuisse diloricationem, in qua vera aneurysmatum natura consistit.

*Aneurysmatum  
natura in quo consistat.*

IV. Si quis autè diligentè animo teneat, arteriam magnam, & venam cauam in Ægro incurui habitus ob artem futoriam, angustiori situ, quàm humani corporis ferat constitutio, coerceri; fortè causam inueniet, cur initio morbi sanguis maiori nisu ob tussim exagitatus, prædicta sanguifera vasa vehementius distenderit. Deindè quomodò per impetum reciprocati sanguinis minimo negotio haberi potuerit intrusio, & mora perti-

*Ars Sutoria, quomodò infirmâdis præcordiorum vas contulerit.*

*Artifices seden-  
tarij Cur rarò sani  
conſeneſcant.*

nax falino-erodentium ichorum intrà fibras eorundem canaliculorum. Rarò enim qui feffilem, incuruamque ducunt vitam, ſi vitioſis redundent ſuccis, abſque inſigni aliqua pulmonum, cordis, aut magnorum vaſorum labe conſeneſcunt.

*Ex aneurysmatum  
folliculis Saniei ef-  
fuſio.*

*Cauæ eroſio quo-  
modò inducta.*

V. Et quoniàm nigræ quædam ſtriæ ab aneurysmatis fundo ad cordis baſim intrà pericardium apparuerunt; dubitandi anſam nunc, præbent ſubtilem, acremque ſaniem, (quam aneurysmaticus quiſque folliculus perpetuò fundit) ſenſim ſupra Cauam diſtillaſſe, vt illius magnam eroſionem faltem accelerauerit; præfertim cum Aorta iſto in homine, vt dictum eſt, ex inflexo, ac dilatato trunci ſitu neceſſariò magis appropinquauerit ad Cauam: quo factum fuit, vt affectiones vtriuſque ſanguiferi ferè per contactum adaugeri mutuò potuerint.

*Frequens Cordis  
palpitatio, & ver-  
tigo vnde.*

VI. Non admodum hîc laborabimus in exponenda cæterorum ætiologia ſymptomatum, quæ futorem hunc ante mortem maximè exercuerunt; cum abundè ex legibus motûs ſanguinis euadat perſpicua. Etenim, vt recurrens cordis palpitatio procedebat ex reflexione motus ſanguinis ab Aortæ aneurysmate verſus cor; ſic frequens vertigo, & capitis excalefactio ex impedita identidè traiectione ſanguinis a caua intrà dexterum cordis ventriculum proficiſcebantur. Sanguis enim,  
qui

qui a cerebri sinibus in iugulares, & Cauam, indeque intrà cor, solutè, ac liberè in homine valente, atque incolumi, motus fuisset; in casu nostro ab erosâ, suisque propterea viribus eneruatâ Cauæ texturâ, per cordis itinera nonnisi ægrè vrgeri poterat; ac propterea idem sanguis, maiori sæpè sæpiùs quantitate intrà Cauam collectus, impedimento erat, quominùs subsequiturus e iugularibus venis, sinibus duræ matris, ac cæteris capitis sanguiferis, liberè descenderet. Vndè quemadmodùm ex maiori ignearum particularum per minima cerebri diffusionem, inæqualique irritatione, & pressione; calor, ac vertigo contingebat; ità ex intercepto eodem tempore motu sanguinis e Caua in Cor, præceps virium lapsus oriebatur; cuius certè deliquij causam, quam aliam quæremus? cum in promptu sit, Cor inter duo positum fuisse aneurysmata, Cauæ nimirum, quod sanguinem frequenter eidem subtrahebat, & Aortæ, quod illum identidem in cor repellebat? Quæ sanè res in causa fuit, vt sanguis in cerebro etiam remoratus, ex dissecto duræ matris sinu largè præfluxerit. Neque aliundè petenda est ratio inuentæ serositatis intrà cerebri ventriculos, quàm ex summa plexuum turgentia, ac distensione, cuius vi, diductis, ampliatisque poris tunicularum vascula comprehendentium, subtilis percolatio feri, veluti per manicam Hippocratis, habita est.

*Quare præceps virium lapsus.*

*Cor duo inter aneurysmata locatum*

a In coac.

VII. Denique repentina mors, quam  
 (a) Hipp. prædixit Senibus, quibus cordis dolores  
 sæpiùs consuefcunt, tribuenda esse videtur subitæ  
 ruptioni tuniculæ illius, quæ, cauæ foramen te-  
 gens, cruoris effluxui renitebatur. Sanguini verò  
 duplex consociata probabilitèr vis nouissimè  
 accessit, scilicet erosiva ex falsamentis, per  
 dimidium quadragesimæ ingurgitatis, & ex-  
 trusiuâ, seù distractiuâ ex hausto tandem,  
 meraco. Vndè iunctis cunei, & vectis viri-  
 bus in sanguine, tenuissimum illud membra-  
 næ repagulum cedere coactum fuit; vitæque,  
 fluente cruore de Caua in pericardium, il-  
 lico recessit.

Vnde repentina  
 mors.

VIII. Neque sanè huiusmodi mortis ge-  
 nus nouum erit ijs, qui in medicarum hi-  
 storiarum lectione versantur. Prostant enim  
 similia exempla apud (b) Bellinum, aliosque,  
 vt nostra nunc taceamus. Sed vnum legimus  
 descripto casui ferè tam simile, quàm ouum  
 ouo apud (c) Andream Laurentium in Æquite  
 Guicciardino Legato Magni Ducis Hetruriæ  
 ad Regem Gallorum, qui, tametsi cum Ma-  
 gnatibus quibusdam obambulans, familiari-  
 tèr colloqueretur, subitò respiratione, pulsu,  
 & vitâ priuatus cecidit; cuius in cadauere in-  
 uentum fuit venæ Cauæ ostium disruptum, &  
 Arteria magna ita dilatata, vt brachij am-  
 plitudinem æquaret. Sed hîc demirari fatis  
 non possumus, quomodò insignis adeò Ana-

b De morb. pect.  
 tit. de inter. puls.

c Lib 9. quest. 18.

Similis historia ex  
 Laurentio.

tomicus miratus fuerit, quòd nulla externa  
 causa ad Cauæ disruptionem accesserit; per-  
 indè quasi internæ, vt passim videmus, fa-  
 tis esse non potuerint.

*Causæ internæ ad  
 vasorum disruptio-  
 nem solæ sufficiunt*

F I N I S.

# Lectori suo .

**H**Actenus pro viribus nostram fidem persoluimus . Speramus interea , vt , quæ non minùs celeritèr , intèr occupationes nostras , quàm candidè scripsimus , ab æquis , ingenuisque Lectoribus , ad Reipublicæ utilitatem , ad quam studia nostra direximus , perhumanitèr referantur . Huic verò labori , inchoato in Ædibus Vaticanis medio Ianuario , supremam imposuimus manum in Ædibus Quirinalibus ipsis Kalendis Nouembris eiusdem anni MDCCVI. Augustissimis nobis fauentibus auspicijs S. D. N. CLEMENTIS XI. PONTIFICIS verè , inter Optimos , Maximi .



## I N D E X

Rerum, & verborum, quæ in hoc opere continentur.

## A

- A** Bdominis tensionem eneruantia. pag. 135.
- A**bscessus polypeus meningum. 37.
- A**cicula sub vnguibus adaëta apople-  
cticos excitat. 134.
- A**equinoctia apoplexiarum feracia. 84.
- A**er vnum ex tribus fluidis maioris  
vsus. 14.
- sanguinem fecundat. 44.
- in conclavi calido, montiumque  
cacuminibus sanguini premendo est  
insufficiens. 17.
- ad subitam necem diuersimodè  
concurrit, 43.
- eius in pulmones ingressus variè  
inhibitus repentinæ mortis causa. 26.
- pòdus vel moles nimiù aucta, aut  
diminuta subitæ necis causa. 16. 17.
- in fodinis metallicis ponderosus,  
& lethifer. 17.
- qui prauus dicitur, iuxtà corpo-  
rum dispositiones noxiam infert. 17.
- externus cum interno equilibra-  
tus mortem infert repentinam. 27.
- A**eris probi mutatio in deleteriù mor-  
tifera. 69.
- motus vehemens vasorum ruptu-  
ram cur acceleret. 97. & seqq.
- virus in hac romana constitutione  
non vnicè culpandum. 113.
- eius tamen intemperies quomodo  
subitæ morti contulerit. 115.
- A**gyrtæ cur vitandi. 32.
- A**loetica pblegmaticis congestionibus  
curandis opportuna, 103.
- A**mara præseruante spasms ex mate-  
ria viscida. 100.
- A**neurysmata quid. 223.
- sub varicum nomine comprehen-  
dit Hippocrates. 97.
- præcordiorum sæpe ab vniuersali  
arteriarum spasmo incipiunt. 222.
- interna quosnam citiùs peri-  
mant. 78.
- ex horum folliculis sanies effun-  
ditur. 224.
- horum prophylaxis, quæ secu-  
rior. 224. & seq.
- A**nimalia in machina boyliana cur  
morianur. 16.
- A**nimalium perfectorum vita in quo  
verè consistat. 3.
- A**nimi deliquia inter signa corrosionis  
magnorum vasorum. 11.
- vt subitam mortem præfagiant,  
quid opus sit. 75.
- A**nimi passiones solida debilitando,  
mortem improuisam accersunt. 15.
- spirituum excursus ad præcor-  
dia perturbant. 22.
- cur sint lethales. 19. 40. 41.
- A**nimi tranquillitas, & diætæ ad su-  
bitam mortem auertendam ex sacr.  
Pag. 105.
- A**nni quædam tempora noxia. 68.  
etiam

- etiam ex Hipp. 69.  
*Aorta compressa, cordis rotunditas.* 212.  
 — eius aneurysma. 219.  
*Apoplexia ex epilepsia cur, & quando.* 23. 24.  
 — epileptica ex animi passionibus. 41.  
 — ob vasorum thoracis interceptionem. 200.  
 — eius potior causa non est lymphæ in cerebri sinibus collecta. 20.  
 — a frigidis succis rarò procedit. 137.  
 — aliquando ob hemorrhoides suppressas. 142.  
 — rarò præhendit absque prævijs signis, & quæ sint. 48.  
 — inter morbos huius constitutionis. 43.  
 — hac correpti, vid. præfocati.  
 — in senibus quâdo inuincibilis. 47.  
 — pulmonum mortifera. 65.  
*Apoplexiæ præseruatio Romæ.* 101.  
 — eius curatio quibus remedijs tractanda. 134.  
 — non semper calefacientibus. 136.  
 — per inediam curata apud Hippocratem. 48.  
*Aphonis sublingualium incisio prodest.* 129.  
 — eius rei experimentum. 140.  
*Aquea utilia in spasms hypochondriorum.* 99.  
 — in salinis pectoris congestionibus. 100. 103.  
*Arcanorum abusus in medicina.* 31. 32.  
*Aristoteles de Vita obscure sensit.* 2.  
*Ars Naturæ opera imitatur.* 3.  
*Ars sutoria, vide sutoria.*  
*Arteriæ carotides vid. carotides.*  
*Articuli pulmonum vid. pulmonum.*  
*Artifices sedentarij cur rarò consenscant.* 224.
- Artuum sphacelatorum amputatio quandoque subito interficit.* 41.  
*Aspera arteria, vid. tracheæ.*  
*Asthma conuulsuum quando mortiferum.* 68.  
*Athletæ quomodo, & quando repentinis mortibus corripiantur.* 78.  
 — quomodo a subita nece præseruandi. 90.  
 — his quando imperanda exercitatio. 91.  
 — iisdem stomachus validus obest. ib.  
*Audacia, vide timoris.*  
*Auri tinctura absque menstruo corrosiuo laudatur.* 137.  
*Auster, & Aquilo noxij ex Hip.* 116.  
 — ille Romæ deterior. ibid.  
*Autumnale æquinoctium pbthysicis mortiferum.* 80.

## B

- B** *Aglius laudatus.* 216.  
**B** *Balnea aquæ dulcis in calida paralyti.* 154.  
*Balneum frigidum post corporis calefactionem repentinæ mortis causa.* 19. 20.  
 — eius usus in spasms a materia subtili. 99.  
*Bernabeus Phisicus nominatus.* 128.  
*Bernardini Medici mentio.* 141.  
*Biliarie vesicæ pus, & vlcera in caduere obseruata.* 177.  
 — mala ab his producta. 180.  
*Bilis vitia multorum pectoris morborum radix.* 184.  
*Bonum nullum in terris absque mixtura mali.* 125.  
*Brutorum mors repentina quandoque ex causis vniuersalibus.* 111.

## C

**C**adauerum frequens sectio magna utilitatis. 77.  
 — quales internæ lesiones, inueniende sint cautè a Medicis prædicende. 179.  
 Cadauerum fætor signum mortis certissimum. 54.  
 Calcis effluuia nocua. 149.  
 Camphorata in spasmo pectoris. 100.  
 Capitis vulnera, vid. vulnera.  
 — leuis contusio &c. sæpè funesta, & cur. 34.  
 Carbonum fumus, vid. fumus.  
 Cardica in spasmis pectoris quomodo vsurpanda. 100.  
 Cardiogmos quando mortem repentinam portendat etiam ex Hipp. 74.  
 — rationes adducuntur. ibid. & seq.  
 Carotides ad explorandum superstitem pulsus cur aptiores. 59.  
 Catarrhus suffocatiuus. 65. & seq.  
 Cause subitanæ mortis quot, & quales. a pag. 13. vsq; ad 42.  
 — semper cum tempore operantur. 13.  
 Cerebri structura, eiusque viarum libertas ad vitam necessaria. 33.  
 Cerebrum per neruos cor, & thora- cem mouet, & vicissim mouetur. 4.  
 — est vnum ex tribus solidis maioris vsus. 14.  
 — eius hemispheria an e directo corporis partibus respondeant. 169.  
 — per decussim respondere probatur. 170. & seq.  
 — horum subita, & constans læsio mortem repentinam accersit. ibid.  
 — eius lentæ congestiones repentiè tandem ingulant. 35.

— corticalis substantia polypea. 37.  
 — vasorum turgentia quomodo dignoscatur. 154.  
 — spasmum quænam indicent. 211.  
 — eius, & cordis læsio respiratio- nis causa, & contra. 44.  
 — eodem conuulso, serum in eius sinubus tanquã effectus reperitur. 20.  
 Chalybeata, vide Martialia.  
 Chocolata pro causa grassantis repenti- næ mortis perperam adducta. 113.  
 — est probi nutrimenti. 119.  
 Ciborum indigentia, vide indigentia.  
 Circulatio in præcordijs duplici ex Cau- sa intercepta. 201.  
 Circulationis in cerebro inequalitas ob sanguinis vitium. 157.  
 — ab Hipp. indicatur. 158.  
 Coffè potus in congestionum cura. 103.  
 Congestionum curatio Medicum exigit omninò prudentem. 102.  
 Conuulsio vasorum quomodo contin- gat. 203.  
 — eius causa experimentis roboratur. 213.  
 Conuulsiones pertinaces ad subitam mortem sunt viæ. 96.  
 — ipsarum curatio extrè parosys- mum. 152.  
 Cor suis vasis est vnum ex tribus soli- dis maioris vsus. 14.  
 Cordis congrua structura ad vitam ne- cessaria. 28.  
 — etiam systole, & diastole, 30.  
 — eius, & vasorum vis circum- pulsua rationem habet ad determi- natam sanguinis molem, & grauita- tem. 20.  
 — eadem a structura, fluidisque nerueo, & sanguineo pendet. 28.  
 — ideo ab istorum fluidorum defe- ctu, aut vitio labefactatur. ibid.  
 — conuulsio, obstructio &c. mortis  
 caus.

- causa* . 29.  
 — *morsus a vermibus* . ibid.  
 — *dolor pertinax in senibus exi-*  
*tialis* . 31. 74.  
 — *huius rei ratio* . 75.  
 — *an in pectoris conuulsionibus*  
*cor compatiatur maxime obseruan-*  
*dum* . 100.  
*Cordis motus in pseudo-mortuis qui-*  
*nam* . 54.  
 — *sepultus quid indicet* . 56.  
 — *in pseudo-mortuis quomodo per-*  
*quirendus* . 58.  
 — *paralysis futuræ indicia* . 72.  
 — *palpitatio qualis plus, minus per-*  
*niciosa* . 73.  
 — *eadem cum sterni dolore sepul-*  
*to* . 218.  
 — *cum vertigine vndè* . 224.  
 — *prodest urina stranguriosa* . ibid.  
*Cordis sarcomata in semilunaribus val-*  
*vulis* . 162.  
 — *vitia diuersa ab Authoribus no-*  
*tata* . 166.  
 — *ingens amplitudo* . 178.  
 — *a Marchetto etiam inuenta* . 195.  
 — *magni, & prolabentis supra*  
*diaphragma symptomata* . 185.  
 — *eius rigiditas in cadauere* . 209.  
 — *immobilitas ex aortæ compres-*  
*sione* . 212.  
 — *idem cor inuentum inter duo*  
*aneurysmata* . 225.  
*Cornacchini pulueris vsus in subitaneis*  
*morbis* . 147.  
*Corpora repentinæ morti subiecta mul-*  
*tipliciter consideranda* . 84.  
 — *bene nutrita phlebotomiam cur*  
*feliciter fuerint experta* . 129.  
*Corporum varia dispositio aeri noxio*  
*diuersimodè resistit* . 17.  
 — *post eorum excalesfactionem fri-*  
*gidæ potus, & balneum cur lethi-*  
*fera* . 19. 20.  
*Corrosio lenta sanguiferorum valetudi-*  
*narios sæpè detinet* . 96.  
*Corrosionem magnorum vasorum que-*  
*nam præcedant* . 11.  
*Corticis peruiani vsus in præserua-*  
*tione a spasmo* . 100.  
 — *cerebri pars dextera flacida re-*  
*perta in quodam cadauere* . 160.  
*Cranij foramen, vide foramen* .  
*Cranio desquamato, cerebrum facilè*  
*afficitur* . 184.  
*Crisis suppressa, vbi subitam mortem*  
*presagiat* . 79.  
*Cursorum præcordia cur facilè labefa-*  
*ctentur* . 189.  
*Cyatus supra Xiphidem positus ad*  
*explorandum an verè quis mor-*  
*tuus* . 57.

## D

- D** *Ecotiones vulnerariæ, vide*  
*vulnera* .  
 — *exiccantes dictæ in apoplecticis*  
*sæpè noxiæ* . 137.  
*Deliquia animi, vide animi deliq;*  
*Diabeticorum renes flaccidi, ac du-*  
*tiles* . 214.  
*Diaphragmatis vulnera, vide vulne-*  
*ra septi &c.*  
 — *lesio tussim siccam excitat* . 36.  
 — *qualis motus in pseudo-mor-*  
*tuis* . 56.  
 — *idem quomodo perquirendus, vi-*  
*ve cyatus* .  
*Dieta athletis necessaria* . 90.  
 — *exiccans obesitas iungenda* . 93.  
 — *præseruatiua in aneurysmatibus*  
*ex Hipp.* . 97.  
 — *cur in his tantopere commende-*  
*tur* . 98.  
*in*

- in Epilepsia idiopathica 101. & seqq.  
 — pro præseruatione a subito interitu . 105.  
 Diætæ animi tranquillitas iungenda ex diuino Oraculo . ibid.  
 Diluentia temperata ab Hipp. quandoque laudata . 136.  
 Disruptio vasorum non a solis externis causis excitari potest contra Laurentium . 227.  
 Diuites a mortibus repentinis præ pauperibus cur feliciùs euaserint . 119.  
 Dolores diuturni circa cor &c. quid indicent . 11.  
 — interni pectoris quinam lethales . 66.  
 — laterales quosnam morbos arguant . ibid.  
 — in spasmodicis affectibus quid admittant . 100.  
 — vagi externarum partium quando lethales . 150.  
 Doloris in syncipite , & oculo sinistro causa in opposito latere delitescēs . 37.  
 Ducie in spasms a tenui materia pendentibus . 99.  
 Dura matris morbosa contractio in caduere . 160.  
 — notabilis laxitas . 181.  
 — paralysis . 182.  
 tium constitutio . 121. & seqq.  
 Epilepsia cessante, cur interdum mortifera corripiat apoplexia . 24.  
 Epilepsia pertinax cur frequenter in apoplexiam transeat . ibid.  
 — quomodo contingat . 23.  
 — hac correpti ; qui repentè decedant . 85.  
 — in diopathica abstinendum a vino . ibid.  
 — in sympathica tam vomitus, quàm purgatio conuenit . 101.  
 Epileptica apoplexia , vide apoplexia &c.  
 Efferarum repulsio aliquando mortifera . 176.  
 Ethnicorum sententia de subita morte eligenda damnatur . 87.  
 Euacuationes suppressæ modò sunt signa , modò etiam subita mortis causa . 81.  
 — & contra . 82.  
 Exercitatio Athletis quando imperanda . 91.  
 — eius utilitas . 93.  
 Exercitium vehemens vasorum rupturam promouet . 97.  
 Experimenta Authoris de causis particularibus in singulis hoc anno morientibus . 113. & seqq.  
 Extispiciorũ utilitas, & cautela . 180.

## E

- E** Missarij oclusio sæpiùs subita mortis præludium . 81.  
 — dum viget est medela . 84.  
 Emplastica in spasms a subtili materia ortis . 99.  
 Emulsiones in spasms pectoris . 100.  
 Epicratica purgatio , vide purgatio .  
 Epidemica non fuit præsens morien-

## F

- F** Acies in Aegrotis iuxta cordis affectiones variè coloratur . 216.  
 — cadauerum sæpè Medicos erudit . 177.  
 Facultas pulsua ad Vitam necessaria . 28.  
 Febris quando subitam mortem posset auertere . 182.  
 Fer-

*Ferramenta ignita pedum plantis admota in forti apoplexia.* 134.  
*Fibræ tendineæ, vide tendineæ.*  
*Fistulis ani occlusis mors repentina quando.* 81.  
*Fluida, & solida maioris vsus animalium perfectorum Vitam constituent.* 3.  
 — *qualia sint.* 14.  
*Fluxilitas summa sanguinis in cadavere.* 208.  
 — *rardò inuenitur.* 211.  
 — *cur acciderit in nostro casu.* 212.  
*Fœminæ in hac mortifera constitutione maribus feliciores,* 119.  
 — *rationes adducuntur.* 120.  
*Fonticulorum occlusio sæpiùs mortis signum, quàm causa.* 81.  
*Fonticulus utiliter excitatus.* 175.  
*Foramen cranio forsan innatum.* 178.  
 — *quomodo infirmandæ duræ matri contulerit.* 183.  
*Frigidæ potus quando, & quomodo subitæ necis causa.* 19. & seqq.  
*Frontis venarum incisio in presenti constitutione utilis.* 127.  
*Frumenti corrupti exhalationes cur pestifera.* 17.  
*Fumus carbonum aerem ad necem vsque inquinat.* *ibid.*  
 — *ex eodem trachæ color vitiat.* 195.  
*Funerum opparatus tardi cur inuenti.* 52.  
*Fungi Melitensis vis vulneraria.* 99.

## G

**G** *Attuccius Physicus allegatus* 155.  
*Gaudio subito percussæ cur interdum repenti concidant.* 19.

*Glandula scirrhusa sub cerebello cur subitam mortem ascuerit.* 39.  
*Glandularum racemi ad sinus duræ matris obseruati.* 160.  
*Glandulæ vberius liquida secernentes cur euadant graciliores, & è conuerso.* 171.  
*Graciles cur rariùs repenti moriantur.* 79.  
*Gummosa in phlegmaticis congestionibus curandis.* 103.

## H

**H** *Hæmorrhagia quando sit subitæ necis præsagium.* 77.  
 — *larga in quodam sene utilis.* 132.  
*Hæmorrhoides senum suppressæ aliquando subitæ mortis præludiù.* 80.  
 — *ijsdem restitantes fortis apoplexia.* 142.  
 — *arte reuocatis morbi solutio.* 143.  
*Hemisphæria cerebri, vide cerebri & c.*  
*Hepatis tumor folliculatus tussim siccam excitabat.* 36.  
 — *abscessus post interimentia capitulis vulnera.* 86.  
*Herbarum epicerausticarum vsus.* 103.  
*Hirudines naribus quando applicandæ.* 154.  
*Hispanicum vinù septentrionalis ventus glaciât.* 17.  
*Homo grauiùs, & frequentius ægrotat, quàm bruta.* 87.  
*Hydatis insignis in pia meninge.* 38.  
*Hydrops pectoris repentinus cur aliquando ex tempore perimat.* 26.  
 — *ex causæ ligatura ortus.* 203.  
*Hypochondriorum succi præcordijs, & cerebro sæpè mortiferi.* 20.  
 — *qua via ad has partes ferantur.*

tur. 144. 151. 204.  
 — conuulsiones eliminantia. 99.  
 — tensioni quomodo succurrendum. 151.  
 Hystericis paroxysmis solum tempus  
 quandoque medetur. 48. & seqq.

## I

**I** Ntemperantes &c. in presenti con-  
 stitutione repente sublatis. 114. 120  
 Inuincibiles repentinæ mortis causæ  
 quales. 46.  
 Iudicium cautela aduersus simulatos  
 mortuos. 51.  
 Iugularium incisio in hac constitutione  
 cur proficua. 128.  
 — cerebri, & præcordiorum mor-  
 bos leuat. 129.  
 Iuris longi vsus. 136.

## L

**L** Actis vsus in spasms a tenui ma-  
 teria. 99.  
 Lamella ossea in aneurysmate. 219.  
 Laminae ignitæ pedibus admotæ in for-  
 ti apoplexia vtilis. 135.  
 Lana naribus admota ad dignoscen-  
 dum an quis mortuus. 56.  
 Latex a cadaveris pulmone compresso  
 manans. 199.  
 Latinus Physicus carcerum. 176.  
 Liquida quædam morbosa per secerni-  
 cula naturalia ægrè secedunt. 145.  
 Liquidi impetus, vide impetus.  
 Liquidorum magna vitia solidis exitia-  
 lia, & contrà. 45.  
 Loquela post raninas incisas restitu-  
 ta. 141.  
 Lympha in thorace aut cerebro collecta

non semper morbi, aut mortis cau-  
 sa. 20.  
 Lymphatica piæ matris varicosa. 36.  
 Lymphaticorum internorum ruptura  
 quomodo præcauenda. 98. & seq.  
 Lymphæ congestio in spasms pectoris  
 quibus auertenda. 100.  
 — concrefcentis causa ex Chymi-  
 cis. 194.

## M

**M** Ala, quæ mortem præcedunt  
 diligenter inuestiganda. 179.  
 Manfredus inter Romanos Medicos,  
 laudatur. 141.  
 Mares in hac cõstitutione fæminis de-  
 terius habuerunt. 119.  
 Marmotana, vide muris montani.  
 Marsialia in præseruatione a spasms  
 ex materia viscida. 100.  
 Mechanicam in Medicina primus in-  
 uexit Hippocrates. 3.  
 Medici spes in hystericis paroxysmis  
 qualis. 49.  
 — prudentia, & fama in scientia  
 prædicendi. 61. 86.  
 — ingens labor in curandis solidor-  
 um morbis. 154.  
 — cautela in prædicendis internis  
 cadauerum lesionibus. 179.  
 Medico-astronomicæ, vide obseruationes  
 Medicus in diuinando sit peritus ex  
 Hippocrate. 84.  
 Meningum, & corticis cerebri motus  
 ad Vitam necessarius. 33.  
 — ex horum constanti lesione mors  
 citissima. ibid.  
 — compressis nervis ad has partes  
 tendentibus idem euenit. 39.  
 — conuulsio in epilepsia idiopathica  
 duplici de causa contingit. 23.

- motus multipliciter ablati. 40.  
 — abscessus polypeus. 37.  
 Menti, & sensibus non omnia innotescunt. 54.  
 Mistichellus Physicus laudatus. 134.  
 Morbi externi diuturni cur valetudinarijs sæpè proficui. 103. & seqq.  
 — ex loco tantùm differunt. 144.  
 — ipsorum occasiones perpendendæ ex Hipp. 155.  
 Mors quid sit. 8.  
 — eius diuisio, & natura. 9.  
 — etsi indiuidua in plures tamen vulgò distinguitur. 5.  
 — variæ eius species multipliciter considerandæ. 6.  
 — eius varia discrimina Moralitatis ad corrigendos mores hominum vtilia. ibid.  
 — inopinata a probis Viris non exoptanda. 88.  
 — naturalis accidit decreptis æquè ac iuuenibus languidis. 9.  
 — subita ex obstructione, [compressione & c. cordis, & vasorum. 29.  
 — quibus potissimùm accidat. 64.  
 — quælibet est repentina, & cur. 5.  
 Mortis idea ex Vitæ notione desumenda. 1.  
 — differentie vndè petendæ. 7.  
 — sunt duplicis generis. 14.  
 — causæ in repentina semper cum tempore operantur. 13.  
 — occasiones sæpè confunduntur cū causis, vide occasiones.  
 — signum certissimum, [vide fætor.  
 Mortui simulati quomodo dignoscantur 50.  
 — repentiè tardiùs sepeliendi. 53.  
 Mortuus a pseudo-mortuo quomodo distinguendus. 55. & seqq.  
 Motus non vitales aliquando etiam in mortuis. 58.

— cordis in pseudo-mortuis, vide cordis & c.

Muris montani adeps ad paralysim 140. & seqq.

Mumiata in spasms præcordiorum, quomodo vsurpanda. 101.

## N

- N** Arcoticorum vsus in spasms cum dolore. 99.  
 Nasi mucus suppressus a calcis effluvijs. 147.  
 — cruenta ab eodem filamenta pendentia interceptionis vasorum sunt indicia. 203.  
 — venæ apertæ vtilis in hac constitutione. 127.  
 — eidem [hirudines quando applicandæ. 154.  
 Nervus succus vnum ex tribus fluidis maioris vsus. 14.  
 Negligentia quandoq; superantur morbi. 46.  
 Nervis propè iugulum ligatis, mors in cane ex Valsalua. 40.  
 Nervorum discontinuatio cum cerebro insuperabilis causa repentinæ mortis. 47.  
 — liquidi motus in pseudo-mortuis qualis. 54.  
 — motiones sopitas excitantia. 60.  
 — opticorum compress: vide optic.  
 Nobiles huius constitutionis vim rari subierunt. 118.  
 — contrarium accidit Leidensibus teste Sylvio. ibid.  
 Nuccarinus Fulginei Physicus commendatus. 36.



- O** *Befis* repentina totalis vasorum  
intrà cranium obstruētio faci-  
lis. 39.  
— cur præ gracilibus mors accidat  
improvisa. 79.  
— præseruatina remedia qualia. 93.  
*Observationes Medico-astronomicæ* uti-  
les ad prædicendum. 85.  
*Occasiones* aliquando confunduntur cū  
causis subitæ mortis. 13.  
*Odoramenta venefica* aerem pestiferum  
reddunt. 17.  
*Oleosa* cum fluidis exhibita a quibus  
spasms præseruant. 100.  
— in spasms pectoris cum lymphæ  
congestione. ibid.  
*Omenti loco nigra membrana* in cada-  
uere inuenta. 161.  
*Opij vsti vis vulneraria.* 99.  
*Opticorum neruorum compressionem*  
quanam indicent. 85.  
*Ordo anima disciplinarum.* 83.  
*Oris ventriculi morsus a vermibus.* 29.  
— collutiones ex dissoluentibus uti-  
les in aphonis. 140.

## P

- P** *Acchionus Physicus* laudatus. 37  
*Palpitatio*, vide cordis & c.  
*Pancreatis mollities* excedens in cada-  
uere. 208.  
*Paralysis præcordiorum*, vide præcor-  
diorum & c.  
— cordis, & arteriarum 29. vide  
etiam cordis.  
— partium omnium intrà cranium  
181.  
— post syncopē & c. opportuna. 153.

- ex inæqualitate circulationis san-  
guinis. 158.  
— ex causa calida, curatio. 154.  
*Paregorica* in spasms pectoris quando  
conducant. 100.  
*Pasculus Physicus publicus Anatomes*  
*Professor.* 176.  
*Pauli Sacr. Pal. Ap. Medicus.* 176.  
*Pauperes*, vide *Diuites*.  
*Pectoris hydrops* repentinus, vide hy-  
drops.  
— dolores, vide dolores pectoris.  
*Penis est musculus.* 215.  
— rigidus in cadauere obseruatus  
208.  
— spuria erectio in cadauere quo-  
modo excitetur. 215.  
*Pericardij cum corde adhesio* quibus  
familiaris. 165.  
*Pericardium concreto sanguine* ple-  
num. 220.  
*Periculum mortis* quibus egris aperien-  
dum. 65.  
*Perspiratio* in agentibus sessilem Vi-  
tam, cur, & quibus in partibus  
minor habeatur. 92.  
*Pestes animalium particulares* vnde  
17. & seqq.  
*Philosophia experimentalis illustratur*  
etiam ijs, quæ successum non habue-  
runt. 7.  
*Phthysicis quale æquinoctium* magis  
lethale. 80.  
*Physicis mortium varia discrimina*  
quid suggerat. 6.  
*Piq matris lymphatica*, vide lymphat-  
tica.  
*Pierleonus Medicus allegatus.* 143.  
*Pillul. de succino Cratonis vsus.* 143.  
— de spuma chalyb. 101.  
*Placentius Medicorum Urbis senior* in  
authoritatem adductus. 113.  
— eiusdem mentio. 141. 155. 176.

*Pletthora nimia repentina mortis causa.* 19. & seq.  
 — *oritur sepè a stomacho valido.* 91  
*Podagra suppressa quinam morbi insurgant.* 37.  
*Pondus aeris ex fodinarum effluuijs maius.* 17.  
*Polypi acidis non alchalicis dissoluntur.* 206.  
 — *constructio in aneurysmate.* 219.  
*Præcordia in Cursoribus, vide Cursorum &c.*  
 — *ijisdem conuulsis seri effusio intrâ thoracem.* 20.  
*Præcordiorum labes a liene communicata.* 201.  
 — *aneurysmata, vide aneurysmata &c.*  
 — *paralysis mortem infert insensilem.* 11.  
 — *dilatatio morbosa principijs hydrometricis illustrata.* 191.  
 — *pertinax conuulsio postquam cessauerit cur nihilominus interdum mortifera.* 31.  
 — *spasmus quæ signa indicent.* 211.  
*Præfocati aliquando naturaliter rediuiui.* 46.  
*Præseruatiua methodus a subitaneis mortibus.* 90. vsque ad 105.  
 — *ex Christi Oraculo vera in tranquillitate, & sobrietate.* 105.  
*Prolabentis Cordis supra diaphragma modus mechanicus exponitur.* 189.  
 — *cûr in isto casu palpitatio post cibum succedat.* 190.  
*Prolapsus cordis quandoque hydropem mentitur.* 196.  
 — *symptomata ipsum concomitantia.* 185.  
*Prudentia summa est necessaria in Medicina.* 62.  
 — *quomodo aquiratur.* *ibid.*

*Pseudo mortui difficulter a mortuis distinguuntur.* 53.  
 — *quomodo tamen id assequimur* 55. & seq.  
 — *in bis centrum diaphragmatis solùm trepidat.* 54.  
 — *cordis motus in ijisdem qualis.* *ib.*  
*Puerperis mors repentina quando.* 80.  
*Pulmonica venæ, vide venæ &c.*  
*Pulmonum adhesio cum costis.* 198.  
 — *aliquibus fortè naturalis.* 205.  
 — *latex ab ipsorum superficie manans.* 199.  
 — *rigiditas in cadauere.* 209.  
 — *apoplexia mortifera.* 65.  
 — *eorundem articularum conuulsio.* 66.  
 — *quosnam repentè interimat.* 67.  
 — *ex ea quinam diutiùs seruentur.* *ibid.* & seqq.  
*Pulsus in carpis deficiens non semper cordis motus cessatione testatur.* 59.  
 — *intermittens non semper funestus.* 71.  
 — *Authoris experimento comprobatur.* 72.  
 — *tardus quando exitialis.* *ibid.*  
 — *aliquando ob tangentis incuriam mortuis attribui potest.* 60.

## Q

**Q** *Vercet. antepilepticum medicamentum laudatur.* 154.

## R

**R** *Aninis incisus, vide loquela.*  
*Realis Sac. Pal. Apost. Medicus.* 176.  
*Remedia mixta quando vsurpata.* 103.  
*Re.*

- Repentè mortui tardè sepeliendi . 53.  
 — quo morbo laborauerint maximè  
 sciendum . 173.  
 Repentinæ mortis idea . 11.  
 — species rara etiam ex Lauren-  
 tio . 226.  
 — cause sunt duplicis generis . 14.  
 — semper cum tempore operari so-  
 lent . 13.  
 — non omnes inuincibiles . 46. 48.  
 — vincibiles ex medentium auda-  
 cia, & naturæ vi quales . 48.  
 — eadem mors a magna sanguinis  
 diminutione . 19.  
 — ex pertinaci eiusdem mora, aut  
 impetu in præcordijs, & cerebro. ib.  
 — ob spiritum spontè cohibitum. 27.  
 — exesis parietibus cordis, & san-  
 guiferorum . 28.  
 — quomodo ex inflicto pugno sub  
 Xiphoide . 30.  
 — inhibito spirituum animalium  
 influxu ad præcordia . 34.  
 — a leui capitis contusione &c. ib.  
 — cur in his præcedat rigor . ibid.  
 — quomodo ex sternutatione con-  
 tingat . ibid.  
 — ex lentis in cerebro congestioni-  
 bus . 105.  
 — compressis &c. nervis etiam ex-  
 tra cranium . 39. & seqq.  
 — aeris, ac instrumentorum respi-  
 rationis vitio . 43.  
 — ob triplicem contemporaneum  
 morbum . 45. 216. & seqq.  
 Repentina mors quandoque grassatur  
 in homines, & bruta, ex causis uni-  
 versalibus . 111.  
 — eiusdem causa in præsentì consti-  
 tutione non uniuersalis, sed parti-  
 cularis fuit . 112.  
 — idcirco non unicum signorum  
 genus præiuit . 120.
- cum ab uniuersali causa produ-  
 citur eadè semper signa adsunt. 121.  
 — ea grassante, ceteri morbi, &  
 mortes, Romæ minùs frequentes. 123  
 — & contra . 125.  
 De Rubels Medicus nominatus. 143.

## S

- S** Alis vrinosi vim ad dissoluendum  
 sanguinem . 213.  
 Salsæ infusio in paralyti utilis. 140. 143.  
 Sanguis unum ex fluidis maioris vsus .  
 14.  
 — instar aquæ hydraulica machi-  
 na mouetur, & mouet . 3.  
 — quadrupliciter fit causa mortis  
 repentinæ . 19.  
 — intrà compressam arteriam vio-  
 lenter trusus cunei, & vectis po-  
 tentiam induit . 191. & seqq.  
 Sanguinis impetus aut mora pertinax  
 vbi mortis repentinæ causa . 19.  
 — fluxus ad cerebrum interceptus  
 subito interficit . 21.  
 — missio parca in principio aneu-  
 rysmatum laudatur . 97.  
 — item in morbis capitis cum ple-  
 nitudine . 101.  
 — in hac constitutione profuit ex sy-  
 derata etiam parte, & cur . 127.  
 — ex iugularibus, & sublingua-  
 libus . 128. & seqq.  
 — tollit vasorum interceptionem  
 130.  
 — Romæ non semper prodest .  
 130. & seqq.  
 — quando omittenda . 148.  
 Sanguinis coagulatio lacti coacto assi-  
 milatur ab Hipp. 117.  
 — hanc serositatum exundatio con-  
 sequitur . ibid.  
 mer.

- morboſa penetratio ad cerebri medullam unde. 215.  
 — fluxilitas, vide fluxilitas.  
 Sarcomata cordis, vide cordis &c.  
 Saxus Phyiſicus Allegatus. 155.  
 Secernicul. natural. vide liquida.  
 Senes ſyderationibus ſunt ſubieſti. 83.  
 — quando facilè euadant apopleſtici. 75.  
 Senſibus, & menti non omnia innoſcunt, vide menti.  
 Senum tuſſis, vide tuſſis.  
 — dolor cordis, vide cordis.  
 — hæmorrhoides, vide hæmorrhoides.  
 — iſdem benè nutritis phleboto- mia, ſalutaris. 132.  
 Septi tranſuerſi vulnera, vide vulnera thorac.  
 Septentrionalis ventus mortifer, vimumque hispanicum congelians. 17.  
 Sepulchrorum exalationes cur exitiales. ibid.  
 Serum lactis quibus ſpasmis conferrat. 99.  
 — cum infuſione radicis china vbi uſurpandum. 104.  
 Setonis uſus. 154.  
 Simoncellus publ. Anat. Miniſter. 117.  
 Sincipitis ſiniſtri dolor, vide dolor.  
 Sinibaldus Protomedicus laudatus. 132. 155. 176.  
 Sinifter cordis ſinus duplò maior dextero. 187.  
 — cur ſanguinis motus per hunc tardior fuerit. 192. & ſeq.  
 Sobrietas Vitæ protrahendæ fundamentum. 93.  
 — aneurysmaticis (maximè con- ducit. 97.  
 Solida, & fluida maioris uſus quomodo animalium perfectorum Vitam conſtituant. 3.  
 — utraq; ſunt tria. 14.  
 — ad interitum mutuò conſpirant. 25.  
 — eadem ſtructura, vel motu pertinaciter læſa ſunt mortis repentinæ cauſa. 26.  
 — ipſorum vitia fluidis exitialia, & contrà. 45.  
 Solidorum morbi difficilis ſunt curationis. 154.  
 Solſtitia apoplexiarum feracia. 84.  
 Spasmi pectoris quomodo ſint tractandi. 100.  
 Spasms a materia ſubtili productis quomodo ſuccurrendum. 99.  
 — a materia viſcida aliter tractandi. 100.  
 Spasmus uniuerſalis a meningibus. 212.  
 Sphacelati artus, vide artuum.  
 Spiritus in homines ſumma neceſſitas. 26.  
 — ſpontè cohibitus ſubitæ mortis cauſa. 27.  
 Spiritus dictus vitæ quid, eiſque uſus. 140.  
 Spirituum defectus mortalis ex varijs cauſis. 21.  
 — copia quomodo exitialis. 22.  
 — item acrimonia. ibid.  
 — vitium ab aere hauſtum. 24.  
 — animalium deſcenſus ad præcordia inhibitus ſubitæ, mortis cauſa. 34.  
 Sterni dolor ſepultus &c. 218.  
 — pars dextera elatior inuēta. 119.  
 Sternuentibus mors ſubita. 34.  
 — mos præcandi ſalutem unde. 35.  
 Sternutatoria acria pro ſepulta reſpiratione excitanda. 56.  
 Stibiata in thoracis ſpasmis quando conueniant. 101.  
 — in curatione phlegmaticarum congeſtionum. 103.  
 ſti-

*Stibij diaph: vsus ad aphoniam vtilis.* 140.  
*Stomachus validus cur interdum plethoricis infensus.* 91.  
 — *debilis quomodo ad protrahendam vitam conferat.* 99.  
 — *ad eius languorem ius appropriatum.* 147.  
*Succinata in thoracis spasms.* 100.  
*Suffocatio inter morbos huius constitutionis.* 43.  
*Sulphurata in spasms pectoris.* 100.  
*Sutoria ars in firmandis precordiorum partibus conducit.* 223.  
*Syderationis origo interdum a corde eiusque vasis.* 217.  
 — *nomine quid comprehendat Hippocrates.* *ibid.*  
*Syncope ex cordis, & arteriarum paralysis.* 29.  
 — *morbus huius constitutionis.* 43.  
 — *hac correpti, vide presocati.*  
 — *ab erosione &c. est inuincibilis.* 47.  
 — *eiusdem recursus.* 151.  
 — *vitio valvularum cordis observata.* 168.  
*Syncope lethalem ex obstructione &c. quenam precedant.* 11.  
*Syncopis particularis mortiferae causa mixta.* 182.  
 — *periculum detractum.* 153.

## T

**T** *Abaci vsus non fuit in causa grassantium repentinorum mortium.* 112.  
*Tabidis &c. cordis cum pericardio adhesio familiaris.* 165.  
*Taciturnitas quid indicet.* 152. 154.  
*Temperati mortem repentinam hoc an-*

*no non subierunt.* 118.  
*Tendineae fibrae pulmones costis colligantes.* 198.  
*Terrae motus pro causa huius mortiferae constitutionis falso accusatur.* 113.  
*The in congestionibus curandis.* 103.  
*Thomassinus Protho Medicus allegatus.* 176.  
*Thoracis vasis interceptis, apoplexia succedit ex Mart. & Fracass.* 200.  
*Therebentinata in spasms pectoris cum lymphae congestionem.* 100.  
 — *in curatione congestionum.* 103.  
*Thoracis vulnera, vide vulnera thoracis.*  
 — *in spasms quid observandum.* 100.  
*Timidi quomodo a subita nece precauendi.* 94.  
 — *subito percussi interdum repente concidunt.* 19. 20.  
 — *ipsorum cerebri constitutio qualis.* *ibid.*  
 — *phlebotomia quando conveniat.* *ibid.*  
*Timoris, & audaciae causa in solidis partibus.* 76.  
*Tracheae vitio subita mors varie contingit.* 26.  
 — *color fulgineus, vide fulgineus.*  
*Trullus Physicus laudatus.* 37. 147.  
*Tuberculo apparente ad exteriora pectoris, & cerebri, quorundam symptomatum alleviatio.* 155.  
*Tuberculum pulmonis sepultum quomodo dignoscatur.* 66.  
 — *de ipso quando dubitandum.* 100.  
*Tussis sicca ex diaphragmatis labe.* 36.  
 — *cum foetore quid indicet.* 67.  
 — *diurnae humidae in siccam conversio in senibus exitialis.* 65.  
 — *suffocativa quomodo.* *ibid.*

## V

- V** *valetudinarij alij interiùs, alij  
exteriùs agrotant.* 95.  
 — *triplex affectionum genus eos ad  
subitam necem disponit.* 96.  
 — *quomodo ab eadem præseruan-  
di.* 104.  
 — *in præfenti constitutione subito  
periere.* 114.  
*Valetudinarijs diuturni morbi externi  
sæpè conferunt.* 103.  
 — *mors subita fuit Romæ instar ma-  
le crisis.* 114.  
*Valsalua Anatomicus Bonon. lauda-  
tur.* 157. 169.  
 — *eiusdem experimentum nobile.* 40  
*Valvularum semilunarium sarcomata*  
 162.  
 — *a nemine indicata.* 166.  
 — *productio quomodo euenerit.* 167.  
 — *ijsdem durantibus, quomodo pul-  
sus æqualis esse potuerit.* 168.  
 — *quomodo syncopem sollicitaue-  
rint.* *ibid.*  
*Varices in pulmone cadaueris.* 161.  
 — *pro aneurysmatibus accipit Hip-  
pocr.* 97.  
 — *internæ cognitæ difficiles.* 63.  
 — *lymphaticorum piæ matris.* 36.  
*Variolarum retrocessio quando morti-  
fera.* 80.  
*Vasorum magnorum corrosionem quid  
præcedat.* 11.  
 — *structura, & libertas ad vitam  
necessaria.* 28.  
 — *conuulsio, compressio &c. mor-  
tis causæ.* 29.  
 — *interceptio, vide interceptio.*  
 — *dehiscentia in ascite.* 205.  
 — *disruptio, vide disruptio.*  
*Vasorum, & cordis vis pulsua deter-  
minatæ moli, & grauitati sangui-  
nis proportionalis.* 20.  
*Venæ pulmonicæ dilatatæ indicia.* 66.  
 — *rupturam quænam præcedant.* 67  
*Venæ causæ ruptura.* 220.  
 — *corrosio quomodo inducta.* 224.  
*Venetijs olim repentinæ mortis grassa-  
tæ sunt.* 112.  
*Ventriculi vitia cerebro, & præcor-  
dijs communicata.* 20.  
*Ventus interdum mortiferus.* 17.  
*Venus in senibus perniciofa.* 22.  
*Vermium morsus quomodo mortem in-  
ferat.* 29.  
 — *in ipsorum suspitione quid agen-  
dum.* 100.  
*Vertigo tenebrososa.* 218.  
 — *cum palpitatione cordis undè.*  
 224.  
*Vesicantia sunt emissaria artificia-  
lia.* *ibid.*  
 — *ipsorum vsus, & utilitas.*  
 133. 143.  
 — *quid excitent.* 145.  
*Veternus larga hæmorrhagia in sen-  
sanatus.* 132.  
*Victus plenus vbi noxius.* 146.  
*Vini abstinentia Athletis necessaria.*  
 91.  
 — *itè in Epilepsia idiopathica.* 101.  
*Viperata in præcordiorû spasms quan-  
do præscribenda.* *ibid.*  
 — *valetudinarijs præseruadis.* 104.  
*Virium præceptus lapsus.* 225.  
*Vis mouens ad vitam necessaria.* 28.  
*Viscerum vigor confert ad morbos ad  
exteriora detrudendos, & cõtrà.* 157.  
*Vitæ notio veram mortis ideam exhi-  
bet.* 1.  
 — *de hac Aristoteles obscure scri-  
psit.* 2.  
 — *vniversalis conceptus undè.* *ib.*  
 — *tria sunt necessaria ex parte  
cordis*

*cordis, magnorum vasorum.* 28.  
*Vita in animalibus perfectis in quo consistat.* 3. & seqq.  
 — *longa ob sobrietatem.* 93.  
 — *sepulta in morientibus quomodo excitanda.* 59.  
*Vomica pulmonum, vide pulmonum.*  
*Vomitus in epilepsia sympathica excitandus.* 101.  
 — *quibus proficius.* 136.  
*Vrina tranguriosa in palpitatione salutaris.* 73.  
 — *quando dubia.* 152.  
*Vteri conuulsionum medela.* 99.  
*Vterus quomodo labem mortiferam in præcordia, & cerebrũ suffundat.* 20.  
*Vulnera circa ingulum cur lethalia.* 21

— *thoracis, & septi simul transuersi quænam, & cur perimant.* 27.  
 — *capitis subito enecantia, quæ* 85. & seqq.  
*Vulnerar. decoct. vsus in vasorum athonia.* 98.  
*Vulnus capitis profundum cur lethale.* 34.

## X

**X** *Iphoidis cartilaginis percussio cur aliquando mortifera.* 30.  
 — *mirabilis partium nexus sub ipsa delitescens.* *ibid.*  
 — *Cyathus eidem applicatus ad quid.* 57.

F I N I S.

Pag.	v.	ERRATA	CORRIGE
2	7	cofufionem	confufionem
20	I	dele dum	
20	ult.	circa cor	adde pulfus inæqualitates
23	16	inordinatæ	inordinati
113	5	cuculatæ	chocolatæ
129	27	cuculata	chocolatâ
158	28	die VI. Kal.	VII. Kal.
219	21	dele externam	
226	21	Æquite	Equite

---

*Cætera benignus Lector per se ipsum  
aut corrigat, aut excuset.*





