

證治準繩

四十


伍函

三 傷寒

陽明病
潮熱

胃實不大便
譫語
狂亂

不得卧
自汗
循衣摸牀



內閣文庫			
番號	漢	12971	
冊數	100 (40)		
函號	301	60	



傷寒證治準繩帙之三

金壇王肯堂輯 門人南昌張 緯校

陽明病 胃實不大便 自汗 不得卧 潮熱

譫語 狂亂 循衣摸牀 渴 嘔 乾嘔

黃陽明之為病胃家實是也謂之正陽陽明屬下證輕則大柴胡重則大小承氣此邪自陽明經傳入府者經曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿有潮熱者此欲解可攻裏也手足濇然汗出者此是大便已鞅也大承氣主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹滿不通者可與小承

氣湯微和胃氣勿令大泄下謂陽明亦有在經者未全入府猶宜解外縱有大滿大府不通亦不過小承氣微下之入胃在經猶宜兩審也其陽明一證少有自病多因太陽傳入兼與太陽陽明合病用葛根湯者是也少陽陽明合病用黃芩芍藥湯者是也自少陽傳入陽明及未合併病者亦然

汗

桂枝湯

麻黃湯

五苓散

此亦作汗劑

麻黃連軛赤小豆湯

吐

梔子豉湯

下

調胃承氣湯

大承氣湯

抵當湯

麻仁丸

茵陳蒿湯

小承氣湯

溫

吳茱萸湯

四逆湯

和解

白虎湯

白虎加人參湯

猪苓湯

小柴胡湯

蜜導煎

猪膽汁

土瓜根

梔子槩皮湯

刺

熱入血室刺期門

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也經曰太陽脾浮而瀉浮瀉則小便數浮瀉則

相搏大便則難其脾為熱者屬胃也調胃承氣湯主之正

陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃

中燥煩熱大便難是也宜小承氣湯微瀉之蓋少陽復

入太陽經酒洗入陽明經病之高下全在酒之多少以

引之耳又按太陽陽明正陽陽明承氣湯中不用酒浸也以此

推之則太陽陽明當用調胃承氣湯蓋以調胃承氣既

附在太陽篇中而大黃下註曰酒浸正陽陽明當用大

承氣其大黃註曰酒洗少陽陽明當用小承氣湯不惟

且當少少與之也書此以駁成氏之誤又須識太陽陽

明脾約在少陽陽明又可大柴問曰何緣得陽明病

答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥

因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也成本

病不解因發汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入

府轉屬陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便

不更衣則胃中物不得泄故為內實胃無傷寒脈浮

而緩手足自溫者是繫在太陰太陰者身當發黃若小

便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也

成浮為陽邪緩為脾脈傷寒脈浮緩太陰客熱邪在三

陽則手足熱邪在太陰則手足溫邪在少陰厥陰則手

陽則手足溫邪在少陰厥陰則手

足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸
 乏則色見於外當發身黃小便自利者熱不內蓄不能
 發黃至七八日大便鞭者即陽明病若能食名中風
 太陰之邪入府轉屬陽明也
 不能食名中寒成陽明病以飲食別受風寒者以胃為
 者能食寒為陰邪陰邪不殺穀故傷寒者不能食
 陽明病但頭眩不惡寒故
 能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛按目眩之眩
 玄謂其眼中黑暗也頭眩之眩當作若藥不瞑眩之眩
 訓之謂眩憤亂也謂其頭岑岑然憤亂而不寧也凡書
 皆當活看不可拘執成陽明病身不重痛但頭眩而不
 惡寒者陽明中風而風氣上攻也經曰陽明病若能食
 名中風風邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者胃之系欬甚
 則咽傷故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也
 胃氣主嘔肺氣主欬成氏以胃氣上逆則欬恐非
 蓋風邪侵肺也肺雖不為足經肺主氣風為氣類
 陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也

方字本大作

以其人本虛故攻其熱必噦成不能食胃中本寒攻其
 令噦也經曰關脈弱胃氣虛有熱不陽明病脈遲食
 可大攻之熱去則寒起此之謂也
 難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之
 腹滿如故所以然者脈遲故也成陽明病脈遲則邪方
 有寒食難用飽飽則微煩而頭眩者穀氣與寒氣相搏
 也寒熱相搏必小便難利者不能發黃言穀熱得泄也
 小便不利則穀氣醞釀成熱不得泄出身必發黃疸黃
 也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下之則愈脈
 遲為寒故雖下之祇益其寒腹滿陽明病欲解時從
 亦不減也經曰脈遲尚未可攻傷寒嘔多雖有陽明
 申至酉止成向旺時是為欲解
 證不可攻也見陽明病面合赤色不可攻之必發熱
 色黃小便不利也成合通也陽明病面色通赤者熱在
 傷寒易月病

白黃小便不利也... 證不可文也... 申至酉止... 小便不利... 大便難... 燥屎... 其人本虛... 其熱必... 燥屎... 燥屎... 燥屎...

胃實不大便

大便難

大便鞭

燥屎

成不大便大便難大便鞭燥屎悉屬裏證宜下者多矣... 然而有表未罷風濕相搏尤宜先解表已而下之可也... 如經曰傷寒不大便六七日頭疼有熱者小便清知不在裏仍在表是也... 無所復傳自太陽少陽傳入者衆所共知而於三陰傳入者鮮或能識若能熟視其微則三陰有急下之證多矣豈非仲景之微意歟... 胃實有表者先解表傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也須當發汗

傷寒胃實

失之

無太陽

有汗桂枝

若頭痛者必衄宜桂枝湯三時羌活湯成不大便六七

小便清者知裏無熱則不可下經曰小便數者大便必

者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭

痛不已為表不罷醫甚于經迫血妄行上為衄也○丹

謹按外證未解不可下下為逆今頭痛有熱宜解表反

與承氣正是責其妄下之過也故下文又言小便清者

知其無裏邪不當行承氣又繼之曰當須發汗曰頭痛

必衄血宜桂枝湯反覆告戒論意甚明而註反直曰故

當宜下想因六七日不大便爾雖不大便他無所

無汗表解然後攻之正仲景法也註意似未盡

明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯陽明病

脇下鞅滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解也陽

病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可下若脇下

鞅滿雖不大便而嘔舌上白胎者為邪未入府在表裏

之間與小柴胡湯以和之止焦得通則

嘔止津液得下則胃氣因和汗出而解

陽明中風

脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通

鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時

時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者

與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿

加噦者不治成脈浮大為陽風在表也弦則為陰風在

中而不通也若寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛

止此以風熱內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾

不得臥自汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而嗜臥者

風熱內攻不于表也一身及面目悉黃小便難有潮熱

時時噦者風熱攻胃也陽明之脈出天迎循頰車上

耳過客主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之

經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不解

傷寒胃實

若其脉但浮而不弦又無諸裏證者是邪但在表也可
與麻黃湯以發其汗若不尿腹滿加歲者關格之疾也
故云不治難經曰關格者不得盡其命而死

口苦咽乾脉浮緊宜和陽明中風口苦咽乾腹滿微喘

發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也發熱惡寒表未

解也而悞下之則亡陰無陰則陽無以化陽明腹滿

脉浮緊口苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身

重者忌發汗忌加燒針忌下論見陽明病脉浮而緊

者潮熱發作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖二尺之童亦知可下也殊不知

仲景之法雖有胃實證若表未解及有半表者亦先

用桂枝柴胡以解外然後視虛實消息之也

胃實表解無證者忌攻大便鞭者導之陽明病自汗出

若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當

須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜根及入猪

膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令

焦候可丸以手捻作挺子令頭銳大如指長二寸許

乘熱急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去

之又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和

湯藥胃實

攻之二

七

勻灌入穀道中如飯時頃大便自去

便鞭無所苦者俟之太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱

汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不

下者病人不惡寒而渴此轉屬陽明也小便數者大便

必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以

法救之渴者宜五苓散成太陽病脈浮陰弱邪在裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳經之邪入裏裏

不和者必嘔此不嘔但心下痞者醫下之早邪氣留於

心下也如其不下者必瀉不惡寒而渴太陽之邪轉屬

陽明也若吐若下若發汗後小便數大便鞭者當與小

承氣湯和之此不因吐下發汗後小便數大便鞭者當與小

便數少大便自出也渴欲飲水者少少與之以潤胃

氣但審邪氣所在以法救之如渴不止與五苓散是也

○張或問上條云小便數者大便必鞭不更衣十數日

無所苦也嘗有四五日六七日不大便者即為攻之今

言十日不更衣而不用攻伐何也曰此非結熱乃津液

不足雖十日不更衣亦無所苦也經曰陽明病本自汗

出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此大便必鞭

故也以亡津液胃中乾燥故令大便硬當問其小便日

幾行本小便三四行今日再行故知大便不久出為

者若有潮熱譫語可下之證者然後可以攻之其不大

便而無諸下證者此津液不足當須自審慎勿以日數

久而輒為陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚

微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥

故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行

今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當

還入胃中故知不久必大便也

胃實表解有證者隨證攻之陽明病潮熱不大便六七日恐有燥糞欲知之法少與小承氣湯轉失氣者有燥屎可攻若不轉失氣者無燥屎不可攻方論見潮熱陽明病汗出大便鞭而讞語者宜小承氣湯方見不大便腹滿者宜下之若但繞臍痛者則為燥屎宜承氣湯若心下至小腹滿痛者則為結胸宜陷胸湯論見陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯成註吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩則是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱○按陽明一證分為太陽陽正陽少陽三等而以調胃大小承氣下之者按本草曰大黃酒浸入太陽經酒洗入陽明經浸久於洗得酒氣為多故能引之於至高之分若物在山巔人迹不及必射以取之也故仲景以調胃承氣收入太陽門而大

黃下注曰酒浸及詳其用本湯二則曰少溫服二則曰當和胃氣與調胃承氣湯又詳本湯之證則曰不吐不下心煩者又發汗不解蒸蒸發熱又吐後腹脹滿是太陽陽明去表未遠其病在上不當攻下故宜緩劑以調和之也及至正陽陽明則若曰急下之與大承氣湯而大承氣湯中大黃下注曰酒洗是洗輕於浸微升其走下之性以治其中也至少陽陽明則去正陽而過太陰其分為下故小承氣湯中大黃不用酒制少陽不宜下故又曰少與曰微溲之勿令大泄下此仲景之妙法也東垣不審胃之二者乃仲景置調胃承氣於太陽篇太陽不宜下故又稱胃以別之却鍾成氏之謬以承氣治太陽脾約之證以調胃承氣治正陽陽明大承氣不能無辨小便不利大便乍難乍易有微熱喘冒不針者宜大承氣湯論見不傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯成諸脈皆屬于目傷寒六七日邪氣入裏之時目中不了了睛不和者邪熱內甚上

傷寒問答

卷之三

熏於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者表熱也身微熱者裏熱也對經曰熱病日不明熱不化者死此目中不了了睛不和則證近○趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之成跌陽者脾胃之脈診浮為陽知胃氣強濇於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱致小便數大便難與脾約丸通腸潤燥

麻仁丸方
麻子仁 貳升
芍藥 半斤
枳實 半斤
大黃 壹斤去皮
厚朴 壹尺去籠皮炙
杏仁 壹斤去尖別熬作脂
右六味為末煉蜜丸如桐子大飲服十九日三服漸

加以知為度

成內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易去聲其色必黑宜抵當湯主之方見畜血無表裏證下後脈數不解消穀易饑六七日不大便者有瘀血宜抵當湯

許有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澀神昏而睡診其脈長大而實予用承氣下之而愈一則陽明白汗大便不通小便利津

液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞
得澹利而解其家曰皆陽明不通何以治之異子曰
二證雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五藏為無
津液也然則傷寒大證相似兩證稍有不同宜子細
斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通
不相侔者於一時中有淺深故知不可不謹
便初鞭後澹仲景論中有四證內有二證不言小便
一證言小便不利一證言小便少其二證不言小便
者陽明病潮熱不大便六七日與小承氣湯不轉失
氣者此但初鞭後必澹不可攻之此胃中邪熱未作

實者也又太陽病下之心中懊懣而煩腹滿者初鞭
後必澹此虛煩熱在上胃中無燥屎者也其一證小
便不利者陽明病中寒不能食小便不利手足澀然
汗出此欲作痼瘕必大便初鞭後澹所以然者以胃
中水穀不別故也又一證言小便少者服承氣湯一
升若不大便六七日小便少者雖不能食但初鞭後
必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻
之是知仲景測大便法皆以小便覘之如小便清知
不在裏利不止者利其小便小便數少津液當還入
胃中必大便皆可驗者然小便利屎定鞭固為可攻

亦有小便自利大便鞭而不可攻者何哉陽明病自汗或發汗小便自利此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導蓋非裏實故不可攻也太陽病又一證云若吐若下若發汗微煩小便數大便鞭與小承氣湯和之此兩證汗後大便鞭小便利皆同而治法不同者後證為有傳邪故微煩又因發汗吐下後小便數內亡津液大便鞭是熱邪入裏故以小承氣利之至若前證小便自利以無傳邪故無煩證大便雖鞭不得為裏熱但腸頭乾燥止可用蜜導也讀仲景書者宜詳究焉

不得卧

不得眠陰陽皆有之正病於不得眠者陽明也若少陰當病於欲寐今乃不得眠緣陽氣入少陰經非少陰正病也有因汗下而然者有不因汗下而然者有因火逆而然者治見本條但不得眠皆為熱證其有太陽汗下之後晝日煩躁不得眠一證雖用乾薑附子湯蓋復其汗下所亡之陽非治其所感之寒病也不得眠為常證然少陰脈沉細自利煩躁不得眠者死傷寒發熱下利厥逆煩躁不得卧者亦死俱為正氣弱陽不能復故也活人云汗為火之液汗多則神昏故不眠大熱則神

不清故不眠大下則動血心主血故不眠瘥後熱氣未散陰氣未復故不眠

太陽病二三日不得卧但欲起心下必結脉微弱者此

有寒分也桂枝加厚朴杏子湯 傷寒脉浮以火劫之

驚狂起卧不得安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救

逆湯 下後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安靜不嘔

不渴無表證脉沉微身無大熱乾薑附子湯 衄家不

可汗汗則額上陷脉急緊直視不眴不得眠黃芩芍藥湯

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯 發汗

吐下後虛煩不得眠反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯

太陽病發汗後胃中乾燥不得眠欲飲水者少與之

則愈

陽明身熱目疼鼻乾不得卧尺寸脉俱長者陽明受病

也病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能

卧者有燥屎也宜大承氣湯 陽明病脉浮而緊咽燥

口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若加燒

針必怵惕煩躁不得眠梔子豉湯

少陰病欲寐二三日後心煩不得卧者黃連阿膠湯主

之
黃連阿膠湯方

傷寒不得卧
失之三

黃連 肆兩

黃芩 貳兩

芍藥 貳兩

阿膠 參兩

鷄子黃 貳枚

右五味以水五升先煮三物取二升去滓納膠烱盡小冷納鷄子黃攪令相得溫服七合日三服

成陽有餘以苦除之黃連黃芩之苦以除熱陰不足以甘補之鷄子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱也然服鷄子黃其病有不愈者今議加當歸人參茯苓白朮各等分與前藥四味服之立效

少陰病下利欲寐六七日後欬而嘔渴心煩不得眠者

宜豬苓湯論見下利少陰病但欲寐脈沉細不煩欲吐至

五六日自利復煩躁不得寐者死發熱下利厥逆煩

躁不得卧者死

吳大陽脈浮數身疼無汗煩躁不眠者宜汗之則愈

陽明標熱頭額痛目疼身熱鼻乾不得卧脈長者

宜葛根解肌湯汗之若自汗脈洪數表裏俱熱煩渴

舌燥飲水者白虎加人參湯主之若蒸蒸發熱大便

秘鞭者調胃承氣湯下之外有傷寒已解或因食復

劇煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯

主之若表裏大熱舌燥飲水者人參白虎湯合解毒

湯主之凡少陽發熱口苦心煩不得眠脈弦數者

小柴胡加黃連山梔子之類若虛弱人津液不足者

傷寒不得卧 失之三一

加麥門冬酸棗仁之類 太陽病發汗後不得眠脉浮數微熱煩渴小便不利者五苓散主之脉數大者宜人參白虎湯或竹葉石膏湯不可用五苓也 凡汗下後虛煩不得眠者加味温膽湯酸棗仁湯梔子烏梅湯朱砂安神丸之類選而用之

○附

酸棗仁湯治虛煩擾奔氣在胃中不得眠者

酸棗仁炒 人參 茯苓各壹錢半

桂心伍分 石膏貳錢半 知母

甘草各壹錢 生薑叁片

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓臨卧服
千金流水湯治虛煩不得眠

麥門冬去心 半夏 甘草

黃連 遠志 人參

葶藶以上各壹錢 茯苓 酸棗仁各壹錢半

桂心伍分 生薑叁片 米壹合

右用長流水二鍾半先煮米令蠶目沸以杓揚萬遍

取湯二鍾煎藥至一鍾去滓温服

加味温膽湯治太陽病後虛煩不得眠此膽寒也

半夏洗 酸棗仁炒各壹錢半 綠枳實

陳皮

甘草

人參

茯苓 貳錢

竹茹

生薑

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服若心煩內熱者倍

加黃連麥門冬若口燥舌乾者去半夏加麥門冬五

味子天花粉若有表熱未清加軟苗柴胡若內虛大

便自利者去枳實加白朮茯苓若內實心煩顛倒者

加山梔仁

酸棗湯治吐下後晝夜不得眠

酸棗仁

麥門冬

茯苓

當歸身

甘草

知母

川芎

乾薑

生薑

右煎法同前

梔子烏梅湯

梔子

黃芩

甘草

人參

麥門冬

柴胡

烏梅

生薑

竹葉

右煎法同前

黃連解毒湯治大熱乾嘔錯語呻吟不得眠

黃連

黃芩

黃蘗

梔子

少寒不得卧

十六

水二盞半煎至一盞半去滓分二服

黃連各半兩

黃芩各半兩

芍藥各半兩

白朮各半兩

人參各半兩

黃芩各半兩

甘草各半兩

川芎各半兩

黃芩各半兩

自汗附盜汗 頭汗 手足汗 無汗 不得汗

衛氣者護衛皮膚肥實腠理禁固津液不得妄泄邪氣
干之則不能衛固於外由是津液妄泄澌澌然潤熱熱
然出不因發散而自汗出也傷風則發熱自汗中暍則
汗出惡風而渴風濕甚者則汗多而濡是風與暑濕為
邪皆冷自汗惟寒邪傷榮而不傷衛是以膚腠閉密汗
不出也始雖無汗及傳入裏而為熱則榮衛通腠理開
亦令汗自出矣自汗又有表裏之別虛實之異若汗出
惡風及微惡寒者皆表未解宜發散至于漏不止而惡
風及發汗後惡寒者表虛也宜溫之此皆邪氣在表若

傷寒自汗

汗出不惡風寒者此表解裏病下之則愈如陽明發熱汗出此為熱越及陽明發熱汗多急下之者是也自汗雖常證或汗出髮潤如油如貫珠着身不流皆為不治必手足俱周徧身悉潤漉漉然一時汗出熱已身涼乃為佳兆

身熱汗出惡寒屬表病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯風則傷衛衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮膚是以常自汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛則愈○餘詳見前太陽病條 兼項強痛者桂枝加葛根

衛字本神作

湯項強兼骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子

湯論見風濕若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子

湯論見後條汗出而渴者五苓散 不渴者茯苓甘草湯

活人云傷風自汗桂枝湯難用須子細消息之假令

傷風自汗若脈浮而弱設當行桂枝服湯後無桂枝

脈息證候而煩者即不可再服也若傷風自汗出而

小便數者切不可與桂枝也又太陽病自汗四肢拘

急難以屈伸若小便難者可桂枝湯內加附子服之

若小便數者慎不可與桂枝附子湯宜服芍藥甘草

湯若誤行桂枝附子攻表便咽乾煩躁厥逆嘔吐作

傷寒自汗

秩之三

十六

甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸

趙有發汗漏風小便難與自汗小便數二證相近似溫仲景亦恐後人誤認故重出一章問答以明之前一證云太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝附子湯主之蓋是因邪發汗遂漏不止乃服汗藥太過非自汗也惡風者餘邪未盡也小便難四肢急為亡津液筋失所養也乃汗多亡陽外虛經氣病帶表邪不在裏也故宜附子溫經桂枝解表芍藥益血舒筋也此一證云蓋是脈浮

為虛也汗自出微惡寒者陽虛無以衛外也小便數為下焦虛寒不能制水也心煩為陰虛血少也脚攣急乃血為汗奪筋無以潤養也此初得病便自表裏俱虛外無陽證病不在表固不得與桂枝同法設若誤用桂枝攻表重發其汗是虛虛也固得之便厥咽乾煩躁吐逆厥為亡陽不能與陰相順接咽乾為津液寡煩躁吐逆為寒格而上也故宜乾薑以溫裏復陽甘草芍藥益其汗奪之血然後可以復陰陽不足之氣得脚伸後或謔語者由自汗小便數胃家先自津液乾少又服乾薑性燥之藥以致陽明內結謔語

雖然非邪實大滿故但用調胃承氣以調之仍少與之也原其芍藥甘草湯乃是厥愈足溫後專治兩脛變急之藥非正治厥浮自汗出小便數之藥也今活人書却云芍藥甘草湯主厥浮自汗出小便數者何也又云通治誤服桂枝湯後病證仍存者愚不知病證何似可用如上仲景藥法蓋嘗復玩味而細繹焉自常人觀之豈不曰自汗小便數證又無自利遽用乾薑溫之因而以致結燥謔語後却用芒硝大黃寒藥以解其熱似若失矣病家遇此必咎醫者以為誤用乾薑熱燥之失後藥解先之差矣殊不知仲景之

意不患乎乾薑之熱燥惟患乎正氣之虛正氣之長邪氣之所由消也且自汗小便數等證為表裏俱虛治法必先復其陰陽不足之正氣然非乾薑芍藥甘草不可至於正氣陰陽已復而內有所主則雖胃燥謔語不過大便內結大黃芒硝潤滑而去之而正氣內強不至下脫結燥而正氣安矣以上用藥次第先熱後寒先補後瀉似逆而實順非仲景之妙孰能至是哉後之學者可不以此推廣而應變又何暇辯病家之謬誦也耶

若夏月中暑自汗身熱惡寒脈微弱口渴渴足冷者白虎

加人參湯主之

治法詳見雜病中暑門

身熱汗出不惡寒屬裏為陽明本證問曰陽明外證云

何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也大承氣湯問曰病

有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一日惡

寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷答

曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日

自止此為陽明病也傷寒轉屬陽明者其人濺然微

汗出也

中風則有汗傷寒無汗唯入陽明乃有汗故經曰陽明病法多汗

蕪便鞭謔語者下之汗出身熱不惡寒便鞭謔語者宜

承氣湯

論見諸語

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣

湯

許有人患傷寒目痛鼻乾不得貼大便不通尺寸脈

俱大已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫

駭曰陽明自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下

藥予謂曰子雖知蜜煎為穩當選用大柴胡湯此仲

景不傳之妙公安能知之予力爭竟投大柴胡湯二

貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是

自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰

病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之

日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端

傷寒自汗

。秩之三

二十一

則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也
予謂仲景稱急下之者亦猶急當救裏急當救裏之
說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速
下之則為精捷免致用蜜煎也若胸中識得了了自
無可疑若未能了誤用之反不若蜜煎之為穩也

兼脈浮緊口苦者忌汗下針宜和解陽明脈浮而緊咽
燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發
汗則心憤憤反譫語若加燒針必怵惕躁不得眠若下
則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯
主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之註云脈

口苦者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

兼小便不利者分飲食不欲食陽明欲食小便反不利

大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澀然

汗出而解此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈桂枝湯

類之陽明病若中寒不能食小便不利手足澀然汗出

此欲作痼瘕必大便初鞭後溏以胃中冷水穀不別故

也厚朴生薑甘草半夏人參湯吳茱萸湯理中湯之類

兼心下痞汗出心下痞滿有一證其痞按之濡軟不痛
而惡寒者宜附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體

不惡寒者宜十棗湯方論見

兼下利汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯 下利

清穀者通脈四逆湯 汗出下利有微熱者其脈數自

愈脈緊未愈 六七日後發熱而利其人汗出不止者

死俱見

兼吐利脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽 吐

利汗出手足厥冷脈微欲絕者四逆湯 吐利止汗出

而厥脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯俱見

海太陽自汗桂枝湯 陽明自汗白虎湯 少陰自

汗四逆湯

陽明證身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡

熱而尺寸俱浮者白虎湯主之 傷寒尺寸脈俱長

自汗大出身表如米石脈傳至於裏細而小及瘧疾

但寒不熱其人動作如故此陽明傳入少陰戊合癸

即夫傳婦也白虎加桂枝主之然脈雖細小當以遲

疾別之此證脈疾而非遲故用此法白虎加桂枝湯

如中暑自汗微惡寒者亦宜服之

活傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩

汗出筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡蠣散

次服建中湯

防風白朮牡蠣散

治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風

牡蠣炒成粉

白朮各等分

右為細末每服貳錢以酒調下米飲亦得日二三服

汗止後服小建中湯

集傷寒汗多不止

內庭瀉

合谷瀉

復溜瀉

似陽明外證太陽病吐後汗出不惡寒發熱關上脈細

數曰小逆吐後似陽明而關脈細

太陽病發熱汗出不惡寒者

為柔瘧柔瘧似陽明而身反張

發汗已身灼熱者名風溫風溫

為病脈浮汗出身重多眠

汗吐下後自汗二陽併病太陽初得病時發其汗汗先

針灸

出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不

罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正

赤者陽氣怫鬱在表當解之薰之若發汗不徹不足言

陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在

腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不

徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也

成太陽病未解傳併入陽明而太陽證未罷者名曰併

病續自微汗出不惡寒者為太陽證罷陽明證具也法

當下之若太陽證未罷者為表未解則不可下當小發

其汗先解表也陽明之脈循面面色緣緣正赤者陽氣

怫鬱在表也當解之薰之以取其汗若發汗不徹者不

足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從

出擁越于經故燥煩也邪循經行則痛無常處或在腹

中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更

發汗則愈內經曰諸過者切之瀉者陽氣有餘為身熱
無汗是以脈濇知陽氣擁鬱而汗出不徹○凡經文言
或言若言設言假令者皆更端之詞即成氏所謂或為
之證也○不徹不足言正與可小字相反○因太陽故
當汗因併陽明故當小發先下後不可更行桂枝湯
字最有次第仲景之樞機也
若汗出而喘無大熱者與麻黃杏仁甘草石膏湯發
汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者麻黃杏仁
甘草石膏湯服桂枝大汗出脈洪大者仍與桂枝若
形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻黃一湯太陽
病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與
之胃和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散
傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之柴胡

證仍在者復與柴胡湯雖下之不為逆必蒸蒸而振發
熱汗出而解太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈
促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之
言不宜下而便攻之內虛熱入挾熱遂利桂枝證者邪
在表也而反下之虛其腸胃為熱所乘遂利不止邪在
表則見陽脈邪在裏則見陰脈下利脈微遲邪在裏也
促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而
喘者為自汗而喘也即裏熱氣逆所致與葛根黃連黃芩湯
因喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃連黃芩湯
以散表邪除裏熱清肌脈促有此證者宜用此方厥
陰證脈促手足厥即以前當歸四逆湯加吳茱萸主之
脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可
發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須表
裏實津液自和便自汗出愈成經云諸脈浮數當發熱
而漸洒惡寒言邪氣在表

傷寒論卷之六 辨發汗病脈證治法第二十二

也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃
氣若身重心悸而尺脈實者則下後裏虛邪氣乘虛傳
裏也今尺脈微身重心悸者知下後裏虛津液不足邪
氣不傳裏但在表也然以津液不足則不可發汗須裏
氣實津液足便自汗出而愈 宜麻黃湯桂枝湯
枝加白木茯苓甘草湯下後桂枝加芍藥湯 太陽病
當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以
醫吐之過也詳發熱 太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱
汗出惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如不因下
病人不惡寒而渴者此轉屬陽明渴欲飲水少少與之
宜五苓散 傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以其
人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃
中寒冷故也詳發熱

亡陽傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安
者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之 太陽
病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈
伸者桂枝加附子湯主之 發汗多若重發汗亡其陽
譫語脈短者死脈自和者不死亡陽胃燥譫語者脈短
津液已絕不可復治脈
自和為正氣未衰而猶可
性也宜小柴胡加桂湯 脈陽微而汗出少者為自
和也汗出多者為太過陽脈實因發其汗出多者亦為
太過太過為陽絕于裏亡津液大便因鞭也 少陰病
脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀋者復不可
下之脈微為亡陽表虛不可發汗
虛復不可下宜桂枝芍藥炙甘草湯四逆湯

傷寒自汗 失之三 二上

病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利或用桂枝加乾薑湯四逆湯

盜汗盜汗者謂睡而汗出也方其睡熟湊湊然出覺則止而不復出矣睡則胃氣行裏表中陽氣不絀故津液得泄覺則氣行于表而汗止矣雜

病盜汗責其陰虛傷寒盜汗由邪氣在半表半裏使然也若邪氣在表則又謂之自汗矣經曰微盜汗出反惡

寒者表未解也又陽明當作裏實而脉浮者云必盜汗是猶有表邪也又三陽合病目合則汗是知盜汗邪在表裏之間而悉屬和解明矣非若自汗有表裏虛實之別也

太陽病脉浮動數頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也

陽明病脉浮而緊必潮熱發作有時但浮者必盜汗出活人云脉浮盜汗黃芩湯或柴胡薑桂湯桂枝茯苓白朮湯

三陽合病脉浮大上關上但欲眠睡目合則汗出成關脉陽之氣太陽之脉浮陽明之脉大脉浮上關上知二陽合病膽熱則睡少陰病且欲眠睡目合則汗出以陰不得有汗但欲眠睡目合則汗知三陽各病膽有熱也小柴胡湯瀉心湯○張或謂此證俱屬少陽篇中亦可

者表未解也詳見結胸陽明病脉浮而緊必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

頭汗頭乃諸陽之會熱蒸于陽故但頭汗出也三陰無頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

者大陽也大者陽明也上關上者少陽也但欲眠睡目合則汗此膽有熱脉證相符故出于少陽篇下蓋浮脉無證不可汗大脉無證不可下浮大之脉俱上關知三陽合病而熱在膽也然膽居

在半表半裏用小柴胡亦當

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗頭乃諸陽之會熱蒸于陽故但頭汗出也三陰無

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

頭汗其經不上頭故也偏身有汗謂之熱越但頭汗出

而身無汗者熱不得越而上達也如癩熱在裏身必發黃及熱入血室與其虛煩或陽明被火及水結胸數者皆但頭汗出俱是熱不得越故或吐或下以除其熱也且邪但在表則無頭汗之證必也寒濕相搏與邪在半表半裏乃有頭汗也如傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩及傷寒五六日頭汗微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此皆邪在表裏兩間令頭汗出也濕家但頭汗出欲得被覆向火者寒濕相搏故頭汗也此皆不得謂之逆然小便不利而成關格若頭汗者陽

脫也經云關格不通不得尿頭無汗者生有汗者死又濕家下後頭額汗出而微喘者亦陽脫也經云濕家下之額上汗出小便不利者死下利不止者亦死二者乃頭汗之逆

太陽傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱大柴胡湯但結胸無大熱者此水結胸但頭微汗者大陷胸湯 傷寒五六日已汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯 太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰盛則小便難陰陽俱虛竭則身體枯燥但頭

汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則澹
語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治
成風為陽邪因火熱之氣則邪氣愈甚迫于血氣使血
氣流溢失其常度風與火氣謂之兩陽兩陽相熏灼熱
發于外必發身黃若熱搏于經絡為陽盛外熱迫血上
行必衄熱搏于內者為陰虛內熱必小便難若熱消血
枯燥三陽經絡至頸三陰經絡至胸中而還但頭汗劑
頸而還者熱氣炎上搏陽而不搏于陰也內經曰火氣
脹大皆屬于熱腹滿微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣
內發上為口乾咽爛者火熱上熏也熱氣上而不下者
則大便不鞭若熱氣下入胃消耗津液則大便鞭故云
或不大便久則胃中躁熱必發譫語內經曰病深者其
聲啞火氣太甚正氣逆亂則噦又曰四肢者諸陽之本
也陽盛則四肢實火熱太甚故手足躁擾捻衣摸牀擾
亂也小便利者為火未劇津液未竭而猶可治也宜
黃芩梔子檉皮湯衄黃芩湯小便難五苓散小便利津
液未竭其不利者上乾下竭故名不治大柴胡湯承氣

湯 太陽病脈浮動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒
者表未解也醫反下之動數變遲陽氣內陷心中因鞭
則為結胸若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小
便不利身必發黃通頭汗出有數種如發黃頭汗出者
出者寒濕客搏經絡也下血譫語頭汗出者強惡寒頭汗
虛煩懊憹頭汗出者邪客胸中熏發於上也水結胸頭
汗出者水氣停蓄不得外行也發黃鼻衄小便難頭汗
汗出者邪在半表半裏也發黃鼻衄小便難頭汗出者
邪風火熱薰灼上炎也此數者皆為邪風所干而然今
活人書却稱病人表實裏虛玄府不開五內乾枯胞中
空虛津液寡所致于上數證皆非也外有二證又為
汗出之逆經云關格不通不得尿頭無汗者生有汗者
死又濕家下之額上汗出微喘小便利者死下利不止
者亦死以陽氣上脫故也活人書此問不言何以為可
治之別 陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但
傷寒頭汗 失之三

頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿此為蒸

熱在裏身必發黃茵陳湯主之或用茵陳五苓散三陽合病

腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則

譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯

陽明病被火額上微汗出小便不利必發黃成陽明病則為

內熱被火則火熱相合而甚若遍身汗出而小便利者熱得泄越不能發黃今額上微汗出而小便不利則熱不得越鬱蒸于胃必發黃也陽明病下之其外有熱

茵陳五苓散梔子檉皮湯

手足溫者不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出梔子

豉湯陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出

者刺期門隨其實而瀉之澱澱然汗出而愈成陽明病熱入血室

迫血下行使下血譫語陽明病法多汗以奪血者無汗故但頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除則榮衛得通津液得復澱然汗出而解傷寒五六日頭汗

出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞅脈細者此

為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也頭汗出為

陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在

裏半在外也脈雖沉緊不得為少陰病所以然者陰不

得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯若不

了了者得屎而解成傷寒五六日邪當傳裏之時頭汗

下滿口不欲食大便鞅脈細者邪結於裏也手足冷心

陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則熱結猶淺故

日陽微結脈沉雖為在裏若純陰結則更無頭汗惡寒

之表證諸陰脈皆至頸胸中而還不上循頭今頭汗出

傷寒頭汗

知非少陰也與小柴胡湯以除半表半裏之邪服湯已
外證罷而不了了者為裏熱未除與湯取其微利則愈
故云得解
孫凡水結胸脇間頭必有汗治以半夏茯苓湯

活病人表實裏虛玄府不開則陽氣上出汗見於頭

凡頭汗出者五藏乾枯胞中空虛津液少也慎不可

下下之謂重虛

海頭汗出劑頸而還血證也額上偏多者屬心部為

血證也獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣

手足汗胃主四肢為津液之主故病則手足汗出也手

足汗出為熱聚于胃是津液之傍達也經曰手足澀然

汗出大便已鞭又曰手足漿漿汗出大便難而譫語二

者俱宜下之又陽明中寒不能食小便不利手足澀然

汗出此欲作痼瘕不下為宜二者俱手足汗出一則大

便初鞭後澹胃中冷水穀不別故不可下一則大便難

譫語為陽明證具故宜下也 二陽併病太陽證罷但

發潮熱手足漿漿汗出大便難而譫語下之則愈大承

氣湯 陽明病脈遲雖汗出不惡寒身重短氣腹滿而

喘潮熱者此外欲解可攻裏也手足澀然而汗出此大

便已鞭也大承氣湯主之詳潮熱 陽明病若中寒不能

食小便不利手足澀然汗出此欲作痼瘕必大便初鞭

易寒手足汗

失之三

痼瘕必大便初鞭

痼瘕必大便初鞭

痼瘕必大便初鞭

痼瘕必大便初鞭

痼瘕必大便初鞭

痼瘕必大便初鞭

必發黃及一本
心中懊懷作
汗字本汚作

後澹以胃中冷水穀不別故也厚朴生薑甘草半夏人參湯吳茱萸湯中湯

無汗有數種寒邪在表而無汗者邪氣行於裏而無

汗者水飲內蓄而無汗者陽虛無汗者經謂太

陽病無汗而喘及脈浮緊無汗發熱及不出汗而煩躁

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥若頭

痛及鼻乾不得汗脈浮無汗而喘與其剛瘕無汗是數

者皆寒邪在表而無汗者也經謂陽明病無汗小便不

利心中懊懷身必發黃及傷寒發熱無汗渴欲飲水無

表證者白虎加人參湯與夫三陰為病不得有汗惟少陰亡

陽一證有得汗是是數者皆邪行于裏而無汗者也其

水飲內蓄無汗者經謂服桂枝湯或下之仍頭痛項強

翕翕發熱無汗心滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓

白朮是也其陽虛無汗者經謂脈浮而遲遲為無陽不

能作汗其身必痒是也太陽發熱惡寒身疼無汗而

喘麻黃湯證發熱惡寒身疼不汗出而煩躁大青龍

湯證服桂枝或下之仍頭項強痛發熱無汗心下微

痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯證項背強凡

凡無汗惡風葛根湯證陽明脈浮無汗而喘麻黃湯

證以上俱傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白

虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯陽明病法

傷寒無汗

多汗反無汗身如蟲行皮中狀者久虛故也胃為津液之主病人

久虛津液竭不能為汗胃主肌肉實則為痛虛則為痒宜用黃芪建中湯得津液既和而陽明證仍在以小柴

胡湯徐陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手

足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

陽明病無汗小便不利心中懊懣者必發黃成陽明病無汗而小便不利熱蘊于內而不得越心中懊懣者熱氣鬱蒸

少陰病但厥無汗強發之必動其血或從口鼻或從目

出名下厥上竭為難治成但厥無汗熱行于裡也而強發汗虛其經絡熱乘經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸厥者皆屬于下

但厥為下厥血亡下為上竭傷氣損血邪甚正虛故為難治也

不得汗太陽病以火熏之不得汗其人必躁到不解必

清血名為火邪成此火邪迫血而行也太陽病用必發躁也六日傳經盡至七日再到太陽經則熱虛被火

解若不解熱氣迫血下行必清血清則也藥皮湯犀角湯太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其

人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈

脈微惡寒者此陰陽俱虛不可更汗吐下也面色反有

熱色者以不得小汗出身必痒宜桂麻各半湯太陽

病二日反燥凡熨其背而大汗出大熱入胃胃中水竭

躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者為欲解從腰已

下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞅

傷寒不得汗

洪之二

三十三

小便當數反不數及多大便已頭卓然痛足心必熱穀
氣下流故也或云汗多先服桂枝湯後用調胃承陽
明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣
不通鼻乾不得汗嗜卧一身面目悉黃小便難有潮熱
時時噦者柴胡湯但脈浮無餘證者麻黃湯 或當汗
而汗之服湯至三劑而不得汗者死病也 或熱病脈
躁盛而不得汗者黃帝謂陽脈之極也死此二者為真
病不治 然有當和解之證汗之而不得汗者和解之
力到汗自出而解矣慎莫錯會作死證也

潮熱

潮熱者若潮汛之來不失其時一日一發按時而發者
謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱屬
陽明陽明旺于未申必於日晡時發乃為潮熱

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴
日晡小有潮熱從心下至少腹硬滿而痛不可近者大

陷胸湯主之

成重發汗而復下之則內外重亡津液而

日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下
至少腹硬滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱
甚者也宜陷胸湯以下其邪○丹謹按太陽病已重發
汗表則虛矣而復下之裏又虛矣不大便五六日可見
津液之耗矣非若前章之未曾發汗而但下之傷于早
爾今雖有硬滿而可以迅攻之乎若日潮熱于申酉係

傷寒論卷之二十四 三十四

陽明屬胃承氣證既又曰小有潮熱猶可凝待之間
惟此一證耳雜病太陽潮熱則在巳午更
玩一小字則知邪太陽為多陽明為少

陽明病潮熱大便微鞭可與大承氣湯不鞭者不與之
若不_三大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯
入腹中轉失氣者此有燥糞乃可攻之若不轉失氣者
此但初頭鞭後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也
欲飲水者與之則歲其後發熱者必大便復鞭而少也
以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也 陽明病
脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮
熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已

鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也

其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承

氣湯微和胃氣勿令大泄下 陽明病譫語有潮熱反

不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾

宜大承氣湯下之 胃熱當消穀引食反不能食者胃中

雖鞭不得為有燥屎玩但字則未可恐當在若能食者

之上燥屎在大腸而曰胃中者傷寒傳胃不傳太陽治

病必求其本故仲景從本言之况 二陽併病太陽證

罷但發潮熱手足熱汗出大便難而譫語者下之則

愈宜大承氣湯 成本太陽病併于陽明名曰併病太陽

身汗出為熱越今手足熱熱汗出是熱聚于胃也必大

便難而譫語經曰手足熱然而汗出者必大便已硬也

陽明病

與大承氣湯以陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小

承氣湯主之與湯一升腹中轉失氣者更服一升不轉

失氣勿更與之明日不大便脈反微澀者裏虛也為難

治不可更與承氣湯也成陽明病譫語發潮熱若脈沉

為裏熱未實則未可下先與小承氣湯和之湯入腹中

轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若

氣傳時脈得沉實緊牢之類是裏實也反得微澀者裏

氣大虛也若大便利後脈微澀者止為裏虛而循可此

不曾大便脈反微澀是正氣內衰為邪勝也故曰難治

大承氣湯方海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大

黃酒洗厚朴炙去麋皮枳實伍枚

芒硝柴錢半

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮

取二升去滓內芒硝更上火微煎一二沸分溫再服

得下餘勿服

成承順也傷寒邪入胃者謂之入府府之為言聚也

胃為水穀之海榮衛之原水穀會聚於胃變化為榮

衛邪氣入胃胃氣鬱滯糟粕祕結壅而為實是正氣

不得舒順也本草云通可去滯洩可去閉塞而不利

閉而不通以湯蕩滌使塞者利而閉者通正氣得以

舒順故曰承氣也王水曰宜下必以苦宜補必以酸

潰堅破結苦寒為主是以枳實為君內經曰燥淫於

陽明潮熱 卷之三 三十五

內治以苦溫洩滿除燥苦溫為輔是以厚朴為臣內
經曰熱淫于內治以鹹寒人傷于寒則為病熱熱氣
聚于胃則謂之實鹹寒之物以消實熱故以芒硝鹹
寒為佐內經曰燥淫所勝以苦下之熱氣內勝則津
液消而腸胃燥苦寒之物以蕩滌其燥熱故以黃
為使是以大黃有將軍之號也承氣湯下藥也用之
尤宜審如大滿大實有燥屎乃可投也如非大滿則
生寒證而結胸痞氣之屬由是而生矣

小承氣湯方

海藏云大黃泄實厚朴去痞必痞實全皆可用

大黃

肆兩

厚朴

炙去麤皮貳兩

枳實

參枚大者炙

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服

初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿再服

大熱結實者與大承湯小熱微結者與小承氣湯熱不大甚故大承氣去芒硝結不至堅故不減朴枳也

吳或問承氣湯仲景有大小調胃之名何也然傷寒

邪熱傳變入裏謂之入府府者聚也蓋邪熱與糟粕

蘊而為實也實則潮熱譫語手心濇濇汗出者此燥

屎所為也如人壯大熱大實者宜大承氣湯下之小

熱小實者與小承氣湯下之又熱結不堅滿者故減

去厚朴枳實加甘草而和緩之故曰調胃承氣也若

病大而以小承氣攻之則邪氣不伏病小而以大承

氣攻之則過傷止氣且不及還可再攻過則不能復
救可不謹哉仲景曰凡欲行大承氣先與小承氣一
鍾服之腹中轉失氣乃有燥屎也可以大承氣攻之
若不轉失氣慎不可攻攻之則腹脹不能食而難治
又曰服承氣湯得利慎勿再服此諄諄告戒也凡用
攻法必須妙算料量合宜則應手而效若不料量孟
浪攻之必且殺人

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日
脯所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識
入循衣摸牀惕而不安微喘直視脉弦者生濇者死但

發熱譫語者大承氣湯主之一服利止後服詳循衣摸牀

陽明病發潮熱大便澹小便自利胸脇滿不去者小柴

胡湯主之陽明為病胃實是也大便澹而言陽明病者謂陽明外證身熱汗出不惡寒反惡熱之病也

也陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾

不得汗嗜卧身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加

茯苓主之傷寒十三日不解胃脇滿而嘔日脯所發

潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者

知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡

湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之

柴胡加芒硝湯方

柴胡 壹兩

黃芩

人參

甘草 炙

生薑 各伍錢

半夏 湯浸

大棗 叁枚

芫花 壹兩

每服伍錢水一盞半煎至八分去滓納芫花更微沸

溫服

陽明病脈浮而緊必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

成浮為在經緊者裏實脈浮緊者表熱裏實也必發潮熱發作有時若脈但浮而不緊者止是表熱也必盜汗出盜汗者睡而汗出也陽明病裏熱者自汗表熱者盜汗

活人書冬月陽明朝熱脈浮而緊者發作有時但脈

浮者必盜汗黃芩湯主之方見下利

下利

讖語

陽明為病胃家實是也胃實則讖語故讖語宜入陽明門

成讖者謂呢喃而語也又作譫謂妄有所見而言也斯

皆胃中熱盛上乘於心心為熱胃則神識昏亂而語言

謬妄也輕者睡中呢喃重者寤亦謬語經謂讖語獨語

狂語及語言不休與言亂者由其熱之有輕重也讖語錯妄

若與人言有次與獨語如見鬼者熱之輕也狂言無所知識甚則至于喊叫與語言不休者熱之甚也迨夫言

亂乃狂言罵詈不避親疎此為讖語之由又自不同有神明已亂難可復制其猖狂在也

火劫有汗出有下利有下血有燥屎在胃有三陽合病

有過經有亡陽等讖語者俱已條具于後茲不及贅諸

如此者脈短則死脈自和則愈又身微熱脈浮大者生

逆冷脉沉不過一日死或氣上逆而喘滿或氣下奪而自利皆為逆也

陽明胃實潮熱宜下陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一盞腹中轉失氣者更服一盞若不轉失氣勿更與之明日不大便脉反微澀者裏虛也為難治不可更與承氣湯陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚若能食者但鞭爾宜大承氣湯下之一陽併病太陽病罷但發熱手足皴熱汗出大便難而譫語者下之則愈宜大承氣湯陽明病其人多汗以津液出胃中燥大便必鞭鞭則譫

語小承氣湯主之若一服譫語止勿更服

胃實汗多宜下汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經乃可下下之若早語言必亂以表虛

裏實故下之則愈宜大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲

譫語者謂亂言無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩也口將一句舊言重疊頻言之終日殷勤不換他聲也蓋神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則無機變而只守一聲也傷寒四五日脉

沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語成氏謂鄭聲為鄭聲是前已辨明

火後形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脉浮解之當汗出愈太陽病火劫汗

後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘或不大便久則讖語論見太陽病二日反躁乃熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發讖語十餘日悵慄自下利者此為欲解少陰病欬欬而下利讖語小便難者被火氣劫汗故也吐下汗溫鍼後讖語柴胡證罷者此為壞病知犯何逆以法治之詳見汗後傷寒脈浮自汗小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也若胃氣不和讖語者少與調胃承氣湯方論三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿發汗則讖語下之則額上生汗手足

逆冷若自汗出者白虎湯主之論見傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則讖語大承氣湯見不傷寒脈弦頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讖語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸見少發汗多亡陽讖語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽讖語脈短者死脈自和者不死諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩者歿下後傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡痛不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論

傷寒論卷之五
辨陰陽下利之脈證
四十一

熱入血室陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗

出者刺期門隨其實瀉之澱然汗出則愈腹滿譫語脈

期門太陽少陽併病發汗則譫語婦人中風發熱

惡寒經水適來得之七八日熱除脈遲者身涼胸滿如

結胸狀者刺期門若晝則明了暮則譫語者無犯胃氣

及上二焦必自愈活人以小柴胡湯主之論見婦人傷寒

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之

若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸

藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此

為內實也調胃承氣湯主之謂之過經譫語者陽明胃

成傷寒十三日再傳經盡

熱也當以諸承氣湯下之若小便利者津液偏滲大便
當鞭反下利者知醫以丸藥下之也下利脈微而反和者
虛寒也今脈調和則非虛寒由腸虛胃熱協熱而利也
與調胃承氣湯以下胃熱○經文內實之實當作熱注
偏參偏當作漏○此段有五反一對熱與厥反湯與丸
反便鞭與下利反脈微與脈和反藥下與自利反小便
與大便鞭為一對
讀者宜細詳之

右下利譫語其曰脈調和而手足和小便利者陽也

故用承氣下之其脈當微厥及少陰但欲寐被火氣

劫汗譫語小便難者陰也故當用補劑和之但欲寐

語俱見下利少陰條

許有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或

者見下利便以譫語為陰虛證予曰此亦小承氣證

衆駭曰下利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉

活大便秘小便赤手足溫脈洪數者必譫語也調胃承氣湯 譫語不惡寒反惡熱白虎湯 已得汗身和譫語者柴胡桂枝湯 火迫而致譫語亦白虎湯

海治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起卧無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢

耳治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癲癩言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入罐內泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋半日許研如麵新汲水調下三錢或未退再服愈

人中黃即屎也

吳治傷寒熱甚心煩有痰神昏譫語者以竹瀝一盞生天花粉汁一盞服之或加好金子三五錢同煎妙

按此諸方內熱不禁下者可用

補虛素問云譫語者氣虛獨言也歸全善云余用參芪歸木等劑治譫語得

愈者百十數豈可不分虛實一藥用難經云脫陽者

黃連解毒大小承氣等湯以治之

海黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或

語言錯亂失次世疑作譫語狂言者非也神不守室

耳兩手脈浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦

損小皆陰脈也甚者用調中丸或理中丸方見前補養條

丹浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼

醫與小柴胡湯數貼熱愈甚予視之形肥面亦帶白

却喜筋骨稍露診其脈弦大而數實脈本不實涼藥

所致此因勞倦成病與溫補藥自安遂以參朮為君

苓芍為臣黃芪為佐附子一片為使與二貼而證不

減或曰脈既數大狂熱而又大渴用附子誤矣予曰

此虛證而誤投寒涼之藥入肥而脈左大於右事急

矣非加附子參朮焉能有急効再與一貼乃去附子

作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後又補養兩

月氣體方始平復一人五月內患譫語大發熱肢

體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃

煎如膏却用涼水調與之三四服後病者昏睡如死

狀但顏色不改氣息如常至次早方醒諸證悉退而
安。盧兄汗後再發熱妄言呂仲修汗後熱不退亦
妄言陶明節熱退後不識人言語謬妄皆用參芪朮
歸等補劑而愈信哉。譫語屬虛者十居八九。
陰證手足冷脈細微而譫語用四逆湯活人用白通湯
海藏用黃芪加乾薑湯。

侯輔之脈極沉細外熱內寒肩背胸脇斑出十數點
語言狂亂或曰發斑譫語非熱乎予曰非也陽為陰
逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如
狂非譫語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與

薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發
脈又沉遲三四日不大便與理中丸三日內約半斤
其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之
狂即陰虛也。

診直視譫語喘滿者死下利者亦死。譫語妄言身微
熱脈浮大手足溫者生逆冷脈沉細者不過一日死矣。
鄭聲鄭字書曰鄭重煩煩也又曰殷懃也鄭聲謂止將
一事煩煩殷勤言之蓋神氣不足不能更易而但守一
聲與譫語之錯出不倫者異矣此虛實之分也成氏以
為鄭衛之聲迂而鑿矣治法於前補虛條求之。

吳大抵鄭聲乃因內虛正氣將脫而言皆不足之貌
如手足並冷脉息沉細口鼻氣息短少所說言語輕
微無力氣少難以應息者皆元氣將脫也或吃逆不
止神昏氣促不知人事者死如氣息不促手足煩溫
其脉沉細而微者急以附子湯倍人參主之或以接
氣丹黑錫丹兼進一二服以助其真氣也或濃煎人
參徐徐與之或未可用附子者以三白湯倍人參主
之
戴謔語屬陽鄭聲屬陰經云實則讖語虛則鄭聲讖
語者顛倒錯亂言出無倫常對空獨語如見鬼狀鄭

聲者鄭重頻煩語雖謬而諄諄不已老年人遇事則
諍語不休以陽氣虛故也此讖語鄭聲虛實之所以
不同也二者本不難辨但陽盛裏實與陰盛隔陽皆
能錯語須以他證別之大便秘小便赤身熱煩渴而
妄言者乃裏實之讖語也小便如常大便洞下或發
躁或反發熱而妄言者乃陰隔陽之讖語也裏實宜
下調胃承氣湯熱燥甚而妄言不休大渴喜飲宜理
中湯陰隔陽宜溫膽湯四逆湯附子理中湯 又有
不係正陽明似困非困間時有一二聲謔語者當隨
證施治 外有已得汗身和而言妄者此是汗出後

津液不和慎不可下及非陽非陰者宜小柴胡湯和
建中湯各半貼和榮衛通津液若陽傳入陰自利手
足厥逆語或錯亂此雖已自利其中必有燥屎猶當
下之陰中之陽宜調胃承氣湯瘀血在裏大便黑小
便利小腹痛其人如狂譫語者桃核承氣湯婦人傷
寒發熱經水適斷此熱入血室其血必結亦能譫語
宜小柴胡湯病後血氣未復精神未全多於夢寐中
不覺失聲如魘此不係譫語鄭聲宜溫膽湯去竹茹
入人參半錢或用六君子湯

狂亂

經曰邪入于陽則狂又曰重陽則狂諸經之狂為陽盛
也傷寒熱毒在胃併於心至於發狂為邪熱極矣狂之
發作少卧不饑妄語笑妄起行棄衣而走登高而歌甚
則踰垣上屋皆獨陽亢極使之非吐下不能已亦有當
汗不汗痰熱在裏下焦畜血而如狂者小便必利特如
狂而未至於狂耳其或熏熨迫汗灼艾燒針令人煩躁
卧起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例其或
狂言目反直視為腎絕汗出輒復熱狂言不能食皆死
證也非藥石所能及矣

陽明病欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翁翁
如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣
與汗共併脈緊則愈成陽明病客熱初傳于胃胃熱則
消穀而欲食陽明病熱為實者則
小便當數大便當鞭今小便反不利大便自調者熱氣
散漫不為實也欲食則胃中穀多內經曰食入于陰長
血氣于陽穀多則陽氣勝熱消津液則水少經曰水入
于經其血乃成水少則陰血弱金匱要畧曰陰氣不通
則骨痛其人骨節疼者陰氣不足也熱甚于表者翁翁
發熱熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫不專著于表
裏故翁翁如有熱狀奄忽也忽然發狂者陰不勝陽也
內經曰陰不勝其陽者則脈流薄疾并乃狂陽明蘊熱
為實者須下之愈熱氣散漫不為實者必待汗出而愈
故云濺然而汗出解也水穀之等者陰陽氣平也水不
勝穀氣是陰不勝陽也汗出則陽氣衰脈緊則陰氣生
陰陽氣平兩無偏勝則愈故云與汗共併脈緊則愈○
八府見表證汗出解理順見汗脈緊首尾如初爾杜技
湯主之此段發汗則愈○汪按水陰氣則穀陽氣傷寒

以陽為主水不勝穀乃陰不勝陽病漸向安故陰氣與
汗共併而散因見脈緊者陰寒脈也此則變熱入府
何以脈緊蓋由陰氣與汗共併然也且緊亦與長類長
為陽明本脈成氏所註汗出陽衰脈緊陰生陽衰陰生
則陰陽不平矣下文乃云陰 太陽病六七日表證仍
在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹
當鞭滿小便自利下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀
熱在裏故也抵當湯主之或云桃仁 承氣湯 太陽病不解熱
結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻
當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承
氣湯

張或云上二條證俱係下焦蓄血中間雖有輕重未

審緣何而致此也此皆發汗未得其宜或當汗不汗
或汗遲或脉盛汗微或覆蓋不週而不汗其太陽之
邪無從而出故隨經入府結于膀胱今小腹鞭滿若
小便不利者血不蓄若小便利者乃蓄血證也血或
不蓄為熱迫之血則自下血下則熱隨血出而愈若
蓄血而不下其外不解者尚未可攻當先解外外已
解但少腹急結者乃用桃仁承氣湯攻之此如狂者
之所處也其發狂者則不然表證雖在脉已沉微邪
氣傳裏其可已乎下之則愈故以抵當湯主之
太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小

便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之
傷寒脉浮以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝
湯去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方論見驚汗家重發
汗必恍忽心亂小便已陰痛與禹餘糧丸方見痞

○附

陽毒活人云凡病人煩躁狂走妄言叫罵面赤咽痛鼻
如烟煤或身斑如錦或下利赤黃此陽毒也表者陽毒
升麻湯黑奴丸裏者大黃散楊仁齋用葶藶苦酒湯梔
子仁湯三黃湯大黃散升麻葛根湯加大黃狂走者水
調瓜蒂末吐痰

本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連 寒水石 各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連 大黃 防風

遠志 茯神 各半

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭謔言妄語方見發熱

陳志仁傷寒狂安每欲狂走四五人扶捉不定肌虛數

用柴胡湯反劇以參芪歸木甘草陳皮煎湯一服狂定

再服安睡

脫陽者見鬼脫陰者發狂宜峻補其陰天地煎之類

是也天門冬地黃煎膏為之

陰證乃是病發于少陰不當正發汗醫見其惡寒遂強

發之汗因漏不止其人亡陽故狂大與陰極發躁同當

用陰躁之藥加以收汗之劑玉屏風散入熟附子一錢

仍外以溫粉傅之或冷汗自出手足逆冷其人狂不止

者宜四逆湯冷進

發狂而肌表雖或熱以手按之則冷透手或肩背胸膈

有斑十數點脉極沉細用乾薑附子湯以人參冷進

生瀉者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服

利止後服成若吐若下皆傷胃氣不大便五六日上至

王于申酉戌日晡所發潮熱熱者陽明熱甚也

者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣

有餘若劇者是熱氣太甚也熱大甚于內昏冒正氣使

不識入至於循衣摸床惕而不安微喘直視傷寒陽勝

而陰絕者死陰勝而陽絕者死然劇脈弦者為陽勝脈弦為

陰有餘脈澀則絕陰故不可治其邪熱微而未至於劇者

可生脈澀則絕陰故不可治其邪熱微而未至於劇者

但發熱譫語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下

藥中病即止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則

止後服○趙此段當分作三截看自傷寒若吐若下後

不解大便對為現證下文又分作一截以辨劇者微者之

寒獨語如見鬼狀止為上一截是將潮熱譫語不惡寒

不大便對為現證下文又分作一截以辨劇者微者之

殊微者但發熱譫語但字為義以發熱譫語之外別無

他證其用承氣湯曰一服利止後服見其熱輕猶恐下

之太過也至于劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安

微喘直視如此熱極證危不可不決其死生以斷之

脈弦者生瀉者死此陽熱已極若脈弦為陰未絕者

下之以復其陰若脈瀉為陰絕不可藥而必死矣人

人善但言劇者而去其微者二字混兩證通作一證

日用承氣湯又將脈弦者生瀉者死本劇者斷語移而

繼于微者服藥之後豈有但發熱譫語無別惡候遽然

許有久病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩
手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得
之者十中九死仲景雖有證而無法但云脈弦者生
瀉者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便得通

而脉弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脉且微弦半月愈或問曰下之而脉弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生濟者死微者但發熱識語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻物者肝熱也此證在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脉則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許衣撮衣是肝熱風淫未疾此論誠當然莫若以為肺熱之邪其人必云言亂語難經云肺邪入心為譫語

○附

婁嘗治循衣摸床數人比用大補氣虛之劑惟一人兼調振脉代遂於補劑中略加桂二分亦振脉和而愈

