

證治準繩

六



五 外科

天泡瘡
結核
凍瘡
水入瘡


瘰癧
癰瘤
漆瘡
馬汗入瘡

熱瘡
癩子
疔
癍

痞瘤
手足皸裂
類破傷風



內閣文庫	
番號	漢 12971
冊數	100 (63)
函號	301 60



天泡瘡

一〇〇〇

三〇〇〇

天泡瘡卽丹毒之類而有泡者由天行少陽相火爲病故名天泡爲火熱客於皮膚間外不得泄怫熱血液結而成泡如豌豆瘡根赤頭白或頭亦赤隨處而起若自裏達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖散若止從頭項兩手起者此上焦熱也則服涼膈散若從身半已下起者則服黃連解毒和四物湯若發於秋冬則宜升麻葛根犀角或加槩苓一二味外傳如馬齒莧吳藍赤小豆苧根之類皆解毒消腫可用於初起之時或蚶殼或龜甲水龍骨各煨存性則收濕

以酒之却如世謂之癰疽甲水諸骨各藥法到俱效然
 湯商莫莫與鹽赤小豆等淋之酸皆能毒消斬也凡
 淋冬則宜并和葛根半斤如以藥茶一二和以酒
 其長半寸不取根則黃連黃芩四味是皆藥也
 若山藥與真兩毛味皆出上煎煎也則則京國藥
 味皆自果毒然伏發在春夏三煎則煎與煎更煎
 煎此而丸以收應豆發射赤面白如煎亦亦煎更煎
 味好冬天以煎火煎容然丸散開衣不腎煎煎煎煎
 天以煎煎汁毒之酸而直宜若山天行少則則火煎
 天以煎

瘰

瘰小瘰世謂之熱瘰是也王註云大如酸棗或如豆
 色赤而內有膿血也

風濕

海藏云汗出見濕乃生瘰癧瘰癧為瘡瘰也

勞汗當風寒薄為皴皴乃瘰瘰色赤膜內有膿血
 旋覆花丸

旋覆花

卷兩

防風

白芷

甘菊花

南星

半夏

石膏

川芎

陳皮

白附子

各半兩

蝎稍

僵蠶

炒各參錢

右細末薑汁糊丸梧桐子大薑湯下參伍拾丸食後服

黑末子 治癰毒

用羊角連內骨燒存性為末酒調參錢分上下服之瘡可散

按此方未嘗用服蓋秘方也常治面上或身卒得赤癰或痒或癩毒不治殺入以殺羊角燒存性研令極細末以雞子清調塗之甚效本草亦云然

熱瘡痂子

千金云凡熱瘡起便生白膿即今俗名膿窠瘡是也其初起即淺但出黃汁名肥瘡又名黃爛瘡初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢圻裂春夏秋冬隨瘡劇者名痼瘡治法已見芥門

濕熱

膿胞瘡治熱為主

黃芩

黃連

大黃

各參錢

蛇床子

寒水石

黃丹

貳錢

伍分

白礬

輕粉

白芷

壹錢

無名異

木香

各少許

少許痛者加

九一散

小斗

百五

右為細末麻油調塗

又方 蕎麥麵壹兩 硫黃捌錢 水銀制鉛壹錢 或油

或豬膽汁調搽

白蒺藜散 治熱毒瘡瘙痒心神壅躁

白蒺藜炒去刺 白鮮皮 防風去蘆

川大黃剉炒 赤芍藥 梔子仁

子芩 麥門冬去心焙 玄參

桔梗去蘆 甘州炙赤剉 前胡去蘆各壹兩

右為細末每服貳錢食後用薄荷湯調服

蜜陀僧散 治熱毒惡瘡鼻爛久不生肌

蜜陀僧 雄黃 雌黃

定粉各半 膩粉叁錢

右研為細末先用柳枝壹握生甘草壹兩搥碎以漿貳升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之

白金散 治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼痛出

黃水

用桂府滑石為細末先用虎杖甘州豌豆各等分約半兩許水貳碗煎上項藥至壹碗去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上搽滑石末令通身便睡至明決愈

玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫痒焮痛

定粉 壹兩

蛤粉 玖兩半

白石脂

白龍骨

石膏 各半兩

滑石 捌兩

寒水石

燒通赤放淨地上
冷出火毒壹兩

粟米粉 貳兩

右為細末研勻每用些少乾擦患處

七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荆芥穗

地骨皮

木通 各貳兩

白礬 壹兩

右為麤末每用藥壹兩水叁大碗煎五六沸濾去

滓稍熟淋滌患處避風少時

赤石脂散

治癩子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂

細研

黃檗 去粗皮

臘茶末 各半兩

白麩 貳兩

龍腦 半錢

右為細末研勻每用時綿搨撲之

龍腦粉方

治癩瘡痒痛

龍腦 壹錢

粟米粉 伍兩

右研勻先用棗葉湯洗後用綿搨撲之

玉女英 治癩瘡痒痛

滑石 半兩

藜豆粉 肆兩

右研勻以綿搵撲之一方有棗葉壹兩

棟花粉傳方治癩子癢痒

右用苦棟花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許研勻且頻傳之

治暑月汗漬腋下赤腫及癩瘡

右取臘雪水和蛤粉傳之

戴院使治癩子用香撲粉入朴硝末如常撲使更入

少許枯礬末

治熱癩瘡遍身如蠶子用不灰木棗葉為末瘡上搽

之即止又法用茨菰葉陰乾為末傳之又方用

臘雪以瓶收貯遇生癩時以所花水塗傳又方用

黃瓜切斷擦癩子上即安又方用棗葉煎湯浴之

又方用蚌粉肆兩棗豆粉貳兩滑石壹兩為末乾

擦之

各少許研勻以漿傅之
 右用苦楝花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末
 治諸子疳疔
 本取膽草水和粉何之
 刺之
 又用抽絲綫兩菜豆絲疔兩散豆壹兩為末
 黃瓜口澗刺于上噴安 又用棗葉煎湯谷之
 蠶雪以斑外與蟲土煎以洗疥水塗刺 又用

痞瀰

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與
 熱氣并則生痞瀰狀如麻豆甚者漸大搔之則成瘡
 也

麝羊角散

治風熱皮膚生痞瀰痒痛

麝羊角

烏蛇肉

川大黃

玄參

枳殼

白茯苓

甘艸

秦艸

防風

右件咬咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去粗入
 牛蒡根汁半合更煎一兩沸溫服不拘時候

秦艽湯 治風熱毒氣客於皮膚遍身生瘡癩如麻

豆

秦艽 去蘆 壹兩

防風 去蘆

黃芩

麻黃 去節

甘艸 炙

玄參 去蘆

犀角屑

牛蒡子 炒

枳殼 去穰 炒

川升麻 各半錢半

右件咬咀每服伍錢水壹中盞煎至柒分去粗溫

服不拘時候

當歸飲子 治心氣凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身

瘡疥或痒或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡癩

當歸 去蘆

白芍藥

川芎

生地黄

白蒺藜

防風 去蘆

荆芥穗 各壹兩

何首烏 去蘆

黃芪 去蘆

甘草 炙各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎至捌分去

粗溫服不拘時

烏蛇散 治風熱遍身生瘡癩搔痒

烏蛇肉 酒浸 貳兩

羌活 去蘆

白鮮皮

桂心

甘草 炙

枳殼 去穰 炒

蒲黃 炒

蔓荊子

芎藭

卷一百一

小斗五

百

當歸 去蘆各半兩

天麻

麻黃 去節

秦艽 去蘆

牛蒡子 炒

藁本 去蘆

白殭蠶 炒各半錢半

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時

荆芥散 治風熱皮膚瘙痒生瘡癩

荆芥

赤茯苓 去皮

苦參 去蘆各壹兩

蔓荆子

天麻

人參 去蘆

防風

獨活 各去蘆

枳殼 麸炒各半兩

牛蒡子 炒

黃芩 各半錢半

烏蛇肉 酒浸貳兩

右為細末每服同前法

防風散 治風痞癩

防風 去蘆

杏仁 麩炒另研為泥

白殭蠶 炒各貳兩

甘草 炙壹兩

右為細末每服叁錢空心蜜水調下或溫酒調服

亦得日進二服

牛膝散 治風痞癩

右用牛膝酒浸搗為末每服貳錢食前溫酒調下

兼治骨沮風癩皆効

疾藜丸 治風瘙痒生痞癩

白疾藜

秦艽 去蘆

赤茯苓 去皮各壹兩

羌活

苦參

並去蘆

黃芩

細辛

去苗各半兩

枳殼

朱錢半去穰炒

烏蛇肉

酒浸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾丸温蜜湯送下不拘時候

黑龍丸

治風毒上攻頭面多生痞漏

羌活

薄荷葉

蔓荊子

細松烟墨

獨活

去蘆各壹兩

川芎

甘艸

白附子

山梔子

白芷

防風

去蘆

荊芥穗

天南星

薑製

草烏頭

生

白僵蠶

炒

川烏頭

炮去皮臍各半兩

右為細末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸細嚼茶湯或温酒送下食後服

莽草膏

治風瘙痒皮膚生痞漏體腫疼痛

莽草

壹兩

當歸

去蘆

芎藭

大戟

去皮

川椒

附子

細辛

去苗

赤芍藥

芫花

躑躅花

蒴藿

各貳兩

右細剉用醋參升浸壹宿用豬脂參斤同煎令附子色黃為度綿濾去粗每塗摩病處日三五上

治風瘙痒皮膚生痞癩搔之成瘡宜用此粉身即瘥

芎藭

麻黃根生

白芷各參兩

雷丸伍兩

藿香貳兩

藜蘆壹兩半

右為細末入英粉伍兩相和令勻逐白粉身上

治風熱皮膚瘙痒搔之生痞癩粉身

麻黃根伍兩

蛇床子肆兩

白蒺藜

白礬各貳兩

白米粉貳升

右為細末用疎生絹袋盛痒即粉身

治風瘙皮膚生痞癩搔之腫痒柳枝湯洗之

嫩柳枝

桃枝

蒴藿

苦參各伍兩

槐白皮肆兩

茵陳

狼毒

青箱葉

麻黃各參兩

右細剉和勻每取壹斤用水伍斗煮取肆斗去粗

更入鹽及朴硝各貳兩攪勻看冷熱於溫室中洗

浴浴罷衣覆出汗瘥切慎外風

治風熱皮膚生痞癩苦痒成疥丹參湯洗之

丹參

苦參各肆兩

蛇床子生用

右件藥用水壹斗伍升煎至柒升去粗乘熱洗之

治皮膚風熱生瘡痞癩或痒痛宜用垂柳湯洗之

垂楊柳壹斤

杏仁叁兩

白礬生用

白芥子

各半

白芥子

白芥子風熱主痰痰脈近熱証宜用此藥

白芥子

各半

白芥子

白芥子風熱主痰痰脈近熱証宜用此藥

白芥子風熱主痰痰脈近熱証宜用此藥

白芥子風熱主痰痰脈近熱証宜用此藥

白芥子風熱主痰痰脈近熱証宜用此藥

白芥子

各半

白芥子

白芥子

各半

白芥子

結核

獨形而小核者為結核

河間云結核火氣熱甚則鬱結堅硬如果中核也不須潰發但熱氣散則自消丹溪云結核或在項在

頸在臂在身皮裏膜外不紅不痛不硬不作痛多是痰注作核不散問其平日好食何物吐下後用藥散

核結核在頸項方僵蠶炒大黃酒浸青黛膽星各等

分為末蜜丸噙化結核在下頰二陳湯加酒炒大

黃連翹桔梗柴胡結核在臂二陳湯加連翹防風

川芎酒芩蒼朮皂角刺僵蠶麝香行太陰厥陰之積

痰使結核自消甚捷風核以去風消核散常服消

結核

下斗

百五

之風熱結核以大連翹飲加僵蠶牛蒡子凡一切風核疼痛宜以大蕎麥根及金線釣葫蘆根磨半泔半醋煖塗之

儒者楊澤之缺盆間結一核余謂此肝火血燥而筋攣法當滋腎水生肝血彼反用行氣化痰外敷南星商陸益大如碗余用補中益氣湯六味地黄丸以滋腎水間用蘆薈丸以清肝火年餘元氣復而消一男子頸間結核大潰一婦人左眉及髮際結核並用梔子清肝散海藻散堅丸以清肝火養肝血益元氣而愈此症亦有大如升斗者亦治以前藥可愈

婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥愈甚治以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘貼愈一婦因怒結核腫痛察其氣血俱實先以神効散下之更以益氣養榮湯三十餘劑而消常治此症虛者先用益氣養榮湯待其氣血完充乃取神効散去其毒仍進前藥無不効者一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以連翹丸而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏之藥一兒項結一核堅硬如癰面色痿黃飲食不甘服托裏藥不應此無辜疔毒也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按

之轉動軟而不痛者內有蟲如粉急針出之若不速

去則蟲隨氣走內蝕藏府不治蟾蜍夏月溝渠中腹

蠶蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得

出將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食盡夜次以新布袋包

繫置水急處浸一宿取出瓦上焙為末入麝香一字

軟飲丸如麻子大每服二三十丸空心米飲送下

一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉痠疼體瘦面黃

經漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之少可彼

自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不救

海藻連翹湯 治諸般結核瘰癧馬刀瘻瘤痰核

白茯苓

陳皮 去白

連翹

半夏 薑製

黃芩 酒拌炒

黃連 酒炒

南星 薑製

牛蒡子 炒

柴胡

三稜 酒炒

莪茂 酒炒

殭蠶 炒去絲

昆布

海藻

羌活

防風

桔梗

夏枯草

川芎

升麻

右生薑薄荷煎食後服

連翹丸

連翹

防風 去蓋

黃檗

肉桂 去麋皮

桑白皮

香豉

獨活

秦艽

牡丹皮 各半兩

結核

小科

百五

海藻貳錢半

右為末煉蜜丸如菜豆大每服拾丸燈心湯下
五香散 治肉中忽有惡核生腫硬不消惡肉惡脉
瘰癧風毒腫氣

木香

鷄舌香

沉香各壹兩

麝香

細研貳錢半

射干

薰陸香

乾葛

剉

川升麻

獨活

桑寄生

連翹

甘草生各貳兩

川大黃

參兩剉碎微炒

右剉碎入麝香研勻每服參錢水壹中盞煎至伍

分去滓入竹瀝半盞更煎一二沸溫服日三

連翹散 治項上惡核焮腫

連翹

射干

獨活

川升麻

木香

沉香

木通

剉各壹兩

桑寄生

丁香各半兩

川大黃

貳兩剉碎微炒

右為細末每服貳錢清粥飲調下日三服

獨活散 治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

獨活

木香

射干

桑寄生

連翹

升麻

結核

小升麻

升麻

系在

沉香

川大黃 生用

甘草 生各壹兩

右剉碎每服肆錢水壹中盞煎至陸分去滓入竹瀝半合更煎一二沸放溫服日三得快利為度

清肝益榮湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛或作疾子并一切肝火之症

山梔

當歸

木瓜 不犯鐵器

茯苓 各壹錢

柴胡

川芎

芍藥 炒各柒分

熟地黃 壹錢半

白朮 貳錢

龍膽草 捌分

炙甘草 伍分 右薑水煎服

瘦瘤

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內着寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋疾前二字衍文也筋當作筋屈不得伸邪氣居其間而不及發為筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得及津液又留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣歸之津液留之邪氣中之凝結日以易其連以聚居為昔瘤以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣并日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而不去

瘦瘤

瘦瘰 有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也刺節真邪篇此言虛邪中人月而成疽也三四五六瘦多着於肩項瘰則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘰皮色不變者名曰肉瘰筋脉露結者名曰筋瘰赤脉交結者名曰血瘰隨憂愁消長者名曰氣瘰五瘰皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致天枉瘤則有六骨瘤脂瘤氣瘤肉瘤膿瘤血瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈丹

海藻丸 治瘰癧通用

海藻 洗晒

川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白斂

昆布 洗晒

明礬 煨各壹兩

海蛤 煨

松蘿 各柒錢半

守瘰丸 治瘰癧結硬 為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食後含嚥下

通草 貳兩

杏仁 去皮尖研

牛蒡子 各壹兩

昆布 洗

射干

訶梨勒

海藻 洗各肆兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食後嚼化日三

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成癭瘤

右用海藻洗去鹹壹斤酒貳升漬一宿取壹貳合飲之酒盡將海藻曝乾搗末酒調壹錢七日三即瘡如浸用絹袋盛了浸春夏二日秋冬三日

白頭翁丸 治氣癭氣瘰

白頭翁 半兩 昆布 拾分洗 通草

海藻 洗各 柒分 連翹 各捌分 玄參

桂心 叁分 白欬 陸分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服伍丸用酒送下忌蒜麵生葱豬魚

海藻散堅丸 治肝經癭瘤

海藻 昆布 各貳兩 小麥 肆兩醋煮炒乾

龍膽草 貳兩

右為末煉蜜丸桐子大每服貳叁拾丸臨卧白湯送下并禽化嚥之

五癭 五癭在頸項間皮寬不急累累而垂者是也宜破結

散消癭丸海藻丸昆布丸黃藥酒藻藥散兼以針灸法同施方有效及常服復元通氣散蠟礬丸自然縮

癭之類

小引五

癭之類

海源

治癭

三

木通散 治癭下卒生結囊欲成瘦

木通

松蘿

桂心

蛤蚧

酥炙

白欬

琥珀

海藻

洗

昆布

洗各壹兩

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下

五瘦丸

菖蒲

貳兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏

各壹兩

神麴

參兩

羊靨

百枚

右為細末以半羊脂髓為丸如芡實大每服壹丸食後臨卧嚙化服

昆布丸

檳榔

昆布

海藻

各貳兩

右為末煉蜜丸彈子大每用壹丸含嚙化下

藻藥散

治氣瘦

海藻

酒洗壹兩

黃藥子

貳兩萬州者佳

右為末置掌中以舌時時舐以津嚙下消二分之二止藥先須斷厚味戒酒色按本草黃藥子主諸惡腫瘡瘦斗門方以

海源

治癭

三

浸酒療項下瘦氣醫學綱目及丹溪誤作黃檗
蓋藥字相近又誤藥為連則其失愈遠矣

二海丸 治氣瘦

海藻

昆布 各酒洗晒乾

右等分為末煉蜜丸杏核大稍稍嚥汁又用海藻
洗淨切碎油醋熟作常菜食之

消癭散 治癭氣

海藻 酒洗

海帶 酒洗

昆布 酒洗

海馬 酒炙

海紅蛤

石燕 各服

海螵蛸 各壹兩

右為末清茶下兼服含化丸兼灸相濟以收全功

含化丸 治癭氣

海藻

海蛤 煨

海帶

昆布

瓦龍子 煨

文蛤 即花蛤背
有斑文

訶子 去核

五靈脂 各壹兩

豬臑 拾肆个焙
乾另研

右為末煉蜜丸臨卧含化時時嚥下 兼灸法以

助丸功

通氣丸 治癭氣

海藻

海帶

昆布

夏枯艸

木通 各壹兩

訶子

薄荷 各伍錢

杏仁 少許

瘰癧

外科五

五

右為末煉蜜丸如芡實大每用壹丸噙化兼灸
以泄癭氣方効

黃藥酒 治忽生癭疾及一二年者

右用萬州黃藥子叁斤須緊重者為上如輕虛即
是他州者力慢須加一倍以無灰酒壹斗投藥在
內固濟瓶口以糠火燒一伏時停待酒冷即令患
者時時飲壹盞勿令絕酒氣經三五日常把鏡自
照覺消則停飲不爾令人項細也用火時不可多
惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待經宿也已
驗如神忌毒食

昆布散 治癭氣去風火鬱滯散痰氣壅結

防風 荆芥 黃連酒炒

昆布 海藻 海粉

羌活 升麻 連翹

青皮 膽星 貝母

牛蒡子炒 夏枯草 沉香

香附子 撫芎 黃芩酒炒

右薄荷煎服或末或丸俱可痰多加南星半夏
又宜灸天突穴為妙

三因破結散

瘰癧

外科五

五

海藻 洗

草龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石 枯

松蘿 各參分

麥麵 肆分

半夏 半斤

貝母 各貳分

右為末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜

諸雜毒物十日知二十日愈

玉壺散 治三種瘰

海藻 洗

海帶 洗

昆布

雷丸 各壹兩

青鹽

廣茂 各半兩

右等分為細末陳米飲丸如榛子大噉化以煉蜜

丸亦好

子和人參化瘦丹

海帶 洗

海藻 洗

海蛤

昆布 已上四味皆焙

澤瀉 炒

連翹 已上各等分

豬鬣

羊鬣 各拾枚豬羊鬣即豬羊外腎乃囊中之卵也

右為末蜜丸如芡實大臨卧噉化壹貳丸忌油膩

物

羅氏寶金散

偏醫瘦氣無不瘥

豬羊鬣

拾對煖水洗去脂膜後晒乾杵為細末

海藻 洗

海帶 各貳兩洗

丁香

木香

琥珀研

麝香研各貳錢半

真珠研半兩

右件先將丁香木香海藻海帶梓為細末入下項藥末合和再研細重羅過每服壹錢熱酒壹盞調服夜卧服垂頭而睡若在室男女十服必効如男子婦人患者一月見効有胎不可服

海帶丸 治瘦氣久不消

海藻洗

貝母

青皮

陳皮各等分

右件為細末煉蜜為丸彈子大食後嚥化壹丸効針砂方 治氣瘦

右用針砂浸於水缸中平日飲食皆用此水十日一換針砂服之半年自然消散

昆布散 治瘦氣結腫胸膈不利宜服

昆布洗

海藻洗

松蘿

半夏泡湯

細辛

海蛤細研

白飲

甘草炙各壹兩

龍膽艸

土瓜根

檳榔各貳兩

右為細末每服貳錢食後溫酒調下

治瘦氣胃膈壅塞頸項漸羸宜服此方

商陸

昆布洗各貳兩

射干

治瘰癧

羚羊角

木通

海藻

杏仁

湯浸去皮尖炒

牛蒡子

壹兩半

右咬咀每服參錢水壹中盞入生薑半分煎至陸分去滓不拘時溫服

治瘰癧氣神驗方

琥珀

桔梗

烏鰂魚骨

昆布

洗各壹兩

赤小豆

酒煮熱焙

小麥

酒煮各叁分

右為細末煉蜜丸如小彈大綿裹壹丸常噙嚥津

神効開結散

治瘰癧疾不問年歲極驗

沉香

木香

橘紅

肆兩

豬鬃子

生於豚豬項下

珍珠

肆拾玖粒

封口煨過絲壹枚如棗大取肆拾玖

右為末每服壹錢臨卧冷酒調搽徐徐嚥下輕者

三五服重者一料全愈修合用除日効忌鹹酸油

膩瀦氣等物

六癧

六癧者隨氣凝結皮膚之中忽然腫起狀如梅李皮軟而光漸如杯卵若發腫都軟不痛者血癧發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣癧氣結微腫久而不消後亦成膿諸癧疔贅等至年衰皆自內潰治於壯年可無後憂按之推移得動者可用取法去之

癧癧

外科五

百六十七

如推之不動者不可取也。瘤無大小不量可否而妄取之必妨人命。俗云瘤者留也。不可輕去。不為無理。治法先以鐵罐膏點瘤頂上。令肉黑腐。不痛方可。以刀剪去黑腐。又以藥塗令肉腐潰。又可剪之。又塗。又剪。瘤根去盡為度。若怕針刀者。却以井金散塗之。令肉黑極十分腐爛。方可用刀剪之。刮之。若稍有此肉不黑盡。恐肉未死。血亦未死。血未死則不可剪。刮恐血來多。致有昏暈之失。其肉十分黑極十分腐爛。推得動者。此肌肉死也。肌死則血死。其血死乃可剪。刮無妨。雖血瘤肉瘤取之亦無妨也。小瘤取

之即愈。大瘤取之有半載。肌肉麻痺也。宜服養氣血藥。久之自愈。薛內經云。肝統筋而藏血。心裏血而主脈。脾主肉而統血。肺主氣而司腠理。腎統骨而主水。若怒動肝火。血涸而筋攣者。其自筋腫起。按之如筋。久而或有血縷。名曰筋瘤。用六味地黃丸四物山梔木瓜之類。若勞役火動。陰血沸騰。外邪所搏而為腫者。其自肌肉腫起。久而有赤縷。或皮俱赤。名曰血瘤。用四物茯苓遠志之類。若鬱結傷脾。肌肉消薄。外邪所搏而為腫者。其自肌肉腫起。按之實軟。名曰肉瘤。用歸脾益氣一湯。若勞傷肺氣。腠理不密。外邪所

補中益氣之類若勞傷腎水不能榮骨而為腫者其
自骨腫起按之堅硬名曰骨瘤用地黃丸及補中益
氣湯主之夫瘤者留也隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣
血乖違當求其屬而治其本凡屬肝膽二經結核
八珍加山梔膽草以養氣血清肝火六味丸以養肺
金生腎水若屬肝火血燥須生血涼血用四物二地
丹皮酒炒黑膽草山梔中氣虛者補中益氣兼服若
治失其法脾胃虧損營氣虛弱不能濡於患處或寒
氣凝於瘡口榮氣不能滋養故患處以致久不生肌

而成漏者悉調補脾胃則氣血壯而肌肉自生矣若
不慎飲食起居及六淫七情或用寒涼蝕藥蛛絲纏
芫花線等法以治其外則誤矣長洲庠王天爵辛
丑春左腿近環跳患之狀如大桃按之濡軟恪服除
濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脈
洪大而虛氣瘤也肺主之蓋膽屬木肺屬金然發於
膽經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰
矣遂用十全大補湯數劑出清白稀膿甚多頓加寒
熱煩渴頭痛殊類傷寒狀余謂此因膿泄而血氣益
虛耳仍用前湯其勢益甚脈洪數大按之如無乃加

附子壹錢其勢愈甚而脉復如前此虛甚而藥未能及也更加附子貳錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患處復潰諸症更發咽間如焚口舌無皮用十全大補加附子壹錢服之諸症悉愈二日不服內病悉至患處復潰二年後又患服前藥不應診其尺脉微細如絲此屬命門火衰用八味丸為主佐以十全大補湯稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿 一男子左腿外側近髻腫一塊上有赤縷三年矣飲食起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此

贈經受證故發於腿外側診其脉左尺洪數右關洪此腎水不能生肝木用補中益氣湯六味地黄丸而痊 一男子小腹患之膿水淋漓此足三陰之症用補中益氣加麥門五味以培脾土用六味地黄丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂 一老儒眉間患之二年其狀如紫桃下墜蓋自按之如水囊此肝脾之症膿瘀內潰而然耳遂刺出血膿自即開以炒黑膽草山梔芎歸芍藥柴胡白朮茯苓之類而愈 嘉善周上舍兩耳下項間筋攣腫腫堅硬咳嗽氣喘內熱盜汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚予

診之左關弦澁左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須
滋腎水生肝血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲
速効乃外敷商陸石灰等藥內服海藻蓬朮之類至
秋金旺之際元氣愈虛其腫愈甚而歿 鎮汪孫上
舍缺盆間腫如覆甌堅硬色赤內熱晡熱自汗盜汗
就治於余曰賤疾皆以散堅行氣降火破血之劑欲
其內消而反甚其脈左尺洪數按之而弱左關洪數
按之而澁此怒氣傷肝血澀而筋攣也因其急於仕
進予辭不能治彼亦不信後果歿此症若補脾肺滋
肝腎則木得水而敷華筋得血而滋潤多有得生者

張子和治新寨一婦人年四十餘有瘤三辨戴人
令以鹹吐之三涌三汗三下瘦已消半次服化瘦之
藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息之法
耳 又在西華衆人皆訕以為吐瀉而已一日魏壽
之與戴人入肆中見一夫病一瘤正當日上綱內背
色如灰李下垂覆自睛不能視物戴人謂壽之曰吾
不待食熟立取此瘰癧未之信也戴人曰吾與爾取
此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割
別有一術其人從之乃引入一小室中令俛卧一床
以繩束其胸刺委中大出血先令以手揉其目瘤上

雙

百

亦刺出雀巢立平出戶壽之大驚戴人曰人之有技
可盡窺乎 郢城戴人之鄉也一女子未嫁年十八
兩手背皆有瘤一類雞距一類羊角腕不能釧向明
望之如桃膠然夫家欲棄之戴人見之曰在手背者
為限瘤在面者為粉瘤此膠瘤也以鉗鍼十字刺破
按出黃膠膿三二匙立平瘤核更不再作婚事復成
非素明者不敢用此法耳

清上消鬱湯 治痰火氣血鬱結作核成瘤脉弦而
滑在上部者

昆布 洗

玄明粉

陳皮

陳皮

半夏 薑製

黃連

海藻

莪朮

川芎

香附

青黛

白芥子

右薄荷煎服

解下除濕湯

治濕熱鬱結血氣凝滯作核成瘤在
下部者

海藻 洗

黃礬

三稜

香附

青皮

梔子 炒

連翹

積殼

木通

右薄荷煎服

南星散

治皮肩腫痛大者如拳小者如栗

嬰留

嬰留

或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸
多致不效

生南星 大者壹枚

右細研爛入好醋五錢點杵如膏先以細針刺患

處令氣透起以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效

枯稻膏 治六癰癩痔漏如無此膏以鐵罐膏代之更捷

草烏 肆兩 川烏 壹兩 乾桑耳

桑朽木 各壹兩半 礬石灰 桑柴灰

蕎麥稽灰 各壹碗

右將草烏川烏桑耳桑朽木共燒成灰和礬石灰

桑柴灰蕎麥稽灰一處裝入酒漏內以棕塞其

竅用水二斗煎滾淋汁慢火熬濃以十碗取一碗

為度以厚實磁器收貯密封固如用入礬石灰調

勻為糊點瘤頂上以濕紙數重貼藥上如若未乾

不須貼若留久藥乾以唾調塗直待十分黑腐以

刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却

用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀後却以

膏藥貼之去盡腐肉為度

井金散 治六癰癩大有神效

土黃 叁錢 礬砂 生晒乾 雄黃 各貳錢

瘡癤

輕粉

朱砂

乳香

沒藥

各壹錢

麝香

片腦

各少許

爲末以唾調爲稀糊塗瘡頂上唾濕紙兩重蓋之
後用黃龍膏貼紙上間日一度上藥次添藥徹的
周廻大如韭葉如此上之無復漸漸折之後根搖
自然有裂疊隨後自下來若腐肉未去盡者揆針
頭散於瘡口腐肉上貼膏藥一日一換直待腐肉
去盡爲度

造土黃法

信石

生貳兩

礶砂

生貳錢

木鱉子肉

巴豆肉

各五錢

右以信礶研末以木鱉巴豆搗成膏入石腦油和
作一塊油紙數重包裹埋於土坑內四十九日取
出磁器收貯聽用如無石腦油亦可

黃龍膏

涼肌退腫

黃蘗

黃芩

大黃

右末蜜水調爲糊餅貼紙上

又枯癩方

砒

礶砂

黃丹

雄黃

輕粉

各壹錢

硃砂

瘡癤

外科

百七

乳香

沒藥

各錢

蟹螯

生用

參拾箇

右研為末糯米粥為丸捏作棋子樣爆乾先灸破
瘤頂三炷以藥餅蓋上用黃檗末以水調貼之數
日自然枯乾落下

一方以銅綠為末草刺溜破搽上以膏藥塗之
世點溜贅方神驗

桑柴灰

棗樹灰

黃荆灰

桐殼灰

各貳升半

右以沸湯淋汁五碗許澄清入蟹螯肆拾箇穿山
甲伍片乳香腦子不拘多少約伍碗煎作貳碗用

磁器盛之乳香腦子候冷入之後臨用時入新石
灰調成膏神妙傳溜上乾以清水潤之其效如神

龍骨散

生肌肉

訶子肉

龍骨

細茶

各等分

右末乾揆

麻藥

南星

半夏

川烏

川椒

石灰

草烏

各等分

右六味各生為末醋調塗瘤上用藥則不痛

止血藥

瘦瘰

京墨煨

百草霜各等

右為末揆之即以手按任

桃紅散止血大効

石灰拾兩

麻油

大黃伍錢水浸透取汁各

右將石灰炒紅入麻油大黃汁和勻慢火炒如桃

花色磁器收貯聽用

瘦瘰諸瘦惡氣男左灸拾捌壯右拾柒壯女右灸拾捌壯左拾柒壯

又法 天府拾柒

衝陽隨年

甲瘦天窓一作天窓干及臍會土之瘦瘰氣舍主

之

本事治果報面生贅瘤方用艾丸灸拾壯即用醋磨

硫黃塗紙上剪如螺螄掩于大臍所灸處更用膏藥

重貼二日一換候痒擠出膿如紫豆粉即愈硫黃羅

謙甫作雄黃

肝膽少陽經風熱而燥或怒助肝火或濕氣所致蓋肝熱木相腎氣不榮故精血不流而面黃九滋腎水以生肝血為善若用雄黃

在為未發之時以手按之

此紅收止而大動

石炭 餘兩

藥用生肌黃

重韻一日一辨新藥出類收其味似愈黃

黃全原上真收神靈子入眼而炎退更用膏藥

本藥心果辨由土贊部以真艾其炎合長明用醋藥

及醫會十之

腕 腕音休俗呼 雞眼子是也

手太陽之别名曰支正上腕五寸虛則生腕小者指

痂疥取之所別也 肘後方手足生腕目鹽傳之舌

舐之只三次瘥 初虞世方用雞胃中食指腕上指

餘者以石壓之驗 鬼饅頭尖上指破有白汁出頻

拭之佳

薛耽屬肝膽少陽經風熱血燥或怒動肝火或肝客

淫氣所致蓋肝熱水涸腎氣不榮故精亡而筋纏

宜以地黄丸滋腎水以生肝血為善若用蛛絲蠶

娘蝕著艾灸必多致誤大抵此症與血燥結核相同

故外用腐蝕等法內服燥血消毒則精血愈虛肝筋受傷瘡口翻突開張卒成敗症 府庠朱宏仁年二十右手背近中指患五朮中一大者如黃豆餘皆如聚黍拔之如絲長三四寸許此血燥筋縮用清肝益榮湯五十餘劑而愈 府庠沈姬文幼齧指甲及長不能自禁余曰此肝火血燥也又頸側常生小朮子屢散屢發又臂生一塊如棗豆大若觸碎如斷束縷扯之則長縱之則縮後兩鬚發白點求治余曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪為筋之餘膽行入身之側正與齒爪生朮等症相應須滋補腎水以生肝

膽則諸病自愈矣乃與六味地黄丸服之二年白點自退朮亦不生 一男子臉患朮初如赤椹雜用敷貼之藥翻張如菌又用腐蝕熨大如瘤此足三陰經虛症悉具治以補脾肺生肝腎等劑而尋愈 一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應尤以為血鼈服行氣逐血之劑後手背結一朮子漸長寸許形如鼈狀肢節間如豆大者甚多彼泥鼈生子發於外亦用行氣逐血證悉至左尺洪數關肌洪數弦余以為腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味地黄丸生腎水滋肝血三月餘諸證悉愈

一男子因勞役過度面色青黑發熱咳嗽面生脫子
腹內一塊攻上攻下作痛口乾小便祕澀服消尅之
藥愈甚察其脉左右關俱弦洪元氣弱甚此肝脾受
病而筋攣也投以加味道遙散合地黃丸料元氣遂
復若誤以爲血鼈之類消之必致不起 一男子素
膏梁醇酒先便血便結驚悸少寐後肛門周生小顆
如脫子如鼠乳大小不一用清熱消毒等藥半載之
間腿內股亦然又用化痰之藥寒熱吐痰頸間俱作
肝腎脉浮數按之而弱余以爲是三陰經血虛火熾
法當滋化源彼不信別服四物黃蘗知母之類諸症

蜂起此胃氣復傷各經俱病也先用補中益氣湯三
十餘劑諸症漸愈乃朝用前湯夕用八珍湯又各五
十餘劑諸症尋愈於是夕改用六味丸加五味子又
半載諸症悉愈 一婦人左手背并次指患五六枚
如熟椹內熱晡熱月經素不及期余曰此因肝脾血
虛而有熱也當調補二經使陰血生而諸症自愈不
信乃用艾灸手腫脹發熱手背皆攣兩脇項及胸乳
間皆患脫經行無期余用加味道遙散少加炒黑黃
連數劑漸愈乃去黃連更佐以歸脾湯其患漸愈又
百餘劑經行如期再用地黃丸三料而痊 一婦人

小腹內一塊或時上攻或時下墜寒熱胸痞小便淋瀝或用行氣化痰等劑前證愈甚月經兩月餘而一行或以為內有肉贅啖其血而經不行服驅逐之劑下血甚多兩手背結一疔如大豆許兩月漸長寸許又兩月餘又患數枚疑以鼈子行於外仍行驅逐兩耳下各患腫又疑為瘡毒余曰此屈肝火血燥也用加味道遙加味歸脾一藥兼服佐以六味丸三月餘而愈一婦人患之用蛛絲纏元花線螳螂啖毒藥蝕着艾灸大潰腫痛發熱出血余曰此陰血虛也不信仍服降火之藥而歿

痣

世取痣餅藥

糯米 百粒

石灰 拇指大

巴豆 參粒去殼研

右為末入磁瓶同窰三日每以竹簽挑粟許點上自然蝕落

潔取靨

風化石灰 壹兩 花碱 半兩

右為細末上三次如天色冷濕用

衍石灰水調壹盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有

黑屬子及紋刺者微微以針頭撥動置藥少許於其上經半日許屬汁自出剔去藥不用且不得着水二三日愈 又方用水蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

自然蟾蜍

或為末入磁瓶同窖三日再以竹簽淋粟指濕土

蘇米 百錢

豆豉

豆豉

搗碎去

此類藥

蘇

手足皸裂

夫秋冬風寒燥烈人手足為之皸裂者血少肌膚虛故易傷也外潤以膏澤內服益氣和血之藥可也

東垣潤肌膏治手足皸澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠千歷青 壽兩

白黃蠟 捌錢

乳香 貳錢

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鍋內隨

手便下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青

盡溶開微微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥

用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟

硬合宜用新綿濾淨入水中折疊扯之以白為度

手足皸裂

小引

頁

油當旋旋入勿令乾了以篋器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之自然合矣

東垣老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴裂甚痛兩手不能執轅足不能履地而車上宿制此藥傳之即效明日遂行自後屢用屢效故錄於此

初虞世治手足皴裂春夏不愈者

生薑汁

紅糟

白鹽

豬膏臘月者佳

右研爛炒熟擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再用即安

丹手足寒皴裂合椒三四合煮浸半食頃須更再浸又傳以羊豬髓腦甚妙梅師方

世治脚跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮落爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗皴裂令軟傳其上即安一方加水粉

山脚裂爛蒸蒜研成膏傳之

世用五倍子為末同牛骨髓填縫內即好
又治脚指縫爛瘡搗時取鵝掌黃皮焙乾燒存性
為末濕則搽之 一方用生桐油塗之妙
黃蠟膏 治冬月手足坼裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎
熔入光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以
熱湯洗火上烘乾即用藥傳以紙貼之其痛立止
入水亦不落若合藥入粉多則硬而成塊旋以火
灸動挑傳不妨一方無五倍子

凍瘡

子和經曰寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不愈者用
野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢
厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計
壯數以泥乾為度去乾餅子再換濕餅子灸不問多
少直至瘡亦覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗
漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗
刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傳
之如夏月醫之更妙

世足跟紅腫凍瘡 足跟左足指面後跟赤白肉際

河灸卷
朱壯

足跟凍瘡潰破用蔥椒湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傅之效

禹錫取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出粗丹煎成膏塗凍瘡及拆破瘡

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

丹治凍瘡用煎熟桐油調蜜佗僧傳

爛痛

如神散羅氏治凍瘡皮爛痛不可忍用川大黃不拘多少為細末新水調掃凍破瘡上痛止立效

下和戴人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸濟川散大下之遂愈人或疑之戴人曰心火降則寒消何疑之有

雉腦膏 治凍瘡久不瘥年年發歇先痒後痛然後腫破出黃水及血出不止

雄雉腦壹枚研爛

黃蠟各等分

清油減半

右同於慢火上熬成膏去滓入瓷器中盛每用塗瘡上

栢葉膏 治凍瘡手足指欲墮及耳欲落

栢葉

炙乾為末肆兩

杏仁

去皮研拾个

頭髮

壹拳大

凍瘡

沙... 夕禾五

食鹽半兩

乳香貳錢

黃蠟壹兩

油壹升

右先煎油沸次下前五味藥待髮盡再下黃蠟攪
勻磁盒收先以熱小便洗瘡以綿挹乾後以藥塗
即以軟帛裹勿令寒氣侵入每日一換如瘡漸差
三四日一換

橄欖散 治脚凍瘡

右用橄欖核燒灰存性為末入輕粉油調塗
一女年數歲嚴寒上京兩足受凍不仁用湯泡漬至
十指俱爛牽連未落予用托裏之劑助其陽氣自

潰脫得保其生此因寒邪遏絕運氣不至又加熱湯
泡漬故歿而不痛也余嘗見人之嚴寒而出凍傷其
耳不知痛痒若以手觸之其耳即落當以煖處良久
或熱手熨之無恙若以火烘湯泡其耳即死至春必
潰脫落矣北方寒氣損人若此可不察之

賞辨恭矣此大寒廉價人者此口不察之
 如煎手處之無恙味以火熱處其耳咽至春必
 耳不暖而寒若以手攤之其耳咽亦當以熱氣其
 耳責以火而不融也余嘗見人之耳寒而出寒其
 費則持其耳此因寒深也雖廉不至又或熱也

漆瘡

聖濟總錄治漆瘡諸方

生柳葉三斤冬用皮煎湯適寒溫洗之

芒硝五兩湯化浸洗之

豬膏一味熬去滓停冷塗貼之

生螃蟹一味取黃塗傳日三五次

荷葉燥者一斤煮水洗之以貫眾末搽之乾則油

和塗

鷄子黃塗瘡上乾則易之不過三次

黃櫨木煎湯頻洗之

一方穀精煮成末之

又方用白礬煎湯浸洗

又方用杉木煎湯洗之效

又方用莽艸葉煎湯洗

又方用無名異末水調傅

又方用羊乳傅之愈亦治蜘蛛瘡飲之尤妙

治漆瘡凍瘡犬咬瘡並用秫米嚼爛塗傅

治漆瘡久不差用漆草搗爛傅患處立效

漆瘡

發瘰

瘡瘍發瘰因氣血虧損外邪所搏或內虛鬱火所致其形牙關緊急四肢勁強或腰背反張肢體抽搐其有汗而不惡寒者曰柔瘰風能散氣故有汗也其無汗而惡寒者曰剛瘰寒能瀆血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍產後多患之乃敗症也若大補氣血多有復生者若作風治速其危矣 秋官張同野舊有流注因暴寒睡炕口目抽搐手足戰掉余以為氣血虛熱而然用參芪歸朮川芎山梔柴胡半夏天麻炙甘草治之愈 吳瞻之

給事墜馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞶筋惕或作
破傷風欲發汗驅風余曰此亡血火動也無風可驅
無汗可發當峻補其血用聖愈湯二劑頓愈又用健
脾胃養氣血而全愈 一儒者背瘡將愈發熱煩躁
自用降火之劑項強口禁自汗惡寒此汗多內亡津
血筋無所榮也用補氣血之劑及地黄丸而愈 一
男子素勤苦早行遍身發疥瘡口禁目直脈弦緊此
勞傷氣血內熱外邪所搏也用補中益氣加山梔羌
活川芎而瘥半載後遍身作痒搔破成瘡發熱作渴
脈洪大而虛復以前湯加芍藥麥門熟地天麻而愈

一儒者善怒患瘰癧復因大怒跳躍忽仆地兩臂
抽搐唇口喎斜左目緊小此肝火血虛內熱生風用
八珍散加牡丹皮釣藤山梔而愈次年春前病復作
兼小便自遺左關脈弦洪而數余謂肝火血燥用六
味丸加釣藤五味麥門芎歸治之漸愈又用補中益
氣加山梔釣藤牡丹皮而安 一癩婦因怒仆地瘡
口出血語言蹇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿或
用驅風之劑六脈洪大肝脈尤甚此肝火熾盛也用
加味道遙散加釣藤及六味丸尋愈 一婦人患內
痔因勞出血甚多不時發瘕飲食少思形體倦怠其

癩瘕

百七

面色白余謂此氣傷而不能統血也用補中益氣湯
反寒熱出血此陽氣虛寒也仍以前湯加炮薑四劑
寒熱漸止飲食漸進又四劑而血頓止後因勞役或
怒氣即便血或發瘧投以補中益氣湯加釣藤而愈
一婦人素性急患遍身瘙癢或項間結核常服搜
風順氣之劑後大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時
自遺此怒動肝火而血妄行也用小柴胡湯加山梔
牡丹皮而愈 一癰婦因勞兼怒四肢攣屈頭痛自
汗小便短少畏見風寒脉浮弦緩此氣血虛而風寒
濕熱相搏也先用東垣清燥湯漸愈再用加味道遙

散及八珍湯加牡丹皮而痊 一婦人素有肝火兩
脇間或腫痛或寒熱忽然昏憤瘈瘲抽搐善伸數欠
四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚而血液衰少也用
清燥丸六味丸兼服尋愈 一婦人因大勞患癰瘡
發疔瘡搔碎成瘡日晡熱甚或口噤發搐或頭目眩
暈此肝脾氣血虛而內熱以八珍散加柴胡山梔治
之諸症少愈復因怒前症復作經行不止此肝脾血
熱用加味道遙散漸愈又用八珍散加柴胡山梔而
痊 一婦人發疔瘡日晡熱甚月經先期或頭目昏
眩或寒熱發熱或四肢抽搐此肝經風熱血燥用加

條
卷
小
百
七
一

味道遙散治之尋愈後因怒前證復作口禁遺尿此
肝火血燥也用加味小柴胡湯治之漸愈又夜間發
熱譫語此血分有熱也用小柴胡湯加生地而愈更
用加味道遙散調理而安一婦人患齒唇月經先
期余以為肝火血熱不信乃汎用降火之劑反致月
經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不隨六脈洪大面
目赤色用八珍加五味山梔丹皮麥門數劑漸愈蒸
用逍遙散六味丸料各三十餘劑全愈一婦人經
行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涌抽
搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡加熟地黃山梔

子釣藤鈎而愈一婦素陰虛患遍身搔痒誤服祛
風之藥口噤抽搐肝脈洪數余曰肝血為陰為水肝
氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝
火遂用四物麥門五味柴胡山梔生草熟搖頓止又
以八珍加黃芪麥門五味釣藤炙草調理而愈一
婦人久患流注脾胃虛弱忽痰壅氣喘頭搖目劄手
揚足擲難以候脈視其面黃中見青此肝木乘脾土
也用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加
半夏茯苓而安

半夏茯苓而安

此用六香以柴胡長根氣之清頗更以蘇中益康
風之藥口禁由熱用和共燒余曰用血為金為水根
干而難而食 一微素金重思感良蘇藥器用却
風之藥口禁由熱用和共燒余曰用血為金為水根
干而難而食 一微素金重思感良蘇藥器用却
風之藥口禁由熱用和共燒余曰用血為金為水根
干而難而食 一微素金重思感良蘇藥器用却
風之藥口禁由熱用和共燒余曰用血為金為水根
干而難而食 一微素金重思感良蘇藥器用却

類破傷風

破傷風方論已載雜病第五此其似是而非者爾
薛大凡癰疽潰後筋縻肉爛膿血大泄陽隨陰散或
筋脉拘急惡寒惕搖甚者舌強口噤項背反張痰涎
壅盛便閉汗出不時發熱此氣血俱虛而傳變雖與
破傷風相類而主治之法當大補氣血若果係風症
亦須以大補氣血為本而兼以治風之藥設若不審
是非而妄藥之則誤矣 司徒邊華泉肩患癰潰而
發熱目直或囁殊類中風日晡熱甚脉益數此足三
陰氣血虧損虛火妄動用參芪歸朮炙草加酒炒黑

黃檗五味麥門肉桂四劑而愈又數劑而斂 陸大
 行背瘡內潰出膿二盞許用托裏之劑痛止腫消停
 藥忽寒熱作渴頭痛自汗此元氣虛而未能復也用
 十全大補加麥門五味肉桂二劑益甚診其脈如故
 此藥力未及仍用前藥加附子一錢三劑諸症悉愈
 乃去附子加肉桂數劑而斂 一儒者患腿癱深蓄
 於內肉色不變久不穿潰針出膿瘀五椀許惡症駢
 臻全類中風此脾胃虛而變症也用六君子加當歸
 炮薑及聖愈湯各四劑而安又勞心不寐用歸脾湯
 而愈 一儒者傷寒後患流注腫痛潮熱用十宣散

敗毒等劑出稀膿五六碗許發熱惡寒煩躁作渴殊
 類破傷風症而斂 一男子背瘡未痊斂以膏藥剪
 孔貼之患破傷風症而斂此先失於內補外邪襲其
 虛耳余見此症貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷
 風搽斂藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致斂者
 多矣可不慎哉

受天四不刺結

風熱爛藥玉用始其外且而又用其籍毒以逐逐皆
五耳余原批其其膏藥復其其飯康而又患如
下想之想其風武而發此夫公內斷收深頭其
詳如風武而發一畏子背脊未登煥以膏藥
如毒者隨出蘇則五六痲精幾幾惡寒與熱刺或

水入瘡

皂子散 治水毒入瘡腫痛或刺入骨者

皂莢下米粒 大乾蝦蟇壹枚 胡椒拾伍粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出
研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾擦藥次以
別膏藥貼之良久水盡出有刺者即自見

鉛丹散 治破傷入水腫潰不愈

鉛丹 蛤粉等分

右同炒令變色擦瘡口上水即出漸愈

去水膏 治癰疽破元後誤入皂角水及諸毒水以

水入膏 馬王八膏

致疼痛及驢馬屎糞一切毒水入瘡並治

糯米粉

砂糖各叁兩

甘艸生末壹分

右為膏攤在絹上貼毒水出效

馬汗入瘡

治馬汗入瘡毒氣攻腫痛方

右用馬鞭上手執處皮燒灰研細和豬膏塗瘡上

一方以馬鞭稍燒灰豬脂和塗瘡上

治驢涎馬汗入瘡

右用乾冬瓜燒灰洗淨瘡上擦藥在內一方用冬

瓜青皮陰乾為末傅之

瘍醫準繩卷五

