


衛生家寶

卷第三



第三策

衛生家寶卷第三

凡七門

傷寒方貳拾陸道

中暑方壹拾道

瘧疾方拾肆道

中惡諸疾方肆道

諸嗽方叁拾道

諸痰飲方拾柒道

吐血咯血等疾方拾陸道



衛生家寶卷第三

治傷寒

六 神仙截四時傷寒加減百解散無問陰陽二證  
其間所用藥味各隨經絡治病如傷寒在表  
未傳入經發熱惡寒腰脊強痛連進二服汗  
出而愈若已傳經絡胃滿短氣肢體煩疼目  
睛微痛耳聾口燥咽乾或渴不渴手足自溫或  
肢厥自利或不自利小便反快服之則調中順  
氣祛逐寒邪如頭面感寒風傷膝理頭痛項  
強發熱增寒鼻流清涕咳嗽涎痰及又治風

濕相搏骨節煩疼肢體沉重洒浙惡風時自汗  
出此藥大能調順三焦解表救裏溫潤肺經正  
四時之氣升降陰陽進美飲食不問傷風傷寒  
中暑中暍骨蒸頭疼氣逆胃滿失飢吐逆眩  
暈惡心及已經汗後不解下之不當吐之不中此  
藥清而不涼溫而不壅無問老人虛人丈夫  
婦人孕婦小兒並宜服之如連進二服無不取  
効春常服免瘟疫之疾夏常服不中暑暍之  
病秋服之即無瘧痢冬服之不感寒毒真神仙

衛生妙藥也功效不可盡述每服三錢水一盞  
半入生薑三大片棗子二箇同煎至一盞去滓  
熱服不拘時候日進二服如要發散加葱白三  
寸淡豉三十餘粒同煎熱服以衣被蓋覆汁  
出而愈

柴胡

洗去蘆頭

昇麻

用輕者

乾葛

有粉者

白芍藥

白朮

剉碎焙乾

防風

去苗

甘草

羌活

去蘆

獨活

用川中者

藁本

去蘆

半夏

湯洗七次切片子薑汁浸一宿次日再炒乾用

人參

去蘆頭切片子焙

半夏

藿香

揀梗去土

蒼朮

米泔水浸一宿次日漉出控乾切作片子再用麩皮炒乾節去麩皮用之

白已上修事了各秤一兩

立春已後不須加減

立夏已後每一料加柴葫一分赤茯苓當歸

各半兩

立秋已後減柴葫當歸赤茯苓三味只加

麻黃去節半兩乾薑一分炮官桂

去皮不見火用一分

立冬已後並無加減

四時正氣百解散治男子婦人四時傷寒人般

痞氣山嵐瘴氣熱病頭疼渾身壯熱增寒或

中暑或風疾灌注手足虛腫痰實噎塞十種

隔氣不思飲食不問百病纔覺意思不快便

先進一二服無不尅効婦人產前產後及小

兒一歲有病皆可服

白木二兩

茯苓二兩

藿香葉二兩

去土

陳橘皮

去穰

甘草

炙

半夏

擘開薑汁製

梓州厚朴

去皮薑汁蘸炙

已上四味各三兩

右七味先將厚朴半夏搗為麤末用生薑四兩爛研同厚朴半夏一處拌和令勻於淨器中  
 罨一宿次日焙乾却入前五味藥拌和令勻並搗為麤末每服三錢水一盞半生薑五片煎至六分去滓熱服如傷風併喫二服常服寬中進食或冷物傷脾臟腑不調並皆治之神功不可具述  
 來蘇散治男女五勞七傷增寒壯熱骨節痠疼口舌乾苦四體骨蒸傷寒頭疼背膊勞倦

膈胃煩壅多睡昏沉或時咳嗽面無顏色小便黃赤婦人血風勞大宜治之

甘草

焙搗粉去滓秤

肉桂

去皮不近火

桔梗

淨焙乾秤

防風

淨洗焙

五加皮

淨洗焙秤

赤芍藥

淨洗焙秤

荆芥穗

別輕焙

柴胡

去蘆淨洗焙

乾葛

焙搗節粉去滓秤

白茯苓

已上十味各一兩

麻黃一兩半

去節秤

陳橘皮一兩半

去白焙秤

右須州土新好者焙乾搗羅為末每服二錢薑三片烏梅棗子各一枚水一大盞煎至七分去

○  
滓熱服日一二服善解勞倦及不染山嵐瘴  
氣時行傷寒如傷寒壯熱頭疼連進二三服  
稍輕調理日一二服並不拘時候

聖僧散治時行一切傷寒不問陰陽不拘輕  
重應老幼及孕婦皆可服

香白芷一斤生

甘草半斤生

右二味焙乾碾為麁末每服二錢水一盞棗子  
一枚生薑三片葱白三寸同煎至六分熱服用衣  
被蓋覆如人行五六里更進一服汗出即愈此藥可

卜病之好惡如煎得黑色或悞打翻即難愈如  
煎得黃色無不愈者煎藥之時要在志誠

保真湯治傷寒時氣瘟疫陰陽未分及感  
風體倦頭痛身熱一名神木散

蒼朮一斤

米泔浸一宿  
去皮切焙

川芎四兩

藁本二兩

去髮頭  
秤

甘草一兩炙

右為麁散每服三錢水一盞半薑三片棗子一  
箇煎至七分去滓通口服不拘時候如久傷風  
不解如葱白一二寸同煎尋常感風只三服立愈

仙授散治傷寒三日內無問陰陽二證但得脈浮皆可服

蒼朮四兩

半泔浸一宿去皮洗淨乾秤

麻黃四兩

去節

香附子四兩

炒去毛秤

甘草二兩

生用

杏仁

去皮尖及雙仁者

右為末每服三錢白湯調服如人行五里間連

進三服避風如出一服出汗不須再服

香芎散大解傷寒瘟疫

香附子

去毛并黑皮三兩

川芎

香白芷

甘草

各一兩

藿香葉二兩

石膏

研粉一兩半

右為末每服二錢熱酒調下戰食其藥口苦甘草

治時氣瘟疫傷寒渾身壯熱四肢疼痛汗與

未汗但是陰陽二證皆可服普救散

蒼朮

緊實小者逐日換新泔浸三日去皮焙乾四兩

甘草一兩半

生用

乾葛一兩

坐

右為細末每服二錢水盪煎至七分熱服不拘

時或只入葱湯調下亦可服藥訖欲出汗以衣

被覆之

蒼朮散治傷寒一日二日已前通毒氣令散

蒼朮四兩 去黑皮泔浸一宿 甘草一兩半 炙

香附子二兩半 炒 甘草一兩半 生用

右為末每服二錢水中盞入葱白三寸淡豆豉三

粒同煎至七分熱服不拘時候併三服汗出為効

神白散治四時傷寒在表渾身壯熱口苦舌乾

惡風無汗

蒼朮 米泔浸一宿去皮焙乾秤一兩半 麻黃一兩 去根節

甘草一兩 炙 防風一兩 去芦 石膏一兩 研

乾葛一兩 川芎一兩 香白芷半兩

瓜蒌根半兩

右為末每服二錢水一盞入生薑三片葱白三寸煎

至七八分熱服如傷風身熱面赤脉大以衣覆出

汗即愈

人 加減香薷散治時氣瘟疫四時傷寒頭痛壯

熱惡風無汁

香附子一兩 炒去毛 陳皮半兩 浸去穢秤

甘草三分炙

紫蘇一兩

去梗

麻黃一兩

去節

艾蒼木半兩

清泔浸三宿  
去皮乾秤

桔梗一分

去芦  
炒

右為麤末每服四錢水一盞煎七分去滓

溫服不  
拘時候

人參奪命散無問陰陽二證傷寒日子深淺

差誤服藥而成壞證垂死者服之再生

人參二兩

緊實  
者

右為麤末分兩服生薑三片水一盞半煎至七

分通口服一時辰間連進三服覺鼻上汗出無

不即活

藥散當作服

芎朮散解截四時傷寒或已病四五日表裏未分

亦可脈

川芎

甘草

微炮

升麻

香附子

白芷

羌活

艾蒼木

人參

當歸

白芍藥

各等分

右十味以咀每服四錢水一盞生薑四片煎至七分

去滓稍熱連進二兩服熱漸退脈緩頭輕為効

治初覺傷寒身熱頭痛昏重未辨陰陽夾食

及傷暑等證

辯傷寒證

陳皮

水浸去白二兩

生薑

槌碎不去皮四兩

右以水四碗煎一碗半每服一盞通口併服

加減正氣散治傷寒傷風不問表裏但連進二

服立効

藿香葉

半夏

研細用薑汁搜和炙黃

厚朴去皮

姜炙

陳皮

去白

甘草炙

已上五味乃為方正

亦氣散

再加白茯苓 草菓子仁

右各等分細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇

煎七分食前稍熱服

麝香散治運血不歸肝元或吐逆或便血大安心

胃并治傷寒吐不止或小兒吐此方累試

人參

白茯苓

芎藭

各半兩

麝香一錢

研

藿香葉一分

薰陸香二錢

辰砂一分

丁香一錢

新者不可見火

右為末每服一錢薄荷菓子湯下小兒半錢薄

荷蜜湯調下

尅効交泰聖餅子治結胃傷寒脈浮不可下下

之必死宜用此方

黃連

七寸

巴豆

十四粒  
連皮用

一方加大黃末一錢

右同搗成末津唾調捻成餅子安臍中以艾炷灸藥上候熱透腹中其氣自下即止此法十用

十全大補膏一錢

薑黃膏一錢

黃連膏一錢

治結胃糖灸法

胃中水糖不拘多少置病人胃上其糖乾再塗

病愈則止

真仙濟急解危救死奪命辨證差誤立驗少

効治傷寒辨證

傷寒無治法仲景止言調理身涼無汗墨舌白

刺大腸堅閉者乃是陽證便以大承氣湯下

之不汗自愈只喫一服未通再服其後只服

四君子湯和氣等藥。發狂止服至寶丹白

湯化孕婦亦可脉之。脉病人不病不躁不

渴即是陰證並以薑附湯入沉香煎頓服次

服聖散子藿香正氣散。吃逆用乾柿蒂七

枚煎湯呷之發厥厥冷脉細氣短即加白沉

香散黑錫丹極則臍心着灸。汗後飲水即  
結胃捻着覺痛切不可下止以交泰餅子一  
枚安在臍心裏坐艾炷於其上灸之俟臍通  
周迴汗出爲度當時結胃氣下不用服藥  
不得喫水交泰餅子方具在前。時氣瘟疫  
頭痛咽喉疼冷咯痰者是纏喉風證誤作  
傷寒治之即死止用此三方。白僵蠶爲末  
每服三錢生薑自然汁調服。膽樵爲末用  
竹管吹在喉中。青鑲子皴面草同生薑并

少蜜爛研含化之

李子子建傷寒十勸

傷寒頭痛又身熱便是陽證不可服熱藥。傷  
寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不疼身  
不熱少陰病有反發熱而無頭痛厥陰病有  
頭疼而無發熱餘發熱即是陽證若醫者妄  
投熱藥決死

傷寒當直攻毒氣不可補益。邪氣在經絡中  
若隨證攻之三四日痊愈醫者必謂先須正

氣却行補益使毒氣流熾必多致殺人  
傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥。傷寒不思  
飲食自是常事終無餓死之理如理中圓之  
類亦不可輕服若陽病服之致熱氣增重或  
至不救

傷寒腸痛亦有熱證不可輕服暖藥。難經云  
痛爲實故仲景論腹滿時痛之證有曰痛甚  
者加大黃夫痛甚而反加大黃意可見也唯  
身冷厥逆而腹痛者方是陰證須消息之每

見醫者多緣腹痛便投熱藥而殺人  
傷寒自利當看陰陽證不可例服補暖及止瀉  
藥。自利唯身不熱手足溫者屬太陰身冷  
四逆者屬少陰厥陰外其餘身熱下利皆是  
陽證當隨證依仲景法治之每見醫者多緣  
下利便投暖藥及止瀉藥而殺人  
傷寒胃脇痛及腹滿不可妄用艾灸。常見村  
落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火  
而盛膨脹發喘以死不知胃脇痛自屬少陽

腹脹滿自屬太陰此外惟陰證可灸  
傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證治  
有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投熱  
藥殺人速於用刃蓋陽病不至於極熱不能  
發厥仲景所謂熱深則厥是也熱深而更與  
傷熱藥寧復有治之理但看初得病而身熱至  
三四日後熱氣已深大便秘小便赤或譫言  
昏憤及別有熱證而反發厥者必是熱厥也  
宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大便

不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見熱  
證而厥逆者即是陰厥也方可用四逆湯之  
類二厥所以使人疑者緣其脈皆沈然陽厥  
脈沈而滑陰厥脈沈而弱又陽厥者時復指  
爪却溫陰厥常冷此為可別

傷寒病已在裏即不可用藥發汗。傷寒病須  
看表裏如發熱惡寒則是表證宜發汗如不  
惡寒反惡熱即是裏證若醫者一例發汗則  
所出之汗不是邪氣即是真氣邪氣未除而

真氣已涸死者多矣。又有半在表半在裏之證，不惟皆不可下，仍皆不可汗，但當隨證治之。傷寒飲水為欲愈，不可令病人恣飲過度。病人欲飲水，當與之，以消熱氣。故仲景以飲水為欲愈，人見如此說，遂令病者縱飲，因而為嘔，為喘，為咳，逆為下利，為腫，為悸，為水結，胃小便利者多矣。且如病人欲飲一椀，只可與半椀，飲之常令不足為善。

傷寒病初瘥，不可過飽及勞動，或食羊肉行房事，與食豬骨汁及飲酒，病方愈，脾胃尚弱，食而過飽，不能消化，病即再來，謂之食復。病方愈，血氣尚虛，勞動太早，病即再來，謂之勞復。又傷寒食羊肉行房事者，並死人。食豬骨汁飲酒者，再病。

六 治傷寒陰證脫陽，或因大吐大瀉之後，四肢逆冷，元氣不接，不醒人事，或傷寒新瘥，悞與婦人交，其證小腹緊痛，外腎搐縮，面黑氣喘，冷汗自出，亦是脫陽證，須臾不治，即不救。

葱白

炒令熟熨  
臍下次用

附子一箇

重七錢者  
剉作八片

白木半兩

乾薑半兩

木香一錢

右各剉碎用水兩椀煎至八分去滓放冷灌與服須臾又進一服兩服滓再作一服。如無前件藥只用單方。桂皮二兩用好酒二升煎至一升候溫分作二服灌與。如無桂皮只用連鬚葱白三七莖細剉就砂盆中研細用酒伍升煮至二升分作三服灌陽氣即回先更用炒鹽熨臍下氣海之所勿令氣冷為妙

不換金正氣散治四時傷寒五種隔氣和脾胃止吐瀉溫中下痰飲止腹痛脹滿吞酸噎痞噎塞乾嘔惡心內受寒濕外感風邪身體沉重肢節酸疼頭昏鼻塞未分陰陽之間尤宜服之則氣自正而邪氣退及能止汗解山嵐瘴氣八般瘧疾遍身浮腫五勞七傷或風氣所灌手足腫痛全不思飲食孕婦產前產後皆可服餌霍亂吐瀉心腹疼痛又治胃氣虛弱藏腑時鳴小兒脾胃不和時氣諸疾及治四方不伏水土凡過嶺南此藥不可闕

厚朴

去麁皮剉如菲葉闊長半寸  
枰二兩以生薑自然汁罨一宿

陳皮

二兩  
取紅

胃半夏

二兩湯洗七次以生薑四兩  
取汁浸向日攪候汁盡為度

甘草

二兩剉  
炒罨用

藿香

二兩取  
葉水洗

蒼朮

二兩去皮米泔浸  
一宿切作片子

草菓

生去皮  
二兩

右六味先用砂鍋炒厚朴令香次入蒼朮炒令紫

色又入半夏炒香熟又入甘草炒黃又入陳皮紅

炒破方始將藿香葉二兩斡開衆藥安於藿香

葉在中心用藥遍蓋罨定少時約藿香葉乾方

可取出同為麁末每服二大錢水一大盞生薑五片

棗子一箇煎至七分去滓空心服食前亦可常服

和一切氣永無瘟疫此乃不換金真方也煎時不  
得犯銅鐵器

霍夏和散補血益氣治虛勞少力

黃芪

熟地黃

當歸

川芎

各一兩

白芍藥

二兩半

官桂

甘草

各三分

右為麁末每服四大錢水一盞半生薑三片

肥棗一箇煎至八分去滓服此方止是建中

四物二方而已每傷寒瘧疾中暑大疾之後

虛勞氣乏者以此調治皆驗不熱不冷溫

而有補  
凡人皆以此散治中暑不省人事者服之立效

七珍散開胃養氣進食  
凡中暑不省人事者服之立效

凡人參  
白木 黃芪 蜜水 山芋 中

白茯苓 粟米 微炒 甘草 炙已上各一兩 生薑 同煎

右為細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七

分如大故不思飲食加白扁豆一兩蒸用名八

珍散此方溫平不熱每有傷寒瘧疾中暑得

差之後用此以調脾胃日三四服十日外飲食

倍常

治四時傷寒時氣神效散

龍蒼木

麻黃 去節

甘草

右等分為麩末每服五大錢水一椀煎至半椀

去滓溫服兩服滓再煎作一服不拘時候安即

住服 草一兩 烏梅一兩 白礬半兩

治時氣傳染

以雄黃用水磨塗鼻中雖臨看病人時不妨

如瀉霍亂作渴一服即愈雖平日不飲冷者亦可服

治中暑熱悶欲絕不知人事服之立效

而有補

七珍散開胃養氣進食

以熟黃用米湯塗鼻中驗諸香味人即不效

治胃虛齋菜米微炒甘草各一兩

每服細末每服二錢水一盞薑棗同煎至七

去積蠱脹兩服再煎并頭不吐即斷矣

治霍亂吐瀉每服一錢煎至半碗

治中暑吐瀉每服一錢煎至半碗

治中暑吐瀉每服一錢煎至半碗

治中暑

龍須散

治中暑吐瀉霍亂或伏熱在內頭旋目暈

身體壯熱發渴飲水並宜服之

甘草一兩炙烏梅一兩去核瓦上焙乾白礬石半兩生研

五味子一兩

右為末入白麩四兩同和勻每服一大錢新水調下

如瀉霍亂作渴一服即愈雖平日不飲冷者亦可服

治中暑熱悶欲絕不知人事服之立效

大蒜二大片  
研細

右以新汲井花水調下立活

地榆奪命散治中暑昏迷不省人事但心頭微

溫藥下即活

地榆兩 青皮兩 黃連兩

赤芍藥

右等分為末每服二三錢以新漿水調下無漿

水只用井花水若患瀉痢瘧疾及婦人患熱血

崩每服二三錢水一盞煎十數沸溫服

治中暑皂角燒灰存性為細末炙甘草為末等

分和勻每服一大錢米飲下

金露解毒元大治暑毒

船上明淨礬黃蛤粉已上各一斤右為末用連

皮生薑作片子取自然汁為元如彈子大陰乾

每服一元生薑薄荷研細入蜜一小匙新水調下

玉壺丹治暑氣

硫黃一分 寒水石一分 石膏煨

盆硝一分 甘草一分 菜豆粉各一兩半

太陰玄精石一兩

草

右細末蒸餅元如彈子大與生薑同嚼新水下

治暑毒黃龍元

黃連四兩

去鬚酒煮

半夏四兩

醋煮水淘洗淨

赤茯苓四兩

甘草二兩

微炙

右為末薑汁煮糊為元如梧桐子大每服三十

元至五十元溫水空心食前服

用新汲水下亦得

治中暑橘皮半夏湯此方王醫師傳云伏暑乃

痰在胃膈服此大有神効

陳橘皮六兩

去穰

白朮三兩

去芦頭

白茯苓三兩

人參一兩

枳殼一兩

去穰炒

當歸一兩

去芦頭

半夏三兩

湯浸洗七遍剉如米

甘草三分

炙

右八味除半夏外咬咀同拌勻每服三大錢生薑六

片棗二箇水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

飲靈圓治中暑神効

牛膽製天南星

無以法製半夏代

人參肉

茯苓

桔梗

乾葛葉

麥門冬

不去心

桂

去皮

紫蘇葉

極香者

甘草炒

已上各一兩

烏梅肉

餘甘子

去核二味各一兩半餘甘無以百藥煎代

右為末以夾絹篩過煉硬蜜和勻入臼杵數百下

先以酥塗曰杵

圓如櫻桃大生朱為衣常用一圓含化舌下

靈液澱澱湧出此藥大去水息除煩下氣老人

虛熱宜服此藥若躁渴嚼三二圓麥門冬水送下

此藥仍無藥石氣味

又一方

附子六兩

白朮三兩

白朮三兩

消暑毒水瓢圓

丁香枝杖

一兩

甘草

半斤

白梅肉

三兩為末

烏梅肉

一斤

紫蘇葉

去土三兩

檀香

半兩

麝香

一字

右為末蒸熟藥木瓜兩枚同蜜拌和為元如彈子大溫熟水嚼下不拘時候每服一圓

半夏

白茯苓

青皮

陳皮

枳殼

桔梗

紫此行發

水

交門火不去 桂去皮 紫蘇葉極香

甘草炒 已上各一兩 烏梅肉

子大量 燒水攪 下不 啉類 煎每 瓶一 圓

故為未熟熟 藥本以 兩分 同煎 料味 煎飲

沈藥 香嬰 飛大 生朱 為衣 常用一 圓含 化苦 下

靈藥 香藥 寒新 兩分 藥大 去豨 香除 腐下 氣老 人

虛白 蘇肉 兩分 湯酒 煎魚 蘇肉 去前 冬水 送下

此藥 香好 味一 兩味 甘草半

人皆 香毒 不微 圓

治瘧疾

附子湯治脾胃積冷瘧疾經年不差面色黃瘦

身體羸弱飲食不進危殆甚者以 止瘧

大附子一 箇

炮去皮 臍切片子

右用生薑十四片水三升煎至一升三合分三服

空心溫服

人

半夏湯治瘧疾及暑毒消痰逐飲

半夏湯泡

七次

服

白茯苓

青皮

去白

陳皮

去白

枳殼

去穰

桔梗

炒 各一兩

右為劉散每服三錢水一盞半生薑十片煎至七分去滓溫服

通神元治五種瘡疾熱多寒少諸藥不効者

神桃 一七箇桃木上自乾經冬不落者 黑豆 一兩

右巴豆 七粒去殼并心膜研細 煎至一丸三分三服

右為末以冷水和丸梧桐子大以朱砂為衣侵晨

面東念藥上菩薩七遍以井水吞下一元立瘥

生熟飲子治久患瘡一二服差

半夏 半炮半姜製 烏梅 半炮半生 厚朴 半生半姜製

草藁子 半生半炮 甘草 半炙半生 陳皮 半生半炒

右等分剉碎每服五大錢生薑七片棗子五箇水

二盞煎至八分去滓空心熱服

治一切瘡瘻久患瘡如神鰾魚甲湯

鰾魚甲 好醋炙透去裙襴 常山 烏梅肉

桂心 柴胡 去苗 知母各一兩

牡礪半兩 燒

右為麤末每服二錢水二盞煎至八分去滓發

前一服已發一服

七棗湯治久近寒熱諸藥不効者

大川烏一箇

於熟灰中制度須記移七處  
炮裂熟去皮臍研為細末

大北棗七箇

各畧  
擘破

老生薑

如當二錢厚  
切十片大者

右三味只作一服用水二盞煎至一中盞於臨發  
日早先將棗子喫盡次溫進藥汁須飲盡便  
藥濃也不妨

瘧丹

雄黑豆四伯粒

細者  
是

朱砂二錢

先研  
細

砒霜二錢

右先將黑豆用久年法醋浸五七日取端午日午時

至誠對聖修合勿令師僧女人雞犬猫兒見先研  
黑豆仍入朱砂砒霜同研細可元為度梧桐子  
大每服一元於發日忌腥羶俟臨發時前面向東  
方以新汲水吞下亦勿令師僧女人雞犬兒見  
若女人服者令丈夫拈藥安口中孕婦不可服如有  
久患不計年月者再服一粒忌食熱物半日  
交加飲子治一切瘧疾

肉豆蔻

草菓

甘草

厚朴

薑製

右等分為麤末每服二大錢水一盞東一箇生

案寒當作

薑三片煎至七分去滓溫服不計時服

溫脾飲治寒瘧兼脾久濕上焦噎塞不通止渴

進飲食

真陳橘皮伍箇

去穢

烏梅十箇

人參一分

大棗子二十箇

甘草五寸

草菓子七箇

生薑五寸

右件洗淨分作五服紙裹以鹽少許煨香熟去紙水一椀煎至一盞去滓溫服空心日午

治嵐瘴柴胡飲子

柴胡

常山

青蒿

甘草

秦艽

人參

茯苓

枳殼

炒

半夏

湯盪七遍

右各等分焙乾為麤末每服二錢用水一盞半烏梅三箇生薑五片煎取一盞去滓食後溫服逐日一服極妙切忌空心不得行路須是湯水白粥之類點心酒色不可太過忌四五月一過至九月十月一過不得喫柑子紫菜猪羊心并牛肉定被瘴

治山嵐瘴氣沃雪湯

案此方三四法  
雪湯去乳  
羊和朴消

蒼木

炮去麋皮

甘草

鹽擦炙各二兩

防風

細切

白芍藥

去皮

厚朴

去麋皮用生姜壓一宿然後炒黑色為度

乾葛

各四兩

朴硝

一兩半研

右為剉散每服四大錢水二盞煎至一盞半去滓

熱服不拘時候服畢少時薑葱作羹美或作粥

喫了避風坐卧身躰淑潤即愈兩滓又合煎服

寇相入朝湯衝冒霧氣春天不可闕服空窓進餌

沉香

木香

甘草

人參

茴香

肉苳蔻

草苳蔻

葶澄茄

各等分

右件為末每服一錢沸湯點入鹽少許

治山嵐瘴癘必効散

青橘皮

去白

陳橘皮

去白

常山

麥牙

神曲

地龍

去土

檳榔

苾萋

甘草

炙

秦艽 各等分

右為細末每服三大錢水一盞半煎至七分通口

服忌生冷鹹藏猪犬魚腥羊肉

治嵐瘴及一切瘧疾半夏草菓散

古半夏七箇

湯泡七遍每遍百沸候湯冷用手搓去滑

全青橘皮四箇

棗子五箇

右烏梅五箇

草菓子二箇

熟生薑兩塊

草菓大

甘草二寸

炙黃

右並洗淨爛搥碎同入碎瓶內用水一大椀以濕

紙蓋頭及此甬以文武火煮至一盞去滓通口

服又將滓再依前作一服煎更作一料作兩

服煎

治中惡諸疾

治尸厥其證奄忽死去四肢逆冷不省人事腹

中氣走如雷鳴返魂散

焰硝半兩 硫黃一兩

已上二味細研如粉分作三服每服用好舊酒一大

盞煎與見焰傾於盞中蓋着覺溫灌與服如

人行五里間又進一服兼灸頭上百會穴二七壯

兼臍下氣海丹田穴三百壯覺身體溫暖即止

進三服即醒 如無前件藥只用單方

案內服極  
取令陽氣  
為起者以  
六一五子  
段宜原  
手兵家

治附子一隻重七錢

右件炮熟去皮臍碾為細末分作二服每服用酒三盞煎至一盞溫服如無前藥只用生薑自然汁半盞和酒一盞煎令百沸併灌兩服亦依前法用灸也

治中忤中惡鬼氣其證昏黃暮夜或登廁或出郊野或閑遊空冷屋或人不至之地忽然眼見鬼物或鼻口吸着惡氣驀然倒地四肢逆冷兩手握拳或鼻口出清血性命逡巡須臾不救此證與尸厥

同但此證腹不鳴心脇俱暖犀鹿射散

犀角半兩細剉研為末 鹿射香一分研 朱砂一分研

已上三味為細末和勻每服二錢井水調嚙服如無

前件藥只用單方雄黃為末每服一錢煎桃

枝葉湯下如無雄黃只用故汗衣或觸衣汗衣者着

在身上多時久遭汗者佳觸衣者久着 燒灰每服二

錢百沸湯點嚙服中惡驀然倒地切勿移動

其屍即令親戚眾人圍繞坐擊鼓燒火或燒

麝香安息香蘇合樟木之類直候醒記得

人事方可扶歸

治鬼魘鬼擊其證初到客舍或官驛及久無人

居冷房睡中覺鬼物魘鬼擊但聞其人吃吃作聲

便令人叫喚如叫不醒者此乃是鬼魘鬼也須臾不

救則死二黃散無驗者用艾炷灸之

牛黃一錢

研

朱砂半錢

研

雄黃一錢

煎煉

已上三味為末和勻每挑一錢許床下燒次挑一錢用

酒調灌之如倉卒無前藥只用東邊挑柳枝

同各三七寸煎湯三盞候溫嚙與服如無前件

藥只取竈龜心土碓碎為末每服二錢新汲井花

水調嚙與服更挑半指甲許吹入鼻中更用

艾灸人中穴

人中穴在鼻下

并灸兩脚大母指內離甲一

韭菜許各灸一七壯即活

治忽感惡氣悶昏悶暈倒逆冷氣絕卒中驚

氣四肢厥冷冲和湯

香附子

不拘多少

右為末每服二錢白湯調服心疼醋湯服

人事方可扶歸

治諸嗽和末黃子每斤一石元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治諸嗽和末黃子每斤一石元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

治一切嗽百花元元如彈子大每服

山藥

百合

阿膠

黃臘

彈子

靈應散

白茯苓

甘草

阿膠

黃臘

彈子

靈應散

灸門冬

甘草

阿膠

黃臘

彈子

靈應散

人靈鍾乳粉一錢 款冬花

一不枯白茯苓各一兩 甘草半兩

同輕粉一錢 桂六錢 每服一錢

右件為細末入鍾乳粉輕粉同研令勻每服半

錢用匙抄入喉中嚥津隨用茶清壓下每日臨

卧服小兒或以糖少許和服 甘草一兩

人治嗽五味子元 白茯苓 麥門冬

人欒櫻栗 殼去穰四兩擘破用白錫少許入

人欒五味子 新鮮者去梗二兩 須地方者為妙

右為細末拌勻用白錫為元如彈子大每服

一元水一盞捺破煎六分澄清臨睡溫服不拘

時候 桑白皮一兩

人沉香阿膠散治咳嗽 沉香半兩 阿膠半兩

火炒 搥碎慢

人華參一兩 桑白皮一兩 碎搥

右件為散不以大人小兒姪婦每服二錢水八分

盞入生薑二片煎五七沸和滓食後服小兒半錢

人二聖散治一切嗽喘 桑白皮

二頭漢防己一兩有花紋者馬兜苓一兩去子

右為末每服二大錢水一盞生猪肉半兩煎至六

分去滓肉溫呷藥清汁臨卧服服二錢水八分

華蓋散治上喘咳嗽痰涎多不止虛煩發熱

錢白桑皮兩神麴半兩桔梗已上各一兩

人參三分百合三分甘草半兩炙

杏仁半兩去皮半夏半兩湯泡七次

右為細末每服一錢水一盞煎至六分食後溫

呷服之不拘時候

調肺散治嗽不以新久服之立効

麻黃二錢重不去節甘草二錢生用杏仁二錢不去皮尖

燈心十莖尺長湖南蚌粉一塊如彈子大

右為剉散入瓷瓶內用水一大碗煮火至小半碗候

五更初再溫過去滓作一服滓再煎一服經年

嗽者一二服止

貝母湯治諸嘔久不差

貝母一兩去心姜製黃芩生乾薑一分生

陳皮去白五味子各一兩及白皮

嘔當作嗽

半夏麩

柴胡

桂心各半兩

木香一分煨

甘草一分炙

右為麩末每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之生薑七片同煎至七分去滓熱服食稍空及臨卧各一服

聖棗子治大人小兒諸般嗽疾悉皆治之

佛耳草

天南星

半夏

甘草

款冬花

鍾乳粉各一兩

桂半兩去麩皮

井泉石半兩

研極細如粉

右為末內天南星半夏用生薑汁製成餅子炙黃次入六味用好皂角去黑皮炙搥碎用麩汁浸一宿按取汁煎成膏子和藥搥棗核子如服時用好棗一枚去核入藥在內濕紙裹文武火煨香為度卧時用糯米飲嚼下

紫苑半夏湯治停寒飲冷內傷肺經咳嗽痰涎久不愈者

紫苑

淨洗

麻黃

去節

半夏

洗

五味子

去枝梗

乾薑

炮

桂

去麩皮

赤芍藥

甘草炙

等分

石為麤末每服二錢水一大盞煎至七分去滓稍  
熱服不拘時候

無比飲子治一切咳嗽神效

櫻栗殼四兩

去中穰  
蒂子

杏仁二兩

去皮  
尖

山梔子二兩

去仁  
用殼

五味子半兩

生用

阿膠半兩

麩炒

甘草半兩

炙黃  
色

右件為麤末每服二錢重用水一大盞入生薑薑  
三片煎至六分盞去滓溫服

人參散治咳嗽上氣喘急嗽血咯血服二十分

人參

新羅  
好者

木香一分

右搗為細末每服三錢用雞子一枚取清調之五  
更初服服後便卧去枕仰卧只一服人愈年深者

不過再服忌腥羶鹹鮓將胃熱麵毒物并不得

過醉飽將息惟久為佳

大効潤肺杏仁飲

紫苑一兩半

去泥

杏仁

湯炮七次  
去皮尖

半夏一兩

黃

五味子一兩

櫻栗殼半兩

炙

紫蘇葉二兩

右為麤末每服三錢薑三片棗一箇煎八分去滓  
食後服水一盞半煎

人參元治肺壅嗽有痰寒熱涕腥宜服

不人參半兩對鮮枳殼半兩去穢

夏兩味用皂角水浸三日焙乾

南星半兩二味白礬水浸三日令乾為細末生薑汁搗成餅子炙乾入藥

訶梨勒半兩用麩炒去核木香一分

右為細末煉蜜為元如梧桐子大每服二十元食

後用生薑湯吞下

治傷風嗽八寶飲

麻黃半兩去節桔梗半兩人薑馬兜苓半兩

櫻栗殼半兩甘草半兩炙五味子半兩

陳皮半兩桑白皮半兩

右為麤末每服三錢用水一盞薑三片杏仁三粒去

皮尖白糖一塊煎至七分去滓食後臨卧服

肺傷湯治遠近一切嗽疾渾身勞倦脇下疼時作

潮熱飲食減少

紫水一盞半  
煎至五分  
食後服

五味子二兩 紫苑一兩 熟地黄二兩

阿膠二兩炒 人參半兩 杏仁一兩炒去

黃耆一兩蜜炙 川當歸二兩身 桑白皮一兩炙

甘草一兩炙 款冬花一兩 肉桂一分三錢去

枳殼半兩去炒 乾薑一分炮 青蒿一兩小便

黃芩半兩 甘草半兩 五加皮半兩

右為麤末每服三錢水一盞入薑三片棗烏梅各一枚煎至七八分去滓空心溫服一日三服

治遠年日近寒熱咳嗽喘滿有痰吐紅並昏

治之二母湯 真蘇子二兩

茯苓半兩 麻黃一兩去節 知母半兩炒

貝母半兩炮 桑白皮半兩蜜炙 馬兜鈴半兩

漢防己二兩生 阿膠一兩炒 甘草半兩蜜炙

五味子一兩新 人參半兩原 紫蘇子重

櫻栗殼半兩蜜炙 紫苑半兩去新

右為麤末每服二大錢水一盞白糖一塊煎至七分去滓不拘時候

九寶湯治傷風咳嗽化痰解利 新蘇子

麻黃去節 紫蘇去穢 陳薄荷各二兩

杏仁去皮 官桂半兩 甘草炙

大腹皮每服二兩 陳皮一兩 桑白皮各一兩

右為麩末每服二錢水一盞薑七片煎至八分去滓

通口服不拘時候如久患勞氣嗽水一盞童子小

便半盞櫻栗殼二箇去頂仁參多少許烏梅一箇

生薑三片煎至八分通口服日進三服除根本

十全元治痰嗽每服一兩 半夏一兩 真珠粉一兩

南星一兩 炮半 夏一兩 薑製

石膏一兩 煨白 礬石一兩 飛桑 白皮一兩 炙

款冬花半兩 焙櫻 栗殼一兩 炙生 薑一兩 焙

青螺半兩 為衣

右為末用薑汁打糊為元如梧桐子大螺青為

衣每服三元薑湯下

暴嗽立効方二白圓

白善粉一兩 白礬石一兩

右為末每用薑汁為元如梧桐子大每服二十

元臨卧薑湯下

元臨卧薑湯下

杏仁膏治久嗽不止肺氣滿急

攢猪胰一箇研杏仁半兩去皮麩仁半兩去殼

貝母半兩為末

右爛研細用新瓷瓶盛以黃蠟一分蓋面上於甑上蒸令熟逐時批服之至妙

養肺湯治肺感寒邪上氣喘急咳嗽無時聲

音不出痰唾稠粘

紫苑半兩去土款冬花半兩杏仁半兩去皮

五味子半兩白茯苓一兩半夏一兩溫泡洗十餘次

辛溫當作湯

桂半兩去麋皮桔梗半兩微炒紫蘇子半兩微炒

右為麈末每服三大錢水一大盞生薑十片同煎

至七分去滓微熱服不拘時候

八 保胃破痰元治肺寒咳嗽痰厥頭暈嘔吐涎

沫喘滿氣急

天南星生半夏生橘紅

寒水石煨通白礬枯川烏炮去皮臍

白附子生乾薑炮赤茯苓

右等分為末用生薑汁煮火糊為元如梧桐子大

每服三十元濃生薑湯下不拘時候  
審平湯治肺氣不足寒邪留滯上氣喘急咳嗽無時

人參

木香

半夏

阿膠炒成珠子

瓜蒌連子炒熟

紫苑洗淨各一錢

五味子炒

款冬花去皮梗

真紫蘇子

苦杏仁炒各一錢

陳皮去白半兩

甘草炙

桂心

乾薑炮裂各一兩

右為麤末每服秤半兩用水二大盞入薑十片慢

火煎至半盞去滓放溫細細呷不拘時候

五靈元治肺喘久不愈漸成息責

五靈脂二兩半 木香半兩煨

馬兜苓一分去殼炒

葶藶一分

右為末煮棗肉和元如梧桐子大每服二十元生薑

湯下日三服

人參茯苓湯治痰盛喘滿咳嗽大能降氣

人參去芦頭

川芎

白茯苓

桂心

知母

貝母炒

杏仁去皮尖 麩炒

苦苧葶藶炒

柴胡去芦 頭

半夏

湯泡七次為麩末取生 姜自然汁製三次

麻黃

去節

已上各二錢半

石膏二錢

陳皮二兩香白

訶子煨二兩取皮

白朮一兩

甘草一兩炙

羌活半兩

馬兜苓半兩

右為麩末每服五錢水一盞半薑七片棗子二箇

煎至八分去滓不以時候溫服

人參多煎元治咳嗽痰盛喘急

紫苑去根洗 焙秤

人參去芦上 等者

貝母去心 炒

款冬花去梗

枳殼麩炒

百合

茯苓

桑白皮自取 者

地黃生乾已上 各半兩

甘草一錢

真酥二錢別用

杏仁一兩去皮尖 別研

右並淨秤搗為末入杏仁真酥和勻煉蜜元如

梧桐子大每服三十元茶清下食後臨卧服

治久嗽語声不出訶子飲

訶子二兩去核

生薑一兩煨熟

灯心半兩

右件一處每服五錢重水一勝煎取半勝空心服藥

隨意服之

治喘嗽哮喘氣急雌雄二黃圓

雄黃三錢 雌黃三錢 信砒一錢

馬兜苓 三錢 杏仁 七粒去皮尖

右件研極細將皂角五條不蛀者越碎接取汁一盞熬成膏子和藥安乳鉢內燒皂角煙薰過元如蘿蔔子大每服三元臨臥壅水送下小兒一元孕婦不可服一夜只一服喘退不可服也

至聖真人全功飲治久新咳嗽痰盛氣喘肺痿

瘦悴不能坐卧服藥無効者服之立減如年

深日久者連進取効

款冬花二兩 去梗淨炒 櫻栗殼 括去內皮淨并去蒂二兩用蜜少許炒

陳皮一兩 甘草一兩

右四味一處微炒為麩末每服三錢水一盞半入生薑三片烏梅二箇煎至一盞去滓臨卧服之忌鹹酸酒麪鮓等物

湯下每日空心一服忌熱物少時

鐵刷圓化痰實覺利胃助清頭目除痰治嗽

隨意服之

治喘嗽哮喘氣急雄雌二黃圓

細細服之

半入生薑三先煎每二箇煎至一盞去滓

古四者一處煎成藥末每服三錢水一盞

煎對及一兩和藥末甘草一兩煎煙盡過

二錢及一兩煎成藥末三錢對及一兩煎煙盡過

煎日入者煎成藥末每服一兩煎煙盡過

煎對及一兩煎成藥末每服一兩煎煙盡過

### 治諸痰

治一切痰嗽七生元

白附子

白僵蚕

大天南星

半夏

洗

川姜

乾蝎

無以乾葛代

草烏頭

水浸一二宿去皮臍焙乾用

右七味等分並用生者以生薑汁煮糊和元如梧

桐子大以蛤粉為衣每服十元生薑自然汁浸温

湯下每日空心一服忌熱物少時

鐵刷圓化痰實寬利胃膈清頭目降氣治嗽

葉乾竭無時用乾者未知其義候

去停飲

圓淨半夏四兩

湯浸洗七次焙乾秤

緊實檳榔四顆

右為細末生薑自然汁煮火麩為稀糊元如菘豆大每服三十圓淡薑湯吞下食後臨卧服小兒服七圓或別作小圓亦得

導氣元治痰涎壅盛降氣逐風

半夏二兩

用皂角五錠按汁浸一宿控乾切片子

南木香半兩

赤茯苓一分

紫蘇葉半兩

白附子一分

右為細末水煮火麩糊為元如梧桐子大食後每服三十元生薑湯送下不拘時候亦可服

化痰元治停痰宿飲

半夏

湯泡七次別為末

人參

白茯苓

白朮

切作小塊姜汁浸各二兩

枳椇

炒去毛

前胡

甘草

炙各半兩

右為末用半夏薑汁煮火糊元如梧桐子大每服三四十元生薑湯下

八 檳榔元治心下停飲冷疾頭旋目暈睡卧口流涎

檳榔三分煨丁香一分二分半夏一兩湯泡

右細辛乾薑炮人參各半

右為末薑汁煮糊元如梧桐子大每服二十元至

三十元生薑湯下日三服

八 神效白朮元治痰壅喘嘔不下飲食

外半夏八兩湯泡洗七遍去滑神麩六兩

右為末生薑自然汁和為餅子以紙裹當風處

候乾用麩一兩白朮一兩同為末生薑自然汁元

如梧桐子大每服三十元淡薑湯下無時

八 四金丹治風痰壅盛咳嗽不已

桔梗炒防己 白礬枯各一兩雄黃半兩研

右為末水浸蒸餅元如雞頭大每服一粒綿裹

含化

八 治大人小兒肺壅痰嗽入參膏子

人參半兩好者麻黃半兩不去節甘草一分

治漢防己半兩青杏仁四十九箇湯泡去皮尖研細百部一分生用

右為細末煉蜜為膏子不拘多少含化

懶當作嗽

者火朴元治諸痰疾和中治嗽

厚朴十二兩去皮淨天南星六兩元大者

半夏六兩元細者大棗六兩拍破

右四味用生薑一斤切作薄片貯銀石器內水高

藥三寸許慢火煮一日旋添水熟者火乾焙燥再入

白朮六兩人參三兩大香附子六兩

青橘皮六兩

並羅為細末用神麩煮火糊為元如梧桐子大

食空臨睡生薑湯吞四十粒

太乙丹治痰癖不可解者

半夏二兩南星二兩天花粉四兩

五靈脂二兩苦葶藶二兩

巴豆七粒去皮油朱砂半兩一半入藥

右並生用以生薑自然汁煮火稀糊為元如鷄頭

大朱砂為衣每服三元先嚼胡桃半箇次用薑

湯吞下

治痰涎壅結咳嗽咽痛硝礬元

白礬石各等焰硝各等

右為細末入鍋子內捺實以生茶葉數片蓋之火  
煨通紅伏火為度茶葉旋添直待伏火後却  
連鍋子入地坑一宿取出為細末糯米粥為元如  
梧桐子大朱砂為衣每服三二元薑湯送下食後  
臨卧服

化痰圓治痰涼膈止嗽治頭眩

半兩

半兩

天南星 生用

半夏 生用

薄荷葉 二兩

人參 二兩

茯苓 二兩

白礬石 枯

右等分為細末生薑汁麵糊元如梧桐子大每服

三十圓生薑湯下食後服

半夏圓治痰實惡心嘔吐頭目昏暈心忪背寒  
臂痛涎嗽胃膈不快

半夏 一兩洗去滑

赤茯苓 去皮半兩

白礬石 一分枯

鈆白霜 半分

右為末取生薑自然者又麵糊為圓如梧桐子

大每服十五元生薑湯下食後臨卧服

除飲圓治一切久積痰癖停飲常服永無患仍中

酒人服之極妙

天南星 半夏

二味同剉碎以生薑自然汁浸一宿同薑汁慢火炒乾為度

青皮

湯浸去白

陳皮

湯浸去白

枳殼

湯浸去穰麩炒

桔梗

炒

已上六味各四兩

檳榔

乾薑

炮

紫蘇子

赤茯苓

高良薑

剉細用巴豆十四粒搥碎同炒焦黃色用紙包定安地上候冷去巴豆秤薑用

縮砂仁

白匾豆

大腹皮

蜜炙

已上八味各二兩

右為細末用神麴末半斤交蘗半斤以生薑自然汁打糊為元內不得着水元如梧桐子大每服五七十元生薑湯送下不拘時候若患心脾病怔忡

驚悸加石菖蒲四兩遠志去心二兩若夜不得眠夢泄白濁加酸棗仁龍骨各二兩仍用朱砂為衣人參麥門冬湯下每服半兩

驅痰飲子治痰飲神効如人頭痛背疼飲食

嘔惡皆痰飲之證

半夏

湯浸七次

天南星

切作十片湯浸七次

半夏

湯浸七次

青皮

去白

陳皮

去白

已上各一兩

赤茯苓

草薺子

去殼秤切破

甘草

剉

已上各半兩

右七味以咀每服二錢水一盞生薑七片棗子

一箇煎七分通口服不拘時候如遇飲酒先服一服酒後再一服或次日夜醒又一服永無痰飲

治飲白木湯主心胃疼悶脇肋支滿水走腸間漚漚有聲老封傳此二方

白木

白茯苓皮

半夏

湯盪洗七次

前胡

去苗

已上各一兩

甘草

炙

橘皮

去白

已上各三分

肉桂半兩

皮

右為麤末每服二小錢水一盞生薑七片煎至六分去麤滓溫服食前日二服如脇下不快

即去橘皮以枳實代之分兩與橘皮同去穰以麩炒

治飲木苓圓

白木五分

白茯苓

乾薑

炮二味各三分

枳實二枚

大者去穰麩炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓加至二十圓溫米飲下空心食前日二服

一箇煎七分通口服不拘時候如遇飲酒先服  
一服酒後再一服或次日夜醒又一服永無痰飲

治至口木圓是米給不虛心會前兩六瓶腸  
味甘為味本熱蜜圓味甘味甘子大每瓶十五圓

蘇實二升 蘇實 半夏 湯盪洗

柏木五斤 白茯苓二兩 薄薑一兩 三升

治心燈末各圓 已上各三分 肉桂半兩

夜焚燒末每服二小錢水一盞生薑七片煎至

啗法蘇文及法費力子及兩與蘇文同去蘇

治吐血咯血等疾 半盞盞時瓶筆酸三雞肝一頭立

八生血地黃百花元治諸虛不足妄下血咯血衄血

腸癰肉痔虛勞寒熱肌肉枯瘦等疾

生地黄十斤 洗日中搗取汁 生薑半斤

藕四斤 搗取汁 白沙蜜四兩

無灰酒一勝

以上五味用銀器或砂鍋內熬取貳碗許漸成膏

一半磁器收之一半入乾山藥末三兩再熬二十沸

次入後藥

川當歸 焙

熟地黄 焙

肉苁蓉 酒浸

破故紙 焙

阿膠 炙炒末

黃芪 蜜炙

石斛 去根

覆盆子 焙

白茯苓 焙

遠志 取皮

麥門冬 去心

枸杞子

右十二味各二兩為末用入山藥膏子元如梧桐子大每服五十九用溫酒調地黄膏子下日三服

空心食前

治吐血妙方大菊飲

刺芥菜搗汁半盞調飛羅麵三錢作一服立

有神効

山梔散治鼻衄血不止昏悶欲死

山梔子不拘多少燒存性為末搐入鼻中立愈

扁豆散治久嗽咯血成肺痿多吐白涎胃膈滿悶

不思飲食

白匾豆 炒去殼

生薑 各半兩

枇杷葉 去毛

半夏

人參

白木 各一分

白茅根三分

右細剉水三勝煎至一勝去滓下檳榔末一錢和勻

分四服下拘時候

治肺破吐血嗽血治不瘥者補肺散

獾豬肺 一具不  
破者

雄黃三錢 研細

蒲黃三錢 炒熟

桑白皮半兩 為末

右三味和勻入白麵少許水調灌入肺內用繩子

縛肺口者炙熟任意喫之立効

二神散治吐血便血尿血及婦人血崩不止

香附子一兩 燒存性

蒲黃一分 炒

右為末每服三錢取大眼桐皮刮去青取白皮

濃煎湯調下一二服立止

栝葉散治肺損吐血及嗽方

乾栝葉 炙黃  
色

蒲黃 炒各  
一兩

木香

婦人油頭髮

二味入瓷瓶  
中泥封燒灰

烏賊魚骨 炙黃  
色

椶櫚皮

當歸 去苗各  
半兩

阿膠五分 炒浮  
起

右八味為末每服一錢生地黄汁調下或只粥飲

下地黄汁冬溫夏冷調之不拘時候服

黑神散治吐血妙方

瓜蒞

取端正者絨筋和泥通裏只於蒂上  
留一眼子煨存性地坑內合一宿

右一味為末每服三錢糯米飲調下再服立止  
治氣弱不正血氣欲妄行覺喉中血腥微微咯  
出唾中帶些紅色順氣散

當歸一兩

洗淨去  
芦細切

川芎二兩

細切

木香四錢

細剉

陳皮二錢

洗去白  
焙細剉

大薊

野生薊芥紅花  
者乾濕皆可用

右為末每服四錢水一盞紫蘇葉煎七分去滓

溫服不拘時候

治血妄行鼻口中出者薊芥散

薊芥菜

連根  
二顆

地黃

相等  
分

生薑

數片

薄荷

數葉

右一處研細入蜜一匙如鼻中出用冷水調下如  
口中出溫湯調下

側柏散治內損吐血下血皆因酒太過勞損於內  
或血氣妄行其出如湧泉口鼻皆流湏臾不救

栝葉一兩半

蒸乾

人參一兩

荊芥穗一兩

燒灰

右為末每服二三錢入飛羅麩二錢和勻新汲水調  
如稀糊啜服血如湧泉不過二服止

八治鼻衄出血刺芥酒

用刺芥自然汁半盞同酒半盞調百草霜二大

錢服之一服即止永不再發

刺芥乃野草中紅花者

又方

生蘿蔔以薑擦子擦細取汁服之其滓捏作挺

子任入鼻中令細細出氣或諸病後亦可服

八治鼻衄蒲黃一兩

微炒舒紙上去火毒

用茅根少許煎

湯調蒲黃多寡分恣意服

蒲黃一兩以下  
石本置換行  
而後人誤以  
接上故其行  
空扶者須

八治諸血妄行大効黃耆湯

綿黃耆

打匾二寸許切以湯泡蜜一大匙浸半日控乾焙黃色一兩

川當歸

一兩用生地黃汁浸焙乾汁多尤妙

白芍藥

以童子小便浸少時焙乾一兩

官桂

八錢重去皮不見火

敗龜殼

一兩蘸醋炙七次極黃色用

茅花

八錢生用

人參

八錢紫暈者懷乾

大薊

一兩旋取洗焙用

白茯苓

八錢米泔浸去紅絲焙乾

蒲黃

半兩銀器中炒黑紫色用

伏龍肝 半兩

甘草 一分

右件為吹咀每服五大錢水一大盞酒少半盞

煎至九分放溫併三服妙

治鼻衄不止麝香散

人中白三五錢重入銀朱半錢麝香少許

同研極細每用少許鼻搗之立効

衛生家寶卷第三

治鼻衄不止麝香散

知不足齋叢書

