

百咳定

藥粉 藥水 藥片

祛痰鎮咳新藥

本品用國產藥材中含有祛痰鎮咳皂素 (Saponin) 之植物中製出經多數醫師之實驗功效極為確實當此國難臨頭之際願各大醫師盡量採用如蒙索樣試驗尤為歡迎

上海新聞路一千零九十五號新亞藥廠發

全國各大藥房均有出售



● 證 實 用 ● 療 病 指 南

● 發 揚 醫 學 舉 提 倡 衛 生 ●

汪建侯主編

第三卷第二十期

中華民國二十二年十二月出版

毒質輕微之安息香砒劑

四大特點

SULFARSENOL

INTRAVENOUSLY
SUBCUTANOUSLY
INTRAMUSCULARLY

可皮下供
皮肉及
靜脈注射

改良新六〇六

無反應！
無痛苦！
無危險！
詳細說明
函索即寄

- 一、本劑含砒素百分之一九故其毒性極微
- 二、本劑可供皮下及肌肉注射毫無痛苦亦無發炎反應
- 三、本劑分量完備自0.05gr.起至1gr.止有十九種不同分量故老人小兒均可施用
- 四、本劑兼治白濁之合併症有特殊效力為他種砒劑所不及

中國總經理上海天津法商永興洋行

杭州

同濟藥房

經理雷鏡	華廠出品	泰西名藥	化裝香品	注射新藥	家用良藥	醫療器具	接方送藥	日夜應配
------	------	------	------	------	------	------	------	------

杭州州橋路寶善巷
電話三三四四號

本誌主筆

(以姓氏筆劃多少為序)

簡章刊于
文字後面

外界惠稿
無任歡迎

江秉甫 沈康白 汪建侯 汪鶴盒 邵象伊 夏慎初 徐祖毅 郭人驥 章松筠 鄒躍如 厲綏之 盧良銘

本期目錄

血痊兩側肺動脈後急死之病理解剖……蔣樹忠

小兒咳嗽之原因與診斷……石錫祐

肺病之預防法……章松筠

軟性下疳……恆瑞

鼻內異物之一例……張益人

藝林

海棠香館吟草……汪建侯

補白

肺病預防療養教則

廣告索引

CLASSIFIED LIST OF ADVERTISEMENTS

新亞藥廠	百咳定	Pacdin	封面
新亞藥廠	三福消炎退腫膏		1
美狄根洋行	奧頗靈	Opolen	Cover
永興洋行	啟良新六〇六	SULFARSENOL	Cover
同濟藥房	營業要目		Cover
謙信洋行	奧拍泰片	Optarson	Cover
興華公司	沃度拏	Jodipin	2
先靈洋行	亞陀方	Atophan	7
禮和洋行	梅乃落	Milanol	3
安定洋行	蘇柏喜本	Supl ahypon	6
汽巴華廠	愛爾邦	Elbon	5
福康西藥店	撲咳他勁與法可爾		4


(齊)布(巴)齊小貼敷新

膏腫退炎消

三福

本劑用國產原料製成，功效與同類之舶來品無異。及統治諸種急性及次急性炎症，如肺炎、骨痛、癰腫、濕骨痛、瘡癤、痔瘡、本膏敷貼於患處，後血液有改善，局部之血液循環，促進其毒素之排除，增加其愈轉機。

商標



號五十九零十一路開新海上
行發廠藥亞新
售出有均房藥大各國全

膏腫退炎消福三
房藥大各國全
售出有均

梅毒之最新療法

應採用鉍劑

效力最大

毒性最小

首推 梅乃落

"MILANOL"

梅乃落為 Bismuth Salt of

Trichlor-tertiary Butylmalo-

nic acidester 之油溶液

專供肌肉注射無痛

無反應一全劑之治

療注射十次已足

梅乃落每匣十二

管每管一西西五

山德士鈣

止血 強心 營養 解毒
注射劑 藥粉 藥片

用山德士鈣之功效

肺癆：使肺部壞處恢復健全

病後：調理清補勝於病前

孕婦：使母子營養佳良


產後：防止血虧體虛

小孩：發育健碩成長迅速

成人：強胃納補體力長精神

總經理 德商禮和洋行

本外埠各大藥房均有分售



國產祛痰鎮咳新藥

BOCKTAGIN & FACOL

“F. KOONG”

撲咳他勁與法可爾

【撲咳他勁BOCKTAGIN】與【法可爾 FACOL】功效皆能祛痰鎮咳。皆為國產植物中抽出之治咳有效的部份。【法可爾 FACOL】則祛痰力為最強、較之桔梗遠志等、均高二十倍以上、而毒力反較少（皂素類藥、雖不為消化管所吸收、然遇胃腸有損傷時、即有吸收之虞、故毒力愈少而愈佳、）用於痰難咯出之乾咳、劇咳、及小兒咳嗽等、為尤宜。【撲咳他勁 BOCKTAGIN】則不獨祛痰鎮咳、容易見效、且能健胃整腸、並有強心之功、而無溶血作用。用於虛弱人之咳嗽、及須運用者、最適宜。於感冒初起乾咳嗽時、亦甚效。此二藥之大較也。如須說明書、函索即寄。

【撲咳他勁BOCKTAGIN】分粉末 片劑二種
 【法可爾 FACOL】分單純液 複方糖漿二種
 上海南福康西藥店製 各大藥房均代售
 市虹橋
 總經理處 上海肇嘉路三 復康藥行
 百九十七九號

新鎮痛劑

NEO-VETOLIN & VETOLIN


“F. KOONG”

萬痛靈與凡痛靈

此係有機化合物、初名「凡痛靈 VETOLIN」止痛之功尚迅速。惟藥為淡黃色、於化學上猶覺未滿。因又再四研究、另以最新化學方法、製成一種白色「最新萬痛靈 NEO-VETOLIN」功效更妥更速、吸收亦更容易、服後立刻痛止。並無種種不快、及催眠等副作用。凡各種神經痛 婦女月經痛 外科創痕痛等均甚效。而尤以三叉神經痛為最。舟車眩暈、及動脈硬化之頭頸脹痛、亦有效。定價甚廉（醫界用黃色藥片、五百片瓶裝、僅定價七元五角。白色五百片、僅定價一十元）如須說明書、及新藥價目表、函索即呈。由郵購、亦即寄。

「裝盛」 藥粉每兩一瓶
 藥片分五百片 一百片 一十片
 上海南福康西藥店製 各大藥房均代售
 市虹橋
 總經理處 上海肇嘉路三 復康藥行
 百九十七九號

新出品



止痛止癢軟膏劑

佩爾卡因那路

PERCAINAL



止痛止癢

消炎收斂

內含佩爾
卡因百分
之一

主治


慢性濕疹。皮膚濕爛。痔瘡。帶狀疱疹。皮膚裂傷。乳頭裂傷。下腿潰瘍。愛克斯光線潰瘍。皮膚擦爛。癢疹。肛門及陰部發癢。痔瘻痔核。火傷及燙傷等。

包裝 每管二十格爾姆

全國各大藥房均有出售
承索仿單及藥樣請函示

瑞士國汽巴藥廠

上海九江路五號



死後解剖之所得——脈管系統——於腹腔右側總腸骨靜脈最低處。發見大血栓。其二CM在總腸骨靜脈內。其餘則佔同側小骨盆內腸骨靜脈之全部。又於左側內腸骨靜脈全部。有新鮮之血栓。在心臟之右心室開一窗。沿肺動脈辦。達肺動脈內再切開達左右分支處兩側均發現血栓。又有一新鮮血栓壓緊左肺動脈之上下分支。而盤成兩個圈形。取出量之。有十七CM右肺動脈上下分支亦有血栓塞緊。但此栓子已變硬白。時間較久。量之共七CM長。其二CM在上支。五CM在下支。

泌尿生殖部——於膀胱叢小靜脈內有許多新鮮之血栓。

在陰道上子宮截除術所遺留之殘體。已現佈有膿液之肉芽質。並於其周圍組織有許多不規則之小膿瘍發見

肺組織切片。經顯微鏡下檢查。肺胞內祇現含有液體之浮腫。尙未有梗塞之形成。

(完)

小兒咳嗽之原因與診斷

石錫祜

(丙)喉頭「實扶埕里」。是乃噴聲與犬吠樣之咳嗽爲其主症狀。隨經過之進展。而起失音呼吸困難「棲亞奴在」。屢起幾至窒息狀態之喉頭狹窄。噴聲者與假性「格魯布」時甚

相似。在「實扶垓里」。不如假性「格魯布」之簡單。隨時間之經過。逐漸惡化。大概「實扶垓里」最初現於咽喉部扁桃腺上。後至於喉頭部。最初即突發喉頭者亦有之。有時初起於鼻等。後現於喉頭者亦非無之。在麻疹場合。多於喉頭最初現出。

(丁)又有於喉頭起水腫者。此在猩紅熱等時。咽喉蜂窩織炎。或者尋麻疹。血清病。被藥物侵蝕場合等起之。善與喉頭炎相合併。而呈同樣之狀態。其原因見於有腎臟障礙者。或血液循環障礙者。

(戊)又孩童常於遊嬉之際納異物(如貨幣小笛等)於口。誤為嚥下。嵌入喉頭部。成窒息狀態。現出呼吸困難與咳嗽。其時不甚咳嗽而感苦痛者。故X光線診斷。實為必要。

其他於乳兒。徐徐進行之喉頭狹窄症及現復聲者。大抵為聲帶之乳嘴腫(Papillom)。有時為徵毒。此乳嘴腫至三歲左右逐漸變大。啼泣興奮時。行動時等忽現呻吟音(Stridor)。所有原因於喉頭或氣管疾患之上氣道狹窄症者有之。則呼吸變激。故孩童頭部屈向後方。具後弓反張時姿勢。補助呼吸筋起激烈作用。乃努力於順利呼吸。

喉頭部有狹窄症場合。多帶咳嗽。有如前述。在不甚咳嗽。單起呼吸困難。則胸骨把柄上緣窩之吸氣困難時陷沒。同時亦來上腹壁之陷沒。吸氣延長。而發呻吟音(Stridor)者

亦有之。若此場合。音聲不嘎。而於吸氣帶笛聲。則此患兒爲聲門痙攣。在佝僂病性或痙攣素質之幼童多有之。探究其頭蓋。則看出有頭蓋癆。殊於三個月乃至一年半乳兒期不鮮。又有時聲內痙攣。在腦疾患際。慢性腦水腫場合。或者爲癲癇前提而現出。是乃突發笛音。而爲吸氣。又屢反復興奮與啼泣。有時各吸氣每數秒間或數分間反復之。如斯有持續數日或數週間者。在重症者尙有陷於「棲亞奴在」或意識障礙狀態。不乏至於死。多痙攣性體質孩童若起強奮。則發聲門痙攣或呼吸筋之痙攣而死者亦有之。

如斯痙攣性體質之聲門痙攣。與百日咳時所發者略同。有時雖屬健康孩童。生後一週間或一個月間。爲其聲門狹窄。僅因啼泣乃變酷似以上症狀之狀態。是名啼泣啞軋音 (cri-stidor)。又於喉頭「實扶垓里」場合。咳嗽雖少。而聲音自然嘶嘎。若狹窄症狀劇甚。則呼吸困難之至也。如斯症狀起於未脫乳兒期之年少小兒。殊帶鼻聲啼泣時。應念其或爲咽後膿瘍。或屬扁桃腺周圍炎之劇甚場合。不可不注意之。如前述。咽喉後壁等之腺樣增殖症。若著明。則於六個月乃至一年半左右之小兒屢發咽後淋巴腺炎或咽後膿瘍。若爲年長兒。其時附近淋巴腺變小。故此事不甚有之。在健康狀態。乳兒於咽喉後壁。脊柱前面。時可觸得豌豆大或小豌豆大之淋巴腺。此淋巴腺之肥大。由種種原因而起。例如呼吸器管之加答兒後。續發者是。最初伴紅聲。囉音而呼吸。爲咽喉部腫脹。

乃起呼吸困難。並嚥下困難。不但頭。強向側方伸展。屢發劇甚嘔聲。帶熱。遂成可得而想之窒息狀態。起喉頭浮腫。呼吸。於吸氣際有劇甚啞音。其音色爲特別一種。嘔聲亦著明。經一度診察。其狀態令人永不能忘之特異症狀。然此際左右之頸淋巴腺而腫化膿。故僅集注於一方。而緊要之咽喉部病竈容易付於等閑傾向。亦非無之。又有時不誤診爲肺炎或假性「格魯布」。亦未可定。如一檢查咽喉部則決無錯誤之理由。若付於等閑。膿瘍之位置低下擴大至下部。則變喉頭「實扶埕里」之同樣症狀。欲確診本病。以指頭插入口腔。咽喉後壁之腫脹者觸知之可也。在經過前進。患部已化膿。可觸知其波動此時若不速切開。排膿。則其後。起嚥下性肺炎。敗血症。頸部膿瘍。窒息等。以至於死亡。罕有爲頸椎骨結核。而於此部起結核性膿瘍。

以上關於咽喉及喉頭部之詞意。大體告畢。總之此部分粘膜炎受侵犯時。鮮有咳嗽。而呼吸困難與發生嘔聲。啞音則甚多也。

今更擬就其炎症。從上氣道以進於氣管。氣管枝。肺之場合述之。

上氣道之急性傳染病。如麻疹。流行性感冒等時。伴嘔聲。而發咳嗽。然在此場合。常有「實扶埕里」之混合傳染。不可不注意之。

(一)著明痙攣性咳嗽。殊於夜間有一定之間歇。而起咳嗽時。先不能不疑其爲百日

咳。在百日咳場合。假令如斯痙咳。繼續頗長時間。而於肺無所見以經過者。時常有之。數日或數週間後。肺之所見始現。咳嗽亦為吸氣時痙攣性咳嗽。乃伴嘔吐。而有喀痰，咳嗽發作以外之時。百日咳患兒。於肺診之無所見。不聽其咳嗽狀態。有遞難下確實診斷場合。斯時以舌壓子之尖。刺戟其咽喉部以察之。或者以指壓迫胸骨把柄上緣窩。若即放其指。則起特異之咳嗽發作。多能容易確定其診斷。然於此有不能不注意者。在本來為痙攣素質 (Spasmophilia) 小孩雖屬加答兒性咳嗽。時有起百日咳樣之咳。故不得不注意。又於流行性感胃場合。時發百日咳樣之痙攣性咳嗽。尙有為之帶嘔吐者。然此不如百日咳。從病勢稍事經過而發痙咳。發疾後即生如斯咳嗽為普通。不特此也。無百日咳樣於吸氣時特異痙攣。故注意此等要點。則診斷大體可無誤也。殊於流行性感胃。最初帶熱。為其通例。百日咳若無合併症。則殆不發熱。惟與氣管枝炎合併時。成為有熱。乃其常態。故於此事加以考慮。則於鑑別。無甚困難。

(二) 氣管或者氣管枝有狹窄症狀場合。亦有發呼吸困難者。咳嗽或呼吸之際。帶笛聲樣雜音。氣管或者氣管枝部分「實扶埕里」已擴大又異物業嵌入氣管內。亦有因之呈重篤症狀者。殊於「實扶埕里」深入(侵蝕)氣管枝時。由氣管全體於其巨大部分被覆厚義膜。故於氣管切開場合等。時見有成樹枝狀義膜之被排除者。又異物深侵入氣管枝時。咳

嗽自然激甚。而呼吸亦成極困難。時來如窒息狀態。又氣管內部無變化。從外部之變化。因起氣管或大氣管枝慢性的狹窄症狀。乃舉一例。如甲狀腺腫誠為其原因。即於新生兒時代已可認其原因。頭部欲向後背方伸展場合。殊壓迫症狀劇甚。乃成呼吸難狀。又於喉咽後膿瘍流下場合等。在乳兒等亦有氣管被壓迫之事。

(未完)

肺病之預防法

章松筠

本病極為頑固不治之疾病昔時皆以為不治之症近年來漸次良好初期肺浸潤及第二期結核三分之一可以愈治然日後恐續發耳故傳染後欲思治愈非常困難故宜注意平日預防預防法(第一) 不與肺癆病人及有肺癆之疑者接近

(第二) 有傳染結核者宜從隔離(世界各國俱有法律規定)

(第三) 欲撲滅肺癆微生物宜注意痰之消毒(肺癆病人痰中最多)個人方面由家庭負責處置其餘

學校，火車，旅館，遊戲場，公共場所，茶坊酒肆須多置痰盂且揭示不得吐痰之規則，同時派人宣傳，督察盂中宜置昇永，石炭酸石炭之消毒藥現在通行身遍口小之痰盂余以不甚妥當因痰及涕入盂仍在盂外故不若採用長而高之痰盂每

日至少傾去一次傾去前再加入昇汞₁炭等以殺微菌然後傾入流通之陰溝中

(第四) 住所宜有充分之光線及清潔之空氣

(第五) 個人每日食前食後三次須有嗽口刷牙洗面淨手之習慣

(第六) 運動最有益衛生然不可過劇

(第七) 肺癆往往由傷寒流行性感冒糖尿病肋膜炎百日咳麻疹等及女子生產後發生疾病

宜施適宜治療以求速治

(第八) 女子緊縛胸部呼吸障害為肺癆之誘因此宜革除之

(第九) 乳兒之營養最好由其母哺乳倘雇用乳母須詳細檢查若用牛乳務須蒸沸

(第十) 狂飲吃烟亦往往誘發宜戒絕

(第十一) 小兒衣服宜寬鬆褲帶切忌過緊因恐肺尖易壓迫而致疾病

(第十二) 男女結婚患結核者可否結婚亦為討論之問題但美國那威等已由法律規定禁止

重症結核病之結婚

(第十三) 男女春情發動期往往色慾過度亦為肺病之誘因故宜自行節制

軟性下疳

恆瑞

軟性下疳。亦屬花柳病之一種。係常發於男女生殖器之局部潰瘍。病原為德克雷氏鏈桿菌。多與他種疾病混合傳染。其與梅毒之混合傳染者約佔百分之五十以上。

傳染——其傳染與梅毒之初瘡相同。亦為接觸性傳染病。

病狀——軟性下疳。為多發性之局部潰瘍。其潰瘍易向四圍侵蝕。平常與梅毒之初瘡(硬性下疳)不易分辨。梅毒之初瘡。常為單獨一個。底部以手捫之覺硬。不向四圍侵蝕。軟性下疳。則為多發性。以手捫之不硬。侵蝕性很強。其名軟性下疳。即對硬性下疳而言。

治療——當病初發時。即應用二氯化氫 hydrogen peroxid 先洗滌患部。然後抹乾。再用純石炭酸或強氫酸腐蝕後再用二氯化氫洗滌。糝以甘汞。若患病已逾七日以上者即不宜用此法。應到醫院於適當之處理。

併發病——軟性下疳之併發病最常見者為。(一)由包皮炎症腫漲而起之各式包莖。(二)陰莖頭繫帶之損毀(三)有時包皮全壞而致成壞疽崩蝕性潰瘍。(四)淋巴管炎。及腹股溝淋巴炎。(魚口)

此病雖較梅毒與淋病為輕。但亦應視若同惡之疾患未可輕視。如雜有他種傳染病時。亦可致危險之重症。其損傷於精神及健康。同屬重要。

結 論

喜健康而惡病患。此乃人類同一之心理，在預防不及。與人力所不能限止之疾病。暫不值論。花柳症乃是可以預防之疾病。只要我們不去找她。便可以不受傳染。有些人。不但不知預防反拿錢去買病。因一時性慾之衝動。以求片時之歡。致羅此病。不但有害己身。且能遺傳後代。此誠最矛盾之心理也。

花柳病實可謂人類之一大蠱賊。雖可預防。並可治愈而其蹂躪人類範圍之廣。性度之酷。實非他類疾病所能及。醫界同志未嘗不洞鑒此種隱患。一般人士亦未嘗不深惡痛絕之。而其淫威所施。曾不少殺。侵淫復侵淫。頑強自若焉。此則尤可駭異者。

吾人之對於花柳病。應如何限制。如何抵抗。如何消除。亦可為現時最急要之問題。

鼻內異物之一例

張益人

鼻內異物常見於數歲之小孩。蓋以年幼無知。不辨利害。每喜以玩物塞入口腔或鼻孔以為戲。迨一經塞入。細長者尙可自行取出。但小而圓形者如豆類菓核等。即無法取出。事後祇覺痛苦而叫號。但不能以言語表示其痛苦之由來與所在。為父母者惟覺小孩之吵

擾不安。除見鼻孔分泌物異常外。無法確定其致病之原。或者不以爲意其日然。或者就醫診治。求去病原。然一般開業醫師每因診務繁忙。或一時忽於檢查。每將異物輕輕看過。而僅憑眼見之分泌旺盛而斷爲鼻加答兒。隨即處方給藥。令其在家自療。或稍一措拭。點藥了事。此種情形。誠數見不鮮。殊不知患者已受苦不淺矣。茲將最近所遇之一例。略記如下。以自勉而勉同道也。

某小孩年三歲。由其母抱來就診。據述一星期來左鼻孔流鼻涕甚多。有時帶淡紅色。日夜吵擾不安。近數日微有寒熱。曾就某醫師診治數次。迄未見效。

檢查所見。患者體格中等。營養佳良。有微熱。鼻之左側較右側微隆起。壓之劇痛。左鼻腔內膿樣分泌物甚多。有臭氣。洗滌後由鼻孔以窺器檢之。則見粘膜紅腫脹。離鼻孔入口約三分之二英寸處有一黑褐色塊狀物充填鼻腔。以探針觸之則覺堅硬。與四週粘膜並無愈着之處。

據此則顯係異物填於鼻內。因即以鉗子取出之。檢之乃一圓形豌豆大之硬塊。外包凝血。中心何物以病家要求整個帶回傳觀。未能剖視。爲可憾也。

藝林

海棠香館吟草(十續)

汪建侯

秋容淡冶畫說黃花妙筆描摹倩畫家名士文章驚絕艷酒人顏色愛風華神傳傲骨凌霜健照
寫疎枝倚月斜老圃從今留色相丹青一幅碧籠紗

細品幽香到評小山評香評色繞柴關清標直在羲皇上雅態端宜漢晉間桃李孰能爭冷豔松
筠方許比清顏名山一席應增入俗客何容識一班

黃花何處放訪枝枝有客尋幽過短籬老圃雲霞舒已漸遠村風雨竟何辭同為冷客攜筇早生
恐高人見面遲無限詩情兼酒意莫教辜負好芳時

攜杖閒遊看九月天乍開黃菊色鮮妍科頭獨坐踈籬畔抱膝長吟小院邊快飲清芬時馥郁偶
親佳釀倍流連彈琴酌酒休辜負幸會今朝亦有緣

不隨穠豔癖送芳妍別有酸鹽嗜好偏詩酒關懷吾輩事烟露抱痼晚秋天臨波迂方雲林畫拜
石狂思海嶽病巖我愛黃花已成癖買花豈惜杖頭錢

憔悴丰神病峭舊姿霜天三徑耐棲遲澹懷早為秋來瘦傲骨應非俗要醫小閣清燈寒中酒半
階黃葉苦吟詩藥爐經卷常相伴况是相如臥病時

一莖丈六是非耶金地分明此散花妙悟色香歸冷澹澄觀水月攬清華踈林秋磬徑聲落曉

寺霜鐘塔影斜夕照滿園黃葉下是誰懷衲掛袈裟

隱

幽棲直欲隔塵喧黃葉江南正滿邨聊託閒居歸老圃自誇清福住柴門
菜西風憶故園抱甕年心跡共不知過客有高軒
余既作此十六律石翁久而未和且擬四題曰壽
稚瘦腴意在要其作此四律也日窳之曰能再擬乎乃以憶問舟守覆我亦殊新穎

滿身風露踏歌行低叩重門午夜清金谷春濃猜曉約玉階人去記分明香魂尋遍欄三匝殘

四影續吟

醉扶來月五更最是薄羅衫子上折枝新樣畫難成(花影)
此君心性本高寒曳雨臨風亦自安清翠碧隱搖處好愁禁翠袖倚來難擬和菊蕊燈邊寫許

伴梅花月下看一夢瀟湘人不見空餘環碧隱珊珊(竹影)
天風吹處雨初過四壁峯巒萬象羅障日每因空際巧隔江偏愛晚來多蒼茫烟樹遲歸鳥歷

落雲屏淡染螺對此真能開眼界琴羅障日每因空際巧隔江偏愛晚來多蒼茫烟樹遲歸鳥歷

落花芳草黯無邊莽莽奔瀉夕照天最憶銀燈飄畫舫怕開明鏡感華年權縱鷗立溪頭穩活

潑魚游水面鮮更有漪裙人宛在臨風偷覷兩相憐(水影)
歸鳥西山暮蒼煙入遠峯偶尋之子過欲問少人逢樹禿葉全脫谿寒水不春前村冷吟者

偶檢舊簾得楊半儂書為辛酉仲春寄自申江者念我故人未知何託為賦二律聊寄所

琴劍飄零寄一枝海天雲水悵稽遲最難春樹懷大日正是浮萍逐浪時故國驚心花月夢風

塵泣血蓼莪詩年來我亦傷心甚好覓雙魚慰所思
回首河梁贈遠行相思萬里別愁縈美人自古傷遲暮我輩相知在性情舊雨琴樽空選夢秋

波鷗鷺欲尋盟他時同話杭州月好訪湖山十里程

(未完)

醫林新誌第三卷總目錄

第一期目錄

楮民誼題詞

劉瑞恆題詞

謝筠壽題詞

夏慎初題詞

郭人驥題詞

沈康白題詞

邵韞山題詞

汪建侯醫師玉照

夏慎初醫師玉照

謝筠壽醫師玉照

郭人驥醫師玉照

沈康白醫師玉照

輓近胃擴張症研究進步

(郭人驥) 總 1—3

吃逆之簡易療法

(謝筠壽) 總 4—6

血液之共働放射

(蔣如璠) 總 6—7

習常便秘症

(邵韞山) 總 8

診斷用細菌學檢查法(續)

(汪建侯) 總 9—10

急性傳染病第一種傷寒(人續)

(沈康白) 總 11—13

第四期目錄

火傷之單甯酸療法	(朱道周)	總69—72
腦膜炎血清治療之手續	(國 樹)	總72—74
血壓談話	(謝筠壽)	總74—75
診斷用細菌學檢查法	(汪建侯)	總76—79
鴉片及嗎啡中毒	(邵韞山)	總79—81
急性酒精中毒	(邵韞山)	總79—81
煙草中毒	(邵韞山)	總79—81
我們爲什麼要再種痘和怎樣種法	(汪靜貞)	總81—85
新藥要義	(汪鶴齋)	總85—87

第五期目錄

婦人科疾患之嘔吐與其鑑別之方法	(郭人驥)	總89—90
檢痰之洗滌法及其價值	(費子章)	總90—93
中毒症篇	(汪建侯)	總93—96
男子懷胎之同例及及原因	(陳大衡)	總96—97
傷寒	(沈康白)	總97—100
傷寒症之看獲其食物	(鄧源和)	總100—101
產婦衛生常識	(傅和平)	總102—106
海棠香館吟草	(汪建侯)	總107—108

第六期目錄

傳染病時循環衰弱之療法	(蔡適存)	總109—122
哺乳兒營養障礙	(邵韞山)	總123—126
中毒症篇	(汪建侯)	總126—128
產婦衛生常識	(傅和平)	總128—132
福白龍與葡萄糖治愈妊娠肺炎一例	(劉天恩)	總132—134
診餘漫筆	(汪鶴齋)	總134—135
海棠香館吟草	(汪建侯)	總137—138

第七期目錄

帶狀疱疹之新療法	(郭人驥)	總139—140
急性傳染病之症候診斷	(張素如)	總140—142
傷寒	(沈康白)	總142—147
貧血與充血在療法上的區別	(李啓驥)	總147—148
哺乳兒營養障礙	(邵韞山)	總149—152
海棠香館吟草	(汪建侯)	總153—154

第八期目錄

肺癆初期診斷法	(汪建侯)	總155—158
酒的醫藥觀	(顧學箕)	總158—162
診餘漫筆	(汪鶴齋)	總162—165
腰痛之研究	(郭人驥)	總165—168
梅毒和驗血	(謝筠壽)	總168—171
海棠香館吟草	(汪建侯)	總173—174

第九期目錄

駁某舊醫瘧疾發于冬春季者非蚊為媒介說(葉植生)	總175	
妊娠期內之性交問題	(沙光)	總176—179
中毒症篇	(汪建侯)	總179—182
酒的醫藥觀	(顧學箕)	總182—185

急性傳染病之症候的證斷	(張素如)	總186—189
實驗破傷風治療法	(劉天恩)	總198—191
海棠香館吟草	(汪建侯)	總193—194

第十期目錄

防疫與管理尿糞之關係	(郭人驥)	總195—199
肺癆初期診察法	(汪建侯)	總199—101
小兒咳嗽之原因與其診斷	(石錫祜)	總101—106
骨盆領域之麻醉法	(謝遠芳)	總106—109
吃逆之原因及其療法	(文 起)	總109—101
新藥要義	(汪鶴盒)	總111—112
海棠香館吟草	(汪建侯)	總113—114

第十一期目錄

近代新醫學治療法之變遷	(汪建侯)	總115—118
小兒咳嗽之原因與診斷	(石錫祜)	總118—123
強壯身體的根本辦法	(惠 潮)	總123—127
雇用乳母的智識	(林復生)	總127—130
顧佩芬女士遺像		131
悼芥詞	(鶴 舛)	總131—132
海棠香館吟草	(汪建侯)	總133—134

第十二期目錄

血栓兩側肺動脈後急死之病理解剖	(蔣樹忠)	總135—136
小兒咳嗽之原因與診斷	(石錫祜)	總136—141
肺癆之預防法	(章松筠)	總141—142
軟性下疳	(恆 瑞)	總142—144
鼻內異物之一例	(張益人)	總144—145
海棠香館吟草	(汪建侯)	總146—147

投稿簡章

- (一) 本誌各欄如蒙醫藥諸彥龍賜鴻文自撰或譯述均所歡迎
- (二) 譯文請註明原著者姓名出版日期及發行處能將原本附寄更佳
- (三) 惠稿字跡務望繕寫清晰若模糊不辨者惟有割愛
- (四) 惠稿揭載與否本社不能預先聲明而原稿亦概不寄還其欲寄還者請附郵費
- (五) 稿末請註明真姓名住址以便通訊
- (六) 惠稿本社得酌量刪改若惠稿者不願刪改須先聲明
- (七) 本誌宣傳公衆衛生介紹世界醫學爲宗旨編者皆盡義務故對惠稿者皆盡義務故對惠稿諸君僅以本誌爲酬
- (八) 惠稿者請寄杭州東街路一二三號醫林新誌社編輯部收

廣告價目表 ADVERTISING RATES

位置 Position	面積 Space	每期刊目 Rate for each issue
封面 Front cover (outer)		Mex. \$ 30.00
底面 Back cover (outer)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 30.00 \$ 17.00
封面之內面 Front cover (inner)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 25.00 \$ 14.00
底面之內面 Back cover (inner)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 20.00 \$ 11.00
普通文字 前接隨排 Ordinary pages	全半面 Full Half page	Mex. \$ 12.00 \$ 7.00

廣告簡章

- (一) 以上價目以杭州銀元計算當于廣告第一次登出後付清
- (二) 如用銅鋅版或彩紙彩印價目另議
- (三) 于合同有效期間本誌每次出版均贈送一冊
- (四) 如欲換登廣告須于出版前十日將稿寄下不另收費
- (五) 如訂全年合同者八折計算

定報價目

每月一冊零售大洋一角全年十二期大洋一元半年五角五分(郵費在內)
 蒙古新疆及日本均照國內
 歐美各國及香港澳門照定價另加郵費五角
 票郵九折以一分四五分爲限

中華民國二十二年十二月出版

編輯主任 汪建侯 醫師
 事務主任 汪鶴齋 醫師
 總發行所 醫林新誌社
 分理處及 杭州東街路一二三號
 上海北京路九十六號五定公司
 上海河南路中英大藥房
 杭州湖濱路西湖小說林
 杭州保佑坊古今圖書館店

代表全國新醫學界言論中心的唯一刊物
醫學評論
 社長 褚民誼 編輯主任 宋國賓
 特點 (一) 評論公正 (二) 內容豐富
 (三) 印刷精良 (四) 訂價公道
 訂價 預訂每年十二冊連郵費洋一元
 國外二元五角
 訂閱處 上海法租界亞爾培路四百〇八號
 函索附郵一角即刻寄奉

黃鳴龍 汪元臣 黃鳴駒 主編
 黃勝白
醫學
 △定價 每月一冊二角五分全年二元五角
 △社址 上海北京路九十六號
 醫學雜誌社

吳軍 民衆醫藥社編輯
 宗編者 范守淵 林郁青醫師
 起 宗旨 宣傳普通衛生介紹通俗
 醫 內容 分評論專著介紹譯述開
 藥 出版 話插圖問答等等
 週 社址 上海晨報附送不另取費
 刊 上海小沙渡路四十九號

胡定安 謝筠壽 余雲岫醫師主編
社會醫報
 提倡社會公衆衛生每月兩回出版
 介紹世界醫學識全年大洋兩元
 社址 上海新開路鴻祥里二一三六號

汪企張醫師周夢白藥師夏慎初醫師主編
診療醫報
 △價目及出版期 每月十號全年十二冊
 大洋一元寄費在內
 △社址 上海霞飛路一〇四號
 (試閱樣本每份三分)

張克成醫師主編
 世界最新醫療智識之報告
生活醫院醫刊
 每月一冊
 預定全年連郵費國幣二元樣本一角來信
 註明第十二局
 上海法租界白爾爾二五六號生活醫
 院發行

趙燭黃藥師主編
新醫藥刊
 每月一冊全年十二冊大洋六角
 歡迎試閱請示訊通處即寄奉一份
 △社址 上海白克路四三〇號

請訂閱 宣傳公衆衛生介紹世界醫學的
新醫報
 編輯主任 羅廣庭
 出版期 每月五日
 報費連郵費 國內全年大洋一元半年五角
 每冊一角國外加倍港澳全年
 港銀一元二角
 兩案樣本請附郵票四分
 廣州市泰康路光華醫院內
 廣州市西關和樂新街一號

醫學與藥學
 社長盛佩慈 編輯主任毛成余德葆
 事務主任盧銘
 總發行所杭州市醫師藥師公會
 每冊大洋壹角全年十二冊連郵費大洋壹元

質精量富的
 國立同濟大學醫學出版
同濟醫藥季刊
 價目 訂閱全年國內一員一角
 零售每冊三角
 發行處 上海白克路同濟大學醫學院宿舍
 代售處 上海四馬路現代書局華通書局

東南醫刊
 編輯主任 郭琦元 楊蠡舟
 陳卓人
 出版期及價目 每季一大冊每冊二角五分
 全年一元
 社址 上海滬軍營東南醫藥院校友會


北平醫刊
 介紹醫藥名著 普及衛生常識
 編輯者 北平醫刊社
 發行者 北平西四順賞胡同二十號
 北平醫刊社
 定價 每冊六分全年六角郵費在內



SUPRAHYPON

本善柏奇

藥聖喘氣



行藥西定安號八五七路德斐林海上理總總華駐


行藥定五號六十九路京北所行發總

Atophan Atophan-Balsam Atophanyl

亞陀方藥片
亞陀方軟膏
亞陀方耐而

亞陀方製劑乃由杜尔姆氏及尼可拉氏在先靈藥廠最大實驗室內苦心研究而製成至一千九百十一年始引用於藥物學且為治療痛風症之第一專劑本品除具有偉大消炎作用與止痛性質外對於普林之新陳代謝影響尤巨故全世界著名醫師凡遇痛風及傷風發熱性疾

德國柏林先靈開爾邦製藥廠
駐華總經理 上海國明園路
十九號 先靈洋行



OPTARSON

奧拍泰純	<p>奧拍泰純</p> <p>新發明砒素士的 年化合劑專治諸 虛百損以及患瘡 後及患他種傳染 病後虛弱諸症</p> <p>包裝 每盒十二管 每管一立粉</p>
------	--

SOLARSON

所拉純	<p>所拉純</p> <p>功效準確可供皮 下注射用之砒素 強壯劑注射後病 人皆能忍受毫無 副作用專治諸虛 百損萎黃病及貧 血等症</p> <p>包裝 每盒十二管 一分及二 立粉</p>
-----	--

TONOPHOSPHAN

託拿福賜芬	<p>託拿福賜芬</p> <p>無毒有機性磷化 合物能振足貧血 患者之新陳代謝 功能並能補益骨 組織之機能不全 毫無副作用</p> <p>包裝 一或溶液每盒 二十管每管一 立料 加料每盒十管 每管一立料</p>
-------	--

行洋信謙路西江海上理經家獨國中造製「脫斯赫耳拜」廠藥大遠天國德

THE MODERN MEDICAL JOURNAL

123 Tung Chieh Road, Hangchow China.

Vol. III DECEMBER 1933 No. 12.

奧顏靈

各大藥房
均有出售

上海美狄根洋行經理
德國海芬勃廠製



能溶解尿酸止痛
消炎故為痛風性及
其他急性慢性關節炎
筋肉痠麻質斯各種
神經痛等之聖藥

Opolen