

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白嶽 趙文燧子垣氏訂正

西陵 汪 淇懽漪子箋釋 天都 查 望于周文叅閱

產後下

虛煩

凡產後血虛氣無所附則逆而

為大火上逆而

瘀血迫之則心

煩矣童便濁陰

也其味苦鹹寒

其性就下降火

消痰故宜服之

所謂濁陰出下

聚也

大全云餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并擗心下及臥太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見

發熱條

陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯温膽湯殊不知產後

與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

金黃散 治產後惡血衝心時發煩躁

玄胡索

蒲黃 各半  
桂心 二錢

右為細末烏梅煎湯調下二錢

荷葉散 療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉 一兩七錢半  
延胡索 二兩  
地黃汁 二合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食

一日

川芎散 療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黃 白芍 枳殼 各等分

芎黃生用性涼 逐瘀桂心去皮 性熱行血烏梅 酸收滌汚用此 方不可忌此法 前考以括行血 此方以涼行血 集考者溼滑自 分用方者毋得 未紫不辯

此方行氣行血 小兒不寒較前 方是一天靈色 令人心曠神怡

此方清新簡切

以上四方看一

方有一方妙用

細玩之真如山

陰道上行令人

不忍捨去

讀治症語便知

用藥宜溫所謂

寒者熱之留者

行之也

以煩躁二字似

不宜用熱藥問

到惡血不快便

是瘀血衝心而

如此溫行破血

右為末酒調方寸七日二服

集驗方

產後血氣煩悶

生地黄汁

清酒

各一升

右二味相和煎一沸分為兩服

經効方

療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿

當歸

川芎

桂心

吳茱萸

陳皮

生薑

各一兩

白芍

二兩

右咬咀以水三升煮取一升去滓空心服

沒藥丸

治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥

蠶薑

延胡索

當歸

...

...

...

...

...

之藥必不可少  
者也又烏論其  
煩而不用熱藥  
哉  
連讀數方各呈  
妙相如化工天  
巧有難播及  
此數方又有淡  
糝濃抹之致  
藕汁竹瀝雖俱  
治煩然清火則  
同而破血消痰  
則異宜別之如  
陳白梅蒲黃失  
笑散人皆能之  
而羊血之用誠  
有奪天之力造  
方者集方者均  
神德可涯矣

乾漆炒

桂心

牛膝

牡丹皮

乾薑

各等分

右為細末醋煮麩糊丸如桐子大煎麩湯下十九丸至十五丸

治血氣煩悶雜方

生藕汁飲二升効竹瀝亦得

一方陳白梅槌碎煎湯飲

一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下

用失笑散亦佳

一方療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血

一盞頓服若不定更服立効

○已上治餘血奔心之劑

此方以四物去川芎惡其散氣也。用肉桂助其止汗也。但與眾藥等分亦須斟酌。而以粳米竹葉加之。治心煩短氣之良法矣。血熱加生地。尤佳。如肉桂所當去也。

此方以小麥補心。麥門竹葉除煩。甘艸大棗益氣。安其子。併培其母。亦良法也。生薑佐之。更有替養之夕。而曰

人參當歸湯 治產後去血過多。血虛則陰虛。陰虛生內熱。令人

心煩短氣。自汗頭痛。

人參

當歸

熟地黄

麥門冬

肉桂

各二錢

白芍藥

炒二錢半

右用水二鍾。粳米一合。竹葉十片。煎至一鍾。食遠服。○血熱甚者。加生地黃二錢。

竹葉湯

治產後短氣欲絕。心口煩悶。

竹葉

細切

麥門冬

去心

小麥

各升

甘艸

各一兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右切以水一斗。煮竹葉小麥至八升。去渣。納餘藥。煮取三升。去

虛悸加參多多益善糯米用之為心力之助又

養陰也

此治虛煩短氣神方雖品味數少而藥方精專

可法可法如黃芩文可去

取者也

此治胸痺法之變也原方出自

仲景薤白半夏所以治逆氣括

萎根麥門所以治煩熱人參甘

艸補虛知母石膏之加非熱甚

不用益為血虛所忌故也

仲景治傷寒虛煩不眠有枝子

渣温服○虛悸加人參二兩○少氣力加糯米五合

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹升一 人參 麥門冬去心 茯苓 甘艸各一兩 黃芩三兩

右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日三

薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣

薤白 半夏 人參 甘艸各一兩 括萎根二兩

麥門冬牛 熱甚加知母石膏

右咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二

芍藥梔豉湯 治產後虛煩不得眠

白芍 當歸 梔子 香

或湯而此如白  
骨當歸者乃雲  
岐變傷寒法以  
治產後也人常  
謂傷寒方可通  
於雜症有是哉

要在風字上看  
以頭痛不痛為  
法

此大苦寒之劑  
與產後非宜意  
者熱病成煩欬  
要以但煩二字  
上貼

中虛症不可用  
石膏煩亂症不  
可用桂枝而此  
方以甘艸七分  
配藥六分又

右用水二鍾半、先煮前三味得二鍾、內香豉煮取一鍾半、去滓

分二服溫服、此雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當

○已上治血氣虛煩之劑

仲景二物黃芩湯 婦人在艸褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩一兩 苦參二兩 乾地黄四兩

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸 治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹 石膏各二分 桂枝 白薇各一分 甘艸

右五味為末、棗肉和丸如彈子大、以飲服一丸、日三夜二服

以寒而為丸仍以一丸飲下可想見其立方之微用藥之難審虛實之不易也仍飲服者尤虛夫虛虛之禍耳用是方者亦當深省

若謂去血過多而用童便以治

有熱倍白薇。○煩喘加栝實一分。

○已上治中風煩熱之劑。

經驗方

治產後煩躁。此重可去怯之義。

禹餘糧一枚。狀如酸餠者。入地埋一半。四面緊築。用炭一秤。發頂火一觔。煅去火三分。耗二為度。用濕土罨一宿。方取出。打去外面一層。只用裏內細研。水淘澄。五七度。將紙襯乾。再研數千遍。用甘艸湯調二錢。七只一服。立効。

○發渴

熊氏曰。產後心煩發渴。宜清心蓮子飲。

薛氏曰。前證若出血過多。虛火上炎。用童子小便。或四物白朮麥



虛火是矣而以  
四物治虛則川  
芎之物能不升  
散乎以胃氣虛  
而渴用白朮宜  
矣而以血虛用  
白朮亦難信也  
必血虛胃氣弱  
者乃可審證用  
藥幸毋執一

此方分兩有法  
讀者不可輕放  
過  
真人以天地之  
心為心故其方  
亦以雲行雨施  
之道渴教此方

門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸耆湯若血虛發熱用八珍加  
麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中  
益氣湯或七味白朮散

一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣  
俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補

血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門

冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一

錢半熟地黃七分天花粉三錢甘艸五分糯米薑棗煎服

千金竹葉湯  
療產後虛渴少氣力

以治渴補虛之藥十分為君而

又以淡滲燥血

生渴之藥十分

一分為使佐此

何為也蓋以秋

谷能降天之陰

氣半夏發地之

陽氣脾者土也

天氣通於地地

承天氣而施生

故佐姜棗發脾

氣以通滯滯而

生津經曰氣和

而生津液相成

神乃自生此大

意也真人素有

一体同仁之教

豈不知半夏痰

苔之過而反用

之秋後之苓者

效之去之各存

竹葉三升

人參

茯苓

甘艸各一兩

小麥五合

麥門冬五兩

半夏

生薑各三兩

大棗十五枚

右吹咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取七升去滓入餘藥再

煎取二升每服五合日三夜一

竹葉歸耆湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢

黃耆二錢

人參

白朮

當歸各一錢

麥門冬去心七分

甘艸炙五分

右剉水煎服

熟地黃湯

治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黃酒洗一錢半

人參

麥門冬去心各二錢

括蕞根四錢

平其入焉

少用地黃多用

入參便是妙法

○糯米養陰○

自治中氣虛弱

以致津液短少

者宜之蓋為胃

氣不能致津液

子脾也乾葛木

香藿香皆發脾

氣而木香於小

兒更宜於產後

須量用

方名清心理宜

保肺以生木導

赤以瀉火也攷

諸藥性乃知其

理

用遠志石菖蒲

以治煩恐有未

當處

甘艸 炙五分

右咬咀作一服加糯米一撮生薑三片棗二枚水煎服

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參 白朮 炒 白茯苓 甘艸 炙 藿香

木香 乾葛 各錢

右剉一服水煎服

清心蓮子飲 治產後心煩發渴

麥門冬 去心 黃芩 地骨皮 車前子

甘艸 炙各一錢半 人參 黃耆 蜜炙 白茯苓

石蓮肉 各七分半 一方加遠志石菖蒲 各一錢

大渴妙藥亦有  
補土生金之理

血渴者血虛而  
渴也故加生地  
此二方不惟產  
後宜服與消渴  
証亦相宜

右另用麥門冬二十粒水二鍾煎一盞水中沉冷空心温服○

發熱加柴胡薄荷

### 洋寶方

療產後大渴不止

蘆根

切一升

麥門冬

生四兩

瓜蒌根

人參

茯苓

甘艸

各三兩

大棗

二十枚

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌菽菜

### 括蕒根湯

療產後血渴

括蕒根

四兩

麥門冬

生二兩

人參

各三兩

生乾地黃

甘艸

各二兩

土瓜根

五兩

大棗

二十枚

右咬咀以水八升煮取二升半分三服

黃芩散 治產後血渴飲水不止。

黃芩 麥門冬 各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服無時

當歸補血湯 治產後血脫煩躁引飲晝夜不息脉洪大而虛重

按全無者。

當歸二錢 黃耆二兩

右剉作一服水煎服

一方 療血渴及產後渴

用蓮子心取為細末米飲調下二錢効

一方 治產後出血太多虛煩發渴

原東垣治脫血方也移之以治產後煩渴非有見者不能

以下三方一清心一涼血一生血如一山一水一琴一雀各得其趣

用真正蒲黃末二錢白湯調下如渴燥甚并花水下

一方 治產後中風煩渴

用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

桃花散

治產後不煩而渴

新石灰

一兩

黃丹

五錢

右為細末渴時用井水調下一錢

○自汗

丹出於醋內含真水且以鎮墜浮火故能止渴而石灰最為燥烈之物何以用之而况以產後乎日不煩日渴時用井水調下一錢須當勞其故也

夫汗者陽之氣陰氣不復則陽無所歸以入於陰故虛陽上浮於外而為汗耳常謂汗多成氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也

大全云產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣

獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其

瘧而失言因而遇風變瘧之理又不成瘧而短氣柴瘦者此交熱也省之省之

全大補參附芪附之類必審其所以而用毋泛之執以為是也而額汗當分部位似近于迂臨症尤宜詳悉蓋腎液入心為汗於理須究其始也妙在為丸少其雜也宜大劑湯煎服

凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成瘧縱不成瘧亦虛乏短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰按前證屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附著附等湯若汗多亾陽發瘧尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至

頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竊謂前證當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治者審之

一產婦略聞音響其汗如雨而昏憤諸藥到口即嘔余以為脾氣虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

代茶炒黑之理  
可法

前論汗出因風  
變瘧之說居優  
不然即謂之脫  
陽矣此大補法  
所當施也

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連檉炒黑倍加人參五味子二劑而愈

大全云凡產後忽胃悶汗出不識人治用鷄子及竹瀝二法見前血暈

薛氏曰前證屬太虛宜固元氣為王其汗不止必變柔瘧東垣先

生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞑蓋因血暴亾而火上熾但

補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安

則目明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活

血湯

黃耆湯

治產後虛汗不止

此得於風其  
愈公為易子



固表也而黃芪  
二錢防風五分  
大約足矣牡蛎  
腎家藥也以腎  
液入心為汗故  
止汗又宜固腎  
其他可意解矣

麻黃氣悍而輕  
陽藥也用其根  
用其陽中之陰  
耳非後陽引陰  
歸根之意乎要  
知用藥自有至  
理

小麦生于陽至  
成于陰至內陽  
而外陰也今用  
其麩亦用其陽  
中陰耳且汗為  
心液而小麦卷  
心用其麩飲液

黃耆二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣煨為粉

白茯苓

麥門冬去心

甘艸炙各五分

右切作二服加大棗一枚水煎服

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸

黃耆炒

麻黃根

杜蠣粉

人參

甘草炙各等分

右剉每服四錢水煎服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煨成粉

小麥麩炒令黃色碾成粉各等分

下合用... 卷十三自汗... 蠲寄

心也又腎之液入心為汗而猪水畜也調以肉汁能不又歸之腎乎服無時者以此藥力緩功遲宜頻服多服耳  
 麻黃根引陽歸陰因其性也白芍藥抑肝斂陰用其酸也當歸黃芪原自補血湯之變據愚見從本方立法以黃芪為君者得正也  
 陽加於陰謂之汗陰加於陽之謂聖而反治之則汗自止矣立方大意如此所謂

右和勻煮生猪肉汁調下二錢無時

當歸二黃湯

治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能

入

當歸

黃耆 各一兩  
 麻黃根 半兩

右咬咀每服三錢水煎服○一方無麻黃根用白芍藥

當歸六黃湯

治血氣虛熱盜汗不止

當歸

黃耆 炒

熟地黃 各二錢

生地黃

黃蘗 炒黑

黃芩 炒

黑

黃連 炒

黑各一錢

右水煎服○不應加入參白朮○心血不足加酸棗仁

人參湯

治產後諸虛不足發熱盜汗

逆者正治也

此方以氣血為

至而引經之妙

在清腎然糯米

蒸陰葱白發散

何為用之然汗

不以奇下不以

耦故葱白不單

用而又熟之於

米又非引陰意

乎噫有深思焉

此無上救急神

方乃回陽返本

之道惟四肢厥

冷汗出如雨者

宜之

二方一用參一

用芪一固表氣

一補裏氣自是

不同用藥者當

於此際審其內

### 人參

當歸各等分

右為末以豬腰子一隻去脂膜切小片子以水三升糯米半合

葱白兩條煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分溫服不拘

時

### 參附湯

治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或臍腹

疼痛吃逆不食或汗多發瘧等證

### 人參

一兩

### 附子

炮五錢

右作一服加薑棗水煎徐徐服

### 蒼附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉

腹痛飲食不入及一切虛寒等證

外有無而求責  
焉庶近道矣所  
謂有者求之無  
者求之也至哉

言乎

用桂枝湯以治  
風加附子以治

虛即桂枝加附

子湯也乃仲景

法以四肢拘急

故用此方不然

胡為用此

此方以風升之

劑而治自汗盜

汗誰其信之然

東垣至此湯者

益陽為素問曰

陰者從陽而亟

起也陰不從陽

則陽外散故多

汗也而升麻葛

根升陽明之氣

黃耆 一兩

附子 炮五錢

右作一劑加薑棗水煎服如不應倍加附子方得全濟

千金方

療產後風虛汗出小便短少四肢拘急難以屈伸

甘艸

炙一兩

附子

炮

桂心

芍藥

炒各一兩半

右剉每服三錢加生薑四片棗一枚水煎服忌豬肉冷水生葱

等物

全生活血湯

治產後冒悶發熱自汗盜汗目瞞瞞四肢無力口

乾頭暈行步欬側

升麻

芍藥

炒各三錢

當歸

柴胡

防風

羌活

獨活

葛根

甘艸

炒各一錢

川芎

柴胡防風升厥陰之氣羌活藜本升太陽之氣干背細辛獨活升少陰之氣于前蔓荊子涼諸經之血甘艸和諸陽之氣四物赤血于諸陰之經紅花活血于諸陽之絡然則升而不歛非所以藏陰故用白芍為君升而太過非所以益氣故用甘艸為佐言雖如此誰敢用也現其曰同悶發熱口乾頭暈行步欹側皆邪客經絡也以邪客經絡兩者

藜本 各一錢五分 生地 熟地黃 各一錢 細辛

蔓荊子 各五分 紅花 三分

右剉每服五錢水煎熱服

○發熱

薛氏曰產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火證投以涼劑禍在反掌王太僕先生云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱

發熱 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

不和故爲自汗盜汗之症以此方和之則外者得入內者得出使經絡通邪氣散陰陽和筋骨用矣而安有以上諸症也

妙在以胃氣爲主

腎盛則生寒。腎虛則寒動於中心。虛則熱收於內。又熱不勝寒。是無火也。寒不勝熱。是無水也。治法無水者六味丸。無火者八味丸。氣血俱虛者八珍湯與十全大補湯。

大尹俞君之內。產後發熱。肺熱吐血。便血。兼盜汗。小便頻數。胸脇脹痛。肚腹痞悶。余曰。此諸臟虛損也。治當固本爲善。自恃知醫。用降火之劑。更加瀉痢。腸鳴嘔吐。不食。腹痛足冷。始信余言。診其脈或浮洪。或沉細。或如無。其面或青黃。或赤白。此虛寒假熱之狀。時值仲夏。當捨時從證。先用六君子湯。加炮薑肉桂數劑。胃氣漸復。諸證漸退。更佐以十全大補湯。半載全愈。

儒者楊敬之內人。所患同前。但唾痰涎。或用溫補化痰之劑。不應。

清魂散乃散風  
之補劑

以此觀之原有  
外感

既知內熱生風  
只宜治熱不必  
治風所謂求標  
取本也即用三  
和散或桃仁承  
氣湯俱妙三和  
散有大黃

面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火虛不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸補土之母而痊

一婦產後三日起早况氣血未定遂感身熱日暗如風狀即以清魂散二服得微汗而愈

滑伯仁治一產婦惡露不行臍腹痛頭疼寒熱眾皆以為感寒温

以薑附益大熱手足搐搦語謔目獐診其脉弦而洪數面赤目閉

語喃喃不可辯舌黑如烙燥無津潤胸腹按之不勝手蓋燥劑搏

其血內熱而風生血畜而為痛也曰此產後熱入血室因而生風

即先為清熱降火治風涼血之劑兩服頗爽繼以琥珀牛黃等稍

解人事後以張從政三和散行血破瘀三四服惡露大下如初時

此敗血之劑其不用大黃者以脉虛大也

產已十日矣于是諸證悉平。

一婦盛暑月中產三日發熱其脉虛疾而大惡露不行敗血攻心狂言叫呼奔走拏捉不住以乾荷葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下生蒲黃二錢一服即定惡露旋下而安。

一婦產後時發昏瞶身熱汗多眩暈口渴或時頭痛惡心醫用四物涼血之劑病不減又用小柴胡病益甚石山至診得脉浮洪搏指汪曰產後而得是脉又且汗多而脉不為汗衰法在不治所幸者不喘不泄耳其脉如是益涼藥所激也用人參三錢黃耆二錢甘州當歸各七分白朮門冬各一錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服

五劑脉歛病漸安。

以此脉認到涼藥所致而致以陰盛格陽也以搏指之脉用參芪薑朮必其脉堅強搏手而無陽以和之也甚有用附子者不可不知



石山先生長厚君子而老於醫者也其言必不誣然初李不知

實難下手而况素厚不受補之人乎須要膽大

心小乃能濟事不然弗安為也

快甚快甚

古人於血証中每每用乾姜而今人率用炮姜則孰是而孰非也若謂入肺則宜乾姜入肝則宜生姜入脾溫中則宜炮姜以其有守有走有

王僉憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲飲冷水瓜果譫語若狂

飲食不進體素豐厚不受補醫用清涼之劑熱增甚診得六脉浮

大洪數汪曰產後暴損氣血孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補

氣血與八珍湯加炮薑八分熱減大半病人自以素不宜參耆不

宜再服過一日復大熱如火復與前劑潛加參耆炮薑連進二三

服熱退身涼而愈

丹溪曰產後發熱用參朮黃耆陳皮當歸川芎炙甘艸補虛輕則

加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾薑或云大熱而用乾薑何也

曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能入肺分利肺

氣又能入肝分引眾藥生血然不可獨用必與補陰血藥同用此

從之不同也今  
用炮姜須炮得  
十分極黑乃妙

要訣

此以佛手散合  
四君加黃芪而  
不用芍藥地黃  
音以新產之後  
宜用血脫益氣  
之法不宜歛降  
以伐生氣也此

造化自然之妙。非天下之至神。其孰能與於此耶。  
王節齋云。凡婦人產後。陰血虛。陽無所依。而浮散於外。故多發熱。  
治法用四物湯補陰血。而以炙乾薑之苦溫從治。收其浮散。使歸  
依於陰。然產後脾胃虛。多有過食飲食傷滯。而發熱。誤作血虛。則  
不効矣。但遇產後發熱者。須審問食何飲食。有無傷積。若有胸膈  
飽悶。噯氣惡食泄瀉等證。只作傷食治之。若發熱而飲食自調者。  
方用補血正法。

丹溪方 治產後發熱

當歸

川芎

黃耆

人參

白朮

白茯苓

各一錢

甘艸

分五

方於氣血俱虛及氣虛者皆宜之

此方全不用氣藥是血虛而氣不虛飲食善用者也加茯苓者使天氣降而陰自生陰生熱自退也熱甚者加炒姜則不惟從陽引陰亦可從陰引陽也微乎微乎

此又前方之變

內不用背

是一錢當在肝

腎上求之

此方用參歸為氣血之王而作

右劉水煎服○熱甚加乾薑

加味四物湯

治產後陰虛血弱發熱

當歸

川芎

白芍

熟地黄

白茯苓

各一錢

右水煎服

○熱甚加炒乾薑○虛煩加茯神遠志

抽薪散

治產後血虛發熱

當歸

熟地黄

各四錢 乾薑 炒黑 一錢

右劉一劑水煎服

人參散

治產後諸虛不足發熱盜汗

方見前自汗

人參當歸散

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令人

以熟地麥門肉桂白芍粳米竹葉煎服如血熱甚者加生地

此与原方逍遙散不同又與立齋所用加味逍遙散亦不同此則以小柴胡湯合四物生脉散去半夏五味而加烏梅葛根者也若原方之用薄荷為引而此用葛根又各有妙處予常去川

芎藭根薄荷而加青蒿薑甲以治胃熱亦尋古法全耳

亦血益氣

總解

心煩短氣自汗頭痛

方見前虛煩

加味逍遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸 白芍 乾葛 生地黄 川芎

黃芩 柴胡 人參 麥門冬 烏梅

甘草 六分

右劉散分作二服用水一鍾煎七分空心服

犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角

麥門冬

白朮

柴胡

生地黄

當歸

人參

烏梅

甘草

各錢

錢一

各二錢

各九分

各半

六分

各半

兩

兩

兩

兩

各半

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

平穩正方

生薑發汗浮麥

正汗而同用之

首內以養心外

以和表也

平正之劑可法

黃耆

黃芩

甘艸

炒各七錢

右咬咀每服四錢入生薑三片浮麥七十粒同水煎

三合散 治產後日久虛勞發熱即四物四君子小柴胡三方合

當歸

川芎

白芍

熟地黃

白朮

白茯苓

黃耆

各一錢

人參

柴胡

各錢半

黃芩

半夏

甘艸

各五分

右作一服加生薑三片紅棗一枚水煎食前服

○往來寒熱

郭稽中曰產後乍寒乍熱者何荅曰陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或

何爲敗血入肺  
則熱入脾則寒  
也豈以肺主氣  
氣不和而熱脾  
統血不榮而  
寒乎抑脾陰肺  
陽而自爲寒熱  
也然德以逐痰  
爲主而溫涼之  
法有不同焉  
閉陰閉陽之說  
卒難理解以敗  
血閉陰則寒閉  
陽則熱而有解  
休會作之時則  
似瘧矣若瘀血  
爲有形之物閉  
則壅矣而安有  
解會之所也愚  
謂血閉於陽經  
而榮衛行之不  
通則寒閉於陰

寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺  
則熱入於脾則寒若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四  
物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血  
也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減  
陳無擇評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止  
入脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱  
只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解  
則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳  
薛氏曰產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之証經云陰  
虛則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不可用

經而榮衛行之不通則熱故必其瘀通而寒熱自已也又就大調經散而言行瘀於內也五積散行瘀於外也又意為外經或為寒客則肺為之病肺病則肌表瘀而榮衛不通則熱內腑或為冷物所傷則脾病脾病而榮衛不通則為寒故所用之方一主裏一主表也亦或內外俱瘀則寒熱並作而二藥又均不可廢也粗淺之言伏惟裁之誤矣

發表降火若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒須用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認為實則誤矣

一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難候其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土

相白虎湯而言  
○以欲按腹手

護中虛也以犯  
怒抽搐而青肝

木也六君補中  
木香調肝以治

肝木侮土是矣  
然亦有不受補

者又以疎肝為  
急所謂標而本

之亦有之焉  
此翁善補然亦

認症的確故可  
用設不的即敗

乃事矣慎之  
此正治常法

此法宜知

飲食停滯而作用六君加木香一劑而安

一產婦惡露發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以為風寒

用小柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛乏不信仍服一劑汗出不

止謔語不絕煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補湯二劑益甚脉

洪大重按如無仍以前湯加附子四劑稍緩數劑而安

吳菱山治一婦人產後去血過多食後着惱頭疼身痛寒熱如瘧

左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食飲痰火也二者因虛而得

宜養正祛邪遂以茯苓補心湯去地黃加羌活青皮葱棗三服汗

出身涼其患漸差然後以八物湯調理半月後全愈一婦產後惡

露未盡瘀血入絡又感寒邪身熱如瘧即以生料五積散五帖惡



露自下而寒熱除。

又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊而弦以葱白散二帖安。

冷物是病根故諸症皆從瘀血變怪

弦緊為寒審症法尤宜如是察識

重在琥珀豈大豈有如是之神也

一少婦初產四日冷物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少心腹滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽搐類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不効汪至見醫滿座亦踟縮診其脉弦而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大勢惡露已下未必還有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客於經絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患

往來寒熱 十七

以小柴胡合四物一名三之一氣湯其參芪甘半各用三錢爲重在補氣也而甘草半何爲亦倍之似可損益也原方有姜本亦不可少

此亦小柴變法而去黃芩加陳皮者所以益胃除脹也加芍藥川芎者所以和

方愈遂合前藥服之。五日後行惡水斗許。臭不可近。患者覺倦。病勢漸減。然後以人參養榮湯數十帖。月餘如初。

柴胡四物湯

治產後往來寒熱。及日久虛勞。微有寒熱。脈沉而

數。

當歸

川芎

白芍

熟地黃

各一錢半

柴胡

一錢

人參

黃芩

半夏

甘艸

各三錢

右剉每服一兩水煎服。

增損柴胡湯

治產後虛弱。寒熱如瘧。飲食少。腹脹。

柴胡

人參

甘艸

半夏

炒

陳皮

川芎

白芍

炒各等分

血也本州以當歸治酒酒寒熱不已則產後寒熱正宜加之何為不用宜思之

按往來寒熱者

寒往熱來熱往

寒來也寒熱如

瘧者寒熱有時

也乍寒乍熱者

時乎寒時乎熱

也發熱增寒者

身發熱而又惡

寒也治各有法

不能備錄

此方前三味各

一兩何其多後

三味各三錢何

其少非有大智

慧大力量大見

解者不能處此

右咬咀每服八錢加生薑五片棗二枚水煎服

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯

胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸

芍藥

川芎

人參

乾薑

各一兩

甘艸

炙半兩

○右咬咀每服四錢加生薑三片水煎服

釋曰此方治陰陽不和乍寒乍熱之寒熱不治惡露未盡血滯

胞絡小腹急痛之寒熱宜詳之

更生散 治產後去血過多或不<sub>○</sub>止或眩暈眼暗口噤發熱增寒

人參

當歸

熟地黃

薑汁炒

川芎

荆芥穗

香油燈

乾薑

炒黑各

三錢

方治此病名之曰更生能不於危急時用乎

下三味乃固澀

惡藥非血大下不止者不用

此方重在惡露未消而疾神之

用所以和陰陽

也有謂此方如神者功在琥珀

大豆湯飲間也

此方重在傷風二字故以柴胡

為君蓋風邪陷入胞中則發熱

故宜柴胡為君少陽氣陷入厥

陰而寒熱如瘧者氣不得條達也故亦以柴胡為君芳復除熱

右剉水煎空心服○如血大下不止加龍骨赤石脂各火煨等

分每二錢同前藥調服外以五倍子末津調納臍中即止

大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰

陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平之所為也

大豆 一兩半 扶神 一錢 真琥珀 一錢

右為細末每服二錢濃煎烏豆紫蘓湯下

黃龍湯 治產後傷風熱入胞室寒熱如瘧及病後勞復餘熱不

解

柴胡 四錢 黃芩 八分 人參 一錢 甘艸 各一錢八分

右作一服水煎服

者亦為餘邪熱陷也故亦用柴胡

此方以治少陽等症似矣然以弦脉而加生地山枝者傷寒家以弦脉為陽也故以柴胡為君此方治表裡風寒食積氣血痰飲無不誦括故曰治錯雜之邪蓋此方也與五積散相為伯仲若借此以治三陰瘧之有錯雜之邪者必臻至効語云醫者意也請嘗試之

小柴胡加生地黃湯 治產後往來寒熱而脉弦者少陽也

柴胡二兩 黃芩五錢 人參三錢 半夏製兩 生地黃

梔子 枳殼麩炒各半兩 大棗三枚

右剉加薑棗水煎服

加減烏金散 治產後寒熱似瘧。此治錯雜之邪

厚朴 柴胡 黃芩 麻黃 羌活

草果 半夏各二錢 當歸 川芎 白芍

熟地 陳皮 茯苓 桔梗各一錢五分 桂枝

蒼朮 白芷 枳殼各一錢 甘艸九分

右剉為散分作兩服每服用水一鍾半薑三片葱三莖煎至一

卷十一 往來寒熱 十九

加減法切中不可不法

此方雖出產室然闕其症攷其其藥皆治產後外邪乘虛傳入之抵症也如惡寒壯熱一夜三五度發惡語者印熱久血室類也故用防獨葛

鍾不拘時服○有汗多當歸川芎白芍藥熟地黃○有脹多厚朴陳皮○有熱多柴胡黃芩○有寒多蒼朮草果桂枝○有痰多半夏桔梗茯苓○有頭痛多川芎白芷羌活○有瀉去枳殼甘艸不用○有餘血塊在腹作潮熱疼痛加三稜莪朮多用玄胡索八角蘘香○遍身痛加羌活獨活○寒熱往來加黃芩柴胡

產寶方 療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時

乾嘔困乏悶絕

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風

青竹茹 遠志 各一兩半 扶神 二兩 白欬 二兩半

根以散之口瘡  
 乾嘔者熱傳胸  
 中也故用玄參  
 二竹以清之白  
 蘗皮苦寒治產  
 後百病自欬自  
 銀人參遠志茯  
 神爲邪散熱清  
 故用之以治困  
 乏也  
 按自黃龍湯以  
 下皆集外感治  
 法至於錯雜之  
 邪時熱之症安  
 不備載而次第  
 有節真如綱之  
 有綱也今人但  
 知產後寒熱以  
 補氣血爲主者  
 其不誤盡世人  
 平  
 草菓飲生熟飲

玄參三兩 竹瀝 一升

右取銀一觔水一斗五升煮取七升而諸藥重者取三升分温

三服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後乍寒乍熱通身温壯脇心煩悶

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二兩 桂心 甘草 各一兩

右咬咀用水五升煮取二升半分三服○一方不用桂心用生

地黃

○瘧疾

婁氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之熱多者艸果飲子寒多者生熟飲子

是散法柴胡四物是調理法而

暑瘧虛瘧久瘧未俗者當與雜

症同

此數條俱屬溫

補大與時宜可

備前方之未備

而暑邪所伏之

方不載為以治

暑方用石膏也

蓋薛翁喜溫補

而產後尤忌寒

涼血虛又忌白

虎故不言耳臨

症又宜分別

補遺云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者養胃湯久而不已者七寶飲截之

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多人參養胃湯飲食勞役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百證當補其病自退若誤用清脾截瘧之類多致不起



亦自不必拘此  
方者須因人尋  
怯而施如清脾  
飲脾果飲之類  
是也

以氣虛故可至  
三十五日而便  
固不燥若以日  
久大下之誤矣  
六脈不恆宜乎  
用此然非醫工  
之良者不能非  
王人之專任者  
不用各宜自省

以一瘧而用百  
餘劑真為可笑  
然病有如是者  
不得不然也幸  
勿以迂而勿信  
蓋目擊時事故  
敢蒼及

一產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸暖氣  
此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作  
酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計  
進飲食七十餘碗腹始悶令用猪膽汁導而通之其糞且不甚燥  
一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脉或洪大或微細或弦緊或沉  
伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脉證稍得又用參朮煎膏  
佐以歸脾湯百餘劑而瘥

一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服  
百餘劑而尋愈一瘧用藥百餘劑世間豈有此治法此非藥之効乃病久自息耳丹溪立齋用藥多如此殊為可笑  
草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

此治外感風寒  
內傷飲食之瘧  
也若暑瘧服之  
則自誤矣以暑  
言然清暑之劑  
非產後所宜亦  
須防慎

所謂脾寒作瘧  
也非多寒者勿  
用

半夏 炮

赤茯苓

甘艸 炙

艸果 炮去皮

川芎

陳皮

白芷 冬二錢

青皮 去白

良薑

紫蘇 各二錢半

乾葛 四錢

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎當發日侵早連服

二服無有不安者

生熟飲子

治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻

艸果仁

厚朴 生用去皮

半夏

陳皮

甘艸

大棗 去核

生薑 各等分

右八味判碎和勻一半用生一半用濕紙裏煨令香熟去紙與生者和勻每服五錢水煎食前一服食後一服

雖曰久而不已  
者宜截然此方  
有常山於痰瘧  
則可若果虛症  
大非所宜

清脾飲 治產後瘧疾。熱多寒少者。

人參養胃湯 治產後瘧疾。寒多熱少者。

七寶飲 治產後瘧疾久而不已者。以此截之。

方俱見胎前瘧疾。

○蓐勞

大全云。產後蓐勞者。此由生產日淺。血氣虛弱。飲食未平復。不滿  
日月。氣血虛羸。將養失所。而風冷客之。風冷搏于氣血。則不能溫  
于肌膚。使人虛乏勞倦。乍臥乍起。顏色憔悴。食飲不消。風冷邪氣  
兩感於肺。肺受微寒。故咳嗽口乾。遂覺頭昏。百節疼痛。榮衛受於  
風邪。流注臟腑。須臾頻發。時有盜汗。寒熱如瘧。背膊煩悶。四肢不

葶勞二說總起  
于產葶然一挾  
外感一由七情  
其或兼內傷飲  
食泄瀉與夫瘀  
血未淨者皆有  
之不可不別也

大主意

舉沉重着床。此則葶勞之候也。

又曰婦人因產理不順。疲極筋力。憂勞思慮。致令虛羸喘乏。寒熱如瘧。頭痛自汗。肢體倦怠。咳嗽痰逆。腹中絞刺。名曰葶勞。

薛氏曰。按前證。當扶養正氣。為主。用六君子湯。加當歸。若脾肺氣虛。而咳嗽口乾。用補中益氣。加麥門。五味。若因中氣虛。而口乾頭暈。用補中益氣。加蔓荊子。若肝經血虛。而肢體作痛。用四物。參朮。若因肝腎虛弱。而自汗盜汗。寒熱往來者。用六味丸。加五味子。若因脾虛血弱。肚腹作痛。月經不調。用八珍湯。倍加白朮。若因脾虛血燥。皮膚癢痒。用加味逍遙散。大抵此證。多因脾胃虛弱。飲食減少。以致諸經疲憊。而作。當補脾胃。飲食一進。精氣生化。諸臟有所

授莖大无力則  
 似於革矣革屬  
 於虛非胡連所  
 治如果胡連能  
 治必非无力也  
 請詳之

節十全大補之  
 變所少者白朮  
 甘草然以茯苓  
 為君猪腰為佐  
 者心腎交寒熱  
 兼也

倚賴其病自愈矣仍忝虛損發熱方論主治

汪氏治一婦產未滿月因怒氣血流如水三日方止隨又勞苦四肢無力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如灸諸醫皆用柴苓薄苛之類其熱愈熾診其脉弦大無力此葶勞也以四物湯一兩入胡黃連秦艸青蒿各半錢數服熱退身涼後以黃連八珍丸一料而安

白茯苓散 治產後葶勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓一兩 當歸一兩 川芎 熟地黃 白芍炒

黃耆 人參 桂心各半

右先以水三盞入猪腰一雙薑三片棗三枚煎至二盞去麤入

前藥半兩煎一盞服

黃耆建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛。

黃耆炒

肉桂各一兩

白芍炒二兩

甘草炒七錢

右剉每服五錢用薑棗水煎服日二三次虛甚加附子

當歸建中湯

治產後勞傷虛羸不足腹中疼痛呼吸少氣小腹

拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至月滿一日三服令

人身壯強健

當歸四兩

白芍六兩

桂心三兩

黃耆一兩半

右剉每服四錢加薑棗水煎入飴糖一塊再煎稍執服○如崩

中衄血加阿膠地黃

所謂建中者建

中土也芍藥甘

艸易老為有甲

已化土之象加

肉桂以治脉弦

虛寒腹痛加黃

芪益表氣以助

中氣之虛

此方專治氣血

虛寒所生諸症

加之飴糖乃建

中之良法

以盜汗而用柴  
前川芎似非宜  
矣以咳嗽有痰  
而用黃芩又似  
難用然以之爲  
君而柴前僅用  
錢許何多寡之  
相懸也要之產  
後當以氣血爲  
主故用之耳惟  
無邪者宜之

四物四君內去  
木加其合小柴  
胡湯者是也會  
三方之意方得  
其理之真  
羸勞一症總屬  
氣血兩虛故主  
於十全大補爲  
法加續斷治諸

加味佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸 川芎 黃芩 柴胡 前胡  
蜜炙各一兩 錢半

右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚

生薑一片煎服○如有痰不用烏梅

柴胡四物湯 治產後日久虛勞而脉浮大者

方見前往來寒熱

三合散 治產後日久虛勞鍼灸服藥俱無効者

方見前發熱

雲岐熱地黃散 治產後羸勞皆由體虛氣力未壯勞復所起四

肢煩疼時發寒熱不思飲食

六十一 二 羸勞 二 四

不足婦人內漏  
五味生津歛神  
加麥門更妙所  
去三所加三又  
也

按此不離四物  
黃芪續斷桂心  
五味而驚甲除  
骨節之勞熱栢  
子潤心中之津  
液牛膝除足膝  
之苦沉香通天  
徹地花卷為可  
命枳壳利胸膈  
細閱前後諸方  
以補氣血為

熟地黃 人參 白芍 白茯苓 白朮

續斷 各一兩 黃耆 當歸 川芎 五味子

桂心 各七錢半

右咬咀每服四錢生薑三片束一枚水煎服○大全方有麥門冬七錢半○一方無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各七錢半

黃耆丸 治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力羸乏

黃耆 驚甲 當歸 炒各一兩 川芎 白芍

桂心 續斷 牛膝 菴蓉 栢子仁

沉香 枳殼 各七錢半 五味子 熟地黃 各半兩



至或溫或清或  
飲或散或破血  
或行氣各隨兼  
症而佐使之妙  
諸用者不必膠  
甘而調瑟  
石子即猪腎用  
以佐諸湯者得  
本來面目也然  
現葱豉似有外  
邪易知母又有  
內熱不可不辯  
用人參更佳

右為細末、煉蜜丸如桐子大、每服四五十九、食後粥飲下

石子湯 療產後虛羸喘乏、乍寒乍熱如瘧、四肢疼痛、面色痿黃

名曰蓐勞

猪石子

一雙去脂  
膜四破

香豉

一方無此  
有知母

葱切

粳米

當歸

白芍

各二  
兩

右咬咀、分兩劑、每劑用米三合、煮取一小碗、去滓、分三服。○廣

濟方無白芍、有人參。○許仁則方無香豉、有生薑二兩、桂心一

兩、葱白止一兩

人參驚甲散 治蓐勞皆由在產內未滿百日、體中虛損、血氣尚

弱、失於將理、或勞動作傷、致成蓐勞、其狀虛羸、乍起乍臥、飲食

此十全大補湯  
 去川芎白朮加  
 鼈甲牛膝寄生  
 續斷桃仁麥冬  
 六味以治聲勞  
 有去舊生新之  
 意而寄生主產  
 後餘疾用猪腎  
 者以胎繫于腰  
 故皆借之以為  
 補助耳

不消時有咳嗽頭中昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膈  
 拘急沉困在牀服此大効。

黃耆 鼈甲各一兩 牛膝七錢 人參 白茯苓

當歸 白芍 桑寄生 麥門冬去心 熟地黃

桃仁 桂心 甘草各半兩 續斷二錢半

右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩大盞生薑半分

棗三枚煎至一盞去猪腎薑棗然後入藥末二錢葱白三寸烏

梅一箇荆芥五穗煎至七分去滓空心晚食前溫服神効

胡氏牡丹散 治產後虛羸發熱自汗欲變聲勞或血氣所搏經

候不調或寒熱羸瘦

五加皮去賊風  
惡血腰脊痛

開元錢麻油莫  
解

此方較前人參  
鼈甲散少桃仁  
續斷於煎法又  
少葱白烏梅荆  
芥要知有痰則  
兼破瘀有風則  
兼治風寒則兼  
寒熱則兼熱無  
定一也

當歸 白芍藥 人參 五加皮

地骨皮 各半 牡丹皮 三錢 桂心 沒藥 各二錢

右為細末每服二錢水酒各半盞如不飲酒只用水一盞開元  
錢一枚麻油蘸之同煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煮散 治產後蓐勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒壯熱四肢

痠疼心煩頭痛

鼈甲 醋炙 黃耆 各一兩 牛膝 七錢 當歸 白芍 熟地黃

人參 白茯苓 麥門冬 去心 桑寄生 桂心 甘艸 各半兩

右為細末每服用猪石子一對去脂膜切破先以水一盞入薑  
半分棗三枚煎至七分去石子薑棗却下藥五錢更煎至四分

承會圖目 卷下三蓐勞 三二六 翳寄

此不藥之藥所  
謂穀肉果菜食  
亦盡之地

去滓空心晚食前温服二滓並煎

猪腰子粥

治產後蓐勞發熱

猪腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作會狀空心服之

○虚羸

產寶云產後虚羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可涉墮否則氣血復傷虚羸之證作矣

薛氏曰前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停

食傷脾者。用六君子湯。勞傷元氣者。用補中益氣湯。若噯氣覺有藥味者。此藥復傷胃也。但用四君子湯。徐徐少飲。以調脾胃。若胃氣一健。血氣自生。諸證自愈矣。

君為氣血虛則為本氣虛而寒。即無風冷客之而亦寒也。治者須知不足有餘。

初感為寒久則為熱。若果胞冷。即本氣虛熱者。即血虛。

此方以中氣元氣為主。而無血藥者。必脾胃虛。

大全云。冷勞者。產則血氣勞傷。臟腑虛弱。而風冷客之。冷搏於血。氣血氣不能溫於肌膚。使人虛乏疲頓。致羸損不平。復若久不平。復風冷入於子臟。則胞臟冷。使人無子。

薛氏曰。前證若血氣虛弱。用八珍湯。血氣虛寒。用十全大補湯。胃

氣虛弱。用補中益氣湯。脾氣虛弱。用六君子湯。命門火衰。用八味

湯。肝脾血虛。用加味逍遙散。肝脾鬱怒。用加味歸脾湯。

補虛湯。治產後一切雜病。只大補氣血為主。

而本元不足也  
其血藥止用川  
芎又於補氣中  
以行肝血抑血  
腕益氣補脾生  
血之良方也

黃芪易芍藥者  
即補血湯以黃  
芪為君之義所  
謂氣能生血血  
不能生氣而芍  
藥有殺伐之性  
無生長之能故  
去之  
加減法妙

多用酒炒助生  
氣也乃丹溪法

人參

白朮 各一錢

黃耆

川芎

陳皮 各五分

甘艸 各三分

右剉加生薑二片水煎服○熱輕倍加茯苓熱

甚加炒黑乾薑三分

黃耆四物湯

新產不可用芍藥以其酸寒能伐生發之氣只以

黃耆易芍藥為補虛之要藥

黃耆

當歸

川芎

熟地黃 各等分

右剉每服四錢水煎服○氣虛加參朮茯苓甘艸○發熱加乾

薑○自汗多者少用川芎勿用茯苓倍加蜜炙黃耆○口渴加

五味子麥門冬○腹痛者非白芍不可雖新產亦用但以酒炒

不妨

惡寒者陽虛發熱者陰虛此八物之用也肉桂能通榮衛而和陰陽猶諸候之命圭使通兩家之好也

本草云人參黃芪與羊肉同功又謂羊肉補形蓋有形之物者血而參芪益氣羊肉補形似有懸殊烏可同語然有形生於無形故曰形不足者溫之以氣則羊肉參芪二而一者也而四味有氣有血能補能行故無疾亦

# 十全大補湯

治產後血氣未復形體虛弱發熱惡寒不能飲食

人參

白朮

茯苓

黃耆

當歸

川芎

白芍炒

熟地黃各一錢

肉桂

甘艸各五分

右剉加生薑五片棗三枚水煎服

# 當歸羊肉湯

治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛即宜服之

肥羊肉

一觔去脂當歸五兩

黃耆四兩

生薑六兩

右先以水一斗煮羊肉取汁八升後下三味煮取二升五合分

為四服○若覺惡露不盡加桂三兩○惡露下多加川芎三兩

○有寒加茱萸一兩○有氣加細辛二兩○有熱加生地黃汁

二合

宜服也

肝屬與木雞屬  
巽禽雌雞者陽  
中之陰黃色者  
九土之正產後  
肝虛血弱故取  
以補之色之正  
脾之宜也其所  
配藥摠以血氣  
為主故曰補虛  
羸也其治腹痛  
全在桂心  
此即十全大補  
湯之變其去地  
黃白朮茯苓者  
意恐滯痰滯氣  
痰滲泄氣耳

釋曰所加五法分兩多寡皆有意義若川芎之治惡露下多陰  
中升陽也有氣之加細辛辛以散肝也餘可類推

黃雌鷄湯 治產後虛羸腹痛

小黃雌鷄 一隻去翅足頭 當歸 白朮 熟地黃

桂心 黃耆炒各半兩

右先以水七鍾煮鷄至三鍾每用汁一鍾藥四錢煎日三服

產寶方 治產後虛羸不生肌肉

黃耆 炒 當歸 白芍 炒 人參 各三分 桂心

甘草 炙 川芎 生薑 各四分 大棗 十二枚

右九味用水七升煮三升分溫三服



此方與前羊肉湯相為表裡而後四味尤佳以其能助胃氣內通榮衛三焦外達頭自皮毛也夫先天之氣生於腎後天之氣生於脾元神生於二氣之先為不可名之物其德藏而不用是方以人參回元氣於無何有之鄉以歸芪生氣血於元氣之戶猪腎粳米益脾胃之氣于先後生薑豆豉雞白通神明于內外散邪穢于天壤遇行血脉而無

一方 治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不止

黃耆<sub>三兩</sub> 當歸 人參 生薑<sub>各二兩</sub> 淡豉<sub>三合</sub>

猪腎<sub>二枚</sub> 粳米<sub>三合</sub> 薤白<sub>三合</sub>

右以水一斗五升先煮猪腎取六升下諸藥煮取二升分為三

服

又方 猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之

○痞悶

郭稽中曰問產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服

所不通宣券百  
骸而無病不治

以是骨痛頭疼  
自汗諸症有邪

則散無邪則補  
所謂妙用無方

隨感隨應者也  
於治產後虛勞

者宜識思焉

隨因調治極是  
但治煩以四物

去地黃尤不如  
玉川芎也

見睨丸則愈

釋曰為食麵者之戒。南人甚少。於諸飲食。皆能致疾。不必拘於

一麵也。

陳無擇評曰。產後口乾痞悶。未必只因食麵。或產母內積憂煩。外傷燥熱。飲食甘肥。使口乾痞悶。當隨其所因調之。可也。心煩宜四物湯。去地黃。加人參。烏梅。煎。若外傷燥熱者。屬何經。當隨經為治。難以備舉。飲食所傷。見睨丸却。能作湯。

薛氏曰。前證若宿食停滯。用六君。枳實神麩。若因肉食所致。更加山查。若因魚鱸之類。再加陳皮。其物既消。而仍痞。或反作痛。作嘔。此脾胃受傷。用六君子湯。或噍酸。噉腐。加炮薑。作瀉。更加升麻。如

不應佐以四神丸或間用補中益氣湯。

一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積為患用大酒麴炒為末溫酒調服二錢俄而腹鳴良久仍下糞而愈。

一婦人食魚肝腹痛患痢諸藥不應用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數劑而愈。

見睭丸 治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛。

薑黃炒 萆澄茄 良薑 三稜醋煨 蓬朮醋煨

人參 陳皮去白各等分

右為細末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛取餘汁煮麴糊丸如桐

按見睭丸有三稜莖莖不長安溫酒之味加以人參丸以蘿蔔汁亦巧於治也矣而立齋純於用補亦為膏梁久用消導者設也如藜藿新病未嘗用消導而氣

實者豈可泥於  
立齋之說乎法  
當臨時消息  
蘿卜湯為治趣  
也

大每服三五十九蘿蔔湯或白湯下

○腹脹

鄧稽中曰產後腹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受  
之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐  
逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干更傷正  
氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

稽中之言雖泥  
於敗血而其方  
亦加參立齋之  
言純於補氣似  
近於偏臨症似  
宜斟酌  
節飲食者損谷  
自愈之理

薛氏曰前證若敗血傷於脾胃宜用前方若飲食停於脾宜用六  
君加厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其

飲食為善

抵當湯太峻似  
非產後所宜即  
有用之亦不得  
已也如下後重

一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小腹重墜似欲

本節不用抵當亦宜升補

此方亦穩當即半夏能破血立希曰最宜以其有和胃益氣之物也

是法家語簡當

敗血日久成反胃者理實有之而古方六丁丸可治此方不能治瘀血也

去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重

墜如故又用六君子湯而安

抵聖湯 治產後腹脹滿悶嘔吐不定蓋敗血入於脾胃而脾不

能運化故胃不能納穀以致嘔吐腹脹等症薛氏曰此方最宜用

赤芍藥

半夏

湯泡

澤蘭葉

陳皮

去白

人參

各一錢

甘草

炙五分

右作一服加生薑三片水煎溫服○惡露過多者去澤蘭赤芍

藥倍加陳皮生薑

香砂養胃湯 治產後嘔吐飲食不下腹脹者此敗血攻於脾胃

之間日久成反胃之症

半夏

一錢

白朮

陳皮

茯苓

厚朴

香附子

各八分

與人參參胃湯  
少有差別而香  
附檳榔砂仁白  
木皆得治法之  
要  
此立齋方也如  
果有飲食停滯  
者不妨另為加  
減

以平胃加入參  
搥是慮產後氣  
虛之故却為醫  
家作一法眼

丹溪云上升之  
氣自肝出產後  
肝血虛而肝氣  
彌盛以是衝上

人參  
藿香  
砂仁  
檳榔  
草果各五分  
甘草四分

右劉加生薑三片烏梅一個水煎服

加味六君子湯 治飲食停滯于脾以致腹脹嘔吐

人參  
白朮  
茯苓  
甘草炙減半  
陳皮去白

半夏湯泡七次  
厚朴姜製各一錢

右劉加生薑三片水煎服

加味平胃散 治產後腹脹

厚朴姜炒  
蒼朮米泔浸炒  
陳皮  
甘草炙  
人參各一錢

右劉水煎服

紫金丹 治產後衝脹胸中有物狀如噎氣

作脹用代赭者  
鎮肝氣之上逆  
也醋煮更妙  
礮石即磨刀石  
亦為肝而設

此兼血脹

此治水法惟有  
餘者可服曰治  
喘者因水逆而  
上喘也水下則  
喘自止矣

代赭石

礮石各等分

右為細末醋糊丸如桐子大每服三五十九酒下胸中痛加當歸湯下久服治血癖

又方

代赭石

一兩

桃仁

三錢炒去皮尖

大黃

半兩

右為末薄荷水打糊丸如桐子大每服三五十九溫水下無時

白聖散

治產後腹大堅滿喘不能臥

樟柳根

三兩

大戟

一兩半

甘遂

一兩炒

右為極細末每服二三錢熱湯調下取大便宣利為度此主水

氣之聖藥也

此藥峻利不可輕用

○浮腫

郭稽中曰產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢留淫日深却還不得腐壞如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之投以甘遂大戟等藥以導其水夫產後必虛又以藥虛之是謂重虛往往多致天枉但服小調經散血行腫消則愈

氣分者先腫而後經血不行血分者先經血不行而後腫也故治法不同

陳無澤曰產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可不辯要當隨所因脈證治之小調經散治血分固效但力淺難憑不若吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏於氣不得



宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也

潔古云如產後風寒在表面目四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度如浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也如只浮腫止七聖丸本方服

東垣云中滿分消丸

見腫滿門

用四物湯吞之

丹溪云產後腫必用大補氣血為主少佐以蒼朮茯苓使水自利薛氏曰前證若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中益氣當參雜證本門主治

以中氣虛誤服  
消越藥所致故  
宜補土爲至金  
匱左者以補火  
生土而有水鬱  
折之之法存焉

審水氣法如咳  
嗽小便澀者乃  
肺失降下之令

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫余謂中氣不足朝用補  
中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐  
瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸  
而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾肺虛寒用六君加  
薑桂而泄瀉愈用補中益氣而脾胃健

杜氏治張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月  
不差病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮  
腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀是也今愛寵小便不澀不作  
咳嗽惟手足寒乃血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用益血和氣

藥治之旬日病去七八。經半月全愈。所用之藥乃靈苑方牡丹散也。其方云：治血臙風虛冷。今產科家多用此藥治產後諸病如神。更名捐金湯者是也。牡丹散見血量

一婦產後四肢浮腫寒熱往來。蓋因敗血流入經絡。滲入四肢。氣喘咳嗽。胸膈不利。口吐酸水。兩脇疼痛。遂用旋覆花湯。微汗漸解。頻服小調經散。芎藭湯。調下。腫氣漸消。大調經散。治產後腫滿。喘急煩渴。小便不利。

方見前往來寒熱。

小調經散 治敗血乘虛停積。流入經絡。四肢浮腫。

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

細辛

麝香

各五分

右為細末每服五分薑汁温酒各少許調服

經驗方 治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

乾漆

大麥芽

各等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥藥一重乾漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下

二錢

白木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實

一兩半

白木

三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓温服腹中爽即當

此仲景方也易  
老交而為左

膏膠者血瘀也  
以血化為水故  
用此乃簡便良  
法

此行氣法謂之  
正脾者氣行而  
脾得運也

散也。

正脾散 治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣虛弱中滿腹

脹等症。

蓬莪朮

香附子

童便浸

茴香

甘草

陳皮

各等分

右為細末每服二錢燈心草木通湯下。

小調中湯 治產後一切浮腫但用此藥無不效者。

茯苓

當歸

白芍藥

陳皮

各一錢

白朮

半錢

右切作一劑煎湯調後藥末。

沒藥

琥珀

桂心

各一錢

細辛

麝香

各五分

橘皮酒 治產後肌浮以此行氣。

補脾胃行瘀血  
妙在調服法

此方以白朮為君陳皮為佐川芎調血通荏利水與雞丸清金

此方甚奇大藥中宜有濕痰留積致小便不利者宜之猶服二劑湯能使大便澀而小便長也

橘皮為末每服二錢酒調服

丹溪方 婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛

而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行氣可也

白朮

二兩半

陳皮

兩

川芎

兩半

木通

六錢

茯苓

三錢

右用水煎下與點丸二十五丸

黃芩為末糊丸名與點丸亦名清金丸

奪魂散

治產後虛腫滿促利小便則愈

生薑

三兩取汁

白麵

三兩

大半夏

七枚

右以生薑汁搜麵裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調一盞小

便利為效

張氏方

治產後血虛風腫水腫

澤蘭之性能通瘀血利水道同防已則又為利水絕藥矣

瀉肺利水之急劑也

此方為實熱者設

澤蘭葉 防已 各等分

右為末每服二錢温酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防已散 治產後風虚氣壅上攻頭面浮腫此藥虛人戒服

漢防已 豬苓 枳殼 桑白皮 各一兩 商陸 甘草 各七錢半

右為釐末每服四錢生薑三片水煎空心温服

七聖丸 治產後風氣壅盛面目四肢浮腫涕唾稠粘咽乾口燥

心膈脹滿大便秘小便赤睡臥不安

肉桂 去皮 川芎 大黃 酒蒸 檳榔 木香 各半兩

羌活 郁李仁 去皮各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後温湯下○山嵐瘴

本虛便是寒氣  
故用溫劑

地最宜服。量虛實加減。○如浮腫。又頭痛昏冒。加羌活川芎。謂風多也。○如只浮腫。此用本方。

加味吳茱萸湯

治婦人臍氣本虛。宿挾風冷。胸膈滿痛。腹脇絞

刺。嘔吐惡心。飲食減少。身面虛浮。惡寒戰慄。或泄瀉不止。少氣

羸困。及因生產。臍氣暴虛。邪冷內勝。宿疾轉增。此治風寒之劑

吳茱萸

一兩半

乾薑

桂心

防風

細辛

當歸

牡丹皮

赤茯苓

半夏

桔梗

麥門冬

甘草

各半兩

右為籠末。每服四錢。水煎。食前熱服。

加味八物湯 治產後遍身浮腫。氣急潮熱。

人參

白苓苓

熟地黃

小檳香

各三錢

白朮



川芎各四錢 當歸 白芍 香附子各五錢 柴胡

黃芩 甘草各一錢

右剉散分作六七服每服加生薑三片水煎空心熱服盡此藥方服調經丸○若肚痛加延胡索乾漆枳殼各三錢○若嘔吐惡心加良薑砂仁各二錢○若手足麻痺加肉桂一錢半○若咳嗽加五味子款冬花杏仁

加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰重脚腫小便不利或肚腹腫脹

四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱證其効如神此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

熟地黄四兩酒拌搗膏 白茯苓三兩 山藥 山茱萸 澤瀉

夫土為防水之隄腎為置水之器腎為胃之關而開竅於二陰土惡濕腎惡燥而命門之氣藏於腎為生土之母主化津液以利膀胱故醫氣

盛則土旺而水有所隄自無泛溢之患若火衰則氣不化而水溢溢則濕土卑溫而妄行矣故有水脹之病此方既能益火以生土又能化氣以利水此其所以為治腫之聖藥也若於熱脹又非所宜

牡丹皮 牛膝 車前子 官桂 各一兩 附子 半兩

為末和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八十九空心白湯下

○積聚 血瘕即見枕宜參看

大全云夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚兼陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也薛氏曰前症乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固真氣為主若求旦夕之效而攻其邪則速其危矣當參前雜証積聚諸方



所至而飲食無味則脾也故須肝脾兼治

雖以風冷為因  
挽是血氣不治

此亦大弊言耳  
至於治法非行  
氣破結不可而  
禁止邪自除之  
說於胃氣不足  
及於太過者切  
有補焉  
其都肝血虛而  
大補者宜用

或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無味殊類廢症久而  
不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而  
愈

大全云新產後有血與氣相搏而痛者謂之痲痲之言假也謂其  
痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產血下則少故致  
此病不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也

薛氏曰前證乃寒邪乘客氣血壅結此因氣病而血病也當補養  
胃氣調和月經寬緩靜養為善難經云任脉之病男子為七疝女  
子為瘦聚當參前後各論治之

河間芍藥湯 治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

此方若為風冷所致與夫瘀血所積者當以別治之

此以佛手散溫行

芍藥一斤

黃芩

茯苓各六兩

右剉散每服半兩水煎溫服日三

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸

去蘆

川芎

赤芍藥

乾薑

炮各等分

右為細末每服二錢食前同溫酒調服

一方 治血痕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸

二兩

芍藥

炒

桂心

血竭

蒲黃

炒各二兩半

玄胡索

炒一兩

右為末每服二錢空心熱酒調下

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢

羸瘦煩疼

此三方皆以消  
瘳為至而此兼  
行氣然有輕重  
之分在人因病  
抹擇

按瘳有形瘳無  
形有形者血病  
無形者氣病故  
血病則著氣病  
則行今以血瘳  
而痛無定所者  
乃氣血俱病也  
氣為瘳鬱鬱則  
生火火薰瘳行  
故痛無定所方  
以童便生地藕  
汁者養血清火  
發瘳也蓋火清

桂心

當歸

赤芍

牡丹皮

沒藥

檳榔

乾漆

炒烟  
盡

青皮

各七  
錢半

厚朴

製

三稜

煨

玄胡索

大黃

桃仁

去皮  
尖

鱉甲

酥炙各  
一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九食前溫酒下

產寶方

療血痕痛無定處

童便

三升

生地黄汁

生藕汁

各一升

生薑汁

三升

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀飴每服取

一合煖酒調下

千金方

療血痕

生乾地黄

一兩

易賊魚骨

二兩

則不痛痰破則  
瘳消佐以姜汁  
調以煖酒以熱  
則行寒則凝故  
用之以從治耳  
此方平順中有  
奇處可法之  
凡霍亂暑症者  
多不可輕用熱  
補之劑蓋暑熱  
之氣迷結心胸  
若投以溫補是  
寔實也今人飲  
以冷水則生與  
之熱飲則死者  
可想矣  
此以飲食稍過  
即嘔吐或瀉知  
其脾虛矣致於  
手足冷能不溫  
之乎然以霍亂  
愈後故可服否

右為細末空心溫酒調服二錢七

○霍亂

大全云產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸大段虛冷者加附子來復丹亦妙

薛氏曰一產婦停食霍亂用霍香正氣散之類已愈後胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作瀉余謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調兼恚怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或

則不宜也

平日吐瀉與霍亂吐瀉不同治法亦別蓋此非霍亂正治法弗妄試也盡信書不如無書正為此耳

用此方者當認虛寒字為主

用平補之劑必致不起

一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主

佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加半夏茯苓而脾胃康

四生散 治一切霍亂吐瀉極效

方見胎前霍亂

五苓散 治霍亂渴而飲水者

白木炒 茯苓 猪苓各一錢 澤瀉二錢 桂三分

右剉作一服水煎服

理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹膨脹

人參 白木炒 乾薑炮 甘草炙各一錢



右爲末米糊丸如彈子大每服一丸嚼細白湯下

白朮散 治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷或大便不實

白朮

橘紅

麥門冬去心 人參

乾薑

炮各一兩

甘草

半兩

右剉每服四錢薑水煎服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參

白朮

當歸

草豆蔻仁

乾姜

各一兩

厚朴

姜製一兩半

右爲麤末每服三錢水煎服

附子散 治產後霍亂不止手足逆冷

附子炮

桂心

吳茱萸

炮

丁香

當歸

白朮

吐瀉用當歸者甚少而前三方皆用之亦非理之所宜也  
 霍亂忌粥飲此又以粥飲調所宜所忌有虛寒暑之別焉  
 主治的確誠為對病良藥

人參

橘紅

甘草 炙各半兩

右為細末每服二錢粥飲調服

高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疝痛

良薑

當歸

草豆蔻仁 各等分

右為細末每服二錢用粥飲調下

○右三方非真寒不可用

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或

作瘧疾

藿香 一錢半

桔梗 炒

大腹皮

紫蘇

茯苓

白朮 炒

白芷

半夏麴

陳皮

厚朴 製各一錢

甘草 炙五分

伏暑發熱

伏暑者暑熱之

氣因時感胃伏

於心胸之間以

致正氣鬱遏上

下不得宣通遂

令悶絕而死有

如尸厥之狀所

謂中脘閉結三

焦不通者是也

暑月長途往往

有之切不可補

宜備此藥以濟

以真得水土相

性比故能燥

吐逆也

右剉加薑棗水煎服

來復丹 治伏暑吐瀉身熱脈弱其效如神倉卒間須用此藥

硝石 一兩同硫黃火上微炒用柳木條攪結砂子不可火大

舶上硫黃

太陰玄精石 研各一兩

五靈脂 去砂

青皮

陳皮

各二兩

右為末醋糊丸如小豆大每服三十九空心米飲下○易簡方

云硝石性寒佐以陳皮其性疎快硫黃性寒味澁若作煖藥以

止瀉誤矣蓋用啖食生冷或冒暑熱之氣中脘閉結揮霍變亂

非此藥不能通利三焦分理陰陽其功甚效而速

一方 治吐逆不受湯藥者

伏龍肝為細末每服三錢米飲下

嘔吐

生機一明以  
此之蓋之

大全云夫胃為水穀之海。水穀之精以為血氣。榮潤臟腑。因產則臟腑傷動。有時而氣獨盛者。則氣乘腸胃。腸胃燥澁。其氣則逆。故嘔逆不下食也。

薛氏曰前證若因飲食過時。用四君子湯。飲食過多。用六君子湯。飲食過時而兼勞役。用補中益氣。若因飲食停滯。用人參養胃湯。脾胃氣虛。用六君子湯。胃氣虛寒。加炮薑木香。寒水侮土。用益黃散。肝木侮脾土。用六君升麻柴胡。命門火衰。不能生土。用八味丸。嘔吐泄瀉。手足俱冷。或肚腹作痛。乃陽氣虛寒。急用附子理中湯。多有生者。

脾專主脾胃  
之常八味  
非救急之

此屬脾虛生痰  
故以六君子為  
先是摠訣

此方不獨產後  
可用於雜症之  
有嘔吐者亦效  
妙在狗胆灵脂

以惡露發為嘔  
吐人嘗失之此  
方用荷蒂紅花  
蒲黃當歸治惡  
露不下生姜止

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食  
日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝  
夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次  
調理而痊

香靈丸 治產後嘔不止者

丁香

辰砂

另研各六分

五靈脂

一錢

右香脂先研後入砂再研勻用狗膽或猪膽丸如鷄頭大每服  
一丸生薑陳皮湯磨下

蒲黃散 治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥

二兩

當歸

知母

生薑

蒲黃

各二兩

嘔安胃是矣若  
生地知母芍藥

能不寒胃乎要  
知此三味又為

壯熱者設荷無  
壯熱其敢用乎

况在三四日之  
間芍藥尤為所

忌讀方者當知  
其源

此方治痰埋氣  
為治嘔正方前

方一寒一熱之  
治瘀血者不同

當知此案  
人參益胃氣訶

子治胸滿一益  
氣一欬氣自與

前後諸方不同  
別是一種見解  
人所未知  
實無他疾專主

紅花半兩

荷葉心中蒂一個

生地黄汁一盞

右咬咀水二升煎至一升去渣下蒲黃煎數沸空心分三帖

橘紅半夏湯

治產後胃虛嘔逆

橘皮一兩

半夏

甘草炙各半兩

藿香三兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

人參一兩

訶子一兩半

甘草炙半兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

薑水散 治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮一兩二錢半

生薑一兩半

膏氣虛寒也故  
惟以溫補為主

既用生姜以佐  
木復加酒以爲  
煎又法之妙也

本草石蓮即蓮  
實之沉水中干  
年者也其味甘  
其性降致能益  
胃清水而治嘔  
况加茯苓以下  
氣丁香以溫寒  
生姜佐之其中  
品味大非前方  
比矣奈何今之  
所買市中石蓮  
味極苦而肉無  
心形似蓮實而  
寔非蓮寔效之  
市人乃云皆是

右剉作一服酒水各二升煎取一升分三服

石蓮散 治產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

石蓮肉 一兩

白茯苓 一兩

丁香 半兩

右爲細末每服三錢用薑湯或米飲調下日三服

錢氏益黃散 治脾胃虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚腹作

痛或大便不實手足逆冷等症

陳皮 一兩

青皮

訶子肉

甘草 炙

丁香 各二錢

右爲麤末每服四錢水煎服

加味四君子湯 治產後嘔逆不已

人參

白朮

茯苓

甘草 炙

半夏

陳皮

山中木實本卦  
既殊性味亦重  
又豈有清胃和  
中之理求治者  
宜審擇之毋為  
市人之所誤  
治脾虛有痰嘔  
逆之正方也  
以上八方各有  
見解宜一一致  
証施治勿妄投  
也  
上言風冷外因  
也下言聚冷內  
因也然又有痰  
蒸虛呃之不同  
正宜詳辨  
期門在乳下

藿香

砂仁

各等分

右劉每服四錢加生薑三片棗一枚水煎溫服

○吃嘔

大全云夫五臟六腑俱稟氣於胃而肺為主氣之總司若產後致傷氣血則臟腑氣損而風冷搏之肺因氣逆而上則吃逆矣又脾虛氣冷胃中伏寒因食熱物冷熱相擊氣厥而不順則吃逆也脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噫者胃寒所生服藥無效者灸期門三壯必愈期門穴乃胃之大絡薛氏曰前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯赤



有復生者

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香

白豆蔻

各半兩

伏龍肝

一兩

右為細末每服一錢煎桃仁吳茱萸湯調下如人行五里再服

薑桂散 治產後欬逆三日不止欲死

肉桂

五錢

薑汁

三合

右剉同煎服三合以大火炙手摩令背熱時時塗藥汁盡妙

羌活散 治吃逆

羌活

附子

炮

茴香

炒各半兩

木香

白薑

炮各二錢半

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱服一服止

此治欬逆也而何又有心煩焉闕此方欬逆是虛寒氣滯心煩是敗血瘀留不然以用桃仁吳茱萸為湯也當識之此治寒自背入而欬逆也摩背法極妙其曰時時塗藥汁蓋則既服之外又以藥塗手摩之也治下元虛中氣弱而又為外感寒邪者設也妙在用鹽

吃逆症俱用柿  
蒂而此用乾柿  
意自有別

望鼻上蜂窠也

一方 治產後吃逆

乾柿一個切碎以水一盞煎六分熱呷

一方 治產後吃逆三五日不止

陳壁窠三五個水煎呷瘥即蜂子窠

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆效

右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂熱者宜乾柿  
竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子佐之誤施則噬  
臍之悔慎之

○咳嗽

大全云肺主諸氣產後肺虛外邪易感少有微邪便成咳嗽故或

風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也。若產後喫鹽醃太早而咳嗽者難治。

郭稽中曰：產後血氣不通咳嗽者，何荅曰：產後咳嗽多因食熱麵壅滯，或熱病或有氣塊發時衝心痛，氣急咳嗽，四肢寒熱，心悶口乾，或時煩躁，睡夢驚悸，氣虛肢體無力，宜服局方黑神散、五積散，加棗煎服。

薛氏曰：產後咳嗽，若因陰血虛者，用四物加參、木、陳皮、桔梗。若因肺氣傷者，用四君加芎歸、桔梗。因陰火上炎者，六味地黃丸加參、木。因風寒所感者，補中益氣加桔梗、紫蘇。若瘀血入肺發喘，兼口鼻起黑氣，或鼻出血者，急用二味參蘇飲，亦有得生者。然而所患

悉因胃氣不足。蓋胃為五臟之根本。胃氣一虛。五臟失所。百病生焉。但患者多謂腠理不密所致。殊不知經云。肺屬辛。金生于巳土。若脾土一虛。則不能生金。故腠理不密。外邪易感。法當壯土。金生腎水。以制火為善。若不補其虛。而直治其病。則誤矣。

李氏曰。產後咳嗽。多是瘀血入肺。二母散加桃仁杏仁人參茯苓。水煎其餘。以意會之可也。

旋覆花湯 治產後感冒風寒。咳嗽喘滿。痰涎壅盛。鼻塞聲重。有

汗者不宜服。

- 旋覆花
- 麻黃
- 赤芍藥
- 荆芥穗
- 前胡
- 茯苓

- 半夏麴
- 五味子
- 甘草炙
- 杏仁去皮尖麩炒各等分

此金沸草散加杏仁甘草乃麻黃湯例也。而茯苓五味又有下氣欬肺止嗽之妙。善用者則五味不嫌于太早。麻黃不嫌于太散。不善用者則

美也虛之禍  
可立見矣用者  
審之

此方以出症論  
別治風寒痰嗽  
而用葱豉甘桔  
款花則可狀以  
生地麥門為君  
而欲治多痰寒  
嗽則不可大慨  
始于風寒而終  
于虛熱者宜之  
所謂其始則同  
其終則異也

二母涼藥也豈  
能治惡露上攻  
人參補氣藥也  
豈能治流入肺  
經之嗽故立齋  
以桃仁杏仁加  
倍蓋謂瀉肺導

右咬咀每服四錢生薑三片棗一枚水煎食前溫服

集驗方 療產後感風傷寒咳嗽多痰

甘草 桔梗各一兩半 款冬花一兩 麥門冬去心 生地黄各三兩

豆豉一兩 葱白一握

右咬咀水二升煮取八合去滓食後分兩服

二母散 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參各二錢 桃仁去皮尖

杏仁去皮尖 各一錢

右咬咀作一服水煎食後服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿不食面浮

癩也狀亦不敢  
妄用  
補土生金法

久嗽多痰者此  
方甚良蓋為散  
中能斂補中有  
瀉也

此保肺法古菴  
曰久嗽不愈須  
用百部加以百  
合欬肺桑皮瀉  
中有補苦梗下  
氣亦冷瀉火乃  
清降斂劑也於

氣逆等證。

人參

白朮炒

白茯苓

甘草炙

陳皮各二錢

右判一劑加薑棗水煎服。

經效方 治咳嗽多痰唾粘氣急。

前胡

五味子

紫苑

貝母各一兩半

桑白皮

茯苓各二兩 淡竹葉二十片

右咬咀水二升煎取八合去滓食後分兩服。

一方 治產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗各六分

桑白皮二十分

乾百合

赤茯苓

右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服。

結症亦佳

釋曰以上六分先以散邪為第一以散中兼涼血清心為第二清肺補氣利氣行瘀為第三補土生金為第四而第五第六一則散而收之一則清而歛之數方之內治嗽之法初中末三治補瀉兼該先後不紊能推廣之以治雜症之咳嗽亦無不可集方者其藥上藥王歟

○喘急

婁氏曰產後喘極危多死也

此真實語也臨症者慎之

郭稽中曰產後喉中氣急喘促者何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不

快敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。但服奪命丹。見胞衣不下血去喘自定。

陳無擇評曰。產後喘急。固可畏。若是敗血上薰於肺。猶可。青效奪命丹。若感風寒。或因憂思。飲食鹹冷。等致病者。奪命丹未可均濟。况孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料煮散芎藭湯。亦可救傷風寒。宜旋覆花湯。性理鬱發。宜小調經散。用桑白皮杏仁煎湯調下。傷食宜服見睨丸。五積散。芎藭湯。

薛氏曰。前證若脾肺氣虛弱。用六君。桔梗。若兼外邪。更加紫蘇。若中氣虛寒。用補中益氣。加炮薑肉桂。若陽氣虛脫。更加附子。若瘀血入肺。急用二味參蘇飲。

專一補似太泥



以洗浴氣喘及得煖稍寬之症審之自宜發散而百藥不效乃更用破血溫消之劑愈之者是當責在產後有餘邪也關脈動尺寸虛者邪鬱正中不得出也故當溫散而愈可為學者法此治敗血

此保肺逐瘀

一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附

湯四劑而愈

浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二月洗浴即氣喘但坐不得臥者五個月惡風得煖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不效用

牡丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五味瓜蒌仁煎湯服之即寬三服得臥其痰如失蓋作汚血感寒治之也

奪命散 治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾

方見前血暈

二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參 一兩 為末

蘇木 二兩 搥碎

此治風寒

此治飲食

此單補虛

此補肺法果虛者宜之

右用水二碗，煮蘇木取汁一碗，調人參末，隨時加減服。

旋覆花湯 治產後傷風寒喘嗽，痰涎壅盛。

方見前咳嗽。

見睨丸 治產後傷風冷飲食而喘者。

方見前痞悶。

五味子湯 治產後喘促，脉浮而厥。

五味子炒

人參

杏仁

各二錢

麥門冬去心

陳皮

各一錢

右加生薑三片，棗三枚，水煎服。

六君加失笑散 治產後喘急不能臥，痰與血雜湧而上，此脾胃

氣虛而敗血乘之也。服此立止。

據此法亦二味  
參蕭飲之變設  
非究理為治即  
敗乃事矣妙在  
佐以失咲散

要訣在面青自  
汗土審此大方  
也宜知之

即十全大補去  
桂加乾姜五味  
子甘非有真見  
者不能用

川島木香尤良

六君子料六錢加生薑三片水煎服調入蒲黃五靈脂各炒

五分攪勻溫服少頃滓再煎再入蒲靈末服神效

余一日庄居一鄉人

踵門哀懇道其妻產後數喘促不能臥痰與血交湧而上日夜兩人扶坐纔側身壅絕乞救療之無暇檢方書以意度之新產後血氣脾胃大虛頓損故虛痰壅盛而敗血乘之犀角六君子加失咲散一服痰血俱下喘亦立止次日來謝云諸病皆去止不能食再與參苓白朮散二帖全愈對症之藥神効如此故特附於此

大補湯 治產後百外面青浮腫唇口氣急有汗乃大虛之證

急宜服此

當歸頭

大川芎

大白朮

白芍藥

白茯苓

人參 多

黃芪 多

五味子

熟地黃

乾薑 上上

甘草 少

右剉散水煎服此帖不退即加川島木香另磨入服○有瀉加

訶子肉豆蔻栗殼

○鼻衄

郭稽中曰。產後口鼻黑氣起。及鼻衄者。何。荅曰。陽明者經脈之海。起於鼻。交頰中。還出頰口。交人中。左之右。右之左。產後氣虛血散。榮衛不理。散亂入於諸經。却還不得。故令口鼻黑氣起。及變鼻衄。此緣產後虛熱。變生此症。胃絕脈敗。不可治。○經驗方云。急取緋線一條。并產婦頂心髮兩條。繫繫中指節上。即止。無藥可治。亦禳厭之一端也。

薛氏曰。按胃脈俠口。繞承漿。蓋鼻準。屬脾土。鼻孔屬肺。金謂胃虛。肺損。氣脫。血死之證。急用二味。參蘇飲。加附子五錢。亦有得生者。

真良法也。當備之。脈中以待不時之用。

益母重便妙治  
虛熱

此治虛熱亦良  
熱加益便更妙

汪石山治一婦人產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑蓋因瘀血  
上升遂用益母丸二丸童便化下鼻衄漸止血漸通  
李氏曰此產後虛熱所致犀角地黄湯救之  
加味參蘇飲

人參 二兩

蘇木 二兩

附子 五錢

右剉水煎服