

欽定四庫全書總目

續名醫類案六十卷

編修御醫
汪家藏本

國朝魏之瑋撰之瑋既校刊江壇名

有未備因續撰此編雜取近代醫書。世在志

文集說部之類分門排纂大抵明以求事為多而

古事在。言兩道者亦間為補苴故網羅繁富細

大不增女尸也。戰神人教用香蕪散一條沈日存

其方也至時門載赤人定患脚疾道人与綠豆兩

粒而愈一條是斷非常會之經豆豈可錄以為紫

又如金瘡門載薛衣道人接已斷之首使人回生



一條無葯無方徒以語怪更與醫家無關如斯之類注：而是殊不免蕪穢又虫獸傷門于薛立齋出入耳中一條註曰七案耳門亦以之非重出也恐患此者不知其出便檢閱耳云：而腹疾門中載金匱一 該服乾姜理中凡發狂入井一條隔五六頁而重出又是何義例乎編次尤未免潦草然採摭既博變証咸備寔足與江瓘之書互資參考又所附案語尤多所發明辨駁較諸空談医理固有寔徵虛揣之別焉

續名醫類案序

黃帝言不能起死人而不殺生人扁鵲述其言是病已成雖黃扁不能使之生明矣其有卒無病或小有病而誤針之誤藥之以至于不可拯則粗工之罪也然而病者之妻子父母轉讓之命與數而粗工曉之自解且以為吾嘗盡心是而不謂其人之不克承也天下如此其大歲月如此且久粗工遍滿宇宙如此其衆計其一日之中方心毒手詎知刑戕賊者各別其姓氏各存其醫案蓋較之刑部秋審之冊或相什伯或相千萬而不可底止幸矣其各相抵諱閤然而不以告人故其

案如飄風陰火隨時滅沒而世莫知也一二上工診脉
審運針當處方慎人過其人之福厚而美長者必逢其
適而瘳者立起于是乎喜之而樂道之或以為得効或
以為經驗筆之為書而立之為案自宋迄今凡幾百家
傳其術者室 神其術總之為轉相告語隨之為貼
耳而聽受杭子曰嘻甚矣其沾之自喜也以陰陽而論
人有二十五主是人即有是病有是病即有是醫之者
知其入知其時知其脉因勢而利導之黃帝扁鵲去人
不遠也不謂黃帝扁鵲之書而欲試黃帝扁鵲之術死
者不能致之生而生者即可致之死語云孝醫則人費

人之類多至二十有五而醫之殺人則一日不孝而已
孝之道何從則曰讀黃帝扁鵲之書而已黃帝存乎曰
死矣扁鵲存乎曰死矣類案其在是發明其書之旨也
一書謂黃帝扁鵲為至今不死可也望南江氏稿集

士橫氏人從而廣之粗工觀
子觀之則以為醫孝之蒙
鵲之書者也合士者必有
為孝醫者之範與則而思

其範代和孝又有
過半矣醫案云乎哉仁和世駁序

天之生物人為貴人莫大乎死生修身立命葆真精神
全乎生之理矣若違天常而召診疾則六疾待于前五
刑隨其後矣古之聖人擬乎有瘳于是乎刑以弼之藥
以瘳之刑者司寇之職葢者醫師之掌其趣不同而所
以衛人之生共意一也刑有律之不足以盡其變則有
例比乎例則罪無隱情矣醫有方之不足以盡其變則
有禁禁于禁則疾無遁形矣律一而已例則增出度變
而不窮故刑名家以律為本而折一獄受一讞必折衷
乎例亦犹是也然則軒岐素難之外醫禁固可廢乎
史傳而左氏實為權輿後之嵩門成一索言

紀望南江氏本來入醫說而為名醫類案行

世知不足為力之重刻吾友魏柳州先生循江氏之例而變通之荟萃江氏之所遺而增益其所未見成續名醫類案六十卷削稿甫就遽歸道山會

朝有求書之詔其子錄副以進著錄于四庫全書中是書之遭可謂幸矣先生孤貧力孝性喜吟咏所著詩卓然成家其于醫多治之冥悟治疾首肝腎以為肝為生發之源腎為歸宿之府二藏得所養則營衛和而疾疾除所治往之有奇驗而人罕有知者其輯是書也蓋深有疾夫世之言医者多軒岐倉扁之書束而不觀即

後世張王朱李名家之緒論亦未嘗一涉其藩籬問其病則五運六氣經絡藏府之圖辨問其脉則三部九候營衛血氣之莫分問其方則寒熱虛實表裡陰陽之不審率爾懸壺謬憑臆斷求其如刑名家之治獄斤之為比例于成案折衷于舊章而後事百不一二無怪病輕者治之而重病重者治之而死試以庸人殺人之律科之又誰批其咎欤是殆先生之罪人矣是書呈進後越二十餘年友人某始劇金將謀授之梓錄屬予弁其首予與先生為總州之交知先生之醫殊异乎近日函莽庸庸為述其大凡如此世之讀者亦可以知其子

嘉慶七年夏四月仁和余集書于虞山瞿氏鶴宅之耕
石齋

續名醫類案目錄

錢唐魏之珩玉橫輯 男斌編次

卷一

傷寒門

傷寒上

卷二

傷寒門

傷寒下

卷三

傷寒門

國立中央圖書館藏



疫

大頭疫

卷四

禱病門

中寒

中風

卷五

禱病門

厥

瘧

暈

麻木

卷六

禱病門

感症

卷七

禱病門

傷風

暑

濕

目錄

二編



卷八

襍病門

熱病

燥

火

卷九

襍病門

惡寒

寒熱

霍亂

瘴

卷十

襍病門

嘔吐

反胃

瀉

卷十一

襍病門

瘧

痢



瘡痢

卷十二

襍病門

飲食傷

消渴

赤疸

黃疸

卷十三

襍病門

癥瘕

痞

卷十四

襍病門

鬱症

內傷

卷十五 起失至共卷

襍病門

虛損

癆瘵

卷十六

目錄

四錄廣書屋

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

襟病門

吐血

衄血

下血

溺血

卷十七

襟病門

癰瘕

痿

痛脾

卷十八

襟病門

腫脹

膈

閉格

卷十九

襟病門

諸氣

哮

喘

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

飢逆

汗

卷二十

襍病門

咳嗽

卷二十一

襍病門

痰

飲

吞酸

十五卷起至廿一卷已失計少七卷

卷二十二

襍病門

頭

眉髮

面

目

耳


鼻 附鼻淵

卷二十三

襍病門

目錄

六經廣書屋錄



口

唇

齒

脫斷

舌

喉附瘡

卷二十四

襍病門

心胃痛

脇痛

腋氣

卷二十五

襍病門

腹痛

腰痛

前陰

鶴膝風

足

腿

足跟



脛

卷二十六

襍病門

遺精

白濁

淋

疝

小便秘

小便不禁

大便不通

卷二十七

襍病門

驚恐

顛狂

癇


笑哭

不眠

卷二十八

襍病門

跌撲



誤吞諸物

卷二十九

襍病門

出蠱

諸蟲

蛇疔

中毒

丹石毒

卷三十

襍病門

邪祟

奇疾

飛尸

詐病

針灸

色診

卷三十一

婦人門

經水

熱入血室



崩漏

白帶

交腸

卷三十二

婦人門

求子

妊娠

胎不長

胎動

子懸

子腫

轉胎

胎墮

胎死

異胎

鬼胎

卷三十三

婦人門 胎前

妊娠傷寒

感寒



傷暑

喘逆

咳嗽

煩熱

嘔吐

瀉

遺尿

秘結

瘡

疔

瘡疔

內傷

虛損

增附

悲傷

心腹痛

膈

瘖

乳病

惡阻

下血

傷暑 喘逆 咳嗽 煩熱 嘔吐 瀉 遺尿 秘結 瘡 疔

十一 續廣書屋

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

癰瘕

子癰

見鬼

卷三十四

婦人門 產後

產難

脫衣不下

隱疾 即脫陰

痰滯

癥瘕

血崩

血迷

血虛

卷三十五 起失玉五十一卷

婦人門 產後

產後感症

暑

火熱

惡寒

喘

咳嗽

嘔吐

瀉

小便頻數 附不禁

秘結

瘡

痢

痘

卷三十六

婦人門

類風

症

痛痺

頭痛

瘡

乳病

腰脇痛

腹痛

浮腫

盜汗

靈損

驚悸

顛狂

見鬼

卷三十七

痘疹門

痘

報痘

黑痘

白痘

嬌紅

卷三十八

痘疹門

痘順症

壺

泉毒

毒癰

血熱

諸熱

汗

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

中暑

渴

痛

痒

疥癬

疔

水泡

肉濃泡

夾斑

夾疹

夾丹

失血

傷食

卷三十九

痘疹門

寒战咬牙

寒析

厥逆

昏冒

驚搖

項躁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

譫妄

喘急

咳嗽

嘔吐噦

瀉

吐瀉及痢

大小便秘

疫癘

怪異

卷四十

痘疹門

目

口唇

口疳

咽痛

瘡

發核

腹痛

腰痛

手足

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷四十一

痘疹門

膿期

腐期 附加後

洩腐

毒

腫脹

倦怠

嗜卧

羸瘦

卷四十二

痘疹門

疹

卷四十三

小兒門


小兒初生

走馬牙疳

臍風

赤丹 即遊風

胎毒



乳病

變蒸

喉口滯頤

瘡

卷四十四

小兒門

傷寒

感症

傷風

暑

傷食

受驚

驚風

慢驚風

搐搦


癰瘰

慢脾風

風癰

卷四十五

小兒門



發熱

嘔吐

吐瀉

瀉

卷四十六

小兒門

瘧

痢

瘰癧

咳嗽

喘

哮

虛損

疳

疔

腫脹

癖積

蟲

吐衄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

心腹痛

黃疸

啼哭

語遲行遲

胎疾

惑病

相思

卷四十八

小兒門

跌撲損傷

發背

結核

下疳

疝

便血

疔瘡

瘍疔

卷四十九

癰疽門

癰疽 附 瘰癧門

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

腦疽

鬢疽

頤毒

項毒

肩瘡

臂癰

卷五十

癰疽門

乳癰

胸癰

脇癰

馬刀

腋癰

腋疽

卷五十一

癰疽門

發背

以上夫玄十六卷

卷五十二

癰疽門

肺癰

腹癰

腰疽

卷五十三

癰疽門

腸癰

腸風臟主母

痔附脫肛

漏

腎癰

卷五十四

癰疽門

囊癰

懸癰

疔癰即便毒

腿癰

臙瘡

脫疽

多骨疽

附骨疽

卷五十五

續名醫類聚 目錄 三 續廣書屋錄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

癰疽門

時毒

疔

疔附癭

結核

卷五十六

癰疽門

瘰癧

流注

卷五十七

癰疽門

膿疥

癬

疔瘡

血風隱疹

癢痒

卷五十八

癰疽門

瘡瘍

患瘍便秘

三三錄廣書屋錄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

腎臟風

癘風

下疳

梅毒

白癩風

斑瘡

天泡

卷五十九

癰疽門

跌撲

卷六十

癰疽門

杖瘡

金瘡

湯火傷

竹木刺傷

蟲獸傷


破傷

醫方類聚

目錄

山西錢廣書屋錄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類聚卷一

傷寒上

錢唐魏之珩玉橫輯 男鈺編次

許叔微云有病傷寒身熱頭疼余視之曰邪在表此表
實也當汗之以麻黃湯或問曰傷寒大抵因虛故
邪得以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱
邪之所聚其氣則虛留而不去其病則實蓋邪之入
人也始因虛入邪居中反為實矣大抵調治傷寒先
要明表裡虛實能明此四字則仲景三百九十七法
可立而定也何以言之有表實有表虛有裡實有裡

虛有表裡俱寔有表裡俱虛余于表裡虛寔歌中常
編其事矣仲景麻黃湯之類為表寔而設也桂枝湯
之類為表虛而設也裡寔則承氣之類是也裡虛則
四逆之類是也表裡俱寔所謂陽盛陰盛汗之則愈也常讀華陀
也表裡俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華陀
傳有府吏倪尋李延其症俱頭痛身熱所苦正同陀
曰尋當下之延當發汗或問其異陀曰尋外寔延內
寔故治之异耳外寔內寔汗下例施疑有
誤此可當傷寒總論

一八初得病四肢逆冷膈下築痛身疼如被杖蓋陰症
也急服金液破陰承復等丹其脉遂沈而滑沈者陰

也滑者陽也病雖陰症而見陽脉有可生之理仲景
所謂陰病見陽脉者生仍灸氣油丹田百壯手足溫
溫陽回得汗而解或問滑沈之狀如何便有生理曰
仲景云翁奄沈名曰滑何謂也沈為純陰翁為正陽
陰陽和合故名曰滑古人論脉滑雖曰往來前却流
利旋轉替之然与數相似仲景三語而足也此三字
極難曉翁合也言張而復合也故曰翁為正陽沈言
忽降而下也故曰沈為正陰方翁而合俄降而沈奄
為忽之間仲景論滑脉可諦當矣其言皆有法故讀
者難知宜細思之可作諷傷寒指
南治陰症法

一人病傷寒下利神昏多用詘語不得眠或者見下利
便以詘語為陰虛症許曰此亦小承氣症眾駭曰下
利而服小承氣仲景之法乎許曰此仲景之法也仲
景曰下利而詘語者有燥矢也屬小承氣湯而得解
予嘗謂素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者
反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞
因塞用通因通用王冰註云大熱內結注瀉不止熱
宜寒療結復瀉除以寒下之結散利正則通因通用
也正合于此又何疑焉

引經証論治法了如
指掌治裏症法

一人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷

此是
無厭心下痞悶大便秘結或者見四肢冷人汗出滿
悶以為陰症診其脈沈而緊曰此症誠可疑然大便
結非虛結也安得為陰脈雖沈而緊為少陰症多是
自利未有秘結者此症半在表半在裏投以小柴胡
湯得愈仲景謂四肢冷脈沈緊腹滿全似少陰然大
便鞭頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰
正胸而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是
陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈
法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死
心為手少陰腎為足少陰相與為上下唯以意逆志

者斯可得之

治羊表
半裡法

一人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寐
真勞復也診之曰勞心之所致神之舍未復其初而
入勞傷其神營衛所以失度也與補其子益其脾解
其勞廢凡得愈投以補脾湯佐以小柴胡湯解之而
愈補脾湯人參白朮甘草橘皮青皮乾姜各等分或
問曰虛則補母今補其子何也曰子不知虛與勞之
异乎雜經曰虛則補其母寔則瀉其子此虛當補母
人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾旺
則感之于心矣此勞則補其子人所未聞也蓋母

生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生
我者與錦囊所謂奪骸得氣道侷受陰同義方治其
勞則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧同
義此治虛與治勞之异也 勞復治法

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沈弦欲厥
陰脉也服溫葯數日不已又以姜附等葯竟陽微回
脉生因渴私飲水一杯脉復退又見頭不昏目不開
問之則犯陽易若只與燒帚散則寒而不消矣遂更
用吳茱萸湯一大服燒帚散連進二劑出大汗兩日
夜而愈 陽易治法

衍義治傷寒汗不出搖腳法用海蛤粉烏頭各二兩穿
山甲二兩為末酒糊為丸大一寸許捏遍置患人足
心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室取熱湯浸腳至
膝下久則水濕又添熱水候遍身汗出為度凡一二
日一次浸腳以和為度

外治取汗法
上供醫家經目

張子和曰予之常溪雪中冒寒入浴重感風寒遂病不
起但使煎通聖散單服之一二日不食惟渴飲水亦
不多飲時使人槌其股按其腹凡三四日不食日
飲水一二十度至六日有詰語妄見以調胃承氣湯
下之汗出而愈常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最

為妙藥但不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七
日見有下証方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人
飲水至有渴死者病人若不渴強与水飲亦不肯飲
也予初病時鼻寒聲重頭痛小便如灰淋汁及服調
胃承氣一兩半竟欲嘔狀探而出之汗出漿然酒
史下五六行大汗一日乃痊當日飲冰水時水下則
痰出約一二椀痰即是病也痰去則病去矣予時年
六十一

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人點蜜茶一椀使啜
之焦因熱服之訖偶思張語曰凡苦味皆能涌今煎

頭痛是病在上以物探之吐畢而解

孫兆治俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解眾醫

以為溫病用表有謂食在膈者治之不愈召孫至用

半夏茯苓湯遂痊眾問其故曰頭有汗心下滿非溫

瘕乃水結胸也小便既去其病乃愈許叔微治頭汗

作半表半裡且如濕氣心下滿自當遍身有

心下滿豈得汗若言是表身又不惡寒疼痛表瘕何

在故凡水結胸脇頭必有汗出傷寒口訣

實材治一人患肺傷寒名別頭疼發熱惡寒咳嗽肢節疼

脈之緊服華蓋散黃芪建中湯略解至五日昏睡詰

語四肢微厥乃腎氣虛也灸關六百壯服姜附湯汗愈

一人傷寒昏睡妄語六脈弦大實曰脈大而昏睡定非

實是熱乃脈隨氣奔也強力之治用烈火灸關元穴初

灸病人竟痛至七十壯遂昏睡不疼灸至三鼓病人

開眼思飲食令服姜附湯至三日後方得元氣復大

汗而解

一人患傷寒至八日脈大而緊發黃生紫斑噫氣足指

冷至脚面此太陰瘕也最重難治為灸命關五十壯

關元一百壯服金液丹鍾乳粉汗愈

一人患傷寒至六日脉弦緊身發黃自汗太陰症也先服金液丹點命關穴病人不肯灸傷寒惟太陰少陰二症死人最速若不早灸雖服藥無功不信至九日而死

一人病傷寒至六日微發黃一医与茵陳湯次日更深黃色遍身如皂子此太陰症誤服涼藥而致肝木侮脾为灸命關五十壯服金液丹而安

一人患傷寒初起即厥逆脉一息八九主諸医以为必死實曰乃陰毒也厥逆脉数断五陰主毒必青吐利倦卧等症与姜附湯一椀至半夜汗出而愈若以脉数为热下凉藥必死

無疑

張子和之僕嘗与鄰人同病傷寒俱至六七日下之不通鄰人已死僕發熱極投于井中撈出以汲水貯之極使坐其中適張遊他方家人偶記張治法曰傷寒三下不通不可再攻便当瀉之試服瓜蒂散良久吐膠涎三椀許与宿食和屎在地状如一帚頓快乃知世医殺人多矣又一吏吐訖使服太白散甘露飲以調之非結陽明發狂熱吐之犹足痛食共若燦矢便瀉可下而愈也

張子克治南陵富人子傷寒不知人氣息僅属張視之曰此嗜卧症也新後三日当蘇之則欲飲欲飯与此

藥必沉睡竟当大汗果然 新安志

萬密齋治賒尸唐有峰一月間患傷寒醫進几味羌活湯不効又云內傷挾外感進補中益氣湯不効又進柴苓湯去人參病畧減日復發熱頭苦疼醫欲下之未決萬脉之洪長而弦曰此元氣素虛因起早感寒得之今病在陽明少陽乃併病也乍熱乍涼者少陽也頭苦痛者陽明也宜小柴胡少陽合葛根葱白湯明唐曰吾素多痰火病勿用人參萬曰元氣不足乃虛火也寔宜瀉虛宜補一劑而安

胡晏年五十病傷寒十六日不解其症乍寒時即以衣

被厚覆蒙頭而卧不勝其寒乍熱時即撤去衣被裸露其身更用扇不勝其熱如此一日夜十餘次醫者不識萬至告以病狀可怪逆診其脉曰不必診此易知耳夫惡寒病在表也何以無頭痛症惡熱病在裡也何以無煩渴及便溺不利症此病在半表半裡陰陽混亂也陰氣乘陽則惡寒陽氣乘陰則惡熱宜用小柴胡以治其半表半裡之邪梔子豆豉以治其陰陽錯亂之邪而安

李養晦患傷寒苦右脇痛醫用陶節安法以小柴胡加枳壳桔梗服之無効已十七日萬脉之沈弦且急曰

此水畜疰也。經云沈潛水支飲脉弦急必得之飲水。過多問曾服何方。以前醫對萬曰只用此方再加牡蠣以洩水可耳。

一門子病傷寒。醫與發汗七日後不愈。小腹滿而痛。欲下之未敢。萬脉之沈弦而急。問曾渴飲水乎。荅曰渴甚。惟飲水渴不止。曰此畜水似疰。疰不可下也。乃用五苓散以利其水。加以棟子小茴香以止小腹之痛。一服洞泄四五行。皆清水。次日再求診曰不必再藥矣。果三日而安。

沈天祿病傷寒。汗下後病不解。身無大熱不惺。醫者

但云詬語以疰論之乃錯語也。

詬語錯語 極宜細解

若作知母

麻黃湯疰非發後昏沈也。乃汗下之後元氣未復。神識不清耳。與補中益氣湯去升柴加麥冬生地熟附一服愈。

孫文臣治張二官發熱頭痛口渴大便秘結三日未行

脉洪大曰此陽明少陽二經之病。用大柴胡湯行三

五次。兩下皆黑。矢夜出臭汗。次日清爽。惟額上仍然

陽明。用白虎湯加葛根天花粉。因食粥太早復發熱

咳嗽口渴殊甚。且惡心。復用小柴胡加枳實山梔麥

芽。次日渴不可當。半夏枳實麥芽皆能耗陽明津液。改以白虎湯加

麥冬花粉外与辰砂益元散以井水調下五錢熱始
退渴始定不虞夜睡失蓋復受寒邪天明又發大熱
不知人事感急用小柴胡湯加升麻葛根前胡薄荷
汗出熱退神思大瘳四肢皆冷語言怠倦且咳嗽以
生脉散加石斛百合大棗白芍服後咳止精健飲食
日進而安

繆仲淳治姚子之傷寒頭疼身熱舌上胎胸膈悶二
四日熱不解奄之氣似不屬者邪熱甚則正氣餒一
不可誤認也
臣以其体素弱病久虛甚意欲投參少許繆叱曰一
片入口死矣啞以大黃二兩瓜蒌二枚連子切片黃

連枳實下之小論胸
加大黃主人驚疑不得已減大黃之半

二劑便通熱止

按是症熱未解犹有表邪何以下之而愈金匱曰
吸而微數其病在中焦寔也當下之則愈上云奄
奄氣似不屬殆其候歇然非明眼不辨

高存之一家人媼傷寒求乞方繆已疏方与之矣見其
人少年曰若曾痛此否曰然曰愈凡日而妻病曰人
凡日曰曾有房事否曰無之繆故曰若有房事此方
能殺人也其人即置方不取遂以禪襖雄鼠矢麥冬
韭曰柴胡二劑勢定更用竹皮湯二三劑全安現此
則傷

寒初愈藏府犹多热时脚不察即投
参芪木附温補其始患可勝言哉

一奴傷寒熱解後復下血不止主人以痢藥投之更甚
繆曰此傷寒失汗之餘症也用地榆麥冬知母竹叶
代仲景血症藥遂愈

翁其茨感冒壯熱古生黑胎煩渴陽明勢甚劇諸昆仲

環視揮涕群臣束手繆以大劑白虎湯加入參三錢
一劑立甦或問繆治傷寒有秘方乎繆曰熟讀仲景
即秘方也

常熟吳見安在京師時有小青衣患傷寒愈而復
而愈之而再復不知其凡謂繆曰非兄不能教診之

病人黃白面色有胃六脈微弱有胃大便不通胸中

不快亦不思食曰方傷寒百合無絛絡百脈一宗悉

壞症正氣已虛邪氣留滯及逆經不之餘邪且退矣

以色脈胸中不快虛而氣壅非實邪也不大便者久

病津液枯氣弱不能送也投以人參五錢麥冬一兩
枳壳炒八錢盡劑而痊

梁溪一男子素虛忝中感冒頭痛肌痛發熱羌活二錢

麥冬三錢炙甘草一錢紫蘇一錢五分北細辛七分

前胡一錢五分次日頭痛止熱未退繆用白芍五味

子人曰風未退遂用酸斂何也曰因人而施尔一杯

即愈麦冬三錢甘州括萎根桔梗白芍各一錢乾葛
錢半桑白皮三錢五味五分

四明虞古卿因三十外出疹不忘猪肉魚之好飲作泄

八年矣忽患傷寒頭痛如裂滿面發赤汗出不徹舌生黑

胎煩躁口渴時發詘語兩眼不合者七日皆屬陽明洞泄

如注較前益無度也脈之洪大而數實力疏竹叶

石羔湯方因其有腹瀉之病石羔止用一兩病初不

減此兄素不謹一友疑其虛也云宜用肉桂附子凡診

病淺見者反若深慮多令病家無所適從或以其言來告乃曰誠有是理

但前者按脈似非此症豈不數日脈頻變即復往視

仍洪數而大曰此時一投桂附即發狂登屋必不掇

矣一服前方但加石羔至二兩或曰得毋与瀉有妨

乎曰邪熱作祟此客病也不治立殆渠泄瀉已八年

非暴病也治病須先太甚急治其邪徐并其臥恙除

之金匱云病痼疾加以卒病當先治其卒病然後乃治其痼疾急進一劑其病遂

安即省人事再劑而前惡症頓去不數劑霍然但瀉

未止且為疏脾胃以補丸而加黃連乾葛升麻以痧

痢法治之瀉竟止八年沉痾一旦若失

莊歛之一庄僕因受寒發熱頭痛如裂太陽兩目俱痛明

渾身骨肉疼痛下元尤甚傷勞狀如刀割不可忍傷熱甚

口渴甚大便日解一次胸膈飽脹不得眠已待斃矣
力疏一方乾葛三錢石羔一兩五錢麥冬八錢知母
三錢五分羌活二錢五分大瓜蒌二個連子打碎枳
壳一錢桔梗一錢竹叶一百片河水煎服四劑而平
此太陽之明病也貧人素多作勞故下体疼痛尤甚
以羌活去太陽之邪石羔竹叶乾葛麥冬知母解陽
明之熱括萎桔梗疎利其邪故痊

人在一僕因傷寒後勞復發熱頭痛腹內作瀉勢甚危
力疏一方山庖四錢枳實二錢豆豉一兩川黃連二
錢乾葛三錢調六一散五錢服二劑熱退瀉止頭疼

亦愈但不思飲食力去山庖枳實黃連加鱉甲四錢
炙艸五分麥冬五錢全愈

朱遠高治從祖近湖公少年因房勞食犬肉傷寒諸醫
以其虛也攻補兼施至發狂登屋奔走大呼陽明府
症實熱

日夜令壯夫看守凡日餘矣急走使延朱之先命煎
人參羔二片以待用潤字號丸數錢下之去黑矢無
數熱遂定奄之一息几于死矣徐以參羔灌之至一
百二十日全痊自縲茶至此十一則
俱茶煖然傷寒約言

龔子才治一人頭疼發熱增寒身痛發渴語日久不
出汗以大梨一枚生姜一塊同搗取汁入童便一椀

重湯煮服汗出如水而愈

製方甚妙愈于甘露飲且免地黃之忌

太守劉雲亭患傷寒發熱面紅唇赤面躄跨身而臥諸

醫以小柴胡湯解毒湯之類數劑弗效診之六脉浮

大無力此命門無火也

合脉与兆即是戴陽

以人參附子沈香

三服全愈

一婦年七旬傷寒初起頭疼身痛發熱增寒醫以發散

數劑不效淹延旬日漸不飲食昏沈口不能言眼不

能開氣微欲絕

純是虛症

凡襍症見此六宜独參

与人參五錢煎湯徐徐灌之頃更少省欲飲水煎查

服之頓愈入十年乃卒

当与疫症內蘇論光一藥同參

李士材治一人傷寒凡日以來口不能言目不能視俸

不能動四肢俱冷或謂餘症診之六脉皆無

熱甚而脉伏也

以手按腹而手護之

拒按也

肩皺作楚

寔邪

按其跌陽大

而有力乃知腹有踈矢也欲与大承氣湯病家惶惧

不敢進李曰吾即能辨是症者惟施笠澤再

此等症人便稀

奇可為浩歎

延診之若合符節遂下之得踈矢六七枚口

能言俸能動矣故按手不及足者何以球此垂絕之

症耶

一人傷寒煩躁面赤昏亂絕時索冷水手揚足擲雜

以候脉五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲

李子曰浮大沈小陰症似陽也與附子理中湯當有生
理其第駭曰匡者十輩至不日柴胡承氣則曰竹叶
石膏今反用熱劑烏乎敢李曰溫劑猶生涼劑立死
矣卜之吉遂用理中湯加入參四錢附子一錢煎成
入井水冷與飲甫及一時狂躁定矣再劑而神安服
參五斤而安

凡遇此等傷寒能以全料六味減苓瀉加麥冬杞
子用大砂罐濃煎與之代茶必數杯而後酣寢汗
出而愈于時此法未聞惟倚仗人參之力取効奪
陰竭之症乃峻補其陽必待陽復生陰而愈故用

參母多至數斤使在今時罕此富人

一八傷寒至五日下午利不止懊懣目脹諸藥不効有以
山藟茯苓與之虞其瀉脫也李診之六脈沈數按其
臍則痛此協熱自利中有結垢小承氣培大黃服之
果下結矢數枚而安

一八傷寒第二日頭痛發熱正屬太陽李曰方今正月
時令犯寒必服麻黃兩日愈矣若服沖和湯不惟不
得汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以
滾湯入浴桶置牀下熏之得汗如雨密覆半日易被
神已爽矣至晚索粥家人不與李曰卯已解矣必不

傅裡食粥何妨明日果安不以麻黃汗之傳變深重
非半月不安

吳光祿兼太陽頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語
言詰妄有云表裡俱有邪宜以大柴胡下之李曰此
三陽合病也誤下之決不可揉乃以白朮湯連進兩
服少痊更加花粉麥冬二劑安

楊孝師妄發熱頭疼六日後忽見紅疹衆皆以爲發斑
用升麻犀角等湯凡五日不効李視之曰此疹也非
斑也斑爲陽明大毒疹爲太陰風熱一表一裡判如
天淵乃用防風二錢黃芩一錢甘艸五分薄荷桔梗

蟬退各一錢四劑而安

一人傷寒六日詰語狂笑頭痛有汗大便不通小便自
利衆議承氣湯下之脈之浮而大因思仲景云傷寒
不大便六七日頭疼有熱小便清知不在裡仍在表
也方今仲冬宜与桂枝湯衆皆咋舌掩口謗之甚力
以詰妄力陽盛桂枝入口必死矣李曰汗多神昏故
發詰妄虽不大便腹無所苦和其營衛必自愈耳遂
遣衆用之及夜笑語皆止明日大便自通故大病變
端不可膠執

盧不遠治東照庵始身伴頭傷寒已二十八日人事不

省不能言語手足揚擲腹脹如鼓而熱烙手目赤氣粗齒槁舌黑參附石羔硝黃芩連無不服諸匠告退

矣診之脈洪鼓指用大黃一兩佐以血藥以血為佐下穩安微妙一劑下黑血一二斗少甦四劑始清蓋此症寒邪

入胃畜血在中其昏沈揚擲是喜怒如狂之深者也當時大黃未嘗不用而投非其時品劑輕小不應則

惑矣安敢放胆哉

先時雖用大黃仍覺大下合脈与

黑奴凡治陽毒發狂發狂大渴極之症水化服彈凡大即愈用小麥奴乃麥穗上黑微者及梁上塵釜底黑灶突黑等此取火化之類嚼其性而治之燥墨梁塵黑微乃火之翳狗用治熱極症使之復于平常非否之泰乎此入用藥清義一種也

蜀孝廉阮太和病厲吳山下召診披衣強坐對語甚莊神氣則內索也身熱進退舌胎黃而厚蓋自吳門受寒以內養為補而時吹之遂纏綿匝月盧用疎散輕劑熱退人復強咬再熱不能起坐逾五日診之詰妄呼笑不識人已三日形骨立汗雨下而內熱時甚胸脇之熱則之烙手第脈尚有神乃用人參八錢加四逆散中一劑而詰妄定三劑而熱邪清矣自言其神魂窮天之上極地之不飛揚奇變得太乙神符召之返愈後問藥狀曰此寒傷心氣在苜厥深而湊于胸也以不第南旋病淹中道骨肉遼遠藥石弗周則心

已傷甚又反復再回汗液多亡內無主宰熱遂入胸
胸為心主之宮城精神因而渙散是以游魂為變也
用四逆使熱外出加入參俾神內凝氣復邪散是以
生耳

吳孚先治一人傷寒身寒逆冷時或戰慄神氣昏大
便秘小便赤六脉沈伏或憑外象謂陰症投熱劑或
以脉沈伏亦作陰治吳診之脉沈伏而重按之則滑
數有力愈按愈甚視其舌則燥探其足則暖曰此陽
症似陰誤投熱藥火上添油矣乃用苦寒峻劑煎成
熱飲而痊

寒因熱
用法

按內真寒而外假熱諸家嘗論之矣至內真熱而
外假寒論及者罕此案宜玩

一人病昏：默：如熱無熱如寒無寒欲臥不能臥欲
行不能行虛煩不甯若有神矣莫可名狀此病名百
合雖在脉寔在心肺兩經以心合血脉肺朝百脉故
也蓋心藏神肺藏魄神魄失守故見其忘良由傷寒
邪熱失于汗下和解致熱伏血脉而成用百合一兩
生地汁半杯煎成作兩次服必俟大便如漆乃除

合脉深
得真音

張景岳治王生年出二旬病陰虛傷寒其舌芒刺乾裂

焦黑如炭身熱便結大渴喜冷而脈則無力神則昏
沉群謂陽症陰脈必死無疑察其形氣未脫遂以甘
溫壯水等藥大劑進之以拯其卒仍間用涼水以滋
其標蓋水乃八一之精涼能解熱甘可助陰非苦寒
傷氣之比故于津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之
症在所不忌由是水藥並進前後凡用人參熟地等
各一二斤附子肉桂各數兩冷水亦一二斗然後諸
症少退飲食少進神氣俱復矣但察其舌則如故心
甚疑之閱數日忽舌上脫一黑壳其內新肉燦然始
悟其膚腠焦枯死而復活使非大為滋補安望再生

若此一症時奪其甚者凡舌黑用補得以保全者甚
多蓋傷寒之舌寔固能黑以火盛而焦也虛亦能黑
以水虧而枯也若以古黃古黑恣疑為寔熱則陰虛
之症萬無一生

按是症既云陰虛燥渴用涼水是矣而人謀与桂
附各數兩治法未能無疵至舌胎成壳脫落恐桂
附不能無過

一衰翁年逾七旬岐患傷寒初起即用溫補調理至十
日之外正氣將復忽尔作战自旦至辰不得其汗寒
战危甚用六味回陽飲八人參一兩姜附各三錢煎

服下咽少頃即大汗如浴時將及午而浸汗不收身
冷如脫鼻息几無令以前藥復煎与之曰先服此藥
已大汗不收今又服此尚可再汗乎笑謂曰此中有
神非尔所知也急令再進遂汗收神復不旬日起矣
嗚呼發汗用此而收汗復用此無怪乎人之疑之也
不知汗之出与汗之收皆元氣力之耳

喻嘉言治黃長人犯房勞病傷寒守不服藥之戒身熱

漸退十餘日外忽然昏沈渾身战慄手足如冰

乃熱深厥

亦深也亟請喻至一醫已合就姜附之藥矣見而駭之

診畢再三闕其差謬主人自疑陰症言之不入又不

可以理服乃与医者約曰此一病藥入口中出生入
死關係重大吾与丈谷立擔承倘用藥差誤責有所歸
医者云吾治傷寒三十餘年不知甚麼擔承喻笑
曰有吾明眼在此不忍見人活之就死吾亦不得已
也如不擔承待吾用藥主家方安心請治与以調胃
承氣湯約重五錢煎成熱服半杯少頃又熱服半杯
其医見厥漸退人亦甦知藥不悞辭去乃与前藥服
至劑終人事大清忽然渾身壯熱

厥止則陽回後現熱症再与

大柴胡一劑熱退身安門人問曰病者云係陰症見

厥先生確認為陽症而用下藥果應其理安在答曰

其理頗微吾從悟人可得言也凡傷寒病初起發熱煎熬津液鼻乾口渴便秘漸至發厥者不問如其為熱也若陽症忽變陰厥者萬中無一從舌至今無一也蓋陰厥得之陰症一起便直中陰經唇青面白遍體冷汗便利不渴身倦多睡醒則人事了了與傷寒傳經之熱邪轉入轉深至人事昏惑者萬一不同諸書類載陰陽二厥為一門即明者犹為所混况昧者乎如此病先犯房勞後感傷寒世醫無不為陰症之名所惑往往投以四逆等湯致陰竭莫救從其暴亡尚不知悟摠由傳派不清耳蓋由房勞而病感者具

勢不過比常較重如發熱則熱之極惡寒則寒之極頭痛則痛之極所以然者以陰虛陽往承之非陰盛無陽之比况病者初能勿葯陰邪必輕旬日漸發尤非暴症安得以陰厥之例為治耶且仲景明言如發熱六日厥反九日後復發熱二日與厥相應則病且暴愈又云厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈明之以熱之日數定厥之痊期也又云厥多熱少則病進熱多厥少則病退厥愈而熱過久者必便膿血發瘧厥應下而久汗之必口傷爛赤先厥後熱利必自止見厥復利止反汗出咽痛者其瘳大瘳

厥而能食恐為除中厥止思食邪退亦愈凡此之類
莫非熱深發厥之旨原未論及于陰厥也至于陽分
之病而妄汗妄吐妄下以致熱極如汗多亡陽此利
煩躁四肢逆冷者皆因用藥差誤所致非以四逆真
武等湯挽之則陽不能回亦原不為陰症立方也蓋
傷寒十一發熱渴定然陰分先虧以其誤治陽分比
陰分更虧不得已從權用辛熱先拯其陽與純陰無
陽陰盛隔陽之症相去天淵後人不窺制方之意見
有成法轉相効尤不知治陰症以拯陽為主治傷寒
以拯陰為主

此一語為治傳
經症之秘旨

傷寒縱有陽虛當治必

看其人血肉充盛陰分可受陽為者方可回陽若面
黧舌黑身如枯柴一團邪火內燔者則陰已先盡何
陽可回即故見厥除熱存津液元氣于什一已失之
晚況敢助陽劫陰乎証治方云若証未辨陰陽且以
四順丸試之直指方云未辨疑似且與理中丸試之
亦可見後前未透此間縱有深心無可奈何耳因方
子革詳之并告業医者云

成無己云凡厥若始得之手足便厥而不溫者是陰經
受邪陽氣不足可用四逆湯溫之若手足自熱而至
溫從四逆而至厥者搏經之邪也四逆散主之必須

識此勿令悞也又當外症別之
此句疑予嘗治一中
脫一字
年頗人惡熱身熱而渴脈數細弱先厥後熱用溫藥
反甚後以回逆兼參朮各半服之厥止脈出洪大
而痊

按成所論陰經受邪及傳經之邪二厥一用回逆
湯溫治一用回逆散涼治已昭然若揭喻或未之
見耳故列案于此



續名醫類案卷二

傷寒下

錢唐魏之瑋玉橫輯 另鈔編次

陸平叔文之子平素体虛氣怯面色痿黃葯宜溫補不宜
 寒涼固宜常也秋月偶患三瘧蓋冬後受外寒虽遲
 寒熱一班而未至大寒大熱医者以為瘧後受邪不
 知其為新受寒邪也 因用病感新邪 投以參朮補劑轉
 欬奄之一息遷延兩旬間有從外感起見者用人參
 白朮湯畧無一効昏之嘿之漫無主持已治不矣喻
 診之察其脉未大壞膜未大滿小水尚利謂乃可治

但筋脉牽掣不停祇恐手足痿癱仲景二筋脉動場者久而成痿今病已二十餘日血枯筋燥遂可知矣

令治則兼治當于仲景之外另施手眼以仲景虽有

大柴胡湯而解表裡之法而無治痿之法

治痿欲取陽明清陽

明之熱邪則痿不治而痊况此証原為暴傷非緣痿損也

變用防風通聖散成方

減白朮以方中防風荆芥薄荷麻黃桔梗為表藥大

黃芒硝黃芩連翹梔子石羔滑石為裡藥原與大柴

胡之制相仿且內有當歸川芎白芍正可領諸藥深

入血分而通經脉減白朮者以前既用之貽悞不可

再悞耳当晚連進二劑一劑殊相安二劑大便始通

少頃睡去津汗出次早診之筋脉不為牽掣但陽

明胃脉洪大及加隨用白扁湯石羔知母每各兩許

次加柴胡花粉芩相連翹梔子一派苦寒連進十餘

劑要知前悞溫補劑之劑亦不少矣

神識清飲食進半月起于床一月

步于地畧過峻即腹疼便泄大似虛症不之顧但于

行滯中加柴胡桂枝升麻散餘邪不使下留變痢然

後改用葳蕤二冬畧和胃氣間用人參不過五分前

後治法一不違始克起死于一生

徐國棟傷寒六七日身熱目赤索水復不飲異常大躁

將門戶洞啟身卧地上展轉不快更求八拜一區洵

急以大承氣與服喻診其脈洪大無倫重按無力
謂曰此用人參附子乾姜之症奈何認為下症和臣
曰身熱目赤有餘之邪踰急若此再與姜附踰垣上
屋矣喻曰陽欲暴脫外顯假熱內有真寒以姜附投
之尚恐不勝回陽之任况敢以純陰之藥重劫其陽
乎觀其得水不欲咽熱在陽明經者亦漱水不欲咽情已大露豈水
尚不欲咽而反可咽大黃芒硝乎天氣燠蒸必有大
雨此症頃刻大汗不可拭矣且既認大熱為陽症則
下之必成結胸更可慮也惟用姜附所謂補中有發
并可散邪退熱一舉兩得不必疑慮以附子乾姜各

五錢人參三錢甘州一錢煎成冷服後寒戰戛齒
足冷以重綿和頭粟之縮手不肯與診陽微之狀始
服再與前藥一劑微汗熱退而安一戴陽症耳所謂甚奇然此症却不

吳卿子治塘栖婦人傷寒十日熱不得汗或欲以錦黃
下之主人俱延卿子脈之曰脈強舌黑而有芒投錦
黃力宜今舌黑而潤不渴此附子症也不汗者氣弱
耳非參芪不可一劑而汗仁和縣志

張路玉治范主事求先患寒傷勞症惡寒三日不止曾
投二劑第七日踰擾不安六脈不至伏手足厥

冷 独左寸厥：動搖心生汗故也知是欲作战汗之

候入勿服藥宜記但与热姜湯助之作汗若誤藥必

热不止後數日枉駕謝別詢之果如所言不藥而愈

战汗治法

吳氏子年二十餘素有夢交之疾十月間患傷寒頭疼

足冷医用發散消道屢汗而昏熱不除反加喘逆更

医用麻黃重刮頭面大汗喘促更甚或以为邪热入

裡或以为元氣大虚議用冬地爭持未决張診之六

脉微：按之欲絕正陽欲脱亡之兆急須參附庶可

望其回陽此喻嘉言所謂遂疏回陽返本湯加童便

誤治致陽危也

以斂陽一劑少安三吸安床改用独參湯加童便調
理而安

一人途次患傷寒經吳門泊舟求治詢之自渡淮露卧

受寒恣飲燒酒發熱在京口服藥行過兩次热勢略

減而神昏不語不時煩擾見其唇舌赤腫燥裂以開

水与之則咽不与則不思察其兩寸瞥之虛大關寸

小弱按久六脉皆虛曰此热傳手少陰心經也与道

赤瀉心湯一吸神識少安泊舟一日夜入進二帖便

溺自知次早解維再診脉已和与五苓去桂加冬二

劑属其頻与稀粥可安

吳介臣傷寒餘熱未盡曲池壅腫不潰不消日發寒熱
瘍醫禁止飲食日服清火消毒藥上氣形脫倚息不
得卧渴飲開水一二日腹脹滿急大便燥結不通兩
月中用蜜導而去數次去甚艱勢大危診之其脈初
按細急按之絕無此中氣逮盡之兆豈能復勝藥力
耶乃令連進稀粥床前以鴨煮之香氣透達徐以汁
啜之是夕大便去結矢甚多喘脹頓止飲食少進數
日後腫亦漸消此際雖可進保元獨參之類然力不
能支僅惟穀肉調理而安近一人過餌消導胃氣告
竭聞穀氣則嘔亦用上法而痊

高鼓峰治徐五宜長君傷寒危甚延往頃之忱有來言
病者晚來狂叫暈去五六次早起一暈而絕不必往
也問病來凡日云凡日矣又問胸尚熱否曰胸但不
冷耳曰可球也急往視之至則僵尸在床口鼻無氣
面色青晦口噤目閉手撒唇色紫黑高笑曰此人
不死陰虛症誤服白席而致耳切其脈兩尺尚在
在脈乃是遂取人參一兩熟地二兩炮姜五錢濃煎湯挖
而灌之尽刮口開面色轉紅不及一時大叫冷甚
厥明連以熱湯飲之即發壯熱通身淋漓汗下而甦此
晚腹脹不便曰無憂也大汗之後虛不能出耳再飲

約一杯即得解次日諸病悉除但多妄言怒罵如有

鬼神驅之者却是何故調治數日至夜半診其脉曰虛全

此乎復以大劑附子理中建中投之數日而安結局却

與陰虛

杭反沈僑如甥病傷寒診其脉浮數有力舌黑胸膈疼

脹此得之勞倦後復傷飲食戰汗而解不得單謂飲食勞倦醫以寒

涼消導攻之火受遏抑無所歸也急以大劑參朮歸

者炮姜抹之戒其家人曰夜半當戰則得汗而解

矣如戰時頻以粥与之時高卧天長寺四鼓時病

家急叩門曰服藥後果寒甚索被頃之大坦昏沈而

死矣先生尚有法抹之否曰不足計也汗來矣但戰

時曾進粥否曰寔未也曰吾語汝戰時須與粥要以

助胃氣使汗速來不至困乏耳今亦無妨第歸此時

當汗矣果坎仲景法

張隱安治一少年傷寒三四日頭痛發熱胸疼不可按

病家曰三日前因食面而致病張曰不然起飯糧食

何日不食蓋因外感風寒以致內停飲食非因食而

而為頭痛發熱也故凡停食感寒只宜解表不可推

食如裡氣一鬆外邪即陷入矣為庸即說法且食停于內

在胸下胃脘間按之而痛今胸止痛不可按此必誤

下而成結胸病家云昨延某師告以食面故乃用消
食之藥以致胸中大痛因診其外症尚在仍用桂枝
湯加減服愈

張令韶

即隱安

治一婦人患傷寒十餘日手足踈墮口目

瞶動面白身冷話語發狂不知人事勢甚危急其家

以為風縛其手足或以為疫迷心竅或以為虛或以

為寒或辭不治張診之切其脉全無

脉因厥而伏也

問其証

不知按其身不熱

邪已入府也

張曰此非人參附子証即

是大黃芒硝症出此人彼死生立判因坐視良久聆

其声重而且長

亦有中焦實而發之氣似不屬者亦下之而愈見繆仲淳治姚年之一案

曰若是虛寒症到脉脫之時氣沈々將絕耶得有如

許氣力大呼疾声久而不絕即作大承氣湯牙關緊

閉空開去齒藥始下咽黃昏即解黑矢半床次早脉

出身熱人事亦知舌能伸出而黑又服小陷胸湯二

劑而安

一婦人素有虛弱之症後患傷寒一醫以為陰虛發熱

用滋陰之藥命食鴉子火肉而病更甚所用皆玉竹

骨皮丹皮歸芍之類十餘日死症悉其延張至其人

已死

此与高鼓峯治徐氏子案同皆厥也虽補瀉不同其狀若死則一

張請視之然

氣虽死而脉尚在且帶滑曰此症不死乃誤服補藥

即不解胃絡不通胃家寔也幸正氣未敗可治少頃

果甦所以厥故用調胃承氣湯一服而結矢解諸症安次

日大汗如雨此虛象也用人參三錢芪朮各五

錢而愈善後法欠安

一男子新婚患傷寒吐蛔發熱醫以為陰虛用理中湯

而吐尤甚張診其脈緩而長一日夜吐蛔十餘條以

為風木生虫濕熱相顯預然而生隨生隨吐欲用黃

連等清濕熱之藥不信復易一医用歸芍玉竹之類

吐更甚虫更多復延張二日必欲治非黃連不可遂

用黃連厚朴枳實廣皮半夏各等分煎服其吐少止

再服不吐神清雖後大便而出約數十餘大小不一

後加白朮等以補之即脹不安共用黃連枳實二十

劑而愈此乃千百中偶見之症不可以為常有也但此

發熱吐蛔入云風木生虫絕無表裡症入吐蛔門乃是

按發熱脈緩而長則是陽明經症茶中但與治蛔

似多脫略此非非傷寒若入蛇門口卒云傷寒而非傷寒

陸養愚治周兩峰頭疼身熱又每行遇風几撲比至家

脇大痛耳聾煩渴語昏來見吐血盈許喘息不安

診後曰兩尺不起寸關弦緊今煩渴語昏是陽症也

弦乃陰脈仲景曰陽病見陰脈者死况兩尺乃人之

根蒂今不起根蒂已絕孤陽上越通血妄行據症脉

不可為矣辭去此人亦不甚味陸全血已止而喘定至此可

亦得福命脉之兩寸關弦而微數兩尺果沈而不起蓋症

屬少陽弦數宜矣兩尺不起亦自有故經云南政之

歲少陰在泉則兩尺不應今歲己酉乃是南政酉為

陽明燔金司天少陰君火在泉故不應耳吐血者因

舟中驚恐血菀為熱所搏也詰語者三陽表症也尽

將傳三陰也先以小柴胡和之俟寔堅而下之旬日

當愈也因与三劑明日脇痛減耳微聞但詰語胸滿

舌上黃胎仍以小柴胡加枳桔黃連日服一劑二日

胸膈少寬而胎黑有刺大便不行約七日矣乃以潤

字凡三錢前湯送下至夜更衣身涼諸症頓失後去

枳桔加歸芍而安

王野溪病傷寒六七日已發表矣身忽熱煩躁口渴咽

乾大小便利而不任風寒或用涼膈散反胸前見斑

數小點色微紅乃投消斑青黛散又發詰語手足厥

逆謂熱深故擬用承氣下之陸診之浮數六七至按

之而空曰此陰盛格陽症也下之立死內經至真要

論云病有脉後而病及者何也岐伯曰脉至而從按

之不鼓諸陽皆然今脉浮之而數按之而空乃陽虛

為陰所拒不能內入而與陰交身熱煩躁口渴咽乾
浮陽外越之故也惡風畏寒陽氣不足也發斑者因
寒為粵之致無根之火聚于胸中止熏于肺傳之皮
膚也詎語者神不守舍也厥逆者陽將竭也若冷至
肘膝則無及矣此與東垣治馮內翰之姪目赤煩渴
王海藏之治侯輔之發斑詎語同例一用真武一用
理中此先哲之成驗後學不知取法耳急用大料參
朮姜附峻補回陽麥冬五味甘艸白芍飲而和之濃
煎俟冷徐徐服之日夜令為不斷三日夜病勢少安
旬日後稍加減之一月起

吳子生病發熱頭痛腰疼煩躁口渴無汗有主麻黃湯
者有主羌活沖和湯者脈之陽部浮數而不甚有力
陰部沈弱而濇謂曰此症此脈有兩感之象必重有
兩用力煎之房勞而得者不可輕汗宜先投補劑托
住其氣血待日期而汗之或曰太陽症而用補劑景
有此治法乎曰雖無此法而未嘗無此論太陽症宜
汗假令尺中遲不可發汗何以知之以榮氣不足血
少故也今寸脈浮數而無力表症不甚急尺脈沈弱
而濇則裡虛可知傷寒有失汗而傳裡者亦有誤汗
而傳裡者此症是矣眾不決姑服羌活沖和湯一日

夜二劑前症俱加仍不得汗擬麻黃者以葯輕病重
欲大汗之陸曰若服麻黃湯亡陽詰語即見死可立
候也乃用補氣養榮湯二劑病未減亦不加診之寸
關如故兩尺稍有神再二劑又約一日夜方以參蘇
飲汗愈

凌東陽患傷寒已經汗下身體外不熱捫之則熱極不
能食而飢不可忍及強進稀粥即脹不可忍必用力
揉之一二時始下甫下又飢不能支大便五六日不
行亦不鞭滿或以汗下身涼而用開胃養血順氣之
劑病日甚診之兩寸關浮數兩尺沉數有力曰此畜

血症也因下之太早濁垢虽去邪熱尚留致血結成
瘕胃中飢甚者火也食即脹者邪熱不殺殺也揉下
仍飢者腸中空澗協熱消穀也

語又

法宜清上焦之

熱去下焦之瘕而後議補或曰許孝士謂血在上則
喜忘血在下則發狂今云瘕而何以無此也曰成無
己深于傷寒者也謂不大便六七日之際無喜忘如
狂之症又無少腹鞭滿之候何以知其有畜血蓋以
脈浮數故也浮則熱客于氣數則熱客于血下復浮
數俱去則病已如數去而浮仍在則邪獨留于衛善
飢而不殺穀潮熱反渴也浮去而數仍在則邪獨留

于榮血熱下行血得瀉必便濃血若大便六七日不行血亦得泄必在下焦而力棄瀕以抵當湯下之此煎矣之成紫也乃用淡鹽湯送抵當丸三錢取鹽走血之意以去榮中之結熱隨濃煎人參湯調涼膈散五錢徐送下以去衛中之浮熱用人參湯者病人數下恐元氣不能支也如此兩日結血去浮熱解復以養榮湯調安

湯二老病傷寒已發汗矣後忽下利身熱頭痛昏惰或謂合病下利復用解熱發表藥反加甚自汗惡風或謂陰虛用理中合四物遂不眠妄見踈煩詰語或云

此協熱下利也用白頭翁湯二劑病少可數日諸症不減四肢厥逆脈之浮按散大而數表虛沈按細數而

有力理曰向云協熱者是也第調胃承氣湯下之不

當止用白頭翁湯耳或云下利厥逆可復下乎內經

云塞因塞用通因通用王太僕云大熱內結溼瀉不

止熱宜寒療結後瀕除以寒瀉下之結散利止此通

因通用之法也又仲景云下利詰語有燥矢也厥逆

者熱深厥亦深也承氣下之第此症初見時下之即

安今日數已久元氣將脫不得竟下因用人參二錢

濃煎送潤字凡五錢半日許下溲尿數十枚利減半

手足少溫第昏沈更甚問之不語左脉微浮略數右脉少沈微數無力再用人參五錢濃煎送潤字丸二錢少時入去結矢數枚溲便少許遂能語索粥与之次日身涼神爽用調養氣血佐以清熱漸愈而大便結八物倍生地調安

陸肖愚治臧苔泉患傷寒發熱鼻燥口乾嘔惡胸脇痛滿小水短赤大便瀉利或投柴苓湯反加頭痛如破徹夜不寐已三日脉之左弦右洪寸關數而尺少加以柴葛解表為君黃芩石膏知母清腑為臣枳桔寬中為佐竹茹甘州平逆為使一日二劑嘔止痛減餘

如故因去知母黃芩竹茹如倍柴葛加生姜五片亦一日一劑熱退安卧瀉亦止矣口尚微渴以花粉麥冬甘州陳皮黃芩桔梗枳殼四帖而共後十日食復身熱詰語如見鬼狀舌黑有刺大便三日不行日輕夜重脉沈有力兩尺帶弦用枳寔黃連姜仁桃仁白芍檳榔元明粉二劑諸症悉減而大便未行用桃仁十枚煎湯下潤字丸一錢五分全愈後以清氣養榮湯而安

吳煦野子年二十三精神素旺清明日館中歸有房事五更小解忽臍下作痛腸中雷鳴大便瀉水小便不

利明日遂發寒熱頭痛醫來告以酒后犯遠歸之戒
醫疑是陰症湯寒以理中湯二劑令一日夜服之次
日嘔逆大作煩燥口渴飲食不進日夜不卧診之已
三日矣其脈左弦右洪寸關有力尺部尚和面赤戴
陽乃与柴葛解飢二劑因述遠歸陰虛投理中不減
咸擬倍加參附陸曰脈症俱陽縱有房事陰未嘗虛
若再投參附不可為矣令今夜必服此二劑庶不傳
裡病者心虛止服一劑明早診之症不加重脈仍洪
大并兩尺亦大曰熱邪已入腑矣日晡必劇以白朮
湯二劑与之病者沈豫謂曰今日怕石羔明日大黃

也怕不得延挨未服而煩渴躁熱大作且有詬語遂
連進二服熱略不減再以前方二劑与之至五更始
得少睡早間診視兩尺沈寔舌胎已厚改用小陷胸
湯送潤字凡一錢至晚又進一錢夜半出燥矢數十
枚熱減瀉止又服枳實黃連數十劑少用滋補即痞
隔調治二月始安

陸祖愚治顧玉岩年六十患傷寒服葯頭疼骨痛已際
身熱煩躁兼發赤斑而狂診之六脈沈數有力目瞪
直視喋不出声舌黑芒刺四肢冰冷詢其大便二十
日不行謂年虽高脈尚有神力任無事投以大承氣

湯日開昏沈咸謂決死一二時頃腹中鳴响出嚙矢若干諸症脫然僅存一息改用人參麥冬歸芍芪朮而安

吳開之二月間患頭痛身熱服藥已愈旬日矣忽耳後紅腫作痛大發寒熱或以為毒用花粉連翹解毒散劑不効或以為痰核用南星半夏數劑反甚胸脇滿痛飲食不下氣喘而粗夜卧不安脉之兩寸關弦數兩尺和此本傷寒少陽之邪不解所以發頤耳之前後上下乃少陽部分寸關弦數亦少陽不和之脉宜小柴胡湯和解之用軟柴胡七錢軋葛黃芩各三錢

生甘州桔梗蘇子白芥子各一錢姜枣煎服一劑喘定四劑腫消

王節齋治陳湖一男子患傷寒仰卧一月且耳聾意其痛尚在少陽故脇痛不能轉側及耳聾也与小柴胡湯加山芎一劑即能轉側耳亦有聞尾閭穴內潰皆蛆蓋少陽屬風木故也

一卒傷寒大小便不通予与五苓散而皆通五苓固利小便矣而大便亦通者津液生固也或小便通而大便秘用蜜道之

資生經

醫說續編

施秘監尊人患傷寒欬甚醫告技窮試檢灸經于結喉

下灸三壯即痊蓋天突穴也神哉 全上

范汪方云故督郵顧子猷得病已痊詣華陀視脉佗曰
高虛未復勿為勞事御內即死臨死当吐舌数寸其
妻聞其病除從百餘里來省之止宿交接中間三日
發病一如佗言嬪人傷寒虽痊未滿百日氣血骨髓
未牢寔而合陰陽快者當時即未竟惡經日則令百
節解離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭恍々吸々氣力
不足著床不能動搖起居仰人食如故是其志也女
夫亦然 病原論

有士益正者疾愈後六十日己能射獵一犯房室即吐
涎而死 热病房室名为陰陽易皆難治近者有一
士大夫小得傷寒痊已十餘日能乘馬行来自謂卒
復亦以房室腹疼拘挛而死

嬪人温病虽痊未卒復血脉不和尚有热毒而与之交
接得疾者名为陰陽易医者張苗說有婢得病痊後
數日有六人姦之皆死 千金方 全上

林觀子父因積寒腹疼以痧疰刺指而愈數日後神思
蕩結胸腹不安日就瘦削不能自言所苦然絕無表
裡症犹日食粥二三次大便溏日二三行雜治二旬
餘漸重後一医診之曰傷寒之邪尚在何候至此也

服小柴胡八劑別下結矢十數枚而安此亦職結類
所謂飲食如 時之下利也 傷寒折衷

吳仁齋治一人傷寒十餘日脉沈細手溫而足冷大便
不通面赤嘔煩渴藥不能下惟喜涼水一二口或西
瓜一塊食下良久吐出此陰甚于內逼其浮陽上冲
咽溢故面赤煩嘔也遂用附子大者一枚以生姜自
然汁和白麩色裏煨熟去面去皮尖切片入以人參
三錢炮姜二錢水煎冷服

一人傷寒七八日服涼藥太過遂變身涼手足厥冷通
身黑斑惟心頭溫暖乃伏火也六脉沈細昏不知人

不能言語狀如尸厥遂用人參三白湯加熱附半个
乾姜二錢服下一時許斑漸經手足漸暖甦矣數日
後有餘熱不清此伏火後作再用黃連解毒竹叶石
羔湯調安 先溫補後涼解法

馬元儀治沈某發熱七日神昏詰語中州結塊高突拒
按作疹診之右脉虛微左見弦澁此血氣奪而邪氣
盛也症寔脉虛法在不治不待已必先補後攻庶几
萬一與人參桂枝炮姜半夏枳寔厚朴廣皮補正散
結脉少起再与附子加桂理中湯以恢復元氣兩劑
右脉已透四劑兩脉有神而前症犹在中痛轉甚時

衆議交沮蓋此症原有積滯可攻兩日用葯而行溫
補者全是顧慮元氣若卑下之必先脫矣今已補完
胃氣即可施治寔之法也以人參三錢大黃五錢厚
朴一錢枳寔一錢桂枝五分服未一時大便連行三
次其塊如矢再與理脾胃葯而安

卜晉公患傷寒數日面赤踈煩手足搐搦起卧轉側不

安口燥渴大便結

無甚表症只一味燥火為患耳

或用清火發散俱

不應診其脉虛瀉煎結夫瀉則傷陰結則氣滯得之
憂思勞懣肺胃受傷津液虧而虛邪結也散邪清火
適所以耗其陰而留其邪耳治法必須大劑滋解乃

可用瓜蒌寔一兩紫苑二錢枳壳桔梗各一錢秦艽
一錢杏仁蘇子半兩等一劑便得大睡身安數日而
安

鮑坤厚病經半月兩寸独鼓兩關尺虛微頭痛如斧劈
汗出不止詒語神昏曰寸大尺小平為上盛下虛之
候沉頭痛如破者虛陽上潛也汗出不止者虛陽外
散也詒語神昏者孤陽氣浮神失其守也非人參附
子無以追散失之元氣非童便猪胆葱白無以通潛
逆之陽氣法當用白通湯以急球之時夜半特宰猪
取胆比葯成牙關緊急不知人事乃挖而灌之黎明

神氣少清此陽氣已漸歸原但欲其深根固蒂非大劑溫補不可用人參四兩附子一兩肉桂五錢連皮數劑疼定汗止而安

一八傷寒六日兩脈微弱不起面垢遺尿自汗詰語身重不能轉側此三陽合病汗下兩不可用仲景云腹滿身重口不仁而面垢詰語遺尿自汗者白虎湯主之蓋三陽合邪至遺尿詰語其中州變亂真氣與津液並傷可知故仲景復云發汗則詰語下之則額上生汗手足逆冷以汗則偏于陽而津液益傷下則偏于陰而真氣復損惟白虎一法解熱而不礙表裡但

三陽病其脈當浮大而反微弱不起者以邪熱抑遏不得外達非陽衰脈微之比但清其壅熱而脈自起矣用大劑白虎一服便得大睡再劑神清脈起與補虛清熱而痊

張氏子傷寒四五日而脈虛微神氣昏亂躁煩不安時欲得水復置不飲棄衣而走勇力倍常言語狂妄不避親疏此陰盛格陽欲脫外假熱內真寒也欲與理中湯咸謂大熱有餘之症欲行寒下曰豈有大熱症而不引水自投者况兩脈微弱明屬陰盛陽微若不急與溫補大汗一至不可為矣前方加入人參至四兩

煎成冷服一二時許狂亂即止反見寒慄欲覆重被

再与前药一剂而安

与喻嘉言治徐嗣楨案同

周禹九傷寒五日發熱中痛嘔逆瀕三四人搖扇取涼不已与药随吐脉之寸空大關尺虛小曰兩寸空大陽欲從上越也關尺虛小陰欲從下脫也若大汗下至陰陽兩絕不可为矣以白通湯加入尿猪胆服後嘔逆隨已寸脉乍關脉起後見口燥中痛脉寔乃以承氣湯下之周身發斑疹兩頰赤腫反用黃連解毒湯而安

張氏僕病經五日發熱脉沈微口燥煩躁不眠曰發熱為陽脉沈微為陰少陰症似太陽也口燥煩躁乃邪氣內攻当用麻黃附子細辛湯以溫少陰之經而驅內陷之邪彼以心身安得陰症乃用附子別商瓜姜滋解之法症益甚再脉之沈微轉為虛散已犯條款不得已惟四逆湯一法或可挽回遂連進二服是夜得睡明日遂起

李季虬曰趙和齋年六十患病予以他事請見延至中堂云偶因勞倦倅疲正欲求教為診視細按其六部并察其形神謂云翁病屬外邪非勞發也瀕著意珍重時葛存誠在坐私謂云此病是極重外感邪氣有

內陷之兆恐難挽回別去三日復請看則神氣已脫
脈無倫次問所服何藥云石羔湯日病愈固重服藥
又差無汗發熱非陽明症何得用石羔此大陽未
經發汗邪氣傳裡之虛水瀉不勝邪熱真氣已脫必
不可救兩日死 廣筆記

張意曰治一人春間傷寒七日後煩躁咽痛胸悶泄瀉
皆作濕熱治不效診得脈來細急乃少陰脈象也大
少陰上火下水而主樞机水火不交測脈急胸滿而
煩躁火上咽痛水下泄瀉此神机內菴旋轉不出不
得周遍于內外之症也與少陰下利咽痛胸滿心煩

之論吻合宜用猪膚湯法用猪膚六兩刮取皮上白
膚煎汁一大碗去滓及浮油加白蜜五錢穀芽一兩
炒香研末文火熬成半碗溫服之症少減其脈細而
短濇此戊癸不合以至陽明血液不生經脈不通之
候也與炙甘草湯通經脈合陽明而痊

薛立齋云鄭汝東妹婿患傷寒得純黑舌醫士曾禧謂
當用附子理中湯八錢驚駭遂止迨困甚治棺曾往
視之調用前藥犹有生理其家既待以死拚從之數
劑而愈大抵舌黑之症有火極似水者即杜孝士所
謂薪為黑炭之意也宜涼膈散之類以瀉其陽有水

來克火者即曾所治之人是也宜理中湯以消陰翳
又酒以老生姜切平擦其舌色少退者可治堅不退
者不可治

一云以姜切
午擦蜜擦之

弘治辛酉金臺姜夢揮患傷寒亦得純黑舌手足厥冷

訖逆不止

前有吳仁
論三案

衆醫紈作火治几致危殆判院

吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必
用是為附子療寒其効可數奈何世皆以為必不可
用之藥盍視人之死而不拯不亦哀哉至于火極似
水之症用藥得宜効應不異不可謂百無一治而棄
之也 傷寒折衷

庚辰年少司馬楊夫人傷寒誤服附子藥一杯即時咽
喉赤腫急邀薛治薛謂仲景先生云傷寒症桂枝下
咽陽盛則死况附子乎是日即死

辛卯年一吏傷寒誤用附子藥一杯發踈奔走跌死夫
感暑之際附子桂姜三藥併用連進三四劑無事嚴
冬時候三藥單用一味止進一劑者却死可見羅謙
甫捨時從症權宜用藥之妙

吳洋治汪伯玉從嫂病衆醫窮洋始至曰家人曰易与
尔弟以凉水飲之其覺謂病者三日不食奈何予
洋曰傷寒陽明熱甚時藥將不達即投所宜勿藥可

也乃督汲者陳榻下先以一杯飲之病者爽然遂尽
一斗病良已乃進入參白朮而卒 太函墓

吳橋治表姪方輅自浙病傷寒諸醫不效歸再挾

不退耳稍解俸倦心煩醫率投以補劑漸至昏替絕
食漚衣已治本具逆橋至六脉弦緊而數病由傷寒
未解而復感寒幸而年力方強非汗不解乃以麻黃

石羔湯汗愈 全上

續名醫類聚卷三

疫

錢唐魏之琇玉橫輯 男斌編次

王宇泰曰聖散子方因東坡先生作序由是天下神之
宋末辛未年永嘉瘟疫服此方被患者不可勝紀余
閱葉石林避暑錄云宣和間此藥盛行于京師大孛
生信之尤篤殺入無數醫皆廢之昔坡翁謫居黃州
時其地瀕江多卑濕而黃之居人所感者或因中濕
而病或因雨水浸淫而得所以服此藥而多効是以
通行于世遺禍于無窮也弘治癸丑年吳中疫癘大

作吳邑令孫磐令匠人修合聖散子遍施街道并以
其方刊行病者服之十無一生率皆狂燥昏瞶而卒
噫孫公之意本以活人殊不知聖散子方中有附子
良姜吳茱萸豆蔻麻黃藿香等劑皆性味燥熱反助
大邪不死何待若不辨陰陽二症一概施治殺人利
于刀劍有能廣此說以告人亦仁心之一端也
續 說 醫

薛立齋曰嘉靖甲申春南都大疫煎聖散子普濟老幼
並服來者接踵死者塞途良可哀憫殊不知此方因
嶺南風土而作且浙之與廣相去萬里殊感異方天
時人事大不相侔豈可一概治之哉

張子和曰元光春京師翰林應泰李屏山得瘟疫症頭
痛身熱口乾小便赤澀渠素好飲匠者便與酒癰丸
犯已豆利十餘行次日頭痛諸病仍存匠者不識復
以辛溫之劑解之加之卧于暖炕強食葱醋湯希得
一汗豈知種々客熱疊發併作目黃斑生潮熱血泄
大喘大滿後虽有承氣下之者已無及矣至今議者
紛紛終不知熱為之過往歸罪于承氣湯用承氣
湯者不知其病已危犹復用葯孝經不明故也良可
罪也然議者不歸罪于酒癰丸者亦可責也夫瘟疫
在表不可下况巴豆之凡乎巴豆不已况復發以辛

熱之劑乎彼隨眾毀言皆妄議也

宋宝慶二年丙戌冬十一月耶律文正王從元太祖下
靈武諸將爭掠子女玉帛王獨取書籍數部大黃兩
駝而已既而軍中病疫惟得大黃可愈所活凡萬人
輟畊錄

職方外紀云哥阿島曩國人患疫內有名醫名依卜
加得不以藥石令城內外遍焚火燒一日夜火息
而病亦痊矣蓋疫為邪氣所侵火氣猛烈能盪滌諸
邪之久而疾愈亦至理也 想書初編 火攻法

印汝誠因訪友聞其鄰家哭声問何故曰鄰某甲得時

疾印令汲水置大桶中以簾橫其人于上遂愈 揮塵新說

水攻法

蘇黼光侍郎云予作清流縣宰縣倅申 行父之子歸
患時疫三十餘日已成壞症予令服奪命散又名復
脉湯人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服
之少頃鼻梁有汗出脉復立痊凡傷寒時疫不問陰
陽老幼誤服藥餌困重垂死脉沈伏不省人事七日
以後皆可服之 本州經目

吳嗣昌治浙督趙清猷公名臣也常遇危疫吳獨排眾
議投冰水立甦之公尊礼若神曰君其不朽矣 仁和縣志

孫文垣治一老妓三月患頭痛身熱口渴水瀉不止身重不能反側日漸昏沈耳聾眼合詰諸醫不効有主補中益氣者有主附子理中者煎成未服孫診之六脈洪大面色內紅外黑口唇乾燥舌心黑胎不省人事曰此疫症也法當清解急以小白湯進之犹可生也蓋氣理中殺之耳安可用問小白何湯也曰小柴胡今白扁湯即是曰泄瀉如此石羔可用乎曰此協熱下利當早服之既服至夜半神氣甦醒惟小水不利熱渴未退師仲景法渴而身熱小水不利者當利其小便乃以辰砂六一散一兩灯心湯調服之兩

帖而痊

張淨宇發熱腹疼泄瀉口渴嘔吐不止有認寒者有認熱者有認傷寒者孫診之曰此時疫瀉也以二陳湯倍白朮加青蒿芎根酒苓白芍猪苓澤瀉滑石一劑而安

一僕病身如火燥頭痛如破小水赤口渴鼻乾不得卧胸膈脹飢不能食六脈弦而數孫与竹叶石膏湯加知母枳壳白芷芎根大加青蒿一帖而熱痛減半胸膈亦寬唯口渴小水短澀睡卧不安又与化瘟丹三錢井水犯下渴止少得睡頭暈脚軟与四物湯加

青蒿酒芩苈仁木瓜服愈

一僕病与前相似，医与药乃大吐大泻，热更甚，头疼不可当，烦躁口乾，鼻衄，嘔吐，小水短，滴已十四日，甚危。徐詢所服药乃藿香正氣散，加砂仁、厚朴、山查、大耗元氣之品。時五月火令，当權之疫，当以甘寒之剂治之。何可以辛热香竄益其尺而枯其津耶？急投人參白虎湯，加竹茹、葛根、青蒿、升麻一帖，热除，再帖頭痛止。諸症尽去，後連治数人，皆如此。盖天行之疫，一方多有先以甘寒清解之剂，投之热退，即以四物養陰血，少加清热之品，而青蒿之功居勝。

治疫尽此数語

吳某媼先感風邪，後傷飲食，發熱，頭痛，腹脹，医与巴豆凡瀉之热如初，又以大黃重瀉之，热亦如初，再后者以瀉而热不退者，為虛，大用參、芪、朮補之，四日神氣昏沈，不省人事。徐診之，左脉弦数，右關尺沈，数有力，舌尖沈，香色，舌根焦黑，芒刺，語言不清，盖不知飢饉之餘，疫氣乃癘，妄下妄補，誤成壞症，危且殆矣。姑以柴胡、知母各三錢，石羔六錢，枳實、花粉各五分，甘州黃芩、麥冬各一錢，山炮、生地各七分，人參六分，竹叶三十片，姜三片，水煎飲之。中夜後人事少清，微有汗，舌柔，和次日前方去生地，加白芍、杏仁、焦黑，尽退。

便五日未行身尚痛咳嗽与七製化痰丸二帖再以石羔二錢麦冬貝母各一錢前胡枳壳黃芩梔子各六分甘艸三分桑皮八分全安

程氏嬪乃夫没于疫病七日疫即反之大抵頭疼口渴胸脇併痛医与小柴胡湯夜忽夢夫交洩而竟冷汗濡四肢如解神昏澀語面如土色舌若焦煤強硬孫診之六脉沈弦而數大小便俱秘此亦陰陽易類也疫後有是危已極矣与生脉湯加柴胡黃芩桂枝甘艸煎成將乃夫昔穿袴裆燒灰調下兩劑而神醒体温汗斂舌柔焦退前方加枣仁竹茹四肢能運

動乃進稀粥子女妯娌婢僕凡六人次第均以六神通解散汗之而安

与陸紫丁程同

一嬪人發熱頭痛医与九味羌活湯十神湯不効加口渴舌黑如煤人医与如神白席湯竹叶石羔湯亦不効加泄瀉不止人事昏沉四肢厥冷呼吸氣微米粒不進者十四日具含斂矣孫診之脉細如蛛絲曰此疫症也令生脉理中二湯飲之連進二劑後半神氣少甦飲粥湯半碗次早六脉已見喜曰脉絕續者生可無虞矣仍与前葯至晚瀉止口不渴舌煤退精神爽再用人參白朮各五錢乾姜炙艸各二錢麦冬三

錢五味十五粒

仍是理中主脈

不拘時服數日全安

此即壞症也前

以溫補奏功

吳球泉內人痢疾後感寒月水遠至壯熱頭微疼口渴

遍身疼胸膈飽悶煩躁耳聾大便瀉舌上白胎脈七

八至乱而無序

脈躁多凶第此為熱菴之極而然躁極而靜菴極而通后之代而或汗勢

也亦理也孫曰此三陽合病春瘟症也宜投三陽藥服之

批察徵應再為區處以柴胡三錢葛根白芍各二錢

枳實桔梗酒芩竹茹各二錢天花粉八分炙甘草桂

枝各五分服後遍身如水而与四肢尤甚六脉俱無

脈双伏或單服而四肢厥冷欬或汗也宜熟記

幸家及医者皆嘆為物故矣

孫曰非死候也蓋夜半一陽生勢欲作汗譬之天將

雨必六合晦冥諸臣咸匿笑四鼓后果战而汗出衣

被皆濕肢體漸溫神思清爽且索粥唯耳尚聾腹中

大响脉近六至以柴芩湯加烏梅而愈

族孫醉後犯房事起而小溲即暗下作痛水瀉腸鳴一

日十餘度發熱頭疼醫与理中湯一帖反加嘔逆煩

躁口渴孫診之左脉弦大右洪大俱七至不食不眠

面赤唇燥舌胎黃厚自云房勞失後陰症傷寒小腹

痛且漏底乃笑曰春溫症也族人交口謂的屬陰症

故嘔吐水瀉不可因其面赤便認為陽願戴陽症与

此近似幸加察烏咸擬理中湯再加附子肉桂庶可

保全

房勞外感即謂陰症而與熱為殺人多矣當與喻嘉言治黃長人一案同參喻案見傷寒門

孫曰桂枝下咽陽症即斃陰陽寒熱之間辨之不真

死生反掌茲當舍症後脉也

即症論發熱頭以濕胆疼亦非陰症

湯加姜汁炒黃連柴胡乾姜二帖令當夜飲尺俾不

他傳因畏竹茹黃連只進一服嘔逆止餘症悉在決

日脉之洪大搏指與白席湯加竹茹兩帖亦令服完

因畏石羔只進一服瀉止小腹仍疼又次日脉洪長

堅硬邪已入腑非桃仁承氣不可乃靚面煎服連飲

二劑下黑漆矢五六枚痛熱俱減再診六脉皆緩弱

以四君加連芍香附調安

程兄腮頰紅腫嘔惡寒發熱不食下午煩躁口苦不

寐此俗名鸕鷀瘟是也乃少陽之明二經之症法當

清解以柴胡芫仲各二錢乾葛竹茹半夏曲各一錢

黃連枳殼各七分甘州四分二帖而安

喻嘉言治錢仲昭患時氣外感三五日發熱頭疼服表

汗藥疼止熱不減口乾唇裂因而下之遍身紅斑神

昏詎語食飲不入大便腹秘小便熱赤脉見緊小而

急曰此症前因悞治陽明胃經表裡不清邪熱在內

如火燎原津液盡乾以故神昏妄語若斑轉紫黑即

刻死矣

昔人以斑紫黑為胃爛

目今卒是難據但其面色不枯

声音尚朗乃卒日保養腎水有餘如旱田之側有下泉未竭故神虽昏乱而水小仍通乃陰氣未絕之象尚可治之不用表裡單、只一和法取七方中小方而氣味甘寒者用之惟如神白席湯一方足以治此盖中州元氣已离大劑急劑後劑俱不敢用而虛熱內熾必甘寒氣味方可和之耳但方虽宜小而服則宜頻如飢人卒欲得食不得不漸、与之必一日夜頻進五七劑為浸灌之法庶几邪熱以漸而解元氣以漸而生也若小其劑後曠其日縱用葯得當亦無

及矣如法治之更一日夜熱退神清脉和食進其斑自化

金鑑春日病瘧候治二旬致成極重死症壯熱不退譫語無倫皮膚枯澀胸膈板結舌卷唇熱身跨足冷二便略通半渴不渴面上一團黑氣前醫所用之葯不過汗下和溫之法絕無一効喻曰此症与兩感傷寒無异但彼日傳二經三日傳經已尽即死不死者又三日再傳一週定死矣此春溫症不傳經故虽邪氣留連不退亦必多延几日待元氣竭絕乃死觀其陰症陽症兩下混一區治陽則礙陰治陰則礙陽与

兩感症之病情符今仲景原謂死症不立治法然曰
發表攻裡本自不同又謂治法在人神而明之未嘗
教人執定勿為也吾有一法即以仲景表裡二方為
治虽未經試驗吾天機勃々自動若有生變化行鬼
神之意必可効也于是以麻黃附子細辛湯兩解其
表在陳陽之邪果然皮間透汗而熱全清再以附子
瀉心湯兩解其在裡陰陽之邪果然胸前柔活人事
明了諸症俱退次日即思粥以後竟不需藥只此二
劑而起一生于九死域哉

此紫宜反
粟玩之

虛不遠治永嘉王龍友望其色黯紫舌本深紅知其次

日當病果發熱越三日其叔培竹欲歸將發診其脈
沈而散虛極力挽留謂龍友虽病而脈有神理居虽
未病而邪寔深入病中殆將奈何至天晚大吐脈隨
脫藥以人參三錢脈復有以棗仁等劑按之者其熱
更甚十四日脈入至舌短神昏虛謂今晚非用下必
然胃爛因用芩連大黃一劑次日遂愈蓋疫為腐氣
入受之多從口鼻入先由寒鬱火故其色紫々為水
尅火之色也火病之發應心之苗故舌色深紅 清
碧謂之將瘟舌而脈俾瀕浮々脈象火病發必順若
沈則邪深入裡河間多用下法如當下而失時必胃

爛而死

吳又可治朱海疇年四十五歲患疫得下症四肢不舉
身卧如塑目閉口張舌上胎刺問其所苦不能答因
問其子兩三日所服何藥云進承氣湯三劑每劑投
大黃一錢許不効更無他策惟待日而已診得脈尚
有神下症悉其為淺病深也先投大黃一兩五錢目
有時而稍動再投舌刺無芒口漸開能言三劑舌胎
少去神思少爽四日服柴胡清燄湯五日復生芒刺
煩熱人加再下之七日又投承氣養榮湯承氣養
榮宜考肢
体自能少動計半月共服大黃十二兩而愈又數日進

進稀粥調理兩月而安此症千人中一二而已姑存
案以備參酌

施幼升賣卜頗行年四旬稟賦肥甚六月患時疫口燥
舌乾胎刺如鋒不時太息咽喉腫痛心腹脹滿按之
痛甚渴思冰水日晡益甚小便赤澀得涓滴則痛甚
此當急下之症也緣遍身肌表如水指甲青黑六脈
如絲尋之則有少按則無医者不究裡症熱極但引
陶氏全生集以為陽症但手足厥逆若冷過乎肘膝
便是陰症今已遍身冰冷比之冷過膝更甚宜其為
陰症一也且陶氏論陰陽二症全在脈之有力無力

中分今已脉微欲絕按之如無此之無力更甚宜其
為陰症二也陰症而得至陰之脉人何說為遂投附
子理中湯未服延吳至以脉相參麥裡正較此陽症
之最者因內熱之極氣道壅閉下症悉其但嫌下之
晚耳今元陽已極以至周身冰冷此倖厥也六脉如
無者群龍無首之象症亦危矣

破其疑感不
知如此惜哉 急投大承氣湯囑其緩下之脉至厥

回便得生矣其妻以一日陰症一日陽症天地懸二
疑而不服更一医指言陰毒須灸丹田又三医續至
皆言陰症妻乃惶惑病者自言何不卜之神明遂卜

得從陰則吉從陽則凶

從陰者謂從陰為也
神自明而人自昧耳

更惑于
医之議陰症居多乃進附子湯下咽如火煩躁之極
嘆曰吾已矣藥之誤也言未已而殞

吳江沈氏婦少寡多鬱怒而有吐血症歲三四發吐后
即已三月間小發熱頭疼身痛不惡寒而微渴次日
舊病大發吐血逾常更加眩暈手振煩躁飲食不進
且熱加重医但見吐血以為舊病不知其時疫也以
發熱為陰症頭疼身疼為血虛不知吐血前一日已
發熱頭痛非吐血后所加也眾議用補問吳可否吳
曰失血補虛權宜則可今兼時疫非昔比也于是用

人參二錢茯苓歸芍佐之兩服后虛症咸退熱減六
七医者病者皆謂用參得効欲速進吳禁之不止遂
竟心胸煩悶腹中不和求噦不得遍体不舒終夜不
寐蓋虛邪得補而退寔邪得補而剝也因少与承氣
微利之而愈按此病設不用利葯靜養數日亦愈以
其人大便一二日一解則知地氣自通邪氣在內日
從胃氣下趨也

嚴氏嬭年三十時疫後脉症俱平飲食漸進忽然肢
浮腫別無所苦此即氣復也蓋大病后血未成氣暴
復血乃氣之依歸氣無所依故为浮腫嗣后飲食漸

如浮腫漸消若投行氣利水葯則謬矣據云則養
血之劑所宜

投也 宜入腫門 吳人有
前門一案亦身忽腫后消

一人感疫發熱煩渴思飲水水医者某服生冷甚嚴病

者苦索不兩張子和曰病入不能飲水虽強与之不
飲也 遂何處哉 凡遇此病欲得水者与

之立起遂致兩日火逆咽喉焦燥日夜不寐目中見鬼

陰脫見鬼力多病人困極自謂得冷水一滴下咽虽死無恨

于是乘隙剖竈取井水一盃置之枕旁飲一杯目

頓清亮二杯鬼物潛消三杯咽喉声出四杯筋骨舒

暢不覺熟睡俄而大汗如雨衣被濕透脱然而愈蓋

其人瘦而多火素稟陽藏医与升散不能作汗則病

反劇得水表裡和順而痊

張路玉治洪氏女壬子初冬發熱頭痛胸滿不食已服
發散消導回劑至六日周身疼楚暖中疼不時奔响
屢欲圍而不行口鼻上唇忽起黑色成片光亮如漆
与玳瑁無异医駭辭去張診之喘汗脉促神氣昏憤
虽脉症俱危喜具黑色四圍有紅暈鮮澤若痘瘡之
根脚緊附如錢他處肉色不變許以可治先与葛根
黃芩黃連湯加犀角連翹荆防紫荊人中黃解其肌
表毒邪俟其黑色發透乃以涼膈散加人中黃紫荊
烏犀微下二次入与犀角地黃湯加人中黃之類調
理半月而安此症書而不載唯龐安常有玳瑁瘡之
名而治法未備人罕能識先是一人患此瀕危口自
鼻孔皆流鮮血亦不能收大抵黑色枯焦不澤四圍
無紅暈而灰白色黯者皆不可收其黑必先從口鼻
至兩頰目眦兩耳及手臂足領甚則胸腹俱黑從未
見于額上肩背陽位也

陳端之七月間患時疫初發独熱無寒或連熱二三日
或暫可一日半日熱時煩渴無汗熱止則汗出如漉
自言房勞后乘涼所致服過十味香薷丸味羌活柴
胡枳桔等十餘劑煩渴壯熱尤甚張診之六脉皆洪

盛搏指舌胎焦枯唇口剝裂大便五六日不行雖云
病起于陰寔則熱邪亢極胃府剝腐之象急與涼膈
加黃連石羔人中黃得下三次熱勢大減明晚復發
熱煩渴與白虎加人中黃連熱渴俱止兩日而左
頰發頤一晷時即平而氣急神昏此元氣下陷之故
仍與白朮加人參犀角連翹升柴甘桔牛蒡馬勃一
服右頤入發一毒高腫赤亮瘍醫調四十日而乃安
同時患者頰多良由時師不明此為濕生之邪初起
失于攻下緊用發散和解引邪泛濫而發頤毒多有
腫發綿延以及膺肘臂膊如流注潰腐者綴用攻下

解毒皆不可抹勿以小疔而忽之

一遼東人患時疫寒熱不止方胎黃潤用大柴胡下之
煩悶神昏襟入參白虎補中益氣熱勢加甚頰與
苓連知母不應張診之左脈弦數而勁右脈再倍于
左周身俱發紅斑惟中腕斑色皎白諸醫莫審白斑
之由因喻之曰良由過服苦寒之劑中焦陽氣失職
故也法當通達其斑魚通氣化無慮斑色不轉也遂
用犀角連翹山嵐人中黃日夜連進二服二便皆行
而斑化熱退神清食進起坐徐行矣其昆季同時俱
染其氣並進葱白香豉人中黃連翹薄荷之類皆隨

手愈

一人壯熱十餘日神昏語言難出自利溏黑舌胎黑燥唇焦鼻煤先候發散消導等數劑煩渴彌甚恣飲不輟此本伏氣宛發更遇風遂成風溫以熱邪久伏少陰從火化出太陽即是而感幸年壯質強已逾三日六日之期症之危殆良由風藹性升鼓激周身元氣皆化為火傷耗真陰少陰之脈不能內藏所以反浮古人元無治法唯少陰例中則有挾熱存陰承氣下之一症可借此以迅掃久伏之邪審其鼻息不鼾知水之上源未絕無慮其且視不溲也

喻嘉言治錢仲昭亦以其腎水未竭

故傷寒多死下虛人非盡言也酌用涼膈散加入中黃生地急球垂絕之陰服后下溏黑三次舌胎未潤煩渴不減更與大劑涼膈大黃加至二兩煎黃連犀角三方得熱除于是高以生津止渴大劑投之舌胎方去津回渴止而痊

按喻嘉言治金鑑論而感其論症与此略同第金則舌卷足冷身蹇而便略通此則舌黑唇焦鼻煤而利溏黑故金則以麻黃附子細辛及附子瀉心此則需用涼膈治法不同如此

楊栗六治一人病疫大熱大渴唇焦目赤兩額嬌紅語

言謬妄神思昏沉手冷過肘足冷過膝其舌黑滑而
胖其脉洪大而空曰此戴陽症也水熱內寒虽身熱
如烙不 粟蓋口渴引飲不耐寒涼面色虽紅却嬌
嫩而游移不定舌胎虽黑却浮胖而滋潤不枯症類
白席然白虎症未有厥冷上過肘下過膝者遂以大
劑八味飲加入參濃煎數椀探冷与服諸症乃退繼
以理中附子六君歸芍調理而安先是有用白席者
幸未服

張孝海業匠以疲于臨危染時疫微寒壯熱頭痛昏沈
服散發藥數劑目直耳聾病勢增重口渴便秘改用

瀉火清胃解毒等劑熱尤甚油汗如珠詰語撮空惡
候悉具楊診之其脉洪大踈疾而空其舌乾燥焦黃
而胖座皆匿也僉擬白席承氣湯以養榮湯用參附
各一錢与之曰服此後當得睡則諸脉俱靜諸症
俱退而舌變嫩紅滑潤矣第元境旁議翌日復診果
如所言蓋症有真假憑諸脉有真假憑諸舌如係
寔症則脉必洪大踈疾而重按愈有力如係實火則
舌必乾燥焦黃而飲束且堅卓豈有重按全無滿舌
俱胖尚得謂之寔症也哉仍用原方減去參附一半
守服而痊

陸養愚治費而村患時疫頭疼身熱口渴氣喘下午熱潮更甚或以膏香正氣散投之煩發更加舌心焦黑詎語發斑人与柴苓湯更加嘔噦且自汗不止脉之浮數而微曰此少陽之明合病之虛熱也用白朮湯加入參黃芪葛根柴胡灯心竹叶煎減十分之七汗亦少止後以人參麥冬五味黃芩山芩甘草二劑斑亦退

陳好古患兩太陽疼左脇作疼口渴大便瀉水小便短赤面色如塵脉之滑大而數右關為甚時春未夏初曰此疫症也陳忽溫病之名

此等入世上不少薛區者亦宜知之

去或以胃苓湯投之煩渴異常言語錯亂再求診脉仍前症似危急然細參症候不過熱菴之極故煩亂沈昏耳其瀉者因表氣未舒故裡氣不固也用白虎合解飢湯四劑全安

丁程川之寵患疫而死半月后丁自病頭痛身熱口渴煩躁或与小柴胡湯忽夜夢与亡寵交接驚寤而精已洩汗出如雨不能轉側神昏詘語匪陸診之其脉沈微如絲面色如泥四肢厥冷幸未過肘膝而陽事尚自尅然令剪其亡寵田褲襠燒灰以附子理中湯調灌之而劑神清陽亦收斂后以人參麥冬五味白

与黄連枣仁知柏而安

陸肖愚治沈屠四月間患疫其妻以勞亦相傳染月餘而身熱詁語不減困極待尽其鄰邵南橋年高好善常令小奚以飲飼其夫且飲皆為此媼具棺歛陸遠見之請診見面赤唇黑氣促厥冷身熱如火其脉浮之數大而散沈之細澁而微乃謂邵曰若以殯歛之資半易人參此媼尚可生也即以白席合生脉二劑与之屈服後八事損爽熱已減半手足溫和再診脉少斂有神以前方加白与人參止用二錢与四劑十日後其夫卧床未起而此媼已能行走矣

此案似赤水玄珠亦

有

柴岫青治吳氏媼患病家人謂因怒而致醫遂用沈香烏藪代赭等藥兼用表劑二十餘日胸膈脹悶壯熱不休脉之左手少平右三部洪數此疫疰邪熱入腑表散徒傷衛氣病亦不解乃連進瓜蒂散二劑吐去涎痰察其未衰又与小承氣二劑下宿垢數行而熱退調治二十日始平

繆仲淳治史鶴亭太史丁亥春患瘟疫頭疼身熱口渴吐白沫胃熱日夜不休醫誤謂太史初罷官歸妄投解鬱行氣藥不効又与四物湯益甚諸醫辭去謂其必

死迎繆至病二十餘日矣家人具以前方告繆曰誤矣瘟疫者四時不正傷寒之謂發于春故謂之瘟疫不解又不行使邪熱留腸胃間幸元氣未盡故不死亟索豆豉約二合許炒香麥冬一兩許知母數錢石羔兩許一剖大汗而解時大便尚未通史問故曰昨汗如雨邪盡矣第久病津液未回故大便不通此腸胃燥非有邪也今可食甘蔗二三株兼多飲麥冬湯不三日去燥矣甚多而痊

張鳳達萬曆丁未三月間寓京師吏部劉蒲亭病劇求治已脩後事詰語抹衣不寐者七八日矣御醫院吳思泉名醫也偕數醫治之張診脈只關脈洪大其餘皆伏乃書方竹叶石羔湯咸驚曰吳等已煎附子理中湯何冰炭如是張詰之吳曰陽症陰脈故用附子張曰兩關洪大此陽脈也其餘絳為火所伏非陰脈也一劑詰語抹衣即止就寐片時再脈之洪者卒而伏者起矣又用辛涼藥調安

元時江西泰和縣疫症大作有医者視病中夜而歸忽遇神人騎馬導後而來医知非人拜伏于地神至前此曰汝何人也答曰某医人也神曰汝今医病用何药答云随病冷热轻重用药治之神曰不然天一類

用香蘇散好。臣如其言。試之皆効。香附炒去皮。紫蘇各四兩。陳皮。甘艸各一錢。右為粗末。每服三錢。水一盞。煎七分。去渣。熱服。不拘時日。三服。戒葷腥酒肉。無不應妙。

人記云。昔城中大疫。有白髮老人。教一富家人。令香蘇散。施城中病者。皆効。其後疫鬼作人。問其家人。家富人。以寔告鬼。相顧曰。此老教三人矣。遂稽顙而退。則皆萬家之保命歌括。

醫者喬姓。奉呂仙甚虔。一夕夢呂告之曰。水之浮萍。甚能愈疾。幸多貯之。喬乃收積至十車。是冬大疫。喬藥

中每加萍一撮。無不立愈。其門如市。遂獲重利。他醫初之。都不驗。雲間雜志無名氏

薛立齋云。甲申年。一男子時疫發。厥以為陰症。服姜桂藥一盞。發狂。溺水死。外科心法

羅謙甫云。提帥相公。年近七旬。戊午秋。南巡之揚州。停虜萬餘口。內選美色。室女。近筭者。四置于左右。予因曰。提帥領十萬餘衆。深入敵境。非細務也。况年高氣弱。凡事宜慎。且新虜之人。其驚憂之氣。蓄于內。加以飲食不節。多致疾病。近之則和氣相傳。其害力大。提帥笑而不答。其副帥時亦在座。異日名予曰。我自十

三歲後征回鶻此事飽經汝之言深可信矣至臘月中班師值大雪三日新掠人不禁凍餒皆病頭疼咳嗽自利腹滿多致死亡者春正月至即隨路多以禮物來賀相公因痛飲數杯遂病脉得沈細而弦三四動而一止其症頭痛咳嗽腹痛自利与新虜人病無異其脉短澁其氣已衰病已深矣三日而卒和氣害人其禍如此內經云乘年之虛遇月之空失時之和因而感邪其氣至骨又曰避邪如避矢石錢仲陽亦曰冀履不可近襁褓嬰兒多生天吊驚風亦由正氣弱不能勝邪也聖人之言信不誣矣

錢國寶治管船王元暴病頭疼身熱倦卧懶動不惡寒止畏扱舌紅肌黃二便不利六脉浮洪視其症脉瘟病也用清涼發散之劑八日罔效再四審之心胸腹脇俱無他症口渴飲水欲向外卧令人移出解衣視其前後心間有黑點數十如疣蚤班知為羊毛瘟也用小針于黑處一挖即出羊毛一莖凡取數百莖乃少安日食西瓜而愈

吳橋治胡有濡壯年偶以訟繫士師歸數日而發熱患者以為疫火治之旬日而病益危橋診六脉隱見不常且全身紫斑發矣耳聾口噤目上視循衣摸床昏

醫絕食者五日語所親曰疫也即以寒水下辰砂六一散稍飲即少安尋授柴胡石膏犀角湯一再服而病去大半七日愈 太函集

疫

楊兆成母年六十餘病疫頭痛身熱嘔惡不眠時見其面赤又舌胎燥黑辭不治延余診投以白扁湯入生地杞子各一兩二劑嘔漸止舌胎忽尽退色如軋猪腰形如軋荔子捺之堅硬触手此津液枯竭不可為矣不得已改与犀角地黄湯加麦冬杞子生地一兩一劑熱少退頭疼亦漸已舌虽轉赤其軋如故再与大劑甘露飲去枳壳茵陳入杞子一兩三四劑舌乃見滋潤仍前方加減而安

一與人媼年近三十初夏患疫医与燄散消導十餘日

耳無聞目無見矣又經水暴至米粒不入臣禁与生
冷苦索李齊不得已枯悴如鬼且時：見鬼診之脉
如沸令啗升水一甌置其前病者即大悦有笑容急
持欲呷其夫前奪之戒勿尔已一飲而尽乃曰目前
亮矣犹持甌苦乞令再与一甌飲如前則曰今日活
了也欲再得則戒勿与遂以甘露飲方合服四劑竟
霍然余治热症曾以水發汗止嘔退热止瀉茲特幸
其一耳

王治安年三十餘初夏病疫診之脉虛弦微數踈卧語
言無力腰痛面赤黑而黯足冷微嘔身無大热頭亦
不甚痛唯不欲食時忽煩躁自言未病時見疫氣甚
熾時：恐惧畏其傳染乃終不免察其脉症大有類
乎直中陰經与外間時行迥異意其必先犯房勞過
甚所染疫氣則輕腎虛故善恐也淫与甘露飲加杞
子投之次日復診則面色開爽矣改用左歸而愈

大頭疫

李東垣治一人病雷頭風症頭面疔瘡增寒發熱狀如
傷寒諸藥不効此病在三陽不可過用寒藥重剗誅
伐太過因以清震湯治之而痊用荷叶一枝升麻五
錢蒼朮五錢小煎濕服蓋震為雷而荷叶之形象震
体其色入青乃涉類象形之義也

孫文坦治張孝廉患大頭疫頭大如斗不見形唇垂及
乳色如紫肝昏惜不知人事見者駭走脉之浮弦而
數初以柴胡一兩黃芩元參各三錢薄荷連翹葛根
各二錢甘艸一錢服三劑寒熱退弦脉減但洪大改

以貫仲一兩葛根天花粉各三錢甘艸一錢黑豆四
十九粒甘艸黑豆二味治疫古方也一劑腫消其半再劑全消再
与小柴胡兩劑始進粥向安

金谿令太夫人八十誕辰過勞且多食魚腥蝦蟇陽明熱

之端偶發寒熱少陽三日不退至四日左耳前後少陽及類

車皆紅腫陽明五日右邊亦腫六日腫及滿頭紅大如

斗眼合無縫昏憤不知人事詰語若有邪祟粒米不

進者八日陽明熱壅徐診之六部皆洪大而長曰此大頭

疫也即以貫仲石羔各六錢柴胡葛根各三錢赤芍

花粉各二錢甘艸一錢黑豆四十九粒日進二帖脉

始減半九日方進粥飲半杯前藥除石羔又兩劑而

痊是症乃陽明少陽二經熱壅而然夫陽明多氣多

血之經也宜可下以高年故不用硝黃惟投輕清解

散之劑使汗而解

柴崎青治妹婿張道淵忽增寒壯熱狀如傷寒頭面俱

生疙瘩腫痛異常頗以黃連石羔茅苦寒之劑清火

而病不衰來問柴曰此雷頭風症也東垣言其病

在三陽不可過服寒涼重劑誅伐太過投以清震湯

二劑愈

龔子才曰萬歷丙戌春寓大梁屬溫熱大作問卷傳染

甚至滅門其症頭疼身痛增寒壯熱頭面頸項赤腫
咽喉腫疼昏憤此乃冬應寒而反熱人受不正之氣
至春發為此症至夏發為熱病名曰大頭瘟大熱之
症也余製一方名二聖排苦丸用阜牙以開闔竅而
發熱表大黃以瀉諸火而通其裡一服即汗一汗即
愈真仙方也全活不可勝數稟厚者百無一失其虛
弱者只與人參敗毒散輕者亦愈如未愈用牛蒡子
連湯可收全功

前方因妙合而
治法始為十全

姚允吉云今年瘟疫氣多腫頭面頸治用金銀花二兩
濃煎飲之立消 續金陵瑣事

錢國賓治益商黃近州癸丑夏得頭痛身熱症臥床二
十餘日吐痰火感其頭漸大如斗諸藥無効昏沈不
省人事延診乃霹靂之脈寸關俱盛尺少沈數大便
不解風熱上壅之症有失升清降濁三陽經脈壅塞
危已至此非灶底抽薪之法莫排也欲用三黃湯加
大黃四兩下之奉家与同道未允欲辭去其子苦留
肯用半劑以權宜就被日服二次至三更下積矢升
許其脈少平入以前藥再催下粟糞十餘粒腫漸消
而調安



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



續名醫類案卷四

錢唐魏之珩玉璜輯 男斌編次

中寒

萬密齋治一婦人病至十三日其家人求求為告以病
 狀初若頭痛到今日昏睡不醒喉中痰响手足俱
 冷其身僵直萬思之時辛酉二月朔後平地雪尺餘
 此婦元氣素弱必因遠行而得 三陰麻從腹下是也 問之果
 于初三日冒雪往親戚家歸即病也曰此寒邪中足
 少陰厥陰二經也然喜睡者是少陰腎病也頭若
 痛厥逆僵直痰响者是厥陰肝病也乃以十全大補

湯去地黃白芍加細辛半夏乾姜與三劑去五日來
謝曰病安矣

吳孚先治一人傷寒頭痛不發熱乾嘔吐沫醫用川芎
藜蘆不應吳曰此厥陰中寒之症乾嘔吐沫厥陰之
寒上干于胃也頭痛者厥陰與督脈會于顛寒氣逆
經脈上攻也用人參太棗益脾以防木艸吳茱萸生
姜入厥陰以散寒邪且又止嘔之止而頭痛自除設
頭疼人屬太陰而非厥陰矣設頭疼向費解且太陰
元頭痛直中病但有
少陰症
及發熱

一人患厥陰直中四肢厥冷脈細欲絕爪甲青紫但不

吐利與四逆湯至三日肢暖甲紅發熱脈形定數有
力此陰極陽生也便與涼劑病家疑一日寒溫有異
不宜服至九日熱不退熱利下重飲水不輟再求診
用白頭翁 黃連黃柏各二錢一帖減二帖痊真
症斷元飲水
下痢之變

按肢冷脈伏恐是陽厥至爪甲青紫烟是欲戰汗
也四逆湯之誤特隱而不彰耳余有凌二官案可
參

吳孚先治汪掖蒼甘怒心腹奇疼異常左右脈弦緊用
二陳去甘艸加肉桂乾姜木香病不減次日寒熱交

作往來如瘧熱已復寒已復熱日夜無度脈更疾
數前方加人參五錢附子二錢不應復增參至一兩
附至五錢服反漸脫吳謂少陰中寒當以參附今不
効畢竟病深藥淺故時有醫者四人一欲用枳實貝
母一欲用全蝎防風一欲用八味丸一欲用人參黃
芪各八分肉桂四分附子三分吳曰業已泄瀉反用
枳實虛極汗多反用全蝎此二人全不知病八味丸
係調理之藥尚在未著參芪桂附庶几合症但杯水
車薪曷克有濟夫用藥如用兵衝堅搥厚非猛士多
不可李信之敗可監也用芪四兩煎湯代水入參

四兩附二兩煎羔時病人面色如粒汗出如珠六脈
俱脫呼吸全無牙關緊閉幸太谿脈尚在乃以筋挾
齒齧灌半杯移時入進半杯犹防脈之暴出也既而
重按兩尺隱躍指端乃曰脈漸出大有起色矣復進
半杯自午至晚方眼開語出欲啜粥已而反畏寒喉
疼頰索冷水或疑是火曰畏寒者真情索冷者假象
少陰脈循喉嚨邪客其絡令人咽痛今寒邪由臟出
經病將退身仍前方加桔梗甘州而痛止自後每日
參必一兩附必三錢調理百日而愈 愈后遍体發
疹天生疣瘡奇痒异常抓搔不輟不寐汗多用六君

子另將黃芪二兩煎湯煮為十日不應汪檢準繩風
疹門與關俱係風為並無補方曰神而明之存乎其
人不可泥也守方而安

馬元儀治陸涪臣患疰甚篤診之兩脈虛微自汗厥逆
面青唇青饒逆不止曰此少陰真陽素虧寒邪直中
之候也陰寒橫熾上千清道旁逆四支甚危厲魚
以自汗不止虛陽將脫法當用桂附理中湯以消陰
攝陽：既安位則群陰畢散矣是夜連進二劑脈漸
起汗漸收五六劑愈

吳洋治結林潘氏子始強早起有事牖下尋病作頭痛

惡寒諸飲食自昂沸中致半之不尽三之一其一以
為寒矣即他人嘗之莫不糜爛彼口舌自如當暑重
裘犹以為薄眾醫累治不効乃速洋之曰病由下虛
故寒氣深入固結不散法當不治即幸而可治不出
三年尋以溫補劑愈之參附必倍他為其後復病而
卒終三年 八函集

中風

黃帝問岐伯曰中風半身不遂如何灸荅曰凡人未中
風一兩月前或三五日前非時足胫上忽痠重頭痺
此將中風之候急灸三里絕骨四處三壯后用薄荷
蔥搥柳叶煎湯淋洗驅逐風氣于瘡中口出灸瘡春
較秋灸秋較春灸常令兩脚有瘡為妙凡人不信此
法飲食不節酒色過度忽中此風言語蹇澁半身不
遂宜七處下火各三壯風在左灸右在右灸左百會
耳前髮際肩井風市三里絕骨曲池七穴神効不能
共錄依法灸之無有不痊

醫說續編

徐子中風不省得桃源主簿灸臍中百壯即神關穴
灸先以始蘇更數月乃不起鄭糾云有一親表中風
醫者灸五百壯而蘇後年餘八十使徐子灸三五
百壯安知其不永年耶

許叔微云范子默自壬子五月間口眼喎邪灸聽會等
三穴即止右手足麻無力灸百會髮際等七穴安次
年八月間氣塞涎上不能語金虎丹臍粉服至四九
半氣不通涎不下葯從鼻中出魂魄飛揚如墜江湖
中頃欲絕灸百會風池等左右頰車共十二穴氣遂
通吐涎儿一碗許經又下十餘行伏枕半月餘遂卒

尔後人竟意思少異于常心中憤亂即使灸百會風
池等穴立効 本事方云十二穴謂聽會頰車地倉
百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也
用之大効全上

鄉里有八忽竟心腹中熱甚急投葯舖說其狀舖家以
為此中風之候与治風葯而風不作子心中藏之至
夷陵見一太守夏中忽患熱甚不免以水洒地設簟
卧其上令人扇之次日忽中風數日而殂人皆咎其
卧水簟上而用扇也后到豐陽見一老婦人夏中亦
患熱夜出卧廳上次日中風偶其子預合得小續命

湯服之名醫調理而愈始知中風必腹中多熱之故
小續命湯不可不服也 以上資生經

岳鄂鄭中丞頃年至穎陽因食一頓熟肉便中暴風外
甥盧氏方穎陽尉有此方當時便服得汗隨安神効
其方用紫細牛蒡根取時須避風以竹刀或剗刀刮
去土用生布拭淨搗絞取汁一大升和灼熱好蜜四
大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗立出
立痊 本州 全上

新武義唐丞李潤名灌云切記風中人不可便服風藥
氣中人不可便服氣藥或竟有此症候急用真好射

香肉三錢乳鉢內研令極細以真清麻油不拘多少
調令稀薄可飲為度即令患人一服頓盡須辨菜子
油不可用為少即見効遲如牙關緊撮開灌入候少
甦者然後服此湯其方用川獨活刷洗去沙土薄片
切以豆淋酒煎濃汁服之累服至一二斤無害服此
二藥永無手足偏廢語言蹇澁之患後見得是中風
只服小續命湯之類見得是中氣只須服勻氣散自
然無事也渠作漢東教官得之太守張守衛云歷試
有驗季潤亦以治數人矣云麻油射香煎五積散 是

羅謙夫曰按察書吏李仲寬年逾五旬至元己巳春患
風症半身不遂四肢麻木言語蹇澁精神昏困一及
處一法用大黃半斤黑豆三升水一斗同煮豆熟去
大豆黃新汲水淘淨黑豆每日服二三合則風熱自
去服之過半又一友云通聖散四物湯黃連解毒湯
相合服之其効尤速服月餘精神益困又加音啞不
能言氣冷手足寒命予診視細詢前由尽得其說診
之六脉如蛛絲細謂之曰夫病有表裡虛實寒熱不
等藥有君臣佐使大小奇偶之制君所服藥無考憑
故病更甚今為不揀君自取耳未几而死有曹通用

外郎妻蕭氏六旬有餘孤寒無依春月忽患風疾半
身不遂語言蹇澁精神昏瞶口眼喎邪与李仲寬症
同予刺十二經丹穴接其經絡不通又灸肩井曲池
詳病時月處藥服之減半予曰不須服藥病將自己
明年春張子敬即中家見其行步如故子歎曰夫人
病得全者不乱服藥之力由此論之李仲寬亂服藥
終身不挂蕭氏自困恬淡自如復安內經曰用藥无
據反為氣賊聖人戒之一日姚雪齋許先生魯齋
之言曰富貴人有三事反不如貧賤人有過惡不能
醫救有疾病不能醫治其李氏之謂歟

陳自明治一婦人中風牙關緊急痰涎溢出口神仙太
乙丹一粒服愈方見靈門

宋時東京開河掘得石碑梵書大象一詩無能曉者真
八林靈素遂穿辨絳乃是治中風方名去風丹也詩
云天生豐艸無根幹不在山間不在岸始因飛絮蓬
東風汎板青飄水而神仙一味去沉疴宋時瀕在
七月半遠甚癱風與大風些小微風都不美豆淋酒
化服三丸鉄鑊頭也出汗其法以紫色浮萍晒乾
力細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下
治左癱右瘓三十種風偏正頭風口眼喎邪大風

紫之衣兮錦之玉之帶兮卷之中之藏兮困之
外之澤兮日之宣於乎磨尔心之堅兮壽吾文之
傳兮

右錄文信國玉帶生銘

凡今亦用之何也張曰此收後之蒸也今人并之于
勢甚之時正犹蚍蜉撼大樹也

頤長火病口眼喎邪張摩之日之邪矣以承泣口之喎
矣以地倉供効苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而
為偏正不得出下不得泄真氣為風邪所陷故宜灸

陳自明治一婦人中風牙關緊急痰涎溢出與神仙太
乙丹一粒服愈方見靈門

宋時東京開河掘得石碑梵書大篆一詩無能曉者真
八林靈素遂字辨絳乃是治中風方名去風丹也詩
云天生豐艸無根幹不在山間不在岸始因飛絮遂
東風汎梗青々飄水面神仙一味去沉疴采時須在
七月半選甚癱風與大風些小微風都不美豆淋酒
化服三凡鉄鑊頭上也出汗其法以紫色浮萍晒乾
為細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下
治左癱右瘓三十六種風漏正頭風口眼喎邪大風

癱風一切無名風及脚氣并打扑傷折及胎孕有傷
服過百粒即為全人此方後人易名紫萍一粒丹此

希愈凡相類亦惟宜症
可用也 今叶經日

張子和治高許事忽中風稍緩張令涌之后服鉄彈丸
五普濟加減方中或問張曰君常設人中風服鉄彈
丸今亦用之何也張曰此以後之藥也今人用之于
勢甚之時正犹蚍蜉撼大樹也

顏長史病口眼喎邪張療之目之邪灸以承泣口之喎
灸以地倉供効苟不効者當灸人迎夫氣虛風入而
為偏上不得出下不得泄真氣為風邪所陷故宜灸

內經曰陷下則灸之正謂此也所以立愈又東祀一夫亦患此脉其兩手急數如絃之張甚力而寔其人齒壯氣充與長史不同蓋風火交勝乃調承氣湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五行去一兩益次解毒數服升降水火旬日而愈

王克明治盧守王安道中風喑不語他匠望而去克明曰此非湯劑可及燒地洒藥昇安道于上瀆史而甦

江西通志

李東垣治董監軍寒月忽竟有風氣暴仆診得六脉俱

弦甚按之洪寔有力其症手掣急大便閉澀而赤熱此風寒始至加于身也四肢者脾也風寒之邪傷之則筋掣卒人素嗜酒內有寔熱乘于腸胃之間故大便閉澀而面赤熱內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘艸以却寒邪而緩其急搖黃柏之苦寒以瀉寔而潤燥急球腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明經不令道絕更以桂枝辛熱入手陽明經為引用潤燥後以白芍甘艸高補脾氣使不受風寒之邪而退木邪高益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加歸身去裡急而和血潤燥名

活血通經湯惟桂柏二錢白芍五分餘皆一分水煎
熱服令房中近火摩搓其手乃愈

宋瑞州楊某医道大行招者相繼郡守得危度夜急招
之楊造醉歸不能升車裝藥授价旦起盥面不見澡
豆而所裝藥在烏方知其誤而郡守謝礼至矣蓋郡
守得卒臥症澡豆中有皂角故也 聖設

荆和王妃刘氏年七十病中風不省人事牙關緊閉群
医束手李時珍尊人大医吏日月池翁診視藥不能
入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜芦湯灌之少
頃噫氣一声吐痰而甦 卒叶經目

龔子才治桑環川刘前溪年俱近五旬而桑多慾刘嗜
酒其脉左手俱微入迎甚右脉滑大時常手足痠麻
肌肉蠕動此氣血虛而風痰感也謂三年內俱有癱
瘓之患因勸其服藥謹慎以時未然桑然其言每年
製披風順氣丸 此丸亦未可常服 延齡固本丹各一料后果
無恙刘不信縱飲無忌未及三年果中風卒倒癱瘓
語清因求治与養榮湯加減并健步帛潛凡煎服年
餘而安

萬密齋治蕭敬吾庚戌冬得風疾医治之未及辛亥春
右肩膊抽掣手唇吻隨動診之脉浮緩而澁此風邪在

太陰經也右寸浮而清肩膊動者肺病也手大右關

脈緩唇動者脾藥也是陰大以黃芪蜜炙白芍酒炒甘

艸灸作大劑服之問何以不用治痰之藥曰此緩則

治本也蓋風傷衛肺者衛氣之生也黃芪之甘溫以

補肺白芍味酸曲直作酸者甲也甘艸味甘稼穡

作甘者已也所以補脾經白諸風振掉皆屬于肝

肝苦急食甘以緩之用甘艸肝欲收酸以收之用

白芍乃守法調安

孫文垣治吳勉齋體豐腹嗜炮灸任性縱欲年六十七

極躁急一日跌傷齒恬不為意後連跌兩次將中而

也次日晚左手足忽不能動口眼喎邪診之左洪大

右緩大其色蒼黑神昏鼻呼長而吸短呼至口氣

嘔出不能回終日僵卧如醉人問曰此非半身不

遂乎曰症甚惡不特此也半身不遂者中風已過之

疾甚勢仍緩亦有十餘年無恙者今方病勢便若此

乃中風且不可測与六君子加全蝎天麻兩日無進

退間作吐前藥再加竹茹兩日神始甦欲言舌不能

掉前藥如石菖蒲遠志紅花始能進粥數日夜与正

舌散同前藥飲之又三日能坐粥亦頗加言尚蹇澁

以筆書我左手痛甚大小便艱少又用四君子加陳

皮竹茹當歸白芍紅花鉤藤天麻服三日神思大好
飲食且加服彌月手疼減語言亦少清唯大便十日
一行此血少故補養久日當痊病人嘗自言吾疾乃
疫在膈間安得一吐為快蓋肝腎之氣上浮病者不
知誤發為疫不能用峻劑
養陰即龍雷之火下
歸元海區之過也 孫曰據脈乃大虛非疫為害不
可輕吐有醫謂是病疫吐而后補可全痊不然必成
痼疾病人欲速効決意吐之家人不能阻一吐而煩
躁犹曰吐不快耳瀉大吐始可再吐而神昏氣促汗
出如雨而卒

程曉山客湖州四十誕辰徵妓行酒宴樂彌月一日忽

竟兩小指及無名指擗硬不舒且不為用口角一
常牽引診之六脈皆滑大而數浮而不斂其俸肥而
色蒼紫據脈滑大為疫數為熱浮為風蓋濕生疫之
生熱之生風也以善飲故多濕近女故真陰竭中風
之症已兆喜面色蒼紫神藏犹可活宜戒酒色以自
保護以二陳湯加滑石為君苓連為臣健脾消疫撤
無從小便出加胆星天麻以定風竹瀝姜汁拌晒仍
以竹瀝姜汁打糊為丸引諸為入經絡化疫又以天
麻丸滋補筋骨標本而治服二料遂十年無恙至五
十妓飲如舊酒色荒淫忘其昔之致疾也于是手指

口角掉硬牽引尤甚未几中風右体癱瘓矣歸而召
診脉皆洪大不斂汗多不収呼吸氣短蓋自虛不能
納氣歸原故汗出如油喘而不休虽盧扁無能為矣
閱二十日卒

李士材治一商人忽然昏仆遺尿手撒汗出如珠或謂
絕症既見决無生理李曰手撒脾絕道尿管絕法在
不治惟大進參附或真萬一遂以人參三兩熟附五
錢煎濃灌下至晚而汗減復煎人參二兩芪木附各
五錢是夜服尽身体稍能動再以參附羔加姜汁
竹瀝杯許連進三日神氣漸清復以理中補中等藥
調二百日而安

唐太守多苑多思人為府事勞神昏冒痰壅口喎語塞
四肢不隨時欲悲泣脉大而軟此脾肺氣虛風在經
絡以補中益氣去黃芪如秦艽防風天麻半夏十劑
症減二三更加竹瀝姜汁倍用人參煎与八味兩月
乃愈

一人自遠方歸忽然中風昏冒牙關緊閉先以牙皂末
取嚏次以筋快開灌蘇合丸一丸然后以防風散投
之連進三服出汗如洗此邪自外解矣去麻黃独活
羚羊角加秦艽半夏胆星鉤藤姜汁小劑度消神爽

服六君加竹瀝姜汁勾鉤調安

她太史中風昏愒語言不出面赤時笑非腎絕是心臟而笑

中風也時初秋診之六部皆得石脈李曰石者冬令之脈也新秋見之非其時矣其象先見于非時當其時豈能再見耶果至冬而卒

一八年近六旬昏倦不能言鼻塞二便閉此心肺二臟中風也服順氣疎風化痰之劑已瀕于危矣診之六脈洪大按之搏指乃至虛及有盛候也宜補中為主佐以祛風化痰方可回生病家惶惧兩日不決乃力任之遂以大劑補中益氣加秦艽勾藤防風竹瀝再

剖全愈 李共五案

黃履素曰余從弟履中年方強任以勞心憂菀忽然昏愒痰升遺尿眼斜視逾時不醒竟類中風灌以童便而甦此等症候皆大塊痰而作又非三生飲可活者并姜湯亦不相宜也 此与江遷薛立盤治王進士案同參

趙以德治陳孝士敬初因醜事跪拜間就仆倒注注如雨診之脈大而空虛年當五十新要少煩令人拜跪致勞故陽氣暴散急煎獨參湯連飲半日而汗止神氣少定手足俱癢瘡而無聲遂于獨參湯中加竹瀝開上涌之痰次早悲哭一日不止因以言慰之遂笑

復笑五七日無已時此哭笑為陰陰下疑有脫字動其精神
魂魄之藏相併故耳正內經所謂五精相併者心火
併于肺則喜肺火併于肝則悲是也少加連柏之類
瀉其火而安

陸養愚治吳少參年五十新得美寵榮歸祭祖跪拜間
忽倒仆汗注如雨渾身壯熱人事不省或欲灌以牛
黃脈之關尺浮數而空兩寸透入無際此陰虛甚而
陽亢極也若灌牛黃必死矣急用生地自然汁一升
人參一兩麥冬五錢五味子百粒濃煎灌之二三服
神氣少定汗止似睡非睡至五更時作恐懼狀如人

將捕之至清晨又作盛怒狀罵詈不止至午間又大
笑一二時至日莫又悲泣自此夜靜日作病家以為

鬼祟此即內經所謂五精相併也并于腎則恐并于

肝則怒并于心則喜并于肺則悲此与趙以德治陳
季士一案大同小

并奇劉河間云平時將息失宜腎水不足心火亢極乃

顯此症夜間陰盛邪乃暫息日中陽隆遂遊行五臟
而無定時也仍用此方減人參之半旬日間或但悲
笑或但悲哭罵詈恐懼人事時省時不省飲食与之
盡食方止不與不思索大小便亦通至半月后始安
調治百日全愈

長興林中尊年已五旬初竟身倦怠頭目眩暈既而
頰振動搖欲語不能喉中喘逆咸與牛黃蘊合丸及
小續命湯已旬日病如故脉之沈緩而弱左關尺尤
甚此肝腎虛精氣蒸奪之候也詢其由乃由按院嚴
厲惟恐失錯煩勞之極歸而病作內經云諸風掉眩
皆屬于肝劉河間曰此非外來風邪由將息失宜腎
水不足心火亢甚所致又經云諸逆沖上皆屬于火
今振動喘逆職是故也夫恐傷腎今以矜持太過而
氣下故声不出且肝腎之脉俱挾舌本故宜壯二經
之氣以治其標滋二經之血以治其本用枸杞為君

以補腎天麻川芎為臣以益肝又用人參少加附子
以為佐二冬以為使二劑諸症頓減用八味丸間服
而愈

鄒春元心泉年未及五旬患中風耳聾鼻塞二便不通
四肢不隨而厥語言不出或言皆說亡故之人已灌
牛黃錢許矣或曰經云脫陽者見鬼脫陰者目盲今
口說亡人目無所見是見鬼與目盲也又潔古云中
膈者著四肢中臟者滯九竅今手足不隨上下秘塞
是藏府蕪中也且六脉弦數無倫脉訣云中風之脉
遲浮吉急寔大數三魂孤脉症俱危恐無生理立方

人參五錢熟地一兩桂附各二錢半未服陸至脈之
浮按果極急數中按少寬和緩此犹有胃氣第兩尺
重按竟空耳乃曰陰陽兼補誠治本之法第當上下
秘塞之時恐不能奏效宜先通二便便通陰降則清
陽之氣得以上升然後議補經謂病發而不足本而
標之无治其標後治其本咸謂病勢已危急恐不可
迂緩遂將前藥灌之連進數劑俱停胸中揉之作声
而不下腹再促診脈仍前即袖中出家製神佑丸數
十粒挾其口納之令灌以沒姜湯藥已下即為灸百
會穴使陽氣上升又灸關元穴不使陽氣下陷一二

壯日即能開眉頻蹙問痛否能點頭四肢亦少動謂
之曰忍至七壯可生矣亦點頭矣將畢腹鳴欲便既
而前後俱通去垢穢極多少頃又瀉一行令急以前
藥倍人參煎候及再便有軍意徐灌之自甦此后人
事漸省第手足振掉左半身不遂于大補氣血藥中
少佐却風順氣消痰之品調治年餘而愈蓋此症初
起氣血不足為本凡竅閉塞為標先通其秘者急則
治其標也迨后見風症亦不足為本風症為標而高
補氣血少佐風藥者緩則治其本也

范溪菴患口喘不正四肢拘急自汗惡風凡針灸塗貼

諸風藥遍嘗不効已半年脉之左手浮緊右手洪緩
此風客陽明留而不去虽宜解散然邪在一經襟進
諸經之藥誅伐無過後虛其表而不能去邪故反見
惡風自汗而無核于口之喘也經曰胃足陽明之脉
挾口環唇所生病者口喘唇邪是乃陽明一經之症
麻桂羌活豈所宜哉以葛根五錢升麻二錢以逐陽
明固結之邪白芷二錢僵蚕一錢五分以達頭面不
正之氣黃芪一錢五分桂枝五分以固周身疎泄之
表桔梗一錢甘艸五分載諸藥上行二劑便効數劑
全愈后以養榮血寔勝理少佐清熱去痰之品調理

之許叔微
紫台參

李思唐母年六旬倅肥盛正月間忽中風卒倒不省人
事口噤喉鳴手足不隨服牛黃小續命不効脉之浮
洪而滑右手尤甚緣奉養太厚形氣盛而脉有餘經
云凡消痺擊扑偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則羔梁
之疾也又云土太過令人四肢不举丹溪所謂濕生
痰熱生風也当先用子和法涌瀉之乃以稀涎
散薑汁調灌之去痰涎數升少頃又以三化湯灌之
至晚瀉兩三行喉聲頓息口亦能言但人事不甚省
知上下之障塞已通中宮之積滯未去也用二陳湯

加枳寔黃連萊菔子木香白豆仁每日二服數日人事漸清腹中知飢令進稀粥大便秘結每日以潤字丸五分白湯點姜汁送下犹時有拘攣燥結之患知為血耗津衰用四物加奈朮黃芩甘草數十帖三月而愈

陸祖愚治趙一陽年過五旬中風卒倒牙關緊閉兩眼上竄手握而四肢振掉或以稀涎散吹入鼻中吐稠痰數椀投小續命湯二劑反口開足冷眼合尿溺四肢厥逆人事昏沈喉鳴發熱脈之洪滑而歇至症已危甚勉立方用二陳加南星枳寔以導其痰四物以

養其血佐以牙皂姜汗竹瀝人事已清改以參朮歸芍而安

李翠岩年近六旬肥盛多勞一日行至門外視一人如兩人一路如雨路一門如雨門不知從何處入遂卒然仆倒扶歸嬾于言語尚能道其病狀咸以中風治之投消痰搜風十餘劑遂冷汗如雨驚惕振掉昏不知人脈左寸浮大按之無神餘俱遲弱而空已神志昏沉不能言矣此屬虛脫宜培補正氣為主用四君加芪歸地芍天麻杜仲牛膝杏仁二劑汗止五劑能言語識人七八劑頓愈每劑加入參三錢二十餘劑

全安

馬元儀治周某神昏不語狀如中風已半月脉之右虛微無力乃陽虛之候也胸中時滿或氣立加呆上焦之陽不用矣足膝無力轉側不能下焦之陽不用矣諸陽既微陰乃用事不行溫補陰日以長陽日以消一如氣化有肅殺而無陽和物其能久乎遂与附桂理中湯大培陽氣半月而神始清便乃行一月而食進可步煎服八味丸而安

馮楚瞻治張銓部先年以焦勞遂得怔忡耳鳴諸症醫以疫治涌出疫涎斗許復用滾疫凡疫勢雖清精神

內奪初秋卒倒僵仆疫涌麴麯目直口開手足強直自汗如雨危甚脉之六部皆豁大無倫其候欲脫則不容緩矣乃用人參三兩白朮二兩附子五錢濃煎灌之日三劑按時而進服后脉勢少斂身熱亦和清汗亦收次日仍用前方日二服夜一服至三日諸症乃減但僵仆不省如故此工夫未到故標症稍予而元神未復也仍照前服之後必灌陳米汁半杯以保胃氣助藥力或有勸入瓜蒌者曰保之不暇敢散之乎有勸加疫藥者曰補之難寔敢消之乎有勸入清火者曰此尤誤矣元陽欲脫挽之尤恐不虞敢散之

乎今重用人參附子者既壯人參培元之功而消痰去風息火之義已在其中矣若稍涉標治則虛症蜂起勢難益矣違衆勿用三日所用人參計三十五兩附子六兩白朮二十四兩至晚間忽能言語少省人事進粥半碗而睡其麴黷目竄諸症仍在早間陽分用大補心脾氣血之藥如參仁當歸白朮芍藥神遠志人參桂員五味之類下午陰分用八味湯沖入參濃汁服之六七日後諸症漸平每日人參尚用四五兩后早間以生脈飲送八味丸之加牛膝杜仲鹿茸五味子者四五錢日中加減歸脾與八味湯飲食

倍進一月而起大凡治症危候全在根本調理得力自然即無容地先哲云識得標另取本治十人無一損也

与李士才治商人案全

譚掌科年六十餘卒然暈仆痰涎涌盛不省人事頃之吐痰枕許少甦長班用力擁之輿中挾其兩腿而歸醫與疎風清熱豁痰旬餘痰勢不減煩燥倍常頭疼腿疼更甚脈之兩寸甚洪大兩尺石閉甚沈微此孤陽獨亢于上弱陰不能斂納且中宮脾土亦虛陽在還藏之舍上浮顛頂力脹為疼宜壯水以制之培土以藏之補火以導之佐以滋肺清金以成秋降之令

則收歛蟄藏矣熟地八錢為君乳炒白朮五錢為臣
米炒麥冬三錢為佐製附子一錢半為使煎成另用
人參五錢熬汁沖服頭疼頓減諸症少痊但腿疼如
故蓋長班用力挾之而傷也視之五疳之痕在焉此
外因當外治用猪肘生精肉搗爛入肉桂細辛末葱
白食鹽和勻厚攤患處而安后因素患晨邁飲食不
甘令早晨空心參湯送八味丸午間食前以炒黃白
朮三十兩製附子二兩共熬成羔人參細末六兩收
成細丸白湯吞三錢半月愈

景氏媼年近五旬中風已五六日汗出不止目直口噤

遺尿無度咸以為壞症脈之甚微而重按尚不疾
不徐自然之勢此即胃氣也乃曰遺尿本屬當下脫
症故不治若多日安得不尿且坐視數日而不脫斷
非絕症也投參附湯而甦重用溫補全安

金教諭夏月壯熱頭疼咳嗽醫謂感冒用羌前蘇橘半
枳之類未終劑頭疼如破舌強不清消汗黏于左臂
麻木神氣不堪脈洪大而空緩而無力知為氣虛類
中誤投發散當此疎泄之時几成脫症与孰也一兩
二錢麥冬三錢炒白朮四錢牛膝二錢四分五味子
八分製附子一錢五分人參八錢另煎沖服日一劑

不五日全安時有李庠生同日得病症候元异一副發散汗出而死

張路玉治春榜趙明遠卒時六脈微弱患中風經年不痊診之左手三部強大而堅知為腎藏陰傷壯火食氣之候且入迎斜內向寸入力三陽經滿溢入陽維之脉是不能無顛仆不仁之虞右手三部浮緩而氣口以上微滑乃痰涌于腦之象以清陽之位而為痰氣占据未免浸漬心主是以神識不潰語言錯悞也或者以其兼口角微涎目睛恒不易轉為邪在經絡用法風導痰之為不知此本腎氣不能上通于心虛

熱生風之症良非風燥藥所宜或者以其小便清利倍常力腎虛而用八味壯火之劑不知此症雖虛而虛陽伏于肝藏所以陽事易卒飲食易飢人非益火消陰藥所宜或者以其向患休息久痢大便後常有淡紅潰沫而用補中益氣不知脾氣陷于下焦者可用升舉之法此陰虛久痢之餘疾有何清氣在下可升發乎若用升柴升動肝腎虛陽鼓擊膈上痰飲能保其不為喘脹逆滿之患乎今与河間也黃飲子助其腎通其心一卒而而得之但不能薄滋味遠房室則藥虽中病終無益予治療也惟智者以善調攝為

第一義

侍衛金漢光妻中風四肢不能辛勤喘鳴肩息声如曳
鋸不能著枕寢食俱廢半月餘脈之右手寸關數大
按久無力尺內尤虛左手關尺弦數按之漸小惟寸
口數盛或時昏眩煩乱所服皆二陳導痰瀉以秦艽
天麻之類不應入与牛黃凡痰涎愈逆殆甚因以六
君子或加胆星竹瀝或加黃連当歸甫四劑喘稍除
再二劑飲食可進稍能就枕入四劑手足運動十劑
可步

漢川令顧義生夫人高年氣虛痰盛近以抑菀忽然下
作墮床便舌強不語肢體不遂以是日曾食温面群
議消化不効更增困頓人事不省頭項腫脹診之六
脈皆虛濡無力臣抗謂大便六七日不通擬攻下張
曰脈無寔結何可妄攻且病人素有脾約大便常五
七日一行乃令先試糜飲以流動腸胃之樞机日進
六君子湯每服用人參二錢分二次服四劑后大便
自通再四劑自能起坐數日間可扶掖徐行因戒其
慎防步履以氣虛故也

呂東莊治沈凝芝內人時当就卧息作寒熱至夜半即
不能言喘急或以为感傷或以为寒熱氣逆痰結因

烏藥順氣散不効診之聲如曳鋸手撒遺尿口開不能言自汗如雨曰此類中風也已傷藏不可治矣凝芝曰即無球理應用何藥曰初發即當用易簡附子散今無及矣乃自進之喘聲忽止且稍發語疑尚可球曰五臟俱絕令得參附氣必甦耳終無及也果三日而歿

韓貽豐治司空徐元正風疰滿面浮虛口角流涎不已語不清不能出喉兩腿沈重足趑趄不克踰戶限脈之曰此疰非針不可遂呼燃燭牽手向項門欲用針徐公及其令孫皆大懼駭云此處安可用火攻強之

再三終不允而罷后聞韓之針頗神復邀與針百會神庭腎俞命門環跳風市三里涌泉諸穴道俱二十一針方針之初下也以為不知當作如何痛楚及藥蒸氣行氤氳不可名狀連聲贊歎以為美効積久周身之病一時擯去

神針心法

柴崎青治考功吳景星太翁卒中昏愒滿面油光兩關弦緊投以附子理中湯次日心中明白面上浮光即飲調數月安

大司徒阿年已七旬偶患胃疼延治至則其勢已減診其六脈平和兩尺神完氣足如此稟厚者不可多見

乃以曾經口眼歪邪至今面部微有不正為患日陽
臟之脉前因心火暴盛無制遂流經絡而然今惟有
壯水之主以鎮陽光當服丸劑可保期爾

薛立齋治靳閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗
如雨小便自遺大便不寔口緊目矇飲食頗進十餘
日或以為中藏甚憂曰非也若風既中藏真氣將脫
惡症已見禍在反掌要能延至十日乃候其色面目
俱赤而或青診其脉左三部洪數惟肝尤甚乃知胸
乳脹痛肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛
不能養筋也自汗不止肝經血熱津液妄泄也小便

自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不寔肝木熾甚尅
脾土也遂用犀角散回劑諸症頓愈又用加味道遙
散調理而安後因鬱怒前症復作煎發熱嘔吐飲食
少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加
味歸脾為主佐以逍遙散而愈後每遇怒或睡中搖
動前藥愈

大參米雲漢母于凡月內忽仆地痰眩不省人事唇口
喘邪左目緊小或用疫血之劑其勢少緩至次年四
月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病
乃大作小便自遺或謂風中于藏以為不治診之左

喘誤服寒劑而卒

一婦人因怒仆地語言蹇澀口眼喎邪四肢拘急汗出遺溺六脉洪大肝脉尤甚皆由肝火太甚蓋肝主小便因熱甚而自遺也經云肝虛者善溺用加味道遙散加鈎藤及六味凡愈亦可入厥門

一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血虛而肝火動用加味道遙散加丹皮治之尋愈後因飲食停滯口吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君子三十餘劑而安

一婦人因怒口眼喎邪痰涎上涌口噤發搐此脾肺氣

虛而肝木旺用六君子加木香鈎藤柴胡漸安又用加味歸脾全愈

一婦人元氣素虛勞則侷麻發熱痰氣上攻或用烏藥順氣散祛風化痰凡之類肢侷痰軟痰涎自出面色痿黃形侷倦怠而脾肺二脉虛甚此氣虛而類風朝用補中益氣湯夕用十全大補湯漸安又用加味歸脾湯調之

一婦人口眼歪斜四肢拘急痰涎不利而惡風寒其脉浮緊此風寒客于手足陽明二經先用省風湯二劑後用秦艽升麻而安

王海藏云某黃中門卒中風病發時服紫苑凡泄出惡膿及赤黃水各升餘一肉中如亂髮愈

方見癘風門

姚僧坦治大將軍樂平公竇集暴感風疾精神瞶亂無所覓知諸醫先視者皆云已不可拯僧坦後至曰用則用矣終當不死若嵩以見付相為治之其家忻然請受方術僧坦為合湯散所患即瘥大將軍水泄公此伏列椿若利積時而不廢朝謁燕公謹嘗問僧坦曰樂平水世俱有痼疾若水泄差輕對曰夫患有淺深時有尅殺樂平虽困終當保全水泄虽輕必不免世死謹曰君言必死當在何時對曰不出四月果如

其言謹歎異之周嘗

高祖親戎東計至河陰遇疾口不能言臉垂栗日不復
瞻視一足短縮人不得行僧坦以為諸藏俱病不可
並治軍口之要莫先于語乃處方進藥帝遂得言次
入治目之疾便愈未乃治足之疾亦好比至華州帝
已痊全上

李季虬曰子乙卯春正月三日忽患口角歪邪石目及
右耳根俱疼右頰浮腫仲淳曰此內熱生風及痰也
治痰先清火清火先養陰最忌燥劑蘊子橘紅天冬
花粉鮮沙參甘菊花各三錢貝母白芍各四錢麥冬

五錢甘州七分天麻一錢連翹二錢加竹瀝童便各
一杯霞天羔四五錢日服二劑初回至初九日加生
地初十加牛膝四錢黃柏二錢十三日去連翹加石
斛三錢五分五味七分扁豆二錢乾薑八分十八日
去天麻乳菖扁豆加蓮肉四十粒廿二日定方天冬
甘菊沙參各三錢麥冬生地牛膝各五錢炙艸一錢
貝母蘇子橘紅花粉各二錢東仁六錢五味八分蓮
肉四十粒二月十二日定方天冬茯苓貝母沙參各
三錢麥冬東仁牛膝各五錢蘇子橘紅甘菊各二錢
五分黃柏甘州各一錢五分花粉元參各二錢五味

之分生地白芍各四錢蓮肉六十粒十日后去花粉

後入去元參加石斛至五月尽病始全安

前方中曾加參二錢

服一錢及竟浮火上

攻而去之 庶華記

沈明生治潘子琴軀幹魁梧素無恙然室多姬妾且縱飲皆致疾之媒也已已夏忽患類中風項強胸滿不良于行才卒足即竟首重而欲仆地或知其嗜酒及內病由上感下虛即用參附峻補治久轉劇診之六部沈滑有力殊非腎家不足之象然病人傍人舍補而別商則紛然辨難棄不用矣因語之曰病本不足更無可疑但補虛而不去病甚于攻尅也今當分塗

治之湯劑以補虛吾立方而君自製服凡劑以去病則有家秘神方未可明告奉饋服之兩旬必奏殊功潘以愈期甚速欲然見從前方以六君理中加減而不用附子別製大劑消痰凡服十日而項強若失然更衣陸續去痰積稠黏甚多潘惟恐其虛復生猶豫乃謂之曰大便虽行神氣日旺况有參朮以培養脾元何慮之有去痰莫如尽此之謂也勉其尽劑果越兩月而步復康



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



續名醫類案卷五

錢唐魏之琇玉橫輯 男鈇編次

厥

孫兆 杜士 同診 仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷

急奏上乃急召孫杜既至奏曰不妨此乃氣厥尔
少頃吐即復甦也御坐良久果吐而甦上問因何而
得二人並奏曰此貴妃方食因憂怨氣上逆与食相
併故如此者吐即氣透故復甦也上問妃有何事如
此妃对曰陛下無嗣臣妾不能为陛下生皇嗣所以
自怨氣忽上逆至驚動聖駕上曰朕亦自責乃勞汝

致病即因嘉獎孫杜之能良久曰醫道如此豈非良
醫耶 送子經目

于敷青衣為崔侍御所得忽暴死梁革曰此非死乃尸
蹶也刺心及睛下數處衣以單衣卧床上縛其手足
置微火于床下稍甦以葱粥灌之而青衣遂活 凡病尸厥

脈伏者死脈大反者
死 設茶 津應秋

實材治一人因大惱悲傷得病日則安靜夜則煩亂不
進飲食左手無脈右手沈細世醫以死症論之實曰
此腎厥病也因寒氣客肝腎二經灸中腕五十壯閉
元五百壯每日服金液丹四神丹至七日左手脈生

少頃大便下青白膿數升許全安此由真氣大衰非
藥能治惟艾火灸之 注此症非灸法不愈非丹藥
初二者人多不能行醫人但
用後常具
何能生

一婦人產後發昏二日帶清面上發麻牙關緊急二手
拘身實曰此胃氣閉也 蓋由肝邪上逆胃
之入經而成厥 胃脈扶口
環唇出于齒縫故見此症今灸中腕五十壯即日而

愈 原注名產後血
厥含公白微湯

一婦人時時死去已二日矣凡醫作風治之不効實與
灸中腕六五十壯即愈 即尸
厥

張子和治一人痰厥不知人牙關緊急諸藥不能下候

死而已張見之問侍病者曰口中曾有涎否曰有遂
先以防風藜芦煎湯調瓜蒂末灌之口中不能下
乃取長蛤甲磨去刃以紙裹其火灌于石鼻竅中咽
然下咽有聲復灌其左竅亦有然日可治矣良久涎
不出遂以砒石一錢投之鼻中忽偃然仰面似竟有
痛斯涌吐穢吐膠涎數升頰腥砒石尋常勿用以其
病大非如此莫能動然無瓜蒂亦不可使用宜消息
之大凡中風痰塞注之止斷及風喘求風藥靈寶
至寶誤人多其故劉河間治風拾風不論先論二火
也

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛張曰四肢者諸陽之
本也當夏時散越而不痛及乎秋冬反斂則痛以三
花神祐丸下之而愈此氣熱
散也

張叟年六十餘病熱厥頭痛以其用蒲葯時已一月間
矣加之以大其人先利年高身困出門見日而仆不
知人家入驚惶欲揉扑之張曰大不可擾續与西瓜
涼水蜜雪少頃而甦蓋病人年高漏泄因脉易亂身
体内有爰火外有太陽是以跌仆若是擾之便不救
矣惟安神定思以涼水投之待之以靜之便屬水自
然無事臨症者當諳練也

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲更甚每月發

一兩次發必頭痛、則擊數百拳出黃綠涎一兩椀

方已比年發益頻日見黑花發則昏不知人也厥三四

日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效偶

遇張子隱水之南鄉以双解散發汗次以苦劑吐痰

病去八九續以分劑卒調自春至秋方獲全安此即痰案

中身令剛皆宜漏之一病也

莊一生治金壇庠友張逢甫內人方食時触暴怒忽仆

地遂絕氣一医用皂角灰吹鼻中不嚏用湯藥灌之

不受延至午夜謂必不治告去急叩莊過視之六脉

尚全而獨氣口沈伏細尋之滑甚曰此肝木之氣逆

冲入胃之中素有痰致痰夫食閉胃口氣不得行而

暴絕也胃氣閉之說厥歷時久湯藥不可入矣急

宜吐之可治所謂木鬱則達之也亟令飲其身垂首

向床下以鵝翎蘸桐油微齒探入喉中展指引吐出

痰与食才一口氣便稍通再探吐至兩三口便竟油

臭以手推翎但不能言並口無妨矣知其体怯不宜

多吐急煎枳橘推蕩之藥灌之大劑而甦後以平肝

和胃藥調理數劑復故此因暴怒、則氣上逆痰因

氣壅故現斯症耳所謂尸厥也治厥注、有誤子故

表其症以示后来云 廣筆記

李季虬曰太季朱方仲內人稟賦極弱兼之作勞善怒
內熱怔忡胆虛氣怯已三四年矣壬申夏忽發厥冒
痰氣上升則兩目上視手足發搐不省人事初時一
日一發三四日後則連發不止日夜凡百次牛黃竹
瀝遍嘗不效予計已窮意欲用參附峻補因其時常
口渴大便不通不敢輕投適一友至極其贊決謂非
附不可強用附子二錢人參六錢作一劑投下午后
進葯黃昏發大熱煩躁渴甚不兩日斃矣此固非因
附子而然第症候決不宜用激悍之愈念漫試也全

口逆能自訟自古
今在繁所死者

張意曰乙酉歲治一反忽患泄瀉數次僅仆不醒神昏

目瞠肉瞤口噤狀若中風脈之沈弦而緩手足不令
身強無汗鼻色青兩腮紅此肝鬱之復也用童便葱
葱煎服少醒以羌活防風柴胡勾藤香附炮子之類
次用天麻白朮湯加歸芍丹戩而愈或問肝鬱之復
故曰運氣不和俸虛人得之今年陽明燦金司天金
運臨酉力不及艸木晚榮因去冬晴暘無雪冬不潛
藏初春乘其未藏而艸木反得早榮矣燦金主肅殺
木欲達而金勝之故近日梅未標而吐華密散淒風

交亂其側木氣鬱極則必思復經所謂偃木飛沙筋
骨掉眩風熱之氣陡然上逆是為清厥今其脉沈強
而緩乃風水之象因審量天時用童便慈蔥使之速
降濁陰透轉清陽則神氣自清用羌活等以舒風木
香附炮子解肝而清鬱火再用天麻白朮湯加歸芍
丹色培土清火暢肝木以成春氣不能斡旋造化亦
庶几不背天時也已

李東垣治中書令公脚膝尻腰皆冷脉沈數有力用黃
柏滋腎丸再服而安

乘選入

汪石山治一人卒厥暴死不知人先前因微寒數發熱
面色痿黃六脉沈弦而細知為中氣久鬱所致與人
參七氣湯一服為未熟而暴絕汪令一人繫抱以口
接其氣徐以熱姜湯灌之禁止喧鬧移動移動則氣
絕不起矣有頃果甦溫養半月而安不特此症為然
凡中風中氣中寒暴厥俱不得妄動以斷其氣內經
明言氣復返則生若不諳而擾亂其氣不得復致天
枉者多矣

遇卒暴病者病家醫士皆宜知此蓋暴病多火擾
之則正氣散而死也予友年十八忽暴厥家人不
知此群集喧鬧人扶挾而從之他所致甦而復絕

捕無及矣今錄此二案五內攸摧傷也

歐用敬治二嬪卒欲昏之若醉夢手足筋牽歐診之六
脉俱脫忽有麻衣者在側問其人則病者之婿也問
其服妻之服也問其妻之死僅半月死以產後忘忽
悟曰此病必憂鬱所致以木香流氣飲投之一服而
痊吳江縣志

陸怡華字亨人善醫洋人段氏客比隣一夕溘死怡取馬
櫃去底置大上昇死者內之蒸以葱藥及且皮腐
而氣復江南通志

孫文垣治丁曜川長姊常患暈厥諸風掉眩皆係于肝吐痰梳許

乃甦度日火物一月三五發後又口渴五更倒飽二字新腸

鳴暖疼泄瀉小便短滿咳嗽皆肝火脉之兩寸濡弱

而關滑大此中焦挾積所致也却是先與二陳湯加

蒼朮山查麥芽以健脾為臣以白芍止痛為君以滑

石澤瀉引濕從小便出為佐黃芩為禪佐張十帖二

陰之痛俱止前未秋明改以六味地黃丸加知柏牛膝而

愈

按此女之病稟母氣也予常見父母有肝病者其
子女亦多有之茲病厥亦肝病也其母病甚在二
陰見鬱鬱症門

白仰雲令眷每觸怒即暈厥必閉門合目靜坐不令一

人在旁可見此病不宜擾之手足皆冷汗出如雨氣息俱微越

一時許甦如常原以項生瘰癧多服女匠斑蝥等毒

藥致脾胃損元氣弱也年三十八未嘗生育欲睡則

腿必抽敲既睡則心常驚跳經將仁小腹先疼二目

色紫有塊以上熱非肝病惟肌肉飲食如常人脚胃不痛診之兩

寸短弱左關大而有力右關滑左尺滑右尺沈微據

脈肺氣虛肝木寔胃中有痰之症也未熱則流脂斷無肝火盛而無

痰者不必用六君子湯加升參酒連青皮外与珠母

青諸胃也凡及使活湯而安二方在李經日

龔子才治劉司寇患卒倒不省人事口眼作相引手足

战掉一匠作風治一匠以度火治俱罔効診之六脉

沈數氣口紫此非風非痰乃氣夾食也其家人始悟

口遺正食之際破惱怒所觸遂致如此用行氣香蘇

散加木香青皮山查即愈萬病回春

喻嘉言治吳添官生母時多暴怒致經行後止入秋以

來斬竟氣逆上厥卧床如在舟中旋轉眩暈不能強

起百治不効因用人參三五分略安片刻最後服至

五錢一劑日費數金至家財盡費病轉凶危大熱引

飲腦如刀劈食少瀉多已治未矣喻診之曰可揉蓋

怒甚則血菀于上而氣不返于下者名曰厥顛疾厥者逆也顛者高也氣與血俱逆于高顛故動必眩暈也人上厥下虛者過在足少陽胆之穴皆絡于腦樹鬱怒之火上攻于腦得補而熾其痛如劈同為厥顛之疾也風火相煽故振搖而蒸熱木土相凌故艱食而多瀉也于是合內經鍼落鎮墜之意以代赭石龍胆州芩芩黃連之屬降其上逆之氣以蜀漆丹皮赤芍之屬行其上菀之血以牡蠣龍骨五味之屬斂其浮游之神最要在每劑中生入猪胆汁二枚蓋以少陽熱熾胆汁必乾亟以同類之物濟之病者葯入口

便若神返具舍忍其苦口連進十數劑熱退身涼食進瀉止能起行數步然尚覺身輕如叶不能久皮因恐葯味太苦不宜多服減去猪胆及芩芩加入參歸姜枣為引調愈

李士材治安給諫天人先患胸腹痛次日卒然暈倒手足厥逆時有昏者以牛黃丸磨就將服矣診之六脈皆伏惟氣口稍動此食滿胸中陰陽否隔升降不通故脈伏而氣口獨見也取陳皮砂仁各一兩姜八錢鹽三錢煎湯以指探吐得宿食五六碗六脈盡見矣左關弦大胸腹痛甚知為大怒所傷也以木香青皮

橘紅白朮香附煎服兩劑痛止更以六君加朮香烏
藥調安

楊太史夫人忽然暈倒醫以中風之藥治之不効李診
之左關弦急右關滑大而軟本因元氣不足又因怒
後食停先以理氣消食藥進之下黑矢數枚急以六
君子加姜汁服四劑而后暈止更以人參五錢芪朮
半各三錢歸苓各二錢服愈

一八年五月荒于酒色忽頭痛發熱醫以羌活湯散之
汗出不止昏暈不省李失矣關元十壯而醒四君子
加姜桂日三劑至三日少安因勞怒復發厥用好參
朮香治之而甦更以六君加朮香漸安乃去朮香又
二十劑而痊

陸養愚治許省南忽得暴疾如中風口不能言目不識
人四肢不舉服蘇合牛黃丸不効或与小續命湯反
增喘急壯熱手足厥逆或以六脉沈微擬用附子理
中湯診之兩寸似有似無而尺難以求索此由氣壅
逆而然非不足而欲脫也按其胸即肩力之皺按甚
即後作為之奔詢其由因日間煩冗無暇吃飯至晚
陪客畢即病發口飢極過飽此食中也昏愒不語脉
伏皆飲食填塞清道所致四肢不奔經謂去太過之

病也初時一吐即已今已一二日上中下俱受病當吐下消導以分殺其勢乃先以生姜沒藍湯探之涌痰涎湯水數碗少頃神思少清診之寸關通而末入以稜莪檳榔麴木香白豆仁萊菔子煎送潤字凡五錢下三四行勢大減再診關尺俱見且沈寔有力第胸腹按之犹疼再以前方煎送潤字凡二錢四日後方与稀粥故用二陳少佐參朮歸芍朮香豆仁白而日愈

陸肖愚治潘碧泉嬪年近五旬因大怒後忽然倒仆牙關緊急脉之而寸關滑大而尺沈無以稀涎散蓋水

一兩熟附三錢煨姜十片煎服稍醒但一轉側即厥一日之間計厥七次服參三兩至明日以羊肉羹糯米粥与之尚厥二三次至五日而厥定乃泣而問也曰可再生否曰脉有根蒂但元氣虛極非三年調攝不能康也幸其恪信堅守兩月之間服參四斤三年之內煎劑六百帖凡為七斤乃方得步履如初親友衆方多議論百出此最病家大忌若非病人任之而久見疑未有獲生者也

張路玉治顧允祥之內暴怒傷食喘脹嘔逆不止怒則氣上

医者誤認風邪而与表药遂昏愒目瞪不語呼之不

省而或散鼓動肝邪診之其脉六部濇伏知為疫因為氣閉

所致卒當因勢利導探吐以通其竅緣病家畏其吐
刺遂与導子疫湯加菖蒲遠志一吸便能語言更与前
药加枳榔鉄落得下而安

黃履素曰凡人精神極壯定者偶患疫厥可服牛黄丸
反八屠伯尚忽然疫壅不能語服牛黄丸立愈子姊
丈周公美一日忽神呆目怒頃之疫涌手揚足擲有
類中風不服药而愈此等稟賦有一無二

薛立斋治一妇人因怒發搐嘔吐疫涎口噤昏愒氣口
脉大于人迎此氣滯而食厥用予胃散加茯苓半夏
調糯米灌之吐疫盈許少頃而甦第人事尚不清爽
再診牙關稍开而尺已起以二陳加貝母黄連香附
而安

陸祖愚治邵仲開勞心之後復感怒氣清晨篋頭未畢
忽然昏暈四肢厥逆口目不開喉声如鋸二便不利
脉之左三部弦歸而數右三部沈實有力此疫厥也
先用牛黄丸姜湯化開加川牛黄一分連瀉四五丸
再用陳皮貝母花粉胆星黄芩黄連枳實瓜蒌前胡
桔梗皂荚姜汁竹瀝頓服涌去稠痰二三碗前方去
皂荚陳皮加青皮二劑行二次其老疫俱從後便出症

損減後用健脾胃消痰葯調安

鄭顛天年六十餘因大怒遂昏仆四肢不用余以怒則
火起于肝以致手足厥陰二經之氣閉而不行故神
無知怒甚則傷于筋繼其若不容故手足不用急以
連柏瀉其上逆之火香附降其肝氣一二日神志少
回後以調氣血壯筋骨之劑補之一月安矣葯要或問 區

說續編

朱丹溪治呂宗信有積塊足冷至膝用大承氣湯加減
下之其塊厥皆痊精此易知足冷乃寒熱之厥入厥門

吳洋治里人病歸自浙四肢厥冷六脉若亡尸卧旬餘

水漿不入象醫以為死矣洋至曰此熱厥也乃就浴
室貯熱水之皆汲新煎藥傳之卧病者其上則以青
布拭回俾挹水沃之即以小煎病者唇欲得水甚遂
盡量飲之乃痊太正景

吳橋過章神有人遊道告曰江一洋年五十兩渡血后
發熱畢致諸醫或以為傷寒劑以發散或以為痢後
虛損劑以補中久之話語昏迷四肢厥冷蓋不食者
旬日矣即其家絕望以待盡願一診之橋曰此熱厥
也吾能活之則予石羔黃連湯一服而蘇再而減五
服而愈全上

厥

鮑綠飲妹病厥昏不知人目閉鼻息煽年壽環口皆青手
足時三抽搐自夜分至已婢湯水不入脉之大小參
伍無論次謂此肺金大虛肝火上升火極似風之候
唯獨參湯可愈他藥必不受也參已煎或沮之遂不
敢与一医用菖蒲遠志以開心氣茯神枣仁以安神
麥冬貝母以消痰辰砂鉄銹水以鎮墜奈藥後左灌
入即從右流出絕不下咽群視束手時已過午再視
之則面額間漸變黑色令急灌參湯犹活耳乃以茶
匙注之至六七匙喉開泪然有声已下咽矣察其牙

閉漸開再以米飲一盞和參湯灌下遂日開身動而
額青黑之氣一時消去徐飲薄粥一甌起坐而愈后
嘗發惟与地黄沙參麥冬杞子即痊

顧氏女年十六內賺有瘡三陰之病其素也以歲莫勞
于女工脇疼發熱咳嗽吐痰一医与廣半荆防香砂
枳桔等三四劑竟中腕有物如拳上項食不能下又
一老医謂此痰也其賦盈斗必須去乃已其方与前
方增蒼朮厚朴竹瀝姜汁服二劑病益甚延治開歲
之二日也比至則曰死矣無庸診也詢死几時曰天
黎明忽目閉口張挺臥僵直呼喚不應湯水不入詢

其胸腹如何其母按之曰犹暖遂入診已無脉面死
白殺青牙齦迸紫血赤已凝返令曳其四肢尚軟謂
本元虛勞役而病誤行燥散傷其肺金致肝木扶火
上逆人加醋蒸之品遂令水涸木枯而厥胃第度食
之厥可一吐而甦此陰亡陽越之厥唯有提升魄降
而已今生氣未絕姑以熟地二兩杞子一兩沙參麥
冬各五錢急煎徐灌但慮其不下咽耳下咽即活乃
如言次日延診告以初時藥不能下以薑搗灌久之
入咽有声今起坐矣前方減半入姜仁二錢八劑全
愈後數年出嫁不得于姑脇痛不能卧一医令木香

力未調一錢數服竟一厥而終

瘛

瘛症詩曰強直反如弓神昏似中風疫流唇口動瘛瘲与癩同

許叔微治一人項強筋急不可轉側自午後發黃昏時

受此肝腎二藏受風也謂此必先發足起少陰之筋自足至項筋者肝之合令日中至黃昏陽中之陰也自離至兌陰旺陽弱之時故灵宝畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二藏受邪故發于此時用宣州木瓜二个取蓋去蘇沒約二兩乳香二錢半二味入木瓜內縛定飯上蒸三四次爛研成羔每用二錢入生地黃汁半盞無灰酒二盞煖化溫服及都梁丸服愈

易思蘭治宗室毅齋年五十二素樂酒色几月初患倒地昏不知人若中風狀目閉氣粗手足厥冷身強硬牙關緊閉有以為中風者有以為中風中痰者用烏藥順氣散等藥俱不効人有作陰治者用附子理中湯愈加痰响五日後召易診治六脉沈細緊滑愈按愈有力問此何病曰寒濕相搏痲症也痲屬膀胱当用羌活勝濕湯主之先用稀涎散一已吐痰一二碗昏憤即醒隨進勝濕湯六劑全愈更以八味調之

張路玉治吳江郭邑侯公子患柔痲用桂枝湯及六味地黃湯加蝎尾服愈

朱丹溪治王秀濕熱大作脚痛手筋拘攣足乏力生地当歸川芎白朮各二錢蒼朮一錢甘草炙三分木通五分煎湯下大補丸三十九丸酒炒煖

張子和治新寨馬叟年五十九因秋久稅官狀六十得驚氣成風搖已三年矣病大發則手足顛掉不能持物食則令人代哺口目張眩唇舌嚙爛抖擻之狀如綠引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被尽去遍身燔痒中熱而外反寒久欲自尽頗產求醫至破其家而病並堅叟之子邑中舊小吏也以訊張曰此

病甚易治若隆暑時不過一涌再涌必愈矣乃今已
秋寒可三之如未更刺俞穴必愈先以通聖散汗之
繼服涌劑則去痰一二升至晚入下五七行其疾小
愈待五日再一涌出痰三四升如雜黃成塊狀如湯
熱曳以手顫不能自探妻与代探咽溢腫傷昏愒如
醉約一二時許稍醒入下數行立覺足輕顫減熱
亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筋未至三涌病
去如濕病後但覺極寒張日当以食補之久則自退
蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不
可熱劑恐成他病

琇按是症本因驚而得尤不能無驚也蓋驚入心
之受之則為顛癇分心不受而反傳之肝而為應
慶亦母球其子之義也肝病則乘其所勝于是生
風生痰怪症莫測治以上涌下泄乃發而蕪奪之
理並行不悖張案于此是尤為合法

黃如村一叟兩手搖擗狀如曳鋸冬月不能覆被張之
舞陽道經黃如不及用為針其兩手大指後中注穴
上曰自肘以上皆無病惟兩手搖擗左氏所謂風淫
末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋尽
處是穴也

完顏氏病播先右臂并右足約播六七十數兩目直視
昏憤不知人凡月餘求治先逐其寒疫三四升次用
導水禹功散泄二十餘行次服通聖散辛涼之劑旬
日安

薛立齋治一婦人素有內熱日水不調經行後四肢不
能伸卧床半年或用風溫疫火之劑不效其脈浮緩
按之則清名曰癰症屬風寒所乘用加味道遙加防
桂少安更以八珍湯調愈

一婦人素經行后期因勞怒四肢不能屈名曰癰症此
血虛而風熱所乘先用八珍湯加鉤藤柴胡少愈更

以加味道遙散調愈

一婦人四肢掣屈煩痛自汗小便短少畏見風寒脈浮
弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏先用東垣清燉湯
少愈再用加味道遙散及八珍加丹皮痊

一婦人素有火怒熱昏憤癰症由痛善伸數久四肢筋
掣夜涎上升此肺金燄甚血液衰少而然也用清燉
湯六味丸服愈

一婦人因怒經水淋泄半月方竭遇怒其經即至甚則
口噤筋掣鼻衄頭疼疫壅搐搦瞳子上視此肝火熾
甚以小柴胡加熟地炮鉤治愈

一婦人素陰虛患遍身瘙痒誤服祛風之藥口噤抽搐
肝脉洪數薛曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃
肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火用四物麥冬五
味柴胡山梔甘州熱搗頓止又以八珍黃芪麥冬五
味鉤藤炙州調安

一婦人發熱遺溺自汗面赤或時面青飲食如故肝脉
弦緊此肝經血踈風熱名瘕也肝主小便其色青入
心則赤法當滋陰血清肝火遂用加味道遙散數劑
而安

許叔微云同官欽丞張德丞燥常言其內子昔患筋挛

脚不得屈伸逾年動則令人抱持求醫于泗水揚吉
老云此筋病宜服下三方一年而愈春夏服養血地
黃丸熟地蔓荆山萸狗脊地膚子白朮乾漆蝮螬天
雄車前草薛山藥澤瀉牛膝秋服羚羊湯羚羊角肉
桂附子独活白芍防風川芎冬服烏頭湯大烏頭細
辛川椒甘州秦光附子官桂白芍乾姜茯苓防風當
歸独活

馬元儀治童氏嬖患頭身振搖手足癱瘓諸治不效診
之兩脉浮虛魚清浮為氣虛清為血傷得之憂思勞
鬱陽明損甚也蓋陽明胃為氣血之海主束骨而利

机関若氣血不充則筋脉失養而動惕不安仲景云
發汗則動經身力振搖者茯苓桂枝木甘艸湯主之
凡汗傷津液犹足擾動經脉况氣血內竭乎但彼有
外邪搏飲当發飲散邪桂枝俾津液四布以滋養筋脉
此屬勞鬱所傷必峻補陽明使氣血內盛以充灌周身
令服參乳兩月安

立而治一人感冒後發瘧不醒人事磨傷脊肉三寸許
一魄此膀胱經必有濕熱診其脉果數謂此死肉取
毒宜速去之否則延積良肉多致不排遂取之果不
知疼痛因瘧不止疑其去肉所触謂此風熱未已彼

不聽另用乳末之劑愈甚復以祛風消毒藥敷貼查
春田飲以祛風涼血降火化痰之劑而愈金工部載
陽傷寒後亦患此甚危亦取去死肉以神効當歸羔
粿貼以內疎黃連湯下之狂言愈感其脉愈大更以
涼膈散二劑又以四物湯加芩連數劑而愈凡患瘡
者責効太迫服一二劑未應輒改服他藥反致有悞
不思病有輕重治有緩急而藥欲効予一二劑之間
難矣况瘡瘍一症其所由來固深以久人形瘡在外
肌肉潰損較之感冒無形之疾不同安可旦夕取効
患者審之

吳橋治程嗣恩故肥白藪瘍過當腠理皆疎始竟汗多
久而益甚一發則汗下如雨而厥逆反張口噤目瞪
痰喘並作良久氣反小便不禁瞑不能言旬日益深
日十數作諸醫謝去橋既而按諸方則曰經云汗多
亡陽此柔痊也諸君失之矣乃重參芪次桂附芍藥
次尾骨牡蠣飲之半劑而寢復者將升屋而踞橋曰
藥中病而行得寢乃復非死也亟為粥湯待之頃之
呻吟呼粥湯少進三月而復初六函集

暈

實材治一人頭風發則旋暈嘔吐數日不食乃針風府
穴向左耳入三寸去來留十三呼病人頭內竟麻熱
方令吸氣出針服附子半夏湯水不發華陀針曾操
頭風亦針此穴立愈但此穴入針入即昏倒其法而
右耳橫下針則不傷大筋而無暈乃千金妙法也此針

法奇妙頭与高手指
家議之方得無悞

龍共子才診熊槐二官年六十餘身体胖大其脉下手即
得五至一止乃驚曰君休矣渠曰連日惟竟頭暈別
無恙也何故出此願定教焉龔曰越十日用藥相哂

而退少頃間中痰求救于龔知其必不可治令以香
油灌之即醒十日死

張路玉治董司業夫人體雖不感而恒有眩暈之疾診
其六脉皆帶微弦而氣口尤甚蓋緣性多鬱急則
飲食不思恒服消導之味則中土愈困飲食皆化而
痰之後火化而為眩暈矣豈平常肥盛多濕之痰可
比例乎為疏六君子方水泛為丸服之以培中土中
土健運當無專化不及留結為痰而成眩暈之慮所
謂治病必求其本也

翔容梁姓者邀診時當夏日裸坐盤餐倍于常人形偉
氣壯熱汗淋漓于頭項間診時不言所以切其六脉
沈寔不似有病之候惟兩寸略顯微數之象但切其
左則以右掌抵額切其右則以左掌抵額知其肥盛
多濕而夏暑久在舟中時火鼓激其痰而為眩暈也
詢之果然因與導痰湯加黃柏澤瀉茅朮厚朴二服
而安

吳友良年逾古稀頭目眩暈乃弟周維素習岐黃與補
中益氣數服始用人參一錢加至三錢遂痞滿不食
坐不得卧三日夜喘不休

上微下虛之症服補
中益氣其害如此

時見其面赤進退不常左頰聾、瞤動其六脉皆促

或七八至一歇或三四至一歇詢其平昔起居云自
五十即絕慾自保飲啜且強此壯火燥陰煎肝風上
擾之兆与半料六味除去萸肉八勺藤大劑煎服是
夜即得酣寢其后或加鱉甲或加龍骨或加枣仁有
時妄動怒火逢旦不寐連宵不已則以秋石湯送灵
砂丹應如桴鼓盛夏酷暑則以十劑生脉散代茶後
与六味全料調安

繆封君偶因小憤遂眩暈痞悶三月來服豁痰利氣藥
不應反竟疲倦飲食日減下元之力診之六脉似竟
有餘指下略無冲和之氣之口独滯不調時大時小

面尺俱濡大少力此素多痰濕漸積于水土二經加
以剝削之劑屢犯中氣疲倦少食迨所必致法当先
調中氣輸運水穀之精微然後徐圖温補下元为疏
六君加当归調营血而安

陸養愚治陳翼源室而有頭眩之症不药亦止八月中
旬偶作勞煩悶飲酒数杯坐月下更餘方寢便竟微
热不安次早忽眼黑頭旋且微疼如在風雲中發比
平時为甚医謂脉得浮数此热極生風也用芩連山
芩等以清之二劑眩暈不減而頭痛如破上身如火
而欲厚覆又謂無痰不作暈再以清火之品合二陳

湯二劑亦不効脈之左手浮弦而緊右手浮數而弱且寸強尺微右脈乃正氣之虛左脈乃邪氣之實尺微寸強邪在外也此必乘虛感邪中于上焦所致經曰筋骨血氣之精而与肝并为目系上属于腦後出于項中故邪中于項因逢其人之虛其入深則随目系以入于腦入于腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣今作勞以致煩悶作虛乎月下坐至更餘頭項之間能不为霧露之清邪所中乎法当驅上焦之邪補中焦之氣而徐議消痰清火則自愈矣因先用參蘇飲加藜蘆二劑頭疼頓止眩亦少安

再以補中益氣佐二陳苓連而安

龔子才治大之子士高中立患頭目眩暈耳鳴眼黑如在風雲中目中溜火或与清火化痰或与滋補氣血俱罔効診之六脉洪數此火動生痰以酒蒸大黃三錢為末茶下一服而痊

薛立齋治一婦人頭暈吐痰用化痰理氣葯肢體痠麻服祛風化痰葯肢體常麻手足或冷或熱此脾土虛而不能生肺金用補中益氣加茯苓半夏炮姜二十餘劑脾氣漸復諸症少愈更用加味逍遙散三十餘劑而愈復因怒吐痰自服清氣化痰凡飲食不進吐

瘦甚多胸脇脹滿教用六君子倍加參朮少加木香而愈

陶天爵妾媵素多時患頭暈瘦甚勞則肢體痠軟筋骨作痛殊類風症以為腎虛不能納氣歸源用加減八味丸而痊後因房勞氣惱頭暈項強耳下作疼此肝火之症仍用前藥滋腎水生肝血而愈

張飛疇治一媼胸滿身熱六脈弦數無力形色倦怠渴不甚飲云自遊席卽暈船吐後汗出發熱頭痛服發散四劑頭痛雖緩但眩暈不禁復用消導四劑胸膈愈膨聞穀氣則嘔眩因熱不退醫藥粥食已半月日

惟飲清茶三四碗今周身骨肉疼楚轉側眩暈嘔噦曰當風汗嘔外感有之已經發散矣吐則飲食已去消尅則更傷脾之虛故脹甚脾絕穀氣則嘔土受木尅則軍宜勿藥惟与米飲繼進粥食使脾土有主更議可也竟不為而安

立齋云上舍顧桐石會飲周上舍第問余曰向孟有涯陳東谷俱為無嗣納寵已而得疾皆頭暈吐瘦並用蘇合香丸惟孟得生何也曰二症因腎虛不能納氣而力頭暈不能制水而為瘦涎陳嵩服攻瘦行氣孟嵩服益火補氣故耳後余他往桐石房勞過度亦患

前症或用清氣化痰更甚願曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而歿惜哉

昌卒守王大成頭暈惡寒形体倦怠得食少安勞而益甚寸關脈浮大此脾肺虛弱用補中益氣加蔓荊子即痊後因勞役發熱惡寒詰言不寐得食少安用補中益氣而痊

大戶祝支山因怒頭暈物內筋掣時或寒熱日晡熱甚此肝火筋掣氣虛頭暈用八珍湯加柴梔丹皮二十劑愈

琇按肝火亦作頭暈不定屬之氣虛也經云諸風

掉眩皆屬於肝之支脈上絡顛頂余嘗以一氣湯加吳萸炒連二三劑愈

朱丹溪治一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無力吐痰口之相續左手脈散大而緩右手脈緩而大不及于左重按皆無力飲食略減而微渴大便三四日一行眾人皆與風藥至春深必死曰此皆大虛症當以補藥大劑服之衆怒而去乃教用人參黃芪當歸白芍白朮陳皮濃煎作湯使下連柏凡三十粒如此者服一年半而精力如少壯時連柏凡冬加乾姜少許餘三時皆依法連柏皆姜汁炒為細末又以

姜汁煮糊為丸

琇按此症大補而佐以連柏妙不可言矣蓋一眼注之肝腎二經以連清肝火柏清腎火也既慮其寒重以姜汁製之可謂盡善然不若竟用地黃杞子如左歸加減尤為善中之善也

陳自明治一媼人苦頭風作暈數年服太乙丹一粒吐

痰梳許遂不發

方見靈門

馮楚瞻治金紹老夫人因歲事積勞忽眩暈不省妄有見聞語言襍亂診其脈細數無倫真陰真陽並虧已極東此初起即為挽回愈久愈虛愈虛愈脫矣用全

真一炷湯日進二劑每劑人參八錢不十日而全安

果選入

錢國賓治陳叔明幼年多讀飽學貧居自甘清沒有品士也至三旬外一見日光即竟昏暈漸至見光即暈遂坐于帳凡有隙處莫敢窺如是二十年矣諸藥遍嘗親友備具品行時以升斗周之與診乃湯虛陰極之症須返本還元之藥可治也用首經人乳脂帶胎髮秋石煉蜜凡如炭子大硃砂為衣三更酒下一凡月餘而愈遠錢有此凡因與之也

麻木

王損安治大理卿韓珠泉一身麻木不能牽動以神效
黃芪湯加減投之用芪一兩三錢參芍各六錢他稱
是一服減半彼欲速効遂併二服為一服之旬日
病如失論以元氣未復宜靜養完固而后可出渠不
能從歐夏遠出見朝謁客勞頓累日忽馬上欲墜仆
後者扶歸邀診視辭不治數日沒嗚呼行百里者半
于九十可不戒哉 治法彙

張路玉治沈步雲解組後以素稟多痰恒有麻木之患
為疏六君子湯服之頗驗而性不喜葯入秋以來漸

竟肢体不遂脉之得爽滑中有微之象仍以前方去
陳皮加歸耆巴戟而安然此症首重樽節不後葯力
為也

已慈明媼產後眩暈心悸神魂離散若失臟腑之狀開
眼則遍体麻木如在雲霧之中必緊閉其目似覓少
可日則煩躁夜則安靜服回物等則嘔逆不食姜附
等則躁擾不安其脉虛大而數按之則散卒之應指
此心火浮散之象因生產受驚疫飲乘虛入心包
絡中留伏膈上有入無出致綿延不已蓋目閉則諸
竅皆閉疫火者塞心竅所以神識無主目閉則諸竅

皆閉疫火潛伏不行故得少安與東垣所云合眼則
陽氣不行之麻迥別况日甚夜輕明是上焦陽位之
病與理疫清火之劑諸症漸安然或因驚恚或因飲
食不時卒發此伏匿膈上之疫無從搜滌也乘發時
用独參湯下紫雪開通膈膜仍与前葯調補半年而
愈

黃履素曰余年四十七時忽患小指麻軟時作時止每
夏安而冬甚素聞指麻當防中風因講求預防之法
有言宜祛風化疫者其說大謬有言宜順氣活血者
謂氣行則疫自消活血則風自滅其言近是及讀薛

氏醫案治蔣州判中滿吐痰頭暈指麻云中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能用也遂以補中益氣湯加茯苓半夏以補脾土用八味地黃丸以補土母而愈后惑于乾坤生氣方云凡八手指麻軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二凡以預防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿夫預防之理當養氣血節飲食戒七情遠帷幙可也若服前丸以預防必所以招風取中也謾之快然遂確守其法蓋于今十有三年矣

陸養愚治丁慕雲患麻木左手足不能卒患風或時自汗服小續命十劑不効或謂風症宜大汗之小續命祿以補養氣血之品故不効耳因倍風藥減參芍等二劑汗如雨反竟一身尽痛游走不定并左手足不能卒昏沈厥迷甚危診之陽脉弦細而數陰脉遲瀼而空謂此虽似風然者入云麻者氣虛木者血虛手足不任者脾虛具此三虛正宜調養氣血則風症自除小續命正以風藥過倍血藥殊少何反倍風藥而去參芍宜其甚矣仲景云大法夏宜汗以陽氣在外也春月陽尚稚幼出地下大汗之使衛氣亟奪而失

守榮血不隨所以偏身走痛昏沈厥逆皆氣血垂絕之象也急用大料十全大補湯濃煎灌之少甦為灸風地百會肩井曲池間使三里六以各數壯以防中臟之危自此諸症少減飲食少進第大便常結痞悶微熱此汗多津液不足故下不去則上不舒以潤字凡五分日二服便行犹燦以八物倍歸地加麥冬知母以潤之少佐煥榔木香豆仁以調其氣可不復每燦結服潤字凡五分月餘安

張文叔傳木香丸續命丹二方戊辰春中書左丞張仲謹患半身不遂麻木太医刘子益与服之汗大出一

服而愈

李東垣治杜彥達患左手右腿麻木右手大指次指亦常麻木至腕已三四年矣諸医不効求治曰麻者氣之虛也真氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁与一药次三日効遂製人參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢触者似痒痛滿脹之意指上瑟瑟不敢用手擦傍触之曰真氣遍至矣遂于兩手指甲傷各以三枝針一刺之微見血如黍粘許則自息矣

繆仲淳治願仲恭心腎不交先因失意久鬱及平日勞
心致心血耗散去歲十月晨起尚未離床忽左足五
指麻冷淡已至膝便不省人事良久而甦乍醒乍迷
一日夜十餘次医者咸云疫厥繆云純是虛火服丸
藥一劑今春俸竟稍健至四月後丸藥不繼而房事
稍過至六月初十偶出門前症復發扶歸良久方醒
是日止發一次過六日天雨稍感寒氣前症又發二
次見今兩足無力畏寒甚自腹以上不畏寒繆云八
之五臟各有致病之由謹而察之自不爽也夫志意
不遂則心病房勞不節則腎病心腎交病則陰陽將

離之則大病必作以一截不交故也法當清熱補心
降氣豁痰以治其上蓋精強腎滋陰增志以治其下
則病本必拔以心藏神腎藏精與志故也予居應獨
處曠野與道流韻士討論高欲之道根極性命之原
使心境清泰暫離愛染則情念不起真精自固陰陽
互揖而形神調適矣煎方貝母茯苓遠志棗仁蘇子
石斛麥冬甘州木瓜牛膝石菖蒲八牛黃末一分天
竺黃一分竹瀝一杯后加入人參五錢枇杷叶三片霞
天羔五錢凡方遠志天冬麥冬茯神茯苓棗仁生地
白芍甘州黃柏牛膝五味蜜丸空心及臨卧服五六

錢石斛湯加竹瀝送下



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

感症

續名醫類案 卷六



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

續名醫類案卷六

錢唐魏之琦玉橫輯 男鉞編次

感症

朱丹溪治一人因感寒倦怠不食半月後發熱惡寒遍
身疼脈浮大按之豁然此極重受寒以人參為君黃
芪歸芍為臣蒼朮陳皮通州為使大劑服五劑大汗
而愈

沈明生治丁惠書秋得感寒停食之症入夜輒寒熱如
瘧竟夕作嘔病數發醫亦數更体弱不勝昏沉垂殆
矣或謂日靜夜劇屬乎陰元或謂胃寒而嘔當理中

沈獨以為日靜夜甚由于陽氣陷入陰中且嘔噦聲
長明是諸逆冲上屬火不惟不可溫直應用寒亦不惟
不可補更宜攻伐竟投三黃等味一劑知二劑減三
四劑其嘔若失神情始甦但嘔止而胸脹繼作或疑
寒涼傷胃沈曰食虽潤而火未歸原犹留連膈上三
太僕云寒之不寒責其無水当求其屬以衰之乃改
用純甘壯水之劑益以牛膝車前使熱從水道發洩
果氣順脹消而安

陸養愚治邱全谷年正方劉九月間忽身微熱頭微疼
心神恍惚有時似夢非夢自言自語醫謂此輕傷寒

也當發散之用解表二劑汗不出熱皮甚妄言見鬼
前醫因無汗故再表病家疑又延一醫因妄言見鬼
謂熱已傳裡欲下之而大便之去未久不能決脈之
輕按浮數而微重按澁而弱微數者陽氣不足也澁
弱者陰而不足也此陰陽俱虛之候不可汗尤不可
下主表者曰汗既不出何謂陽虛曰此症虽有外邪
因內損其氣餒不能逼邪外出而作汗法當補其正
氣則汗自得而邪自去矣若再發之徒竭其陽而手
足厥逆之症見矣其主下者曰仲景云身熱詎語者
有燄矢也何不可下曰經云詎語氣虛獨言也此症

初止自言自語因發散重虛其陽所以妄言見鬼即
難經所謂脫陽者見鬼也王海藏曰傷寒之脈浮之
損小沉之損小或時悲笑或時太息語言錯亂失次
世疑作詬語狂言者非也神不守舍耳遂用補中益
氣湯加附子姜枣煎服一日二劑至晚汗散而來
清晨身竟涼頭不疼第人事不甚省此陽氣少復陰
氣未至耳仍用前湯吞六味凡旬日猶未精采調理
月餘而愈

韋汝經春初肄業于蕭寺其房屋新葺不甚謹密天寒
夜坐至一二更倦怠倚几而卧泊醒身竟寒甚頭微
痛天明自服參蘇飲二劑未得汗他無所苦但頭疼
數日不止或謂其体弱必攻苦勞神上氣不足而痛
也今以補中益氣湯倍人參服之服後便覺神氣昏
悶胸膈不舒從早至夕粒米不進晚發呃逆睡卧不
安醫以脈帶數是火也用知貝苓連竹茹等投之反
遍身壯熱呃逆不止亟診之面赤戴陽鬱胃嘔逆左
脈沉數而弦右脈尚和乃曰病輕葯悞耳不汗而劇
得汗即解矣乃以火鬱湯倍麻黃強發大汗之至晚
諸症如失明日索葯曰昨見几上尚有補中益氣湯
一帖服此足矣

琇按補中益氣為東垣治內傷外感之第一方後人讀其書者鮮不奉為科律無不知近代病人類多陰分不足上盛下虛者十居九焉即遇內傷外感之症投之輒增劇非此方之繆要之時代稟賦各殊耳陸麗京曰陰虛人悞服補中益氣輕之暴脫司命者其審諸

朱時川內先感風邪後傷飲食發熱頭疼中脫痞悶以牛黃散下之瀉而二行而熱不減痞亦不寬再服復瀉兩三行熱不減而痞更甚雖云先外感始終未進表劑又醫曰瀉而熱不減者虛熱也通而脹不減者虛痞也乃

用人參白朮黃芪甘州補之初服無進退至四劑神昏不省人事手足厥逆古有黑胎脈之浮數而空喜面不黑黯犹可救乃以枳寔五錢黃連三錢人參七分麥冬一錢五味十粒灯心煎灌之二劑人事少清六脉畧有神熱亦減半又二劑熱仍劇大便五日不行姑以潤字丸一錢下之不動又催一服復不動至一服三錢而后行；后熱漸退矣飲食少思稀粥与之而氣之不足以息仍以前方去枳寔之半人參加一錢五分三日後大便又不行而熱即微；來復以潤字丸一錢五分下之便通而熱退自此一日不服

人參則自汗力不能支三日不投潤字丸則便閉而熱發共服人參一斤潤字丸數兩始安

陸肖愚治鄒氏子年十八新昏感冒症似傷寒或以丸味羌活湯嘔吐一二日不止改用藿香正氣散吐少止而倦乏食即飽悶腹中漉漉有聲四肢微厥小便短赤大便或溏或秘口渴而不喜飲日輕夜重煩悶有主調氣者清火者滋陰者皆不效而滋陰尤為不宜脈之寸關沈緩而弱尺脈頗和曰此得之煩勞傷氣非得之使內傷陰也用四君子湯加棗仁豆仁木香姜朮數劑如故乃倍人參加熟附子五分而胸膈

寬食進二十劑愈

陸方伯年過古稀因仲冬天氣有非時之熱患時氣咳嗽醫以芎蘇散汗之汗出不止咳嗽連綿不絕飲食不進昏憤經旬脈之浮大無力以五十動脈法按之二三十動間竟常有止意曰此高年勞倦即有微邪止宜扶正氣以勝之豈可妄汗今雖昏憤喘息尚可治安第壽算不出三年外耳用補中益氣湯加棗仁以助參朮歛汗又加枇杷叶桑皮蘇子石斛以降氣定喘二劑汗止四劑嗽亦減矣十劑而安后計至果不出三年

陸祖愚治朱明宇子嬭年二十未出痘疹患疫症類傷寒脉之右手氣口洪滑而數左三部沈寔蒸：內熱五六日不大便腹滿氣喘用黃連枳寔山查厚朴花粉前胡桔梗瓜蒌生姜兩服后通身發斑或謂疹子或云石痘乃用炒黑麻黃柴葛荆防甘州牛蒡蟬退黃芩薄荷等味服后即疫聲如鋸氣不轉舒詰語發狂不時昏暈又用姜汁竹瀝牛黃通天散探嘔吐膿疫數口方醒仍灌前藥又復昏暈如是三月細斑轉而成片嘔血數碗后聞已死陸往嗆之身虽冷而脉未絕以牛黃丸竹瀝灌下少頃手足微動又灌一丸

有呻吟声四肢微温面顴紅色脉大起反竟洪數而滑用人參瓜蒌枳寔黃連黃芩大黃元胡粉徐：温服用炒麩皮熨腹上約兩時腹疼异常即下燦矢十餘塊白疫稠積若干再用獨參湯灌下以防其脫六脉弱甚四肢厥冷口不能言精神恍惚用參附歸芍苓朮之類元氣復食飲進調理月餘而愈五年后陸往閩中疾復莫能祛

王敬溪年五十六先富后貧心事多鬱七月間恣食羊肉酒麪当風而卧內傷外感相煎或与發踈頭不痛身微熱惟胸腹不快或与踈利便通溲利而痞滿如

故或與溫胃或與消導月餘其症依然診之左脈浮
弦而弱右脈浮滑有力或議下之陸曰此症內傷雖
重于外感然有否滿而無實堅且舌無胎口不渴脈
雖有力而浮尚帶表焉可下耶宜用小柴胡和之俟
寔堅脈沈而下之方為萬全自此半月症猶未減又
半月脈沉便結乃以潤字凡五錢三次吞服去垢穢
若干內有羊肉數枚始知飢餓改用健脾調理之劑
而痊

張意田治一人戊寅五月間發寒熱胸悶不食大便不
通小便不利身重汗少心悸而驚發表消食不減更

加詰語喊叫診其脈弦緩乃時行外感值少陽司天
之令少陽症雖少其執顯然脈弦寒熱者少陽樞象
也胸悶不食者逆于少陽之樞分也少陽三焦內合
心色不鮮則煩而驚甚則陽明胃氣不和而詰語少
陽循身之側樞机不利則身重而不能轉側三焦失
職則小便不利津液不下則大便不通此症宜以傷
寒八九日下之胸滿煩驚小便不利詰語一身盡重
不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之法治之服后

果愈

陸祖愚治會邑宰因大寒出入勞頓感冒身熱骨疼而

體極倦怠氣難布息脈之左弦右緩與疎氣養榮湯
二劑彼見用歸芍謂傷寒何遽投滋補曰此傳家治
類傷寒之方毫無差池也服之果痊

潘衷弦母年六十餘勞倦感冒次早仍然飲食晡時遂
發寒熱頭疼骨痛嘔吐酸水冷汗心疼一醫知其不
日多鬱多火乃引經云諸嘔吐酸皆屬于熱投以清
涼愈甚吐虵數條脈之兩關緊盛兩尺空虛乃風寒
飲食之故用橘半枳桔查朴藿芷桂枝姜砂疰少減
次日復傷飲食疰仍劇夜不得卧先用烏梅丸三錢
以安虵隨用檳榔青皮枳實厚朴山查陳皮半夏炮

姜藿香黃連姜砂之類寬其中又用麩皮炒熨中脘
旬日後用小承氣加元明粉去燥矢二次調理半月
而安

汪敬泉子年十六稟賦薄弱病十餘日他醫不効診之
外症身如灸昏倦古上黃黑胎尚有津液胸不可按
日瀉黑水十餘次六脈細數重按有神而氣口独有
力氣口脈盛傷于食也曰此虫起于不足而內傷甚重宜先消
後補用小陷胸加減疰不減夜間煩躁再与前方日
進二服四帖胸膈略舒而靈怯煩渴暫投麥冬棗仁
山卮豆豉之類稍安而熱與疰不減瀉已止遂與潤

字凡一錢少項又催一錢去燥矢三四枚而虛煩之
症又見仍用安神滋補之藥略轉而舌胎未見明知
宿垢未清元氣弱甚不敢急攻乃消補間進調理兩
月始暢而安

吳文孝季鴻体弱多鬱偶患內傷外感先則過汗后則

下早竟成結胸

表症未罷而下之乃成結胸
今云過汗豈表症未及耶

診之胸

不可按身熱如火肢冷如水不寐譫妄恍惚如見鬼
狀已二十餘日矣脉則兩寸空虛兩尺微有根蒂乃
以培植元氣中稍加消導之品治之十日后胸膈已
柔其熱盡在下焦繞臍硬痛時轉矢氣舌胎有刺而

尺脉漸寬有神乃用潤字凡三錢以歸尾枳實黃連
山查元明粉為煎藥送之去燥矢甚多乃用四君四
物兼安神藥調安

表兄費組修初夏勞倦怒氣復兼風寒飲食診之左手
浮弦氣口緊盛謂兩手脉俱挾邪病方進也不信次
日漸頭疼身熱胸膈飽悶項強骨痛醫与凡藥數錢
服之遂瀉不止轉加飽悶惡寒再求診知其表症其
在而竟下之竟成結胸矣与五積散二劑表症已除
減去芎芷脉桂等又二劑胸寬瀉止改用歸芍六君
子湯十餘劑方用潤字凡一錢姜湯送下連進三服

所去甚多遂進而安

朱靖山子年十五稟賦薄弱患內傷外感醫治半月矣
視其面赤唇焦舌胎白燥身熱欲得近衣手臂不敢
袒露反引手入被診之六脉鼓擊而大乃用人參知
母五味當歸白芍一服酣睡半晌一醫再診謂陽明
經病改用柴葛解肌遂大劑再求診則面如土色身
冷自汗四肢厥逆六脉蝦游急以人參一兩附子三
錢灌之隨服隨醒次早大便一次仍前靈脫又以人
參一兩二錢附子三錢芪朮各二錢入童便服之得
以挽回

董蔚如弟飽食麪食樹下納涼困倦熟寢遂頭疼身熱
骨節煩疼胸腹痞塞醫以丸藥下之表症未除胸滿
兼痛又行表汗頭疼減胸痛更甚或消導或推遂其
痛漸下而未得舒暢凡兩月診得六脉澁數面容白
黃舌胎灰黑而潤按其胸腹柔粟臍下堅硬晡時微
熱小便自利大便不通此畜血症也乃用批仁承氣
湯服後滿腹攪刺煩躁欲死其父母哭泣詈罵不可
堪至夜半下黑糞衄血若干遂服寬神爽改用調理
而痊

葉能甫七月患外感內傷之症或用煎劑解表丸藥攻

裡遂連瀉數次胸悶口乾潮熱詰語舌上黑胎手足
微冷脉之左三部沉細而澁右寸關沉滑尺脉空虛
凡陽症見陰脉也若再一瀉必然不治乃用陳皮甘
艸山查小柴胡木通澤瀉厚朴炮姜先溫消分利三
劑后竟不瀉矣但兩手俱沉寔改用黃連枳寔山查
黃芩厚朴瓜蒌五六劑急轉矢氣投潤字凡二錢少
頃去燥矢二三次前症悉除遂投養血健脾之藥調
安

易思蘭治王孫章湖壯年七月間秋收忙迫飢食二鴉
子酒數杯時因惱怒至暮風雨大作又當風沐浴夜
半身熱寒戰腰背脊強胸滿腹疼醫用五積散發汗
身涼戰止惟頭額壯腹大熱又服柴苓湯半月不愈
大便屢去不去每出此：即時作痛又用大黃下三
五行病仍不減反加胃寒吐逆飲食入口即吐：時
頭汗如雨至頰而還四肢或厥冷或發熱大便一日
二三次小便如常飲食不進者四十餘日亦不知飢
形瘦日甚診之左手三部俱平和無恙惟大腸與脾
胃脉俱沈緊按之則大時一結堅牢有力推之不動
按之不移曰此氣裹食積也下之則愈先以紫霜丸
二十一粒溫水送下三時不動又進七丸約人行三

五里腹始鳴下如血餅者五六塊血水五七升隨腹
飢索食以清米飲姜汁炒鹽少許一二味与之神氣
頓生次早復診右寸閉脈豁然如左以平胃合二陳
湯日服一副復用補中益氣湯加麥冬砂仁清晨服
六味凡而愈

張令韶治孝廉項恂如秋患傷寒用發散二劑更甚又
二劑神昏不語大熱診之六脈已脫急用人參芪朮
各一兩附子三錢姜桂各二錢午后脈漸出更進六
七劑而病如故更加舌腫唇爛渴飲湯水不絕如何
地入熟曰病是此病藥是此藥服之反甚得毋悞乎細

審不差又數劑仍如故十餘日搥不能言其子終懇
治曰藥已至矣病終不轉迨死症也更用八味凡全
料濃煎六碗冰冷与之一日夜服尽舌腫消即能言
語識人每日用藥一副粥食數碗佐之以人肉白鯊
鯽魚之類大便不行聽之將一月腹始脹食后更甚
乃以參苓芪朮姜桂附煎汁去渣加大黃二錢服後
額上微汗出手足躁擾不安此正氣虛極也又与大
料溫補一副遂安卧夜間下宿垢半桶飲食如故後
用溫補百餘劑而愈共用人參五斤餘附子三十餘
枚後稍失調理便發熱脫落下額直至次年夏間始

康健

矣

張氏六案皆用溫補此與陳媯皆唇舌咽喉腫爛案中亦不明指藏府一味含糊知其多獲多矣

錢泰應同道也五月間患傷寒十餘日熱不退泄瀉一二次或用炮姜白朮等而瀉止急發斑昏語大渴改用荊芥防風蟬退紅花筍尖連喬等更加昏迷欲飲冷水脈之散大斑色沒而隱々不明白此手少陰心之病也由勞心過度真火虛極神氣外浮故現此假症不可治斑少頃必發狂遂用人參芪朮各三兩茯苓麥冬附子各六錢五味子三錢分作三劑煎未就果發狂人不能制服一劑狂如故再劑稍定三劑遂

睡次日復進藥如初神清渴止斑亦不見連進二十餘劑每日晡尚有昏語數句幸粥食進而大便不行忽一日心中開亮如開窻見日然讖語遂已乃曰先生所云手少陰心病果然也或問何以不用姜桂而止用附子白乾姜入太陰肉桂入厥陰附子入少陰今病乃少陰君火衰微故宜用附子也又少陰下水上火而至神机主入凡病足少陰腎水者虽凶易愈病于少陰心火者治得其法間有生者否則十無一生何也心藏神腎藏精者有形神者無形治有形易治無形難也

陳讚先長媳上年患虛寒之症張治之而痊次年七月
間又患發熱惡寒之症診其脈虛用桂枝乾姜白朮
等一劑次日更大熱反加喉疼腫連頰頰復大嘔吐
不止再召診曰得毋姜桂太熱乎張曰予亦意其火
熱也脈之如初乃曰咽喉腫疼固屬火然亦有虛寒
者吾不慮其腫疼而慮其大吐不止也可多請高明
治之不愈再來召我彼見勢危即遍延諸公皆曰人
雖虛固不可太涼然而熱藥豈可用乎俱用甘桔山
地麥冬人參之類隨服隨吐藥俱不受病轉劇復召
張曰諸公之論極是但此病却不然也初予所以

辭者一則再用熱藥恐不信二則必有識此病能用
溫補者何必功自我出也遂用人參三錢桔梗一錢
五分甘州柴胡枝桂乾葛附子炮姜各一錢下咽不
吐少頃大寒戰粟以重棉不解更與二服復大熱劑
劑隨大汗如雨諸症悉退後用姜附參芪朮二十劑
而安

呂東莊治蔡氏嬪病感症初服疎表降火清疫之劑半
月更甚胸脹疼用溫胆湯及花粉瓜姜疫反急用理
中加肉桂延胡二陳枳壳痛結不可忍醫謂調補不
應技窮矣呂曰調補固如是耶即理中湯入破氣之

藥已能益痛至甘州一味若虺動者便非所宜故仲

景安虺散去甘州加椒梅也病人果向多虺結症凡

吐此便虺多由肝火煎厥乃厥陰病故名虺厥非結也乃仍用理中湯去甘州

加白芍三錢木香五分痛減半脉之細數甚口渴欲

飲水不能咽進湯輟吐手足時冷時熱面色嬌紅不

定体如燔爇此邪火內沸怒木乘土五陽火隨之上

燔下灼真陰龍雷飛越以葯敲之陽格于下外伏陰

互結而致詳繁多遂以八味丸作飲与之曰得汗

病已黃昏服葯即少睡面紅即退為日頃乃索被日

俟之汗至矣及三鼓煩亂異常至黎明診之脉緊數

至八九至曰汗已泊矣而靈不能發也急煎人參一

兩茯苓歸芍五味甘州為佐飲之汗大至日未也次

日再服汗又大至如雨諸症頓愈或曰前之甘州不

宜服今兩劑俱重用何也曰初胃中氣血攻竭空虛

寒凝故虺發而疼得甘州則虺愈昂上故不可今得

濡潤之葯胃氣沖和虺頭下伏虽濃煎服無害也法

可執哉昔人謂戰汗則不可与葯否則必貽后患

沈毅之側室病傷寒壯熱不止疎散之更甚神情昏昧

不寐呂診之曰此感症也然起于勞倦不當重靈其

靈即投以參朮等得汗神情頓清次用地黃飲子下

黑矢熟寐惟熱未盡退前方加炙艸一錢即安再以
滋腎養榮藥調之

呂妙婿勞仲虎初夏勞倦致感寒熱口苦医用重藥發
散之復用查朴枳半花粉瓜蒌攻其中熱益甚痰嗽
喘急語言無序診知其誤急止餘藥重用滋水清金
之劑一服痰喘漸退神情稍清次日脈之浮洪而數
語急遽而收輕手指時作微脹曰此皆虛象也邪未
嘗入陽明而先攻之傷其元氣邪反隨而入陽明矣
重虛其虛愈不能鼓邪外出今虽稍定夜必發詰語
当亟以人參棗之適篋中所帶不多只用人參二錢

黃耆一兩次日家人言夜來甚狂乱不安似不可救
曰無妨參力不足故耳時鼓峯在邑拉之同往曰汗
已至矣何慮為乃用參兩許仍入前藥進之或議參
与痰喘詰妄相背乃曰無庸疑若輩在此坐一刻待
其汗至而別何如衆在猶豫間因出酒食過年辛杯
未盡內出報曰汗大發矣是夜熱退痰喘悉平繼用
調之劑而起

林觀予治一人頭疼身熱体疼傷寒症也然舌乾燥

邪入裡未嘗不乾燥繆仲淳謂古好沉睡診之脉豁
根不燥者其症輕非真傷寒也

大無倫次知其勞于房慾復感邪也与補中益氣湯

人人參一錢五分服之得汗熱減三日內進八劑漸起入粥而安初服彼甚疑后見藥入口必小汗漿：周身和暢始信服之 傷寒折衷

劉雲密曰予于癸巳春因老人氣虛而春每有暴寒時或胃之欲疎散而氣益虛遽投參耆而微寒更不去將補益与疏散酌用又未能恰中用荔枝肉肥厚者五枚煮酒一鍾屢服之頗効 又壬寅冬癸卯初春予時因微寒胸膈稍滯鼻塞不暢用荔枝浸酒每飲一杯入蘇叶陳皮湯十分之二服之及數杯無不捷効是則丹溪所謂能散無形質之滯氣也

吳季先治魏司馬夫人感冒發熱頭疼項強遍身拘急脉浮緊医用羌防芎蘇等發散毫無汗意曰浮則緊矣独不按其沉則溢乎且左部尤甚灼見陰虛血不足不能作汗也即以前方如當歸熟地血藥使雲蒸而雨降一降汗如雨而愈

馮楚瞻治常侍衛塚云感冒得之醫以發散繼用涼鮮已五十餘劑粒米不進每日惟飲涼水而已下身寒冷尚木漸致胸腹皆冷而寔手足面目肌肉痛痒不知語言無音难以布息按其脉沉微欲脫令人參一兩附子三錢早晚一服：後倘暫有煩躁無慮也

既而果然之三日間漸即相安脉稍起肢體之冷亦非若前之徹骨矣乃以附子理中湯去甘州以胸腹實滿也早晚各一劑以溫米湯墜之數日后冷減神氣稍清早晨仍服前方午后以濃參汁冲服去丹皮加牛膝杜仲之八味湯又數日骨節疼痛不堪曰此陽回水解之象也無復慮矣后以八味加鹿茸靈胫牛膝杜仲為丸加減十全大補湯送之兩月后言語疴有聲三四月后始能步行年餘始能鞍馬常患腹疼必服溫煖之劑而愈

杜仲堂子年十九夏月病感脉之時而洪弦尺弱時而

弦細尺緊乍寒乍熱脉隨寒熱而變也飲食即吐靜則吐少

減動則吐更甚詢其病由因偶雨冰雹駭而出視背

上受寒發散和解不効繼用清熱之劑內有黃芩山

芎服后即發嘔矣蓋暑天感寒中表之氣不固可知

况先天薄弱兼梁嬌養只宜溫中調理寒邪自散不

知出此致夏鬱火升兩耳之下斬腫及頰又悞為實

火清以寒涼釜底之火既浮中宮之陽復損尚堪延

納飲食乎今欲溫中間胃則耳頰之腫疼為礙何用參朮

姜附奏効非欲滋陰培本中脘之道路不通初用

八味加牛膝麥冬五味大劑冲人參十服下即吐改

用人參炮姜附子為末以焦白朮熬羔略入姜汁和勻為凡少、參湯吞下幸不吐頃之腹疼大便知其氣下行吐可止矣次日仍以昨煎方作大劑人參湯飲之日用參兩餘出入加減漸愈后以地黃歸脾二湯間服安

李士才治一人勞神之後煩躁大熱頭疼時作時止非便

外感 醫者禁其飲食与之解表見四日熱不退欲與攻

裡診之日脈不浮緊安得表耶又不沉寔安得裡耶

惟心部大而溢此心勞而虛煩乃類傷寒非真傷寒

也亦非類寒宜曰此內傷非外感也若禁飲食即餓絕矣便以粥與

之更進歸脾湯而安

張三錫治一人熱而頭身疼七日不已疑是下疰診得

左脈浮緊且時惡寒仍屬表熱投大羌活湯加蔥姜

遂汗出而愈一人疰同此多煩躁時值爰月與六神

通解散汗愈

張路玉治太倉夫人素患虛羸骨蒸經閉少食時偶感

風熱咳嗽悞迫滋陰清肺二經劑遂昏熱痞悶異常

凡素患虛損人忽有外感宜細審之診之入迎虛數氣口濡細寸口瞥

瞥兩尺搏指此肝氣與胃氣皆虛復感風熱之狀與

加減蔥白香豉湯一服熱除痞止但嗽則頭面微汗

更与保元湯而安

王氏子四月間患感冒昏熱喘脹便秘腹中雷鳴服硝黃不應脈之氣口弦滑痰按之則亢乘其腹脹滿按之則濡濕此痰濕挾瘀濁陰固閉之候与黃龍湯去芒硝易桂苓半夏木香下痰垢甚多因宿有五更咳嗽更以小劑異攻加細辛潤之大抵腹中奔响之症虽有内实当下必無燥結所以不用芒硝而用木香苓半也用人參者借以助胃氣行其藥力則大黃輩得以振破敵之功非謂虛而兼補也当知黃龍湯中用參則硝黃之力愈銳也

錢慎所素有内傷因勞力感寒發熱頭痛表散數劑胸膈痞悶不安以大黃下之痞悶益甚更一医用消尅破氣藥逆傷胃氣遂厥逆昏憤勢漸危脈六部索如蛛絲舌上焦黑燥涸異常此熱傷陰血不急下之真陰立槁抹無施矣因以生地黄、連湯去苓防風加人中黃麥冬酒大黃另以生地黄一兩酒浸搗汁和服夜半下燦矢六七塊天明復下一次乃与生脈散二劑以后竟不服藥日進稀粥調養而大便數日不行魄門迸迫如火令用導法通之更与異攻散調安

楊乘六治沈氏嬾感症身熱口苦脇疼頭眩或以表劑
發散身熱益盛舌黑唇焦口渴煩躁手足腫疼大便
艱澀小便短赤眠食俱廢脈之浮數無序乃肝鬱致
感因發散大過血少陰虛而火燥生風也以滋水清
肝散倍熟地二劑諸症悉去次用歸脾湯去木香加
白芍丹皮調理而愈踰年產后復因勞力致感乃恐
蹈前轍不敢發散一味滋陰致漸大便不實飲食不
進氣促如喘日夜不眠合眼即見一白髮老嬾坐立
面前胸中戰跳恍惚不安仍邀診曰脫陽者見鬼非
真有鬼也蓋陽氣大虧則神不守舍其所見者即其

不守舍之元神也所以病男必見男形女病必見女
狀且虧在某藏則某色獨見脈之脈浮如絲沉則緩
大無力面色晁白眼光發散舌胖而嫩且白滑此中
虛挾感逼以寒涼致陽虛氣益虛而陰氣乘之耳乃
與參附養榮湯倍棗仁白芍五味服訖則老嬾不見
而熟睡矣繼用補中益氣加白芍五味數劑全安
為病即類傷寒也亦並表裡然多內傷重而外感輕
以元氣壯實者即感而易已也抑或軍施汗下消尅
以致危篤諸家不無妙用而要以楊氏為最
簡某病感症發熱飽悶神思昏沈更衣八日未能矣諸
發表攻中不効且益甚脈之滑而有力面壅熱通紅

氣粗舌胎黃厚而燥按其胸微痛此感症兼食俗名
停食傷寒是也乃用逍遙散加熟地二兩或曰如許
發熱又煎飽脹補藥可遽投乎曰此非補藥乃發表
攻裡之劑用之以代麻黃桂硝黃者也此法固妙要
當附子發散
攻中之後第服此則汗至而便通熱自退脹自除矣一劑
淋漓汗下二劑下黑矢十數枚諸症悉愈或問其
旨曰此症初起本一道遙合小柴胡養肝開肌助脾
消食則愈矣乃風濕混表腸胃乾枯宿物燥結愈不
能出所以仍用逍遙重加熟地養陰使陰氣外溢下
潤則汗至便通矣用六君歸芍而安

吳某病感症先微寒繼熱頭疼惡心吐沫不絕脹悶
懶言氣難布息四肢麻木痠疼腰疼如折眠食俱廢
大便亦秘結俱感輕傷
重之候醫與清暑解表消食益氣益
脹不時暈絕脈左手沉細右手緩大皆無力面晝白
舌胖嫩且白滑知其多慾陽虛致感也與養榮湯加
附子或疑熱甚益脹而投溫補令但服此諸症自然
退若用芩連枳朴則真悞事矣一劑即卧醒則大叫
冷甚比及半時汗出如雨再剖胸寬食進便通熱退
又以兩腿外臚向生瘡腫消皮爛臭膿水淋漓痛痒
甚一切膏丹洗貼不愈已六七年問治當何法曰病

有內外源無彼此。因陽氣素虧不能下達毒氣時墜不肯上升故也。第用前方作凡久服則陽分充氣血和則毒自出瘡自斂矣。

潘某自京回南勞頓感冒發熱時作微寒發散數劑熱漸熾改用清火養陰數劑熱轉甚比到家舌胎已由白而黃由黃而焦乾燥裂黑如炭色神思昏沉手足振掉撮空自汗危症。蠅集矣。醫見其熱勢謂寒之不寒是無水也。與六味飲不應見其舌色謂攻代太過胃陰乾枯也。與左歸飲又不應脈之左關尺細而緊右寸關大而緩。舌浮胖謂症乃陽虛火衰非陰虛火

旺也。蓋陰虛火旺者其舌必堅斂蒼老。今雖焦黑乾燥而見胖嫩且服六味左歸而症反加。反加二字母乃太過其為陽虛無疑矣。以養榮湯用人參五錢加附子三錢一劑熟睡竟夜次早舌上胎尽脫變為紅潤滑嫩矣。原方減人參二錢附子一錢五分四劑回陽作汗而愈。

戴氏子年二十四病感症寒熱或用發散詎妄發狂又以苦寒下之危症蜂起又有用二冬二地石斛黃芩者五六劑益狂悖不安診之面白無神舌滑無胎脈細緊無力知其臟寒真陽欲脫以養榮湯用人參五

錢加附子五錢又知其必為旁議所阻也噉其于后
至申察病人足冷過膝則亥子之交不可言矣已而
果然乃自戌至亥始尽劑子時后由腰至足漸溫五
鼓進粥半杯而熟睡矣又十餘劑諸症悉愈未半月
忽右足大指旁大敦隱白所在乃肝筋縮而痛外科
与乳香未為疼甚呼號再診之乃用思慮傷脾人但
不知謀慮不能榮養本經筋脉所以筋挛燥痛也以
又傷肝也歸脾去木香加白芍而安

陸氏子病感症發熱咳嗽發散轉甚氣短如喘痰涌如
潮甚至詰妄撮空脉之輕按滿指重按則空面色晁

白眼眶寬大神水散漫舌胎嫩黃中間焦燥兩手振
掉症由氣虛致感悞用峻表致陰被刻而將亡陽無
附而欲脫非救陰揖揚不能挽也乃用左歸去茯苓
加人參五味大劑濃煎服訖即睡六時候方寤：則
身涼嗽止喘定痰消繼以生金滋水飲二劑養榮湯
四劑全痊又其母孀居卧病不起二載矣或作濕或
作痞治之不効并乞診之脉緩大無力面色痿黃古
胖而滑詢其飲食不思略食即飽夢中常見鬼神醒
則胸中战跳否則其如所言此命門火衰元陽虛墜
脾土不生以致四肢無力不能運動也亦用養榮湯

煎送八味丸而安

沈某病感疰身熱自汗或乍寒倦卧懶言手足心熱日
輕夜甚或與發散愈甚口渴語煩燥便秘又襟進
寒涼解毒等劑勢垂危脈之洪大而數按之不鼓面
色漫紅游移不定舌黑而潤手足厥冷此假熱疰也
與八味飲加人參諸醫以火疰悉具力爭參桂附子
不可服曰外雖似實熱內實虛寒初誤發散令津液
傷而口渴便秘煩躁詎妄復用寒涼重陰下偏致危
雷之火不安其它非人參桂附何以挽回公等不信
但以附子作餅熱貼臍間時許便竟稍安矣外試
妙試

之果然乃進藥不及時而紅立退詎妄煩渴悉除
次用生金滋水補中益氣調理而愈未半月其父亦
病感疰危甚延楊驗其舌黑而枯滿時偏裂人字紋
曰脈不必診也驚問故曰此腎氣湊心亦八味疰也
誤用苓連無裨矣蓋昨一日夜果服苓連兩許問何
以知之曰舌上明現出耳姑求一診以冀萬一日
卒

諸某年五十四冬抄因勞力致感頭疼發熱時作微寒
緣混表太過口乾便秘壯熱不退復用苦寒瀉火頭

汗如油不餉脫斷口角流涎鼻声如鋸語言錯乱甚
至循衣摸床撮空諸悉惡脩脉之洪大躁疾重按全
無舌糙刺如沙皮焦黃如烘糕并舌底俱乾燥斂東
如荔支肉而滿舌却甚胖壯日進稀粥椀許大便半
月未行乃曰若論外象百無一治幸脾氣不泄胃氣
不絕尚有生理第服葯后神得收斂而睡脉得靜細
而沉乃佳遂以大劑養榮湯重加附子与之服訖果
睡脉亦和四劑舌轉紅潤惡症悉退頻進稀粥惟交
陰分尚有微熱或疑陽葯助火欲去者木桂附日勞
傷脾肺氣虛發熱非甘温不能陰方嫌火力不及不

能蒸土回陽推出陰邪耳俟其力到地氣升而為雲
則天氣降而為雨頃刻為清涼世界矣守方十二劑
始战汗：后身冷如水問之不應推之不理或問其
故曰此病既到今日斡然不死不過汗后虧其衛外
之陽故身倦懶言無氣以動子刻自平復已而果然
次日欲便扶至圍虛坐弩責数次忽小水不行點滴
不能出少腹脹疼不可言此因大便弥月不行腸胃
所積已多今頻加弩責將宿物推併大腸致壅塞寒勝
脱所以癰閉不出也妙解須以輕清之劑升奔之則小
水自利立煎補中益氣与飲頃刻即通大便亦潤繼

以養榮作凡補中煎送而安

馬元儀治沈某發熱惡寒頭身俱疼燥渴詰語脈之洪數而澁此外感而病危者以五志過極陰氣未虧邪復乘之重傷其陰而火熱愈甚也先與鮮肌一劑惡寒已而熱未除詰語更甚神魂飛越蓋肝藏血而舍魂心藏脈而舍神木火太過不獨自傷且賊真陰之氣以肝腎為母子其氣相同也心奉制于腎而亦傷腎者藏邪暴甚反侮所不勝也法當養肝之陰使不誅求于腎而水自充抑心之陽使不擾亂乎腎而水以安用生地知母甘州茯神丹參貝母花粉等一劑

知三劑安

丁某病經二十餘日脈之左手弦數兼澁右手澁結少神發熱神昏詰語胸中滿結中疼拒按舌胎黑刺而色枯燥時有喘嗽日晡愈甚此肝木內鼓心火上炎肺金失養而胃土無滋也用瓜蒌枳殼半曲芦根汁紫菀杏仁蘇子等服后倦卧片時神氣少清治脈亦透但澁象不減重按少神古上胎刺去而復生此津液元氣枯竭之甚轉用人參三錢生首烏一兩知母生地川連芦汁兩劑脈澁減症亦安但胎未盡去中脘滯悶前方加枳實查肉一劑而已改用滋陰補虛

之品二劑諸症悉退右脈向和右脈轉浮而數微恐發疹此正氣復餘邪悉從外達也與荆炭牛蒡乾葛防風杏仁桔梗蘇子薄荷清透之品經云因其衰而彰之意也二劑后再與益元氣滋陰燥調理而痊婦人四旬外頭疼發熱口乾便閉不眠已月餘矣此邪風外煽寔熱內燔表裡邪結之候也前所用藥仍是發表攻裡而不愈者為不勝病耳今上下分消表裡交治而于攻發之中仍用溫養散汗不傷于過下不傷于峻也用荆防薄荷麻黃輕揚發表使邪從汗而散于上大黃芒硝梔子滑石通幽利水使邪從便

而泄之于下黃芩連翹清其上白朮甘州和其中桔梗石羔開其肺川芎歸身養其肝一劑而減三劑而安

安氏子年二十初得惡寒發熱身疼症診得內傷之脈而顯陽微之象曰此病枝叶未害根本先撥乃陽虛受邪症也若誤行表劑則孤陽飛越而危殆必至當用參朮等大培元氣以揖虛陽加桂枝透表以散外邪不信越四日發熱不休自汗不止神氣外揚或且欲用柴胡疏表之劑乃曰此症似太陽而得少陰之脈當是平素下虛故真陽上越耳遂定參朮建中湯

或復謂外邪初入太陽表散即愈若徒進參芪遠助邪而滋患也越三日症變危篤再診脉几微欲絕汗出如雨昏沉欲脫此非大劑溫補不能挽回以人參六兩合附桂理中湯連進三劑汗少收脉微續然神氣尚未安和也復用人參三兩附子五錢方得陽氣內充餘邪尺從外達兩頤透發而安

琇

按是症固屬虛而邪熱原有或与表散未嘗無功至汗出脉復第与大劑養陰其病立已乃恣用桂附遂至發頤尚謂善治哉

感症

楊氏子年二十餘四月初以啖麪過飽午睡竟即身熱頭疼醫与消散至七日而愈兩日後因食水團復病仍与消運不應乃以小承氣下之連去糞水二次二劑皆無燥矢更医与厚朴山查陳皮枳壳之類穀芽用至兩許月餘病不減而股內尽脫枯瘡如柴不食日進糜湯數杯寒熱往来小便亦少最后一医教用胆箭導之胆入而糞不出又用燭蠟探之燭化而糞亦不出其胆汁与燭油凝注下部楚不可堪號呼之燄四鄰為動時已四十餘日方治本邀診以决早晚

察其脉弦而迤：尚有神氣其声尚明亮按其腰不
拒至臍下若有物築：然振手解衣視之状如百錢
梗起其父曰此必宿食不下而然曰非也糞穢在腸
豈能跳動此緣悞下悞消傷其本元肝腎之氣不藏
橫豆奔突經所謂動氣是也幸屬少年尚可治熟地
一兩五錢肉蓯蓉五錢甘杞子一兩麥冬當歸各三
錢三劑下黑天塊尺餘者二胆汁俱去號呼頓息始
得睡再按之則若百錢者仍在再与前劑不減令辨
参数錢勉措十金僅得錢半煎調前藥服下遂泯然
立能進食惟寒熱每日一作知非本病必卧室秋隘

天氣暴暑乘虛感瘧也且勿亟仍与前方減半數日
后飲食大增乃以尝上二錢火酒炒透五更煎服寒
熱亦止

湯某年四十餘新秋病感冒醫屢發散至七八日無汗
脉弦數且長身重頭眩尿少而赤鼻乾不眠微熱而
渴此邪漸入裡腎陰不足肝脾血燄表之則不能作
汗下之必成壞症既非少陽無庸和解問欲飲水手
曰甚欲而不敢飲命与一大盞犹竟未足再与一小
盞今且勿藥逾時許汗果大至身冷如水急再診脉
之虛細而弦少腹旁跳躍振手以動氣也緣多服表

散令汗出邪去而虛症見矣与生地杞子等峻養肝
腎二劑全愈

陳士華兄武生也值鄉試伊迹日与朋濟練習技勇忽
感冒医治月餘不効脉之弦大而澁外症已不發熱
大便秘小便少兩頰深紫若胭脂腰疼口乾不欲食
所服葯類皆燥散之品此少陰不足勞傷外感治之
失宜熱邪內陷法當內托令其汗出自愈用熟地生
地杞子各五錢麥冬三錢萸仁二錢黃芩一錢石斛
三錢傍晚服下黃昏忽胸膈脹悶欲絕躁擾異常其
家大懟以為候補必死矣怒持葯甌擲之門外環視

涕洟一更后忽大叫汗如雨衣俱濕汗止即索粥連
進兩碗已而酣睡達明旦晨延診脉已負滑頰赤亦
退第困之無力且因問夜來腹悶汗出之故曰病由
前為劫其津液外邪乘虛內結今以大劑甘潤投之
即借其熱結之力薰鬱勃發乃一涌而汗出邪散此
所謂內托之法也令前方再服四劑病即起矣如言
而愈

李韞玉母年已四旬素有脇疼肝火之病深秋感冒醫
与表散數劑熱未退以不大便投大黃元明粉下
之遂脇疼大作暈厥欲脫更用人參附子乾姜肉

桂苓厥止復煩躁汗時出不眠小便短澁仍虛脫目
投參朮姜桂每汗出則加五味黃芪龙骨以斂之又
時欲痢則加補骨脂肉豆蔻以固之如是四十餘
日已服參朮兩病益進而食不進診之脈躁數時大
時小微有寒熱古黑而弦鼻煤溢出塗黴頰唇口如
墨小便惟點滴兩手索刺如柴第神氣不昏語言犹
亮此由表邪未清悞下邪陷入裡且傷其真陰致肝
急而厥又悞投辛熱固澁令熱邪與熱藥鬱結藏府
今幸死氣尚存犹可活也治法仍當汗下否則邪何
由解正何由復或訝曰是疰瘴可再團攻表乎曰不

可第可用不攻表之汗下疏方以生地杞子各五錢
麥冬二錢沙參三錢萸仁一錢半黃苓一錢或謂前
醫深恐泄瀉今所用葯一派寒滑服之必利下無疑
將弗服又或曰前醫治經月餘且諱吐治曷進此以
窺進退服二劑果痢數行然病人殊不困遂日進一
劑四日則痢下頓數腹疼后重日夜十餘次所下穢
惡不堪青紅黑白而黃者絕少惟飲食少進舌本少
柔鼻煤少退小便漸長仍前方加熟地五錢黃連五
分夜乃汗出其汗亦極臭穢半月餘汗乃止漸減
乃加生熟地至一兩減黃連增白芍甘州凡五十餘

剖病始痊

姚氏娟年逾四旬素有胃疼疾蓋肝火上逆也夏日患感冒 熱頭痛眩暈不眠善嘔初服發散未減改用二陳左金治嘔未愈而腰連少腹痛不可忍議為邪入厥陰症將危殆欲用四逆回陽之劑診之脈微數而弦于見紅疹面珠清白舌兩旁及尖皆紫色中則微黃口乾不甚喜飲斷為肝胆之火熾盛遇暴寒折之不得宣洩乃上沖胃絡作嘔故頭疼偏甚于左紅疹見于四支者木鬱則乘脾也其初與逍遙自愈乃與煖散之劑更擾其陽而傷其陰是以腰腹窘疼

症本厥陰然非傳經亦非直中也今標屬陽明宜用竹叶石膏湯入枳子一兩飯下嘔止腰腹之疼亦止惟頭疼仍在改與逍遙湯加川芎當歸時方雷雨至夜半忽霹靂一聲病人竟四肢酸脹異常此少陽之鬱本諸外淫因雷得發越也已而頭疼如失次日診之脈既和予與四物去川芎加女貞石斛平調而安余表甥常病疫因熱深厥冷一名醫亦與四逆散幸病家未服用小柴胡合白虎而愈

俞氏娟初夏病感症天癸適來病隨愈蓋熱隨血去也越七日遇端節食鷄子五个酒二碗又進飯一碗臨

憲少坐少頃即頭疼發熱次日前醫詢知病原以山
查三錢穀芽二錢葛根三錢其他消散大約祿是連
進三劑勢忽大劇亟余至則前醫已在與一鄰醫議
處方診之已昏不知人面色死青呆白目閉口張氣
出手撒呼之不應脈如沸羹重按則無症已敗矣幸
未大汗令人以手按其心下亦不拒知其病初愈臟
腑之熱未清食入腸胃一時不能運化又感微邪遂
如復症便勿藥則展轉自愈乃悞以大劑消散投之
元氣靈弱之人鼓動其火反致長熱不退猶以為藥
力未到再進三進至陰陽脫離如是叩其今日將用

何方則云總是鷄子五枚硬飯一甌為患既消散不
應惟有承氣一方下之為已曰承氣因是第真元已
奪恐宿食未下而遽脫奈何乃曰正為此耳曰余有
一方且勿頌其病但服之令病人目開口閉神氣稍
回再為調治何如二醫欣然肯諾乃用熟地一兩六
錢當歸五錢炮姜八分囑其急煎服遲則不及第得
藥下咽則活矣抵暮來告病者不知飲藥以匙抄灌
數口喉間咄咄有声遂全蓋頃與少頃果目開口閉
能轉側似大有生机求再往診曰無庸但四劑方再
判一劑并前查濃煎與服可也明日視之神氣清明

脈亦圓穩弟祢口燥舌乾小便短澀夜卧不安就前
方去炮姜加沙參麥冬一服汗出遍身能進粥矣再
以前方而愈



傷風
暑濕

續名醫類案卷七



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷七

傷風

錢唐魏之瑋玉橫輯 男鈺編次

孫文垣治王祖泉乃眷朝飯后稍寒惡風發熱傷風思風思風遍

身疼痛汗大出不止傷風則口中熱腹中不知餓小

水短即氣不利而汗多也六脉皆虛營衛不和投以白芍五錢白朮

二錢桂皮黃芩各一錢甘州八分二帖汗止寒熱除

去白朮加當歸身病亦愈

費一吾六弟媯一身疼發熱汗大出昏如醉卧不能

起孫診之兩寸短弱六脉皆數而無力此勞倦之餘

故汗大走也身疼發熱乃屬傷風黃耆三錢白芍四錢甘艸一

錢五分桂皮八分當歸一錢石斛二錢與前案俱就建中加減孫

子樸症多一帖熱除痛汗皆止惟倦不能起前方加

人參陳皮兩服而痊

一婦人先傷風發熱咳嗽二日乃分媿熱尚未退食鷄

汁肉等太早嗽熱愈盛已八日矣胸膈脹疼頭痛口

渴大便秘肺氣壅而血液燥也嗽出之痰色黑而臭小水短多

脇下扯痛氣逆而喘不得卧右脇不能著蓆汗出不

止症甚危以瓜蒌五錢蘇子一錢枳壳酒芩各六分

前胡桔梗各五分甘艸三分姜三片製方甚妙服之胸膈

痛減半喘稍定再進前葯大使用蜜棗調不能用大劑生地乃

出此熱退而愈

胡鏡陽尊堂年七十二脾泄十五年不愈近加吐紅咳

嗽痰多痰不易出肺金壅滯可知申酉時潮熱胸膈壅塞不

不能就枕飲食大減且惡風終日坐慢中醫謂發熱

吐血法當寒涼脾泄多年氣虛老葯法當溫補二症

矛盾难于投劑且身熱脈大血家所忌束手無策皆

辭去孫診之兩手脈皆浮洪而數皆帶滑据脈洪數

為熱滑為痰浮為風邪在表以陽風故惡風法當清

解可無恙也謂二病矛盾者暗子先後者也夫脾泄

已久未嘗為害新病熱熾宜當連去所謂急則治標
候邪去後補脾未晚且朝熱為風邪所致之熱非陰
大虛動之熱吐血乃當汗不汗之血非陰虛火動之
血經云奪血者無汗奪汗者無血當汗不汗之邪血
動但得表解熱退血自止耳胡曰昔老母過錢唐遇
風濤受驚因發熱咳嗽血出瘦多今以公言質之誠
由風邪起病也用蘇子前胡麻黃薄荷鮮表為君枳
殼桔梗桑白皮瓜蒌紫菀貝母消痰治嗽為臣酒苓
甘州為佐二帖五更微汗而熱退胸膈不壅嗽亦少
減血止火半始進粥次日減麻黃加茯苓夜服七劑

化痰凡嗽又咸半自是不惡風而去慢矣前方減枳
殼加苡仁而安

黃履素曰予弱冠患傷風不遠床第每晨起即鼻重流
涕竟日度不絕口留連月餘遂見瘦中縷血遺害無
窮諺云傷風不醒結成癆蓋金水二藏情閉子母金
傷則不能生水子瀉則其母愈虛水不能制火之乘
金而金益敗此勞嗽之症所由成耳信乎傷風虽小
病最不可不慎者故補脾保肺乃養生家第一義而
肺病極宜斷色慾相閉相應捷于影響

又曰予臨傷憲不耐風寒合玉屏風散之服及自汗津

津不止蓋防風與黃耆各等分之繆也奉州云黃耆得防風其功愈大用黃耆七分配防風三分斯得之矣

凡傷風未經和鮮此方斯不可服慎之

俞嘉言治石開曉傷風咳嗽未嘗發熱自竟急迫欲死呼吸不能相續診之見其頭面赤紅躁擾不歇脉亦豁大而空謂曰此症頗奇全似傷寒戴陽症何以傷風小恙亦有之急宜用人參附子等藥溫補下元收回陽氣不然子丑時一身大汗脫陽而死矣渠不以為然及日落陽不用事愈慌動不能少止忙服前藥服后稍安片刻又為林側添同寢一人偏出其汗如雨再用一劑汗止身安咳嗽俱不作詢其所由云連服麻黃葯四劑遂而躁急欲死然后知傷風亦有戴陽症與傷寒無別摠因其人平素下虛是以真陽易於上越耳

傷風而服麻黃四劑即壯至矣人亦不能無害矧者虛下哉○此人既為麻黃所誤

大傷肺臟凡成脫症俞君以參附治之即收一時之功后必不起此弦外之音淺又不足與言也

虛不遠治嚴忍公內人病發熱無汗傷風亦多無汗嘔吐不止

脉及沉弱傷風脉當浮今沈故曰反人皆以為少陰症盧脉之沈

弱中弱右關表弦而中滑蓋風邪挾胃中水飲停積所致用乾薑半夏吳萸黃連急煎緩服嘔吐遂止而熱轉盛復診視脉勢欲浮命其進粥皆不敢予再三

強之呷濃米飲半杯遂有汗而熱平再進薄粥汗多而熱退乃問曰風寒之邪世俗大禁飲食今啜粥而熱退何也曰風之與寒原自有別世蓋溷之耳仲景桂枝湯治風服已啜粥右人之精義也蓋風者木也木尅土脾胃受之仲景法：妙在不治風水直欲濕土氣行而風水之邪自散今熱轉盛而脈勢欲浮是風邪欲散也非穀氣揚溢則胃力孱弱汗何從來是借桂枝之義以除風邪之不能汗者

按傷寒及感症日久津液既枯不能行汗必得大劑三才一氣湯一服乃蒸變為汗而愈若多服風

藥及香燥者藥入必大作脹一二時許然後蘇後腎以此為內托之奇予謂仍是仲景啜粥法耳後人安能越右人之範圍哉

吳浮先治盧敬庵暑月傷風服羌防發散汗出已愈後復感冒又用發散旋愈旋感前藥不應吳曰屢散不愈肺氣已虛徒攻表而不救裡表風邪乘虛而入無已時矣方用苦黃耆五錢寔肺氣以固衛位防風一錢助者力以祛邪玉屏風散如是則舊邪無所容而新邪無可入也二帖而痊

愚謂傷風一症殊非小恙有寒煖不時衣被失節

而成者此必鼻塞声重咳嗽多痰在元氣平和之人即弗葯自愈有等腎水素虧肝火已然不過因一時風寒所乘遂作乾嘔喉痛此外邪奔輕內傷寔重醫者不察縱與表散致鼓其風水之火上交反令發熱頭疼繼又寒熱往來益與清解不至十劑肝腎與肺三藏已傷損無遺久者周年近者百日溘然逝矣而世俗設者咸以傷風不醒便成癆為言噫彼癆者豈真由傷風而成也耶愚謂繆也當易之曰傷風悞表必成勞耳

柴岫青曰乙丑新正張妹壻家人之壻董四患傷風咳

嗽來寓求診即決其不治內人曰彼少年粗人傷風小病何遽若此柴曰脉象已敗不可為也后果歿

肝腎大傷之候也

張三錫治一人傷風自汗發熱不止自以為虛服補中益氣湯熱轉劇診之脉弦而長實有力與麻葛根湯

倍曰芍加桂枝少許一劑汗止熱淨 治法彙

一人瀉而左脉浮急自汗鼻塞乃傷風作瀉也與五苓散加防風白芷升麻葛根姜葱煎服 全上

陸肖愚治吳遜齋夫人年六旬外素有脾泄之症三月間患咳嗽吐血瘦多而咯之不易出日晡潮熱胸膈

支結不能就枕畏風畏寒或以脉數吐紅身熱咳嗽
皆血虛火盛也與養血清涼症不減而脾泄頓甚或
以高年久瀉豈宜清涼與六君子湯泄未已而瘦瘠
益加遂一以吐血不宜身熱一以泄瀉不宜身熱脉
大俱辭不治脉之左寸閉浮洪右寸閉滑數而尺弱
此表邪不清也蓋脾泄乃宿疾吐血乃表氣之鬱耳
詢之果受風數日而病作用炒黑麻黃蘇叶前胡
解表為君杏仁蘇子陳皮利氣為臣桑皮片苓花粉
石羔清熱為佐甘艸桔梗散膈和中為使二劑即微
汗症頓減去麻黃蘇叶石羔加白芍茯苓二劑症如

失與凡方治其脾泄人參白朮茯苓為君白芍霞天
曲為臣炙艸乾姜砂仁為佐粳肉神曲糊為凡以為

使服數劑而痊

此與孫紫胡
敬陽世同

陸祖愚治陳理刑因勞頓後頭疼鼻塞咳嗽胸膈不利
咽乾身熱行動則有微汗有瘦不能咯出兩寸浮弦
而數左關弦緊右關弦滑兩尺平和先用疎解利氣
二劑繼加養血二劑而愈

薛立齋治一媼人素清苦動于女工因感風邪自用表
散之劑反朝寒暮熱自汗盜汗形氣甚虛其脉或浮
洪或微細其面或青白或痿黃此邪去而氣血愈虛

也用十全大補湯三十餘劑漸愈又用加味道遙散
兼治半年而痊

琇按傷風候表多成勞損現此可鑒

林觀子治一人浴後被風遂自汗出兼身熱然無頭疼
体痛惡風諸症旬日來謀治皆不效其胸以上痞膈
漸至湯飲到喉而止脉之關以上微浮此瓜蒂散症
也其人素虛与桔梗芦一两煎服到咽一吐悉涎濁
酸穢之物又与一服再得吐始快然熱遂除調理數
日而安

馬元儀治毛氏子傷風喘嗽復以飲食起居失調遷延

轉劇診之面色枯白夢洩不禁飲食減少喘嗽發熱
兩脉虛微知其喘為真氣上脫熱為陽氣外散不与
陰氣純虛者同面色枯白脾肺氣虛而不榮也飲食
減少脾胃氣弱而不化也夢泄不禁腎藏氣衰而不
固也此皆本氣為病用人參三錢黃耆三錢肉桂五
分炙艸五分茯苓一錢半曲一錢橘紅八分服數劑
喘漸平熱漸退隨与大造羔調理飲食進而神旺如
初

朱翰文偶患風寒小恙或以麻黃大發其汗出
不止遂致言語短怯神氣不收面色枯白時有寒熱已瀕

危診其兩脉微澁而虛：則氣少澁則陰傷此元氣
津液所傷之候也傷風小症何遽至此蓋以麻黃辛
甘氣溫為傷寒發汗重劑今不當用而用之不特劫
其津液外云并元氣亦因之內脫矣治法宜陰陽兩
補用人參製首烏茯苓白芍丹皮甘艸廣皮半曲等
三劑脉象有神諸症漸已漸加耆朮而安

劉雲密曰丁酉臘人病頭疼惡寒鼻出清涕兼以咳嗽
疫甚一時多患此用冬時傷風之劑而愈者多固然
殊治者亦不少蓋是年君火在泉終之氣乃君火客
氣為主氣寒水所勝經曰主勝客者逆夫火乃氣之

主故雖不同于傷寒之邪入經然寒氣已逆而上行
反居火位火氣不得達矣所以雖同于風投以風劑
如羌活輩則反劇蓋耗氣而火愈虛也至如桂枝湯
之有白芍固不得當即桂枝僅洩表實不能如麻黃
能透水中之真陽以出也故愚先治其標用乾姜理
中湯佐五苓散退寒疫寒水之上逆乃治其本用麻
黃湯去杏仁佐以乾姜人參川芎半夏微：取汗守
此方因病進退而稍加減之皆未脫麻黃但有補劑
不取汗矣

但有句
糊模 病乃霍然

耳聾久吾曰一友以醫自負稟性素熱慣服涼藥在京朝

觀因傷風久嗽求方于予：曰嗽因風寒必先除寒
邪而後可以清熱先用桑杏麻黃防風等彼自是已
見以為素不用燥藥單用皂芩花粉等涼藥服多一
日声啞不出復求治乃戒之曰公能任吾意用藥勿
參已見則声可立出若必自用不敢與聞彼不得已
而聽予因與加味三拗湯一劑未畢而声出矣棗仁
二錢半麻黃二錢生甘草五分羌活桔梗各八分防
風一錢生姜三錢水煎帶熱服

傷風

孫敦夫女十歲許冬月感冒微嗽耑科與發散太過反
致長熱不退更醫投六君子加炮姜五味一劑熱退
矣而咳嗽轉盛下利頻併裡急后重中有白膿醫以
熱退為藥對症再與之則面赤口燥惡食不眠余適
診其大父因求視脈之虛而駛曰四劑可愈然必少
衄血與生熟地杞子各四錢天麥冬姜仁各錢半乃
說曰今病已洩瀉又從而滑利之寧不增劇乎余笑
曰但服之病自減乃姑進半鍾竟嗽利稍瘥遂連進
二劑果愈四五再以前方加酒芩酒芍各一錢二劑

衄血小蓋全安或問故曰見稟素弱所病即俗名火傷風也不治亦愈乃以荆防廣半芎蘇前桔諸燥竅鼓動其三焦之火至擾陽而熱感后醫謂虛是矣宜以甘寒潤降与之則症自平乃用六君燥補加以炮姜之辛溫五味之酸斂雖藉人參之力而熱退其內燔之火尽入于肺若傷寒傳裡然肺熱甚則下迫大腸而為痢矣其中白膿乃燥金壅熱所化与痢疾正同茲但養其榮氣潤燥清熱病自愈也又問何以知其当衄曰初時下痢則火從下泄痢止餘熱反走諸絡而上溢否則炮姜五味之性何由消釋其衄也亦

猶傷寒陽明熱邪得衄汗而解耳

暑

許叔微治一人頭疼身熱心煩燥渴診其脈大而虛授以白虎湯數服愈仲景云脈虛身熱得之傷暑又云其脈絃細乳遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脈虛弱所謂弦細乳遲者皆虛脈也仲景以弦為陰朱龐亦云中暑脈微弱則虛可知

醫案當以許為古今第一

張子和治小鄭年十五田中中暑頭疼困臥不起張以雙解散汗之又以米醋湯投之未解薄晚又以三花神祐凡大下之遂愈

張叟年七十一暑月田中困飢因傷暑飲食不進時
嘔吐口中當流痰水腹脇作痛医者概用平胃散理
中凡導氣凡不効又加針灸皆云胃冷乃問張曰
痰屬胃熱不收故流痰水以公年高不敢上涌乃
使一筋探之不約而吐去痰沫一升次用黃連清心
散導飲凡三露散以調之飲食加進惟大便秘以生
姜大棗煎調胃氣湯一兩而安

萬密齋治縣丞李天泉六月中暑腹疼渠有婢妾匿謂
病寒進理中湯一劑疼止乃發熱一身骨節尽痛又
進十神湯發汗熱退身不疼矣萬侯之李称病安現

其面色帶赤知病未解請脉之洪滑而數

色脉相對經曰

火者病進今汗後脉犹洪數病方進也而彼自称愈
萬去未食頃而病作矣滿腹急痛狀如奔豚上下左
右衆手按摩亟萬全曰汝先診脉不言而去知我病
也幸急救我萬曰無傷乃進建中湯一服而疼定次
日有省祭官萬朴來問疾朴善醫診之且駭且顧李
亦疑懼萬診之謂朴曰汝怪其脉之促止乎蓋心下
怔忡故脉如是耳李即應曰我心下跳乱不寧即命
取藥方用人參麥冬甘草白芍生地五味猪猪心煮
湯煎一服心跳止脉不促矣蓋心惡熱用熱愈熱向

服理中十神皆犯時禁故病復作也

李少華知醫六月得暑病服几味羌活湯一劑汗出不
解謂為劑小發汗不透復作大劑服之汗大洩而熱
轉甚連進三劑病益亟如癡如狂舌強言語蹇澀手
足掣動小便不利莖中痛以手捏之總下一二滴不
能食惟飲水萬脈之微弱而遲或問病可治否曰壞
病也醫之過耳心惡熱壯火食氣方合盛夏火氣正
壯而重發其汗之過多則傷心之藏神如狂如癡
者神氣亂也非畜血舌內應乎心汗多則血虛不能榮
舌故強不能言也手足掣動者汗多筋惕內關也非中

風渴飲水者汗多津液涸非陽明發渴小便不利者心移

熱于小腸小腸移熱于膀胱大腸津液少而氣不化故莖

中痛而溺不出也非水畜淋秘乃用人參以補元氣當歸

生地以養心血麥冬助人參以利竅使溺得行助生

地以入心安神炙甘州以瀉火生甘州稍以去莖中

之痛連服五劑而安

汪懷中受暑復傷食一医用五積散發其汗熱轉甚一

医用大柴胡下之熱既不退痢又不止且后重萬診

之其脈浮數而滑外症喜裸体而卧膚燥無汗兩足

冷日前醫之誤汗不出反增內熱後醫之誤下之輕

下未盡而利為挾熱急則治其標用黃芩白芍甘州
作湯而服一劑止復診其脈浮滑而數未改也蓋此
病屬陽明原無汗症因悞汗而成可汗之症原有下
法因輕下而立再下之法方今成夏氣熱乃用五積
散燥熱之劑陽氣外散陰津內竭陽強陰弱故皮膚
燥而無汗當先用養陰以制其陽使汗出而表和遂
以涼膈散去大黃芒硝加知母石膏淡豉竹叶一服
微汗出而身潤矣方誤下之又一醫至稱是陰虛火
動不可下也用四物湯加炒乾姜觸動陽明之火齒
縫出血足冷成湯厥矣乃復作涼膈散服之劑三行

而病痊

龔子才治一婦人暑月因廚房熱極遂出當風處脫衣
乘涼即頭疼發熱惡寒身痛醫悞為傷寒用附子理
中湯一服下咽立時不語口中無氣唇口青紫心頭
微溫診之六脈洪大而數此熱症悞用熱藥令以燒
酒噴其胸將鏡朴之外治法妙更以新汲水入蜜用鷄翎
沃入其口數次少頃患又即伸舌探水以益元湯灌
下即愈

李士材治張邑尊令即六月間未申時暈絕不知人更
餘未甦此得之生冷太過也皂角末吹鼻中無涕奔

家驚惶數以皂角灰存性新汲水灌之更取沉檀焚之香氣滿室以達其竅至子後方甦服十味香薷飲而安

吳孚先治一人奔馳烈日下忽患頭疼發熱或時煩燥汗大出大渴引飲湍急乏氣服香薷飲尤甚此暑症也然受暑有陽有陰道途勞役之人所受者交熱名曰陽暑亭館安逸之人所受者寒涼名曰陰暑所謂動而得之為中熱靜而得之為中暑也香薷飲只宜于陰暑若陽暑服之反為害矣與人參白虎湯而愈董仁仲當暑天納涼飲冷忽頭疼發熱霍亂吐瀉煩燥

口渴舌胎白滑此陰暑也得之過于寒涼致周身陽氣為陰邪所遏宜藿香之辛熱發越陽氣散水和脾而愈

一蜀菟娟夏月貪涼飲冷胸前如有一團之火冷水涼茶入咽竟從火團上分流而下目則羞明畏火口臭間頻出火氣診之六脉俱陰舌胎青紫而滑吳曰此寒格反見熱化也與乾姜肉桂溫散少加黃連為向導移時胸中之火頓化

孫文垣治弟叔南額疼遍身痛口乾舌胎黃厚左脉浮大六部俱數時當仲秋初旬以小柴胡合白虎湯加

羌活熱不退下午用六神通解散以蔥湯調服三錢
熱少退至半夜后又復熱額疼顛頂尤甚古根黃豆
焦黑小水赤痛煩燥不睡遍身又疼此三陽合病暑
症也次日以小柴胡大加石膏為君藜蘆白芷竹葉
梗米生姜大棗少頃汗出至足必至足乃為上汗熱始退
猶煩躁不睡仍以小柴胡湯加桂枝山梔竹茹竹葉
飲下遂愈

張路玉治內兄顧九玉大暑中患胸痞頭脹脈得虛大
而濡氣口獨顯滑象此濕熱泛溢于膈上也與清暑
益氣二劑頭脹止而胸痞不除與半夏瀉心湯減炮

姜加大棗去枳實服愈

范文李孫振麟于大暑中患厥冷自前六脈弦細乳遲
按之欲絕舌色淡白中心黑潤無胎口鼻氣息微冷
陽縮入腹精滑如水問其所起之由因臥地晝寢受
寒是夜連走精二度忽覺頭脹如山坐起暈倒四肢
厥逆腹疼自痢胸中元氣欲吐口中喙妄言與溫
濕之症不殊醫者誤為停食感冒與散消導引一劑
脹后胸前頭項汗出如流背上更加畏寒下体如水
一日昏惰數次此陰寒入暑挾中手足少陰之候緣
腎中真陽虛極所以不能發熱遂擬四逆加入參湯

方用人參一兩熟防三錢炮姜二錢炙甘草二錢日
夜煎進三日中連進六劑決定第四日寅刻回陽是
日悉屏姜附改用保元方用人參五錢黃耆三錢炙
甘草二錢加麥冬二錢五味子一錢清肅膈上靈陽
四劑食進改用生料六味加麥冬五味每服用熟地
八錢以救將竭之水使陰平陽秘乃安

申叔旆觸熱過梁溪歸而眩暈麻脅發熱便秘服黃連
香薷不應用涼膈散便通或時昏眩不省或時四肢
清冷而晡時為甚診之脈弦細而芤此暑傷心也陽
氣鬱伏所以有似陰寒也與生脈合保元清理肺胃

而安

柴岫青治陳忠之患疾醫以溫散之藥投之遂至終夜
不能合眼時見鬼物面脈沉伏症屬受暑加減用清
暑益氣湯去人參一劑勢減六脈俱現洪大再服六
一散數劑而病退惟夜間尚不能睡遂以滋補安神
之劑調愈

壬戌夏五營繕朱載常早間入暑輿中嘔吐昏憤遺尿
醫似中風治開附子理中湯加殭蚕后又以西脈鼓
指危篤已極參附尚少恐難挽回柴曰此暑風也脈
無死象力保無事伊同寓水部錢築岩不信急煎服

藥將進幸未中未汝能進以六一散一服神氣稍定
錢雖不知醫固知六一散之與理中冰炭因停前藥
次日以香薷飲加羌活調愈

陸祖愚治一人七月間曾構訟事腹中飢食冷粥數碗
少頃即吐自此茶飯皆吐頭疼身熱咽喉不利昏冒
口中常流痰涎醫知為中暑用冷香薷飲投之隨吐
又井水調益元散投之亦吐昏沈益甚脈之陽部洪
數無倫陰部沉微無力此邪在上焦在上者因而越
之此宜吐者也蓋飢餓之時胃中空虛暑熱之氣乘
虛而入于胃熱極而以寒冷之水飲投之冷熱相

反所以水入即吐即口中流涎亦胃熱上溢之故也
因用沸湯入鹽少許蘆汁數匙乘熱灌之至二三碗
不吐至一時許方大吐水飲與痰涎同出納益許即
以生脉散投之人事清爽諸症頓減又合四物調理
而安

張紹蒲治一人暑月患頭疼身熱昏睡大渴引飲衆以
感冒治不効診之脈大而虛曰此暑症也即合撤幔
開窗前后左右各置涼水頓覺清爽仍令二童食以
西瓜取其便連飲四五杯即愈

張鳳達為諸生時萬曆戊子夏患暑症勢極氣索瞢然

自憤庸醫以為內傷勞折幾不自持將信之幸蔽醫
汪韞玉適在旁曰心煩面垢此暑症也又何多指聞
者皆駭其名予于醫中微解依之服益元散二劑而
蘇仍入香薷而愈

无垢治竹垞夫人馮氏病熱七日不汗后又七日不
汗將踰二旬矣諸醫皆云傷寒不可治請辨表其朱
乃邀李徒行登閣診視无垢笑曰君夫人所居閣四
面俱木圍之木生火觸暑脈伏耳聾臟無恙也急以
西瓜井水投之可不為愈後其言越宿而舖糜再宿
主中饋如故

立齋治文選姚海山中暑頭疼發熱氣高而喘肢體倦
怠兩手麻木謂熱傷元氣用人參益氣湯頓安又用
補中益氣湯加麥冬五味而痊

昔有人暑月深藏不出因客至坐于窓下忽以倦怠力
疲自作補湯服之反劇匠問其由連進薷飲兩服而
安

馬元儀治陸太史時值秋暑偶發熱頭疼診之脈大而
虛謂中氣大虛非補不克彼云傷暑小恙况飲食不
甚減起居不甚衰何虛之有但清暑調中去邪即已
何用補為乃勉与清暑益氣而別明晨復診脈之大

者變為虛微發熱如故曰今日不惟用補更當用溫
宜急服之遲則生變矣遂用理中湯服下少頃汗出
如泉涌午后復診兩脈虛微特甚汗如貫珠乃連進
人參四兩附子兩許兩日夜納用人參十兩附子四
兩汗止精藏漸調而安

任邱襄在澗棄家逃禪時戒茹素遍遊五岳是迹几遍
天下偶客金陵壇寓西禪寺僧舍酷暑中坐卧小樓
日持準提咒三千念佛號二萬未是後物忽患頭疼如斧
臂身熱發躁口乾日飲冷水數斗餘渴猶未解自分
必死莊歛之憐其旅病時過視一日急走蒼頭請飲

之永訣以所携書畫玩器盡授歛之泣而言曰未嘗得道
况其為我收藏吾死後切勿用世俗禮葬我惟以兩
缸盛吾尸于中以三尺地理之耳歛之涕泗填胸束
手無策余此時遊梁溪陽羨間歛之命余僕克勤相
追歸視其脈知係受暑為疏竹叶石膏湯方飲之如
方製為躬為煎服一劑即熱渴俱止几十劑病尽退
旋加健脾藥十餘劑全愈舖排點綴其實與醫案無
謂姑仍其旧以見后人之

來天培治蔡氏女病經六七日時七月初旬發熱頭疼
腹痛胸滿煩渴目閉神昏時有獨語脈浮細而數按

之模糊問曾手足掣抽乎曰然曰此俗所謂暑氣傷寒也用香薷青蒿羌防枳桔秦艽鈎藤菖蒲夏曲藿香柴胡黃連一劑症減神漸清脉略和前方去羌活菖蒲枳桔香薷加廣皮厚朴花粉丹皮一劑漸安惟熱未退此津液不生之故耳用生地麥冬茯苓花粉黃芩石斛廣皮穀芽夏曲二劑全痊

沈明生治王明甫長夏神昏不語伏枕信宿午前往視曰脉虛身熱此中暑耳非風也曷不用參其長君曰早間一友因用參而轉增煩懣問用几何曰五分曰宜其轉甚也當四倍之乃克有濟耳乃瞿貽不信因

曉之曰凡參多用則宣通少用則壅滯今病正合東垣避暑于深堂大厦得之者屬陰且古人用清暑益氣人參白虎生脉散等方皆中暑門中要劑俱有人參又何慮之有乃殊不信復理喻再三乃終不信欲辭去而阻于蒸兩強留于餐因再謂曷不就此時如議進藥脫有不安可用法立解也語殊可笑然非是不能使之決意于是勉從以進犹惴惴焉惟恐增脹既而殊安靜愈時神思少清問吐一二語始用參不疑調治決旬竟得全愈

陳子佩治一人八月間發熱詁語不食又不大便諸醫

皆以為傷寒始而表繼而下俱不應延至五十餘日
投以人參熱稍減參少則又復熱于是益疑其靈也
峻補之然不便不食如故診之六脈平和絕無死狀
若謂傷寒無五十餘日不便不食而不死之理間病
者夏月治喪往來奔走必是中暑無疑悞以傷寒治
之又投以人參補劑暑得補而愈不解故至此耳當
六一散与之以涼水調服病者欲之虽多与不妨服
已即睡醒即便之后思食數日愈

吳橋治吳鴻臚妻年三十形故肥當暑而殮如常誥朝
不起啟視之瞑目昏憤口舌唇吻皆色深黑瘦如鼓

韞有聲勺餘不能下咽即千金約無所用逆橋至六
脈浮濡謂鴻臚口是本風痰兼中暑故耳即以厚者
蒿飲灌牛黃凡輒能下痰聲殺尔更進少選黑色退
而為黝薄暮已如羊肝誥朝微紫尔出入前方加補
劑五日始張目能言逾月如故 太函集

章岩暘病快日者再者矣始而發熱繼發斑太甚則循
衣摸床昏瞽五日不食診之脈無異微獨故所進諸
藥裸施無序則予黃連香薷石羔湯一服而蘇再服
而去者大半三服而痊

濕

薛立斋治一婦人肥胖頭目眩暈肢倦脉木腿足痿軟
自汗身重其脉滑數按之沉緩此濕熱乘虛也用清
燥羌活二劑少愈更以加味逍遙而安

趙養葵治一人宦遊京師病腿腫發熱不能履地眾以
為腿癰延趙視之扶掖而出趙曰非癰也以補中益
氣湯加羌活防風各一錢

以開鬼門例

一服如失次日乘

馬來謝

趙養葵自病患陰凡一枚腫如鴨卵以濕症治之不効
細思之數日前從定海小艇回有濕布風帆在坐下

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

比上岸始竟以意逆之此感寒濕在腎丸也乃用六

味地黄此潔淨加柴胡吳萸肉桂各一錢独活五分

此味一服熱退再服腫消后有患偏墜者此方多効

亦惟寒濕者宜之若

孫文垣治沈大官左膝腫疼不能起止者半月大便日

瀉者三次脉之弦緊曰此脾虛濕熱凝于經絡流于

下部也腫屬濕病屬火用蒼朮黃柏改仁為君澤瀉

猪苓五加皮為臣炙甘草防風桂枝為佐木通為使

四帖痛減腫消泄瀉亦止改用蒼耳子五加皮改仁

當歸枸杞杜仲丹參黃栢烏藥酒糊叶為丸調理月

餘而安

吳字先治一人風濕骨節掣疼不能屈伸遍身俱腫醫

以麻黃湯發汗大出而腫不退吳曰前方未嘗謬

也但宜微汗之今過汗風去而濕未除故不愈也

仲景注與胃苓湯二劑而痊

吳紫宜細審之其說似

張子和治李文卿兩膝臃屈伸有聲剝然或以為骨

鳴張曰非也骨不戛焉能鳴此筋濕也濕則筋急

燥則急濕則緩今云有独緩者緩者不鳴急者鳴也

濕則筋急殊未得解若用藥一瀉一瀉上下去其水去則自無聲矣從

其言而愈

朱丹溪治朱秀才久坐受濕能飲酒下血以苦澁葯兜之遂成腫疾而壯足皆腫口渴中滿無力少汗脈澁而短乃濕為濕氣所傷法當行濕順氣清熱化積用滑石一錢五分白朮五分木通七分厚朴五分乾葛五分蒼朮三分蘇叶七片水煎次第下保和丸與點丸溫中丸各五十九

馮官人因內有濕積兼時令濕熱右腿少發陽分發爛瘡如掌大痒甚兩手脈洪緩略數面目手足俱虛腫腸中午前痞后午腫到兩足則膈寬茯苓木通各

朮犀角枳壳炒各五分陳皮連翹白朮各一錢甘州二分加姜汁煎服

朱恕八哥肚腫因濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩足時腫白朮三稜醋炒木通陳皮赤茯苓海金沙厚朴各五分甘州二分肉桂三分煎下保和溫中丸各三十抑青丸十丸

張三錫治一人体厚自寬遍身沉重难于轉側兩膝時疼腫不紅不硬六脈濡弱天陰更甚因作濕鬱用羌活勝濕湯十劑愈

許叔微治王彥龍季夏時病胸脇多汗兩足逆冷謔語

醫者不曉襍進葯已旬日診之脉閉前滿閉后數白
 当作濕溫治之蓋先受暑后受濕暑濕相搏是名濕
 溫先以白虎加人參湯次白虎加蒼朮湯頭疼少退
 足漸溫汗漸止三日安此名賊邪悞用葯有死之理
 有人難曰何名賊邪曰難經有五邪從所不勝來者
 為賊邪假令心病中暑為心邪中濕得之為賊邪心
 先受暑而濕邪乘之水尅火從所不勝斯為之賊邪
 五邪中之最逆也又曰濕溫之脉陽濡而弱陰小而
 急濡弱見于陽部濕氣搏暑也小急見于陰部暑氣
 蒸濕也 右關見陽脉乃木乘土位亦謂賊邪以此類推諸部皆然 故曰暑濕相搏

名曰濕溫是謂濕邪也

不特此也予素有停飲之疾每至暑月汗雨足漿之未嘗

乾每服此葯二三盞即愈

立齋治張縣丞年逾五十兩腿腫脹或生瘡癩小便頻
 而少声如瓮出服五皮等散不效掌醫院銀臺李先
 生疑為瘡毒令請薛治診其脉右關沉緩此脾氣虛
 濕氣流注而然非瘡毒也河間云諸濕腫滿皆屬于
 土按之不起皆屬于濕遂投以五苓散加木香蒼朮
 白朮亦不應意至陰之地關節之間濕氣凝阻且水
 性下流脾氣既虛安能運散若非辛溫之葯開通腠
 理行經活血則邪氣不能發散遂以五積散二劑勢

退大半更以六君加升柴木香苡仁調愈使投峻劑
則虛之禍不免矣

高兵部連日飲酒陰挺并囊濕痒服滋陰等藥不効謂
前陰者脾經絡脉也陰器縱挺而出素有濕繼以酒
為濕熱合于下焦而然也經云下焦如瀆又云在下
者引而竭之遂以龍胆瀉肝湯及清震湯治愈若服
此不應宜補肝湯或四生散治之

趙大用兩臂腫疼脹托裡藥日甚謂腫屬濕疼屬火此
濕熱流注經絡也以人參敗毒散加威靈仙酒芩南
星數劑將愈更以四物湯加蒼朮黃柏相得便二十餘

劑而消又一嬾下体腫疼亦与人參敗毒散加威靈
仙黃柏蒼朮數脹痛減更以四物湯加黃柏紅花防
己蒼朮澤瀉三十餘劑亦消

葉巡檢兩腿作痛每痛即以濕布搦之少安月餘更劇
夜痛尤甚丹溪云血受熱已自沸騰或涉冷或就濕
取涼熱血得寒汚虫凝滯所以作疼夜疼甚行于陰
也苟疼以冷折之即前所謂取涼之症也以五積散
二劑而愈更以四物湯加黃柏蒼朮牛膝木瓜二十
餘劑而消夫濕疫滿血注于僻道若非行經流濕推
陳致新不能療也如葯蒸菴或用涼葯敷貼或用寒

葯降火反成敗症

一男子腿腫筋挛遍身痠軟一道人与痠葯及托裡葯期三日可痊皆不應此非瘡毒大筋軟短小筋弛長此濕熱為患也以人參敗毒散加蒼朮黃柏槲櫚木瓜治之少愈更以清燥湯二十劑而痊夫内有濕熱外有風寒当泄不当補及以甘溫之劑必不効

張意曰治一人時症已二十餘日涼解不愈大便自利不欲飲食舌赤燥硬神清肌削日晡寒熱如瘧無汗診之六脉不浮不沉惟大而緩脇肋邊有痛處按之在肝位此溫濕病不解結于肝部故寒熱如瘧胃中

津液耗涸則舌燥而赤是邪熱留于心腹胃也用玉女煎加犀角蒼朮木通一服舌生津液脇疼未減即于原方加柴胡數服漸瘳更以補陰全安

王宇泰曰昔人治濕溫通身皆潤足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問所服葯皆陰病葯也此非受病重葯能重病耳以五苓合白虎十餘劑少甦更与清燥湯而安 未選入

濕

端州太守吳松巖病凡四十日矣。延診告以初時惡心倦怠，食減便溏，既而夜不寐躁而數起，而復臥。凌晨必嘔痰數升，或以為暑而用香薷六一，或以為濕而用草薢五苓，或以為瘴而用平胃，或以為痰而用二陳。徧嘗無效，漸加煩渴，引飲小便頻數，及起又不行，至坐又欲便，或謂將成消渴，與腎氣丸及生脈飲服之，轉甚。脈之濡而緩，右關為甚。據脈與症，濕熱無疑。何諸治罔效？因思病人素喜肥甘，又喜酒食，面其脾胃如上，在兩中沾漬已久，值夏令乃蒸鬱而發，故

參利分清可愈亦非風行燥散可痊惟聖木煎一味
白朮重兩許酒煎從而治之必應今如法服之再以
兔絲子五錢煎飲代茶服旬餘安

熱病 熱症 燥火 惡寒 寒熱
霍亂 瘴

續名醫類案 卷八九

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

續名醫類案卷八

錢唐魏之瑋玉橫輯 男鉞編次

熱病

滕曇恭豫章南昌人也年五歲母患熱病思食寒瓜土俗所不產曇恭歷訪不得俄過一桑門問其故曇恭具以告桑門曰我有西瓜分一相遺還以與母尋家驚異疾亦愈尋訪桑門莫知所在 南史

唐武宗有心熱疾百治不効青城山邢道人以紫花梨絞汗而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常止忽有一抹目絨寔以進食之辭煩渴殊効 世說續編

張子和治常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛日四肢者
諸陽之奉也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則
痛要言以三花神祐丸下之熱遂去
不煩

李東垣治節使趙君年几七十旬病身體熱麻股膝無力
飲食有汗妄喜笑善飢痰涎不利舌強難言声啞不
鳴診得左寸脉洪大而有力量是邪熱客于經絡之中
也兩臂外有數癩問其故對以然香所致曰君之病
皆由此也夫人之十二經灌溉通身終而復始蓋手
之三陽從手表上行于頭加以火邪陽并于陽勢
甚熾焉故邪熱妄行流散于周身而為熱麻胃熱則

虫動虫動則廉泉開故涎下熱傷元氣而為沉重無
力飲食入胃慄悍之氣不循常度故多汗心火盛則
妄喜笑脾胃熱則消穀善飢肺金衰則声啞不鳴仲
景云微數之脉慎不可灸焦骨傷筋血難復也君奉
以羔梁之味無故而加以火熾之毒熱傷經絡而為
此病明矣內經云熱淫所勝治得其苦佐以甘寒以
甘瀉之以酸收之當以黃柏知母之苦寒為君以瀉
火邪壯筋骨腎欲堅急食苦以堅之黃芪主甘州之
甘寒瀉熱寔表据此葭州五味子味酸止汗補肺氣
可云甘寒之不足以為臣當歸炙甘州之甘辛和血潤肺升麻

柴胡之苦平行少陽；明二經自地升天以苦發之者也以為佐咬咀同煎清汁服之更繆刺四肢以瀉諸陽之本使十二經相接而瀉火邪不旬日良安遂名其方曰清神補氣湯試妙方

張子和曰余向日從軍于江淮上一舟子病余診之乃五寔也余自幼讀醫經嘗記此五寔之症竟未之遇也既見其人竊私料之此不可以常法治乃作大劑而下之殊不動搖計竭知窮無如之何忽憶拖萼花九頓下七八十丸連瀉二百餘行與藥相煎而下烏其人昏困數日方已蓋大疾已去自然卧憇不如此

則病氣無由衰也徐以調和胃氣之藥糜粥日加自

尔平復也

五寔者脉感皮熱腹脹前後不通昏悶也

蔣仲芳治蕭氏嬭年二十餘素靈弱患熱病時一月一夕思死脉虽無仲按尚有心口微温曰似有生机即用竹瀝生姜灯心湯灌之下咽少頃微動細察之腹痛甚問其大便云二十日不食亦不行矣以大黃一两芒硝五錢枳仁當歸各三錢与之衆駭曰素有弱症且病久何能堪此日更有法在強与之遂去黑物半桶即用人參五錢煎補飲之蓋因素弱急下后不得峻補也調理月餘而愈今連生三子此諸醫因

其虛而不治其寔之悞也

樞密副使耶律軫妻有沈疴易數醫不能治之耶律敵魯視之曰心有畜熱非藥石所及當以意療因其瞶聒之使狂用泄其毒則可于是令大擊鉦鼓于前翌日果狂叫怒罵遂愈遼史

上洋列公遠至洞庭山治病者已氣絕劉曰無恐當即活也但禁今夜必欲現劑又所演必剽武者從之遂令以毡褥裹病人置陽上已而鉦鼓喧沸則病者欠伸復醒矣張氏施言

萬密齋治胡應奎五月患熱病治半月未愈脉弦數鼻

衄三四日一作左脇痛不能側卧先以炒山臈一個煇人髮同燒存性吹入鼻中而衄止再以當歸龍荟丸方作湯一劑而脇疼止再診脉弦去而浮數日當以汗解蓋衛氣不共營氣諧和者當用桂枝湯以治其陽今乃營氣不共衛氣諧和則當用黃連解毒湯合白虎以治其陰使營衛和則得汗而愈也乃以二湯合煎飲之先告之曰當戰汗勿驚也連進二劑果汗而愈

胡龍嘉六月病熱身壯熱自汗大渴喜裸体診其脉弦大而虛萬為製一方小柴胡內梔柴胡人參白虎湯

內搭知母甘州卮子豉湯內摘沒豆豉共五味淡竹
叶煎名三合湯一劑安

繆仲淳治辛衡陽銓部患熱病在陽明頭疼壯熱渴
甚且嘔鼻甘燥不能眠診其脈洪大而實仲淳故問
醫師醫師曰陽明症也曰然問投何葯曰葛根湯仲
淳曰非也曰葛根湯非陽明經葯乎曰陽明之葯表
劑有二一為葛根一為白虎不嘔吐而用解表葛根
湯今吐甚是陽明之氣逆升也葛根升散故用之不
宜白虎湯加麥冬竹叶名竹叶石膏湯石膏辛能
解肌銷墜能下胃家疫熱肌解熱散則不嘔而煩躁

壯熱皆解矣遂用大劑与之且戒其仲君曰虜荊非
六十萬人不可李信二十萬則奔還矣又囑曰斯時
投葯王鼓瘞天明投葯朝殮瘞已而果然或謂嘔甚
不用半夏何也仲淳曰半夏有三禁渴家汗家血家
是也病人渴甚而嘔是陽熱邪熾甚劫去津液故發
渴邪火上升故嘔半夏辛苦溫而燥且有毒定所非
宜又疑其不用甘州曰嘔家忌甘仲景法也此案為
陽明熱
病用葯
金針

喻嘉言治王玉原昔年感症治之不善一身津液盡為
邪熱所鏹究竟十年餘熱未盡去古耳之竅常閉今

夏復病感纏綿五十多日面足浮腫寤寐不寧耳間
 氣往外觸蓋新熱與旧熱相合狼狽為患是以惟于
 去俸醫者不察其情治之茫不中窾遂至秋深金寒
 水冷病方自退然淺者可退深者未由遽退也喻曰
 面足浮腫者肺金之氣為熱所壅失其清肅下行之
 權也面腫可云足腫則未必終是陰虛血不配氣耳臥寐不寧者胃中之津
 液乾枯不能內榮其魂魄也語殊牽強亦由陰虛肝火浮入色絡也耳
 間大氣撞出者久閉之竅氣乘不覓令病體虛羸中
 間無阻隔耳中呵氣出者亦有時而仍閉不得謂有無阻隔也氣逆上冲始
 知之也終不外陰虛二字外病虽愈而飲食為餌之內調者

尚居其半持孳二事大意为凡病感者明善後之法
 為蓋人當感後身中之元氣已虛身中之邪熱未退
兩身中字亦感于此而補虛則熱不可除于此而清熱則又
 虛不能任即一半補一半清熱終屬模糊不得要領
 然舍補虛清熱外更無別法當細審之補虛有二法
 一補脾一補腎如瘧痢后飲食不能運化宜補其脾
 如傷寒後胃中津液久耗新者未生宜補其胃二者
 有天壤之殊也清熱亦有二法初病時之熱為實熱
 宜用苦寒藥清之大病后之熱為虛熱宜用甘寒藥
 清之此說極透徹二者亦天壤之殊也人身天真之氣全

在胃口津液不足即是靈生津液即是補靈故以生津之藥合甘寒瀉熱之藥而治感后之靈熱如麥冬生地丹皮人參梨汁竹瀝之屬皆為合法仲景每用天水散以清靈熱正取滑石甘州一甘一寒之義也設誤投參芪苓朮補脾之藥之為補靈不併邪熱而補之乎至于飲食之補但取其氣不取其味如五穀之氣以養之五菜之氣以充之每食之間便覓津汗透將身中蘊蓄之邪熱以漸運出于毛孔何其快哉人皆不知此理急于用肥甘之味以補之日下虽精采健旺可喜不思油膩阻滯經絡邪熱不能外出

久之充養完固愈無出期矣前哲有鑒于此靈食沒茹蔬使俸暫虛而熱易出乃為貴耳前醫藥中以浮腫屬脾用苓朮為治以不寐責心用棗仁茯神為治被餘熱纏綿不已忌田補靈清熱之旨未明故詳及之

瑋按寓意艸中多有發前人所未發處至于支離牽強處亦復不少如此案謂感症后以甘寒清熱竅滯青紫然以補脾補胃立論便尔模糊但當云氣虛者宜補氣血虛者宜補血凡瘧痢后飲食不運多氣虛宜氣分為如參芪苓朮之類凡感症後

津液不充多血靈宜地冬梨竹之屬以感症多餘
熱未清也何等明快然犹未免于偏常見痢以下
多而亡陰瘧以汗多而耗液飲食難運多由相火
盛而真衰氣非大劑二冬二地投之多見其纏綿
不已也至其論面足浮腫臥寐不寧尤屬隔靴搔
痒

陸養愚治凌比部藻泉暑月榮歸煩勞過度夜間頭疼
如破內熱如火不寐汗多小便短赤舌上黃胎右脇
脹疼有謂頭疼身熱宜散者有謂煩勞之后宜補者
診之見其身熱喘急語言間氣之不足以息脈浮數

按之不甚有力曰此熱傷元氣也乃以河間桂苓甘
露飲加人參一錢服之片時汗止熱減喘定能言再
與一劑昏倦思睡次早脈浮按已平沉按弦而有力
此浮熱已除內熱未盡故脇腹尚微疼也與當歸龍
葵凡一錢五分空腹服之而後進粥至下午便通而
色黑痰少減復以參麥散調安

陸肖愚治史洞庭室四月間患頭疼發熱脈洪數見于
氣口用清解為二劑大約柴胡葛苓之屬一醫謂頭
痛身熱乃火陽症而遂用柴葛不引邪入陽明少陽
于汗未得而遂用臣苓寒涼之品表邪河由而解不

將博裡乎

以正傷寒論未嘗不是

用大青龍湯二劑病家止服

一劑夜間遍身如燬口渴咽乾已有譫語矣明日又

以非傷寒乃痛風也

現前說其人亦頗閱書而臨症則鹵莽不堪迨福薄而氣浮乎

抑識淺而

意易移乎用羌活獨活首烏牛膝等二劑乃登高而

歌棄衣而走罵詈不避親疏再求診乃令數嬖人紮

之謂洞庭日此陽症也擾之益劇當以言寬諭之果

如言而止因先用糖水法灌之勢便緩隨以白虎加

元明粉苓連姜仁犀角數劑而罵詈止時或妄言知

大便久而不去也以潤字丸三錢投之夜出燥矢約

二十枚然譫語犹未全止仍進前藥又以丸藥二錢

投之出燥矢數枚唐便少許又三日方思粥飲以清氣養榮湯調之

呂東莊治吳華厓館僮夏月隨役湖上感熱症不痢膿

血身如燔炭

四熱症否則下痢身熱為不治矣

曰此陽明病也不當

作痢治視其舌必黑而燥夜必多譫語果如所言診

之則脈已散亂忽有忍無狀類蝦游不可治也吳強

之不得已用熟地一兩生地麥冬當歸白芍甘州拘

杞佐之戒之曰汗至乃活夜來熱不減譫語益狂悖

但血痢不下耳服藥后見微汗少頃即止診之脈已

接續分明洪數鼓指曰今生矣仍前方去生地加東

仁山葯丹皮山萸加戒無連服六帖其家以昏熱甚

每日求更方今始忽定以活人还汝再診脉始斂而

員乃曰今当為汝去之用四順清涼飲子加熟地一

兩大黃五錢下黑矢數十枚諸症頓愈越二日薄暮

忽復狂詬發熱喘急口渴此欲回陽作汗也与白朮

一兩黃芪一兩乾姜三錢甘州一錢歸芍各三錢尺

劑汗如流酣卧至曉病霍然矣后有發明節去以其諸案同也

瑋按先補而下再補而汗治法固善然此症在初

時數劑能与天水瀉心並行定不致如此

楊乘六族弟患熱症六七日不解口渴便秘發狂踰墻

上屋赤身馳驟詬妄罵詈不避親疎覆蓋尽去不欲

近衣如是者五日矣時楊以歲試自苕上歸尚未抵

岫病人曰救人星至矣問是誰曰雲峰大兄回來也

頃之楊果至家人咸以為奇視之良久見其面若無

神兩目瞪視其言動甚壯勁有力意以胃中熱甚上

乘于心：為熱胃故神昏而狂妄耳不然何口渴便

秘白虎涼膈等症悉其耶及診其脉豁大無倫重按

則空驗其舌黃上加黑而滋潤不燥乃知其症由陰

盛于內逼陽于外虽壯勁有力乃外假熱而內真寒

也其陽氣大損神不守舍元神飛越故先遇人于未

至之前遂以養榮湯加附子倍棗仁五味白芍濃煎
與之二劑狂妄已除神疲力倦熟睡週時方寤渴止
食進而便通矣繼用補中益氣加白芍五味而痊

瑋按傷寒門張令韶治一婦詎妄發狂以聲重且
長斷為實熱下之而愈此案亦壯勁有力斷為虛
寒補之而愈第張案則脈伏全無為熱厥也此則
脈空豁無倫為陽越也故臨症者尤不可執一端
以為的也

朱湘波母病熱疰疫感喘急煩躁口渴喉中如烟火上
攻兩唇焦裂足心如燔小便頻數董安于擬用十全

大補煎送八味凡朱以時方盛暑又係火疰不敢服
招楊商之切其脈洪大而數無倫按之虛軟面色赤
紅舌上生刺且斂束如荔枝曰此腎虛火不歸經脈
從而病反者也當舍時舍疰後脈以治之方用人參
八味飲合生散脈倍加地附未見方論與董合乃出
所擬方示楊曰天熱疰熱非有灼見何敢用此無
庸疑也乃濃煎探冷與飲而愈

李氏嬭年六十餘患熱疰胸痛悶神昏沉氣色粗便秘發
散消導增甚脈之滑數重按有力面色壅熱通紅滿
舌黃胎中間焦黑此食滯中宮竇門壅塞大陰之氣

阻而不運陽明之氣抑而不伸鬱而為火也以大劑
疎肝益腎湯倍熟地与之当晚下黑矢數十塊諸症
大減次日再診脈見浮洪舌上焦燥黃胎尽脫而其
色反黑如炭問曰症減而舌反黑何也曰向者食滯
便秘上下竅不通火悶不舒其縱不能上達今以純
陰之劑便得通則壅塞之火隨便泄去而餘火未
者復炎而上行所以舌反黑耳

與傷寒實熱下后反發危為餘火上中之

義同前方加粳仁當歸山巵以滋水清肝舌黑退再以
生金湯水及六君子加歸芍全安

朱氏媪熱症痞悶眼赤羞明遍身瘡腫大便燥結小水

痛澀聞聲則惕然而驚醫與解毒清火導赤十餘劑
火益甚不食不眠脈之浮分鼓指沉則緩大兩關洪
軟而遲知其外症悉假火也與參附養榮湯不敢服
楊曰此症本為憂慮所復致三陰虧損又為寒涼所
迫致虛火游行冲于上則兩目赤澀流于下則二便
艱難乘于外則遍身瘡腫塞于中則胸膈痞悶

虛火為患

大為如此不故此症為然故其標則似實熱其本則甚虛寒也若
果係寔熱何以聞响則驚寒涼頻進而反甚耶為下
咽即卧至五更大叫餓甚自寅及巳連進粥三次大
便潤而小水長諸症悉退原方去附子十餘劑全痊

張飛疇治一嬾寡居五月間忽壯熱多汗煩渴耳聾脇
疼医用柴葛桂枝等劑其熱弥甚汗出不止胸滿昏
沉時時噫氣診之右脉數大左脉少神舌胎微黑此
伏氣自少陽發出故耳聾脇疼法當用白虎清解柴胡更妙反行發表升越其邪是以熱渴轉甚汗出多故
左脉無神胃液耗故昏悶胸滿其噫氣者平素多鬱
之故今元氣已虛伏邪未解与涼膈散去硝黃易萎
根丹皮竹叶一服熱感得睡但汗不止倦難轉側或
時欲嘔此虛也以生脉加棗仁茯神白芍扶元飲陰
魚進粥飲以扶胃氣渴止汗斂而脉轉虛微欲絕此

正氣得補而虛火漸息之真脉也復与四君歸地而
痊

柴岫青治陳勺山輿人梁大發疹身熱言語口渴遺尿
服藥增劇求治兩脉沉伏意其疹尚未透擬用消毒
飲子不信勢已瀕危復求診脉尚如故探其舌燥烈
生刺且面垢唇焦始信為伏暑即伏氣也發于陽寔明故現以上諸症
熱之症急投白虎湯二劑病解而脉始洪矣故臨症
者脉既難憑尤當察其舌也

王節齋嘗治一僕人病熱口渴唇乾謔語診其脉細而
遲用四君子湯加：耆當歸白芍熟附子進一服熱

愈甚狂言独走或曰附子差矣診其脉如故仍增附子進一大服遂汗出而熱退脉还四至矣

一婦人夏間病熱初用平調氣血兼清熱和解之劑二三服不應熱愈甚舌上焦黑膈間有火嗽水不嚥

火而不能飲冷則非實火可知診之兩手皆虛微而右手微甚六七

日內謔語撮空循衣摸床皆虛熱惡症俱見后用四

物湯加黃耆人參白朮陳皮麥冬知母熟附子服之

一二時汗出熱退次日後熱再服仍退又次日復發知其虛剝也遂連進十服加附子而安

陳三農治一人身大熱兩日出火口舌乾燥手足欲以

水浸不避親疏脉豁大服黃連解毒湯益甚此心之

脾胃而心氣耗散故耳遂用炒黑乾姜一兩人參三

錢白朮一錢不用甘州者恐生者瀉心氣灸者緩中

致脾胃中火和不得發散也三味煎服不踰時引被

白盞戰汗出而愈夫乾姜微炒溫中炒黑涼腎止瀉

張路玉治童姓者伏氣發于盛暑診時大發躁擾脉皆

洪盛而躁其媯云大渴索水二日不敢與飲故發狂

亂因令連與連進二盞稍安少頃復索又與一大盞

放盞通身大汗安卧熱除不煩湯葯而愈同時有西

客二人亦患此症皆與水而安

又薛立齋治一男子感暑發熱胸背作疼飲湯自汗用
發表之藥昏憤詰語大便不寔吐痰甚多以十全大
補一劑又用補中益氣加炮姜二劑全愈

王肯堂治余雲衢太史形氣充實飲啖魚人辛卯夏六
月患熱病肢體不甚熱而間揚手擲足如躁擾決昏
憤不知人事時發一二語不了而非譫語脈也微
細如欲絕有謂是陰症宜溫者有謂當下者時座師
陸葵日先生與曾植齋馮琢庵二太史皆取決于王
玉謂是陽病見陰脈法在不治然素稟如此又值酷
暑外熾酒炙內炎宜狂熱如焚脈洪數有力而此何

為者豈熱氣拂鬱而不得伸而然耶且不大便七日
姑以大柴胡湯下之時用熟大黃二錢而太醫王雷
菴力爭以為太少不若用大承氣王曰如此脈症豈
宜峻下待大柴胡不應而後調胃承氣再不應然後
用小承氣以及大承氣未晚也服藥大便即行脈已
出手足溫矣乃謂雷菴曰設用大承氣寧免噬臍之
悔哉繼以黃連解毒湯數劑而平七月初遂與陸先
生同典試南京不復發矣明年王請告歸里偶得劉
河間傷寒直格論讀之中有六畜熱內感脈瀕疾數
以其極盛熱畜而脈道不利反致脈沉細欲絕俗未

明造化之理反謂傳為寒極陰毒或始得之陽熱暴甚而便有此症候者或兩感熱盛者通宜解毒如矢承氣湯下之下后熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱熱以致身冷脈微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕而死蓋陽氣后竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯養陰退陽積熱漸以宣散則心胸再暖脈漸以生然而挽卷嘆言古人先得我心矣余太史所患者正以失下熱極致身冷脈微而昏胃欲絕也下与不下大下与微下生死在呼吸間不容髮嗚呼可不慎

哉特表而出之以為世鑑

馬元儀治馮太史困客邸無聊挾妓為樂值內虛之際又苦暑熱因而日夜發熱煩渴引飲焦燥不寧脈之細數而急尺帶強神氣不清此房勞過度致真陰受虧陽往乘之也且煩渴身熱神昏火邪內擾外淫已極當此炎夏火炎土燥垂絕之陰其足以供燔灼者幾何若不急救其陰大事去矣用生首烏二兩為君以救肝腎之陰以首烏代地黃馬公創始佐以黃連知母柴胡黃芩枳殼半曲橘紅杏仁清熱化痰之品一劑而神氣清再劑而火便解熱減大半再與人參製首烏鼈甲

丹皮白芍甘州調和陰陽之劑而熱退又以人參道
遙散而安

張意田治甬江焦姓人七月間患壯熱舌赤少腹滿悶
小便白利目赤發狂已三十餘日初服解散繼則攻
下俱得微應而病終不解診脈沈微重按又甚急疾
未表症仍在脈反沈微者邪陷入于陰也重按急疾
者陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂矣此隨經瘀血
結于少陰也宜服抵當湯乃自為製蠱虫水蛭加桃
仁大黃煎服：后下血無算隨用熟地一味搗爛前
汁時：飲之以救陰液候其通暢即用人參附子灸

甘州漸：服之以固真元共服熟地二斤餘人參半
斤附子四兩而安

施豎澤治孝廉唐后坡長公病寒熱面赤頭齒大疼診
之脈洪而數此熱症也當用白虎湯每劑石羔一兩
一副而頭及齒疼俱已寒熱亦除但脈尚搏指曰須
仍前再進一副不然兩日後定發斑矣乃疑而謀之
耑科曰是何斗胆也右為豈堪重劑乎置不服半月
後復求治云兩日后果發斑：十日不解：后身犹
灼熱日曲突從薪其有功乎投柴苓芍為湯一副熱
退又用參朮而安

友人章深之病心經熱口燥唇乾百藥不效有教以犀
角磨服者如其言飲兩椀許疾頓除

游 臣 紀 聞 宗
張 世 南

熱症

凌表姪年二十餘丙子患熱症初愈醫即與山君乾姜
巴戟語氣分蘊溫補久之益覺搗瘦狀若顛狂當食
而怒則嚙蓋折筋不可抑遏所服凡藥則人參養榮
也纏綿年許其母問予曰此餘熱未清過投溫補
所致與甘露飲方合服十餘劑遂痊甲申夏飲患熱
症嘔惡不眠至七日擬用白虎湯以先日服犀角地
黃而吐疑為寒不敢服迨一盧醫至診其脈伏按其
腹痛謂此症非外感也脈已全無危險甚矣姑與
回陽得脈復乃佳所用胡芦巴吳茱萸肉桂乾姜木

香小茴香丁香青皮橘紅等約重三四許今急煎服
蓋是日夜半當戰汗故脈伏而厥痛彼不審以為寒
疝也乃用此方黃昏服下即躁擾煩渴揚手擲足詬
語無倫汗竟不出蓋陰液為燥熱所劫不能蒸發矣
侵晨再亟診脈已出且洪數而目大皆及年壽間皆
迸出血珠鼻煤唇焦右漸黑小便絕無令以鮮地黃
四兩搗汁一茶杯与之飲下即熟睡片時醒仍躁擾
再與白虎湯加鮮地黃一兩煎服熱漸退神漸青次
日漸進粥二白睛赤如鳩目繼而口鼻大發瘡瘍改
與大劑甘露飲二十日始便黑糞甚夥猶時有煩
是全愈

覆服前方至五十餘日忽大汗自頂至足汗極臭自



燥

凡燥病多兼症及諸家罕重此門不知近時病燥十居其九茲特選數案或見于外或見于內及論燥藥之害以備鑑焉

張子和治陽夏胡家嬾手足風裂其兩目昏漫張曰厥陰所致至為瑩又曰鳴紊啟圻皆風之用風屬木：鬱者達之 達喘吐也 先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉之愈

喻嘉言治葉茂卿子出痘未大成漿其壳甚薄兩月后尚有著肉不脫者一夕腹疼大叫而絕令取梨汁入溫湯灌之少甦頃復痛絕灌之又甦遂以黃芩二兩煎湯和梨汁与服痛止令製羔子葯頻服不聽其後

忽肚大無倫一夕痛叫小腸突出脘外五寸交細各
二寸半如竹節壺頂狀莖物絞摺長八九寸明亮如
灯笼此寔未經聞見以阿膠黃芩二味日進十餘劑
三日後始得小水五日後水道清利脘收腫消而愈
門人駭問答曰夫人一身之氣全閉于肺：清則氣
行肺濁則氣壅肺主皮毛痘不成漿肺熱而津不行
也壳著于肉名甲錯甲錯者多生肺癰：者壅也豈
非肺氣壅而使然欤腹疼叫絕者壅之甚也壅甚則
并水道亦閉是以其氣橫行于脘中而小腸且為突
出于至于外腎弛長尤其刺事耳用黃芩阿膠清肺

熱潤肺之燥治其源也氣行而壅自通源清而流自
清矣緣病已極中之極惟單味多用可以下行取効
故立方甚平而奏功甚捷耳試以格物之孝為子廣
之凡禽獸之類有肺者有尿無肺者無尿故水道不
利而成腫滿以清肺為急肺主通調水道又水出高原故謂之化源此義
前人闡發不到後之以五苓五皮八正等方治水者
总之未悟此旨至于單水放塘種：劫奪之劑則殺
人之事矣慎之

趙我完次子秋月肺氣不能下行兩足腫潰而小水全

無肺氣敗者多此二症脘中之疼不可名狀以手揉左則攻于

燥

三子錄廣書屋錄

右揉右則痛攻于左当睛揉熨則滿睛俱痛叫減不絕利水之藥服數十劑不效用敷睛法及琥珀末俱不効診時弥留已極無可救藥

呂東莊治徽人江仲理胃寒發熱火為寒邪所伏也兩頰腫如

升子大狀類雷頭風俗名猪頭風亦與時毒同臂膊磊塊無數不食不

便狂躁發渴診其脉浮數無序醫作傷寒發毒治呂

曰誤矣此燥遂風生也用大劑疎肝益腎湯熟地加

至二兩五劑而腫退便解十劑而熱除食進再用補

中益氣加麥冬五味而安

陸肖愚治李安吾姪年十三大腸燥結不時脫肛鼻中

結塊不時出血記高鼻亦有鼻衄脫肛一案平日喜讀書病由辛

苦而得每勞則發久治不効診之骨瘦如柴面紅身

熱其脉細數曰此天稟燥火之症若破身後即成癆

怯矣急宜治之戒厚味節誦讀庶可療也用天麥冬

各一斤生地半斤人參四兩即加減三才羔也服一

料發即稀三料全愈

萬密齋治一女子年十四歲病驚風后右手大指次指

屈而不能伸或用羌活防風天麻全蠍僵蚕蟬退諸

風藥治之病益甚曰手足不隨血虛也伸而不能屈

者筋弛長也屈而不能伸者筋短縮也皆血虛不能

養筋之疴也手大指者太陰肺經之所主也次指者陽明大腸之所主皆屬燥金此血燥之病也一切風為助風生燥致血轉虛而病轉盛用黃芪人參天麥門冬生熟地黃當歸各等分官桂減半為末蜜丸芡寔大每一丸食後下

馬元儀治周官閉病經一月口燥咽乾胸滿不能飲食二便俱閉診其脉虛而且澁此少陰客熱腎經虛燥也腎開竅于二陰腎陰既虧竅不滑節澤所以二便俱閉少陰之脉循喉嚨挾舌本腎熱則經絡亦熱所以口燥咽乾者腎胃之閉也閉門不利胃氣亦為之

阻所以胸滿不能飲食當用仲景猪膚湯治之夫猪水畜也其氣先入腎膚味甘寒能解少陰客熱故以為君加白蜜以潤燥除煩白粉以補虛益氣二劑熱去燥除而愈

薛立齋治周上舍脾胃虛服養胃湯枳朮丸初有效而久反虛口舌生瘡勞則愈盛服敗毒葯則嘔吐此中氣虛寒也以理中湯治之少愈更以補中益氣湯加半夏茯苓月餘而平夫養胃湯香燥之劑也若飲食停滯或寒滯中則燥開胃氣宿滯消化少為近理設使久服則津液愈燥胃氣愈虛况胃氣本虛而用

之豈不謬哉

此非燥而論
燥故入此

一男子兩掌每至秋皮厚皴裂起白膚內熱倦此肝脾血燥故秋金用事之時而作用加味道遙散加川芎熟地三十餘劑而愈再用六味丸加五味麥冬服之半載后手足指縫臂腿腕皮厚色白搔之則未久服前方愈

一婦人素捕熱月經不調先手心赤痒至秋兩掌皮厚皴裂時起白皮此皆肝脾血燥用加味道遙散加荆芥鉤藤川芎熟地五十餘劑又用歸脾湯二十餘劑乃服六味丸而痊

蔣仲芳治表弟嬭韓貞女幼年守節勤孝清若茹素誦經以故氣血素少而色不榮乙巳春忽冒風寒胸腹脹入夏則脇胸皆痛背如負石百治不效至秋末冬初則竟腸細如綫粒米入胃左盤右旋其行如飛竅澁異常疼若難言過節氣則病劇診之右脉疾左脉清曰疾者氣燥澁者血虛血虛則津液乾而腸胃收小宜其窄狹也氣燥則其行速：則粒米不安宜其如飛也遂用當歸五錢酒炒白芍二錢川芎一錢以補血為君惟其緊寬以七分陳皮惟其澁利以一錢滑石惟其乾潤以二錢蘇子惟其度緩以二分甘

州四劑后諸症漸減至五六十劑榮氣始通不用二冬二地
也膏子凡為調半年方有起色上為中凍皮作棧皮

火

易思蘭治一婦人患渾身倦怠呵欠口乾飲冷一月不食強之數粒而已有以血虛治之者有以氣弱治之者有知為火而不知火之源者用葯謀亂愈治愈病自夏至冬竟微瘥次年夏諸病復作甚于前肌消骨露珍得三焦脉洪大侵上脾肺二脉沉微餘皆和平曰此肺火病也以庖子湯飲之進二服即知飢喜食旬日氣体充寔如常復因久病不孕衆皆以為血虛而用參耆為君大補之劑胸膈飽脹飲食頓減至三月經始通下黑穢不堪或行或止不得通利治以順

氣養榮湯十數劑一月內即有孕夫火与元氣不兩立倦怠者火耗其精神也呵欠者火鬱而不伸也口乾飲冷者火熾于上也飲食不進者火格于中也肌消骨露者火氣銷燥也至經水過期而多其色紅紫肝脉有力乃氣滯血實也非順氣調經清火氣血何由而平妊娠何由而得哉

孫文垣治孫君錫頭疼胸背脹飲食下膈即吐諸逆冲

于咳嗽不住口痰濁如膿大便燥結脉之右寸独洪

大皆金受火以二陳湯加竹茹滑石、姜黃連麥冬赴之候

連進四劑夜与益元散兼服益元能清六腑之大熱不宜于大便燥結之人

嗽吐俱止惟痰浊如膿色且腥氣觸人此將作肺癰改用丹皮麥冬山芩甘州貝母枳壳桑白皮紫苑知母當歸生地桔梗四劑安

易思蘭治一士人素耽詩文夜分忘寢勞神過度忽身熱煩渴自汗惡寒四肢微冷飲食少思初以為外感先發散次和鮮不應又用補中益氣湯加參二錢逾月諸症仍前二日午后發熱忽耳聾不知人恍惚詰語或謂少陽症也宜小柴胡和之易診之六脉皆洪大無力曰非少陽症乃勞神過度虛火症也不信遂以小柴胡去半夏加花粉知母易謂服此必熱愈甚

當有如狂症作已而胸如火灸力刺發狂欲走飲冷水一盞始定復求治以人乳并人參湯与之好方當日進四服濃睡四五時病減半次日又進四服六脉歸經沈細有力終夜安寢諸症悉除或曰是症人謂傷寒今作虛火何也曰傷寒白表達理六日傳遍經絡復傳至二十一日外雖有餘症亦從襍病論今病已二月豈可以傷寒論乎况少陽之脉弦長有力今浮洪滿指而無力豈少陽脉耶蓋平日勞神過分心血久虧肝脾亦損傷陽氣獨盛氣即火也經云壯火食氣火与元氣不兩立于是水涸火勝之病作傷寒云乎哉大小柴胡乃治少陽寔症今陰虛病而以此瀉之則元氣愈虧陰火愈熾故知其當發狂也又補中益氣湯補陽者也陰虛而補陽愈盛則陰愈虛所以不効今用人乳者以真血補真水又以人參導引散于諸經以濟火故効速也

龔子才治管籥相夫人每至夜半不睡口乾煩渴吐黏痰必欲茶水漱口舌上赤黑皮厚胸痞嘈雜飲食少思脉之兩寸洪數兩尺空虛右氣口盛此上盛下虛血虛氣鬱而有火也以四物湯加生地黃連麥冬知母貝母花粉元參梔子甘州數劑奏効又以六味丸

加生地麥冬知母元參花粉貝母五味黃連一料全
安苑火補瀉並行

陳三農治一士人素好蘇補之劑辨字久之致口舌乾
躁腦后作痛神思不爽飲食減少食肉則瀉六脈寔
大作寔火治以知柏連卮赤芍甘州一劑而胸次爽
豁疼瀉俱止再劑飲食倍加精神頓長書此以為無
病好補之戒

陸養愚治董龍山妾

陸與孫文垣繆仲淳俱走董門

每小腹氣上冲則

熱壅頭面卧不能寐身似战慄日中發熱無常至四
鼓五鼓其熱更甚熱時腹中有塊升起經期參前而

淋漓數日飲食過于平時而肌肉消瘦或作陰虛發
熱治之數月不効脉之數而弦左關尺為盛曰此肝
胆病也胆主決斷謀慮不決則木氣菀而成火故于
少陽初動之時其熱更甚也因胆之氣既鬱而成火
則肝之血亦鬱而成癥非血不聚非火不升今塊
之上升熱之上壅即經所謂諸逆冲上皆属于火也
第病止在無形之氣但調其氣而火自泄今兼在于
有形之血必先去癥今有形消而后無形可調也適
在經行之際乃以女金丹連服去癥塊甚多后以達
氣養榮湯尽其旧以生其新數劑諸症漸愈再用棋

柳加人參數劑全安

張路王治張太史虛火症脉之右閉氣口獨顯弦象右尺微數餘皆微細搏指蓋陰火內伏也緣勞心太過精氣遺脫加以怵腸恐懼怔忡驚悸醫峻用人參桂附初少可交春復劇如前仍用參附導火歸元固飲精氣之藥轉甚凡陰虛病初服桂附有小効久服則陰竭而脫余曰見百十人矣稍用心則心系牽引掣疼連脊骨對心處或時疼引膺脇或時顛頃如掀或時臂腿爪甲皆隱作痛怔忡之狀如碓杵如牽繩如簸物如綉絹如以竹擊空控引頭中如失腦髓夢寐不安達旦倦怠睡去便欲

失精去則神魂如飛越現其氣色鮮澤言設妮

總屬真元下脫陽虛上擾之候其人本病三陰虛損

變危細推脉症其初虽屬陽氣虛脫著此一語便而

過餌辛溫之劑卒致陽元反耗真陰當此急宜轉閉

以揀垂絕之陰液可挽回前過為疏二方黃用保元

合四君凡用六味合生脉此時却宜二地二冬沙參

魚鮮菟之去滋元氣大復然後及兩月諸症稍平但倦怠力微因自檢方書得補中

益氣湯為夏月當用之劑于中加入桂附二味一啜

即喉疼声啞用補中益氣者宜留心復邀診見其面顏精采声

音忽瘖莫解其故詢之知為升柴桂附擾動虛陽所致即以前方倍生脉服之半月后声音漸明日漸加安但以衣被過煖咽乾痰結稍涼則背微惡寒或熱飲則大汗時怔忡走精此皆風昔過用桂附內伏之熱所致也遼石門董某謂其伏火未清非芩連不能解散自仲春至初夏純服苦寒亦大初甚竟爽朗至是反竟精神散亂氣不收揖後仍用六味生脉合經年服之以化桂附之毒內因火

內翰孟端士之母虛火不時上升自汗不止心神恍惚飲食不能食欲卧不能卧口苦小便難溺則洒淅頭

暈凡醫每用一葯輒增一病用白朮則室寒脹滿用橘皮則喘息怔忡用遠志則煩擾閉熱用木香則腹熱咽乾用黃芪則迷悶不食用枳壳則喘咳氣之用門冬則小便不禁用肉桂則頭脹欬逆用補骨脂則後重燥結用知柏則小腹枯癯用苓朮則臍下引急用香薷則耳鳴目眩時欲人扶掖而走用大黃則臍下築少腹愈竟收引遂致畏葯如蝎惟日用人參錢許入粥飲和服聊以支撐交春虛火倍劇大氣一升則周身大汗神氣駸欲脫惟倦極少寐則汗不出而神氣少安竟后少頃火氣復升汗亦隨至較

之盜汗迥殊診之其脉微數而左尺与右寸倍于他
 部氣口按之似有似無既云右寸倍于他部又云氣口似有似無曰此本
 平時思慮傷脾之陰受因而厥陰之火尽歸於心擾
 其百脉致病之名百合此症惟仲景金匱言之甚詳
 原云諸葯不能治所以每服一葯輒增一病惟百合
 地黄湯為之端為奈病久中氣虧之淺經葯悞而成
 壞病姑用生脉散加百合茯苓龍齒以安其神稍黑
 茱蓮以折其勢數劑少安即令勿葯以養胃氣但令
 日用鮮百合煮湯服之交秋天氣下降火氣漸伏可
 保無虞後果如言虛火

喻嘉言治漆官困母病久初愈自患腹疼終夜叫喊不
 絕小水全無知為火鬱之痛症以茱蓮加元胡索投之始安
 又因傷食及復病至二十餘日肌肉瘦削眼胞下陷
 適遭家难症變壯熱日細腮腫全似外感有餘之候
 知其為激動真火上焚語有病令服六味加知栢三十
 餘劑其火始退后一身瘡痍黃腫燥火及類溫熱腹中急欲
 得食不能少寐少耐鎮日哭煩臟燥者多哭煩慰之曰旬日
 後腹稍充氣稍固即愈矣服二冬羔而全安鬱火

朱丹溪治一人小腹下常唧唧如蟹声作陰火虛治用

敗龜板用酥炙鹽酒炙亦得側栢用酒九倍黃栢知母俱酒炒川芎

酒當歸製酒右各等分酒糊凡每服八十九淡鹽湯送下治法鬱火

陸祖愚治陳符卿夫人素有痰火症每遇經行一日竟
澀滯二日即洶浦三日大下如注或昏暈幾絕嘗善
怒發即咽喉乾燥氣出如火痰湧胸塞不能轉舒其
平日辛燥之品如陳枳前木及芎歸之類稍用即暈
眩氣絕不足以息及寒涼稍過即大便作泄病作時
日進粥數十碗不竟飽脈之左三部弦細而駛右脈
數而稍充曰此血虛甚故狂火狂字偏旺如此而氣
原非有餘也此時養血則血一時不能充補氣則浮

火無由熄莫若分上下為治人人參于滋陰藥中為
凡引陽入陰以扶生氣之原所以治其本也再用清
涼以為煎劑助陰抑揚以制浮游之火所以治其標
也煎凡間服而痊凡方人參二地二冬知柏阿膠杜
仲前方花粉元參二母苓苓地芍麥冬甘州隨症加
減夫天地之間陽常有餘陰常不足人身之中氣常
有餘血常不足氣有餘便是火血不足則陰虛三十
以前神精血氣日漸旺盛三十以后精神氣血日衰
語曰陰陽水火猶權衡也一高則一下一盛則一衰
又曰大与元氣不兩立故凡火症必先陰虛而後元

氣亦弱也 虛火

朱丹溪治一人夜間發熱早晨退五心煩熱無俸六脈沉數此鬱火也用升湯散火湯熱退后以四物加知柏佐以乾姜而安鬱火

東垣治一人惡熱目赤煩渴引飲脈七八至按之則散此無根之火也用姜加人參服之愈全上

劉彥純治一人不能食而熱自汗氣短不食而熱脾陰弱也自汗氣短肺氣虛也以甘寒之劑補氣瀉火而安全上

琇按治法只從壯氣食四字得之

薛立齋治一婦人口苦脇脹此肝火之症也用小柴胡加山梔黃連少愈更以四君子加白芍當歸柴胡調補脾胃而痊

一婦人每怒口舌發熱此肝火盛而血傷也即以小柴胡合四物湯二劑以清火而生血更以四物加柴胡胡白朮茯苓丹皮生血健脾而愈

一婦人每怒則口若煎辣胸疼脇脹乳內或時如刺此肝肺之火用小柴胡加山梔青皮芎歸桑皮而全安後又怒勞口復苦經水頓至此屬內火動血得熱而妄行用四物加炒芩炒梔胆州一劑而血止更以加

味道遙散而愈

張路玉治徐君玉素稟陰虛多火且有脾約便血症十月間患冬溫發熱咽疼里臣用麻杏橘半枳實之屬遂喘遂倚息不得卧声颯如啞頭面赤熱手足逆冷右寸關虛大微數此熱傷手太陽氣陽字作陰分与姜蕤甘州等不應為製猪膏湯一甌命隔湯頓熱不時批服三日声清終劑全愈虛火方見燥症馬元又案

朱丹溪治施十年四十因灸火太多病腸内下血糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口之熱黃芩甘州茯苓各五分陳皮地黃各一錢連翹白朮各一

錢五分生姜三片外因及内補瀉魚行

楊曾六治姚又曾病感症二字在此案却不必泥外涼内熱肢冷

口渴痞悶昏沈語言謔妄不食不便婦人產后血虛火感者尤多此

症不必有醫作肝經鬱治火用道遙加生地薄荷兩

劑益煩躁不安即症候原屬肝火在立高時原以道遙加芳治之然在此時則迥別矣

脉沈伏按至骨則細數有力面黑滯古黃燥乃火過

陽明胃陰不能充拓所以脉与症皆内顯陽症外呈

陰象也或問症既火過法宜疎散乃服前劑轉劇何

也曰道遙中柴胡薄荷風藥也單走肝胆若陽明病用之則火得風而益熾矣第用左歸飲去茯苓以滋

胃陰如生地當歸以清胃火疰自平耳如言病減數
劑而痊后數年病復如前醫見身涼脉細用左歸飲
加附子則神情昏憒狂擾不寧即前方去附子加花
粉一劑而安乃去花粉數劑而愈
靈火 此等病原
因肝火逆入胃絡
魚犯心包而然楊因高呂六足胃陰而襲其說皆失
本原之論凡肝經陰虛陽虛者服道遠則火愈上竅
惟左歸集靈相宜蓋二方能
滋養肝血也于胃亦何与

龔子才治一人頭疼發熱眩暈喘急痰涌甚小便頻
數口乾引飲遍舌生刺縮斂如荔枝支下唇焦裂面目
俱赤煩躁不寐或時喉間如咽火上冲急飲涼茶如
冰少解已危篤脉洪大無倫且有力捫其身烙手此

腎經靈火游行于外投以十全大補加山萸澤瀉丹
皮山藥麥冬五味附子一鍾必須
冷服熟睡良久脉症畧
減三四再以八味凡服之諸症悉退復畏冷物而痊
靈火

薛立齋治李閣老序菴有門生魏坎離儿喜而服之曰
前凡乃黃栢知母恐非所宜服者內經有云壯火食
氣少火生氣令公之肝腎二肝數而無力宜滋化源
不宜瀉火傷氣也不信服將兩月脾氣漸弱發熱愈
甚小便澀滯兩物腫疼公以為瘡毒曰此肝腎二經
虧損靈火所致耳當滋補二經為善遂朝用補中益

氣夕用六味地黄丸諸症悉痊嘗見脾胃虛弱者肝腎陰虛而發熱馬悉服十味固本丸與黃栢知母之類反泄真陽令人無子可不慎哉虛火

一男子口舌糜爛津液短少眼目赤小便數疫涎壅盛脚膝無力或冷或午后脚熱勞而愈甚數年不愈服如減八味凡而安全上

一男子咳嗽喘急發熱煩躁面赤咽疼脈洪大用黃連解毒湯二劑少退更以卮子湯四服而安虛火

蔣仲芳治楚中一商性急而初嗜烟閱三日五心發熱咳嗽大作百藥不愈診之六脈俱洪火症也莫非烟

毒乎其人亦悟曰吸烟則嗽愈甚遂以麥冬知母山
炮花粉黃芩蘇子甘州姜仁枇杷叶煎成去渣入砂
糖一兩和服愈

聶久吾曰予素稟弱神雖強而精甚弱脾胃兩虛即節
慾犹然三十前後常服參朮等補脾而僅免于病至
四十時脾胃稍可頗覺上膈有熱時齒疼口舌疼每
服清上藥輒愈亦不為大害也至乙未春夏自察脈
竟兩尺弱而寸關亦不旺疑下虛水不能制火宜補
下滋水以制之若但清上非治本也商之饒姓孝匠
亦以為然遂用人參當歸熟地茯苓五味石棗肉巴

戰故紙肉從蓉鹿膠仙茅連志專仁天麥久狗杞鬼
然之類以山為末酒糊為丸服至兩三月上隔靈火
尽除口齒等病不復發矣后滋補凡為服無虛日迄
今二十餘年無靈火者滋水制火之効也

可與靈門
黃履素案

合參 与感症門
予平生少病相背



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷九

惡寒

錢唐魏之琇玉橫輯

男弑編次

張子和治一媼身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以狐
帽蒙其首犹竟寒泄不止常服姜附疏黃燔熱之
劑僅得子和稍用寒涼其病更增三年不痊診其脉
兩手皆如絙繩有力一息六七至脉訣曰六數七極
熱生多以涼布搭心次以新汲水淋其病處媼乃叫
殺人不因病者令人持之復以冷水淋其三四十桶
大戰汗出昏困一二日而向之所患皆除此法華元

化已曾用惜無知者

院案在寒熱門

戴元礼治松江諸仲文盛夏畏寒常御重纊飲食必令極熱始下咽微澁即嘔他医投以胡椒并伏唯之法日啖鴉有三病更加戴曰脉數而大且不屈刘守真之火極似水此之謂也枳殼三陰之火鴉能助痰祇益其病耳乃以大承氣湯下之尽夜行二十餘次頓減纊之半后以黃連道痰湯加竹瀝飲之竟痊

兩浙名案

李士才治吳文遠眩暈二載虽战慄惡寒而不喜飲熱湯五月亦大數妄擁居帷帳屢服姜桂不効脉浮之

細小沉之堅搏是鬱火内伏不得宣越也用金花湯加柴胡甘艸生姜乘熱飲之病頓減再刮撤火一月而起

張路玉治謝某七月間病瘧因服苓知石羔等稍間數日後回小便精大泄遂腦痛如破惡寒振之欲擗地医用八味六君子三倍參附而熱不除繼用大進中每服人參三錢熟附三錢其寒尤甚至正月診之脉僅三至弦小而兩寸俱伏但辛指忽竟流利其症虽五鬢重裘大畏隙風如箭而不喜近火或時重時輕口鼻氣息全冷胸中時竟上冲小腹堅滿塊石磊如石

大便堅硬欲了不了小便短數時白時黃陽道虽痿而緩縱不收氣色憔悴而不晦暗此症本屬陽虛因用參附過多壯火不能化陰遂鬱伏土中反致真陰耗竭法當升發其陽先與薑火湯六服繼進升陽散火補中益氣肢體微汗口鼻氣溫脈復五至後服六味丸生脈散異攻散而安

玉田隱者治衛立礼得寒病虽盛夏必衣重裘擁火坐

密室中醫投以烏附尤甚曰此熱極似寒非真寒也

用硝黃之劑而安

醫說續編
九靈山房集

杞二爺治一人泄瀉惡寒見風即仆日卧密室坐火蒙

毡出語呼之如嬰氣象似沉寒痼冷屢退姜附尤甚

診之脈濡弱而微數濡者濕也數者脾伏火也脾伏

火邪溢熱下流非寒也法當升陽散火以逐其濕熱

治以柴胡升麻羌活澤瀉等劑繼以神芎丸

滑石大黃牽芩

連芎
連芎四五劑而安

薛立之而治一人虽盛夏喜擁火四肢常欲沸湯浸之喜

食辛辣挾湯面赤吐痰一似寔火吐甚則宿食亦出

此脾胃虛寒四君加姜附而愈

一士人患惡寒右尺独滑尺滑者濕熱下陷也惡寒者

因積勞傷脾胃氣下陷穀氣不得升發無陽以護榮

衛也用補中益氣加肉桂二劑愈

龔子才治一婦人六月惡寒之極，雖穿棉衣亦不覺熱。此火極似水也。六脈洪數，小水赤少，以及硝五錢，溫水化服。

薛立齋治一婦人內熱作渴，大便秘結，畏惡風寒，手足逆冷。此內真熱而外假寒。先用黃連解毒湯，后用六味地黃丸而安。

朱丹溪治晉雲胡居錫年三十一，形肥而大，色蒼厚，家富而足，尚嗜口味。兩年前得消渴疾，醫與寒涼藥，得安。有人教以病後須用滋補，令其常用黃雌鷄。因此

食至千餘，只漸有膈滿嘔吐之病。醫者意為胃寒，遂

以附子沉香之藥百餘貼，嘔病除。

此謂極之而愈，反致重病，世不知此。

以女治驗，古今受其害者可勝言哉。

月餘天氣大熱，忽惡風冷，足亦怕。

地氣遂堆糠尺許，厚上鋪以草糊，以重紙方敢坐卧。而兩手不能執筆，口鼻皆無氣，以呼吸欲言無力，行十餘步便困倦，脈皆浮大而虛，僅得回至。乃作內有濕疫，因多服燥熱藥，遂成氣耗血散。當此夏令，自合便死。因其色之蒼厚，神氣尚全，可以安穀。遂以人參、黃芪、白朮熬羔煎，沒五味子湯，以竹瀝調飲之。三日諸病皆愈，令其頓絕肉味。一月後康健如初。又以鷄

湯下飯一月后胸腹脹滿甚自煎二陳湯加附子豆
蔻飲之頓安問調理葯教以勿葯并斷酒肉自愈

寒熱

汪石山治汪世昌形肥色紫年逾三旬秋間病惡寒發
熱頭疼自汗惡心哈痰惡食醫以瘧治診之脉浮濡
而緩右寸略弦曰非瘧也此必過勞傷酒所致飲以
清暑益氣湯而安

易思蘭治一春元下第歸得寒熱病每日申酉二時初
微熱繼大熱而躁之甚如狂過此二時卒復無恙獨
小便亦黃而澁往時有一心事夜即夢遺每日空心
用盞飲燒酒數杯醫皆以為病瘧用清脾飲柴苓湯
并截葯俱不効六脉惟右尺浮中沈取之皆洪數有

力餘部皆平曰此潮熱病也以加減補中益氣治之
日進一服三日病漸退復用六味也黃凡煎前藥調
理一月而安或問寒熱而不以瘥治何也曰此非瘥
乃潮熱也潮者如水之潮依期而至八法流注云申
酉二時屬膀胱與腎此病當屬二經二經水衰火旺
當中酉時火動于中故發熱而蹠：屬腎若瘥疾肝
部必弦今不然惟左尺獨現火象此因平日斲喪太
逆腎水虧損陰火妄熾加之盪飲燒酒引入腎經故
小便赤黃而澀也又曰此莫非陰虛火動乎曰陰虛
之熱自午至亥發熱不間今惟申酉時熱：止便涼
與陰虛不同又曰或亦嘗用補中益氣而不効何也
曰加減之法或不同耳予之去升柴加丹皮澤瀉黃
柏者丹皮瀉膀胱火澤瀉：腎火黃柏為君以生腎
水：旺則火衰而寒熱退矣用六味丸者亦取有丹
皮澤瀉耳如不知此仍用升柴乃以肝脾之藥治腎
所以不効

孫文垣治李恒渠子媼十月寒熱起一日一發咳嗽心
痛腰亦疼次年正月望後始間日一發肌肉大減喉
疼汗出如雨白帶如注飲食減少百治汗不止脉之
右手軟弱左手散亂此汗多而脉不斂病至此危矣

經曰火瘧似熱此之謂歟以黃芪二錢白芍一錢五分甘艸阿膠各一錢鼈甲三錢桂枝五分烏梅一個水煎服其夜汗止再診脈已斂神氣亦回前方加何芍烏石解斛牡蠣寒熱亦止飲食少加駁然有回春之象

喻嘉言治吳吉長內新秋病洒淅惡寒已發熱漸生咳嗽然病未甚也服表散藥不應俾日延脊延至初冬飲以參朮補劑反竟奄奄欲絕飲食不思有咳無聲瀉利不止危甚醫以瀉人參五錢附子三錢加入姜桂白朮等作一劑服以上瀉補虛而取背水之捷

病家無措延喻診畢未及交語前醫至即令疏方喻飄然而出蓋以渠見既訛難以言耳既去乃曰是症總由誤藥所致始先皮毛間洒淅惡寒發熱肺金為時令之燥所傷也用表散已為非法至用參朮補之則肺氣閉錮而咳嗽之聲不揚胸膈飽脹不思飲食肺中之熱无处可宣急奔大腸食入不待運化而直出食不入則腸中之垢污亦隨氣奔而出是以瀉痢無休也今以潤肺之藥兼潤其腸則源流俱清寒熱咳嗽泄瀉一齊俱止矣服四劑必安不足慮也方用

黃芩地骨皮甘艸杏仁阿膠一劑瀉即少止四劑寒

熱俱除再數劑咳嗽亦痊設与若輩商之彼方批參
附为是能相從予入鄉中王氏婦秋月亦病寒熱服
參朮后亦厭一息但無咳嗽十餘日不起粒米亦
無大便時昏去不省人事其夫來寓詳述其症求
發補劑乃以大黄芒硝石羔甘艸四味为粗末与之
彼不能辨歸而煎服其娘云此药甚盛大喜曰盛果
補药遂将二劑連服頃之腹中努痛下結矢数塊絕
而復甦進粥二盞前病已如失矣來謝乃悉之凡遇
此等症中無成見少有不悞

高鼓峯治程氏子病瘡每日至辰時大寒午時大熱

即厥面目直視不能出声頰脫涎水從口角涌出日
流數升至丑時始汗解飲食不進昏冒欲絕診之皆
誅伐太過所致也投以補脾之药不即效延他医用
柴胡南星半夏等药更甚復延診值医者有詢之曰
此何症也而用前药曰子不識乎此肝瘡也肝瘡令
人色蒼然太息其状若死高笑曰据子述經言当
得通脉四逆矣何用前药某誠不識此何病但知虛
甚耳請先揉人然后治病何如曰子用何药曰大劑
參附庶可挽回彼爭为參附不便乃漫應曰謹奉教
始洋之色喜而別是夜用人參一两黄芪二两炮姜

三錢比曉熟地桂附並進次日辰時病不復發矣此緣勞役過度寒熱往來醫認為瘧且時當秋令一味發散寒涼重靈其靈展轉相因肝脾大敗非峻補氣血何由得生夫病由人生人將死矣而乃妄牽經義強合病情及至處方又棄成法自悞：人至死不覓悲夫

呂仲嘉內人在室十四歲時病寒熱往來迨後適仲嘉又十餘年寒熱如故或作瘧治或作虛治疋脊枯削几于骨立高診之曰此非瘧非虛乃血風疰耳以五加皮散加熟地二兩每劑共葯五六兩許水二升濃

煎一升日尽一劑二十劑全安

馮楚瞻治徐山公患似瘧非瘧醫以柴胡湯連進數劑漸至不省人事口噤殭卧咸謂無生理曰此陽虛作寒陰虛作熱悞當瘧治不死也以重劑熟地白朮五味牛膝麥冬製附子另煎人參一兩沖服三日而甦後用溫補而愈

吳學先治小娥病寒熱如瘧語言詭妄如見鬼狀有指及熱入血室者然証与長沙所論三條了不相合診得右寸浮滑知为風痰膠固肺臟故洒淅寒熱疫迷心竅故語言詭妄宜發表利氣自愈用二陳加蘇防

前葛枳桔桑杏微汗而痊

薛立斋治一妇人因夫久出经商发寒热月经旬日方止服降火凉血药内热益甚自汗盗汗月水频数曰内热自汗乃脾氣虛弱也月水频数乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸愈

一室女久患寒热月水失期以小柴胡湯加生地治之少愈更以生地黃丸而痊柴胡秦艽各半而生地二兩酒湿杵羔赤芍一兩为末蜜丸每三十九丸烏梅湯下

日思蘭治一男子病寒热衆以瘧治年餘不痊又以为

勞瘧虛瘧用驚甲散補中益氣湯俱不効脉左右三部俱浮大無力形瘦色黑飲食不美知為陰虛發熱病也早進六味丸晚服補陰丸七日後飲食漸美寒熱減半入服一斤未一月全痊蓋此似瘧非瘧乃陰虛之候也凡正瘧則寒熱參差而有準今寒熱往來或一日一次二次且寒而不厥身熱如火熱退又無汗兼之形瘦色黑怔忡不寐口渴便燥豈可謂瘧乎且瘧脉当弦諸虛皆脉亦多弦發則弦而大退則弦而小今浮大無力早晚相全誠陰血不足陽火有餘火發于外則為熱鬱于中則為寒形瘦者火之消鑠也色黑

者火極似水也怔忡不睡心血虧損也肝火浮入
胞絡者多飲
食不美口舌便悶者火熾于上下也但生腎水養血
滋陰則火降熱退

立齋治一婦人久患寒熱服清脾飲之類胸腹飽脹飲
食減少用調中益氣加茯苓半夏炮姜各一錢二劑
而痊

朱丹溪治趙孺人夜間發寒后便熱至寅時退起來口
渴食少無味穀不化腹痛而泄倦怠或遇事則熱躁
赤眼氣壅又不耐風寒亦惡熱白朮歸身二錢白芍
陳皮一錢人參黃芩五分炒柏炙艸炒芩丹皮木通

縮砂三分下保和寔腸丸各三十丸

呂十四孺人怒氣后寒熱咳嗽食少淋泄縮砂甘艸三
分人參五分白朮錢半連喬陳皮茯苓六錢姜三片
全煎

一婦人年五十餘形寔喜作勞性急味厚喜火食夏却
患惡寒發熱更作無休時衣被虽厚常凜然面脉皆
澁未作禰合邪治之遂以回物湯加陳皮以人參白
朮為君生甘艸黃柏為佐多人姜汁吞通神丸三十
丸回金柳青各二十九阿魏十九煎三帖而得睡第
五帖而身和第七帖而得汗全愈

華陀傳有婦人長病經年世謂寒熱注病者冬十一月
中陀令坐石槽中卒旦用寒水汲灌云當滿百灌始
七灌公战欲死灌者惧欲止陀令滿數將至八十灌
熱氣乃蒸出鬻之高二三尺滿百灌陀乃使然大温
床厚粟良久汗洽出等粉汗燥便愈

馬元儀治張某寒熱數日中痛嘔逆胸滿身熱左脉弦
澁右関尺虛微此中氣虛寒胸中之陽不化而為滿
胃中之陽不布而為嘔衛外之陽不固而為疼以四
君子補脾胃之虛炮姜附子肉桂補陽氣而敵陰邪
少加黃連以為引導一割脉起再割痛處移痛得睡

不數割而霍然

頌允諸寒熱日作胸滿不舒自汗不止已數日或用柴
胡黃芩兩解之法不愈診其脉右三部虛微左三部
弦澁望其枯色之白不澤脉微為陽微弦為虛風由
正氣不足虛邪外入而成寒熱治宜補中益氣即有
胸滿亦是陽虛不布非氣寔而然也况自汗者陽虛
不能衛外為固也面色不華者氣血虧損無以上榮
于面也遂与理中湯理中氣加桂枝以祛虛邪后倍
加參附而安

唐氏子患寒熱弥月不痊胸中有塊高突按之則痛

時見厥逆兼多自汗診其脈右三部虛微按之如絛
此症寔脈虛邪寔正衰之候也攻之則礙虛補之則
助邪然用補則正氣旺而邪自去若任攻則邪氣去
而正獨全者鮮矣用人參三錢扶元養正為主佐以
炙甘草和中益氣以却虛邪炮姜黃連半夏以開痞
而散結肉桂以固其本桂枝以越其邪二劑寒熱減
而脈起倍人參以助中焦運化而疼漸平再用桂附
理中而

一婦人患寒熱半月而脈浮虛按之則豁然空而尺倍
甚曰脈見空豁寒熱不時面色不華者血氣不榮也

語言錯亂者神明失養也與歸脾湯加黃連肉桂各
七分令其心腎內交服后脈漸有神改用人參三兩
黃芪一兩歸身一兩炙艸二錢生地五錢遠志二錢
棗仁三錢杞子五錢大劑補氣養榮數劑熱止神清
令早晚七味味下午進歸脾大造羔百日愈

李東垣治中書左丞姚公茂上熱下寒用既濟解毒湯
良愈

采天培治馬振昌室年約五旬夏間患忽寒熱頭疼每
未申時起至寅卯時退頭暈胸胃嘈噦或作風暑治
尤甚不能飲食無汗氣急懶言診之六脈沉細而關微

弦此勞倦傷脾中氣不足外感寒邪內傷生冷清陽
不升氣虛不能外達也與補中益氣湯加炮姜半夏
一劑汗出熱短嘔噦漸已繼以歸脾加半夏桂枝白
豆仁全愈

馬氏嫗年七旬八月忽病寒熱惡心頭疼身痛心跳不
眠嘔吐不止展轉呻吟診之兩關弦而緊餘脈細小
以為脾氣虛寒肝氣上逆與姜附理中湯白芍和肝
而愈

朱丹溪治一人天明時發微寒熱便熱至晚病減兩腋汗
出手足熱甚四肢力竭則胸滿拘急大便實而能食

邪熱可知似勞怯病者 虛損之甚 脈不數但弦細而沉此張
子和謂及有積之候 詢知因怒氣而得但用大柴胡湯惟胸背
拘急不除後用二陳湯加羌防紅花黃芩治法

汪石山治一人形短蒼白平素善飲五月間忽發寒熱
醫作寒治躁渴益甚時常咳逆嘔吐多痰每次或至
碗許飲食少進頭暈昏悶大便不通小便如常或赤
夜夢不安或一日連發二次或二日三日一發或連
發二日素常兩關脈亦浮洪先令服獨參湯二三帖
嘔吐少止寒熱暫住三日他醫曰渴甚脈洪熱之極
矣復用獨參以助其熱非殺之而何及往視脈皆浮

洪近數日此非瘥而亦非熱也脈洪者陰虛陽無所附孤陽將欲飛越故脈見此其病屬虛非屬熱也渴甚者胃虛津少不上朝于口亦非熱也蓋年逾六十血氣已衰加以瘥為惟性燥烈又當壯火食氣之時老人何以堪此然則邪重剗輕非參所能獨任遂以參芪各七錢歸身麥冬各一錢陳皮七分甘艸五分水煎每次溫服一酒杯服至六七帖瘥止病除食進大便旬餘不通導之以蜜仍令服三十餘帖以斷病根后脈亦收斂非復向之鼓而駛也

霍亂

張子和曰秦河間予親見陳下廣濟禪院其主僧病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾姜一兩炮水一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李彥直中夜忽作吐瀉自取理中丸服之医者至以為有食積以巴豆下之三五丸藥亦不動至明而死悲哉又一遂平李仲安携一僕一佃客至鄆城夜宿郡輔之書齋中是夜僕遮仲安竟其逸也騎馬与佃客往臨穎急追之時七月天火熱爰風如箭埃塵滿天至辰時而還曾不及三時往返百二十里既不獲其人復宿

于邵氏齋忽夜間聞呻吟之声但言球我不知其誰也熱火尋之乃仲安之佃客也上吐下瀉目上視而不下胸脇疼不可動搖口欠而脫白四肢厥冷此症風濕暈三者俱合之症也其昏曾聞余言乃取六一散以新汲水對生姜調之頓服半升其人復吐乃再調并許令徐服之良久方息至明又飲數服遂能起調養三日卒復

張甲僑居司徒蔡謨家出數宿謨日眠夢甲去暴病心腹疼腹滿不得吐而死所病軋霍亂可治而人不知其約故死耳但以蜘蛛生斷去脚吞之則自愈耳謨

竟琛之果死其後遇此症用之輒驗

孫文垣治程氏子先醉酒後御色次早面支冷胃脘痛甚脉僅四至或以熨火力治投以寒涼痛更甚三日前所食西瓜吐出未化乃翁以為陰症傷寒欲用附子理中湯不決迎孫治之視其面色青慘叫痛而声不揚坐卧煩亂此霍亂兼蛇厥症也先當止痛安蛇後治霍亂可免死也遲則悞事矣急用五灵脂醋炒三錢蒼朮一錢五分烏梅三个川椒炮姜桂心各五分水煎飲下痛減大半下午以大腹皮藿香半夏陳皮山查五灵脂茯苓兩剖安

沈繼安內人患發熱頭疼遍身疼軋嘔口渴胸膈脹悶
坐臥不安醫與參蘇飲軋嘔尤甚又加煩躁孫診之
右手洪大倍于左手浮數曰軋霍亂也以藿香正氣
散去白朮桔梗加白扁豆香薷一帖吐止食進一身
痛止惟口渴額疼未愈以石羔香薷滑石各五錢橘
紅藿香苧根各二錢檳榔木瓜各一錢廿叶五分姜
三片一服安

柴岫青治瀋陽少宗伯諱德福夏月抽筋吐瀉用六和
湯而安秋間過府署致謝再診其脉弦洪異常謂宜
合丸劑調養彼謂病已可不信因謂京兆吳穎菴曰

德公脉氣不佳人不信柴曰不預行服藥脉已先時
而見明年春夏可應至期暴脫急着人相邀已無及
矣此吐瀉轉筋者其肝
木必平素有病也

陳三農治一婦暑月方飯後即飲水而睡中心腹疼
極肢冷上過肘膝欲吐痢而不得吐痢絞疼垂死六
脉俱伏此水寒鬱熱氣不得升降故也用鹽五六錢
炒紅入姜五錢搗碎同炒煎湯吐之一吐減半再吐
而安

陸祖愚治陳敬橋母四旬外身軀肥胖暑月多咬生冷
夜半腹疼上不得吐下不得痢或与藿香正氣散入

口即吐不得下咽診之左三部沉緊而細右寸關沉
實有力面色紫脾四肢厥冷昏不知人牙關緊閉此
寒氣太重中焦氣滯不得尅化先用烏梅擦牙俟開
即投炮 凡三厘腹中鳴响去垢穢若于四肢溫暖
面色如常然昏似醉懶于言語恐元氣太削遂用
歸芎川芎茯苓豆仁木香陳皮木通數劑而安

王宇太治一老人暑月霍亂昏冒不知人脈七八至洪
大無力頭熱如火足冷如冰半身不遂牙關緊急此
年高氣弱不任暑氣陽不維陰即瀉陰不維陽即吐
陰陽不相維則既吐且瀉也正值暑氣極盛之時非

甘辛大寒之劑不能泄其暑熱墜其陽熾而安神
遂以甘露飲甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽
水調灌而愈

一婦患吐瀉十餘日水粒不入發熱煩燥欲去衣被六
脈浮洪重按全無用六君子加藿香砂仁附子冷服
悉已

薛立齋治進士李通甫之內冬間開衣箱其內衣服乃
夏月所晒者開時竟為暑氣所侵良久患霍亂足指
足跟俱轉筋甚惡自分必死用香薷飲一劑急煎下
咽即安

儀部李北

仲夏患腹疼吐瀉兩手足捫之則熱按之

則冷其脉輕按則浮大重按則浮細此陰寒症也急

服附子理中湯不應仍服至四劑而安

附子理中大德劑也不應

則不逆可知故可仍服也

包瑞溪李憲博繆仲淳傷暑霍亂神方絲瓜叶一片白

霜梅肉一枚并核中仁同研極爛新汲水調之入口

立痊 廣筆記

馬銘鞠博霍亂方用粟米連殼搗碎煎湯温服下口立

愈 全上

梁溪顧聖符得治霍亂方取扁豆叶搗汁一椀飲之立

愈 全上

繆仲淳治高存之家僕嬾患霍亂以砂仁一兩炒研鹽

一撮沸湯調冷定服一劑愈傷冷物者加吳茱萸四

錢 全上 錢字宜酌

瘴

陳三農治制府王某感冒瘴氣寒熱胸膈飽悶頭疼眩暈惡心脈數而洪用藿香正氣散加厚朴檳榔羌防風蘇叶一劑而寒熱退頭不疼減去羌蘇防風加艸寇半枳諸症悉愈

梧州方姓脈弦而數頭疼身痛惡心飽悶發熱用羌防芎蘇藿朴二陳蒼朮甘艸檳榔二服而減因飽脹未退加艸寇艸果方愈

此頭疼惡心飽脹所以奇于感冒乃瘴氣也

端州李別駕鑲藍旂人年四十餘能騎射署雷州府時善搏虎不避風雨寒暑涉溪嶺染瘴已深其所感冒

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

風寒暑濕不一而足矣且久客半載甫歸本署未暇
休息遂往省謝謁上台可謂勞于公事忘于己躬其
如積邪所感猝然皆發医者紛沓据云略为解散已
進補劑而邪氣大作寒熱神昏語脉空數無根神
氣散亂補瀉兼施而議論紛然矣指陳往視而脉已
如水上莖仲景云只作美上油刻々欲脫寒熱間作蓋受病
既深積氣兩壅邪氣正熾難以措手擬用五積散加
附子人參去麻黃易羌活已言明不治之症不忍坐
視勉盡愚誠之意疑立方有雜色不欲下葯之語遂
置不用越一宿復拉往視脉殆甚因見紫頭昨葯

尚存遂堅辭而出后聞以陰瘡陽虛而用金匱腎氣
湯加參者有以為虛症似瘡當用補中湯而加參附
者三劑而神昏氣喘虛汗如雨足冷而脫矣不知此
症初實受瘴氣屢感屢深今則乘虛而發有云傷寒
偏死下虛人况瘴氣而風寒暑濕兼備者乎

正紅旗孫兄粵東轉運司高公令親也高札云舍親孫
某患不起之症非公不治亦作善之一端時因余創
育嬰局于廣省故云然也往診其脉空豁恍々不定
重按無根神昏語寒熱大作加之咳嗽痰喘轉側
不能日夜惟伏几呻吟且胸膈脹悶足冷惡寒詢知

夏秋積勞寒暑皆受一月以前初感頭疼身痛惡寒
惡熱咳嗽或用桔梗杏仁乾姜芎藭蘇汗而不解復
用前胡桑皮蘇子半夏貝母知母黃芩亦不應寒熱
更甚入用小柴胡加山芩元參薄荷咳嗽更甚不知
此症夏秋暑濕風寒兼感而發尚未得汗何能解散
遂用五積散二劑汗出如淋咳嗽亦減可伏枕矣惟
寒熱未退病入元氣已虧氣上喘小便如油短數其
火從下而上二感下虛用金匱腎氣二服氣平便順
然潮熱如故時有嚔語昏冒午後用參附六君湯朝
與腎氣凡經月汗止神清凡用參附共斤許又服還

少丹加河車桂附鹿膠及十全大補湯五十餘日元
氣始復此与李別駕一病脈虽少異以不信藥而死
悲哉

戊寅十一月高齏使公子患痢非痢紅多白少惡寒
微熱脈滑而數詢知自夏秋以來由以北隨任之粵
久積暑濕感冒而發用平胃加羌防蘇藿一劑而寒
熱退再劑加檳榔木瓜香而痊或問痢忌燥藥今用
蒼朮而痊何也曰常人痢疾因暑令火熱之氣而得
燥為天時之忌是以不可擅用今以積濕之病發于
隆冬外感即是得力要藥也所謂治病而搜其原者

片也。可痊。故醫無執方病無執藥云。

梁溪醫師周西侯之弟開銅山于英德其山下有水人浣衣則垢膩皆去相与為奇以其近便炊爨皆用之未凡人皆黃胖身軟腹脹而無力飲食倍進寒熱間作善啜鳩豕諸肉則胃腹少安在廠同事皆死鮮存因來省求治用平胃正氣治其病後以益氣六君補其受毒水剋劑之愆而安此即粵西太平柳州南寧毒水瘴也。

一時開山病者还省數人皆似瘴非瘴如驛官之戚陳某者醫以瘴視不及月餘而疾篤因勢急方求診脈已細而緊數飲食不進陳曰若欲吾治何不在一月之前病虽甚而元氣犹在令精神殆尽虽有婆心無藥可施矣。

閱一載驛官復有甥陳姓亦以開山病歸仍犯毒水瘴所傳似痢非痢寒熱間作醫以香連朴硝大黃行藥消導更危羸易醫曰可以進補用白朮五分陳皮二分茯苓四分病無進退召陳診犹謂飲食尚可料不致大變脈之恍然不定重按已絕人將謝世而飲食犹能此所謂行屍之疾邪火浮戴真精已竭矣辭之二日卒。

新安陳聖林長子年十六精血充足飲食倍進丁丑春
從人到廣年餘患似痢非痢足腫便赤此受暑濕瘴
熱之病半年前曾視其脉數逾六至每言于其父此
有積疾非壽徵也即欲急治已屬難能人皆以為謬
未几而發此疾医用寒如大黃、柏黃連、芩、硝、厚朴
消導如枳實、檳榔、厚朴、山查、艸寇、補如參、芪、八珍、熟
加桂、附、姜、茱、煎、投、倫、進、時、陳、奉、制、府、之、招、留、滯、端、州
兩月歸而往視不可為矣

洞庭賀澤民按察雲南時分巡騰衝等處討賊自染瘴
癘腰股發熱有監生殺犬煮餽之令空心恣食飲酒

數杯即去溺澀少候清利其脹漸退蓋犬肉能治瘴
也 容慶所聞

治療法宜溫中固下升降陰陽及灸中脘氣海三里或
灸大指及第五指皆能止熱若用大柴胡湯及麻黃
金沸艸散青龍湯膠柱鼓瑟鮮不敗矣又中瘴失語
俗名中艸子移時血凝立刻死法當用針刺頭額及
上唇仍以楮叶擦其舌令血出徐以葯解其內熱立
効 居易錄

漳水界有一水名烏脚溪涉者足皆如墨數十里間水
不可飲、則病瘴梅龍蒿儀堂治療至漳州素多病

預憂瘴癘為害至為脚溪使數人肩荷之以物蒙身
恐為毒水所治就場過其肝胆雙鑠忽墮水中至于
沒頃乃出之幸体黑如崑崙奴自此宿病尽除頓覺
康健 說願

江南間有溪毒疾發時如重傷寒識之者取小筆管內
鼻中以指彈之三五下即出黑血良久疾愈不然即
不 錄異記

行路時但見前後山間有氣如紅或白即是瘴氣急以
身伏于地下用口合土俟其氣散乃起則無傷蓋其
氣空而過不著于地也若有換柳及蒜服之亦可 歌

石間說

瘴疾吐下皆不可治之法惟灸中腕氣海三里三處
并灸大指再用針多刺額及上唇令多出血人以楮
吐擦舌亦令出血後乃用葯解楮叶之毒瘴毒自消
粵瑞

瑋按此本赤雅与唐易錄小異

及八言粵西某縣瘴殊甚縣令赴任即死無逾三月者
一丞至任歷十餘年家口染疾死亡殆尽此匪久無
恙然無他嗜燒酒而已 公上

周公謹云香附四兩去黑皮微炒片子姜黃湯浸一宿

洗淨二兩廿州一兩炒各細末入鹽點辟鼠瘡之氣
極妙心雅堂雜抄

王尔張衡馬均皆冒重霧行一人無恙一人病一人死
問其故無恙人曰我飲酒病者食死者空腹博物志



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

嘔吐反胃瀉

續名醫類案 卷十



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

續名醫類案卷十

嘔

錢唐魏之琇王橫輯 男弒編次

杜士治安業坊有閩家老媪人患嘔吐請石秀才醫曰
胃冷而嘔下埋中丸至百餘丸其病不愈石疑之召
杜至曰藥病正相投何必多疑石曰何故藥相投而
病不愈杜曰藥力未及更進五十丸必愈果如其言
石于是師法于杜 區李淵曰

王普侍即病嘔飲食皆不得進召孫兆治數日亦不愈
後復召杜曰治嘔愈嘔此胃風也遂用川烏一兩

淨洗去皮臍不去共以漿一碗煮乾每斤作兩片復用漿水一碗煮盡更作四片細嚼一片以少溫水下少頃嘔遂止痛既少息杜遂問曰尋常好喫何物曰好喫甘甜之物杜曰是甘甜乃羔梁之物積久成熱內而生風非一朝一夕之故也王服其說全上

毛公弼有一女嘗若嘔吐求龐安常醫与之藥曰嘔吐疾易愈但此女子能不嫁則此病不作若有娘而嘔你不可為矣公弼既還家以其女歸沙溪張氏年餘而孕果以嘔疾死曾達昌獨醒錄志

臧中立昆陵人客鄞崇寧中徽宗后病甚中立應詔以

布衣麻履見命之入診出閣何症中立對曰脾脈極虛殆嘔瀉之痰作楚和為以進旦曰服此得睡為効至夜半果思粥食不一月獲安賜歸詔出官帑予地築室南湖以居焉

許孝士政和中治一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐為食不下用丁香藿香滑石等藥下咽即吐許曰此正汗後餘熱留胃腕正宜竹茹湯用之而愈

薛立齋治府庠沈姬文母患脾虛中滿痰嗽發熱又食濕面冷茶吞酸嘔吐絕食誤脹苓連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治曰脈主

逆以脾虛不能約制也故用人參安胃散惑于衆論
以為胃經實火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如
指甲一塊頃發嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀
視之則神脫脈絕瀕死矣惟目睛尚動曰寒淫于內
治以辛熱然藥不能不矣息用鹽艾附子炒熱熨臍
腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子
作餅熱貼臍間時許神氣少甦以參朮附子為末仍
以是藥加陳皮煎羔為丸如粟米大入五七粒于口
隨津液嚥下即不嘔二日后加至十粒諸病少退甘
涎不止五日后漸服前劑一二匙胃氣少復乃思粥

飲後授以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈

良方

一人湯藥入口即吐出六脈洪大有力此因地道不通
故氣厥逆上行而食物難入耳不更衣已十日餘服
承氣等湯俱不納曰秘結日久涌逆勢盛故也止沸
莫如抽薪遂用密導去燥糞數升嘔吐即止調以養
血清火之劑而安

周慎齋治一人飲食如常每遇子時作吐大便秘結其
人必若慮憂思脾氣鬱結幽門不通宜扶脾開竅為
主遂以參苓白朮以蒼朮拌炒炙甘州各一錢附子
煑為藥三分水煎服愈

通

一士鬱熱嘔吐用竹茹山梔各三錢陳皮茯苓各二錢
甘州一錢煎成加姜汁五匙熱服而愈人還

陸養愚治李糧廳因飯後勞擾下午飲酒數杯遂覺臍
下小腹作痛升至胃腕即嘔：訖痛止少頃又從下
痛上復嘔訖痛緩自后痛嘔益頻自疑中毒以淡鹽
湯垂汁探吐之一無所出醫投藿香正氣散不効其
脈浮按細數稍重即伏沈按甚堅曰此飲食過飽急
遽所至與潤字丸有十顆令淡姜湯服之少頃連瀉
數行而愈此藥亦動
攝久吾

龔子才治梁太守女患頭暈嘔吐聞藥即嘔諸醫束手
令以伏龍肝為末水丸塞兩鼻孔用保中湯以長流
水入膠泥攪漚煎冷頓服而安萬病回春

信陵府桂臺殿下夫人善怒：即嘔吐胸膈不利煩躁
不寧腹痛便秘食下即吐已八日心慌喘急危甚診
之六脈虛微此血虛胃弱氣鬱痰大也與二陳湯加
姜連酒芍炒危當歸酒芍香附竹茹白朮入姜汁竹
瀝一服而安

張景岳治吳參軍困食磨茹致大吐大瀉醫謂速宜解
毒以黃連黑豆桔梗甘州枳寔之屬連進而病益甚
胸腹大脹氣喘水飲不入延張診授以人參白朮甘

草乾姜附子茯苓之類彼疑曰腹脹氣急口乾如此
安敢服此耶閱日愈劇再求治與藥如前且疑且畏
含淚吞之一劑而嘔少止二劑而脹少衰隨大加熟
地以煎救其瀉止之陰前後九二十餘劑復元如故
蓋磨茹之為物必產于深坑枯井或沈寒極陰之處
其得陰氣最盛故肥白且嫩也今中其陰寒之毒而
復解以黃連之寒其解毒之謂何茲用姜附以解其
寒毒人參熟地以解其毒傷元氣此疾之所以愈也
或入飲食傷
或入中毒

金氏少嬾素任性每多胸脇痛及嘔吐等症隨調隨

愈後于秋盡時前症后作而嘔吐更甚病及兩日甚
至厥脫不省肝火衆謂湯飲不入無策可施一醫云唯

用独參湯廢幾萬一張診之其脉乱數且煩熱躁擾
意非陽明之火何以急劇若此乃問其欲冷水否彼
即點頭遂與以半鍾惟此不吐且犹有不足之狀乃
復與一鍾稍寬安靜因以太清飲投之有謂此非傷
寒又值秋盡能堪此乎不与辨及藥下咽即酣睡半
日不復嘔矣后以滋陰輕清等劑調理而愈大都嘔
吐多屬胃寒而復有火症若此者此症火症極多張
編于溫補故有此

說經曰諸逆衝上皆属于火即此是也多屬胃寒自
入是何說

後凡見嘔吐其有声势湧猛脉見洪數症多煩热者皆以此法愈之

以多属胃寒及自后二字观之張生平于此候亦不少矣蓋此症良由肝火上逆故暴急如此而白湯明之火其孟良可知

張路王治曾餘弟嬪患嘔逆不食者月餘服寬膈理氣二十餘劑幾致絕粒而痞脹異常診之脉得虛大而數按中景脉法云大則為虛此胃中陽氣大虛而濁陰填塞于膈上也因取連理湯方用人參二錢服之四劑而痞止食進后与異攻散調理而痊

嵇紹有胸中寒疾每酒後若噎服姜蕤得愈艸似竹取根花叶陰乾昔華陀入山見仙人斲服以苦樊阿服

之壽百歲也 本艸

陳良甫曰胃热嘔吐者手足心热政和中一宗人病傷寒得汗身凉數日忽嘔吐药与飲食俱不下医者皆进于香藿香滑石等药下咽即吐予曰此症汗后餘热留胃腕孫兆竹茹湯正相當尔亟治药与之即時愈

有嬪人病吐逆大小便不通煩乱四肢冷漸無脉息凡一日半与大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翌月乃安此閉格之病極难治医者常謹審也

而治者惟此一入耳 經曰閉則吐逆格則小便不通如此亦有

不得大便者

衍義

醫說精編

張子和治柏亭王論夫本因喪子憂抑不思飲食醫者不察以為胃冷血寒之劑尺用病變嘔逆而搜求治于張一再涌泄而愈歸家忌其禁忌病復作大小便俱秘臍腹撮痛嘔吐不食十日大小便不通十三日復問張曰令先食葵羹菹菜猪羊血以潤燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲水水數升繼搜風丸桂苓白朮散以調之食后服導飲凡三十餘粒不數日前后皆通痛止嘔定張臨別又晉潤腸丸以防復結又留滌腸散大便秘則用之

凡服大黃牽牛四十餘日方瘳論失因嘆曰白使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問張云腸者暢也不暢何以此一句儘多

按子和之醫大抵此法行之耳丹溪云凡病人欲吐者切不可下之逆故也縱使二便復秘可行疎道亦中病而止然后養其氣血潤其腸胃庶乎標本之治乃羸瘠之人服大黃牽牛四十餘日方瘳豈理也哉違聖人之法以欺后世恐非子和之筆也孟子謂盡信書不如無書學者詳之

醫學續編原詳

薛立齋治一婦人食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經

不調手足逆冷此內外俱寒之症遂以六君加附子木香而安

一男子食少胸滿手足逆冷飲食畏寒發熱吐痰時欲作嘔白用清氣化痰之劑胸腹愈脹呼吸不利吐痰嘔食小便淋瀝又用五苓散之類小便不利諸症益甚曰此脾上虛寒無火之症故食入不消而反出非氣膈所致逆用八味丸補中益氣湯加半夏茯苓姜桂旬日乃愈

一婦因勞後發熱倦怠唾痰欲嘔或以為大症用清熱化痰等藥反大便不寔無氣以動此寒涼復傷中氣

形病俱虛用參朮朮麥冬五味陳皮附子治之而痊後復勞經水數日不止衆以為附子之熱所致用四物苓連槐花之類涼而止之前症愈甚更加胸膈痞滿飲食日少仍用前方去門冬更加茯苓半夏炮姜數劑少愈又用當歸芍藥湯而經止但四肢逆冷飲食難化不時大熱此命門其大衰脾土虛寒之假熱也用八味丸半載而痊又服六味丸三載而生子宋理宗嘔吐不止召楊吉老治之問用何方曰辛熱藥也帝曰服之不効吉老奏曰熱藥冷服藥成放井中良久澄冷進服而吐止

勿料發揮

立齋治一癯婦惡心少食服解毒為愈嘔此胃氣虛也
以六君子湯加生姜治之而安戴氏云元如惡心者
無声無物欲吐不吐欲嘔不嘔虽曰惡心非心經之
病皆在胃口上宜用生姜以能開胃也

施笠澤治鄒翁患嘔吐遍身疼不能轉側醫為治其嘔
吐矣然眠食犹未安也診之曰風入于經其脉乃凝
留結不散寒痰中停四支不掉三焦不行亟疏其風
亟調其經氣和血平轉側自能先用蘓合丸以通其
氣隨用導痰湯加桂枝沈香白芍一劑即熟睡竟而
展轉自如再用六君加沈香而安

馬元儀治袁某患小腹厥氣上冲即吐得飲則吐更甚
諸方不効診之兩脉虛濇右尺独見弦急曰人身中
清氣本乎上而及陷下則為注為泄浊氣本乎而下
及逆上則為嘔為吐今病正在下而不在上也下焦
之濁氣上升則胸中之陽氣不布故飲入于胃有上
壅而不下達耳經云雲霧不清則上應白露不下非
地道得通浊氣何由而降嘔吐何由而止以調胃承
氣湯一劑下宿穢甚多再培中氣而安

張司馬子嬭患胸中滿結作痛飲入則嘔涌出痰涎多
成五色已数月或主攻尅或主補虛卒無一効至七

月中病更危迫診之兩關尺虛微少神倦神煩胸
中結痛按之更甚此正氣內傷陰邪內結攻之則傷
其正補之則滯其邪當以仲景臟結之法治之用黃
連湯加桂甫一劑嘔吐頓除再劑胸中滿疼亦釋次
用理中加桂而安

張景岳曰沈姓者業醫年及四旬極勞碌因癩疝下墜
欲提上升用益湯吐法遂吐不止湯水不受如此一
日復夜大便下黑血一二椀脈微如毛欲絕此蓋吐
傷胃氣脾虛之極兼以鹽湯走血脾不能捍從便而
下令速用人參姜附等以回垂絕之陽忽一醫至曰

諸逆冲上皆属于火大便下血亦因火也尚可參附
乎宜速飲童便則嘔與血可止矣病者然之及童便
便入口遂一嘔而絕

琇按疝下墜本由肝木厥張乃復激之上升致脾
胃俱傷而下血不死何俟童便固非即參附亦未
為是也

馮楚瞻治蔣公子精神素弱吐血陰虧調理初愈忽又
夢遺大吐不已六脈沈微曰夢遺俗名走陽更傷
矣大吐不止又亡陽矣急以附子理中湯去甘州投
之到口即吐又以白通湯調人屎与之亦吐衆所用

方不出理中四逆白通之類然均不受沈因數日上
不能入下不能出邊有進西洋藜酒一方神治闕格
吐逆之症內皆辛熱純陽之藥能破格陽之陰又燒
涌力猛辛烈直透丹田令照方修治飲之即不吐矣
遂以參附峻補而愈

琇按馮氏生平多尚溫補如此症吐血陰虛之後
夢遺而吐多由老雷之火下迫上奉以辛熱治其
標則可若守而不化必貽後患

盧不遠曰生平聞銅腥臭即惡心入口鮮不吐者虽人
參湯与茶久在銅鉋中者亦然常思銅青固發吐藥

唯我何独畏之甚久未晰此疑辛亥夏卧病開銅臭
而嘔恍自反為木形人色常青畏金故于銅臭為相
忤自思子和吐論中發吐之藥四十有六種嘗讀而
未能解也遂將以五形五色定人而施之若木形大
畏金腥而吐則火形人畏鹹腐木類而吐矣然畏者
必惡之因其惡以激其怒則用力少而成功多餘三
形可以例見噫豈唯吐為然而下而汗寧不可乎

沈抄

耳聾久吾曰庚寅季春別駕夏公至新興寺放飢穀予備
酒飯款之正飲間忽然腹痛其痛從臍下小腹起痛

至胃腕即嘔之訖痛止半時許又從下痛上復嘔之訖痛止如是者數次醫作感寒治用藿香砂仁等藥不効至申刻予竟是內熱作熱痛熱氣上冲而嘔必須利之然煎劑不可服恐反增嘔急製牽牛大黃丸服至數錢利數次而恍然愈矣黑牽牛四兩寸炒半生磨取頭末一兩大黃酒炒一兩半檳榔六錢枳實炒六錢厚朴姜汁炒六錢三稜莪木醋炒各一錢為末米湯為丸桐子大服三錢未利利再服二錢見効

吐

鮑綠飲年二十餘以夏日肩輿返歛途次受熱鼻衄盈盃愈後偶啖梨遂得吐症蓋肝火而非胃寒也百治不効聞道吐字則應聲而嘔以故家人咸戒之后至吳門就叶氏診以其脉沈細令服附子理中湯人參姜附俱用三錢服後出門行及半里竟頭重目眩急歸寓及門而仆幸其尊人惟諳藥性謂必中附毒亟煎甘州湯灌之良久乃甦后去附子仍服三劑吐轉劇再往診仍令服前方遂不敢試改就薛氏告以故薛用六君子湯服四劑無効再求診邊薛他往薛壻

令照方加益智仁一錢再服亦不應又求診于孫某
其方用甘州八錢下咽即吐因不復求治而返偶以
冬月送殯感寒增咳纏綿至夏余偶訪之則病劇詢
知為向患吐近復二便俱秘已七八日不食惟渴飲
茶水更醫數人或令以艾灸臍俱不應請診之見其
面色青忤脉弦伏而寸上溢謂此緣脾陰大虧木火
熾甚又因久嗽肺虛肝無所畏遂下乘脾而上侮胃
致成閉格幸脉不數易已也宜先平其肝俾不上冲
而吐止斯肺得下降而便行令以黃連肉桂各五分
隔湯蒸服飲下竟吐少止即能食糕數塊然二便脹

不可支令以大田螺一枚独蒜一枚搗爛菴于丹田
以物繫定不逾時二便俱行而下皆青色遂霍然而
愈時甲戌五月二十七日也后与六味加減入炒參
麥冬等咳嗽亦止向後常服養營之劑吐不作矣

葉太史右渠在上江季幕中患吐症久不愈凡季使按
臨之郡必召其名醫診治兩年餘更醫十數病日甚
歲暮旋里或与二陳加左金吳萸川連俱用五六分
服下少頃吐血椀許脉之不數第兩尺俱上魚際左
尺微不應指波欲言病源及所服方葯余曰悉知之
矣第服余方五十劑乃得痊計熟地当用三片許乃

訝然莫喻問所患究何病曰彼上江各醫不過謂病
痰飲耳所用方不過四君六君香砂大君已耳遂指
案笑曰一皆如言但非痰飲何以多酸若涎沫今飲
食日減何以反重用熟地曰此症由于腎虛肝失其
養木燥生火上逆胃絡肺金亦衰飲食入胃不能散
布通調致津液停蓄腕中過大上衝則吐而出也四
君二陳香砂類皆香燥之品以之為治猶抱薪救火
反助之然必滋水生木潤肺養金庶可獲効第陰藥
性緩病既久非多劑不瘳也用熟地杞子沙參麥冬
石斛等出入加減初服吐自若十劑外吐漸減食漸

增果至五十劑而愈

倪首善年未二十稟賦甚弱早婚得吐病或与二陳五
香等劑轉甚有用桂附者服一劑竟不安乃止有聲
單食猪油者初頗効后亦不應脉之虛弦略數与生
熟地沙參麥冬川連姜仁四劑后去連又三十餘劑
而痊

高氏女七八歲時即病頭痛而嘔或酸或苦百治不効
其父詢余曰此肝火上逆耳与生地杞子沙參麥
冬二三劑即愈后及笄於春尽病復作其父已歿乃
凡延數医治之所用皆二陳六鬱香砂丁桂之類經

半年面殺青股無肉其母泣令延余仍前方每劑內
熟地一兩廿餘劑乃愈

金氏嬪患吐症蓋十餘年矣所服香燄不可勝計后左
脇漸有塊經水不行脉澁數善怒延診辭不治強不
已勉与六味加減服之頗有驗然一怒即發越半年
而卒

福建羅二尹悔齋久病足瘦于去季春嘗嘔而頭汗大
出醫療無効乃不為數月漸可隨手夏間又患不眠
治亦無効至秋后乃產合年春用公事寓抗求針科
治足疾又為灸中腕氣海等穴十餘壯步稍良而嘔

症大作食入即吐絕粒數日又不眠服姜附黃桂二
朮二陳等竟有烟辣之氣上衝診之六脉大如筋頭
兩寸皆溢出魚際舌瘦小神之極亢且顫中黃胎渣
紅癩額色赭石鼻色重焦小便清白大便常五日一
行謂此營氣大虧肝腎之火上逆胃絡則嘔吐浮入
心胞則不眠与養青湯加川連牛膝米仁厲其驗小
便黃則病退一劑即不嘔能食小便果黃色二劑得
眠舌胎淡紅癩消唯兩脇如有物動輒牽引加山巵
川棟二劑左脇之物即墜下又加枇杷叶熟地姜仁
去山巵川棟黃連牛膝二劑右脇之物亦墜下脉亦

稍飲大便一行以行期甚迫屬其照方服至古二日
不顛乃可或足疾再甚慎進風燥之劑所以云者知
其針之得瀉而慙愈耳

反胃

常熟一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岫下
夢一僧持湯一杯与之飲罷便覺胸快次早入寺乃
夢中所見僧常以此湯待賓故易名曰甘露飲用乾
錫糖六兩生姜四兩二味同搗作餅或焙或晒入炙
甘草末二兩鹽少許點湯与之予在臨汀療一小吏

旋愈

繼洪齋察方
本州綱目

金山固禪師得正胃散方于異人用白水牛喉一條去
兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時投灸
用米醋一盞浸之微大灸乾淬之再灸再淬醋盡為

度研末厚帛色收或遇陰濕時微火烘之再收過此
疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立効凡及
胃吐食葯物不下結腸三五日至七八日大便不通
如此者必死用此方十痊八九君子收之可濟人命
也普濟方 全上

大順間有周岐鳳者身兼百技溺意方術既死反人偶
召箕用至運箕如飛頃刻數百言乃長詩也後一段
云朗吟当前夜欲闌丹方寫与期平安菊莊老人此
老病反胃病寔由胃寒批把叶芍白豆蔻紫蘆子芍
用莫謬良姜官桂用此須厚朴陳皮看功秦半夏楨

榔赤茯苓沈香丁皮皆用輕白芥藿香吐聖葯杵頭
糠芳尋至誠三片生姜兩枚枣切分明向君道人
參乃是佐使者食前一服沈疴好蓋菊莊患此病周
示以方也第菊莊未知何許人祝子志怪

薛立齋治一婦人患反胃胸膈脹悶或小腹不利或時
作疼小便瀟滂曰此肝火血虛也當清肝火生肝血
養脾土生肺金以薛言為迂別服利氣化痰等劑前
症益甚虛症蜂起乃用加味道遙散加味歸脾湯煎
服而愈

一婦人患反胃吐痰甚多手足常冷飲食少思曰此肝

脾鬱怒兼命門火衰不信另服化痰利氣之劑胸腹
愈脹又服峻利疎導之劑薛曰非其治也必變脾虛
發腫之症急服金匱加減腎氣丸庶有可掬仍不信
反服化氣等致發腫而死

汪石山治李一之年近四十病反食与近鄰一人脉病
頗同汪曰二人者皆急于名利惟一之心寬可治遂
以八珍湯減地黄加藿香為末用蜜韭汁調服而愈
其一人逾年而歿

張路玉治湯伯乾子年及三旬患嘔吐經年每食后半
日許吐出原物全不穢腐大便二三日一行仍不燥

結渴不喜飲小便時白時黃屢用六君子附子理中
六味丸皆罔效日頻于死診之兩尺弦細而沈兩寸
皆濡而大此腎藏真陽大虧不能溫養脾土之故遂
以崔氏八味丸与之或謂附子已服過二枚六味亦
曾服過恐八味未能奏效也張曰不然此症本屬腎
虛反以姜附白朮伐其腎水更耗真陰至于六味虽
曰補腎而陰為性滯無陽則陰無以生必于水中補
火斯為合法服之果愈

張三錫曰治反胃用新汲水一大碗留半碗將半碗水
內細澆香油鋪滿水面然后将益元散一帖輕

鋪滿香油面上須臾自然沈水底此即陰陽升降之道也用匙攪勻服却將所留水半碗湯藥攪漱口令淨吐既止却進朱子涼膈散通其二便未効再進益元及涼膈即効也

王叔權曰有人久患反胃予與鎮靈丹服更令服七氣湯遂能立食若加以炷艾尤佳有老嫗患反胃飲食至晚即吐出見其氣繞臍而轉予為照水分氣海并夾臍邊兩穴而愈資生經

浙省平章南征聞越還病及胃醫以為可治朱先生診其脉告曰公之病不可言也即出獨告其左右曰此

病得之驚後而使內火木之邪相扶氣傷液亡腸胃枯槁食入而不化食既不化五藏皆無所稟去十日死果如言越游集

日死果如言 越游集 醫說續編

薛立齋治一婦人患反胃胸腹痞悶得去后或泄氣稍寬此屬脾氣鬱結而虛弱也當調補為善不信乃別用二陳枳寔黃連之類不應又用香燥破氣時師類形氣更虛用歸脾湯調愈多出此

許孝士治一婦人年四十餘久患反胃面目黃黑歷三十餘年醫不能効脾愈諸穴燒灸交遍其病愈甚服此藥頓然全愈服至一月遂去其根名附子散用附

子一枚極大者生于棗上四面著火漸逼熟焯入
生姜自然汁中再用火逼再焯約盡生姜汁半椀焙
乾入丁香二錢每服二錢水一盞粟米少許同熟七
分三服痊

王海藏云趙侍郎先食后吐目無所見耳無所聞服紫
菀凡五十日瀉出青蛇五七條四寸許惡膿三升愈
方見厲風門

蕭萬興曰崇禎戊寅歲余客汴梁為一郡王宮人產后
發疔疔因言及先王壯齡時患癰疔反胃遍治不効
自料無生理一草匠亦精于脉者連投五劑用大黃

七兩始能食再投十餘劑計服大黃斤許前疔漸愈
後日服痰葯滾痰丸兩旬方得全痊越年餘連生五
子壽至凡十三而薨此稟賦之再厚者

瀉

崔萬安公務廣陵苦脾瀉家人禱于后土祠是夕萬安
夢一媪人珠珥珠履衣五重皆編貝珠為之謂萬安
曰此疾可治令以一方相与可取青木香肉豆蔻等
分枣肉為丸米飲服下二十九丸此葯大熱痰平即止
如其言愈 稽神錄

宋高宗嘗以瀉疾召王繼先繼先至則奏曰臣湯甚乞
先宣賜瓜而後靜心診御上急召大官賜瓜繼先
食之既上覓其食瓜甘美則問繼先朕可食吐乎繼
先曰臣死罪索瓜固將以啟陛下食此也詔進瓜上

食之甚適瀉亦隨止左右驚上亦疑問繼先曰此何方也繼先曰上所患中暑故瀉瓜亦能消暑耳四朝聞見

錄 葉紹翁

王濬亦頗宗繼先術亦有奇驗然用藥多益浪高宗居北宮苦脾疾淫悞用瀉藥竟至大漸孝宗欲戮之市朝憲聖以為恐自此醫者不肯進藥止命天府杖其背黔海山淫先懷金箔以入既杖則以傳瘡若未嘗受林后放還居天街犹揭于門曰四朝御醫王防禦有輕薄子以小指帖其旁云奉家兼施瀉藥王慚甚冷上程火云高宗夙賦允實自少至髦未嘗用瀉每小不怡輒進瀉毒員數百一以芫花大黃大戟

為主一曰進餽飽竟胸膈效壅至淫犹生前菜既投而不支遂以大漸云云

竇材治一人患暴注因憂傷脾也服金液丹霹靂湯不効蓋傷之深耳命灸二百壯小便始長服草神丹而愈

一女人因泄瀉發狂言大脉緊數乃胃中積熱也竇詢其丈夫因吃胡椒生姜太多以致泄瀉五日后發狂言令服黃芩知母湯而愈據此則竇亦非藥用熱補也

衍義治一人大腸寒清小便精出諸熱藥服及一斗二升未効后教服亦石脂乾姜冬一兩胡椒半錢同為末醋糊為丸如梧子大空心及食前米飲下五十七

丸終四劑遂愈 醫季繹目

張子和曰昔聞山東楊先生治府主洞泄不止楊初未
對病人與衆人談日月星辰纏度及風雲雷雨之為
自辰至未而病者忘其圍楊嘗曰治洞泄不已之人
先問其所愛之事好棋者笛笙與之棋好樂者與之
勿較脾土信又主思慮投其所好以移之則病自愈

維揚府判趙顯之病虛羸泄瀉褐色乃洞泄寒中症也
每聞大黃氣味即注泄張診之兩手脈沈而軟今灸
分水穴一百餘壯次服桂苓甘露飲胃風湯白朮丸
等藥而愈

趙明之米穀不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫
以為脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日
藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不思口
張至而朕曰春傷于風夏必飧泄飧泄者米穀不化
而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下久風入中
中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己
腸中有風故鳴經曰歲木火過風氣流行脾土受邪
民病飧泄診其兩手脈皆浮數為病在表也可汗之
直斷曰風隨汗出以火二盆暗置牀之下不令病人
見火恐增其熱給之入室使服涌劑以麻黃投之乃

閉其戶後外額之汗出如洗待一時許開戶減穴一
半頭更汗止泄亦止

喻嘉言治周信川用火之法迨
但此見痢門凡熱極則生
風地壯土治王普嘔症因多食
甘甜積熱而成胃風其理自見

麻知幾妻當七月間病臟腑滑泄以降火之葯治之少

愈后腹脹反乳痛狀如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒

熱往來噎乾嘔逆胸脇痛不能轉側耳鳴食不可下

又腹瀉麻欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以溫劑又

禁上焦已熱實不得其法請張未至因檢劉河間方

惟益元散正对此症能降火解表止渴利小便定利

安神以青黛薄荷末調二升置之枕右使作數次服

之夜半偏身冷汗出如洗元竟足冷如冰至此足大

暖頭項輕肌涼痛減嘔定利止及張至麻告之已解

張曰益元固宜此是少陽症也能使人寒熱偏劇他

經縱有寒熱亦不至甚既熱而有利何不以黃連解

毒湯服之乃令診脉張曰娘子病來心常欲痛哭為

快否嬾曰欲如此予亦不知所謂張曰少陽相火凌

燥肺金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而為

快也麻曰脉初洪數有力服益元散后已平又聞張

之言使以當歸白芍以解毒湯味數服之大瘥矣

一僧病泄瀉數年丁香豆蔻乾姜附子官桂烏梅等燉

藥蟠針燒臍熯腕疑腕無有缺者一日發昏不省張診
兩手脈沈而有力脈訣云下利微小者生脈浮大者
无痊以瓜蒂散痛之出寒痰數升又以無憂散泄其
虛中之積及慘糞盈斗次以白朮調中湯五苓散益
元散而起

劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步傾歌而色
顰黑凡治利之藥通用無效張乃出示內經洞泄之
說以曉之光以舟車丸无憂散下十餘行殊不困已
頗喜食后以檳榔丸磨化其滯待數日病已大減又
下五行后數日更以若劑越之病漸愈而足上患一

痢此裡邪去而之外病痊之后凡病皆如是也子治余氏

媪膈症將愈亦指上生痢

劉倉使大便少而頻日七八十次常于兩股間懸半枚
瓠芦如此十餘年張見而笑曰病既頻欲通而不得
通也何不天下之此通因通用也此一服之力乃与
藥天下三十餘行即止

殷輔之父年六十餘暑曰病泄瀉日五六十行喜飲而
家人輩爭止之張曰夫暑月年老津液衰少豈可禁
水但勸之少飲先令以菜豆鳩卵十餘枚同煮卵熟
取出令豆軟下陳粳米作稀粥攪令寒食唯卵以下

之一二頓病減大半蓋粳米鴉卵皆能斷利然后制抑大流濕之藥与而痊

一男子病泄十餘年豆蔻阿膠訶子皂骨烏梅枯礬皆用之矣中腕臍下三里歲灸之皮肉彼槁神昏足腫泄如泔水日夜无度張診其兩手脉沈且微曰生也病人忽曰羊肝生可食乎曰羊肝止泄尤宜食病人悅食一小盞許以漿粥送之凡半升續又食羊肝生一盞許次日泄減七分如此月餘而安大胃為水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入矣或思葷茹虫与病相反亦令少食圖引漿粥此權變之道也若專

以淡粥責之則病人不悅而食減久則病增損命世

俗誤人多矣

惟傷寒初愈不可而志食

孫文垣治張懷赤每早晨腸鳴瀉一二次晚間瀉一次年四十二且未有子診之尺寸短弱右關滑大曰此蓋中焦有濕痰君相二火皆不足故有此症以六君子湯加破故紙桂心益智仁肉豆蔻煎服瀉遂減前方加杜仲為丸之次年生子

何洗心每飲食稍令饑粥或稀必作脹瀉理脾之劑歷試不効孫診之左三部皆濡弱右寸亦然關滑尺沈各二錢山萸肉人參山藥各一錢茯苓澤瀉各八分

徵此下元虛寒所致法當溫補以補骨脂杜仲兔絲肉果五分愈

吳鶴洲母年八十六素有瘦火大便日三四行一夜兩起腸鳴臍腹膨脹脈三四至一止或七八至一止醫以苦寒入子胃散投之尅代大過因致腹疼且謂年高而脈歇至是為凶兆辭不治孫診之曰脈緩而止曰結數而止曰促此乃結脈非凶脈也由寒濕之痰凝滯所致法當溫補下元俾火得以生土所謂虛則補其母是也吳問壽筭何如曰兩尺過寸有神壽徵也以補骨脂白朮各三錢為君杜仲一錢為臣茯苓

澤瀉陳皮甘州各一錢為左肉果益智仁各五分為使四帖大便寔惟腸鳴未止減肉果加炮姜五分而安壽至九十有八

薛立齋治侍御沈東江之內停食腹痛作瀉以六君加木香炮姜而愈后腹作傳為腎瀉用四神丸而安侍御徐南湖子室瀉屬腎經不信薛言端主參泄后遂致不起

一婦人年已五十不食夜飲五更作瀉二十年矣后患痢午前用香連丸午后用二神丸各二服而痢止又以二神散刮而食夜飯月餘而愈

吳汪史玄年母素有血疾殆將二紀平居泄瀉飲食少
思面黃中滿夏月尤甚治血之藥無慮數百劑示嘗
少減薛以為脾腎虛損用補中益氣湯送二神丸復
用十全大補湯煎送前丸食進便寔病勢頓退若泥
成法藥病相忌必致悞事

沈大尹病瀉五更輒利此腎瀉也用五味子散數服而
愈因起居不慎瀉復作年餘不瘳此命門火虛不能
生止法當補其母火者母生之母也遂與八味丸瀉
即止食漸進東垣云脾胃之氣衰則能食而肥虛則
不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也

故用八味丸屢効

龔子才治一人食下腹即响即瀉至不敢食諸藥不
効以生紅柿核紙色水濕灰火燒熟食之不三四个
即止

許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒三杯而止
二三日以為常畏藥不治誤診之六脉弦數先服此
藥以解酒毒後服理氣健脾丸而愈宣黃連一兩生
姜四兩以微火炒令姜乾脆去姜取連搗末每服二
錢空心臘茶湯下端治脾泄

陳三農治一士喜食瓜果縱飲無度忽患大瀉先用分

利不應再用燥熅及加沈困診其六脉浮因思經曰
春傷于風夏生飧泄非汗不解以麻黃三錢參朮各
二錢甘艸升麻各一錢与之泄瀉頓止以四君子調
愈

一人脾胃素弱少有所傷即泄瀉此肝氣乘脾且久瀉
濕熱在腎故也用白朮八兩紅棗去核四兩二物問
觀煮至焦色搗餅烘乾入松花七錢白豆蔻五錢新
米糊九十前服

一人脚膝常麻飲食多即泄瀉此脾虛濕熱下流用補
中益氣加防已黃柏而痊

一人食物入口須從大便出其脉洪數此火性急速也
用黃連滑石木通澤瀉人參徐服而愈

楊起云余壯年患肚腹微痛作瀉亦不多日
夜數行兩月瘦怯尤甚用消食化氣藥俱不効一僧

授方用蕎麥麩一味作飯連食三四次即愈食便方

綱目曰李時珍謂氣或有濕熱者宜之
虛寒人食則大便元氣而落鬚眉也

李時珍治魏刺史子久泄諸醫不效垂殆李用骨碎補
為末入猪腰中煨熟与食頓愈盖胃主大小便久泄

庸賢虛也本州經目

一嬪人年七十餘病瀉五年百藥不効李以感應丸五

十九投之大便不行二日再以子胃糝加椒紅茴香
東肉為丸服愈後發服之即止全上

一婦年六十餘病溇泄已五年內食油物生冷犯之即
作痛服調脾升提止瀉諸藥則反甚診之脈沈而滑
此乃脾胃久傷冷積凝滯所致王太僕所謂大寒凝
內久利溇泄綿歷歲年者法當以熱下之則寒去利
止遂用蠟燭巴豆丸五十粒與服二日大便反不行
其瀉遂止自是每用治泄痢積滯諸症皆不瀉而病
愈者近百人蓋妙在配合得宜藥病相對耳苟用所
不當用則犯輕用損陰之戒矣全上

有人患內寒暴洩如注或今食煨栗二三十枚即止腎

主大便粟可通腎于此可見

易思蘭治瑞昌王妃患泄瀉屢用脾胃門消耗之藥四
五年不能止一医用補中益氣湯加人參三錢服一
月不泄忽一日胸膈脹滿腹响如雷大瀉若傾昏不
知人口氣手足俱冷渾身汗出如雨用人參五錢煎
湯灌甦如是者三病者服久自竟口中寒逆醫者以
為汗出過多元氣虛弱于前湯內加人參三錢東仁
大附子薄桂各一錢昏厥尤甚肌肉如冰夏日亦不
知熱二年計服過人參廿五斤桂附各二斤東仁七

十斤至已巳冬飲食入口即時瀉出腹中即飢而食即瀉日十數次邪火不殺穀火性迫速愈或而愈迫也身不知寒

目畏灯火熱明燭初診之六脉全無久按來疾去速緩有力如石聞其声尚雄壯此乃大鬱火症也以黃連四

錢入平胃散与之飲下少頃熟睡二時不索食不泄瀉飲五日方知為味甘苦既用通元二八丹与湯藥

間服一月病愈

吳孚先治俞用昭秋間水瀉腹痛異常右脉弦數洪寔

知腸胃濕熱挾補用枳壳山查黃連青皮檳榔木香

一劑而滯見病人慮藥尅代意欲用補白有是病服

是藥邪氣方張非亟攻不退邪退則正復攻即是補也前方再服二劑愈矣設不早攻必致痢疾非一日不痊

謝武功素患大便溏泄兼病咳嗽用涼藥則咳減而瀉

增用熱藥則瀉減而咳甚用補脾則咳瀉俱甚診之

右尺軟如爛綿兩寸寔數搏指酌用附子肉果以溫

下焦之寒麥冬川連以清心肺之火茯苓甘州一以

降氣一以和中甫四劑而症頓減不加人參者緣肺

家有熱耳

喻嘉言治胡太夫人病偶然肚腹不安瀉下數行醫以

痢疾為治之其利轉多更引通因通用之法用九蒸
大黃丸三錢下之遂擾動胃氣脹痛全不思食狀如
噤口診之六脈皆沈而伏應指模糊曰此非痢症乃
誤治之症也今但安其胃不必治痢而痢自止不必
治脹痛而脹痛自除遂以四君子湯為主少加姜蔻
暖胃之藥二劑痢果不作但苦胃中脹痛不安必欲
加入行氣之藥以真脹消痛止而速得進食因爭曰
宜可緩于食不可急于藥蓋前因藥誤引動胃氣作
楚苦再加行氣則脹痛必无紀極即用橘皮亦須炒
而又炒凡五日未得大便亦聽之痛止脹消食進便

利共七日全安

陸養愚治許默安素有腸風之症常服寒涼之藥中年
后腸風幸愈致傷脾胃因成瀉泄之症初時服胃苓
湯一帖即愈久之不効近來四肢浮腫而厥肚腹膨
脹而鳴面色萎黃而帶青身體若冷而帶熱診之左
脈沈緩而遲右脈沈弱而弦曰諸緩為濕應瀉而浮
腫諸遲為寒應瀉而若冷右弦為木乘土位應腹脹
而面青沈者陽氣不升也弱者陰精不寔也脈色与
症悉相應用人參白朮黃芪炙甘草為君以補其虛
炮姜附子為臣以溫其寒升麻防風為佐以升其陽

茯苓澤瀉為使以勝其濕十劑而諸症減又合八味丸間服而安 從薛紫化出

沈少西女年二十自小脾胃受傷不時作泄作嘔近則寒熱不時手足厥冷胸膈不舒脇脹暖氣左眼則氣不通暢左脇胃腕時疼時止渴而不欲飲小便短大便日二三行腹中雷鳴彈之如鼓揉之如水大約氣上塞則脹而痛氣下墜則泄而痛幸飲食不甚減常服胃苓白朮黃連及消導之藥或調氣補血之品不効謂此症非參朮不能取効但今微有表邪先与小柴胡加枳桔二三帖寒熱稍和

近時庸師易以調中

益氣湯去黃柏加青皮以伐脾神曲以助脾炮姜以溫中四帖脹痛俱減大便稍寔改用加減歸脾湯數劑更以六君子料加枳寔黃連麥神木香砂仁為丸與煎劑間服而安

陸祖愚治潘古臣母患脾泄久多咬水果瀉更甚嘗因經行腹痛服攻瘀去血之劑致淋瀝不止肌肉枯槁身伴發熱不能運動不思飲食氣短口渴夜臥不安服麥冬生地東仁等而瀉不止脈之兩寸閉虛數兩尺隱：若無此下元不足中氣虛寒虛火上炎之症乃用人參炮姜白朮陳皮山查木香苡仁木通山藥

甘州豆仁服之頗寬相宜又用肉果人參白朮炮姜
東西為丸日服兩次一月瀉止兩月肌肉漸長月水
亦調

黃履素曰乙巳之夏余患中脘痛既而泄瀉偶過姑蘇
一名醫令診之驚曰脾胃久傷不治將滯下子体素
弱單服攻剋之劑因此醫有盛名一時惑之遂服枳
朮黃連厚朴山查木通等葯數劑又服枳朮丸一月
以致脾胃大傷是秋遂瀉泄不止漸竟飲食難化痞
悶倒飽深自悔恨服參苓等葯及八味丸十餘年始
得愈然中氣終不如故若不耐飢少飢則中氣大虛

憊不可服凡山查消等之物入口即虛脾胃之不可
妄攻如此方書極言枳朮丸之妙孰知白朮虽多不
能枳寔之迅利予反胡孝轅刺史亦悞服枳朮丸而
大病可見此丸斷非健脾之葯或飲食停滯偶一二
服則可耳

又曰脾胃喜煖而惡寒脾虛必宜溫煖之葯予內人少
患脾有冷痰時患嘔吐不止服聶遡源五炁丹數丸
遂不復發予近患脾不和不時瀉泄服參朮三月不
効服胡与辰金鋁一丸脾氣頓佳得兩三月安妥家
卷中一比邱尼患脾氣甚殆肛門不收穢水任出服

張三錫治一人瀉而口乾舌燥脈洪數與六一散一服知二服已又一人服不應用苓連四苓散効

一老嫗久瀉服補劑不應以參苓白朮散加黃連肉豆蔻少許作丸服未半斤而愈

立齋治橫金陳子復面帶赤色吐痰口乾或時作瀉或
用二陳黃連枳寔之類不應脈之左關弦急右關弦
大此乃腎水挾肝木之勢而尅勝脾土也不信后交
夏果患痢亡

樓全善治翁仲政久泄早必泄一二行泄后便輕快脈
滑而少弱先與厚朴和中丸五十丸太下之后以白

朮為君枳殼茯苓半夏為臣厚朴炙艸苓連川芎滑
石為佐吳茱萸十餘粒為使生姜煎服十餘帖而愈

作食即
左脾治

羅謙甫曰丁巳予從軍至開州夏月有千戶高因用謂
予曰父親七十有三于去年七月間因內傷飲食又
值霖雨瀉痢暴不數行醫以藥止之不數日又傷又
瀉止而復傷；而復瀉至十月間肢體瘦弱四肢倦
怠飲食減少腹疼腸鳴又以李醫治之處以養臟湯
治之數日泄止後添嘔吐又易以王医用丁香人參
藿香橘紅甘艸同為細末生姜煎數服而嘔吐止延

至正月間飲食不進扶而復起又數日不見大便今
問何以治之醫曰老人年過七旬血氣俱衰弱又况
瀉利半年脾胃久虛津液耗少以麻仁丸潤之可也
或謂馮村牛山人見記不疑有果决遂請治之診其
脉問其病曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利
數行而死悔恨不已敢以為問予曰人以水穀為本
今高年老人久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何
依灵樞經曰形氣不足病氣不足則陰陽俱竭血氣
皆尽五臟空虛筋骨髓枯老者絕減少者不復矣又
曰上工平氣中工乱脉下工絕氣危生絕氣危生其

牛山人之謂欬

琇按是症牛山人固莫可云前李王二君唯知治
嘔治瀉不知下多止陰力進香燦至藏府枯竭而
上不納下不出其視牛亦魯衛之政也盖當時此
等症候即羅公生卒亦未解用峻劑養營矧其他
哉予有治宋復華母一案可合參

繆仲淳治梁溪一女人茹素患内熱每食腸鳴清晨水
泄教服脾腎双補丸立痊人參蓮肉免絲五味萸肉
山藥車前橘紅砂仁巴天戟補骨脂白芍扁豆苧丸
萊豆大每五錢空心飢時各一服如虛而有火盛

肺熱者去人參已天戟補骨脂丸有肉豆蔻無白芍
扁豆廣筆記

開慶己未年七月間裕齋馬覲文夫人費氏病氣弱倦
怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫作伏暑治之
投暑葯一醫作虛寒治之投熱葯無效召僕診之六
脈雖弱而兩關差甚裕齋問曰此何症也僕荅曰以
脈觀之六部雖甚弱而關獨甚此中焦寒也中焦者
脾也脾胃既寒非特但有是証必有腹痛吐瀉之症
今四肢厥冷屬脾是脾胃虛冷無可疑者荅云未見
有腹痛吐瀉之症今用何葯治之僕荅云宜用附子

理中湯未服葯間旋即痛腹而瀉莫不神之遂一服
而安良方

陳良甫治趙府博與輒宜人病泄瀉不止如附子木香
訶子肉豆蔻龍骨等葯及諸丹服之皆無効診之云
是肝腎脈虛弱此肝腎虛也府博云其說見在何經
曰諸方論泄瀉止是言肝胃病不過謂風冷濕毒之
所侵入及飲食傷滯遇腸虛則泄利而不知肝腎氣
虛亦能為泄利古書所載甚明不可不辨經云泄瀉
前後不止腎虛也又諸厥因泄皆屬于下謂下焦
肝腎之氣分也門戶東要肝之氣也守司于下腎之

氣也肝氣厥而上行不能禁固而泄利腎為胃閉門戶不要倉廩不截也若病泄利其源成出于此而端以脾胃為治之則謬固十里矣遂服木香散數服而愈

舊傳有人年老而顏如童子者蓋每歲以鼠矢灸臍中神闕穴一壯故也予嘗患久溇利一夕灸三七壯則次日不如廁連數夕灸則數日不如廁足見經言生泄利不止之驗也又予年踰壯竟左手足无力偶灸此而愈

薛立齋治僉憲高如齋飲食不化腹痛泄瀉用六君子加砂仁木香治之而痊后復作完穀不化腹痛頭疼倦以為脾虛受濕用防芍而安

太僕楊章元先為飲食停滯小腹重墜用六君子加升麻柴胡少愈后飲食不化大便不寔裏急后重數至廁而不得便用升陽除濕防風湯而痊后心腹作疼飲食不甘用和中丸倍益智仁而愈

光祿楊立之元氣素弱飲食不化泄瀉不已小便短少洒淅惡寒体重節痛以為脾肺虛用升陽益智湯而痊大凡泄瀉服分利調補等劑不應者此肝木鬱子脾土必用升陽益胃之劑庶能保生

一儒者季夏患泄瀉腹中作痛飲食无味肢體倦怠用
補中益氣湯八味地黄凡月餘而痊后波云每秋間
必患痢今則无恙何也曰此閉藏之月不遠悻悻妄
泄真陽而然前葯善能補真火：能生上脾氣生旺
而免患也

憲副屠九峯先瀉而口渴尺脈數而無力恪用解酒毒
利小便之劑不應曰此腎陰虧損虛火熾盛宜急壯
水之主不然必發疽而不能收斂也不信別服降火
化痰之劑患疽而歿
繆仲淳治無錫秦公安患中氣虛不能食：亦不化時

作泄胸膈不寬一醫誤投枳壳青皮等破氣葯下利
完穀不化面色黯白乃用人參四錢白朮二錢橘紅
一錢乾姜七分甘草一錢大棗肉豆蔻四五劑漸
愈后加參至兩許全安三年后病寒熱不思食他醫
以前病因參得愈仍投以參病更加仲淳至曰此陰
虛症也不宜參乃用麥冬五味牛膝枸杞白芍茯苓
石斛棗仁鱉甲十劑愈

從妹患泄後虛弱腹脹不食季父延諸醫治之予偶問
疾見其用二陳湯及枳壳山查等味予曰請一省病
者見其向內卧眠兩手置一處不復動曰元氣盡甚

矣法宜理中湯恐食積未盡進以人參三錢橘紅二錢加姜汁竹瀝數匙夜半思粥神思頓活季父大喜
盡謝諸醫再以六君子湯加山查砂仁麥冬調理而
安

朱丹溪治一老人奉養太過飲食傷脾常泄瀉亦是
脾泄白朮一兩白芍神曲山查半夏各一兩黃芩五
錢為末荷叶色飯為丸

聶久吾治庐陵尹之岳素以善醫名患傷感泄利自治
不効脉之知其原感風寒未經發汗久則入裡鬱為
濕熱又內傷飲食脾胃不和是以作泄乃先与清解

滌其入裡之邪前胡甘州麥冬連喬赤芍赤苓花粉
廣皮山查厚朴黃芩乾葛黃連只壳生姜次日再診
知其鬱熱已去脾胃虛滑用補脾藥一劑而安

瀉

宋渡華兄尊堂年七十體素肥長夏病泄瀉診之日此
肝木乘脾也宜養肝腎則愈勿治脾與數劑病已略
減會渡華以事入都家人另延醫授以蒼白朮補骨
脂肉豆蔻丁香香砂建蓮扁豆之屬服至百餘日肌
肉枯削動則忡惕眩暈食入即嘔而下利益頻始謝
去再延余但與重劑杞子地黃沙參麥冬米仁山藥
初加黃連三分四劑隨減去加人參一錢四五劑亦
減去后加肉蓯蓉四錢四劑凡服藥一日而安類皆
甘寒潤滑之品有泥景岳之說謂吐瀉皆屬脾胃虛

寒者宜變通焉

復華令正亦患脾泄每五更黎明必行一二次醫亦以香燐辛熱健脾之劑與之治半年餘泄瀉更加月水數月不至寒熱無時頭暈心中四肢厥冷每下午則面赤口苦舌燥食則欲嘔寐則多驚幸脈未數亦與杞地沙參麥冬間入酒連諸症漸愈經水亦行再如山藥棗仁而安

褚某年二十四五新婚數日忽病泄瀉日五六次第食後即急欲加廁腹脹甚腰亦疼脈之兩手俱弦與生地杞子沙參麥冬米仁川棟稍減旋復乃加杞子至

一兩入酒連而安

項子秋尊堂年五十久為泄日常數行見飲食稍熱即欲去后食漸減治數年无効已聽之偶昏夜于空房見黑影疑外孫也撫之无有因大恐失跌遂作寒熱左脇如錐刺澈夜不眠口苦眩暈或疑邪祟或疑癩帶幸未服藥診之脈弦數與川連川棟米仁沙參麥冬生地杞子萋仁才下咽脇痛如失再劑則累年之泄瀉亦愈矣或問故曰此肝經血燄火旺乘脾之症經曰肝虛則目慌无所見其見黑影者乃眩暈將作又因恐而失跌也原夫向之泄瀉治罔驗者蓋時

師見症治症所用必香砂苓朮諸燥劑也火生于木禍
發必克此陰符經之秘旨也 匠者能擴而充之則世
无难治之病矣

瘡

痢

續名醫類案

卷十一



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十一

錢唐魏之琇玉橫輯 男鈺編次

癰

竇材治一人病癰月餘發熱未退一醫與白虎湯熱更甚竇曰公病脾氣大虛而服寒涼恐傷脾胃病人曰不服涼藥病何時得退竇曰內經云癰之始發其寒也烈火不能止其熱也冰水不能過當是時良工不能措其手且扶元氣待其自復公元氣大虛服涼藥退火吾恐熱未去而元氣脫矣因為之灸命關才五七壯脇中有氣下降三十壯愈

張子和曰有一書生瘧間日一發將秋試及試之日乃瘧之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐延數升瘀血宿疫皆盡同室驚畏至果日入院瘧亦不發亦偶得吐法耳

子和治陳下一人病瘧三年不愈止服溫熱之劑更至

衰羸求張治張見其羸亦不敢投寒涼之劑張公原自細心

乃取內經刺瘧論詳之日諸瘧不已刺十瘡間出血正當發將今刺其十指出血出而寒熱立止咸駭

其神

故息城一男子病瘧求治診之兩手脈皆沈伏而有力

內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作

痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈讓避匿无

所不至終不能療張曰此瘡瘧也以三花神祐丸五

七十九以冷水送過五六行次以冷水止之今生收

斂故也溫水既尽一二日煎白帛湯作搗啜之瘧犹

不愈候五六日吐之以常山散去冷涎六七次以

柴胡湯磨妙功丸服之瘧除

吳升內翰致和丁酉居全椒縣歲瘧大作遇寒多熱少

飲食不思者用高良姜麻油炒乾姜炮各一兩為末

每服五錢用猪胆汁調成膏子臨發時熱酒冲服以

胆汁和凡每服四十丸酒下亦佳凡瘰人
以百計張大亨病此甚欲致仕亦服之而愈
大抵寒發于胆用猪胆汁二姜入胆去寒
而煇脾胃一寒一熱所以効也宋氏藥驗方

野史云盧絳中病疔瘡疲瘵忽夢白衣婦人曰
食蕨可愈及旦買蕨食之果愈本州經目

夔州譚遠病瘡半年故人竇藏叟授方用真阿魏好丹砂各一兩研勻米糊和凡阜子大每空心人參湯化服一丸即愈世人治瘡惟用常山砒霜毒物多有所損此方平易人所不知艸窻周密云此方治瘡以無

根水下治痢以黃連木香湯下瘡痢多起于積滯故耳百方。阿魏非純品用之宜慎

顧室光善画陸既病風瘡久不治室光嘗詣既遂命筆畫一獅子像于戶外云旦夕當有驗至夜聞憲宰之聲明日視獅子口有血淋漓既病遂愈姑蘇志。厭勝之法

張守淳冬月患三瘡斲一曰延王孝先診王搖首曰更十日則不治矣必用參附乃可小減其父隕然縮舌不敢應王力持前說服參附各一錢乃至二錢瘡粗損六七明年初夏始愈半談

孫文垣族子應章三陰瘡發于子午卯酉日昔人謂為少陰瘡

已四越月矣每發于夜熱多寒少左脉欲弦右閉滑
大以二陳湯加柴胡黃柏川芎當歸黃連兩帖熱少
輕飲食不進四肢懶倦脾氣大虛以白朮何首烏各
三錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一個而截

應章之弟十月發三陰瘧至次年仲春未止每發于辰

戌丑未日昔人謂為太陰瘧午后寒多熱少夜有盜汗左脉

軟弱右閉尺弦數有力用白芍當歸各一錢白朮二
錢柴胡川芎甘肅砂仁桂枝酒芩各三分生姜三片
水煎服再首烏鱉甲白朮各三錢柴胡一錢青皮
酒芩各五分烏梅一個生姜一片臨發五更時兩帖

而止後半月下身大發瘡痂伏暑未盡方中以東坡
欠用黃連之故

四神丹調愈

汪省吾暮秋患瘧三日一次發于夜次年仲春犹未止

遍身疼痛背脊疼灸之僅止一日後仍發面青肌瘦

此邪在足太陽經以遍身及脊背疼也用麻黃一錢五分人參

桂枝白芍甘肅知母各一錢陳皮貝母各七分姜棗

煎服痛減半瘧未止以首烏白朮各五錢青蒿一錢

烏梅一個陳皮二錢姜三片水煎臨發服嘗日以六

君加黃芪五味烏梅草果調愈

姪孫二水年三十体肥夏月常浸溪中卧松陰下至八

月大發寒熱自己午至天明乃退飲食不進嘔吐黃
苦胆汁胸膈脹悶舌止乾燥生芒刺沈香色弦硬以
冷水頻漱乃能語言惟啜西瓜生藕先發熱之日吐
血一口今則大便下血且咳嗽此溫瘧之症也由醫解
散遽用黃芪以閉邪氣致成大困用柴胡知母各三
錢石羔七錢葛根三錢橘紅竹茹各一錢五分酒苓
枳實各二錢甘艸貝母各五分三劑吐止改用二陳
湯加柴胡枳實黃芩黃連花粉鱉甲白朮首烏調理
而愈

喻嘉言治袁繼明素有房勞內傷偶因小感自服姜葱

湯表汗因而發熱三日變成瘧疾脈之豁大空虛且
寒不成寒熱不成熱氣急神揚知為元陽衰脫之候
因謂來日瘧發慮大汗不止难于採藥防危不以為
意次日五鼓時病人精神更覺恍惚扣門請採及覺
參且瘧已先發矣又恐人參補住瘧邪雖急採無益
也此語未善瘧未發時豈無邪邪要之發時不當藥耳姑俟瘧勢少退方與服
之服時已汗出沾濡頃之果火汗不止昏不知人口
流白沫灌蔕難入直至日暮白沫轉從大孔遺出乃
喜曰白沫下行可無恐矣但內虛腸滑獨參不能勝
任急以附子理中湯連進四小劑人事方甦能言但

對面談事不清門外有探病客至渠忽先知家人驚以為宗曰此正神魂之離舍耳今以獨參及附子理中駟馬之力進之尚在半返未返之界以故能知宅外之事再与前药而安

裕民坊民家淘井得一瓦枕：上有一符：下有驅瘧二篆字相傳為諸葛武侯所製病瘧者枕之即止彼此轉相借用遂為隣人所匿因訟于官亦不能得

陵瑯事

續金

陸養愚治崔監院八月間病瘧日一發治十日不能止崔曰此病或煎药一二劑或丸药一服未有不止者

令服药一二十劑而病發更劇何医之無良也医者承風進診問曰前日内外之邪尚重未敢即截今邪已去可以截矣因進丸药一服：之嘔惡移時明日

果愈但飲食無味口每若乾甫三日而復作陸診可

正值寒战床帷俱動面木戴陽

戴陽二字欠安

汗泄不止身

热如火其脉洪数無倫沈按則駛

瘧發時脉亦准惡

曰此熱

瘧也與三黃石膏湯乃謂瘧門不載仍進前丸一服服嘔吐不止至巳午時瘧發更甚熱竟日不退再召診因思兩番丸药胃氣重傷且脉較前更弱不可純作寒热治矣以白虎湯合建中生脉之半投之一夜

二劑嘔噦即止明日瘰不發矣以清氣養榮湯調理而安

按面戴陽而脈無倫次則似理中症矣乃作實熱而與三黃石羔其說不無可訖

朱遠齋醫名藉甚與陸莫逆交歸安令聞其名屢召不赴借事繫之獄欲斃之杖下邑神十餘輩為請竟不釋其妻奔號求拯陸亦無計可施邊按臺巡湖患瘧醫治無效召陸診陸喜曰机在是矣視其脈兩寸關浮數微弦按之極弱兩尺沈按緊小其症不發時亦倦怠身常有汗飢而否悶不敢食小復脹急大便欲行不行者已七八日發時戰慄身極熱煩渴踈擾且喘急甚前醫初以發表后以否悶用二陳青皮艸

果燦熱之品常山亦私用而不應審其平日極好原味病後禁絕惟日啜乾糕數枚天滋潤不進腸胃已乾重以風熱燦劑之劑安得不否滿燦結乎因思此症乃腸寔胃虛若以凡劑通其下結以煎劑補其中虛可立已然必徐為之方可為遠齋地乃曰病無大害第勢正猖獗必數日方可表其半十日則全愈矣促進藥曰此時病將發經云無刺熇之熱無刺運渾之脈無刺瀉之汗為其病逆未可治也既定以清氣養榮湯進之令以火肉進粥二碗大便未行以蜜導出燦矢數枚次日瘰減十之三再進前湯二劑

已減十之六七回乘間曰症虽減而脉似未減此餘邪未盡恐後時有變某有師兄未如玉術高為百倍若得此人商治百無一失奈渠得罪縣尊現在監禁按臺隨令捕官着歸安縣請朱：得免及進視論病如見用因潤字丸三錢先服隨以前方湯加生脉散是夜下宿垢極多明日瘰止矣

近未時醫多藉閑說賺錢陸君為友人无

妄出脫与若輩迥別之

陸肖愚治洗后菴年三十七月間患一瘰日一發或兩矣發服藥不效用丸約截之嘔吐竟日次日瘰不作然飲食日減倦怠嗜卧至八月中復發寒熱一二日

仍以丸約截之遂嘔瀉數日不止飲食不進即湯水亦尽吐出身熱戴陽語多詭妄醫尚擬用二陳五苓及診其脉浮而微細如絲乃謂曰疾亟矣兄為寬緩恐無濟今當用附子理中以冀萬一耳彼医心不然之又病家見用附子大駭陸遂辞去彼医治之兩日

而殂妄截之害

陸祖愚治朱明字因暑月多飲水又煩勞過度飲食失節常徹夜不眠偶起酌歸感寒頭疼身熱胸膈不快自用葱姜表汗轉成瘧疾間日一發医用檳榔柴胡枳果青皮乾葛羌活之類投之輒吐及瘧發呻吟煩

踈益甚日久漸危脉之氣口沈實有力臍之上下手不可按六七日不：便口乾煩渴極欲西瓜冷水白可立起也因投其所喜用嫩蘇叶嫩薄荷搗汁和勻井中水与飲吐止而有微汗甚竟爽利隨以順下丸凡四錢投之渴則以前水飲之至莫沈睡至四鼓腹中响微：作痛下燥矢七八枚后又連行三次去稠膩甚多是日微發熱因怠乃用歸芍茯苓知母貝母前胡花粉人參甘州等味調理數日而安

用涼解通利即愈故治瘧當別經歲不時端主少陽也
手足高陽明實邪但

吳抑之少年稟弱多煩勞患瘧間日一作醫峻以參朮

大補家人又以參粥食之遂否悶發狂煩躁不寐脉之左三部弦細而數右寸關浮弦按之有力右尺似有似無其氣血因虛而風寒積滯則實也用柴胡乾葛黃連山查厚朴青皮陳皮半夏一劑胸膈略舒數劑語妄煩躁悉除瘧發于陽分矣其鼻乾唇裂不眠腹中硬塊作疼皆陽明大腑未清也改用改實熟黃山查甘州加鍊綉水一服即下宿垢十餘枚諸症尽減但真元衰弱瘧犹未已以參朮苓艸當歸麥冬二母而愈

李士材治楊太史瘧發間日脉見弦緊兩發后苦不可

支且不能忌口便求截之日邪未盡而強截之未必
獲効即使截住必變他症不若治法得所一二劑間
令其自止升麻柴胡各二錢提陽氣上升使遠于陰
而寒可止黃芩知母各一錢五分引陰氣下降使遠
于陽而熱自己以生姜三錢劫邪歸正甘州五分和
其陰陽兩劑竟止与后張三錫
一案大同

程武修患瘧每日一發自己午時起直至次日寅卯而
熱退不逾一時則又發矣已及一月困頓哀若求速
愈曰頭痛惡寒脈浮而大表症方張此非夫汗必誤
截也果服截瘧凡而增劇此邪未解而遽止之邪不

能伏教以八劑四日服盡決効矣石羔黃芩各三
錢抑陽明之熱使之退就太陰白豆蔻三錢生姜五錢
採木陰之寒使之退就陽明脾胃為夫妻使之和合
則無陰陽舛亂之愆半夏檳榔各一錢五分去胸中
之痰蘇叶二錢發越太陽之邪葛根一錢斷入陽明
之路甫三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服四帖補
中益氣湯十劑而痊

沈相國患瘧吐蛻悶不思食六脈沈細李曰瘧傷太陰
中寒虯動也用理中湯加烏梅三個黃連五分進四
劑后胸中豁然寒熱亦減蛻亦不吐去黃連加黃耆

二錢生姜五錢錢疑五劑而瘧止蓋病人素有寒中之疾虽感暑寒冷不敢沾唇故瘧發而虵動也

陳眉公三日瘧決歲未瘥素畏葯餌尤不喜人參其脉浮之則濡沈之則弱營衛俱衰故遷延不已因固請曰素不服參天畀之豐也令不可缺者病魔之久也先服人參錢許口有津生腹無煩滿遂以人參一兩何首烏一兩煎成入姜汁鍾許一劑勢減七八再劑

瘧遂截与景岳何人飲意同。區通

一士人病瘧久不愈有道士來以枣一枚按病人口上呪曰我從東方來路途逢一池水：內一尊龍丸頭十

八尾問他吃甚麼崑吃瘧疾鬼太上老君急：如律令勅連呪三遍將束納病人口中令嚼食之即安二酒

餘設 一日七遍無果皆可也

馮楚瞻治徐六卿患瘧不已熱時惡心胸脹倍甚医用柴胡湯加艸豆蔻意其痰食為患耳乃徐素有喫飯之症今当壯熱之時忽遇辛熱之葯迫血妄行潰漏數斗昏暈不省冷汗如珠四肢皆冷脉微欲絕令以独參兩餘煎汁半鍾灌之始能吞嚥再煎再灌次日少甦但呃逆不止乃以温補之劑重用人參冲服諸症漸平但人參略少呃逆便甚八味十全早晚服兩

月全愈 悞服辛熱之鑒

韓老夫人患瘧甚重壯熱無汗六脈洪大而空馮曰汗生于陰腎主五液今六脈有陽無陰豈可更汗以促其孤陽亡越乎凡治傷寒感症均宜達此不惟瘧疾為然必用于悞表之后乃為合法以八味加牛膝五味子每劑納熟地二兩煎沽飲之滋水所以發汗也果愈養榮作汗法

趙某形甚肥壯而中氣甚虛下元不足夏月患瘧醫以發散和鮮不愈復以補中益氣調之亦不應發時寒熱大作喉如鶉斝臉紅喘促出多入少脈之寸關豁大而尺甚微勢已危用諺云少不可弱老不可瘵老

年氣血衰微大寒大熱非所宜也故當多出小意一時暴絕理宜大補真陰真陽仍下歸斂納封藏之劑如八味加五味牛膝為當若補中益氣恐益令孤陽上浮陽亡乎上陰絕于下便有不測之患現此則知補中益氣

不可漫用也况以陰虧陽損之軀而犯陰竭陽浮之病復當陽浮陰耗之時升浮之藥斷非所宜奈病家與醫者均以熱大熱病畏投桂附補中益氣先哲良方必欲進之果喘促而歿可為戒

徐氏嬭七十餘患瘧上則咳嗽吐血下則泄瀉粒米不進人事不省胸膈脹悶脈則兩寸細數左關弦火右

閉甚微而尺重按不起勢甚危篤知為陰虛內熱外
寒肝無血養而弦脾無氣充而弱血無所統而吐穀
無所運而瀉氣無所納而服年珠串一悉屬奉源為病用
重剉熟地白朮麥冬五味牛膝製附子參湯沖服瘧
止神清既而病人自謂胸膈有停滯不肯用補乃詭
以八味丸為消食凡參湯送下而愈

謝登之年七十餘偶途中遇雨疾趨而歸繼發瘧疾甚
危每發大便一畢必昏暈欲絕一醫以疎散勢更甚為
曰冒雨受寒疎散宜矣獨不思經曰驚而奪精汗出
于心持重遠行汗出于腎疾之恐懼汗出于肝搖體

勞苦汗出于脾皆傷藏也凡入者為實出者為虛大
便出而昏暈元氣欲脫矣尚可以既散之微寒熱重
而垂絕之元氣為輕耶急以附子理中湯加五味投
之而愈

黃履素曰立齋云大凡久瘧乃屬元氣虛寒氣蓋虛則
寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則
寒熱交作或吐涎不食泄瀉手足厥冷寒戰如慄若
誤投以清脾截瘧二飲多致不起按山瘧久不止者
多成壞症想不遵此治法而醫藥亂投之故予表兄
沈鴻生孝廉精神素旺自閑遊歸患山瘧凡一載元

氣都耗后瘧虽止而面黑眼黃見者驚異如是又二年卒以鼓脹止先生指久瘧為元氣虛寒信為確論余少時曾患此虽不敢服清脾截瘧等葯而所進皆柴胡黃芩之劑十四五伐方得止亦甚狼狽矣此病最忌生冷暈腥使滋味淡泊邪氣自衰予病時守戒甚嚴瘧止後茹素者半月饒極乃葷是以脾胃頓開飲食倍進而愈

黃之姪倩孫培之得胡与辰金鉛丸有一比邱患山瘧已久不止与一丸服之咸半盖山瘧屬元氣虛寒金鉛丸能助陽氣故竟愈也

張路王治張怡泉恒服參附鹿角膠等湯葯而真陰向耗年七十五七月病瘧誤進常山截瘧一劑遂人事不省六脉止歇按之則二至一止尋之則三五至一止惟在寒熱之除診之則不止熱退則如前此真氣衰微不能貫通于脉及寒熱時邪氣冲激經脉及得開通此虛中伏邪之象為製方用當山一錢酒畔同人參五錢焙乾去常山但用人參以助胸中火氣而祛逐之因常山傷犯中氣而變劇故仍用之為向導耳日夜連進二服遂得安寢但寒熱不止脉止如前乃今日進人參一兩二次服并与稀粥助其胃氣數

日瘧止脉復而安

顧玉書瘧疾即昏睡詎語痞脹嘔逆切其氣口獨見短滑乃有宿滯之象與涼膈散易人中黃加枳果仁一劑而安

金氏子八月間患瘧發于辰戌丑未至春子午卯酉每增小寒熱直至初夏診其六脉如絲面青唇白乃與六君子加桂附四服不應每服加人參至一兩桂附各三錢而辰戌丑未之寒熱頓止子午卯酉之寒熱更甚此中土有權而邪併至陰也仍與前藥四服面色榮食進寒熱悉除后與獨參湯送八味丸調理而

而安

顧文孝年逾八旬初秋患瘧瘵昏熱讖語喘足遺溺或以為傷寒詎語或以為中風遺溺危疑莫定張口無慮此三陽合病目不仁面赤垢仲景暑疴中原有是例遂以白席加人參二啜而安同時顧文孝夫人朔客祈連山皆患是疴一者兼風用白虎加桂枝一者兼濕用白虎加蒼朮俱痊

張飛疇治沈子嘉平昔夏間暗一着扇風則腹疼且不時作瀉六脉俱微數此腎藏本寒閉藏不密易于招風也下寒則虛火上潛故脉數與六味去澤瀉如內

桂肉果五味白茯苓作丸服田是臍不畏風脾胃亦
寔明秋患瘧醫用白虎竹叶石膏等瘧寒甚而不甚
熱面青足冷六脉弦細而數用一味凡三倍桂附作
湯更以四君合保元早晚間進二日瘧退調理而安
手眼直与
乃与去遠

高鼓峯治曹猷展室人十一月病瘧發則頭重腰疼寒
從背起頃之壯熱烙手汗出不止曰此太陽經瘧也
用大青龍湯曹曰病未五六日委頓甚矣且病者稟
素怯弱人他醫言有汗要無汗帶補為至令汗如此
而復用此藥恐不能當高笑曰第服此其病自除當

晚汗犹未止進一大劑即熱睡次日不發逾日以補

中益氣調理而痊全在認症明白
故能談笑取功

呂東莊治董兩舟內人病感症久不瘳用清肝醒脾之
劑病解復患瘧用六君子治之不應用補中益氣加
半夏治之又不止呂請再診之曰得矣此鬱火為瘧
也用龍腦叶即薄荷貝母黃連丹皮生白朮茯苓神生白
芍當歸甘州陳皮柴胡即安復用補中益氣湯加黃
連數帖如常

徐方虎病三陰瘧已四年矣幸所治皆武林名醫服藥
得法不致潰敗列薄而善
占地步用人參幾十餘斤然年久

病深至是遂不能支形肉尽眈飲食不進每竟有氣
後左脇上冲即煩乱欲眈奄幾殆左脇中上不乃能明判之即

重用桂附白芍地黄加以養榮逐翳之藥冬至凡正
疾期是日遂不至予後姪蔡明業患此治不効偶端午大咬黃魚竟愈又數人患此

遇朔日亦痊

用生何首烏五錢陳皮二錢青皮三錢酒一椀河水一
椀煎至一椀温服治瘧不論久近即愈

張三錫治翁氏媼久瘧食少汗多用六君子加黃連枳
實月餘不應因悟連枳之過純用補劑又令粥多于
藥而食進再加附子三分半一服而痊

張三錫云準繩載一儒人夏患瘧用柴胡升麻葛根羌

活防風之甘辛氣清以升陽氣使離于陰而寒自己

以知母石羔黃芩之若甘寒引陰氣下降使離于陽

而熱自己以猪苓之淡滲分利陰陽使不得交併以

穿山中引之以甘州和之而止与李士才治楊太史同

有人患久瘧諸藥不効或教以灸脾俞即愈更一人亦

久患瘧聞之亦灸此穴而愈蓋瘧多因飲食得之故

灸脾俞即効資生經

陸祖愚治朱襟湖六旬外肩上一忽生瘡毒因褪衣敷藥

致感冒咸瘧要知瘡毒本由伏暑又因過寒遂發瘧耳其脉浮虛乃于補

氣血為中加疎表之味數劑后膿潰而精神更困遂
加參芪兩許六七日后瘡虽輕而未止有人謂斬鬼
丹之妙不可勝言次早水吞一服少頃寒熱更熾嘔
吐不止昏暈異常喘氣不定乃用甘州為君黃連為
臣佐以金銀花藿香開胃解毒暈吐止乃用大劑人
參何首烏數服瘡止再用養血補托收斂生肌腫毒
消而愈

陳邠初四月初過仙霞嶺陡遇狂風大雨其徒拖遍
身俱濕宿店又無火焙兼長途勞頓水土不服飲食
失宜遂患瘡閩醫肝藥与浙迥殊即柴胡一味惟以

惟以前胡代之名曰香柴胡陳君之療發散為主得
汗而病轉甚陸邊在閩診之而色槁面黑自汗神昏
懶于言語疲憊已極此風云而其脈左手弦細而滑
氣日緩弱知其勞頓之復重加發散乃与養血健脾
寬中和解之劑去病猶及掌云

嚴力闡予之至友也以在閩病瘡數月婦及兩旬
而後因錄是案不覺惘然天耶又耶時已丑長至
后一日

薛立齋治大尹曹時用患瘡寒熱用止截之劑支發熱
惡寒飲食少思神思甚倦其脈或浮洪或微細此陽

氣虛寒用補中益氣內參耆歸朮各加三錢甘州一錢五分加炮姜附子各一錢一劑而寒熱止數劑而元氣復又治東洞庭馬忠卿与此全但去附子加炮姜一錢

一婦人勞役停食患瘧或用消導止截飲食少思侷瘦腹脹以補中益氣倍參耆朮當歸加茯苓半夏冬一錢五分炮姜五分一劑頓安前藥炮姜用一錢不數劑全愈

一男子患瘧久而腹脹脈不數而微弦重取則溲不滑利輕入皆無力遂與三和湯索氏者三倍加白朮入

姜汁服之數服而小便利一二行腹脹稍減隨又小便短少作血氣尚虛于前藥中入人參牛膝當歸服四十劑而愈

一人久瘧先問月后一日一乘早晚不定此腎不納氣故也用人參茯苓半夏各一錢丁香五味子各五分益知甘州各三分姜水煎服

王字泰治蔣先生祝瘧衆醫因身疼寒甚欲用桂附曰溽暑未衰明係熱邪安可溫也經曰陽并于陰則陰寔而陽則陽明虛寒鼓頷陽虛則腰背頭項虛疼三陽俱查大陰則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒

生于内则中外皆寒此寒乃陰陽交爭非真寒也遂以柴胡羌活防風升麻葛根以升接三陽以桃仁紅花引人陰分而取陽以出還于陽分以猪苓分隔之使不復下而愈

又治刘令尹患瘧而洞泄不止以交加飲而愈

一人患三日瘧久而不愈飲食不思口不知味熱多寒少用人參黃耆柴胡半夏茯苓當歸各一錢黃芩七分甘州青皮各五分姜枣煎服

又治一老嫗患瘧因年而懼其再發欲截曰一劑而已亦甚易焉用截葯遂以羌防紫葛升麻升陽氣使離

于陰知母石羔黃芩引陰氣下降使離于陽以猪苓之淡滲分利陰陽勿使交并以山甲引之甘州和之

一劑而愈此与李士材治楊太史之一案合輒其方大小異與三陽一案同

治一老嫗夜瘧作時大小便俱下血飲食不進危其邪熱在于血分故夜發血得熱而妄行故便血以桂枝桃仁湯去血中之邪一劑而安

薛立斋治一婦人因怒卒發无期久而不已胸腹不利飲食少思吞酸吐痰用六君子加柴胡山芎二十餘劑尋愈但晡熱少食又用四君子加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊

馮楚瞻治張子芳年將六旬無發熱頭疼等候但飲食
日少大便甚細而難小便甚赤而澁凡間三日則夜
必氣逆上壅欲死過夕不寐形容枯槁神氣漸瘦不
脈洪數惟右關尺稍緩無力此陰道虧極孤陽无根
但三日一甚兼此脾土信而為病也凡病之難名者
悉由木氣但從本根治之自無可藏匿而外見矣此
古不傳之秘乃以熟地一兩六錢麥冬三錢炒白朮六錢
牛膝三錢五味附子各一錢參湯沖服數劑后每至
期則寒熱如三瘧狀此邪外達也照方再服十餘劑
全愈

立齋治洞庭馬志御母瘧後形體骨立發熱惡寒自汗
盜汗胸膈痞滿日飲米飲盡許脹參朮葯益脹臥床
半年矣以陽為氣虛寒大劑補中益氣加附子一用
錢二劑諸症漸退飲食漸進又一劑而愈
即前曹時用之尾而
前云去附子加炮姜此云加附子
一婦人久瘧寒熱服清脾飲之類胸膈飽脹飲食減少
用補中益氣湯加茯苓半夏炮姜各一錢而痊
亦與曹次

朱丹溪治義一姪孀瘧疾初安因沖風又發腰痛白濁
已與參朮樞榔半夏補方治瘧教又以煨牡蠣一錢木

通分五炒柏三分治入草薢杜仲枸杞根治腰粗末
同煎

馬元儀治宋初臣年四十患瘧寒則战慄熱則踈煩脉
之兩關尺空又按之豁然若在熱發時見此未
可便斷為參附症也所服
不過汗不溫和之劑曰此症得之內虛所感其受傷
在少陰腎之一經也與風暑疫熱發瘧者有天淵之
別法宜火振陽氣以敵虛邪時一醫極力排阻言之
不入因思此症一誤不堪再誤乃謂所親曰病勢甚
危今晚可密煎人參一兩附子三錢與服庶可逆挽
如言服之便得大睡寒熱頓止再劑而安一月後后

見嘔吐徹夜不眠而脉空大詢其故有穿窬者至因
恐而得失恐則傷腎火隨上逆况大病后元氣初復
虛陽易于上越遂投真武湯即安

母舅沈青城自金陵歸途中忽染瘧疾三發困甚診之
而脉浮弦滑寔得之風著痰滯表裡俱實陰陽俱病
也脉證有餘可任攻達以柴胡三錢以祛少陽之邪
黃芩一錢以清少陽之熱乾葛二錢白芷一錢以越
陽明之表知母二錢石羔五錢以清陽明之裡蘇叶
三錢生姜五錢以散太陽之寒白豆蔻厚朴橘紅半
夏檳榔各二錢以疎太陰之滯二劑寒熱大減三日

而安

黃氏姑患三日瘧發陰分用何首烏一兩牛膝一兩當歸五錢鱉甲醋炙一兩橘紅五錢水三鍾煎一鍾空心服虛者加參一兩廣筆記

于中夫病三日瘧初服人參一兩生姜皮五錢水煎空心服不効仲淳堅持此方加參至三兩生姜皮至錢半二服必愈全上

繆仲淳年十七時為瘧所苦凡湯液凡飲巫祝無不備至終無效于病徧檢方書迺知瘧之為病暑邪所致經曰夏傷于暑秋必病瘧遂從暑治不旬日瘥后數

以意消息散邪之外為養胃氣痰多者消痰氣虛者補氣血虛者補血又分藏府經絡各從其類以施向導即經年不愈者亦効全上

沈少卿中丞請告時若瘧冲淳往診之用甚曰再一發死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作五劑一日夜飲尽次早瘧止先二劑清暑用大劑竹叶石膏湯加桂枝以其渴而多汗也次二劑健脾去積滯用橘紅白豆蔻白朮茯苓穀蘖烏梅扁豆山查麥牙最后一劑人參一兩生姜皮一兩水煎露一宿五更濕服效濕疑溫全上

顧伯欽患瘧仲淳之門人疏方以白虎湯加人參一兩
一二庸工云豈有用參至兩數者乎改用清脾飲二十
餘劑而瘧不止俸延弱仲淳至笑曰此虛甚非參不
可吾徒不謬也授以大劑參芪一劑而痊人參一兩
黃耆密炙一兩知母蜜炙五錢陳皮二錢乾姜二錢
甘艸八分石羔五錢全上

莊飲之妾患瘧寒少熱甚汗少頭疼不嗜飲食余為診
脈洪數而寔用麥冬五錢知母三錢五分石羔一兩
五錢竹叶六十片粳米一撮橘紅二錢牛膝一兩乾
葛伏苓扁豆各三錢一劑不應忽一日凡寒熱者再

昏米沈用不省人事熱甚危急飲之過余云恐是虛
瘧前方石羔知母竹葉似近寒涼非其治也余心亦
疑為去石羔等而加參二錢已別矣余追想前脈
的非屬虛急令人往視令其將參煎好勿輕與服待
按脈加斟酌焉次早往視其脈洪數如初急止人參
勿服惟仍用前方而加石羔至二兩何首烏五錢令
其日進二劑瘧遂止

莊斂之前患瘧妾越一年忽頭痛如裂心內襟亂不清
喉作痛失音舌破咳嗽有疫胸膈飽服惡心不思飲
食如此者四日漸矣增劇陡發寒熱如瘧狀寒少曰

熱多熱后頻出汗方鮮平時有心口痛症并作下元
无力如脚氣狀斂之疑為傷寒余曰此受暑之症即
前年所患瘧而勢加劇耳法當先去其標令以石羔
二兩麥冬牛膝各五錢知母貝母花粉各三錢橘紅
二錢半鱉甲四錢竹叶一百五十片河水煎服三四
劑心內清頭疼喉痛夫音古破飽脹寒熱俱愈但惡
心不思食如故而心口痛下元無力不減為去石羔
知母竹叶鱉甲貝母花粉而加延胡索木瓜竹茹各
二錢五靈脂七分生蒲黃錢半苡仁八錢石斛扁豆
白芍各三錢枇杷叶三片炙艸四分幾十劑而愈

全上

高存之甥女嫁后患胎瘧久不止仲淳云病在陰分以
人參牛膝兼健脾清暑葯而安 全上

童衛陽子室患瘧后失音寒熱愈甚告急仲淳仲淳云
此必瘧時不遇明眼人妄投半夏故也投以大劑麥
冬茯苓炙艸鱉甲二母即愈 全上

來天培治潘康侯季秋患瘧惡寒發熱頭痛身痛嘔吐
無汗腰重腿痰間日而發脈之沈而弦此寒邪閉伏
募原不能外解也以柴葛解肌羌芎止頭痛藿香廣
半止嘔吐枳桔利肺氣白豆仁溫胃桂枝達募原領
邪外出不使復入茯苓淡滲利竅加姜枣和營衛一

剖而愈

沈明主治丁又銘食后動怒復受風邪惡寒發熱連日
委頓咸謂停食感冒耳曰寒以時而來熱得汗而解
脉弦且數虽素未患瘧：後此開已而果然与清脾
飲加減寒熱漸輕但莖卯日縮有類陽痿甚憂日無
憲也此非傷寒厥陰危症亦非陽衰者此乃陽明熱
極不潤宗筋所謂諸痿住子肺熱：極反兼寒化也
若謂虛而補之悞矣乃用苓芩等劑清火而莖卯如
故瘧亦止惟便秘日久然不脹不疼此瘧時多汗：
多則津液燥而脹胃涸俟飲食漸進參朮滋補氣血


充而便自行勿亟也或診之謂邪氣方安得用補
及今下之尚可為也与承氣湯服半日許便不行而
莖縮再延診仍与調補數十進參二兩餘去宿垢甚
多而全愈肅于是症得三益焉于其初也可驗瘧於
受邪之始于其中也知痿不_{土音節}由陽事之虛_{言之詳}
矣于其末也知便秘有服參朮乃通不可遽然攻下
苦下之不当虽硝黃亦不能蕩條徒令真元耗損在
經固有明訓而泄但知堅者削之未詳塞因塞用之
法耳_{昂者梅公交先之高弟也其沈案皆梅所述余}
_{于諸案悉冠以沈明生于此時存昂云：者持}
_也

錢國賓治大同右營把總張道患瘧七年奄一息診
之六脉弦長尚有胃氣乃足太陰脾經疫結腹右名
瘧母也且久病血凝經絡不攻疫血病不愈也內經
日瘧之間日作者邪氣深入內薄于陰陽氣獨發陰
邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作先以四物
湯加桃仁紅花牛膝人參蒼白朮服十餘帖經絡方
活瘧轉陽分又以八珍湯加黃耆一錢何首烏一兩
服十帖補養正氣瘧輕漸早又以常山三錢酒炒七
次陳皮甘艸各一錢五分葱三段姜五片煎露空心
服熱服瘧止又以鷄蛋上透一孔用簪攪勻清黃入

番木鱉魚一個真射四厘紙封頭飯上蒸熟去壳去木
鱉不用熱酒吃至日、空心一個月餘瘧丹消凡
遇久瘧不如此法不起也

瘧

施渙之予至交也夏秋間自都至吳門就婚橫塘初冬
 以弥月親戚會飲散而病寒熱頭痛自服芎蘇飲
 一劑不愈即進理中湯轉甚益以新婚故自疑為陰
 疰也日是所延醫咸以溫補進日益用亟使詣杭招
 予此至已十餘日矣入門見者為未進診之脉沈弦
 而數且六七至舌強胎黑而燥自言服溫補后寒熱
 已退唯大便不行小便頻數夜間尤甚凡五六十次
 膈間時有冷氣上冲日唯進粥椀許奄奄危殆未審
 何疰曰此伏氣為瘧也小便頻數者內熱下迫也其



出必點滴其色必赤濁驗之果然至冷氣上冲乃熱
斟中宮猶大焰之上必有冷氣也其大便不行則內
熱而燥結不待言矣夫邪伏既深其發乃遲何得遽
用溫補幸壯年截陰不竭急投涼解得寒熱再作乃
可無虞叩所煎藥則人參白朮姜附桂萸棗仁五味
等云昨已服一劑病勢不減今參用二錢桂附俱用
錢半及視前方皆二陳四君丁桂萸萸之屬曰今日
再進參朮桂附則不可為矣以小柴胡小陷胸合白
虎作一劑与之其友壻惶惑無撈堅不肯從蓋洞庭
醫者主于其家就中為難耳曰既不相倍請即原丹

苦辭雖誼屬至友來為治病非送殮也換之間乃懇
留治乃令以葯其相付親與調煎服后小便遂不頻
數次日粥加進再与前方則寒熱大作而舌黑漸退
神氣漸爽又去白虎二劑寒熱减小便長又二日大
便去黑燥矢甚多改用甘露飲而愈

許民懷年近三十患胎瘕遠吳中名醫寓杭延視見其
古胎如爛錢之剝蝕有胎處沒黃無胎處則深紫如
猪腰三四發即困憊不堪杖而后起飲食大減日啜
稀粥兩碗遂不敢與葯診之脈虛數而弦左寸鼓而
上溢右尺微弱曰此手足兩少陰素虛因受暑邪入

色經絡云暑傷心舌乃心之竅故見症如是初與黃連香薷飲一劑即思食繼與導赤散合益元散古紫退再與人參小柴胡寒熱愈后乃告曰其戚反同于是日發瘧者共三人又皆胎瘧其二人死矣一叶姓一周姓也

痢

陳良甫治一婦人病痢疫越四十日病久服諸藥不愈召

診之六脉沈弱大凡下痢之脉宜沈宜弱但服十全

大補湯姜棗煎成加白蜜半匙再煎數沸服之痊良方

醫說續編

一婦人泄瀉不止似痢非痢似血非血其色如濁酒診之則六脉沈絕眾醫用熱藥及丹藥服之明發煩悶乃先用敗毒散加陳米煎次用胃風湯加粟米服痊

仍由血熱而病

泊宅編云姚祐自殿監遷八座母夫人病痢諸藥不効

今李昂筮軌革有真人指灵艸之語一日登对上訝其色瘁其以寔奏詔賜一散子數服而愈仍諭只炒椿子熟米之飲

薛立齋治司馬王荆山患痢后重服枳壳檳榔之類後重益甚食少腹痛此脾胃傷而虛寒也用六君加木香炮姜而愈

祠部李宜散患血痢胸腹膨脹大便欲去不去肢體殊加倦以為脾氣虛弱不能再血歸源用補中益氣湯茯苓半夏治之漸安后因怒前症復作左關脉弦浮按之微弱此肝氣血虛不能藏血用六味丸治之而

愈

朱丹溪治一老人年七十面白脉弦數独胃脉沈滑因飲白酒作痢下血沒水膿后腹痛小便不利裡急后重參朮烏君甘州滑石檳榔木香蒼朮最少下保和丸二十五丸次日前症俱減独小便不利以益元散服平治会萃

寧皇患痢召曾醫不記視曾診御畢方奏病症未有所處慈明立御榻后有旨呼曾防禦官家吃得感應凡否曾連称吃得吃得慈明又諭須是多把与官家曾承教旨对以須進二百丸遂止曾時坐韓党被謹

上亦遂於元降秩上更增三秩 后宣皇不豫久謂
左右曰惟曾某知我性急召入診訖嗚咽不勝上曰
想是脉免不好也曾出自診其脉謂家人曰我脉亦
不好先宣皇一夕而遊 四朝聞見錄

竇材治一人休息痢已半年元氣將脫六脉將絕十分
危篤為灸命關三百壯閉元五百壯六脉已平痢已
止兩脇刺痛再服艸神丹霹靂力湯方愈一月后大
便二日一次矣

一人二病休息痢竇令灸命關二百壯病愈二日變注下
一時五七次命服霹靂湯二服立止后四肢浮腫乃

脾虛欲成水脹也又灸關元二百壯服金液丹十兩
而愈

曾魯公痢血百餘日國醫不能治陳應之用鹽水梅肉
一投研爛合蠟茶入酸服之一啜而安大亟梁莊肅
公赤痢血應之用烏梅胡黃連灶下土等分為末茶
調服亦效蓋血得酸則斂得寒則止得苦則澀故也
醫說

宋張叔潛知歙州時其閣下病血痢一医用乎胃散一
兩入川斷末二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行
痢疾叔潛之子以方傳人往有驗小兒痢尤效

劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不痊

惟久

用故可轉為白膿令孤將軍傳此方用訶黎勒三救

兩炮一生並取皮末之以沸漿水一合服之若止水

痢加一錢也甘州未謂加甘州未一錢也若微有膿血及血多

加三也 全上

胡六卿一僕患痢五色已半年遇杭州一道人教用大

熟瓜萎一斤煨存性出火毒為末作一服溫酒服之

遂愈 本事方

張子和曰一男子之病膿血惡痢痛不可忍 有實熱忽見之毒

水浸甜瓜心酷喜之連皮食數枚膿血皆已人言下

痢無正形是何言也正知痢是虛今溫之濕之截之

此外無術矣豈知風暑火濕燥寒六者皆為痢此之

蜜甜瓜所以効也

潘頊曰予蔓藤年十二日內外熱如火頭眩醫以為

外感汗之不解既而腹痛小水不行又以為內傷下

之不愈后四五日變赤痢日夜無度小水點滴腹連

膀胱脹悶醫乃崇用痢藥而病加甚心切憂之詢之

家人曾食何物以曾飲冰水告予曰病坐此矣醫投

四苓六一不應予曰陰氣結于上陽氣陷于下膀胱

有上口無下口氣不能化而出也須用膀胱奉經為
溫散以之升以奪之衆醫不敢予用溫六凡作散主
天水散以乾姜茴香升柴煎服一二帖小便行三帖
痢止褚記室

李時珍治華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木
用延胡索三錢為末米飲服之病即減十之五而愈

本草綱目

薛立齋治一人利后嘔噦脉洪大按之虛細作渴引飲
諸藥到口不納作脾胃虛寒不能司細以參朮炮姜
等分飯凡米飲不時送下服至三四劑藥不嘔以六

君子和炮姜而安

重見噤門
當入嘔門

王巖如治一人痢如豆汁日夜百餘次群醫投以清涼
下墜之藥愈危六脉沈弱此脾虛受濕也以補中益
氣湯加羌防蒼朮而愈

王又逸治一人痢脚軟難行日久痢傷氣下多止陰后
氣血俱虛不能榮養其筋骨也用八珍湯加牛膝杜
仲木瓜苡仁而愈

陳三農治一婦患痢所服皆剋伐清涼之藥致脾胃虛
弱血無所統日下數升遇有所觸其下益甚欲補血
恐脾愈寒欲引歸經血去殆尽遂用陽生陽長之義

以益氣湯溫養中氣而漸安

一士勤於事業夏末患裡急泄白膿衆以痢治曰非也此積勞傷脾氣下陷即東垣所謂飲食不節起居不時上升精華之氣反下陷云也也用補中益氣湯二劑而安

龔子才治劉司寇年近七十患痢膿血腹痛諸醫弗效診之六脉微數此肥甘太過內有積熱當服酒蒸大黃一兩清利之劉曰吾衰老恐不勝惟滋補平和乃可因再四引喻始勉從之逾日而愈

一人年老久痢不止肌瘦如柴日夜苦楚命已垂危用

人參一兩水煎服之鼻有微汗而甦后用十全大補

調愈

此方亦治傷寒時疫壞症

一人下痢小腹急痛大便欲去不去以脾胃氣虛而下痛也用補中益氣送八味凡二劑而愈此等症候因利藥致損元氣而死者不可枚舉二劑

立齋治一人患痢後重自知疑辭用黃芩芍藥湯后重更甚飲食少思腹寒肢冷以為脾胃虧損用六君加木香炮姜而安

趙養葵治四明徐陽泰体素置多火善渴虽盛夏床頭必置茗椀或一夕尽數甌又時苦喘急順之趙言

此屬鬱火症常令服茱連丸無恙也丁巳夏徐避暑
檀州酷甚朝夕坐冰盤間或飲冷香需湯自負清暑
良劑孟秋痢大作治三日夜下有許次紅白相雜絕
查滓服脹悶絞痛不可言或謂宜下以大黃趙勿頭
也竟用參朮姜桂漸愈枕白積不止服感應丸而痊
后少嘗蟹螯復瀉下委頓仍服八味湯及補十重加
姜桂而愈夫一人之身歷一歲之間耳黃連若茗不
較口而今病以純熱瘥向若投大黃下之不知何狀
又病室孕時喘逆不眠用逍遙立安又患便血下止
服補中黑姜立斷

痢

瘡痢 痢後風

續名醫類案卷十一



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

喻嘉言治張仲儀初得痢疾三五行即診之行動如常
然得內傷之脈而挾少陰之邪曰此疝宜一表一裡
但表為中多用人參裡為中多用附子方可無患若
痢疾門諸為必危之道也張以平日深信經取前藥
不疑然病勢尚未者也及日西忽發大熱身重如巨
石頭在猶上兩人治能扶動人事沈因急服完表裡
二劑次早診時即能起身出房再與參附二帖全安
若不辨疝用藥痢疾門中幾曾有此等治法乎

周信州年七十三平素體堅秋月病痢久而不愈至冬
月成休息痢一日夜十餘行面目浮腫肌膚晦黑脈

之沈數有力謂曰此腸邪陷入于陰也吾以法治之
可愈以人參敗毒散煎好用厚被圍椅上坐定置火
其下更以布條捲成鵝蛋狀置椅褥上殿定肚門使
內氣不得下走內氣提撥在人豈可少物塞定其說未免荒謬然後以前藥
滾熱與服良久又進前藥遂覓皮間有津微潤再
既以滾湯教令努力忍便此却不得移身如此約二
時之久皮間律潤總未乾病者心跡畏熱忍不可忍
始今連被卧于床上是晚止下痢二次后用補中益
氣湯一日一夜止三次不旬日全安蓋內陷之邪欲提
之轉從表出不以急流挽舟之法施之其趨下之勢

何所底哉聞王星宰患久痢諸藥不効蘇郡老醫進
以人參敗毒散其勢差減大有生机但少此一段斡
旋之法竟無成功故凡遇陽邪陷入陰分如久瘧久
痢久熱等症皆當識此意使其緩之久透出表外
方為合法若急而速則恐纏出又入耳

按休息痢多緣悞古而成或兜澁大早或有表症
而驟下之古人多以感應丸為治法至良也茲以
人參敗毒治其內以火蒸其外既之滾湯以助其
汗亦法之變而得其理者至以布蛋殿其肛謂內
氣不下走亦好奇之過耳

朱孔陽年二十五形骸清瘦素享安逸夏月因構訟奔走日中暑濕合內鬱之火而成痢疾日夜一二百次不能起床以粗紙鋪茵上頻易置但飲水而不進食其痛甚屬肛門如火烙揚手擲足蹂擾無奈脈之弦勁緊急不為指撓曰此症一團毒火蘊結腸胃其勢如焚救焚須在頃刻若在二三日外腸胃朽腐矣乃用大黃四兩黃連甘草各二兩入大砂鍋內煎隨滾隨服下人事少益片刻少頃仍前蹂擾一日夜服至二十餘碗大黃湯已煎化黃連日艸俱至無汗次日脈勢少和知病可愈但用急法不用急藥改用

生地麥冬各四兩另研生汁以花粉丹皮赤芍甘草各一兩煎成和汁六碗嚥之以其來勢暴烈一身津液從之奔竭待利止生津則枯槁難回矣今脈既減則火邪自退不治痢而痢自止豈可泥滯之藥而不急用乎服之果痢止但遺些少氣沫略進腐漿米汁調養旬餘始能消穀亦見胃氣之存留一綫者不可少此焦頭爛額之客也

涌君藝云病痢初起有表邪未散誤用參朮因表便邪氣深入又誤服黃連涼解大黃推蕩治經月餘胃氣不運下痢日夜百餘行一夕嘔出從前黃連藥汁三五

梳嘔至二三次后胃与腸遂打成一家内中幽門關
開澗開無阻不但粥飲直出即人參濃蒸純吞入喉
已汨：從陽奔下用大劑四君子湯煎調亦石脂禹
餘糧二末連之与服之：后勢少衰但腹中痛不可忍
浦口用此痢虽多然尚不痛服此葯而痛增未可服
矣喻曰此正所謂通則不痛：則不通之說也不痛
則危痛則安何樂而不痛耶仍以前葯再進俟勢已
大減總用四君子倍茯苓全安

李士材治孫蕭湘夫人下痢四十日口乾發熱飲食不
進服中脹悶完穀不化尚有謂邪熱不殺穀者計服

香連枳壳豆蔻厚朴等三十餘劑絕粒五日命在須
臾診之脉大而數按之豁然詢得腹痛而喜手按小

便清利此火衰不能生土内真寒而外假熱也亟煎
附子理中湯水冷与服一劑而痛止六劑而熱退食

進煎服八味丸而起

后陳三農
一案大同

許即侯女痢疾腹痛脉微而軟李曰此氣虛不能運化
精微其窟迫后重者乃下陷耳用升陽散火湯兼補
中益氣十劑而安

一婦人痢疾一日諸葯無功李診之曰氣血兩虛但當
大補痢門葯品一切停廢以十全大補連投十劑兼

進補中益氣加姜桂二十帖安

張兵導秋間患痢凡香連枳朴等劑用之兩月而病不衰李脉之滑而有力失下故也用香連歸芍陳皮枳殼加大黃三錢下穢物頗多診其脉尚有力仍用前方出積滯如魚腸者約數椀而安

毛撫軍痢如魚腦腸鳴切痛問食則嘔所服皆芩連木香菖蒲藿香橘紅芍藥而已后有進四君子湯者疑而未果診得脉虽洪大按之無力候至左尺

倍竟濡軟此命門火衰不能生土亟須參附可以回陽因問但用參朮可得愈否李曰若无桂附虽進參朮

無益于病且脾土大虛則補母非補火乎遂用人參五錢熟附一錢五分炮姜一錢白朮三錢連進三劑吐止食粥再以補中益氣加姜附四劑后即能視事

吳又可治張德甫年二十患噤口痢日夜無度肢體僅有皮骨痢虽減毫不進穀食以人參二錢煎湯入口

不一時身忽浮腫如次氣球

此陽氣驟復陰血未能相配也自后飲

食漸進浮腫亦消腫間已生肌肉矣

馬元儀案用參亦肌脹不可忍

謂氣達表也

○宜入腫門

高鼓峯治朱殿臣病痢日逾百餘次身發熱飲食不進

所用皆檳榔大黃之屬高曰此破氣利血葯也治滯
下當調氣不當破氣當和血不當利血以歸芍生地
黃芩木香等數劑而愈

呂東莊治徐五宜患滯下膿血日夜百餘次裡急后重

醫謂脈已歇至急用厚朴青皮枳殼木香等或可挽

回徐与鼓峯最契習聞理解不為庸手所誤又能竟服峻補之劑全賴此

頗疑之不肯服時高歸四明呂診之脈洪弦而數或

一二至或三四至或五六至輒一止曰毒及少陰矣

當急顧其陽明用生熟地各一兩

三錢甘州五分既云急顧陽明方中純用陰葯乃急揀腎陰也蓋腎為胃之關入黃連

以逐暑妙矣并不入木香為尤妙群醫議云痢疾一症虽古名醫所

用葯不過數味耳今反常法惟其独精至理恐無

當于病服之必飽悶增劇矣時此見解都不外此明日往候次

數尚頻而急重已除脈洪亦減至數將續邪熱盡熱俱退也

復用前方減去大半又次日去生地黃連加人參不

能用參者重加棗仁亦可白朮山藥茯苓等葯飲食大進午后徐

自按脈云前謂吾脈尚弦此刻漸減矣診之果然而

至數復有止狀或駭曰病退而脈復變得無恙乎曰

無効也歇至者即古代結促之別名也若冲氣中絕

臟脈自見者危余之歇至本以毒盛壅遏墜道陰精

不承故一二至或三四至或五六至而止也經日數動一伐者病在陽之脈也洩及便膿血今緣去陰藥過甚進陽藥大驟雖中臟得和而胃氣安能進飲食而未盡之毒亦隨壯氣而壯故復有止狀也方中仍加生地黃連即愈矣

孟彞錢僕患夢洩不止夜熱羸弱呂用甘溫治之夢洩頓愈惟夜熱未除他醫進清涼之藥身大熱下利膿腹痛不可忍更醫治利稞姜桂苓連益狼狽下鮮血或如屋漏或如猪肝或如魚腦汗呂復服之數大而堅此挾虛挾熱治不得次第致血虛而毒感下与当

歸丹皮白芍澤瀉茯苓地黃加黃連數劑而痢止既而患小便內痛點滴不能便後痛愈甚號呼床席求急釋之因問痛連小腹乎曰否曰予知之矣急取丸子兩許令吞之下咽少許時痛苦失而便通矣孟彞擊問何藥其神如是則金匱腎氣丸也曰苓連桂附兩者水炭他人用之兩敗而今則兩奏功何也曰此所謂次第也毒傳脾胃不先解之而驟用姜桂則其蔽益張不得已用寒涼救之熱毒改去虛症乃見命門無氣腎將敗矣故急以桂附回之也孟彞曰烏知便痛非毒甚乎曰毒甚則必下利頻仍俸反加熱

矣未有利止身涼食進而毒甚者且毒甚而痛乃火

退膀胱所致則必痛連少腹今少腹不痛故知其為

腎氣寒也

此終是餘熱流入膀胱浮桂附之辛熱散其鬱結流瀉腎火治小便秘而用肉桂其

應甚速也若謂命門無氣腎將越數日其人正飲與

人爭評復大發熱此木抑土虛而食復也與補中益

氣湯熱漸退但不寐左橫骨下堅硬飲食過之皆有

礙一醫診之曰傷寒心下痞不當用參朮孟彞問呂

呂笑曰渠輩慣悞下人故熟此症某未嘗妄下故不

識也孟彞曰吾固知其非然此何病也曰是為肝服

曰得毋抑積滯乎曰如所言當連右骨下曰飲食

不經於肝過之而礙何也曰肝怒則叶張右侵于胃

胃虛受侵竅門側寒

寒當是塞之候

故礙也經不云乎肝火

則逼胃迫咽迫咽則若鬲中且脇下痛肝高則支賁

切脇悅為息賁此之謂也乃以加味歸脾湯吞八味

丸加補骨脂吳茱萸杜仲等飲之而平

肝怒因血燥也此方未善

馮楚膽治王姓人久患重痢延診時當六月自腹至陰

囊加重綿厚裏稍薄則痛甚其兩足心又竟熱甚必

重扇始可飲食不思甚危困脈之寸弦閉尺並弱曰

此中氣久虛氣不升降陰陽阻隔似痢非痢誤用香

連苦寒之劑以致抑遏陽氣于九地之下而中宮藏

陽納氣之所友已空虛且久痢陰陽兩亡故足心之熱陰虛所致腹中之寒陽虛所由中宮之陽宜溫而補下陷之陽宜清而升理難並行今但先去其中寒之阻隔則鬱遏下極之火日能上升大用附子理中湯加五味子以斂之二三劑后腹寒足熱俱減六七乃以歸脾湯加肉桂五味煎湯送八味凡而愈

陳季才患白痢甚密診之兩寸略洪兩尺左關甚弱右有黑胎此肝不能疎洩腎不能閉藏宜痢之重密矣且真陰虧極于下真津燔槁于上水來火位故赤方變黑也若服黃連瀉增其害乃果有以香連進者服

復痢更無度復延馮與八味湯大料用人參沖服漸輕調月餘而安

楊乘六治沈某病痢裡急后重日夜百餘次發熱口渴倦懶言嗜卧少食小便不利或用痢門清熱消滯套藥數劑更甚脈之緩入無力面色嫩白舌胎微黃此扶虛感寒不可以痢疾正治之也乃用補中益氣加白芍炮姜一劑而愈急重漸緩痛痢亦減再剖身涼食進而愈

蔡某病痢臍腹絞痛裡急后重日夜無度自知醫所服皆培腎燦脾之劑

補虛太早遂成休息

幸不誤事但病根不斷

每週時或五七次遷延三載形肉漸脫力不能支楊
診之脉附骨而緊左尺尤甚面晁白舌沒嫩且睥目
滑此寒積在大腸疝諸藥不能到故經年果月痢無
止息也今脾腎大虧損服養榮八味各數十帖待其
氣血充足然後蠟丸巴豆一枚大如龙眼空腹以熱
水送之則藥到積所乃化其積自際矣如法治之果
愈

施某痢疾腹痛后重膿血並見日夜無度或用利氣涼
血清火解毒一切消寇之劑病不減而解出斷腸一
段長半尺許延楊診述病情用藥次第并詢斷腸之
故思之良久曰決無此事大腸者起自胃之下口歷
幽門闌門以致肛門大小相連若中既斷矣何能自
出肛門耶且腸既出于昨日則上下斷絕已久何至
今日使中膿血仍相續不絕耶蓋腸中滑膩稠粘如
脂如膏粘貼腸上之一層其形外員中空有似乎腸
而非腸也試揆之必腐矣果然診其脉細數而弦按
之勤指古如鏡而面無神此木氣太甚胃氣將絕無
裨矣數日死

易思蘭省亭殿下七月病痢始服清利次行如解又
次滋補月餘轉甚每日行數次肚腹絞痛但泄氣而

便不多起則腰痛出曲唯伸胸膈脹滿若有物礙噎
氣連声四肢厥逆喘息不定診之兩寸沈大右寸更
力有右關沈緊左關弦長而洪喜兩尺沈微來去一
樣曰此神勞氣滯之病也以暢中湯進之製香附八
叶蒼朮一錢神曲三錢五分撫芎七分黃芩八分枳
壳三分蘇梗五分甘叶三分姜一片棗二丁服后凡
九欲吐冷氣上升噎氣數十口即大便去穢垢頗多
胸次舒暢腹中竟飢自午至酉止去一次四肢不厥
肩背輕快六脉平復但心内怔忡頭目昏眩飲食無
味用六君子湯加香附砂仁二劑胃氣少復眩暈怔

忡乍止乍作又以補中益氣加蔓荊子茯神枣仁黃
栝半月愈

張路玉治頂鳴先尊堂下痢血色如莧汁服消剋苦寒
芩連大黃之類愈甚不時發熱痞悶六脉瞥：虛大
右關獨顯弦象按之則芤此氣虛不能統血之候与
補中益氣加炮姜肉桂而安

郭然明之室患五色痢日夜數十次兼帶下如崩誤服
黃連大黃十餘劑遂隔塞不通口噤不食半月餘至
夜必大發熱踈渴六脉弦細而疾此是三陰俱虛之
候与理中加桂苓朮香烏梅以調其胃次与加減八

味湯導其陰火而愈

某刑部高年久痢色如菟汁服苓連白芍之類二十餘劑漸加呃逆六脉弦細如絲与理中加丁香肉桂疑不服仍啜痢葯數日病愈甚而驟然素弱諸醫皆以能食為慶張再診則脉至如循刀刃真臟也此中氣告竭求拯于食除中症也与傷寒之例同不可為矣褚某尊堂深秋久痢口噤不食者半月餘但飲開水及瓜汁啜后必嘔脹腸鳴絞痛不已煩渴門乱至夜更劇兩下皆膿血日夜百餘次小水滴不通六脉皆弦細乏力驗其積沫皆瘀淡色晦詢其所服皆苓連

樸朴之類所見諸症俱逆幸久痢脉弱尚宜温補用理中加桂苓紫莞調之服后小便即通得少寐數日稀粥漸進痢亦漸減更与理中倍參伏龍肝湯泛凡調安

陳進士歸捷抵家即患河魚腹疾半月后攻剋不効噤口粒米不食日因都門久食煤火肩背發長不赤不疼陷伏不起發呃神昏診之六脉弦細欲絕面有戴陽之色兩下瘀晦如爛魚腸腦症虽危幸脉無旺氣氣無喘促体無膝擾可進温補但得補而癰腫焮發便可無虞遂疏保元湯每服人參三錢黃耆二錢甘

州肉桂各一錢伏龙肝湯代水煎服一啜而稀粥少
進而后重亦稍輕至三啜而癰毒墳起瘍匿敷治其
外屬守前方而安

韓晉度春捷錦旄患腹痛泄瀉下血或用香連凡遂飲
食不進小腹急結虽小便癃閉而不喜湯飲面色痿
黃日夜去血五十餘度診之氣口沈細而緊所下之
血瘀晦如莧菜汁与理中湯加肉桂二錢一劑溺通
小腹即寬再劑血減食進四劑泄瀉止去后有白膿
与補中益氣加炮姜而安

張飛疇治朱元臣子患五色痢二十餘日胸膈脹滿粥

飲不進服葯罔効另延西医一用大黃一用人參不
能決求診之曰用大黃者因其脹滿脉大也用人參
者因其痢久不食也痢久不食大黃斷難施膈滿
作脹人參亦難遽投擬伏龍肝為君嵩温土藏用以
濃煎代水煎焦木茯苓甘草廣藿木香炒烏梅一劑
利減食進再劑全愈

柴岫青治解元周讓谷在安撫張西銘京寓時半年久
痢不止或用參苓赤苓粟壳肉果不効夜起六七次
日間不計其數膿血禱下已瀕于殆始求治以久痢
止陰不宜再用赤苓利水亦非攪瀉之所能且久

痢寒積在大腸底現今兩脈帶緊欲用蠟豆丸衆皆不敢不得已勉用補中益氣加吳茱內製川附一副而減後兼用八味凡而愈

張三錫治一人患痢發寒熱頭痛左脈浮緊而右脈滑大乃內傷挾外感也先用敗毒散加姜蔥一服表症悉除但中脘作脹悶后重不已以平胃散加枳壳木香檳榔山查二服脹悶移于小腹投木香檳榔丸三錢下粘硬之物而愈

一婦病痢自投承氣湯一服不應診之左脈浮而滯弦右三部俱沈閉脈略滑必鬱悶中食所致病家云素

惱怒遂以厚朴蒼朮香附撫芎舒菴山查檳榔橘皮木香理氣白芍調中而愈

一人痢初愈遂飲燒酒襍進肉麪胸口脹滿發寒熱右脈弦滑倍常知飲食酒毒為患也病后中氣未復火邪尚存多食日難傳化燒酒復助其毒勢在不球台食填胸中得吐乃有生意經云在上者因而越之是也不信自服巴豆凡下咽而殂宜入飲食傷

一人夏月遠行飲酒致下痢皆純血日夜無度心下脹不食脈三部俱弦滑而數先與山查枳實檳榔橘紅香連以和其中次與木香檳榔丸以導其滯脹門已

除下血愈甚遂以四物用生地條芩萊連丹皮二劑
血止再加地榆三服已全上

一人痢腹痛自服大黃凡一時痛更甚手足俱冷脉沈
伏知寒涼用早也投炮姜理中湯加厚朴蒼朮山查
一服外用炒鹽熨之下隔週時即定后用香連白芍
厚朴枳壳調愈

一人患痢二月不止穢汗 六脉弦而弱投補中益
氣加酒芍三十劑全愈

一人病痢日久不止四肢俱腫而脉細小尚可揉与參
苓白朮散加肉豆蔻作湯服愈

一婦病久痢食時身熱左脉浮數右脉滑數詢其飲食
虽病未減至劇始不能食与倉廩湯先去其熱后以
枳朮人參陳皮查曲又三服腹中漸寬后重不止乃
以調中益氣下木香檳榔凡二服下穢而愈

陸養愚治一人因路途感冒頭微痛身微熱飲食如故
數日后患水泄小便赤濇自服胃苓湯二劑泄不止
而反見積又服苓連白芍木香檳榔革二劑亦不効
診之兩手浮弦沈按濇數此因表氣不舒致令裡氣
不順偶值脾胃不劑而作泄也乃以五積散微加白
豆仁木香二劑全愈

董潯陽素有酒積因而患痢虽奉養豐而稟賦厚而清涼消導過多今痢已少痊而大便犹滯小便數短黃赤身体時熱上壅頭面鼻塞耳聾眼昏口燥脉之浮大而數按之而駛或謂苓連滑石但可清下焦之火当以涼膈散清上焦以佐之且謂脉当洪盛未可議補陸曰云平日脉項指洪盛以今日較之已弱甚矣凡九竅不利由于陽氣上盛而躍則当清陽若由于腸胃之所生則当補斂今瀉痢久數用清涼消導之劑腸胃有不虛乎夫中焦氣血不足多致虛火上炎下迫用人參白朮補氣為君当歸白芍養血為佐五

味麥冬杏仁斂耗散之氣以為臣甘州茯苓緩以滲之以為使待上焦既竭清而后提其下陷之陽則使寔溺清而通暢矣二劑后再以補中益氣加減服之愈

陸肖愚治吳南邨八月間醉飽後俠內明日患痢日夜百餘次赤白相間狀如爛肉腹中温：作痛四肢厥冷脉之緩大無力而尺尤弱謂此症即宜補塞先書人參肉果二味其子大駭謂無積不成痢豈有一二日即用補塞者不得已姑与調氣養榮湯無進退欲与補塞又力爭仍以前湯加人參彼不加參服之亦

無進退更醫投以芩連枳櫛木香等葯腹痛如割足厥如冰冷汗氣促食入即後大便而出色尚未變再亟診身體不能轉側大便如流幸脈與神氣未絕因用大料人參附子理中湯加肉桂肉果一劑痛減數劑足溫泄止后用人參至二斤始起。

鞠二府九月間患赤痢腹痛裡急後重或用芩連枳櫛朴白芍滑石一劑痛竟增二劑痛更甚乃謂醫曰通則不痛汝為我用大黃下之醫唯：幸其公子刀爭不可診之面赤戴暈唇若塗硃舌白清無苔下有泥血如豆大者數十枚餘淡黃而溏其脈浮按微數

而大沈按遲而無力曰此痛乃寒也當以溫熱解之蓋脈大為熱大而無力者為虛寒痢赤為熱色晦而便溏者為虛寒用白芍五錢醇酒數炒次姜灰二錢炙甘草桂附各一錢木香五分棗二枚一劑痛減能仰臥二劑痛止改加升麻參芪數劑而后重瀉痢並除矣

朱丹溪治青田人肚痢紅紫血下墜逼迫不渴不熱用白朮白芍各一兩陳皮只壳歸身滑石各半兩甘草炙二錢桃仁三十六個分八帖下實腸凡三十粒

許叔微曰陳侍郎經中庚戌秋過儀真求診初不竟有

疾及診視肝脉沈弦附骨取則字予曰病在左脇有血積必發痛陳曰誠如是前某守九江被召胃暑涉長江暨抵行朝血痢已數日矣急欲登對医者以剛劑燉之虽得止數日臍下一塊大如杯旬日如椀大痛發則不可忍故急請宮公祠以歸耳奈何予曰積痢不可強止故積血結于臍脇下非抵当凡不可渠疑而不肯服次年竟歿

鄭奠一治江南臬司多公患噤口痢粒米不進令服午乳而痊州奉備要

陸祖愚診吳翔立年近七旬秋初患痢起于醉飽房勞

診之容顏黯滯六脉弦緊此形症不足脉候有餘明是陽元陰微瀆用參附挽回否則不出五日滿座闕然医者從而和之乃服以鼎串之葯燒蕪艸豆今病人聞咳以開胃氣次早痢果減六七能進稀粥設笑吟詩大有起色閱二日而訃音至矣

陳三農治一媼久痢不止口乾發熱飲食不進犹服香蓮等葯完穀不化尚謂邪熱不殺穀欲進芩連數日不食勢正危迫診之脉大而數按之極微詢之小便仍利腹痛喜手按此火衰不能生土內真寒而外假熱也小便利則不熱可知腹喜按則虛寒立辨亟進

附子理中湯待冷與服一劑而痛止連服而愈

與李士才

一案大同

撫州銅容病痢甚危懸五十金酬匠大孝生視士寔授

一方用當歸末阿魏丸之白湯送下三服而愈

續金陵頭

事

胡竹亭投一治痢方採黃花地丁州搗取自然汁一酒

杯加蜜少許甚效全上

薛立齋治崔司室年已六旬患痢赤白裡急後重此濕

熱壅滯用芍藥湯內加大黃二錢一劑減半又劑全

愈惟急重未止此脾氣下陷用補中益氣送香連丸

而愈

馬元儀治一人年逾古稀下利膿血調治半年不愈脉

之左見弦澁右關尺微濡按之則几微欲絕此脾腎

俱虛之候也脾主轉輸腎主二陰二藏不治將何恃

為健運蟄藏之奉耶病久年高所喜發言清越伸氣

明爽雖危可治用人參三兩熟附三錢服后三四時

許竟周身肌肉脹不可思疑藥之過急召診則右關

尺俱透按之有根曰脉透者氣充于內也肌脹者氣

達于表也前方少減附子連投五劑利減半糞微溏

再服症減七八但小便少而微渴與五苓散減桂加

參小便如泉再以補中益氣調愈

凌伯尹患痢兩月不止百治益甚診之右關尺虛而結
滯胸中有塊突起如拳水漿不得下咽喉噤曰此症
屢經誤治邪未得除而胃氣已傷客邪乘虛結于心
下与痰飲相搏而成痞水不得下咽者土虛不能勝
水且以寒飲内格而不入也与半夏瀉心湯二劑結
塊少平再劑而症減七八漸進粥飲盖外邪挟内飲
相結其留連膠固有非一表一裏所能尽者攻之則
正愈傷補之則痞益甚然舍此則治法何從而舍施
乃用人參大棗以安胃氣之虛而加炮姜半夏黃芩

黃連以條痰治邪而成傾痞之用正如良吏治民感

惠兼著

色端溪孝憲傳治血痢痛甚方白芍酒炒五錢

此一味仲淳加

入枳壳槐花同炒去槐花五錢升麻醋炒七分真川

連姜汁炒二錢滑石末三錢乳香沒藥各七分半山

查肉三錢甘州五分神効廣筆記

黃聚川年兄大夫人年八十餘偶患痢胸膈脹絕粒數

日子以升麻人參黃連：內方授之參至一兩諸子

駭甚再問予：曰遲則不救矣一劑啜粥再劑腹中

响一泄先痢后瀉乃腎傳脾為欲愈也痢即止今年九十餘尚健也

全上

陳赤石督孝子因校士過勞感暑遂滯下純血醫皆難之
陳刺史曰此非繆仲淳莫能治也使者旁午得之吳
門一日夜馳之武林診得其由遂用人參五錢升
麻七分炙甘草紅曲各錢半烏梅二枚川黃連三錢
白芍二錢蓮肉四十粒煎調滑石末五錢二劑而愈
督孝子曰痢止矣心搖不能閱卷奈何仲淳曰此勞
心太過暑因客之故耳加竹叶乾葛東仁一劑遂平

全上

庚子秋華氏妹歸寧忽痢日夜凡百行身熱發嘔一嘔

數十聲不絕吳醫爭欲下之且曰補即死矣時仲淳
以先王母病留湖濱憐其促治后事甚亟曰既已知
危何不以藥試之服如金丸二味黃連
姜汁和丸因思飲子因
守仲淳前方以人參炒白芍扁豆升麻滑石炙艸橘
紅煎下如金丸二劑勢少定更數服愈華水部至今
感服全上

一少年貴介暑月中出外飲食失宜兼以暑熱遂患滯
下除次無藥病偶自止歸家腹痛不已徧嘗諸醫之
藥入口病愈甚亦不思食仲淳視之曰此濕熱也
其父曰醫亦以濕熱治之而轉劇問投何藥曰蒼朮

黃連厚朴枳殼陳皮等仲淳曰誤也木性溫而燥善閉氣故滯下家忌之即君陰虛人也尤非所宜更以滑石一兩為細末丹皮汁煮之別以白芍酒炒五錢炙艸一錢炒黑乾姜五分水煎調滑石米服之須臾小便如注痛立止 全上

秦公藩病痢醫誤以瀉藥一劑痢止濕熱無自而出遍攻肢體骨節間以致項強目赤肩臂脛膝足胫俱發腫痛甚不能轉側仲淳疏方寄之用白芍石斛牛膝木瓜黃柏改仁炙艸車前茯苓痛雖止尚不能轉側更用蒺藜菊花首烏胡麻黃柏炙艸復逾年愈其始

病時一醫稍投參朮痛極欲死此係本症陰虛有大又加濕熱暑濕交攻故現此症名痢風陰虛火多故不受補又不宜燥惟微寒清平之劑調之久之自愈 全上。宜入痢風

立齋治一老人患痢早用濕藥致大腸經分作痛此濕毒服于遂道而然以四物湯加桃仁酒芍紅花升麻枳殼陳皮甘艸治之漸愈因年高胃弱竟至不起久一患者亦用瀉藥環跳穴作痛与前藥去升麻陳皮甘艸加蒼朮黃柏柴胡青皮生姜十餘劑少可更刺委中出黑血而愈如乎蘸熱水柏腿上有泡起去之

亦可不若刺穴尤連効也

委中在膝腕中央橫紋中
動脈便是○与痢風症畧
同

韓戶部左臂患一紫泡根畔赤腫大腸脈訖謂訖生夫
血或積血韓曰血痢果痊以芍藥湯二劑更以人參
敗毒散二劑全愈

沈明生治吳君一媳患痢四十餘日食少倦怠原醫以
日久困憊當從補治無復可疑延診謂其染患以來
羔梁未嘗一日去口則舊積虽除新積復起旋去旋
生形虽虛而真因寔也日虽久而積固新也治去應
与初症同先進導滯丸二服嗣用補消兼進仍囑其

清虛調養后果全愈由此觀之初中末三法有虽尽
拘而望聞切之外不可廢問且吳俗有飽不死痢疾
一語恣噉肥耳唯恐弗及何異藉寇兵而資糧盜聊
蔓延日久馴致託實形虛欲補形則碍其症欲次實
則慮其虛始也求其多實而終至于不能食良可憫
也因志之以戒夫世之患痢而不慎口腹者

章素文母秋間患滯下脉与症本皆輕淺乃過于慎重
泥高年必不耳寒涼之說更医至再亦惟將順主入
之情致今綿延不已最后延診力矯前非竟以黃連
主治得瘥時有童鳴佩章石交也亦久痢亟以沈薦

且言治此恙者莫過于沈而沈之善用莫過于黃連一味耳既診即告曰是症非附子弗痊章誅之謂童利下之色与夫作痛溺澁日期近遠頗与前症相類何用葯水火如是曰辨症不在多岐但須一矢破的童之滯下兼証皆似乎熱而詢其每欲圉時必先腰痛一語而得病根矣夫腰為腎府腎主二便乃胃家北門鎖鑰之司也虛則不能閉藏是以每欲更衣輒先作痛非与腹部之痛隨利減者可同日而語向皆用寒涼蕩滌至治痰何由平于是先以理中補中相合為劑嗣以八味丸益火之原果得秦續嗟失症同

治異就謂可概施一法也哉

吳有声云壬寅秋予病痢而劇群治逾日氣息奄奄色毀骨瘠望者却走明生先生至診視之則曰是何中暑之深也家人疑之謂予安坐書齋足不出戶矣暑之乘先生決之于指折之于心遂投以涼劑一服即有効不數日間而乃全愈蓋于夏間曾製地黃以酒漬之每日必出諸酒而曝之烈日之中至夕仍返而漬之于酒如是者幾一月予愚甚以為地黃凡精神尽在酒也取而飲之而不知炎威之毒漸蓄于酒者早已入余之肺腸此家人所不知即予亦未悟迨病

愈而推之始得而先生独知其中暑之深則其視病可不謂神烏者哉

耳聾久吾曰痢為險惡之症生死攸關然右今治法多空十全予以經年既多病机漸悟乃自制此方所向輒効遂刊布廣施全活甚眾弟服者葯須道地尤不得任意加減耳

川黃連條苓生白芍查肉各一錢陳枳殼炒檳榔厚

補姜汁炒青皮各八分當歸甘州地榆各五分紅花酒洗南

木香二分桃仁泥錢一水二碗煎一碗空心温服查再煎

此方或紅或白或紅白相兼裡急后重身熱腹痛者

俱可服 其有便純血便楊塵水大孔如竹筒等惡

症舌謂不治者急服此亦可救但遲緩毒壞臟腑為

難抹耳 其有噤口者玉母在胃口也此葯煎一劑均分

五六次緩服之令胃口毒氣漸退服完一劑后不

惟葯可進而飲食亦漸可進矣不必另用他葯也

單白無紅者去地榆桃仁加去白陳皮四分木香用

三分滯澁甚者加酒炒大黃二錢服一二劑仍除

之此方用之于三五日神効旬日內外亦効惟半月

外則當加減如後

黃連條苓白芍三味生用各四分酒炒各六分 查肉一錢厚朴陳皮青

皮槿榔各四分 甘州生熟各二分半 地榆醋炒 當歸各五分 桃仁泥

分紅花三分 木香二分 如延至月餘竟脾胃虛滑者用

酒炒苓連白芍各六分陳皮厚朴木香各三分醋

炒地榆四分紅花二分當歸人參白朮熟甘州各五

分

以上方法用無不効間有不効者必其初投參朮等
補劑太早補塞邪熱在內久而正氣已虛邪氣猶盛
欲補而澁之則助邪欲清而疎之則愈滑遂致不效
予嘗治一公子一仕官皆早投溫補不可挽回故表
而出之以戒后

痢

張龍文年三十來九月患痢至十二月未痊已无服痛
後重服補中益氣則不及至圍且下轉數延予治与
熟地杞子白芍東仁米仁等初甚逆腸脹而利旦立
色幸彼能守葯弗更進張再進而利漸減矣泊歲暮
已向愈脉之兩關滑大重按則弦戒之曰葯未可停
恐立春后病再發已而果然其鄰匠就余方加補骨
脂砂仁木香廣皮之類与之了不應且昏睡而多汗
至四月中再求診則以前方加沙參麥冬姜仁黃芩
求二小劑而痊后環跳穴及趾踵疼痛流注無定所

狀如痢后瘋仍前方加知柏川連而安

濮氏子住涌金門外甚貧窘患久痢脫肛諸治不効乃入成就予診虽相去二里途中必數登廁肛既不收行步殊若与補中益氣湯加熟地一兩炮姜一錢服二劑竟愈

范季才年近八旬戊子二月患寒熱原有疝病至是胸脇少腹無不痛楚下利紅白一名医治之有年其邀余診蓋乘便耳其脉弦數所喜者滑詢其小便短赤此純屬肝火下迫似痢而非痢也必多服香竅又值君火司天少陽当令于是乘其所勝而侮其所不勝

一所下皆太陰血津陽明脂羔也与生地女貞沙參麥冬川連姜仁一劑已愈其半而名醫曰七十之年可服黃連之苦寒姜仁之滑泄乎今下利而不与調氣健脾而反用滋陰潤肺此何治耶范乃拘儒復聽之治又一月將斃矣再延診仍前方加杞子白芍甘州數劑全愈

瘧痢

李易安金石錄後序言其夫趙明誠因途中奔馳冒暑
 至行在旅邱病痞予聞信驚胆念渠惟素急病痞患
 熱必服寒涼葯疾可憂遂解舟下一日夜行三百
 里此至果大服柴胡黃芩瘧且痢遂以不起柴芩乃
 葯用之不当便能為患然
 葯不可症虽芩州亦殺人

萬密齋汪氏媳病瘧且利用小柴胡合桂枝湯加當
 歸陳皮一十餘劑瘧愈隨以黃芩芍葯湯加人參治
 痢不効再思之悟曰此病得之內傷名為白蠱乃用
 升陽勝濕防風湯而愈

瘧痢
 六十三 鎮慶書屋錄



陸肖愚治王笠雲八月間患瘧服藥已愈後復飲食不調大便瀉而變痢一日夜約一二十行皆積滯無糞腹疼后重身熱夜不安臥醫以苓連木香檳榔等藥投之益甚脈之左手浮弦而弱右手沈數而微曰此瘧之餘邪也當清解經終中邪熱則大便自固乃曰机要防風芍藥黃芩湯加柴胡二劑諸症悉愈后以調氣養榮數劑全安

孫文垣治董潯老家馬廚七月初旬患病二十餘日勢更甚詢其症曰大發寒熱寒至不憚入灶熱至不憚入井痢兼紅白日夜八十餘行腹痛惡心汗多神氣

倦甚問其脈曰脈不吉下痢脈洪大死細微者生今洪大逆也孫曰痢固忌洪大寒熱亦非細微所宜其中必有故注診其脈察其症果如所言而色微紅汗淋下完病所由起謂客來衆厨間踏熱食瓜果後藕通多晚又過飲接內寢于檐下次日即寒熱腹痛因而下痢與人參白朮石羔滑石各五錢知母炮姜各三錢大附子炙甘州各二錢大劑煎之飲訖即睡各或問曰服后何伏為佳曰倘得一睡則陰陽和則汗可斂寒熱嘔惡可止也夜來痢減半汗吐全无脈亦斂矣再用人參石羔白朮白芍滑石各三錢炮姜

肉桂知母各二錢炙甘州附子各一錢服后瘧止痢
又減半飲食漸進神氣漸復改用酒芍五錢人參白
朮滑石各二錢甘州陳皮炮姜肉桂各一錢二劑痢
全止而痊或問寒熱均投此何症而劑何名也笑曰
此滑公所謂混沌湯也經云夏傷于暑秋必瘧痢口
席湯益元散之劑瓜果寒涼傷其中氣酒后御內損
其下元附子理中湯正所以溫中補下者經又云實
者邪氣實也故以白虎益元應之虛者正氣虛也故
以理中應之若以寒熱均用為疑則仲景附子甘州
瀉心湯既用大黃連又用乾姜附子此何說哉蓋

假對假真對真也

減茗泉脉左弦數右寸弱閉大重按則滑右尺微原以
瘧后復傷飲食大便瀉和變痢一日夜只五六行皆
積滯無糞腹疼后重難堪于未后發熱天明始退此
夏傷于暑秋成瘧痢也其熱仍瘧之餘邪當先解散
然后以補劑投之則痢自愈矣与神授香連丸一服
腹中腸鳴瀉快大便行較前更多且有糞下改以白
芍四錢澤瀉黃連各一錢滑石二錢甘州桂皮各四
分山查七分兩日后与補中益氣加木香黃連白芍
調愈

張路玉治故友子觸疫癘之氣染患月餘不止左右之人失于調理致愈而復發加以五液注下癘痢兼并水穀不食者半月餘乃携歸齋中日与補中益氣兼理中六君黃桂之屬而痊

李士材治一士冒暑勞苦患血痢危甚用黃連當歸烏

梅滑石香薷甘艸一劑而愈

此治大還此案可疑

陸祖愚治姚可儀祖母年七十精力過人勤勞不倦忽于六月怒后感冒風涼兼之飲食頭疼骨痛寒熱大作寒則重衾熱則冷飲或以其年高病重攻補兼施遂腹痛譫語煩躁脉之洪弦而緊謂高年而脉乃如

是病正進也須雙解表裡之邪遂用柴葛二陳枳結查朴芩蘇加生姜二劑表症稍減腹仍痛下利紅白裡急後重日夜去積三十餘次六脉未減乃用潤字凡一錢香連凡一錢和服日夜三服兩日后痢減半惟睛之上下痞滿又用檳榔青皮木香澤瀉木通苓連滑石之類五六劑方得燥矢与積同去病又減二三仍用香連凡二錢日進二服數日積除痢止改投大補氣血之劑而安

韓延年長子初患咳嗽已久至七月患瘧后变痢瘧仍未止或以尺服短瀉投養陰清補之劑診之擬加參

附前醫亦以為然後更數醫仍不外溫補止塞出入
加減服參及四斤病虽減而元氣犹未如故

高麗匠人治疾用藥只一味二味至三味則極多矣未
有至四味者蓋藥性專則達三則濟三則調四則參
与制再多則相牽而不能奏功矣偶傳瘧痢二方甚

簡而驗今錄于此治痢只二味色白者患寒

其說用未是

生姜一兩細茶五錢色赤者患熱用細茶一兩生姜

五錢赤白襍者姜茶各五錢河水二碗煎至一碗溫
服瘧疾不論久近用生何首烏五錢青皮三錢陳皮

二錢酒一碗河水一碗煎至一碗溫服即愈

李白華陸研齋

三
筆

癰痢

汪紹兄室人年五十餘新秋患淋秘小愈即勿為初冬先自汗而日遂寒熱成胎癰匿略与消散不効將半月后增滯下腹痛后重日一二十行因見其脉如蛛絲声微氣之疑屬虛寒乃用二陳香砂蒼朴温胃煖脾之劑十餘日古胎日里多汗不眠遂辭去診之脉果沈微語殊輕怯然小便熱短胸膈痞悶癰則熱多于寒痢則紅少于白此伏氣所發陳莖鬱積大腑為病也在金匱法宜下之但其稟賦甚弱三陰素虧不可峻治且前所服類皆温煖故今積滯不行宜以潤

滑甘寒之品導之用生地杞子麥冬姜仁當歸木通
白芍黃芩枳殼桔梗數劑竟去宿垢甚多又數劑而
痢止瘧仍間日一作加疫嗽甚頻此腸胃既通餘熱
挾虛火上竄也前方去只桔當歸木通加沙參熟地
地骨首烏之屬十餘劑黑胎始盡而寒熱除又數劑
痰嗽亦止后因勞瘧復作用補中益氣去人參內熟
地一兩一劑而愈；后左關尺仍細弱向若峻下必
生變矣當病甚時一柴科與木香白朮炮姜補骨脂
等幸未服

痢後風

孫文垣治程氏子年十五夏月患痢醫治彌月痢止而
筋骨腫痛；處發熱日輕夜重肌肉消飲食少有作
白虎歷節風治者有作霍膝鼓椎風治者病愈甚診
之脈皆細滑白此痢后風也蓋由治痢不善以致寒
濕穢滯凝滯絡日久氣血為痛所傷此疴虛；實
實極唯認虛方亦不易欲補虛則腫愈劇欲疎通則
痛愈甚唯局方大防風湯可用防風熟地黃耆人參
白芍當歸杜仲各一錢白朮一錢五分羌活牛膝甘
州白陽即附子各五分川芎七分加姜三片服三十帖



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷之四
 唐書卷之四十四
 高祖本紀第四十四
 上

飲食傷消黃疸赤丹

續名醫類案卷三



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十二

錢唐魏之琦玉樞輯 男鍼編次

飲食傷

實才治一人慵懶飲食即吐致宿食結于中焦不能飲
食四肢倦怠令灸中脘五十壯服分氣丸丁香丸即
愈

一人脾氣虛好食冷物不消常覺口中出酸卵其腹中
神丹即愈若服全真全夜亦效原注脾胃即五臟
傷不可吐瀉請註唯
治此病此則自運運食胃大非可宜之也
食傷久而夜則求積香煴大非可宜之也

一人暑月飲食冷物傷脾氣欬嗽胸膈不利先服金

液丹百粒泄去一行痛減三分人服五膈散而安但

竟常發後五年復大發灸中府穴五百壯方有極臭

下氣難聞自後永不再發世醫不審病因動云暑熱

水氣不消變
成大痼原注
月熱氣傷肺一派寒涼致

一人因飲冷酒食生菜成泄瀉服寒涼葯反傷脾氣致

腹命灸關元三百壯當日小便長有下氣又服保元

丹半斤即愈

人以冷水自清至膝可損啜數十枚瓜清至腰啜更多

至鎖可啜百餘枚所清氣皆作瓜氣味此事未試人

中酒不解清以湯亦作酒氣也博物志

志

汪穎曰一人好食燒鶩炙博日常不缺人咸防其生瘰

疽後卒不病訪知其入每夜必啜涼茶一碗乃知茶

能解燻炙之毒也本草經目

龔子才治一人房勞后吃紅柿十數枚又飲涼水數碗

少頃又食熱面數碗遂心腹大痛診之六脉沈微氣

口稍大此寒熱相搏所致以附子乾姜肉桂枳實山

查神曲義朮香附一服立止後渾身發熱又以小柴

胡一劑而安

一人臘月嗜吃羊肉數斤被羊肉冷油凝結堵塞胸膈

不下脈悶而死諸醫束手診之六脈俱有乃用黃酒
一大罈煮熱入大缸內令患人坐其中衆手輕亂
拍胸腹背心令二人吹其耳及將熱燒酒灌之次服
萬億丸遂得吐出而安

仍是吐
瀉之功

陶節菴治一人患病因食羊肉滲水結于胸中其門人
請曰此病下之不能吐之不出當用何法陶曰宜食
砒一錢同人未之信之乃以他藥試之百計不効卒
依陶語一服而吐遂安同人問曰砒性殺人何能治
病陶曰羊血大能解砒毒羊肉得砒而吐而砒得羊
肉則不能殺人是以此知其可愈

杭州府志

唐守元治一婦人食羊聞呼吞及吞而應逾月病發淹
及兩年唐曰此必胸有宿物家人曰兩年不食矣曰
試以我藥投之既而大吐痰塊中包羊肉一箇而愈

平湖縣志

王海藏治秦生好服三生茶

續編作
天生茶

及冷物成積而病

寒脈非浮動沉上下內外按者極有力堅而不柔傷
指哭出膚表往承不可以至數名縱橫不可以巨細
狀此陰症鼓擊脈也一身流行之大萃于胸中寒氣
逼之故搏大有力與真武四逆理中等湯大佐以白
芍茴香使不僭上每日服百丸夜八十九至夜汗出

而愈

孫文垣治董得陽年六十七有脾胃疾以過啖瓜果胸膈脹痛諸治不効脈之寸關弦緊曰病傷瓜果而為寒濕滯勝經云寒濕所勝治以辛溫然瓜果非射香肉桂不能消以高良姜香附各一兩為君肉桂五錢為臣射香一錢為佐每服二錢酒調下葯下咽胸次便寬再服知飢三服而巾擲交接賓客如未病者

甚長今節之如此覺者對其原本則知剛節之苦心矣

馬二尹迪菴年五十五以過食鰻肉卷餅心腹脹痛醫不知吐法遂以硝黃下之大便不行脹痛尤甚又用

木香檳榔丸繼又有下以大小承氣者十餘日病益加便既不行食又不進小水僅點滴入服白餅子五日隘急丸三日脹痛遂不可當又服甘遂芫花大戰牽牛之屬三日并小便之點滴亦無矣又灸中脘三十餘壯亦無効此公腸中凡成缺覺喉矣孫至視其色蒼黑神藏不露声音亮惟腹大如箕不能反側脈之兩手皆滑大尺犹有力曰此病初時食在上膈法當用吐素問云在上者因而越之是也乃誤下傷脾失其健運矣以愈下愈脹又以峻利益下之致展轉加甚令先用六君子湯以醒其脾木香砂仁助其運動再用吐法

吐出前藥弗慮大便不行獨慮行之不止耳計所服
藥硝黃五斤巴豆白餅五兩又加諸慄悍之劑幸而
藥性未行否則如瓶水底脫頓瀉無餘矣今傷在上
中二焦下元未損故而尺尚有神色蒼氣固根本未
動尚可為也服藥後腹中大痛知藥力已至改用人
參芦防風芦升麻桔梗各三錢煎服少頃用鷲翎探
之涌出前藥約十餘碗病者曰日前光矣時已刻日
酉時大便必行宜備人參數斤以待至午刻進至寔
丹一帖以溫中氣未申間腹中泄氣下降注竟少寬
至晚大便行一次小水略通即用參朮各五錢炮姜

三錢茯苓二錢木香甘州各五分陳皮一錢煎服四
鼓又行一次小水亦行次日連瀉十餘次以理中為
丸與煎劑煎服脹全消食亦進凡瀉七十二日服參
二斤乃愈

吳九宜每早晨腹痛泄瀉者半年半黃色青腹大脹咸謂
脾胃瀉為矣關元三十壯服補脾腎之藥皆不效自
亦知醫謂尺寸俱無脈惟兩關沉滑大以為憂疑久
瀉六脈將絕也孫診之曰無恐此中焦食積痰瀉也
積膠于中故尺寸隱伏不見法當下反用補悞矣以
丹溪保和丸二錢加脩急丸三粒更五服之下利積

半桶脹痛隨止次日六脉音見再以東垣木香化滯湯而安

汪氏媼腹大如箕堅如石時或作痛襍治月餘更脹急小水不通或用溫補下元之劑則脹急欲裂自經求盡脉之兩關洪滑鼓指按之不下乃有餘之后也疔虽重可生其致病之由母家常令女奴袖熟鷄牛舌之類私受之因數食冷物積成脹滿悞作虛治宜加剝也乃用積塊丸三下之而脹消積去以保和丸調愈

黃履素曰予在臨江時悞服厚朴傷中氣之后偶食犬

肉一塊遂竟停滯時中氣正虛不敢加山查等葯考本州食犬肉不消煮芦根汁飲之亦消如法煎飲竟右脇下微痛次日大疼殊不可解自是日甚一日坐卧皆妨反側痛如刀刺右脇下按之有物如鴉子方書言右脇痛屬食積痰積有謂瀉攻治者有謂不瀉攻必瀉助正以消邪者時有医主攻治謂不治將成痞塊予以为不然確守助正之說当痛極時不敢服葯靜以守之俟痛小定氣虽痞即用六君子加木香等行氣之葯以漸調之竟得痊可若誤信攻伐不知死所矣

張景岳治一上舍年及三旬因午刻食水煮面角將至
初更食及小腹下至右角間遂停積不行而堅突如
拳大如鷄卵其痛之剝莫可名狀察其明係面積顯
而無疑然計其已及大腸此正通則不痛之症也乃
与木香檳榔丸其疼如故因疑葯力之緩犹未及病
及更投神授丸以瀉之入不効因謂此葯性皆寒故
滯而不行也再投備急丸虽連得大瀉而堅痛毫不
为減斯時也張計窮矣因潛思其由不過因面豈無
所以制之今既逐之不及使非借氣以行之不可也
且計面毒非大蒜不殺氣滯非木香不行入其滯深

道遠非精銳之嚮道不能達乃用火酒磨木香令其
嚼生蒜大瓣而再以香酒送之一服後覓痛少止三
四服後痛漸止而食漸進而小腹之塊仍在后至半
年許始得消尽由是知欲消食滯即大黃已豆犹有
所不能及而推宜行氣为先也且知飲食下行之道
乃必由小腹下右角間而後出于廣腸此自古無言
及

琇按就此觀之景岳平生臨症遺憾多矣夫面角
由胃入腸已至小腹之角豈能作痛如 而又如
拳如卵即必其人素有疝症偶因越食之濕熱發

之或兼當日之房勞遂乃決張如是故推蕩之亦不應得木香火酒一派辛熱香竄而痛止耳至謂食由小腹下右角而後出廣腸謂自古無言及者更堪捧腹經謂大小腸皆盤屈十六曲則左旋右轉可知豈如筒如袋而直下乎

張路玉治葉某停食感冒兩寸關俱瀆數糲糊兩尺皆沉弦按之益堅此真藏脈也 雖其人尚能行走而脈少冲和此必向有陳氣在少腹詢之果患寒疝數年因婉辭不用藥是夜脹暴滿而逝或問此人小恙何以知其必死曰凡人胃滿則腸虛腸滿則胃虛更寔更虛

其氣乃居今胸有而腹有積上下俱困能保其不交攻為患乎當知厥痛入腹脚氣冲心等症皆是陰邪搏結鬱積既久則扶陰火之勢而上升若胸中元氣有權則邪不伏今既為宿食填塞逆則上下俱滿正氣無容身之地往々有暴絕之虞所以不使用道具

寔未知其即死也

傷寒論病人素有痞積及病傳入三陰則死謂之藏結蓋新邪與旧

邪合併也

幼科汪玉符夏月傷食嘔吐發熱頭脹自利黃水遍俸肌肉捫之如剝六脈不分指下似有似无足胫不温自認陰寒服五積散一劑熱更甚昏卧 三日

利不止時詰語至夜尤甚或以為傷暑與藿香飲遂
頭面汗出如蒸喘促不定足冷下逆或以為大寒亦
脈息如無按之殊不可得以為陽脫之候欲極進參
附或以為陰症斷無汗出如蒸之理脈雖虛而症大
熱當用人參白朮爭持未決張診曰之六脈如此而
心下按之大痛舌上灰刺如芒乃食填中宮不能鼓
運其脈往之多此當與涼膈散下之一劑神思頓清
脈亦頓起

癸卯元夕周徐二子過宿石齋頭縱飲次日皆病酒不
能起欲得葛花湯解醒張曰此湯雖為傷酒而劑然

人稟各有不同周子縱飲則面熱多渴此酒氣行陽
明肌肉之分多渴知熱傷胃氣豈可重令開瀉以耗
津液與四君子湯去甘艸加藿香木香煨葛根澤瀉
下咽即愈徐子久患精滑飲則面色愈青此素常肝
胆用事腎氣亦傷酒氣皆行筋骨所以不上潮于面
葛花胃藥用之何益與五苓散加入參內倍肉桂服
後食頃漉如鼻汗而安

柴岫青治中翰陳雲山壯熱神昏為時醫所悞者累日
勢甚危篤診得人迎脈緩自無外感惟氣口洪寔舌
胎甚厚重按其胸皺眉呼痛此胸中停食多進發表

相去逢庭無怪予加剝也用小承湯連下二次即神
清熱退而安

張飛疇治謝元海每日常飲火酒致善食易飢半月後
腹漸脹滿大便艱澀食亦日減医用刻削清火俱不
効左脉細數六脉澁滯此始為火助胃強而善食繼
為火灼胃液而艱運艱運則食滯而脹滿脹滿則食
減今宜漸食辛熱聚元氣未漓祛其滯而回其液日
久則費調理也用枳實導滯湯去黃連白朮加葛根
一服大便通行而滯利又用健皮理氣三日後以小
劑生脉加葳蕤煨薑調愈

張三錫治一人發熱頭痛七日不止診之左脉平和右
寸關俱弦急有力乃內傷宿食為患也以二陳加枳
實厚朴查曲柴胡三劑再加黃芩頭痛除但熱不淨
投枳實導滯丸即愈

一婦每夜分即發熱天明暫止自投回物湯反加嘔惡
診得左脉微急右寸關洪弦素有力詢之經後食梨
午後遂熱起正丹溪所謂胃虛逆食冷物抑遏陽氣
于脾土之中此病多因血虛而得者遂以升陽散火
湯一服熱已後用回物去地黃加枳朮陳皮健脾養
血調安

張三錫曰余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼問之
曰此得之秘傳飢者服之即飽者食之即飢因疏
其方名資生凡余大善之而頗不信其消食之功已
於醉飽後頓服二凡徑投枕臥臥興了無停滯始信
此方之神也

許孝士云有人全不思食補脾罔效授二神丹服之頓
能進食此即補母法黃魯直用兔絲子淘淨酒浸日
挑數匙以酒下之十日外飲啗如湯沃雪亦此理也
治法彙

張三錫治一人夏食羊肉太多作渴煩躁自謂受暑用

涼水調一元散踰渴尤甚診之脉虽滑不鼓隨以鹽
湯吐之得生肉梳許乃以二陳加枳朮桂朴山查調
安若用涼藥無疑

一人飲食過度且多憤怒腹中常漉漉有聲秋來寒熱
似瘧以十棗湯料黑豆煮晒乳研末棗肉和凡芥子
大以棗湯下之初服五分不動入服五分無何腹痛
甚以大棗湯飲大便五六行時當日晡也夜半乃大
下數斗積水而疾卒當其下時瞑眩特甚手足厥冷
絕而復甦幸家号泣咸答葯峻嗟乎葯可輕哉

一人多食瓜果時值夏月大瀉不止中脘大痛煩渴引

飲自服天水散及香薷飲脈之石閉寸俱沉伏因作
停冷治香砂六君子湯加炮姜厚朴一服痛渴俱止
只以胃苓而安

龔子才治徐通府目酷好燒酒及五香藥酒過度患吐
血垂瘦氣喘咳嗽或与參蘇飲散毒散滋陰降火湯
俱不効診之六脈急數此酒毒積熱入于骨髓不受
滋補以黃連解毒湯加知母貝母石羔連翹元參花
粉葛根瓜姜桔梗酒蒸大黃早晚服至百日来以六
味丸加解毒湯在內与前湯藥並進又百日始痊后
歸田年餘仍為酒困而卒

陸肖愚治吳武祖之母少寡長齋稟賦不足因正咬糯
粳粉食人誤報武祖不入泮不竟驚而且悶遂成內
傷或与消尅過多而中滿更甚脈之兩寸斷續不勻
洞瀉口開頭汗如洗元氣將脫胸中仍不可按脈不
足而症有餘宜先補後攻急用附子理中一劑汗止
瀉減脈少有根以枳實理中湯進之其漸竟移動脈
亦有神後以潤字丸每服五分以煎劑送之積去身
和而安

徐小園子新昏多咬脾已受傷入外感遂往未寒挾項
強背痛頭疼表裡具在或謂瘧疾遂用截藥因而口

渴多食生冷變為吐瀉與柴苓湯不効診之四肢厥
逆不省人事面色青黃乃用參附理中加枳實厚朴
山查等三劑脈起而內傷之症總視身大熱舌焦芒
刺暗上下手不可按四肢濺然汗出下症悉具第用
枳朴熟黃少許加鉄絳水導之去燥矢三四枚勢未
減又與枳朴查連小柴胡加入參少許間四五日進
潤字丸五分大便去一次如是八十餘日裡症去六
脈有神尚哺時潮熱胃氣不開口軋腹滿前方去參
回劑勢入大減或謂傷寒三七不解謂之壞病經云
安穀者昌絕穀者亡今將百日粒食不進烏有生理

況身不熱舌無胎縱哺時微熱亦是陰虛之故急宜
滋陰養血開胃健脾自愈遂服葯一劑又強飲粥湯
羊蓋及危眼湯一杯是夜仍身體大熱心口作痛異
常煩躁舌上有胎再診石關尺沈寔仍用枳實黃連
卷舒二字不詳麥芽查朴送潤字凡一錢五分去後極暢
諸症稍除改用六君子知飢飽計百三十餘日頭髮
落盡一年未出門戶參附理中
烏得無罪

琇按如此治病時醫之說信哉

陳孟昭新正赴館偶開別室見一樞心中愕然是晚夢
遺次日勉強行文薄莫咬肉面遂頭疼身熱右脇有

塊如椀疼痛寒熱疑為腫毒診之謂內傷兼感不信
瘍醫視之外用專葯內服解毒之劑不効或與投補
遂昏冒煩躁語如狂再延診脈洪數無倫此誤補
故也乃作內傷飲食治之用青陳皮枳實厚朴山查
黃連等又以麩皮炒熨少甦再用潤字凡五分数服
宿垢去而痛減改用參朮歸芍陳冬苓州調十日而
安

沈振宇病愈未久因食饅頭羊肉等物遂胸腹脹滿吞
塞不通服葯旬餘不効口渴煩躁晡時更甚大便閉
結凡硝黃枳朴樵查麻仁青皮紅花歸地苓連遍服

而大便不通陸曰大病須以大方治之若拘一二
錢力量輕薄安能奏効如元明粉樵榔必有五錢枳
實生地當歸黃芩必用一兩紅花必用三錢另以山
查四五兩煎湯代水煎葯臨服必加鉄鈔水半酒杯
其垢自行矣如言一劑果腹中動响不絕時許下宿
垢半桶遂安

昔有婆羅門僧東來見食麩者云此大熱何以食之又
見食中有芦菔云賴有此以解其性自此相傳食麥
麩必咬芦菔又小說云有人中麥麩毒者夢紅裳娘
子悲歌有一丸芦菔火吾宮之句

醫說緣編

薛立齋治一人食粽煩悶發熱大便欲去不去用消導
藥不應以白酒曲炒芡末溫酒調下二錢俄頃腹鳴
粽下而安一人食水晶團子太多肚腹脹痛亦以此
治安

一人食魚鮓腹痛患痢諸藥不効用陳皮白朮等分為
末陳朮湯下數服而愈一人每食蟹即腹痛用紫蘇
濃煎服愈

一婦停食飽悶或與人參養胃湯木香檳榔丸而泄瀉
吐痰腹中成塊又與二陳黃連厚朴反加腹脹不食
此胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十

劑而安

竇才治一人因暑月食冷物以致胸脇脹悶欲死服金
液丹全真丹各百丸氣下行即痊

一人每飯後飲酒傷其肺氣致胸脇作脹氣促欲死服
鍾乳粉五福散而愈若重者灸中府穴亦好服涼藥
則成中滿矣

一人嗜茶成癖二方士令以新鞋盛茶令滿任意食盡
再盛一鞋如此三度自不吃也男用女鞋女用男鞋

用之果痊

果簡方

卒州

立齋治一男子夏月入房食水果腹痛用附子理中湯

而痊有同患此者不信別用芩連二陳之類而死

徐舍

氏則

林觀子治一人房慾後遠涉飢渴飲新汲泉水而歸病
作醫以解表消中藥与之遂冷過膝肘外熱踈擾不
寔掀衣扯被詰語無倫脉寸如蛛絲餘無急以人參
姜附入葱白生姜大劑浸冷連灌之得睡踈寔去葱
白生姜數劑得汗而痊
朱丹溪治一丈夫因酒多下血肚疼後重成痢滑石半
兩連喬黃芩木通白芍枳壳白朮各二錢甘艸五分
桃仁廿一枚分四帖服

有人因憂愁中傷食結積在腸胃欲發吐利自冬後至

暑月積傷發暴下氣日不止玉函云下痢至隔年月

日應期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤佳

如難下可佐以乾姜丸

散白朮附子各等分右細末每二錢水一椀姜三片

東一枚煎服

一人飲酒多病泄又不止人自進附枳等食不進泄更

多滑石黃芩各半兩乾姜黃連檮皮粥丸每下百

丸

許季士治宗室趙彥材下血面如蠟不進食乃酒病也

授紫金丹方服之終割血上面鮮潤食亦倍常新安
士人亦患如是与三百粒作一服立止胆凡三錢黃
蠟二兩大棗三十枚石以沙鍋或銀石器內用好醋
三斤先下凡棗文火熬半日取出棗去皮核次下蠟
再文火熬一二時如羔好入蠟茶二兩同和丸如桐
子大每服一二十九茶下

孫兆治館職李士張君易嗜酒放誕不為名利拘束忽
發熱頭疼俾翰林医官治之十日更甚諸李士共議
名孫兆至脉之曰諸人皆曰傷寒故作此疾也張李
士好酒多啜為飲食所傷也今疾非傷寒而右手脉

甚數左手脉平和此必傷酒食而作頭痛宜吃食藥
五七丸俟之半日進退決矣孫遂用食藥經食久隔
即寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大凡傷邪頭脉
經十日豈得不變發熱而狂乱故知非傷寒乃食病
之過也

朱丹溪治胡孺人因吃冷粉与肉頭痛自汗膈痞小便
赤用白朮二錢半陳皮一錢半木通川芎黃芩各半
錢姜水煎熱吞下卅豆蔻丸阿魏丸保和丸各五十

粒

羅謙甫曰丁巳冬予從軍回至汴梁有伶人李人愛謂

予曰大兒自今歲七月間因勞役偶飲涼茶及食冷飯竟心下痞匿投葯一服下利兩行症遂減不數日又傷冷物心腹復痞滿嘔吐惡心飲食无味且不飲食四肢困倦懶于言語復請前醫診視曰此病易為更利數行即快矣遂以元夏散對加牽牛末白湯服至夕腹中雷鳴而作陣痛少為嘔吐又瀉煩渴不止飲食无度不復能禁時發昏愒再命前醫視之診其脉不能措手而退頃之冷汗如洗口臭氣漸冷而卒矣小人悔恨無及敢以為問予曰未嘗親見不知所以然既去或曰予親見之果葯之罪歟而非歟予曰

此非葯之罪乃失其約量之過也夫葯之無據反為氣賊內經云葯方恍惚囊也囊滿勿約則輸泄方成弗約則神氣弗供故仲景以桂枝治外傷風邪則曰若一服汗出病瘥作後服不必盡劑大承氣湯下大寬大滿則曰得更衣止後服不必盡劑其慎如此為大戒蓋得聖人約囊之旨也治病必求其本蓋季入爰以雜剝為戲勞神損氣而其中痛因時暑熱湯飲涼茶脾胃氣弱不能運化而作痞滿以葯下之是重用也加以不慎又損其陽虛而復傷之而復下陰爭于內陽擾于外魄汗未藏四逆內起仲景所謂一

逆尚引日再逆促命期如是則非失約量之過而何
故內經戒云上工平氣中工亂脈下工絕氣不可不
慎也

張子和治一嬾人好茶成癖積在左脇曰此与肥氣臟
同然瘦瘠不作便非肥氣虽病十年不勞一日况兩
于脉沉細有積故然吾治無針灸之苦但小惱一晌
耳可享寿尺則先以茶調散吐出宿茶水數升再以
木如意煎之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸
九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燦矢痰血襍
然而下明日以除熱之劑使服十餘日諸苦悉去神

色清堂

浙東監憲全公每晨先飲阿刺吉十餘杯然後飲常酒
至六月大發熱張爽之治用冰攤心腹上冰消後加
內飲以藥三日乃愈

一富家子廿餘歲四月間病發熱求趙以德治之脉浮
沈無力而虛熱又往求潮熱作死時脉間有力又洪
數隨熱進退因知非外感之熱必是飲酒留毒在內
今因房勞氣血之虛而病作問之果在正月間每晨
飲阿刺吉吃狗肉一月既得其情遂用補氣血藥加
薑根以散酒毒一帖微汗反倦怠熱如故因知是氣

血皆虛不禁芎藭根之散也必得鴉距則解偶得軋者少許加入葯即愈

唐 生者病因飲酪水及食 物下利紫黑血十餘行脾胃受寒濕毒与六神不胃散半兩加白朮三錢以利腰膈間血而愈

周子固治王經歷患身輕飄之若行空虛中易医凡七八人皆以为風虛与热劑加甚周曰此酒毒也即以寒涼之劑驅之

張子和治一酒病人頭疼身热惡寒状如傷寒診其脉兩手俱洪大三兩日不便以防風通聖散約一兩水

一中椀生姜三十餘片葱二十莖豆豉一大撮全煎三沸去渣稍热分作三服先服一服多半酒更以飯股探引咽中吐出宿酒香味尚然約一兩掬頭上汗出如洗次服少半立愈内經曰火鬱發之發之汗之也

朱丹溪治一飲酒入胸大滿發热夜話語似傷寒右脉不如左尺与補中益氣湯去黃芪加柴胡升麻半夏以黃芪補氣柴胡升麻入升故去之服後病已因食涼物心疼前葯加艸薹數粒愈 治法

立齋治曾銓因飲食法酒肛門腫疼便秘脉寔服 荆敗

毒散不應，用黃連內疎湯而安。

沈明生治蘇郡丞秦水心，初有中氣虛之症，兼以紫膜叢脛，應酬紛紜，遂致勞倦，食少肌表微熱，不能治。正事日診，始而用溫，繼而用補，其後每劑加參，至兩許，附至三錢，然後飲食大進，精神煥發。復因湯液久而苦口，則更製丸劑，常服大抵不外扶陽抑陰之義。忽一日諸症復發，視前尤甚，加之自汗頭眩，怠于言語，急延診，首訊昔日大劑溫補煎方，蓋謂丸劑緩而無濟也。診畢，日症即前日之症，葯非昔日之葯，是治勞神動怒之後，復為飲食所傷，致令當納受者不納受。

當運化者不運化，寔熱滯于太陰陽明兩經。此王安道所謂飲食勞倦之中，仍有餘不足。今非昔比，參附斷不可沾唇，惟宜清導消熱耳。詢之果然，遂

法治之而安。所以知秦之病者，其脈左關獨大而氣口緊盛，倍常左關獨大者，肝主勞與怒也。氣口緊盛者，非食而何？藉若膠柱，前方寔之，咎何能免。

忽然病寔

素症虛寒

沈雲間人，凡按二十，其門人梅鼎公所述，此自沈效兄處抄。

願開一內人，以傷食飽悶求治，診其脈氣口初非緊盛。

而反得虛微察其症虽若胸次有物而神氣殊短正符東垣飲食勞倦之說宜補正以祛邪即用六君子健脾伍以姜桂等味助中焦熟腐水穀一二劑後腹脹寬舒忽又以脾瀉告沈曰服補得瀉此元氣傷而滯氣消君子進而小人退之机也改用補中益氣數劑而愈

且解久吾曰一婢停食腹疼先用消導葯略加發散一劑其疼未減因用炒鹽湯服二椀吐之其疼減半又用發散為主加消導一劑其疼立止因悟寒邪停食作疼散其寒氣則食自消而疼自止自后依此治之无

不神効

消

張子和曰初虞世言凡渴疾未發瘡瘍使用大黃寒藥
利其勢使大因大靈自勝如發瘡瘍流膿瀉血而
此真俗言也故巴郡太守奏三黃丸能治消渴予嘗
以隔數年不愈者減去硝朴加黃連一斤作兩劑以
長流千里水煎五七沸放冷日呷之數百次以桂苓
甘露飲白虎湯生藕節汁沒竹瀝生地黃汁相間服
之大作劑料以代飲水不日而痊故消渴一症調之
而不下則小潤小濡固不能殺炎上之勢下之而不
調亦旋飲施消終不能沃高膜之軋下之調之而不

減滋味不戒嗜慾不節喜怒病已而復作能從此三者渴消亦不足憂矣

昔有消渴日飲數斗劉完素以生姜自然汁一盆令置之密室中具杯杓于其間使其人入室從而鎖其門病人渴甚不得已而飲盡渴頓減內經辛以潤之者入內經治渴以蘆除其陳氣亦平之劑劉完素之劑亦必有他藥也

秦運副云有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴即止法要日吃三五兩或炒或作羹無入鹽極効但吃得十斤即佳過清明勿吃食醬無効 平州

苦楝根取新白皮一握切焙入射少許水二椀煎至一椀空心飲之虽困頓不妨自後下虫三四条狀如蟻虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一症有虫耗其精液者

鄂渚辛祐之患消渴九年服藥止而復作蘇朴教以白芍甘州即戎等分丸末每用一錢水煎服即愈古人處方殆不可曉不可以平易而忽之也 陳日華平州

綱目 經驗方

有仕宦病消渴醫謂不過三十日死急棄官歸途遇一匠令斂北梨二担食尽則痊宦如其言食及五六十

枚而痊

朱丹溪治徐兄年四十歲口乾小便數春末得之夏末求治診其兩手左澁右畧數而不弦重取似大而少有力左稍沉畧弱而不弦澁然却多于右喜而尺皆不甚起此由飲食味厚生熟謂之痰熱禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾用三消丸十粒左金阿魏凡各五粒以姜湯吞下一日六次又以四物湯加參朮陳皮生甘州五味麥冬煎服一日三次與丸藥間服一二日自覺清快小便減三之一口亦不乾止渴未除頭暈眼花坐則腰疼遂以摩腰蒸治腰疼仍以

四物湯用參芪減川芎加牛膝五味炒柏麥冬煎飲調六一散服及覺便多遂去六一散令仍服丸藥而安

薛立齋治一貴人病疸疾未安而渴作一日飲水數升教服加減八味丸方諸醫大笑云此藥能止渴我輩當不復業矣皆用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等生津液之藥止之數劑而渴更甚不得已用前方服二劑渴止因相信久服不特渴疾不作氣血亦壯飲食加倍強健過于少壯之年薛氏家藏此方屢用有驗

寶材治一人頻飲水而渴不止曰君病是消渴也乃脾
肺氣虛非內熱也其人曰前服涼藥六劑熱雖退而
渴不止竟胸脇氣痞而喘材曰前症土傷脾肺因涼
藥復損元氣故不能健運而水停心下也急灸關元
氣海各三百壯服四神丹六十日津液復生方書皆
作三焦猛熱下以涼藥殺人甚于刀劍慎之
引初虞世
之說參看
與薛紫
及子和

楊貢亨鄱陽人博群書精脉理每心計造方有患飢者
諸醫以火症治亨久思之未得頃見堂上木橈自仆
乃為濕氣所蒸致朽忽悟水能消物不独屬火此濕

消耳遂投熱劑而安

江西志

孫文叵治一書吏年近五十沉湎酒色忽患下消之症
一日夜小便二十餘度清白且長味甘少頃凝結
如脂色有油光治半年無効腰膝以下軟弱身不
起飲食減半神色大瘁脉之六部大而無力經云脉
至而後按之不鼓諸陽皆然法當溫補下焦以熟地
黃六兩為君鹿角霜山萸肉各四兩桑螵蛸鹿角膠
人參白茯苓枸杞子遠志鬼絲山藥各三兩為臣益
知仁一兩為佐大附子桂心各七錢為使煉蜜為丸
梧桐子大每早晚沒鹽湯下送七八十丸不終劑而

愈或曰凡消者皆熱症也今以溫補成功何故曰病由下元不足無氣升騰于上故渴而多飲以飲多小便亦多也今大補下元使元氣充盛薰蒸于上口自不乾譬之釜蓋釜雖有水必釜底有火然後水氣上升而不乾也

龔子才治一人消中日夜溺七八升鹿角燒令焦為末以酒調五分日三服漸加至方寸七

一人不時發熱日飲水數碗寒熱二劑熱渴尤甚形體日瘦尺脈洪大而數時或無力王太僕曰熱之不熱者其無火又云候熱往來是無火也時作時止是

無水也當補腎以加減八味丸而安

張路玉治趙雪訪中善食日進羔梁數次不能便敵其肌勢兩夜必進二餐食過即昏嗜卧或時作酸作甜或時夢交精泄或時經日不飲或時引飲不輟自言省試勞心所致前所服皆安神補心滋陰清火之劑不應察其聲音渾而多滯其形虽肥盛色蒼而肌肉綿軟其脈六部皆洪滑而數惟右關特甚兩尺亦洪滑而按之少神此腎氣不足痰濕挾陰火泛溢于中之象遂与加味導痰加蘭香數服其勢大減次以六君子合五金枳寔湯泛凡服後以六味丸去地黃

加鯁膠蒸熟調愈

朔容白小棲中消善食脾胃約便聚察其形瘦而質堅診之乃以調胃承氣三下破其蘊熱次与滋腎丸數丸滌其餘火遂全安 診其脉數而有力時喜飲冷氣酒此酒之濕熱為患

粵容李之藩上消引飲時当三伏熱到吳初時自汗發熱煩渴引飲漸至漉便頻數飲即氣喘飲過即渴脉之石寸浮數動滑知為熱傷肺氣之候因以小劑白帛加人參三服勢頓減次与生脉散調理數日而愈

薛廉夫子強中下消飲一漉二因新娶繼室真陰灼燥虛陽用事陽強不倒恣肆益甚乃至氣息不續精滑不收背曲肩隨腰膝疼軟足膝痿弱寸步艱難水粥到口即厭惟喜蒸梨方物其脉或數大少力或弦細數疾此陰陽離決中空不能主持而隨虛火輒內輒外也与八珍腎氣保元獨參調補經年更与六味地黃久服而痊

卻某仲夏与婢通因容至驚恐精氣大脫即凜之畏寒翁之發熱畏食畏飲小便淋瀝不禁診之六脉弦細如絲責之如循刀刃此腎中真陽大虧之候令服生

料六味加桂附以通陽氣咸謂夏暑不宜桂附另延
醫峻用人參附子月餘飲食大進猶謂參附得力恣
餌不輟遂至日食豚蹄鴛鴨七八餐至夜預治熟食
飽咬二次如此兩月餘形俾充滿倍常但苦時嘈
裸易飢常見青衣群鬼圍繞其側再延診其脈滑數
有力而石停于左察其形色多滯且多言多笑而語
無倫次此 痰壅塞于中復加辛熱助其淫火始卒
陰虛何以前言未溥消中之患也不急祛滌必為狂
痴之患乃製瀉吐之劑遲疑不進未几忽大叫發狂
妄言妄見始信言之非謬也

許孝士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩
悶時已十月予謂心經有伏熱与大府并數服越二
日采謝云當日三服渴止又三服飲食如故此卒治
非用以治渴可謂通變也

陸養愚治兩廣制府陳公年近古稀而多寵婢且嗜酒
忽患口渴茶飲不止而喜熱惡涼小便極多夜尤甚
大便秘結必用蜜導日數次或一塊或二三塊下身
軟弱食減肌削所服不過生津潤燥清涼而已脈之
浮按數大而虛沉按更無力曰症當溫補不當清涼
間消卒熱症而用溫補何也曰經謂脈至而後按之

不鼓諸陽皆然今脈數大無力正所謂後而不鼓無陽脈也以症論之口渴而喜熱飲便秘而溺偏多皆無陽脈也曰將用理中參附乎曰余所謂溫補在下焦而非在上中二焦也經曰陽者從陰而亟起也又曰腎乃生氣之原今恙由于腎衰水竭絕生化之原陽不生則陰不長津液無所兼以出故上渴而飲多下燥而不潤前無以約束而頻多後無以轉輸而便秘食減肌削皆下元不足故也曰予未病時陽已痿病後後不近女色腎未必衰竭曰腎竭于未病以前痿是腎竭明驗既痿之後雖欲竭而無從矣彼雖不

悅而心折其言遂委治之乃以八味丸料加益智仁煎人參羔糊丸每服五錢白湯送下日進三服數日溺竟少十日溺竟如常大便尚燥每日一次不用蜜導矣第口渴不減食尚無味以升麻一錢人參黃芪各二錢煎湯送丸藥數服口渴頓止食亦有味又十

日全安

與孫文
原案同

陸祖愚治李悅吾年五十餘患消渴忘茶飲不能輟口小便多而數殊不欲食及食後即飢病將一年精神困怠肌肉枯澁自分必死脈之沉濡而瀼曰病尚可為凡人一身之津液以火而燦然必以氣化而生前

醫純用清涼滋潤之品所以不効潔古云能食而渴者白扁倍加人參大作湯劑多服之不能食而渴者錢氏白朮散倍加乳葛亦大作湯劑服之今不能食及食即飢當合二方加升麻伍葛根以升清陽之氣少用附桂以合從治之法每味數兩大砂鍋濃煎藥湯飲以此代之此病仲景謂春夏下秋冬差今當感夏病雖不減亦不剝若依法治之薰絕厚味戒嗔怒閉門靜養秋冬自愈幸其能守戒忌交秋即痊秋末全安

薛立竺曰一男子作渴日飲水數椀冬月亦然彼用加

減八味丸去肉桂服之不應一男子患此欲治以前丸彼謂肉桂性熱乃服知柏等藥渴不止背發疽而發一男子亦患此症漸消瘦与前丸數服渴減半一劑而痊再劑形俸復壯太肉桂腎經藥也前症乃腎經虛火爰上無制為患用肉桂導引諸藥以補之及引虛火歸源故効一男子脚面發疽愈而作渴以前丸治之而痊一富商稟賦頗厚素作渴日飲水數椀面發一毒用消毒藥潰而愈尺脉尚數渴亦不止時益秋謂此火旺水涸之脉也流服加減八味凡以補腎水制心火應免疽毒之彼不信至于

夏果脚背發疽脉數按之則澁而無力足竟黑腐而死 一男子稟姿頗寔乏嗣服附子等葯致渴互足大指患疽色紫不痛脉赤數而澁亦死大抵發背腦疽脫疽腫痛色赤水衰火旺之色尚可治若黑若紫火極似水之象也乃腎水既竭精氣因涸決不治外科精要云凡病疽疾之人多有既安之後忍發渴疾而不數者十有八九疽疾將安而渴疾已作宜服加減八味凡既安之後而渴疾未見宜先服之以防其未然薛見時間其父云一士夫病渴疾諸醫皆用渴葯累載不痊有一名醫教服加減八味凡不半年而

愈

一老人冬月口舌生瘡作渴心脉大而寔尺脉大而虛此下消症也患在腎瀉加減八味丸補之否則後發疽難治不信仍服三黃葯降火次年夏果患疽而歿東垣曰腦消者以白朮加入參湯治之中消者善食而瘦大便硬小便數自汗脉訣云口乾饒飲水多食亦飢虛成消中者調胃承氣湯三黃丸治之下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏 又云焦煩水易虧此腎消也六味地黄丸治之總錄所謂未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不

治之症潔古老人分而治之能食而渴者白朮加人參湯不能食而渴者李氏白朮散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或曰未傳瘡疽者也何此火邪盛也其瘡疼甚而不潰或亦水者是也經曰有形而不疼陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死

一婦人面患毒瘰毒疼發熱作渴脉數按之則寔以涼

膈散少愈以消毒母藥全安

以下五條宜外科

一男子肩患疽作渴脉數有力以黃連解毒湯三劑而止更以仙方活命飲潰愈

一男子潰而煩渴不安以聖愈湯二劑而痊以人參黃

芪當歸地黃四劑渴止以八珍湯二十劑而愈大抵

潰後有此症屬氣血不足須用參芪以補氣歸地以

養血若用苦寒必誤

一男子患毒作渴右關脉數以竹叶黃芪湯治愈更以

補中益氣加芪苓而痊

一男子潰後口乾遇勞尤甚以補中益氣湯加五味麥

冬而安更以芪朮湯而斂

芪六朮一

繆仲淳治湖州庠友張時泰正月間忽發毒瘡十餘日

而愈四月間焦勞過多而瘡大作医用石羔知母等

藥不効用刀去齒間紫血滿口齒痛不可忍齒俱搖
動矣至六七月間飲食更多小便如注狀如羔肌肉
尽削至十一月身不能起冬末用黃芪地黃等藥少
能起坐然善食易飢如故小便如羔亦如故今年二
三月更甚亦不服藥齒痛如故當門二齒脫去復加
口渴日夜不止此中下二消症也另立方未數劑而
瘥麥冬芦根各五兩五味丸黃連三錢黃芪五錢生
地六錢天冬一兩用繅絲湯十碗煎二碗不拘時服
凡方于前藥中加黃柏三兩牛膝五兩沙參六兩狗
杞四兩五味六兩蜜丸常服

張景岳治省中周公山左人也年四旬因案牘積勞
欽成羸疾神困食減時多恐懼自冬徂夏通夕不寐
者半年有餘而上焦無渴不好湯水或有所飲則沃
而不行然每夜必去溺二三升莫知其所以從來其半
皆蒸液疰瘠至極自分必死診之脈犹帶緩內亦
未脫知其胃氣尚存慰以無慮乃用歸脾湯去木香
及大補元煎之類一以養陽一以養陰出入間用至
三百餘劑計人參二十餘斤乃得愈此神消于上精
消于下之症也可見消有陰陽不得尽言为火

自來
選抄

喻嘉言曰友人病消渴後渴少止反加憐急足膝痿弱
予主是丸 白茯苓丸 加犀角有醫曰腎病而以黃連犀角
治心非乃倒予予曰腎者胃之關也胃熱不傳于腎
則關門大開心之陽火得以直降于腎心灼火腎燥
不能需予用犀角黃連對治其下降之陽光益五倒
予服之果効再服六味地黃丸加犀角而肌津病起
矣 沈初見抄本

消

胡天叙年五旬素豪飲而多思慮自弱冠後即善病近
則兩足及臂常時痺痛甚則肝腎之氣上逆或致暈
厥汗出不寐齒疼眼露夜卧陽事暴冷時：夢遺面
有油光揩去復尔脉之兩手俱豁大關前尤搏指据
寔脉乃二陽之病發心脾今已傳力風消矣詢其小
便去頻清白令以器貯逾時視之果變稠漿而結腐
皮遂恐甚告以平昔洪飲縱欲勞神數十年來所服
桂附純陽之藥不可勝計未知尚能治否曰幸未至
息責但能斷飲絕慾多服養榮之劑尚可力也今病

但有春夏而無冬秋非兼清肅之治不可乃與生熟地杞子麥冬沙參地骨知母黃柏黃連石羔出入加減十餘劑諸症少平惟齒疼尤甚自製玉帶羔貼之而安次年因診莫媼產病告以前方出入常服計用石羔不下四五斤矣此則初為寒中後為熱中之變症也然初之桂附未發為疽亦大幸矣

黃疽

黃疽之病當十八日及期治之十日以上症反甚難治

竇材治一人一身皆黃亦便赤色而澁灸食竇穴五十壯服姜附湯全真丹而愈

沈以潛葛可久俱神醫也一日有老媪患黃疽詣沈求治口舌固未之能存于葛之涎沈遂飲以針其左右乳下而與沈飲者頃刻時出啟左針而右半身肉色堂然啟右針而右半亦然救石附設

張子和治一男子作贅偶病疽善食而瘦四肢不羸面黃无刀其嬪翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更他適乎翁令農人召培意欲作勞見其病甚每

日辱詬人教之餌胆凡九三稜凡了不關涉針灸祈禳百無一濟張見之不診而痊便服涌劑去積痰宿垢又以瀉水丸通經散下四五十行不止命以冰水一盃飲之立止服予胃散等間服檳榔丸五七日黃退力生蓋脾胆之痿濕熱与宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

周黃刘各有僕病黃疸張曰僕役之職飲食寒熱飢飽風景溫寒尋常觸冒恐難調攝虛費治功其二家留僕于張所從其飲餌一僕不高主人之役三人同服苦散以涌之又服三花神祐凡下之五日之間果二

僕愈一僕不愈

一女病黃一身浮腫面如金色困乏無力不思飲食惟喜食生物泥煤之屬先以苦劑蒸餌為丸涌痰一椀又以舟車丸通經散下五七行如墨汁更以道飲丸而愈 宜入小兒門

趙君玉病發一身黃往問医者医者云君乃陽明症公等与麻知凡皆受制于張戴人是商議吃大黃者難与論病君玉不悅歸自揣無別病乃取三花神祐丸八十粒服之不効乃悟曰予之濕熱盛矣此藥尚不能動以舟車丸滑川散作劑大下一斗糞多結者一

多黃退戴人之言始信

朱丹溪治一婦人年二十八歲發黃脈澁水白經來不行
行身倦怠未曾生子用陳皮白朮木通各一兩黃
芩歸頭丹皮各半兩甘州一錢分作十二帖水煎食
前熱服

一八年二十歲因勞人胃兩痔疝症脚痠心悸口苦力
弱尿黃脈浮而數病在表宜解外黃芪三錢白朮蒼
朮各一錢陳皮蘇叶木通各五分炒山炮二斤甘州
稍少許白水煎服保和丸十五丸點抑青各十九溫
中二十丸愈

一婦人面黃年三十脚痠弱口苦喜茶月水不行且多
倦怠用芪州各三錢人參歸芍各一錢木通陳皮各
五分炒柏秦芫各一分

一婦人年六十面黃困甚足痠口苦脈散而大此濕傷
氣也白朮半兩陳皮四錢蒼朮木通黃芩各三錢人
參川芎各二錢炒黃柏一錢炙甘州五分六帖服之
水煎食前服

王官人瘡後面黃脚痠弱倦怠食飽氣惡頭旋黃者甘
州木通各二分白朮一錢半厚朴陳皮蒼朮各一錢
黃柏炒三分煎服

成五官面黃脚瘦无力食不化脉虛而少弦口苦肚脹
宜補之人參木通各三分白朮一錢五分當歸白芍
川芎陳皮蒼朮各五分甘州二分水煎服保和丸回
十九

孫文垣治一人因冒雨勞力汗出又以冷水洗浴因發
熱口渴心與背脹疼山水長而赤舌胎黃不眠目如
金皮膚盡黃或謂年高不敢與治診得左脉浮數熱
右濡弱濕皆七至相濕熱此濕熱發黃症也病雖重年
雖高尚可為以柴胡三錢太酒芍葛根青蒿香薷
花粉各一錢人參七分甘州五分連進三劑得微汗

即能睡次早熱退其半舌稍沒潤身黃未退胸膈餘
熱作煩以竹茹青蒿葛根各一錢人參麥冬花粉知
母各八分白芍六分二帖熱退食進精神成長後與
補中益氣加青蒿麥冬花粉十帖愈

一人患酒疸遍身皆黃尿如柏汁日如金汗出沾衣如
染胸膈脹痞口不知味四肢痠軟脉濡而數以四苓
散加厚朴陳皮山查麥芽葛根倍青蒿水煎臨服加
萱州根汁一杯四劑痊

一人病後身面俱黃吐血成盆熱荒諸藥不効用螺十
個水漂去泥搗爛露一夜五更取清服二三次血止

黃愈 小山怪症方 卒叶

外臺秘要治三十六黃急球方用鴉子一方連壳燒灰
研酢一合和之温服鼻中出出为効身体極黃者不
過三枚神効

柴嶋青治竟羅名鴉德夫人病疸医投茵陳五苓散末
効入合末為服之肌肉白眼皆如金色轉致不思飲
食石闕緩弱特甚柴曰胃为水穀之海脾为倉廩之
官府藏失職温熱滋甚今惟有調其脾胃上能健運
湿熱自去不必治疸而疸自退 六君子湯加厚
朴炮姜以温中神曲麦芽以助戊己之化不數劑而

全愈

東垣曰戊申春女人六十二歲病振寒战慄太陽寒呵

欠嗜噦是少陽口亡津液是陽明心下急疼而痞少

陰受寒也故急疼身熱近火熱在皮表寒在骨臍下

惡寒丹田有渾身黃而白眼黃寒濕也弱黃

赤而黑頰數寒濕自病來身重如山使著床枕至陰

也其脉診得左右關并尺命門中得弦而急極細襍

之以洪而極緩弦急為寒加之細者北方寒水

以火受左按之至骨脊上乘寔者至陰日六脉按

之俱空虚者下焦元先以輕劑去其寒濕兼退其洪

大脉理中湯加茯苓是也小煎之令寒服之謂之
熱因寒用假寒以對足太陽之假熱也以乾姜之辛
熱以瀉真寒也故曰真對真假對假若不愈當以木
之令寒以補下焦元氣也

陸祖愚治潘巨源食量頗高恣肆大嚼因勞役失飢傷
飽每患脾胃之症或嘔或瀉全不介意後成黃疸用
茵陳五苓散治之而痊後以飲食不節疸症仍作人
傳一方以苦胡芦酒煮服即効試之果然後發至再
三腹如鼓仍卒

薛立齋治大司徒李蒲汀南吏部少宰時患黃疸當用

沒滲之劑公尚死子枕豫不決曰有是病而用是藥
以茵陳五苓散加苓連卮服愈卒外得子

應天王治中一身發黃妄言如狂苦于胸疼手不可近
此中焦蓄血為患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而愈
人朱陽山弟下部蓄血用抵當湯而愈

馬元儀治沈王恪患疸症一身及面目悉黃微見黑肝
煩瀉腹滿脉之左弦數右空大此內傷發黃為厥陰
肝不太陰脾土之二藏交傷候也夫肝鬱則生熱脾
蕩則生濕熱交攻而煩渴腹滿發黃之症矣至于
黑色兼見于面則并傷其腎汗之下之非其治也宜

平肝之元扶土之虛兼解鬱熱以清氣導除濕蒸以
和中氣用人參三錢白朮二錢白芍一錢黃芪山皂
七分丹皮歸身茵陳秦艽各一錢柴胡七分炙艸五
分半曲一錢三十劑愈

顧奉常務遠日黃脾氣弱仲淳疏方用茵陳三錢人參
三錢苡仁三錢蓮肉焙三錢木通八分黃連酒炒一
錢山皂炒八分白朮土炒一錢石羔酒蒸三錢皆活
疸之劑以事冗未服既而身因皆黃小便亦赤乃服
仲淳先見飲前藥少愈一按摩者投以艸汁葯酒脾
敗遂不起臨歿下瘀血數升亦畜血症以其年高不

絕慾耳

施靈修乃兄七年前曾患疸症服艸葯愈後發多氣
多勞故艸葯不能効服發脹一日夜大作寒熱
因發渴小便如油眼目黃且赤手足黃紫仲淳以關
血發黃服葯後大小便通黃及渴俱減橘紅一錢五
分紅曲炒研三錢山查五錢薑金汁十五匙苡仁六
錢木瓜三錢牛膝五錢五分麥冬五錢車前二錢五
分赤苓三錢通艸五分白芍酒炒四錢竹茹二錢酒
水二椀煎八分飢時服三日后加人參三錢

黃疸

徐環徽年三十餘病疸服山庖茵陳五苓六一之劑將
兩月不効脉之弦細而駛而日爪甲俱沒黃語言遊
倦謂之曰君以疸疔求治此其餘疔耳今病成勞損
矣乃竦然曰誠有之近承夜卧不寧晚即發熱黎明
始退咳嗽痰稀腰膝疼痛然治之將奈何曰病緣陰
虛火盛肝熱久鬱移其所勝故食少便溏發為黃疸
與酒穀諸疔為濕熱薰蒸者不全乃服苦寒滲利重
傷其陰致成勞積分宜峻養肝腎俾嗽止熱退食進
便調而黃自消與集靈羔加減十餘劑諸疔遂向安

黃亦愈矣

金魯瞻年四五餘館于時醫湯靜公宅病疸諸治不効已歷數醫最后一人与艸豆蔻四味中有六月雪餘忘之矣服之加甚脉之軟弱無神畧數外症自黃如橘而額則黃而黑黯腹大臍凸便溏愈少動則氣促知為脾腎兩虧近乎女勞一症乃疸中所最難治者也與山藥熟地各一兩杞子枣仁米仁各五錢彼疑太補持以問湯之老醫也謂曰方極是第吾輩素不用此姑試之一劑減一劑又減再診脉已起仍前方八劑全愈

朱天一年二十餘喜食糖及燥炙糕餅忽病黃面目如金脉之而閉數寔有力尺滑大便六七日不行小便黃澁此敦阜太過燥熱所鬱如以素葢凡誤大其色必黃非濕症也與小承氣加歸身一劑而愈

赤丹 一名風痺

孫思邈曰貞觀七年三月子在內江縣飲多至夜竟回
俸骨肉疼痛至曉頭疼額角有丹如彈丸腫疼至午
通腫目不能開經日儿死予思本州芸苔治風遊丹
腫遂取叶搗專隨手即消其効如神亦可搗汁服之

一云元叶用子阿
代之 本州經日

張子和治黃氏小兒面赤腫面目不開非針以刺輕砭
之除而目尖外亂刺數十針出血乃安此法人多不
肯從必欲治病不可謹護宜入小兒門

朱丹溪治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹標用

諸般專貼丹標為及用方于个：丹頭出血皆不退
後以半陳即二陳也生姜加補劑治嘔不効遂純用
參半兩歸朮各一錢五分濃煎一帖嘔止二三帖丹
緩熱減五十帖愈

絕允中年五十歲丹風痒甚腹微疼咽不利面身微腫
五六日不退兩寸脉滑大寔石浮大左浮弦小以炒
芩連四物桔州黍粘紫藏各一錢防風黃芪各半錢
五六帖安

黃師文治一婦人苦風并每酒沾唇則風并重迭而起
痒刺骨始不可活令服五積散約數服以杯酒試之

如其言飲酒已丹不作 一婢亦苦風丹亦似此
聞其說遂服五積散亦効又師文用五積散治產瀉
有奇功 北憲灸螺

薛立齋治一婦人素清苦因鬱怒患遺風晡熱內熱自
汗盜汗月水不行口乾咽燥此鬱風傷脾乃以歸脾
兼逍遙散五十帖全安

一婦人患此性躁寒熱口苦脇疼耳鳴眼腹溺瀉乃肝
脾血虛火旺也用六君加柴胡山梔尾胆數劑更與
逍遙散兼服少安又與六味凡逍遙散五十餘劑諸
症悉已

一婦人患前症候服大麻風葯破而出水煩渴頭眩誠類風症六脉洪數心脾為甚曰風自火出此因怒大脾胃受邪血燥而作非真風症也與逍遙散六味丸清肝火滋脾血生腎水而安

一婦人患前症久不愈食少倦憊此肝脾虧損陰虛發熱也先用補中益氣湯加川芎炒皂元氣少復更以逍遙散而愈

一婦人患赤游風晡熱痒甚用清肝養血之劑不信乃服大麻風葯臂疼筋掣手足厥化瘦順氣之劑四肢弱又一婦患前症數劑葯煎湯泡脹而死

一女子十五歲患瘰癧身發赤丹形氣倦怠此肝火血虛所致用加味道遙散而赤丹止用益氣湯六味他黃丸而消

一婦人身如丹毒抓破膿水淋漓熱渴頭暈日晡尤甚用加味道遙而愈



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

癥瘕

續名醫類案卷十三



續名醫類案卷十三

錢唐之楊玉橫輯男婦綱次

癩瘕

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陳日明者昆陵一書其女患小兒不通胸腹脹疼不可
 忍眾醫皆作淋毒如公毛散之類的不肯通喉診之
 曰此血氣也非腫也藥不可去与樞仁煎初更服至
 日午六分不可忍遂吐少頃下血塊如拳者數枚下
 便如黑莖才一二升疾止乃愈此藥治病初無驗
 製太峻氣虛血弱者宜斟酌之樞仁大黃朴硝各一
 兩並出半兩炒黑共為末醋煉凡梧子大五更切溫

酒吞下五丸 原注此方不可多用 良方

杜士治尚書媳嬭馬氏年二十二腹中血塊作疼經五
六年形已骨立衆皆曰不可為奈其未死何家甚貧
而太少恣之一日召杜至告杜曰但以濟物為怀自
可業已請召明公非所言也遂以少帛物贈杜之不
受曰但服某藥必獲安毋以是為疑遂示方用沒藥
牛膝軋漆當歸各半兩礪砂木香水蛭炒紅娘子炒
紅花丹皮硃砂各一分海馬一个斑猫去羽足炒十
四个為末酒醋各半并熬為羔每日天明用一皂子
大酒醋化下兩日安

陳藏器曰昔有患眩痺者夢人數教日食大蒜三枚初
食遂致眩眩吐遂下部如火後有人教取數瓣合皮
截却兩顆吞之名曰肉炙果獲大効 卒州綱目 痲
痺若是便毒与

外科

張子和治汴梁曹大使女年既笄病血癥數年太医宜
金賢以破血等藥治之不効金賢曰除得陳州張戴
人方愈一日戴人至汴京曹乃遊問焉戴人曰小腸
遺熱于大腸為伏癥故結硬如塊面黃不月乃用涌
泄之法數年之疾不日而効

柴崎青乳陰已未寓瀋陽京兆署兵房吏王某患癥瘕

教以蒸暗法治之煎服加減五積散而安其妻母亦
患此照方服愈

孫文叵治汪氏婦月水久不止內有紫黑血塊胃皖胸
腹皆疼玉戶且腫手足皆冷不知飢飽腹下有二塊
堅如石脉互數石沈澁此血癥症也用糖球子五錢
元胡索五兩脂香附炙芽青皮各一錢水煎服疼減
半手足漸溫加當歸丹參蒲黃益母川芎四帖疼止
人而刮而經調

永康應童嬰腹疾恒痛痲行久不伸松陽周漢卿解囊
之氣冲起腹間者二其大如臂漢卿刺其一塊然鳴

人刺其一亦如之稍按所于之氣尽解午趨無留行續

張子和治一童子入門狀如鞠躬而行張曰此疔氣也
令解衣搦之二道如臂其家求治先刺其左如刺重
紙剝然有聲而斷令按摩之立軟其右亦然觀者嘆
異或問之曰石閉穴也

武叔卿曰夫疔癰癩癧血氣塊便發軟刺疼甚則欲死
究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺疼極
不可忍甚而死一二日不省醫巫併治數年不痊以
葱白散烏鴉丸而安

陳良甫治下婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛腰
要人扶定方少止亦用前二藥而愈尋常小血氣
用此亦効 濟陰綱目

陳宜人病血氣作楚疼不可忍服諸藥無効召診之兩
關脈弱沈為肝脈沈差紫此血氣漸成痲痺也只以
前二方治之而愈人四明馬朝奉後院亦病此用二
方治安 全上

宗孝武路太后病衆醫不識徐文伯診之曰此石博小
腸耳乃為消石湯而愈 南史

董含妾腹内生一痞始如彈丸五六年後大類鷄卵中

似有一窟往來動移或疼或止百藥罔効久之遍作
發腫內作水声日夕呻吟死而復甦者再諸醫束手
無策皆云此名水鼓病已成不可復痊矣章文亨旭
字東生名醫也善治痲痺注邀之曰此非水疝乃積
聚所致不半日可愈但所用藥性猛烈轉門而下驅
水甚提試問病人慮服与否病者曰我已垂殆苟一
綫可生無恨也于是取紅丸十粒如菜豉大以楮
柳根實等五六味煎湯下初覓喉之中响声可畏勢
將不支頃之胸膈開如刀及亂刺良久轉側疼不可
狀又頃之下水斗許頭面腫退不逾時人下數升腹

背腫退病人曰我今竟胸背頓寬遂熟睡片時三章
 君犹在坐也曰此番不使水去痞亦当漸沒矣留補
 劑二日明後日可連服之遂辭去至晚入下水而五
 升手足腫全退不三日病全愈既而忽痞勢搖動下
 紅黑痢三日夜痞亦不見衆醫驚服往叩其故章笑
 曰此名腸覃在內經水脹論中君輩自坐不論書耳
 皆慙而退按岐伯曰寒氣客于腸外与胃氣相搏辨
 而內著應肉乃生始如鳩卵至其成若怀子之状按
 之則堅推之則移月水以時下腸覃生子腸外故也又有一種
 名石癥病状相同月水不以時下石癥生子腸中故也皆嬾人

之疾因內有積聚可導而下似水脹而非水脹也臨
之工夫此疾若非章君久作泉下之鬼矣令人能感
解矣三歌如是者

調識器

一男子腸鳴食少暗下有塊耕動若得下氣多乃已
 則復鳴屢用疎氣降火葯半年不愈乃以理中湯為
 君佐苓連枳寔一服腸鳴止又每服吞厚朴紅豆蔻
 凡其氣耕亦卒矣

薛立齋治一婦月經不調面切腫疼服小便赤腹中一
 塊作疼或上攻脇腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌
 膚消瘦飲食无味殊類瘰疔久而不愈此肝脾血氣

虧損用八珍湯道遙散歸脾湯互服愈

一婦人性多鬱怒勤于女工小腹內結一塊或作疼或

痞悶月水不調恪服伐肝之劑今人受此害者尤多內熱寒熱

胸膈不利飲食不甘形侷日瘦牙跟蛀爛此脾土不

能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋

化源用補中益氣六味地黃至仲春而痊必至仲春者以肝木

司令時也

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上脘蝕透血

氣血虛時季冬肝脉洪數按之弦緊餘脉微弱或用

伐肝木清胃火之藥薛曰真氣虛而邪氣實也恐伐

肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃

以滋腎水肝脉頓退因大怒耳內出血肝脉仍大

煩熱作渴此無根之火也仍以前藥加肉桂二劑脉

數熱退後因大怒果卒于季冬辛巳日乃金魁木故

也婦科撮要十果餘

一婦人耳下腫赤寒熱口苦月水不調小腹內一塊此

肝火氣滯而血凝也用小柴胡加芎藭丹皮治之而

愈

潤州某公補劑中多用敗龜版垂十年頗健晚患蟲膈

乃渴血飛霞飛霞診視良久曰此癥也公嘗餌龜版

藥耶今滿腹皆龜吾藥能逐之其骨節奏理者非吾藥所能也乃与赤丸數粒逐之下龜如款大者并餘得稍寬不數月死易養時驗小遺悉有細虫彷彿龜形物之氣感如此慎之哉 周樸園書影

黃山畢云服温胸剖初頗有效久之得沙淋疾沙皆作大形頭尾略具全上

陳自明治一婦人腹內結塊久而不散与神仙追毒丸一粒即痊 方見蠱門

陳自明云子族子娟病腹中有大塊如杯每發痛不可忍時子娟已貴京下善醫者悉常爾服藥為愈子應

之曰此血癥也投黑神丸尽三丸現氣尽消終身不復作 方最良

孫汝居比部病腹中若有癥瘕不食不眠煩悶身熱仲淳投以人參白芍茯苓麥冬木通棗仁石斛方甫具火劑亭太火至見方有大劑人參駭然曰向因投參至劇此得無謬乎仲淳曰病勢先後不同當時邪未退滯未消故不宜今病久飽服煩悶者氣不歸元也不食者脾胃元氣也不眠而煩者內熱津液少也今宜亟用此藥六劑而痊後復病仲淳曰今病是陰虛也非前症矣更以炙冬白芍枸杞五味生地車前而

熱遂退

立齋治黃恭人腹內一塊不時作痛、則人事不知良久方蘇諸藥不應診其脉沉細則非瘡毒母河間云失笑散五夫脂蒲黃沙等分為末醋湯調每服二錢治疝氣及婦人血氣痛欲死並効与一服痛去六七再服而卒此藥治產後心腹疼及兒枕痛尤妙

錢因賓治陳小山妻年三十二久瘡成形狀如鯽魚長五寸濶寸許頭尾口角悉具漸之瘡行穿腸透腹上近喉邊下近穀道飲血咬肝声呼痛楚形神狼狽其脉弦牢当有胃氣可治先以古方五味紫金錠磨服

止痛次以刀豆壳一两為君以此葢能殺瘡也乳香沒藥定痛活血射香通竅木香順氣調以砂糖作餅瘡受毒藥旬日內伏不動日餘而化便出如蜆肉一堆以四物加參朮枸杞香附調百日愈

痞

張文潛為戒云張子病痞積于中者伏而不能下自外
至者扞而不能納從醫而問之曰非下之不可歸而
飲其為既飲而暴下而向之伏者不終日而散之無
餘向之扞者一而支少焦膈導達胸腹開利呼吸間
若未始有產者起日痞復作投以故葯其疾去如初
日足逾月而痞五作五下每下亦輒愈然張子之氣
一語即三 未不勞而 不勞而 處正無所托
于外而其中 聞楚南有一良醫為

往而問之醫嘆曰子無嘆是也然老也天下之理其

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

甚快于予心者其未必有傷求無傷于然者則初死
望快于予心痞橫于胸中其累大矣輒而去之不瀆
史而除甚大之累和平之物不能為也必將擊搏震
撓而後曰其功未成而和氣已病則予之痞凡一快
者予之和一傷矣不終月而快者五則和卒之氣不
既索乎且將去予之痞而然害于和乎予歸燕居三
月而後予之藥可為也張子歸三月而復請之醫曰
子之氣少全矣取藥而授之曰服之三日而疾少卒
人三月而少康終年而復常且飲藥不得急進張子
歸而行其說其初使人滿然遂之蓋三授其藥而三

反之也然日不見其漸攻久較則月异而時不同蓋
終歲而疾卒

容齋五筆

張子和治息城司候聞父死于賊乃大悲哭之罷便覺
心痛日增不已月餘成塊狀若粟粒大疼不止為皆
無功思用針灸炷艾病人惡之乃求于張：至適巫
者在其旁乃李巫者謀以狂言以譖病者至是大笑
不忍回面而壁一二月心下結塊皆散張曰內經言
憂則氣結喜則百脉舒和人云喜勝悲內經自有此
法治之不知何用針哉

劉子平甚腹中有塊如瓢十八年矣月水斷絕諸法不

措張令一月之內瀉四次下六次所去痰約一二桶
其中不化之物有如葵菜臭爛魚腸之狀瀉時把木
如意搦之竟病積如刮漸而卒及積之尽呢痕及
窪如白畧無所損至是面有童色經水亦行若當年
少可以有子

張主簿妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因
性急悲感益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不
能坐卧針灸西笑徒勞力耳張曰此肥氣也得之季
夏戊己日在左脇下如粟杯久之不愈令人發瘡瘡
者寒熱也以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜

繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六
行凡有積處皆竟痛後用白朮散當歸散和血流經
之藥方愈

山東顏先生有積二十四年因視物不真細字不覩當
心如頑石每發痛不可忍食減肉消黑點滿面腰不
能直因遇張令瀉寒痰一大盆如片粉夜以舟車丸
通經散下爛魚腸葵菜汁七八行病十去三四以熱
漿粥投之復去痰一盆次日人以舟車丸通經散前
後約一百餘行畧無少困不五六日面紅黧去食進
目明遂失頑石所在旬日未謝

杜弓匠子嬪年三十有子已歲半矣每發痛則召侍媪待之以為將產也一二月後發凡數次張診其脉澁而小斷之曰塊病也非孕也脉訣所謂澁脉如刀刮竹形主大夫傷精女人敗血治法有病當瀉之先以舟車凡百餘粒後以調胃氣承湯加當歸桃仁用河水煎乘熱投之三兩日又以舟車凡桃仁承氣湯瀉黃膿血襍然而下每更衣以手向下推之搽之則出後三日又用舟車凡以猪腎散佐之一二日又以舟車凡通經散如前數服病去十九俟晴明當未食時以針瀉三陰交穴二旬而消

孫主簿李述之母患胸中痞急不得喘息按之則疼脉數且澁曰胸膈也因與仲景三物小陷胸湯一劑和二劑愈

龔其子才治吳仰泉室年五旬患腹中積塊如盤大年餘漸壯不剗腹响如雷暖氣不透口乳吐白味下氣通則少寬五心烦熱不思飲食作瘦如柴屢治無効診之六脉清數氣口緊欲知為寒涼尅伐之過使真氣不運而瘀血不行與八珍湯加半夏陳皮木香厚朴萊菔子大腹皮海金沙三劑小便下血如鳩肝狀至十二劑下黑血塊盈許腹中仍有數塊仍以八珍湯

加枳寔香附五帖而痊

一婦人年近三十患腹左有一大塊堅梗如石有時作疼肚腹膨脹月水不調白帶頻下夜熱脈多急數以千金化錢丸一料塊消即孕生一女

此方疑蘇杜檢回物之外一証破血

行氣而已
孝世保元

李河山患腹左一塊數年不愈後食柿餅過多腹脹滿悶診之六脈洪數氣口緊盛以藿香正氣散加山查神曲二劑而愈逾月又因飲食失節腹脹如初用前藥勿効与行濕補氣養血湯二十餘劑始安因囑曰病虽愈体未復元務宜謹守勿犯禁忌後數月遇龔

曰凡有病皆天与也不在服藥謹守若顏子亞聖豈不能保守謹養何不天命我今保養半年未見何如後可知也龔不能对遂後恣肆無忌未旬日忽患病赤白痢急後重疼不可忍日夜无度乃自製大黃一劑數服無効復求診六脈洪數先与調中益氣湯二劑又以補中益氣湯加白芍黃連微効彼欲速愈易医不知其素有痞滿之病復下之不愈人易一医再下下藥遂肚門下脫疼如刀割腹脹如鼓此元氣下陷也当補而反瀉之不亡何待

陸養愚治茅鹿門三天八期經參前腹中有塊升動有

時作疼作脹大便不寔脾胃不和其脉人迎大于氣口二倍以此斷為血有餘芎問曰此症屢服消道及枯血之藥輕則積寔枳壳木香豆仁重則檳榔稜莪俱以養血佐之藥頗中和而病反增重何也曰據脉左盛于右氣不足而血有餘今所服不惟誅伐元瘦且損不足而益有餘欲其病之不剝得乎用人參白朮陳皮乾姜大棗以益其氣用消痞凡以去其血之瘀其方用香附醋炒四兩元胡索醋炒一兩五錢歸尾二兩川芎紅花桃仁海石丸楞子火煨醋焙各一兩醋打麩糊為丸与前劑相間服夫卑料而魏已消大便結

寔經水調

李士材治予即守在白下時每酒後腹疼漸至堅硬得食轉疼得食反疼寔症無疑脉之浮大而長脾有大積矣然兩尺按之軟不可峻攻今服四君湯七月投以自製攻積丸三錢但微下更以四服之下積十餘次皆黑而者察其形不傷又進四錢于是腹大疼而所不甚多服四君子湯十日人進丸藥四錢去積三次人進二錢而積下遂至六七梳許脉大而寔按至關即豁如矣乃以補中益氣調愈以補並施

王工部醫成痞形堅而疼甚攻下大多遂泄瀉不止一

日夜計下二百餘次一月之間肌体骨立神氣昏亂
古不能言已治不待斃李診之曰在症虽死活理在
脉犹有生机以真臟脉不見也大虛之候法當大温
大補一面用枯凡龍骨栗壳櫻根之類以固其腸一
面用人參二兩熟附五錢以取其氣三日之間服參
半斤進附二兩馮遂減半舌已能言更以補中益氣
加生附子乾姜併五帖為一劑一日飲尽就進前藥
論則胃能
細受如是者一百日精旺食進馮減十九然每日夜
犹下四五行兩足俱廢用仙茅巴戟丁附等為丸參
附湯並進計一百四十日全安

姚氏嬪久患居積兩年之間攻擊之劑元遺用矣而積
未尽除形体尪羸李曰積消其半不可伐矣但用補
劑元氣一復病自祛耳遂作補丸服畢而痞果全消
逾三年調理失宜胸腹疼甚醫以痛無補法用理氣
化痰之劑痰不減脉之大無而力此氣虛也投以歸
脾湯加人參二錢立止治法与吳
字先同

喻嘉言治袁聚東年二十歲生居隗卧床數月日進化
豎削痞之藹漸至毛痒肉脫面黔髦倦殊無生理其
塊自少腹脐旁分為三岐皆硬如石按之疼不可忍
脉亦兩尺洪盛餘俱微細謂初時塊必不堅以峻猛

之藥攻至真氣內亂轉護邪氣為害其寔全是空氣
聚成非如女子月經凝而不行即成血塊之症現兩
尺洪盛明是腎氣傳于膀胱候施攻下其氣不運結
為堅塊故按之則愈疼也虛症亦有按之而疼者姑用補中藥
一劑以通中下之氣然后用大劑藥力收腎氣外散
膀胱之氣約三劑可全愈矣以理中湯加附子五分
一劑塊減十之三再用桂附一大劑腸中氣响甚喧
頃之三塊一時頃沒再服一劑果愈更用補腎藥加
桂附河車凡服愈

馮芝瞻治戚氏嬾腹中有塊作疼發則攻心欲死二則

不進飲食下則泄瀉無度醫藥三百餘劑不効脈之
六脈沈細已極石閉尺似有似無明係大衰上弱腎
家虛氣上凌于心脾土不能按納奔豚之氣非溫補
不可用炒乳熟地八錢補水以滋土炒黃白朮六錢
補土以固中炮姜熟附各二錢補火以生土更入五
味子一錢以斂之俾祖氣有歸臟得其藏而腎乃納
而不出也數服全愈

瑋按馮公此案發前人所未發字、如良玉精金
後宜三復之

吳學先治一人患痞前医用攻藥已去六七遠前医也

往吳與湯丸俱係參朮補劑病者云去疾莫如盡柰
何而留之吳曰正所以盡去其疾也經曰大補大聚
衰其半而止此前醫之用攻也人曰補正則邪月除
此余之用補也若必盡攻則痞去而鼓脹成是欲盡
去其疾而反益其疾矣乃恪服不間而安

可與李士
才治姚氏

如案
台參

張路玉曰願晉封室患痞在脇下或令用羔葯加阿魏
一分射香半分貼之五六日間遂下鮮血之塊甚多
二三日方止是後每歲當貼膏時必祭近鄰媪亦用
阿魏膏貼痞下血如前世以阿魏射香為痞塊必用

之葯外用為患若此况服食乎因為拈出以為室人
漫用攻伐之戒

韓貽封治谷中翰如賴病數月二旬不食矣已治木韓
視之氣色如灰声低喉溢腫神黯然無光私語其子
曰此甚難治病者知之乃哀懇曰合我六十七矣虽
即死不為天但遇神針而不一用而死且不瞑目
我生卒好酒而不好色幸為我下一針于是乃勉為
用針今卧床埋腹附其臍下有一痞周圍經七寸堅
硬如石乃以梅花針法重之針之又針其三腕又針
其百勞百会皆二十一針畢令飲醇酒一杯乃搖

手曰惡聞酒氣已兩月矣強之初攢眉既而滿引如
初

楊乘六治朱氏嬾病胸膈痞悶兼寒熱往來口乾作湯
飲食不進服寬利清解為益甚脉之右關弦數而沈
面色帶紅舌乾微黃乃與益陰地黃湯或曰胸滿不
食累月矣二陳枳壳尚不能通地黃山藥五味萸肉
俱酸瀆陰滯之物其可投乎曰此症今因肝胆燥火
閉伏胃中其原則由于腎水之不足蓋腎者胃之閉
也水不足則火旺薰蒸而胃虧陰胃與肝胆相並且
為其所勝人腎既不足則肝胆之木元水以養而燥

火燥熾于是乘其所勝之虛而入之且沖于上則口
乾咽燥流于下則二便秘結寒于中則為胸膈痞悶
故服香燥後令陰益虧而痞益甚耳第服此則腎水
旺而胃陰生次自清痞自除胃自開也一服次早即
進粥胸次頓爽四刻全愈

瑋按是症先由腎水不足不能滋肝木燥生火上
逆胃絡而沖咽故口乾胸滿不能食但附肝叶為
府藏病府亦病故寒熱往來悞服香燥則更損其
陰多成勞膈之症惟峻養肝腎其病立已楊君治
法甚當而言不達意雖剛節尤屬牽強

陸肖愚治梅先之年二十五右脇間患一塊用棧義等
峻攻年餘遂飲食半減且飧泄潮熱盜汗而塊反日
大脈之左浮而數右沈而弦曰此浮數血虛有火也
應熱与汗此沉弦木氣乘脾也應泄与塊先之款急
去塊日久未常為患因峻攻正氣致虛和氣反盛今
宜先培元氣俟其泄止汗收食進次養血以退熱血
氣既充後議河導若攻補兼施未必獲効至純用攻
伐必無幸矣用參芪苓、白朮、白朮、白朮、白朮、白朮、
白芍、姜、棗、數劑瀉減胃開二十劑大便亦寬盜汗潮
熱已減改用清氣養榮加入參白朮之半二十劑后間

投消痞凡三月而塊始消大半遂与純養氣血半年
全痊

費其室間母年五十飲因多產欠調而善病今患胸膈否
滿飲食少思心下有塊如槌按之微疼頭面四肢浮
腫痰出稠粘所喜不發熱不作世夜卧常安小水犹
利耳其脉左手浮弦而閉更甚右手沉細而閉則帶
滑此肝木自餘脾血不足之候也与疎肝助脾調氣
養血則火降鬱間而痰自消矣用調氣養榮湯加陳
皮前胡佐茯苓消痰止嗽青皮香附佐豈仁白芍疎
肝寬膈悅之氣得川流則血自津潤數帖后用潤字

凡間服每次五分十日症漸減改用六君子加養血調氣藥蓋邪之所奏其氣必虛壯者氣行則愈弱者著而成病也后以純補間用調嗽治氣之品五日始痊

陳三農治一少年体薄弱且嗽血左邊一塊不時上攻作疼左金芦菴俱不應診其脉三部虽平而細濡不流利因作陰靈治四物加知柏元參丹皮鱉甲數劑而安

盧絳中去聲痞疾忽夢一白衣婦人謂之日食蔗即安詰朝見鬻蔗降揣囊中且乏一鏹惟有唐山一冊遠詣

易之曰吾乃負販者將安用此哀君欲之遂貽數挺絳喜而食之至旦遂安

野史 絳仕南唐為蜀后曰之欲入塔明經欲忽刺又蘇

璜按本州蔗能治蛇之能令人痞脹盧病殆是蛇作楚耳故食之即愈

張子和治顯慶寺僧應公有沈疴數年虽不卧床枕每于四更後心頭悶硬不能安卧道起行寺中習以為常人莫知為何病以藥請于張、為涌出膠涎一二升如黑醬水繼出綠水入下膿血數升自尔胸中如失因出飲餅无筭安眠至曉

朱丹溪治一婦小腹中有塊其脈澀服數藥後脈見大以四物湯倍白朮陳皮甘艸為佐俟脈充寬間与硝石凡兩月塊消先補後消法

至正六十五年夏六月里人周伯安病積氣右脇下喘其脈者已五月醫求類補以溫熱之劑病日劇凡治矣陸君祥往視之曰是息賁也法當大下內經所謂留者攻之土鬱者奪之也積氣賁門大和未去其可補乎從之不終日而愈

強高說 上三 紫洪氏記續編

按息賁乃肺積也今云在右脇人云上苑則奪之宜是培氣為脾積也

汪石山治一八年已三十形瘦蒼白病食則胸膈痞悶

汗多手時汗出尤多四肢倦怠或麻晚食若屋未早必泄初取其脈浮軟近駛兩脈洪乃略大曰此脾虛不足也彼曰嘗服參朮羔胸膈亦竟痞悶恐病不宜于參者曰羔則稠粘難以行散故也改用湯劑痞或愈乎用參者各二錢白朮錢半歸身八分枳實甘艸各五分麥冬二錢煎服一帖上竟胸痞下竟失氣彼疑參不使然曰非也若參不使然則當胸痞不當失氣恐由脾胃過虛莫与枳朴之耗也前為中元厚朴疑誤 宜除枳朴加陳皮六分再服一帖頃竟胸寬失氣除積神爽澁脈皆軟緩不大赤不駛矣此可見脾胃虛者

枳朴瀆用為佐使况有參耆歸朮為之君尚不能制然則醫之用藥可不慎哉

張景岳治金孝廉以勞倦傷脾別无他瘡但瘡滿不食遂用參朮桂附歸姜甘州之屬半劑始愈后因病后復不食如此自分必死仍前藥安

錢國賓治王元直父腹左一瘡形如鏡大視之乃鏡瘡也生于皮内肉上可治以三品羔巴豆艸麻子肉各四兩杏仁一兩黃丹八兩香油一斤二兩熬羔藥貼二十日一日一換出膿一二碗內服參耆托裏月餘收口而安

蔣仲芳治陳氏媼年廿六生瘡塊已十年在睛上月水先期夜則五心發熱大嚼膨悶忽一日瘡作声上行至心下悶疼欲絕為針上腕瘡下而疼定然睛索動氣不息復針天樞穴動氣少止遂用當歸五錢白芍白朮延胡索丹皮以芍藥芍各一錢枳實官桂檳榔木香各三分醋炙鱉甲二錢水煎空心服至二十劑而安

且解久吾

字尚慎清江人著奇效述

治河妹之稟氣怯弱情之沈鬱

年三十病晚開發熱天明復止飲食少進煩燥不安肉削骨露醫藥不效診其脈歇至因其煩燥發熱頗

用芩連知柏等涼劑雖元効亦不竟寒涼第恐多服
傷胃則元生机矣因細問其熱從何處起云自右脇
一團先熱遂致一身乃悟此必氣菟疫結而成痞塊
胸膈壅滯遂燦熱氣結而脉亦結此脉与症合不足
憂也當先用攻痞以除其根諸症自愈因用磨痞丸
每月服三次服至三四而塊消其半熱漸退至七
八而塊熱盡除不數日全安矣當其疫凝氣滯痞結
右脇不惟醫者不知而病者亦不見也非察其病根
而拔去之何能取効即三棱莪朮醋炒花粉大黃
酒炒製香附各八錢枳榔黃連姜汁炒黃芩酒炒枳

實炒貝母連翹各六錢山芩前胡青皮醋炒延胡索
各五錢廣皮四錢南木香三錢芫金三錢為末先用
竹瀝酒潤次用米粉燒糊丸某甚大每服百丸
按此症与疫門陰春愚治董潯陽夫人一紫脉症
俱同而方異九症紫乃則脈耳今以此紫入痞門
者俾知痞有疫結之症也

續名醫類案卷十四



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十四

錢唐魏之琇玉橫輯 男鉞編次

鬱閉症

寶材治一人年十五因大憂大惱却轉脾靈庸医用五
苓散及青皮枳壳等藥遂致飲食不進胸中作悶乃
命灸命關二百壯關元五百壯服姜附湯一二劑金
液丹二斤方痊方書混作勞損肝過卒小葯悞人不
少悲夫

一人功名不遂神思不樂飲食日少日夜昏默已半年
矣諸治不効此病葯不能治令灸巨元關百壯關元

二百壯病減半令服淳酒一日三度一月愈原注失志不遂

張子和治項關令之妻病飢不欲食常好呼怒罵欲

殺互石惡言不輒眾醫至年無功張視之日此難以

藥治乃使二娼各塗丹粉作伶人狀其嬾大笑次日

人令作角觚人大笑其夢常令兩個能食之嬾誇其

食美其嬾亦索其食而為一嘗之不數日怒減食加

不藥而痊後得一子夫醫貴有才無才何得應亦無

窮

羅太無治一病僧黃瘦倦怠詢其病因乃蜀人出家時

其母在堂及游浙而經七年忽一日念母之心不可

道欲歸無腰纏後尔朝夕西望而泣以是得病時僧

二十五歲羅令其隔壁泊宿每日以牛肉猪肚甘肥

等燒糜爛与之太監替和凡經半月餘且時慰諭之

久口戕与鈔十錠作路費我不望報但欲求汝之死

命耳察其形少甦与槌仁承氣一日三服下之皆是

血塊痰積方止次日与熟乳菜稀粥將息人半月其

人如故又半月与十錠而行格致餘論

孫文坦治丁耀文母年四十四常患胃脘疼肝木痼痞

十五年日茹蔬素七月因怒吐血椀許不數日卒矣

九月又怒吐血如前加腹疼肝不次年二月木旺時忽

裡急後重肛門大疼肝火後迫小便短澀惟點滯疼不可

言肝火前迫腰与少腹热如湯灑三陰日惟仰卧不能側

側則互盼并腿作疼兩胯原疼二陰之疼前甚則後

減後甚則前減諸疼至不能坐遇驚恐則下愈墜疼

驚則火動恐則水傷經不行者兩月而經行腰腹必疼下紫黑

血塊甚多今又白帶如注口渴不寐不思飲食面与

手足虛浮喉中梗有痰肌肉消半診之脉僅四至

兩寸軟弱右關滑左關弦兩尺清俗脉上焦氣血不

支中焦有痰下焦氣凝血滯鬱而為火蓋下焦肝腎

兩耳腰跨肝之所經一便腎之所主也据症面与手

足浮虛則脾氣益弱飲食不思則胃氣不充不寐由

過于憂愁思慮而心血不足总為七情所傷故尔經

曰二陽之病發心脾女子得之不月此病近之所幸

脉不数声音清亮当先為開鬱清熱調達肝氣保尚

夏今後後再峻補陰血必成惱怒使血得循經乃可

愈初投当賜龍荟丸以徹下焦之熱繼以四物湯龍

胆知柏柴胡澤蘭煎吞滋腎丸連服四月腰与少腹

之熱漸退後以香當石膏龍胆梔仁滑石杜牛膝甘

州稍軟柴胡前吞滋腎丸二陰疼全減

韓約高子嬭每怒動則夜卧不安如見鬼魅小便淋漓
今人大便秘結腹中疼痛腰胯下墜如生產狀坐卧
不安因疼而脉多不應指孫曰此肝經鬱火所致法
當通利以杏仁桃仁各三錢柏樹根皮山巵青皮各
一錢煨榔五分枳壳八分水煎服之少頃大便通疼
脹隨減

瑋按此亦治癢耳非滋水生肝病何能已

一嬭因夫荒于酒色不事生產多憂多鬱對左胯及環跳
穴疼痛過膝肝火下鬱
于經大小便頻數肝火下迫
于陰二經臍腹
脹疼口乾脉之右手弱左手數近又發熱惡寒汗因

疼出時刺不安此食積痰飲瘀血流于下部足厥陰
經挾鬱火而疼恐成腸癰与神効瓜蒌散一劑疼減
半汗出數脉少退小腹堅如石按之且疼再与前劑
小腹稍軟餘無進退再進之每帖大瓜蒌二枚加丹
皮莪朮五靈脂金銀花諸症悉平

亮御內人頭疼遍身疼挾暑前後心乳皆脹玉戶撮急肛

門逼迫皆肝火
為患大便三日未行口乾因大拂意事而

起下午發熱似瘧惡心煩躁不寐而時常感暑乃怒

氣傷肝挾暑熱而然以石羔三錢青皮柴胡枳壳各

一錢
五分半夏曲黃芩各八分甘州桔梗各五分夜与当

歸龍苓凡下之大小便皆利熱退諸症悉退惟略惡
心与青皮飲而安

程湘内人鼻衄後眩暈嘈雜嘔吐清水夜卧不安腹中
飢而食不下膈孫謂由脾虛肝胆有鬱火也以人參
黃連白朮扁豆甘州陳皮半夏竹茹茯苓石羔水煎
調安

黃履素曰予少年患鬱火之症面時赤而熱手足不温
復覺咽乾口燥体中微熱夜更甚就醫吳門粗工投
以黃連黃芩黃柏茅葯服方二劑忽覺手足甚冷漸
漸過腕過膝鼻間火出冷氣神魂如從高橋墜下深

溪陰不能自主幾登鬼錄延名醫張連水治之張
云症虽悞服寒涼又不可驟以熱葯激之但服八珍
湯加姜及天麻久當自愈如法調之虽漸安而元氣
則大減矣后戒方書有云鬱症不可折以寒劑悞治
致死然則予之不死幸也夫記之以為戒

潘頊曰予稟氣素偏于火晚年多准懷抱鬱因而肝
氣不平上冲心肺水火不能既濟殊無應病之葯乃
自製一方名曰煎制凡以柴胡龍胆青皮各五錢平
肝歸身一兩養肝生地一兩生甘州五錢瀉南方黃
柏一兩知母五錢補北方蒼朮八錢煨温芩連各六

錢清心肺桂心二錢引經加白朮防己陳皮茯苓蜜
凡每服八十丸常服有效

誘按合黃瀆二說觀之皆鬱火症也一則服苦寒
幾治一則服苦寒有效要之入之稟賦各殊陰陽
亦異臨症者不可執一也

龍興子才治何進士夫人患經行胃口作疼增寒發熱一
匝以回物加官桂香附服之即吐血而疼愈甚診之
六脉洪數乃鬱火也以山梔二兩姜汁炒黑色二服
立安

馮芝瞻治一壯年作宦失意退居柳鬱成疾即經所謂

常貴後賤名曰脫營常富後貧名曰失精其候氣血
日消神不外揚六脉弦細而澀飲食入胃化爲痰
必嘔吐盡出乃能卧津液內耗肌表外疎所以惡寒
而瘦削以東垣麻黃桂枝湯加白朮姜枣二三劑脉
氣漸充有神痰涎嘔吐俱愈繼以十補丸及歸脾養
榮而全安

呂東莊治吳弁玉偶患寒熱續至熱不退胸中作惡診
之曰此肝鬱而致感也用加減小柴胡湯一劑減半
次進柴胡地黃引子呂適他往留數方与之次日仍
用地黃飲子後日用六君子湯加黃芩日後月用補

中益氣湯加黃芩且戒之曰明日端犹有微熱在內
則後日須再用地黃飲子一帖而後用六君子此後
皆有次第不可亂也因服地黃飲子竟熱已退遂
竟用補中益氣湯一劑是夜即煩熱不安乃知次第
果不可紊仍用地黃飲子即安然後依次服至第三
日再用補中益氣湯泰然後力矣第竟病後煩怒易
動俾時虛多自改用歸脾湯呂歸診之曰今脈已无
病但夜寐不著耳曰正苦此奈何曰當用加味歸脾
湯曰今已服此方而未効曰若試我歸脾自愈与一
劑而野睡達旦

必去遠志木香而
入地黃麥冬白芍

琇按此等病予惟以地黃飲子令服五七劑永無
他患今必用六君補中歸脾以至終：此何故耶
未免守立齋戒法之過

沈氏嬾夏月發寒熱醫以為瘧也時月事墮下遂淋漓
不斷又以為熱入血室用藥數帖寒熱益甚月事益
下色紫黑或如敗醬醫且云脹此藥勢當更甚乃用
得微愈耳疑其說請呂診之委頓不能起坐脈細數
甚按之欲絕問其寒熱則必起未申而終于子亥曰
鬱火虛症耳檢前藥則小柴胡湯彼意以治寒熱往
來兼治熱入血室也又加香薷一大握則又疑暑毒

作瘥也乃笑曰所謂熱入血室者乃經水方至過熱不行故用清涼以解之今下且不止少腹疔疼与此症何与而進黃芩等藥乎即灼知熱入血室矣當加逐瘀通經之味香薷一握又何為者乃用肉桂二錢白朮四錢炮姜二錢當歸白芍各三錢人參三錢陳皮甘州各四分一服而疼止經斷寒熱不至五服而能起惟足心時作疼此去血過多肝腎傷也投都氣飲子加肉桂牛膝各一錢而全愈使猝進寒涼重陰下偏天僵也拆生氣不內水泉水潰不七日死矣乃云更甚方愈夫誰欺哉庸妄之巧行脫卸而悍于誅

伐如是夫

朱綺崖多憤懣對又以内初憂勞百感數疾初發寒熱湯也漸進不解時方隆夏醫進丸味羌活湯不効易醫大進發表消中之藥凡很悍之味悉備襍亂不成方三劑勢剽又進大黃利下之物下黑水數升遂大熱發狂昏憤暈絕陽水入口即吐其家無措試以參湯与之遂受重絕更甦次日呂至高憤亂不知人事承在筋脈通正營在承氣及長強在尻骨上供發腫在穴下毒時、踰亂診其脈數而大日幸不內陷可生也遂竟用參芪歸朮加熟地一兩許時村醫在坐欲進連

翹角刺等敗毒散且方言熟地不可用其家遂呂言
進藥是夜得卧次早神情頓清謂曰吾前竟不解何
故卧此今乃知病如梦始寤也又數日脈數少退煩
躁亦平但胃口未開腫毒碍事旬日未便令守服此
諸症悉治因留方及加減法且戒之曰毋用破氣藥
以開胃若寒藥以降火通利藥以啟後敗毒藥以消
腫有一于此不可為也出邑遇友人問其病狀曰七
情內傷而外感承之傷厥陰而感少陽從其類也乃
不問經絡而混表之二陽俱敵矣然邪未入府也
轉用枳壳厚朴山查瓜姜之屬而邪入二陽矣然陰

猶不受病也用大黃元明粉而傷及三陰矣究竟原
感分野之邪不得外洩轉輾內逼中寒拒逆幸得參
扶胃氣逼邪出外其發于承靈正營者乃本經未達
營時拂之火也其發于腰俞長強者乃下傷至陰凝注
而成也蓋毒得發者參之巧也今毒之麻木平旦將
未止費調理者前藥之害也其家如言守方服之而
安

張路玉治江札科次媳春初患發熱頭疼腹痛欬逆無
痰十指皆紫黑而痛或用發表順氣不効診之脈來
弦細而數右大于左曰此懷抱不舒肝火鬱于脾土

而發熱。蒸于肺故效。因肺本燥故無瘦。脾受木剋故腹痛。陽氣不得發越故頭疼。四肢為清湯之奉。陽氣不行氣凝血滯故十指疼紫。其脉弦者肝也。數者火也。細者火鬱于血分也。遂以加味道遙散加桂枝于工中。遂全三劑而全愈。十指亦不疼矣。

徐孝廉室不得寐不能食心神恍惚四肢微冷手心熱汗至晚則喉間熱結有痰而耳時塞屢治不效診之方脉索如蛛絲略形弦數此中氣久鬱不舒靈火上炎之候也。今用歸脾湯以補心脾之虛。奈素有靈痰陰不火勝。菴員之滯。木香之燥。用歸脾者素遂以五味

異攻散略加歸芍內桂以和其陰。導其火不數服而安。

張飛疇治一孀平昔靈火易于上升。因有怒氣不得越致中滿。食減作酸。暖氣頭面手足。時冷時熱。少腹不時痰疼。經不行者半年餘。其脉模糊。駛而無力。服諸破氣降氣行血藥不愈。此蘊怒傷肝。火乘靈而尅脾。土脾上受尅則胸中之大氣不布。隨肝火散漫肢體。當知氣從溫騰。濕由火燥。惟太陽當空則陰霾自散。真火行令則鬱蒸之氣自伏。又釜底得火則能腐熟。水穀水穀運則脾胃有權。火氣得歸而諸症可愈矣。

用生料八味倍桂附十日而頭面手足之冷熱除間
用異攻而中寬食進經行而安

柴崎青治潼川守諱八十三在瀋陽禮部時聞伊母在
京病甚忽身熱吐痰妄言昏憤求醫俱主發表病勢
日增始求治悲淚哀号自分必死診其右關沈澁微
滑曰此思慮傷脾更兼鬱結痰涎壅盛脾不能運也
身熱昏憤清陽不升脾氣傷也先用二陳瓜蒌治其
標繼以歸脾加神曲半夏升柴調治數日而痊向使
悞服表劑豈不蹈昔人虛之戒耶

山陰林素臣偶患時氣為醫所悞身熱嘔吐綠水轉側
不安柴以為肝鬱而致用逍遙散加吳茱萸川黃連
各五分一服吐止身涼二服全愈又服調理藥數劑
而安

陸養愚治沈立川內人胸膈不舒咽噎不利中脘少腹
常疼大便溏經行淋漓腰膝無力倦怠頭眩得食少
可食後則異常不快半年間嘔氣清熱開苑化痰消
食之藥服將百劑脈之左手沈數而細右手沈弦而
微此肝脾燥熱愈鬱積久所致始屬有餘今為不足
宜用補劑沈日前用人參五分且有開氣之藥極痞
滿恐補不能投日參少而兼開氣所以痞滿也方用

八物湯入參一錢服之次服乃加參二錢脹即減加至三錢竟不脹矣入合六味凡空心服之調理二月而痊

一婦鬱怒憂思胸腹脹疼甚則四肢厥冷口噤冷汗用二陳湯加芎歸烏藥青皮枳壳香附厚朴蘇叶一劑痛愈乃去蘇叶加姜連而安

一婦鬱怒不發久之噫聲甚高言謔不知終始嘈雜易飢經曰心病為噫此因憂鬱于心胸也用枳仁承氣湯大黃 枳仁 桂枝 芒硝 甘草下畜血數升而安經曰血畜脈上則喜亡在中則喜狂也

凡中年人因鬱悒心下作痛一塊不移日漸消瘦与枳仁承氣一服下黑痰而愈

薛立齋治一婦人身顛振口妄言諸藥不效薛以為鬱怒所致詢其故蓋為素嫵其夫而含怒久矣投以小柴胡少可入以加味道遙而痊

一婦人年六十有四久覺怒頭疼寒熱昏悶乳內時疼脈流氣飲之類益甚不時有血如經行久因驚恐飲食不進夜寐不安此因高年去血過多至春無以生發肝木血虛火燄所以至晚陰旺則發赤經云肝藏魂無所附故不能寐先以道遙散加酒炒黑龍胆

艸一錢山厄一錢半二劑腫退又二劑全消再與歸脾湯加炒芩貝調之

一婦人因喪子怀抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上涌月經頻來曰脾經血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血制涎歸元用補中益氣濟生歸脾二湯而愈又用八珍湯調安

秀才楊若爵年將五十胸痞少食吐痰倦肌肉消瘦兩服方藥皆破耗血氣化痰降火曰此氣鬱所傷陽氣不能升越屬脾經血虛之症當用歸脾湯解鬱結生脾血用補中益氣壯脾氣生發諸經否則必為中

滿氣膈之患不信致斃

羅謙甫曰疏過五論云常貴後賤並不中邪病後內生名曰脫營鎮陽一士人驅幹魁梧而意氣豪雄喜交遊而有四方之志年踰三旬已入仕至五品出入騎從塞途姬侍滿前飲食起居無不如意不三年以事罷去心思鬱結憂患不已以致飲食無味精神日減肌肉漸致瘦弱無如之何遂耽嗜于酒久而中滿始求醫不審得病之情輒以凡為五粒溫水送下二十餘行時值初秋暑熱尤盛因而煩渴飲冷過多遂成腸鳴腹疼而為痢疾有如魚腦以致困殆命予治

之診其脈乍大乍小其症及痰悶亂冗欲吐歡息不絕予料曰此病難治啟元子云神屈故也以其貴之尊榮賤之屈辱心忮慕戀志結憂惶虽不中邪病從内生血脉壅減名曰脫營或曰願聞其理黃帝針經有曰宗氣之道內穀為主穀入于胃仍傳入于脈流溢于中布散于外精專者行于經隧周而復始常營無已是為天地之紀故五十營倫得盡天地之壽矣今病者始樂后苦皆傷精氣精氣竭尽形倅毀阻暴喜傷陽暴怒傷陰喜怒不能自節蓋心為君主神明出焉肺為輔相主行營衛制節由之主貧人欲天

理不明則十二官相使各失所司使道閉塞而不通由是則經營之氣脫去不能灌溉周身百脈失其天度形乃大傷以此養生則殃何疑之有

馬元儀治洪声遠惡寒發熱倦怠懶言語神氣弱兩脈弦虛此甲木內斃生氣不榮而陽明受病也蓋甲木乃少陽初生之氣勾萌始坼其倅柔脆一有拂鬱即萎軟抑遏而不上升及下就燥土而為病矣由是樞机不利虛邪入之而与陰爭則寒頃之既出則与陽爭而熱倦怠者胃病而約束之机閉不利也神怯者木病心藏之神明亦失養也是皆木鬱土衰之故木

氣既鬱惟和風可以達之陰雨可以滋之柴胡風劑
之平者能入少陽升發清陽而汗春氣當歸白芍味
辛而潤辛以疏其氣潤以養其陰白朮茯苓陳皮灸
艸以和中氣而益脾胃土而剝脉有神四劑寒熱已再
以補中益氣升發生陽之令而安

朱氏子場屋不利鬱悶而歸遂神試不清胸滿詰語上
不得入下不得出也半月診之兩脉宜澁兼結此因
鬱而傷肺金清肅之氣不能下行而反上壅曰是木
寡于畏水絕其源邪火內擾而津液乾枯胸中滿結
者氣不得下也神昏詰語者火乱于上也上不入下

不得出者氣化不清而現晦塞之象也但通其肺氣
諸症自己用紫苑五錢宣太陰以清氣化乾葛二錢
透陽明以散火鬱枳椇各一錢以散胸中之結杏仁
蘇子各二錢導肺中之痰一劑脉轉神清再劑少愈
改用歸脾湯而安

顧霖蒼頡寒熱如瘧便血不已左脇有塊攻逆作楚神
氣昏沉診之兩脉弦數兼澁弦則為風數則為逆澁
則氣結此肝脾之氣也鬱不宣胸中陽和鬱而成火
故神明不精肝之應為風肝氣動則風從之故表見
寒熱也人身左半肝腎主之肝氣逆故左脇攻楚有

塊也肝為藏血之地肝傷則血不守風淫熱勝益為亡
血之由也用生首烏一兩滋燦而煎搜風黃連一錢
治火煎以解鬱柴胡以疎其表黃芩知母以清其裡
枳實厚朴以解鬱和其中一劑脈起神清再劑便行
熱解而安

繆仲淳曰甲申夏伯嬭因鬱火痰喘身熱手拳目張半
月不眠食按其胃口不疼諸醫疑其虛也或云中暑
百藥試之痰喘滋急以皂角末嚏鼻通竅痰上逆如
沸延楊石林診視請急吐之先大夫曰病久矣虛甚
可奈何石林曰經云上部無脈下部有脈其人當吐

不吐即死當以鹽湯吞之去白痰數碗喘定先大夫
曰何以為之石林曰吐即為也待其熟寢勿服藥以
養胃氣夜半啜粥二碗語旦投六君子湯數劑而起
石林者里中博雅士而精醫者也

姑蘇張連水治紀華山稚自愛數奇更無子抱不快
漸至痞脹四年肌肉削尽自分死矣張診而戲之曰
公即瀉為一第便當霍然以當歸六錢韭菜子一兩
香附童子便炒八錢下之紀有唯色不得已減其半
張曰作二劑即一服夜夢遺棄家慟哭張相案曰吾
正欲其通耳仍以前半劑進胸膈開若勇士猛力一

擁解黑糞數升吸粥二碗再明日巾櫛起見容矣明年生一子即表弟汝占也 全上

張意田治柯姓人病劇診得脉浮大而空左關沈候有微弦之象左尺沈候有一絲之根面目皆紅鼻青耳

聾眼眩神昏自語不休舌燥赤大唇紫齒齦此此數端便非

戴陽症初病發熱咳嗽已七八日所服乃傷風散解

之藥昨日早間連大便秘三四次即卧床不省人事今

日忽然發昏或謂戴陽症用熟地附子等未服張思

外症雖類戴陽然症起無因察其所言皆平日之事

則似少陰之独語至晨現青色時在秋令則肺氣絕

矣然而有光亮為表氣不和唇色深紫宜有豔時大且

左尺有根脉非無治左關微弦則別有致病之故詢

之乃早晨失手自碎粥雖因怒不止即大便昏迷知

為驚怒所傷肝火上逆而諸症蜂起經所謂怒則氣

上是也與戴陽症相去遠矣用逍遙散去白朮加地

黃丹及炒皂之屬而安病多隱微 醫不審察悞斯眾

矣

一官素謹言一日會堂屬官筵中有蘿蔔頗大容羨之

生日尚有大如人者容皆笑以為無主則悔恨自咎

曰人不見如此大者而吾以是語之宜以吾言為妄

且笑也因而致病為不應其子讀書達事思其父素不輕言因愧報致病必須寔言庶可解釋遂使人至家取蘿藦如人大者至官所復公堂屬強父扶病而陪酒至數巡以車載蘿藦至席前容皆驚許其父大喜疾愈

名山醫案

一女与母相愛既嫁母喪女因思母成疾精神短小倦怠不卧胸膈煩悶日常奄奄諸藥不應子視之日此病自思非為可愈彼俗酷信女巫托降神言禍福謂之下童因令其夫明囑之托母降言女与我前世有冤汝故托生于我以害我是以汝之生命尅我

我死皆汝之故今在陰司欲報汝仇汝病奄奄寔我所為生則為母子死則為寇仇夫乃語其嬭曰汝病如此我他往可請巫嬭卜之何如嬭諾之遂請卜一如天所言女聞大怒詎曰我因母病母反害我何思之遂不思病即痊

全上

蕭萬興治一嬭年四旬怀抱鬱結嘔痰少食胸膈脹疼雖臥著犹著綿衣六脉浮結或煩渴不寐此命門火衰元氣虛寒也以六君加姜桂及八味丸而愈

內傷

萬密齋治董氏子年十七病請治診其脈浮大無力問其症無惡寒頭疼但身熱口渴四肢倦怠曰似白虎症而脈虛乃飢渴勞力行之黃芪炙當歸酒洗各一兩煎服愈

陳正學萬之母舅也病三日後胸中痞脹小便少大便不通萬聞往問疾時近地一醫欲以大柴胡湯下之察脈症不可下乃內傷中氣不運故上竅閉而下竅不通也丹溪云二陳湯加蒼朮白朮升麻柴胡則大便潤小便長一服愈

龍子才治劉太府因勞役太過發熱增寒頭疼身痛口
乳發渴嘔惡心煩或以羌活湯或芍藥香正氣散尤
甚手足無處著落心忙神亂坐卧不安湯水不入聞
藥亦吐皆由風燥之烈診之六脉洪數氣口紫盛此
內傷元氣也以補中益氣湯加遠志參仁竹茹麥冬
一劑即睡再服全安

陳三農治一老人患頭疼惡寒骨節疼痛無汗詰詔自
服參蘇欲取汗脉測數而左甚此胃虛作勞陽明雜
受寒氣不可攻擊當大補其虛俟胃氣充足必自汗
而解以參芪歸朮陳皮炙艸加熟附子四五劑諸症

雖減但口乾熱未退遂去附子加白芍少思食汗出
而安

陸養愚治叢邑宰煩勞忿怒飲食不思已數月初春患
左脇痛不能向左眠入感冒遂致嗽喘促汗出惡風
嘔惡飲冷胸腕痞塞煩燥泄瀉耳鳴十指肉攣振搖
不已脉之兩寸微浮而瀉關尺微虛不固曰靠凡左
不得眠者肝脹靠右不得眠者肺脹及咳嗽自汗喘
促下泄俱難治况瀉脉見于春時金來尅木亦可畏
幸神氣尚未乏兩寸帶浮尚有微陽小便稠黃而犹
長面色焦黃尚微有黃氣犹可治也仲景云脉虛微

弱下無陽又云微靈相搏乃為短氣又云微浮傷容
熱東垣云陰先亡陽欲得去乃見熱壅口鼻謂之假
熱之症此蓋得之七情傷陰煩勞傷陽風寒乘虛入
容胸膈痞塞目邪在半表半裡又為冷水停凝症似
支結合之諸症俱屬正氣已傷宜調養氣血使邪自
散甲順氣養榮湯加桂枝甘艸二劑諸症已減易以
補中益氣少佐小青龍湯二劑自汗喘嘔已除更以
六君子倍半夏陳皮豆仁木香胸痞脇痛亦止又與
四神丸定脾胃氣丸而安

朱少湖仲冬夜間忽頭項微強身體微疼疑是傷寒連
夜用紫蘇二大把生姜十片濃煎熱服厚煖大汗之
身倅竟輕自謂已痊矣至明日之夜復竟拘急反增
沉重復如前取汗不解身倅如石煩燥口乾睡卧不
安天明延一醫診視謂脈極浮數冬日傷寒非麻桂
不解姜蘇輕劑豈能治此大病乎擬用大青龍湯病
家疑而下之不吉復延陸同議診之脈浮數而微細
如蛛絲按之欲絕曰此陽虛症也原不宜汗况經謂
冬至月閉藏之令無擾乎陽無泄皮膚使氣急奪一
之為甚其可再乎彼醫曰仲景云陰盛陽虛汗之即
愈既曰陽虛何為不可汗况麻桂青龍湯正為冬時

傷寒而設如拘閉藏之令不宜汗則仲景此等湯劑
必待春夏傷寒而後用乎陸不能辨但徐曰議論甚
高第恐此脈不相應耳病家問當何用藥曰惟三達
生脈弱而用之彼醫謂邪在表而補歛之不死何待
陸曰汗之而愈則補候補之而愈則汗候原不兩是
也病家不能決卜之謂補吉汗凶乃以建中生脈合
投之煩躁仍劇噫氣不絕足胫逆冷身不能轉側彼
醫謂死可立而俟也陸曰候汗者再藥輕病重故未
効耳仍前方倍入參加附子濃煎冷服少頃煩躁頓
定數劑諸症悉除月餘時出虛汗憊不能起用人參

數兩方獲安

喻嘉言治劉筠之七旬御女不輟此先天素厚也然以
房中之術數擾其陽又值夏月陽氣在外陰氣在內
偶不快飲食起居如常醫者以壯年傷暑之藥香薷
黃柏石羔知母車前滑石木通投之即刻不支診時
則身僵頸硬舌強噉啞無生理矣曰此症虽危然因
悞藥所致甫隔一晚尚可以藥速追急以大附子乾
姜人參白朮各五錢甘州三錢大劑煎服可解此厄
眾議不決姑以前方四分之一服之安適再煎未遲
灌下寸香之久大嘔一声醒而能言呼諸子乳名云

通經見州官回詢其所由開目視之不語轉問醫者
何人曰江西喻遂抬手一拱又云門縫有風米寒之
喻促煎所存之藥續進而姻族襍至商以肩与送其
回寓另進他藥諸症復作而逝

李士材治程初安食少腹悶食粥者久之偶食蒸餅遂
發熱作渴頭疼嘔逆或以傷寒治之或以化食破氣
之藥投之俱不効勢甚危診之曰脉元停滯之象按
之軟且晝是脾土大虛之症也法當以參朮理之象
皆不然李曰病勢已亟豈容再悞再以四君子加沉
香炮姜而安

倪文子累勞積鬱胸膈飽悶不能飲食服消食理氣行
痰開苑清火凡百餘劑不効病勢日增李珍之脉大
而軟喟然嘆曰明是火衰不能生土反以伐氣寒涼
投之何異人井而人下石耶遂以六君子湯加乾姜
肉桂益智仁各一錢十劑少愈然食甚少也遂加附
子一錢兼用八味丸而安

虛不遠治戴養吾夫人冷常用倦眩暈不食胸膈痞滿
脉之寸關不透寸關不透之脉于今以為肝脾之氣絕少臨症者宜知之

不伸用八珍加升麻柴胡而愈後每病用前方即安
若稍為加減便不獲効凡十五年皆何恃焉蓋夫人

性情侷厚起居安適是以氣血不振而消沮故于補氣血為中加開提之劑得其性情故可久服

何介甫病脾數年飲食少而精神瘁就診兩關軟弱不透寸用參苓歸芍陳皮防風甘艸數十劑后遂善啜肥厚數年之疾脫然問曰子疾有年補脾補腎法非不詳而未之效君何從乎治得之曰君疾在肝非脾腎病也凡診病者當窮其源無為症惑如飲食少雖關脾胃其所以致脾胃病者何故此自當審者今君兩關脈弱不透于寸右因脾虛明矣左則何謂此蓋脾侷不足而脾用不行也蓋脾之用肝也星家取尅

我者為用神脾侷無肝木為之用則氣血使不條暢運化遲鈍而脈轉困矣且秋來金肅肝更不伸乃

為補助肝木之氣使之揚溢則脾土舒伸精神治然

外發雖不治脾是時以治也安用奇時之法哉識論

但所用方仍從肝脾並治人引星家之說以立言未免支離

馮楚瞻治王慎瞻年不勝勞偶遠行途中食冷面羊肉及歸胸中疼脹不堪臣所用無非查菴殺朴之類服之益甚漸至心如壓扁昏暈同絕少減則甦日食乃有形之物惟入腸胃滯則為脹為疼著而不移豈能升降于胸次乎蓋胸為心肺之部止受無形之氣不

能藏有形之物也且六脉弦細而數日不熱語言無力皆非傷食之候乃精勞所傷無根之氣上逆于心以致脹疼不堪耳當用塞因塞用之法乃以棗仁硃砂乳香為細末新剖猪心血為丸用人參五六錢煎濃送服少頃以蓮子煮白米粥壓之令忍脹強吞半碗如是數日疼脹漸減繼而胸膈自寬甚空雖多食不飽而大便所出者元儿蓋勞役太過臟腑脂羔耗竭狀如中消食物入腹銷燬無餘故入多出少也

設餘部病熱數日醫以為傷寒投以發散禁其飲食日漸危篤脉之弦緩无力乃勞傷發熱也先以濃粥湯

半碗進之竟香美其甘飲後日頃清亮与歸脾湯令以稀粥食之神復

徐主政天八年已七十江行驚恐早晚積勞到家不儿壯熱頭疼醫作傷寒發散數劑漸至面赤煩燥神昏不語頭与手足移動日夜不安脉之細數無倫次重取无力此勞極發熱者乃元陽浮越于表也更發散之陰陽將竭矣非重劑挽之无及熟地一兩六錢炒麥冬炒白朮各三錢牛膝二錢五味子八分製附子一錢二分另用人參六錢煎冲服一二劑後熱減神清後用八味歸脾調安

洪氏子因勞傷發熱頭疼欬脇疼醫謂傷寒大用發散一劑汗大出熱更甚神昏見鬼踰渴舌焦身重足冷徹夜不寐困頓欲絕脈之細數無倫胃脈微極此勞傷中氣發熱東但補中益氣湯為此等病而設令陰陽氣和自能汗出而解今更虛其虛陽氣發泄殆盡所以身愈熱而神愈昏陰陽既脫自尔目盲見鬼津液既亡所以舌黑足冷至于身重異常此尤是少陰極虛之症蓋腎生骨有氣以牽則輕否則重也與熟地二兩麥冬四錢乳炒白朮五錢牛膝三錢五味子一錢製附子二錢濃煎入參一兩取汁沖服口渴

另用熟地二兩麥冬五錢人參八錢濃煎代茶三四劑後汗收熱退舌潤神清嗽止食進後用生脈飲送十補丸四五錢再以歸脾加減煎羔成丸彈子大龍眼湯化服全安

劉君卿試入都長途冒暑氣已傷矣復日夜課誦未几壯熱頭疼欬嗽乳噯不寐神疲脈之兩寸俱洪兩尺俱弱右關沉取則無此化無腎氣之症矣非溫補脾胃無濟也而以著大熱病堅不肯服乃坐視數日熱益甚復延診其脈轉踣澁無力此久熱陰陽愈傷也與大劑熟地人參白朮麥冬五味製附子牛膝二劑

諸症漸愈惟噦聲聞作胃脈不起仍不喜食乃早以生脈飲送八味丸去丹皮澤瀉加麻茸五味子牛膝晚以歸脾湯去木香甘州加五味肉桂一補先天一補後天全愈 同時彭公子亦患此病身熱兩月服補中益氣加減已數十劑不知此方乃為虛人發散而設不宜久服且時當夏月陽氣上浮致令陰陽離決精氣乃絕面青浮腫肚腹硬心下痞膈飲嗽咽疼口多稠涎壯熱畏寒五心燦熱口乾不渴足脛常冷脈則兩寸乍洪乍數兩關無力兩尺更微上或下虛已極以前方重劑另煎人參一兩沖服旬餘漸愈

復感人言再用發散遂致不起

太親家高年且患足疾初愈偶途中遇雨疾趨兩回遂身熱自汗頭疼咳嗽縱而吐血飲食不思精神狼狽脈之兩寸皆洪大而數右關兩尺甚弱此勞傷中氣脾不統血也咳嗽者火燥于肺也身熱者元陽浮越也自汗者氣虛不能再液也頭疼者血虛火冒也與熟地一兩麥冬四錢炒白朮六錢牛膝三錢五味子一錢製附子一錢二分另煎人參湯沖服數劑咳嗽吐血俱止早晨生脈飲送加減腎氣丸午後加減歸脾湯而愈

高鼓峯治呂用晦病熱症造榻無語察其神氣內傷症也詢其致病之由曰偶夜半徒卧時出庭外與人語移時就枕次日便不爽快漸次發熱飲食俱廢不更衣者數日矣服藥無効曰粗工皆以為風露所傷故重用辛散不進飲食便曰停食妄用消導孰知邪之所湊其氣必虛若投以補中益氣湯則汗至便通熱自退矣用晦欣然輒命取藥立煎飲之旁觀者皆以熱甚又煎飽悶遽投補藥必致禍慰之曰無庸驚擾即便矣頃之下燦天數十塊竟胸膈通泰旁觀者始賀是晚熟寐至五鼓熱退進粥服煎方而安

范中行感冒風寒入過于房勞發熱昏愒醫以為傷寒以羌活柴胡投之不應人以為陰症也內桂枝香投之人不効熱且更甚飲食俱廢舌黑如炭八日不便醫正議下診之脈細數而沉曰陰虧甚矣胃氣將絕矣非溫和甘潤之劑弗能求也急以左歸及滋水清肝等藥重加參芪服之他醫以為不大便奈何議補高曰子以為承氣症耶悞矣第服藥自得便至第二日果下黑矢并許熱退舌亦紅潤但尚未進食病家犹以用補為嫌慰之曰今內傷症一補中益氣療之足矣無奈粗工謀投轉傷胃氣不能即復令以約補

之以稀粥調之不過數日自然知味不信另延一醫
重用承氣湯服至二劑不得便必反謂前病更甚無
顏再延高往采中延薛楚玉至問述田病情及用藥
次第曰既用熟地而便効可知矣何至卒將收之功
而棄之耶今無能為矣逾數日果歿病家目楚玉為党
究不之信嗟乎幸天下才子問之人而尽目之為党為
彼之醫不亦难乎

呂東莊治友人董雨舟夏月搗羔勞力致感頭疼發熱
服解表之藥不効其長居方白耒問呂曰子不觀東
垣脾胃論中服補中益氣加五味麥冬伯愈矣如言

服之頓安復起作勞仍發熱頭疼別用清解藥加甚
因同葉御生往診之曰肢微冷胸腹熱甚煩悶腰墜
下少腹脹疼不能小便時旁現者謂重感風邪所致
力主發散呂曰虛邪內伏正以勞倦傷真氣中不足
不能托之使尽出人過清涼其火下偏膀胱流及卒
藏故然安可攻也請以滋腎飲子合生脉散与之何
如御生論与呂合竟投之得睡醒熱解小便通矣留
方補之而別翌日方白至曰內熱時作煩悶頭疼亦
間發不尽白餘火未散移熱于止也用軟柴胡人參白
朮黃連丹皮甘艸茯苓神而愈

楊乘六治徐氏妾勞倦發熱時作微寒倦怠好卧下午
更甚医用發散兩劑咳嗽不絕脇痛如錐更用清金
瀉火泄利不止不食不寐者旬日脉之浮分細軟沈
則緩大面色晁曰眼光散大舌胖嫩淡白而滑兩手
厥冷而振此勞力傷脾氣虛發熱初時若用補中益
氣一二劑即愈乃誤藥致咳嗽疼利胃氣被劫于前
中氣重傷于后乃擬人參熟地白朮各一兩附子炮
姜各三錢赤石脂禹餘糧炙甘草各五錢濃煎大碗
徐服至大半即睡去已劑至成分始寤咳利俱止脇
疼如失能進粥飲服訖前藥胃氣漸開用調中益氣

生金滋水而愈

簡某病感症壯熱時微寒嗜卧懶言日輕夜甚或与羌
防發散燦渴詰妄不食脉浮數無序重按虛大無力
舌胎嫩黃中間焦燥此內傷似外感症誤表以去胃
陰津枯液涸火無所畏而變生燦症也与左歸飲加
生地當歸白芍兩劑便解熱退再診浮數俱除虛火
仍在繇起之病已退初時之病未減蓋初因中氣素
虛而乘後病因謂陰暴傷而致若不先救其陰而即
補其氣是為無制之陽邪樹幟而將垂絕之真陰下
石矣今陽火已退陰液漸充則初越之症可立除也

與補中益氣合生脈而安四劑而愈

薛立齋云予素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥門五味酒炒黑黃柏少許方覺精神清適否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腿內亦然且兼腿內筋似有抽縮意致兩腿左右顛移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五十歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時五十有五日間齒縫中作脹服補中益氣一劑夜間得寐至壬寅有內脹之變日間雖服前藥夜間齒縫亦

脹每至午前諸齒并肢俸方得稍健午後仍服觀此何知氣血日衰治法不同

琇按立齋生平善用補中益氣据此病先下盛服之宜矣後既土盛而犹服之豈不惑哉

柴岫青治瀉陽少司寇竟羅譚吳拜延診曰數日前因感冒風寒至今不愈其脈或兩至一歇三至一歇遲而見代並非外感乃虛寒凝結氣虛耳用人參養榮湯吳云无力用參以玉竹代之此十月廿一日也至次日告云昨服藥後腰發板轉動必以人必需人參購覓可也遂用參一錢甘三早診之脈氣稍轉仍用

原方午後因膝硬強自令人以熨炒熨之忽至發迷
再延診而医者数人俱云風寒方用大表散并欲下
大黃及諸人去後吳云伊等如何可信仍服公葯但
再為斟酌之乃于方內加參一錢迨服至冬至方斷
煎劑即以原方配合為丸調理而康向使吳公信任
不篤必致悞事

夏大兒年反未中陳雖嗜身熱詰語不甚辨人太守苦
溪陸視三因赴補在京邀柴診視其脉大而無力此
陽虛發熱擬用人參陰陽而咋舌以為漸不可用乃
力任方淺一劑身和三劑全安

少司馬諱雅爾裔隨 加馬打圍至德州抱病給假回京
醫投小陷胸湯一劑頓然仰臥神昏不語又一醫進
參三錢神氣少甦言語恍惚惡食不寐延診雅云素
有肝病遂述前方按左關脉和平惟心部空大此心
家之疾也與酸棗仁湯而愈

周太守家人發熱不食晚間怕鬼因逢中冒雨食冷粽
而起柴口脉無停滯祇見虛火絳所謂形寒飲冷則
傷肺飢飽勞役則傷脾此內傷所致擬用人參以價
貴遂用扁覺六君加姜棗而安

太史張希周丁卯場前勞倦外感身熱委頓兩足無力

欲用發表之劑未決求治右脉軟弱人迎不緊外感
輕而內傷重以補中益氣湯治之後用異攻散數劑
而痊遂聯捷

觀察沈椒園在侍御時家人某新從山左回京身熱不
食沈以熟地等滋陰大劑進遂嘔吐增劇求治于柴
柴曰此傷胃氣所致非陰葯所宜用香砂六君子治
痊

主政蔡修持令即發熱口渴胸悶舌純黑胎謁語延醫
無効已二十餘日矣診之脉氣乍弱並無外邪投以
滋陰之葯二劑不應改用六君子加炮姜一服尚未

効後戴廷博加製附一錢吳茱萸五分一劑汗出胸
快再劑汗出胸中豁然調理而痊病因有如此之類
者毋粗忽也

陸養愚治少湖病已半年先因房勞汗出又傷食初用
消導葯後乃禁遺頭暈初服人參少安因每日五錢
或一兩服至數斤其病自汗身熱咳血痰逆胸膈不
舒心口如物窒碍手足時厥頭常眩暈或昏暗不能
見人大便已六日不行無端頭暈必服參湯少止脉
之氣口右關似清而有力左寸關浮弦似虛尺濡弱
此由肝有拂熱重以思慮房勞致虛參虽中病單服

多服益湯太過化為熱火與積痰膠固脾胃遂致熟
結幽門火逆上行而動血尚以惡寒汗泄重被厚褥
帕裹綿裝至是悉令撤去以潤字凡三錢服之外用
蜜導法去宿垢益許再用人參七分歸身遠志東仁
各一錢山庖茯神白芍各一錢三分香附二錢炙甘
艸三分入竹瀝一鍾一帖即胸次豁然得寐每日以
前方及潤字凡數十粒便潤肝止咳嗽痰血漸減十
帖而安

火喘服
參之鑿

陸祖愚治潘洪宇以過勞傷脾虛而肺臟亦損咳嗽
痰喘微寒微熱或與清涼滋補健脾消導月餘飲食

頓減精神愈衰僅奄一息耳診之遍身瘡癬六脈
如絲言語輕微夜苦無寐大便則向未聚澀乃用人
參白朮貝母東仁麥冬生地君以人參苓冬五味烏
凡五更吞下每日服參約四五錢數日漸痊再以歸
身生地連翹地榆煎湯擦洗肚腹大便通潤調理百
日而安

陸祖愚治本府添設曾向緣中氣不足宜服參芪二日
午飯未几咬楊梅過多便胸中不快身熱頭眩吐痰
口渴不思飲食三日不更衣或用查枳芩連厚朴二
陳之類三四劑大便一次去燥矢數枚而症如故又

用歸芍知麥查芩而腹滿作嘔脈之左三部浮微而弱右三部浮大虛數曰此脾胃虛弱氣不能運故胸膈不舒非有積滯也况素不能服若寒食可再用芩連之類經云但治其虛安問其餘乃用六君子湯加白豆仁煨姜大棗二劑症頓減再與補中益氣而全愈

李東垣治一人憂思不已飲食失節傷脾面色黧黑環口尤甚心懸如飢人欲食呼吸短促曰此脾氣受傷也憂思不已則脾氣結而不行飲食失節則脾氣耗而不足陰氣上入陽中則面色黧黑土衰水侮故

唇口尤甚此陰陽相火病之逆也經曰陽明脈衰面始焦故知陽明之氣不足也遂以參芪升止葛芍朮神姜棗助生發之氣而痊

朱丹溪治一人因勞倦發熱遂以小柴胡湯黃連解毒湯芩連白虎湯等劑反加痰氣上涌狂言自不識人目赤上視身如烈火六脈洪數七八至按之豁然左畧弦而芤此因中氣不足內傷寒涼之物致內發熱入與苦寒藥太多為陰賦格陽之症與補中益氣加姜附大棗二劑而安

陳三農治一友因食不節遠行勞倦發熱煩悶症類傷

寒醫禁食不與診之言語輕微手背不熱六脈數而軟此真氣不足非有外邪也力勉其進粥乃以甘溫大補之劑即熱退而安

陳三農治夏天人年已八旬憂悲不已偶因暑浴遂患

發熱頭疼醫有以為傷寒禁其食而肆行解散越三日氣急而喘汗出如洗昏冒發厥診其脈大而無力乃為之辨曰外感發熱手背為甚內傷發熱手心為

甚外感頭疼常疼不休內傷頭疼時作時止辨內傷外感要

訣宜令頭疼時休而手背不熱是為虛也遂用參芪

各五錢白朮半夏各二錢橘紅一錢甘州六分一劑

減半後倍參朮而痊

龔子才治一人年近四旬發潮熱口乾喜飲冷水咸以

涼藥投之無效四五日渾身沉重不能動止四肢強

直耳聾詰言妄語眼閉不省人事六脈浮大無力此

氣血虧損之極以十全大補湯去白芍地黃加熟附

子一服斷睡痰响咸謂服參芪桂附之誤曰此為病

交攻不必憂疑入進一服過一時許即能轉身動止

次日連進數劑則諸症漸痊矣此從脈不從症之治

也

李時珍治一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食

無姜蒜不能一吸至夏酷暑人多飲水煎以拂怒因
病右腰一點疼牽引右脇上至胸口則必欲卧每發
則大便裡急後重頻欲登廁小便長而數或吞酸或
吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止或得熱少
止但受寒食寒或勞役或入房或怒或飢即時卒發
一止則諸浪然如無病入甚則日發數次服溫脾勝
濕滋補消道諸藥皆微止隨發此乃飢飽勞逸內傷
元氣清陽隔遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯
合四君子湯加柴胡蒼朮黃芪煎服之後仍飲酒一
二杯助之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足

和暎頭目精明神采迅發諸症如掃每發一般即止
神驗無比若減升麻葛根或不飲酒則効便遲大抵
降多升少稟受弱而有前諸症者並宜此為活法治
之

薛立齋治府厚王以道元氣素弱丙午丁未二年以科
場歲考積勞成疾至十二月間其病感作大熱淚出
隨凝目赤面黧揚手露胸氣息沉：凡絕脈洪大鼓
指按之如無舌乾澀之如刺此內真寒而外假熱也
遂先服十全大補湯日既服此湯其脈當收斂為善
少頃熟睡竟而惡寒增衣脈頓微弦如絲此虛寒之

真象也以人參一兩加熟附三錢水煎頓服而安夜間脈復再以人參二兩熟附五錢乃愈後以大劑參朮歸艸而痊

一男子發熱煩渴頭疼喉行發汗喘急腹疼自汗訥語用十全大補加附子治之熟睡喚而不醒及竟各症頓退再劑愈

黃武選飲食勞傷發熱惡寒喉用解表神思昏憤胸發赤斑脈洪數而無力此內傷元氣非外邪也急用溫補彼不從果效

王肯堂治外兄雲文華病發熱一醫審無身疼等症知

非外感用平胃散加人參五分投之熱愈甚用平胃亦無謂

又一醫至診之曰此人參之過也急汗之汗而不解

又一醫至診之曰邪入裡矣宜涼膈散下之煎成欲

服王適至急止之診得六脈皆洪大搏指卒按有力

笑曰此醫之所以悞也用茯苓補心湯加人參六錢

麥冬三錢車仁三錢五分時不卧九日矣服藥即大

睡良久而醒病已退診之脈稍微弱為治方每劑用

人參四錢車仁茯苓神歸朮麥冬川芎之類今日多

服不輟遂別去數日以小便不利求叩令服道赤散

明日熱又作舌焦如墨復延診脈復洪大因連日所

服藥皆減參三分之一而導赤散中入加花粉山梔
黃芩等藥故病復作急令用人參六錢合前藥復大
劑投之舌色始淡熱始除小便亦清利倘進涼膈之
劑必不治矣

馬元儀治邱德初素精勞鬱近復失恃過哀因而發熱
惡寒飢逆煩渴面赤如粧診其兩脈沈微無力知非
實火內熾乃虛陽上越得之悲哀勞倦內傷也悲哀
則傷脾勞倦則傷脾：虛無以生肺：虛無以生腎
所以封藏不回致虛陽上越升降失常致濁氣上行
由是氣逆于胃則為飢逆火游于上則為煩渴也法

宜溫補之劑從其性而歸之于下則諸症自平与人
參桂理中湯而安

吳洪先病經七日寒熱似瘧手足麻木汗出如注心悸
恍惚診得寸脈大關尺虛澁曰此症人多謂風寒
外感不知為勞倦內傷也寸大關尺澁乃脾肺之氣
受驚心腎之陰亦涸氣虛不能并運陰往乘之則寒
陰虛不能內養陽復乘之則熱心悸恍惚者陰不主
事而陽內擾也汗出如注者陽不主事而陰外亡也
手足麻木者陰陽兩虧氣血俱不得榮也以當歸補
血湯為主加入參二錢以桂脾肺之陽肉桂黃連各

七分得以離內交廣及灸州以補胃而和子一割便
得鼻睡再割汗止再以補中益氣湯升發陽氣如穿
山甲以祛內却邪寒熱遂止脈亦和但重按少力微
見飢逆用大割附桂理中加丁半而痊

王亦林患勞倦發熱神昏倦怠已半月皆作外感治不
効診得兩脈浮虛右脈倍甚此飲食失節勞役過度
脾虛則胃氣亦虛氣不上行于陽反下陷于陰而發
熱也夫內傷脾胃之症與外感風寒者不全東垣言
之詳矣外感風寒乃傷其形為有餘之症內傷脾胃
乃傷其氣為不足之症有餘當瀉汗之吐之下之尅

之是也不足當補溫之和之調之補之是也經云勞
者溫之損者溫之又云上氣不足者推之揚之脾不
是者以甘補之當以辛甘溫之割補其中而升其陽
則愈矣乃用補中益氣湯服後得微汗然非發汗也
乃陰陽氣和而汗自出也一割熱退不數劑而精神
如舊

朱丹溪治一人卒內傷汗下後詰語初能認人後三五
日語後便妄言此神不守舍切勿攻伐或當脈多細
數不得睡足冷氣從面褐青色必氣燄用補中益氣
湯加入參半兩竹葉三十斤煎服治法

繆仲淳治一人年三十三歲因勞力即發心腹飽滿疼
痛直至暗下皆板而脇空鬆不可言腹寒即欲就火
火至少睡疼止太便不通小便短縮似宿茶日夜不
卧至五周時飲食漸加時常卒發大約性嗜酒善怒
勞碌所致方用當歸五錢半膝四錢麥冬五錢酒芍
五錢炙艸七分五味一錢橘紅二錢茅根一錢五分
生地三錢宜多食韭菜童便桃肉廣華記

于中父患目珠疼如欲墮此肝火冲也胸脇及背如槌碎狀

此怒而日夜咳嗽此悲傷眠食俱廢自今不起繆令

日進童便三大杯七日下黑血無數疼除咳嗽如故

再以二冬貝母蘇子橘紅白芍鱉甲青蒿桑皮五味
百部枇杷叶竹瀝童便久之未痊病不遂其虛促用
參芪繆不可乃陰以黃芪二錢入煎藥嘗之竟夕悶
熱日不交腹始信不繆因守前方煎服喻化凡勿較
逾月卒蓋仲父病起于哀傷過甚更触惱怒所致非
虛也肺熱而腎肝火上冲故不宜補芪參

立齋治一人因勞倦耳下微腫惡寒發熱頭疼作渴右
手脈大而軟此不足症也当服補中益氣湯彼反用
發表藥遂致嘔吐始悟以六君子湯治之更服補中
益氣湯而愈大抵內傷者榮衛失守皮肉閉無氣以

養則不能任風寒胃氣下陷則陰火上冲氣喘發熱
頭疼發渴而脈大此乃不足之症也大抵飲食失節
勞役過度則多感內傷不足之症若誤以為外感表
實而反瀉之豈不致虛之禍哉東垣曰凡內傷為
飲食勞役所傷則右手脈大于左手外感風寒則左
手脈大于右手當以此辨之

亦未
全足

倪仲賢治林仲因勞發熱、隨日出入為進退飲食漸
減倪切之曰此得之內傷故陽氣不升陰火漸熾温
則進涼則退是其徵也投以治內傷之劑其疾如失

元机啓微

張意田治鍾姓人因辛里用力畧有脇疼數日後發熱
身疼甚至胸脇痞硬服大小陷胸更剝診之左脈弦
硬而數右脈寸尺浮而閉沉滯胸脇拒按四肢厥逆
症似結胸然脈胸不應必有他故察其臂上筋肉
微黃咳出痰色如橘冷症与脈知為用力太過脇肋
受傷瘀血為患欲發黃也所謂瘀血類傷寒者治宜
宜桃仁承氣湯下之但瘀滯日久祿用攻散陰氣不
損當並重養陰血為是用生地二兩當歸八錢丹參
四錢桃仁三錢大黃三錢枳實二錢芒硝二錢甘州
八分服後下瘀血紫塊二次熱退胸平惟神氣欠清

脈氣弦軟此傷陰絡而神靈故也服補陰舒絡之劑而愈

沈明生治徐來一外有下帷之勞以忘衽席之戒偶于夏月縱啖生冷致患脹滿不食腹中漉漉有聲且復喜嘔水道秘滯凡疎解清涼之劑遍嘗妄効診之即主溫補而座間競持他說乃索筆書云積滯雖令中滿獨不思中氣不足則腹為之善脹腸為之善鳴乎諸逆冲上虽多屬火獨不思胃寒不化亦令人吐乎小便黃赤虽為內熱之症獨不思氣不舒化溺因色變乎總之症在疑似惟憑切脈今脈來沉弱左關更

微煎之甚煖畏涼其為虛寒症明矣遂先用六君子蓋以炮姜蓋智仁之屬繼投八味凡出入于參芪桂附之間旬日良已以後依方調理不特精神倍常抑且連徵熊夢

吳橋治陳龍年八十而病瀕瀕不禁則隱几而日夜坐不復近衾綢診之六脈沉垂絕矣叟乃命孫扶起曲跪告曰老夫春秋高子孫僅立門戶死其時也吾從姪繼鸞年四十病瘵且危家極貧空室五口嗷嗷待哺願公內其骨即龍死賢子生就而診之卧無完被室中僅二缶作懔然左脈平右脈虛大而數曰此

憂思傷脾故尔治宜用補脾益肝此金匱法也 叟聞瘵者可生大喜過望其病一再剗而愈逾月瘵者無恙則夫頗率諸幼子羅拜謝矣 太函集

內傷

王某膏粱子也年弱冠好角力因奔石井關致勞傷力而晡熱咳嗽脇疼面青白目下胞青紫諸治不効診之脉弦畧數五尺弱魚瀝口腎為作強之官因勞而傷肺為腎母因子病而耗及母氣肝為腎子母病而子失其養乃金不生水之不滋木之燥則生火上侮金而下乘土故日胞青紫咳嗽諸症作也與生熟地杞子沙參麥冬地骨女貞等四剗忽盜汗如雨疑葯之悞曰此佳兆也天火燦為患津液久涸得純陰之劑以濡之既釜中有水薰蒸而蓋潤也由是鬱熱除

而血脉復矣問可飲乎曰不可若斂之則火仍內伏
第再養金生水使陰平陽調則汗自止而病自痊矣
如言而痊

汪氏姊年五十餘因子病傷寒二十餘日焦勞過甚反
子愈而已病作寒熱頭疼面赤滿口舌發泡目不交
睫者數日夜一老醫謂少陽、明熱症与小柴胡合
竹叶石膏湯脈之豁大無倫乃力斷為傷勞虛火上
浮戴陽假熱之症若惧葯立見危殆乃与熟地一两
肉桂一錢炙甘草一錢麥冬二錢歸身三錢一劑即
熟睡及覓口舌之泡尽消遂霍然矣当是時予初臨

症由今思之則但与養青湯為至當也後六旬外復
患虛症悞服黃芪煮棗單方月餘忽周身浮腫動即
氣急服熟地數斤而愈



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館

面目耳鼻
鼻淵
髮

續名醫類案卷二十三



續名醫西類案卷二十

頭

錢唐魏之琇玉橫輯 男鉞編次

有人三代不壽問彭祖之觀其寐處果有一穴當其腦
戶令塞之遂得壽蓋血際風入耳吹腦則陽氣散頭者
諸陽所聚以主生也 延壽書

靈寶才治一人起居如常但時發頭痛此宿食在胃皖也
服丁香凡十粒而痊 陽明食積

張子和治南鄉陳君將赴秋試頭項遍腫連一目狀若
半壺其脉洪大張出視經白面腫者以此以來陽明

經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑
蔥根豆豉同煎一大碗服之微汗次日以州搗鼻孔
中大出血立消 陽明

王定國病風頭痛至都梁求名醫楊介治之連進三丸
即時病失懇求其方則用香白芷一味洗晒為末煉
蜜丸彈子大每服一丸以茶清或荆芥湯化下遂名
都梁丸其為治頭風眩運女人胎前產後傷寒頭疼
血風頭痛皆效 百一選方

張大復曰偏頭風之苦病者莫能自言方亦多歧而罕
効戊申予忽病此正悶鬱時周叔明以餅法見寄未

服也五月五日頤民服貽二餅貼太陽上一夕良已
法用南星半夏白芷三味等末爛搗姜蔥為餅頭疼
中簡便方也 筆設

姚應鳳治嚴州施盛宇三年患頭疼不可忍姚曰法當
取首中骨今八月時狀歛難碎治期以明歲春乃割
額探去其骨出瘻而愈 錢唐縣志

龔子才治杜侍御患頭痛如刀劈不敢移動俱風怕語
言耳鳴目中流火六脉緊數有力與酒九蒸九晒大
黃為末三錢茶調服一劑而痊 此亦陽明蓄熱為病
在至高之地故大

黃必用如
是製法

薛立斋治潭侍御但頭疼即吐清水不拘冬夏吃姜煨
止已三年矣作中氣虛寒用六君子加当归黄芪木
香煨姜而痊 陽明挾
厥法

孫文垣治蔡樂川內人患頭痛如破髮根少動則痛
連滿頭暈倒不省人事過半時乃甦遍身亦作疼胸
膈飽悶飲湯水停隔間不下先一日因怒吐水數次
虵虫二條今或惡風或惡熱口或渴或不渴大便秘
脈則六部皆滑大有力此疫厥頭痛也 因怒而吐水
吐虵乃肝火
上逆而治疫而不
知養肝必胎後患先以藿香正氣散止其吐繼以牛
黃黑虎丹清其人事頭仍痛甚又以天麻藿香各三

錢半夏二錢陳皮白芷薄荷麻黃生姜葱白煎服得
少汗而頭疼少止至晚再服之五更疼止大半人事
未全清此蓋中州疫感非下不可乃用半夏五錢巴
霜一分麩糊為丸每服二十丸生姜湯送下二午大
便行三次皆稠粘疫積也飯食少進餘症尤可惟遍
身疼未盡去改用二陳湯加前胡石羔藜本薄荷只
壳黃苓石菖治安 木旺土衰

朱丹溪治一人因浴冷水發熱頭痛脈緊此有寒濕也
宜溫葯汗之蒼朮麻黃乾葛甘州陳皮川芎一劑得
汗後知病退又不下補葯白芍陳皮半夏白朮蒼朮

人參木通甘艸姜水煎服 濕熱

一婦人頭痛發熱而渴白木陳皮川芎乾葛木通甘艸
水煎溫服 陽明

樓全善治一老婦人頭痛歲久不已因視其手足有血
絡皆紫黑遂用三稜針盡刺出其血如黑汁者數杯
後視其受病之經灸刺之而得全愈即經所謂大疔
為患及頭痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也
三陽風熱

李時珍治一人病氣鬱偏頭疼用蓖麻子同乳香食鹽
搗貼一夜痛止 治外法

李士材治蔣少宰頭痛如破昏重不安風藥血藥瘦藥
不治無功脉之尺微寸滑腎虛水冷為瘦也地黃四
錢山藥丹皮澤瀉各一錢茯苓三錢沉香八分日服
四貼兩月輒減六七更以七味凡人參湯送五日其
痛苦失 近時上感之病最多現此
可悟一切也 少陰病

吳孚先治一人患頭痛不可禁脉短而澁吳曰頭為
諸陽之首若外邪所乘脉當浮緊而弦今反短澁短
則陽脫于上澁則陰衰于下更加手足厥冷名為真
頭痛當真心痛無異法在不治惟猛進參附或布萬
一如法果愈

李成章官六安衛千戶善針灸或病頭痛不可忍虽震雷不聞李診之曰此虫咬腦也令殺虫諸藥為末吹鼻中二三日虫從眼耳口鼻出

一八素病黃忽苦頭疼不已發散降火歷試元効診得脉大而緩且一身尽痛又兼鼻塞乃温家頭痛也投瓜蒂散一匕内鼻中黃水出 大逆 温熱

張三錫屢見苦頭痛百治不應詢之曾生過楊梅瘡用土茯苓四兩白鮮皮若參金銀花各三錢黃柏一錢皂角子三十粒苡仁木通防風各二錢氣虛加參芪血虛加四物俱効 治法彙

一八頭痛脉滑而軟乃痰火上攻也二喙荆芥羌活酒芩不効加石羔二劑少可終未愈除前方加熟大黃三錢食遠煎服 陽明痰火

一八苦頭衆作外感治診得右手寸口脉大四倍于左兩尺独洪盛乃知傷氣虛頭痛也外煎自午倦怠以補中益氣加炒柏而安 氣虛

一八頭痛而面色枯黑身肉瘦削左寸關俱不應指兩尺独洪大用作陰症治用滋陰四物加黃柏知母元參十日全安

一八煩苦頭痛候為外感治發散三黃白帛硝黃愈投愈

甚診之氣口急大而數按之即濡右脈亦虛大詢之
先不熱服藥後始熱曰風寒必先發熱在二三日間
豈有先不熱而後熱者此虛氣頭痛也現其氣短不
足以息餘皆可知今發散過度復耗其氣又復下之
復損其血氣血內傷宜乎虛火獨熾而身反熱也非
大補不能挽回遂以補中益氣湯大劑加熟附子一
片為向導服下即安睡竟而痛止第人事不清復加
筋惕肉閏振、不安彼歸咎于補劑力虛極所致復
更一医用柴胡表藥致一身之火游行于外變為斑
彼益信為傷寒日進承氣遂不瘳 全上

一八頭痛身形拘急惡寒便秘惡心作食鬱治不應診
得氣口脈平和独尺數而細且行步艱難乃脚氣欲
動也從脚氣治愈 全上

一八頭痛作外感治不應左脈平和氣口独盛症兼飽
悶惡心乃食鬱也消愈 全上

一八牙与頭角左痛乃少陽、明二經火盛之故清胃
散对小柴胡去參、半加薄荷而痊 全上

一老婦頭痛連額發散降火恰用不効面上皆出小紅
泡有微水不甚潰一月後痛悉移于右在眼胞上紅
腫且怠于言動飲食不甘用辛涼尤甚六脈濡弱如

蛛絲初按少弦乃作氣虛治六君倍黃芪加蔓荊子
三服漸寬安心跳不眠愈急乃以補中益氣湯加茯
神元參棗子柏仁治痊 全上

東垣嘗病頭痛發時兩頰青黃眩暈目不欲開嬾言身
体沉重元欲吐潔古曰此厥陰火陰合病名曰風
瘦以局方玉壺丸治之灸決谿即愈是知方者体也
法者用也後执体而不知用者藥体用不失可謂上
工矣 秘藏 醫說續編

湖南押衙顏思進治頭風掣痛用蠟二斤鹽半斤相和
于錫鑪中熔令相入捏作一兜蓋坩可合腦量大小

搭頭至額痛立止

經驗方

王叔權云予年逾壯寒夜現書每竟腦冷飲食過量腦
亦疼甚後因灸顛會穴而痊有兵士患自鼻衄不已予
教令灸此穴即愈有人久患頭風亦令灸此穴即止
但銅人明堂經云主鼻塞不聞香臭等疫而已故予
書此以補其治療之缺然以腦戶不宜針現之額會
亦不宜針恐未盡也

叔權母氏隨叔權赴任為江風所吹身体頭動搖如在
舟車上如是半年乃大吐疫徧服疫葯并灸頭風各
穴方愈

有士人患腦熱疼甚則自床投下以腦挂地或得冷水
稍得減而疼終不已服諸藥不効入教灸顛會而愈
熱疼且可灸况冷疼乎凡腦痛腦旋腦瀉先宜灸此
穴資生經

薛立齋治一人因酒色過度頭腦而脇作痛以為腎虛
而肝病用六味地黄料加柴歸而安

商儀部勞則頭痛作陰虛不能上升以補中益氣加蔓
荆子而痊

王肯堂治一人寒月往返燕京感受風寒遂得頭疼數
月不愈一切頭風藥無所不服厥陰愈甚肢俸瘦削

因思此症明是外部緣何不辨語云治風先治血
行風自滅本因血虛而風寒入之今入疎泄不已烏
能愈哉人云痛則不通則不痛乃用當歸通血活
血不通則閉竅血脉其人能酒用酒一斗入二藥
其中浸三日夜重湯煮熟乘熱飲之致醉則去枕而
卧矣然有人鬪于上而痛者宜酒苓石羔之類治之
又方用芎歸熟地連翹各三錢以薄荷二錢放碗內
將滾藥沖下自鼻吸其氣溫即服之立愈然亦為
血虛者設耳

馬元儀治一友患頭痛經年不愈早則人事明了自午

至亥神氣昏迷不安作風火治无効診之兩脉俱沈
且滑此太陰陽明痿軟頭痛也用礞石滾痰凡間服
導痰湯以蕩滌之次以六君子少加秦艽全蝎調理
而安

張樹滋妹患頭痛累月診之陽脉大陰脉澁曰此陰衰
于下陽亢于上之証下虛之候也法宜六味地黃湯
加青鉛五錢俱清濁之位斯不治痛而痛自止矣所
以然者以陽氣居上俸本虛也而濁氣干之則寔陽
氣居下俸本寔也而氣反上逆則虛頭為清陽之位
而受濁陰之邪陰陽混乱天地否塞而成病矣治之

者不察其脉藥以頭痛為風火而行透解之劑有不
益其虛者乎

朱某患頭痛累月苦不可忍咸用散風清火之劑診其
脉浮虛不鼓語言怯力肢俸惡寒此勞倦中傷清陽
之氣不越濁陰之氣不降也故汗之反虛其表清之
益傷其中其惡寒乃氣虛不能上榮而外困也况脉
象浮虛俸倦語怯尤為中虛氣弱之驗与補中益氣
加蔓荊為使二劑全安

一人頭風裏重綿尚畏冷三十年不愈以蕎麥粉二升
水調作一餅五更合頭上微寒即愈

李樓怪症奇方
玉帶在曰此

方先裴漢伯曾
治族祖有効

繆仲淳治梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下日因于
血熱血虛火上炎也麥冬五錢橘紅木瓜茯苓各二
錢白芍三錢枇杷叶三大片蘇子錢半甘菊錢半烏
梅二个竹瀝一杯芦根汁半碗二劑嘔止頭尚痛加
天冬二錢頭疼少止加土茯苓二兩小黑豆一合全

愈 廣筆記

沈規順中丞傳自一道人頭風神方予僕嬪患此痛甚
欲自縊服二劑數年不發土茯苓四兩錢金銀花二
錢蔓荊子防風明天麻各一錢元參八分辛夷川芎

各五分黑豆四十九粒灯心二十茎芽苓五錢河井
水各杯半煎服全上

廣筆記治半边頭痛屬火症者用大黃末三分黃芩末
一錢和生白酒一碗熱服

立而治一嬪人腦左腫痛左鼻出膿年餘不治時或掉
眩如坐舟車正許叔微所謂 虛風邪襲之而然也
以川芎一兩當歸三錢羌活旋覆花細辛蔓荊子防
風石羔藁本荆芥穗半夏西乳地黃甘州各半兩乃
製一料每服一兩姜水煎服

劉雲密曰一嬪季冬受寒甚至仲春巔頂並左後腦痛

是原病于足太陰寒水寒久化熱鬱熱上行以病手
手太陽因風升之化不達而病亦在足厥陰也經曰
過在巨陽厥陰者誠然診者云手太陽熱甚于風足
厥陰熱勝于濕更謂脾肺亦有鬱熱心自微熱余正
治手太陽而微煎肺以上焦合而營諸陽歸于手太
陽之氣化在肺主氣者也並治足厥陰以風升之化
達而手太陽之氣化乃暢更微利小腸以通血脈而
和其氣並心經之熱亦去故不必多治他經也按此
亦治巔頂之一因見寒者溫治之未盡耳

酒片苓二分半酒林
分半酒林
苓分半蔓刺子二分半防風分半黃連一分半柴胡
二分藜蘆三分升麻二分川芎二分酒黃柏三分當

歸八分不通四分牛
膝二分水煎一劑痊

嘉祐初仁宗寢疾葯未驗間召州澤醫始用針自腦後

針入針方出開眼曰好惺惺翌日聖体良已自乍以

穴目為惺惺穴針經初無此名或曰即風府也

宗張濟民

西錄

吳橋治方簡妻病五年時飯不盡一器至夜則頭岑岑
欲絕遍更達旦乃交橋至曰少食久卧肌宜瘦今且
肥而脈不數奚病為或媼當娠大損血于頭審是治
二年可受胎復生男而起矣蓋媼嘗妊哭姑髮根有
疣如豆大出血數升匪勿令人知尋免男弗育也治

不補氣而補血果二年而卒子命之曰去病 太函集

髮鬻髮

李林甫嗜鄭子為省即林甫見其兩鬻斑白因日上明日當賜甘露美鄭即食之能烏髮翌日食之一夕兩

鬻如漆 即柳代酢編

李脚換白髮方云刮生老姜皮一大斤于鐺中以文武火煎之不待令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刮便以姜皮置鐺中密封固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分時察明便滴煎之緩不可令火急如其人稍疲即換人看火一伏時即成置于磁鉢中研極細李方虽云一伏時若火候勻至日西

即成葯也便時以篋脚拖取如麻子大先于白髮下
點葯訖然後拔之再點以手指熟擦之令人肉第四
日當有黑者生

梅師治年少髮白拔去白者以白蜜搽毛孔中即生黑
髮不生取桐子搗汁搽之必生

千金療髮黃熊脂搽髮梳之散頭入床底伏地一食頃
即出便盡黑

薛立齋治一男子因大怒發熱眉髮頓落蓋髮屬腎而
眉屬肝此肝腎素虛為怒陰火愈盛消燂精血而然
也用六味丸料加柴胡山梔黃柏數劑漸生又二十

餘劑而完

一男子染時瘡服換肌散之類眉毛頓脫遍身作痒或
時赤暈乃燥為損其陰血陽氣偏旺而然朝用四物
湯倍熟地加茯苓白朮丹皮山梔甘州夕用六味丸
料加歸芪而復生

一男子素不慎房勞其髮忽落或發熱惡寒或吐痰頭
暈或口乾作渴或小便如淋而足發熱或冷至胫屬
足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補夕用六味
丸料加炒柏枸杞而漸

一男子遍身瘙痒服祛風辛燥之劑眉髮脫落此前葯

復傷肝腎精血虛而火內熾所致朝用八珍湯加麥冬五味夕用六味丸料加當歸黃芪治之風熱退而眉髮生矣

一儒者一身作痒搔破膿水淋漓眉毛脫落如癩風症久服祛風等藥致元氣虧損日補中益氣湯加茯苓而愈后失調理日晡熱甚用八珍湯加五味麥冬五十餘劑而痊

面

孫兆治樊樓居家劉三一日滿面皆黑色有相者斷云不過月餘死既逾月且安適孫入店与客飲酒遂拜孫述說其病狀孫診之曰非病也乃為臭氣所熏穢氣蓄于面即不散故有此色問劉汝一月前間甚一陣非常臭氣不能避即劉曰一日登溷其廁臭氣不可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香我家有南人將至售香可用沉檀二香各一兩碎劈焚于炉中安帳內以重絹被蓋定勿令香氣散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散方可出帳明日

引鏡照之劉依其言面色頓變

樓全善曰腎臭腐屬水脾臭香屬土廁臭者臭腐也故聞之則入腎而面黑沈香者香臭也故熏之則脾土勝腎水也

蘇子由面有瘡高安丐者趙生謂子由曰君好道而不得要陽不降陰不升故肉多而浮面赤而瘡吾行教君梳水以灌漑子骸經旬諸疾可去子由用其說信然唯怠不能久故不能極其妙龍川志略

治面部生瘡或鼻臉赤風粉刺用盡為不効者惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨卧時洗面令淨如

面油用之近眼處勿搽數日間瘡處自平赤亦消如

風粉刺刺一夕見効閔提點方用生硫黃五分香白芷

五分羌青七分去翅足全蝎一个洗炒瓜蒌五分膩粉五分蟬退五个洗去

是右為細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬熔取

下入諸藥在內每用少許搽面上

趙居猷撫幹所傳云有貳脚趙再可知湖州時与一寺

僧相厚而僧患酒豔鼻端生赤贅數枚大者如橘小

者如梅李下垂過口飲食言語皆所妨廢良自厭苦

之即有一小兵事刀鏞又但聞其善取鬻瘡不知其

能治酒豔也一旦自言于僧請医此疾即以藥傳之

凡半月餘每日取惡物如膿紅自皮膚出者甚多其
教員后悉成痂落去鼻面瑩然遂以十千為謝且語載
御婢直齋閣而求得其方以
治人良驗用黃

丹五餅藥

五十五著

硃砂

三十又

研

巴豆

十個去壳

去英

右件

同入餅藥

確子

中慢火熬

三兩

沸取

下續

入研細生礦炭三錢酒豔鼻用鵝毛掃在紅處一日

一次上藥以追出毒物病退即止雀子斑用小竹棒

兒拖為點患處才覓微腫即便洗去恐力太猛並集

全上

陳三農治隣媼面上一熱即通身燦熱而汗隨之日夜

六七次百治不痊細思之經日面熱者是陽明病此
脾陰不足而胃火有餘也以山藥為君歸芍地黃為
臣以補脾陰之不足佐以石羔甘州黃芪麥冬五味
竹叶二劑愈

朱丹溪治一媼人面頰兩腮熱腫此隔壅之病也乳葛
桔梗各錢半升麻一錢蘇叶錢半薄荷一錢炙甘州
七分姜一片水煎食後服

王莽遺孔沐玉休不受莽曰君面有疵美玉可以滅疵
休犹不受莽曰君嫌其價重乎遂搥碎進休之方受
之

薛立齋治吳黃門瞻之顛赤腫痛此胃經風熱上攻所致犀角升麻湯二劑即愈卒又姜大理患此前湯藥人所惑謂湯內白附子性溫而不服另用荆防敗毒散愈甚後雖用此湯尚去白附子亦不應後用前方三劑而愈本艸云白附子味甘辛氣溫無毒主面上百病及一切風瘡乃風熱之主藥此經所謂有是病用是藥也

吾進士面患瘡已潰作渴自服托裡藥及降火藥不効診其脈浮而弱丹溪云潰瘍作渴屬氣血俱虛况脈浮弱投以參芪各三錢歸朮熟地各二錢數服渴止

又以八珍加黃芪服愈

韓氏子年十四早喪天真面紅腫如風狀不時牽作或

誤用癘風藥內

熱口燥煩渴此內傷不足陰火

上炎而頰赤遊風疔也藥宜滋其陰則火自退用

加參芪四十劑又用此作丸服斤許不兩月而

痊 癘風机要

許孝士治王檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆疼不開口難言語飲食亦妨左額與頰上常如糊手觸之則痛作足陽明經絡受風毒傳入血凝滯而不行故有此疔或者以非

風小續命透髓升之類与之皆不効乃疏犀角升麻湯贈之數日而痊犀角升麻防風羌活川芎白附白

芷黃芩甘艸石粗末每服四五錢水煎日三四服明

經絡環唇快舌起于鼻合額中膺類車上耳前過客主人膺髮際至額頭今所患皆一經絡也

老母年七十餘累患頰車痛每多言傷氣不寐傷神則大發上連頭下至喉內及牙齦皆如針刺火灸手不可化乃至口不得開言語飲食並廢目覓火光如閃電尋常涎唾稠粘如絲不斷每勞與飢則甚得卧與食則少安知其虛也始以清胃散犀角地黃湯人參白虎湯羌活勝濕湯加黃芩甘桔皆不効後反用參

芪朮艸芎歸升柴桔梗之類少佐黃芩山危牛蒡連翹空心進之而食遠則服加減甘露飲始竟安然老人惟多躁而不耐煩勞與多言時有之不能除去病根然發亦不剽矣

從子培因喪子鬱結後多餌鹿角膠種子藥或于之食後臨卧輒進之以至成積于胃而患而疼如老母之症服清胃散甘露飲重加石羔太過而見虛症又服參芪等補藥而復見火症門人施生以越鞠丸加山危連翹貝母橘紅之類開其鬱結始安然如無病人

矣 未選入

目

孫兆治國婆之患眼冷淚眼科醫科醫官治二三年不
効上召孫之至曰臣非眼科但有葯耳容進方用石
決明一兩赤小豆一兩半之夏五錢生斑猫二十一
粒炒去頭足木賊五錢為末姜汁丸如桐子大每服
二十凡姜湯下方進聖旨下眼科詳定奏曰此方于
眼科甚不相涉斑猫有毒恐傷臟腑不敢用合再取
聖旨國婆之聞之曰眼科醫官不惟不能亦不愿俟
我治也但合此葯忌傷無怨上聞之孫自進葯服經
十餘日愈八分二十日全安時眼科並降兩官孫賞

錢三十萬

竇才治家中女婢忽一日失明視之人无暈翳細思此
女年少精氣未衰何緣得此疾良由性急多怒有傷
肝臟故經脈不調而致遂与密蒙花散一料如旧光
明矣

張子和治女僮目忽暴盲不見物此相火也太陽之明
血氣俱盛乃刺其鼻中攢竹穴与項前五穴大出血
目立明

李民範目常赤至戊子年火運君火司天其年病目者
往之暴盲運火爻烈故也李是年日大發張以瓜蒂

散涌之赤立消不數日又大發其病之来也先以五
目内皆赤發牽睛狀如鋪麻左之右次銳皆發赤左
之右赤貫瞳子再涌之又退凡五次交亦五次皆涌
之又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中尽
皆奪方能战退然不敢觀書及見日張云当候秋涼
再攻則愈火方旺而在皮膚難攻其裡無益也秋涼
則熱漸入裡方可擒也惟宜暗窺閉目以養其神目
暗与靜屬水明与動屬火所以不宜見日也蓋李因
初愈後曾冒暑出門故痛連發不已如此洞洩之後
不可常攻使服鼠黏子以退翳方在別集中

趙君玉目暴赤腫點洗不退偶思張語曰此病在上者
皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散乃知法不
遠人自遠法耳

王之一子十餘歲目赤多淚衆工無効張曰此兒病目
還當得之母腹中被驚其父曰妊娠時在臨清被圍
乃令服瓜蒂散加鬱金上涌而下泄谷去涎痰數升
人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明
日双目耀然光明其日又與頭上出血及眉上鼻中
皆出血吐時次用通經散二錢舟車凡七十粒自叩
却少年人以通經散一錢投之明日又以舟車凡三

十粒投之下十八行而安

士人趙仲溫赴試病面目赤腫睛翳不能識路大痛不
任欲自尋死一日與同侪釋悶坐于茶肆中忽釣忌
脫鉤其下正中溫額上髮際裂長三四寸紫血流數
升血止目快能通路而歸來目能辨屋脊次見瓦溝
不數日如故此不藥不針誤出血而愈夫出血者乃
發汗之一端也

一小兒名德孫眼發赤其母買銅綠欲洗兒目煎成家
人誤與兒飲之瀉更火吐日明

樓全善男因珠至夜疼連眉稜骨及頭半边腫疼用黃

連羔點必反甚諸藥不効矣厥除少陽疼隨止半日
又作月餘以夏栝州二兩香附二兩甘州四錢為末
每服錢半茶調下

一男子所患与前症皆同但黑睛有白翳二點諸藥不
効亦以此藥與東垣選奇湯加四物及黃連煎間服
而安

王海藏妻姪女形肥筭年時得目疾每月或二月一發
發則紅腫難開如此者三年服除風散熱等劑左目
反有頑翳從鏡背遮瞳人右目亦有翳從下而上經
云後內支外者少陽病從下上者陽明病也少陽

明二經有積滯也脉短滑而寔鼓最則以短清潔古

云短為積滯遏抑藏府宜下之遂用温白丸減以川

芎附子之二多加龍胆州黃連加東垣五積法後二

丸加起每日加一丸加至大利然後減丸又後三丸

加起忽一日于利中下黑血塊若干如黑豆大而堅

硬從此遂痊

以上三則
醫案綱目

盧州如錄彭大辨在臨安暴得赤眼後生翳一僧用蘭

香子

本名羅勒人名香
藥又名翳子叶

洗眵每納一粒入背肉閉日

少頃連膜而出也一方為末點之李時珍嘗取子試
之水中亦脹大蓋此子得濕即脹故能染惹眵淚浮

膜耳然目中不可著一塵此子可納三五粒不妨碍
亦一異也 卒卅經目

張大復云予目初眇有教服三花五子凡者或云緩一
甚安蓋予用乎遂止揚州張斗嶽謂予淮僧某者又
眇暫然問之則服三花五子凡也此古本所載耳而
修合之法稍異則効不為應為比歸請以相与予病
久且老無事与方然頗得之以濟同病者張信任通
劍術其言不妄 筆設

張三丰真人治目疾碧雲羔臘月取猪羊胆十餘枚
以蜜裝滿紙套籠住懸檐下待霜出掃下點之神

効 卽二百味
花卅羔

充州朱秀才忽不見物朝夕拜大士夢神傳方用好敲
硝一兩銅器鎔化入飛過黃丹二分片腦二分銅匙
急抄入罐內收之每點少許即愈 張三丰仙方
卒卅經目

宋丞相言黃典史病外障翳夢神傳一方用大陰玄精
石陰陽火煨石決明各一兩蕤仁黃連各二兩羊子
肝七个竹刀切晒為末粟米飯丸梧子大每卧時茶
服二十丸服至七日烙頂心以助藥力一月而愈 朱氏

集驗
方

魏全家富母忽然失明王子明卜之曰明年三月一日

有從東來衣青者治之必痊至時候見一人著青綢
衣遂邀為重設飲食其人曰僕不解_醫但解作犁耳
為主人作之乃持斧就倉求犁轆見桑曲板器并上
遂斫下其母兩眼煥然見物此曲板叶蓋并之所致
也 朝野僉載

玉璽集要詩云赤眼之餘_醫忽生_叫中_我鳥不食為名塞
于鼻內頻_換三日之間後_用明又_倪惟德原机啟
微方用_鷺不食_叫 本名石晒乾二錢青黛_凡芎各一
錢為細末嚙水一口每以末許_嚙入鼻內_泪出為度
一方去青黛 本叫經目

經驗方治目障翳以熊胆少許淨水略調開_去筋膜
塵上入冰片一二月或痒則加_生姜汁些_多時以
銅筋點之絕_奇赤眼可用_余家二老婢俱以此_効熊
胆善辟塵試之_法淨一器塵其上投胆一粒許則
凝豁然而開 全上

朱丹溪治飛絲入目紅腫如_眯痛_滴不開鼻流清涕用
京墨濃磨以新筆搽入目中閉目少時以手張開其
絲自成一塊着在眼白上却用綿_輕拭去則愈如
未_尽再治人飛絲入目用頭垢點入目中即出入_眯
目鹽与豉置水中視水中立出 本叫經目

龔子才治一八兩眼角出烟霧此肝火也以柴胡黃連等分臨卧煎服

周漢卿治鄉人蔣仲良左目為馬所踉睛突出如桃他醫謂系絡已損不可治漢卿封以神羔越三日復故
明史

華州陳明遠盲十年漢卿視之曰可針也及翻睛刮翳朗然辨五色全上

福建按察使沈文敏其母隨養時双目失明延醫一治之云障翳已重藥不能効乃先葯之使不知葯尋以物撥轉眼睛面內一面向外封閉三日而開視物無

一不見云眼睛惟兩角有筋絲之故可撥轉然非前鼻壅手不能也茶園雜記

京師法云靈僧禪師失明數年夢中有人授一方治內

外障但神水在青色可療烏二兩

二兩上脫一味是首烏抄平但字

下空一字人為字似烏字之記蔓青子枸杞蒺藜甘菊荆芥穗各一

兩當歸地黃川芎赤芍防風各一兩半十二以末之水麩糊凡桐子大空心食前溫水下二四十凡僧服之日復明因名夢靈丸續夷堅志

白彥良壯歲常赤目道人曰但能不赤頭則不病此彥良記之七十餘更无眼疾延壽書

有人年八十餘眸子瞭然夜視蠅頭字云別无服藥但
自小不食畜獸肝人以羊肝明目疑之余曰羊
肝明目性也以食百他肝不然畜獸臨宰之時忿氣
聚于肝主血不宜乎目明矣全上

陳坡次女痘後餘毒上攻遂成目障遍試諸藥半月不
驗後得老醫一方用蛇脫一具淨光焙燥入天花粉
等分細末之以羊子肝破開入藥在內麻皮傅之用
泔水煮熟切食之凡旬餘而痊其後程甥亦用此取
效糕安小乘

萬密齋治孫操軍淮海患目疾因官孝政時夜閱卷而

得今每閱文案則眼珠脹痛用八珍湯為主人參芪

苓炙甘州酒洗當歸酒炒白芍酒炒生地去白木

以川芎以加其麥冬五味子柏子仁栗仁黃連減半

共十一味孫曰何不用菊花蔓荆子曰凡目疾有外
因內因由風熱得之為外因宜發散所謂火鬱則發
之也由久視傷血得之為內因宜以養血為主所謂
目得血而能視也

孫文垣治吳小峯與弟小川俱病目嵩科治之益甚其

目始紅腫次加大陽痛繼以星翳疊出脉之小峯濡

緩而大兩目血縷直貫瞳人至暮則疼脉寸則洪

大鼓指黑珠有浮翳膜隱然難開大小便皆不利矣

故于小峯用補先以清肝散与之夏枯艸五錢香附

四錢甘艸一錢五分細茶五分以上止其痛治藥兩進

而痛止方法與前樣全善案公繼用八參茯苓熟地杞子桂心

牛膝破故紙白蒺藜丹皮治本痰熱宜酌用于小川用瀉

內用瀉肝湯及當歸龍荟丸外用象牙之庄末點之

其點眼為細七日全安經云實者正治虛者後治小川

之症正厥陰肝火熾盛肝常有餘有餘者瀉之正治

也小峯則下虛又為怒所激怒則火起于肝為藏

血之地故血熱貫瞳人而至暮作痛故先用瀉之散

以去其痛耳用甘溫補下元之虛俾火歸原此謂從

治若用苦寒降火之劑恐血凝而痛加且火激而愈

熾矣

姪孫眼紅腫脹或以苦寒治時疾之劑与之眼更腫目

增而太陽痛再加石羔病不減且遍身脹悶寢食俱

廢脉之弦大無力乃用蔓荊子桑白皮柴胡香附夏

枯艸甘艸芽茶服愈

孫氏婦年過四旬眼赤腫太陽痛大便三日不行經水

四日未止諸治不効石目內皆突生一白泡垂与鼻

脊大二寸餘端科見而却走以為奇疾時眩暈不能

少動則嘔吐益甚孫脈之兩寸關俱滑大有力而尺沈微此中焦有痰肝胆有火為怒所觸而然經云諸風掉眩皆屬於肝諸逆中上皆屬於火蓋元痰不作暈也却未其血泡乃大性急速怒氣加之氣乘于絡上而不下故暴脹垂下也古壯士一怒目皆裂与此理同治當抑肝不鎮痰火先用姜汁益元凡以壅火止吐再以二陳湯加酒連酒芩天麻滑石吳萸竹茹枳實一帖吐止少能運動仍以二陳易加芩連之類數劑而痊

呂東莊治吳約陸弟患左目痛連腦醫以頭風治之不

解初時發寒熱後遂壯熱不止呂診之曰火伏于內

風燄泉涸水乃折矣非得汗不解也或曰汗須用發

表葯獨非風燄乎且發汗葯須擁被悶卧乃得身熱

甚若此奈何唯得呂曰庸醫發汗皆屬強逼故須擁

被悶卧然而汗不可得也說破此人伎倆令葯非此

類葯葯食舒体時而汗至豈能消過哉語久乃用尾

腦白不飲子必道遠夜分大汗淋漓次日頭目爽然

矣龍腦白不飲子先考道氏

吳季先治一人目痛取竹叶一片刺鼻之迎香穴出血

而痊鼻內迎香穴乃手足陽明交經也治本

王宗蒼目珠紅赤驚悸腸鳴色夭不澤左寸浮空右關尺重按无力矣曰此肝腎交虛不能制游行之火非肺家寔火也朝服加味歸脾湯夕服八味凡不一月紅退脉和

楊貞亨治一貴人患內障性暴躁時時將鏡自照計日責効數醫不愈名楊診曰公目疾自痊第服藥過多毒已流入左股旦夕間當發毒竅為公憂之既去資人日夕視在股撫摩唯恐其毒發也久之目漸愈而毒不作貴人以楊言不驗名詰之對曰医者意也公性躁欲速每持鏡自照之心所屬无時不在目則

火上炎目何由愈故詭言令公凝神于足則火自降自目愈矣兵行說道惟醫亦然貴人曰良醫也厚礼而遣之

簡齋漫錄

江西通志

范武子嘗苦目痛就張處度求方處度因嘲之曰古方宋楊果子少得真術以授魯東門伯魯東門伯以授左邱明及漢杜子夏鄭康成魏高堂隆晉左太冲凡此諸賢並有目疾相傳此方云用捐讀書一減思慮二專內視三簡外觀四旦晚起五夜早晚六六物熬以神火下以氣徒蘊于胸中然後納諸方寸修之一時近能數其目睫遠視尺蠶之餘長服不已洞見

牆壁之外非但明目乃亦延年全上

黃履素曰予少時神氣不足患目每用目少過輒酸澁

無光者累日博考方書多云六味地黃凡可治目予

連服二三料目疾更甚改用別方補腎養血之藥始

得少愈汝謾醫竟鉤元有目病不宜服六味凡辨謂

洋瀉茯苓滲水山茱萸不宜于目

山茱萸味酸肝同藏于目經云肝病者

毋多食酸凡肝病皆不宜此三味不惟目也言之甚詳以予驗之此論

良是然從今思之目病有屬血虛亦有屬氣虛者予

血固不足氣則尤虛辭立高治兩目紫澁不能瞻視

以為元氣下陷用補中益氣湯倍加參芪而愈予悔



往時不多服前湯而事于補腎養血致久不痊迨

四十后以指麻多服前湯原元意于治目而目光漸

充始信往時之悞予幼時患風弦爛眼甚受其累百

藥罔效遇一陳姓醫士于長安邸授予白朮為令專

于眼背患處隨專隨痊取効如神不肯傳方予畧訪

之云有吐蛇在內吐蛔者小兒口中吐出蛔虫收乾

候用其中想更有製就芦甘石配之者真奇方也

按風不為病善生虫爛弦有虫治以吐蛔乃以虫

殺虫也凡吐蛔病多由厥陰風木上乘肝火之為

病故名蛔厥者厥陰也今用以治目疾之虫即

經所云衰之以其類也

張三錫治一人病目不久能視涼葯盡試不應診之兩
手微弱命服八珍加麥冬一月如旧乃知飲食不運
腸胃枯澀髮落皮皺噎膈淋閉等症目昏耳聾悉由
氣液血脉榮衛衰少不能升降出入虛火阻滯而然
故元府閉小瀾火炎上則視昏花隔簾視物之象也
丹溪東垣治目昏用參芪補養氣血久靡不獲効以
氣血旺則元府氣得利升降清明乃復
百云羊肝凡用
羊肝引黃連等
入肝解經諸菟蓋肝主目肝中菟解則元府通利而
日明矣故黃連之類解大餘之火菟也椒目之類解
濕菟也芫蔚之類解氣菟也荆芥羌芷等之類解經
菟也磁石之類解頭目菟墜即氣使下降也蔓青下

氣通中皆治氣血菟
致日昏有餘之症

一人目赤黑珠傍暗赤成瘡耳中痒作腎臟風治用四

生散二三服即愈 聖惠方

一人拳毛倒睫用木鱉子一个去壳為末綿色塞鼻內

互塞石：塞左一二夜自分

陸肖愚治孫憲副夫人因怒氣患兩目赤痛兩太陽亦

痛治及半月赤疼更甚目腫大如棗經行數日不止

大便數日不行飲食不進頭眩吐逆脉之左弦石滑

上下俱有陽分有餘曰相火寄位于肝胆怒氣觸之

其發如龍雷不可逆折 兩用多苦寒
非逆折而何 病虽上劇而下

緩然寔因下而逆于上也用醋炒柴胡青皮吳茱萸炒黃連鹽水炒黃柏酒炒黃芩白芍丹皮青黛竹茹為煎劑以抑青丸入龍荟丸一日夜煎丸各二服遂減大半大便未行經血未止煎劑仍煎以抑青丸合潤字凡投之便行極澁進粥安睡明日諸症俱痊後以清氣養榮而安

一老八年八十四夜能細書詢之云得一奇方每年凡月二十三日桑叶洗目一次永絕昏暗宜五月五日六月六日立

冬月采者佳

倪新溪母陶氏哭子喪明已十一年忽一人踵門曰吾

能治瞽時其孫上成均宗親會餞其在老人曰諸公但少留此視之發囊出針二其目兩眇目頓能見物撫其孫頤曰吾久不覩汝今成人矣新溪德之手百金謝不受而去雲開某

九江有夫歐其嬖致以睛突出適有兵過其門令勿動取手中水盪睛旋轉使其系不乱然后納入即以濕巾裹住令三日勿開其嬖性急閉二日遂解巾眼好如故但遇風寒常發痛云解早之故也吳誠有設奇疾方玉帶存抄本

晉顧含養嫂失明嘗葯視瞎不冠不食嫂目疾須用蚘

蛇胆含計盡不得有一童子以一合授含開乃辨蛇胆也童化青鳥而去嫂目遂痊 晉書

王叔權云 即批中也 子遊季公稽絕早觀書晨牌方食久之

患目溢倦遊而歸同舍遺以鹽精數日指目而疾除

鹽精且尔則青鹽之治目固也古方用青鹽指牙因

指在手洗目而目明鹽精乃鹽地之精也 資生經

唐丞相李恭公扈從在蜀中日患眼或溢或生翳膜或

即疼痛或見黑花如豆大累之數十不断或見如飛

虫翅日百方治之不効僧智深云相公之病緣受風

毒夫五臟寔則瀉其子虛則補其母之能令子寔子



能令母虛腎是肝母今腎受中消風毒故令肝虛肝虛

則目中恍惚五藏亦然脚氣消渴諸風等症皆由于

腎虛也 此增深得經音並未能暢發所以終是唐人老手諸說終之徒亂人意 地黄丸

慈主 生地黃熟地黃各一斤石防風皆去芦枳

壳楚炒去穰牛膝酒浸杏仁去皮尖各四兩石為細

末不犯鐵器煉凡如桐子大空心以豆淋酒下五七

十凡豆淋酒法黑豆半升淨揀煎炒令烟出以兩三

升浸之不用黑豆用此酒煮独活即是紫陽也 百乙方

豆淋酒方見此

陸景淵之子患爛弦風眼兩眦皆痛淚漬兩頰皆即成

瘡百藥不効因理故書得此方試點之須臾藥淚俱
下滴瘡中流出其間有小虫自此遂愈其妙黃連一
兩沒竹叶一兩柏樹皮乾用一兩半濕用二兩石三
味咀以水二升煎至五分稍冷用滴目兩眥及洗
爛處日三四次 全上

咒偷針眼已結赤腫未成膿者神驗取患人衣衫角以
手紫捻定于所患眼大眥上搵之每一搵即念一声
移甚底移擱眼如此一氣念七遍搵七遍訖即隨身
就手撫令緊打一結之定自然便退直候眼安方解
切在志誠不須令病人知咒語或欲自咒自移亦甚

可全上

朱丹溪治一人病眼至春夏便發当作翳時治用黃芩酒

南星

姜製

香附蒼朮

俱童便浸

連喬

各二兩

山庖

炒一兩

川芎

童便

浸二兩

陳皮

酒浸

龍胆

酒煎

萊菔子

青黛

各半兩

柴胡

錢三

為

末神曲糊丸服旬日痊

華川陳明遠言十年百藥屢嘗而不見効自公承為殘
人松陽周漢卿視之曰是翳雖在內尚可治用針從
背入睛背捲其翳下之日數然辨五色陳以為神

粹

趙良仁云丹溪先生嘗用參羔治一老人目暴不明昏

暗如夜正乃灵樞謂氣脫者目不明是也余亦曾治一士人患頭風連左目壅痛後戴人法于百会上生出血皆不効遂在頭偏左之足太陽所過第二行与上星对平按之痛甚處出血立痊由是而言針之与药必切中病所病与邪对然後可愈盖前人之方不遇立規矩耳 药要或問

繆仲淳從父病後眼花服此立痊盖肝腎二經虛也真甘枸杞 一斤 極肥大者酒洗淨 真懷生地黃 一斤 極肥大者酒洗淨 河水砂鍋內熬羔以無味為度去渣重湯煮滴水成珠便成羔也每羔一斤入煉蜜六兩空心白湯下 廣筆記

黃子諭潛白患風淚眼每出則流淚盈頰繆仲淳疏一方寄之穀精州為君蒺藜和枸杞之屬佐之羊肝為丸不終劑愈 全上

薛立斋治一男子眼赤痒痛時或羞明下淚耳內作痒服諸药不効氣血日虛飲食日減而痒更盛此肝腎風熱上攻也以四生散 白附子 黃芪 熟地 沙苑 蒺藜 酒調四服而愈人一人頭目昏眩皮膚瘙破成瘡搔痒以八風散治愈

立斋曰世傳眼背初生小蛇視其背上即有細紅點瘡以針刺破一時即痊故名偷針实解太陽經結熱也

人每試之有効

張子顏少卿晚年常目光閃々然中有白衣人如佛相者子顏信之彌謹乃不食肉不飲酒然倅瘦而多病矣一日從汪壽卿求診卿一見大驚不復言但投以大凡數十小凡千餘粒囑曰此十日內服之當盡却以示報既如期視所見白衣人變黃而光无所見矣乃欲得肉食又思飲酒又明日黃亦不見竟氣象异他日矣乃請壽卿以告卿曰吾固知矣公脾初受病為肺所乘心脾之母也公既多疑心氣不固自然有所視吾以大凡寔其脾小凡補其心肺為脾之子既

不然勝其母而病愈

沈存中云予為河北察訪使時病目赤四十餘日黑時

傍暗赤成瘡日變作夢百治不効即官印

見問

予病目如此曾耳中痒否若耳中痒即是腎家風有回生散治腎風每作二三服即痊問里號為聖敬子予傳其方合服之午時一服臨卧一服目乃大痛至三更乃能眠及竟日赤少散不復痛矣更進三四服遂午安如旧是時孫和甫李士師鎮陽用予說大喜曰吾固知所以治目矣向久病目嘗見呂吉甫叅政曰頃目病久不痊服透冰丹乃痊如其言修合一劑

試服了二三十服日遂痊乃知透冰丹亦可治見風
目 未 選 入

龔子才治一人兩目作痛服降火祛風之藥兩目如桃
熱俶殊甚用十全大補湯數劑諸症悉退后服補中
益氣湯兼六味凡而痊復因勞役午后目澁俶倦仍
服十全大補而痊

一八日赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛
此因勞心過度飲食失節以補中益氣湯加茯神棗
仁山藥五味頓愈人勞役復甚用十全大補兼前藥
而痊

前日与歐陽叔弼晁无咎張文潛同在戒垣予病目昏
將以热水洗之文潛曰目忌點洗目有病当存之齒
有病当劳之不可同也又記魯直語云治目当如治
民治齒当如治軍治民当如曹參之治齊治軍当如
商鞅之治秦頗有理故追錄之 東坡志林

相国崔公慎由庶察浙西左目皆生贅如息肉欲蔽助
人視物極礙諸醫方无驗譚簡見曰此立可去但能
安神不撓独断于中则必效矣崔公曰如約虽妻子
必不便知譚入曰滴用凡日晴明亭午時静處治之
若其日果能遂心无憂矣是時月初也至六七日間

忽陰雨甚譚生極有憂色至八九大開霽問崔公飲
酒多少崔曰戶雖至小亦可引滿譚大喜是日于使
宅北樓請飲酒數杯端坐无思俄而譚以手微捫所
患曰殊小事耳初竟似拔之虽痛亦忍又聞動剪刀
声乃白崔曰此地稍暗請移往庭中坐既定聞唧然
有声先自譚請好綿數兩染絳至是以絳之拭病處
兼傳以藥遂不甚痛請開眼者所贅肉大如小指堅
如虬筋遂命投之江中後數日詔徵入秉鈞

目

金封翁年近七旬

厥即類風也小愈後眼花不良

于步或數以一味白炭藜水法為丸每早晚服四錢

既可祛風又能明目且價廉而工省才服數日竟口

咽苦燥再服遂茫然夫明重以鬱閉然暈厥後作目閉

不語汗出如珠延診脈已散亂始以熟地二兩杞子

一两煎服一時至不敢主方欲就中加附子一錢

謂重劑純陽宜少入陽藜金曰此症外間多用參附

湯以致筋枯皮黑人未死而半身先死有以衰微之

陰被劫也今症屬三陰虧竭五志之火上炎故卒然

暈厥且病人以誤服白蒺藜之燄失明而病作其可
再服附子而乃默然去二味服下神氣漸退乃減半
入沙參麥冬沙苑蒺藜而痊令常服之二年許能辨
磁器花色

盧玉川年六旬外人病脇痛凡一切香竈古方 遍
嘗後一醫与凡方以胡盧巴為君餘多伐肝之品服
之脇痛畢暫安既而一目失明獨不謂葯之誤也再
服則兩目俱損近脇痛加甚延診以大劑生熟地杞
子女貞沙參麥冬萸仁与之一服即安始悟向葯之
非然黑水久枯不能復矣

一八年二十左右求診無他病唯日入則兩目無所見
此即誤語所謂雀盲是也其脉唯左關尺左尺極微
語之曰君得毋新婚乎曰然与生地杞子牛膝甘菊
沙參麥冬女白四劑而 戒其房帷擗節否則再
發成廢人


方懋德內人患瘡荆防二味為時師治瘡所不可缺者
服四劑不慮其芳香燥烈竟能致兩目赤腫 成
障也已一月漸次失明診之兩才上溢且弦數令以
前方加當歸白芍數服而愈其姪亦同此患及視瞳
人逆出不及葯矣

耳

許叔微治一男子年二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中拂意則轉充虛重鳴疼痛地黃湯生地枳壳羌活桑白皮磁甘州防风黃芩加木通石為粗末每服四錢水煎日二三服綱目

朱丹溪治馮官人左耳鳴此勞得之法當補陰而鎮墜之黃芪人參當歸陳皮茯苓升麻酒相防风甘州白芍食前熱服飲了去眠一竟全上其方則似補氣而非平之非補陰鎮墜也

薛立齋治一入耳內不時作痛時欲死痛止如故六



脉皆安非瘡也話間忽作度其有虫令急取猫尿滴

耳果出一臭虫遂不復痛或用麻油滴之則虫死難

出或用炒芝麻枕之虫亦出但不及猫尿之速也猫取

尿法用生姜擦
猫尿其尿自出

趙養葵治一小兒患耳膿医以葯治之經年累月无効

殊不知此腎疳也用六味丸加桑螵蛸服之而愈或入

小兒
加門

吳孝先治張司馬素有火症兩耳腫痛係少陽風熱勸

延針科刺聽会谷臨泣而安

柴岫青治汪謹堂夫人兩耳蟬鳴昕夕不歇服過人參

熟地數兩无少効柴白腎開竅于耳心亦寄竅于耳

治耳必責之腎固矣但診得兩尺尚屬有神決非腎

虛左寸亦平緩无疴惟右寸關洪大此肺胃兩部風

熱所過而致遂不治病而治脉用清解之劑不數服

而右耳已痊再服數劑兩耳全愈因思耳目口鼻虽

于五臟各有分屬而由竅相通治病惟以切脉為憑

夫固有治在此而効在彼者全在一心之員机活法

也

李九溥尚書在河陽日蜃蚶入耳无計可為腦間有声

至以頭擊門柱奏狀危困因御医治之不驗忽有人

獻方用胡麻油作餅枕之自出而安

蜀經 卒
綱目

江湖紀聞云有人臂氣入耳頭痛不可忍百藥不効用
桐桿灰煎汁灌入即死而出也又萬苜搗汁滴入亦

出百虫也 卒 綱目

薛立斋治一婦人耳內或耳后項側作痛寒熱口苦月
水不調此肝胆經火煎傷脾胃用四君加柴胡升麻
黃芪白芍而痊後因勞役怒氣嘔吐脇脹用六君子
加柴扈而安

一婦人耳內外腫痛胸脇不舒寒熱往來小便不利此
肝火傷血先用危胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加

味道遙而安

一婦人經行後因勞怒發寒熱耳作痛以經行為血虛
用八珍湯加柴胡怒氣及肝火用加味道遙散勞後
為氣傷用補中益氣加山扈而安

一婦人素鬱怒耳內作痛腫焮寒熱面色青黃經行則
變赤用加味歸脾味道遙而愈

一婦人懷抱素鬱因怒耳作腫痛經行不止寒熱發熱
面色青赤肝脉弦數此人鬱傷脾暴怒傷肝先用加
味小柴胡隨用加味道遙而痊

一婦人因怒發熱每經行兩耳出膿兩太陽作疼胸脇

乳房脹痛或寒熱往來或小便頻數或小腹脹悶皆屬肝火血虛先用梔子清肝散一劑又用加味道遙散諸症悉退乃以補中益氣而痊

一婦人耳內腫痛出水寒熱口苦牽連頸項飲食少思此肝火甚也用小柴胡湯加山梔丹及少安用加味道遙散漸安用八珍湯加柴胡升皮山梔調補肝脾全安

一婦人耳內腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝經濕熱也用龍胆瀉肝湯四劑諸症悉退用加味道遙散而安又因怒復作用柴胡清肝散而痊

一婦人耳內不時脹痛內熱口乾勞則頭眩吐痰下帶此肝脾氣虛也朝用補中益氣夕用加味道遙散而痊

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味道遙散調補肝脾而愈

一婦人耳內外或作痛或赤腫或寒熱月經旬日而止潮熱內熱自汗盜汗此肝脾氣血俱虛而有熱用歸脾湯六味凡而愈

一婦人性急或耳內作痛或耳外赤腫發熱脇脹目瞤
益盛此怒氣傷肝氣血俱虛朝用加味道遙散加黃
柏桔梗夕用歸脾湯送地黃丸愈

一寡婦耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月水不調
吐痰少食胸膈不利此鬱怒傷肝朝用歸脾湯以解
脾鬱生脾氣夕用加味道遙散以清肝火生肝血而
愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月水不調小腹內結一塊
此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加枳芍丹皮
又用清肝散而痊

一婦人耳下腫痛發寒熱與荆芥防敗毒散四劑表症
悉退以散腫潰堅湯數劑消大半再以神効瓜蒌散
而平

一男子肝經風熱耳下腫痛發熱脈浮數以薄荷丹治
之而愈

一男子每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮木
香紅花桃仁而愈

一婦人耳鳴內熱經行不調肢倦怠飲食无味以為
肝脾虛熱用四君加柴枳耳艸而安

一男子耳內出膿或痛或痒服聰耳益氣湯不應服防

風通聖散尤甚以補腎丸治愈

自臭

張子和治常仲明嘗于炎暑時風吹時披露肌膚為風

所賊三日臭室虽坐于暖處少通終不大解使服通

聖散入生姜葱根豆豉同煎三兩服大發汗臭立通

矣此由傷風而得
宜入陽風門

有人患鼻中有瘕肉垂出鼻外不聞香臭用瓜蒂細辛

等分為細末以綿包如豆大塞鼻中須臾鼻即通瘕

肉化為黃水点滴至尽三四日愈又聖惠方用陳瓜

蒂以羊脂和傅上日三次效臣字經目

薛立齋治一男子面白鼻流清涕不聞香臭三年矣

此肺

氣靈也 用補中益氣加冬卮而安

陳都憲夫人患鼻疳爛通鼻孔用鹿角一兩白凡一兩
瓦上煨過入頭髮五錢灯火上燒過為末用花椒湯
洗淨糝藥疳上三四次即痊如不収口瓦松燒灰存
性研末乾糝

一八酒黷鼻紅赤用全花凡

服

苓連知柏大黃桔梗
白芎骨并水為丸

用六味地黃丸全料加當歸一兩苦參四兩空心下
一月愈

孫文垣治吳儀制尚卿弱冠時病鼻塞不能歛者四年
且血寒月更甚口渴咽喉邊有痰核脉之右寸關洪

滑此肺經痰火症也與前胡秦艽葛根薄荷石羔天
花粉元參貝母山卮甘州白芍子桔梗丹皮四帖而
血止夜與半黃三清丸數粒噙之鼻氣即通利能嗅
旬日全愈

一婦人方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流清涕不止
便竟頭眩兩太陽常痛且多噴嚏脉之兩寸洪大用
秦艽酒芩桑白皮馬兜鈴白芍滑石、蒸蔓荊子甘
州各等分四劑全愈

病鼻赤者乃陽明胃經火上焚一方只食鹽一味研細
每晨起撮少許擦齒噙水蕩嗽旋吐掌中掬以洗面

行之月餘而鼻如舊

吳季先治一人患鼻淵十年乃脾肺氣虛下陷須用補中益氣湯百劑方愈不信用白芷防風羊支川芎等味病尤甚後求治与前方百帖而痊

丹溪治一中年人右鼻管流濁且鼻脉弦小石寸滑左寸瀆灸上星三里 谷穴以酒芩二兩蒼木半夏冬一兩辛夷川芎白芷石羔人參葛根各半兩分七帖服痊 大述

一人鼻中流臭黃紅腦亦痛名控腦沙有香食腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服即愈

又灸法顯公

在鼻心其上一髮除一寸再容豆是穴

通天

在顯公上一寸兩旁各一

寸灸七壯隨臭左右去臭肉一塊從鼻中出而病愈

有人卒食物從鼻中縮入腦中介之痛不得出以牛脂或羊脂如指頭太內鼻中以鼻吸入須臾脂消物逐脂出也 治法彙

孫文坦治從姓中叔以暑月赴南雍一日微出索茶飲之趣後互鼻逆流而出入腹者十之且勺凡一日即粥飯亦多鼻出矣再為更加惡心豆暈肌削四肢無力診畢詢醫作何症投何劑曰食謂此症書所不載

治法无稽或云胃火或云諸逆上冲皆属于火所用
非黃連解毒即三黃石羔及諸苦寒之劑自以多飲
火酒曰動理或為然：竟无効曰治病貴辨經絡之
貫通与藏府之出納豈拘：後守方書而已哉經云
咽喉者水穀之道路氣之所以上下者也頭顙者分
氣之所洩也人之涕出不收者頭顙不開也此症亦
類是耳頭顙不開故氣上而不下会厭弱而不能擗
其氣喉夫鼻与氣喉相通惟不 故飲食逆從鼻中
而出不見尝人偶氣逆則飲食逆噎中出乎今石脉
緩弱无力氣虛明矣經云形寒飢冷則傷肺脾胃喜

温而惡寒因多服寒涼所以惡心頭眩肌削也盖肺
屬金而主氣金氣旺則收斂下降氣下降則飲食自
不逆矣以六君子湯加辛夷桑白皮苳仁沈香一進
而勢減三進而止大半七劑全安

肺飲一
劑可痊

是病盖因暑熱傷
氣而成其初不生

王執中母氏久病鼻乾有冷氣問之 医者 医者亦不曉
但云病去自愈既而病去亦不愈忽後因入絕骨而
少痊執中亦嘗患此偶絕骨微痛而著文鼻乾赤失
去初不知是灸絕骨之力後聞千金方有此症始悟
鼻乾之去因絕骨也若涕多宜灸息会前項大人小

兒同

許知可自停飲食已必嘔服藥無效而愈本方
孫氏姑息不聞香臭有年矣後因他病友人繆仲淳為
靈方每服用桑皮至七八錢服久而鼻塞忽然通矣
未幾入

鼻淵

沈晉階年二十許患鼻淵黃濁加膿時醫以為以烘上
淫乎腦与薄荷辛藥此等香茸有正蔓荆子方治之
不効人加五逆頭痛下涕亦唯五鼻多就診曰此
肝火上炎為病耳与生熟地杞子沙參麥冬十餘劑
而愈是后由賜以用力去涕而得者易愈若因火熾
而成必由水虧而致蓋肝脉上給顛頂与督脉会腦
為通海為无火謂其故濃虫膿穢源之而下自若淵
然久之督脉之髓亦隨輪世致成勞損者有之在李
自立為以前穿元明初諸公未詳肝腎之治法全

國朝諸老亦漸講明然多裡底不柱耐惟集零羔一
方最善治法章載之但云吳中一匠用之所向神効
是亦知其然而未知其所以然也故守免園一冊者
其衆鍊多矣

一醫者徐姓年三十患真痢年餘醫亦以辛散服之竟
反甚遂堅守不葯之戒此醫人心靜自能消息病情
故不為庸手所誤後為子教服集零羔十餘帖而安
一曹氏子年二十嘗亦患此時師與年歲嘗耳等症
荆薄之屬二百二十劑後就診于余而手脈神氣索
然不可治矣遂卒

口唇齒舌喉瘖脫斷

續名醫類案

卷二十三



續名醫類案卷二十三

錢唐魏之瑋玉橫輯 男斌編次

口

張子和治相臺藍酒岳成之病瘡滑泄日夜不止腸鳴
而口瘡俗呼為心勞口瘡三年不愈令以長流水同
姜朮煎五苓散五七錢空心服以治其下以宣黃
連与白茯苓去皮二味各等分為末以白麩糊為
丸食後溫水下三五丸而痊 作濕火治

一男子病口瘡數年上至口中全咽噎下至胃脘皆疼
不敢食熱物一涌一泄一汗去其凡次服黃連解毒湯

而安作寔火治

一男子年二十外病口中氣出臭如發廁雖親戚莫肯
与对語張曰肺金本主腥為金為火所煉火主焦臭
故如是也久則成腐者腎也此極熱則反煎水化
也病在上宜涌之先以茶調散涌之去其七分夜用
舟車丸濟川散下五七行比旦而臭止嗚呼人有病
口臭而終其老者世說以肺系偏而与胃相通故臭
妄論也

立齋治廷許田汝為口尚如瓦皮狀或咽喉作痛喜熱
飲食此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而安

靈寒

一人胃弱痰鹹口舌生瘡被服滾痰丸尤甚反瀉不止
惡食倦怠此胃氣被傷也与香砂六君子湯數劑少
可以補中益氣加苓半而安

立齋治一男子口臭牙根赤爛腿膝痿軟或用黃柏等
尤甚或口鹹此腎虛也以六味丸愈 靈熱

孫文垣治汪東之手設過勞口中生瘡凡進大苦大寒
之劑十餘口瘡更甚延及于喉葯食難進脉之六部
俱豁大无力有齒科欲剪口疳葯令以荆芥湯洗而
引之梳出稠涎一二升傾于地下二鷄爭食之立死

其毒如此當是別芥為亦症之奇者乃囑其用藥只

可吹入喉中必俟喉全好然後專舌之好再專口唇

毋得概專令毒无出路反攻入喉則誤事矣謂其父

曰此陰虛口瘡也非附子理中湯不可球曰瘡乃熱

症况上自已熱入天時酷熱大熱之劑其敢進乎曰

此陰盛格陽之症悞服寒涼漱之試探兩足必冷按

之果然遂與人參白朮各三錢大附子炮姜炙甘州

各一錢小煎冷服之後即酣睡遂安次早能食粥半

盞足膝已暖藥仍如前遠散步午歸見章家号泣曰

本熱病誤服熱藥今舌腫大塞滿口中不能言語不

可為矣駭其驟變再診之則六脉歛而有神面色亦

和舌已消脹大心知為寒涼專藥兩致也乃語之曰今

日可用專藥否曰已二次矣令急取官桂研末五錢

以生姜自然汁調搽舌上搽訖則涕淚流出口内涎

垂舌已消去即令取粥与食使壅之庶虛火不再引

蓋舌脹大者乃專藥寒涼閉其毒氣王母无從出故耳

桂姜辛散之物也

黃師文父病口創師文治之不痊心訝之乃密訪諸婢

果其父嘗日同一婢子寐明日創作師文即詳其時

節明日即用其父所寢時令其父淨濯足以其藥貼

脚心痊

不外吳萸生附子
之為北意火燥

盧不遠治李某口舌生瘡凡三年矣脈浮細急數按之
空虛而尺尤甚用立齋虛火不歸經法以加減八味
丸料而安

柴岫青治吳頴庵少廷尉甥閔年三十口舌生瘡下部
泄瀉脈尺弱而無力寸豁大此陰盛于下逼陽于
上若用涼藥清火則有碍于脾用燥藥治脾則有碍
于舌惟有引火歸源之法竟用附子理中湯冷飲送
八味丸三錢而愈

光祿御李瀛少夫人患口瘡醫屢投清火寒涼之劑元
効更兼泄瀉飲食少思始求治按其右關微弱知係
胃虛穀少浸為寒涼損傷致脾胃虛衰之火被遏上
炎則為口瘡元氣虛寒則為泄瀉也惟補其火散其
寒則火得而助接引而退舍矣方用人參白朮附子
炮姜炙甘草李君畏不敢與服迨數日勢益困勉
用前方連進數劑即安蓋口瘡非止一端有上焦實
熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變而致必須分別治
之不可熱也

陸養愚治姚明水天稟素弱脾胃兩虛幸能節養兼服
溫補之劑中年頗健咬因元子置妾遂患口舌齒痛

初以涼膈散數錢服之即安自后常服常服至半年
許口中腐爛飲食不進脈之兩寸浮數而微閉尺沈
弱而澀曰形雖有餘精仍不足當嚴守禁忌服滋補
藥涼劑不可再投矣用八物湯倍地黃以峻補腎水
加桂附各一分引火歸源經謂折之不去求其屬以
衰之是也煎就涼服十劑全愈

薛立齋治儒者劉允功形尠魁偉冬日飲水自喜壯寔
薛曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑
反甚乃與六味地黃而安

王肯堂治常熟嚴蒼翁相公春秋高而求助于厚味補

藥以斂胃火久而益熾服清胃散不効加山梔苓連
而尤甚以為涼之非也疑其當補聞至善用八參因
延診而決之才及門則口中穢氣達于四室向之欲
噦此正清胃散症也獨熱甚當用從治而既失之今
且欲從而不可矣當求其傷而衰之用天冬麥冬生
地熟地石斛升麻犀角 香之類大劑投之數日
而臭已止經云諸病寒之而熱者取之陰所謂求
其屬也火衰于戊故峻補其陰而熱自己後因不屏
肉食胃火復作大便不利目翳耳鳴不能自忍裸進
寒涼時或利之遂致不起嗟乎苟知其熱涼之而已

則塗人皆虛扁何用医子 醫問筆談

邑侯許少微患口糜玉謂非乳姜不能治許疑之後
竟從王言而痊後子懋銘亦患此甚危急熱甚惟飲
飲冷水玉用人參白朮乾姜各二錢茯苓甘草一錢
煎冷服病已

口瘡無論新旧遇夜卧將時自己兩掌凡以手握紫左
右以手揉之三五十遍每夜睡之見也行之愈于服藥

蘇設

立齋治一男子口舌生瘡服涼藥更甚治以理中湯而
愈 又一男子口舌生瘡飲食不甘勞而尤甚亦与

前湯而痊

一男子口舌糜爛服涼藥尤甚脉數无力以四物加酒
炒知柏元參而痊

一男子口舌生瘡脉浮而緩服補中益氣湯加泡姜更
以桂朮含之而痊 一男子患之勞而尤甚以前藥
加附子三片二劑即安丹溪云口瘡服涼藥不効者
此中焦氣不足虛火泛上无制用理中湯甚則加附
子

一婦人常口舌潰爛頰赤唇乾眼滿作渴脉數按之則
清此心肺壅熱傷于氣血為患名曰勞瘵也當多服

滋陰養血藥彼欲速効用敗毒寒劑攻之後患瘵疰而發媼人良方云媼人熱勞者由心肺壅阻傷于氣血氣血不調藏府壅滯熱毒內積不得宣通之所致也其候心神煩燥煩赤頭疼眼清唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思沈昏嗜卧少寐飲食无味牽脊疼痠或時心怔或時盜汗肌內日消瘦故名曰熱勞也

焦秀才病口苦羅謙夫製龍胆瀉肝湯治之得効內經云有病口苦名曰胆痺乃肝主謀慮胆主決斷胆汁三分為清淨之府肝取決于胆或不決為之患怒

怒則氣逆胆汁上溢故也 寶鑑

羅謙甫治梁濟民羔梁多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥臭涕唾稠黏咽嗑不利口舌乾燥以加減瀉白散主之雜經云心主五臭入肺為腥臭此其一也因火飲大熱之氣所傷使心火刑于肺金以桑皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣為君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣為臣肺欲收急食酸以收之五味子酸溫以收肺氣麥冬甘寒治涕唾稠黏口苦乾燥為佐桔梗辛溫俚輕浮治痰逆利咽膈為使服數劑愈

唇

李太富而極都容唇生肉長頰一尺長痛不可忍或云用
刀或云用藥隣有金生光者曰我能治頰言定謝金
方匠家親友講以十兩為謝金用求藥一匕炉中燒
烟熏之即落去一寸袖手索謝李先付一兩五日已
好及請完前藥乃堅不與矣金哭曰逆知其然也明
年必發即百金不用藥後果發遂死焉

一 續金

一 按瑣事

晉魏詠之生而兒缺有善相者謂之曰卿當富貴年十
八聞荊州刺史殷仲堪帳下有名醫能治之貧乏行

裝謂家人曰殘醜如此用治何為遂賣數斛米西上以投仲堪既至造門自通仲堪與語嘉其誠意召醫視之醫曰可割而補之但須百日進粥不得笑語詠之曰半生不語而有半生亦當後之况百日耶仲堪于是處之別室令醫善治之遂閉口不語惟食薄粥百日而痊

薛立齋治一婦人怀抱久鬱患齮唇襍治消痰降火虛症悉具盜汗如雨此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃芩連柏俱炒黑二劑而盜汗頓止仍用歸脾湯八珍散兼服元氣少復更以逍遙散加歸脾湯間

服百餘劑而痊

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血水益加他症此胃火傷血而藥傷元氣也用加味清胃散而愈後用怒唇口腫脹寒熱作嘔吐屬肝木乘脾土用小柴胡加山梔茯苓桔梗諸症頓愈復以加味逍遙散而安

一婦人生育多胎月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則是腿痠疼入年餘唇上裂痛入半年唇裂出血形侷消瘦飲食无味月水不通唇下腫如黑棗此肝脾血虛火症也被不信用通經藥而致

一婦人忿怒而唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘矣此肝火尅脾土而血傷也須養脾胃滋化源為主彼批用前藥致腫爛而歿

一婦人懷抱不舒或時胃口嘈辣胸膈不利月水不調哺熱食少侷倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火傷血用歸脾湯加姜汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食少進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又用加味道遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇腫愈

州守刘克新患齒唇時出血水內坩口乳吐痰侷瘦腎

虛之症悉其用濟陰地黃丸一年愈

一儒者因勞役感暑唇生瘡或用回物湯加知柏之類而愈後復作彼仍用前藥益甚腹中陰冷乃用補中益氣加苓半治愈

一男子素善怒唇腫脹服清胃等藥時出血水形侷骨立用補中益氣湯加半夏茯苓桔梗月餘唇腫漸消元氣漸復人以回物加柴梔丹艸數劑去梔加參朮而痊

一男子內熱作渴咳嗽痰涎大便乾澀自喜壯寔此脾腎陰虛陽旺之症當壯水之主不信自服二陳苓連

之類次年下唇漸腫小便赤澆坻守前葯唇出血水
大便黑塊小便淋漓再求治曰大便結黑小便淋漓
肝腎敗也唇口腫白脾氣敗也辭不治歿

齒

元亨在大聖中結道友登嶽頂至明星館故址得斷碑
數行彷彿古文因洗滌之得歌一首曰猪牙阜角及
生姜西用升麻蜀地黃木律旱蓮槐角子細辛荷叶
要相當青藍等分同燒燬研細將來使最良借齒固
牙髭髮黑誰知世上有仙方荷叶下注云剪荷叶心
子也因錄以歸朝之名卿巨公皆依之修用其効响
應 皇朝新苑

朱端章云

續醫說編作
玉是齋云

余被檄任淮西幕府時牙疼大
作一刀鑷人以卍葯一搥湯泡少時以手蘸湯挹痛

靈即定因求其方用之治人多効乃皺而地松州也
俗人訛為地葱沈存中筆談出地松其子名鶴虱
正此物也錢李誠方用鶴虱一枚擢置齒中高藍方
以鶴虱煎米醋漱口或用防風鶴虱煎水含漱及研
艸塞痛靈皆有効 本草綱目

周密名雅堂襟抄治齒痛腫云用黑豆以酒煮汁漱之
立愈

仙人鄭思遠常騎虎故人許隱齒痛求治鄭曰虎鬚及
虎揮齒間即止拔荃与之

澤州李繼之忽病牙痛皺眉不語葉景先見之曰何不

藥也曰牙痛藥曰曾託戴人云陽明經挾有餘也宜
大下之乃付舟車凡七十粒服畢遇數知交留飲強
飲酒數杯藥為挾酒所發盡吐之吐畢而痛止李
大笑曰戴人神仙也不三五日又疼再服前藥百餘
粒大下而愈 儒門事說

姚應鳳視一人唇有紅痣无他病苦謂之曰此齒蓋也
三年必死其人怒不應三年齒潰請求救謝曰君天
譴也不能為矣果歿 錢唐縣志

龔子才治一人齒浮作痛耳面黑色口乾作渴日晡尤
甚此脾虛弱也用補中益氣八味丸而安

一男子每足發熱牙即浮腫此是三陰虛火用加減八味丸而止

李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙也諸醫不効忽遇道人傳一方用川椒炒一錢五分銅青一錢硼砂一錢三味為末每少許擦患處流涎立痊

易思蘭治一人患齒病每有房勞齒即俱長痛不可忍涼湯凉水俱不得入凡有惱怒痛亦如之十年前尚輕十年後殊甚每發必三五日呻吟極楚竟絕欲服補腎丸清胃飲俱不効一日疾作七日不能飲食診其

脈上二部俱浮木休惟二尺洪數有力此腎經火邪火盛也以滋腎飲餌之且漱且咽下二杯隨竟丹田熱氣升上自咽而出復進二盞其痛稍止齒即可而永不再作其方黃柏三錢青鹽一錢升麻一錢水五椀煎湯含漱

呂東莊治許開雍病齒上銀後耳根痛起便苦之不百耐醫用平胃降火藥日加甚診之閉滯而尺衰授方以熟地為君杜仲枸杞女貞甘州黃柏山藥山萸為佐其尊人青臣奉以問醫曰此方何如醫云大謬不可服問其謬狀曰齒病為陽明之火与腎何干而俱

用補腎藥師青臣曰果尔則吾知此方之妙矣乃更連往視呂曰病見于上而治當從下起此有步驟不可責速効也仍用前藥數劑繼用人參白朮茯苓甘草白芍東仁遠志當歸黃芪丹皮數劑痛已減而未去也診其兩尺已應右關以上皆平和惟左關尚鬱塞曰今當為君立除之遂用補中益氣湯加龍胆艸即愈後小發復加減前方愈因囑之曰此虽小疾而其根下當慎調攝也

孫文垣治昆池內人患牙痛一脫暈厥三次二日兩頰紅腫痛不可支且洒淅惡寒寢食俱亡与清胃湯加

石羔為君白芷為臣連翹為佐北細辛為使服之痛如失外以明凡為末大五倍子一枚入凡滿之炭火炙以凡紅粘為末擦之

孫護齋因食鷄嚼骨逆碎其齒出血至暈自後遇鷄鳴時輒痛不可忍餘時則否凡燕會遇鷄湯羹則痛發即不染指疼亦然如是數年其家禁不畜鷄親田欲招之者必先戒庖人弗用也後有人教食黃鼠狼家人乃設法捕得一頭烹而進之孫以其物異心惡之強飲湯數呷自後啜鷄了無所苦

新案

文潞公方治牙齒風坩工攻腫痛独活地黃各一為末

每服二錢水一碗煎服卧時再服 李時
薛立斋治毛宗伯已病胃脉无力用補中益氣加生地
丹皮治痊

楊考功齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾甚用補中益氣
加炒黑黃柏同煎又加減八味而痊

王待御齒搖齦露喜冷飲食此胃經濕熱先用承氣湯
以逐其火又用清胃散以調理而齒固繼用六味丸
以補腎而痊

一男子晡熱內熱牙痛齦潰常取小虫此是三陰虛火
足陽明經濕熱先用梔仁承氣湯二劑又用六味丸而

愈

茯苓石羔龍骨各一兩寒水石二兩半白芷半兩石羔
子大者一枚小者一雙末之早晚揩牙齦時王文漢
卿得此方于麟撫折守折守得于因初洛陽帥李成
折年逾九十牙齒都不疎豁亦无虱虫王公今亦几
十食肉尚能齒決信神方也 續或堅志

薛立斋治一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥尤
甚此肝火傷胃寒藥復傷故也用六君加白芍柴扈
而安

一婦人發熱齒痛日晡尤甚月水不調此脾經血虛用

道遙散加升麻而愈後因怒復痛仍以前藥加川芎而止

一婦人胃中嘈辣 熱痛後患齒疼此胃中疫火也
用二陳加芩連下越鞠丸而痊

一婦人因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芎歸苓朮山梔痛止再以加味道遙而安

一婦人每產後齒齦皆動一日乃止此氣血虛而火動也後復懷妊臨月与十全大補湯二劑令產後煎服其齒不動如故

廷尉張中梁齒動採用安腎丸考功楊仲玉齒動用補

中益氣湯侍御王齊川齒搖齦露用承氣湯文選鄭伯与齒腦痛用羌活附子湯顏愈憲齒痛用涼膈散
郭職方過飲用清胃飲黨吏部風熱用犀角升麻湯
朱二部血氣虛用十全大補湯沈大戶頭腦齒痛頭重手足厥冷用麻黃八細辛並痊

一男子齒痛脉數寔而便秘用防風通聖散而安

一男子齒痛胃脉數而有力以清胃散加石羔荆防二劑而痊

一男子齒痛胃脉數寔以承氣即止

一男子齒痛脉浮无力以補中益氣加黃連生地石羔

治之不復作

一老人齒疼午後即發至晚尤甚胃脉數而寔以涼膈散加荆防石羔而痊

王教授云有老嫗人旧患牙疼人教將兩手掌交文以中指頭尽處為穴灸七壯永不疼恐是外關穴也穴在手少陽去腕後二寸陷中泉州 稍子妻旧亦苦牙疼人為灸手外踝穴近前些遂永不疼但不知千金所謂足外踝即手外踝即識者辨之 百乙方

師自患傷寒方痊食青梅既而牙疼甚有道人為之灸屈手大指本節後陷中灸三壯初灸竟病牙痒毒

矣尋牙有聲三壯疼止今二十年矣恐陽谿穴也銅人云此穴治齒痛手陽明脉入齒縫中左疼灸右右疼灸左効全上

昔有為樂清主簿者蛀牙疼不可忍號呼之声徹于四隣用為不効有丐者獻一方用之即安漢椒為細末及巴豆一粒同研成羔飯為丸如菜豆大以綿裹安在蛀牙孔處立効全上

馬叔說一村媪苦牙痛百藥不効用丝瓜兒俗呼為磨羅炒存性為末擦之効全上

香白芷

本平州道地者不拘多少

硃砂

十分白芷並另研

右為細末入硃砂

拌勻煉蜜如櫻桃大每用一丸擦痛立止盧州郭醫
傳云渠親曾累取效盡勝他藥此藥乃濠梁一村媪
人以醫治帥母夫人者倉卒不用硃砂及蜜亦可其
功只在香芷耳趙從簡判所用亦白芷細辛二味
亦效

李莫安撫安子退齒踰年不生甚以為燒回過平江公

李華卿語之李云予有一方已經試驗用之一月齒

遂生用雌烏鴉雄烏鴉矢

以二鳥合
畜之狀

舊鞋底

麻底者
尤佳

右三物等分燒灰存性細入射香少許同研粿于齒

銀全上

立齋治黨吏部類顯腫燉至于銀石閉脉數此胃經成

熱上攻也以犀角升麻湯治愈

郭職方齒疼燉至類素善飲以清胃散止

一男子齒痛服清胃散不效以涼膈散少安用補腎丸

治愈

求天培治一婦年五旬患齒痛連腦兩頰赤腫惡寒發

熱脉細而澁此肝脾鬱熱為患治以逍遙散加熟地

石羔荆穗杞子而腫消再剖全安

脫齧

羅大元治一人伸欠頰車蹉但聞不能合以酒飲之令

大醉睡中以皂角末搗其口與噴透即自正矣

醫說綱目或

是燥元作

龔子才治一人因怒氣大叫下頰脫落任撮不上眾莫

措手令以烏梅搥餅塞于兩頰至牙尽頰控処張口

流涎須臾隨手撮上

張三錫治一婦常錯下頰古謂脫金鈎兩手脉弱用八

珍湯加升柴遂愈先用手法掣上正骨科當知

舌

張子和治隣人朱翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫之至滿口以先舌大二倍一外科以燔針刺其舌兩旁下魚泉穴病勢更凶轉至顛岷下疑灸與後張曰血寔者宜決之以排針磨令鋒極尖較砭之日砭八九次血出約一二椀如此者三次漸而血出痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈人口諸痛痒瘡疹皆屬心火燔針艾火是何義也

元順帝之長公主之駙馬劉哈刺哨慶王因墜馬得一

奇疾兩眼黑睛俱死而舌出至胸諸醫罔知不措廣
惠司御攝只兒乃也黑可溫人也常試此症遂剪去
之頃間復生一舌亦剪之人于真舌兩邊各去一指
許搭藥而愈 輟叫錄

宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用前人軋姜
末等分軋搽而愈蓋舌乃心之外候而平厥陰相火
乃心之臣使蒲黃活血涼血湯軋姜是陰陽相濟也

芝隱方 不叫經目

仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用
鴉子白皮袋之搽止血藥于舌根以蠟化蜜調沖如

羔粵鴉子皮上三日按住乃去皮只用火蠟勒粵也
日全安如死速効以金創藥參治之用鴉子白皮但
取其柔而透藥也 不叫編目

凌漢章治一男子病後舌吐凌元亦知醫謂曰此病後
近女色太早也舌者心之苗腎水竭不能制心木病
右陰虛其火右左 太陽是當以陽攻陰凌曰能加
其火針之舌吐如故凌曰此知瀉而不知神也補數
割舌乃復 明火

何百庸治前鋒賴將軍舌本腫出不能縮何曰心氣壅
熱也久則飲食不下死矣灸良器灼之腫消再授以

湯剖立愈 雲南通志

龔子才治一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本散舌下其熱當責之心脾二經：所謂熱勝則腫也用草麻子去壳紙包搗出油透紙作燃燒烟吞之服清心脾之藥而痊

一人舌青黑有刺乃批及也欲以舌貼土壁上少可良由思慮太過怒氣所得為製一方名清心散服之即効用茯苓仁麥冬胡麻仁黃連各一錢遠志五分木通連翹各八分甘艸三分煎服

一羔梁之人患舌腫專服皆消腫之藥舌腫甚急与刺

舌尖及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯二劑蓋早復腫脹仍刺出紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大腫入刺出黑血一杯許腫消忽寒熱作嘔頭痛作暈脈浮洪而數此邪虽去而真氣愈傷也与補中益氣倍參芪歸朮四劑而安又數劑而愈

鄭秋官過飲舌本強腫語言不清此脾虛濕熱用補中益氣加神西麥芽乾葛澤瀉而愈

柴崎青治滿少司農 名兆惠內閣侍讀時同在軍机處值宿患重舌腫痛問曰曾服通聖散瀉火而病不去

何也答曰火有諸經豈可混治誅伐无過幸汝少年未至大害診其右關洪寔胃火時甚用清胃散一劑全愈

薛立齋治一婦人善怒舌痛煩熱或用降火化痰藥前症益甚兩脇作脹又服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能攝血而前藥復傷也用加味歸脾加五味而痊

李士吳北川過飲痰甚舌本強硬服降火化痰藥尤甚肢倦不遂作脾虛濕熱治安

二守韓宗器不慎起居舌脹如菌痰涌便秘服芩連二陳之類脉浮而數欲針出血薛謂此是三陰虧損之症且有形而不痛者陰之類也法當峻補其陰毋損其血况虛浮之脉乎遂朝補脾肺夕滋腎肝而痊後因大勞而目俱赤遍身瘙癢時已仲冬大寒不寒是無水也用壯水之劑而痊

楊誠金允文舌脹吐痰反服降火化痰針刺出血便秘痰甚診之五尺關洪數右寸關弦數用滋腎水生肝血益脾胃之劑諸症少安因近火因而赤身痒六脉弦數薛謂此水竭火升之象難免于春二月矣于次年清明日卒

大尹王汝隣兩足發熱吐痰加痛左尺數而无力此足
三陰虛彼反服四物二陳知柏之類候舌作痛又服
清熱消毒之劑其舌加赤按脈洪數而无力此脾肺
後傷腎經虧甚虛火上炎水泛而為痰也當滋化源
以生腎水遂用補中益氣六味地黃而愈

李莫安撫內子夜半忽不能言燭之乃舌下生一舌急
于外台檢得一方用新真蒲黃羅細末剪之如此五
七次愈

有人自行被癩穿斷舌出血不止以米醋用鴨翎刷
所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮 硼砂少許

研細末蜜調稀稠噙化而安 得効方

馮芝瞻治李工部一日忽發熱牙床腫爛舌起大泡白
胎甚厚痛不可忍或用清解之藥口舌腫腐尤甚數
夜不寐精神恍惚狼狽不堪其脈兩關尺甚微惟兩
寸稍洪耳曰龍雷之火亦能焚焦艸木豈心寔熱方
使口舌生瘡乎蓋脾元中氣衰弱不能揆細下焦陰
火得以上乘奔潰腫爛若一清胃中氣愈衰陰火更
熾急為溫中下二焦使火有所接引而退舍矣乃用
白朮八錢炮姜三錢溫中為君炒麥冬三錢清上為
臣牛膝三錢五味一錢下降斂納為佐附子一錢五

分直煖丹田為使如是數劑精神乃復腫者消而潰者愈矣 未選入

一人死故舌縮不能言用芥菜子研末醋調專頸項下即能言服清脾降火等湯再用紫雪冰片散吹之而安

錢國賓治板橋李氏僕刘二与租房之嬪私年餘不収其租一日主人笑脹元抵刘二坐逼嬪恨戲將刘舌咬下二寸延視舌根腫滿湯水不下製金瘡藥用敗龜板燒銀帶黑色一兩血竭一錢冰片三分共末糝上血痛俱止腫尚未消其人昏不醒夢聞帝示以

半紅半白鴿豆大約一粒用元根水吞汝即生矣驚竟難言乞筆書出衆人方知自是其腫漸消可灌飲湯至于稀粥其舌長完比前短小日服參芪歸朮湯愈

蔣仲芳治一同李年二十餘患顯腫醫以清涼散火之劑不效一夜舌忽腫塞口命在須臾叩門求救診其脈微細而數大便四五日不行矣微數屬虛火而便結久已屬實乃用百叶霜吹舌上再用酒蒸大黃五錢內桂一錢引及下行而安

喉

李王宮主患喉癰數日腫痛飲食不下 名到醫官言

須針刀開方得潰破公主聞用針刀哭不肯治痛甚

水穀不入忽有一州洋匠口其不便刀針只用筆頭

蘸藥癰上霎時便潰公主喜遂令治之方兩次上藥


遂潰出膿血一碗餘便寬兩日瘡无事今傳其方匠

云乃以針藏筆心中輕刺破乃潰散耳 名醫錄 此与藥

范九思法同凡喉症当用 針者此法最妙故首及之

元祐五年自春至秋蘄黃二郡人患急喉痺十死八九

速者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍羔方



球活數十人其方治九種喉痺用大皂角四十挺切水三升浸一夜煎至小升半入人參末半兩甘州末一兩煎至五升去渣入元灰酒一升釜煤二匕煎如錫入餅封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後噲甘州片 李州

孫兆治文潞公一日喉腫翰林咽喉科治之經三日更甚上名孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水沾筆管點為入喉便愈孫隨手便利 藏鋒于相公 昏仆不省人事左右皆駭愕流汗孫乃笑曰非我不能拯相公須更嘔出膿血升餘旬日乃卒復如故見

上之喜曰孫卒良醫甚有手段 此即前法也

孫仲班治都知潘元從喉閉孫以為半錢吹入喉中少頃吐出膿血立愈潘請孫謝曰大急之患非公不能拯之入之急非為不能治贈金百兩願求方以濟非常之急孫曰用猪牙皂角白凡黃連各等分置薪為上煨乳為末即授以方不受贈 萬病回春方見回案 竇才治一人患喉痺疫氣上攻咽喉壅塞天突穴四五寸壯即進粥姜附湯一刻愈

一人患喉痺頤頤粗腫湯藥不下四肢逆冷六脉沈細急灸關元穴二百壯四肢方暖六脉亦生但咽喉尚

腫仍令服黃葯子散痰出而愈

一人患喉腫六脉細為灸關元一百壯六脉漸生一醫曰此乃熱症復以火攻是抱薪撲火也遂進涼葯一劑六脉復沈咽中更腫醫計竭用尖刀于腫處刺之出血一升而愈但此症忌用涼葯痰見寒則凝故用刀出其肺血而腫亦消也

張子和治一婦人病咽喉腫塞水粥不下數日腫不退葯既難下針亦无功以當歸荆芥甘艸煎使熱漱之以冷水拔其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄下針葯

樓全善治一男喉痺于大溪

疑即大溪

穴刺出黑血半盞而

愈由是言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不愈次取痰取痰不愈次去汚血也

薛立齋治一婦人咽間作痛旬餘突腫如赤楊梅狀面月後始潰而不斂遍身筋骨亦痛諸葯不應此時行楊梅瘡也先以土草薛湯數而斂更以四物湯倍加土茯苓黃芪二十劑愈

薛立齋治莆田史侍御患喉閉以防風通聖散投之腫不能咽此症須針乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出

血口即開更以胆凡攻患處吐痰一二碗許仍投前

藥而安嘗見患此疾者畏針不刺多死此筆爾藏針之語為至妙

也少商穴在手大指肉側去爪甲角韭叶許

薛立齋治于縣尹喉閉腫痛寒熱脈洪數此少陰心火

少陽相火二經為病其症最惡惟刺出痰出血為上

因彼畏針先以涼膈散服之約從鼻出急乃願刺則

牙關已緊不可針遂刺少商二穴以手勒去黑血口

即開乃刺喉間治以前藥及金銷匙吹之頓退又以

人參敗毒散加芩連元參牛蒡四劑而卒經曰火鬱

發之謂發汗出血乃發汗之一端也

廷評張汝翰患喉痛日晡尤甚此氣血虛而有熱用八

珍湯而安後每入房發熱頭疼用補中益氣加麥冬

五味及六味凡而安

一儒者三陽畢忽喉中腫閉不省人事喘促痰涌汗出

如小肢作痿軟脈浮大而數此飲食勞役元根虛火

上爻用補中益氣加肉桂愈上感下虛者不可用

李通判咽喉腫痛口舌生瘡此上焦以熱先以劑防敗

毒人以元參升麻湯服痊

孫文坦治姪娘十年喉痛近來痰多暈厥一日二三發

頭痛面赤素未生育左脉弦大右寸關滑大有力以

荆芥薄荷甘州桔梗元參僵蚕柴胡枳壳竹茹貝母
水煎連進二帖其夜得卧惟背脹怔忡痰涎不清而
多熱用黃芩枳壳甘州桑白皮地骨皮天花粉元參
前危橋半而愈

張景岳治王蓬岷年出三十患喉痺十餘日頭面浮火
喉領粗極氣急聲啞咽腫口瘡痛楚甚一婢倚背坐
而不卧有累日矣察其脉則細數微弱之甚問其言
則聲微似不能振者所服皆芩連芩柏之類此蓋傷
陰而起復為寒涼所過致寒感于下格陽于上水飲
難入而尤甚畏煩熱乃曰危哉少遲半日必不救矣遂

與鎮陰煎以涼水預冷徐徐使咽之諸症全消再用
五福飲而起

人朱宅嬪年近三十因患虛損煎喉癰疼痛多醫不効
脉數而无力大便溏瀉所服皆寒涼清火之劑而喉
更痛知其本非實火多用寒涼致肚腹不寔亦陽陰
之類也以理陰煎及大補元煎出入加減半月而喉
痛減半年愈

景岳在燕都嘗見一女子年及笄于仲秋時无病而喉
中紫滯息難出入不半日紫滯更甚診其脉无火也
問其喉不腫不痛也面青目直不能言語其声之細

針息之窟如綫伸頸爭命不堪之狀甚可憐也

喉絕

非外感能以五臟合生脈投之尚可生也心疑之不得其解意謂風邪閉

塞喉竅非辛溫不能解散遂以二陳湯加生姜此下

俗工意用独參湯以球其肺然見其勢危若此

恐滋謗怨終亦未敢下手他醫見之亦束手而已

此輩安可做即竟一日夜而歿後又一人亦如此而沒若此二

人者至今不知其所以病此終身之疑竇殊自愧也

然意其必肺氣竭絕而然倘再值此恐非独參湯決

不能球筆之以俟君子

按丹溪云咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上

者脉必浮大重取必澁必死為逆宜人參一味濃

煎細飲之如作寔症治之禍如反掌現此則丹

溪之孝何可薄哉傳忠錄之言九原有知宜滋愧

矣

楊乘六治房氏子年近三十病咳嗽午後少安醫作傷

風連進芎藭干神等劑咽喉腫疼痰涎上涌更醫則

以為喉痺也極用芩連苦寒之劑尤甚喉益閉煎氣

喘如鋸不寐不食危症患其脉之輕按滿指兩尺更

竟有力其面游紅其舌焦黑其唇焦燥生皮其氣自

暗下冲上此腎水不足六味症也乃不吐水之王以

鎮陽先反用風燎以利其陰煽其火致痰涌咽閉復
用苦寒以傷之病加而危又何怪乎遂与都氣飲一
劑喘息定而熟睡醒則腫痛已止痰涎悉已飲食已
加再用六味合生脉歸脾加白芍間服月餘咳嗽亦
愈

吳氏媼兩目赤痛上連太陽下及肩胛襟用荊防辛芷
之屬赤障如膜目痛更盛口燥唇乾喉中如烟火上
冲窒塞不利重以苦寒之劑生冷之物遂至咽喉腫
閉點水不入勢危多幸脉之兩尺沈而軟兩手洪而旺
兩關細而緊舌見紫色上加微黃而胖診間聞一嫗

云昨日尚吃大柿數枚今水不能下咽縱有仙丹奈
喉嚨作癩何得此數語益悉其腫閉之故為想一進
藥之法即令老媼取磚一塊投火煨熟將夾布數層
烈氣海妙法噴之竟滿暖溫和試以米湯可咽矣乃
与附子養榮湯服後即睡至曉腫閉如失蓋此症本
由肝脾靈火上冲妄用發散火得風而愈熾重以苦
寒生冷致下焦益寒火不敢下歸壅逼于上而為腫
閉故与温補即愈

馮芝瞻治何太守咽喉口舌腐潰而不疼胸膈脹悶不
寐不食脉之左寸關弦洪搏指右寸關沉微欲脫乃

平時勞心惱怒以致內傷身熱醫候發散乃見紅點
認為麻疹更用疎解清化遂因倦尤甚頰肉腫硬疑
為瘧毒更用清涼解毒于是脹悶不堪疼痛欲絕蓋
勞傷發熱原係中氣不足誤發散而榮氣逆行乃為
斑點後誤清解致陰火上浮齒頰為腫入謂疹毒脾
胃愈虛元氣愈損于是咽噎腐潰成穴而不疼如物
失天日照臨陽為腐壞故名陰爛非若陰火沖擊為
腫為痛也以熟地一兩二錢炒白朮四錢麥冬二錢
五味八分製附子一錢五分二劑脹減睡安改用人
參三錢東仁二錢熟地四錢當歸二錢

冬各二錢五味六分肉桂八分姜枣煎二劑神清思
食咽喉知痛此陽和已轉如凍解而水活故知疼也
外用銅青二錢煨人中白二錢牛黃一錢冰片二分
射香一分研極細少許吹之涎痰涌出再吹再流自
愈

吳寧先治相子宜患咽喉齒痛脉沈細足冷大便泄瀉
此腎虛龍火飛越欲用金匱腎氣彼疑火症恐桂附
不合或以石羔連翹苦寒進之其痛尤甚復求治用
前方二劑痊

凡咽喉初竟壅塞一時元葯以紙絞探鼻中或嗅鼻角

未取嚏數次可散熱其母仍以李子樹近根皮磨水搽喉
外良愈 栴園雜記

金陵黃泥巷楊馬軍治咽喉等法以中指蘸藥少許于
喉中用力一搥腫處出血并痰涎隨即能下湯水絕
妙即前用針之意也 治法彙

陸祖愚曰郁仲開室人壬子年忽患咽喉阻塞湯水不
下六脉平和身无寒熱但氣逆喘滿日夜不安予与
諸君俱作痰治藥到即吐強下一口面色紫脹氣窒
睛突蹠乱不安狀如發狂嘔尽藥汁則略可投牛黃
丸亦不効疑受暑与新汲水亦是如之与沒姜湯蘇

合丸重捺內關俱无一効經七八日或云脉不齊而
危如是乃閉格也今藥不下咽雖靈丹亦无如之何
矣而日夕驚然鼻聞緞香遂作湯与之甫吞半錢嘔
出紫血數碗胸膈頓寬即飲米湯漸進稀粥守之數
日不藥而愈可謂奇症書以俟教

薛立齋治一婦人產後喉痛服清熱等劑益甚此膀胱
經血虛也蓋膀胱之內脉上行至喉而还用八珍加
柴升酒相而愈

孫真八日咽中帖：如有灸肉吐之不出吞之不下噙
生姜片五十日愈以最道一人之寒傷經絡氣血不

和浮于咽中煩人血分受寒多積冷氣故有此症予
用破棺丹含化頻咽之曾治數人多効蓋喉者候也
喉出天氣咽者嚥也咽出地氣故喉為呼吸之門咽
為水勞之路其或憂思內結風冷外侵痰氣膈塞挾
于喉中妨碍飲食久之而成反胃噎膈者有矣
叶香
林女

科

樓全善曰洪文成辰春鄉村病喉痺者甚衆蓋前年終
之氣及当年初之氣二火之邪也予用甘桔湯加
加黃連半夏僵蚕牛蒡等劑發之挾磨者加參芪歸
輩水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉疫

出更用生姜汁灌之均用上項藥症不神驗若用胆
凡酸寒點過者不治邪不能出故也

陳自明治一男子喉閉湯水不下一男子纏喉風疫
涎涌盛与神仙追毒丸並痊

立齋治一男子咽痛而脉數以荆防敗毒散加芩連二
劑可乃去芩連全安

一男子咽喉腫閉牙關緊急針不能入先刺少商二穴
出黑血口即開更刺患處飲清咽利膈散一劑而愈
大抵吐痰針刺皆有發散之意故効症不用針刺必
多致不效

一婦人咽喉腫痛大小便秘以防風通聖散一劑諸症悉退又荆防敗毒散三劑而安此症雖則荆防敗毒散吹喉散重則金鎖匙及刺患處出血最効否則不採針少商穴亦可

一男子咽喉腫痛脈數而寔以涼膈飲一劑而痛止以荆防敗毒散加牛蒡二劑而腫退以荆防敗毒散二劑人以甘桔荆防元參牛蒡而平

一男子咽喉腫閉痰涎涌甚以胆凡吹咽中吐痰梳許更以利膈湯而安

一男子咽喉腫痛約不能下針患處出紫血少安以破

棺丹噙之更以消毒散服安

一男子咽乾燥而痛以四物湯加知柏元參四劑少痊又以人參兩奉凡全安

一男子咽痛午後尤甚脈數元力以四物湯加知柏荆防四劑而愈仍以前藥去荆防加元參甘桔數劑全安

一弱人咽痛服涼藥或過勞尤甚此中氣濕熱以補中益氣湯加苓連四劑而安乃去苓連又數劑不再發常治午後痛去苓連加知柏元參亦効

一男子乳蛾腫痛脈浮數尚未成膿針去惡血飲荆防

敗毒散一劑消

一男子乳蛾腫痛飲食不入瘡色白其膿已成針之膿出而安

一男子喉癭腫痛脈浮數更沈寔飲防風通聖散瀉一次勢即退人以荆防敗毒而消

一男子咽喉腫痛欲針之以泄其毒彼畏針止服葯然葯既熟已不能下矣姑急針患處出毒血更餘清咽消毒葯而痊 一患者其氣已絕心頭尚溫急針患處出黑血即甦以鮫侍御高侍御素有此症再患皆以針出血即痊大抵皆因火為患其害甚速須分緩

急及膿成否若腫閉及壅塞者死在反掌之間宜用金鎖匙以患處吐出痰涎氣得通即甦若吐後仍閉乃是惡血或膿毒為患須急針患處否則不治前人云治喉閉之火与球火同不容少時又云走馬看喉閉信天治喉之方針為最妙

一男子咽喉作痛痰涎上壅欲治以荆防敗毒散加連翹山芩元參牛蒡彼自服甘寒降火之葯反加發熱咽愈腫痛急刺少商二穴仍以前葯加麻黃汗之諸症並退唯咽間一紫處仍痛此欲作膿以前方去麻黃一劑膿潰而愈凡咽痛疾治之早或勢輕者宜用

用荆防敗毒散以散之遲或勢重者須刺少商穴瘀血已結必刺痛處亦有刺少商咽虽利而未全消者必成膿也然膿去即安若有大便秘結虽經針刺出血必當以防風通聖散攻之甘寒之劑非虛火不宜用

一癰癩咽中如一核所縛咽吐不出倦怠發熱先以四七湯治之而咽利更以逍遙散一頓所患同前兼胸膈不利肚腹膨甚飲食少思睡臥不安用分心氣飲並効

秋官葉素陰虛因怒忽喉腫寒熱頭痛項強目直小便

自出此皆肝火之症肝主筋膜火主腫脹火旺則血涸筋挛日系緊急預預如板陰挺痿痺則小便自遺遂刺患處出毒血用四物柴胡山皂元參甘州而甦再用六味凡料以生肝血滋腎水而痊

太守葉咽喉腫痛痰涎不利手足發熱喜冷飲食用清咽利膈湯二劑不應刺少商穴喉少寬痰從鼻出如膠出紫血少可七日出穢膿愈

義士顧克明咽喉作痛至夜發熱此肝腎陰虛之熱用四物加酒炒黑知柏麥冬五味治之而痊後因勞咽喉腫閉刺患處出血用桔梗湯吐痰而消至仲夏乾

咳声嘶作渴發熱日晡足熱用滋腎丸加減八味丸
開服三月餘喜其慎疾得痊

通府李朝用咽喉腫痛口舌生瘡此上焦風熱先用荆
防敗毒散二劑後痛少止又以元參升麻湯口舌遂
愈

地官黃北盤喉痛作渴飲冷大便不通此上不表裡宜
熱用防風通聖散治安

地官胡誠甫咽喉疼痛此腎經膀胱虛熱四物知柏元
參少愈更以固本丸全安

職方盧抑齋咽喉腫痛兩目矇昧小便赤濁此膀胱濕
熱用四苓散加知柏黃連茵陳防已治之而安又用
六味地黃丸而痊

儒者王文遂咽喉腫痛口舌生瘡勞則尤甚此脾肺氣
虛膀胱有熱以補中益氣加元參酒炒知柏少安乃
去知柏加山萸山藥乃安

一儒者脚發熱則咽喉作痛內熱口乾痰涎上涌此腎
經虧損火不歸經用補中益氣加麥冬五味及加減
八味丸全愈

一老人咽痛小便數面赤目晡尤甚此乃膀胱陰虛當
滋化源以補中益氣加酒炒黑知柏四劑咽痛少可

去知柏加山萸山藥麥冬五味愈

一男子素善飲咽中作痛內熱作渴小便不利飲食如常此膀胱積熱用四苓散加茵陳大黃四劑諸症漸退入用清心蓮子飲而安

一星士勞而入房喉痛漸閉痰涎上涌四肢乍熱此陰虛陽氣飛揚用補中益氣加附而安

憲副姜時以癸卯冬就診右寸浮數有力口中有瘡曰此火傳于肺也當薄滋味慎起居甲辰秋復就診尺脈洪數而无力曰此肺金不能生腎水且靜養以滋化源彼云今喉間及耳內不時燥痛肢倦不時發熱

若元根之火竭無疑矣謂劉古峽云立齋謂我之病可疑至己巳蓋春古峽謂薛曰姜公之病已如葶子料遂同往視喉未腫消脈愈洪大或用瀉火之藥反連其死

雲間吳上舍年已五十咽喉腫痛或針出血神思並清尺脈洪數而元倫次按之微細如元曰有形而元痛陽之類也當峻補其陰今反傷陰血必死已而果歿蓋此症乃腎氣虧損元根之火交上為患服如減八味料或可救

馬元儀治任宗元咽痛三年不痊診其脈虛中兼瀉此

因勞鬱傷中氣偏虛者火偏盛也火性上炎必傷其
肺、既不受脾中生化之氣反為壯火所熏灼其津
液久損不能下灌靈根可知則下焦陰火不能蛰藏
并可知矣壯火虛火兩合為虛故延久不愈治法當
先解鬱熱于上次納浮火于下病虽久可愈也用紫
壳乳苒杏仁蘇子前胡桔梗甘州兩劑而脈已透再
用人參石斛炙州半曲橘紅黃連肉桂等四劑而咽
痛除再以七味凡愈

沈氏嬾侷胖而多勞寃時竟喉痒如虫行皮中經五六
年不痊兩脈浮虛而沈澁此陽明氣血不榮火動生

風之候也陽明之脈起于鼻交頤中下循鼻外挾口
環唇循頰車上耳前其支者從人迎前下入迎循喉
嚨入缺盆今者血虛風熾是諸脈不為血養而為風
所淫矣風勝則氣風行則動然治法不出治風而當
治血蓋血足而風自息也用生地黃製首烏天冬為
君以滋陽明之血秦艽白蒺藜甘菊為臣以清陽明
之風佐以芦根汁蒸漿甘州甘寒氣味以滋燦養陰
而安

周子因治趙鶴皋妻病咽乳水飲不能下眾醫無措因
叩以予生所最嗜獨鷓鴣即命烹飪進之授以七箸

入口死而苦遂愈 九零山房集

李蘇其稱武德中云鎮潞州許人甄權以新撰明堂示予時有刺史成君縛忽顯額腫大如升喉中閉塞水粒不下三日矣予屈權採之針其石于次指之端一食頃氣息即通明日欲啜如故 千金 按銅人云少商穴在手大指端肉側去爪甲角加韭叶冷君縛患顯額腫大如升甄權針之立痊病狀少異功效寔同李云次指端銅人云大指端未知孰是果針少商當在大指端也存之以俟知者 資生經

鄭惟康主簿嘗苦喉間虽水亦不能下咽矣三更延繆

愈 區說綾編

吳內翰倫急方云余嘗苦咽喉腫痛用白僵蚕直者不拘多少炒為末以生姜自然汁調服一錢許甚効昔彥恢提齊關中曾患喉痺王八主簿用此方治之即安一方調下二錢不通半時許再服立通吐出頑痰另將大黃一塊慢火炮熟打搥尽灰如一米厚切片以兩指大一片口內含汁嚥之一食頃再換一片或患人語不得及自嚥不下即扶起靠斜仰坐令人呷藥在口以筆管注入鼻中男左女右注藥訖隨即扶令正坐須臾吐涎下即扶起恐吐自鼻中出也吐了

令嚥大黃如前 百乙方

治急喉閉開口不得者右以黃蠟紙裹色豆一子如患
人鼻孔大小中心切破急以塞鼻氣沖入喉中自破
已竟通利即除去濠守王亞夫方巴豆去壳拍碎以
綿包隨左右納鼻中即吐出惡物即安鼻中或生少
瘡亦无害 全上

治咽痛至危用以手用力拔頂心髮立通无髮者撮頂
心皮利大夫得此方未試忽一卒苦咽痛不能言亟
乃患酒禿即以意令人用力撮頂心皮遂安

繆仲淳治纏喉風

即喉痺

試過有驗方明凡三錢巴豆去

壳七粒溶凡入巴豆燒至凡枯去巴豆研細吹入喉

中涎出立開 廣筆記

馬銘鞠治倪仲昭患喉痺遍治喉漸腐去飲食用粉
麩之爛者必仰口而咽母咽泣數行下曰此非風水
毒也若少年曾患梅毒乎曰未也父母曾患此疾乎
曰然愈三年而得我乃知此必誤服昇藥之故凡患
此瘡者中寒涼輕粉之毒之發于鼻為之毒之發
于愈後所生子女毒深者且延及子孫若甥尚不以
治結毒之法治之必死以甘桔湯為君少入山豆根

草龍胆射干每劑用土茯苓半斤濃煎送下牛黃二分半月而痊竟不用吹藥既而云父母病時曾服凡藥而痊之後曾口碎非昇藥而何今醫家恬然用之不曉其中主母之深故明其說 全上

立齋治杜率人咽喉腫痛口舌生瘡先以清咽消腫散
二服更以元參升麻湯而痊

一男子年三十餘口舌常破口无皮狀或咽喉作痛服
清咽利膈散更甚以理中湯治愈

一婦人肥甚暑熱咽痛腫甚痰涎上壅語声不出甚危
先用針刺主母血次以金鎖匙去吐稠痰五六碗以清

咽利膈少減去硝黃再服愈 外科正宗

蕭萬興治王氏孀善咬辛辣季夏病胃熱咽痛脉洪滑
微數以甘桔湯加苓連瓜蒌元參即痊

都聞連亨天之內季秋患肺經風熱咽痛脉浮洪有力
以金沸州湯加牛蒡倍甘州而痊

岸及鄭能仁孟冬患風痰上壅咽痛初治數劑加甚察
其六脉浮弦无力以補中益氣湯加胆星肉桂兩劑
頓愈

王氏少孀季春患肝經鬱火上升咽痛畧治不痊以道
遙散加牛蒡桔梗黃芩香附而愈

王洪緒治一壯年新昏百日妻歸寧匝月初四值酷熱
房后多扇取涼五鼓時喉痛氣逆寒熱交作問之則
曰三日前喉間畧有微痛今則脹痛腫甚視其小舌
腫如柿入母指知為心腎虛火并慾後經風火兩
閉之候若用發表虛上加虛若投寒涼風火被遏乃
以前蘓翹芍甘桔元參貝母服安 全上

無錫村嬪年可三旬五月望日下午腹飢正取麪食得
卒筋忽喉間難咽一醫以射干赤芍翹苓花粉牛蒡
等煎服即痰涌聲嘶詢知驟起因服涼藥增劇以用
寒元疑也但痰塞滿口難以進葯即取鵝翎蘸桐油

厘許入喉一捲隨出痰升許以肉桂炮姜生甘州各
五分入碗內以滾水沖浸仍預湯中以匙炒嚥一口
病者即云好了連呷三四口即起說飯間飯可吃否
曰宜粥 全上

蔣仲芳治一友始而牙痛既而咽腫遂投涼葯病尤甚
診其脈沈細大便一日二三次曰浮火上升也其足
必冷察之果然以金匱腎氣料作湯与之服完即卧
之竟而病安

劉雲密治一女子年五旬素因血虛生熱血熱化風患
遍身疙瘩經年不痊久之少陽相火并于陽明而患

喉脾其勢暴盛喉中歧似捺痒作嗽氣上而喘血泡
繫上腭一泡大如鳩卵口塞不能合氣涌上更急
少頃泡尽破血射如注其泡皮尽脱落喉皆潰腐紅
腫异常疼不可忍且滿口痰涎如羹如糊盖壅于
上而大傷陰氣也用養陰退陽活血祛風煎以止痛
之劑緣湯藥難吞為未或吹或點諸症漸退然潰處
肌未生痛未止因及破致時作嗽而血隨出乃于
吹藥中入白芨磨漿合丸如芡寔大日夜嚙化之遂
全安

瘡

歐用敬診道士顧奉初病失音醫皆以厥陰傷寒治之
歐全日內傷外感元可為者某日當汗某日死已而
果然入問其故曰肺金屬主聲肺則失音而且面黑
色腎氣竭矣某日屬火之乘金位真陽既奪不死何
待

孫文臣治徐檢安以正月內食新蒜炒肉人冒風寒自
咳嗽喉疼聲啞此原有痰火人為外邪所乘不得發
越而致當潤肺化痰調氣以法其本煎散邪解表以
治其標痛瘕可除而聲可復矣先与瓜蒌仁橘紅桔

梗薄荷貝母桑皮地骨皮葛根前胡甘州四劑溲以
滾痰丸同七製化痰丸兩帖夜服諸症除而声音亮
矣此釜底抽薪法也

張路玉治一西客感寒乘蘇忽然喘逆声瘖咽喉腫疼
察其形体肥甚飲啜如常切其脉象浮與按之益勁
此必寒色熱邪傷犯肺絡也遂以麻杏甘石湯加半
夏細辛大劑葳蕤二服喘止声出但呼吸尚有微瘖
更与二陳加枳桔葳蕤調安

王惟一數年前虽有血症而年壯力强四月間忽患咳
嗽服痰散藥後痰中見血數口繼服滋陰藥過多遂

声颯而啞時覓胸中氣塞遷延月餘診之脉虽沉澁
按之益力奔之應指其体肥色浮非陰虛之候也盖
此之声啞是金窠不鳴非金破不鳴之比因与導痰
湯加入中黃洋瀉方高一劑痰為務四劑後痰中見
紫黑血數塊其声漸出而颯未除更以秋石煎入中
黃枣肉丸服經月而声音清朗始終未嘗用清理肺
氣調養榮血為也

張飛崎治郭代上午日少食角黍倦怠作瀉曾用消尅
不効因圓跌仆即昏迷不醒數日後邀診之六脉虛
微欲脫右臂不能轉動声瘖无聞時有用大黃之劑

者急止之曰此脾肺虛憊安能任此惟粥飲參湯庶
為合宜所謂漿粥入胃則虛者活依言調之瀉止神
安聲音亦出而甦能食後亦惟獨參湯調理不葯而
愈

艾桂字廷肅治一嬭娠八月卧不語眾醫束手桂曰此
內經所謂瘖也十月當自愈 嘉善縣志

萬曆時京口名醫何繼先世業也方成童犹在家塾遭
鎮江道有幼子忽瘖不能言召其父診視值父遠出
召者不及待令繼先往遂診之曰公子无病勿葯也
但多令嬭人以氣呵入口中耳遂使迭呵之半晌後

果能言人問故曰頃見衙內多嬭人而公子貌甚美
諸嬭人愛其美也攫抱之時必多吸其口今少陽之
氣乍奪第令呵以还之耳 張氏危言

陸青愚治范青麓令即厚味奉養酒量極高性尤偏
嗜沈酣多怒初患吐血服犀角地黃等湯月餘不愈
更加溺血咳嗽一日忽声啞然肌肉如故飲食不减
眾作瘵治无一效脉之左關洪大而弦右關滑大而
数乃有餘之火症非不足瘵症也因厚味生痰及醇
酒助火之痰痰涌於肺中所以声啞其血上下行
者怒則傷肝之脉挾古本而絡陰器龍雷之火一動

血隨之而上逆下洩矣法宜清熱降氣化痰導血歸源十日可愈若認為瘵而以地黃二冬投之則左矣用真霞天曲山查理胃家濕痰為君杏仁橘紅利肺竅栳仁鬱金行肝滯為臣山庖生甘艸清上焦為佐滑石車前清下焦為使又用茅根煎湯代水數劑而血止声清不十日愈

薛立齋治一羔梁之人素不慎起居忽失瘖不語神思昏憤痰涎上涌此腎經虛寒氣厥不能上接清陽之氣故也須用地黃飲子不則後必啞舌經曰少陰氣至則啞舌少陽氣至則啞頰不信仍用風藥後果啞

舌急用前湯而安

議謂袁補之患前症不信余言數服祛痰之劑后啞舌而效

一婦人忽然不語半年矣諸醫不應兩尺浮數先用六味凡料加肉桂數劑少安乃以地黃飲子三十餘劑而痊

一婦人因忽仆地痰涌不語灌牛黃清心丸少甦用神

仙解語湯加山庖柴胡桔梗少愈又用六君柴胡山

庖枳壳而痊

神仙解語并日附子石菖蒲遠志天麻全蝎羌活南星木香桂木香半兩餘皆

一

貴溪湖山夏公明道貳郡行縣訪虞文靖公伯生于山中

道臨川章伯明之醫云其子嘗忽瘖不能言而死他

苦群醫環視莫究其故難于用藥伯明診之曰此熱
症也徐解之則愈投熱劑則大寔從之不半日而愈
又其僕人得寒熱一醫治以常用之藥伯明視之曰
法當死今夕復云使人鼻還其家僕起拜辭謝登車
而去行未至而歿

瘡

嚴鐵橋天姿英邁人也豪于詩酒自首夏忽患失音咳
嗽時作守不藥之戒至八月初余偶過齋頭設次一
小青衣持葯甌至余曰君謂不藥今乃葯乎弟醫作
何治所用何葯出方示之乃前胡桔梗蘓子杏仁等
傷風劑也曰君病豈宜服此安有傷風至百餘日者
乎肝腎久病相火刑金唯集零五歸六味為對症耳
幸勿誤聞言即起送之再就二人診則勸服六味丸
後服至三四十劑忽發肛痔之發而音復蓋肺氣之
病傳大腸府也是為佳兆唯痔痛甚剝宛轉床第月

月餘亦以服葯太過且六味不宜依古方也病痊數
年豪飲如故後登乙酉賢書明年遠歸于闕患瘧疾
既數月始得歸已成損症遂不起自失音至是凡十
年三十七惜哉

宋耀 翁年六十餘素亦豪飲咳嗽失音醫作傷風治
更甚余與生熟地麥冬沙參萸仁杞子服至二十餘劑
亦發肛痔而咳嗽失音皆愈後數年以事入都于山左
遇大水上沒至腹行水中數里年初愈其肛痔遇勞
則發否亦時有膿水至是痔忽全愈而咳嗽失音復
作抵都治之不痊歸而延診其脈弦澁而數語之曰

初病以發痔而愈藏溼于府也為咽今痔愈而病發
則府傳藏矣為逆數月終

心胃痛

脇痛

續名醫類案 卷三十四

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類聚卷二十四

錢唐胡之珩王橫輯 男斌編次

心胃痛

張子和治一將軍病心痛不可忍張曰此非心痛也乃

胃脘当心痛也二語為此症眼晴凡子更有一轉語

由緣口歲不太逆風氣流行民病胃脘当心而痛風

為病非乃与神祐丸一百餘粒病不減因問曰此胃

脘有寒宜温補將軍素知張明了後求為乃復与神

祐丸二百餘粒作一服大下六七行立愈矣去非

宜非

一婦心痛數年不痊一医用八言半分茶末一分白湯下吐瘀血而愈 李樓奇方

王執中久患心脾疼服醒脾藥反脹用耆域所載蓬莪朮麩裡煨熟研末以水与酒醋煎服立痊蓋此藥能破氣中之血也 資生經

一婦年三十病心氣痛

音統痛用小

小葶水 荳花為末熱

酒服二錢立効又方男用酒水各半煎女用醋水各一半

煎 痛元方 卒神經目

李時診治荆穆王妃胡氏因食蒿麥麩著怒遂病胃脘当心痛不可忍医用吐下行氣化滯諸藥皆入口即

吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃延胡索末三錢温酒調下即納食少頃便行痛止

友人言于武昌見一老僧患胃痛腕痛發瀕死其徒亦患之師死遺命必剖視吾心務去其疾果于胃間得細骨一條長七八寸形如筭其後以罈瓶中供師前已數年矣有貴客來寓庵中偶殺鷺未斷喉其僮取瓶中骨挑鷺喉凡染鷺血處即化矣徒因悟此理飲鷺血疾遂除 蘭譜 腦病門有飲鷺血一案宜參看

薛立齋治一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐

薛以為脾胃虛弱用白朮一味同黃土炒去土每服
一兩以米泔煎濃塗服少許數日後自能大飲用三
斤餘而安

上舍陳履亨長子室素怯弱產後患疥瘡年餘不痊因
批表旬日每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼
手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形寔誤認
諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而
愈繼又患瘰且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元
氣轉脫病家無識再投參芪補劑不應矣六脉如絲
欲絕迎薛至診之曰形雖寔而虛極反用理氣之劑

損其真氣故也速投參芪歸朮附子姜桂二劑間用
八味丸五日眠食自甘六脉全復此症若心脾疼痛
時即服此為瘰亦不作

龔子才治一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲青百藥
不効以當歸三錢煎湯用水磨沈香木香烏為枳壳
服立止

一教諭年五十一為酒食過飽胃脘作痛每食後其氣
自兩脇下及胸次至胃口痛不可忍令人將手重按
痛處移時忽响動一聲痛遂止如是八年肌瘦如柴
診之六脉微數氣口稍大有力以神祐丸一服下之

痛如失以參苓白朮散調安

程沙隨在秦其時有一乳娘因食冷內心脾脹痛不可忍錢受之以陳菜菔五六十粒水一大碗煎取汁去渣入官局午胃散三錢再煎熱服一服痛止再服無他云高宗嘗以此賜近臣愈疾甚多真奇方也

小乘

孫文垣治張二尹近川始以內傷外感過服發散消道之劑致胃脘当心而痛診之六脉皆弦而弱法當補而斂之白芍五錢炙甘草三錢桂枝錢半香附一錢東三枚糖三合一劑安

族弟應章胃脘当心而痛手不可近疑有瘀血使煎延胡索五錢脂丹皮滑石川芎當歸甘草桃仁桔梗香附臨服加韭菜汁一小酒杯夜痛止得睡飲食亦進惟大便下墜逼迫不安此瘀血已動欲下行也前劑去其汁一服全安

吳鶴洲如夫人病胃脘痛醫有認為出者為火者又有認為痰為氣為食為虛為血為寒者百治不効遂診之兩手大而無力皆六至曰肝脾相勝之症耳

向以東垣治例腹痛

胃脘亦非腹

以白芍為君惡熱而痛

加黃柏効此法則萬全矣白芍四錢一半生一半炒

伐肝補脾為君甘州二錢一半炙一半生緩肝養脾
為臣山查為佐黑山扈五靈脂各一錢止痛為使三
帖而安

吳仰元患胃脘痛：則徹于背以手重按之少止痛時
冷汗如雨脉澁孫曰此氣虛而痛也

服瀉乃血虛
此強言氣虛以

小建中湯加御米壳而安

仍是
肝症

李士才治宋敬夫心腹大痛偃僕不能仰自服行氣和
血藥罔效其脉左滑而急其氣不能以息偶一咳攢
眉欲絕為心疝無疑以生姜飲粥取小茴香川棟子
青木香廣木香吳茱萸木通延胡索歸身青皮一服

而痛減五日而安

李長蘅吳門舟次忽發胃脘痛用順氣化食之劑弗效

李診之曰脉沉而遲客寒犯胃也以參蘓飲加艸豆

蔻三錢煎就加生姜自然汁半碗一服而減二服而

痊

一人將應試八月初五心口痛甚至不能飲食李診之
寸口滿而軟与大劑歸脾湯加入參三錢官桂一錢
彼云痛而驟補寔所不敢得母与場期礙乎李曰第
能信而服之可以死礙矣投破氣之藥其礙也必矣
遂服之不逾時而痛減更進一劑連飲連參湯場事

獲竣

喻嘉言治一人病後胃中隱隱作痛有時得食則已有時得食轉加大便甚難小便不暢蓋因脾中津液為火所燥津液未充火勢內蘊易于上燎所以得食以壅其火而安若食飲稍過則氣不能轉運其食而痛亦加蓋火不除則氣不復氣不復則胃中清濁混淆不肯下行而痛終不免也論症調為訂降火生津下氣血痛方為常用之藥務先以攝腎氣不使外出然後濁氣之源清而膀胱得吸引上中二焦之氣以下行矣喻君實有發前人所未發之奇領惟久峻養肝腎一看然此案未行已駁之乎得之矣 醫通

高鼓峯治一婦人胃痛身水不入寒熱往來或從火治用芩連芩柏或從寒治用姜桂茱萸辰轉月餘形體消瘦六脉弦數几于死矣高曰此肝痛也非胃脘也其病起于鬱結生火陰血受傷肝腎枯乾燥迫成痛色惡之人 厄多此症 醫復投以苦寒辛熱之劑胃脘重傷其能瘳乎急以滋腎生肝飲与之一日夜尽三大劑五鼓熟寐次日痛定再加味歸脾湯加麥冬五味十餘劑而愈

按此病外間多用四磨五香六鬱逍遙新病亦効久服則殺人 又用肉桂亦効以木得桂而枯也

屢發屢服則肝血燔竭少壯者多成勞衰弱者多發厥而死不可不知

呂東莊治吳維師內患胃脘痛叫號几絕俸中忽熱忽止竟有氣逆左脇上嘔吐酸水飲食俱出或疑停滯或疑感邪或疑寒疑或宜疫積脉之弦數重按則濡蓋火鬱肝血燔耳与以当歸白芍地黄柴胡枣仁小蘗山萸丹皮山庖茯苓澤瀉頓安惟胃口犹竟劣用加味歸脾及滋肝補腎丸而愈

高呂二案持論略同而俱用滋水生肝飲予早年亦嘗用此却不甚應乃自創一方名一貫煎用北

沙參麥冬地黄当歸杞子川棟六味出入加減投之應如桴鼓口苦燥者加酒連尤捷可統治脇痛吞酸吐酸疝瘕等症

薛立之而治一婦人心腹作痛久而不痊此肝火傷脾氣也用炒山庖一兩生薑五片煎服而痛止更以二陳加庖枳而愈

孫文垣治周芦汀內人患胃脘痛嘔吐不食者四日晝夜號呼不絕脉則兩手俱滑數故作白当以清熱止痛為先乃先与朮子葯二錢令服之不一飯頃痛止而睡家人色喜曰未此火暫息耳其中疫積甚固

不乘時下之勢必再作因与总管凡三錢服下腹中微痛再服二錢又睡至天明乃寤腹痛亦止大便下痰積甚多次日以二陳湯加枳寔姜黃香附山巵黃連与之服後胃痛全止惟小腹畧脹蓋痰積未盡也再与总管凡三錢天明入行一次痰之下如前胃脘之痛若失

薛立齋治陳湖陸小村母久患心腹疼痛每作必胸滿嘔吐手足俱冷而赤唇麻咽乾舌燥寒熱不時月餘竟夕不安其脉洪大衆以痰火治之屢止屢作迨己春發頻而其仍用前藥反劇此寒涼損真之故內

真寒而外假熱也且脉息洪弦而有怪狀乃脾氣虧損肝木乘之而然當溫補胃氣遂用補中益氣湯加半夏茯苓吳茱萸木香一服得寐徹曉洪脉稍斂怪脉亦除

陸養愚治陸前川素患腸風便燥冬天好食盆柿致胃脘当心而痛醫以溫中行氣藥治其心痛未減而腸紅如注以寒涼潤燥之劑治其血便未通而心痛如刺脉之上部沈弱而遲下部洪滑而數此胃中冷而腸中熱也大腸傷金原喜清而惡熱毒潤而惡燥况素有腸風燥結之症因心痛而投以辛香燥之劑

能不割乎脾腎原喜溫而惡寒喜燄而惡濕况新得
容寒化胃之症因下血而投以苦寒濕潤之品能不
甚乎今大便不行已數日矣乃用潤字凡三錢以沈
香末三分衣其外濃煎姜湯送下二錢半日許又送
一錢至夜半大便行極堅而不甚痛血減至日十之
六七少頃入便一次微痛而血亦少清晨入便溏一
微次見血而竟不痛矣惟心痛未舒与臟連凡亦用
沉香為衣姜湯送之以清下焦熱而潤其燄入以附
子理中料為散飴糖拌吞之使惡隔而不連下不終割
而痛痊

玉旨堂治韓敬堂患胸膈痛脉洪大而澀用山炮赤曲
通州麦芽香附歸芍煎湯加姜汁竹瀝韭汁童便之
類飲之而止一日勞倦忍飢痛大發與遊玉至入房
問曰晨起痛甚不能待公服家兄為下咽如刀割其
痛不可忍此何意也曰得非二陳卒胃紫蘇之屬乎
曰然曰是則何怪乎其加病也大勞餓而發飽逆則
止知其虛也以十全大補而痊

張三錫治一婦苦胃腕痛每發輒大吐多方不効以鹽
湯探吐出積痰梳許痛甚愈后常作惡心知胃中有
痰也以橘羊樵不加香附川芎白螺壳南星海粉神

曲打糊為凡白湯下錢半未及一羊病去如脫

要皆

陳三
農亦抄之

一老嫗性急胃痛已六日諸辛葯歷試無驗診得左關弦急而右寸更甚其痛一乘即不可當少選稍定口乾而時亦知肝氣有餘成火也以越鞠加吳萸炒連姜汁炮子而安

一婦胃痛凡一月右關寸俱弦而滑乃飲食下節所致投滾痰丸一服下痰與宿食三碗許節食數日調理而安

一嫗胃痛久諸葯不應六脉微小按之痛少定知中氣虛而火鬱也理中湯愈

一中年人因鬱怒心下作痛一塊不移日漸消瘦與桃仁承氣一服下痰而安

一八中脫大痛脉弦而滑右為甚乃食鬱也二陳子胃加山查枳殼木香砂仁而安

一八中脫至小腹痛不可忍已三日矣香燐歷試且不得卧則痛往上每痛急則脉不見詢之因入房後過食肉食而致遂以為陰而桂姜附因思其飲食日倍中氣損矣況在房室之後宜宿物之不能運化又加燐劑太多消耗津液致成燐矢苑滯不通所以不

得卧而痛也古云胃不知则卧不安遂以枳实导滞
丸三钱去黑矢椀許小腹痛减矣人与黄連枳实瓜
蒡麦芽川朴山查莱菔子二服痛復移于小腹乃更
与潤腸丸二服更衣痛除第軟倦不支投補中益氣
而愈

王叔權曰荆娘舊侍親疾累日不食因得心脾疼發則
攻心腹後心痛亦應之至不可忍則与兒女別以藥
飲之疼反甚若灸則一身不勝灸矣不免令兒女各
以大針刺之瀕史痛之

叔權舊患心脾發則疼不可忍急用瓦引竇炭火中燒

令通紅取出投米醋中漉出以紙二三重包之置疼
處少止冷即再易者日所傳也後閻千金方有云凡
心腹冷痛煎薑一升熨或煎蚕沙燒磚石蒸熨取其
裡溫暖正或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金
方也他日心疼甚急灸中脘數壯竟小腹兩足有冷
氣自下而上至灸處即散此灸之功也今事方載王
思和論心忪非忪也胃之大絡名曰建里絡胸膈及
兩乳間虛而有痰則動更瀉史發一痺是其症也
審若是人当灸建里矣但不若中脘為要穴云

建里
字

左傳巫臣以夏姬之故怨子反曰余之使汝疲于奔命以死于是子反一歲七奔命遂遇心疾而卒則入因用心而成疾矣然則如之何子居當養其心使之和平疾自不作其次則服鎮心丹補養之可也若疾將作而針灸抑亦可以為次矣

一婦人患胸中痞急不得喘急按之則痛脈數且澀此胸脾也小陷胸服治

一八年二十三歲婦有一點相引痛吸氣皮竟急此有汚血也滑石一兩枳實五錢黃連五錢枳殼炒一兩甘草炙二錢為末每二錢半以萊菔自然汁煎熟飲

之一日五六服

繆仲淳治高存之夫人患心口痛一日忽大發胸中有一物上升冲心三婦人用力捺之不下叫號欲絕存之曾詢求繆立此方是日急煎服之冲上者立墮下腹中作痛不升矣再服腹中痛亦消二日後以病愈起洗沐人忽作嘔頭痛如劈存之曰此即前症也煎前約服之玄安白芍炙艸吳茱萸茯苓延胡索蘇子橘紅后加半夏衆花木通竹茹

李季虬曰予痛今春忽患心痛連下腹如有物上下撞痛不可忍急以手重按之病少定按者少鬆即叫號

仲淳曰此必血虛也脈之果然急投以白芍五錢炙
艸七分橘紅三錢砂仁三錢炒鹽五分一劑少定已
入以牛黃蘇合丸疏其氣暖氣數次痛徐解予問故
仲淳曰白芍甘艸治血虛之聖藥也因久菀氣逆故
減甘艸之半仲景甲己化土之論詳矣諸醫不解耳
炒鹽者何心虛以炒鹽補之即水火既濟之意也予
俱俗師藥以痰火食積治心腹之痛故疏其詳如左
全上

昔年予過曲河遠王字泰夫人病心口痛甚日夜不眠
手摸之如火問予用何藥曰以大劑參歸補之少定

今尚未除也曰得無有火或氣乎字泰曰下陳皮及
涼藥少許即脹悶欲死非主人精醫未有不誤者予
存此案以告世之輕執方者 全上

劉雲密治一女子值暑月夜間甚涼患心痛後右脇下
起至心前岐骨膈處并兩乳下俱痛復連背痛腰及
兩膊俱骨縫脹疼唯右肋并心疼甚時作惡心且
嘔疑夜眠受涼寒邪鬱遏氣不流暢所致用散寒行
氣藥不効人疑寒滯中有鬱火加散鬱之品亦不効
服加味煮黃丸乃頓愈姜黃三錢五分確黃三分乳
香三分去油淨巴霜八分共為細末醋糊為丸如黍

米大虛者七凡寔者十一凡姜湯送下經云邪氣盛則寔此煩素虛弱而受寒邪甚則為寒唯此辛熱之劑可以導之前所用藥雖亦散寒而不能及病也其用姜黃乳香亦有深意蓋寒能散血故耳時珍之所謂配得合宜罔不奏功也

脇痛

空實材治一人脾氣虛致積氣留于脇下而肋常如滋水

多服叫仲井而愈 原此脾虛致積當用溫行化五助下當行溫化

玉海藏治一煩人先病惡寒手足冷全不發熱脈八至
而脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏于骨髓陰
在外至候發寒治當不從內外逆乎中治也宜以小
柴胡倍姜棗宜入惡寒門

許孝士云沈存中良方頃在建陽醫者王琪言諸氣唯
膀胱脇下痛最難治謂神保丸能治之熙寧中病頃
筋骨痛諸醫皆作風治之數月不痊乃流入于背脊

人臂牽痛甚苦憶琪詒有証乃合服之一服而痊再
發又一服立効方用木香胡椒各二錢五分已豆十
枚去皮心膜研乳燭七枚石回味共為末湯浸蒸并
為丸如麻子大用硃砂為衣每服五丸視諸經痛用
引送下心脇痛柿蒂心湯下腹痛柿蒂煨姜湯下
血痛炒姜醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通
蜜湯調楨柳末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶
酒任下

朱丹溪治一婦人脾疼帶脇痛口微乾問已多年時尚
秋用二陳湯加川芎乳苜青皮木通下芎朮凡二十

粒

章宅張即氣痛自右脇時作痛時止脉沉而弦小便時有
赤色吞酸喜嘔出食此濕痰在脾之間所以肝善乘
之小柴胡湯去黃芩加川芎白朮木通白芍滑石生
姜煎湯下保和凡三十五粒

一婦人氣暈而脇胸背皆痛口乾用青皮半夏各五錢
白朮黃芩川芎各三錢木通二錢五分陳皮桔梗各
二錢甘州炙半錢石分六服煎熱服入脇下有食積
一條扛起加炙萊菔炒黃連

孫文垣治徐三泉子母下午發熱直至天明后熱更甚

右脇脹痛咳嗽則吊疼坐卧俱疼。醫以瘧治无効。已二十餘日。後醫謂虛投以參朮。痛益增。診之左弦大。右滑大。搏指經云者。左石者陰陽之道路也。據脉肝胆之火為痰所凝。必勉強作文。過思不決。木火之性。不得通達。留而為痛。夜甚者。肝邪寔也。初治与通調。肝氣一剖。可痊。誤以為瘧。瘧動其火。補以參朮。閉塞其氣。語云。侏若燔炭。汗出而散。今汗不出。舌胎已沈。香色熱。菀極矣。不急。抹立見凶危。以仲景小陷胸湯為主。大小芩一兩。黃連三錢。半夏四二錢。前胡青皮各一錢。水煎服。夜服。当歸龍荟丸。微下之。臣珖。予曰。

病久食不進。精神狼狽。若此。豈可下乎。曰。醫屬有餘。有餘者。瀉之。已誤于補。豈容再誤哉。服後。夜半疼止。熱退。而帖全安。

虛山內人胸脇脹痛。五更增。襟則痛尤甚。左寸關脉洪滑。孫曰。此肝胆有鬱火。胃中有膠痰。乃有餘之痰。經云。木鬱則達之。人云。通則不痛。与以当歸。龍荟丸一錢五分。大便行一次。疼隨止。惟声不聞。却是以陳皮柴胡貝母茯苓甘草白芍酒苓香附杏仁桔梗調之而安。

父子徐檢老。俸肥厚。善飲。致有腸風。計下血不下數桶。

因而委頓已卯仲冬石脇極疼痛上至耳前後分几
 甚左右不能轉動之則痛甚飲食減面色青汗出如
 雨濕透衣被故不敢合眼而睡俗醫皆投以香附香
 皮及辛散之劑痛愈甚汗愈多面愈青逆予診之兩
 寸短弱左關弦而搏指右關沈滑六脉皆近七至予
 曰据痛在少陽經必始于怒木火之性上而下之故
 上冲耳后而皆痛也夜痛甚者蓋夜屬肝氣用事內
 經云司疎洩者肝也卯在肝胆故合自汗即大出中
 焦原有濕痰此語比案必關入法當謂肝清熱解毒
 為主毒字鶴案之全兼利小便語亦不可遽止汗便

邪無出路逆其木火之性不惟痛加且將發腫毒而
 害非淺矣內經云蒸梁之變足生大疔當慎防之非亦

地黃當歸黃芪皆滯痰閉氣味桔梗亦非所宜書曰
 下虛乏者及怒氣上升者皆不可用故當慎也且將

臣紅花連翹為佐龍胆艸為使服後汗並仍舊疼即
 減二之一不妨睡矣仍用前藥痛又減半第三日又
 服左右轉動如常飲食亦加予未至公先近姑蘇蘇
 氏即臧用敬也敬東臧公幼時臆友也家世授醫公

初不急予曰引領期感到可刈枯削朽也感至診畢
遂詰曾用何藥公出予發劑示感：大呼稱謬謂當
隆冬之候汗多如此陽氣大洩何敢以柴胡為君嘆
中痰既未清又何不用桔梗當歸六黃湯前美已試
之為置而不用是舍紀律而務野戰也即取六黃湯
加桔梗以進此孫君
真是神仙公惟信感仍傾心以從連煎
服之未一時田疇隨作色：加惡四喜
收甚左右復不
能轉動自成至子丑苦不能支有內侍語之曰假內
侍之
言其鄙服孫君藥雖未全亦已去 甚彼曾言
二藥不可用何為輕犯而受此苦宜急取孫君藥煎

飲：下即伏枕斲：達旦始寤命便速予至而
未必
即予曰人言隆冬汗出不當用柴胡為公用為君何
旨予曰胆与肝為表裡肝胆之火鬱而不發故痛：
極而汗：出而痛減者是火從汗出蓋汗乃邪出之
門也予故曰汗不可斂本神云柴胡瀉胆之火而以
黃連佐之內經云木鬱則達火鬱則發言當順其性
而利道之勢則易克古人治火之法輕則正治重則
從其性而升之者以此蓋醫貴變通如陰虛火動而
汗出者內無有：餘邪故以六黃湯斂而降之常治
法也今內有：餘邪未出遽斂降之邪無從出勢必

成毒故變常而淺治者便邪有出路水火之性不逆則毒不成而痛可滅也公曰善哉孫君之剖竒正相生不下孫武子兵法何輕以無紀律議之願投劄而奏凱也予曰公數月后瘡瘍大發兩胯且有与塊作痛此毒出之微公于時無恐改用柴胡白芍甘艸丹參苦參茯苓瞿麥車前黃柏金銀花連翹服三日而痛全減汗全收左右不難轉動矣逾日公謂肌膚痒甚蓋之然似癢疹豈瘡出欬欬以藥治之予曰可再三日兩胯果發与塊如棋子大者數枚且痛予業已製蠟凡丸以待至是授服之瘡果遍身大發兩腿為

甚一月餘而痊公始信予防毒之言不謬披襟交歡且作序識勝

何勝之自期与終身不替云云

是紫孫君生予得意筆也然治法非竒行文頗謬盈筭徇環語滿紙收心卒不入選願集中以彼紫微多患加節畧独於此仍其原卒以見一班第亦偶然非有心吹索人之短也

劉默生治諸葛子立脇痛連腰脊不能轉側服八味丸加杜仲續斷不効或者以為不能轉側必因閃挫与挫氣散更甚劉診之曰脉得弦細乏力虛寒可知与生料八味丸茴香四剖安

李士才治一人受暑脇痛及黃痰滯清肝破氣之劑俱
不効用大小蓼一个搗爛加粉艸紅花少許葯入而
痛止病机沙篆

薛立斋治一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡尤甚
此怒氣傷肝氣血俱虛也朝用逍遙散倍加炒黑
柏貝桔麥冬夕以歸脾湯下地黃丸

龍葵子才治一婦人口苦脇脹此肝火也用小柴胡加黃
連芩子少安以四君子湯加當歸白芍柴胡調理脾
胃而痊

吳季先治蔣氏婦善怒兩脇作脹歷有年所医用補脾

代肝勿應脉之石閉細澀左脉無病此肝勝則尅脾
取明自因補尚嫌緩尚以代為乃与四物湯加阿膠
玉竹杏仁杞子二十劑愈

柴胡青治侍御范講弘宣定太夫人吐痰脇痛飲食無味
告以肝病一二十年矣率服平肝之葯凡香附鬱金
等皆各服過數斤此二味為治肝症要葯然用之氣病
亦可矣用之血病則与干將莫耶無
異也今為我理肝氣可也柴白肝脉已虛理無再用
伐肝况腎肝同治乙癸同源自應滋腎養肝為正先
服加味道遙散二劑即以八仙長壽方進太夫人曰

熟地臍膈說恐勿堪用柴白此方此方二字可不
必以詳婦人之疑

耳熱地直走腎家斷無臑膈且風以煦之必需雨以潤之服後果驗

按二地臑膈之說不知始自何人致令數百年來人皆畏之如虎俾世之陰虛火盛之病之死而不救一嘗迨已瀕危始進三數錢許已無及矣竊料其人此時必死在阿鼻地獄也

朱丹溪治楊淳三哥素有腎氣上引乳邊及右脇痛多疫有時膈上痞塞大胸秘結平時少汗脈弦甚与保和溫中各二十丸研栝仁郁李仁吞下

陳三農治一人右脇痛引背口乾舌燥上身發熱腰以

下俱冷石閉尺不起此血虛氣無所附宜用溫藥行動其氣使氣有所歸水升火自降或用乾姜肉桂各五分當歸一錢吳茱萸半分鹽水煮煎服上身熱退下停溫暖陽氣漸回但食難消化此元氣未復耳理脾胃為主養血次之胃氣一轉諸恙自去用參苓歸朮各一錢姜桂各五分神曲六分陳皮四分炙甘草二分安

一人遇勞与飢則脇痛用八珍加牛膝木瓜山藥石斛苡仁杏仁柏子仁栝仁數服頓愈一人同此医投于肝約痛甚而效

一八痛引腰脇脉弦數有力知肝火菀結也投龍苓凡五十粒全安 大正

立齋治一男子脾胃不知服香燥行氣之劑飲食少思
而脇脹悶服行氣破血之藥致飲食不入右脇脹痛
喜手按之靈應曰乃肝木尅脾土而脾土不能生肺
金也用滋化源之藥四劑諸症頓退又曰火令在途
當補脾養肺不信遂歿

王肯堂治雲中參文山掌教子湖因勞患兩脇滿痛清
晨并飢時尤甚書求方知具肝虛當母子兼補今
用黃芪白朮補母熟地川芎山萸山藥柏子仁之類

佐以防風細辛各少許姜枣煎服不數劑而愈王容
表安時聞魏昆漢吏部之變因投謁忍飢歸而脇痛
無他苦也而粗工以青皮枳壳投之遂致糾纏可不戒
哉

丹溪治壽回即石脇痛小便赤少脉少弦不數此內有
陳久積痰飲因外感風寒所遏不能宣散所以作痛
与尾芬凡三十五粒保和丸三十粒細嚼姜片以熱
湯下服后脇痛已安小便尚赤少再用白朮三錢陳
皮白芍各二錢木通一錢半條苓一錢甘州五分姜
三片服安

方提領年五十六因酒后忽受怒氣于左脇下与暗卒
作痛自此以后漸成小塊或起或不起、則痛、止
則伏而黃口乳無力食少吃此物便噉此味轉惡風
寒脉之五大于右弦率而長大率左甚重取則全弦
此得熱散太多以致胃氣大傷陰血下衰且与和胃
湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化机伺腎
寔陰血稍充却用消塊和胃方八參三錢白朮錢半
陳皮一錢白芍歸身各五分乳葛三分紅花豆大甘
藷二錢炙 為疑誤或製 作一帖下保和丸廿五粒龍
吟丸十五粒

瑋按此症全屬肝傷木反尅土其塊隱現不常乃
虛氣也時師多以香燥辛熱治之促八年壽余治
此不下數人而悉用一煎湯加川棟米仁姜仁等
不過三五劑其病如失若立高多用加味道遙散
鼓峰雲峰輩多用滋水生肝飲皆不及余法之善
也

立高治崑岸馬進伯村左脚連脇作痛遣人索治意此
醫然傷肝脾用六君加桔枳柴胡升麻彼別用倉藥
蓋甚始請治其脉右關弦長按之軟弱左關弦洪按
之滿滯乃脾土不及肝木太過因飲食之主母七情之

火也用前藥加芎歸四劑全愈此症誤用行氣破血
導痰死者多矣

一男子因怒脇下作痛以小柴胡湯對四物加青皮枳
枳治愈

內翰李蒲汀太人夫左脇內作痛牽引胸前此肝氣不
和尚未成瘡用小柴胡湯加青皮枳壳四劑少可再
加芎歸治安

張景岳治一姻家年正壯素飲酒常失飢傷飽偶飯后
脇肋大痛自服行氣化滯等復用此法尽出飲食
吐后逆氣上升脇痛虽止而上壅胸膈脹痛更甚且

加嘔吐張用行滯破氣等愚嘔痛漸止而左乳胸肋

之下結聚一塊脹寔此按膈腹脇閉不能下達每成

亥子丑之時脹不可當因嘔吐既已可用下愚凡大

黃芩硝葶莢巴豆等及蘿蔔子朴硝及大蒜菴等法

毫不應愈攻愈脹愚因疑其脾胃氣受傷用補尤竟

不使補湯水不入者二十餘日無計可施只得用手

揉按其處竟肋下一點按著則痛連胸腹細為揣摩

正在章門穴章門為脾之募為藏之舍且乳下肋間

正屬靈里大絡乃胃氣所出之道路而氣寔通于章

門因悟其日輕夜重本非有形之積而按此連彼則

病在氣分無疑

此屬音情

乃用神香散令日服三四次

用艾火灸章門十四壯以逐散其結滯之胃氣

到氣未知

乃用不三日脹果漸平食乃漸進始得保全

幸此其

症誠難測矣 未選入

琇按張君壬子于薛氏諸書似未曾寓目至脇痛

由于肝木為病至元未知良可哀也此症之愈全

在一灸與飽逆病灸靈里同

黃古潭治一八六月途行受熱過勞性且燥暴忽左脇

痛皮膚上一片紅如椀大發水泡瘡三五點脉七至

而弦夜重于日 醫作肝經伏火治以黃連青皮香附

川芎柴胡之類進一服其夜痛極且增熱次早視之

皮膚上紅大如盤水泡瘡入加至三十餘粒 醫教以

水調白凡末要仍以前藥加青黛龍胆州進之夜痛

更甚胸中如鉤摘之狀次早視之紅已半身水泡增

至百數乃載以詢黃為吐一方以大瓜萎一枚重一

二兩者連皮搗爛加粉甘州二錢紅花五分進藥少

頃即得睡比竟已不痛矣蓋病勢已急而時 醫執尋

常瀉肝正治之劑入多苦寒益增其燥故病更加甚

水泡瘡發于外者肝鬱已久不得發越乃侮所不勝

故皮膚為之潰也瓜萎味甘寒經云泄其肝者緩其

中且其為物柔而滑潤于鬱而不逆甘緩開下又如油
之洗物未嘗不潔此其所以奏効捷也 全上

發明瓜蒌之功此藥為最然犹未盡也

吳橋治陳泉中年而脇極痛楚冷汗淋漓伏枕憎嘔
逆絕勺飲者六日已治本橋診之日無傷此畜血尔
家人曰固也昔者嘔血數升即有畜且尽矣曰畜未
尽尔尽則当夜日暮乃投補中行血一劑飲之僅内其
半中夜尸寢家人升屋而踞橋曰子之半陽当回
故服以需來復則脈血行矣第且人參湯待之焉
鳴而甦大汗大吐天下則垂滿器如腐肝敗腎

乃進參湯大汗漸止入七日乃復初或問畜血而腹
不鼓何也且昔嘔血數升其後何畜之多也曰病得
之怒而傷肝或以蹶而畜血傷肝則血不納畜血則
道不通犹之溝澮塞流則新故皆壅矣故多也 本草
汪雲程年已七十患胸脇痛轉側尤甚寒熱交作喘欬
煩躁再不能伏枕遂下之而病益深橋診之六脉
浮滑大而搏指曰病得之過飲且内故火上炎以清
涼一服而愈 全上

腸痛

范康侯年弱冠患腸痛已六七年更醫既屢更覺消瘦
食少而氣餒言懶而神疲稍遠行則心下忤然遇
勞則腸間如裂就予診告以初時但腹脇痛醫與道
遠散暫愈再發再投不應矣更醫投四磨飲亦少愈
再發再投亦不應矣入更醫用五香散越鞠凡則愈
而即發自是腹中忽有塊再更醫以為痛積進青皮
厚朴五灵脂延胡索之類塊益多時隱時現上下左
右約五七枚如拳如掌往來牽痛近有老醫謂為虛
也用當歸白芍香附鬱金之類服之了無進退予曰

似君之疾適字內矣誤治而死者可勝道哉蓋古求
方昔于此症殊無肯綮無異乎世之夢也原其誤
人之治只肝無補法四字遂使千萬生靈含冤地下
或以鍊散成勞或以香燄成隔或以攻伐成鼓或以
辛熱成癰其餘變症筆難盡述幸子青年稟賦厚而
未婚僅若此否則不可言矣今據脈已細數弦瀉臟
氣全虧幸不敷且無咳嗽夜熱尤可為第服余劑只
可希速効而不可求近功耳与生熟地沙參麥冬杞
子中仁等數劑少安至數十劑塊亦小遂以方為凡
服數年益就痊可今已娶第能博節庶無後患也蓋

此症唯兩儀羔鼠妙然有力者能用之

方某年三十餘因折筋關隔病脇痛左肋下有塊如盤
按之堅硬食下則脹痛甚不能側卧百治莫効枯瘁
如柴矣偶于約肆遇人謂之曰此病惟淳佑橋魏某
能治因就診脈之弦且急曰此肝卒症也肝叶左三
右四血是則潤而下乘今怒火傷陰其葉燥硬故耳
而不下也經曰肝病則迫胃逆咽故左葉張則反眩
而不可側卧右叶張則攣腕而不能容食味者不知
投以香散則如火上添油耳与生熟地沙參麥冬姜
仁米仁杞子川棟十劑而安

詹渭峰卅年六十餘九月中瘧后自汗余已愈之至十
一月脇痛大作醫以加味黑逍遙治之未為悞也服
一副至夜分忽暈厥欲脫蓋柴胡白朮皆非陰虛火
感之八所宜進也天明急余治脉之兩關俱伏兩尺
極微足冷過膝面如紙灰云初起左脇痛服藥后怒
移于右遂紫厥之量止而痛甚不可轉側疼處不可
按察其舌燥硬如乳荔已危矣姑与生熟地杞子各
五錢沙參麥冬各三錢服下痛少減前方加倍再入
米仁五錢姜仁二錢其痛乃后歸左脇能轉動矣仍
服前方數劑而痊予嘗治數貧人感瘧后不能起坐

不能進食宛如百合壞病脉之或弦或澁按其脇或
左或右或有塊無塊皆曰痛甚檢方諸燄散外有服
柴胡至二三兩者一二兩者察其舌或中焙或枯燄
或紫赤此皆誅伐元過傷其肝腎之害也悉以前方
相其傷之輕重為劑之大小數服而愈又趙氏子年
十六金氏女年十七其家皆素封病脇疼服逍遙散
俱五十餘劑病益困以前方去熟地与之皆不服乃
更從香燄而致蓋地黃杞子辛世咸畏之如席綠苓
州謂地黃膩而杞子熱也其殺人亦多矣言醫藥者
可不慎哉

陳理堂母年六旬外久病脇疼每發必伏枕經旬醫所
與皆香附薑金青皮木香小茴香延胡索五靈脂
胆艸之類或配六博或加五金而已近發則腰背脹
痛嘔逆便秘口燥不眠脈則兩寸鼓指兩關弦而乏
韻此將成閉格之候投以滋水養金之劑加川棟川
連一二劑愈然性畏葸為愈即止矣閉格之患其將來

乎

此與賜虎門
胡氏始同

腋氣

咸克民教授治腋氣大妙方大田螺一枚水中養之俟
開以剝淨也豆一個先用杖子或針割著才開即放
在內取出成乳即傾在盞中夏月一宿冬月六七宿
即自然成水取出用漆水絕根本也又用烘蒸餅一
枚碎作兩片糝密陀曾細末一錢許急夾在腋下畧
壓少時候冷棄之如一腋有病只用一半永絕根本
廣筆記



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



腹痛 腰痛 前陰 鶴膝風 脚病 足跟瘡腫

續名醫類案卷三十五

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類聚卷三十五

腹痛

錢唐魏之琚玉橫輯男鈇編次

周漢卿治永康人腹痰病倭行董卿解衣視之氣冲起
腹間者二其大如臂刺其一甚然鳴又刺其一亦如
之加以按摩疾遂愈明史

薛立齋治一婦人小腹脹痛小便不利或胸乳作痛或
脇肋作脹或氣逆心吻薛以為肝火而血傷脾用四
物柴胡青皮元胡索木香愈

一婦人久患腹痛去瘀血方止而復大痛諸藥不下薛

以脾胃之氣虛寒用參朮炮姜丸如黍每用數粒津
嚥下後以二味濃煎漸呷而愈

通府張孟威云其妹小腹痛服附子理中湯附子服過
八十餘枚此乃寒痛之甚不多有者

壬年仲冬金臺一男子患腹痛誤服乾姜理中丸即時
口鼻出血煩燥發狂而死

龔子才治一婦人臍腹疼痛不省人事只一劑立止人
不知者云是心氣痛誤矣方用白芍五靈脂木通去
皮二味等分再服五錢水醋各半煎至七分去渣溫
服

李北州仲夏患腹痛吐瀉兩手足捫之則熱按之則冷

外假熱內真寒之証其脉輕診則浮大重診則微細外假熱內真寒之脉

此陰寒之症也急服附子理中湯不應仍服至四劑

而愈是薛案以薛案中有人也

汪石山治一人多病形瘦年二十餘忽病腹痛磊塊起

落如波浪然日輕夜重病在血分可知医用木香沈香磨服

及服六君子湯皆不驗診其脉浮緩弦小重按似瀉

曰此血病也前為作氣治謬矣彼謂血則有形發時

虽有塊磊痛減則消而無迹非氣而何此不可少蓋不

知有形者血積也无形者血滯也滯視積稍輕耳安

得作氣論耶若然則前葯胡為不驗遂用四物湯加
棧木乳香沒葯煎服遂愈本傳

孫文垣治嚴印老長媳患腹痛有小塊蟲然腹竟冷
甚兩寸關皆滑數兩尺沈微此脾氣弱而飲食不化
又當秋令濕滯之時不利亦瀉宜預防與白朮蒼朮
茯苓甘艸白豆仁木香半夏陳皮澤瀉煎服其夜果
瀉一度次早又瀉一度小腹仍疼且裡急后重蓋其
稟賦素虛當補中兼消兼利白芍三錢桂心一錢甘
艸人參茯苓澤瀉陳皮白朮各八分升麻葛根各六
分服後脈皆軟弱不滑蟲塊亦消改以人參黃芪白

朮白芍各二錢炙甘草陳皮澤瀉葛根柴胡茯苓各
一錢調安

張道南內人以飲食忤于氣因腹痛不飲食五日矣兩
寸關弦尺滑孫曰此上焦氣虛下有鬱滯也以姜黃
青皮為君山查檳榔當歸杏仁烏葯枳殼為臣柴胡
木香為佐吳茱萸為使服后氣稍順然後用葱二斤
煎湯浴洗腰腹即將熟葱擦摩使氣通透鬱滯外洗
治法
畢即安卧少頃其夜大便通先下皆黑硬結塊后皆
清水此積滯行而正氣靈也以建中湯加山查茯苓
澤瀉柴胡香附姜連而痊

李士才治一人鬱怒之餘胸腹脹痛先服消痰疎氣化食之劑不效更以人參補之亦不效診之六脉弦而數此內有鬱熱為寒涼飲食壅之而痛用黃連二錢芫子一錢五分橘紅白豆蔻各二錢鈎藤木香各八分官桂二錢加姜汁半杯二劑痛止四劑后加乾姜人參而安

焦太史當臍切痛作氣食治之無功李診之曰當臍者少陰腎之部位也况脉沈而弱与氣食何干非徒無益反害真元以八味料服十日而痊

胡京卿少腹作痛連于兩脇服疎肝之劑一月以來日

甚一日李診之左關尺俱沈遲治以理中湯加吳茱萸十劑全愈

柴岫青治廣撫諱蘇昌將赴瀋陽京兆任時伊嫂腹痛吐酸日夜轉側呼號已治未求一診以決之其脉微緊受寒所致並非危症何用驚惶若此蘇云昨服藥後稍定以方就改并屬定方柴見前方係附子理中湯頗合是症遂不另立

王海藏治姬提領因疫服涼劑數日遂病臍腹下大痛几至于死与姜附等劑虽稍甦痛不已随奉方内倍白芍服之愈

陸肖愚治尤少溪年近六十性急多怒困食冷粽四枚
遂患腹痛并脇亦痛医用平胃散加枳寔黃連不効
彼亦知其家潤字丸方以五錢分三服令一日內服
之大便已瀉而痛仍未止謂通則不痛今通而仍痛
為力淺而積未盡也再以五錢令一日服之大便數
十行皆清水而痛反加剝踊叫不已飲食不進面色
青病勢極危陸診之弦細沈弱右關弦而有力曰虛
中有寔消則元氣即脫補則腹痛尚劇因用理中湯
料五錢配枳寔五錢一日二劑始下堅積在許是夜
痛大減明日減枳寔之半又二劑而腹疼全止第脇

間尚微痛去枳寔加青皮吳茱萸數劑而痊后以調
氣養榮湯理之

張三錫治一人腹痛而瀉口乾面時赤乃食積也與木
香檳榔丸服愈

一酒客每日腹痛瀉黃沫知積熱也投芩連厚朴炒廔
子木通澤瀉赤苓三劑少可復以酒蒸大黃為丸酒
下二錢三服愈

一婦人小腹塊痛醫作陰治投熱劑不應又作燦矢治
者硝黃潤腸丸等藥屢用不減詢之七日前作寒熱
起遂腹痛左三部皆絕小無力右寸關俱弦滑必起

腹痛

五
屋

于外感內傷挾氣下早故食滯不下每痛則下黃水
止作無時下傷津液故作渴遂以炒白芍茯苓保脾
木香青皮流氣炒山卮清塊中之火當歸潤燥陳皮
甘州和中小水不利加澤瀉升麻車前二劑黃水虽
少痛塊不减随用葱豉慰法復投二劑二便大去而
安

朱丹溪治一嬾上腹大痛連及兩脇以香附末湯調探
吐而安

陳良甫治家提幹內人病心腹脹痛衆投木香檳榔大
腹白芍姜桂之類病益甚診之六脉弦緊而和不似

病脉但診時兩手如火以此知其熱痛也衆問治法
曰大凡心腹刺痛可不便作虛冷治之或曰非冷而
何熱即生風冷生氣是也曰不然雜經云虛則痒寔
則痛又仲景曰腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝
加大黃病家云荆布素來質弱日有可辨處遇痛時
使一婢按之若痛止是虛寒症也若按之轉甚手不
可近此寔痛也即令一婢按之手不可近叫喚異常
曰此寔熱無可疑者當用大柴胡湯治之衆皆不許
乃与責狀而投之遂愈

羅謙甫始副使覃郎中年四十九歲至丙寅春遂病脘

腹冷疼完穀不化是脂寒而逆皮膏不仁精神困弱
診其脉沈細而微遂投以大熱甘辛之劑及灸氣海
百壯三里二穴各三七壯陽輔各二七壯三壯后以
葱熨灸瘡皆不發復灸前穴依前壯數亦不發十日
后瘡亦更不作膿瘡口皆乾癸丑歲
前云丙寅此云
癸丑蓋追述享
針之時也后戊辰乃
丙寅用灸之后一年予隨朝承應冬屯于瓜忽都地
而季針于甯子声先生因誦穴諭曰凡用針者氣不
至而不効灸之亦不發火抵外氣空虛不能作膿失
其所養故也更加不慎和氣加之病必不退異日因
語針科忽教授亦以為然戊辰春副使除益州府判

到任未几時風疾半身麻木自汗惡風妄喜笑又多
健忘諸言微澁醫以續命湯復發其汗津液重竭其
症更甚因求醫还家日久神氣昏憤形容消瘦飲食
無味便溺遺矢扶而後起屢更醫為皆不能効因思
內經云陽氣者若天与日失其所則折壽而不彰今
因此病而知子声先生之言矣或曰副使肥甘足于
口輕暖足于体使令足于前所言無不如意君言失
其所養何也予曰汝言所養之口体者也予論所養
養性命者也且覃氏壯年得志不知所養之正務快
于心精神耗散血氣空虛因致此疾灵樞云人年十

歲五藏始定血氣已通其氣在下故好走二十歲血
氣始盛肌肉方長故好趨三十歲五藏大定肌肉堅
血氣盛滿故好步四十歲五藏六府十二經脈皆大
盛以子定膝理始疎華容頽落髮頰斑白平盛不搖
故好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄胆汁始減目始
不明六十歲心氣始衰善憂悲血氣懈惰故好卧七
十歲脾氣始衰皮膚已枯八十歲肺氣衰魂魄散
離故言善悞九十歲腎氣焦藏枯經脈空虛百歲五
藏皆虛神氣皆去形骸獨居而終矣蓋精神有限嗜
慾無窮輕喪性命一失難復其覃氏之謂也欵若嫌
文煩

經語可以自八十歲
至百歲或少而衰多

朱丹溪治一人痛當臍綿綿不已脈弦伏無力因作扶
陰治理中加桂附服愈

薛立齋治羅給事小腹急痛大便欲去不去此脾腎氣
虛而下陷也用補中益氣送八味丸二劑而愈此等
症候因利藥致損成腫脹死者甚多

副即李孟卿常患腹痛每治以補中益氣湯加山梔即
愈一日因怒腹痛脈弦緊以前湯吞左金丸三十粒
而愈

一婦人心腹痛諸藥不効用炒黑山梔更治愈

傳青生治一婦妬惡夫有所昵忽患腹痛展轉地上不可忍其夫求先生令持散瓦釜置婦床前搗于杵服之立止 劉紹敏几畹古文

一婦人少腹痛百藥不効一医用杉木節童便煎服下血而愈 醫子綱目

汪訥菴室病腹中啾唧經兩月有友人見招飲以芦稷

燒酒一醉而愈

芦稷最能和中治霍亂如神

華佗傳有人病腹中半切痛十餘日中髭眉墜落佗曰是脾半腐可剝腹養治也使飲葯令卧 或即麻皮帶散也 腹就視脾果半腐壞以刀斷之刮去惡肉以膏傅瘡飲

之以葯百日卒復 三國志

趙後先治保義即垣公苦冷疾時方大暑俾就屋開三天窓于日光下射處使垣仰卧揉艾遍鋪腹上約數斤移日時先透臍腹不可忍俄而腹中雷鳴下瀉口鼻間皆濃艾氣乃止明日復為之如是一月疾良已乃合滿百二十日宿疴如洗壯健如少年時趙曰此孫真人秘訣也世人但知灼艾而不知點穴又不審虛寔徒受痛楚損耗氣力日者太陽真火艾既遍復徐：照射入腹之功極大五六月若秋冬間當以厚艾鋪腹蒙以綿衣熨斗盛灰火慢熨之以聞濃艾

氣為度亦其次也

繆仲淳治高存之長即患腹痛問曰按之痛更甚否曰按之則痛緩曰此虛症也即以人參等藥飲之數劑不愈但為入口則痛止其痛每以卯時發得藥漸安至午痛復發又進再煎而安近晚再發又進三劑而安睡則不復痛矣如是者月餘存之疑之更他醫藥則痛愈甚為入痛不止矣以是服繆方不輒一年後漸愈服藥六百劑全痊人參白芍甘草麥冬當歸橘紅水瓜萸肉黃柏鱉甲或去當歸黃柏加牛膝秦苑棗仁石斛延胡索

包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜無間百藥不效診其脈兩寸關俱伏獨兩尺寔大按之愈甚詢知其起于暴怒風木鬱于地中投以芎藭上柴胡中升麻下下咽暖氣數十聲痛立已而作喘曰是升之大驟也以四磨湯即平

蔣仲芳治吳代母年六十餘患腹痛瀉四五行已三四年矣遍治不効診之三尺沈緊曰內有沈積也用熟大黃三錢入本藥煎服一劑而安沈抄本

示吉日毛古來忽患真寒症腹痛自汗四肢厥冷脈絕諸醫束手予用回陽急掇而痊吳石虹曰此症暫愈

后必下膿血則危矣數日后果下痢如魚腦全無臭
氣投參附不應忽思三物桃花湯仲景法也為丸与
之三四服愈

腰痛

陶弘景曰相傳有人患腰脚弱往栗樹下食數升便能
起行此是補腎之義然應生啖若服餅則宜蒸曝之
按蘇子由詩曰老去自添腰脚弱山翁服栗旧傳方
客乘為說晨与曉三咽徐收白玉漿此得食栗之訣
也 本草綱目

竇材治一老人腰脚痛不能行步今灸關元三百壯更
服金液丹強健如前

張仲文傳神仙灸法治腰重痛不可轉側起坐艱難乃
冷痺脚筋牽痛不可屈伸灸曲踈兩文頭左右脚四

處各三壯每灸一脚二火齊下艾炷竟燒至肉初竟
疼便用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸至人定以
米藏府自動一二行或轉動如雷聲其疾立痊此法
神効不可量也 經目

張子和治張進道病腰痛年餘不除診其兩手脈沈寔
有力以通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒
斷然為細末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先
以椒姜淹去腥水摻藥在內包以荷葉外以濕紙數
重封以文武火燒熟臨卧細嚼溫酒送下每旦以無
比山藥丸數日愈

子和女僮冬間日途來面赤如火至聽陽病腰膀大痛
裡急後重病則見思神張曰此少陽經也在身側為
相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病犹未痊人皆
怪之以為有祟張大怒曰馱鬼也復令調胃承氣湯
二兩加牽牛頭末一兩同煎服之大下數十行約一
二疋方捨其杖策但發渴恣其飲水西瓜梨柿等張
由凡治火莫如水：天地之至陰也藥飲水一二桶
犹竟微痛乃刺其陽陵穴以伸其滯足少陽胆經之
穴也自是方安女僮曰言此病每一歲須瀉五七次
今年不曾瀉故如是也常仲明悟其言以身有濕熱

病故一歲亦瀉十餘行病始已此可与智者言難与
愚者論也

一人六十餘病腰尻脊胯俱痛數年不痊日靜夜踈天
病往來痛作必令人以手槌擊至五更鷄鳴則漸減
向曙則痛止左右及病者皆作鬼神陰譴百方禱祝
無驗淹延歲月內瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候
一死張診其兩手脉皆沉滯堅勁力如張絙謂之曰
病虽瘦難于食然腰尻脊胯皆痛者必大便堅燥其
左右日有五七日或八九日見燥矢一兩塊如彈丸
結硬不可言曾令人剝取之僵下一兩塊渾身燥痒

皮膚皴揭枯澁如麸片既得病之虛寔隨用大承氣
湯加姜枣煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑盖
病者聞暖則悅聞寒則惧說補則後說瀉則逆此弊
非一日也而况一齊人傳之衆楚人咻之乎及煎成
使稍熱咽之自少至多累至三日天且晚藏府下泄
四五行約半盆以燈視之皆燥矢 塊及瘀血襍

穢不可近須臾痛減几分昏睡如常人至明日
將夕始覺飢而索粥溫涼与之又因睡一二日其痛
尽去次令飲食調養日服導飲凡甘露散滑利便溺
之藥四十餘日乃復盖虛結与閉虽久犹可解而决

去腰脊膀胱痛者足太陽膀胱經也。膀胱足少陽胆經之所過也。唯經曰諸痛為寔，又痛隨利減，不利則痛。

何由去故？凡燔症皆三陽症也。病者既痊，壽乃八十。

歲其治法及論症迥非東垣丹溪所能企及。余常遇此等症不能奏效，設此案不禁太息終日。或入

燔門或入痛脾

衛德新因之折津，冬月飲寒則冷病，腰常直不能屈伸。

兩足沈重，難于行步途中，以沐昇通程。問醫皆云：

腎虛用茯苓、巴戟、附子、鹿茸、大便反秘、潮熱上升，將

經歲矣，乃乞極張。曰：此十日之効耳。衛曰：一月亦

非遲。張曰：足太傷，經血多病，則腰似折，脰如結，臑如

裂，入陽所致，為屈伸不利。况腰者腎之腑也，身中之

大關節，今即既強直而不利，宜鹹以軟之。頓服則知

柔。難經曰：強方入房，則腎傷而髓枯。則高骨乃壞，

而不用，与此用疑訛同。令君之症，太陽為寒，所過血墜，

下滯腰間也。原缺必有積血，非腎也。節次以

葯下，可數百行，去血一二斗次，以九曲玲瓏灶蒸之，

汗出三五次而愈。初蒸時至五日，問曰：腹中鳴否？曰：

未也。至六日，竟鳴七日而起。已能揖人。張曰：病有熱

者勿蒸，則損人目也。旧案与此有异同去，留再商。

饒之城中某病腎虛腰痛，沙隨先生以其尊人所傳家

誼叔方用杜仲酒浸透炙乾搗羅為末無灰酒調下
三服而愈 槎庵小乘

薛立齋治一婦人腰痛三年矣痛作每面青頭暈目緊
薛以為肝脾氣虛用補肝散而痊三年后因勞役患
頭痛魚惡心用補中益氣湯加茯苓半夏蔓荊子而
愈

一婦人苦腰痛數年不痊薛用白朮一味大剖服不三
月而痊乃胃氣虛也故用白朮

一婦人先腰胯作痛後而腿亦痛薛以為是三陰虛寒
外邪所傷用續命湯及獨活寄生湯或作或止所用

用飲食極熱腹中方快薛曰邪氣去而元氣虛寒也
診之脉沈細用養肝散及十全大補而痊

一婦人所患同前但發熱作渴喜冷飲食脉洪數按之
遲清薛以為血虛有熱用羚羊角散去換柳加白朮
茯苓數劑更用逍遙散而痊

一婦人患前症時或腿膝作痛脉浮數按之遲緩此元
氣虛而風濕所乘用獨活寄生湯少安又用八珍湯
而安

一婦人用怒患前症寒熱往來口苦不食晡熱內熱薛
以為肝火血虛先用小柴胡山梔少愈又用加味道

遙而痊

一婦人患前症寒熱頭痛殊似傷寒此寒邪之症用換蘇敗毒散而安

龔子才治一人跌后腰痛用定痛等為不効氣血日衰面目黧色齷日腰為腎之府虽日閃傷寔腎經虛弱所致也遂用杜仲補骨脂五味子山萸後蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神曲各二錢食后服不月而痊

神曲何以加入

張路玉治沈雲步媳常有腰疼帶下之疾或時勞動則日晡便有微熱診其兩尺皆弦而右寸關虛濡少力

此手足太陰氣衰專化之令不及也合用異攻散加當歸丹皮調補胃中營氣兼杜仲以壯關節澤瀉以利州都諸症自愈矣

江蘊巡撫張公嚴冬腰腹疼重甲夜延診候脉得沈滑而駛遂与導瘦兼五苓之製一劑而腹痛止三啜而腰胯弛縱自如未尝用腰腹之藥

沈為在裡滑為痰駛為熱故清導分

盧不遠治陳孟抒父六月中受寒尚淹未甚也至次年二月忽小腹与腰急痛即令人緊挽外腎稍鬆便

欲死与羌活黃柏茯苓肉桂等味令刮委中痛止而

足軟至三月天熱身發紫斑有汗至是乃愈此小腸
腑病也經曰小腸病者腰脊挾臑而痛以羌活入太
陽小腸故痛隨愈其足軟未痊者原以寒邪鬱火故
需夏時則火力全而血脉之邪始去所以斑出足汗
百骸暢美寒淨而火遂融通也

吳孚先治尹瑞之腰痛異常從目內皆進葯而愈或問
之曰是乃精明穴也在目內皆紅肉中土行足太陽
經于腰下背應足少陰通于心腹故心腹腰背之痛
從精明進葯良有奇驗古來神聖有從耳進葯者病
愈而耳聾針之則愈矣

蘇頌治一女子忽得小腹冲痛月水初來便覺腰間切
痛連脊間如刀錐所刺不可忍衆醫不別謂是鬼痊
妄服諸葯終無所益其疫益增審察前狀相當即用
積雪州其葯夏五月正放花時即來晒乾搗篩為末
每服二方寸匕和好醋二小合平旦空心頓服之每
旦一服以知為度 本州經目 天室單行方

張三錫治一人瘦弱性腹好酒致腰及兩胫痛不可忍
作腎虛治不應診之左脉濡細而數乃血虛受熱也
遂以四物湯生地加知柏杜仲肉桂小許一劑知十
劑已

一人因大勞又過飲酒致濕熱乘虛入客于經腰痛夜更甚不得俯仰脈濡而痛先与拈痛去參朮二帖少愈遂用四物加杜仲牛膝独活肉桂而安

一人脉症同上服拈痛漸減一人改用桂附遂攻出一癰膿出補愈

一人肥盛而肢節痛腰更甚脉沈濡而滑知濕疫也与二陳加南星三朮二活秦防十劑愈

一人因墜馬後腰痛不止日輕夜重瘀血与四物去地加肉桂桃仁泥蘇木四服大下而痊

王叔權曰舍弟腰疼出入甚艰余用火針微頻刺腎

俞則行履如故初不灸也屢有人腰背偃倭來覓點灸予意其是筋病使然為點陽陵泉令歸灸而痊筋會陽陵泉也然則腰疼又不可專泥腎俞不灸其他穴也

陳三農治一士精神倦怠腰膝異痛不可忍咸謂腎至腰膝乃用桂附之劑延兩月竟四肢痿軟腰膝寒冷遂恣服熱葯了無疑悞診之脉伏于下反重按之振指有力此陽盛格陰乃火熱過極及見勝己之化以黃柏三錢胆朮三錢芩連芩子各一錢五分加生姜七片為之向導乘熱搗飲移時便竟腰間暢快二劑

痛若失

立齋治一婦人患腰痛脚弱弛長不能動履以人參散毒散加蒼朮黃柏澤瀉而安

一人体厚腰間常冷与腎著湯加星半蒼朮三服愈

朱鶴山老年久患腰痛用茯苓三錢枸杞一两生地二錢麥冬五錢人參二錢陳皮二錢白朮三錢河水煎日服一副強健生子八十未艾

繆仲淳治錢晉吾文孝腰痛甚診之氣鬱兼有傷瘀血停滯投以牛膝五錢當歸二錢五分炙甘草一錢蘇梗一錢五分加皮三錢橘紅二錢製香附二錢續斷

二錢水一鍾煎八分既時加童便一大杯服二劑安
全上

繆之外祖李思塘少年患腰痛至不能坐立諸醫以補腎藥治之不效朱遠齋者湖明醫也用潤字號丸藥下之去黑矢數升盖濕疫乘虛流入腎中作苦瘦去

方以補藥滋腎不逾月起惜其方傳者不真全上朱与陸

卷愚反善陸氏當用潤字丸治病

李李虬曰先安人因亡女忽患腰痛轉則不便至不能張口受食投以鹿角膠不愈以濕疫治之亦不効遍走使延仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日

矣用白芍製香附各三錢橘紅白芷肉桂各三錢炙
艸一錢乳香沒藥各七分半灯心同研細臨服下之
一劑腰脫然竟漏体疼仲淳曰愈矣再煎淳服立起
予駭問故仲淳曰此在素問木鬱則達之顧藥君不
識耳全上

薛立齋治一男子年四十餘患腰痛服流氣飲寄生湯
不應以热手熨之少可盖脉沈弦腎虛所以補腎丸
愈之

張景岳治董翁年六旬資稟素壯因嗜火酒致濕熱聚
于太陽小腸膀胱忽病腰痛不可忍至求自尽診之六脉

甚洪滑且小水不通而膀胱脹急遂以大分清飲倍
加黃柏胆艸一劑便行痛失

劉宏璧曰一友病腰痛醫以杜仲補骨脂等治之不効
診其脉浮細緩止知為風傷血脉耳与当歸四逆湯
劑尽痛止次日前医来深詆此湯之謬復進杜仲等
藥腰痛如故怪而問之曰子或又服他藥耶反以寔
对令再服四逆湯即已

錢因賓治榆林張叅戎体厚力大素善騎射壯時縱慾
水敗火虧腰胯如折其脉寸關浮大而尺若有若無
不可以指非人扶不起已三年筋骨皆冷以六味丸

加河車膏皂鹿膠參桂歸附補其真元腎命年餘方能步又五年卒

腰痛

陸茂才父年七十素有肝疾偶于春分有玉山顶燒香
育王之高為湖上衆山之最高晨而往晡而歸足力
可云健矣至夜忽腰大痛不可轉側或以勞傷兼感
冒宜先表散与羌活秦艽等味一劑痛益甚脉之弦
硬參伍不調二便俱秘面黯囊縮日夜不得眠曰此
肝腎大傷疎泄已廢症瀕危矣豈可再投風葯以養
湯加牛膝當歸痛畧減二便仍秘且嘔惡蕪餽此
地氣不得下行而反上攻也前方重内熟地外以田
螺独蒜搗爛擊臍下二便既行嘔餽亦止痛忽移入

少腹控引畢凡前方加杞子至一兩再入白芍甘州
數劑漸痊乃素性畏葸為停數日竟復甚又與數劑而
安

前陰

朱丹溪治吳江王氏子年三十歲忽陰挺長腫而痛脉
數而實用朴硝荊芥湯浸洗又用三一承氣湯大下
之愈 本艸經目

姚蒙字以正巡撫鄒來孝嘗使視脉蒙既叙病原因曰
公根器別有一竅出汗水來孝大驚曰此隱疾何由
知蒙曰以脉得之左關滑而緩肝第四叶有漏洞下
相通來孝改容謝 江南通志

薛立齋治一婦人陰中腫悶小便澀滯兩脇作痛內熱
晡熱月經不調時或寒熱此因肝脾鬱怒元氣下陷

濕熱菟滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解菟結補脾氣
升元氣夕用加味道遙散肝火生肝血除濕熱各
數劑諸症悉退又用四君芎歸丹皮調補肝脾而經
水如前

一婦人陰中寒冷小便黃澀內熱寒熱口苦脇脹此因
肝經濕熱用龍胆湯祛利濕熱用加味道遙散調之
而安

一婦人所患同前更寒熱嘔吐兩股腫痛先用小柴胡
加山梔一劑寒熱嘔吐頓止次用龍胆瀉肝湯一劑
腫痛俱止

一婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食少思大便
不寔下元虛寒治以八味丸月餘食加便寔又一月
全愈

一婦人陰腫下墜悶痛出水胸腹不利小便頻數內熱
晡熱口苦耳鳴此肝脾火症用小柴胡加車前胆州
苓朮升麻二劑少愈又用加味道遙加升麻數劑少
愈乃以加味歸脾加升柴并補中益氣加梔數劑頓
愈仍用加味道遙歸脾而愈

一婦人患前症熱痛或用寒涼敗毒藥飲食不入時欲
作嘔小腹重墜此脾胃復損元氣下陷先用補中益

氣加炮姜二劑重墜頓愈又加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸脾湯少加柴胡升麻并六味地黄丸

康

陳三農治一婦陰中有一物如石塞之收痛不可當此石瘕也治以火黃肉桂三稜煨榔樞仁血竭元胡索澤瀉而愈宜入瘕門

孫文垣治一婦人暑月小便不利而痛玉戶腫大便血發熱左脉弦數右寸短弱此肺氣不足肝火太熾蓋肝為血海又主疎洩二便玉戶為肝經所絡之地治當疎決肝經壅滯俾氣暢則新血得以歸經熱解則

小水可不痛而腫亦可消矣以滑石三錢桃仁當歸白芍各一錢柴胡黃連人參各八分川芎六分甘艸肉桂白芷各三分四劑愈

馬鳳林內子有隱疾每月汎行子戶

而不痛過三五日以銀簪燒紅針破出白膿杯許而消不必煮葯亦無疤痕初用針刺近則以指搯之膿即出但汎行即發上下左右無定所第不離子戶于今八年內外科歷治不効且致不孕孫曰此中焦濕痰隨經水下流壅于子戶也經去而痰凝則化為膿本來非毒故不痛

怪病之謂痰

用白螺蛸壳煨火存性為

君南星半夏為臣柴胡甘艸為佐麩糊為丸令早晚服之未終劑而汎行不腫次年生子

一嬖有隱疾其夫三造門而不言繼至欲言而面頰孫開喻之乃俛首曰言之無任主臣先生長者諒無哂山婁子戶中突生一物初長可三寸今則五寸餘矣狀如堅筋已赤大可拱把脹而且痛不便起止增寒壯熱寢食俱廢報于言欲求自尽逡巡百日矣孫曰乃陰挺疝也厥陰肝經之脉女子下系庭孔濕熱則陰挺犹木有濕熱而生草也畢竟熱則挺與龍胆肝湯以及蝟皮散當歸黃芩牡蠣蝟皮赤芍為末每

用三錢空心米飲調下去后數月來報云前疝果痊茲為汎期一月不至敢問曰此有身也彼疑疾甫愈未必能孕謂曰前恙乃肝經有餘之疝肝為血海女子血盛則懷胎據血盛當先期今汎逾期寔孕耳非病也后果生子

尚某言昔在粵東与都司李某交善後李沒其妻售濠畔衙宅与尚仍分院而居西家往來如親串然一日李妻私語尚夫人有女及笄而病且甚異欲求尚診之而难于言夫人以告尚曰李君夙交好言之何傷李妻乃言女初患腹痛久之溲溺甚艱溲内有物

能游泳或二或三似有鱗鬣者取視之乃比目半魚
体也身微黑止其一日其背白置水中果如所云試
診之乃肝氣久鬱所致投以疎肝之劑而愈李河南
人居易錄

有孀婦患陰中痒不可告人斬至委頓此婦平日虔奉
大士忽有尼僧來与葯一色日以此洗之數洗而愈
其葯乃蛇床子吳萸苦參也

何首烏本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順用
南河縣人祖能嗣本名田兗生而閹溺年五十八無
妻子醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久而

解：合三四田兗心異之掘根持問鄉人無能識者
遂曝乾搗末酒服七日而思人道百日而舊疾皆除
十年而生數男後改名能嗣又与子庭服加壽一百
六十歲首烏服葯亦百三十歲唐元和七年曾文象
遇茅山老人遂傳其事 甘泉叢錄

富家子唐靖瘡發于陰至爛道人周子真曰病得之欲
泄而不可泄也 治宜龙胆瀉肝湯外
以甘州木參之

有人陰冷漸入陰囊腫滿日夜疼悶不已用上好川
椒為末帛色裹囊如不竟熱烘熱更妙內煎大薊湯
汁服妙陰冷而丸如冰出汗兩脚痿弱宜補肝湯千金

方

王節齋曰男子陰痿不起古才多云命門火衰祖氣虛固有之矣然亦有鬱火盛而致痿者經云旺火食氣譬如人在夏暑而倦怠遇冬寒而堅強予嘗親見腎經鬱火而有此症令服黃柏知母治之堅腎之藥而効故須審察不可徧認為火衰也

薛立齋治一媼人吐痰發熱遍身作痛小便頻數陰中作痒日晡益甚曰此肝脾血虛氣滯而兼濕熱也用加味道遙散加車前子而愈

馬元儀治尤悔翁姪患陰莖作痛之甚而憤遂昏迷不醒凡閱月診其兩脉浮虛而澁浮為氣虛澁為精傷陰陽兩虛之候得之憂思勞倦而傷中也經云陽明主潤宗筋又陽者氣精則養神柔則養筋令悒鬱勞倦氣血兩傷故令作痛以當歸補血湯加入參炙艸榮卷氣血桂心秦艸紅花宣通血脉一劑而痛止復診而脉沈微連進大劑參附諸症已平惟徹夜不寐用歸脾湯調之

有人陰脾匿以赤土搽之令服八味凡而愈一鬼陰腫醫亦以赤土搽之愈若久病而陰腫病已不可抹宜連灸水分穴蓋水分能分水穀水穀不分故陰腫不

特陰腫也虛亦宜服禹餘糧云 即効方

陳良甫家婢患陰蝕就瘡家治不痊蝕處作兩瘡深早
寸良甫于消子方中檢得甘州湯方仍以自處蚺蛇
胆散不經七日瘡乃平復甚効凡抹十八人手下即
活

葛氏云此見人患莖頭腫攻下瘡欲斷者以猪肉湯漬
洗之再用黃連黃柏末搽之又方蜜煎甘州末搽之
千金方

立齋治一嬾人隱內膿水淋漓或痒或痛狀如虫行診
之少陰脉滑數此陰中有瘡也名曰蠹由心神煩鬱

胃氣虛弱氣血凝滯所致當升麻白芷黃連木通當
歸川芎白木茯苓柴胡煎服白搗腫湯熏洗更搽蒲
黃水銀兩月餘而愈或有胞絡虛風邪乘陰血氣相
搏令氣否塞致陰腫痛當以菖蒲散治之更以枳寔
炒熱帛包熨之冷則再炒或有子臟虛冷氣下冲致
陰胞出謂之下脫或因產努力而脫者以當歸散治
之久不愈者補中益氣加升柴

靳閣老子陰莖腫痛服五苓散等葯不効診其脉左關
弦數此肝經積熱而成以小柴胡湯送芦荟丸一服
勢去三服愈

一婦人陰器腫痛小水澀滯遇晚寒熱交作此肝經濕熱為患以龍胆瀉肝湯二服小水通利又以四物湯並小柴胡加花粉木通山梔服之而愈外科正宗以下共六案未選入

一婦人無故發熱月餘忽陰中突出一物如鷄冠一片此肝鬱脾虛所致以補中益氣湯加杏皮梔苓柴胡甘艸外以白芷蒼朮紫蘇煎湯每日熏洗十餘日其患竟小仍前湯倍參朮而安

一婦人無故陰中作痒后五心煩熱作渴不寐此思慮太過致心胃不交以四物湯加龍胆艸山梔知母黃連

以銀杏散納入陰中二日其痒即止又朝以八味丸午用歸脾加銀柴胡茵陳而愈

一婦人陰器半边腫痛身發寒熱口乾便秘脉寔有力以內疎黃連湯一劑大便通利口乾乃止惟腫痛尤甚此濕毒結聚欲為膿也以四物湯加角針澤瀉一劑膿熟脹痛又以透膿散一服出臭膿杯許痛止以八珍加丹澤十劑安

一婦人肝經風濕下流陰器浮腫痒甚至抓出血不痛以消風散加黃參胆艸澤瀉木通山梔外以蛇床子湯熏洗搽擦銀杏散而愈

一婦人孀居十餘年陰器作痒生虫含忍不言后陰器
蝕爛已蝕內臟疋羸發熱作渴脉洪而數詢其痒痛
日久陰器黑腐小水不禁內臟已壞不可用藥彼苦
求治曰痒者虫也痛者損也先用鯽魚數枚以香料
糝炙魚熟以絲綿薄色納入陰中夾之良久取出紅
虫長寸餘者五六短者無數細如絲線二百餘條置
溫湯中搖擺片時方死彼家惟脫以為可治曰再取
再有生化无窮強投養血清肝藥不効竟死

錢因賓曰浙湖戴氏女年五歲胎生雙陰溺後上出下
戶亦流因母病延診以私語言及余曰此女天生雙
陰也不開楞嚴經云五種不男之人即此類也長大
經行生子如常以上竅為正從此勿疑待嫁

鶴膝風

朱丹溪治一文人年七十歲患脚膝疼稍腫此血虛而
挾濕熱也用生地歸頭白芍蒼朮炒柏川芎桂木通
煎食前服

經日

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀枯左右
一點發痛延及膝髁日靜夜甚痛處惡寒或渴或不
渴或痞或不痞醫多用風藥兼補以次年春其膝漸
腫痛更甚食減形削至春末膝腫如碗不可屈申診
甚脈左弦大頗寔寸澁甚大率皆數知其小便必數
而短遂作飲食瘦積在太陰陽明治之炒柏一兩生

甘艸稍屑犀角蒼朮鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛
膝木通白芍各五錢遇暄熱加條苓三錢為細末每
三錢重与生姜自然汁調研細多少以水盪起煎令
沸乘熱食前飲之一日夜兩次与至半月後數脉漸
減痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩当歸半兩如
煎服又与半月腫漸減食前進不惡寒惟脚膝痠軟
未能久立久行去蒼朮黃芩時当夏熱加炒柏至一
兩半依本方内加牛膝春夏用莖叶冬用根杵取汁
用之効尤速須新酒肉濕麩胡椒当仲夏加生地半
兩冬加萸桂

鎮江外科史姓者曾治人鶴膝風以蝦蟇用椀鋒累
破腹有縫不可穿縛置患處待動脇移時受毒即死
如前再易一枚不過二三枚愈 戒安漫筆

孫文垣治程紹溪中年患鶴膝風兩腿及腿肚内外腫
肉尽消兩膝腫大乃酒后縱慾所致且四肢膿疥淫
濕腌臢自分必死家人以病久一醫為破家不復求治
矣孫以鄰人之親往診左寸關浮數左寸短弱兩尺沈
微口此氣虛血熱之候法当大補壯其筋骨犹可
冀生第非百日不見功盖補血為速効必漸而濡之
關節通利骨正筋柔腿肉自生初以龜板苡仁各三

二十餘劑胃氣少醒又用大防風湯與歸脾湯膝腫漸消用加味道遙散大防風湯全消又用八珍湯加丹皮調安

一婦人患前症腫痛寒熱先用大防風湯一劑又用加味道遙四劑月餘腫痛漸退惑于速效另服祛風散毒虛症蜂起仍用大防風為主佐以十全大補而消又服大補湯而痊

一婦人患前症兩切中腿股筋牽作痛內熱寒熱此肝火氣滯之症先用加味小柴胡湯四劑后以加味道遙散為主佐以大防風湯而消又患痢后兩膝腫痛

寒熱往來用十全大補湯為主佐以大防風湯而仍消

一婦人患之雖潰而腫不消朝寒暮熱飲食不入經水三四月一至此屬肝脾氣血俱虛也用補中益氣加味歸脾二湯各三十餘劑腫漸消而寒熱止又佐以大防風月餘而能步履再月餘經行如期又服六味丸八珍湯愈

一男子腿筋弛長月餘兩膝腫痛此陰虛濕熱所乘也用六味丸為主佐以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣而消

通府劉國威先筋掣骨痛右膝漫腫用化疫消毒之劑
腫痛益甚食少倦加祛風消毒等藥寒熱作嘔大
便不寔用二陳除濕之類腫起色赤內痛如錐診其
脈滑而無力此膿已成元氣虛而不能潰也用十全
大補湯四劑佐以大防風陽一劑而潰又百餘劑而
痊

一男子腿痛膝腫脈浮按之弦緊此肝腎虛弱也用大
防風湯二劑已退彼惑于附子有毒乃服治瘡之藥
日漸消瘦虛症漸至復求治曰倦怠消瘦脾胃衰而
不能營運也小便不禁膀胱虛而不能約制也焮熱

虛痞胃氣弱而不能化也恍惚健忘精失而情亂也
惡症蜂集辭之後果歿與下案畧同

一男子患腿痛膝微腫輕診則浮按之弦緊此霍亂風
也與大防風湯二劑已退二三波謂附子有毒乃服
敗毒藥日漸消瘦復求治薛謂今飲食不為肌膚水
穀不能運化精微灌溉藏府周身百神將何依夫
氣短而促真氣損也怠惰嗜卧脾氣衰也小便不禁
膀胱不藏也時有躁熱心下虛痞胃氣不能上榮也
恍惚健忘神明亂也不治后果然此症多患于不足
之人故以加減小續命大防風二湯有效若用功毒

藥必誤

一婦人膝腫痛遇寒痛尤甚月餘不愈諸藥不應脈弦緊此寒邪深伏于內也用大防風湯及火龍羔治之而消大抵此症虽云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱邪氣得以深入若真氣壯寔邪氣烏能為患耶故附骨瘰疽及雀膝風症虛者多患之前入用附子者以溫補腎氣而又能行葯勢散寒邪也亦有体虛之人秋夏露卧為冷氣所襲寒熱伏結多成此症不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若被賊風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛止須大防風湯及火龍羔治之若失治為彎曲偏枯有堅如硬石謂之石疽若緩熱積日不潰面色紫赤皮肉俱臃名緩疽其始未皆宜服前葯欲其驅散寒邪以補虛托裡也

一人患雀膝風五年專葯三日即愈王心極傳乳香沒葯各一錢五分地骨皮三錢無名異五錢射香一分各為末車前艸汁入老酒調粵廣筆記

立齋治一男子左膝腫大三月不潰謂体虛之人風邪襲于骨節使氣滯而不行故膝愈大而腿愈細名曰

霍膝風遂以大防風湯三十餘劑而消張上舍亦患此伏枕半年流膿三月彼云初服大防風湯去附子將潰服十宣散今用十全大補湯而去肉桂俱不應視其症甚弱乃以十全大補湯每帖加附子一錢服二十餘劑少愈乃去附子五分服至三十餘劑將愈乃去附子更以三十餘行而痊蓋桂附當用而不用則無功也

王汝遠膝腿腫筋骨痛服十宣散不應脈沈細以五積散二劑而痛止更以十宣散去桔梗加半膝杜仲三十餘劑膿潰而愈

脚

蘇頌曰水氣脚氣散為急病有人患此以袋盛赤小豆

朝夕踐踏展轉之久

遂愈

本草綱目今人多誤為相思子其實即食豆

赤腫而紫小者耳其紅而大者不入藥

竇材治一人患脚氣而筋骨連腰日夜痛不可忍為灸

涌泉穴五十壯服金液丹五日

一女人患脚氣忽手足遍身拘攣疼痛脈沈大乃胃氣盛也服宣風丸而安

張文定嘗苦脚疾無藥可治一日遊相國寺有賣葍人得葍豆兩粒服愈

瑯玕代醉篇

劉敬叔云滎陽鄭鮮之字道子為尚書左僕射女脚患
孛癰就王僕醫僕陽請水澆之餘澆庭中枯樹：既
生女脚痊 推書初編

鄱陽周順治一士人得脚弱病方書羅列積案如山而
疾益甚令屏去但用杉木為桶濯足及令排樟腦于
兩股間以脚綳繫定月餘而安健如故南方多此疾
不可不知 遜齋問覽

六七叔婆血少氣多大便后脚痛而用當歸白芍白
朮青皮地黃川芎甘艸梔仁煎服

薛立齋治一嬾人兩膝赤痛寒熱口苦嘔吐嬾食面色
青黃此肝木乘脾土用小柴胡加苓卮升麻二劑少
愈又用六君加柴卮全愈

一嬾人飲食勞役兩腿兼腿疼痛或時寒熱薛以為脾
虛濕熱下陷用補中益氣加卮苓半夏治愈后復作
用六君加柴卮治痊

一嬾人經行後寒熱晡熱兩腿作痛此肝經血虛也用
加味道遙散加山卮治之而安後因勞日晡內熱或
用四物黃柏知母之類前症益甚更加食少作瀉薛
以為元氣下陷前葯復傷先用六君子湯加補骨脂
二劑調補脾胃而瀉止食進又用補中益氣升萃元

氣而痊

一婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四物數劑肝症頓愈又用加味道遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑少安又用加味歸脾一年愈

一孀婦兩腿作痛或用除濕化痰等藥遍身作痛而無定處薛曰此血症也不信仍服流氣飲而效

一放出宮人年四十餘臀腿內股作痛晡熱口乾月水不調此係肝經血少不能養經絡而然也宜用加味道遙散加澤蘭叶五十餘劑諸症少緩又以歸脾湯服二百劑而痊

一放出宮人臀腿腫痛內熱晡熱患寒倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以為氣毒流注服清熱理氣之劑益甚薛曰此乃肝經瘀血停滯所致蓋肝經上貫高布脇肋循喉嚨下循脘內脇繞陰氣抵少腹主治之法但常補其所不勝而制其所勝補者脾也制者肝也經曰虛則補之寔則瀉之此之法也彼不信仍服前藥遂致不起

薛立齋治一儒者兩足發熱脚跟作痛用六味丸及四

物湯加麥冬五味元參治之而愈后因勞役發熱惡寒作渴用歸補血湯而愈

一婦人下躄腫痛用人參敗毒散加蒼朮黃柏威靈仙痛減又以四物加蒼朮黃柏防己紅花澤瀉安

一人足熱口乾吐痰頭暈服四物湯加黃連黃柏飲食即減疲勢更甚用十全大補湯加麥冬五味山藥山萸而愈

吳孚先治楮仁甫病足腫虛軟無力頗能食醫與二妙散加米仁木瓜牛膝防風之屬愈服愈困此脾虛濕熱下陷法當補脾升脾誤用下行之藥故愈陷下也

凡診是疝須審右寸不數并能食否如數又不能食則是痿疝宜清肺熱不可不知

張路玉治楮廷嘉患脚氣痼疾恒服腎氣丸不徹六七年未宿患懇除之乃彙取朮附桂附芪附參附守法煎來八風散中菊花鱉甲湯中鱉甲貝齒羚羊犀角風引湯中獨活防己竹瀝湯中姜汁竹瀝烏丸共襄祛風逐濕之助服后必蒸汗出不終劑而數年之疝頓愈

洗汝楫子夏月兩膝胫至脚痛極僵挺不能屈者十餘日或用敷治之法不効其脈奕大數令拭去專藥與

當歸拈痛湯二劑愈

陸養愚治仰完吾左臂夾腹痛引至膝脰行動不便眠
睡亦難治療半年不効肌肉尽削診之沈弱似緩按
之遲々兩尺沈數曰此由元氣虛弱寒濕乘之胃氣
不升陰火伏匿于下法當扶元升陽導濕清熱則痛
自止用補中益氣湯加蒼朮黃柏猪苓澤瀉桂附少
許十劑其痛頓止后去桂附五苓倍人參歸身月餘
全愈

張三錫治一人素有脚氣每發則引腰痛不可悅仰其
人雄飲明是濕熱脉濡而數投拈痛湯八劑漸減遂
以提扁丹酒下二丸空心丸三腹腿腕出黑汗永不
再發

陳三農治一人熱從脚起入腹視其形壯体寔作濕鬱
成熱之候治以潛行散加牛膝防已服愈

一婦精勞病兩足如火燒即惡寒壯熱頭疼眩暈齒痛
齒浮安卧片時少減日二三發此氣血俱虛火妄
動所致以十全大補加五味而安

朱丹溪治一婦人脚疼怕冷夜甚日輕用生地白芍歸
尾各五錢炒芩柏白朮分四帖煎服

一婦人脚人骨痛用蒼朮白朮陳皮白芍各三錢木通

二錢甘州五分送大補丸五十粒

立齋治儒者章立之左服作痛用清熱滲濕之藥色赤腫脹痛連腰脇脹已無力此是三陰虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸症漸退喜其慎疾年許而痊

府庠鍾之英兩腿生瘡色黯如鉄似癩者三四痒痛相循膿水淋漓晡熱內熱口乾面黃此腎虛之症用加味六味丸數日而愈此等症疾用祛風敗毒之劑誤人多矣

一男子素遺精脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午后熱甚用補中益氣加白芍元參及六味丸愈

周都憲兩腿作痛形體清瘦肝脈弦數却屬有餘之症以龍胆瀉肝湯治痊

一婦人兩腿作痛不能伸展脈弦緊按之則澁先以五精散二劑痛少止又一劑而止更以神應養真而能屈伸

一男子腿痛每痛則瘦食或作嘔雜脈滑而數以二陳加升麻二朮羌活南星而安

一男子素有脚氣脇下作痛發熱頭暈嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脈緊右關脈弦此亦脚

氣也以半夏左經湯治愈

一男子脚軟腫痛發熱飲冷大小便秘右關脈數乃是陽明經濕熱流注也以大黃左經湯治愈

一男子臙脰魚踝脚皆焮痛以加味敗毒而愈

一男子兩腿腫痛脈滑而緩此濕疫所致也先以五苓散加蒼朮黃柏二劑少愈更以二陳二朮檳榔紫蘇羌活獨活牛膝黃柏而痊夫濕疫之症必先以行氣利濕健中為主若中氣和則疫自消而濕亦無所容矣

一婦人兩腿痛脈清而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃柏知母龍胆州茯苓防風防己羌活數劑腫痛少愈又以四物加二朮黃柏半膝木瓜而愈

一婦人脚脰腫痛發寒熱脈浮數此三陽經濕熱下注為患尚在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結為不能及也於患處砭去瘀血乃用前藥二劑少退以歸當拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是為壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也重既成而甚者砭去惡血而去其重勢經云畜則腫熱砭射之后以藥治之

一婦人兩腿痛退寒則筋挛脈弦而緊此寒邪之症以

五積散對四物湯數劑痛止更以四物數劑痛全止
更以四物加木瓜牛膝枳殼而愈

一男子腿腫筋挛不能動履以交加二劑愈

一婦人患腿痛不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應某
苦先以活絡丹一丸頓退又服而痊次年復疼仍服
一丸亦退更以獨活寄生湯而愈

一男子素有脚氣人患附骨疽作痛服活絡丹一丸二
症並痊 上舍俞魯用素有症不能愈因患腿痛示
用一丸不惟腿患有効而病亦得愈矣夫病深伏在
內非此藥莫能通達但近代始去此藥引風入骨如

油入麩之說故后人多不肯服大抵有是病宜用足
藥豈可泥乎

一男子素有腿痛飲酒過傷痛益甚倦怠脉弱以六君
加查曲芎歸升柴蒼朮而愈

一老人素善飲腿常腫痛脉洪而緩先以當歸拈痛湯
候濕熱少退后用六君子湯加蒼朮黃柏澤瀉治之
而痊

一男子每飲食少過胸膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導
引丸一服頓愈更以六君子湯加神曲麦芽蒼朮二
十餘劑遂不后作河間云若飲食自倍脾胃乃傷則

胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎之虛以致足腫加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷飲食脾胃之氣有虧不能上升則下注為脚氣者宜用東垣開結導引丸開導引水運化脾氣如脾氣虛濕氣壅遏不通致面目發腫或痛者宜用導滯通經湯

一婦人患腿痛兼足胫牽痛服發散藥尤甚脉弦緊此肝腎虛弱風濕內侵也以独活寄生湯治之痛止更以神應養真丹而弗寧矣神應養真丹熟四物加羌活天麻兜絲木瓜

王執中舊有脚氣疾遇春則足稍腫夏中尤甚至冬腫漸消偶夏間依素問注所說三里火之所在以温針微刺之翌日腫消其神効有如此者繆刺且尔况于灸乎有此疾者不可不知千金謂脚氣宜針灸為三許其灸指述方云若灸脚熱不得灸之

凡灸脚氣三里絕骨為要而以愛護為第一王舊有此疾不履濕則數歲不作若履濕則頻作自后常忌履濕凡有小濕不敢著鞋踐之或立潤地亦不敢久須朔移足而后無患此亦愛護之第二義也有達官久患脚氣多服八味丸愈亦以脚氣冲心惟此藥能治

之

有人舊患脚弱且瘦削后灸三里絕骨而脚如故益知
黃君鍼灸者所謂絕骨治脚疾神效信然也同官以
脚腫灸承山一穴瘡即乾一穴數月不愈豈亦將揖
失宜耶

執中母氏常久病夏月脚忽腫舊傳夏不理足不敢著
艾漫以針置火中令熱于三里穴刺之微見血凡數
次其腫如失去執中素患脚腫見此竒效亦以火針
刺之翌日腫亦消后常灸之凡治此当先三里而后
陽矯守穴也

王執中患脚氣指縫爛每以茶末糝之愈他日復腫而
爛用茶末不効漸腫至脚背上以為脚氣使然竊憂
之策杖而後敢行偶賣葯僧者見之云可取床荐下
塵糝之如其言而愈此物不值一文而能愈疾其可
忽哉

一人筋動手足大指漸上乘至大腹近腰結了奉養
且厚因酒食作此是熱傷血而物湯加酒黃芩紅花
蒼朮南星愈法治

忠州太守陳遂原傳云渠前知防刑因暑中取涼食瓜
至秋忽然右腰腿間疼痛連及膝腫曲折不能經月

右脚艰于牵動儿治腰脚药服之無効俛于雲安刑
曹偶在高熙助教處得養腎散方服之才一服移刻
牵身麻痺不數刻間脚遂屈伸再一服即康安人坊
州監酒药年凡四十虚損兩脚不能行步試与此药
初進二錢大腿麻木遂能起立再服二錢大小拇指
皆麻迤邐可行三服馳走如故太室居士得此方軋
道己丑歲在鄂州都幕府中宋判院審言久病脚膝
緩弱不能行傳之數日來謝此疾經年無药不服得
方次日即吾二服見効五服良愈今有力能拜起矣
后數日又云因浴遍身去薄皮如糊肌骨逆瑩其効

如神其方用全蝎兩半天麻三錢蒼朮一兩去黑皮草烏頭二錢
去皮脂生用黑附子二錢炮去皮脂右為細末拌勻如腎氣豆淋
酒調一大錢豆用黑大豆能除去腰脚筋骨疼痛其
効如神

金山長老子張顯李甘露寺齋會上說此方渠旧患脚
氣曾于天台一僧處傳方用木瓜蒸艾服之少安后
來往金山日登陟脚復痠重又一堂眾處得此方
合服頗竟輕健如前日方云破故紙炒舶上茴香酒浸
一宿葫芦巴炒牛膝酒浸肉蓯蓉酒浸川續斷揀淨
杜仲去粗皮姜汁製一日各四兩同為細末右用艾
夜炒令熟斷黃色用

脚

早七

四兩去枝梗秤以大木瓜四個切作合子去盡穢以艾實之用麻線扎定蒸三次爛研和為丸如梧桐子大每服五七十九溫酒食前下

申屠府判傳脚氣流注四肢手指腫痛不可屈伸四物湯去地黃加附子入姜煎服如常法遇疾作時服之必安

是齋云脚氣上攻流注四肢結成腫核不散亦熱焮痛及治一切腫毒用甘遂為細末以水調傳腫處又濃煎甘艸一味服之其腫即散二物本相及須兩人買各處安搗切不可相和清流所子韓詠苦此一服病

去七八再服而愈云符之牛馬牙人醫者之意正取其相反故以甘遂傳其外而以甘艸引于內所以作効如磁石引針之義也 三則並集成

立齋治余孝廉弟年及二十腿膝腫痛不能伸屈服托裡藥反甚以人參散毒散加檳榔木瓜柴胡紫蘇蒼朮黃柏而愈

施沛然治張侗初足脛痛三年矣診之兩尺沈細而澁此下焦元氣不足不能營養筋骨宜用滋補舒筋之劑不數服病少間會勞病旋作且甚再診則脉兼浮數元氣愈耗矣為製人參羔及河車天乙丸間服元

氣漸壯，獨兩腿作楚，不能除。為製萬靈羔，去樟木加韶粉、蘇合油、射香，以軟帛繫繫兩胫，仍令飲甘艸湯。不頃刻而痛若失。先是兩股傍亦傷痛，用羔后并愈。其方載本艸綱目，以意增損。之后用黃芪建中湯加歸參、潞養全痊。

吳橋治周千戶孫幼，得軟脚疾，治者以為痺也，百治不功。橋診之，六脉沈滑有力，曰：病由多服燥藥而傷脾，氣脾氣不運，故積濕氣下陷而瘦。後之政足重而軟耳，劑以補中去濕，加草薢、木瓜、寄生、半夏四劑，復

舊 太函集

耳聾。久吾甥年十九，初患吐血，用滋養清涼之劑而愈。后因体虛，兩足感冒風寒，遍身發熱，初以為內傷也。仍服清火化疫藥，而未經發汗，數日后遂成脚氣，兩足胫及脚背腫痛。又二日，則兩膝痛甚，不能屈伸。因而遍身作熱，絕似傷感，且小便黃而大便澀。予知其脚氣初發也，用酒大黃二錢、赤茯苓、黃芩、防己、茵陳各一錢、乾姜一錢、枳殼二錢、製蒼朮、木瓜各七、厚朴、前胡、羌活、防風、牛膝各六、甘艸二，水煎，飢時服。

足跟瘡腫

薛立齋治一婦人素血虛因大勞兩足發熱晡熱月經
過期或用四物芩連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳
實黃連大便不寔吐痰無度足跟作痛日足熱晡熱
月水過期肝脾血虛已胸痞吐痰飲食少思脾胃氣
虛也蓋胃為五藏之根本胃氣一虛諸病悉經先用
補中益氣加茯苓半夏脾胃漸健乃佐以六味丸補
脾腎而月痊

一婦人經水不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清
熱寬中消導守之劑前症更甚又魚肢体痠疼服除濕

化瘦等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟
足趾作痛其熱如灸此是三陰虧損用補中益氣
六味地黃兩月諸症漸退又以前湯并八珍湯兩
月而康

一婦人勞則足跟熱痛作陰血虛用八珍而痊后遍身
搔痒服風藥發熱抽畜肝脈俱教此肝家血虛火盛
而生風以天竺胆星為丸用四物麥冬五味芩連灸
州柴卮煎送

一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛用
逍遙散六味丸五十劑而痊

朱丹溪治一人足跟痛疾有血熱用四物湯加黃柏知
母牛膝之類治法

治脚汗用楊花著鞋中或如綿絮入襪內佳百乙方

薛立齋治通府黃廷用飲食起居失宜兩足發熱口乾
吐痰自用二陳四物尤甚兩尺數而無力此腎虛之
症也不信仍服前藥足跟熱痒以為瘡毒又服導濕
之劑赤腫大熱外用粵藥破而出水久而不痊及用
追毒丹會突如桃始信薛言滋其化源而痊

一男子素不慎起居內熱引飲作渴倦兩足發熱后
足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒

之藥燉赤痛甚恪用祛毒清熱清裂翻張熱如赤榴
熱痛如錐肉熱晡熱此因是三陰虧損朝用十全大
補夕用加減八味丸外專當歸羔兩月餘而安其服
消毒藥而死者多矣

一羔梁之人兩脚發熱作渴左尺脈數而无力謂此足
三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更加晡
熱頭暈又服四物知柏日晡熱甚飲食更少而發疽
乃用補中益氣六味地黃百餘服而起其不信以致
不起者多矣

治遠行脚腫痛方用之可行千里輕便甚妙附夙細辛

艸烏等各為細末糝在鞋底內如暑艸鞋即以水微
濕過然後糝藥一法以蚯蚓搽腫處高閣起一夕即
愈

醫說疑編

立齋治楊錦衣脚跟生瘡如豆許痛甚狀似傷寒謂獺
人被兇咬脚跟成瘡淫蝕為終身之疾若人脚跟患
瘡亦終不痊因名兇嚙也遂以選少丹內寒散治之
少可次因納籠作痛反眼攻毒藥致血氣愈弱腿膝
痿軟而死蓋足跟乃二蹠發源之處腎經肝由之地
若瘡口不合則蹠氣不能生發腎氣由此而泄故為
終身之疾况彼瘡先得于虛復不知戒虽大補氣血

猶恐不及况攻毒以戕之乎

王太国治南昌司理胡慎之左足患癰直穿脚底医已
数易日甚一日痛楚几絶国至命急去粵药止服湯
剂司理曰湯剂豈能生肌耶国曰願限半月全痊服
至三四日瘡口漸合司理大喜才二十日肌肉已生

江西通志

柴岫青治陳季士白山長男孝廉忽患兩足涌泉穴中
俱有隱之一青困旋即破口出水疼痛異常延医治
之俱不識其症診之兩尺極微弱症属少陰不足而
致遂定十全大補湯乃以年少畏服力劝之服二十

餘剂而愈

遺精

白濁淋

續名醫類案

卷二十六



續名醫類案卷三十一

遺精

錢唐魏之珩玉橫輯 男弒編次

孫文垣治一人色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑
不効繼用固澁之劑亦無功求孫治予以玉華白丹
濃煎人參湯送一錢兩服後稍固兼進六味地黃丸
加蓮鬚芡實遠志五味子丸一月而愈玉華白丹鍾
乳粉白石脂湯起石左顧牡蠣是并孫案
李妓兩寸短澁兩尺洪滑閑弦孫診之間經可行否白
僅行一日亦點滴耳曰此脈在良家主夢遺若不宜

有也曰良然即御客時亦或遺之則冷汗淫之體倦不能支不与葯或問故曰金木相勝心神無主法在不治或謂人尚無恙何便至此曰弦為春令當金旺之時犹然猖狂設在卯月木旺火相則肺金枯痿水之上源竭矣且腎脉洪滑妓以慾勝陰血既虧淫火更熾陰虛則病陰絕則死今已咳嗽其兆見矣烏可治乎次年二月果死

薛立斋治朱工部勞則遺精齒牙即痛用補中益氣加半夏茯苓白芍并六味地黄凡更以十全大補加麥冬五味子而痊

一男子白濁夢遺魚脚跟作痛口乾作渴大便閉澀午後熱甚用補中益氣湯加白芍元參再加減八味丸而安

龔子才治陳桂林秀才患夜夢遺精每月一二次或三五次遺後神思昏沈身體困倦診之六脉微瀽無力此陰虛火動之症以辰砂既濟丸加紫河車龍骨服之數月奏效奈教患于不能謹守因口占里語一章以戒之曰培養精神貴節房更祛岸慮最為良食惟半飽宜清淡酒正三分勿過傷為餌隨時宜勉進功名有分未須忙凡行埋語君能味便是長生不老方

黃履素曰余年三十外曾患遺精龜頭時有精微：流出日夜嘗然初時惧之持甚人身中凡許精血而堪此涓：不絕乎醫之高明者謂為無害但毋服瀉藥緣病以服附子得之知是火症但涼補而勿熱補用六味凡加沙苑蒺藜鬼絲子及炒黃柏少許等藥將此病付之度外莫寘之懷如當將理凡兩年始全安龍骨牡蠣等藥以未入口蓋人身中惟氣血同流斯快暢豈可澁之使滯虽得暫効為害寔深患者審之予初有惧心及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精与交媾之元精不同邪

張路玉治韓慕廬季子素稟清癯宿有精滑不禁之恙診之脉微弦而數尺中畧有不續之狀此不但腎氣不充抑且氣秘不謂致不能司封藏之令与六味凡去澤瀉加鯢膠五味畧煎沉香于補中寫宜法虽如此但久滑竅疏難期速効耳

李士才治一人考試勞神患精滑小便後及夢寐間俱有遺失自服金櫻膏經月不驗李診之曰氣虛而神動非遠志凡不可服一月而安

王叔權曰有士人年少見灸夢遺為点腎俞痠疼令其灸而愈不拘老少皆腎虛也古人云百病皆生于心

又曰百病皆生于腎心勞主百病人皆知之腎虛亦
生百病人未知也蓋天一生水地二生火腎水不上
升則心火不下降茲病所由生也人不可不養心不
愛護腎也 奇生經

平江譚醫云夫遺泄尋常只治心腎未有別治以素問

仲景考之當脾治服之葯屢用厚料朴二兩 姜汁

脛一兩 炭火煨過通紅取出 右二味白水麩糊為丸

如梧子大每百凡米湯下 集成 全上

陸祖愚治一人因作文夜深倚几而卧：即夢遺明早
吐血數口數日后復遺復吐自此或間日或連日或

吐血或夢遺或与六味地黄湯凡百帖即加減亦不
出滋陰清火而已數月不痊口乾微欬惡風惡寒懶
于動作大便溏小便短赤脉之豁大无力沈按則駛
曰此症非得之房室乃思慮太過損其心血心血虛
則无以養其神而心神飛越因有夢交之事神不守
舍則志亦不固而腎精為之下遺腎虛則火益无制
逼血妄行而吐上刑肺金而欬其畏風寒而懶動作
者火為元氣之賊火旺則元氣自虛也其肌肉削而
大便溏者思慮損其心血即是傷其脾陰也与歸脾
湯二十劑遂吐遺減半又二十劑各症俱痊百劑而

精神而倍矣

繆仲淳治婁東主官壽患遺泄聞嬭人声即泄瘖甚欲死医告技窮繆之門人以遠志為君蓮須石蓮子為臣龍齒茯神沙苑蒺藜牡蠣為佐使之丸服稍止然終不斷繆于前方加鯢膠一味終劑即止

趙京之太史未第時因肄業勞心太過患夢遺症已三四年矣不數日一發過則虛火上炎頭面紅熱手足逆冷終夜不寐補心腎及瀉精為死不用過壬申春偶因感冒來邀診視談及前症之苦為疏丸方以黃柏為君佐以地黃枸杞蓮鬚鯢膠萸肉五味車前

天麥冬之類不終劑而痊初京之疑黃柏太寒不欲用謂尊恙之所以久而不愈者正未用此葯耳五藏若欲補瀉六腎欲兼急食苦以兼之黃柏是也腎得堅則心經虽有火而精自固何夢遺之有哉向徒用補益收澁而未及此故不効

立齋治王上舍遺精勞苦愈甚切中結核服清心蓮子飲連喬消毒散不應以八珍湯加山藥萸肉遠志十餘劑少愈更以茯鬼丸治之遂不復作叶巡檢患此云諸葯不應盧丹谷与八味丸治愈

白濁

沈朗仲治王雨泉壯年氣弱溺後精水淋漓不斷服六味丸不應易珍珠丸更加澁痛兩尺脈數而氣口虛大此正虛不能引水也與補中益氣加麥冬五味子劑而痊

張氏通

薛立齋治一婦人善怒或小腹痞悶或熱往來或小便頻數時下白淫蕩久不愈面青口苦此積憤而不能發散所致用龍胆瀉肝湯而愈用加味道遙散八珍湯間服而安

立齋為一代醫宗全由知得肝病其未至虞則未

達乙癸同源之義惟以小柴胡及逍遙龍胆瀉肝
從事損亦多矣

一男子莖中痛出白津小便閉時作痒用小柴胡加山
厄澤瀉木通炒連胆艸茯苓二劑頓愈又煎六味地
黃而愈

司所陳石鏡久患白浊發熱体倦用補中益氣加炮姜
四劑白浊稍止再用六味地黃丸煎服諸症悉愈
宰汪涵全患頭暈白浊用補中益氣湯加茯苓半夏
愈而後患腰痛用山藥山萸五味草薢遠志頓愈又
曰劳心益汗白浊以歸脾湯加五味而愈後不時眩

暈用八味丸全痊

孫文垣治一人稟質素強縱飲無度忽小便畢有白精
數點自以為有餘之症不宜医治經三月以來虽不

小便時有精出竟頭目眩暈

此上病多由
下之証驗也

醫者以固

精澁脫之劑治之兩月畧不見功診之六脉滑大此因
酒味濕熱下注精藏遂以白朮茯苓橘紅甘艸軋
葛白豆蔻少加黃柏全安

潘見所患白浊精淫下治三年不効孫診之兩寸短
弱兩關滑兩尺洪滑曰疾易愈弟待來年春仲一劑
可痊問故曰素問云必先歲氣毋伐天和今所患為

濕疫下流症也而脈洪大見于尺部為陽乘于陰法
當以陰引陽今冬令為閉藏之候冬之閉藏寔為來
春發生根本天人一理若強升提之是逆天時而洩
元氣也後醫者接踵竟无効至春分逆孫以白螺螄
壳火煨四兩消痰為君牡蠣二兩固為臣半夏消痰葛根
引陽明柴胡并少陽之清氣苦參濕各一兩為佐黃柏聖一
兩為使麩糊為丸名端本丸令早晚服之不終劑而
安

李士材治李即侯白濁服五苓散數劑无効診之兩尺
大而清是龍火虛炎精瘀竅導用牛膝茯苓黃柏麦

冬山為遠志細生甘艸十劑愈

吳光祿閉精行房患白濁莖中痛如刀割自服瀉火疎
利之劑不効改服補腎之劑又不効李診之白精久
畜已足為害况勞心之餘水火不効坎離頃用也有語
病用單薜分清飲加茯神遠志肉桂黃連四劑即効
兼服補中益氣而愈

陸祖愚治韓舜臣年近三旬夏月遠歸連宵多事卧当
風涼致成瘡疾間一日發自以為虛而投參附丸用
參二三錢及五錢者數十劑一医用參一兩附三錢
又八劑服參約及二斤其病寒輕而熱重偏于靜坐

時竟陽道微溫以紙拭視如漿糊一點白而光亮訝為滑精滲漏若此無怪大劑補養無效決死無疑及診視正當悲哀之后面赤如妝六脉洪滑而數日脉候無事不必張皇令將溺器滌淨次早診之脉畧和而仍滑大令傾溺器中有白膩稠粘約半椀許乃曰當此短夜去已如許之多則後朝至暮自當加倍此是白濁非滑精也試思少壯之時每交感輸洩之精能有几何病者始太悟乃用萆薢分清飲用萆薢石菖蒲益智烏菟茯苓甘州四劑其症減半又以二陳湯加升麻柴胡蒼朮白朮十餘劑濁淨而瘡亦止夫

竒經之脉督行而背脊任行于腹外衝行于腹中溺出于前自膀胱而來精出于後自俠脊腎藏而來男濁女帶自腎家傍衝而下蓋衝向血海其脉起于脾

中脉起脾中則不得謂膀胱無与也

丹溪曰胃中濁湿下流滲入膀胱

上句極為有理下句恐未必然曾詢患濁者小便或清或渾其濁或隨溲溺而下或不時淋瀝可見与膀胱竟不相干又見患此症者經年累月飲食照常起居如故非胃家湿熱而何此君加以勞頓解飽陰虛貧涼而得故得補益甚丹溪曰二陳湯加升提能使大便潤而小便長前後二方皆賢所驗第后人

未知用耳

按精与溺原分二道所云良是至謂浊不由膀胱而出自胃傍冲而下然則湯飲入胃独不可傍冲而下乎不知帶浊之病多由肝火熾盛上蒸胃而乘肺：主氣：弱不能散佈為津液反因火性逼連而下輸膀胱之州都奉後氣化又肝主疎泄反稟其令而行遂至滯：不絕使推歷家濕熱无肝火為難則上為痰而為瀉耳古今医案于帶濁二門独罕存者亦以未達其旨而施治无驗也至單由濕熱而成一味涼燦虽葯肆工人亦能辨此其說本諸

丹溪

其父肖愚一案治吳南邱之子亦瘥且浊

以二妙散取效

立齋治光祿柴黼庵因勞赤白濁如注用歸脾湯而愈
同廳張檢齋小腹不時作痛莖出白濁用小柴胡
加山扈胆艸山茱萸歸而愈

馬元儀治陳晉昌患濁症累月不止後因房勞痛更加
浊更頻有語以煎蘇叶湯澡洗者後之遂致精滑傾
更燦擾不安發熱煩渴而手脉俱沈而微尺脉不應
曰此陰精大傷真陽元隅膀胱不來此時陰氣尚存
一綫以急求其陽而通其陰直至陰尽而欲回陽罕

克有濟矣或曰既有陽无陰補陰犹恐不足尚堪純陽之為重渴其陰乎曰真陽以水為宅水足則凝然不動水竭則不安其位甚而飛揚屑越孰而把握之哉此時陰陽並離似宜兩補然陰氣易虧而難復若掇其陰恐陰未回而陽已絕矣宜急擾虛陽先歸窟宅然后補陰以配陽此必然之次序也乃煎大劑白通湯与服便得濃睡諸症漸已次服人參七味湯飲陰陽兩平而安

蕭萬輿治一健卒年甫三旬素善飲喜啖辛香病濁寢疼以二陳湯加苓連胆艸赤芍車前二劑即止如寔

症本不難治若驟施補必變症矣

漳粹林振伯素善飲因修途勞頓飢飽失時復冒暍病白濁經年不痊察前治非辛熱即涼瀉或滋補壅塞遂至小腹脹悶或氣喘拒食六脉滑數无力此中宮虛熱津液下陷膀胱氣化不能分別以歸脾湯去朮香加炒山梔半夏車前黃連七劑而濁出便清神思清爽矣

施笠澤治公謨病小便黃濁医用淡滲之劑施日靈樞不云乎中氣不足溲便為之變但当服異攻散加黃柏一二分可也医曰黃柏一二分遂足清利小便邪曰

子不現之鹿酒者乎。濁醪數斗，以黃柏少許旋澄清，澈底豈一洩不當之衆，皆大笑用之，果驗。蕭施三條，皆未選入。

蔣仲芳治梁敬州年六十餘，病濁三年矣。沒滲寒涼溫補，俱不効。診之六脈俱微，惟左寸帶數。此因心火不之降，脾胃之氣不升，濁物因而下滲。法當養心升補。若用本病藥，無益也。用丹參、茯苓、遠志、棗仁、山萸、山藥、黃芪、白朮、升麻、柴胡、甘艸、陳皮、姜、棗煎服。三劑，其濁倍至。詢其體健否，曰如故。曰：若使所出盡為津液，其體必憊甚。今濁增而體健，知濁物積于中而為藥所迫而出耳。清者既升，濁者自降。再服二劑，而病如失矣。投之果然，使無妄見，再易一方，安能痊乎。

淋又名癃閉

張子和治酒盞房善良之子年十三病沙石淋已九年
矣初因瘡疹餘毒不出作便血或告之令服太白散
指止後又因積熱未退變成淋閉每發則見鬼神號
叫京隣張曰諸醫作腎与小腸病者非也靈樞言足
足厥陰肝之經病遺溺閉癃閉謂小便不行癃謂淋
瀝也此乙木之病也木為所抑火來乘之故熱在脬
中下焦為之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯
鹵今犬羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真有沙石
而能漏者耶以此知前人所說服五石散而致者恐

未盡然經白木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正散加湯鹽等分頓啜之其沙石自化下

張氏兒年十四病陽一年半矣得之麥秋發則陽大痛至握其峻跳躍旋轉身呼不已小溲數日不能下則成沙石大便秘澀肛門脫出一二寸諸醫莫能治張曰今日治今日効時日在辰巳間矣以調胃承氣僅一兩加牽牛末三錢汲河水煎之今作三五度服之又服苦末凡如芥子許六十粒日加晡上涌下瀉一時音出有膿有血既定令飲新汲水一大盞小溲已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去几分

止哭一次明日因卧如醉自晨至暮猛然起走索食与母歌笑自得頓失所苦繼与太白散八正散等調一日大溲此下焦灼也不吐不下則下焦何以開不令飲水則小溲何以利大抵源清則流清者是也又刘氏子年六歲病沙石淋張以苦劑三涌之以益智散三下之立愈

一人年二十三歲病蔗淋三年矣醫不能効多作虛得補以温煖灼以針艾无少減張曰惑盡之疾也亦曰白淫實由少腹菟熱非虛也可以涌以泄真人以時著悼其法峻不決者三日浮屠一僧曰子以有暑病

近竟頭痛張曰亦可涌願與君同之母畏也于是涌疾二升色如黑凡汗內有死血并黃綠水又瀉精穢數行尋竟病去方其來時而无入色及治畢次日而如醉慮其路遠處數方以使歸云

一男子病淋張令頓食鹽魚少頃大渴又令恣意飲水然后知淋者無水故瀆也

王執中曰一嬾人患淋久諸藥不効其夫夜告予按既効右治諸淋用剪金花十餘葉煎湯服令服之明早來云病減八分矣再服而愈煎金花一名禁宮花一名金盞銀台一名玉不留行

王執中資生經本州經目

葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如藟弱久而有變如鼠形但无足耳百治不効一村医用牛膝根煎汁日飲五服名地髓湯虽未即愈而血色漸淡矣乃如舊後十年病又作服之又痊按楊士法直指方云小便淋痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝二兩水二盞煎一盞温服一媼患此十年服之得効土牛膝亦可入射乳香尤妙

全上

薛立斋治一媼人患小便淋瀝內熱体倦以為肝火虛少脾氣虛弱用八珍逍遙二散兼服月餘而小便利又用八珍湯全安

一婦人素善怒小便淋瀝不利月水不調半載矣或兩
脇脹悶或小腹作疼或寒熱往來或胸乳作痛或咽
喉噎塞或兩脚筋牽或肢節結核面色青黃不澤形
氣日瘦左關強洪右關弦數此鬱怒傷肝脾虛血氣
滯為患朝用加味歸脾湯以補脾氣解脾鬱祛肝火
夕用滋腎丸生肝散滋腎水以生肝血抑肝火舒筋
膜而安

一婦人小便淋瀝小腹脹悶胸滿喘急諸藥不應以為
轉脬用八味丸一服便如涌

孫文垣治抗芝崗酒後近內每行三峯採戰對景忘情

之法致成血淋自仲夏至歲杪未愈便下或紅或紫
中有塊如筋膜狀或如蘇木汁間有小黑子三五日
一簇或勞心力或久坐立亦簇百治不痊診之其色
白而青肌肉削甚脈左寸沉弱關尺弦細右寸畧滑
此必肺經有濁瘦肝經有瘀血良由酒后竭力縱慾
淫火交煽精欲出而強忍之致凝結經絡流子弱道
新血阻塞而成此症也三五日一至者盈料滿溢故
耳先與丹參加茅根濃煎服其小便在器中少頃即
成金色黃沙乃用腎氣丸加琥珀海金沙黃柏以杜
牛膝連叶搗汁熬羔為丸調理外以川芎五錢當歸

七錢杜牛膝煎服臨發時以滑石甘州稍槐仁海金沙射香為末以韭菜汁調服去其凝精敗血則新血歸源而病根除

族姪善飲好內病血淋與滑石甘州稍海金沙琥珀山
卮青蒿茅根煎羔為丸梧子大每空心及食前行心
湯送三錢不終劑而愈後數年服補下元藥過多血
淋又作小便痛及立不能出空蹲便乃得所出皆黑
塊每行必一二碗許已半月諸通利清熱之劑不應
脈洪數以五靈脂蒲黃甘州稍各一錢水煎空心服
二帖痛減半改用瞿麥山卮甘州各二錢茅根杜牛

膝連葉車前州各三錢生地柴胡木通黃柏各一錢
四帖痛全減血止惟小便了而不了以人參羔根青
蒿白朮茯苓甘州白芍升麻知柏而愈

康侯云治暑氣在內小便血淋用白虎湯加麥冬煎屢
取其效此亦有理 忠雅堂雜抄

李時珍若一男子病血淋痛脹祈死李以藹汁髮灰每
服一錢三日血止 本草經目

深師治淋用葛王亭長折斷腹中有白子如小米二
三分安白板上陰二三日收之若有人患十年淋服
三枚八九年以還服二枚服時以水如枣許著小杯

中用爪研之當扁：見于水中仰面吞之勿令近牙
齒間葯虽微下咽自竟至下焦淋所有頓葯作火煩
急不可增飲乾麥飲汁則葯執上也若元乾麥飲但
水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如濃血連：
耳去者或如指頭或青或黃不拘男女皆痊者葯不
快淋不下以意節度更增服之此虫五六月為亭長
頭赤身黑七月為班蝨九月為地胆隨時變耳全上
李士材治嚴邑宰患淋經年痛如刀錐凡清火疎利之
劑計三百帖病勢日甚脉之兩尺數而无力是虛火
也綠泥痛无補法愈疎通則愈虛愈虛則虛火愈熾

遂以八味地黄料加車前沉香人參服八劑痛減
一二而頻數如故前醫漫云淋症作疼定是實火若
多溫補恐數日后必將悶絕不可數矣後疑而問李
李曰若不宜溫補服葯後病勢必加今既減矣復何
疑乎朝服補中益氣湯晚服八味丸一月而疾去其
丸更倍用參芪而安

杜司寇夫人淋瀝兩年無葯不嘗卒無少効診之兩尺
沉數謂有瘀血停留法當攻下因年高不敢輕投但
於補養氣血之中加琥珀牛膝此等緩劑須以數十
劑收功而夫人跡急求効遂成痼疾

馮楚瞻治李參領年將六旬患淋兩年有時頻利且連
有時點滴難過急痛刺如肥液如脂如羔或成條紫
血日夜不堪時欲自尽詢所服醫：立通利止瀉二
方遇頻利則用立清遇秘塞則用煎利此輩伎倆乃
原品如此服通利則頻數无度矣服止瀉則結瀉難通至按其
脉兩寸洪大餘皆無力独肝腎更甚曰肝主疎泄腎
主閉藏今肝腎俱病各廢乃職利則益虛其虛溢則
更增其滯惟調理肝腎自愈用八味加麥冬二錢并
麻八分紅花四分重用人參煎服使清者并浊者降
瘀者化中氣既足肝腎自調開闔自然得所矣后以

生脉散送八味丸于空心以歸脾加減服于午后而
安

一少年勞心色慾過度患小便淋瀝脹痛且二便牽疼
其脉兩寸沉微左關甚弱右關微滑兩尺弦瀉乃心
肺之氣不足下陷肝腎之氣又不能不能疎洩閉藏
清陽不升中宮鬱滯滲入膀胱乃是淋非淋二便牽
痛如火癍泄也令早服六味加黃柏製附子使寒熱
互為向導以去濕熱食遠用補中益氣去陳皮柴胡
加茯苓防風酒炒其查臨脫煎服探吐遂愈

張路玉治內閣文湛持夏月熱淋医用香薷飲益元散

五日不應淋瀝尤甚反加心煩不寐診之見其唇赤
齒燥多汗喘促不時引飲脈見左手虛數知為熱傷
元氣之候與生脈散類進代茶至夜稍安明日復若
洩便澁數然其脈已和仍用前方不時煎服調理五
日而痊

太史沈韓倬患羔淋小便頻數日夜百餘次日則滴瀝
不通時如欲解夜虽頻逆而所解倍常洩中如脂如
涕者甚多服清熱利水藥半月餘其勢加劇面色痿
黃飲食兼退脈得弦細而數兩尺按之益堅而右關
瀼大少力此腎水素虧加以勞心思慮肝木乘脾所

致法當先寔中土使能阻水則陰火不致下陷清陽
得以上升氣化通而漏澁痊矣或由邪火亢極反用
參芪補之得毋助長之患乎抑知陰火乘虛下陷非
開提清陽不應犹之水注塞其上孔傾之涓滴不出
所謂病在下取之上者清熱利水氣愈陷精愈脫而
溺愈不通矣遂與補中益氣湯用人參三錢服二劑
痛虽少減而病者求速効或進四苓散加知母門冬
沙參花粉甫一劑徹夜痛楚于是揣服前方兼六味
丸用紫河車熬羔代蜜調理服至五十劑參尽一斤
而安

陝客元仁軒年壯色蒼体胖善峻患胞痺十餘年求吳
求治其脈奩大而濇：不調不時躑踞于地以手揉
其莖囊則溲後穀道點滴而滲必以熱湯沃之始得
補通寐則有時而遺其最苦者中有結塊如結核外
裡紅絲內色黃水襟于脂膩之中此因恣飲不禁酒
濕乘虛入髓竅而為患因令堅戒烟艸火酒濕麩椒
蒜糟醋鸡豚炙燂等味与半夏茯苓猪苓澤瀉草薢
犀角竹茹作湯四劑不應則以不守禁忌故乃令堅
守勿犯方与調治仍与前药四劑勢減二三次与腎
瀝湯加草薢數服水道遂通洩亦不痛但食不甘美

投以補中益氣加車前木通調之而安 肥盛多濕故先与清
胃消瘦而后理腎調脾

侍衛金漢光年已花甲初夏誤飲新酒致病前則淋瀝
瀉疼後則四痔腫突此陰熱虛陷膀胱也先与道赤
散次進補中益氣勢已向安惟孔中瀉痛未除或令
進益元散二服遂致遺弱不能自主投劑不應直至
新秋脉漸奕弱因採腎瀝之義以羯羊腎製補骨脂
羊脖製兜絲子濃煎桑根皮汁製螵蛸連進三日得
終夜安眠消瀉遺矣

閔少江年高体肥患胞痺十三年歷治不効凡遇勞心

嗔恚或飲食失宜則小便頻數滴瀝瀉痛不已夜略交睫即滲混而遺竟則阻滯如前人參鹿茸紫河車

无筭然皆无碍独犯丹皮白朮即脹痛不禁香燉之為空

誤投殺人世罕有也張診之曰病名胞痺俗名尿管病惟見于內經

由羔梁積熱于上作強傷精于下濕熱乘虛聚于膀胱

素問云胞痺者不腹膀胱按之內痛苦沃以湯瀉

于小便上為清涕詳其文則知膀胱虛滯不能上吸

肺氣不清肺氣不能下通水道所以瀉滯不利得湯

熱之助則小便澁微通其氣循經蒸發肺氣暫開

則清涕得以泄也因与腎瀝湯方服之其效頗捷

原其寢則遺溺知肝虛火擾疎泄失宜所以服丹皮

疎肝之藥則脹不勝氣之竄以擊動陰火也服白朮

亦脹者不勝其味之浊以壅滯濕熱也肝腎病不服

人參鹿茸河車無碍者虛能受熱但補而不切于治

也更擬加減桑螵蛸散用羊腎湯送丸庶有合于病

情然八秩之年犹恃体健不遠房室葯虽中竅难保

其不復也与陝客案全

元吉年六十餘因表明畜妾患小便淋瀝春間顛仆

昏憤遺溺后隨時遺或發或止至一陽後其症大剝

日則苦于不通夜則苦于不禁其脉或時虛火或時

細數而左關独弦此胃氣久虛而為下脫之兆也乃
与地黄飲子數服溺瀉少可遺亦少間后与八味丸
去丹澤加鹿茸五味巴戟遠志調安

新安富室有男子淋弱不止者漸痿黃諸醫束手孫卓
三治之亦不効偶隱几坐以手戲弄水灌后孔塞則
前竅止開則通為腦后灸三壯立愈 江西通志

王肯堂治外兄賀晋卿因有不如意事又當勞役之後
忽小腹急痛飲溺中有白物如膿并血而下茎中
急痛不可忍正如滯下后重之狀日夜十數行更數
醫不効乃作汚血治令以牛膝四兩酒浸一宿長流

水十碗煎至八碗再入桃仁一兩去皮炒紅花二錢
五分當歸稍一兩五錢木通二兩生甘草梢二錢五
分苧麻根二莖同煎前一椀去渣入琥珀末二錢射
香少許分作四服一日夜飲尽勢減大半按素問奇
病論云病有瘥者一日數小溲此不足也今瘥血虽
散宜用地黃丸加兜絲杜仲益智牛膝之屬補陰之
不足以杜復至回循未及修治遂不得全愈或間或
通一夜十起溺訖痛甚竟服全丸及以補腎之藥入
煎劑調安

從兄尔祝得淋疾日數十溲畧帶黃服五苓散稍止因

腹中未快多服利葯三五日后忽見血諸醫以八正散治之不應詢其便後時有物如膿小勞即發診得六脉俱沉細右尤甚此中氣不足也便後膿血精內敗也經云中氣不足則溲便為之變宜補中益氣湯加順氣之葯以滋其陽六味地黄丸疎內敗之精以補其陰更加五味牛膝而安

蕭萬興治鄭友患淋經年屢治罔效日淋症有虛實寒熱殊今君年未三旬元氣充寔因修途勞役飲食不調復喜火酒脾受濕氣時當炎令丁火司權丙火協應故心移熱于腸至火因而內灼上肺燥口渴下

腎燥淋結前服八正五淋只端治淋而未知清水上源滋益肺金故不効以二陳小柴胡加龍胆知母木通麥冬數劑全安

朱司馬六閏年五旬銀嗣不慎酒色飲食起居失宜面日青黑怒則暈大便秘塞脫血小便淋血如割屢服清火通淋之劑反加甚脉沉遲八蕪澁此腎水枯竭不能滋生肝血遂致虛火上炎移熱二腸迫血下行因而遂道澀枯妨礙升降故每欲便痛塞難堪須用甘溫之品滋益化原補養肝木使陰血盛則津液充而淋閉自解矣以補中益氣湯去柴胡倍人參加

牛膝少加肉桂及加減八味丸八人參茯苓遠志服一月而安

淋

張云訂年近四十因暑月往來道途多飲火酒遂成癰
閉廣陵匠者已多與清熱滲利之藥黃連服至三兩
不能愈後黑后診之右尺洪大左尺不應指口燥渴
知其三陰已傷與六味地黃湯殊未効更匠仍用車
前赤苓琥珀木通瞿麥偏蓄五苓六一之類遂致一
夜必便百餘次溺惟點滴少腹急痛而脹寤迫楚甚
面漸黧黑此復傷少厥二陰致疎泄衞密俱失其職
而太陰太陽之升降氣化亦紊也今朝服補中益氣
暮服六味地黃每方各三十劑乃痊

症

杜士治三十七太尉忽患小腸氣痛諸醫不効每一發
几死上召杜至進藥不數服无効太尉曰我命不久
致良醫不能治上召杜問所以杜对臣用古方皆不
獲愈今日撰一方容進上遂合藥以進一服十愈八
九再服全愈因名方曰救命通心散川烏頭一兩月
青鹽一錢酒一碗浸一宿去皮共焙乾川鍊子一兩
用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴豆茴香半兩石
燕一对土狗五枚芥子一錢六分為末每服三錢入
羊石子内濕紙煨香熟夜半時用好酒半升入鹽細

嚼石子以酒咽下不得作声其病遂去曹五家今此方

辛稼軒初自北方還朝官建康忽得疝疾重墜大如杯

有道人教以取叶珠即薏苡仁用東方壁土炒黃色然后

小煮煖入砂盆內研成膏每用无灰酒調下二錢即

消程沙隨病此稼軒授之亦效官遊紀聞

張子和治珍寇鎮一夫病瘡癰發渴痛飲蜜漿劇傷水

水匠者莫知瀉去其濕反襟進姜附濕為焮熱所壅

三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大于升斗

張氏以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青

赤水一斗遂失痛之所在又穎尾一夫病卒疝赤腫

大痛數日不止諸藥如水投石張以導水一百五十

丸令二次咽之次以通經散三錢空腹沒酒調下五

更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去不三日卒復如

故查虛濕二門

李審言因勞役飲水坐濕地乃濕氣下行流入脬囊大

腫痛不可忍以金鉸川棟子等藥不效求治于張曰

可服泄水凡審言感之又數日痛不可堪竟從張先

以舟車丸審言散下青綠沫十餘行痛立止次茴香

丸五苓苓下宜有散字以調之三日而腫退至老更不作大

疝者乃肝經也下青沫肝色也

王敏之病寒疝時下結聚黃瓜每發繞臍急痛不能忍
以舟車丸猪腎散即煨腎散下四五行竟為繞腹三五
次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治
寒萬毒萬全但下后忌飲冷水及冷物宜食乾物以
寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又數日
以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四
日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃行步如常
矣

一僧病疝發作冷氣上貫齒下貫腎際若繩挽兩辜時
腫而冷兩手脈細而弱斷之日秋脈也此因金氣在
上下伐肝木之畏金抑而不伸故病如是肝氣壅滯
不能下榮子辜丸故其寒寔非寒也木受金制傳之
胃土胃為陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火
之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而火化乘之經
曰木鬱則達之土鬱則泄之令通泄四次果竟氣和
辜丸凡痒而暖此氣已入辜中也以茴香木茂之藥使
常服之一月而安

霍秀寸之子年十二辜丸一旁腫脹張見之曰此因驚
恐得之驚之為病上行則為嘔血下則腎傷而為水
腫以通經散一瀉而消 查新案 腫脹門

朱丹溪治鄭子敬因吃酒后飲水与水菓偏腎大時作
蛙声或作瘡炒枳寔一兩茴香鹽炒：卮子各三錢
研煎下保和丸

湜兄年三十左香核腫痛此飲食中濕墜下成熱以桔

核即臭

五枚桃仁七枚細研順流水一盞煎沸熱下

保和丸

龔子才治一船家小腸疝氣腫痛不可忍又病兩眼腫
痛眵淚隱濇兩寸脉洪數兩尺脉微此上盛下虛之
症用涼葯治眼則疝痛更加用熱葯治疝則眼痛更
盛百治不効与木香金錢丸空心服以治下焦之虛

寒以退血散卧時服治上焦之風熱三服全安

趙雪山因房勞後五更起早感寒疝氣痛不可忍增寒
战慄六脉微而无力以五積散加吳茱萸小茴香又
与蟠葱散俱不効復以艾灸之將恣人兩脚掌相对
以帶子綁住兩寸指合縱處以艾炷麥粒火灸七壯
痛立止

按肝脉起足大指旁大致穴子和治一人瀉大敦
穴而愈此云灸足中指末詳其義

子才親家周峯步患疝氣偏墜腫痛不可忍遇秀才傳
一方用黃土水和作軋泥拍作大餅子火上烘熱熨

痛處冷則再易立愈

萬密齋治朱氏子病卵腫逾年不消成癩疝矣問萬曰足厥陰肝經之脉環陰氣肝之病為怒小兒性急多哭者常有此病一名氣卵常見人病此者不廢生育無壽孝子曰有治法否曰有但勿求速効可也用川棟肉小茴香青皮山萸肉木香當歸川芎海藻莢朮二味再用黑牽牛同炒去牽牛不用共為末神曲為丸溫酒下更灸臍旁穴而消

喻嘉言治胡翁常苦脾氣不旺通年少腹有疝形如鴉卵數發後其形漸大而長從少腹墜入辜囊甚易返

位甚難下体稍受寒即發之時必俟塊中冷氣漸轉暖熱始得縮入不然則脹于隘口不能入也近來益大如卧酒瓶于胯上半在少腹半在辜囊堅緊如石其勢逆入前后腰背各道筋中同時俱脹止攻入胃則大吐上攻顛頂則战慄畏寒喻診之知為地氣上攻亟以大劑參附姜桂枝之一劑而愈以後但發悉用桂附連効其服小全大補則不應以半陰半陽之藥勿克勝病也凡陰卵為害不發則已其發必暴此陰即龍雷之火試觀天氣下降則清明地氣上升則晦塞陰遇直中陰經之病尚不知所措手况親症乎第姜桂性

熱屢服則慮其僭上旧病未除新病必起乃先以姜桂附子為小丸曝入乾透然後以參朮厚為外廓俾喉胃間自參朮不知有姜桂附子及達積塊之所猛烈始露于是病乃痊

孫文垣侄患偏墜臍腹腰俞俱腹疼左關脉弦大鼓指小茴香甘艸蒼朮益智仁防風各五分荔枝核核山查柴胡各二錢山巵青皮各七分服后其痛如旧脉更轉數恐作寒瘧急為解毒瓜蒌五錢當歸甘艸節金銀花各一錢連喬柴胡青皮各七分煎服痛定腫消因食鴉魚臍腹復脹痛發熱不眠脉復弦以山查

肝疾其狀若死亦厥陰症故溫補而痊

馮楚瞻治工刑部痲痛甚危脉之左三部強洪而數乃陰甚不足也右關尺洪大重按有力此膏梁酒濕太過者致真水消亡木失所養筋无所榮濕熱內攻陰寒外遏為疼為脹不可忍也以熟地二兩山萸山藥各二錢滋其肝腎丹皮三錢茯苓二錢澤瀉一錢五分參其子熱桔核三錢疎其木鬱製附一錢五分鹽酒炒黃柏一錢二分使寒熱互為向導由是外寒散內熱除真水生雷火息而痊

派建東秘傳治一切痲氣神方于洗浴畢濕身坐門檻

上而囊著水印一濕印即于濕即患左灸左患右灸
右俱患則左右俱灸須避四眼又一法午月午日午
時灸尤妙或小兒不須洗浴但用灰布門檻上令兒
坐之亦就所印灸即痊

王叔權曰舍弟少戲弄重得偏墜之疾有客人為當關
元兩旁相去各三寸青脉上灸七壯即痊王彥賓患
小腸氣灸之亦安

張子和治項間一男子病卒疝暴痛不任倒于街衢人
莫能動呼張掇之張引經証之邪氣客于足厥陰之
絡令人卒疝故病陰丸痛也急瀉大敦二穴其痛止

瓜蒌各二錢 金銀花連翹各八分 甘艸節 黃連 當歸
五分 青皮七分 二帖安

李士材治尹文輝嗜火酒能飲五斤五月間入閩中溪
水驟漲沙水至七里竟腹痛甚半月后右丸腫大漸
如斗閩甲匠者皆與肝經之劑及濕熱之品半年无
功歸就診李曰嗜火酒則濕熱滿中涉大水則濕熱
外來今病在右正是脾肺之濕下注辜丸以胃苓湯
加卮子枳壳黃柏茴香十劑略減即以為丸服至十
八斤全安

駱元賓十年患疝形容枯槁李視之左脇有形其大如

箕以热手按之漚：有声甚至上致于心悶絕良久以热醋熏灸方醒李曰此經之所謂厥症也用当歸四逆湯一月積形衰少更以八味丸間服半載餘積塊尽消

盧不遠治湯某長病腹痛：則繞臍有形甚則欲死皆謂生氣獨絕于內慮不起診之聞脉近尺有滑附之久痛氣羸頓乏精彩因用枸杞為君白芍茯苓肉桂吳萸佐之六劑痛止服瑞竹堂方四製枸杞丸一料竟愈天暗症：當引陰原无斯症蓋症者有形之痛而有所止之處故字從山不必定引陰也症本厥陰

已夫大敦穴者乃足厥陰之二穴也

鄭亨者病疝灸之得効其訣以淨艸一條茅及麥桿尤妙度病人兩口角為一剛指斷如此二剛：指成三角如公字樣以一角安臍中心兩角在臍之下兩傍去尽處是穴若患在左即灸右在右即灸左兩邊俱患即兩穴皆灸艾灶如麥粒大灸十四壯或二十一壯即安

奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜搐疼暗下撮痛以

致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓成瘡皆

治之吳茱萸一斤去枝梗四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸各一夜同焙乾

澤瀉二兩去灰右為細末酒煮面糊為丸如梧桐子
大每服五十九空心食前鹽湯或酒下神妙不可其
述馮仲柔云 年某倉使家傳因令局中合賣紹熙
壬子冬予親曾得効時苦奔馳寒氣攻冲小腹引痛
四日只一服藏府微動痛苦失去遂安一方名星斗
丸湯浸者用鹽水浸澤瀉用四兩切作粗片酒浸一
宿

一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦適摩腰膏內用烏
附丁射者將以厚其囊上抵橫骨端灸后溫帛覆之
痛即止一宿腫消

孤
小便秘
大便不通

續名醫類案卷二十六



國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薛立齋治一婦人小腹痞悶小便不利內熱倦懶食
用八珍加柴芩胆神治安

王肯堂曰張仲景治寒疝腹中痛及脇痛裡急者當歸
生姜羊肉湯主之本艸行義稱其無不應驗豈非補
肝之効乎余每治病其氣上冲心氣危急者以八味
丸投之立應又補腎之明驗也

羅謙甫治漆匠韓提控疝氣每發痛不可忍則于榻西
末各置一枕往來伏之以受如是三年不已与丁香
練寔凡三劑良愈夫男子七疝痛不可忍者婦人癥
聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸

子一当歸附子川棟子茴香各一兩右對碎以好酒
三升煮酒尽為度焙訖作細末每藥末一兩入丁
香木香各為分全蝎十三个元胡索五錢同為細末
拌勻酒糊為丸梧桐子大先服三十九至百丸温酒空
心送下凡疝氣帶下皆属于風全蝎治風之聖藥
也川棟茴香皆入小腹經当歸元胡索和血止痛疝
以寒邪積于小腸之間故以附子佐之丁香本香為
引導也

王海藏云楊駙馬時患風氣冲心風氣即疝氣也羅謙
甫云疝氣帶下皆属于飲食吐逆偏食枯瘦日服紫苑丸五丸至二十日

瀉出因塊如蝦蟇五六枚白膿二升愈

李靈患肥氣病肝精謂之肥
与疝氣同日服前丸五丸經一年瀉
出肉蟹二枚愈

馬元儀治陳子芳患疫喘發熱胸滿身痛左边罌凡
不時逆上痛不可忍診之肝脉弦急肺脉大閉尺虛
小此肝肺受邪之候也肝為水藏其化風其生火風
火合邪于本位則為熱為痛乘于肺金則為痰為喘
以柴胡疎用散治之表症少安欲速愈別用沙參二
兩煎服始若相安繼轉加劇再急診寸脉鼓數閉脉
急疾左丸引右凡痛甚日閉脉急疾木火日旺也寸

脈鼓數火刑肺金也肺為藏俸燄氣肅火邪入之則氣化失常金愈困而木益張也法宜滋達肺金稟疎肝木以瓜蒌實五錢潤燄紫苑三錢宣通半曲貝母消痰枳壳桔梗開鬱杏仁蘇子定喘柴胡以達之秦艽以舒之再劑而安

琇按用沙參原无大謬第單用且重至二兩又无甘潤之佐則清降之力薄而速及致水火厥張云

耳

立齋治一男子年逾四十陰囊腫痛以熱物熨之少緩服五苓等散不應足脈遲與此下虛寒邪所襲而然

名曰寒疝非瘡毒也以蟠葱散治之少可以胡盧巴凡服愈

杜辛人名京年逾三十陰囊濕痒莖出白物如膿辛則急痛此肝疝也用龍胆瀉肝湯而愈有陰莖腫或縮或挺或痒亦効

施笠澤治錢元一患疝氣冲痛盖有年矣每抑鬱則大作嘔吐瘦涎不進飲食已未春病甚陝司診得左關弦急而數右關尺俱浮大而无力此命門火衰不能生土肝木乘旺復來侮脾用胡芦巴元胡索等疏肝之劑以治其標隨用八味丸益火之原以消陰旧聞

進參朮補脾之藥以治其本漸服漸安數年沈疴不
三月而愈

錢國賓云黃州客陳思云負貨行至德州仕館其人素
有疝氣忽然陰子漸大如斗半月臥床不起偶有道人
抄化彼甚嗔怪道人曰尔病尚得我医如何發怒
遂請進坐先問根由与苾寔大紅藥一丸用无根涼
水送下供之而去約三日後再來看汝陳服藥腹中
微响如周身氣行之状至三日消已大半道人又至
仍与前藥二丸三日一次服尽陰子如故謝銀一兩
不受封紫花布道袍一件而去陳求丸方曰此藥汝

不能合用紫金錠亦可以消斗大之陰子也余与同
寓親見其治真仙丹也

蔣仲方一日治二疝一人升上作痛一人墜下作痛俱
悶痛欲絕升上者与故紙三兩炒黑豆一兩生硫黃
七錢俱為末鹽酒打糊面為丸鹽酒送下墜下者与
補中益氣湯加杜仲故紙肉桂炮姜香附川芎二人
駭曰疝氣同也何方之不同若是日始試之至明日
而皆愈

潘惟德秋間患疝氣症服肉桂小茴荔枝之類不應自
用生姜泡沙糖湯服一二日稍愈遂止飲沙糖湯而

安

吳橋治胡有濡父旦通以疝作逆槁。以其人習飲醇
第以涼劑而清濕熱遂痊一日疝作適槁他出乃逆
方生家人出槁旧方示之生按方而治不効頃之則
小溲浸短小腹浸墜復逆文孝先生至注黃金二鎰
內文孝篋中文孝力任之治再信而病反甚短者枯
堅者石矣既而槁至則病者通出錯言槁心異之此
神亂也既診曰殆矣有濡曰家大人疝通作賴公一
再劑而痊乃今兩君子亦仿故方何卒不効槁曰此
刻舟也今病得之內當在陰兩君后以陰葯投之嫌

于无陽也既以陰劑陰陽失其健而不能運則壅閉
矣家人偵其故則故女豎私為槁辭歸里中夜死文
孝祛篋歸金而去

大函集

疝

江氏甥素有疝疾發則腎囊如盛二升米增寒壯熱或
与小茴香青皮木香胡芦巴等服之囊赤而痛甚勢
將成瘕次日仍与前药診之脉数大无伦面赤黯亟
用熟地二两杞子一两川楝一枚一剂而愈後与人
鬪颊项著捧悶絕而甦次日陰囊腫大如疝發時于
是顛痛甚則囊痛減囊痛甚則顛痛減寒熱往来崑科
遍治无効盖厥陰肝脉下絡纂上行顛故上下相遠而
甚疼則互為消長也与前方数剂土下皆愈失疝治
之失宜過服香辛燥烈之品遂成勞損者多矣

鮑二官六七歲時忽腹痛發熱夜則痛熱尤甚或謂風寒發散之不効又謂生冷消導之不效語之面潔白微有青氣按其虛里則築然跳動問其痛云在少腹驗其囊則兩罩凡有曰此疝痛也與生地甘把沙參麥冬川棟米仁一劑全愈兄疝症虽有寒濕疫氣之殊余所愈多以此方捷如桴鼓蓋疝虽不一而病屬厥陰則一也要之肝木為病火抵燦火多而寒濕絕少也余鍼兒十歲時忽蹲地以拳壯其腹宛轉不能語察其面青知疝發也亟以杞子一兩加川棟一枚煎服下咽立愈

小便秘

朱丹溪治馬叅政父年旬初患小便短濇因服分利之藥大過遂致秘塞點滴不出謂其胃氣陷于下焦用補中益氣湯一服而通因前多用利藥損其腎氣遂致通後遺溺一夜不止急補其腎然後已凡醫之治是疝者未有不用泄利之劑誰能顧其腎氣之虛哉

盛用敬治文孝妣汝翊內傷新愈又病食傷他醫皆用下藥病益甚小便閉中滿腹堅如石三陰受傷所致盛診之日此不可用分理孝也理當作利宜以參芪進其氣升柴

提其氣：升則水自下矣加以益甚之劑數服霍然而愈

鍾大延治徐大理病小便秘腫脹而赤發喘衆醫皆從熱症治愈甚大延診之曰是无火也急煮附子湯一服而愈

錢唐有人小便秘百方通方不効有一道人錢宗元視之入下縮小便為縮而遂通人皆怪之以問宗元曰以其秘故醫者驟通之則小便大至小道愈澁而小便愈不得通矣今吾縮之使小道稍寬此所以得流也此一治殊為特見

黃氏小便不通陳宦麓用芒硝一錢研細龍眼肉色之細嚼咽下立通

竹鎮有人病弱不下求于乩仙判云牛膝車前子三錢共五錢同判為細末將來白水煎空心服之果愈居

易錄

龔子才治一人小便不通服涼藥過多脹滿九死以附子理中湯加琥珀末調服立愈

一人小便不通已經七八日遍身手足腫滿諸醫罔效以紫蘇煎湯入大盆內令病人坐重蒸冷則添滾湯外用鹽炒熱熨臍上遍身腫處良久疎通腫消而

愈

李士材治王郡守疫火喘咳正甚時忽然小便不通自服車前木通使苓澤瀉等藥小腹脹悶點滴不出李曰右寸數火是金燄不能生火之故惟用紫菀五錢麥冬三錢五味十粒人參二錢一劑而小便涌出如泉若沒滲之劑則必致燄急矣

先兄念山以謫官鬱怒之餘又當盛夏小便不通氣高而喘以自知醫服胃苓湯四帖不効李曰六脈見結此氣滯也但用枳殼八錢生姜五片急火煎服一劑少通四劑全安

俞孝廉修府志勞神忽然如喪神守小便不通李診之曰寸微而尺鼓是水涸而神傷也用地黃知母各二錢人參丹參各三錢茯苓一錢五分黃柏一錢二劑稍減十劑全安

馮楚瞻治王氏女年十三小便不通甚危初二三歲時乳母恐其溺床切戒之由是寤寐刻在心但三歲能記數年以來日中七八次夜中七八次習以為常漸有冷狀近來尤甚或以導赤利水之劑投之初服稍應久則增劇點滴不通脈之六部洪數久按无神知為過于矜持勉強小便心腎久虛又服利水之劑

真陰益槁臟涸津枯氣何能化以八味湯知五味麥
冬取秋降白露生之意每劑為熟地二兩連進兩服
使重濁以滋之為小便張本再以其查探吐之上竅
既開下竅日利果愈繼以調養失宜一日后其症復
發渠以前方二劑服之亦令探吐不唯不効初止少
腹脹悶吐后胸膈亦脹悶唯堪矣六脈洪大而空馮
日前者神氣未衰今則汗多心跳精力甚疲必補其
中氣乃能升降運行仍令服前方二劑悶尤甚則以
人參一兩附子三錢濃煎溫服少頃自胸次以至
小腹漉漉有聲小便連行而愈信乎為不執方也

可入

兜門

吳字先治曹世常患小便不通多服分利之藥遺尿一
夜不止既而仍復秘塞點滴不行此利藥太過腎氣
虧極用補中益氣送腎氣丸而痊

黃履素曰予家有僕媼患小便不通之症時師為以丸
節湯腹漸滿而終不通凡殆矣有州澤匠人以白蘿
蔔子炒香白湯下數錢立通

孫文垣治袁洪溪以冲暑往來經略政事致發熱燥渴
因過食水浸瓜果遂成泄瀉水小短少醫与胃苓湯
加利藥瀉止而大便燥結不堪乃用潤腸丸復瀉不

止又進前方瀉止而小水失其常度臍下脹急立溺
則点滴不出卧則流滲不竭以頓取夜壺致通宵不
寐治半月精神削寢食廢診之兩寸短弱閉緩大兩
尺洪大此餘暑未消素善飲濕熱流于下部也以益
元散三錢煎香薷湯服之畧无進退脉亦如昨再思
之此蓋尿管不對也膀胱者脬之室也脬中濕熱下
墜立便則窠不對水？因不得出卧則脬不下墜而
滲出膀胱猶以窠不對消？流溢不能暢達故了而
不了也

提補止中二焦元氣兼清下焦濕熱斯得矣今氣虛
下陷已久二劑未能收功安得伏枕而卧且此不
寐非心血不足乃因著意防閉小便故也暫以物襯
席上任其流出免取溺器致擾其神自然熟寐矣以
補中益氣湯提補上中二焦元氣加黃柏知母祛下
焦濕熱使清陽升則濁陰自降脬元濕熱則不下墜
窠可對而病可痊矣如法治之果啞然而竟早視觀
布亦不甚濕以冬不閉目得此恬寢神氣頓回如未
病者

張隱庵治一書吏患癰閉諸治无効更補中益氣投之
一劑而愈或問曰此症人皆以降利治之不効今以

升提治之而効其故何也曰君不見夫水注之乎閉其 upper 而倒懸之点滴不能下矣去其止之閉而水自通流非其驗耶

薛立齋治一婦人患小便淋瀝不通面青脇脹諸方不應此肝經氣滯而血傷用厄芎服愈

婦人小便不利小服并水道秘悶或時腹脇脹痛此肝火用加味道遙散加龍胆州四劑少安乃去胆州佐以八珍加炒卮而安

鄭奠一曰木瓜乃酸漬之品世用治水腫腹脹誤矣有大寮舟過金陵愛其芬郁購數百果置之舟中舛舟

人皆病溺不得出医用通葯罔效迎余視之間四面皆木爪香笑謂諸人曰撤去此物溺即出矣不必用葯也于是尽投江中頃之尽溺

汪認菴曰家母舅童時病溺塞服通淋葯罔効老医黃五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱難非淋症也以牛骨作楔塞於皮端竅遂展開勿葯而愈使重服通利葯得不變症乎乃知医理非一端也

一人燠熱傷下焦數小便不利當養陰當歸地黃牛膝知柏苓州陳朮之類

紹興刘駐伯汝翼云魏郎知明州時宅庫之妻腹脹小便不

通垂殆隨行御醫某人治此藥令服遂愈瓜蒌多少
培乾碾為細末每服三錢重熱酒調下不能飲者米飲
調下頻進以通為度

小便不禁 頻數遺漏

孫文垣治倪二南內人小便不禁一日二十餘起脈之
右寸洪而有力左寸虛右寸沈微此心腎不交也以
當歸遠志丹參丹皮桑螵蛸人參山萸肉益智仁黃
伯知母為丸服之五日而安後凡遇辛苦則發以此
服之立効

薛立齋治一嬾人小便自遺有時不利日晡尤甚此肝
熱陰挺不能約利用六味丸料加白朮酒炒黑黃柏
七分知母五分数劑諸症悉愈若誤用分利之劑更
損真陰必致不起矣

一老嫗患前症惡寒體倦四肢逆冷薛以為陽氣虛寒用補中益氣加附子三劑不應遂以參附湯四劑而安

李士材治張方伯夫人患飲食不進小便頻索不禁李曰六脈沉遲水泉不藏是元火也投以八味丸料兼進六君子加益智仁肉桂二劑全愈

俞文孝憂憤經旬忽然小便不禁醫皆以固脬補腎之劑投之凡一月轉甚李診之曰六脈平之則軟按之則堅此肝腎之陰有伏熱也用丹皮茯苓各二錢甘草稍六分黃連一錢煎成調黃鳩湯與服六劑而安

矣適有吳門醫者曰既愈當大補之數日后仍復不禁再來求治李曰肝家數有鬱熱得溫補而益熾遂以龍胆瀉肝湯加黃鳩湯服之四劑即止更以四君加連芩而安

張三錫治一人病風狂服甘遂等利藥太過小水不禁服桑螵蛸散未終一料而安真桑螵蛸同桑皮炒遠志菖蒲龍骨人參茯苓當歸龜版醋炙已上各一兩為末參湯下二錢

薛立齋治一婦人患小便頻數日晡熱甚此肝脾血虛氣滯而兼濕熱也用逍遙散加車前而愈

婦人患前症發熱煩躁面目赤色脈洪大而虛此血
虛發熱用當歸補血湯而痊

一婦人久患前症泥屬於火雜用寒涼之劑虛症悉其
曰此脾胃虧損而諸經病也當補中氣為主遂以六
君補中二湯兼服愈

劉大參年近六旬形氣瘦弱小便不禁或頻數內熱口
乾或咳嗽喘暈此肺腎氣虛用六味丸益氣湯以滋
化源彼不悟反服補陰降火瀉積之劑陰竅作痛或
小便不利仍前藥而安

王執中壯年寓孳忽有遺泄之患閱方書見有用五
倍子末酒調服者服之而愈葯若相投豈在多品而
亦無事于灸也 資生經

大便不通

安康郡太守苦風祕陳良甫為處二仁凡杏仁去皮尖
麩炒黃麻仁另研枳殼去穰麩炒為末訶子炒去核
為末右用煉蜜為丸桐子大每服二三十丸溫水下
未利增之乃愈

薛立齋治一老媪大便欲去而難去又不堅寔腹內或
如故或作脹兩關尺脉浮大薛以為腸胃氣血虛弱
每服十全大補湯加肉蓯蓉去后始快若間二三日
不服腹仍脹便仍難

一媪人大便秘瀆諸葯不効苦不可言令飲人乳而安

張子和曰頃有老人年八十歲藏府滯滯數月不便每臨便時頭目昏眩鼻塞腰疼精漸食減縱得食便結燥如彈一日友人命食血臟葵羹油漂菠菱菜遂頓食之日不之前后皆利食進神清年九十歲無疾而終畜經云菠菱菜寒利腸胃芝麻油炒而食之利大便葵寬腸利小便年老之人大小便不利最為急切此亦偶得瀉法耳

子和表兄病大便燥澀無他症當不敢飽食飽則大便極難結寔如鉄石或三五日一如圓目前星飛鼻中血出肛門連廣腸痛極則發昏服葯則病更加已

豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏葯性暴急不服但卧病待尽而手脉息俱滑寔有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等葯使食菠菱菜及猪羊血作羹百餘日充肥親知駭之粗工不知燥分四種燥于外則皮膚皺揭燥于中則精血枯涸燥于上則咽鼻熱乾燥于下則便溺結秘夫燥之為病是陽明化也水液寒少故如此然可下之當擇之巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹽以軟之周禮曰以滑養竅

龔子才治一男子年六十七因怒左邊上中下有三塊
時動而脹痛揉之即散去心痞則噯食下胃口氣溢
夜卧不安小便澁大便八日不通一醫以大承氣湯
一醫以化滯丸一用猪胆導法一用蜜道子俱不效診
之六脉弦數有力此血不足氣有餘積滯壅塞與大
黃末三錢皮硝五錢熱燒酒調服下黑糞如石數十
枚如前再進下糞彈盆許遂安后以四物湯加桃仁
紅花酒蒸大黃、連危子三稜莪朮枳殼青皮木通
甘草十劑而安

李時珍治一宗室年已六十平生苦腸結病旬日一行

甚于生產服養血潤燥藥則泥膈不快服硝黃通利
藥則若罔知如此三十餘年矣診其人体肥膏粱而
多憂急日吐酸瘦碗餘乃寬又多火病此乃三焦之
氣壅滯有升无降津液皆化為痰飲不能下滋腸腑
非血燥比也潤劑留滯硝黃徒入血分不能通氣俱
為痰阻故無效也乃用牽牛末皂角豕凡与服即便
通利自是但竟腸結一服就順亦不妨食且復清爽
盖牛能走氣分通三焦氣順則痰遂牽飲消上下通
快矣

外甥柳喬素多酒色病下極脹痛二便不通不能坐卧

立哭呻吟者七日夜医用通利药不效遣人叩李
思此乃湿热之邪在精道壅胀隧路病在二阴之间
故前阻小便后阻大便病不在大腸膀胱也乃用楝
寔茴香穿山甲等入牽牛加倍水煎服一服而減
三服而平

張景岳治一壯年素好火酒適夏月醉則露卧不畏風
寒此其食性臟氣皆有大過人者因致熱結三焦二
便俱閉先以大承氣湯用大黃五七錢如石投水又
用神祐丸及導法俱不能通且前后俱閉危益甚遂
仍以大承氣湯加生黃二兩芒硝三錢又加牙皂二

錢煎服黃昏進药四鼓始通大便通而小便亦利此
所謂盤根錯節有非斧斤不可者若優柔不斷鮮
不害矣

症与李紫同
治較李紫劣

朱翰林太夫人年近七旬偶因一跌即致寒熱醫与游
陰清火勢轉甚診之六脉無力虽頭上面身有熱而
口不濁且足冷過股曰此陰虛受邪非跌之為病寔
陰症也

陰虛陰症
四字模糊

遂以理陰煎加人參柴胡二劑而

熱退日進粥二三碗已而大便半月不通腹且漸脹
咸以燥結為火欲復用涼药張不可謂若再用清火
其原必敗不可為矣經曰腎惡踈急食辛以潤之正

此謂也乃以前藥更加姜附倍用人參當歸數劑而便通脹即退日就痊

此實風秘之類未可歸功姜附

按此症乃陰虛陽越亦類中之輕者一跌而病良有以也不知陰症二字何以挿入其生平見解大可知矣

李士材治蔣少宰服五加皮酒遂患大便秘結四日以米腹中脹悶服大黃一錢通后復結李曰腎氣衰少津液不充誤行疎利

疎字不妥

足助其火矣以六味丸料煎成加入乳一杯白蜜五錢便通十劑愈

顧文孝素有風瘦大便秘治風瀕治血乃太法也用十

全大補湯加秦苧麻仁杏仁防風煨皂角仁而愈后

不再發

此亦風秘之候

馮楚瞻治姓人六脉沉微身熱四肢厥冷發狂譫語

連夜不寐口渴活飲二便俱秘

絕似陽明熱症而新為陰伏逼陽乃舍症

從脉之治此陰伏于內逼陽于外因津液不行故小便秘

而口乾渴非寔熱也因穀食久虛故大便秘不通非燥結也若不急為斂納則真陰真陽並竭矣乃用

熟地麥冬以壯金水炒白朮以托住中氣牛膝五味以下趨藏飲製附子以引火歸原另重煎人參沖服

三劑定神思清而愈

按此亦陰虛陽越之病甚則為類中其治法亦大醇而小疵耳至云陰伏于內逼陽于外亦與景岳案中謂為陰症同一模糊也此二案不入補中門者以世俗惟以二便為急且風秘一條人多不講也

胡念菴治陳鹽商年七十六矣春時患中風脫症重劑參附二十餘帖獲痊至十月大便秘結不行日登廁數十次冷汗大出面青肢厥医用滋補劑入生大黃三錢胡深以為不可戒之曰老年脫后幸參附救全不能安養過于思慮以致津液枯竭傳送失宜何

事性急以速其變若投大黃往而不返恐難收功矣姑忍二三日勢當自解病者任其遲緩日出怨咨之辭次日不得已用人參二兩茯苓一兩當歸五錢松柏仁各五錢附子三錢升麻四錢煎服外用綠凡一斤入固桶以滾水沖入坐上自通 臣林指月

按傷寒瘧痢之后患秘結者皆由攻下散表失宜所致究其由則皆虛燄為病至若風秘一條其病本由燄火生風醫者昧于風字動用風藥死者已矣其存者亦必貽后患然此尚輕者也

張路玉治楊松齡夏月感冒復發散十餘劑二便俱閉

一医用硝黃下之少腹左畔遂脹起如墩不赤不熱
有時嘍々作聲瘍匿乃以敷藥治其外以解毒利水
治其內葯未進而踈擾不安診之六脉緊細而駛此
過汗津液大傷又与若寒攻裡致陰邪內結膀胱不
化弱積不通法在不求幸胃氣有權形神未槁尚能
少進粥糜姑許以治因与濟生腎氣大劑煎成人有
嘴壺托起其頃徐々仰灌并許頃令轉側以鵝翎探
吐即時溲便如注少腹頓平更与十全大補調理而安
此症前后患者四五人或小便淋瀝或遺溺不止或
形羸氣脫皆力辭不治

按此由感症混表混攻而成秘結收入此門以備
參酌

孫文垣治溫南溪內人居常大便秘結面赤不思飲食
頭時眩暈診之石闕尺滑大有力此疫症火也用瓜
姜四錢為君滑石三錢枳實二錢半夏一錢半為臣
蘿卜子姜黃各一錢為佐兩帖愈矣又教以或遇大
便秘服尤荅丸加牛膝南星立愈

一人大小便秘數月不通用商陸搗爛敷臍上立通
本
冊經目

一人大便秘久用烏桕木方停一寸劈破以水煎取半

蓋服之立通 全上

陸養愚治閔望亭年近古稀常患脇痛用行氣藥及當歸芍藥丸即愈后患便秘服潤腸丸便虽通而飲食減胸膈不舒有時溫作痛苦數日不服又秘結矣或以高年血不足所致投以白朮湯數劑并小便亦不通三日脹急殊甚竇導熨臍百計不解服之沉遲而弱詢其平日大便有欲解不解之狀及解又潤而不燥矣此非血秘乃氣虛不能傳送所致也用補中益氣湯少以木香白豆蔻佐之二劑而便俱通此后常服一劑不惟無秘結之患且飲食倍增脇痛亦不

作矣

此抄聶久吾治乃父案

陸祖愚治邱念招稟賦薄弱常有夢遺疰愛食煇炒飯大便二三日一度思受風寒仍吃煇飯且日進四餐旬日間飲食如舊而大便竟不行后復寒熱頭疼發黃發斑黃退而斑色純紅仍以涼解之劑煎送潤字凡二錢五分良久去煇矢七八塊斑消身微涼然胸口尚不可按再服涼解六劑便不行而小腹微滿或謂病已月餘可以試下弗之聽仍用潤字凡二錢五分姜湯服少頃去大便七八塊而胸中如故令以前方日服一劑間二日投潤字凡二錢病至六十餘日

服潤字丸計五兩胸膈猶未清然病久肌肉削尽况常有遺症不宜再行消導矣与枳實二錢山查二錢人參六分附子四分連進三劑遂大便日行一次又參漸加枳實漸減數劑后食進病起服參至半斤始得復元

丹溪治一婦人脾疼後患二便不通此是瘦膈中焦氣聚上焦二陳加大通先服後吐渣再煎燒皂角灰為末粥清調下一尼体厚病吐逆忽小便不利頭汗出立斃入小便

薛立斋治儒者王錄之素瘦甚導吐之後大便燥結頭暈眼花等症尺脉浮大按之則漉此腎氣虛而兼血虛也四物送六味丸四劑諸症悉退仍用前凡一月而康

食憲高如齋素吐瘦服下瘦藥瘦去甚多大便秘結小便頻數頭暈眼花尺脉浮大按之如無謂腎家不能納氣歸源前為復耗金水而甚用加減八味丸料煎服愈

陳三農治中州王太守素多酒食藥下極脹痛二便不通坐卧不能沉吟七日矣百般通利不應此濕熱之邪遏塞二陰壅服陸路故前後不通病不在大腸膀

朧也乃用韭菜子以山甲茴香棟寔各一錢五分入
牽牛頭末三錢水煎一服即減三服即愈乃知牽牛
能達右腎命門走精隧故東垣用天真丹以牽牛鹽
水炒黑入佐沉香官桂杜仲破故紙治下焦陽虛也
此即時珍治柳高案三農抄之
增入韭菜子及乃知以下數語

陳良甫曰一男子病風淫未疾或用快葯利之患肺痿
咯膿血至大便不通而死惜哉

易思蘭治一儒官患便秘初因小便時秘服五苓散
八正散益元散俱不効一醫診得二尺俱無作陰虛
水酒用八味凡日一服三日大便亦秘口渴咽乾煩

滿不睡用脾約丸潤腸丸小便日數十次惟點滴而
已大便連秘十日腹滿難禁眾議急用三一承氣湯
下之服後微利隨秘又加小腹繞臍滿痛復用舟車
凡遇仙丹每空心一服日利三五次裡急後重下皆
赤白如此半月日夜呻吟惟進米飲及茶盃許診得
兩尺沉伏有力兩關洪緩無力兩尺不見口閉尺無
恙病在膈上此思慮勞神氣秘病也以越鞠湯投
之服一盃暖氣連出再一盃大小便君傾而下皆沉
積之物渾身稠汗因進姜湯一盃熟睡竟進粥一
盞復診脈平調愈

立齋診職方陳莪齋年逾六旬先因大便不通服內疏
等劑后飲食少思胸腹作脹兩脇作痛形體倦怠兩
尺浮大左關短澁右關弦澁時五月此乃命門火衰
不能生脾土而肺金又尅肝木決其金旺之際不起
後果然

萬密齋治汪玉虹大便不通服通幽湯潤腸丸俱不効
診其脈微氣弱乃內傷症也氣口脈浮大而軟此氣
不運而血不潤氣血兩虛故也宜亟補之曰其如腹
脹何曰無慮但服補中益氣湯倍加當歸五日而愈
矣

許季士治一人母年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食
召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目葯數
日無效全不入食其家憂惶許辨說前葯皆誤矣
此症正是老人風秘藏府壅滯聚于胸中腹脹惡心
不思飲食又上至于巔則頭痛神不清也若藏府流
暢諸疾悉去矣乃用紫蘇子大麻子各半合先淨研
細取汁一盞分二次煮粥兩啜而氣泄先下結矢如
胡椒者十餘枚漸通而愈

文路公在北門日盛夏間苦大腑不調公隨行醫官李
琬奉衢州市戶公不独終始涵容之又教以醫事公

病泄利琬以言動搖之又求速効即以赤石脂龍骨
乾姜等藥饋公：服之累日不大便其勢甚苦初虞
世共城來見公未坐定語及此事公又不喜服大黃
為虞世告曰此燥矣在直腸為所不及請以蜜允導
之公以為然時七月中苦熱虞世冒汗為公作蜜允
是夕三用下燧矢四五枚大如胡桃色黑如栗乘
公二三日間飲食如故良方

指宮有一老人患風秘八九日不通有木匠授以此方
只一服見効用不蛀阜角當中取一寸許去黑皮以
沸湯半盞泡上用盞蓋定候通口服之先辨少粥通

後即食 是為方

繆仲淳治唐震山年七十餘大便不下胸中作悶曰此

血液枯槁之候用大肉苁蓉三兩白酒浸洗去白湯

三椀煎一椀頓飲：竟大便通胸中快然偶一醫問

疾曰此故為也當調補脾胃為主易以白木厚朴淡

苓陳皮病如故唐翁曰誤矣仍飲前為立解高存之

聞而叩其故繆曰肉苁蓉峻補精血驟用之及動大

便為性載甚明也

張選卿治大便不通甚驗方硃砂加飛五錢真芦荟研細

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒吞下朝服暮

通暮服朝通瀕晴日合妙

劉雲密治一老人因胃雨感寒未經發汗至春初內熱煩燥胸膈緊滿十日不大便用清解二劑入口即吐其半加熟大黃利之下咽即吐去殆盡蓋因疫熱疑結胸膈以治血分者反拒而不受也因用牽牛大黃丸緩服之而大便通后乃服清熱化疫葯十餘劑而安

吳橋治張邦達謝邑歸年踰艾矣其貌壯碩如廁率易行偶以信宿夢遺早呼旨酒進人參膏二七既而大溲稍寔無他端張所善者已深以為誤飲而內勢不

急下且虞有他既飲大黃湯不為動猶以為熱甚至于再三腹脹膨脹石矣旬日尸卧如縛昏瞑不食不言擒診之脈隱：將絕橋曰腎司啓閉主二溲脾居中制之必閉脾而后轉運長者故中枵而下瀉誤以悍劑代之脈有死徵不可為矣衆曰否即中氣乏過下且如建瓴何不為動橋曰公等信知脾虛不任寒涼不知脾斃則寒涼無所用矣諸子跪曰誠得一劑藉于庶毋怒于人子之心曰第進獨參湯當下其下亦薄于治無俾既得劑則腸鳴而溲腹脹者虧三之一張乃張目問狀人：以為更生諸子問曰大

黃不行而人參行何說橋曰否中權廢矣即前茅安
所受命哉補中而健招搖摧堅者始為之用此亦人
參用大黃尔非自用而能下之頤病少減而脉不歸
終于不治深且復至將攘為己功大詬諸子曰尔曹
以不治之家大人無人子礼茲更一下而起復何待
乎橋故避深度復爭之無益適諸子問可否乃徐應
曰茅死耳下則死疾不下則死遲公等自裁橋何敢
与深詬愈急卒復下之不旋踵死矣 太函集

王生病發熱頭疼腹脹甚醫為之解散熱退而疼如故
且不得前后澀以又大黃通之大澀稍行小便赤澀

脹痛特甚仍以為熱結將復下之橋曰病得之三勞
倦上內復食冷尔內則損腎勞搏食冷則傷脾腎主
大小澀腎損則不能轉輸故作濕熱而為脹藉冷亟
下則將亡陰脹滿有加矣危之道也王俯首叩枕曰
誠如公言三者皆如見遂授人參五苓散一服得前
澀再乃大通痛亦漸減病者求通后澀急橋曰公六
脉沉微且數必假信宿脾氣始回脾得生則濕熱將
自行毋欲連明日大澀自下調愈

驚 顛狂
癩 笑哭
不眠 跌扑
誤吞諸物

續名醫類案 卷二十七 二十九

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類聚卷二十七

錢唐 之 琇玉橫軸 男 弒 編次

驚

張子和治衛德新之妻旅中宿于樓上夜值盜劫入燒舍驚墮床下日後每聞有响則驚倒不知人家入等躡足而行莫敢觸冒有年餘不痊諸醫作心病治之入參珍珠及定志丸皆無効張見而斷之曰驚者為陽從外入也患者為陰從內出也驚者為自不知故也患者自知也足少陽胆經屬肝木胆者敢也驚相則胆傷矣乃命二侍女抱其面手暖高榻之上曰

面前置一小兒張曰娘子當視此一木猛擊之其煩
大驚張曰我以木擊兒何以驚乎伺少定擊之驚也
緩入斯須連擊三五次人以杖擊門入遣人畫背後
之窓徐驚定而笑曰是何治法張曰內經云驚者
卒之卒者常也卒常見之必無驚是夜使人擊其門
窓自夕達旦夫驚者神上越上從擊下兒使其下視
所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜張
至是終身佩服

卜氏子年二十八病身弱四肢無力面色蒼黃左脇下
身側上下如臂狀每發則痛無時食不減大便如常

小便微黃已二三年矣諸醫計窮求張治之視其部
分乃是厥陰肝經兼足少陽胆經也曰甲胆乙肝故
貴其黃者脾也診胆脉小此因驚也驚則胆受邪腹
中當有驚涎綠水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾
作乃夜以舟車一百五十九番川散四五錢加生姜
自然汗卒且果下綠水四五行或問大加生姜何也
曰辛能伐木也下後竟微疼令再下之比前為減三
之一人下綠水三四行痛止思食及有力張謂卜曰
汝妻亦當病卜曰太醫未見吾妻何以知之曰尔受
此驚凡年矣卜曰當被火時我正在艸堂中熟寐人

驚喚我睡中驚不能言火已塞門我父拽出我火中
今五年矣張曰汝胆伏火驚甲木乘脾土是少陽相
火乘脾土中有熱故能食而殺穀熱雖能化穀其精
氣不完汝必無子蓋敗經反損媾人汝妻必手足熱
四肢無力經血不時卜曰吾妻寔如此亦已五年矣
他日門人因觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論
其法何如以問張曰且如胆木乘胃土此土不勝
木也不勝之氣尋採其子已土能生庚金庚為火勝
味辛者為金故火加土姜使茂木然不開脾土無由
行也遂用舟車丸先通其閉塞之路是先瀉其所不
勝後用姜汁調滑川散大下之次瀉其所勝也大抵
陽干尅陽干府尅府藏尅藏

張路玉治吳昭如室年壯体肥而素有嘔血腹脹脾約
便難之恙兩遭回祿憂患頻仍近于失血之後忽然
神氣憤亂口噤目矇診其氣口數盛而促人迎弦大
而乳形神不能自主似有撮空之狀或謂疰犯條款
不出五日当死張謂不然若是撮空必然手熱当作
散漫今括着衣被冷力扑搗定為疾驚挾怒無疑爪
者筋之餘非驚怒而何況脉來見促当是痰氣中結
殊非代脈之比詢其病因驚怒俱有遂用勾藤一兩

煎成入竹瀝半杯姜汁五匙連夜製服。後即得安
卧六脉亦少卒但從未退仍前方用減半調牛黃末
一分共夕大解三度去燄矢五六十枚腹脹頓減脉
靜人安

老僧悟菴心悸善恐過服補心養血之藥不應天王補
心丹服過數斤驚悸尤甚面目四肢微有浮腫之狀
求張治察其形肥白不堅診其脉濡弱而滑此氣虛
痰飲浸漬于膈上也以導痰湯少加參桂通其陽氣
數服而悸恐悉除更以六君加桂水泛丸調補中氣
而安

吳學先治王兵憲患驚悸時或煩躁夜更不安石閉虛
弱五寸尤甚与加味歸脾而愈

龔子才治一童子因用心過度少寐驚悸怔忡惡寒先
用補中益氣湯茯苓杏仁遠志惡寒漸止人用加味
歸脾少安再用養心湯全愈

杜某 當是杜士治林孝士子居常好食海蛤飲食之頃未嘗
不設至十八年忽面色頹青形俸瘦削夜多驚悸皆
謂勞瘵之疾百治不痊杜脉之曰非病何以知之虽
瘦削面青精神不減問孝士子秀才好食甚物日多
食南海中味杜曰但多服生津液葯病当自愈如是

經兩月面色自有紅潤意夜亦無驚悸林間所以然
杜曰王水素問云鹽發渴乃勝血之症海味皆鹽物
既多食使心血漸衰則夜驚悸今既去減用生津液
之藥人且少壯故疾易去

薛立齋治一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾湯
為主佐以八珍湯諸症少安入用加味道遙散益志
丸而安

一婦人患心悸怔忡日晡發熱月水過期飲食少思服
八珍湯加遠志山藥米仁三十餘劑漸愈佐以歸脾
湯全安後因勞發熱食少倦用補中益氣湯又因

怒適月經去血不止前症復作先以加味道遙散熱
退經止入用養心湯治痊

一婦人驚悸怔忡自汗盜汗飲食不甘怠惰嗜卧用歸
脾湯而安至年餘懷胎醫結患前症魚血便血仍
前湯而安

許紳者京師人嘉靖初供事御藥房受知于世宗累遷
太醫院使歷加工部尚書領院事二十年宮婢楊金
英等謀逆以帛縊帝氣已絕紳急調峻藥下之辰時
下藥未時忽作聲去紫血數升遂能言入數劑而愈
帝德紳加太子太保禮部尚書賜資甚厚未几紳得

疾曰吾不起矣前者宮變吾自分不効必殺身因此
驚悸非葯石所能治也已而果卒賜諡恭僖官其一
子卹典有加明世醫者官最顯止紳一人明史 陸道事亦
載此葯乃大黃
桃仁紅花等

馬元儀治一人患心悸怔肢倦怠或以陰虛治之不
効診其脉浮虛無力蓋得之焦勞思慮傷心也內經
云心痺者脉不通煩則心下鼓又原病式云水衰火
旺心胸躁動據此則足陰虛矣且後而于二
句人無發明人何必勉強用入其言脉
不通者正以焦勞太過心藏之脉鬱而不通也鬱則
傷血而動君火故悸動不安也心之下脾位脾受心

以病鬱而生延精液不生清陽不布故四肢無氣動
而倦怠也法宜大補心脾乃與歸脾湯二十劑即以
此方丸服

章氏頗因失時于歸勞心倦鬱形志倍傷遂心悸恍惚
身體如在舟中雲霧中或与降氣理痰之劑不應診
之而脉虛微尺脉倍弱曰憂勞過度則脾損脾虛必
盜母氣以自求故心虛而悸心藏神為十二官之十
虛則無所聽命而恍惚不安也宜大培土氣則脾自
復不仰給予心而心亦安神亦守矣與參附理中湯
四劑全安

仲氏女因驚恐即發熱神昏語言措妄診之右結滿左
浮弦此虽驚怒而得寔先因悒鬱所傷也凡鬱則肺
金必虧肝木因之寡畏而妄行腎水因之失養而不
足加以驚恐則腎益傷而肝愈擾其發熱者風木內
甚也神昏者火熱上升也宜舒通肺氣以制肝生腎
用姜仁紫苑只壳吉梗杏仁蘇子秦艽胆星二劑右
脉透神氣清加生首烏黃連二劑熱亦退再以生地
三錢首烏五錢遠志一錢牛膝知母胆星貝母橘紅
茯神各一錢甘艸五分而愈盖金氣治則木受制而
水得養所謂一辛而三善備也若泥驚恐所致而用

金石之品不几延寇入室乎

高逢辰表姪嘗遊惠山吳歸遇一巨人醉卧寺門驚悸
不解自是便溺日五六十次李氏云心小腸受感腑
也因驚而心火散心虛腎冷而然其傷心傷腎之驗
張 說續編

按經云驚則心無所倚恐則傷腎是為水火不交
二臟俱病臟既受暗欲出為其可得乎此受感臟
廢運化無權而溲泄不禁矣 原注

長山徐姬得驚疾初發手足顛掉脫去衣裳裸而奔或
歌或哭或牽曳如舞木偶粗工見之吐舌走以為鬼

迷周漢卿刺十指端出血而愈

續文粹
全上

繆仲淳治顧太孝叔夏內八舟中為火所驚身熱瘦弱
几成瘵症遂誤投參芪勢危甚以清肌安神之劑與
之戒以勿求速効凡十數劑而安麥冬青蒿子銀柴
胡桑及枇杷叶各二錢炙鱉甲苡仁各三錢五味白
芍生地各一錢

施沛然

疑即
錢洋

治呂孝廉沈僕患驚悸三月聞响則甚遇

夜則恐之甚則上屋踰垣夜食旋飢日咬飯無算咸
謂心偏大神用補心湯尤甚脉之右關洪數無倫兩
尺浮大按之極濡病得于酒且內腎水枯竭客熱化

胃經云腎主恐又曰胃熱亦令人恐又曰胃熱則消
穀勿飢又曰足陽明病聞木音則惕然而驚甚之則
踰垣上屋此病在胃與腎脾合胃心屬火是脾之母
補心則胃益而寔火滅則水益潤故藥之而病反甚
也但病不在腎而標在胃先治其標用瀉黃散後治
其本用腎氣丸一病而寒熱並用補瀉兼施第服瀉
黃散三日當不飢矣服腎氣丸十日自不恐矣已而
果然

一儒者苦孝久困場屋得疾吐血盈盆脛骨立夜卧
交曉即夢鬥敗爭負恐怖之狀不可形容如是十載

每勞則發用鎮心安神不効一日讀藏氣法時論乃
知人魂藏于肝；又藏血作文既苦衄血又傷則魂
失養故交睫若此知非峻補不奏功乃以酒鎔鹿角
膠空腹飲之五日而睡卧安半月而肌肉生一月而
神氣復 朱氏選

張景岳治一強壯少年遭酷吏之恐病似脹非脹似熱
非熱絕食而困衆謂疫火宜清中焦診之曰此恐懼
內傷少陽氣索而病及心腎大虧之症也遂加溫補
兼治心脾一月而起愈後虽形氣健如初而陽寂不
辛告之曰根蒂若斯腎傷已極非少壯所宜之兆連

宜培養心腎庶免他虞彼反以恐嚇為疑全不之信
未及半年復病而歿 朱氏選

顛狂

孫兆治相國寺僧充患顛疾經半年遍服名醫藥不効
僧俗兄潘氏家富召孫治之孫曰今夜睡著明後日
便愈也潘曰且告投藥報恩不忘孫曰有鹽物但與
師吃待渴却來道至夜僧果渴孫至遂求溫酒一角
調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡而
日夜乃覓人事如故潘謝孫問其治法曰衆人能安
神矣而不能使神昏得睡此乃夫苑方中硃砂末仁
乳香散也人不能用耳辰砂一兩光明有墻壁者末
仁半兩微炒乳香半兩光瑩者右量兩患人飲酒几

何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作
一服溫酒調下作一盞調之令頓飲如飲酒素少人
但以適量取醉服藥訖便安置床枕合卧病淺者半
日至一日病深者三兩日令家人潛伺之氣息勻調
但勿喚竟亦不可驚觸使竟待其自醒即神魂定矣
萬一驚悟不可復治正肅吳公少時心病服此一劑
五日方寤遂痊 醫家綱目

浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩為末再重一錢
井花水調滿一盞投之隨得大吐之後熟睡勿令驚
動遂安 同上

竇才治一人得風狂已五年時發時止百治不效竇為
灌蠟聖散三錢先灸巨闕五十壯醒時卧服入灸心
俞五十壯服鎮心丹一料竇曰病患已久須大發一
回方愈後果大發一日全好又一婦人產後得此亦
如前灸服姜桂而痊

張子和治一叟年六十值淫疫煩擾而暴發狂口鼻竟
如虫行兩手總檢數年不已兩手脉皆洪大如絙繩
斷之曰口為飛門胃為竇門口者胃之上源也鼻者
足陽明經起于鼻交頰之中旁納太陽下循鼻柱交
人中環唇下交承漿故其病如是夫淫疫煩擾便屬

火化火乘陽明經故經言陽明之病登高而歌棄衣而走罵言不避親疎又況肝主謀胆主決徵役迫遽則不能交則肝屢謀而胆不能決屈無所伸怒無所泄心火壅滯遂乘陽明金金作然胃本屬土而肝屬木胆屬相火之隨木氣而入胃故暴發狂論症如列李朱羅氏當退舍視火甚餘子終之何足語此乃命置煨室中涌而汗出如此三次內經曰木鬱則達之火鬱則發之良謂此也又以調胃承氣湯半斤用水五升煎半沸分作三服大下二十行血水与瘀血相襍而下數升之多乃安以通聖散調其後大下則是土苑奪之也

一男子落馬發狂起則目眩狂言不識親疎棄衣而走罵言涌出氣力加倍三人不能執縛燒符打醮問鬼跳巫殊不知顧丹砂牛黃犀珠腦射資財散去室中蕭然張以車輪埋之地中約高二丈許上安中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛病人于其上使之伏卧以軟褥觀之令一人于下坐机一枚以棒境之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許繞車輪數匝其病人曰我不能堪可解我不從其言而解之索凉水与之水飲數升狂乃止矣此其治法也庸之所能辨哉

范純佑如喪 發狂閉之室中夜斷窓櫺登樨樹上食
樨花几及旦家人接下自是遂痊按此亦驚恐傷
肝疫扶敗血遂致發狂偶得樨花利疫飲散滯血之
功与張仲景治積熱發狂用承氣湯畜血發狂用桃
仁承氣之意同 杜陽編 本冊經目

一婦人顛狂十年至人授以真鬱金七兩明凡三兩為
末薄糊凡梧子大每服五十丸白湯送下初服胸中
有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂疫血絡聚心
所致鬱金去惡血明化頑疫也 全上

龔子才治一人顛狂亂打走叫上屋用瓜蒂散吐出其
疫數升又以承氣下之

一人氣心風即是疫迷心散發狂用真花葯石燬黃酒
淬一次為末每一錢酒下

一婦人發狂棄衣而走踰屋上喧不識人狂言妄語三
八等不住諸匠束手龔同家人將凉水亂潑不計其
數頭暈倒仆脉之六部俱弦數有力此熱極生風也
用防風通聖散加生地黃川連樨仁紅花丹皮三劑
而安後以祛風至寶丹服安

凌漢章治金華富家婦少寡得狂疾至裸形野立凌視
曰是謂喪心吾針其心：正必知恥蔽之帳中慰以

好言釋其愧春安可不發乃令二人堅持用涼水噴而針之果安明火

孫文臣治莫某以積勞心有星士決其發解適以瘡作不能終場遂抑鬱而成顛狂或悲或歌或鼓掌或頓足甚則罵詈不避親疎診之面白而青兩寸短澁左關弦石關滑兩尺平此心肺之神不足志願高而不遂鬱結不舒津液生痰而不生血人攻痰尅伐太過在度心神愈不得養故昏亂無所攝持經云：主不明則十二官危按此則宜補養以斂心神兼之清痰可萬全也用參仁人參茯苓神甘草丹參當歸以

補心安神黃連竹茹以清肝胆之火元參佐之外以龍齒珍珠羚羊角牛黃胆星天麻青黛辰砂全蝎冰片黃連廿艸羔為丸金箔為衣服安

張路玉治黃人李誕妾顛仆數月未或六七日一發或一日二三發之則大吐涎水血沫或一日半日而甦以如日夜恒見亡婢僕嬪二鬼纏繞或時昏惰不省同症或時妄言妾見精氣不時下脫不能收攝服二冬二地連柏金櫻石蓮之屬反作瀉不食診之寸脈尺微前大後小按之忽無卒之忽有知為神氣浮散之候因與六君子加龍齒菖蒲遠志送養正升間續而進

前後共六七服自後詰妄顛仆絕不復作和崇亦不復見唯夢泄為卒時痲疾更与卒補鎮心丹兩月而

安

与孫案同

一婦人狂言叫罵歌笑不常似崇憑依一逆眼与口角

吊起或作狂治或作心風治皆不効乃是舊有頭風

疾使然用芎辛散加防風服痊

宋氏作玉肯堂

女科鄭青山因治病不順沉思徹夜煎受他医諷言心

甚懷憤天明病者霍然憤喜交集病家設酌酬之而

諷者已適憤無從洩忽然大叫發狂

即是現之狂者亦可憐哉有

志之士慎勿為此彼云不可不知區者非聖人之言也

同道治之无効一日主

道來往候索已服未服等方視之一併毀棄曰此乃

神不守舍之虛症豈露痰理氣清火藥所能奏効哉

遂令覓上好人參二兩一味煎湯服之即安三服而

病如失以歸脾湯調之

李士材治張少椿女以喪子悲傷忽当雷雨交作大恐

苦無所避且日或泣或笑或自語或罵詈如中鬼祟

診其心脉浮滑餘皆沉細此氣血兩虧憂恐傷心

傷則熱積生風也以滾皮凡用桔梗延胡索陳皮

杏仁煎湯送下痰出而安

全上

龍興子才治一女子年二十歲未婚患每見男子咬住不

放後昏倒陰戶流出冷精頃間即醒其厥陰肝脈弱
出寸口乃陰賊思男子不可得也令其父母用棍痛
責使之思痛而失德也服抑青丸而痊

韓貽豐治永和一少年患風狂百治不効其父兄縛送
求治為針百會二十一針升堂公坐呼少年前求命
去其縛予杖者十杖畢而醒問以前事茫然不知也
神針心法

一婦因天病垂危心患之乃天病起婦即病風狂日夜
不思眠食白日裸身狂走或登高阜或上室房不能
禁也乞韓治將至其家其婦正在袒裼狂跳中忽自

不見衣蔽俸歛容屏息若有所俟者隣媪訝之初不解
其何意俄而韓至令之跪則跪因跪而受針時韓為
為針其百會一穴兎眼二穴各二十一針即叩頭跪
謝曰吾今不敢為祟矣願乞 饒命吾去矣言畢而

醒

柴崎青治少京兆傅嘉言夫人忽患顛疾詢知胸有鬱
結投以逍遙散加鬱金香附而劑而癡象頓安惟神
氣尚呆不語即用前方為散服三兩用靈苑方服之

而痊

靈苑方見
孫兆紫

薛立齋治一婦人素清苦因驚而顛或用風痰等為丸

甚薛用參芪歸朮濃煎佐以姜汁竹瀝三斤餘方全愈

王海藏治許氏湯厥狂怒罵詈親踈或哭或歌六脉皆
按無力身表如水石發則叫呼聲高聲高則知其脉伏
潔古云奪其食即已因不与之食乃以大承氣湯下
之得臟腑積穢數升狂少定數日後復發復下如此
五六次遂大便數月疾緩身溫脉生良愈此易老奪
食之法也 大逆

人一入病顛脉喘且搏承氣湯下而安 病批沙家

采天培彙選云陳 甫治一嬾眼見鬼物言語失常循

衣直視醫用心藥不效乃投養正丹二帖煎乳香湯
送下以三生飲佐之立愈又一男子亦嘗病此症亦
用此藥收功養正丹与百乙方抱胆丸無異抱胆丸
由無硫黃有乳香也 良方

五批中治一士人女語異常且欲打人病數日矣意其
是心疾為矣百會百會治心疾故也又疑是鬼邪用
秦承祖灸鬼邪法併火手大拊指用軟帛繩急縛
定當肉甲相接處灸七壯四處皆着火而愈一貴家
子亦患此有僧亦灸此而安

張子和治一狂人陰不勝其陽則脉流薄厥陽并乃狂

雜經曰陽極則狂陰極則顛陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱并于陽則狂、則生寒并于陰則顛、則死內經云足陽明有熱則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行此亦七八度如吐時暖室置火以助其熱而汗少解數汗方平 醫說續編

廣筆記風顛病神方好生犀角四兩到末每用一兩加清水十椀入砂鍋內熬至一碗濾淨再加水十椀熬至二酒杯加淡竹叶四兩水六椀煎二椀去渣加犀

角汁同服盡四劑即安

汪石山治一人縣差拿犯人以錢索贖所犯行至中途投河而死犯家告所差人索騙威逼致死而差脫罪未免費財憂憤成病如醉如痴詰言妄語全無知識診之曰此以費財而憂必得喜乃安葯豈能治哉令其鑿錫作銀數錠置其側病者見之果喜握視不置病遂愈

劉宏璧治一富室女正梳洗間忽見二媼相拘方奔逸獲拏之遂大叫：後及大哭：已即發狂寒熱相繼目眩不眠以為鬼祟召巫符咒而病益困診之肺脉

直上魚際肝脉亦弦知所見者即本身之魂魄也蓋
肺藏魂肝藏魄因以小柴胡湯去甘艸之戀加羚羊
龍骨牡蠣清肺肝鎮驚為怯一服而安

癩

實才治一人病癩三年餘灸中腕五十壯即愈又一婦
人病癩已十年灸中腕五十壯愈凡人有此疾惟灸
此穴最効

張子和云一婦病風癩自六七歲因驚風得之後每三
二年間一二作至五七年五七作達三十歲至四十
歲則日作甚至一日十餘作遂昏痴健忘求死而已
值歲大飢采百艸而食于水濱見艸若葱狀采歸蒸
熟食之至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止
約一二升汗出時先甚昏困三日後遂輕健病去食

進百脉皆和以所食蔥訪人乃蔥苗也即卒艸藜
葷是也

龔子才治王八參子年十八患癩每發即仆地吐涎不
省人事少頃復甦或一月一發或兩月發四五次已
七年遍醫不效診之六脉皆數人迎緊盛此氣血虛
而有風痰壅併也以追風祛痰丸加入參當歸黃連
各一兩安神丸二葯煎服未及半年而痊後有數人
俱如此治愈

馮楚瞻治金氏子年十而患癩病群醫不效針灸繼之
清痰鎮墜其發更甚且願診之脉洪弦有力惟兩尺

俱弱此陰虧之極孤陽無斂火性上炎僵仆諸候乃
發理所然也清痰鎮墜不更耗陰分子乃令空心淡
鹽湯吞加味八味丸四五錢以使其陽藏納然陽無
陰斂何能久藏火無水制難免浮越隨以重濁大料
壯水之劑繼之以助其封蟄之勢則水火得其所矣
下午乃服大補氣血養心清肺和肝之膏滋一丸如
是調理兩月病始愈

楊乘六治翁姓人得癩症每日至子時必僵体手足並
硬兩目直視不能出声其狀若死必至午後方甦
則言動依然飲食如故別無他病如是者三年畧無

虛日遍治不痊楊察其氣色晦滯口眼呆瞪而若失
神上下自脫黑暈舌壯如無皮脉則右關虛大而滑
石可若有散意曰此非癰疔乃痰厥也必因驚而得
蓋心為君主驚則心色氣散君火受傷致脾土不生
中州虧損不能抃水因而生痰夫痰隨氣為升降者
也天地之氣生于子而降于午人身亦然當子時一
陽生其氣上升痰亦与之俱升逢虛則入迷于色絡
之中故不省人事僵仆若死也至午時一陰生其氣
下降痰亦隨之同降色絡得以清虛而天君泰然百
体從令矣詢之數年前來受驚兒死今因驚致損因

損致痰然鎮驚消痰皆無益也惟有補其君火極其
色絡俾其氣不散則痰不能侵擾而為害且君火漸
旺則能生土以抃水其痰不消而自消矣養榮湯去
遠志倍重仁五味白芍一劑是晚即安五日服十劑
皆安遂留方而別

薛立齋診鴻臚王繼之室人素有癰疾遇勞役怒氣則
發良久日省一日因飲食勞役失宜發而半日方省
不能言語或以為風中于藏用祛風化痰順氣之劑
及牛黃清心丸病尤甚六脉浮大兩寸虛而不及芤
卻且進飲食曰此脾胃之氣傷也若風中于臟禍在

反掌彼不信後果卒

劉宏璧治一女年方及笄忽染怪症醫莫能識延診牙

閉緊急手足伸搐目睛上瞪日夜兩發非癩而何甦後腹

內攪痛欲吐不得冷汗淋漓皆肝木察其邪不在表

裡在工下上部有熱下部有寒胸胃互異寒熱交感

投以黃連湯熱勢少殺再數劑輒頌更生蓋連以治熱

姜以治寒桂枝半夏祛風化痰參朮甘艸輔正和中

使正氣立邪氣散而愈

琇按癩症多由肝病蕪扶疫火方中姜夏以消疫

連桂以平肝甘艸緩肝而和脾參朮補脾壯肺

肺盛則木亦自平劉用此獲效當矣然目之為怪

疾而曰上熱下寒豈知其然而未知其所以然也

笑哭

張子和次子自出妻之後日瘦語如泥凡中此病在中也
常撫第三指失笑此心火也約半載日飲水雪更服
涼劑張曰惡雪則愈矣其母惧其太寒張罵曰吾用
藥如鼓之應桴高惡涼為宜世俗之謗我也至七日
厭水而病愈

邱汝誠治一女子恒笑不止求診問生卒所愛何衣
著之母与對飲故汚其屨女大怒病痊 柳塵新說

先達李其姓歸德府鹿邑人也世為農家癸卯獲隲乃于
鄉其父以喜故失声大笑及春卒進士其笑弥甚歷

十年擢諫垣遂成痼疾初獲間發後宵旦不能休大諫甚憂之從容語太醫院某因得兩授命家人給乃父云大諫已歿乃父慟絕凡殯如是者十日病將痊洋為御語云大諫治以趙大夫絕而復甦李因不悲而笑症永不作矣蓋医者意也喜則傷心濟以悲而乃知技進于道矣

醫案樓標記 見說鈴

戴原礼治姑蘇朱子明之婦病長號數十声暫止復如前入以為屬而憑莫能治戴曰此鬱病也痰閉于上火鬱于下故長號則氣自舒經云火鬱發之是也遂用重劑涌之吐痰如膠者數升乃痊

兩浙名醫錄

吳季先治宋小泉發熱自汗肢倦搖振或時自利嘔噦聞作條尔喜笑條尔悲哭語言錯乱六脉沉瀉微弱此陰盛陽虛而君加炮姜茯苓愈

管先生治一婦妊娠四五個月臟燥悲傷過日則慘戚淚下數久象若神灵如有兩憑醫与巫皆無益与仲景八粲湯一投而痊

臣子綱目

孫文垣表嫂孀居二十年矣右癱不能卒動不出戶者三年今則神情恍惚口乱言常悲泣詰之答曰自亦不知為何故也而寸脉短澁以石菖蒲遠志当歸茯苓人參黃芪白朮附子晚蚕沙陳皮甘州服四劑少

愈但悲泣如舊夜更泣因思仲景大棗小麥湯正与

此对与而剖而痊方用大棗十二枚小麥一合大甘

艸炙三寸水煎飲此憂傷肺之職寒故多泣也憂傷肺二

諸平經文第卷民本則憂傷肺為脈之更泣大棗小麥湯而此以較肺藏寒有理錢仲陽治小兒哭叫入謂金不相擊亦有見解

馬元儀治吳氏嬪兩寸浮數餘脈虛溢時悲哀不能自

禁喉中窒塞火升痰喘此悒鬱過多肺金受病也金

病則火動痰生火痰相搏氣湊于上故喘促不安而

氣不利也法當舒通肺鬱則火降痰清而悲哀喘

促諸症自己用紫苑乾薑枳壳桔梗半曲橘紅杏仁

蘇子一劑而神氣清再劑而悲哀止繼以人參白朮

炙甘艸補其正氣遠志茯神安其神志半面廣皮導

其痰涎肉桂黃連以交心腎數劑而神復脈和再以

歸脾湯而安

五批中母氏久病忽悲泣不可禁知是心病也灸百會

穴而愈批中凡遇憂恐悽愴亦必灸此有此疾者不

可不知信也

吳橋治胡有濡拜半年親酒而踈穀倏忽心乱恍惚日

夜啼泣如不欲生橋始診之曰脉無他但此病非歲

月可已假令用藥即積寒涼而他病生但勿藥而聽

其自愈爾語不入徧謁諸醫治逾年病更甚逆橋復
診橋曰脉虽稍損予前然不為害第勿為而聽其自
愈耳毋敬諾每月必逆橋一視之橋持議如初勿約
踰年愈

不眠

張子和治一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可
治其夫求張治之張曰兩手脉俱緩此脾受之脾主
思故也乃與其夫以怒而厭之多取其財飲酒數日
不處其家而去其婦大怒汗出是夜因眠如此者八
九日遂愈

王思中治周氏患發熱咳嗽以陰虛內傷治之更甚經
月不得眠王診之曰此謂懸飲乃鬱氣所致氣不升
降則湯水停積漸成飲囊法當開鬱行氣每刮用
荷叶蒂七枚一服而斲睡數日卒復

吳江縣志可入
飲門与水停心

下則悸之理同心屬火通
于水則畏而不能安其神

張瀛水名康忠

通

嘗治董尚書潯陽不眠用百部一

兩半夏一兩董即得美睡酬之百金董既睡夢為役

夫牽船行赤日中甚疲勞忽見涼樹美蔭其樂大叫

而寤人謂張君一味葯即得百金董公百金乃得役

夫一息 識小錄 徐樹玉

按素問秫米湯治不眠半夏秫米用千里長流水

煎

孫文垣治潘景宇內人後半夜不眠肝火浮而太陽及

肩稜骨痛

肝火工

面黃肌瘦大便溏稍勞則倅熱四

肢無力

皆肝陽盛

其脈左寸洪滑

肝脈

自春至秋皆

然此由脾虛肝心二經火盛然也

當云肝

先用四君

子加酒連柴胡扁豆澤瀉滑石調理夜与錢仲陽安

神凡灯心湯下服八日得睡而太陽亦不痛

黃連之

繼用六君子加黃芪秦艽柴胡澤瀉當歸白芍黃柏

全安

虛不遠治開子將母冬月心忽然如散而沉下便不得

睡凡三月矣脉之独左閉弱不能應指以為肝虛須

補其母当立春始安用熟地為君茯苓朮仁当歸人

參防風遠志佐之

防風遠志

服二十貼至期愈子將問

宜酌用

二十七

心散不寐似屬心經何反以肝腎為勅而立春日應
曰此得之脈也經曰肝不足則恐、則氣下故先其
令而疾作補水生木待時而元氣復也其沉下若散
乃肝氣不得腎養非心病也

李士材治張侗初善怒善鬱且酬應繁劇病膈中痛甚
夜不成寐医用菖蒲枳朴木香豆蔻殊不知此症屬
虛、則濁陰不降神氣失守故痛且寤也遂以歸脾
倍參歸十劑安卧臣道

張路玉治一少年因思慮兩月不卧服安神補心藥無
效與以溫胆湯倍半夏柴胡一劑頓卧兩日夜竟尔

霍然

一人遺精煩擾不得卧与六味丸料加棗仁數服而安
寢

一人膈膈久不收斂而不得卧膈膈不能治令与十全
大補而安

陸養愚治沈翰煥虹臺年近五旬体徵善酒而厚味常
露卧致病之由秋末冬初忽酒後煩躁不得寐或以安神
養血不効惟服清火清痰少應后每易一方間痊數
日即復如故惟大醉後得吐如熟寐一二時然日間
則倦不能起且飲食無味延至仲夏偶煩躁身痒以

熱湯澡浴是夜睡至天明由是臨卧必浴即不能長
睡而或一二更安寢若間日浴即不寐至立秋浴亦
不應八月間竟全不睡矣診之六脉沉瀉兩寸尤甚
自言卒日天氣稍暖即畏熱多汗自病後但煩悶而
不畏熱暑月竟無汗因思內經每有論而無方独不
寐一除兼有其方何今人不知用及用又無効也經
言不寐之因則曰衛氣行于陽不得入于陰行于陽
則陽氣盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑人曰陽
明逆不得從其道故不得卧又曰胃不和則卧不安
其言治療之法調其虛實以通其道而去其邪又曰

決瀆壅塞經絡大通陰陽和得其方則以千里水揚
之萬遍炊以葶藶用秫米半夏煎飲其汁病新發者
栗杯則吐汗出則已久者三飲而已今得吐則睡是
內之壅塞漸決也澡浴則睡是外之經絡流通也因
用子和法以秋聖散三日約滿其涎飲盡許是夜身
雖困倦然已得睡禁其厚味酒醴惟進粥飲五日後
令密室中置沸湯數鍋使熱氣熏蒸中設一桶探湯
澡浴之拭乾就寢用麻黃蘇叶乳葛防風威灵仙半
夏各一兩照內經煎法熱服厚覆之汗微而末是
夜睡始沉人將息二日再以此法大汗之自此睡卧

如常身倦輕快精神清爽六脉皆起且流利而病去矣

一人煩躁發熱肌骨立日不得眠已三年矣醫與清熱養陰化痰安神之藥及十劑弗效一刻不得安卧診肝脉独沉而數此怒火久伏木鬱宜達用柴胡四錢白芍二錢丹皮梔子各二錢五分甘州五分桂枝四分葯連熟寐至一日夜後用逍遙散加入參丸服而愈大正

李季虬廢母因兒痘驚苦積勞虛煩不得卧心胆虛怯触事驚悸百藥不效家弟長文偶于友人許聞与化


陳丹崖治一女八甚奇其症与母類叩其方乃温胆湯也試之數劑而効半夏七錢竹茹枳實各三錢陳皮四錢半夏各二錢二分半分二劑姜枣煎服外加杏仁五錢後因虛極加入參二錢增之仲淳曰此必有度而善飯者也果然 廣平記

顧大孝叔夏山人患陰虛火症徹夜不眠者兩月飲食俱廢形作日削中外疑其必無救矣李為之診視決其必無大害第要多需時日耳用大劑人參杏仁茯苓遠志生地當歸五味麥冬因虛其氣怯佐以琥珀辰砂金銀器之類約百餘劑而痊後有人詢其故李

謂此病雖屬虛幸藏府無損心經雖有火幸不至鏢
肺多服補陰以斂之劑則水火自然升降而云壯水
制陽光正此謂耳至于久病脈調身不發熱豈有他
虞哉 同上

錢國賓治陝西俞少山久以開毡店居常体厚劉健偏
嗜炙燂性燥多動肝氣年近五旬終夜不寐者六年
用度火氣血之藥多矣早晨診候寸關洪浮有力若
堅寔之筋惟兩尺脈大熟思之以脈論肥人當沉今
六脈洪浮有力以症論上身怕熱足及畏冷以藥論
清補俱已尽服難經曰人之安睡神歸心魄歸肺魄

歸肝意歸脾志藏腑各安其位而寢且夜屬陰
主靜日屬陽主動陰陽和乎安然寤寐此六年不睡
乃陽亢也者大泄其陽使陰氣漸復則寐矣用大
承氣湯加大黃二兩泄十餘行其人昏倦睡二日方
醒粥進遂安



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十八

錢唐魏之琇王橫輯

男鈺編次

跌撲

陸養愚治沈華南原有濕熱疫積五旬時因乘馬墜地
 傷其左脇痛不可忍外科以羔散專之治而愈然每
 疾走脇間一點微痛少息半時痛即止矣周甲偶患
 滯下小腹痛引左脇手不可按裡急後重或与香連
 檳榔痢止而痛不止發熱便時後重尤劇飲食全不
 思脈之沈弦有力左關尤甚曰痛者積瘀也治法云
 瘀血穢腐下焦令人不食則飲食不思者亦瘀也當

急下之痛隨利減矣用潤字凡加桃仁泥合凡之紅
花湯送下二錢出稠痰碗許而腹脇抽痛更甚此痰
積動而未出故也再投二錢半日許又出稠痰碗許
內有黑色如泥者一二塊痛仍不減脈尚沈弦而堅
又投三錢半日許出泥色塊并稠痰數碗而痛頓減
腹腸即可按漸思飲食其脈亦和後以達氣養榮湯
加入參而安

陸肖愚治寧見源年近古稀偶登舟失足墮水足大腿
挫氣作痛左脇亦引痛服藥已愈三月矣忽左股內
作痛或謂此乃肝經所絡之地高正肝血不足

虛而作痛或謂濕疫流注或謂肝經久鬱或謂崑崙
氣逆偏治痰腫日甚增寒作熱脈之六部洪數而左
關尺帶弦因詢其曾有所傷否乃述其前墮水之由
曰此必瘀血未尺留而成毒也視痛處已有膿水在內
今延外科教以針破之出膿血數碗服大料參芪托
裡散數十劑而痊

一人因墜馬腰痛不止日輕夜重瘀血諦矣与四物去
地加肉桂桃仁泥紅花蘇木大下黑而痊大逆

湖廣有胡氏子五六歲時因升高為戲墜地物其頭骨
稍長竟不能伸朱守真者同里也一日相見戲擊其

頭有聲戛然置地溘然死矣朱惧而逸胡氏子復甦
頭頓直婦家人見之大喜謀尋朱謝之

張子和治張仲温因登露臺高四尺許下臺腸一足外
蹠腫起熱痛如火一医欲以鉋針刺腫出血張急止
之曰胸已痛矣更加針二痛俱作何以忍也乃与神
祐丸八九十丸下二十餘行禁食熱物夜半腫處發
痒痛正行步如常張曰吾之此法十治十愈不誑后
人

一小兒七八歲膝被胸行則痛數月矣張曰小病耳
以舟車丸道經散温酒調而下之夜半涌泄齊行上

吐一椀下泄半缶既上床其小兒謂母曰膝臍痒不
可任來日使服烏金丸壯其筋骨一月而走

德宗時有朝士墜馬傷足国医為針腿法針法字有
脱悞有

氣如烟出朝士因憊將至不抹国医惶惧有道士詣
門云某合治得視針處責国医曰公何容易生死之
穴乃在分毫人血脈相通如江河針灸在思其要扑
公亦好手但悞中孔穴乃令衆床就前于左腿氣滿
處下針曰此針下彼針跳出当至担板言訖遂針入
寸餘蕙穴之針沸然躍出果至担板氣出之處泯然
而合疾者當時卒愈朝士与国医拜謝以金帛贈貽

道士不受而去逸史

石城尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓用葱新折者燻火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處仍多煨續易熱者或搗爛專之而痛止翌日洗而不見痕迹宋推官鮑縣尹皆得此方每有殺傷氣未絕者亟用此甚效今州綱目如有擊損杖傷用此亦效

龔子才治一男子墜馬腹有瘀血服藥下之遂發熱盜汗自汗脈浮滿此重創過傷氣血所致也投以十全大補湯益甚時或詰語此藥力未及而然以前藥加炮附子五分服之即睡而安從新

張三錫云曾見一人因踢門用力遂小腹痛不止湯藥亂投臨死小腹腫青方悟受病之由也

孫文坦治一人梅瘡後偶遭一跌環跳脫出不能復入科血疼痛殊甚兩足長短不齊此蓋瘀血流入科血占滿故竅致骨不得復入也今但消去瘀血以行氣活血之藥主之佐以下行嚮導之劑度可復元用陳年窖中磚瓦洗淨煨過四兩生地杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五分自然銅三兩蒲黃車前子蘇木各一兩鹿角二兩元明粉五錢各為末加茅艸根一斤紅花四兩煎羔拌晒前藥煉蜜為丸梧子大每空

心反食前酒送下八九十九初足長出二寸餘服藥
后只差半寸沒再製久服必能全愈惜素畏藥中道
而止

李克齋家一鶴飛來馴熟不去以為祥瑞未几鶴折其
胫私心殊不喜日聞有能接其胫骨者乎一人對曰
家藏接骨秘方想人禽一理或可接也急命修製之
方用上蟹新瓦焙乾半兩錢醋淬七次自然銅乳香
沒藥菜瓜子仁各等分為細末每服一分半酒調灌
之霍胫如故但人上身傷食后服下体傷空心服李
乃傳方于人續金陵瑣事

張三錫云南京下浮橋梁回丹藥每用二三厘瓜仁
搗色酒下極驗遠近患損傷者爭覓之皆不外土鼈
自然銅第製法佳耳

四川提督總兵官吳英說昔得秘方治扑打跌損傷極
効虽重傷頻死但一絲未絕灌下立甦注在福建為
副將時軍中有二弁相鬥皆重傷其一則死矣吳聞
馳往視之惟心頭氣尚微煖亟命心藥灌入覓胸間
咯咯有声不移時張目索食翌日遂能起行自后屢
著神効云其以十一月內采野菊花連枝叶陰乾用
時每野菊花一兩加童便無灰酒各一碗同煎熱服

又一方未退胎毛小鷄一只扣骨生搗如泥作餅
入五加皮專傷處如神居易錄

馮楚瞻于五十歲由棗城回都適有鄉人伐一大樹時
風沙蔽目騎至樹扑人騎俱為壑倒正在腰脊間養
骨脫縫疼如腰斬胸骨扇動腰膚青紫下体俱冷頭
汗如雨回憶跌扑傷損門中有一絲血入心即死之
語以酒冲童便服之頓覺睛下極冷氣逆上奔乃思
急固陽氣為主以人參一兩炒白朮六錢製附子三
錢煎服日二劑有外科老匠教用破血行瘀之藥馮
曰傷在上者宜消瘀滯傷在下者宜補氣血此正法

也遂早晚用八味凡之加牛膝杜仲五味者各五錢
隨進參朮附湯各一劑緣右腎連脊受傷腎經袒氣
無根故不能寐併不能言一言一寐即逆氣上奔欲
絕憑仗葯力之猛得以接納葯后必進乾餅以壑之
腸中如火乾餅多進亦易消化八日始便並無點瘀
外以猪油熬化頭髮入十全大補加減煎羔以乳末
收之遍貼傷處七日后氣逆少緩半月后漸可寐言
月餘始能憑几而坐兩月餘始能扶立而脊骨突起
半寸終成痼疾自是精力大衰膝踝筋脉之間時有
痠痛然幸知治法得以全生

李南公知長沙縣有門者甲強乙弱各有青赤南公名
使自以指捏之乙真甲偽也詰之果服蓋方有梓柳
以叶塗膚則青赤如毆傷者刮其皮橫置膚上以熨
之則如倍傷者以水洗不落南公曰毆傷者血聚而
硬偽者不然故知之 凍水紀聞

葉南岩刺蒲時有群閔者訴于州一流血被面經重
創腦儿裂命懸旦夕公見之惻然時家有力瘡藥
公即起入內自搗藥令舁至幕廳委一謹厚廳子及
幙官曰宜善視之勿令傷風此人死汝輩責也其家
人不令前乃畧加審覈呈狀收其仇家于獄餘皆釋

之友人問其故凡人事爭鬥無好氣此人不求死則
償命者一人寡人之妻孤人之子者凡人干証連係
者儿人破家者儿人此人愈恃一鬥毆罪耳且人情
欲訟勝于骨肉亦甘心焉無所恤忿憤故也木儿
傷者果卒復而二家之訟遂息刀瘡為方端午取韭
菜搗汁和石灰杵熟為餅陰乾用以治諸傷專創處
即止虽骨破亦合有奇効熱能行瘀灰能止血
韓貽豐攝水憲篆有部民被毆死已逾夕即單騎往驗
則遍身傷重僵挺無生氣矣因念死者父母年老貧
病惟此子死則二老必不能生不得已因取針其

百公亦異萬一非謂其必活也時天氣甚寒令村又
各解衣輪熨屍身又熬水令極熱探湯揉屍手足無
何屍得人氣倅頓柔針至十四針忽喉中作響音口
鼻微有氣診其脈：忽動乃喜曰有裒矣針至二十
十一針則喉間大出聲痛哭手足能屈伸口稱遍體
痛不可忍則皆其被毆處也乃呼酒來以葯飲之傷
處糝之以葯痛處以針：之責令亮首保辜調養如
限內死仍抵償后傷者全愈求和息乃杖亮首而遣
之

薛立齋治一男子墜馬傷頭并臂令葱搗爛炒熱菴患

處以熱手熨之服末為降聖丹而愈本州云葱大治
傷損

誤吞諸物

張子和治一小兒約五六歲同隊小兒以蜀黍稽相擊
逆芒倒刺于咽喉數日不下粥藹腫大發其家告張
張命取水依道經呪法以左手屈中指及無名指作
三山即坐水盞于其上右手描印文是金鎗即脚踏
字立望太陽或灯火取氣一口吹在淨水中盞呪曰
吾取老君東流順老君奉勅揖去毒去五托大帝尊
所到稱吾者各：現帝身急：如律令揖去七遍吹在
盞中虛境掉三次為定其兒嚙水下咽曰我可也三
五日腫散乃知法亦有不可侮者

夷堅志云小兒誤吞榴芒著咽喉中不能出者名之曰穀
賊鷲延灌立愈

一小兒吞一錢在咽中不下諸醫不能取亦不能下戴
人熱思之忽得一策以淨白表紙令卷寔如箸以刀
縱橫亂割其端作鬚髻之狀又別取一箸縛針鉤于
其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之竟鉤入
錢竅然後以紙卷納之咽中與鉤共相抵竟鉤入
紙卷之端不礙肌肉提之而出

方雪瓢偶在鮑綠飲處設及名匠類中以南硼砂灰治
誤吞金及羊胫骨灰治法皆神驗座客有言麩筋灰

治誤吞銅錢甚異者方默識之暮歸適鄰家小兒誤
吞銅錢哽于喉間不能上下危急之際方即以法教
之終下咽錢自口中出其巧值如此殆有鬼神使之
耶因附記之其法以面筋置新瓦上燒作炭研末用
滾湯調溫服如錢未下咽者即從口出已下咽者必
從便出 近又傳以生大蒜塞鼻中其錢立出尤為
簡便弟未試耳

張子和曰昔過秣林見一童子誤吞銅錢之物成疾而
羸足不勝身會六七日淫雨不止無薪作食過飢數
日一旦鄰卒死聞作葵羹梗飯病人乘飢頓食之

良久泄瀉如傾覓腸中痛遂下所吞之物余因悟內
經中肝苦急食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆甘物
也故能寬緩腸胃且腸中久空又遇甘滑之物此銅
錢所以下也

近有稚子戲以線鑄置口中誤吞之有胡僧啖以餲糖
半斤即于穀道中隨穢而下僧云凡誤吞五金者皆

可啖也

近峯間畧 續醫說 田案有
僧用錫糖出眼中箭頭甚捷

張景岳治王氏子甫周歲其母以一錢釘与之玩弄吞
入喉間往視之見其母倒提兒足以異其出口鼻皆
血因曉之曰此豈倒懸可出者乎連令挹正遂間啼

聲蓋釘已下咽不在喉因思本州云錢畏朴硝遂得
一法用慈石一錢朴硝二錢並研為末令以熬熟猪
油加蜜和調為末与服下午吞之至三鼓時解下一
物莹如莖菜潤滑無稜為護其外撥視之則釘在其
中矣乃京中釘鞋所用麻姑釘也立方之意以硝非
慈石則不能使為附釘慈石非硝則不能遂釘速出
非油則無以潤非蜜則未必肯吞合是四者則著者
者遂者潤者潤同功合力而釘出矣

按物理小識亦載小兒誤吞錢針以乳香荔枝朴
硝為末以大豕脂入鹽和之吞下自愈若碎鉄則

用阜英硼砂雷敦曰錢遇神砂如泥似粉神砂應即礶砂也 又小說一銀工于錢砧上杵阜英其砧立碎則錢畏阜英可知矣

一吏部無子妻極妒妾方坐蓐乃盤腸生妻暗將針刺于腸上妾后竟腸有時刺痛難忍穩婆稱告于妾：與吏部言之諸醫束手一全真曰我能治之用礶石大塊從痛處引之引至于臍針從臍出妾竟無恙續金陵瑣事

劉浴德號壺隱知匠洞庭葉雅南之細君五七日前偶因事不順意：欲自斃遂吞布針十餘根目請箕仙

降筆云吾乃碧雲仙使始問曾吞針否又曰果則果矣事則無事仙方不書凡方可治復問明書凡方食久乃書問壺隱予因造劉問方劉教以櫟炭末三錢用井水調服可下如不下可再服之乃曰愚意欲餌磁石未審何如劉曰臣：世臣此言不可也宜取磁石一大塊置肛門外或度儿烏如法治之針果出全上

百一選方以淨器盛新汲水一碗捧之而東默念云謹請太上東流順水急：如南方大帝律令勅一氣食七遍即吹一口氣入水中如此七次以水飲患人立下或用此水呪可以食針併竹刺較子和紫中頗易

諸骨哽喉用清水一碗以手指向水面虛寫天上金鷄
叫地上卅鳩啼西鷄并一鷄九龍下海喉嚨化如滄
海二十五字口誦七遍飲之立愈 又一法以清
水一碗用手指向水面虛寫鳥飛龍下魚化丹邱八
字飲之立効 並酉陽雜俎

劉浣隣人馬湘生兒數月偶遺金網中圈子案上兒誤
吞之哀泣不已相求求于醫：適出相伺于門坐立
不定或詢其子何疾驚惶如是相以前事告或教以
急買生韭蒸熟而不斷與蚕豆同嚙之不過二次從
大便出矣此法方書所不載故表之 北壕紀言 數
月兒如何能咽

豆 韭
李奎治一人誤吞指爪喉哽凡殆金令剪人指爪燬服
之立愈疑其方古奎白不然此內經所謂哀之以厲
者也聞者歎服 寧波府志

張子充治當塗郭祥正子患咳嗽肌骨如削醫多以爲
勞脹曰是不必憂就坐飲以葯忽大吐使視涎沫中
當有物也視之魚骨也遂安 新安志

一富家子被鷄骨哽百方莫治家人驚惶忽一叟至自
云我有巧術但行手法取之不勞葯餌也許以千緡
厚謝叟乃以線綿裹白糖如梅大令其咽下入喉間

留一半于外時以手牽掣俾喉中作痒忽然痰涎涌出其骨黏于綿上遂如約酬之 續醫說

孫文垣治查良本內人怒後偶食魚頭骨哽于喉中即以饅頭粽肉等壑之骨虽随下竟胸膈不快又服消骨藥二帖已七日矣胸膈脹痛殊甚飲食悉從背下惡寒發熱脈之兩手弦數蓋骨硬之后用硬物壑之傷其胃腕必有瘀血停蓄膈間將食管逼向後故飲食竟從背下也但銷去瘀血使食管復原胸膈之痛可痊矣以五靈脂為君山查元胡索枳仁枳壳為臣赤芍丹皮香附山厄為佐柴胡石菖蒲為使入韭汁

一酒杯服後胸膈寬快大便瀉一次痛減大半飲食乃從右下右邊胸喉畧痛吞物甚艱吐出痰皆血腥氣故以山厄赤芍歸尾枳仁劉寄奴五靈脂丹皮穿山甲八劑而愈

張景岳曰凡物諸哽于喉中或刺或骨必有鋒芒之逆所以棘而不下凡下而逆者反而上之則順矣故治此者當借飲食之勢涌而吐之使之上出則如拔刺之捷若芒刺既深必欲推下非惟理勢不能必且遲延或食飲既消無可推送以到漸腫為害非小矣又曰凡諸骨哽或以錫糖一大塊滿口吞而嚥之或

用韭菜蒸熟勿切吞下亦妙

高坡纂異載洪洞韓肅即忠定公之父三歲時誤吞下一釘家人皆驚哭待尽其祖以神醫召視之曰無恙必待三年釘乃得出人莫之信遂定時日書壁間以俟但每作腹痛必絕而復甦久漸黃瘦骨立及斯謂家人曰兒將痊勢必大作雖絕勿惧宜先煮粥飲以俟之既而腹果大痛一叫而絕良久吐出釘銳尽利又復絕逾時始甦一年獲安

金陵秣陵鄉中一人姓李號守泉符水絕妙遠近求無不立効其法命哽者坐自己佛堂中佛前供一盂潔淨

水令親屬往來燒符用法訖徐以小箋十之云已愈矣其人婦看淨水中所哽之物在內隨愈乃親見者

治法

景德鎮湖中市張婆女名婆兒因吃糍糕被噎而死氣尚未絕須明日方斂守尸悲哭忽聞叩戶聲問為誰曰我是何裡住人陳曾二也張曰何故夜深相遇曰知道婆兒不幸但扶策起坐將管帚拍背打三下糍便落腹可活矣張啟門稱謝了無所見試用其法不食頃女腹如雷鳴即時安好迨曉尋訪陳曾二蓋七年前溺河而死者鬼未受生猶懷惻隱存心如是張



乃命僧為符拔之 夷堅志

蠱 諸蟲 虺症 中毒 丹石毒

續名醫類案 卷二十九



10

續名醫摺案卷二十九

錢唐魏之珩王橫輯 男斌編次

蠱

有人行蠱毒。山病人若欲知其姓名者。以敗鼓皮燒
作末飲服。方寸匕。須臾自呼蠱家姓名。可語之。令呼
蠱。時去則愈。在子細日

子晉外姊夫。晉士先。子庚。下與言中蠱家。人密以表荷
置其席下。士先忽大笑曰。蠱我者張小也。乃扶小
是。并令解之。士先獲。存世。以此物為治蠱之良方。表荷

按：晉州名秦州。而故也。通志略出。則備。

自此解蠱毒為多用之周禮蒞氏以嘉州除蠱王母宗懌
謂嘉州即義荷是也 搜神記

梅師方云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切
痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱但
令病人吐水沈者是浮者非也用敗鼓皮燒灰服方
寸匕須臾自呼蠱主姓名 本州經目

夷方有蠱毒之害酒袖中嘗帶當歸遇飲食訖即咀嚼
少許若有毒即時嘔吐而安 漱石開說

生甘州五錢煎汁半盞飲之入咽即吐初中蠱毒入腹
未久其虫未生得吐即出矣如恐未盡再煎五錢服

之加麻油更妙

食不暇醋蠱下入肚又肘後方云馬兜鈴藤能逐蠱從
小便出用至十兩水一斗酒二升煮三升分三服不
痊更服土人呼為三百兩銀藥

大蜘蛛一斤研爛入蜂蜜半杯和服蠱畏蜘蛛故用蜘蛛
蛛治蠱而蜘蛛有毒又用蜂蜜製之此方獨治金蚕

蠱

蠱毒在上則服升麻吐之在腹則服鬱金下之或合升
麻鬱金服之不吐即下李侍即壽初為雷部推官鞠

獄得此方

范谷湖集

升庵外集

新州郡境有葯人呼為吉財解諸毒及蠱神用無比昔
人嘗有至雷州途中遇毒而貌頗異自謂即斃得吉
財數寸飲之一吐而愈俗云昔有遇毒者其奴吉財
得是葯因以奴名之之寔草根也類芍葯凡人遇毒
夜中潛取二三寸或剉或磨少加甘州桔旦煎飲之
得吐即愈俗傳將服是葯不欲顯言故云潛取或云
昔有里嫗病蠱其子為小育邑宰命以吉財飲之暮
乃其葯及旦其母謂曰吾夢人告我若飲是且死函
云之即仆于地其子又告縣令縣尹因令能飲果安
豈中蠱者亦有神若二豎哉 投荒雜錄

吉利草類石斛根類芍葯吳黃武中李侯以罪涉合浦
入境遇蠱其奴吉利取卅解之故名卅即吉
財也

常撫軍安已酉歲秉鉞由臬獻案有為蠱死命者獄已
定因檢卷閱之綠卷蠱媼女覘富室貿易遠歸知其
必携財物倩媼詰其家初作問候狀后来机藏蠱
于指彈之立死事至疑而執之送諸官究得其寔媼
媼女初嫁時已隨附十九蠱嫁後与伊夫又害六人
後增至二十五蠱矣其所害六人族察出確證者三
挖土得尸骸者二其一即犯事之家子怪之而未
信次日提媼女親鞠之寔：不諱因令呈所卷蠱

虫視之初出一竹筒空然所有女稟法堂聽政之
所邪祟不敢入必呪祭司戶而后可如之而果現乃
嚙：赤虫耳遂令以是踐踏之如泥水吏曰却未減
令嬾女呼之蠱仍在筒中依然如前數于是訪所以
絕之：法用石函入蠱虫封以印紙投于江蠱乃滅
蓋蠱之為害甚毒有謂刺蝟能捕蠱虫使无遺匿殊
不知蠱之為類不一其最毒者虽刀斫石碎火焚土
埋而蠱依然不滅多依附嬾女中人立死：后財物
為蠱搬運以利養蠱者每害一人則增一蠱或云其人
被害魄即附而為蠱官遊筆記

陳自明云兩廣山谷間有艸曰胡蔓又曰斷腸亦有感
蛇毒致生惡菌名為變年藥有淫嬾与比人交好者
別時陰以葯置飲食中仍戒之曰子必某時来若依
期而至彼復以葯解之若過期不往必死故謂之定
年葯如服神仙追毒丸一粒其病即瘥五倍子三兩
山茨菰二兩射香三錢十金子去油一兩紅牙大戟
一兩半各為末用糯米煮濃飲為凡分為四十粒每
服一粒用井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止
之此丸能解一切毒一名太乙丹紫金丹一名神仙
太乙丹一名玉樞丹又名神仙解毒萬病丹宜于端

午重陽七夕合之須潔淨之所尤忌一切冲犯

諸蟲

賈誼新書云楚惠王食寒菹得蛭恐監食當死遂吞之
暖有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有
仁德病不為傷王病果愈王充論衡云蛭乃食血之
虫楚王殆有積血之病故食蛭而病愈也陶弘景曰
楚王食寒菹見蛭吞之果能去結積虽曰陰裕亦是
物性自然 本草綱目

唐時京盛医人吴元禎治一嬪人從夫南中還曾誤食
一虫常疑之由是致疾頻治不减請吳医之吳揣知
所患乃于主人媵妳中謹密一人預戒之日令以葯

探之以盆盂盛之當吐時但言有一小蠅墓走去然
切不可令病人知之是誑給也妳僕如約此疾頓除
北夢瑣言

元載不飲酒人強之諱以鼻聞酒氣即醉人謂可治取
針挑載鼻共出一小青虫曰此酒魔也聞酒即畏之
去此元患楚日載飲一斗五日倍之清賞錄

孫兆治向大玉宮中有一宮人七太尉所寵也忽患一
病凡惡心則吐虫數條后乃頻作七太尉甚愍之累
治不痊每用殺虫藥則吐虫愈多召孫診之孫曰六
脉皆細非虫脉也今虽吐虫乃臟寒而虫不安失居

上膈因而吐出後用殺虫藥為藥所苦不能自安
所以吐虫愈多也孫遂用藥下虫五服皆一色丸子
虫遂不吐明日再召孫至六脉漸大進前藥其病不
作後求方乃硫黃附子各一兩並末糯米糊為丸每
三十丸米飲下經目

竇材治一嬾人病腹脹諸藥不効令解腹視之其皮黃
色光如鏡而乃燒瘕也先炙牛肉一斤食令後用生
麻油調輕粉五分服之取下燒虫一合如線如鬚狀
後服安虫散而平

張子和曰汴梁諸匠氏有木匠趙作頭錢匠杜作頭行

次失路迷至大定乞宿至人不納曰家中有人重病不敢納君杜作頭給曰此趙公乃汴梁太医之家今蒙上同見召迷路至此盖病者当愈而遇此公也至人然而入良久復出將邀二人入室与之食已至人起請曰煩太医省病何如趙見而笑曰一药可安二人窃議曰来时所携熟药寄他車上此中寔元奈何杜曰此甚易耳潛出門得牛糞一塊作三十粒下以温水少頃病人竟胸中如虫行一涌而出狀若小蜣螂一二升以手探之又約一升頃竟病去明日主人出謝曰百歲老人未嘗見此神効之药也礼餞

二人遂歸嗚呼此二子小人也欲苟一夕之宿遂以穢物治人亦偶得吐法耳

張子和曰予昔過夏邑西有媼人病脹如鼓飲食乍進乍退寒熱更作而時嘔吐且三年矣師巫覲符呪無所不至惟俟一死会十月農隙田夫聚獵一天後死際于大樹根盤遺腥在其上病媼偶至樹根頓竟昏惰眩瞶不知人枕于根側口中虫出其狀如蛇口眼皆具以舌舐其遺腥其人驚見長虫兩袖裹其手按虫頭極必出之且二尺許重几斤剖而視之以示諸人其媼遂愈虫亦無名正与華元化治法同盖偶得

吐法耳

張子和治酒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲
二三杯必奔走跛懶兩足三五十次其酒稍散方能
復席飲至前量一醉必五七次至明嘔青黃水數日
后變魚腥臭六七日始安張口宜涌乃吐虫一條赤
黃色長六七寸口鼻皆全兩日膜瞞壯如蛇類以鹽
淹乾示人

周漢卿治武城人病胃痛奮擲乞死漢卿納葯于鼻俄
噴赤虫寸許口眼悉俱痛旋止明史

鍾大延治一僧嗜鹽每食斤許眾醫知為虫也然服葯
輒痛悶欲絕大延曰是虫不受葯也當有以餌之以
鹽筍乾用葯煮仍加以鹽令服越數日果嘔虫數升
而安靈波府志

李明甫東陽人善醫尤妙針法義烏令病心疼垂死明
甫視之曰有虫在肺下為所不及惟砭乃可然非易
也謬謂于背上點穴密取水以噴之令方驚而針已
入口虫已死矣既而腹大疼下黑水數升虫亦去遂
愈兩浙名醫錄

尹蓬頭者傳稱騎錢鶴仙去蓋其人也一貴人閨女弱
病形容俱變匠人束手無葯可愈母鍾愛不能捨偶

邀視之曰有瘡虫尚可醫請用何葯曰葯力不能治
只消与我同宿一夜便好也母信其仙術決无戲言
自之于父大怒云胡說豈有公候家女与一風道
士全宿之理後見女殊无生意母又涕泣言之懇切
不已從之尹令紙糊一小室不許留孔設一榻不用
障令女去其相衣用手摩足心極熱如火抵女陰戶
東西而睡成女云喉中有虫出可急叫我女不能合
眼而尹鼻息如雷天將明女報虫從口中飛出尹四
顧覓之不見曰從何處鑽去不能除根定要害一人
也蓋乳母不放心因開一孔窺之虫出女口已入乳

母之腹也天明父母視之女之顏色已變尹大笑而

去後数月乳母死

續金陵瑣事

馮益齋給諫每發言腹中輒有声應之此應声虫病也

遂告病卜居南京楊守極用小藍飲之即吐出其虫

全上

郭茂倩嫂金華君產七日不食始言頭痛頭疼已又心
痛作既而目睛疼如割如刺更作更止相去無瞬息
間每頭疼甚欲取大石墜良久漸定心疼作則以十
指抓臂血流兩手痛定日復痛又以兩手自剜取之
如是十日不已眾醫無計進黑龍丹半粒疼少間中

夜再服下瞑目寢如常昔至午旦下一行約三升許
如蝗虫子三疾減半已刻又行如前則頓安 疑是綱目

孫文恒治一婦人心痛唇紅痛則大發熱頭疼少頃出

汗脉大小不一 虫脉曰此虫痛之症痛吐白沫可徵也

凡心腹痛面唇紅吐白沫者多属虫 換柳川椒各二錢杏仁一錢五

分石菖蒲一錢烏梅七个 太多炮姜州豆仁陳皮各五

分山危一錢一帖愈

閩蜃樓乃政体肥性躁患痛風手不能握沫足不能步

履痛處略腫呻吟喊叫 此風木生虫也 凡治七越月不減孫

診之曰溫疫凝滯經絡作痛 也精錯 醫作血虛投以補

劑宜其不應乃用二陳湯加烏葯葉蒼木僵蚕海桐

皮南星服至六帖遂不肯葯強之曰醫以治痛今反

加疼吾何葯為烏時至申刻知其驕蹇性成亦不再強

改以芫花醋炒過三分海金沙一錢為末白湯調下

防更衣 至曉瀉一次下稠疫半盃足痛減大半稍能

動止初更後忽腹大疼促進診行至後堂家人出

曰病者卒矣曰此必痛厥非竟死也 臨症者不可不知 且視

之至則冷汗淋漓元坐溺器面青息斷診之手冷如

冰六脉俱在但沈伏耳知為痛極使然用姜湯灌之

乃甦徐語侍女適未腹中痛甚火氣迸出肛門如焚
大响一声不知瀉下何物視之乃血鯁一條長六寸
濶半寸餘鱗目悉其尚能游動衆問如何曰此尤物
也得下幸耳但下剖寔為行痰初不知其有虫如是
盖芫花乃殺虫之品故偶中亦病人之福也次日手
足皆能動仍以二陳湯加苡仁紅花五加皮四帖脫
然痛痺門有乘青卷中女
未有長虫重出宜在一處

葉潤齋年近四十心膈嘈雜好咬肉尤好鴉一日不可
缺：即身浮力倦神魂无錯必急得乃已大嚼入腹
腹又大痛：極則吐酸水稠涎然后稍定少頃又息
咬矣其疼痛之態喊叫之声聞見酸鼻而被則苦心
焉或勸其勿咬肉謂久病脾虛肉又難化故作楚也
曰吾豈不知盖痛苦深而能熬者嘈喋則遍身淫：
蘊：左右無可奈何手足無所把握頃刻不能自存
有逾于死也孫診之六脉大小不等視其色唇紅而
黃曰据色脉有虫病也先与雄黃丸一服改以臟粉
五分火君子末一錢用鴉子打餅五更空心飼之可
法唇刺下長蟻十餘條内有二大者長尺有咫首尾
皆紅色下午又下小虫百餘自此不嗜肉而病亦遂

愈

与陸肖患
治案全

龔子才治一嬾年四十心胃刺痛時止時痛不思飲食即吐手足厥冷胸中痞悶口乾作渴曰此胃中有虫也以二陳湯加檳榔枳實烏梅花椒黑姜苦楝根皮生姜煎一服下虫一太碗而愈

孫一奎在吳下時有吳生諸震者博雅士也一日偶設及鼓脹吳乃詰于曰鼓有虫否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之奉事方云暗腹四肢悉腫者為水只腹脹而四肢不腫者為蠱注曰蠱即鼓脹也由是叅之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三虫為首豈无首哉蓋鼓脹即今云氣虛中滿也是以其外堅中空

有似于鼓救以名之彼蠱症者中是有物積久既聚理或有也吳曰子誠敏也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢痰削三吳名醫歷嘗不痊吳俗死者多用火藥燒至腹忽响声如炮人皆駭然乃見虫從腹中爆出高二三大許燒所之天為昏俄而遂地細視之皆虺也不下十萬數大者長尺餘虫腹中復生小虫多者一五六條虫在人腹中蓄息如是曷不令人脹而死哉惜諸書未有言及者予后至淮陰有五鄉官者其子年十六新娶后腹脹大按之有塊形如稍小發熱日夜不退已半年矣

張病因虫者極多張虫不設書耳

醫惟以發熱消脹之劑投之其脹愈甚喉中兩目俱
疹診其脈滑數望其唇則紅其腹則疼人多嗜肥甘
腹疼而唇紅好
咬者皆病虫 因思凡腹痛者唇色必沒不嗜飲食
今其若此得非虫乎遂与阿魏積氣丸服之下虫数
十大者数條小者亦三四條虫下則熱漸減脹漸消
三下而愈益信前聞之不虛也 景岳全書

李士材治候給諫腹中嘈襍痛按其左脇手不可近凡飲
食到口喉間若有一物接之者然曰脈大而數腹痛
哕涎面色痿黃此虛而有濕熱相兼虫乃生烏当
煎人參湯送檳黃凡以下虫清虫若不去虽服補湯

竟何益乎病家畏謹之甚不敢輕投終莫能起 何不改用

平善殺
虫之劑

張遠公三年久嗽服藥無功委命待尽姑乞診之問曰
飢時胸中痛否曰大痛視其上唇白點如蠶者十餘
處此虫嚙其肺也用百部羔一味加烏梅檳榔与服
不十日而痛若失咳頓止令其家人從淨桶中覓之
有寸白虫四十餘条自此永不再發 立齋業云上唇
白點虫蝕上部

下唇白點
虫蝕下部

王海巖云有楊時者自患風氣冲心飲食吐逆遍身枯
瘦日服萬病紫苑凡至二十日瀉出肉塊蝦蟇五大

枚白膿二升愈又趙侍郎先食後吐日无所見耳无
所聞亦服萬病紫苑丸瀉出青蛇五七條下惡膿三
升方愈紫苑丸即厚朴丸加羌活独活防風是也厚
朴凡厚朴蜀椒川烏頭紫苑吳茱萸菖蒲柴胡桔更
茯苓官桂早角乾姜人參黃連巴豆霜

益昌伶人刘清嘯一娼名曰花翠年逾笄病好食生米
否則終日不樂至憔悴委黃不思飲食思民局監趙
尹用蒼朮米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅梧子大每
服五十九食前米飲下日三服兩旬而安蓋生米
留滯腸胃受濕則穀不磨至生虫蒼朮能去濕温胃

消穀也

楊氏經驗方
本州綱目

戴元礼奉太祖命往治燕王患癩見他医所用良是因
念何以不効乃問王何嗜曰嗜生芹元礼曰得之矣
投一劑夜下皆細蝗明史

葛可久治一人患腹疼脉之謂其家曰腹有肉龟視熟
寐吾針之勿令患者知則龜藏患者問故家人誰
曰医云寒氣凝結多飲醇酒自散矣患者喜引杯
劇飲沈酣而卧家人亟報葛以針刺其患處病者驚
寤俾以葍餌須臾有物下儼如龟形厥首有穴蓋針
所中也黃日升蓮
憲類記

杭州府通判王某河間人病腹脹服藥不效夢人語云
鬼族藜可治王尋取煎液飯之痛不可忍俄頃同池
出一虫丈餘遂痊 覽餘漫抄

山野人好嚙風左腹生長為虱癩用敗梳敗篦各一枚
各破作兩分以一分燒研以一分用水五升煮敗一
升調服即下

張路玉曰近有女子效逆腹痛后忽喜呼叫初是呀呬
連聲漸至咿唔不已變易不常或如母鷄聲或如水
蛙鳴或如舟人打号每作數十声日發十飲次忍之
則胸中悶：不安此為蚘虫即應声虫之類也復有

一人忽發熱痞滿後常兀：欲吐：中必有虫数枚
狀如蝦形跳躍不已諸治不應或令服銅錄涌之不
過二三度遂絕

黃履素曰人陰毛中生虱名八角子貼伏毛根最痒腦
人相傳此虱不医延及頭髮眉毛其人当死治法以
生銀杏搗爛敷合毛上隔宿其蟲尽死予少年曾患
此法神効有友為予言生此虫者運會將否之地予
患此之後抱病十餘年備尝苦楚驗矣

虫之類能入耳者不独蛭虫凡虫皆然有人患腦疼為
虫所食或教桃叶枕作一夕虫自鼻出形甕嘴如入

無識者 遜齋閒覽

有人患脚瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一
道人云尔因行艸上惹蛇交遺歷瘡中有蛇兒冬伏
夏出故也以生蝦蟇搗敷之日三換凡三日一小蛇
自瘡口出病愈 撫青集說

至順辛未上埠一婦人就山林中採笋歸竟手拈和飴
一時不暇洗盥既剥笋殼人以齒嚙之由是成癩產
蛇而死蓋受蛇遺毒也 靜齋至正直記

小校果联元偃師又得奇疾左股痛不可忍呻吟累月
有僧詣門丐食問其所苦曰此肉縵也早治可治今

病深矣因刺其膝出小蛇十餘條僧持之去逾數日
蛇復涌出而死 三岡識畧

陸肖愚治陳曙先患飢必食肉方解否則遍腹蠕走身
体如在空中每食肉初一盪必滿心如箭攢作痛至
數盪方定少則頻飢多則不能尅化而作瀉醫治半
年肌削骨立脉之六脉皆弱而浮沈大小遲數不等
面黃而帶青紋曰此患虫耳可立除之令購史君子
肉半斤猪精肉半斤同煮俟肉極爛去史君子入膩
粉一錢令連汁頓食之初食亦如箭攢食後半日不
飢至五更下盆許皆虫有全者有半爛者間有活

動者宿疾全除乃以參苓白朮等調理禁其一年
勿食肉遂安

浦南一人少時每向溪邊拾蚌三旬外患腸痛極時
凡不欲生發必三四日偶一僧過其門問其叫号出
藥七丸大如菜子用白湯送下少頃下虫二三十作
紅白色其形如蚌病愈 雲間雜志

薛立齋治一男子患腹痛熱則疼甚諸藥不應半年之
後腹加腫脹面色痿黃診其脉不洪滑知非癰也詢
之云始于渴甚俯飲澗水意其誤吞水蛭而然令取
河泥為丸空心用水送下百丸果下水蛭而愈又一

子因跌海中膝作疼服積驚等藥不應亦依前症
治愈

一婦人于壁上取鷄翎卷耳邊蜈蚣生子在翎上帶入
耳中上小蜈蚣穿腦內且痛且痒百藥不効夢神人
傳一方令炒鷄肉熱置一器內留一小孔蓋上令病
者以耳受之鷄氣熏入蜈蚣悉措鷄肉上其病立安
廣筆記

錢因宥治周氏子業儒年二十脚掌常腫生黃泡數十
水出即愈及昏厥之症不時常發偶家宴忽然仆地
延醫診按諸經脉動独腎濡數或乱或靜回思濡主

濕也主熱也能主虫動也靜主虫伏也脚掌生瘡屬腎也是腎經濕熱生虫。氣上攻昏厥以雄黃丸巴霜罇金大黃各五分煉蜜為丸菜豆大雄黃為衣湯送十五丸以姜湯再催虫化如膠黑汁解于露地數次後用冷米湯補之恐防再發又食榧子一二升遂不復發

服巴豆利不止者得冷米飲即止

濟寧店主女年十八勞病三年体瘦神昏疾目黃多視其形神憔悴根露光芒六脉襍亂細問起居女日腹中常隱痛喜食糖米及着面生白點方知是虫也非芳也与雄黃丸十九粒檳榔湯下至午不動又催

五丸腹中大响下虫有餘形如玉鱉上有魚鱗下有黑骨四足能動此女昏暈半日方醒飲以薄粥用人參當歸檳榔紫蘓赤苓各一錢丁香五个烏梅一个數服除根

錢案

苔中唐国李子年十八骨立修長而乏肌肉面白筋青小腹近脇微痛已經多醫莫知其症脉乍長乍短虫之候也筋青暴露肝之病也小腹近脇微疼肝之地也遂知肝内濕熱生虫薄蝕久矣而以煨存性肥皂子一兩芦荟一錢共末每日糖湯調下一錢餌虫受葯便于露也日：一堆虫化膠矣厚旨苔廿五日虫

尽服參芪歸朮而收功全上

蔣仲芳曰姚軼指嬭年二十餘骨蒸潮熱乾咳口乾百治無効遇一方士曰肝中有虫今当盛夏正可引出即用童子鷄一只去毛雜煮熱貯漆盤中以盤蓋半開半閉俟病睡著以半開處病人鼻邊覓束即

盤蓋：緊侵晨用水一大痛置盤水底揭開視其鳴上小虫有翅無翅者二三百即傾在長流水中第二夜用鷄引之又去虫七八十虫尽而病愈至冬无恙予意鷄喜食虫故虫亦喜食鷄正如蜈蚣与鷄有相伏之意煮熱者取其香盛夏則虫四散睡著不動則虫聞香易出付之長流者水欲其去而永不來也后試他人亦驗然其要處不可令人先知恐虫亦知而避去耳

王守泰曰汪仲嘉謂余曰公知王節齋所以死乎曰不知也汪曰節齋為四川叅政時得心腹痛疾醫療之百方不効日益甚聞我眉有道者善醫然不可致也節齋親至山屏与從徒步諸之道者望見即驚曰病深矣既坐問公于服餌有生用氣血之物焙製未徹者乎曰有之常服補陰丸數十年矣中用龜甲酒炙而入之曰是矣宜亟歸屈其指曰獨可及家也節齋

通投檄歸至吳閭輒大下赤色小龜無數是夕卒于舟中王曰奉艸稱龜甲所主大率破癥瘕已瘡痔陰蝕漏下赤白不言補心腎自丹溪有補陰之說而后世煎膠製丸服之无纖毫之益且有害若是可不戒乎 醫暇卮言 程雲來

蛇症

孫文垣治馬迪菴內人原以飲食過傷又為風寒外襲

或以內傷外感治之致而更發熱感于唇燥胸中衝

跳不已手足皆冷脈兩寸俱滑數寸感是曰此寄

度症也杜撰以小陷胸湯加白芍薤白子前胡酒苓二

帖次早大便行下蛇虫八條却不見有奇疾胸中即不冲跳

但竟力怯再診之而寸減半尺脉稍起以二陳湯加

白朮白芍酒苓調理後四帖加當歸愈

琇按此由發散過劇擾動其火上冲胸跳蛇亦不

安而欲出以小陷胸湯投之則黃連之苦寒能降

火萋仁之甘寒能清火枳實之峻削能攻下病去厥止虵亦從而下行其力怯良由攻之猛耳非其有奇疾為病也孫君子生端以瘦揣病其不經處類如此

張景岳治王氏少婦年未二旬素喜瓜果生令常病心腹痛每發必數日不食后數年發必吐虵初吐尚少既而日多每吐必一二十條每發必旬日不食醫者但知攻虫旋去旋有百葯不痊察其脉症曰知其傷于生冷致脾胃虛寒陰濕氣聚故是為疰使不溫胃養脾以杜寒濕生化之源虫去復生終無濟也乃製

溫臟凡与之葯未完而病愈后仍耽生果川病又作
原法凡治虫之法但察其別元病
與前葯而安熱等症者以患溫補脾胃為主

中毒

唐崔鉉鎮諸官有富商船居中夜暴亡待曉氣獨未絕鄰房有武陵医工梁新聞之乃与診視曰此乃食毒也三兩日非外食耶僕夫曰王翁少出舫亦不食于他人梁曰尋常嗜食何物僕夫曰好食竹鷄曰竹鷄吃半夏必半夏毒也命搗姜挾汁折齒而灌由是而甦崔聞而异之召至安慰称獎資以僕馬錢帛入京致書于朝士声名大振 至尚為奉御有一朝士詣之梁曰何不早見示夙疾已深矣請速歸處置家事委順而已朝士聞而惶惧告退策馬而歸時有廊門

馬醫趙鄂新到京都于通衢自榜姓名云工匠
術此朝士下馬告之趙亦言疾危与梁生之說同
謂日即有一法請官人刺吃消梨不限多少咀乾不
及掇而汁飲或希萬一此朝士又策馬而歸以書筒
質消梨為上旋乾行到家旬日惟吃消梨頓竟爽朗
其恙不作却訪趙生感謝又訪梁奉御且言并趙生
所教梁驚異且曰凡國必有一人相繼者遂召趙生
資以僕馬錢帛廣延言官至太僕卿北夢瑣言
段已見舊唐書后段与茅山道士治階庭同亦舊唐書前
紹其十九年三月有客船自番禺至舟中士人携一僕

僕病脚弱不能行舟師憫之曰吾有一藥治此病如
神餌之而差者不可勝計當以相与既賽庙畢飲酒
頗醉乃入山求得蕪清酒授病者令天未明服之如
其言為入口即呻吟云腸胃極痛如刀割截遲明而
死主人以咎舟師舟師怒曰何有此即取昨夕所餘
蕪自漬酒服之不一時亦死蓋山多斷腸草人食之
輒死而舟師所取為蕪根蔓所纏結醉不暇擇往投
酒中是以是及禍則知州蕪不可妄服也洗冤錄
見甲志 說

黃啟東治分巡僉事戚公過縣晨興欲發忽疾作不語

呼黃視之黃曰脉与症不應乃詢其左右云夜食蒸
鷄黃曰此必食後就寢有蜈蚣過其口鼻中毒耳為
處剖投之立甦臧独未信乃更烹鷄置寢乃果有蜈
蚣三枚自榻頂下 湖廣通志

盛啟東明初為御醫晨值御醫房忽昏眩欲死募人治
之莫能應一州澤匠人應之一服而愈帝問狀其人
曰盛空心入為房猝中為毒能和解諸為者甘州也
帝問盛果然乃厚賜之 明史

凌漢帝歸安人為諸生棄去北遊泰山古廟前遇病八
氣垂絕凌嗟嘆久之一道人思曰汝欲生之乎曰然

道人針其左股立甦曰此人毒氣內攻非死也毒散
自生耳因授凌針術 全上

張鄒西言某巡按過山東見木下有大木耳一叢甚嫩
好以為天花菜也取歸煮食之尽一盤即入卧房明
日已牌尚未起書吏倒門而入止見骨頭一副其肉
尽化為水流滿床下迹至山中木耳處掘之得一蛇
大如桶殺之 戊安漫筆

陸放翁老孝庵筆記云族子相少服兔絲子十數年
所服至多飲食倍常血氣充盛竟背腫赤爛乃大疽
也適四五月金銀花開乃取花作良方所載法服之

計已數斤背腫尺消以是知非獨金石之藥不可妄服即鬼絲亦能致病也

按是人或迷于酒色或傷于爵怒遂致此症未之由服鬼絲也然為物久服亦多致偏勝之患

辛未冬德興西南磨石窰居民避兵其中兵人來攻窰中五百人悉為烟火熏死內一李師迷悶中搜索得一凍芦菰嚼之汁一咽而甦更与其兄亦活五百人者因此皆得命芦菰細物治人之功乃如此中流失船一壺千金真不虛語河中人趙才卿又言炭烟熏之往致死臨卧刮芦菰一片著火中即烟氣不能毒人如無鮮者畜乾者為末亦可續夷聖志

王思中治海鹽彭氏巨室也其媳方婚亦病煩急欲絕諸醫莫知所為思中診視令去帷幔櫛櫛并房中什器密求蟹脐炙脆研入為中服之即痊吳江縣志

姚福庚已編云太倉民家得三足蟹命婦烹食畢入卧

少頃形化為血水止存髮耳隣人疑其媼謀害訟之官時知縣黃廷宣鞠問不決乃別取三足蟹令媼如前烹治取死因食之入獄亦化如前人遂定其獄按爾雅蟹三足名能又山海經云從水多三足蟹食之

無蠱近有人而食之無恙何哉 本草綱目

吉安朱氏有為子腹痛人教以取棟樹東南根煎湯者其子初不肯服其父撻之既入口少頃而死蓋出土面之根能殺人朱氏不考古之誤也今醫家用桑白

皮本草云出土者亦能殺人

靜齋至直記 孔行素

邱傑年十四遭母喪以熟菜有味不嘗于口歲餘忽夢母曰汝咬生菜遇蝦蟇毒矣床前有三丸為可取服之傑起果有為在服之下料斗數升

姚應鳳治一人患身疼左臂似有條之者應風曰君食肉中鼠毒石臂生鼠用力決之墜地而逸 錢唐縣志

龔子才治一男子倏然低頭往暗處藏身不言問亦不答飲食俱背人竊啖人見之則食不下請人以為中邪用三牲祭之其物經宿乃妻食之病亦如是諸醫莫識龔知必中鼠涎有大毒也以吳茱萸塞入貓口貓涎自出取茱萸令夫媼服之而安

一葯室家人正對葯忽仆地不省人事諸人以為中風病厥醒曰此非病也必葯氣熏蒸中于葯毒令以甘草煎湯灌之立醒 與威改東 症治同

一媼人以燒酒貯錫壺內絳筒取服止飲一小杯即迷門不省人事眾莫能識其症龔曰此中鉛毒也令以

陳土攪水澄清入甘州煎湯而愈

吳季先治一人長夏元故四肢厥冷神昏不語或竹陰
症或作熱厥或作中風或作疫治俱不効吳診之消
息再四問前者曾食何物其家人曰前日晚間曾食
豬肺乃恍然令以忍冬花二兩煎湯灌之而痊蓋所
食乃瘟豬肺也

有人好食豆腐中毒不能治更醫至途遇作腐人家相
爭因妻誤將菜菔湯置鍋中腐便不成醫得其說
以菜菔湯而安 醫說續編

唐李宝臣為妓人置堇 音斬即烏頭也于液宝臣飲之即瘖

日死又唐武后置堇于食賀蘭服之暴死 全上

刘立之治一媼人病腰痛已歷年諸藥不効刘診之云
病雖危殆然一夕可安主人訝焉乃請其藥答曰不
須藥但用鉛粉二三十兩壯士五人各鈐五七枚足
矣于是主家悉備刘命撤床帳幔移置屋中以米飲
和粉置病媼腰周回令其舒卧壯士一人負鈐遠床
急走使其声不絕人倦即易之至夜半後其媼少能
自起立已而腰痛頓除幸家拜云師神医也頭聞其
意刘云此病因服水銀所致然水銀客腰窠間不能
出故疼不已今用鉛粉乃水銀所化為金之母取

金音以母呼子母子合意出投粉中則病安矣 醫史
醫說續編

明太祖制曰 匠人王允堅買藥為生錦衣衛監犯厨子
王宗自知罪不可逃慮恐刀加于頸令家人買毒藥
王允堅即時賣與隱飯中入外監門力士楊受財放
入內監門力士郭現保驗出外監者慌忙反說內監
者易其藥朕謂之郭現保曰彼往賣藥王允堅家買
者朕令王允堅拿至乃黑藥一丸因授與王允堅自
吞服之久毒不作朕知易藥矣謂允堅曰前賣此藥
何顏色允堅曰紅丸曰凡枚對曰三杯噫毒吞三丸
色赤全止一丸色且黑何也于是急遣人取至果赤
色隨令王允堅吞服令人持藥在手顏色為之變其
態憂驚猶未吞督之乃服既服后隨謂之曰此藥以
何料成曰此礪巴豆飯粘為丸硃砂為衣曰服后
何時人表曰半日語既允堅淚下朕謂曰尔所以凄
涼者畏死如此乎曰一子見軍一子在外故悲焉嗚
呼其王允堅初賣毒藥毒人及其自服也為方入腹
眷戀之情畏死之狀一時發見嗚呼愚哉至此而若
此亦何濟哉然終不以此藥致奉人之死何致若督
令服此藥而死是藥之也解而後刑之法也隨問允

聖此毒还可解乎曰可何物可曰涼水生豆汁熱豆湯可朕謂曰此解不速餘何連解曰糞清揀涼水糞清用多少曰一鴉子于是遣人取至候毒作可与解之少頃聖身不自主手按上下摩腹四顧張皇朕謂之曰毒何尔患曰五臟不寧心熱氣升曰此毒身死傷何經絡允聖對曰五藏先壞命絕矣身墨黑謂曰此時可解何時不解曰三時候不解朕見毒作令人与之解本人痛利數番其毒潔然人復如初明日梟令以至其罪嗚呼昔者古人制葯惟積陰陽以生人今之貨葯者惟望生理不施陰陽少有逆其意者活名恐詐者有之即時毒害者有之畜利其賣與人傷生者有之噫如此不才者犯法遭刑而殺身亡家者非止一人而已京市貨葯者往之不戒蹈齷前非將奈之何此語一出所在貨葯之人聽朕言者推已以及人永為多福不然罪烏可逃哉

嘉靖四十三年陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃韋家昏迷任其姦污復將魔法吹入柱耳中柱發狂惑見韋家皆是妖鬼尽行殺死凡下十六人並無血迹官司執柱因之十餘日柱吐疫二

挽許問其故乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子娣姪也柱与如香皆論死世宗命榜示天下覩此妖為亦是莨菪之流耳唐安柱山誘姦契丹飲以莨菪酒醉而執之 本州綱目

周櫟園曰癸未冬親串有從余遊都門者具人謹愿生平絕迹北里寔生天疱不解所自予忽悟其故解之曰君質弱常服紫河車京師四方謀集患天疱瘡者甚多所服葯中安知無天疱衣胞此瘡能延子孫氣味所冲尚能中人生子多無皮膚衣胞尤為毒氣所歸君之患必緣于此衆皆以為然夫忍于殤人之子

以自禪蓋仁者尚不為况未必有功而反以滋害乎

原注江南以胞衣為人食者兒不育京師不甚論

陳自明治二男子剝自死牛即日遍身患紫疱不計其數已而俱憤各灌神仙追毒凡一錠吐瀉而甦一葯不下者死 方見蠱門

吳內翰倫急方云全椒匠高照一子無賴父答之遂服砒霜自毒大渴利腹脹欲裂余教令服此葯以水調隨所欲飲与之不數椀即利而安其方用白扁豆晒乾為末新汲水下

凡中毒及附子烏頭河豚之類一切葯毒皆可治用多

年壁土熱湯泡攪之令濁少頃棄熱去脚飲不省人事者尤妙

北夢瑣言有人為野苗所毒而笑者煎魚椹汁服之即愈楓樹菌食之人亦笑

未安縣李主簿絃元度云白塔寨丁未春有二卒一候兵同食河豚既醉燒子併食之遂皆中毒人急以告巡檢二卒已困殆倉卒無葯用或人之說獨以麻油灌候兵者油既多大吐毒物尽出腹間頓寬以此竟無恙

朱丹溪解中葯方毒五倍子二兩重研細用無灰酒

溫調服毒在上下吐瀉醫說續編

一人吃水銀僵死微有喘息肢體如水間萬可久治奇疾往候之可久視之曰得白金二百兩可治病家謝以貧故不能重酬可久笑曰欲得白金煮湯治耳已而扣富者乃得之且囑之曰熱浴時如手足動當來告我有頃手足引動往告之復謂曰眼動及能起坐悉來告我一如其言乃取川椒二斤置沒桶中坐病人其上久之病脫去其水銀已入椒矣蓋銀湯能動水銀而不滯川椒能來水銀而聚之吁人謂可久之術良惜乎不多傳也酉陽雜俎云椒可以來水銀

于此可徵矣

繆仲淳曰莊歛之平日素壯寔多岐丁巳四月忽患泄瀉為粥蔬菜入喉竟如針刺下咽即辣因而滿腹皆辣隨竟腹中有氣先後左升次即右升氤氳遍腹即欲如廁彈响大泄糞門恍如火灼一陣甫畢一陣繼之更番逾方得離廁諦視所下皆清水盈器白胎上浮所飲食俱不化而出甚至夢中大遺了不收揖諸匠或云停滯或云受暑或云中寒百藥襍投竟如沃石約月餘大肉尽脫束手待斃余至仲夏偶過金壇診其脉洪大而數知為火熱所生病為疏一方用

川連三錢白芍五錢橘紅二錢車前扁豆茯苓石斛各三錢炙甘草一錢視其煎成將井水澄清加童便一杯十服臨別囑其此方勿以示人恐時師見之大笑不已也為軀命計爾堅信服之年彼却眾醫格信服藥方入口恍如飲薄荷汁隱隱沁入心脾腸中似別成一清涼世界甫一劑夜卧達旦洞渾頓止連服三劑大便已寔前世時凡飲食溫者不咽遽竟氣升即欲大便一切俱以冷進為快至是竟惡心畏冷得溫乃安曰此火退之徵也前方加人參二錢半蓮肉四十粒紅麩一錢五分黃芪二錢升麻五分黃連喬

半五六劑后去升麻又三十餘劑瀉大止而脾氣困
頓不知飢飽且少飲茶湯竟腸痛急服如欲寸裂白
此大瀉之后下多止陰也法宜用補倘用香燥取懷
暫時元氣常傷必成鼓脹不可為矣惟繆公今所不
格足以一其之
以走越為疏丸方用人參五分白芍六兩炙甘草一
古今矣兩左味六兩黃芪五兩黃肉五兩山藥五兩熟地八
兩牛膝六兩紫河車二具蜜丸空心飢時各一服少
日進前湯亦或時去黃連錢二分知飢而時食時
亦漸充矣其病一平勸其絕慾因出妾得盡發人之
秘謀乃知向之暴注由中巴豆毒本州中巴豆毒者
黃連冷水解之余用大劑黃連冷服正為對治時師
即信為火用連不過七八分至錢許止矣况一月之
瀉敢用連至三錢乎此予所以囑其勿出以示人之
故也席筆記

余治歛之泄此後恐其元氣下陷急宜升棄用升麻以
提之初不知其為中毒也乃因用升麻太早致濁氣
濕于上焦胸中時竟似辣非辣似嘈非嘈迷悶不可
名狀有時滴酒入腹或咬一切辛溫者更竟若不勝
狀一生知其故曰此病在上焦湯液入口即下注恐
未易奏功宜以噉化凡治之用貝母五錢苦參一兩

真龍腦薄荷叶三錢沉香四錢人參五錢為極細末
蜜丸彈子大午食后臨卧時各噙化一丸甫四丸胸
中恍如有物推下三年所苦一朝若失全上。以此
知上感下虛
補中益氣不
可漫服也

丹石毒

劉表在荊州与王粲登漳山見一岡不生百艸粲白此
必古塚其人在世服生礬石熱蒸出外故艸木焦滅
鑿看果蒸礬石滿堂客齋四筆

按仲宣元識若此何仲景預告以眉髮脫落而不
之信耶事見舊案第文太略

洪容齋夫子仲兄文安公鎮金陵因秋暑減食當塗匿
湯三益教以服礬石員已而飲啖日進遂加意服之
越十月而毒作鼻衄血斗餘自是數：不止竟至津
液皆竭迨予捐館偶見前語使人追痛因書以成未

者 全上

按陰虛火盛之人初服桂附姜萸等熱劑藥初則甚得其力所謂剗治也昧者不知止及至決裂莫可挽回余自擊其敵者數十人矣此亦与初服礬石員而食進者同

毛公弼守泗州病泄利久不愈及罷官歸遂謁龐安常求治安常診之曰此丹石毒作非痢也乃煮葵菜一釜令公弼食之且云当有所下明日安常視之曰毒未去問食凡何云進兩盃安常曰某煮此藥錢兩升合自有制度不尽不可于是再煮強令進之已乃洞

泄爛斑五色安常視之曰此丹毒也疾去矣但年高入久痢入尔去丹毒脚当弱不可復餌他藥因贈牛膝酒兩瓶飲尽遂強如初 独醒雜志 曾達臣

虞都巡者曾達臣先人同僚也自言常服石燕其法取雄者十枚煨以火通紅則出而清酒中候冷復煨既煨復清如是者無美度乾酒一升乃取屑之每早作以二錢七擦齒上漱燃以酒虞時年五十服此為二 年膚髮甚澤才如三十許人自謂服藥之功一日忽竟熱氣貫兩目睛突出痛不堪忍而死因思久服金石藥鮮有不為其所毒者 全上

臨川周推官平生孱弱多服丹砂烏附葯晚年發背疽
醫悉歸罪丹石服解毒不効瘍醫老祝脉之曰此乃
極症正当多服伏火丹砂及三建湯乃用一劑試之
復作大劑三日後用羔敷貼半月而瘡平凡服三

建湯一百五十服

音東野語 見本州綱目 意其
人必誠陰之体故耐大熱之劑

張路玉治孫古修誤服伏火丹砂中毒察其本元素虧
虛火 爻舌下腫脹延及兩頤医用苦寒清熱
大過神思不安葯中毒服加丹砂五錢甫進一劑竟
胸中有物觸者數次請政于醫復出丹砂視之色黑
而晦醫令易砂更服四劑日夜 蹠不寧有時洒淅

惡寒頭面烘熱大汗脛膝逆冷如水忽之氣逆欲絕
張診之六脉濇數糲糊次驗唇舌俱色如汙泥而腫
厚濕滑若條熱極似陰必先濕滑之理若條寒犯三
陰必無反厚之理惟酒食內蘊微翳色現有之審其
二便調速胸腹柔和決无食停胃腑之理以脉合症
詢為陰受熱鬱最急者恐其喘汗欲脫乃以生脉六
味合劑以棗肺皆一服神少安汗稍斂再進人事少
知稀粥少進犹未言及伏火砂也見其舌胎稍轉微
紅而氣微足冷如故前方入桂心五分五味數粒服后
足少溫和氣少接續語稍有次方詳述伏火砂之

誤前方減去他黃桂心五味入枣仁秋石人中黃嵩
鮮丹砂之毒三服古轉微紅虽未鮮潔而伏毒漸解
緣兩尺弦細乃去人中黃仍用地黃以填補下元而
安

羅謙甫曰僧闔仲章服火煉丹砂二粒頂出小瘡腫痛
不任牙疼不能嚼物服涼膈散半斤始緩後飲酒必
發為之則緩終身不愈

何橫淫好色卒居進熱劑偶与方靈谷对奕呼小童取一
釐散來童誤聽為七厘也何時仰子布笑不暇
覘遽服之是夕卒于書齋后十餘年孫理安倩居其室

偶至書齋見一人仰卧榻上問之荅曰我何橫淫也
孫大駭走十日卒

雲間雜志

秀州張生本郡中虞侯其妻遇神人自称皮楊大王授
以癰疽異方一丹且誨以手法遂用醫著俗呼張小
娘子又轉以教其夫吳人張縣丞祖母章子厚妾也
年七十疽發于背邀治之張先潰其瘡以盞貯所泄
膿穢澄滓視之其凝處紅如丹砂謂丞曰此服丹葯
毒所致也丞怒曰老人平生尚不服一暖葯况于丹
乎何妄言若是病人聞之亟呼曰其說是也我少在
汝家時每祖公餌服大丹必使我輩伴服一精積久

數多故貯畜毒根今不可悔矣張謝去母竟以是終

李日華六

所齋記

陳良甫治一富室男子鼻血不止六脉洪數究竟云服丹藥太多遂用黃連黃芩大黃為末水煎服或調服亦可良方

無錫華氏年六十患背瘡潰後大如旋盤而色赤想是平日多服金石藥毒發所致問之果然因令侵晨飲羊血一五升始用退熱解毒生氣血之劑燴以生肌羔半月後肌生膿少予曰歸令服此藥百餘劑方可全安一月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但食少死力曰問前日之為服凡何曰瘡將平遂止不服脉之沈細甚曰知其氣血只可供給瘡平而已子真氣則已竭不可治即古人所謂死子瘡結痂之后果不出半月而死此膿出后之虛若因虛而發癰疽者亦然藥要或問

忠安公安道居南都煉丹一炉養火數一年月成不敢服時張芻聖民守南都羸瘠殊甚聞有此丹堅求餌之安道云不敢吞也但此丹服火之久不有大功必有大毒不可遽服聖明求之甚力乃以一粒如粟大以与之且戒宜諱藏慎勿輕餌聖民得之即吞焉

不數日便血不止五臟皆糜潰而下竟死云 張邦基
墨莊漫錄

士大夫服丹砂死者前此固不一余所自擊林彥振平日充實飲啖兼人居吳下每以強自誇有匡周公輔言得宋道方煉丹砂秘術可延年而后死害道者供州良醫也彥振信之服三年疽發于腦始見髮際如粟越兩日項頷与胸背畧平十月死方疾亟時醫使人以帛漬所潰膿血濯之水中登其不畧有丹砂蓋積子中与毒俱出也謝任伯子日聞人畜伏火丹砂不問其方必求之服唯恐尽去歲亦發腦疽有人与

之語見其疾將作俄頃竟形神頓異而任伯犹未之竟既竟風雨經夕死十年間親見此兩人可以為戒矣 避暑錄

吳興吳景淵刑部服硫黃人罕有知者其後二十年子索為華亭市易官發背而卒乃知流毒傳氣尚及其子可不戒哉 治宅編



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

邪祟 奇疾 飛尸 詐病 九針形 針灸
色診 經水 熱入血室

續名醫類案 卷三十三



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十

錢唐魏之琇玉橫輯 男弒編次

邪祟

舒氏子為素衣女子誘患瘵捕不得意緒恍惚如痴家
人共狀請符于朱善誠法師朱讀狀大駭曰必鱗介
之精邪毒入脾肝裡病深矣非符水可治與躬往治
之乃假巨鱗黃油二十斤焚符被拘之乃大白鱗也
鱗由正沸自投其中糜爛而死朱戒其家俟油冷以
斧破鱗節骨并肉蒸日中黃極乾八人參茯苓龍骨
末成丸託為補藥命病者晨夕餌之勿使知之如其

言病愈 艷異編

宗人王纂精針石元嘉中縣人張方女日莫宿廣陵廟
門下夜有物假作其婿來女因被鬼惑而病正為治
之下針有繭從女被走出病愈 列細叙異苑

願歡隱于公稽素有道風有病邪者以問歡曰君家
有書乎曰唯有孝經而已歡曰可取仲尼居置病人
枕邊恭敬之當愈如言果安其家問故曰以正勝邪
故愈也 吳均高春秋 北史

黃帝灸法療神邪鬼魅久癩狂病語不擇尊卑灸上唇
裡面中央肉弦上一壯如小麦大又用銅刀將廢裡

面弦上割令其斷更謹也

秦承祖灸狐鬼神邪及癩狂諸般醫治不痊者以并手
兩大拇指用軟絲繩急縛之灸三壯其炷著四處半
在甲上半在肉上四處盡一處不燒其病不能得愈
神効不可量小兒胎癩妳癩一依此法灸一壯炷如
小麦大 東垣十書

李士材治章氏女在閨時昏暈不知人蘇合丸灌醒後
狂言妄語喃：不作左脉七至大而無倫右脉三至
微而難見兩手如出兩人此祟憑之也脉絃帶于掌
二大拇指以艾炷灸兩甲界 鬼哭 至七壯鬼即哀詞

求去後調氣承胃散加梳奴數日而祟絕

喻嘉言治楊季登次女病多汗食減肌削診時手間筋掣手肉顫身倦氣怯曰此大驚大虛之候宜從溫補予補劑中多加茯神芩仁十餘劑全不應因思症非外感也內傷也襟症也虛汗振掉不虛能受補而為病無增減其間中處子素無家雜其神情渾似喪敗之餘此曷故耶忽悟曰此必邪祟之病而其父何不言往診問其面色曰時赤時黃同謂此症必有邪祟吾有神葯可以驅之季登終曰此女每夕睡去口流白沫戰慘而絕以姜湯灌至良久方醒挑灯侍寢防之

亦不能止因見用安神葯甚當又恐疇家傳聞故不敢明告也曰何不早言吾一劑可安乃以犀角羚羊角龍齒犀威骨牡蠣粉鹿角霜人參黃芪等葯合水令以羊肉半斤煎服濃汁三碗盡調其末一次服之果得安寢竟不再發相傳以為神異蓋以祟附于身與人之神氣交持亦過處不安無隙可出故用諸多靈物之道形引以羊肉之羶俾邪祟轉附骨角移後大便而出仿上古遺精變氣祝由故事而充其美耳又熊去疾鬻年患一奇疾飲食如常但麻細神呆氣奪色夭乃翁曰此何病也喻曰病名確磔左傳所謂

女室晦即是此病彼因近女又遭室晦故不可為令
即受室晦而未近女是可為也即前方少加牛黃凡
服旬日而安

孤之迷入先用口向女子陰戶一展其人即昏迷不醒

或男子則向陽物一展亦令昏迷方用真桐油抹于

陰戶陽物上即大嘔而去甚妙 全神綱目

朱丹溪治一婦人如癰或作或輟恍惚不省人事一日

略蘇醒診視忽聞床上有香氣繼又無所知識朱曰

氣因血虛亦從而虛邪因虛入裡或有之遂以秦承

祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即安 此紫

舊在
刪門

徐秩夫療鬼穴凡有病者鬼邪須針鬼穴鬼去病除其

應如神

一針名鬼宮 八中穴
八三分 二針名鬼信 少商穴
八三分

三針名鬼節 行間穴
八三分 四針名鬼心 大陵穴
八三分

五針名鬼路 隱白穴
八三分 六針名鬼枕 厥陰穴
八三分

七針名鬼關 極中穴
八三分 八針名鬼門 承漿穴
八三分

九針名鬼臂 間使穴
八三分 十針名鬼額 出門穴
八三分

十一針名鬼會 正乳穴
八一分 十二針名鬼腿 傷陵穴
八三分

十三針名鬼身 異名舌
出紫血治身腫難言心經邪熱繼出

抑紫

四

血便

陳自明治一女子為邪所交腹作痞与太乙井一錢服之隨下惡物其邪仍至又服半錢每夜更換二三錢使烟氣盈屋遂不再至 方見靈門

金劍峰之子患妖症吐舌數寸許每以足居上首居下癱倒而行劍峰偶送一道士出門復入中堂目見一婦人在戶內走入屏風中乃碎屏風火之鬼不後見而子病亦痊 雲間雜志

蔡石戶抱病三年耳中日聞鬼嘯凡有所在鬼必相隨初甚怖久之殊不為怪病痊鬼嘯亦息 全上

臨海章安鎮有蔡木匠者一夕手持斧斤有外道遊東山東山泉所燭葬之處蔡氏醉中將謂抵家捫其棺曰是吾榻也寢其上夜半酒醒天且昏黑不可前未免坐以待旦忽聞一人高叫棺中應云喚我何事彼云某家女病損症蓋其後園葛大哥淫之耳却請治師從鬼我与你同行一看何如棺中云我有客至不可去蔡明日請至人曰娘子之疾我能治之主人驚喜許以厚謝因問屋後曾種葛否曰然蔡漏地翻掘內一根甚巨且有血者啖之而愈

唐同州刺史孟詵云婦人夢与鬼交者鹿角末三指一

撮和清酒服即出鬼精入舌令錄驗治妹魅猫鬼病
人不肯言鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕即言寔
也 平叫

王欽授云有嬖人患赤白帶淋得子灸針經初為灸氣
海穴未効次日為灸帶脈穴有鬼附患身云昨日灸
亦好只灸我未著今灸著我：今去矣可為酒食祭
我其家如其言祭之其病如失此寔事也予初怪其
事因思晉景公膏肓之病蓋有二鬼焉以其虛勞甚
矣鬼得乘虛而居之今此嬖人之疾亦有鬼者豈其
用心而虛故有此疾鬼亦乘虛而居之哉灸既著穴

其鬼不得不去雖不祭之可也自此有求覓灸者必
為按此穴莫不應手按疼予知是穴也今歸灸之無
有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者
速宜灸之嬖人患此疾而喪生者甚多切不可忽若
更灸百會尤佳此疾多因用心之故也 養生經

何伯庸診西山道者素無疾病寢不能興曰六脉純陰
為鬼所盜當午刻死竟如其言又嘗為劉某診曰尺
脉有怪徵後嗣有厄是夕其孫溺死 雲南志

錢國賓治上橋張林巡司書役也其妻勞怯也三年服
藥無効卧床不起矣脉沉大至骨數十至中一鼓或

隱或現形色蒼脫所居暗室曰此非勞怯乃陰邪之
症但不知名非葯可治先當移房再讓解之更語其
母以好言相問見何作祟媼只不答及移室禱工有
毛數莖長寸半許透露狐交即延道士及狂天師符
即攘退至夜多人環繞而來反更頻頻因迫問媼曰
但竟冷風吹面身即寒噤胸如石壓則昏不知人矣
因再求球為思久之猛悟人交陽交也狐交舌交也
密詔其夫少製毒葯無聞六耳塗陰戶之四圍是夜
狐來果中毒而死乃一元狐間生白毛錢乃令林縛
之極肥壯林遂剖其肉剝其肉崇遂絕媼病亦愈後其

媼服葯經年方得飲食起居如舊

奇疾

穆吏部深者山東濟南人壬辰進士罷官里居忽患奇疾耳中間車馬之聲則疾大作一日聞耳內議曰今日且遨遊郊甸即有裝駝駝馬鱗次而出其恙頓除至晚復聞遊者回駝馬尽返耳中則所苦如故屢治不痊一日忽失敵帚軒刺語

一人卧于床四肢不能動只進得食好大言說吃物謂之失說物望病治法如說食猪肉時便云尔吃猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要却不与吃此乃失他物望也涎出自愈萬病回春

有富家子年十七八病遍体肌肉拆裂名黃子厚治子厚階門生四五輩注診視各以所見陳論皆未當子厚乃屏人詰病者曰童幼時曾近女色犯天真乎曰當十三四曾近之已子厚得其說矣褚澄云精未通而御女則四脊有不滿之處後日有難狀之疾在法為不可治后果惡汁淋漓痛楚而死

其論或未然

江南逆旅中一老嫗咬物不知飽余德占以炊餅咬之

盡一竹筐优稱飢不已日飯一石米

郁滄浪吳

醴泉主簿蔡繩子友也亦得飢疾食稍遲則頓仆悶絕繩有美行博學有文為時聞人竟以飢死無能知其

疾者每為哀傷

全上

琇按此恐即中消病也

予嘗至候潮門外觀潮見一人丐食者一手掌倍大五指各長尺許但伸而不能屈嘆其賦形之奇其人曰予病也昔業織練足以餬口容夏病傷寒當發寒時此手在被外獨不汗病愈而此手疼不已漸痛漸長以至于此故乞食耳

全上

卽汝誠治一女子久伸臂不下卽命其母裸女上身以單裙著之曰俟吾揭簾卽去下衣母如命卽揚聲而入女羞縮臂而復故

揮塵清談

陸道先治一兒染奇症四肢堅不屈先日此非藥可治
幸筆衆之統床焚安息沈檀兒即卒復少頃入焚屑
沈香飲之遂痊 平湖縣志

高陽氏家子年十餘歲忽臂上生宿瘤痛痒不可忍醫
皆不辨何症一日忽自潰中有員卵墜出尋化為石
劉工部霖以一金售之治腦如神 也北偶談

江寧有蕭生者食香菌則死又有玉生者飲茶則死必
二三日始甦醫無能識其故者誌于此俟明醫或知
之 居易錄

桐城友人姚文燮字經三順治己亥進士詩畫皆有名
年六十餘忽病不識字而其姓名亦不自知醫不知
為何症也竟以是終璣夢溪筆談記松茲令姜愚者
忽不識字者數年後稍復舊信奇疾也 全上

劉進士祖向言緬甸一少年為邪所侵疾入羔音家人
謂不可活置之路旁忽一道士過之自言美匠命取
鐵錘重數十斤錘病者頭而父母泣謂病已至此鐵
錘下者立碎矣道士笑曰無傷也錘下病者若無所
知輒有二美姬人長二寸許自口中躍出而滅凡百
錘口出百痛人大小形狀如一少年立愈道士不知
兩注 也北偶談

宗元嘉禾有長廣人病瘥即能食却不得卧每飯輒覺
其身增長數日頭遂出屋時改某為刺史令人度之
已長二丈后縮如旧乃死 異苑

醫書言瘦人驟肥：人驟瘦皆不久同年薛為孝登進
士時体甚肥及為御史忽尔瘦削未几公幹鄆陽一
夕而歿聞歿時身材縮小如十餘歲小兒此无可異
也 覽餘漫抄

陶九成云都下一兒患頭疼不可忍有回二医官用刀
割開額上取一小蟹堅硬如石尚能活動頃之方死
痛亦止当求其蟹藏之 輟耕錄

宋史載古夏卿辛進士歷知制誥典滁州年五十二得
奇疾身体縮小卒時終如小兒救園雜記載御史薛
惟覽 餘漫抄 身体甚肥忽尔瘦削一疾而歿二時縮
小如十餘歲兒 自詩話

廣陵有田嬀患泄瀉下惡如油鄰童以紙燃醮然与油
熱異医不能治孫紫几先生聞而往視令買補中益
氣湯十劑天王補心丹四兩以煎劑下丸服訖而愈
眾医問之曰大驚恐則氣下大腸脹損所致此嬀必
受驚後得此疾也問之果力作于役見幼子匍匐赴
火驚而急拯得免遂得此疾此方書所未載 奇疾

錢國賓治鎮江錢青藜中年無病一日足跟偶响聽之
有声自覺怪異數月漸响至頭竟如雷声医者症名
不一七年懷生死之憂矣錢一日過甘露寺尋蒼耳
叶治毒会于涼亭偶言此症以骨雷告之速全家候
其脉五部皆和独腎乳大冲之始見按之似無乃腎
敗也自下响者足少陰腎經之脉起于小指之下斜
走足心出然谷之下循内踝後別入跟中以上膻内
出膈贖上股入後贖貫脊且腎主骨腎虛則髓亦空
髓空則鳴所以骨响自足之頭即当從也起响于天
上也以六味丸加紫河車羔席骨羔猪髓枸杞杜仲

方示之彼謝曰公論破七年之迷良方起終身之病

矣長揖而別至次年春錢復至京口聞已全安錢唐人

萬曆時人有壽世堂送紫四十則多
高疾乃刻奉田坑大史董浦延借得

癸亥冬山海天行時疫病者頭疼發熱惡心口渴神昏
欲寐四肢不奔其肉推之則一堆平之則如故医有
作傷寒者有作時氣者投以發散藥無不加重死者
數百時督師閣部孫及替畫各傷一僕至乙丑春錢
之關門謁太師設次問及曰此症天行時疫名内行
也入内屬土：燥則崩土濕則流其邪感于血脉既
非内不比傷寒治也古今医集不載止于官即便方

見此異症一疑因人血枯而感天時不正之氣當大補血用首烏杞子歸地等味少加羌活風藥足以應病矣若經發散必死

湖洲鄔阿二織絲人也忽然而睛紅十數條其紅條頭粗尾尖腹大長尺許濶寸許此青蛇氣異毒也急治之不然蛇形入腹而死或生大小腿如頭向上攻入腹者亦死以針挑破頭尾使其不走流出惡血又研明雄黃吐調查患處內服清涼散毒散防風荆芥白芷羌活黃連黃芩連翹金銀花槐子甘州當歸生地各一錢而痊

吳橋治呂建充年二十五得奇疾作則衆竅氣全出瞑而垂縫家人為之閉口鼻塞兩耳握小溲抵大溲乃稍回氣蒸之出毛孔中良久始定迎橋治橋曰病得之內而受驚陰陽而脫橋不能往第以大溫補劑投之持方約歸三月而安 太函集

金節年如廷充始病潮熱夢遺面頰而欬血醫而少間已復愈奇疾作則如求薪執涌泉由脛及腹直達如貫梁傾耳而聽輒有聲至則堅強不仁膚革一如木石噴涕不通水漿不內良久忽發一歎身柔緩如常以日計之凡六七作諸醫斂手橋視之脈數而

浮不任按病得之荒淫不節以故陰虛火炎此其甚也為之正治則以一耘而熄輿薪無已則從治之主以甘溫佐以清涼可也日一劑皆有驗迄于旬日而新疾平其父以故疾未除則挾一方士自九華至乃恚屏前葯日烹一鴨餉之葯以人參和以大棗元何大症復作中脘膨脹乃復迎橋診之則六脉浮取如弦之為木旺蓋以咬鴨而傷脾氣故肝木乘虛而尅之將變而為中滿急以溫補為剷治之兩月乃安

飛尸 即鬼疰

薛立齋治錦衣楊永興家避青有僕沈醉失避者既而神思昏昧遍俸青傷令煎金銀藤灌之即愈

葯大治五種飛尸此其驗也

云此

一婦人忽昏憤發謔語自云為前謀賴某人銀兩某神請我將你起解到城醒理問兩脚踝膝臂處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤煎服愈

一婦人入古墓患前症以紫金錠灌之即甦通政余子華汪太常用之皆因法弔而卒死即此症也

謝士泰刪繁方治尸症或見尸或聞哭聲者取死人席
斬棺內餘棄路上有一虎口長三寸水三升煮一升
服立効按此即用死人枕之遺意也 平州經目

庚申中家一婦人夢中見二蒼顏一前一後手中持一
物前者云到也末後應云到也擊下爆然有聲遂覺
竟後心一點痛不可忍昏悶二時許予忽憶精神并
有此一症取三粒令服之少頃已無病矣云服藥竟
痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣与二一服
無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少曾
青磁石為難合耳 臣子經目

竇材治一婦人因心氣不足夜有少年人附著其体
診之六脉皆無疾令灸上腕穴五十壯至夜鬼來離
床五尺不能近服姜附湯鎮心丹五日痊

一貴人妻為鬼所著百法不効有一法師書天醫符奏
玉帝亦不効材令服睡聖散三錢灸巨闕穴五十壯
又灸石門穴三百壯至二百壯病人開眼如故服姜
附湯鎮心丹而安

一婦人病虛勞真氣將脫為鬼所著材用大艾火灸關
元彼難忍痛乃令服睡聖散三錢復灸至一百壯而
醒人服又灸至三百壯而鬼絕

越民高十二歲無食其妻子至德清雇妻子于秀州倉
官李深家為乳媪高得錢還越而死李僕許入直隨
在秀以幹歸德清及再乘之日媪患恍惚詰語作駭
大聲責罵故妻不為資荐李問何以得至此曰我隨
許僕船便是以得來李命亟逐未至漫燒蒼术烟薰
燎鬼遂云我怕烟氣不敢更留遂無語媪亦病痊今
人冲惡必蕪术即此意也 類編

李行簡外甥女適葛氏而寡次嫁朱訓忽得疾如中風
狀山人曾居白視之曰此邪疾也乃出針刺其足踝
上二寸許至一茶久媪人醒曰疾卒矣始言母疾作

時夢故夫引行山林中今早夢如前而故夫為棘刺
足脛間不可脫惶惧宛轉乘間乃得歸言笑自適所
刺者八邪穴也 莊說

詐病

張景岳向寓榆關客邸一友忽黃昏叩戶張皇甚問之
則所仰之奴忽得急症勢在垂危喘遺其危禍不可
解因求球隨往視之見其吐白沫僵于地口鼻四肢
俱冷氣息如絕狀殊駭人及診之則氣口和手足與症
不應沈思久之復診脈如故始悟其詐也乃以仲景
法試之遂大聲言曰此病危矣使非火攻必不可活
非用如棗如栗之艾亦不可活又非灸人中眉心小
腹數處亦不可活吾寓有艾可速取來然火灸尚遲
姑先與一葯能下嚔之復少有声息則生意已復即

不灸亦可若口不咽或咽後無聲速灸可也即与一
藥囑其服後即來報我彼聞言已驚惟恐大艾著俸
藥到即咽少頃即呼聲出而徐動徐起矣次日問其
由乃知為吃醋而然也西中妍狡有如此也

景岳在都時有金吾畜二妾其一則燕姬也有母隨之
一日二妾爭競燕姬理屈若母助其跳踉遂致氣厥
若死乃令一婢抱持而坐自暮達晨絕無甦意延治
初入室見其肉厚色黑面青目瞑手撤息微診其脉
則伏渺若脫亦意其真危也而治法難施溫補則慮
其氣逆發散開導則慮其脉絕難勝躊躇乃請以復

診則以十指交錯扪腹坦于婢懷因疑其前已撒手
今能又于豈他人之術為乎及診之似有延拒意拽
之不能動乃出其不意猛拽之則頓脫有聲力強且
勁此非欲脫真病明矣因思其脉若此或以肉厚氣
滯此其人稟賦多有之也或以兩腋緊夾此奸人狡
詐亦有之也若其面青色微則怒氣使然自不足怪
識見其受因聲言其危使聞灸法遂先以一劑下咽
即活金吾因詢其病真耶假耶若假何以竟夕如是
且形症畢肖若真何以藥下即痊抑果藥之元秘乎
曰元秘乃在言耳不過借藥為名但使彼惧病即去

矣。經曰：憂可勝怒。正此謂也。然其狡詐一至于此，使非再診，亦几為所誑矣。

一士子為官家所歐，遂臥病旬日，吐血盈盆，因喧傳人命運及多人延醫，數人見其危甚之狀，皆束手遠避，防為所累也。最後張視之，察其色則絕無窘苦之况，診其脉則皆和緩如常，始而疑，繼而悟，乃潛語之曰：他可欺也。余亦可欺耶？此尔之血抑家禽之血，即其人愕然，澆予勿言，遂与調和，銜感而罷。

一鄰婦以如妾，詭詐与夫反目，因而病劇，咬牙瞪眼，僵厥不蘇。若命在呼吸間者，其夫驚惶無措，其妾几遭不堪。求張球之，則脉非其病，遂用前法治之。愈後，其夫感謝而不知為其詭詐也。若此二人，則入人事中之常態，使不有以鑑別，則此中變幻，有以假病而延成真病者，有以小愈延成大禍者，故并記之以資聞見。

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



鐵針 針如泰字之體長三寸

針 針如泰字之體長三寸

針 針如泰字之體長三寸

針 針如泰字之體長三寸

針 針如泰字之體長三寸

針

子

員利針 尖如毫其首且利中可散寒

毫針 法象毫尖如針其長三

長針 鋒如刺長七寸却半居前

燭針 一名燭針長四寸以虛合

禁刺

病与相逆者皆不可刺

大渴 大飽 大驚 大怒 大勞 大醉

大驚 大驚 大驚 大驚 大虛 大困

大渴 大飽 大驚 大怒 大虛 大困

燭之之熱 燭之之脈 身熱甚陰陽交爭

五行刑制 如心相過 望不補 晦不瀉

弦不奪 湖不濟

禁針穴

腦顛 顛會 神庭 絡卻 玉枕 角孫 顛顛

承泣 承靈 神道 靈臺 膈中 水分 神隱

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

會陰 橫骨 氣冲 箕門 承筋 青靈

三陽絡 手五里 北二十 合谷 三陽交 二穴

石門 針之合死子 雲門 鳩尾 缺盆 容主人

不宜 肩井 此穴針深令入

禁灸穴

承光 庭門 風府 天柱 素脊 臨泣 睛明

攢竹 迎香 禾髻 額髻 絲竹空 白環俞

頭維 下關 脊中 肩貞 心俞 天牖 人迎

乳中 周榮 天府 中衝 臨關 陽池 隱白

涌谷 地五會 陰陵泉 絳口 膺臑 陰市

伏光 郛門 委中 殷門 申脉 承扶 凡四十

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

傷寒灸之可否

內經云脈之所見邪之所入在脈沈者邪氣在內脈浮者邪氣在表世醫只知脈之說不知病之禁忌若表見寒症身汗出身當清數標而寒不渴欲飲厚衣常惡寒手足厥皮膚乾枯其脈必沈細而遲倘有一二症皆宜天之陽氣下陷故也若身熱惡熱時見躁作或面赤面黃咽乾噤口乾舌赤黃赤時渴咽噤痛皆熱在外也但有一二症皆不宜灸其脈必浮數或但數亦不可灸之災害立生若有鼻不聞香臭而流清涕眼瞼時痒或久或惡寒其脈必沈是脈症

相應也或輕手得弦緊者是陰伏其陽也鼻面赤宜灸之不可拘于面色赤而禁之也

辨傷寒五十九刺

五十九刺者為頭上五行以冠起諸陽之熱也

大杼 膺俞 缺盆 背俞 此八者以瀉胸中之熱也

氣沖 三里 巨虛 上下廉 此八者以瀉胃中之熱也

雲門 髀骨 委中 髓空 此八者以瀉四肢之熱也

針灸

用灸八法

用灸八法者迎隨一也轉針二也手指三也轉針頭四也虛室五也陰陽六也提按七也呼吸八也補瀉損益虛實在此八法

針用五門分主客

針用五門者并榮俞經合也春刺并夏刺榮秋刺經冬刺合季月刺愈以有五門一月亦同一日亦有五門同年賓客為邪氣主人乃正氣知者刺之無不効也定刺象木

針刺可曲可斜可直可正故定刺以象木性之曲直也
口藏比火

凡用鍼先以針含口內令溫調榮衛以火性灸上即升
降旋轉左右而下也

常山關氏曰口溫針暖不惟滑利而少痛亦借已之和
氣與患人榮衛元寒溫之爭便得相從若不先溫針
暖與血氣相逆寒之交爭而成瘡矣

灸刺外午前卯后高五酉南

午前卯后者乃卯辰巳三時也陽中之老陽可灸刺乃
病之虛寒高五酉南者乃午未申三時也陽中之少

陰可灸刺萬病之煩躁薰蒸之勞熱而瀉之灸以吹
之灸時丈夫用室女婦人用童男吹之呵之反作清
涼之氣也呵吹者灸之瀉法也

接氣通經法

凡欲取偏、枯久患榮衛諸疾多是愈而復作者由氣
不接而其氣不通虽有暫時之快客氣勝真病當未
愈也當此乃令上接而下引吸呼多少經脈長短各
有定數立法手五陽接而九呼過經四寸手三陰接
而七呼過經五寸足之三陽接而一十四呼過經四
寸足之三陰接而一十二呼過經五寸重者倍之吸

亦同數此接氣通經呼吸長短之法也

灸分陰陽上下多少

凡灸當先陽後陰言後頭向左而漸下次後後頭向右而漸下先上后下明堂云先灸于上后灸于下先灸于少便灸于多皆宜審之 王執中

針灸須藥

千金云病有須針者即針刺以補瀉之不宜針者直灸之然灸之大法其孔穴與針無忌即下白針或溫針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針灸並施而不針非良醫也針灸而藥之而不

針灸亦非良醫也但眼下里間知針者少尔所以孝者須解用針燭針曰針皆須妙解知針知藥固是良醫此言針灸與藥之相須也今人或但知針而不灸知灸而不針或惟用藥而不知針灸者皆死孫真人所戒也今世所謂醫者則但知有藥而已針灸則未嘗過而問焉人或告之則曰是外科也業貴精不貴雜也否則曰富貴之家未必肯針灸也皆自艾其過耳吾故詳言之以示人云

避人神說

千金云欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁

忌相應即可故男忌除女忌破男忌戊女忌己有日
神忌有每月忌有十二時忌有四季人神有十二部
人神又有所謂血支血忌之類凡医者不能知此避
忌若逢病人危會男女氣怯下手至困通神達士豈
拘此哉若遇急卒暴患不拘此法許希亦云若病猝
暴宜急灸療亦不拘此一日之間止忌一時是也
又云瘧疽疔腫喉痺容忤尤為急凡作湯藥不可避
凶日竟病須臾即宜便治又云凡人卒暴得風或中
時氣凡百所苦須急灸治若久後必皆難治論最確
夫急難之際命在須臾若必待吉日后治已淪于鬼
錄此所以不可拘避忌也惟平居治病于未形擇天
德月德等日服藥針灸可也

論灸

灸有補瀉不可輕議大率沉結寒冷之度施之為宜蓋
陰寒濕氣凝留血脈湯割熨引不能獨治方是時惟
火艾足以灼其勢豈非火能陽氣運行偏逢陰邪其
効有速于藥石者即老壯不同強弱異稟灼治之法
夫豈一端故多有踰于數百壯少或止于三五七九
之數要皆詳審而行之若夫陽病灸之則為火逆是
以論傷寒者謂微數之脈既汗之後脈浮熱甚三者

悉不可灸惟少陰背惡寒吐利脈不足與夫脈從手足厥陰之類三者為可灸焉通明乎此融類以往又有灸燭之妄也故曰不瀆灸而強與之灸者令人火邪入腹于錯五臟重其煩躁瀆灸而不與之灸者使冷結重凝久而弥固氣上冲心無他可消散可不鑒哉

論刺

其病掌病其治宜微錚形樂志若病生子脈治以灸刺明九針之用經絡補瀉之法也故榮衛異刺以分血氣之虛實并榮異刺以分五行之子母募俞異刺以分背腹之陰陽春夏異刺以分人氣之淺深大抵慮補實瀉無過不及之傷以輔其平者刺法之大要也然有病勢未深可刺而即愈者所謂病之始起可刺而已或痺不仁腫痛可灸刺而去之是也有病傳諸經必上下俱刺者所謂刺熱瘧病或為法五十九刺是也然刺之為言同于擊刺之刺以為利也害在其也黃帝謂徐人安靜手巧而心審題老可使行針灸張杅謂針能殺生人不能死人只以用之不可不慎也况九針異俸取病有殊十二節異法用有輕重必明日月星辰四時八正之在天寒暑燥濕經水盈虛

虛之在天肥瘠壯弱虛實盛衰之在人然后呼吸補
瀉出入迎隨惟意之從豈特知募俞部分皮肉筋骸
飢飽勞逸而已哉故曰見微得過用之不殆

論砭石

上古針法垂布于天下制砭石有大小者乃隨病所宜
用石代針一曰針石二曰砭石三曰鑿石其實一也
破堅決肉砭則腫熱者則決之以砭石良久邪氣暴
戾則微針不能及况又病有氣虛盛實逆于肉理畜
結腫癰之類非砭石則不能射之此所謂四實宜法
之人形樂志樂病生于內者治之以砭石東方之民

多病癰瘍其治宜砭石砭石之采始自于此扁鵲有
云病在血脉者治之砭石是故一切腫疾悉宜鑿割
足小指下橫紋間腫在左則割左在右則割右血少
出則塗以至疔腫癰瘍耳毒瘰癧代指痛病氣痛流
腫之病皆宜出血者急以砭石砭之夫砭石之用
其法必焉若在久時人氣閉塞則用藥而少針石而
謂少針石者非癰疽之謂也癰疽不得頃時回苟緩
于針石則毒氣內攻腐壞筋骨穿通臟腑矣治石疔
瘡則忌瓦礫磚石之類治刀鑷疔瘡則忌鉄刃湯割
若是者可以藥治也素問人曰人病頸癰或石治之

或針灸治之而皆治此蓋同病異治也夫癰疽之氣
息者宜針開除去之氣盛血聚者宜石而瀉之若然
則砭石九針之用各有所利善治血脈之變癰腫之
病者當審輕重而割之自玉批中下俱聖者摠錄

色診

洛陽孫伯英因誣獄妻于被係逃于故人是夜竟胃腸
疼死故人求藥故人曰有名醫張戴人在烏当与公
同往時戴人隔窓望見伯英曰此公伏大驚恐故人
曰何以知之戴人曰面青脫色胆受怖也後公赦乃
出方告戴人 臨門筆記

華佗傳靈濟嚴昕与数人共候佗適至佗謂昕曰君身
中佳否昕曰自如常佗曰君有急病見于面莫多飲
酒坐車歸行数里昕猝頭眩墮車人扶将还戴歸家
中宿死 三因志

有士人病顏面青而光其氣哽。錢乙曰肝乘肺此逆候也若秋得之可治今春不可治其家哀求強之與藥約明日曰吾藥再瀉肝而不少却三補肺而益虛又加唇白法當三日死然安穀者可過期不安穀者決不及期今雖尚能粥飲無益也至五日果絕 宋史

亦仿僖公傳

汪石山曰伏經脈最難求如積熱之久脈反沈細而外忘久寒苟非兼望聞問切何可得也世俗諱言試醫醫後諱情妄臆而豪貴嬪女汪之不得望問豈不大錯吾願今人克知變通慎勿當生死之關而泥于豪

貴俗氣悞人不少



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十一

錢唐魏之琇王橫輯 男弒編次

經水

王氏云一媼人有女年十五請診言女十四時歲經水自下乃忽斷其母甚思佈師曰此女為是夫人親女非人若親女者當相為說之媼人曰答言是自女耳師曰所以問者無他夫人年十四時亦以經水下所以女至此而斷是為避年勿怪

東垣十書

張子和曰一媼人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來咳嗽潮熱痛醫禁無物可食一日當暑出門忽見賣

涼粉者以冰水和飲大為一食頃竟神清數日而月水下

滑伯仁治龍君澤室人暑月中病經事沈滯寒熱自汗咳嗽有瘦体瘦瘁臍腹刺疼脉弦數六至有餘曰此二陽病也素問云二陽之病發心脾女子得之則不月二陽、明也陽明為經金為燄化今其所以不月者因其所遭也陽明本為燥金遭于暑、火也以火燥金則愈燥血者水類金為化源宜月水沈滯不來他醫方製歸茸桂附丸以溫經而未進滑曰夫人血得寒則止得溫則行得熱則燔、則燥復加燥藥

血益乾則病必甚急令却之更以當歸柴胡飲子為之清陽瀉火流溫潤燥三五進而經通餘病悉除龍君曰微生凡為人悞

薛立齋診一室女年十七歷久不愈天癸未通發熱咳嗽飲食少思欲用通經丸薛曰此蓋因稟氣不足陰血未充故耳但養氣血益津液其經自行彼惑于速効仍用之薛曰非其治也此乃慄悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛后果經血妄行遂致不起

一婦人經行腹疼食則嘔吐肢体倦怠發熱作渴此乃

素稟氣血不足用八珍湯二十餘劑而安后生二子
二年而經不行前症仍作服八珍湯逍遙散百餘劑
方愈

一 嬾經行脘腹疼用桂桃湯而愈

一 嬾人素有界火或用清胃散而安后因勞役膝渴內
熱肌肉消瘦月水不行薛謂此胃經火燥陰血用道
遙散加丹皮艸卮以清胃氣用八珍湯加茯苓遠志
而經行

一 癡嬾少寐經水兩月餘一至誤服逍經丸遂致不寐
午前惡寒午后發熱薛以為思慮虧損脾上用歸脾

湯作丸午前以六君子送下午後以逍遙散送下兩
月經行如期半年瘡愈

龔子才治魏憲副妾患逆經吐血不止六脉微瀉有力
此血虛火盛也以四物去熟地用生地共一兩加酒
薰大黃一錢錢刊本作四錢誤全煎入童便服之服后血止
而經通

徐憲副妾患經閉人皆疑有孕七八月來漸覓黃瘦腹
中左右有塊如鼓發熱面赤不思飲食診之六脉微
澁此血枯氣鬱也以四物湯加香附丹皮白朮之類
白朮何十數服又加桃仁紅花數服下血塊多許乃

愈

孫文垣治吳北海內人每月經期之前四肢壘：發塊

紅紫脹疼不思飲食胃腕亦常疼肝火經水多不逆

期而至肝火下迫脉之兩手皆駛以疝忝現肝脾二經鬱

火也蓋肝主怒脾主思多思多怒隱而不發鬱滯于

中故臨經壘：發紅腫于四肢也脾主四肢以青皮香附

柴胡川芎烏藥白芍丹參元胡索鬱金酒炒黃連卮

子治之而愈青皮烏藥宜配用

潘氏媳因經水不行醫投安胎之劑越七日經忽暴至

內有血塊經膜如年大者一二桶昏胃困憊其脉右

關洪滑左寸洪數兩尺皆洪大夜分咬牙亂語狀如

血手心熱口噤時手足皆冷心胸脹悶不快面色青

孫曰此濁度流注血海以悞服安胎之劑益加其滯

由血去多故神魂無依痰迷心竅故神昏亂語急為

調氣開痰安神養血可生也即以溫胆湯加石菖蒲

酒苓天麻杏仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語皆

減半仍与前藥每貼加竹茹五錢臨睡又与黑虎丹

數粒諸症悉愈或問病每感于夜半何也曰此心色

絡与胆經有痰熱故也當治此內經痰既消神魂自

安矣

程好吾子媼腹中微疼經行不暢喉疼四肢麻木作战
不知飢餓孫診之右脉洪大如駛豆以川芎香附麥
芽山查烏梅甘州桔梗酒苓防風荆芥白朮茯苓四
劑而安次日經水大行十日不止以黃芪阿膠蒲黃
各一錢白芍二錢甘州三分一帖而安此后但覺渾
氣下墜尻後子戶中出即陰以補中益氣湯加酒連
吹病調安

胡氏女及笄后患吐血每吐碗餘下午倦急夜分潮熱
嘔惡不食便秘時師謂陰虛火動投滋陰之劑反加
飽悶背心脹疼脉之兩寸洪大兩尺弱知其有瘀血

凝滯致新血不得歸經故滿而倒溢也俗名倒經
又名逆經先

以老葵丸通之更以石羔三錢橘紅半夏曲黃連苗
根竹茹枳殼各一錢茯苓半錢甘州三分服后大便
行三次吐止食進后用二陳湯加滑石丹參丹皮茜
根白芍香附二十帖經調而愈此吐血亦經逆也與
子才治逆經副委一

案參

喻嘉言治楊季登長女及笄經閉年餘發熱食少肌削
多汗而成勞怯醫見汗多誤謂虛也投以參朮更甚
喻脉時見汗出如蒸籠氣水謂曰此症可治處全在
有汗蓋經血內閉止有從皮毛透出一路以汗亦血

經水

五

也設無汗而血不流則皮毛乾槁而死矣

當云榮衛通固宜

用極若之為以飲其血入內俾通于冲脉則熱自退
經行而汗自止非補藥所能效也以龍荅丸日進三
次 餘經略至汗熱稍輕今前九日進一次又一月
經大至淋漓五日諸症悉痊

王肯堂治一婦寡居鬱結成疾經事不行俸熱如炙忽

吐血若泉涌或用止血藥不效今以荊根搗汁濃磨

沈香服至五錢許此以醱醋貯瓶水

作

內火上炙熱氣

薰兩鼻孔血始得降下吐血不復作經事乃行

此亦逆經

忘續醫說

呂東莊治曹遠思內人月水不至四月矣腹疼不止飲

食不進醫作胎火治呂曰此鬱血也然氣稟怯弱當

補而行之用八珍湯三大劑果下血塊升許腹疼猶

未除也以大劑養榮等藥調理而疼安

與立高素有胃人一紫略

同

黃復素曰予媳申氏多鬱怒忽患不月腹漸大疑有妊

醫者視之亦以為妊也十餘月弗產諸症漸見乃始

疑之醫者亦以為下血之症

下字疑

時有欲下之者衆

議以体弱恐不勝但可暗消因久用行血調血之劑

而不敢用下血之藥竟勿效

惟景岳決津煎為合此症

厥后醫藥

襍投遂致不起日間偶閱震澤紀聞載盛啟東治東

宮妃一案大為悔悼

案載江董南名
醫類案

南山嬪人年三十八于九月廿三日月經行比前過后

十日復艸葯以敗血海為下胎之謀有數滴血下因

此腹痛在小腹下有塊如椀大不可按湯熨則疼稍

定大小便抽疼小便澀大便畧下少赤積垢食不進

口畧渴發熱此胃氣為艸葯所敗加以受傷之血妄

行而不得洩所以為病砂仁甘艸川芎黃芩各三錢

滑石一錢五分牛膝二錢桃仁七錢

錢作
水酒煎服

醫李綱曰

黃師文治子才婢子得面熱病每一面熱至赤且痒悶

絕曰此經水來時嘗為火所偏也問之曰無之已而

思曰昨者月水來適為孺人結衣服偃倮曝日中其

昏如烈火灸以孺人趣其物不敢已由是面遂熱黃

曰是也以四物加防風而痊 北胞炎輟

孫文垣治一婦經不行者三月大便瀉腹脹噎雜吐酸

水時下白帶常思心自謂有孕脉之曰此脾經有濕

熱 經有瘀血也與二陳湯加白朮澤瀉猪苓酒連

茶萸滑石麥芽山查瀉止腹寬經行腰腹作疼以川

芎三錢當歸五錢香附丹參桃仁各一錢服之口中

吐黑血甚多且有如膿者改用四物湯加丹皮丹參
桃仁紅花滑石調安

從孫娟程氏年方三旬產五次今則經閉不行已八年
肉則豐肥于昔飲食又倍于昔精采則艷美于昔腹
柔不堅畧無所謂病者或用四物湯元胡丹皮之劑
十餘服矣至三稜義朮乳漆桃仁蘇木之類遍嘗皆
不應診之六脉緩大有力曰此痺濕生痰脂滿子宮
用活血破血元益也以平胃散加滑石桃仁黃連姜
黃丹參南星半夏作丸服之半年而經行次年生子
後又生一子一女

薛立齋治一嬾人性善怒發熱經水非過期則不及按
脉体倦怠飲食少思而顫振此脾氣不足肝經血少
而火盛也午前以調中益氣湯加茯苓貝母送六味
凡午后以逍遙散送六味丸兩月方全安凡嬾人經
病皆由于
肝脾二臟而肝藏痰病為
多惟立齋能深知此理

一嬾人年甫五十內熱晡熱經水兩三月一至此血虛
有熱用逍遙散加山茱萸治之而安后有疾作渴或
小便不利或頭暈白帶用六味丸而安

琇按五十之年經宜止矣此不當在經水血虛之
門或五字乃四字之誤耳

一婦人月經不調，哺熱內熱，飲食少，思肌，體消瘦，小便頻數，或用清熱生血之劑，月經不行，四肢浮腫，小便淋瀝，朝用金匱加減腎氣丸，夕用歸脾湯，兩月而全安。

陸養愚治董危山夫人，胸膈不舒，大便不寔，或時去血，或時去積，經期或先或后，或多或少，參差亦疼，養血健脾，俱不効，飲食既少，肌肉亦瘦，晚不能食，則飽脹不能安卧，脈之沈弦而滑，右關尤甚，曰沈為氣滯，弦為晉飲，滑為痰凝，經之不調，便之不寔，腹之脹疼，皆瘦積為之也。乃合清氣化痰丸，二陳湯，送下數劑。

大便去痰積若干，遂不服，不疼，改用六君子湯，數劑而大便堅，後以調氣養榮湯，間服，經調而孕。

中另有一案亦陸氏

董嬭似癡痞門

施鳳岡室人素嗜五辛，三孕皆不育，年三十即月事不行，將及三年，胸腹作疼，行走無定，或數日一發，或一日二三發，服養血行血之藥，身體微熱，肌膚消瘦，或謂補血不補氣，無陽則獨陰不生，用參芪白朮肉桂芎歸，數劑，瘦中見紅，便燥，魚血脈之，兩手平按皆數，左關散而弦，右關數而寔，兩尺數而沈，澁曰此血虛，不待言然，脈症皆大家也，惟清其熱，則血得所養而

經自行矣或謂寒則凝熱則行今以清火療血閉何也曰寒疑熱行者蓋謂无火病者言之也經不云乎二陽之病發心脾有不得隱曲女子不日其傳為風消傳為息賁者死王太僕曰二陽胃與大腸也二經有熱心脾受之以致消肌灼肉上氣喘逆今病者素嗜辛辣豈非腸胃有熱乎今已移之心脾月久不行肌肉消削是傳為風消幸不喘咳未至息賁耳復投溫熱是抱薪救火經所謂贊其復翼其勝也法當先清腸胃積熱使心氣不降續以養血滋陰濟之則水泉通而流不絕也用三黃湯加山梔丹皮生地白芍

十劑瘦紅便血俱減更以前方加芎歸十劑而月水通矣后以六味丸料加知柏紫河車一其服之即有孕

陸祖愚治吳君采內平日血虛有火生一女已七歲不再孕忽經候兩月不行以為孕也偶胸腹不快投安胎養血之劑反少腹作疼經行如崩去血多而疼不止足膝逆冷氣短奄奄或以為小產用芎歸元胡姜桂等血不止而疼愈甚咽喉燥疼各吐有妨脈之沈細而寔按之有力用燥連白芍丹皮花粉當歸炒梔查肉阿膠煎令徐吞下次早喉腹之疼俱減足膝

反溫暖后用歸芍參苓地黄丹而安

韓延年夫人患少腹痛繞 前后疼尤甚晡時身熱如火內科治之不効疑癰腫症延外科診治謂脈細澀且不時昏暈宜用人參培補元氣未必成毒陸脈之左弦濡而弱右弦數而微月事數次不行此似阻而欲大行之候所以作疼然脈微弱如此不可攻宜用養氣以揖血而于補養之中佐行瘀之品庶免其排山倒海之勢用熟地物合參芪丹皮紅花查肉二劑病勢少減數日后血果大下昏暈片時即醒血去后熱退更以養榮湯而安

吳清源女善文詞性聰慧以嫁壻不如意憂思熾居常反目三年后患經閉不行已數月矣或与行血不効又投養血亦不効近則飲食入口即心腹作疼不可忍夕吐尺方止平時亦嘔酸水數十日間飲食出多人少或投二陳正氣等湯嘔吐遂無已時脈之六部沈數按之則駛氣喘汗微曰此元氣不足虛陽浮越之候也用生脉散濃煎徐徐呷之一二日吐少止后与調胃養榮湯半年經行受孕

陳三農治一媼經行后作疼用八珍湯加杜仲一錢元胡索香附各五分服愈

一婦經行作脹作疼行后又脹又疼如是二三年矣大便燥小便微疼微噎肝脉弦滑餘皆沈細而緩弦乃脾土不足滑乃脾有濕疫乃脾虛濕不流也用參苓白朮散加松花木香而愈

一婦經后凝血成塊在左泄瀉不止完穀不化血塊暴下如注臭不可堪經候不調脾胃因而下損且經漏不止前陰之氣血已脫泄瀉不止后陰之氣血下陷總是熱症而下焦久脫亦化于寒矣瀉寒以熱瀉濕以燥宜大升大韋以助肝木生發升長遂以柴胡升麻各五分炙州陳皮歸身黃芪各一錢人參神曲各

半白朮二錢黃芩少許水煎服愈

一婦經水不調未來先疼行后又疼用人參炙州川芎肉桂丹皮酒洗各五錢白朮茯苓各一兩半當歸酒洗白芍酒炒益母州酒洗蜜拌各一兩白芷木香各三錢糊丸

一婦經前作疼且有白帶用十全大補湯加元胡索益母州木香而安 以上俱大送

張路玉治薛氏婦每經行必先作瀉二三日其脉左關尺弦細如絲右關上小而駛滑服姜桂萸附則大渴泄瀉轉甚服苓澤車前則日暗如育此肝血虛寒而

脾胃有伏火也俟經將行作瀉時朝用理中加黃連作湯服五六劑暮與加減八味丸加紫石英作丸常服不終劑而安

立齋治一婦人晡熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半年矣或用順氣清熱止血等劑不應更加寒熱且時欲作嘔此為鬱損作虧傷脾胃虛火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣夕用六味地黃丸兩月安

一婦人素恬靜晡熱內熱月經不調后每一二月或齒縫或舌下或咽間出血梳許此亦逆經也如此年餘服清

熱涼血調理之為益甚此脾肝氣血鬱熱行先用加味歸脾湯后用加味道遙散揖血歸源而經自調前症搗愈

陳自明治一婦人月經過期不止腹內作痛脹破血行氣之劑不効與神仙追毒丸一粒服愈方見靈門

立齋治一婦人因經水多服瀉藥止之致腹作疼服失笑散一劑而痊五炙脂蒲黃俱炒等分每服二三錢醋一合熬成羹入水一碗煎七分食前熱服又用加味道遙而安

一婦人經水不調兩月一至或三月一至四肢微腫飲

食少思日晡發熱此脾土氣血皆虛也須先用壯脾胃養氣血之劑飲食進則浮腫自消氣血充則經自調矣彼以為緩乃用峻劑先通月經果腹疼瀉不止致遍身浮腫飲食愈少致于木旺之月褚氏云月水不通久則血結于内生塊變為血癥亦作血癥血水相併壅塞不通脾胃虛弱變為水腫所以然者脾侯身之肌肉象于土；王尅于水；血既併脾氣裡弱不能剋消致水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也現此豈宜用剋伐之劑

有女人月事退出皆作禽獸之形欲求傷人先將棉塞

陰戶乃頓服沒藥末一兩即愈 奇疾方

朱丹溪治一婦人積痰傷經不行夜則詭妄以瓜蒌子

一錢黃連半錢吳茱萸十粒栝仁五个紅曲末些少

砂仁三錢山查一錢為末生姜研炊餅丸 治法

一婦人陰虛經脈久不通小便短澀身體疼痛以四物

湯加蒼朮牛膝陳皮生甘艸又用蒼砂丸加蒼耳酒

芍為丸前湯下 全七

一婦人兩月經不行腹疼發熱但行血涼血經行自愈

用四物加黃芩紅花桃仁香附元胡索

一婦人寡居經事久不行腹滿少食小腹時痛形弱身

热当歸酒浸熟地姜炒香附各一錢白芍川芎陳皮各七分黃柏

炒知母炒厚朴製元胡索五分白朮二錢生甘艸大腹

皮各三錢紅花酒浸桃仁五枚右咬咀水煎全上

陳良甫治羅安人每遇經行時則暗与小腹下疼不可

忍服藥無効以桂枝桃仁湯愈自后再發一投而痊

杜枝白芍生地黃各三錢桃仁七枚去皮共甘艸一

錢姜水煎全上

立愈治一婦人性沈多慮月經不行胸滿少食減作脹

或吞酸以為中虛寒用補中益氣加砂仁香附煨姜

二劑胸膈和而飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗

生薑大棗數劑脾胃健而經自調

一婦人因怒傷不思飲食發熱倦怠骨內痠疼羸瘦面

黃經水清漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之

少可彼自悞服水蛭等藥血氣愈虛遂致不起良甫

云憂愁思慮則傷心傷則血熱竭血逆竭則神色

先散而月水閉火既受病不能榮養其子故不嗜飲

子虛則金氣虧故發咳既作水氣絕故四肢軀木

氣不充又云經候微少漸不通手足骨內煩疼日

漸瘦潮熱其脉微數此由氣虛血弱陽往來之少水

不能滅盛火故火逼水涸生津液當養血益陰用柏

子凡淫藺湯為主勿遽通之

錢國賓曰吳江黃起元妻劉氏生子潔淨自十七行經
每年一度生二子一女又武陵陳氏媳每季行經一
次七年方受二胎生二子二女皆嘗診治之夫此稟
賦之異非按月而行也

徐孟陽母叶氏八九經仍不斷体厚無病然甚憂之以
問錢：曰經云陰生于陽：之數七故媼人七：經
斷無子女母稟厚之極經出理之外矣后壽至九：
而終

錢國賓云余游蘭溪時逢端陽友人冥于花園設及邑

中篋匠孫二之妻年三十生四子一女自來無經予
以戲言未信適媼貨藍至客皆笑曰此媼是也予即
問之媼云不知經為何物夫媼人經候經者常也候
者候一月之陰陽也若潮候應乎時天真氣与流通
所以女子二七天於至月：水如斯凡媼人受孕經
止者平日所主氣血以養体積而為經血熱則經早
血少則經遲氣盛則七：乃經血衰則五七外經止
受孕所生氣血以養胎：生血上為乳：止血下為
經元門探真返經為乳而說則經乳一耳經本于腎
旺于冲任二脉冲為血海任為胞胎此媼無經者乃

冲脉血海与人禀赋不全任脉与人全故乳子生子
則一樣素問曰人之心偏則作事不定人之下眼睡
窄則胆小五臟各有禀賦外候以此理推矣

蔣仲芳治姚生嬀年二十五其月事或半年或三月方
得一至温經補益調治二年尤甚診之血未微溢外
症口乾唇燥手足心热日后期古法主寒然其兼症
热也因热耗血少故后期耳遂用大剂生地当歸
為主佐以條芩山巵白芍川芎丹皮澤蘭知母蟹甲
六剂后則經准而孕

經水

徐德滋女年近二十素有脇疼肝病常時月事先期而
至近忽逾數日脉之兩關燥疾而寸上溢察其面有
如疹者數十點其色或青或紫詢其身亦有舌上亦
有數點絕類陽明寔热症然並無頭疼寒热且能進
飯二甌良由肝火内熾上乘肺胃而然与生地杞子
麦冬丹皮山后当歸生芍甘州元參合服一剂次日
晡後始至見其偃卧上半俯著床沿嘔血盈許詢之
則自己脾血出如涌既而上下若有一塊上攻故必
偃伏以床沿抵住稍可否則上頂悶絕脉之若有若

無意其經水過期乘肝火上逆而出即俗名倒經是也然其急暴如此煎之地氣上攻其症危矣非大劑純陰可以挽回與熟地二兩杞子一兩令連進二服服下即能仰臥血止脈四次日忽咳嗽無痰此肺金燥而肝木未平也前方減半加麥冬沙參萸仁生地八劑而愈：后面上之疹乃消舌上之疹褪下如荳靨云又頤卜周内人失血奄：垂斃亦以前葯數劑而安

范氏女年及笄矣忽病夜臥小便自遺晨起昏：如醉神氣與人了不相當晡后漸清爽皮膚癢疹胸膈迷悶食亦少初起竟咽疼頭暈已十餘日矣診之脈弦小而數此屬血虛火盛詢其天癸云何則自前月火行去血甚多至七日乃已謂肝木過盛尅脾海胃乘肺而然尅脾則脾不攝血故經水去多侮胃則胃之終溢故脹悶食減乘肺則肺熱故癢疹咽疼又肝藏魂肺藏魄二臟不和是以小便自遺而神氣昏昧也與生地杞子羚羊角黑山梔麥冬萸仁黃連丹皮沙參牛黃之屬出入加減六帖而安后經水數月不行則已前者去血過多也仍用杞地歸芍丹皮麥冬加紅花八劑而安

熱入血室

孫文垣治呂氏媼胸脇大腹作疼詰語如狂寅卯辰三

時稍輕午后及夜疼甚病在血分原有疫火頭痛牙疼之

疾又因經行三日後頭疼發熱寒暄以瘧治因大惡

熱三四入交肩之以兩手浸冷水中口含水而不嚥

鼻有微血此在經路又常自悲自哭狂如痛時欲奔竄劇則

咬人此小水直下不固此肝喉哽吞藥不下脈之左

脈數右關洪滑曰此熱入血室也悞服治瘧剛燥之

劑擾動痰火以致標本交作其胸脇痛者病屬少陰

陽也劇則咬人者虫行求食而不得故喉中哽然

也。以小柴胡湯加枳仁丹皮少安。詰在少減。次日与安虵湯疼止。

元素姪嬭春温后經水適至餘熱不退口中甚渴胸脇痛而耳重少陽脉左弦數右滑大而數小柴胡加石膏

知母桔更枳壳葛根瓜蒌半夏曲服下熱渴如故改

用柴胡二錢人參甘艸天花粉黃芩小柴胡湯去半夏加天花粉以

血家忌白芍紅花當歸丹皮知母各八分調理而痊

半夏也 此亦無詰妄發狂然以涼解不應必用諸血為乃應剛仍是熱入血室矣

朱氏嬭經行一月不止母黃昏先寒後熱遍身疼痛胸脇脹悶必得大喊叫嘶用手探吐痰涎乃寬且渴甚

此疫飲瘧疾今飲食不進夜如見鬼者乃熱入血室

也用小柴胡加生地丹皮枳仁兩帖后以白朮三錢

首烏二錢陳皮麦芽各一錢烏梅一個姜三片水煎

服之寒熱而止

繆仲淳治張璇浦內人患熱入血室發狂欲殺人醫以

傷寒治之煎葯未服邀繆注繆曰悞矣覆其葯投一

劑而安先与童便心主血熱邪從血分上乘于心故發狂先与童便引熱下行最為元

解解繼与凉血行血安心神葯遂安

陸養愚治臧堯山夫人向有頭風症八月間患腹疼日

輕夜重疼作昏措語言不倫唇口燥裂而不欲湯飲

已十日或投香燥行氣益甚身熱如火飢不能食脈
之沉數而弦詢之通經行時感冒身發熱寒頭大疼
卒日服川芎茶調散今服之頭疼少止而身熱更甚
遂變為腹痛再問經行如常否謂此卒素竟住快曰
此必熱入血室也或語此傷寒症乎曰豈必傷寒而
后熱入血室哉凡病未有無客熱者况初得之感冒
因頭疼而以茶調散過之熱無從洩遇經行血室空
虛熱乘虛而入因以成瘀血瘀下焦飲食不進而作
痛亦勢使然也用小柴胡以清其熱丹皮紅花桃仁
以去瘀人參麥冬生津止渴兩劑神清疼減能食日
服二劑兩日后送化字凡一錢大便如硬血數塊疼
全痊減桃仁紅花加歸芍而安

薛立齋治一婦人多怒手背患瘡出血至夜發熱妄語
服清心涼血藥不應乃熱入血室而然也遂以加味
小柴胡湯二劑而安

崩漏 白帶 交腸 求子 妊娠 胎動
子懸 轉脬 胎墮 胎死 異胎 鬼胎

續名醫類案 卷三十二



續名醫類聚卷三十

錢唐沈之誥王橫輯男斌編次

崩漏

薛立齋治一婦人性急每怒并大陽耳頭齒喉咽乳作
疼則胸滿吐瀉少食吞酸經行不止此皆肝火之危
肝日病則外症見土受剋則內症作先以回物加白
朮茯苓柴胡炒芍炒龍胆清肝養血次用四君加柴
胡白芍神曲茯苓炒黃連以培土制肝漸愈惟月
經不止是血分有熱脾氣尚虛以蓮蓬散倍苓朮陳
皮入以補中益氣加酒芍全安

一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少瘦涎上涌月水頻數薛曰脾統血而主涎此鬱怒傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣湯生歸脾而安

一婦人血崩兼心疼三年矣諸藥不應每疼甚虛症悉具面色痿黃薛曰心主血蓋由去血太多心無所養以致作疼宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑少安百劑全痊

大尹王天成之內人患崩自服四物涼血之劑或作或輟因怒發熱其血不止或服煎藥不應乃主降火更加脇腹疼手足俱冷薛曰此脾胃虛寒所致先用附

子理中湯俾熱疼止又用濟生歸脾補中益氣二湯全安

錦衣楊永具之內患血崩過服寒涼之劑其症益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱煩躁脈洪大而虛薛曰此脾經氣血虛而發躁也當急用八珍湯加炮姜以溫補之緩則不效不信仍服止血除火之劑虛症蜂起遂不效

一婦人因怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木制脾土而血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸脾補中二湯益脾氣生肝血而痊此症若因肝經風

熱而血不寧者防風為凡以煎症之藥煎送或肝經
火動而血不寧者炒條芩為凡以煎症之藥煎送若
瘀血為患用五靈脂為末燒鐵器淬酒調服無不効
者

周暉內人病血山崩諸醫皆危之劉春參用當歸荆芥
各一兩水酒煎服續金匱遺事

易思蘭治一婦患崩日夜十餘次每次去血升許用止
血藥尤甚臥床月餘消瘦食少面青爪黑氣促痰喘
診之心脈平和肝脈弦大時一結肺脈沈而大且有
力脾胃脈沈澁而尺沈而無力曰此氣菹病也詢之

果因午飯小婢忤意發怒患疾隨以回神散与之服
為半盃未及一時頓見神爽易曰未也明日子時分
指甲變桃紅色方可抹至時甲色果紅也復活復診之

左三部如前肺脈微起脾胃雖沈緩而不澁二尺仍
田謂其家曰午前血當大止毋得驚惶以駭病者至
午果然下紫黑血塊數枚乙未生午二時肝氣得令邪不能容也自此

遂止後用壯真五和丸調理月餘乃安次年生子方
用回神散以香附行氣為君烏藥為臣蘇梗通十二
經之閉竅白芷化腐血生新血為佐加當歸引氣入
心而生新血撫芎引氣入腎舒肝之苑而去舊納新

神曲引氣入脾暢脾之結而統新血白朮健脾胃而
和中氣為使以行氣為主活血輔之此治血先調氣
之法也

吳季先治俞氏嬪血淋廿載已成痼疾因幼孫出痘危
險忽下血兩日夜不止汗瀉交作暈數次思慮恐懼
三陰並傷
也脈向弦大而革者忽變而數矣欲脫奄一息用
人參黃芪各一兩製附炮姜棗仁各三錢五味龍骨
各一錢或疑附子太熱且謂何不用血藥曰血脫補
氣古人精義謂有形之血不能速生凡微之氣所當
急固又脾胃氣血俱喜溫而惡寒姜附宜服也二劑

脈漸轉前方加芎歸等血藥症已除然脈氣未強非
三年調攝未易復也自後參芪不輟計服補劑六百
餘帖羔丸數料而起

一婦半月前小產繼以血崩舌硬心搖汗出髮潤日夜
俱熱耳閉不聞目視不見身浮如在舟中六脈細
數欲脫用人參二兩黃芪二兩白朮一兩熟地二兩
當歸五錢炮姜製附棗仁各三錢龍骨一錢五分二
劑全安

陸肖愚治王笠雲母年四十九月水已止半年一日忽
暴至不止昏暈厥逆脈之兩手沈微如絲急以八物

湯加附子姜炭煎灌之半時方醒連進二大劑乃止
十之七八至十劑六日方止後數月復崩亦昏暈或
以犀角地黄湯加藕節阿膠之屬不止脈仍沈弱以
附子乾姜鹿茸俱燒存性同釜底墨酒調服之即止
後以六味加四物服之約二斤一年不作次年八
月間又暴至昏暈更久脈之如旧仍以八物湯加附
子連進二劑昏暈自晡至晚未甦咸謂必死診之決
其必生蓋氣血暴脫一時補劑未能與胃氣相迎耳
或投以牛黃丸至半夜人事少省而血尚未止明早
陸診后仍對八物湯加姜附二劑或適至云昨夜之
甦乃牛黃丸之功公竟不知也向因屢服參附致屢
崩今人事既省漸宜順氣行瘀去其病今豈可復蹈
前轍曰昨早投大補之藥即不服牛黃丸亦甦此等
脈症急宜續投參芪少緩恐成不救况可更以他藥
乎或乃怫然而去曰讀父書而坑趙卒天下每多此
人陸令先服煎劑隨制存性附子等灰午後人事大
爽進粥晚投末藥一服夜間血少止明日又湯散並
投血止而安

立齋治一婦人飲食後因怒血至如涌四肢逆冷抽搐
口禁如發狂然吐痰如涌灌以二陳柴胡山梔只壳

吐出酸水神思少甦為止次日進稀粥少許但乳脇
脹疼此悉屬肝火太甚致脾氣不能運化先用六君
柴胡山梔勾藤諸症頓退惟四肢不遂血崩如初或
入以為肝火未息欲投清肝涼血之劑此肝脾氣血
俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經人用
回物參朮柴胡養肝而愈 异症名要

一婦人月水淋漓無期作鬱怒傷肝脾虛火動而血不
歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣與
歸脾逍遙二散調裝

一婦人因怒經水淋漓多年不止每怒其經即至甚則

口禁筋牽鼻衄頭疼按抽搦上視作肝火熾盛以小
柴胡加鈎連卮地而安

王執中治皮匠妾患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服
少減而未斷因檢得耆域方如聖散用椶櫚烏梅乾
姜各一兩並燒存五分研為末每服二錢食前烏梅
湯下一劑而疾卒甚者三劑 資生經

有巡捕之妻年踰五十因傷寒而血崩與膠艾回物湯
一服已止後因勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或
燒鹿角存性為末酒下亦効 全上

陳良甫治一婦人崩漏暴下諸醫投姜肉桂等藥服之

愈甚診之六脉緊數遂用金華散煎局方龍腦烏蘇
凡服安奉事方單用黃芩意同良方

一親戚嬪人年四十五經年病血崩不止面黃肢瘦髮
黃枯槁語言声瘖服諸藥無効診之六脉微濡問服
何藥云凡芎歸瀝血諸品服之皆不効遂合溥濟方
伏肝危散煎白凡凡治安全上

繆仲淳治黃龍山夫人患血崩由于中年鬱怒百藥不
効用大劑參芪令覓胎髮百餘凡火煨調入藥服久
之漸安煨髮用小砂罐盛泥煉極熱將髮入罐中封
固陰乾以炭火圍之俟黑烟將尽即起青烟出時髮

枯不可用矣非細心人不可任也

王肯堂曰徐朝奉傳其內人有血崩症服諸藥不効用

香附炒為末每二錢米飲下

一親戚黃正卿內子凌夫人忽若血崩百藥不効用五
灵脂一味不拘多少炒令烟尽研末每服一錢溫酒
下即安

蔣仲芳治毛氏女經水淋瀝不斷已經三月涼血止血
之藥服至五六十劑不効而口乾唇燥愈甚脉來微
澁詢其大便必瀉果然即以回君子湯加熟附炮姜
熟地血餘二劑而止蓋寒客于中火浮於上脾虛而

不揖血故淋瀝不已也

聶久吾嬪年三十九生子月內調養未善次年春其經
兩月餘不行一日忽暴至不止一二飯久即昏暈不
省人事急用十全大補湯去桂枝加參芪又加熟附
子炒乾姜各一錢灌之甦省後連二大劑遂止十之
七八又十餘日共服二十餘劑乃得全止次年春崩
又大作比前尤甚昏暈更久又服前方三十餘劑尚
未全安後用鹿茸炒燒存性研末酒下二錢服數次
而血止繼服峻補丸藥半年餘不發然病根卒除次
年中秋忽又暴至前方連服二大劑血流如水涌吐

冷痰至日晡昏暈初更而氣絕惟胸次微溫至三更
用灶心土研細水調灌一二酒杯冷痰少聞遂飲滾
湯一盞甦省漸安豈初發時服大補二劑能令生意
不絕即後又服峻補之劑而血止因思三年之內嘗
服峻補丸藥而病仍大作者何也或謂補血太過是
以積而成崩或謂不宜用附子等熱藥推動其血遂
至于崩此說極是備抑知土虛不固然後山崩今既
血崩則是血大虛且以氣相依附氣虛甚則降令多
升令少是以不能揖血致血不歸經而妄下不惟大
補血而尤當大補氣也前方雖峻補不合摻入香

附益母砂仁元胡等損氣之品乃今病根不除而屢
作也因純用補氣血藥一料而神氣爽健二料而病
根除次年遂孕而生第八兒矣

崩漏

劉氏媪年七十病血行如注年月事淋漓久之不斷而
月餘耳鳴心跳頭暈目眩惡食少眠奄奄就死醫者
不一有與歸脾補中者六味四物者十全八珍者諸
治未為無見然服歸脾補中則上高脹而面腫似不
宜于補氣服六味四物則少腹脹而足腫似不宜于
補血服十全八珍則中脘脹而氣急似氣血兼補又
不宜延診先告以不宜用補以症皆緣補而增也脉
之沈小而澁而關尤甚且無神曰此脾肺兩傷之候
也以七旬之年兩月之病非補何以能安第全之補

異乎人之補無慮也與熟地二兩以一兩炒炭杞子一兩白芍炒枣仁炒各五錢酒連三分四劑而淋瀝止去連回劑而腫脹消

姚氏婦早寡年三十餘因月事暴至遂崩漏不止勢甚猛脈之兩寸上溢兩尺甚弱據脈不可與補中益氣據症又不可不暫升提以挽其下陷之勢先與熟地杞子各一兩枣仁白芍各三錢作大劑煎服之果不應急以草麻仁十數粒去壳研細末入射香一分搜作餅子用綠雲羔貼臍上再服前藥血去少緩少頃再服藥遂竟血止不行即令揭去羔藥仍用前方出

入加減調半月始復全安

白帶

朱丹溪治陶遵外姑年七十形瘦善啜白帶食前姜湯
吞大補丸五十九丸一二次午膳后及臨卧時各与小
胃丹十五丸愈

胡安人白帶下月水甚多食少倦怠面黃經中如有血
塊者有如筋膜者与參朮等補血氣調脾胃後諸症
皆退惟帶未止以檗皮治之

薛立斋治一媼入帶下面肢無力薛曰四肢者土也此
脾胃虛弱濕痰下注以補中益氣濟生歸脾二藥治
愈

孫文垣治吳涌瀾母年六十餘久患白帶諸治不効變為白崩診得石寸滑左寸弱兩關濡而尺軟弱據脉心腎俱不足中焦有濕古云崩中日久為淋帶漏下多時腎亦枯令白物下多氣血日敗法當燥脾煎補心腎以既濟丹補其心腎以斷下丸燥中宮之濕則萬全矣

一僧治蔡大尹內人崩中赤白帶下用墓頭回一把酒水各半碗童便半杯新紅花一捻煎七分卧時溫服効董炳集驗方

一婦人小腹痞脹小便時下白帶小水淋瀝此肝經濕

熱下注以龍胆瀉肝湯而安

一女子赤帶腰疼以四君子加乾姜肉桂地榆而痊男子腰疼亦効

一婦人赤白濁腰疼四君子加當歸杜仲續斷乳姜地榆而愈

王海藏云李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨瘦著床日服紫菀凡五凡至十九凡十五凡取下膿血黃水二升內塊如卵者而安方見鶴門

王教授云有來覓赤白帶藥者予以鎮靈丹与之鎮靈丹能活血溫中故也以其神効故書于此但有孕不

可服耳若炎帶脉穴尤奇于此丹也 資生經

一婦人白帶兼痛風用苓半芎陳艸蒼朮浸黃柏浸

炒南星牛膝酒煎服全服

蕭萬興治龔氏妾年三十婉未百日恣啜生冷嘔吐臍

病痛白帶月餘行經衝任胃寒發熱煩渴赤帶下注

脉沈遲無力此內真寒而外假熱症也用四物二陳

加姜桂木香伍升麻凡而痊

一寡婦年三十時或增寒發熱通宵不寐時或經日昏

睡喃；独語遇勞肢倦厥冷每用姜葱解表致停

熱脾胃乘虛下注而患赤帶脉沈伏童便搏指童便二字

作重以為相火蘊結外假寒而內真熱用四物加連

庖苓母龍胆木通八劑全安

朱天培治一婦年四旬外苦于白帶朝夕常流不止已

十餘日矣外症頭暈腰疼診其脉細澀此肝腎陰虧

氣虛下陷所致

否則因循致成弱症矣以六味飲去萸肉澤瀉加牡

蠣龍骨川斷肉桂仲白芍鹿角膠而痊

一閩女年十五歲夏間患白帶月餘更兼腹疼診之六

脉供弦細而數按之中指下時一沈此屬脾氣下陷

肝藏濕熱為患用升柴苓半蒼白朮廣皮艸連柏而

安

交腸

男子亦有

張路玉治詹石道嬪產后五六日惡路不行腹脹喘滿
大便從前陰而出省其故予日好食烟酒所產之兒
身軟無骨因而驚駭遂患此症以芎歸湯加莪朮肉
桂炒壹一服惡路通而二便如常

陸聖祥之女方四歲新秋患血痢而稀糞出于前陰作
冷熱不調与五苓散服香蓮丸而愈

錢吉甫女年十三体肥瘦賦因隣家被盜發熱頭疼嘔
逆面青六脉弦促而便溺易位此因驚而氣亂痰聚
竅端所致也与四七湯下礞石滾痰丸開通痰氣而

安

喻嘉言治姜宜人得奇症簡本州經疏治交腸用五苓散之說以為神秘俞曰交腸一症大小二便易位而出若交易然古用五苓治之嵩為通前陰而設也若此症閉在後陰二便俱從前陰而出擬之交腸誠有似是而非者况交腸乃暴病驟然而氣亂于中此症乃久病以漸而血枯于內有毫厘千里之別原夫疾之所始：憂思傷脾：傷則不能通血而錯出下行有若崩漏寔名脫營宜大補急因乃悞以涼血清火為治脫出轉多于是乎陽明之血亦漸消亡今乃大

腸枯槁幽門驟閉飲食至此無庸分別遂清法併走前勢必大腸復通令透滓率由故道斯為得耳与五苓一方有何干涉况五苓一方人為亡血而深成乎向診時嘗問病中多哭泣否答曰時：泣下乃知臟燥者多泣大腸方廢而不用也交腸云乎哉今大腸之脉繫：而現于指可虞之時其承春東：叶生乎東：叶生而言果驗

按此乃是交腸症惟与
驟然氣亂者不同耳

透按治之：法宜集灵羔重用人參以補其肺而潤之盖肺与天腸相表裡而主氣又肺者相傳之官治節出焉肺得養斯大腸之燥可清人得枸杞

二冬以滋其失血之槁然後故道可復而清濁自
分矣

薛立齋治一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛
失行嘗道先用六君子湯二劑又用五苓散二劑而

痊

婦人良方作先用五苓散二劑
而痊人用補中益氣湯而安

沈明生治葉惟和室月夜探親其母留之食時春寒犹
峭歸途即覺肌粟慄二次早復當窓梳櫛重感于邪
元熱惡寒胸膈填滿一醫見其肌表元熱竟作食傷
大陰主治遽用大黃下之不特不更衣及致水道閉
澀元可异者白物腥穢如羔淋之狀後大腸來繇々

不絕漸致肌侷萎弱骨立難支診之脉沈而澀虛寒
可知計惟有溫中澀元之法然慮大便尚結小水未
行或增滿之患遂先用五苓散倍加肉桂一服而水
道果通再服而宿垢併下嗣用附子理中湯三四劑
後白物少止更以十全大補調理一月而安夫白淫
白沃載在靈蘭之典皆指前案中來今乃移之于後
何也蓋此病始終是一寒症初因食在胃腕之上大
衰不能熟腐而反下之大早則有形之物不能即降
而無形之物抑遏于闌門之剗際遂致清濁混淆涓
涓不息似淋瀝而寔非淋帶也令先以五苓分利陰

陽而倍肉桂使寒隨弱減上下宣通繼以理中之劑
撤其餘邪鼓其陽氣令脾土溫燥而決流有制宜其
效如桴鼓也

求子

建平孝王妃姬侍皆美無子璋良家未笄女入御入無
子問尚書褚登曰求男有道乎登對曰合男女必當
其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天
癸至必二十而嫁皆欲陰陽完寔然合交合別交而
孕；而育；而為子堅壯強壽今未笄之女天癸始
至已近男色陰氣早泄未完而傷未寔而動是以交
而不孕；而不育；而子脆不壽此王之所以無子
也然嬪人有兩產皆女者有兩產皆男者大王誠能
訪求多男嬪人媒至宮府有男之道也王曰善未再

期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

朱丹溪曰肥盛婦人不能孕育者以其身中脂膜閉塞子宮而致經事不行可用導痰湯之類瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故也可用回物湯養血養陰等藥余姪女形氣俱實以得子之遲服神仙聚室丹背上發癩疽症候甚危余診其脈散大而濇急以加減回物湯百餘帖補其陰血幸其質厚易于拯救質之薄者悔將何及

龍共子才治劉小亭年四十無子陽事痿弱精如冰冷求診兩寸脈洪兩尺脈微無力此真元衰敗乃斷喪過度所致以固本健陽丹加入參附子枸杞覆盆子各二兩製一料服盡覺下元溫暖如前又製一料服至半料而乃正果孕生一子后傳之于劉柏亭劉敏菴服之俱得子

汪石山治一婦人形肥色淡紫年才三十艱于育子脈之兩尺皆沈微法當補血以形言之肥人氣虛亦當補氣遂令多服八物湯仍以補陰凡加參芪空腹吞之三月餘有孕復為診之兩尺如旧以理論之孕不當有昔人云脈雜書憑殆此類歟

薛立斋治儒者钱思習子室年三十餘无子月水淋漓
无期夫始異處几年矣思習欲為娶妾以謀之薛
意此鬱怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏
脾不能攝也當清肝火補脾氣遂与加味歸脾道遙
二藥回劑送至其家仍告其姑曰服此當病愈而孕
妾可无娶也後果然

后妃不妒忌而百斯男独中山靖王飲酒好内生子百
十二人世稱全鹿凡為周文王所定嘗服之故生子
衆多豈中山靖王亦常服此凡者即何生子之多于
文王也張氏危言

馮楚瞻治金紹老晨瀉不已就診按其脉兩寸關俱沉
弱無力兩尺沈微更甚曰少年得此不惟難愈更恐
嗣育之間多女少男耳遂許其至亦索診其脉亦然
各道連生數女而無子余以八味去丹皮澤瀉加補
骨脂三兩兔絲子四兩五味子二兩早晚食前各服
五錢後各生子精要云久服多子信然

吳學先治蔡孝廉年已五旬苦乏子徧求種子方論云
十載無一効診得石尺神旺真火平自不衰惟五尺
虛弱乃真水乾涸也宜補陰配陽与六味地黃丸加
元武膠越二載果生一子

萬密齋曰嘗見男子陰痿者多致無子不可不慮也惟其求子之急易為庸醫之惑或以附子石床脂為內補或以蟾酥呵芙蓉為外助陽事未與內熱已作玉莖雖勁頑木无用以致終身無子或有夭歿者吾見此輩無辜而受醫為之害徧訪諸方無越此者出以示人名曰壯陽丹熟地黃四兩已戟去心破故紙炒各二兩仙靈脾一兩桑螵蛸真者鹽焙陽起石煨另飛各十兩上六味合陰之數研末蜜為丸如桐子大每三十丸空心酒下不可恃此自恣也

生地四兩熟地四兩天冬四兩麥冬四兩當歸二兩枸

杞一兩仙靈脾八兩碎絹袋盛浸大罈酒內隔湯煮後如至酒取出埋地下七日夫嬪日共飲五六杯嬪人經水不准者即准而受孕此方刻邕南臬仁文書院禁驗方中扶銀臺徐光祿俱云汪：有効因復記而筆之 李子曰華

吳橋治吳巨卿吳善誼諧故与橋習則以久不宜子請壯陽方橋診曰公寸脉洪浮尺中沈澁火爰而不降水涸而不升水火不交是未濟法宜滋陰補腎庶几相濟相生使復壯陽則火益爰而水益涸歎血嘔血將不可為危矣吳大笑曰吾五十而善飲強飯不异

丁年何病徒以陽痿精滑願得方藥壯之且吾料滋陰藥如奉漏卮無益橋曰技止此耳胡後遇邑人老而卒子者得壯陽方至留都急服之效而失声已復效血久之內削大洩浸勤則遣使逆橋謝不暇病深且告歸即召橋歎曰不用公言至此矣幸脈不數声不嗜骨不蒸血不效独大洩日三四行尔橋曰否夫數者嗜者蒸者效者則陽火未熄犹可鼓而行之今熄矣即爐鞴無及也無何而絕 太函集

妊娠

王顯字世榮文昭皇后之懷世宗也夢為日所逐化為龍而繞后之寤而驚悸遂成心疾文明太后勅召徐謩及王顯等為后診脉徐謩言是飛鳳入臟宜進湯藥及加針灸顯診云按三部非有心疾將是懷孕生男之兆後果如言 魏書

汪石山診一婦形長色紫妊五月矣求脉之以別男女汪曰脉右大于左脉訣云左大為男右大為女今脉右數當是女即彼則喜曰我男胎矣往歲有妊時尊甫先生診之亦謂石脉浮大當是女孕後生男令妊

又得是脉可知為男矣後果生男汪曰脉書但道其常莫能尽其變一至于此

張子和診一婦人年四十餘得孕自以為年衰多病故疾復作醫亦不察加熇針于兩腋旁又以毒藥攻磨轉之腹疼食減形瘦已在床枕張診其脉曰六脉皆平惟右尺洪大有力此孕脉也煎棗食為孕無疑左右皆笑之不數月生一女兩目下各有一針痕儿喪其明

鬪王之妻病暗下積塊噎食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無効張視之孕也其人不信再三求治

乃与之平蕪以應其意妙否則別求入終不肯下毒

蕪凡攻病之為後月到果胎也問何以別之曰尺脉洪

大也亦有尺脉微弱者素問陰陽別論所謂陰

搏陽別之脉

崑山周知縣景星家一婦病腹中塊疼嵩科診之曰氣積痰以流氣破積之劑又令人以湯餅抽其之不効聞有巫峯神廟頗靈往問之云此胎氣也勿用葯信之後果生一男南京戶部主事韓文光妻病腹中作疼按之若有物在臍下左右者遼浙中一名醫至京診之云是癥瘕服三稜蓬朮之劑旬餘竟更長亦以

其不効乃止後數月生二男此皆有命而然可不慎哉
客中問集

程世光治一有胎婦兒腹啼皆不治乃傾豆于地令婦
低頭拾之兒啼止
江南通志

萬密齋曰兒啼腹中此症臨月將產婦人有之師母錢
氏嘉靖戊子有娠九個月兒在腹中哭錢大驚令作
男子拜而止之過二十日生師兄邦孝也
師母以下似萬門人之語

李有懷妻高氏孕二十七月孝子亦長成
雲間雜志

朱丹溪曰懷孕愛物乃一臟之虛假如肝氣虛其肝氣

止能養胎無餘用也不能榮肝：虛故愛酸
治法

邢氏朱勝非婦偶小疾命視之曰小疾耳不藥亦痊然
不宜孕：必死其家以為狂言後一歲朱婦得男其
家方有抱孫之喜未弼月婦疾作急召之堅不肯來
曰去歲已言之不可治也頗果卒

妊娠胎不長

薛立齋治一婦妊胎六月倦癩食而黃晡熱而胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍參朮茯苓三十餘劑胃健而胎長矣

一妊婦因怒寒熱往來內熱晡熱脇疼嘔吐胎至八月不長此因肝脾鬱結所致用六君加柴芩枳桔紫蘇病愈而胎亦長

妊娠胎動

薛立齋治鴻臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢倦殊倦用八珍散二十餘劑已愈因勞加煩熱頭疼以大劑補中益氣湯加蔓荊子治之其疼頓止仍用前散又五十帖而安

一妊婦八月胎欲墜如產卧久稍安日晡益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯而安

一妊婦小腹作疼其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而安后因怒

小腹脹滿小水不利水道重墜胎仍不安此亦脾木
熾盛所致用龍胆瀉肝湯一劑諸症悉愈乃以四君
子加升柴而安

孫文垣治張溪亭子室妊已七月夢見亡過祖母揮拳
背打一下即覺胎動不安血已下大小便皆急腰与
小腹脹疼者五日診之兩尺俱短弱此上焦元氣大
虛當驟補之人參阿膠黃芪白朮各二錢當歸白芍
條芩杜仲各一錢砂仁香附各五分芩根嫩皮三錢
葱白六錢一劑而血止再服諸症悉除四帖后減去
葱白芩根調旬日乃安

吳孚先治孫氏嬪妊六月作瀉欲小產診之曰此水胎
也用四君加姜附而安

陳三農治一孕婦腰疼甚如欲小產用杜仲一兩姜汁
拌炒續斷一兩為凡白湯下愈

薛立齋治一嬪人八月胎下墜或動而黃俸倦飲食少思
此脾氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇根三十餘
劑而安產後眩暈胸滿欬嗽用四物加茯苓半夏桔
梗而安

一妊嬪內熱晡熱或煎寒熱飲食少思甚或下墜胎或
上攻此肝經血虛而火動耳先用加味道遙散數劑

次用六君加柴枳而安

一婦人每胎三四月作疼欲墜此為痛胎用當歸二錢
熟地黃三錢而安

妊娘子懸即胎上逆也 附子滿

薛立齋治一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃
肝火內動用小柴胡加茯苓山芩而愈但俸倦不食
用六君加柴枳調安

一妊婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫
蘇飲預安又用四君加柴胡芩枳全愈

孫文垣治費少垣乃室妊已九月瘦多喘嗽胎氣上逆
眼撐不起面太陽微疼此子懸危兼瘦火也以大紫
蘇飲為主才服一帖即不上逆胸膈頓寬惟咳喘不
止与七製化瘦丸而安

陸祖愚治梅養中子嬪孕七月其夫出外經商患胎上
冲心不時昏悶或与紫蘇安胎飲數劑不効脉之才
大于關、大于尺俱帶弦數此血虛極而火上炎之
故也用清氣養榮湯磨沉香四分牛黃二分煎就徐
灌之即甦

蔡元度寵人有孕夫人怒欲逐之遂病胸腹間氣刺滿
疼腸鳴嘔吐減食醫官王師復處香木散用義木煨
二錢丁香一錢甘艸三分共為細末分作三服空心
鹽湯調竟胸中有物推下之狀而愈

義木之
力乎

萬密齋廣嗣紀
要推下者其

萬密齋治徐太和之妻娠八月得子滿病或作子懸治
不効腹滿更甚胎墜下迫玉門大張胞形外露但仰
臥不能坐其脉而手俱大堅搏指謂曰病無害乃以
胎也胎肥氣弱不能束約故下墜耳用安胎和氣藥
主之加入參一錢升麻炒三分服三劑胎復上而安
後生一男一女

楊乘六治我修姪嬪妊八月一日胎忽止搶塞至心口
喘滿不食自汗悶絕僅臥口噤目直視面色不赤舌
色不清按其兩手脉息尚有急取丸子兩許滾水研
化灌之灌至兩酒杯胸口鬆動口開睛轉手足運動

而甦問何藥乃尔神曰八味丸也又問此何病而用此丸曰此子懸也由下元虛冷腹中無火以養小兒故上奏以就心火之溫如人睡被中足冷則上縮也後用芪朮芎歸煎送前丸服至兩月而產未選八為 備覽

薛立齋治一妊媼每胎至五月肢倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及遍頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君加蘊根而愈

元豐中淮南陳景初名匠也独有方論治妊媼子腫病其方初名曰香附散李伯時易名曰天仙藤散王景

公居金陵李家病以詩贈景初曰李族貧兼病煩君藥石功到家何所寄一問征鴻因此見方得于李伯時家傳于臨川張石丞宅一說

薛立齋治一媼子腫用紫蘇飲而愈大遲

一孕媼遍身皆腫或以為白火症或以為鼓脹治俱不効產科郭大生曰此名琉璃胎至將產一月前必飲食大進產即腫消矣已而果然彼閱歷多故知耳然病之所以然究未之知也

一媼人妊七月先下俸發腫漸及面目間數日忽子戶內突出一水泡皮薄而光亮于是身腫悉消矣然起

卧不便困苦非常後復皮破出 恒不得輒偶一內
親自言昔常患此有医教用王不留行及明凡等藥
煎洗而疼如言試之若于蜚疼如此月餘比前少愈
而終不除詢產科亦罕知者但云此似不妨必所謂
琉璃胎也產時自消后果然 全上

一媼亦一身發腫既產仍不消只向裡床卧終日昏迷
不省人事有時少醒即又狂躁不安如此二十餘日
絕口不食諸医束手偶有村媼聞而告曰無憂我兒
媳亦曾患此不餓死也但有陳年白蠶向病人前灸
熱以米醋沃之彼聞香自然欲食如言果効腫亦遂

消 全上

轉脬

鍾大延治一貴家孀婦便秘腫脹面赤發喘衆醫莫
効大延診之曰是可勿藥乃胎墜脬脫耳令其周身
轉運而痊 靈波府志

孫卓三潯梁人精岐黃正德間邑人以濠梁之變先与
送其夫人避山中病前秘五日腹膨如鼓仰而張目
息已微急召孫曰此感暑急驅飲水過度羞溺而
轉脬也法以猪尿脬吹氣貫滿令奴婢投入冲之而
溺淋下遂起 江西通志

孫文垣治一富家嬪大小便秘者三日市師以巴豆凡

二帖大便瀉而小便更秘脹悶睛突二寸餘前陰脹
裂不能坐卧啼泣呻吟欲求自尽孫曰此轉脬病也
栲樹東行根皮一寸滑石三錢元胡索拖仁當歸瞿
麥各一錢臨服入韭菜汁半杯服後食頃小便少行
玉戶痛甚非極用力努之則不能出改用升麻桔梗
枳壳元胡索煎成調元粉二錢乃提清降濁之意
服後大小便俱行始不脹急次日報云每便時腹先
痛有淡血水小便短再以升參元當歸白芍甘州
青皮香附元胡苓鹿山查而安

與陸榮
大全

孫君又有四卷七十七頁一案一轉脬病治法大

抵如前難多令患者橫卧令有力婦人以患者兩
脚膝旁架肩上將下俸虛空提起搖擺數回則尿
脬倒上徐放患者去衣不及小便箭射而出
熱如湯黑如炭頃刻盈盆一段

按轉脬病在入但
令患者橫卧榻上

高熱下俸良久其
尿自通殊不費力

黃履素曰予憲友賀立安方伯常言其伯父賀岳精于

醫曾治一孀將產坐岬患小水通百藥不効愈飲
愈飽束手待斃賀君診之曰此乃脾氣虛弱不能勝
胞故胞下墜壓塞膀胱以致水道不通大健其脾則
胞奔而小便自通以白朮二兩土炒加炒砂仁數錢

別加一二錢輔佐之藥服一劑立便小水其神如此予
常記此言予心中壬寅歲內人有妊臨月竟同此病
醫藥无功危甚余以此法告医者喜醫虛心如法治
之立効遂幸長子寅錫予若不聞此言則母子均殆
矣

李時珍常治數人小便不通及轉瞬危急者令將葱管
吹入莖內極有捷効又小兒不尿乃胎熱也用大
葱白切四片乳汁半大杯煎片時分作四服即通不
飲乳者服之即飲乳若胎回旁有青黑色及口撮者
不可揉也 李時綱曰

薛立齋治司徒李咨剛仲子室孕五月小便不利諸藥
不應薛曰非八味丸不能救不信別用分利之藥遂
致不救

儒者王文達室患小便不通小腹腫脹几至于殆用八
味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子二劑
即利而安

陸養愚治方思桂女年十四患大小便不通已三日村
醫与凡藥數十粒如芝麻大服之大便立通而瀉小
便仍秘又二日脹悶暗突少腹時時抽疼不能坐卧
啼泣呻吟欲求自尽脉之沈數而兩尺尤甚曰此轉

痔病也時尚爰熱以六一散井水調服之小便少行
行時陰中極疼後仍點滯不暢大便努青而無積腹
疼時作疼則如刀刺再診脈仍沈數乃用升麻三錢
柴葛甘桔各一錢以提清降濁服後二便俱行小便
純血大便亦帶血水其家猶危之曰今無患矣向者
凡藥必巴豆也病卒熱鬱而以極熱之藥攻之向之
刺疼今之溺血皆已去便然也以犀角地黄湯加連
尾數劑而安

身孫文頃治
富家婦同

萬密齋治一妊婦淋瀝小便不通匿作轉胞治之不安
乃用檳榔赤芍二味研末順取長流水煎湯調服効

此方治男婦一切血淋及淋瀝水道疼痛用之無不
神效

馬元儀治沈氏妾妊娠八月下利二十餘日利后患小
便淋瀝渴而引飲之單方去滴許澀痛異常已三日
夜診得肺脈独大餘脈虛澀曰下利經久脾陰必耗
燥火自強今見肺脈独大是火踞肺位金被火制氣
化不及州都便溺何由而出經曰病在下者治上今
上竅越則下竅自行矣且妊娠之冷脈見虛澀氣血
不能養胎可知若再行逆下不惟病不除且有胎動
之患因与紫苑三錢高麗肺氣下及膀胱乳葛一錢

升發胃氣專布津液火鬱則氣燥以杏仁蘇子潤之燥勝則風生以薄荷青之加枳桔開提三焦之氣一劑小便通利亦止

吳橋治趙氏媼故孱弱有身七月病不得大小便醫者與以四苓利之卒不利久則小腹前后脹急疼楚燥亂昏惰殆將不勝橋診之則以補中益氣湯加黃連為劑一服小便稍行明日為湯液五斗呼壺者口授之扶病者坐臨盤通引湯沃病者沃己口授產媼牽手奉其胎大小便即行病愈矣病得之食訕而唾未盡其遺毒觸胎病者故內虛胎氣下墜而壓脬

矣或曰胎壓脬而不得誠是也大溲何為橋曰小溲塞則鼓膀胱是將壅大腸其氣亦為不利故爾聞者曰善

太函集

妊娠胎墮

薛立齋治一婦人墮胎昏愒不時吐痰自用養血化痰之劑昏愒不省自汗發熱搖痰涎涌出彼以為中風欲用祛風化痰之劑薛曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補加炮姜二十劑愈

一婦人年二十餘痰疾墮胎時咳服清肺解表喘急不寐薛謂脾土虛不能生肺金為損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮姜四劑少安入與八珍加五味及十全大補全安

龍葵子才治一婦人每懷孕至三個月必墮不肯服藥教

以四五年老母鳩煮湯入紅壳小黃米煮粥食之不
數服而胎回

方節安之夫人朱屢受產厄因就醫乞墮胎方服之無
效後求方于薛醫產鄭氏鄭云墮胎不下必貴兒也
今後宜服安胎藥矣一日方聞步許陌間見一道人
手携竹筐坐于橋下与之語道氣益然因設齋留之
到家問筐中何物曰此濟治病入丹藥也因授一方
名曰回生珠產丹并勸修合普施朱夫人誕彌厥月
時服一丸則果如達矣遂連生二子長名鵬字矯亭
次名鸞字改亭後俱顯貴云 張氏危言

薛立齋治一婦苦于生育及三月以面粉燒酒調服
墮胎去下血不止嘔吐湯藥不納六脉細小欲絕
作毒藥傷胃氣胃虛不能司納以人參二錢甘州五
分煎徐之与服嘔止八珍湯而安

人治一孕婦用前藥患前症胸腹飽滿嘔吐不止用菜
豆甘州湯而安

一婦懷孕三月而墮之后發熱自汗四肢軟弱口氣血
虛不能榮養其胎故墮之后益虛陰虛則發熱陽虛
則自汗以大補湯去桂加五味而安

吳橋治程應兆妻故多病三月不月已忽微行諸醫以

為積血而力導之惡乃大至幸身汗溢垂絕而甦則
又以為虛極而重剗補之上視反張驚搐昏冒節中
待盡橋診之脈雖離經而欲下則血竭而逢窮陽氣
積血迫之大行胎離經而欲下則血竭而逢窮陽氣
元陰血可依則浮騰而上越胎隨陽上逆而触心故
上視反張驚搐昏冒法不當死乃子順胎散始進甚
艱既及半而藥力行嗒焉而寐諸醫目橋曰死矣橋
曰藥中病乃寐諸公待之頃之呻吟始云頭疼諸醫
以為餘燼也夜分乃終橋曰中夜陽生此當求復時
至而墮之乃少舒詰朝爽然俄仆卧內諸醫目揖橋
曰真死矣橋曰胎欲下而血垂盡壅滯不得行尋以
順胎散下之則血塊大如拱諸醫揖橋曰吾倍固以
為積血果然橋徐應曰非積血也胎也立引水漱而
灌之外紫而中白其人形象乃服八正集

妊娠胎死

許裕御治邵涵貞內子孕十七月不產不敢執意憑脈
聞諸情況果孕非病但云孕五月以行不動心竊訝
之為主丹參一味今日服七錢兩旬餘胎下已死而
枯其胎之死料在五月不動時經十三月在腹不腐
理可相也張路雲治馬雲玉媼孕十三月不產脈乘
而枯如果實在樹敗者必腐亦有不腐者則枯胎之
微結為處十全大補湯服至二十餘劑而下胎枯色
白治雖異而枯則一也

喻嘉言治顧季掖乃室仲夏時孕已五月偶尔下血醫

以人參阿膠勉固其胎又經一月身腫氣脹血逆上
奔結聚于公厭胸膈中飲食不入触之痛楚轉下甚
艱稍急即嘔出全似噎症數更醫咸謂胎氣上偏延
至秋計孕已八月病已急呼吸將斷診之不云病狀
其脉尺部微清惟推独肺部洪大無倫其喘声如曳
鋸其手臂青紫腫脹作如毆傷色乃駭曰似此凶產
何不早商然不必明言以滋驚恐姑以善葯投之通
其下閉上壅可也必求病名曰上壅者以肺脉洪大
合于公厭之結塞知其肺当生癰也下閉者以尺脉
之微清合于肉色之青腫知其胎已久壞也善葯者

瀉白散加芩桔之苦以開之不用硝黃葶峻葯也服
一大劑服即努痛如欲產狀問欲產乎曰肺氣閉而
下行多時聞拒惡穢得出可也矣產之云有進一劑
身腫稍退上氣稍平下白汚如膿者數斗裏朽胎而
出旬餘高去白汚並元點血相間可知胎朽腹中也
近百日陰胎之血和胎俱化為膿也病人當時胸膈
即閉連進粥神思清爽然朽胎虽去而穢氣充斥
周見為青腫者奉去也胸膈虽實而肺氣壅遏為寒
熱咳嗽者未除也乃一以清肺為主旬餘始痊然則
未成乃穢逆之
氣上攻而然耳

立齋治一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢意其胎必死令視其舌果青黑与朴硝半兩服之下穢水而安 濟陰綱目

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以回物姜桂而安

李將軍妾病甚呼華陀視脉曰傷娠而胎不去將軍言聞寔傷娠胎已去矣陀曰按脉胎未去也將軍以為不然陀舍去嬭稍小差百餘日復動更呼陀之曰此脉故有胎前當生兩兒一兒先出血出甚多后兒不及生母不自覺旁人亦不悟不復迎遂不得生胎

死血脉不復歸必燥暑母脊故使多脊疼今当与湯并針一處此死胎必出湯針既加痛急如欲生者陀曰此死胎久枯不能自出宜使人探之果得一死男手足完具長尺許陀之技皆類此 三國志

陳三農治一婦孕四月而墮之復腹腫發熱氣喘脉洪盛面赤口臭舌青黑陳曰脉洪盛者胎未墮也面赤者心火熾而血乾也口臭舌青黑肝氣絕而胎死也以蛇脫煎湯調子胃散加芒硝歸芎服之下死胎而安

甘陵相夫人有妊六月腹痛不安華陀視脉白胎已死

矣使人手摸之所在：左則男在右則女人云在左
于是為湯下之果男形即愈三國志

陳良甫治繆宅次媳孺人杜氏生產不下坐婆視童搯
治皆無効召診之曰產前脈不可考但當察色而知
之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者
和胎已死母却無憂矣或問曰何以知之荅曰面赤
舌青者子死母活明矣躬自合至寶丹二粒服之胎
即落矣以此見古人處方之神良方

妊娠異胎

莊氏媼懷妊三年不產有医者診之曰脈象頗異疑必
異物當以為下之腹畢竟腹中奇痛產一肥墮地而
裂中有小蛇五蜿蜒盤屈以次而出急拊殺之沈布
衣麟親見之三國識畧

張路玉治一媼懷孕六月因喪子悲哭動胎医用黃芩
白朮等二服不應改用香附紫蘇枳殼砂仁一服胎
遂上逼心下脹悶喘急口鼻出血第三日抵暮往診
其脈急疾如狂風急雨十餘至則不至頃之復至如
前因喻之曰此孕本非好胎安之無益不若去之以

存母命因思此胎必感震氣所結震屬木惟金可制
令以鐵斧燒紅醋淬乘熱調芒硝一兩灌之夜半果
下异胎下後脉息少和神思恍惚而去惡路甚多人
与安神調血之劑而安

孫文垣治張氏嬪年二十一診之左寸關短弱尺滑右

寸亦滑左寸尺皆滑關濡弱尺沈微診畢其夫問曰

脉何如不告曰心神脾志皆火不足得肺經有痰

孫君孀生多以一痰推病曰不然乃有身也曰左寸短弱如此安

得有孕云已五十日矣問曾經孕育不曰已二次今

乃三也問二產皆足月否男耶女耶曰始產僅九月

手足面目俱全第無啼声抱起已身冷矣細檢之乃

知其無水火也水火次亦九月而產亦無啼声驗

之口中無舌二胎之異如此乃為制方以補心脾為

主令多服以百帖為率杏仁茯神遠志各一錢白朮

二錢白芍歸朮杞各一錢五分甘州五分生地八分

艾絮二分龍眼肉五個水煎服是月產一子次年又

有身不以前事為意至九月產下形侷俱備外有

脂膜一片色其面不能去即殞因思上年產獲全

為之功也乃以前方粘壁上方竟有身即照方服之

後生子女皆無恙此小兒有不足之症皆因

河南開封府有丹容之媼懷妊甚巨動躍間似双胎也
丹容語媼曰若生二男當名虎四兒虎五兒一日欲
出而天若雨狀謂妻曰晴後可即抑雨其去可即妻
未答則腹中朗應無雨其容驚惧曰汝何人則曰虎
四兒也言未竟又聞聲曰雖不落也有兒點丹容曰
汝入何人則曰虎五兒也自後凡有言無不驗一日
謂丹容曰汝所為竟燥不成必須燼如何置火如何
候為如何辨人曰如何如何乃也如何如何小點
化如何如何火點化徐吾母為之可也丹容遂如言
行之大然硫磺偶容至門室既不深廣而容入不行
其媼与二兒俱白黃乳迫人奈何奈何至夜薰蒸死
世今有小點化之術謂其傳也子則以為豈非天怒
其世故欲滅其口而然亦不知何妖也 七 疹類稿

錢國賓云山西大同軍人朱劉祿娶妻孔氏七年始孕
其腹極大六月不能行八月不能動仰卧于床延診
石寸及兩尺脈玉別部一倍經斷當生双女其懷胎
之狀主難產令服易產湯刻以揉其母至十月期足
腹痛產下一女其腹不減至三日腹痛再產一女
其腹仍大咸謂怪異必傷其母矣次日腹入陣疼又
產一女腹始如故初生之二女存三生之女斃

妊娠 鬼胎

滑伯仁治仁孝廟之祝楊天成一女薄莫道痛無見黃
夜神竟心動是夕夢与之交腹漸大而若孕逮伯仁
治診之曰此鬼胎也其母竟其由与破血墮胎之藥
不加蚬料者一并遂安

此說行
言意則

薛立斋治一婦人經閉八月肚腹漸大而色或青或黃
用胎疰之藥不應診之曰面青脉虛寒熱往來肝經
血為也而黃腹大少食停滯脾經血病也此傷傷脾
肝之疰非胎也不信仍用治胎散之類不驗薛用加
味歸脾道遠二藥各二十餘劑諸疰少愈彼欲速効

別与通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食薛用人參炮姜二劑少愈又用十全大補湯五十餘帖而安

此案係婦人良方是胎門秘入

東白馬氏嬪有妊經十四月不產形瘠危且黑松陽周漢御服之曰非孕也乃為妖之所乘耳以葯下一物如金魚蓬矣

明史

立高治一婦人虛羸有鬼胎癥塊經水不通診之曰此病也非胎也令服回物湯加莞花根而塊漸消又令用吳萸川芎柴秦僵蚕巴戟巴豆不去油莞花醋製為末煉蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下即出惡物而

愈後以八珍調安

本草入似非前案

錢用賓云予之太倉有兵年吳山其妻懷孕十有八月胎形漸大山以貧人難養日懷生死之憂求便道一診其脈浮沉長短去來至上下不一知疫非胎矣曾是疫火當門書中一款凡婦人當經受驚其疫由心色給流入血游如懷胎狀經閉漸大活動身安此假胎也以清疫活血輕劑用芎歸也每日母天冬半夏香附白芥子茯苓陳皮枳殼各一錢煎服數日乃愈

六和塔農夫朱言之妻生卒無痛為人寡言凡有氣喘

不發肝火醫可知矣于天啟二年經後懷胎漸大起
居飲食如常至十月不生入十月不生家人憂甚醫
莫知其故錢曾診之見六部浮鼓亦未敢斷又過五
月終日撒屁如此兩月胎消因當經暑氣傷肝久鬱
沖于血海似懷胎而無形此名氣胎特表出之



妊娠

傷寒 感寒 傷暑 喘逆 咳嗽 煩熱 嘔吐
泄瀉 遺尿 秘結 瘧疾 痢疾 瘡痢 內傷
悲傷 腹痛 膈氣 痞病 乳病 惡阻 下血
漏胎 癰瘕 子癰 見鬼

續名醫類案 卷三十三

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十三

錢唐楊之瑋王樞輯 男斌編次

妊娠 馬寒

繆仲淳治予潤父夫人娠凡月患傷寒陽明症頭痛吐
熱渴甚舌上黑胎有利勢甚危繆投竹叶石膏湯索
白芍子在馬前者不得即以井底泥擦胎上乾則易之一
日夜盡石膏十五兩五錢病除生一女
治妊娠傷寒護胎為要否則胎墮多死以白芍子為
細末鳩子清調雞屎子如槐大自胎前至胎下胎
存生處乾即以薑水潤之臨產者記之

妊感寒

馮楚瞻治一孕婦勞役受寒忽四肢厥冷喘急太作額汗如雨六脉沉微欲絕令以人參五錢桂附共三錢煎服病家曰已孕三四月服桂附保勿墮乎曰此時重母不重子未有母亡而子能活者服下少頃吐出清白水為入腸胃其声泠泠直達而下作暖數声喘減汗收脉亦起乃平和調理以漸而安十月足產一子

張路玉治一婦人素稟氣虛多疲怀孕三月因臘月辛表受寒遂惡寒不食嘔逆清血

此血字疑水字之誤腹疼下墜

脈得弦細如絲按之欲絕與生料乳姜人參半夏凡
一服不應更與附子理中加苓半夏桂調理而安大
抵懷孕母氣多火得苓連則安多寒得桂附則安多
痰得苓半則安務在調其偏勝適其寒溫未有母氣
逆而胎得安亦未有母氣安而胎反墮者較馮說所
尤自然
以金匱有妊娠六七月胎脹腹疼惡寒少腹如扇用
附子湯溫其藏者然認症不果不得妄行是法一有
差悞禍不旋踵也

妊娠傷暑

孫文叵治竹匠娘孕五月患心疼完所由為失足墜樓
也教飲韭菜汁一杯疼隨止又服他醫藥二帖心腹
疼吐鮮血盈盆胸間沖之工抵疼不可言危在頃刻
再診六脈皆洪大汗出如雨喘息不相續急令移居
樓下與益元散五錢用紫蘇湯調服戒之曰今夜若
睡聽其自醒切勿驚動汗止即甦也服後果睡至晚
汗斂胸膈不疼喘息亦定再與固胎飲一帖全安先
是鄰醫診之曰吐血脈宜沉細今反洪大又汗出喘
息不休危在今夕見病起來詢曰孕婦不得汗下反

利小便謂之三禁昨剖悉犯之而反獲効何也曰醫
貴審症蓋煩之汗非由病以棲居低小當酷暑熱逼
故也汗血去而太多則胎失養故上抵喘息不續移
居避暑益元散為解暑聖藥紫蘇又為安胎下氣妙
品氣下則血歸元而病去矣法出醫壘元戎中回血
飲是也乃唯之而退

妊娠喘逆

張子和治胡產祥之妻臨難月病喘以涼膈散二兩四
物湯一兩朴硝一兩作二服煎令冷服之一服病減
大半次又服之病痊効矣張曰孕婦有病當十月九
月內朴硝無碍八月者忌之七月却無妨七月者已
成形矣

周仁齋治一孕婦疫喘用生半夏錢半肉桂乳姜各五
分五味子三粒麻黃二分先以水煎後下葯勿令太
熱熱服其喘即止

半桂皆孕
婦忌宜酌
大逆

薛立齋治吳江庠火萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎

時咳服清肺解表之藥喘息不寐此脾土虛而不能
生肺金藥復損而益甚也先與補中益氣加茯苓半
夏五味炮姜四帖少安後往視之用八珍及加五味
十全大補全安

妊娠咳嗽

薛立齋治一妊婦嗽則小便自出此肺氣不足腎氣虧
損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五
味以生腎氣而安
一妊婦咳嗽其痰上涌日五六許諸藥不應此水泛為
痰用六味丸料及四君子湯各一服即少安數服全
愈

一妊婦因怒咳嗽吐痰而脇作疼此肝火傷肺金以小
柴胡湯加山炮枳殼白芍茯苓治之而安但欲作嘔
此肝侮脾也用六君子加升柴而安

妊娘煩熱

薛立齋治一妊娘煩熱惡食惡心頭暈此脾虛風
痰為患用半夏白朮天麻湯以補元氣祛風邪少愈
惟頭暈未痊巧用補中益氣湯加蔓荊子以升補陽
氣而安

一妊娘煩熱煎明間作疼用知母散

知母 麥冬 黃芪 黃芩 赤苓 甘草 加

山梔竹瀝以清肺金而痊後內熱咳嗽小便自遺用
補中益氣加麥冬山梔以補肺滋腎而安

妊娠嘔吐

薛立齋治一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食以為

飲食停滯兼肝木傷脾土用六君子湯以健脾胃加

蒼朮厚朴以消飲食吳茱萸所製黃連以清肝火諸

症悉愈人以六君子加砂仁調理而脾土乃安惡阻門已

此然宜
八四湯

一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺而尅脾

土用六君加柴胡枳桔而安

一妊婦胸腹脹痛吐痰不食此脾胃虛而飲食為痰用

半夏茯苓湯少安又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而

飲食如常後因恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓

苓湯加柴扈而安

立治妊婦亦用半夏

一妊婦因怒寒熱胸脇脹疼嘔吐不食狀如傷寒此怒動肝火脾氣受傷也用六君子加柴胡山扈枳壳丹皮而痊但內熱口乾用四君加芎歸升麻而安

一妊婦霍亂已止但不飲食吐酸泛用消導寬中薛曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯不信乃服人參養胃湯吐酸不止其胎不安仍用四君子湯俾煎熱令患者先嗅藥氣不嘔而呷之恐嘔復釣動胎氣也如是旬餘而起

妊娠瀉

陳三農治一婦有妊常作瀉久瀉屬腎用白朮四兩煮熟山藥二兩炒甘艸一兩炙杜仲姜汁炒松花炒各七錢飯丸服

薛立齋治邊太常副室妊娠泄瀉自用枳朮黃連之類復吐痰發熱惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理氣薛曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮姜為末丸如黍粒不時含咽三五丸漸加至三日後日進六君子湯尋愈

進士王徽徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔此脾氣傷也其
夫君憂之強進米飲薛曰飲亦能傷胃且不必強別
用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒葯曰
若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食遠
其寒溫果愈

一妊媵因怒胸膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾
弱愈虛飲食益少大便不寔且無度久而便黃水
或帶白視其面色黃中隱白曰黃色脾虛也白色肺
虛也朝以補中益氣湯升補胃氣夕以六君子湯培
補脾氣而安

妊媵遺尿

薛立齋治一妊媵遺尿因熱肝脉洪數按之微弱或兩
太陽作疼脇肋作脹此肝火血虛用加味道遙散六
味地黃丸而愈後入寒熱或發熱或寒怒前症仍作
用八珍道遙二散清肝火養肝而痊

妊娘 秘結

張子和治一媼人病大便燥結小便淋瀝半生不孕常服疏導之藥則大便通利暫止即結滯忽得孕至回五月間醫者禁疎導之藥大便仍難臨固則力努為之胎墜凡如此胎墜者三入孕已經三四日前後結滯十分胎損張診之兩手脈強滑不敢陟作攻以食療之用花減煮菰菜葵菜以車前苗作茹襍猪羊血作羹食之半年居然生子燥病亦痊嘗見孕媼秘結極努損胎但用前法治之

薛立齋治李蒲汀側室妊娘大小便不利或用降火理

氣之劑元氣反虛肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃不澤薛曰此鬱怒所致也用加味歸脾湯為主佐以加味道遙而安

主政王天成之內妊娠痢疾瘥後二便不通其家世医自用清熱之劑不効診其脉浮大濇而此氣血虛也朝用八珍湯加杏仁杏仁夕用加味道遙散加車前子而瘥

陸養愚治一媼孕已九月大小便不通已三日忽胎上冲心昏暈數次診之脉沉洪而寔謂當下之与大承氣湯一劑少加木香豆蔻仁村医見用大黃兩許搖頭伸

舌其良有人難色乃謂之曰予坐汝家待其得生始去乃安心煎服一二時許二便俱行去黑矢極多胎亦無恙乃留調氣養榮湯二劑而不服數日後小便不利乃服後生一男

抄韻紫

陳三農治一媼妊娠五月大小便不通胸腹痞滿腿足及小腹刺痛難忍用芎歸赤芍枳殼煨榔木通滑石杏仁葱白童便水各一杯煎八分人大黃末一錢車前子末二錢再沸入蜜四五匙溫服大小便皆利而安

百爾久吾曰一医來問云我治一媼孕八九月忽然大小

便不通腹脹甚用承氣湯下之仍不通今危矣予曰
此非煎藥所能下教用牽牛大黃凡下之服至一兩
許而大小便俱通次日其夫來謝曰云諸病皆除惟
小便時要人將手緊按小腹方可便否則不能便因
思此是氣尚閉與青皮香附等行氣藥一劑而安十
月生男母子無恙 方見嘔門

妊娘瘕

薛立齋治一妊娘瘕久不已暖氣下氣胸腹脹甚食少
欲嘔便血少寐此屬肝脾竟怒用歸脾湯加柴扈少
安人用六君加柴扈升麻而愈

一妊娘患瘕已愈但寒熱少食頭疼晡熱內熱此脾虛
血弱也用補中益氣湯加蔓荊子頭疼頭止人用六
君子湯加芎歸飲食頓進再用逍遙散加參朮而寒
熱愈

陳良甫治一妊娘六七個月而病瘕疾先寒後熱六脈
浮紫衆医用柴胡桂枝無効陳言此疾非常小不愈