

中華醫學月刊

本期自次

癃閉與淋瀝

楊則民

夾陰傷寒真相

姜春華

中醫証候療法發凡

宋大仁

後世方藥解記

楊子鈞

癃寒治療一得

蕭俊逸

痘疹述要

徐頌南

癃閉與淋瀝

耿鑑庭

通論 痘疹述要

姜春華

楊則民

癃閉與淋瀝，皆排尿發生異常之病。吾人體內新陳代謝之結果，常產生一定之廢物，而此廢物如不能排洩於體外，則其人必病，管此排洩工作者，有肺腎皮膚消化管等，而腎尤其重要者，即排尿是也。

排尿作用可分為二，腎臟及輸尿管之作用在泌尿，膀胱及尿道之作用在放尿，排尿異常，則此泌尿放尿之異常，古人因之立癃閉與淋瀝之名，蓋先論癃閉。
癃閉者，無尿之謂，而有其別，癃者，膀胱著明膨隆，尿量頗多，不能照常排出之謂，換言之，泌尿作用如常，而放尿作用異常，其為膀胱尿道之病也可知，閉者，少腹不滿，而體內必須排出之代謝物，不能排出，為腎與輸尿管之病也可知。

以上為無尿症之籠統的分類，若更分析之，則無尿有因重症腎炎而起者，有因輸尿管結石而起者，有因膀胱括約肌痙攣而起者，有因膀胱壓縮肌麻痺而得者，有因尿道狹窄而得者，有排尿中途驟然停止而起者，有因藏躁病而起者，有故意忍住，久而久之，遂絕不能排出者，有大汗大吐，大下後，體液損失過多而起者，其原因複雜有如此者。

第 四 卷 第 五 期

精神及消化器官種種之不通，重則發生尿毒症，而失神發狂，強直痙攣，嘔吐惡心，自汗下利，喘息，而卒至於死。蓋尿為體內必須排洩之代謝物，若不能排出，則復由自己吸收而中毒也。即宜先治其標，而無所躊躇，張景岳謂嘔吐溼中大小便不通者，暫置其本，獨治其標，其斯之謂乎。

淋瀝者，有數義，一即尿量多而次數多之謂，二即尿量少而次數多之謂，三即排尿不能盡量，猶有餘瀝之義，四即有意識與無意識之自遣，試分端述之。

第一意義之淋瀝，即多尿之謂，如糖尿病，如尿崩病，如末期攝護腺肥大症，如老人腎萎縮等，其排尿之數與量，有足以驚人者（與健康人有一與二〇之比者），其次則為水腫消退時，膀胱炎消退，均有於一夜以內排尿多量，蓄水全然失去者，又其次則為大酒客與茶客，尿量亦比平人特多，更有精神、感動劇烈，一小時內排尿至十餘次以上者，平劇嗜白，有「嚇得來屁滾尿直流」。殆非誇大之詞。

第二意義之淋瀝，即尿意頻數之謂，有因感冒而起者，有因膀胱炎而起者，有因尿道炎而起者，有因初期攝護腺肥大而起者，有因膀胱痙攣而起者，有因慢性淋病而起者，有因急性熱病而續發者，凡此皆尿意頻數，而排尿量不多之病也。

第三意義之淋瀝，即排尿困難之謂，如尿道結石，尿道狹窄，急性尿道炎，急性膀胱炎，急性腎臟炎等，皆現排尿困難，而感劇痛，前人稱五淋者，即氣淋，血淋，熱淋（皆為膀胱炎或尿道炎），石淋（即結石），勞淋（即慢性淋病），皆同有排尿困難之症狀也。

第四意義之淋瀝，即遺尿之謂，成人有此，大抵屬神經衰弱，或攝護腺病，此古人稱為氣虛，腎虛者，每當溺畢，即有餘滴未盡，殊感痛苦，此蓋放尿之自律神經已脫離大腦之支配，故無意識的流出，如小兒也。若夫大病臨危，每多自溺，此殆膀胱括約肌已起麻痺之。

夾陰傷寒真相 宋大仁

「夾陰傷寒」之名，知之者甚衆，但其實際則又茫然不
所以者多，故有論之必要，民衆昧於事理，徒震撼於醫者之
口，世俗流言誤事者多矣。所謂名醫也者，不過名而已，僅憑
一棍或湯，已足成家名世，苟可聞問其餘耶？前日偶與前輩余伯
陶先生縱談之頃，彼即大惑於夾陰傷寒之名，舉世滔滔，未有
能正其謬者，抑亦已！

【病名之來歷】 痘非無有，名亦不出杜撰，凡稍能讀書之醫，皆知其載於明時陶氏全生集，惟野狐禪之流，祇知口頭引用，不識病症之屬性，隨口告人，以求達其欺人惑世之目的，病家無知，彼此稱述，於是病此者衆，不亦冤乎？

【病症之現象】今如牽醫瞪目無種印象，遇起自不退之熱也，但檢陶氏說，則爲「不發熱、面赤、或燥、脈沉」者爲是。

【陰字之解釋】何謂夾陰，在理必須先明此義，但談論者雖多，而皆不問陰字之意義，人都以陰陽解釋之，辨者亦然，其實陰陽之義，涵混不清，不足一辯，男性生殖器或謂之陽物，或謂之陰莖。遺洩曰走陽亦曰陰虧。精滑不止，曰脫陽或曰脫陰。陰即是陽，陽即是陰，此定名之不甚確實，可勿深究，意者即爲因色而起之病也。

【斷病之附會】 真正夾陰傷寒之現象，除陶氏所舉者外，頗不知以何者爲標準，醫者病者皆無標的可憑，乃以慾後前曾日新許，年三十自處試，謂得之夾陰之症，坐此，不知其所病者何，皆謂之夾陰。如余雲岫，新工道、衛、肺陰、經也。症，病者斷之，不論其例，徐惠進今外，實寒之，牛雜至有臭，其傷寒，為得之夾陰之症，猶遇，乃無未定所，謂不在此社會報文，關腸斯反，應於出黑夾陰，來歸，傷則死，晨綠，傷寒，發寒，寒室扶歸，終去四十許，其皮色爲症，見黑夾陰，而病，日病，其亦種者，諸議者，數生，不殞，見症，治症。

【本病之研究憑以事實言，僅定胎象靈名，未隨如以整個評則，又可厚非。】
諸君當知此種情況，首創人不察，則失醫學之本也。哲至確者，有賢妄言，而病隨，症皆經詳，不言此亦實錄。

【事實由來】房事爲一種劇烈運動，於神經中樞及交感神經，實刺甚烈，大約心藏衰弱者，易起變動，如再感寒冷，其病必發矣，所以陶氏主以麻黃附子細辛湯，甚爲合拍，其病必先潛伏未發之類，因房事發之，或體內傷膜炎、腹痛甚盛，會逢其適，因以牽強附會，其輕性者有有用鴿子縮肚臍有效，即翫包法（消炎）也。

故。至於小兒遺尿，尤爲習見之事，容於幼科中述之。
因排尿異常而引起疾患者，非止一端，試以尿量減少言之，
第一以代謝產物，不得充分排出，而起自家之中毒，第二以水分
鬱積過多，而起局部或全身之浮腫，第三熱性傳染病，因代謝旺
盛，若尿量減少，則代謝物將與病毒交互爲病，益陷病體於不良
，第四腎與膀胱，因病而起排尿障礙，復因排尿障礙，尿以鬱積
而分解腐敗，更促進原病之加劇，第五血液清潔，爲生體最要之
道，尿量減少，則血中鬱滯之毒素必多，而血乃病，此皆就尿量
減少爲害之大者言之也。

口渴之患，第二則有引起便祕之患，第三則皮膚以無所排洩，而有引起乾燥之患，第四膚乾便祕之結果，又足引起其他之病變，第五水份消失，則有引起體力消失之患，第六尿量過量，則腎與膀胱無不疲勞，而陷於衰弱，此又尿量過多爲害之彰彰者也。

中醫證候療法發凡

凡
(續)

妻春華


第四章 陰陽

第五章 三焦 營衛 氣血

表裏既已述竟，覺中醫之三焦氣血，尚有一述之必要，因自葉天士倡病在三焦說，而吳塘復據之以著溫病條辨，由此遂成一學派，而熟入營份氣份，才為現時葉派中醫之口頭語，故再引申葉吳二家之說，以闡明其究竟。

三焦者，本中醫生理上之名詞（詳生理篇），其意義本爲消化、吸收、排洩諸作用，而其部位乃將整個軀體分而爲三；胸以上爲上焦，胸部爲中焦，胸以下爲下焦，各焦各有藏器部位，如上焦爲心肺，中焦有脾胃，下焦有陽膀胱是（中醫之生理系統），惟葉天士之邪入三焦，並未指實其界限，至鞠通作條辨，始以三焦分綱，然其病包含至多，而三焦證狀，亦復籠統，茲先述葉

第一節 三 位



六經 表見前

注三
溫熱病條辨

葉天士醫案存真

卷三

溫熱病源

卷四

溫病別編

卷五

溫病之說

卷六

溫病之說

卷七

溫病之說

卷八

溫病之說

卷九

溫病之說

卷十

溫病之說

卷十一

溫病之說

卷十二

溫病之說

卷十三

溫病之說

卷十四

溫病之說

卷十五

溫病之說

卷十六

溫病之說

卷十七

溫病之說

卷十八

溫病之說

卷十九

溫病之說

卷二十

溫病之說

卷二十一

溫病之說

卷二十二

溫病之說

卷二十三

溫病之說

卷二十四

溫病之說

卷二十五

溫病之說

卷二十六

溫病之說

卷二十七

溫病之說

卷二十八

溫病之說

卷二十九

溫病之說

卷三十

溫病之說

卷三十一

溫病之說

卷三十二

溫病之說

卷三十三

溫病之說

卷三十四

溫病之說

卷三十五

溫病之說

卷三十六

溫病之說

卷三十七

溫病之說

卷三十八

溫病之說

卷三十九

溫病之說

卷四十

溫病之說

卷四十一

溫病之說

卷四十二

溫病之說

卷四十三

溫病之說

卷四十四

溫病之說

卷四十五

溫病之說

卷四十六

溫病之說

卷四十七

溫病之說

卷四十八

溫病之說

卷四十九

溫病之說

卷五十

溫病之說

卷五十一

溫病之說

卷五十二

溫病之說

卷五十三

溫病之說

卷五十四

溫病之說

卷五十五

溫病之說

卷五十六

溫病之說

卷五十七

溫病之說

卷五十八

溫病之說

卷五十九

溫病之說

卷六十

溫病之說

卷六十一

溫病之說

卷六十二

溫病之說

卷六十三

溫病之說

卷六十四

溫病之說

卷六十五

溫病之說

卷六十六

溫病之說

卷六十七

溫病之說

卷六十八

溫病之說

卷六十九

溫病之說

卷七十

溫病之說

卷七十一

溫病之說

卷七十二

溫病之說

卷七十三

溫病之說

卷七十四

溫病之說

卷七十五

溫病之說

卷七十六

溫病之說

卷七十七

溫病之說

卷七十八

溫病之說

卷七十九

溫病之說

卷八十

溫病之說

卷八十一

溫病之說

卷八十二

溫病之說

卷八十三

溫病之說

卷八十四

溫病之說

卷八十五

溫病之說

卷八十六

溫病之說

卷八十七

溫病之說

卷八十八

溫病之說

卷八十九

溫病之說

卷九十

溫病之說

卷十一

溫病之說

卷十二

溫病之說

卷十三

溫病之說

卷十四

溫病之說

卷十五

溫病之說

卷十六

溫病之說

卷十七

溫病之說

卷十八

溫病之說

卷十九

溫病之說

卷二十

溫病之說

卷二十一

溫病之說

卷二十二

溫病之說

卷二十三

溫病之說

卷二十四

溫病之說

卷二十五

溫病之說

卷二十六

溫病之說

卷二十七

溫病之說

卷二十八

溫病之說

卷二十九

溫病之說

卷三十

溫病之說

卷三十一

溫病之說

卷三十二

溫病之說

卷三十三

溫病之說

卷三十四

溫病之說

卷三十五

溫病之說

卷三十六

溫病之說

卷三十七

後世要方解記

失數道明著
存濟醫廣譯

平胃散類

人參養胃湯(和濟局方)

(主治)外感風寒，內傷生冷，增寒壯熱，頭疼目昏，肢體拘急，兼治山嵐瘴氣，避四時之溫疫，常服尤佳。兼治飲食發為瘧瘧，或脾胃中脘虛弱而發為瘧者主之(口訣集)。

(處方)蒼朮二○ 厚朴一○ 半夏一○ 五陳皮一○ 薑香○ 八草莖○ 八茯苓一○ 五人參○ 八甘草○ 五烏梅○ 八生薑○ 七大棗○ 七右十二味，一回量。即不換金正氣散加茯苓人參草莖烏梅。

(運用目標及應用)此方為溫補中焦脾胃消食解表之劑，而治外感風寒內傷生冷，其候脾胃本虛弱者，因內傷外感而發如瘧狀之寒熱用之。此瘧即所謂寒瘧，大抵如柴胡姜桂湯症者，用此方溫補脾胃，又老人胃中有停飲，釀成寒熱飲食不進者用之。加柴胡黃芩治小兒疳瘧之症，有寒熱如瘧者，若實症用淨腑散，虛者用清脾飲或其他柴胡劑。

(應用)瘧疾 咳嗽 食傷 小兒疳瘧

胃苓湯(古今醫鑑)

(主治)中暑傷濕，停飲夾食，脾胃不和，腹痛泄瀉而小便不利，水穀不化，在陰陽不分者。又治飲食停積浮腫泄瀉脈證共實者，總之，此方用於脾胃皆有力者。

(處方)蒼朮 厚朴 陳皮 猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 白芍 各一錢 肉桂 炙草各二分 右腹二劑 生薑 紫子煎

(運用目標及應用)此方以治暑濕為提綱，不能四時通用，於四五月至八九月間用之最多，傷食而帶水飲水穀不消化而腹痛泄瀉者良，隱寓平胃散之分利食滯而去水流之意，或轉水腫，脈進有力者用之。

(應用)急性胃腸炎 烦躁 氣脹 夏月之神經痛 優麻賓斯

分消湯(萬病回春)

(主治)治中滿鼓脹兼脾虛，而發腹滿飽悶鼓脹，其外雖堅滿中空無物似鼓者。

(處方)蒼朮一○二 白朮一○二 茯苓一○二 陳皮一○ 厚朴一○ 香附一○ 猪苓一○ 澤瀉一○ 枳實一○ 五 腹皮一○ 五 砂仁一○ 五 木香一○ 五 生薑一○ 五 灯芯一○ 五 上十四味，一回量。

(運用目標及應用)此方為順氣而治水腫腹水，左腹脹之初期用之有效，其候心下痞鞕，小便短少，大便秘有脹脹勢而充實，食後訴飽悶噯氣吞酸惡食有飽悶之症者良，體力衰而無脹脹勢，不可用之，而大柴胡湯及四逆散等亦可選用，脈沉有力者用之。

(應用)腹膜炎之初期 腎臟炎之一症 腹水鼓脹之初期

五積散(和濟局方)

(主治)調中順氣，除冷風，化痰飲，脾胃宿冷，腹脹脹痛，膈胸停飲，嘔逆惡心。或外感風寒內傷生冷，心腹痞悶，頭目昏痛，肩背拘急，肢體怠惰，寒熱往來，飲食不進，及婦人血氣不調，心腹撮痛，經候不勻，或閉而不通宜用之。

(處方)蒼朮一○ 陳皮一○ 茯苓一○ 半夏一○ 厚朴一○ 六 當歸一○ 六 药石一○ 六 川芎一○ 六 白芷一○ 六 枳殼一○ 六 桔梗一○ 六 乾薑一○ 六 桂枝一○ 六 麻黃一○ 六 大棗一○ 六 生薑一○ 六 甘草一○ 五 白朮一○ 以上十八味，一回量。

(運用目標及應用)此方為治氣血飲食痰五積，故名之。主治胃有寒濕，此方具有平胃散，原方，二陳湯，四物湯，桂枝湯，續命湯之意，驅逐風濕調和胃，補肝脾，食滯血虛，痰飲中寒，氣鬱感冒等，故廣於用。玄仙云以服冷痛，腰股掣急，上熱下冷小腹痛等症為目的。但不必限於上述各症，應用範圍頗廣。

(應用)胃擴張 冷症 脚氣 神經痛 痛氣 胃加答兒 血道 心臟病 帶下 催生劑 打撲 傷寒症 經閉 中風

討易可對的並非
。發暫是子材。是
生且景施並科科與
的不針針且，學學科
，談總的不不不的學
不，難原理成在，絕
妨那免理定功經夏綠
先末時，任的書枯，也
提什碰及孔，皆能做科學
來部到孔，皆是其枯子事。
，隨在皆是。只要留心去
報告，。與十二經脈的。
一什量針的。比
下麼針孔如脈的。
然後，何的。比
可以麼治係如。比
根情與如。比
據事實來，何發且不
加最生不談，
以是，談人，
探容皆

工吧很刻左，錯事
作！占試轉置則實
呢要重驗者熟不是至
。知要。為銅利否于
這地但男器尿如藥
是位須，中；此物
十，多右宿豆大比
分也多轉宿豆大比
基是試者，與黃方
本最驗為粘黃非說
的小，女着連與採
，初以。處同枳取
偉步免這自用實龜
大的偶然不白不用
的科然不白不用，
啊學或過變烈則祇
！工例略如，不得放
誰作外舉銀同得通
中請大種而驗反是鏡
是家工言孕不可，自會
不立作，我，；靠
能幹起於人自阿魏
科實藥可呼真花的
行上立之者非，

婦科

學 (續)

楊子鈞

陸養愚治施鳳鵠尊正，素嗜五辛，三孕皆不育，至三十歲即月事不來，將及二年，胸腹作痛，行走無定，數日一發，甚者一日二三發，養血行血之藥，無日徹口，身體時熱，肌膚漸瘦，一醫謂鳳鵠曰：「補血不補氣，無陽則獨陰不生，血何自來乎？」用人參芪歸朮芍肉桂峻補溫行之法治之，服數劑，瘀中見紅，大便乾燥帶血，予診其脈，兩手舉按皆數，左關數而弦，右關數而弱，兩尺數而沉濶，曰血虛，不待言，然血因火耗，肌削身熱，痛無常處，作止不定，六脈浮沉帶數，皆火象也，愚見清其熱，則血得所養，而經自來矣，彼醫曰：「內經云：天寒地冷則水凝成冰，天暑地熱則經水沸溢，夫寒則凝滯澑，熱則流通，此不易理，君獨以清火療血閉，果何說乎？」余曰：「案聞一書，可以意會，不可以意執，彼寒止而熱行者，蓋為無大病者言之也。今經閉不行，以致肌肉消削，又不可以此為例矣！內經不曰『三陽之病發心脾，有不得體曲，女子不月，其傳為風消，其傳為熱消，其傳為濕消，其傳為寒消』？」王太僕曰：「三陽胃與大腸也，二經有熱，心脾受之，則血凝，是以消爛肌肉，上氣喘逆，今病者素嗜辛辣，豈非腸胃有熱？不熱受息乎？今已移之心脾，月事久不行，肌肉消削，是傳為風消，幸為風消，幸為熱消，幸為濕消，幸為寒消，未至恩賁耳，復投溫熱之劑，是抱薪救火，病奚不增劇乎？」法當清腸中之積熱，使心氣下降，續以養血滋陰之劑，濟之是水，加山梔，丹皮，生地，白芍，十劑瘀紅便血俱減，更以前方加減，更服加味潤下丸，調理百餘日乃愈，逾年生一子。

赤山埠李氏本素羸怯弱，春間汎事不行，脹腹聚氣如癰，誠餐肌削，服溫通之藥，至孟秋加以微寒壯熱，醫仍作輕閉治，勢瀕於危，乃母託伊表兄林豫堂指辨後事，豫堂特請孟英一診以決之，孟英切其脈時，壯熱烙指，汗出如雨，其汗珠落於脈枕上，微有粉紅色，乃曰：「羸損是其本也，今暑熱熾盛，先當治其客邪，庶可希冀，疏白虎湯加西洋參，元參，竹葉，荷梗，桑葉，及何醫至。一籌莫展，聞孟英主白虎湯，乃謂其母曰：「危險至此，尚可服石膏乎？」且本草於石膏條下，致戒云：「血虛胃弱者禁用，豈彼未之知也？」豫堂毅然曰：「我主藥與其束手待斃，盍從孟英死裏求生耶？」遂服二帖，熱果退，汗漸收，改用甘涼清餘熱，日以何安，繼與調氣養營陰，宿穀亦消，培補至仲冬汎至而痊，次年適孫婁伯之弟——王氏醫案。

(一) 柏子仁丸 治血虛有火，漸至月經不通，羸瘦而生潮熱等證。

柏子仁（炒另研）熟地三兩（酒浸搗）續斷 淳蘭葉 各二兩 牛膝 卷柏 各半兩

(二) 淳蘭湯 治症同前

(三) 淳歸補血湯 治血虛發熱症類白虎。
黃芪一兩 當歸二錢五分 水煎

(四) 金匱麥門冬湯 治火逆上氣，咽喉不利。

妻兆期治一婦頭眩耳鳴，肉瞤筋惕，恍惚不得寐，乍作乍止，半載矣，後乃阻經，四月小腹如懷孕，醫者疑其姪而安之，忽一日下紫黑血少許，始識經閉，改用通經藥數劑，腹不減，反惡心嘔嘔，嘔飲下咽，旋越出咽喉，焦痛，舌黑無津，衆醫不能增效，余診得大脈弦細而滑，而關尤甚，曰：此頑痰閉滯，血海壅者，痰解，月事乃阻耳！何以徵之，其脈細而滑者痰脈也，頭眩耳鳴恍惚者痰証也。嘔吐不食者，痰客中焦也，舌黑無津，咽喉焦痛者痰生熱而然也，案問謂治病必求其本，今病本於痰，必以治痰。

- (五) 逍遙散 治血虛火旺，頭痛目眩，頰赤口苦，抑鬱脹痛寒
熱等證。
當歸 白芍 柴胡 白朮 茯苓各一錢 炙甘五分
加薄荷 煨薑煎再加丹皮 橘子 名加味逍遙散。
- (六) 抵當湯 治婦人經水不利，少腹鞭滿。
水蛭三十個熬 蟎蟲三十枚熬去足翅 桃仁二十個去皮尖
大黃三兩酒浸 四味爲末煎服。
- (七) 土瓜根散 治帶下經不利，少腹滿痛。
土瓜根 桂枝 芍藥 蟎蟲各三分 為散酒服方寸匕。
(八) 大黃甘遂湯 治婦人少腹滿，如敦狀，水血俱結在血室。
大黃四兩 甘遂二兩 阿膠二兩 三味煎服
- (九) 膏下逐瘀湯 治癥瘕積塊。
當歸三錢 赤芍 川芎 靈脂 烏藥 丹皮 甘草各二錢
元胡一錢 桃仁 紅花各三錢 香附 枳殼各錢半
(十) 壽濟當歸散 治婦人血勞氣滯，經脈不通，腹內疼痛。
當歸(炒) 白芍 川芎 延胡 丹皮各一兩 桂去蕊皮
(十一) 血竭散 治婦人血瘀作痛，臍下脹滿，月經不行，發熱
體倦。當歸八分 白芍炒 桂心 血竭 蒲黃炒 各六分 玄胡
炒四分 為末酒調
- (十二) 牡丹散 治婦人久虛羸瘦，血塊走注，心腹疼痛。
丹皮 玄胡 當歸 桂心各一兩 赤芍 牛膝 藥朮各三
兩 京三棱一兩半 右爲末，每服三錢，水酒各半煎服。
- (十三) 見曉丹 治寒客於下焦，血氣閉塞而成瘕，日以益大，
狀如懷子。
- (十四) 穿山甲散 治婦人癥瘕及惡血氣攻，心腹疼痛，面無顏
色，肢瘦。
穿山甲炒 鱗甲醋炙 赤芍 大黃炒 乾漆炒烟靈 桂心
另研 三棱五錢 桃仁三十個另研
各一兩 川芎 當歸 芫花醋炒 麝香二錢半另研爲末每
服二錢熟酒調服。

- (十五) 當歸沒藥丸 治月水滯澀，身體麻痺癩痒疼痛，飲食減
少，面黃肌瘦背脊拘急，骨間酸痛，多吐清水脣腹脹悶。
沒藥二兩 丁香三錢 木香一兩 丁香皮 桂去蕊皮 麝
麟竭延胡索 乾漆炒烟出 丹皮 當歸炒 肉豆蔻各五錢
安息香 乳香各一兩搗末酒瀝熬膏
右十二味搗羅爲末，以二香膏和丸，梧子大，丹砂爲衣，
溫酒下。
- (十六) 加味導痰湯 治肥人脂滿經閉。
半夏 陳皮 白茯苓 甘草 枳實 生薑 川連 川芎
(十七) 消脹化痰丸 治痰脹經閉，其腹脹大，四肢瘦削，面黃
食少。
木香二錢 右藥研細末，紅棗肉搗和爲丸。
(十八) 加味虎杖散 治經來行房 經水驟停，少腹刺痛不可忍。
紫大戟二錢 煨甘遂一錢 炒黑丑錢半 製牙皂三錢 廣
土牛膝一兩 琥珀末三分沖服 當門子五厘沖服 菁蔚子
三錢 生甘梢八分 細不通一錢
(十九) 雄砂丸 治虫証經閉腹痛。
鶴虱 蕪荑 乾漆 疣瘡各三錢 貢仲 榴皮各五錢 榴
丸 雄黃 珠砂 甘遂各錢半 米粉糊丸，五更粥飲下。
一方加麝香少許尤妙。
- (二十) 犀角地黃湯(竹林女科) 治過食椒姜熱物，經從口出。
生地二錢 犀角 白芍 丹皮 枳實各一錢 黃芩 橘紅
桔梗 百草霜各八分 甘草三分 水煎空心服
- (廿一) 冬花散 治同前。
冬花蕊 栗殼密炙 桔梗 枳殼 蘇子 紫苑 知母各八分
(廿二) 龍會丸 治肝火通經。
龍胆草(酒洗) 當歸(酒洗) 焦山梔 黃連酒炒
柏酒炒 黃芩酒炒各一兩 大黃酒浸 青黛 蘆薈各五錢
木香二錢 麝香五分 密丸淡姜湯下。
- (廿三) 通經丸 治經閉不通及血塊疼痛。
歸尾 桃仁 大黃 丹皮 乾漆炒烟靈 肉桂 牛膝
各一兩 藥朮一兩 三稜醋炒五錢 麝香八分
右爲末，皂角五錢 芫花二錢水煎糊爲丸，米湯下。

三診法半夏二錢瓜萎仁三錢正川連一錢五

舌苔

厚

三錢

半

白茅根四錢

黃芩三錢

九月五日

數日


三十日



標商 註冊

敵 濕 敵 之 瘡

專治大小癰子疔毒惡瘡無名腫毒搭背砍頭瘡不能成膿即破已破者貼換數次自能平復效驗如神因「瘡之敵」有極大提毒止疼去腐生肌力量舉凡癰疽已破者貼「瘡之敵」不論膿水如何黏稠不用擠取而膿自能被吸在膏藥上而使瘡口潔淨「瘡之敵」藥力宏大而切不黏皮膚一張可貼數次以上皆其特認絕非普通膏藥可能比擬也各代售處均有以「瘡之敵」治好像片多種以作鐵證



品出廠造製藥國予警津天 優利代外歡 厚益銷埠迎

號六十路號五區三亞興處發批總
售代均店商大社告廣房報京房藥各

良 藥 小 娃 娃 宁

天津針市街

偉迪氏製藥廠出品

近為普遍推銷，廣為救濟起見，特聘各地藥房，藥鋪，醫藥團體，雜貨，廣告店代為銷售，利益優厚，開以往之紀元。娃娃寧裝璜美麗，服用便利，可引起信仰之心，如代售定可獲得重利。

已為全國中西醫師所贊許，近年以來，更作進一步研究，極力減少藥量，增加治療實效，使嬰兒服用便利，不感絲毫之痛苦，為娃娃寧之特長。




和 平 藥

娃娃寧是採取上等國產藥材，精製而成，主治小兒百病，有極準確之把握，早



我西士

西士，是小孩最喜歡的就是糖果，見了就想要，要過來就吃。可是這種東西，是不與小孩有好處呢？人人都知道糖果吃的多了，小孩的牙齒會壞的。想要避免這種現象，最好叫小孩每天食糖果，兼服若素，效果異常。小孩強壯，百病不生。若素味甜，小孩最愛食，齒全，每天給以四五片吃，定可免去胃腸病，肺病，一切虛弱症，發育正常。可若素不只小孩服用，成年人服用更佳，男女老少皆宜。



胃腸
營養

若素

天津特別三區西鈎路

若素製藥公司

北京營業所：東單新開路
濟南營業所：濟南商埠緯三路
蒙疆營業所：張家口市至善街
各大藥房 均有代售