

國藥提要

於達望編著

國藥提要

於達望編著

新 醫 書 局 發 行

1 9 5 0

新醫叢書二期之一

國藥提要



一九四九年十月十五日付印
 一九五〇年四月一日出版

編著者
 校對者
 發行人

於 達 望
 於 達 望
 韓 學 川

發行所

總局杭州解放路三六九號
新醫書局

分發行

滬局上海漢口路六六八號
新醫書局
 京局北京宣內大街八五號

印刷者

新醫書局印刷工場
 杭州解放路皮市巷一四四號

基本定價六十元

(印刷地點外酌加郵運費)

國藥提要序

本草學在吾國有數千年之歷史，而李時珍「本草綱目」一書，尤爲吾國醫藥界之巨著。其搜羅之廣，解釋之詳，引證之博，實爲古今中外所罕見。惟其書之成，遠在有明末葉，衡以近代科學，則無論在理論與實用方面，俱缺點甚多，有加以考證、實驗、糾正及闡明之必要。換言之，該部門學術，必須加以科學方法之整理，方可合於現代之應用，吾友於達望君，對於藥學有深刻之研究，其所著「國藥提要」一書。由「本草綱目」及其他本草中，選有用藥材一千二百種，依植物、動物、礦物、科屬分類，用表解方式，參照中外書籍，加以整理。表解分中名、拉丁名、藥用部分、成分、用途、產地、備考等欄。對於成分一項，最爲注意。精搜詳列，藉以明該藥品之本性及價值。又將舊時名稱易以新近名稱，使各藥之效用產地，俱合於現代之命名，俾讀者對於有關各項，皆能瞭如指掌，其有功於醫藥學，豈淺鮮哉。此書始於公元一九三六年，逐年修正，易稿凡十餘次，至一九四九年夏始告完成。其審慎精詳，及其治學之精神，實與李時珍著「本草綱目」之淵博嚴密，同其偉大，吾料此書之出，必能溝通中西醫藥兩界，其有益於西醫、國醫、國藥、西藥專家，固不待言也。用敢爲之序。

公元一九四九年十二月 季梁王璉謹書於浙江大學理學院

曾 序

於教授達望致力藥學，凡數十年，誘掖後進，不遺餘力，今復出其編著，名曰「國藥提要」，囑余爲序，披閱內容，覺其材料豐富，切合實用，對於提倡國藥之研究，尤多裨益。按我國古來記載藥品之專書，首推本草，其體制與近代各國出版之藥典相類似，惜以年代湮遠，其中藥品，失傳者有之；失效者亦有之；卽就「本草綱目」而論，雖在明萬歷間印行，距今已三百六十餘年矣。若以唐宋時代之本草論之，當各在千年上下。惟我國各種藥品之應用，並非由理論而起，蓋以實際經驗而來。就近代科學觀之，除中醫界陰陽五行等虛玄之說以外，藥品一項，均由實際所用而累積者，頗有研究之價值，此種論法，幾爲世界科學家所公認，故自二十世紀之初，迄今已有半世紀，研究動植物之成分者，爭先恐後，遂成爲今日一般化學之基礎。我國本草，當亦不能例外，其中礦物及動物藥品之數不多，且礦物屬於無機化學範圍，所含成分，均已明瞭，植物藥品之數獨多，至少亦在千種以上，其已經科學研究者，不過十之一二。所有報告，散處四方，參考檢閱，甚爲不便，昔伊博恩及劉汝強二氏曾搜集此種研究資料，輯爲「本草新註」一書，用者便之；惟歷時已久，自應有所增刪。茲者於教授年事雖高，仍不辭勞瘁，繼伊劉之後，搜集文獻，列表詳解，不論中西醫士藥學化學方面，凡對於國藥之有研究者，均可憑此書檢索其底蘊，而爲應用上之參考。茲值付梓之際，聊述所感而爲之序。

一九五〇年元旦 曾廣方謹序於中央研究院藥學研究所

黃 序

在一切爲勞動大眾的號召下，科學工作者已
 往的錯誤方向，必須承認從前的個人優越感，尤其是醫學界
 藥的，必須承認從前的個人優越感，以及自由職外
 業的觀點，是錯誤的；同時，也是盲目的，無計劃的，忘記了
 國學的，忘記了廣大人民。

科學的醫藥學，在國外也是不過百多年的新
 學，其發揚光大，也在近五十年。牠傳來中國次學
 ，一般有了四五十年，這四五十年中間，曾屢次學
 掀一起中西醫鬪爭的風浪。中醫就是舊醫，舊醫之
 的；西醫就是新醫，是科學的；醫有新舊之分，書
 百年前在國外也是一樣的。舊醫的理論，以舊書
 爲根據，以保存國粹爲護符；新醫的理論，以實
 驗爲根據，以追求新發明爲急務；因此西醫則中
 醫是騙子，根本無存在價值；而中醫則中國人
 ，而外國藥廠或器械廠的推銷員，遂強調「國
 政策下，這中西醫鬪爭風浪，是沒有一個合理
 無法處理的；一般社會上出發的點，大小不一，上
 斷。原因是所有一個人生計，大的是在學術上爭
 小的，是各爲個人生計，大的是在學術上爭

4

；就後者論，新醫所爭，當然是比較對的。可是！
他們兩方面的廣大人民，勞動大衆，他倆的的健康，寄生
他請問什麼保障？中西醫的們所從時荒騙送命該負了自已的政府了，人民
憑生市都的衆聽草藥人，翻身是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
產的大衆，憑巫而們，該不了，首先要照顧教育而的欺騙學或中務學習（即密和本去，這
或者是單方藥的人，是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
吃單醫藥的人，是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
學醫藥的人，是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
現的在人民，翻身是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
政府的醫藥政策，是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
以很明白的規定，是：縮中爲人志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
造科學醫，一陣綫下，在志說德是醫中，醫，利人民服學（即密和本去，這
，使在統絕巫醫壯，同不，都結合一，又說：儒醫（即密和本去，這
，以永大校長譚，中，民團結，一致，互相學（即密和本去，這
二野醫有，在解和國中，人團結，一致，互相學（即密和本去，這
區沒有，在解和國中，人團結，一致，互相學（即密和本去，這
美醫，在解和國中，人團結，一致，互相學（即密和本去，這
和有特點，學工，不融洽，但和中的國人民是緊密結合的，因此不是的產是
；他互用廣所，所以

值得科學工作者學習的。所以中國學科醫學醫藥的
人們，必須承認過去的錯誤。中國一般新醫學的學
家，只知道崇拜外國，從不拿正眼去看中國舊醫書
籍。這種盲目，就是不能將新醫術，確切地，這錯
誤的結果，就中國醫藥學，及其中醫，病醫，中
；所以健康狀況，所謂「中醫」，保健康，中
動大底明瞭，而健康爲第一義，那分。凡以服從
須是些什麼，健康爲第一義，那分。凡以服從
以全人而之，不改業，而一切爲就下，離赤裸裸的，
中，如不真，這是團結政行檢討，都赤裸裸的，
，服從，這是在下一策，就下，離赤裸裸的，
，在，就必須自檢討，都赤裸裸的，
，累，加以討論；那末，中國藥，在過的一
，必烈的年頭，中的藥，是
方一致不爭的定論。

早在世紀前，西洋學者，就已着手研究中藥材。東西各國，都有很多的紀錄；近三十來，中國學者，自己在研究，也少計劃。數。中國藥業，不全是個秘密。可惜在過去，始終沒有好好的資本主義和武斷的封建主義統治下，始末研究部；所以「本草綱目」後三百年來，尚無一現。同人的；而政府是明確的，這門工作，該是迫切要的。

藥學教授於禪定先生，新編的國「藥提要」，剛趕着這個時候出版，可謂應時之作。雖然只是一個提要，但已足夠使一般懷中藥的人，得到正確的觀念。將來，將以他的計劃，擬再繼續作生藥和成分的分析，自應得他的地位。到那個時候，發中展到他在醫藥文化上，都有充分的認識和運用，那健但有助於團結中醫，也有大助於中國人民保，也同是對於全世界人類，對於整個醫藥文化，也一定的。是大大貢獻！我於此謹以至誠慶賀於先生的初步成就，更預祝他此後的偉大成功！

一九四九年除夕 黃勝白序於北固山陽

章 序

黃巖於君達望，撰國藥提要成，將梓行壽世，問序於余，余於醫藥非素習，於君之索序，豈非問道於盲乎，吾國開化最早，自神農嘗百草以療民病，黃帝作內經，探明疾病之原，示人知用藥處方之道，厥後扁鵲華陀，神明其法，遂有聲史乘，自西方醫藥傳入中國，聞者驚爲神奇，而於中國固有醫藥，反視如糞土，故步自封者，則痛心疾首，以爲是舍家雞求野鶩也。予以爲此皆泥於成見，而非融會貫通之道，吾聞日人湯本感於其女死於肺病，中國友人患同一之病，斷定必死，促其回國待死，而卒不死，始悟中藥之不可厚非，中醫亦有獨得之秘，遂撰「皇漢醫學」，推重中醫，余友黃巖周子敘君譯述其書，風行一時，國人漸知中醫確有不可漠視者，今於君之撰「國藥提要」也，舉本草所載，推究效用、產地、藥用部份，附以拉丁名，逐一解釋，使人知尊重國藥，於君研究西藥，殫心國藥如此，其用意殆與日人之撰「皇漢醫學」者相媲美，不亦藥學界一大貢獻乎？天下事由比較而產生新理，由研究而得正確知識，治科學，尤貴平心靜氣，而得真理所在，決不可稍涉客氣，以存出主入奴之見，吾方盛然有深感于於君之請，漫書所見以贊。

己丑歲立冬日富陽章乃夔梅先書於諸暨青山寄廬

唐 序

於教授禪定，專攻藥物，執教垂數十年，畢生精力，寢饋於斯。乃於教學之餘，本其學識經驗，竭盡心力，編「國藥提要」，費時十餘載，稿始告成，余拜而讀之，初覺其條分縷皙簡明扼要，繼感其內容豐富，搜羅無遺，終羨其敘述綦詳，切合實用，尤以成分一項，彌足珍貴。考我國國產藥物，雖有數千年之歷史，然以無人研究，致湮沒而不彰，「本草綱目」雖有記載，然多涉及陰陽五行，不合邏輯；讀之令人如墮入五里霧中，撲朔迷離，使人莫解，外國醫藥界對於我國藥物，頗多研究者，以我國藥物，加工製造，售於國人，一轉手間，獲利倍蓰，不僅漏卮可惜，且其文獻多散見於報章，尙無專書，足資參考。本書則以最新科學方法，整理國藥，對於各該藥物悉按動植礦物學等分科鑑定方法分類，有條不紊，循序詳列；而於所含成分亦記載綦詳，尤爲國內空前未有之巨著，醫藥界人士研究國藥之指針，不僅中醫應視爲唯一之秘笈，所有醫藥從業者，亦爲適用之參考資料，手此一編，按圖索驥；中醫可憑此以解前陰陽五行未解之迷；西醫可憑此探索以國藥代替西藥之道，製藥工業可憑此尋求，以國藥製造西藥之途徑，則此書之出，不僅於學術上有研究之價值，而間接對於製藥工業之促進，挽回漏卮，國家經濟前途，尤有裨益。至於溝通中西，促進新中國醫藥之復興，猶爲餘事。余不才何敢云序，聊述所懷，藉誌個人對本書觀感而已。

一九四九年十二月 唐國藩謹書於浙江大學醫學院

自序

吾國版圖遼闊，產藥甚多，外人有擇要採運而去，製煉成品，返售我國，一轉手之勞，獲利倍蓰，而民間夙有特效藥，其功用顯著，惜秘而不傳，亦亟宜研究，可爲西藥之代用品。考歷代記載藥物之書，以「本草綱目」爲最詳，惟未經科學解釋，不合現代之用，英儒伊博恩與河北劉汝強二氏合著之「本草新註」；日人久保田晴光所編之「和漢藥標本目錄」及大村橋本所編之「綜合藥用植物」，咸採科學方法，用表解式排列，尙較實用。但於命名、成分、產地、效用諸項，或付闕如，或欠周詳。余習藥有年，責無旁貸，乃於執教從政之餘，取以上諸書爲藍本，并參閱有關之文獻，詳加研討，擇其要點，分類編纂，名爲「國藥提要」。此稿始於公元一九三六年，陸續修正，凡十餘易，迄去夏方克告成，茲付剞劂，志在溝通中外醫藥兩界，掛漏之虞，在所難免，尙望海內學人進而教之，則幸甚矣！抑有所感者，余雖年逾花甲，好學之心，未敢後人，惟精力有限，僅涉初階，未能再作詳盡之專著，徒抱宏願，深望有志斯道者，不棄鄙夷，或就余所擬之程序而完成之，卽用「生藥學」及「礦物學」體裁，編纂一部「現代本草叢書」：（甲）各藥材之動植礦種屬名、拉丁原名、詳細調查，分類記載。（乙）將各藥原產地分別調查。（丙）植動礦各藥原圖，均應繪印彩圖，藥用植物部份，可依「內外植物大圖鑑」及「本草圖譜」爲藍本，動物及礦物部份，亦應以「動物圖譜」及「礦物圖譜」爲藍本。（丁）植物學、動物學之解剖組織圖，可取材於德日文「生物學」及「日本藥學雜誌」中藤田氏之「漢藥解剖圖」及趙藥農氏之「邠州藥誌」，再請生藥專家，詳加研討

，繼續記載。(戊)成分一項，「日本藥學雜誌」記載中藥成分甚詳，應盡量譯成中文，再從其他文獻及歐美各國「藥化學雜誌」，凡有關中藥成分者，均應譯成中文，彙集成冊，名爲「國藥成分彙編」；其尙未研究之成分，應由藥學同志，聯合研究，逐漸增加。(己)藥理一項，凡已經各雜誌發表者，須盡量搜查，彙集成冊，名爲「國藥之藥理試驗集」；其尙未經試驗者，應聯合研究，逐步完成。(庚)藥效一項，應聯絡臨床醫師，分類試驗，遇有特殊功能者，將已往文獻之藥效一項，加以修正，並推廣用途。以上夙願，如能逐一實現，對於國計民生保健前途，獲益實非淺鮮。本書屬稿時，對於參考書之著作者，復蒙老友周子敘陳雄飛葉三多諸氏之指正，付印時承楊珠廉君之襄助，又此書之得以如期出版，由新醫書局主人韓學川君之熱心學術所致，並此誌謝，藉以留念。

公歷一九五〇年二月十八日

黃巖禪定於達望時年六十有五序於古臨安宋太學舊址

凡 例

- (一) 本書用表解格式，依植物、動物、礦物科屬類別，分中名（附註別名）、拉丁名、藥用部份、成分、用途、產地、備考等項。
- (二) 成分一項，注意特殊成分，其名稱原以英名為主，但文獻中亦有其書德名者，則照原文選錄，不事轉譯，藉存真意而免錯誤。
- (三) 凡已經藥理試驗者，則附入藥理試驗一項，以明藥品之性質。
- (四) 效用一項，將舊時名稱，易以新近名稱，以符合現代之用，併注意民間特效藥，俾可替代西藥之用。
- (五) 產地一項，記載該藥之原產地，藉知某省某地為道地，知真正藥品之來路，本草所載藥物產地，皆係歷代舊名，茲均改易今名，以便對照。有若干種藥材，雖係產於外國，因各本草書已經收載，且應用年代已久，亦當作國藥論，藉資便利。
- (六) 備考一項，記載該藥命名之原由，庶可顧名思義，便於記憶。
- (七) 中名之下，附註之本草數字，係由本草綱目某卷而來，例如本草 12，則可參照本草十二卷之原文，得知該藥之詳細內容。末尾附載本草卷數索引，可查閱本書某號某藥材之內容，得知在科學上之價值。
- (八) 某種藥材，其原植物，如不止一種，為便利起見，並載數種之拉丁原名，若其科屬不同，則彙集一處，於該原植物拉丁名之下，附註他科屬之名稱，以示區別而免混同。
- (九) 如某種藥材，其特殊成分及藥理試驗已經明確，曾有新藥製出者，則附註新藥名稱，藉供臨床上之採用。
- (十) 本書之參考書籍，附記於次：

引用書籍略名

- 【本草】 本草綱目 李時珍著 【植考】 植物名實圖考長編 吳其濬著
- 【拾遺】 本草綱目拾遺 趙學敏輯 【綜植】 綜合藥用植物 大村重光，橋本亮
- 【中典】 中國藥學大辭典 陳存仁編 【植鑑】 內外植物大圖鑑 村越三千里主編
- 【本新】 本草新註 伊博恩劉汝強合編 【和漢】 和漢藥物學 日野一色共著
- 【邦藥】 邦產藥用植物 刈米達夫 【藥譜】 原色藥用植物圖譜 刈米達夫編
- 【漢藥】 和漢藥標本目錄 久保田晴光 【分類】 高(下)等植物分類學 杜亞泉編
- 【食植】 食用植物學 服部健三 【植典】 植物學大辭典 杜亞泉黃以仁等編
- 【上食】 上海食物 伊博恩 【植名】 植物種名科學名詞審查會審查本
- 【生藥】 生藥學 趙燭黃，徐伯璽、葉三多著 【日藥誌】 日本藥學雜誌
- 【花鏡】 秘傳花鏡 【中藥誌】 中華藥學雜誌
- 【植研】 植物成分之研究 高瀨豐吉 【貴衛】 貴州衛生
- 【化粹】 *Chemistry abstracts* (化學拔萃)
- Wehmer : Pflanzenstoffe* *Henry : Alkaloids*
- 【日局方註五】 第 五 日本藥局方註解
改 正

國藥提要總目

第一編 植物性藥品

甲 種子植物

子 被子植物

I 雙子葉植物

號碼	科	名	號碼	科	名	號碼	科	名	號碼	科	名
1	菊	科	2	桔	梗科	3	葫	蘆科	4	山	蘿 蔔科
5	敗	醬科	6	忍	冬科	7	茜	草科	8	車	前科
9	爵	牀科	10	苦	苴 苔科	11	列	當科	12	胡	麻科
13	紫	威科	14	玄	參科	15	茄	科	16	唇	形科
17	馬	鞭草科	18	紫	草科	19	旋	花科	20	蘿	蔘科
21	夾	竹桃科	22	龍	膽科	23	馬	錢科	24	木	犀科
25	安	息香科	26	栲	樹科	27	磯	松科	(藍雪科)		
28	金	紫牛科	29	石	南科	30	鹿	蹄草科	31	山	茱 萸科
32	繖	形科	33	五	加科	34	蟻	一塔科	(小二仙科)		
35	柳	葉菜科	(待香草科)			36	使	君子科	37	桃	金 蟻科
38	千	屈菜科	39	八	角 楓科	(瓜木科)			40	安	石 榴科
41	胡	頹子科	42	瑞	香科	43	仙	人 掌科	44	紅	木科(椅科)
45	堇	菜科	46	檉	柳科	47	龍	腦香科	48	金	絲 桃科
49	山	茶科	50	獼	猴桃科	51	梧	桐科	52	木	棉科
53	錦	葵科	54	田	麻科	55	葡	萄科	56	鼠	李科
57	鳳	仙花科	58	清	風藤科	(吹泡科)			59	無	患子科
60	七	葉樹科	61	衛	矛科	62	冬	青科	63	漆	樹科
64	黃	楊科	65	大	戟科	66	遠	志科	67	棟	科
68	橄	欖科	69	苦	木科	(黃棟樹科)			70	芸	香科
71	蒺	藜科	72	亞	麻科	73	牻	牛兒科	74	酢	醬草科
75	豈	科	76	薔	薇科	77	杜	仲科	78	金	縷 梅科

號碼	科 名	號碼	科 名	號碼	科 名	號碼	科 名
79	茅膏菜科	89	虎耳草科	81	景天科	82	十字花科
83	白花菜科	84	罌粟科	85	樟科	83	肉豆蔻科
87	蠟梅科	88	木蘭科	89	防已科	90	小蘗科
91	木通科	92	毛茛科	93	睡蓮科	91	石竹科
95	落葵科	96	馬齒莧科	97	商陸科	93	莧科
99	藜科	100	蓼科	101	馬兜鈴科	102	蛇菰科
103	樹寄生科	104	白檀科	105	蕁麻科	106	桑科
107	榆科	108	山毛櫸科	109	樺木科	110	胡桃科
111	楊梅科	112	楊柳科	113	金粟蘭科	114	胡椒科
115	三白草科						

II 單子葉植物

116	蘭科	117	曇華科	118	薔荷科 (蕓科)
119	芭蕉科	120	鳶尾科	121	薔荳科
123	百合科	124	百部科	125	燈心草科
127	鴨跖草科	128	殺精草科	129	浮萍科
131	椴櫚科	132	莎草科	133	禾本科
135	澤瀉科	136	香蒲科		

丑 裸子植物

137	麻黃科	138	松杉科	139	紫杉科	140	銀杏科
141	蘇鐵科						

乙 羊齒植物

142	卷柏科	143	石松科	144	木賊科	145	蕨科 (羊齒類, 水龍骨科, 石韋科)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

丙 蘚苔植物

146	蘚苔類
-----	-----

號碼 科 名 號碼 科 名 號碼 科 名 號碼 科 名

丁 同節植物

147 地衣類 148 藻類 149 菌類
 附錄一 植物性加工品
 附錄二 植物學名尚未明瞭者

第二編 動物性藥品

甲 脊椎動物門

子 哺乳類綱

1 人類 2 猿類 3 翼手類 4 食蟲類
 5 食肉類 6 齧齒類 7 長鼻類 8 有蹄類
 9 遊水類 10 常節類

丑 鳥類綱

11 猛禽類 12 燕雀類 13 攀禽類 14 鴉鷄類
 15 遊禽類

寅 爬蟲類綱

16 龜鼈類 17 蛇類

卯 兩棲類綱

18 有尾類 19 無尾類

辰 魚類綱

20 硬骨類 21 硬鱗類

乙 節足動物門

子 昆蟲類綱

22 膜翅類 23 鞘翅類 24 鱗翅類 25 雙翅類
 26 半翅類 27 直翅類

丑 多足類綱

28 蜈蚣類

號碼	藥名	號碼	藥名	號碼	藥名	號碼	藥名
		寅	蛛 蜘 類 綱				
29	蠍 類	卯	甲 殼 類 綱				
30	節 甲 類	丙	軟 體 動 物 門				
		子	頭 足 類 綱				
31	二 鰓 類	丑	腹 足 類 綱				
32	有 肺 類	33	前 鰓 類				
		寅	瓣 鰓 類				
34	單 柱 類	35	同 柱 類	33	異 柱 類		
		丁	蠕 形 動 物 門				
		子	毛 足 類 綱				
37	蚯 蚓 類	丑	環 蟲 類				
38	蛭 類	戊	棘 皮 動 物 門				
39	沙 蟻 類	40	海 星 類				
		己	腔 腸 動 物 門				
41	雜 類						

第三編 礦物性藥品

1	元 素 類	2	氧 化 物	3	硫 化 物	4	氮 化 物
5	矽 酸 鹽	6	硼 酸 鹽	7	硫 酸 鹽	8	硝 酸 鹽
9	炭 酸 鹽	10	有 機 物	11	雜 類	12	化 石 及 結 石

國藥提要目次

(藥名後之數字為順序之號碼，括弧內之數字為頁碼)

第一編 植物性藥品

甲 種子植物

子 被子植物

I 雙子葉植物

第一 菊科

薯	1 (1)	惡質(牛蒡)	2 (2)	黃花蒿	3 (2)
青蒿	4 (3)	茵陳蒿	5 (3)	牡蒿	6 (3)
菴	7 (3)	白蒿	8 (4)	艾	9 (4)
女苑	10 (4)	東風菜	11 (4)	紫苑	12 (5)
馬蘭	13 (5)	朮	14 (5)	鬼鍼草	15 (6)
狼把草	16 (8)	艾納香	17 (6)	金盞草	18 (7)
飛廉	19 (7)	天名精(鶴齒)	20 (7)	紅藍花(紅花)	21 (8)
石胡荽	22 (8)	蒿	23 (9)	九牛草	24 (9)
除虫菊	25 (9)	千年艾	26 (10)	野菊	27 (10)
菊	28 (10)	苦蕒	29 (11)	小薊	30 (11)
大薊	31 (11)	漏蘆	32 (12)	鱧腸	33 (12)
蘭草	34 (12)	澤蘭	35 (13)	鼠麴草	36 (13)
三七	37 (13)	天葵子(向日葵)	38 (14)	旋覆花	39 (14)
木香	40 (14)	仙人杖草	41 (15)	蕎苳	42 (15)
黃瓜菜	43 (16)	鬼督郵	44 (16)	狗舌草	45 (16)
薇	46 (17)	千里及	47 (17)	豨薟	48 (17)
劉寄奴草	49 (18)	一枝蒿	50 (18)	苦菜(苦蕒)	51 (18)
蒲公英(黃花地丁)	52 (19)	款冬花	53 (19)	菜耳(蒼耳)	54 (20)

第二 桔梗科

沙參(附黨參)	55 (20)	薺	56 (21)	半邊蓮	57 (21)
山梗菜	58 (22)	桔梗	59 (22)		

第三 葫蘆科

合子草	60 (20)	冬瓜	61 (23)	西瓜	62 (23)
甜瓜	63 (24)	越瓜	64 (24)	胡瓜	63 (24)
南瓜	66 (25)	壺盧	67 (25)	苦瓠(敗瓢)	68 (26)
絲瓜(天羅)	69 (26)	苦瓜	70 (26)	木鼈子	71 (27)
王瓜	72 (26)	括樓	73 (27)	白藥子	74 (28)

第四 山蘿藦科

續斷	75 (28)
----	---------

第五 敗醬科

甘松香	76 (28)	敗醬	77 (29)	攀倒甌(男郎花)	78 (29)
-----	---------	----	---------	----------	---------

第六 忍冬科

楊檀	79 (30)	忍冬(金銀花)	80 (30)	陸英	81 (30)
接骨木	82 (31)	朔蕊	83 (31)	莢蕓	84 (31)
折傷木	85 (31)				

第七 茜草科

伏牛花	85 (32)	梔子(山枝)	87 (32)	水梔子	88 (33)
都桤子	89 (33)	賣子木	90 (33)	鉤藤	91 (33)
女青	92 (34)	茜草	93 (34)	曲節草	94 (34)

第八 車前科

車前	95 (35)
----	---------

第九 爵床科

秦艽	96 (35)	爵床	97 (36)	馬藍	98 (36)
----	---------	----	---------	----	---------

第十 苦苣苔科

紫背金盤	99 (39)	石吊蘭	100 (37)
------	---------	-----	----------

第十一 列當科

肉蓯蓉	101 (37)	列當	102 (37)
-----	----------	----	----------

第十二 胡麻科

胡 麻 103 (38)

第十三 紫葳科

梓 104 (38)

楸 103 (39) 角 蒿 106 (39)

葳紫(凌霄) 107 (39)

第十四 玄參科

巴戟天 103 (40)

桐 109 (40) 麝 蒿 110 (40)

馬先蒿 111 (41)

胡黃連 112 (41) 地 黃 113 (41)

玄 參 114 (41)

鬼 油 麻 115 (42) 水 苦 蕒 116 (42)

第十五 茄 科

龍 珠 117 (42)

曼 陀 羅 118 (43) 風 茄 兒 119 (43)

真 紫 120 (43)

枸 杞 121 (44) 菸(烟草) 122 (44)

酸 醬 123 (44)

苦 茄 124 (45) 白 英 125 (45)

茄 126 (45)

龍 葵 127 (46)

第十六 唇形科

金盞小草 128 (46)

夏 枯 草 129 (46) 香 薷 130 (47)

重 葳 131 (47)

藜 藜(益母草) 132 (47) 排 草 香 133 (48)

藿 香 134 (48)

薄 荷 135 (48) 薺 薺 136 (49)

石 香 薺 137 (49)

積 雪 草 138 (49) 假蘇(荆芥) 139 (50)

羅 勒 140 (50)

蘇(紫蘇) 141 (50) 迷 迭 香 142 (51)

鼠 尾 草 143 (52)

丹 參 144 (52) 黃 芩 145 (52)

水 蘇 146 (53)

草 石 蠶 147 (53)

第十七 馬鞭草科

藜 草 148 (53)

海州常山 149 (54) 石 菖 150 (54)

腐 婢 151 (54)

馬 鞭 草 152 (54) 牡 荊 153 (55)

藥 荊 154 (55)

蔓 荊 155 (55)

第十八 紫草科

雞腸草	156 (56)	紫草	157 (53)	生瓜菜	158 (56)
		第十九 旋花科			
旋花甘藷	159 (57) 162 (58)	莼絲子	163 (57)	蘿菜	161 (58)
		牽牛子(黑丑)	163 (59)		
		第二十 蘿藦科			
白薇	161 (59)	白菟菀(牛皮消)	163 (59)	白龍鬚	163 (60)
白前	167 (60)	蘿蘆	163 (60)	徐長卿	169 (61)
		第二十一 夾竹桃科			
水甘草	170 (61)	夾竹桃	171 (61)	絡石	172 (62)
		第二十二 龍膽科			
龍膽	173 (62)	若菜	174 (63)	睡菜	175 (63)
當藥	176 (63)				
		第二十三 馬錢科			
醉魚草	177 (61)	密蒙花	178 (61)	鉤吻(野葛)	179 (64)
番木鱧	183 (63)				
		第二十四 木犀科			
連翹	181 (63)	秦皮	182 (63)	白素馨	183 (63)
迎春花	181 (66)	黃素馨	183 (63)	茉莉	186 (67)
女貞(冬青)	187 (67)	齊墩果(洋檉)	188 (67)	木犀(桂花)	189 (68)
枸骨	190 (68)				
		第二十五 安息香科			
安息香	191 (69)	摩腐子	192 (69)		
		第二十六 柿樹科			
稗楊	193 (70)	柿(柿霜)	194 (71)	君遷子	195 (71)
烏木	193 (71)				

第二十七 磯松科(藍雪科)

白花藤 197 (71)

第二十八 紫金牛科

株砂根 198 (72) 百兩金 199 (72) 紫金牛 200 (72)
 杜葦山 201 (72)

第二十九 石南科

地蜈蚣草 202 (73) 木藜蘆 203 (73) 檎木(馬醉木) 204 (73)
 緞木 205 (74) 南燭 206 (74) 石南 207 (73)
 羊躑躅 208 (73)

第三十 鹿蹄草科

鹿蹄草 209 (76)

第三十一 山茱萸科

松楊 210 (76) 山茱萸 211 (76)

第三十二 繖形科

白芷 212 (77) 獨活 213 (77) 都管草 214 (77)
 當歸 215 (78) 羌活 216 (78) 馬嘶 217 (78)
 革 218 (79) 此胡(柴胡) 219 (79) 南柴胡 220 (79)
 阿月渾子 221 (80) 芍藥(川芍) 222 (81) 胡萎 223 (81)
 三葉 224 (81) 胡蘿藦 225 (82) 阿魏 226 (82)
 翻齊 227 (82) 藿香(小茴香) 228 (83) 藜蘆 229 (83)
 水蘄(芹菜) 230 (83) 前胡 231 (84) 蒔蘿 232 (84)
 防葵 233 (85) 蜘蛛香 234 (85) 蛇牀 233 (85)
 麝蕪 236 (85) 邪蒿 237 (86) 防風 233 (85)

第三十三 五加科

五加 239 (83) 楡木 240 (87) 土當歸 241 (87)
 八角金盤 242 (87) 通脫木(通草) 243 (83) 常春藤 244 (88)
 人參 245 (88) 竹節人參 246 (89)

第三十四 蟻塔科(小二仙科)

水藻 247 (89)

第三十五 柳葉菜科(待香草科)

火炭母草 248 (90) 支實(藎) 249 (90)

第三十六 使君子科

使君子 250 (91) 毗黎勒 251 (91) 訶黎勒 252 (91)

第三十七 桃金娘科

桉樹 253 (92) 丁香 254 (92)

第三十八 千屈菜科

指甲花 255 (92)

第三十九 八角楓科(瓜木科)

大空 256 (93)

第四十 安石榴科

安石榴 257 (93)

第四十一 胡頹子科

胡頹子 258 (94)

第四十二 瑞香科

沈香 259 (94) 蜜香 260 (94) 莞花 261 (95)

瑞香 262 (94) 薔花 263 (94)

第四十三 仙人掌科

仙人掌 264 (96)

第四十四 紅木科(椅科)

大風子 265 (93) 梓木 266 (93)

第四十五 董菜科

* 見 腫 消	267 (97)	紫花地丁	268 (97)		
		第四十六	檉柳科		
檉 柳	263 (97)				
		第四十七	龍腦香科		
龍 腦 香	270 (98)				
		第四十八	金絲桃科		
胡 桐 淚	271 (98)	都 念 子	272 (98)	小連翹(弟切草)	273 (99)
		第四十九	山茶科		
山 茶	274 (99)	茗(茶)	275 (100)	旱 蘆	276 (100)
		第五十	獼猴桃科		
獼猴桃(陽桃)	277 (101)	羊 桃	278 (101)	木 天 蓼	279 (101)
含 水 藤	280 (102)				
		第五十一	梧桐科		
梧 桐	281 (102)	胖大海(大海子)	282 (102)		
		第五十二	木棉科		
木 棉	283 (103)				
		第五十三	錦葵科		
苘 麻	284 (103)	蜀 葵	285 (104)	黃 蜀 葵	286 (104)
綿	287 (105)	木 芙 蓉	288 (105)	扶 桑	289 (106)
木 槿	290 (106)	冬 葵	291 (106)		
		第五十四	田麻科		
黃 麻	292 (107)				
		第五十五	苧苧科		
地 錦	293 (107)	紫 葛	294 (108)	千 歲 蕒	295 (108)
烏 歎 莓	296 (108)	藥 蕒	297 (108)	白 薇	298 (109)

蒲 荷 299 (109)

第五十六 鼠李科

枳 椇 300 (110) 白 棘 301 (110) 鼠 李 302 (111)

棗 303 (111) 苦 棗 304 (111) 酸 棗 305 (112)

仲 思 棗 303 (112)

第五十七 鳳仙花科

鳳 仙 307 (112) 坐 傘 草 308 (112)

第五十八 清風藤科(泡吹科)

清 風 藤 309 (113)

第五十九 無患子科

槩 華 310 (113) 荔 枝 311 (113) 韶 子 312 (114)

龍眼(桂圓) 313 (114) 龍 荔 314 (114) 無 患 子 315 (115)

文 光 果 316 (115)

第六十 七葉樹科

天 師 栗 317 (115)

第六十一 衛矛科

扶 芳 藤 318 (115) 衛 矛 319 (116)

第六十二 冬青科

冬 青 320 (116)

第六十三 漆樹科

都 咸 子 321 (116) 菴羅果(欖果) 322 (117) 薰陸香(乳香) 323 (117)

篤 耨 香 324 (118) 黃 櫨 325 (118) 鹽膚木(鹽肤子) 326 (119)

五 倍 子 326 (119) 漆 327 (120) 婆 羅 得 328 (121)

第六十四 黃楊科

黃 楊 329 (121)

			第六十五	大戟科		
罌子桐	330 (121)	巴 壹	331 (122)	蒴 苈	332 (122)	
澤 漆	333 (122)	續 隨 子	334 (123)	大 戟	335 (123)	
甘 遂	336 (123)	白 附 子	337 (124)	菴 摩 勒	338 (124)	
蕨麻(蓖麻)	339 (124)	烏 柏	340 (125)			
		第六十六	遠志科			
遠 志	341 (125)					
		第六十七	棟 科			
椿(香椿)	342 (126)	棟	343 (126)			
		第六十八	橄欖科			
返 魂 香	344 (127)	橄 欖	345 (127)	木 威 子	346 (128)	
贍 八 香	347 (128)	沒 藥	348 (128)			
		第六十九	苦木科			
枋(臭椿)	349 (129)					
		第七十	芸香科			
降 眞 香	350 (129)	橙	351 (130)	柚	352 (131)	
橘	353 (132)	柑	354 (134)	金 橘	355 (135)	
枸 欘	356 (136)	佛 手	357 (136)	枳	358 (137)	
枸 橘	359 (137)	白 鮮	360 (138)	吳 茱 萸	361 (138)	
食 茱 萸	362 (139)	芸 香	363 (139)	常 山	364 (140)	
藥 木	365 (140)	茵 芋	366 (140)	秦 椒	367 (141)	
燈 椒	368 (141)	蜀椒(山椒)	369 (142)	崖 椒	370 (142)	
地 椒	371 (143)					
		第七十一	蒺藜科			
東 腐	372 (143)	蒺 藜	373 (143)			
		第七十二	亞麻科			
亞 麻	374 (144)					

第七十三 蝶牛兒科

蝶牛兒 375 (144)

第七十四 酢漿草科

五 劍 子 376 (145) 馬 墳 椰 377 (145) 酢 漿 草 378 (145)

第七十五 荳 科

相 思 子 379 (146) 海 紅 豆 380 (146) 合 歡 381 (147)
 刺 蜜 382 (147) 落 花 生 383 (148) 黃 耆 384 (149)
 蘇 枋 木 385 (149) 雲 實 386 (149) 山 苳 根 337 (149)
 刀 苳 388 (150) 阿 勃 勒 389 (150) 苳 芒 390 (150)
 望 江 南 391 (151) 決 明 392 (151) 紫 荆 393 (151)
 薰 草 394 (152) 檳 (黃檳) 395 (152) 藟 豆 (扁 豆) 396 (153)
 稗 豆 397 (153) 海 桐 398 (153) 解 毒 子 (苦 藥 子) 399 (153)
 格 注 草 400 (154) 尾 夾 401 (154) 大 豆 402 (155)
 黃 大 豆 403 (156) 白 苳 404 (158) 甘 草 405 (158)
 肥 皂 夾 406 (159) 小 青 407 (159) 百 脈 根 408 (160)
 苳 菴 409 (160) 黎 豆 410 (161) 血 藤 411 (161)
 綠 豆 412 (161) 赤 小 豆 413 (162) 豌 豆 414 (162)
 補 骨 脂 415 (163) 檀 香 (紫 檀) 416 (163) 欄 木 417 (163)
 葛 418 (164) 榼 藤 子 419 (164) 鹿 藿 420 (164)
 苦 參 421 (165) 槐 422 (165) 羅 望 子 423 (165)
 胡 蘆 巴 424 (166) 蠶 豆 425 (167) 薔 薇 426 (167)
 胡 翹 搖 427 (167) 白 蔘 藜 428 (168) 豇 豆 429 (168)
 紫 藤 430 (168) 黃 環 431 (169) 預 知 子 432 (169)
 豬 腰 子 433 (169)

第七十六 薔薇科

龍 芽 草 434 (170) 扶 移 435 (170) 山 檀 (茅 櫛) 436 (170)
 槿 梓 437 (171) 榼 子 (木 桃) 438 (171) 木 瓜 439 (172)
 槿 櫛 440 (172) 机 杷 441 (173) 蛇 莓 (地 莓) 442 (173)
 水 楊 梅 443 (174) 不 凋 木 444 (174) 醋 林 子 445 (174)
 棠 梨 (甘 棠) 446 (175) 鹿 梨 447 (175) 林 檮 448 (175)

柰	449 (176)	梨	450 (176)	海紅(海棠果)	451 (177)
探子	452 (177)	沙棠果	453 (177)	狼牙	454 (178)
翻白草	455 (178)	蛇含	456 (178)	巴旦杏	457 (179)
杏	458 (179)	李	459 (180)	郁李	460 (180)
梅(附棚梅)	461 (181)	桃	462 (181)	櫻桃	463 (182)
檉木	464 (182)	山櫻桃	465 (183)	蕤核	466 (183)
月季花	468 (183)	金櫻子	468 (183)	營實(薔靡)	469 (184)
覆盆子	470 (184)	懸鈎子	471 (185)	蓬蘽	472 (185)
地榆	473 (185)				
		第七十七	杜仲科		
杜仲	474 (186)				
		第七十八	金縷梅科		
蘇合香	475 (186)	楓香脂	476 (187)	楓柳	477 (187)
		第七十九	茅膏菜科		
錦地羅	478 (187)				
		第八十	虎耳草科		
澁蕪	479 (188)	土常山(甘茶)	480 (188)	虎耳草	481 (188)
		第八十一	景天科		
昨葉荷草	482 (189)	屋遊	483 (189)	景天	484 (189)
佛甲草	485 (190)				
		第八十二	十字花科		
蕓苔	486 (190)	芥	487 (191)	甘藍	488 (192)
菘(白菜)	489 (192)	蕪菁	490 (193)	薺	491 (194)
葶藶	492 (195)	大青	493 (195)	蔞菜	494 (195)
萊菔(蘿蔔)	495 (196)	白芥	496 (196)	蔞蕓	497 (197)
		第八十三	白花菜科		
白花菜	498 (197)				

			第八十四		罌粟科	
博落迴	499 (197)	白屈菜	500 (198)	延胡索	531 (198)	
紫堇	502 (199)	麗春草	503 (199)	罌粟	594 (200)	
阿芙蓉	505 (200)					
			第八十五		樟科	
樟	506 (203)	樟腦	507 (204)	備桂	508 (205)	
桂(肉桂)	509 (205)	天竺桂	510 (203)	月桂	511 (206)	
山胡椒	512 (207)	鉤樟	513 (207)	烏藥	514 (208)	
詹糖香	515 (208)	楠	516 (209)			
			第八十六		肉豆蔻科	
肉豆蔻	517 (209)					
			第八十七		蠟梅科	
蠟梅	518 (210)					
			第八十八		木蘭科	
莽草(東毒尚)	519 (211)	八角茴香	520 (211)	南五味子	521 (212)	
辛夷	522 (212)	浮羅羅勒	523 (213)	木蘭	524 (213)	
厚朴	525 (213)	北五味子	526 (214)			
			第八十九		防己科	
木防己	527 (215)	漢防己	528 (215)	千金藤	529 (216)	
防己	530 (216)					
			第九十		小蘗科	
小蘗	531 (217)	鬼白	532 (217)	淫羊藿	533 (218)	
千年健	534 (218)	南蠟	535 (219)			
			第九十一		木通科	
通草	536 (219)					

第九十二 毛茛科

烏頭	a.附子 b.側子 c.漏藍子	537 (220)	天雄	538 (221)	
牛扁	539 (222)	狼毒	540 (222)	草烏頭	541 (222)
白頭翁	542 (223)	升麻	543 (223)	女萎	544 (224)
威靈仙	545 (224)	仙人掌	546 (224)	黃藥子	547 (225)
黃連	548 (225)	菖菴	549 (226)	芍藥	550 (226)
牡丹	551 (227)	毛茛	552 (227)	回回蒜	553 (227)
石龍芮	554 (228)				

第九十三 睡蓮科

蓴	555 (228)	芡實(鷓頭)	556 (228)	蓮藕	557 (229)
萍蓬草	558 (230)				

第九十四 石竹科

離蒿草	559 (230)	紅芪草	560 (231)	瞿麥	561 (231)
剪春羅	562 (232)	瑯草	563 (232)	蜀羊泉	564 (232)
王不留行	565 (233)	繁縷	566 (233)		

第九十五 落葵科

落葵(附燕脂) 567 (234)

第九十六 馬齒莧科

馬齒莧 568 (235)

第九十七 商陸科

商陸 539 (235)

第九十八 莧科

牛膝	570 (236)	莧	571 (236-237)	青葙	572 (233)
雞冠	573 (238)				

第九十九 藜科

藜	574 (239)	灰藜	575 (239)	藜	576 (239)
---	-----------	----	-----------	---	-----------

地 薈	577 (240)	菠 菱	578 (240)				
		第一百 蓼 科					
蕎 麥	579 (241)	苦 蕎 麥	580 (242)	蕎 麥	581 (242)		
毛 蓼	582 (243)	拳 參	583 (243)	馬 蓼	584 (244)		
蛇 蘭 草	585 (244)	虎 杖	586 (244)	赤 地 利	587 (245)		
蓼	588 (245)	水 蓼	589 (246)	蠶 繭 草	590 (246)		
何 首 烏	591 (246)	葶 草	592 (247)	紫 參	593 (247)		
藍 (大青)	594 (247)	金 絲 草	595 (248)	海 根	596 (248)		
大 黃	597 (248)	酸 模	598 (249)	羊 蹄	599 (249)		
		第一百〇一 馬兜鈴科					
馬 兜 鈴	600 (250)	杜 衡	601 (250)	細 辛	602 (250)		
		第一百〇二 蛇菰科					
瑣 陽	603 (251)						
		第一百〇三 桑寄生科 (槲寄生科)					
桑 上 寄 生	604 (251)	柳 寄 生	605 (251)				
		第一百〇四 白檀科					
白 檀	606 (252)	百 蕊 草	607 (252)				
		第一百〇五 蕁麻科					
苧 麻	608 (253)	赤 車 使 者	609 (253)	水 英	610 (254)		
苧 麻	611 (254)						
		第一百〇六 桑 科					
波 羅 蜜	612 (254)	楮	613 (255)	大 麻	614 (255)		
栝 子	615 (256)	奴 栝	616 (256)	無 花 果	617 (256)		
天 仙 果	618 (257)	木 蓮	619 (257)	葎 草	620 (258)		
桑	621 (258)						

第一百〇七 榆科

榆	622 (259)	燕 莢	623 (260)	榔 榆	624 (260)
櫟	625 (261)				

第一百〇八 山毛櫨科

栗	626 (261)	柯 樹	627 (262)	橡 樹	628 (263)
櫟	626 (263)	櫟 樹	630 (264)	櫟 子	631 (264)
無 食 子	632 (265)				

第一百〇九 樺木科

樺 木	633 (265)	榛 子	634 (266)		
-----	-----------	-----	-----------	--	--

第一百一十 胡桃科

胡 桃	635 (266)	櫻香(化香樹)	636 (267)	必 栗 香	637 (268)
-----	-----------	---------	-----------	-------	-----------

第一百一十一 楊梅科

楊 梅	638 (268)				
-----	-----------	--	--	--	--

第一百一十二 楊柳科

柳	639 (268)	白 楊	640 (269)	水 楊	641 (269)
---	-----------	-----	-----------	-----	-----------

第一百一十三 金粟蘭科

及 已	642 (270)				
-----	-----------	--	--	--	--

第一百一十四 胡椒科

南 藤	643 (270)	蒟 醬	644 (270)	畢 澄 茄	645 (271)
華 芩	645 (271)	胡 椒	647 (272)		

第一百一十五 三白草科

蕺 菜	648 (273)	三 白 草	649 (273)		
-----	-----------	-------	-----------	--	--

II 單子葉植物

第一百十六 蘭科

白及	650 (274)	石斛	651 (275)	天麻(赤箭)	652 (275)
釵子股	653 (276)				

第一百十七 吳茱萸科

吳華	654 (276)
----	-----------

第一百十八 蓼科

山薑	655 (276)	益智子	656 (277)	高良薑	657 (277)
白豆蔻	658 (278)	豆蔻(草果)	659 (278)	草豆蔻	660 (278)
縮砂薑	661 (279)	薑黃	662 (279)	鬱金	663 (280)
山奈	664 (280)	蓬莪茂	665 (281)	薑荷	666 (281)
生薑	637 (282)	廉薑	663 (283)		

第一百十九 芭蕉科

甘蔗(香蕉)	66) (283)
--------	-----------

第一百二十 鳶尾科

射干	670 (284)	番紅花	671 (285)	蠶質	672 (285)
鳶尾	673 (286)				

第一百二十一 薯蕷科

薯蕷(山藥)(附薯蕷)	674 (286)	零餘子	675 (287)
土芋	676 (287)	草薺	677 (287)

第一百二十二 石蒜科

仙茅	678 (288)	石蒜	679 (288)	水仙	680 (289)
----	-----------	----	-----------	----	-----------

第一百二十三 百合科

薤	681 (289)	胡葱	682 (290)	冬葱	683 (291)
---	-----------	----	-----------	----	-----------

葱	684 (291)	山 韭	633 (291)	老 文 韭	685 (292)
山 蒜	687 (292)	韭	633 (292)	蒜	689 (293)
胡(大蒜)	690 (293)	蒼 葱	631 (294)	蘆 薹	692 (294)
知 母	693 (295)	天 門 冬	694 (295)	龍 鬚 菜	693 (296)
鈴蘭(君影草)	696 (296)	貝 母	697 (297)	薺 草	698 (298)
土 茯 苓	699 (293)	玉 簪	700 (299)	百 合	701 (299)
山 丹	702 (299)	麥 門 冬	703 (300)	蚤 休	704 (300)
王 孫	705 (301)	黃 精	706 (301)	萎 蕪	707 (302)
萬 年 青	708 (302)	菝 葜	709 (303)	鹿 藥	710 (303)
山 慈 姑	711 (303)	鬱 金 香	712 (304)	黎 蘆	713 (304)
		第一百二十四	百部科		
百 部	714 (305)				
		第一百二十五	燈心草科		
石 龍 芻	715 (305)	燈 心 草	716 (306)	地 楊 梅	717 (306)
		第一百二十六	雨久花科		
薺 草	718 (307)				
		第一百二十七	鴨跖草科		
鴨 跖 草	719 (307)	杜 若	720 (308)		
		第一百二十八	穀精草科		
穀 精 草	721 (308)				
		第一百二十九	浮萍科		
水 萍	722 (308)				
		第一百三十	天南星科		
白 菖 蒲	723 (309)	菖 蒲	724 (310)	海 芋	725 (310)
白 蔞 薺	726 (311)	山 躑 躅	727 (311)	斑 杖	728 (312)
虎 掌 蕪	729 (312)	芋	730 (312)	半 夏	731 (313)
野 芋	732 (313)				

第一百三十一 櫻櫚科

檳榔	733 (314)	大腹子	734 (315)	桃椰子	735 (315)
蘇木	736 (315)	麒麟竭	737 (316)	黃藤	738 (316)
省藤	739 (316)	櫻櫚	740 (317)	椰子	741 (317)

第一百三十二 莎草科

蒨草	742 (319)	崖櫻	743 (319)	莎草	744 (319)
蒨草	745 (320)	荆三稜	746 (321)	烏芋(芋薺, 地栗)	747 (321)

第一百三十三 禾本科

地筋	748 (321)	茅香	749 (322)	蜀黍(高粱)	750 (322)
蘆粟(小米)	751 (323)	蘆草	752 (324)	雀麥(燕麥)	753 (324)
慈竹	754 (325)	山白竹	755 (325)	茵草	756 (326)
薏苡	757 (326)	龍常草	758 (327)	芒	759 (327)
白茅香	760 (328)	大麥	761 (328)	糠麥	762 (329)
白茅	763 (331)	淡竹葉	764 (330)	粳	765 (331)
a.飯		b.粥		c.青精飯	(332)
d.餡餅	(332)	e.稻蘖(穀芽)	(332)	f.米批(米皮糠)	(332)
g.穀類	(333)	h.糯糖	(333)	稻(糯)	766 (334)
秈(早稻)	767 (334)	陳廩米	768 (335)	稗	769 (335)
稔子	770 (335)	稷	771 (336)	黍	772 (337)
狼尾草	773 (337)	蘆	774 (338)	竹	775 (338)
b.箐竹	(339)	c.淡竹	(339)	d.甘竹	(339)
A鬼齒	(340)	B竹筍	(340)	C酸筍	(341)
D仙人杖	(341)	E竹黃	(341)	甘蔗	776 (342)
A沙簕	(343)	B石蜜	(343)	箬	777 (343)
梁	778 (344)	秣	779 (344)	粟	780 (344)
狗尾草	781 (345)	菅茅	782 (345)	黃茅	783 (346)
小麥	784 (346)	A麥麩	(347)	B蒸餅	(347)
C麵粉	(348)	D麵筋	(348)	E麥麩	(348)

玉蜀黍	785 (349)	菰(茭白)	786 (350)	蓬草子	787 (351)
寒具	788 (351)	黃蒸	789 (351)	饊(棗)	790 (351)
蘗米	791 (351)	糲	792 (351)	a.酒糲	(352)
米酒	793 (352)	燒酒	794 (352)	醋	795 (353)
糲(粽,角黍)	796 (353)				

第一百三十四 水鼈科

龍石草	797 (313)	苦草	793 (354)
-----	-----------	----	-----------

第一百三十五 澤瀉科

澤瀉	799 (334)	慈姑	800 (355)
----	-----------	----	-----------

第一百三十六 香蒲科

香蒲(蒲黃)	801 (356)
--------	-----------

丑 裸子植物

第一百三十七 麻黃科

麻黃	802 (357)
----	-----------

第一百三十八 松杉科

琥珀	803 (358)	鑿	804 (358)	杉	805 (358)
檜	806 (359)	杜松	807 (361)	海松子	808 (46)
松	809 (361)	A ₁ 二鍼松	(361)	A ₂ 黑松	(361)
A ₃ 壽松	(361)	B三鍼松	(362)	C五針松	(362)
長松	810 (362)	柏(側柏)	811 (363)	羅漢柏	(363)

第一百三十九 紫杉科

紫杉	812 (364)	榧(榧子)	813 (364)
----	-----------	-------	-----------

第一百四十 銀杏科

銀杏	814 (365)
----	-----------

第一百四十一 蘇鐵科

鳳尾蕉(無漏子,鐵樹)	815 (368)
-------------	-----------

乙 羊齒植物

第一百四十二 卷柏科

卷 柏 86 (363)

第一百四十三 石松科

石 松 817 (366) 玉 柏 818 (267)

第一百四十四 木賊科

木 賊 819 (367) 問 荆 820 (367)

第一百四十五 蕨科(水龍骨科,石叢科)

鐵線草	821 (368)	石長生	822 (368)	貫衆(鳳尾草)	823 (368)
陰地蕨	824 (369)	水 蕨	825 (369)	烏 韭	826 (320)
狗 脊	827 (370)	螺 屨 草	828 (371)	海 金 砂	829 (371)
蘋	830 (371)	骨 碎 補	831 (372)	綿 馬	832 (372)
金星草	833 (372)	石 草	834 (372)	蕨	835 (373)
仙人掌草	836 (373)				

丙 蘚苔植物

第一百四十六 蘚苔綱

井 中 苔	837 (373)	船 底 苔	838 (373)	垣 衣	839 (374)
土 馬 鬣	840 (374)				

丁 同節植物

第一百四十七 地衣綱

石 蕊	841 (374)	耳石(靈芝)	842 (375)	桑 花	848 (375)
石 蘿	844 (375)	艾 芮	845 (376)	地 衣	846 (376)

第一百四十八 藻類

石 帆	847 (376)	陸 釐(髮菜)	848 (376)	鹿 角 菜	849 (377)
水 松	850 (377)	鷓 鴒 菜 (海 人 草)			851 (377)
乾 苔	852 (378)	石 花 菜	833 (378)	昆 布	851 (379)

海帶	855 (379)	海蘊	856 (380)	紫菜	857 (380)
海藻	858 (381)	石蓴	859 (381)		

第一百四十九 菌類

香蕈(香菇)	860 (382)	天花蕈	861 (382)	葛花菜	862 (383)
木耳	(附白木耳)		863 (383)	鷄攪	864 (384)
磨菰蕈	865 (384)	冬虫夏草	866 (385)	鬼筆	867 (385)
馬勃	868 (386)	芝	869 (388)	蘘菌	870 (387)
地耳	871 (387)	土菌	872 (387)	蛇菜	873 (387)
雷丸	874 (388)	茯苓	875 (388)	猪苓	876 (388)
杉菌	877 (389)	竹筴	878 (389)	栝耳	879 (389)
楊櫨耳	880 (389)	皂莢蕈	881 (390)	桑耳	882 (390)
桃寄生	883 (390)	槐耳	884 (391)	榆耳	885 (391)
柳耳	886 (391)	石刺木	887 (391)	麥奴	888 (392)
落葉松蕈	889 (392)	麴	890 (393)	神麴	892 (393)
紅麴	891 (393)	女麴	892 (349)		

附錄一 植物性加工品

兒茶	894 (394)	藤黃	895 (395)	元明粉	896 (395)
----	-----------	----	-----------	-----	-----------

附錄二 植物學名尙未明瞭者

占斯	897 (396)	赭魁	898 (396)	吉利草	899 (396)
葛車香	900 (396)	質汗	901 (397)	九仙子	902 (397)
城東腐木	903 (397)	秦荻	904 (398)	搗胡根	905 (398)
鵝抱	906 (398)	放杖木	907 (398)	伏鷄子根	908 (399)
鳳眼草	609 (399)	菊花參	910 (399)	紅海粉	911 (399)
淮木	912 (399)	甘藤	913 (400)	靈壽木	914 (400)
透骨草	915 (400)	落雁木	916 (400)	鹿目	917 (401)
馬尾蓮	918 (401)	木麻	919 (401)	辟虺雷	920 (401)
百葳藤	921 (401)	石荆	922 (402)	石瓜	923 (402)
兜納香	924 (402)	獨用將軍	925 (404)	紫金藤	923 (402)
醒酬	927 (402)	天仙藤	928 (403)	草歧	929 (403)
草犀	930 (403)	五子質	931 (897)	越王餘算	932 (403)

第二編 動物性藥品

甲 脊椎動物門

子 哺乳類綱

第一 人類

天靈蓋	933 (404)	亂髮(血餘)	934 (404)	人胞	(胞衣, 紫)
河車)	935 (405)	臍帶	936 (405)	乳汁	937 (405)
童便(人尿)	938 (406)	人中黃(人屎)	939 (406)	人中白	(溺白塗)
	940 (407)	秋石	941 (407)		

第二 猿類

猿膽	942 (407)	猿頭霜	942 (407)
----	-----------	-----	-----------

第三 翼手類

蝙蝠霜	943 (408)	夜明砂	944 (408)	寒號虫	(五靈脂)
	945 (408)				

第四 食蟲類

猬(猬皮)	946 (409)	鼯鼠	947 (409)
-------	-----------	----	-----------

第五 食肉類

熊膽	948 (409)	熊骨	949 (410)	熊掌	949 (410)
虎膽	950 (410)	虎骨	951 (410)	虎骨酒	951 (411)
狐膽	952 (411)	鼬鼠	953 (411)	獺膽	954 (412)
海豹油	955 (412)	海狗腎	(臘鼈獸)		956 (413)
靈貓香	957 (413)				

第六 齧齒類

狼尿	958 (414)	明月砂	959 (414)	海狸香	(附海狸香)
酒)	960 (414)				

第七 長鼻類

象牙	961 (415)	象皮	962 (415)
----	-----------	----	-----------

第八 有蹄類

鹿	963 (415)	鹿 茸	964 (416)	鹿 角	965 (416)
鹿 角 膠	966 (416)	鹿 角 霜	967 (417)	犀 角	968 (417)
羚 羊 角	969 (417)	麝 香	970 (418)	稠 厚 牛 膽	971 (418)
乾 燥 牛 膽	972 (418)	牛 脂	973 (418)	野 豬 膽	974 (419)
豬 膽	975 (419)	酥	976 (419)	酪	977 (420)
乳 腐	978 (420)	阿 膠	979 (420)	黃 明 膠	980 (421)
白 明 膠	981 (421)	馬 骨	982 (422)	馬 頭 骨	983 (422)

第九 遊水類

龍 涎 香	984 (422)	鯨 蠟	985 (422)	鱈 魚 (人 魚)	
(孩兒魚)	986 (423)				

第十 常節類(貧齒類)

穿山甲(鱗鯉) 987 (423)

丑 鳥類綱

第十一 猛禽類

鴛霜(鴟霜) 988 (424)

第十二 燕雀類

白 丁 香 (雄 雀 糞, 雀 尿) 989 (424) 高 雀 990 (424)

第十三 攀禽類

啄 木 鳥 991 (425) 杜 鵑 (杜 宇) 992 (425)

第十四 鴉鷂類

雞	993 (425)	雞 子	994 (426)	卵 黃	995 (427)
雞 肝	993 (428)	雞 內 金	997 (428)		

第十五 遊禽類

鷓 鴒 998 (428)

寅 爬虫類綱

第十六 龜鼈類

璫 瑁	998 (429)	鼈甲(鼈油)	999 (429)	龜 甲 (龜板 , 龜板膠)	1000(430)
-----	-----------	--------	-----------	----------------	-----------

第十七 蛇 類

白 花 蛇 (百步蛇 , 蕘蛇)	1001(430)	烏 蛇	1002(431)
蛇 蛻	1003(431)	蝮 蛇	1004(431)
		蛤 蚧	1005(432)

卯 兩棲類綱

第十八 有尾類

鯢 魚	1006(432)
-----	-----------

第十九 無尾類

山 蛤	1007(432)	蝦 蟆	1008(433)	蟾 蜍	1009(433)
蟾 酥	1010(433)				

辰 魚類綱

第二十 硬骨類

海 馬	1011(434)	河 豚	1012(434)	石 首 魚	1013(435)
鯉 魚	1014(435)	鱧魚(烏鱧)	1015(436)	鰻 魚	1016(436)
鱖魚(泥鰍)	1017(436)	鮠 魚	1018(437)		

第二十一 硬鱗類

鱒魚(白鱒)	1019(437)	鱖 魚	1020(437)	鱒魚(鮭魚)	1021(437)
魚 膠	1022(438)				

乙 節足動物門

子 昆蟲類綱

第二十二 膜翅類

精製蜂蜜	1023(439)	黃蠟(蜜蠟)	1024(439)	白 蠟	1025(439)
------	-----------	--------	-----------	-----	-----------

露蜂房	1026(440)				
		第二十三	鞘翅類		
斑蝥	1027(440)	芫菁	1128(441)	葛上亭長	1029(441)
地膽	1030(441)	蜚蠊	1031(441)		
		第二十四	鱗翅類		
白殭蠶	1032(442)	蠶沙	1033(442)		
		第二十五	雙翅類		
五穀虫	1034(443)	栲雞	1035(443)	九香蟲	1036(443)
廣虫	1037(444)				
		第二十六	半翅類(有吻類)		
蟬蛻	1038(444)	蟲白蠟	1039(444)		
		第二十七	直翅類		
蝻	1040(445)	螳螂	1041(445)	桑螵蛸	1042(445)
		丑	多足類綱		
		第二十八	蜈蚣類		
蜈蚣	1043(446)				
		寅	蜘蛛類綱		
		第二十九	蝎類		
蝎	1044(446)	蜘蛛	1045(448)		
		卯	甲殼類綱		
		第三十	節甲類		
鼠婦	1046(448)				
		丙	軟體動物門		
		子	頭足類綱		
		第三十一	二鰓類		

烏 章	賊 魚	1047(448) 1050(449)	烏 賊 油	1048(449)	烏 賊 骨	1049(449)
			丑 腹足類綱			
			第三十二	有肺類		
蝸	牛	1051(450)	蛞 蝃	1052(450)		
			第三十三	前鰓類		
石 蓼	決 贏	1053(451) 1056(452)	貝 子 海	1054(451) 1057(452)	田 贏 蝸贏(螺螄)	1055(452) 1058(453)
			寅 瓣思類			
			第三十四	單柱類		
牡	蠣	1059(453)				
			第三十五	同柱類		
	蜆	1060(453)	文 魁	蛤 蛤	1061(454) 1064(455)	蚌 1062(454)
淡	菜	1063(455)				
			第三十六	異柱類		
眞	珠	1065(455)				
			丁 蠕形動物門			
			子 毛足類綱			
			第三十七	蛭蚓類		
蚯	蚓	1066(456)				
			丑 環蟲類			
			第三十八	蛭類		
水	蛭	1067(457)	a. 水蛭浸膏	1068(458)		
			戊 棘皮動物門			

第三十九 沙磧類

沙 磧 1069(458)

第四十 海星類

海 燕 1070(458)

已 腔 腸 動 物 門

珊 瑚 1071(459)

第四十一 雜 類

海 參 1072(459) 燕 窩 1073(460) 魚 翅 1074(461)

第三編 礦物性藥品

第一 元素類

硫 黃	1075(462)	鋁	1076(464)	錫	1077(464)
白 然 銅	1078(463)	金	1079(463)	銀	1080(466)
水 銀	1031(468)	鐵	1082(463)	鐵 華 粉	1083(469)
石 炭	1084(420)	金 鋼 石	1083(470)		

第二 氧化物

代 赭 石 (赭 石)	1086(471)	磁 石 (茲 石)	1087(471)	鉛 丹	1088(472)
密 陀 僧	1089(472)	無 名 異	1090(472)	砒 石	1091(473)
馮 餘 糧 (太 乙 餘 糧)			1092(473)		

第三 硫化物

雄 黃	1093(474)	雌 黃 (雞 冠 石)	1094(474)	辰 砂	1095(474)
銀 朱	1096(475)	礬 石	1097(475)		

第四 氯化物

食 鹽	1098(475)	戎 鹽	1099(476)	光 明 鹽	1100(476)
礪 砂	1101(476)	輕 粉	1102(477)	甘 汞	1101(477)

第五 矽酸鹽

雲 母	1102(478)	白 石 英	1104(478)	紫 石 英	1105(478)
-----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

礞石(青蒙石) 1105(479)	瑪 腦 1106(479)	金 星 石 1107(476)
陽 起 石 1108(479)	浮 石 1109(480)	滑 石 1110(480)
石 脂 1111(480)	伏 龍 肝 1112(481)	

第六 硼酸鹽

蓬砂(硼砂) 1113(481)

第七 硫酸鹽

石 膏 1114(481)	明 礬 1115(482)	鐵 明 礬 1115a.(482)
綠 明 礬 1115b.(482)	綠礬(青礬) 1116(482)	膽 礬 1117(483)
皓 礬 1118(483)	凝 水 石 (寒 水 石) 1119(483)	
朴消(芒硝) 1120(484)	玄 精 石 1121(484)	

第八 硝酸鹽

消 石 (硝 石 , 焰 消) 1122(485)

第九 碳酸鹽

白 堊 1123(485)	鉛粉(白粉) 1124(486)	石 鐘 乳 1125(486)
白 堊 1126(486)	方 解 石 1127(487)	石 灰 1128(487)
綠 青 1129(488)		

第十 有機物

石 腦 油 1130(488)

第十一 雜 類

墨 1131(489)	百 草 霜 1132(489)	釜 臍 墨 1133(490)
冬 灰 1134(490)	不 灰 木 1135(490)	石 鹼 1136(491)
扁青(回青) 1137(491)	花 乳 石 1138(492)	

第十二 化石及結石

龍 骨 1139(492)	牛黃(丑寶) 1140(493)	馬 糞 石 1141(493)
石 燕 1142(494)	石 蟹 1143(494)	

補 遺

苦 參 子 1144(495)	髮 菜 1145(495)	葛 仙 米 1146(496)
-----------------	---------------	-----------------

國藥提要

Summarium Medicamentorum Sinicorum

第一編 植物性藥品

MEDICAMENTA VEGETABILES

甲 種子植物 SPERMATOPHYTA

子 被子植物 ANGIOSPERMAE

I 雙子葉植物 DICOTYLEDONAE

第一 菊科 COMPOSITAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1.	蒼 (本草15)	Achillea sibirica. Ledeb. Ptarmica sibirica Ledeb. (Achillea millefoli- um L. 西洋蒼草)	種子 葉	西洋蒼草成 分： 全草： Achillein, Aconitic acid Inulin. Asparagin Ess. Oil (Cineol, Chamazul- en)	蒼草及花爲強 壯劑，又爲痔 藥用	河北北平，山 東曲阜孔林， 雲南大理點蒼 山，湖北，江 蘇 (原產地歐洲)	博物志言蒼 千歲而三百 莖，因此草 多壽故從蒼 。 英法瑞士藥 典採用西洋 蒼草。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
2.	惡 質 (本草15) 別名：牛 蒡，大力 子，蒡翁 菜，鼠粘 ，便牽牛 蝟蝟刺。	Arctium Lappa, L. A. majus, schk.	種子 根 葉， 莖	Arctiin (gl) Fatty Oil 25% Inulin 45% Phytoster in Arginin Adenin 0.0285% Ess. Oil Vitamin C.	根為利尿劑， 驅風劑，瀉劑 。牛蒡子為利 尿劑，治浮腫 及咽喉疼痛腫 脹，解瘡毒虫 毒蛇毒并能化 膿，又治頸淋 巴腺結核，對 瘡疹有快發散 作用。一日用 量8gm為煎劑 。	陝西南鄭，湖 北宜昌，河南 禹州，雲南昆 明，浙江，四 川，山東，北 平，北口外， 關東等田園中 盛行栽培之。 (原產地歐洲)	其實狀惡而 多刺鉤，故 名惡質。 英美藥典 採用牛蒡根
3.	黃 花 蒿 (本草15) 別名：臭 蒿，草蒿 ，邪蒿。	Artemisia annua, L.		葉含精油， 主成分為 Artemisa- keton, Isoartem- isiaketon, l camph- er, Cadinen, Caryophy- llen, Sesqui-ter pen alco hol.	乾莖葉為煎劑 ，有健胃之效 ，揉生葉取汁 ，治疥癬惡瘡 及毒虫。	江蘇，浙江， 福建，湖北， 甘肅，河北， 遼寧。	此蒿色綠帶 淡黃，故名 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
4.	青 蒿 (本草15) 別名：方 潰，葍， 狝蒿，香 蒿，野薺 蒿。	A. apiac- ea, Hce. (A. abrot- anum Th)	葉 根 種子	Bitter Substan- ce, Ess. Oil Abrotani- ne (alk.)	1) 為退熱劑， 止盜汗。 2) 為止血劑， 治鼻中衄血 及便血。 3) 為殺虫劑， 治疥瘡癩瘡 及蜂毒。	江蘇，浙江， 福建，廣東， 湖北，河北， 山東，東北各 省。	蒿草之高者 也。諸蒿葉 背皆白，而 此蒿獨青， 異於諸蒿故 名。
5.	茵 陳 蒿 (本草15) 別名： 茵 陳	A. Capill- aris Th. (A. apiac- ea, Hce) (Artemis 為古代希臘 之女神 Capillaris 其葉細裂如 毛線之意)	莖 葉	草： Ess. Oil (β -1 inen- Capillen) 果實： Dimethyl- aesculetin	1) 治黃疸有效 。 2) 為利尿劑。 3) 為驅虫劑。 一次量 10--20gm	江西吉安，湖 北漢陽黃州， 雲南昆明，安 徽，山東，遼 甯，蒙古。	冬不死，更 因舊而生， 故名因陳， 後加蒿字耳 。
6.	牡 蒿 (本草15) 別名：齊 頭蒿，水 辣菜，蕒	A. Japoni- ca Th.	苗		為煎劑，治疥 瘡等皮膚病。	生山野田疇間 。	爾雅蒿牡蕒 蒿之無子者 ，則牡之名 ，以此也。
7.	菴 闞 (本草15) 別名： 覆 闞	A. keiske- ana, Mig	子		1) 為強壯劑， 治陰痿不起 2) 為通經劑。 3) 治風溼。	廣東韶州，江 蘇，安徽，東 北各省。	菴草屋也， 闞里門也， 此草乃蒿屬 ，老莖，可以 覆蓋菴闞 ，故以名之 。

【新藥】
Ictemin
治肝臟膽道及
浮腫。

【藥理】本品
之水浸液，
有促進膽汁
之分泌作用
。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
8.	白 蒿 (本草15) 別名：藜，藟，山胡，藜蒿。	A. Stellariana, Bess.	雷根莖		1) 爲健胃劑。 2) 爲殺蟲劑，治惡瘡癩疾。	產於各地	葉頗似細艾，上有白毛，錯澀粗於青蒿，從初生至秋白於紫蒿，故名。
9.	艾 (本草15) 別名：冰台，醫草，黃草，艾蒿，蓬。	A. Vulgaris, L. var. indica, Max. 【藥理】艾葉，有解熱之效，因其中含有 KCl 及 Tannin。	葉根	0.02% Ess. Oil (Cineol, α -Thiyon) Cholin, Adenin Vitmm-A. B. C. Inulin, Resin Tannin, KCl.	葉爲止血劑，治寒性虛脫性出血有效。一次量 5—10 gm. 又治腹痛氣喘解熱止瀉。	產於各地 (祁州附近西山北平，湖北新春) (原產歐洲)	艾爲艾絨之原料。有稱祁艾者，爲祁州產之艾。
10.	女 菀 (本草16) 別名：白菀，織女菀，女復，茆	Aster fastigiatus, Fisch. et Max.	根		1) 治霍亂下痢。 2) 治咳嗽。	江蘇，湖北，山東，東北各省，浙江海寧，鎮海，蘭谿。	其根似女體柔婉故名。
11.	東 風 菜 (本草27) 別名：冬 風	A. Scaber, Th.	草		治頭痛目眩。	河北，湖北，廣東，東北各省。	此菜先春而生，故有東風之號，一作冬風，言之得冬氣也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
12.	紫 菀 (本草16) 別名：青菀，返魂草，紫萸，夜牽牛	Aster tataricus L.	根	Astersapoin $C_{28}H_{44}O_{10}$ Shionon. $C_{34}H_{56}O$, Quercetin (邦藥)	爲鎮咳祛痰劑，治慢性氣管炎及消散喉頭之腫脹。 一次量 1—3—6gm	安徽亳州，河北，東北各省。	其根色紫而柔宛，故名紫菀。產於亳州者，稱毫紫菀。
13.	馬 蘭 (本草14) 別名：紫 菊，紺 菊，嫩尖名馬蘭頭。	A. trinervius, Roxb A. indicus L.	葉	0.1% Ess. Oil	1) 爲止血劑，對熱性病出血有效。 2) 爲解毒劑，解菌毒，蟲毒，毒蛇咬傷。	河北，山東，湖北，廣東。	其葉似蘭而大，花似菊而紫，故名。俗稱物之大者，爲馬也。
14.	朮 (本草12) 別名：蒼朮，白朮，山薊，抱薊，山薊，山連，馬薊，吃力伽，赤朮，仙朮，山精，於朮，茅朮，湖廣朮，江西朮，	Atractylis lancea. Thunb (蒼朮) A. lyrata sieb. et zuce. (關朮) A. koreana kitamura (鮮蒼) A. Japonica koidz (新蒼，梵蒼，日蒼)	根	1.5% Ess. Oil (Atractylol; atractylon) Vitamin A. Inulin.	蒼朮爲利尿發汗健胃消化劑，治水腫排尿困難，慢性胃炎，腸炎，又治頭痛。 一次量 1—3gm. 白朮無發汗之效，有止汗之功。	朮產於河北山西陝西及中部各省(尤以江蘇鎮江句容之茅山最爲道地) 故有茅朮之名) 東北各省朝鮮日本等地。 白朮產於浙江於潛，仙居，皖南黃山，江西修水及湖北(產於修水者稱天生朮)	按六書本義，朮字篆文，象其根幹枝葉之形。拉丁名 Atractylis 爲紡錘之意，乃根之形狀。Ovata 謂葉卵圓形之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
	翻朮，鮮蒼，楚蒼，日蒼。(白朮，於朮，山朮，居朮，廣朮，江西朮)	A. Ovata Thunb. A. chinensis, Siebold.		【藥理】蒼朮精油，對金線蛙少量，呈鎮靜作用，大量對中樞神經呈麻痺作用，由呼吸麻痺而致死。			
15.	鬼 錢 草 (本草16)	Bidens pilosa, L. B. parviflora, Willd. B. bipinnata, L.	草		1) 爲解毒劑，治蜘蛛蛇蠍咬傷，取草絞汁服，併塗之。 2) 爲下痢及解熱藥。	河北，湖北，江西，廣東。	此草之腳著人衣如針，北人謂之鬼針，南人謂之鬼釵。
16.	狼 把 草 (本草16) 別名： 郎郎草	B. tripartita, L.	草		治赤白痢 止盜汗	湖北，河北，福建，廣東。	閩人呼參爲郎罷，則狼把當作郎罷也。
17.	艾 納 香 (本草14) 別名：艾片，冰片 艾腦香	Blunnea balsamifera, Dc. (Conyza, b. L.)	莖，葉	0.2-1.88% Ess. Oil (1-Borneol, 1-Campher, Cineol) Phloroacetophenone dimer thylather	爲發汗祛痰藥，又對於食傷，霍亂，中暑胸腹絞痛，亦有效。	生於廣東，福建，台灣，婆羅洲，海南等地池沼中。	本品葉似細艾，可和諸香燒之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
18.	金 盞 草 (本草16) 別名：香葉草 長春草 金盞花， 金仙花	Calendula-officialis, L. C. arvensis, L.	花 草	Salicylic acid, Ess. Oil Calendulin (苦味質) Carotin (色素)	為利尿，發汗，緩下，通經藥。又為興奮及變質劑。	江蘇	金盞，其花形也，長春言耐久也。
19.	飛 廉 (本草15) 別名：漏盧，木禾，飛雉，飛輕，伏兔，伏猪，天薺。	Carduus crispus, L.	根 及 花		治感冒咳嗽。	四川，東北各省，北方各省。	飛廉，神禽之名也，其狀鹿身豹文，雀頭蛇尾，有角能致風氣，此草附莖，有皮如箭羽，復療風邪，故有諸名。
20. a.	天 名 精 (本草15) 別名：天隻菁，天門精，地蕊，玉門精，麥句齒，豕首草，蠓蠟，鱗母，芥，蘭草，草，菜，草，神草，劉謹草	Carpesium abrotanoides L. (C. cernuum L.) C. macrocephalum Franch et Sav. 朝鮮天名精)	莖 葉	0.25% Ess. Oil Inulin	花葉果實根等內服，治腹痛及蛔蟲驅除用。一次量 2—5gm	江蘇，廣東，湖北，河北，東北各省，朝鮮。	實名鶴蟲，根名杜牛膝。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
20. b.	鶴虱 (本草15) 別名：南 鶴虱	Carpesium abrotans ides, L. (1) Lappu'a anisacan- tha Gurke (2)	實果	【藥理】試驗 結果，對於 殺除蚯蚓， 尤有卓效。	為蛔蟲，絛蟲 驅除藥。	(1) 江蘇上海 ，湖北宜昌， 四川巴東，東 北各省，台灣 。 (2) 河北，山 東。	第二種原植 物屬紫草科 。
21.	紅藍花 (本草15) 別名：紅 花，黃藍 草，紅花 ，南紅花 。	Carthamus tinctorius L.	花	花含Safflor- -gelb (黃色素) 20—30% Carthamin (紅色素) 0.3—0.6%	有通經及陣痛 催進之效，并 治分娩時眩暈 。 一次量 0.5—3gm	西藏，河南， 湖南，浙江， 埃及(原產地) 波斯，東印度 ，南歐，北非 ，美洲，日本 。	其花紅色， 葉頗似藍， 故名。 Carthamus 染色之意， tinctorius， 染色用之意 。
22.	石胡荽 (本草20) 別名： 天胡荽 野園葵 鷺不食草 鵝腸草	Centipeda minima, Kuntze. (1) (C. orbi- cularis, Lour) (2) (Myriogy- ne mim- uta,	草	Ess. 0.1 Myriogy- nic acid Bitters, Vitamin A	1) 為眼科藥， 去目翳散目 赤腫。 2) 為痔病藥， 療痔瘡腫痛 。 3) 治一切腫毒 。	生於山東，廣 東，江西等省 池沼中。	石胡荽，生 石縫，狀類 胡荽，故名 。 第四種以下 原植物，屬 繖形科。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		Less) (3) 附錄Hydr- ocotyle rotundif- olia, Roxb (4) (H. sibth- orpiodes Lam.) (5) (H. asiati- ca, St) (6)	根	Vellarin, Vit. C ₁			
23.	荷 荷 (本草26) 別名： 蓬 荷 春 菊	Chrysan- themum Cononari- um L. (C. Rox- lurghii, D. sf.) (C. Seget- um, L.)	莖 葉	Adenine Choline Vit. C (本新)	為祛痰劑， 健胃劑， 又用於感冒及 眼科。	處處有之。	形氣有似乎 蓬蒿故名。
24.	九 牛 草 (本草15)	C. Decais- neanum. Matsum.	草		治痛風	江西萬安 (古筠州)	
25.	除 蟲 菊 (藥植)	Chrysan- themum cinerarii folium Eocc. 白花除蟲菊 C. roseum web et Mohr. 紅花除蟲菊	花	Pyrethrin I. Pyrethrin II. (為 Pyret- hron 及 chrysan- themum saeure 之 Ester)	1) 花為殺蟲藥 ，治蚤虱臭 (奧大利原產) 蟲及一切皮 膚病。 2) 為蚊香原料 。	白花除蟲菊， (秘魯原產) 福建永安漳浦 龍岩，浙江定 海，四川重慶 均有。	農用殺蟲劑 ：取花二兩 ，以石油一 升浸二日， 所得濾液， 和皂肥粉12 —15錢，以 水5合為乳 劑，臨用再 稀釋二至五 倍。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
26.	千年艾 (本草15)	<i>C. Decaisneanum</i> Max.	葉		為強壯劑，男子虛寒，婦人血氣痛，煎水服之。	湖北均縣(武昌)	
27.	野 菊 (本草15) 別名： 苦 蕒	<i>C. Indicum</i> . L.	花 葉	全草中含精油主成分為樟腦狀結晶及炭化氫(邦藥)其色素為 Anthocyanin (本新)花之赤色部分含 Chrysanthemum (gl.) (植研)	1)花之精油可治霍亂，并止腹痛，又為創傷之防腐劑。 2)治癰疔及頸淋巴腺結核。內服量 2—5gm	浙江杭州，江蘇鎮江，北平先農壇，蒙古，東北各省。	野菊，即黃菊花。
28.	菊 (本草15) 別名：節華，女節，(甘菊)女華，女蕒，日精，更生，傳延年，治臚，金蕊，陰成，周盈。	<i>Chrysanthemum sinense</i> , Sab.	全草 花 葉	Adenine, Choline, Stachydrine Vitamin A 0.16% Ess. Oil (綠色)	1)花治頭痛及眩暈。 2)為眼科藥，治綠內障有效。	浙江杭州，安徽亳州，河南懷慶，河北，湖北，廣東。	菊本作蕒，從鞠，籜窮也。禮記月令，九月菊有黃華，華事至此而窮盡，故謂之蕒。菊花有杭菊花(杭甘菊)，白菊花，滁菊花等數種。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
29.	苦 蕒 (本草15) 別名：鉤 蕒，苦根 。	Cnicus chinensis Maxim (Cirsium chinense, G. & C.) (Carduus lanceola- tus, Lour.)	苗		1) 面目通身漆 瘡，燒灰傅 之。 2) 煎湯洗痔有 效。	生於濕地	凡物釋曰蕒 其味苦，嫩 時可食，故 以名之。
30.	小 蕒 (本草15) 別名：貓 蕒，刺蕒 ，山牛蒡 ，鷄頭草 ，千錢草 ，野紅花	C. japoni- cus Max. (Cirsium japonicu- m, DC.)	根 草		1) 絞汁服，破 宿血，生新 血。 2) 又治蜘蛛及 蛇蠍毒。	河北，張家口 ，山東，江蘇 ，福建，湖北 ，四川。	蕒猶髻也， 其花如髻， 莢多刺。
31.	大 蕒 (本草15) 別名：虎 蕒，馬蕒 ，刺蕒， 山牛蒡， 鷄頭草， 千錢草， 野紅花， 山蕒，鬼 蕒。	Cnicus spicatus Max. (Cirsium Spicatum, Matsum) (C. Pend- ulus, Max.) (C. Seget- um, Bange)			1) 根及葉為利 尿劑，又為 止血劑，治 熱性出血病 。 2) 葉治腸癰， 腹臟瘀血， 研酒服之， 又治惡瘡疥 癬。	產於河北，(如北平之西 小五台山， 海關，塘沽) ，山東芝罘， 江蘇上海蘇 州，江西九 江，湖北宜 昌，廣東從 化清遠。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
32.	漏 蘆 (本草15) 別名：野 蘭，莢蒿 ，鬼油麻 。	Centaurea monanth- us Georgi(1) Echinops dahnricus Fisch (2)	全草	Ess, Oil 0.1%	爲排膿止血藥 ，治諸瘡痛風 打撲疔膀胱及 腎臟出血直腸 出血等， 一次量 4—10gm	(1) 爲祁州漏 蘆，產於河北 ，山西，熱河 ，東北各省， 朝鮮。 (2) 爲禹州漏 蘆，產於河北 ，河南，山東 各省。	屋之西北黑 處謂之漏， 凡物黑色謂 之虛，此草 秋後即黑異 於衆草，故 名。
33.	鱧 腸 (本草16) 別名： 蓮子草， 旱蓮草， 金陵草， 墨煙草， 墨頭草， 糊猴頭， 豬牙草， 墨菜。	Eclipta alba, Hassk. (E. prost rata, L.)	全草	Ess. Oil. Tannin, Bitters, Ecliptine, Vitamin-A	治血痢，止血 排膿，傳一切 瘡。	自河北至山東 等地，隨處有 之。	鱧烏魚也， 其腸亦烏， 此草柔莖， 斷之有墨汁 出，故名， 俗呼墨菜是 也。
34.	蘭 草 (本草14) 別名：水 香，香水 蘭，千金 草，香 草，前 澤草， 省頭草， 都梁香 ，燕尾香 ，大澤 ，蘭澤草 ，蘭， 蘭， 蘭， 蘭。	Eupatori- um, chinense. L. E. Lindle yanum. DC.	全草	Ess. Oil 0.4%	爲利尿，通經 ，黃疸，肺病 ，解熱及神經 痛，癱瘓質斯 等藥。	河北，山東， 江西，湖北， 廣東。	葉似馬蘭， 故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
35.	澤 蘭 (本草14) 別名：水香，都梁香，虎蘭，龍耑，孩兒蘭，風藥。	<i>E. japonicum</i> Th.	葉子根	Ess. Oil. 0.1%	1) 爲婦科要藥，治胎前產後諸症。 2) 爲水腫外傷腫物之外塗藥。	浙江，江蘇，福建寧化，湖北，山東。	本品生於澤旁，故名澤蘭。
36.	鼠 麴 草 (本草16) 別名：米麴，鼠耳，佛耳草，無心草，香茅，黃蒿，茸母。	<i>Gnaphalium multiceps</i> , Wall. (<i>G. luteoalbum</i> L. Var. <i>multiceps</i> , H.)	根葉根		止咳化痰，并治氣喘及氣管支炎。	江蘇，浙江，四川，福建，江西，湖北，廣東。	麴言其花黃如麴色，又可和米粉食也，鼠耳，言其葉形如鼠耳。
37.	三 七 (本草12) 別名：山漆，金不換	<i>Gynura pinnatifida</i> , DC. (<i>G. japonica</i> , Mak)	根葉		1) 爲止血要藥，凡金及箭傷，跌撲杖傷，出血不止者，取根葉絞汁塗之，或爲末搽之，其血即止。又治吐血，衄血，下血，血痢，經水不止，產後惡血不止，一次取8gm煎服。 2) 虎咬，毒蛇咬，蜂刺傷，取汁塗之	廣西田州，湖北，廣東，雲南，湖北，山東，浙江，福建長汀連城。	本品能令金瘡如漆黏物，故名，又其葉左三右四，遂名之三七也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
38.	天 葵 子 (本草15) (花鏡) 別名： 向日葵， 草天葵。	Helianthus annus. L.	種子 花	Fatty Oil 22.2—36. 5% Vitamin A Xanthophyll. C ₄₀ H ₅₆ O ₂ (黃色素)	種子供食用及 榨油用，脂肪 油，為肥料及 塗料用，其醃 劑，治瘧疾及 熱性病用。	各地田園村莊 中栽培之。 (原產地美洲 中部)	花序有向日 光傾斜之性 ，故俗名向日 葵。
39.	旋 覆 花 (本草15) 別名：金 沸草，盜 庚，金錢 花，滴滴 金，夏菊 ，戴椹。	Inula britannica, DC. (I. chine- nsis, Rupx.) (I. Japoni- ca, Th.)	根 葉 花	Inulin Flavone	花為健胃藥， 治胃部膨滿噯 氣等。 葉及根治切傷 ，疔毒等。 一次量 1—3gm		花緣繁茂圓 而覆下，故 曰旋覆。
40.	木 香 (本草14) 別名： 土木香， 川木香， 廣木香。	Inula Helenium L. 土木香，青 川木香， 木香 (1) Inula racemosa Hook. f. 木香，川木 香 (2) Saussurea Lappa Clarke.	根莖 及 根	Inulin 44% Bitters Ess. Oil 0.3—2.8% (Aplotax- en, α - β -Cas- ten Alantolac- ton, Dihydroa- lantolac- ton,	為緩和利尿， 發汗防腐，驅 蟲，健胃劑， 一次量2—5gm 木香根與水蒸 溜，所得之土 木香腦 Hele- nin 防腐力甚 強，并治瘧疾 ，霍亂，結核 性下痢，慢性 氣管支炎，一 日服數次，每	木香產西藏， 希馬拉耶山， 印度之克什米 爾(Kashmir) 敘利亞等處， 名番木香，味 濃厚，有產四 川者，名川木 香，味清淡， 木香由廣州輸 入，有廣木香 之名。	木香草類也 ，木名蜜香 ，因其香氣 如蜜也。 Inula 為拉 丁古名 Helenium 為舊屬名， 花之圓形如 太陽 (Helios) 然。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		土木香，(法國及美國藥典採用) (3) Aucklandia Costus, Falk. 廣木香，南木香 (4) Rosa Banksiae, R. Br. 此原植物屬薔薇科 (5)		Alantol. Costol, Camphen. Phellandren)	次用 0.01gm 爲散劑，丸劑或酒精溶液後服用。 【藥理】土木香精油中之主成分 Alantolacton 之 0.1% 文葛乳劑，能使豚之蛔蟲在二小時內死滅。		
41.	仙人杖草 (本草27)	Lactuca laciniata, Mak. forma indivisa, Mak.	草		爲祛痰劑，強壯劑。	四川劍南 (劍閣之南)	
42. a.	萹 苣 (本草27) 別名： 萹 菜， 千金菜， 千層剝， 黑苣藤子， 白苣藤子。	L. Sativa, L. Var. Capitata Hor.	全草 根 種子	Lactic acid. Vitamin A. Ess. Oil Lactucarium, Malic acid Succinic acid Ash 0.7% (Cu, I) Vit. A, B, C2 E Asparagin. Mannit (食植)	古方主治下乳汁，通小便，治陰腫痔漏，下血損傷作痛等症。因含 Vitamin C, E. 可治敗血症，兼有止血，清血及治腳氣病之功效。	歐洲原產，各地菜園栽培。藥生食西菜館，多賞用之。	本品爲食療本草之要藥，萹菜有傳自高國來者。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
42. b.	白 苣 石苣， 生菜	L. Scariola, L, Var. Sativa Bisch.		Vit. A, B, C, D, E.	有抗佝僂病性 效力。	處處有之。	白苣似葛苣 葉有白毛。
43.	黃 瓜 菜 (本草27) 別名： 黃花菜	L. thunber giana, Maxim. (Lampsana Apogono ides. Max.)			利腸胃， 通結氣。	生田澤。	其花黃，其 氣如瓜。
44.	鬼 督 郵 (本草13) 別名： 獨搖草	Macrolini diun Verticilla- tum Fran.			治臟躁症 (Hysterie)	隨處有之。	此草獨莖而 葉攢其端， 無風自動， 故曰鬼獨搖 草，後人訛 爲鬼督郵耳 ，因其專主 鬼病猶司鬼 之督郵也。
45.	狗 舌 草 (本草16)	Senecio campestris DC.	草		爲殺虫劑，治 虫疥癬瘡。	生河北，江蘇 ，浙江，江西 ，湖北，四川 等省渠塹溼地 。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
46.	薇 銜 (本草15) 別名：麋銜，無心，吳風草，鹿銜，承膺，承臍。	S. nikaensis Miq. (S. palmatus Poll.) (S. nemorensis. L.)	葉		治風溼，癱瘓。	河北，陝西。	薇銜當作麋銜，傳鹿有疾，銜此草即癒也。
47.	千 里 及 (本草18)	S. scandens. (S. chinensis. Dc.)	藤		1) 治療瘡，蝨毒。 2) 治赤痢，腹痛。 3) 敷蛇，犬咬傷。	浙江天台山及江蘇，湖北，廣東。	
48.	豬 蕪 (本草15) 別名：希仙，火炊草，豬膏母，虎膏，狗膏，黏糊菜，亞婆針，西蕪，母豬油。	Siegesbeckia Orientalis, L. (S. brachiata, Roxb) (S. pubescens. Mak.)	草 葉	Darutin (苦味質)	1) 為痛風要藥，一次服2—5gm。 2) 蛇及蜂等之咬刺傷，以新鮮之葉貼布之。	處處有之，福建永安最多。	韻書楚人呼豬為豬，呼草之氣味辛毒為蕪，此草氣臭如豬，而味蕪螿，故謂之豬蕪。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
49.	劉寄奴草 (本草15) 別名：夕 句，乃東 ，燕面， 鐵色草， 金寄奴， 六月雪。	Solidago. Virga- aurea, L.	草	Ess. Oil 0.43% Saponin	1) 治產後餘疾 。 2) 爲止血藥， 治金瘡，出 血性下痢， 腸出血，血 尿等。 一次量3gm	浙江，山東， 東北各省。	本品爲宋高 宗劉裕所發 明，其小字 寄奴，故名 。
50.	一枝蒿 (拾遺5)	Solidago Virga- aurea L. (一枝黃花 ：植考) Erigeron canadensis L. (野塘蒿之 一種：藥)			治腎臟膀胱及 其他之泌尿器 病。	原出新疆巴里 坤之深山間。	本品一輩出 土，無枝葉 ，氣味如蒿 ，故名。
51.	苦 菜 (本草27) 別名： 苦蕒	Sonchus oleraceus, L. (S.ciliatus Lam.) (a) Lactu- ca denti- culata, Max.	菜 根 子 花		1) 爲健胃劑， 2) 爲殺虫劑， 治惡瘡及沙 虱毒，又敷 蛇咬(以上 用菜)。	四川，湖北， 江蘇，廣東。	苦菜以味名 也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
52.	蒲公英 (本草22) 別名：黃 花地丁， 金簪草， 稱釋草。	Taraxacum Officinale Wigg.		Inulin, Lactulin, Taraxacin, Taraxacerin, Inosite, Resin, Asparagin P-Hydroxyphenyl-acetic acid, 3,4-Dioxy cinnamic acid, Taraxasterol, Homotaraxasterol, Cluytianol Cholin, Vits. A ₂ , B ₂ , C, Xanthophyll (黃色色素)	爲解熱、發汗、健胃、強壯、變質藥，又治療瘡(乳汁)蛇咬(貼布)。葉爲催乳藥。	產於河北小五台山、北戴河、宣化、張家口、蒙古、東北各省，今各地有之。以T. mongolica 種爲普通。	製劑；有浸膏流浸膏，複方蒲公英醃等。
53.	款冬花 (本草16) 別名：蝮冬，點凍，氏冬，鑽凍，菟奚，藜吾，虎鬚。	Tussilago Farfara, L. (a) (Petasites japanicus Miq.) (J. Hosie. BN.) Ligularia tussilaginea Makino (藜吾)	花 葉	Phytosterin (Faradiol, 1-Phytosterin) Phytosterin, Cholin, Saponin Senecio-Säure (藥植)	花爲鎮咳、祛痰劑，葉爲解毒劑，治河豚毒(爲煎劑內服)，又外用，治化膿症及溼疹。	浙江，山西，陝西，甘肅，西藏。	款者至也，至冬而花也，百草中惟此不顧冰雪最先春也，故俗稱爲鑽東。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
54.	葉 耳 (本草15) 別名：胡 葉，常思 ，蒼耳， 卷耳，爵 耳，豬耳 ，野茄， 耳璫，地 葵，繚絲 草，羊負 來，旒， 道人頭， ，進賢菜 ，喝起草	Xanthium Strumarium, L.	子 實	Fat 39%, Resin 3.3%, Xanthost- rumarin 39%, (gl.) 黃色無晶形 Vit. C ₁	子爲解熱、發 汗、鎮痙藥。 葉莖爲疥癬濕 疹蟲傷藥(葉 莖搗碎塗布之)。	處處有之，福 建西北頗多。	詩經謂之卷 耳，爾雅謂 之蒼耳，廣 雅謂之葉耳 ，皆以實得 名也，陸機 詩疏云，其 實正如婦人 耳璫，今或 謂之耳璫草 。

第二 桔梗科 CAMPANULACEAE

53.	沙 參 (本草12) 別名：白 參，知母 ，羊乳， 羊婆奶， 鈴兒草， 虎鬚，苦 心，文希 ，識美， 志取。	Adenophora polymorpha, Ledeb. Var. latifolia, Herder. (A. verticillata, Fisch.)	根	Saponin	爲鎮咳祛痰藥 ，治慢性氣管 支炎、肺結核 、肺膨脹不全 、肺膿瘍等。 一次量 1—5gm	河北，山東， 江蘇，廣西， 福建。	據趙藥農氏 說，有北沙 參、粉沙參 、土沙參、 明黨參等， 屬繖形科， 尚須待考。
-----	--	--	---	---------	--	-------------------------	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
	附錄： 黨參，潞 黨參，防 黨參，紅 黨參，白 黨參，遼 黨，台黨 ，交黨， 大山淺 川黨參， 南黨參， 南山參， 野黨參， 獅子盤頭 參。	Campanu- maea pilosula, Franch(1) (Codonop- sis Pilosula nannf)(2) Codonopsis silvestris Kom.(3)	根		補中、益氣、 生津、和脾胃 ，除煩渴，中 氣微虛，用以 調補，甚為平 安。	(1) 山西長治 、長子、屯留 、潞城、五台 、陝西終南山 、歸綏大青山 。 (3) 項原植物 稱蔓參，產於 遼甯及朝鮮。	黨參出山西 上黨地方， 而形如參故 名。 (中藥辭典 所載，屬荳 科，姑記之 ，尚須待考)。
56.	薺 苳 (本草12) 別名：杏 參，苳苳 ，甜桔梗 ，杏葉沙 參，白麵 根。	Adenopho- ra remotiflo -ra, Miq.	根 葉		為解毒藥，治 疔瘡、腫毒及 蛇蠱毒。	河北，河南， 山東，陝西。	薺苳多汁， 有濟瀉之狀 ，故以名之 。
57.	半 邊 蓮 (本草16)	Lobelia. radicans. Th.			外用治蛇及犬 傷。	湖北，四川， 廣東，江蘇。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
58.	山梗菜 (救荒本草)	Lobelia sesilifolia Lamb.	根	Lobelin	利尿，催吐，瀉下。	東北各省，朝鮮。	

【藥理】用本品之生物鹼 Lobelin 適量，注射於正常或因嗎啡作用，而陷於呼吸不利之家兔體中，則增大呼吸，迅即恢復呼吸之衰弱，大量則與用遊離之 Lobelin 相同，反使呼吸中樞麻痺。

59.	桔 梗 (本草12) 別名： 白藥， 梗草， 薺苳，	Platycodon grandiflorum, A. DC	根	Phytosterol, Saponin, Inulin.	爲鎮咳祛痰藥。 一次量 0.5—3gm	安徽滁州，廣西各屬。	本品根莖，結實而梗直故名。 platycodon 爲大形釣鐘狀 (Codos 釣鐘) 之花。 Grandiflorum 爲大花之意。
-----	---	--------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------	------------	--

【藥理】桔梗肥皂草素之一萬倍溶液，完全現出溶血作用，對於南京鼠之致死量，如體重爲 10gm，皮下注射 7.7mgm，即能致死，其毒力與美遠志 (Polygalae Senega) 略同。

【新藥】有Evanin, Hustol, Marukofon, Neo-Hustol, Platycodon. 等。

第三 葫蘆科 CUCURDITACEAE

60.	合子草 (拾遺)	Actinostemma rocemosum, (A. japonicum Miq.)	子 葉		蠱毒及蛇咬，搗碎敷之。	河北	其子實中間，有兩片如合子形，故名。
-----	-------------	--	--------	--	-------------	----	-------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
61.	冬 瓜 (本草28) 別名： 白瓜， 水芝， 地芝，	Benincasa cerifera, Savi.	莖， 葉， 種子， 瓢	皮：Wax 26%， Resin 20% 種子： Urease 瓢含Aden- in HCl, Trigonell- in HCl. Hystidin, Vitamin B ₁ , C ₁ , Ash 0.2% (食植)	冬瓜子，為消 炎性利尿劑、 緩下劑。 又治癰腫用。	栽培於田園中。	冬瓜以其冬 熟也。
62.	西 瓜 (本草33) 別名： 寒瓜， 水瓜， 夏瓜， 青登瓜，	Citrullus vulgaris, Schrاد. (Cucumis Citrullus Ser) (Cucurbita C. L.)	瓜瓢 皮， 種子 瓜子 仁。	皮含 Wax， 種子含 Fat 32%， Protein 6% Resin 2% Citrullin, Cucurbitol Pentosan,	為利尿劑，治 腎臟炎及糖尿 病，解酒毒。 西瓜汁膏，治 糖尿病。	原產印度、埃 及、阿拉伯、 中國各地均有。 新疆哈密及 山東德州之西 瓜最佳。	西瓜自五代 入中國，今 則南北皆有 ，契丹征回 紇時，始得 此種，因取 自西方，故 名為西瓜。

(成分續) Emulsin, Amylase, Catalase, Invertase, Peroxydase,
Urease, Vitamin B₂,
果汁中含磷酸，蘋果酸，果糖，葡萄糖，蔗糖， Arginin,
Glykokol, Betain, Citrullin, C₆H₁₃N₃O₃, Lycopin C₄₀H₅₆,
Carotin (以上二者為紅色素), Saccharase, Vitamin C₁ 及
Bromin (100g 中含 26mg) (食植)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
63.	甜 瓜 (本草33) 別名： 甘瓜， 果瓜，	Cucumis Melo, L. C. Conom on, Th.	種子 ，花 葉， 莖， 瓜蒂 ，瓢	種子： Fat 27%， Ash 4%， Galactan. 瓜蒂： Elaterin (苦味質)。 果肉含糖分 (汁液中含 葡萄糖 3.75% 蔗糖5.34% Protein 1%， Protease, Vitamins A ₂ , B ₁ , C ₁ . (食植)	瓜蒂對食傷及 霍亂，為催吐 劑。 一次量 1—2gm	原產埃及。	甜瓜之味甜 於諸瓜，以 味名也。 【藥理】 瓜蒂含 Elaterin， 有催吐及下 痢作用。
64.	越 瓜 (本草28) 別名： 稍瓜， 菜瓜	C. Melo, L. Var. Conomon, Mak. (C. Conom -on, Th.)	瓢	Protein 0.7%， Vit. C ₁	為健胃劑、利 尿劑。	浙江紹興。	以地名也。
65.	胡 瓜 (本草28) 別名： 黃瓜	C. sativus, L.	果肉 藥 根	果肉： Pentosan Vitamin C 種子： Fatty oil, Vitamin A	為利尿劑，清 涼、解渴，利 尿道。	栽培於田園中。	張騫使西域 得種，故名 胡瓜，北人 避石勒諱， 改稱黃瓜。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
66.	南 瓜 (本草28) 別名： 西壺盧， 唐茄，番 南瓜，俗 名倭瓜。	Cucurbita. Pepo, L. (C. auran tia, Willd.) (a.) C. maxima, Duch. (b.) C. moschata, Duch.		種子： Fat 34%， Protein 27%， urease, Vits. A, B, C. 果肉： Saccharo- se, Glucose, Pentosan, Carotin (黃色素)， Adenin, Arginin, Asparag- in, Trigonell in, Cucurbit- en, C ₄₅ H ₅₆ ， Cucurbita- xanthin. C ₄₀ H ₅₆ O ₂ Vits. A ₂ , B ₁ , C ₁ , Fat 0.2%， Ash 0.7% (邦植) (食植)	子爲絛蟲驅除 藥，取新鮮種 子 30—60gm 搗碎，加砂糖 或蜂蜜服之， 或以種子壓油 ，取15—30滴 服之。 【製劑】葡萄牙 之南瓜仁乳劑 ，德國之南瓜 仁糊劑。 【新藥】 Antitenia, Jungclaus- ens, Bandwurm- mittel, Les quatre, Semences froides.	原產東印度， 係南番之地， 故名南瓜。 初傳入閩浙， 今處處有之。	【中華藥典 及美國藥典 】採用南瓜 子。
67.	壺 盧 (本草28) 別名： 匏瓜， 瓠瓜。	Lagenaria Vulgaris, Ser, (Cucurbita lagenaria, L.)	瓢 子	Sugar 6% Fat Vit. C ₁ Saponin	瓜爲利尿劑， 蔓繫花解胎毒 ，種子爲解熱 劑，又治肺炎 及腸加答兒。		壺酒器也， 盧飲器也， 此物各象其 形，又可爲 酒飯之器， 因以名之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
68.	苦 瓠 (本草28) 別名：苦瓠，苦壺盧，附取瓢。	<i>L. vulgaris</i> Ser. Var <i>Clavata</i> Ser.	瓢 子 葉		爲利尿劑，治四肢浮腫，石淋，癰黃疔，吐蠅蟲。	處處有之，壺破開者稱瓢，主治消腫、殺蟲，治痔漏、下血崩、中帶下赤白。	此瓜苦如胆，不可食，故名。
69.	絲 瓜 (本草28) 別名：天絲瓜，布瓜，蠻瓜，魚鱗，菜瓜。	<i>Luffa</i> <i>Cylindrica</i> Roem. (<i>L. aegyptiana</i> , Mill.) (<i>L. petola</i> , Ser.) (<i>L. acuta</i> <i>ngula</i> , Roxb.)	瓢 葉	種子：Fat 41.6%， Protein. (Globurin) 果肉： Saponin, Mucilage, xylan, Fat, Protein 1.5%， Vitamin C, B, 及硝石 (食植)	瓜治瘡癤、鎮咳、祛痰、利尿。 葉治癰腫。		此瓜老則筋絲羅織，故有絲羅之名。
70.	苦 瓜 (本草28) 別名：錦荔枝，癩蒲荷	<i>Momordica</i> , <i>Charantia</i> , L.	瓜 子 葉	Protein 0.6%， Adenin, Betain, Vit. C., Protein (Globurin) Fat Momordicin, Fat 0.16% (食植)	瓜爲退熱劑，子爲壯陽劑，滋養劑。	福建，廣東。	苦以味名，瓜及荔枝蒲荷，皆以實及莖葉相似得名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
71.	木 鼈 子 (本草18) 別名：木蟹	M. Cochinchinensis, Spr. (M. mixta, Roxb.) (Muricia Cochinchinensis Lour.)	子仁	Fatty oil	為消腫藥，利尿藥。	湖南，湖北，浙江，江西，廣東。	其核似蟹蟹狀，故以為名。
72.	王 瓜 (本草18) 別名：上瓜，鉤 瓠，老鴉瓜，馬廐瓜，野甜瓜，師姑草，赤雹子，公公瓠。	Thladiantha dubia (Trichosanthes cucumeroidea, Max.)	塊根：種子	Arginin, Cholin, Starch (多量) 種子：Fat, Protein (globulin)	根治黃疸、下血、利尿、催乳、通經等。種子為袪痰、鎮嘔、收斂劑，治肺萎縮、吐血、腸出血、腸炎及赤白痢等。	河北	禮記月令，四月王瓜生，即此也。Trichosanthes, 為毛狀花之意，因花冠外端絲狀細裂者 Cucumeroides, 似胡瓜之意。
73.	栝 樓 (本草18) 別名：果臝，瓜瓞，天瓜，黃瓜，地樓，澤姑。	Trichosanthes multiloba (T. japonica, Rgl.) (T. Kirilowii Max.)	種子 果實 根 皮	根含多量之澱粉，所製澱粉，名為天花粉。種子含26%之脂肪油。	根治口唇之乾燥、止渴、去胃腸之痲熱及多尿症。一次量1-4gm。天花粉，為撒布劑，治皮膚糜爛、擦傷、濕疹、汗斑等。	江蘇鎮江，廣東陽江，廣西南甯，雲南昆明，羅平，浙江，湖北，福建永安，安徽。	臝與瓞同，木上曰果，地下曰臝，此物莖生附木故得兼名，詩云果臝之實，亦施於字是矣。栝樓即果臝二字音轉也。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
74.	白藥子 (本草18)	T. palmata Roxb. (T. pube- ra, Bl.)	根	Tricho- santhin, Pigments	1) 爲解毒劑， 消腫毒。 2) 爲止血劑， 治吐血、衄 血、合金瘡 。	江西，廣東， 河北，湖北， 甘肅。	

第四 山蘿蒿科 DIPSACACEAE

75.	續斷 (本草15) 別名： 屬折， 接骨， 龍豆， 南草。	Dipsacus chinensis, Bat. (1) D. asper wall. (2) D. japoni- cus, Miq. (3) Lamium album (4) L. petiola- tum, Royle (5)	根	Stachyose, Glucoside, Saponin, Lamiine (alk.) (以上係第 四種原植物 之成分)	治金瘡、癰瘍 、折跌、續筋 骨。	分布於中部各 省。(湖北沙 市、宜都)， 河北，廣東 昌等地。	續斷，屬折 ，接骨，皆 以功命名也 。 第四第五原 植物，屬唇 形科。
-----	---	--	---	---	------------------------	---	---

第五 敗醬科 VALERIANACEAE

76.	甘松香 (本草16) 別名： 苦彌哆	Nardostac- chys Jatamansi DC. (Valeriana J. jon.) (V. spica, Vahl.)	根莖	Ess. oil (Sesquiter- pen) 1—2%	1) 爲芳香健胃 藥，治腹痛 。 2) 爲薰香劑， 治精神之憂 鬱用。	四川，雲南。	產於川西松 州者，其味 甘，故名， 金光明經謂 之苦彌哆。
-----	-----------------------------	--	----	---	--	--------	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
77.	敗 醬 (本草16) 別名： 苦菜， 苦蕒， 澤敗， 鹿腸， 鹿首， 馬草， 女郎花	Patrinia Scabiosa folia, Link.	根	Ess.oil 8%	治腸之炎症、 腹部腫脹、催 嘔吐、止下痢 、排洩粘液及 膿液、并治吐 血、衄血、子 宮粘液分泌物 ，及制止眼之 充血等。 一次量 1—2gm	河北，山東， 江蘇，浙江， 湖北，廣東， 福建永安。	根作腐敗豆 醬氣，故名 。
78.	攀 倒 甌 (本草16) 男郎花	P.villosa. Juss. (1) (Valeriana Villosa, Th. (2)) Arisema. Serratum Schott, (3) A.japoni- cum, Bl. var. Serratum, Engl. (4)	草 汁		為清涼劑，解 煩渴、狂燥。	浙江，江蘇， 福建，廣東， 江西，湖北， 廣西	(3)(4)二種 原植物，屬 天南星科。

第六 忍冬科 CAPRIFOLIACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
79.	楊梅 (本草38)	Dicrvillea japonica, DC.	葉	Sugars, Glucoside, Emulsin.	治瘰癧惡瘡，用水煎汁洗之，即癒。	河北，福建，	
80.	忍冬 (本草18) 別名： 金銀藤， 鴛鴦藤， 鸞鷀藤， 通靈草， 蜜桶藤， 金釵股， 左纏藤， 老翁鬚， 金銀花。	Lonicera japonica, Th. (Lonicera japonica Var. Chinensis, Baker)	葉 葉 花	鞣：Sap- nin 甙：Tann- in 8% 含氮物19% Ash 8% (本新) 花：Inosit 1% (會廣方)	爲利尿、解熱、殺菌劑，治關節疼痛、腸炎、微毒、淋疾、諸瘡等。一次量 2—4gm	福建，浙江，江蘇，河南，河北，山西，陝西，四川，甘肅，甯夏，青海，綏遠，蒙古，東北各省，台灣，朝鮮，日本。	本植物初開白花，後變黃花，故有金銀花之名。其葉經冬不凋，故曰忍冬。 (本植物之第二種，係變種，其花呈紅色)。Lonicera, 爲德國數學家兼植物學者 Adam Lonicer (1528—1583) 之名而定。
81.	陸英 (本草16)	Sambucus javanica, Bl. (S. chinensis Lindl.)	葉 及 根	Chlorogen acid	(1) 爲鎮痙藥，治四肢拘攣疼痛。 (2) 爲消腫藥，治足腫及腳氣上衝，爲煎劑外用。	江西，湖北，四川，雲南，廣東，福建。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
82.	接骨木 (本草36) 別名： 續骨木 木朔菴	S. racemosa, L. (S. sieboldiana Bl.)	皮 葉	歐洲產接骨木花： Nitrilglycosid, Cholin, ferpen, Iricosan, Valeric acid, Emulsin, sugar.	木部及葉，治筋骨之折傷、挫傷。 花為發汗藥。	湖北，江蘇，河北，東北各省，福建。	有接骨之功效，故名之。
83.	蒴 藿 (本草16) 別名： 葦草，茂 ，接骨草	S. thunbergiana, Bl. (S. javanica Bl.) Ebulus chinensis Nakai	葉 葦 根		為驅風藥，治手足偏風及風濕、腰痛。	江西，湖北，四川，福建，廣東，雲南。	
84.	英 薨 (本草35) 別名： 擊迷， 羿先，	Viburnum dilatatum, Th.	葉 葦		為治虫藥，治三蟲作痢，畜，瘡中生蛆立出。	江蘇，湖北，江西。	
85.	折傷木	V. opulus, L. V. pubinerve Blume F.	皮	Viburnin. Phytosterol. Phytosterolin, Valeric acid, Ca Malate Fannin, Wax. Resin, Sugar.	1) 為利尿藥。 2) 為鎮痙藥。	四川 歐洲，北美洲及亞洲各地，	

第七 茜草科 RUBIACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
86.	伏牛花 (本草36) 別名： 隔虎刺花	Damna - canthus indicus, Gaertn. L. (1) Berberis Vulgaris, L. (2) B. Siebol - dii Miq. (3)	皮 葉 根 枝 花	(2)(3)兩 種之成份 如次： 花： Berberine, Oxyacanth ine, Ess. oil 枝： Berberine, HCN 葉： Berberine, Choline, 根： Berberub. in, Berb erine, Berbamin, Columba - min, Jatrorrhi - zin, Malic acid Oxyacanth -in.e (新本)	花為驅風藥， 治風濕四肢拘 攣。 根莖葉為消腫 藥，治一切腫 痛。	江西，湖北， 四川	(2)(3)二種 屬小檗科
87.	卮 子 (本草36) 別名： 木丹，越 桃，鮮支 ，山梔子 ，水枝山 ，山枝。	Gardenia, florida, L. (G. grandi flora S. & Z.)	種子 花 葉	Gardenin (gl.), α-Croce tin, (黃色素) Ess. oil, Chloroge nin, Mannit	1) 為解熱藥。 2) 治耳鳴、聲 啞、黃疸、 吐血、衄血 等。 1次量 1—2—5gm	湖北，四川， 福建，廣東。	卮酒器也， 卮子象之， 故名。 Gardenia 為醫師兼博 物學者 Alexander Garden 之名而來， Florida, 為花多之意 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
88.	水 梔 子	<i>G. radicans.</i> Thbg.	種子	Mannit Fat. Pigment		南方各省	
89.	都 梔 子 (本草31) 別名：構子	<i>Genipa americana</i> L. (<i>Gardenia genipa</i> , Sw)	種子	Genipin Mannite Tannin	(1) 爲收斂劑，止洩、治痔疾。 (2) 爲清涼劑，解酒、止煩渴。	南方各省	
90.	賣 子 木 (本草36) 別名：買子木	<i>Ixora chinensis</i> , Lam. (<i>I. coccinea</i> Curt.)	木 枝 葉		治折傷、血內溜、續傷、補骨髓、止痛、安胎。	福建，廣東	
91.	鈎 藤 (本草 8)	<i>Nauclea rhynochphylla</i> , Miq. (<i>Curouparia r.</i> , Mats.) (<i>Unsaria r.</i>)	根 鈎 棘 莖	Rhyncho- Phylline (Al.) 此成分，能使血壓下降，末梢血管擴大。	爲鎮靜劑，治小兒驚癇、成人眩暈及子宮粘液性分泌劑。 一次量 1—3 gm	湖北及南方各省	鈎藤葉細長，其莖間有刺，若鈎鈎。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
92.	女 青 (本草16) 別名： 雀 瓢	Paederia- tomentosa Bl. (1) P. foetida, L. herb., (2) Cynanchu- msibir- cum R.Br (3) Vincetoxi- cum S., Decne. (4)	根	Chloroge- nin, Indol 以上爲(1) 種原植物之 成分	爲興奮劑及回蘇劑。	湖北，江西， 江蘇，廣東。	(3)(4)二種 原植物屬蘿 摩科。
93.	茜 草 (本草18) 別名： 蒨，茅蒐， 茹蘆， 地血，染 緋草，血 見愁，風 車草，過 山龍，牛 蒞。	Rubia Cor- difolia L. Var. Mungista. Diq.	根	Glucoside, munjistin, Pigment- Purpurin	1) 通經，止血 (略，嘔， 吐血)。 2) 爲解熱強壯 藥。 3) 爲染料用。	中部及北部各 省。 福建清流大豐 山。	陶隱居本草 云，東方有 而少，不如 西方多，則 西草之爲茜 ，或取此意 。
94.	曲 節 草 (本草15) 別名： 蛇藍，綠 豆青，六 月凌，六 月霜。	Serissa fo- etida comm.	葉 莖	Chloroge- nin(gl.)	爲消腫藥，發 背瘡，消癰腫 。	湖北，江西， 江蘇，福建， 廣東。	

第八 車前科 PLANTAGINACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
95.	車 前 (本草16) 別名： 當道，馬 芻，牛遺 ，牛舌， 地衣，車 輪菜，蝦 蟆衣	Plantago major, L. Var. asiat ica, D C.		種子： Plantagin、 Plantaler- olic acid, Adenine Choline. Succinic acid 多量 之粘液。 全草： Auculine (C ₁₇ H ₂₄ O ₁₀), Plantag- ine (gl.)	子利尿、鎮咳 、制瀉、益精 、治難產。 一次量 5-15gm	【藥理】 Plan- tagin 與呼吸 中樞作用，使 呼吸深大且徐 緩，有鎮咳作 用，增加氣管 之粘液及消化 液之分泌，而 無溶血作用。 【新藥】 Husta gin, Hydein, Haonin, Hustidin,	此草生道旁 及牛馬跡中 ，故有車前 、當道、馬 芻（芻足履 也）、牛遺 之名。蝦蟆 喜藏伏於下 ，又稱為蝦 蟆衣。

第九 爵床科 ACANTHACEAE

96.	秦 艽 (本草13) 別名： 秦紉， 秦瓜， sa Vulgaris, Nees.	Justicia Gendarus sa, L. Gendarus sa Vulgaris, Nees.	根	Alkaloid- justicine, Fss. oil 0.001% (於)	1)利大小便。 2)療酒疸、黃 疸、解酒毒 。 3)治關節痠麻 質斯。	四川，廣東、 韶州、陽江、 英德。 雲南大理、河 口、麗江。	秦艽(晉交)本名秦紉 與紉同，出 秦中，以根 作羅紋交糾 者為佳。
-----	--	--	---	--	--	--	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
97.	爵 牀 (本草14) 別名： 爵麻，香 蘇，赤眼 ，老母草	J. Procu- mbens L. (1) Salvia, Plebeia, R.Br (2) (屬唇形科) S.brachia- ta, Roxb. (3) (屬唇形科)	莖， 葉		治腰背疼痛及 癱瘓、癱瘓、痛 風，取其莖葉 所得之汁塗之 ，或為湯浴， 可減疼痛及去 充血。	四川，廣東， 福建，江蘇，	
98.	馬 藍 (唐本草) 別名： 板藍，山 藍，琉球 藍，大藍 ，冬藍	Strobilan- thes flaccidif- olius	全草 葉	Indigo (分解生 Indoxyl)	為染料用。	江蘇	本品為藍之 一種，其葉 如苦蕒者故 名。

第十 苦蕒苔科 GESNERIACEAE

99.	紫背金盤 (本草20)	Lysionotus Pauciflor- us, max.			為通經藥，治 婦人血氣痛， 洗焙研服 2gm ，孕婦勿服， 因能消胎氣也 。	浙江，湖北， 四川。	
-----	----------------	--------------------------------------	--	--	---	---------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
100.	石 吊 蘭 (植考)	Lysionotus Pauriflorus, Max.	草		通肢節，治跌打，療酒病。	產江西上饒、湖南寶慶、江蘇、浙江、湖北、四川等處之岩石上。	

第十一 列當科 OROBANCHACEAE

101.	肉 蓯 蓉 (本草12) 別名：肉松容，黑司命，寸云。	Orobanche ammophyla, Meyer a) Boschniakia glabra, C. A. Mey.	根		暖腰膝，催情欲，治遺精、膀胱炎，膀胱及腎臟出血時，為止血藥。 一次量 1—4 gm	產四川，陝西，山西，河北，山東，東北各省及日本之日光富士山等處。	此物補而不峻，故有從容之號，從容，和緩之貌。
102.	列 當 (本草12) 粟 當 草蓯蓉 花蓯蓉	Orobanche coerulescens, Steph. Var. typica, Beck. (O. amnophila var.)	根		為強壯劑，治男子陽事不興。 一次量 1—4gm	陝西，山西晉城，河北，山東，四川，東北各省。	

第十二 胡麻科 PEDALIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
103.	胡 麻 (本草22) 別名： 巨勝， 方壘， 狗蠟， 油麻， 脂麻。	Sesamum indicum, L. (S.orient- ale. L.		種子： Fetty oil 54—56%， Protein 21%， Ash 5% (Cu...1.7 mgm%)， Ca oxalat 1%， Pentosan, Lecithin, Phytin, Choline 甙： Mucilage 油： Olein 48% Linol 37%， Palmitin 8%， Stearin 5%， Phytoster- in, Sesamin.	1)爲食用。 2)爲軟膏基礎 劑。 3)爲滋養強壯 劑、粘滑劑 、解毒劑。 【藥典】有胡麻 油，氮擦劑， 石灰擦劑，樟 腦軟膏，單軟 膏等品。	原產印度、埃 及，現今各處 均有。	胡麻即油麻 ，中國只有 大麻，張騫 始自大宛得 油麻種來， 故名胡麻， 以別大麻也 。 俗作芝麻非 也。

第十三 紫葳科 BIGNONIACEAE

104.	梓 (本草33) 別名： 木 王	Catalpa Bungei C. A. Mey. C. ovata, Don. Lindera Tzumu.	皮， 葉	果實含枸橼 酸鞣鹽 P. oxyben- zoic acid.	果實爲利尿藥 ，治腎臟病。	陝西，河北， 山東，浙江， 貴州。	梓爲百木長 ，故稱梓爲 木王，蓋木 莫良於梓， 故書以梓材 名篇，禮以 梓人名匠， 朝廷以梓宮 名棺也。
------	---------------------------	---	---------	--	------------------	-------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
105.	楸 (本草35) 別名： 櫻	C. Kaempferi S. et Z.	葉， 內皮	K 25% of ash in ft.	葉為消腫藥， 內皮為殺蟲藥。 。	湖北	葉大早脫曰楸， 葉小早秀曰櫻。
106.	角 蒿 (本草15)	Incarvillea sinensis, Lam.	灰	Alkaloid	為殺蟲劑	河北，東北各省。	本品似白蒿， 花如墨麥， 紅赤可愛， 子似王不留行， 黑色作角，故名。 。
107.	紫 葳 (本草18) 別名： 凌霄， 陵苳， 陵時， 女葳， 菱華， 武威， 羶陵， 鬼目。	Tecoma grandiflora Loisel. (Bignonia g. Delaun) (Bignonia chinesis Lam.) (Campsis adrepens, Lour.)	花		為通經利尿藥。 。 一次量 1—2gm (為粉末服之)	浙江，江西， 湖北及北方各省。	俗謂赤葳， 曰紫葳， 此花赤葳， 故名。 附木而上高 數丈，故曰 凌霄。

第十四 玄參科 SCROPHULARIACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
108.	巴戟天 (本草12) 別名：不凋草，三蔓草，	Bacopa Monniera, Hayata. (Herpestis M., Gratiola M., L.)	根	Vit. C ₁ .	爲驅風劑，強壯劑。	四川，廣東。	
109.	桐 (本草35) 別名：白桐，黃桐，泡桐，椅桐，榮桐。	Paulownia imperial is, S. et Z. (P. tomen tosa, H. Bn.) 榮桐。	葉，花，皮	Paulownia acid; fat in sd.	樹皮及葉，爲利尿劑，治泄疾。	浙江，湖北。	桐華成筒，故謂之桐。
110.	原 蒿 (本草15) 別名：我蒿，羅蒿，抱娘蒿	Pedicular is gloriosa, Biss. et. Mre. (P. sceptr um c rolinum L.)	全草		爲清血藥。	生於澤國。	原之爲言高也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
111.	馬 先 蒿 (本草15) 別名： 馬新蒿， 馬矢蒿， 練石草， 爛石草， 虎 麻，	<i>P. resuipinata</i> , L. (a) <i>Incarvillea sinensis</i> Lour.	全草		爲利尿劑，利小便，破石淋膀胱中結氣。	江蘇，湖北，陝西，河北，蒙古，東北各省。	蒿氣如馬矢，故名，馬先乃馬矢之訛也。
112.	胡 黃 連 (本草13) 別名： 割孤露澤	<i>Picrorrhiza Kurroa</i> Bth.	根	<i>Picrorrhizin</i> 15%， <i>Cathartic acid</i> 9%	爲健胃劑及止瀉劑。 又治眼疾及肝胆病。	陝西 (原產波斯)	其性味功用似黃連故名。割孤露澤，胡語也。
113.	地 黃 (本草16) 別名： 地髓，苺，芑。	<i>Rehmannia glutinosa</i> , Lib.	葉，花，子，根	根： <i>Mannit</i> <i>Succharos</i> ; 【藥植】	爲止血強壯劑，治諸種出血及肺結核，又對潮熱者亦有効。 一次量 2—4gm	河北，浙江	生者以水浸驗之，浮者名天黃，半浮半沈者名人黃，沈者名地黃，入藥以沈者爲佳。
114.	玄 參 (本草12) 別名： 黑參， 玄台， 重台， 鹿馬， 正馬， 遂草， 馥野， 鬼脂， 臧。	<i>Scrophularia Oldhami</i> . <i>Oliv.</i>	根	<i>Scrophularin</i>	爲解熱消炎藥，治咽喉炎、扁桃腺炎、結膜炎、鞏膜炎、頸淋巴腺炎等。 一次量 3—7gm	河北，浙江，安徽，東北各省。	玄黑色也，其莖微似人參，故名玄參。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
115.	鬼 麻 油	Siphonostegia chinensis, Bth.	根 草		爲排膿止血藥。	福建	
116.	水 苦 蕒 (本草27) 別名： 謝婆菜， 半邊山。	Veronica Anagallis, L. (a) Saussurea affinis, Spr. (b) Prenanthes Tanakae, Koidz.	根	Rhinanthin, gl. (aucubin)	爲健胃，利尿，清血藥。	河北，湖北，廣東。	本品生溪澗側，葉似苦蕒，故名。

第十五 茄 科 SOLANACEAE

117.	龍 珠 (本草16) 別名： 赤珠	Capsicum anemallum, Fr. et Sav. (BN.)	草	Ess. oil	苗爲強壯劑，子治疔腫，果實解熱毒。	生道旁。	龍莖赤珠者，名龍珠。
------	----------------------------	---------------------------------------	---	----------	-------------------	------	------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
118.	曼陀羅 (本草17) 別名： 山茄子， 曼陀羅華， 風茄兒	<i>Datura</i> <i>alba</i> , Nees. (<i>D.fatuosa</i> L.)	子 葉 花	<i>Hyoscyamine</i> 0.02% <i>Hyoscyine</i> 0.24% <i>Hyoscyamine</i> 0.04% <i>Hyoscyine</i> <i>Atropine</i>	葉種子，均為鎮咳鎮痛及催眠藥，又為喘息之煙劑，葉之極量一次0.2，一日1gm	原產地印度邊境	曼陀羅華係梵語Mandarava之譯音，為細小圓形美麗之花。
119.	風茄兒 (本草17) 別名： 佛茄兒	<i>D.stramonium</i> , L. (a) <i>D.tatula</i> , L.	子	Fat 25% Malic acid Alkaloids 0.4%	同 上		<i>Datura</i> , <i>tatula</i> , 係阿拉伯語。
120.	莨 菪 (本草17) 別名： 天仙子， 橫 唐， 行 唐。	<i>Hyoscyamus niger</i> L. Var <i>chinensis</i> Makino (中國種) <i>Scopolia japonica</i> Maxim. (日本種，亦稱東莨菪)。	根	<i>Hyoscyamine</i> <i>Nor-Hyoscyamine</i> <i>Nor-Atropine</i> <i>Scopolamine</i> <i>Atropine</i> <i>Scopoline</i> <i>Choline</i> <i>Hyoscyine</i> Fat 35%	1) 為鎮痙、鎮痛藥，治氣喘、胃痛、神經痛。 2) 為歐產顛茄之代用品。 3) 為硫酸阿托品之原料。 4) 製劑：有浸膏、酹、硬膏、軟膏栓藥等。	所在皆有。	食其根，令人狂狼放宕，故名莨菪。Scopolia 係 Jacquin 所定之屬名，為紀念 Tyrol 博物學者 Joh Aut. Scopolia 之名。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
121.	枸杞 (本草36) 別名： 地骨皮， 骨節， 地仙， 地仙， 枸檮， 天棘， 苦杞， 甜杞， 仙人杖， 却老， 羊乳， 西王母杖。	Lycium chinense, Mill. L. barbar- um. L.	葉 莖 苗	Betaine Choiine HCN Ash 2.2% Betaine Proteine 4.6% Fat. 0.2%	藥為解熱、止渴藥，又去皮膚之腫脹。子為強壯劑，治消創病、糖尿病、肺結核、減咳嗽止渴。一次量 2—4gm	河北，山東，湖北，四川，福建，廣東。	枸杞二樹名，此物棘如枸之刺，蜜如杞之條，故兼名之，道書言千載枸杞，其形如犬，故得枸名，未審然否。
122.	菸 (食物木 草) 別名： 烟草	Nicotina tabacum, L.	葉	Nicotin, Nicotiamin Nicotein, Nicotelin,	藥為吃烟料及製烟之原料，煎汁為農用殺虫藥及治療疥等。寄生性皮膚病。	原產南美及西印度。我國向產於福建，今各處均有。	
123.	酸漿 (本草16) 醋漿， 苦蕒， 苦蕒， 燈籠草， 皮弁草， 天泡草， 王母珠， 洛神珠， (小者名苦蕒)。	Physalis Alkekengi L.	子 實 根 葉	Physalin, (Bit.) citric acid Physalien, (紅色素), Zeaxanth- in, Hystonin, Betaine, Physalin.	根莖葉為利尿、解熱、鎮咳藥。果實為利尿痛風及瀉藥。【藥理】根中之果實為利尿痛風及瀉藥。有子宮緊縮作用。	河北，山東，江蘇，湖北。	酸漿以子之味名也。Bacca Alkekengi (為法國藥典所採用)。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
124.	苦 茄 (本草28)	Solanum Dulcamara L.	果 實	Solanine, Solaneine, Dulcamar in, Carotin, Lycopin, Fat 24%	爲清血、利尿 、神經痛藥、 消腫藥。	雲南，廣東， 河北，湖北。	
125.	白 英 (本草18) 別名： 穀菜， 白草， 白幕， 排風。	S. Dulcam. ara, L. var. lyratum. S. et Z. (var. ovatum Dun.)	根 苗 子 葉		根苗爲強壯劑 ，種子治眼病 用。	四川	白英謂其花 白也。
126.	茄 (本草28) 別名： 落 蘇， 崑崙瓜， 草酸甲。	S. melong ena, L. (S. escul- entum. Dun.)	果 實 莖 葉 花 子	果實： Adenin, Beringeli d Trigonell- ine, Choline, Vits. A ₁ , B ₁ , C ₁ , Imidazol- aethyla- min, Fat 0.1% Protein 2.2%	根莖葉爲收斂 性利尿藥，消 腫藥。 花治金瘡牙痛 。 子爲消腫藥。 對菌中毒，食 生茄有效。	原產印度，今 各處多有。	茄音加，乃 蓮莖之名， 有作酪酥， 以其味如酪 酥也。 馬來語 “Terong ”， 法語 “Anberg- ine”

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
127.	龍 葵 (本草16) 別名： 苦 葵， 苦 菜， 天茄子， 水 茄， 天泡草， 老鴉酸漿 草，老鴉 眼睛草。	<i>S. nigrum</i> , L.	子 根 葉 苗 莖	子： Saponine, 根： Solanine, Starch.	爲解熱利尿劑，又有防睡眠之效。	各地均有	龍葵言其性滑如葵也。法國藥典採用龍葵葉。

第十六 唇形科 LABIATAE

128.	金瘡小草 (拾遺) 別名： 蛇含草	<i>Ajuga</i> <i>Pygmaea</i> , A. Gr.	葉		爲收斂劑，治金瘡及刺傷，揉鮮葉貼之，血液突然下者，煮汁服之。	南方各省	
129.	夏 枯 草 (本草15) 別名： 夕 句， 乃 東， 燕 面， 鐵色草。	<i>Brunella</i> <i>Vulgaris</i> , L.	葉 莖	Ess. oil Bitterstuff Salts 3.5% (KCl) Alkaloid (本新，藥植)	1) 爲利尿劑，治淋疾。一日量 5—10gm 2) 治頸淋巴腺結核。	甘肅，四川，湖北，雲南昆明，廣東北江、星子、樂昌、江蘇，浙江，安徽，東北各省。	此草夏至後即枯，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
130.	香 薷 (本草14) 別名： 香 茸， 香 菜， 蜜蜂草， 香 薷。	Elscholtzia, crinata, Willd.	全草	Ess. oil 1% (Elscholtzinketon, C ₁₀ H ₁₄ O ₂ Sesquiterpene) (藥植)	為發汗利尿解熱藥，治顏面浮腫、腳氣水腫、霍亂吐瀉、急性胃炎等。 一次量 2—9gm	河北，湖北，江西，浙江。	薷本作菜，菜菜，蘇之類是也，其氣香，其葉柔，故以名之。
131.	鑿 菜 (本草15)	Leonurus macranthus, Maxim.	莖		苗為清血藥。	河北，山東，東北各省。	
132.	菟 蕪 (本草15) 別名： 益母草， 益 明， 苦低草， 土質汗， 貞 蕪， 野天麻， 猪麻，菹， 火拔， 鬱臭草。	L. sibiricus, L.	草及子	藥： Leonurine (Alk.)， Leonurinine, Resin, Ess. oil, Fatty oil. 子： Leonurine 【藥理】 Leonurine 對子宮，有收縮作用，且有利尿作用。	1) 草為止血劑，對長期子宮出血而起衰弱者有效，又為分泌液制止劑，應用於由子宮內膜炎所起之粘液分泌物及產後液狀排泄物，久未閉止者，劑量一次服 4—6gm。 2) 種子為利尿劑，治水腫，又用於眼病（因血凝滯而起者） 一次量 4—9gm。	河北，湖北，浙江，福建，廣東，東北各省。	此草及子，皆充盛密蔚，故名菟蕪，其功宜於婦人及明目益精，故有益母之稱。Leonurus，為獅子尾之意，其花穗似獅子尾，sibiricus，為西伯利亞產之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
133.	排 香 草 (本草14)	Lophanthus rugosus, Fisch. (1) Agastache r., Kuntze (2) L. chinensis, Walp, (3) Lysimachia sikokiana, Miq. (4)	根 葉	葉： Ess. oil 0.5%	治食傷，為感冒頭痛藥，本品可為藿香之代用品。	河北，山東，湖北，四川，廣東，東北各省。	第四種原植物，屬櫻草科。
134.	藿 香 (本草14) 別名： 兜婁婆香	L. rugosus Fisch. (Stachys betonica Benth.)	葉	Ess. oil 0.5—1.5% Tannin Bitter	為霍亂及食傷之要藥，治劇烈吐瀉及腹痛，又為消炎及健胃藥。 一次量 3—9gm	廣東，福建，浙江，山東，河北，東北各省。	豆葉曰藿，其葉似之故名。
135.	薄 荷 (本草14) 別名： 金葉薄荷 南薄荷， 蕃荷菜， 吳拔蘭， 【附】蘇州產之薄荷，名為蘇荷。	Mentha arvensis, L. (M., a. L. Var. Piperascens, Holmes) (M. haplocalyx Brig.)	葉	Ess. oil (Menthol, Menthon, Isomenthon, Menthenon, Hexenolphenylacetate, Pinen, Camphen, l-Limonen.)	為芳香性矯味臭健胃、驅風發汗藥。一次量 10gm (為浸劑)。又為薄荷腦原料及餅乾牙粉香料。 【藥典】有薄荷葉，薄荷油，薄荷腦，薄荷精，薄荷水，薄荷糖漿，芳香精，白陶土薄荷腦塗擦劑，薄荷錠，薄荷酒，蘇打明錠，複方木鱧油丸，硝酸土的年丸等。	江蘇上海、太湖，浙江杭縣，河北，山東，湖北，廣東，東北各省，英國，美國。	Mentha, 神話中女神 Minthe 化為薄荷者，arvensis 為烟中所生之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
136.	薺 薺 (本草14) 別名： 臭 蘇， 青白蘇。	Mosla grosse- rrata, Maxim. (a)Plecta- nthus glauco- calyx, var. japonicus, Maxim.	葉 莖	Ess. oil 0.2%, Thymol, Cymol, Carvacrol, Myristicin Moslen. (本新)	爲斂收劑，治 洩痢。生食， 治胸間酸水。	江蘇	薺薺似水蘇 ，江名水蘇 爲薺薺。
137. a.	石 香 菜 (本草14) 別名： 石 蘇	M. punc- tata, Max.	莖 花	Ess. oil 1% (Mujone, Sesquiter- pene)	爲健胃劑，調 中溫胃，并治 霍亂吐瀉。	四川，浙江， 江蘇，湖北。	
137. b.	石 薺 薺 (本草14)	M. punc- tata, Max.	莖	Ess. oil	殺虫治瘡疥， 并治痔瘻。	湖北	
138.	積 雪 草 (本草14) 別名： 胡薄荷， 地錢草， 連錢草， 海 蘇。	Nepeta Glechoma, Bth. (Glechoma hederacea, L.)	葉 莖	Ess. oil, Tannin, Glechomin Cholin.	爲解熱鎮咳、 止血、止瀉、 利尿藥，民間 用於治小兒之 疳，有取疳草 之名。 一次量 2—5gm	河北，山東， 江蘇，湖北。	此草以寒涼 得名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
139.	假 蘇 (本草14) 別名： 荆 芥， 蘇 芥， 鼠 薺。	N. japoni- ca, Maxim.	草	Ess. oil 1.8 (d-Menth- on, dl-menth- on, d.Limonen)	爲發汗解熱藥 ，治感冒頭痛 ，眩暈等，又爲 鎮痙藥，治產 後牙關緊急， 四肢強直等症 。一次量 2-6gm	浙江杭州莫橋 ，湖北廣仁， 山西晉城，蒙 古，東北各省 ，朝鮮(中典)	
140.	羅 勒 (本草26) 別名： 蘭 香， 香 菜， 鬻子草。	Ocimum basilicum, L.	草 及 子	Ess. oil (Ocimen, Pinen, Cineol, Terpinhy drate)	1) 草葉治跌打 損傷及腎臟 病。 2) 用於產前產 後，能使血 行良好。 3) 治反胃(胃 痙攣)咳噎 。 4) 子爲眼藥， 治目昏浮翳 。	河北，江西， 江蘇，廣東。	北人避石勒 諱呼羅勒爲 蘭香。按石 虎諱言勒， 又改羅勒爲 香菜。
141. a.	蘇 (本草14) 別名： 紫 蘇， 赤 蘇， 桂 荏。	Perilla nankine- nsis, Decne. (P.frutes- cens, Breit var. Crispa, Decne)	葉	Ess. oil 0.5%， (Perillaal dehyde, α -Pinen l Limon en.)， Perillanin (紫紅色素)	葉爲芳香健胃 劑、祛痰劑、 利尿劑。 又爲發汗劑， 治感冒、去熱 、止咳、增進 食慾，制止嘔 氣。一次量 0.5-3gm	四川，江蘇， 江西，廣東。	蘇從蘇音酥 ，舒暢也， 蘇性舒暢， 行氣和血， 故謂之蘇， 曰紫蘇者， 以別白蘇也 ，蘇乃荏類 而味更辛如

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
b.	荏 別名： 白 蘇	(<i>P. ocimoides</i> , L. var. <i>crispa</i> , Benth, f. <i>Purpurea</i> , Mak.) <i>P. frutescens</i> , Breit var <i>typica</i> Makino (<i>P. ocimoides</i> L.)	子 種	Adenin, Arginin (食植, 藥植) Resin. Fatty oil 40% (Olein, Linolein, Palmitin, Stearin.)	但盜汗自汗者, 宜禁忌, 子能發散精神之沉悶, 并解魚蟹之中毒。	中國各省及印度。	桂, 故爾雅謂之桂荏。
142.	迷迭香 (本草14)	<i>Rosmarinus officinalis</i> , L.	葉	葉： Ess. oil 1—2% (Rosmarin Cineol, Borneol, Camphen)	葉為芳香劑及刺激劑, 製0.5—2%浸劑, 有健胃之效, 通常製芳香茶劑或浴劑, 又為製造迷迭香油及迷迭香精之原料。 迷迭香油, 供製可龍水及複方非沃斯油, 複方迷迭香膏, 迷迭香水, 酒精性迷迭香點眼水, 及神經痛藥之用。	法蘭西, 意大利, 及地中海沿岸。	魏文帝時, 自西域移植庭中, 同曹植等各有賦。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
143.	鼠尾草 (本草16) 別名： 勤， 山陵翹， 烏青， 水青。	Salvia japonica Th. (S. Fortu- nei, Benth.) (S. chine- nsis, Benth.)	葉花		治腸炎、赤痢 、及頸淋巴腺 結核。 一次量 2—7gm	中部及南方各 省。	鼠尾以穗形 命名。
144.	丹 參 (本草12) 別名： 赤 參， 山 參， 鄒 蟬 草， 木羊乳， 逐 馬， 奔馬草。	Salvia, chunensis, Benth. S. multio- rrhiza, Bge. S. nippon- ica, Miq. (a) Codon- opsis tangshen, Wil.	根	Scutellar- in (gl.)	爲強壯通經藥 ，治子宮出血 、月經不調、 硬塞、腹痛、 疝痛、關節疼 痛等。 一次量 1—3gm	河北，山東， 江西，安徽， 江蘇，浙江西 天目，四川龍 安，雲南昆明 (中典)。	五參，五色 配五臟，故 人參入脾曰 黃參，沙參 入肺曰白參 ，玄參入腎 曰黑參，牡 蒙入肝曰紫 參，丹參入 心曰赤參， 其苦參則右 腎命門之藥 也。
145.	黃 芩 (本草13) 別名： 腐 腸， 峇 腸， 內 虛， 始 婦， 經 芩， 黃 頭， 子 芩， 苦 督， 條 芩， 尾 芩， 鼠 尾。	Scutellaria baicalen sis, Georg. (S. macra- ntha, Fisch.) (S. viscid- ula, Bge.)	根	Ess. oil Baicalin, Baicalein, Scutellarin (Woogonin) 【以上二種 爲黃色素母 醌 (Flavone) 衍化物】	1) 爲清涼劑、 解熱劑、祛 痰劑。 2) 治胃部炎症 胃壁硬化、 腸炎之泄瀉 等。 3) 用於小兒之 鼻中出血。	四川，陝西， 湖北，山東， 河北。	芩者黔也， 黃黑之色也 Scutellaria 小皿之意， 因其萼形相 似也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
146.	水 蘇 (本草14) 別名： 鷄 蘇， 香 蘇， 龍腦薄荷 ，芥 菹 ，芥 苳 。	Stachys aspera, Michx.	葉 莖		治感冒鎖咳， 止血（吐血、 衄血、血崩） 消腫，解魚類 中毒，療蛇蝎 螫傷。	河北，福建， 江西，東北各 省。	此草似蘇而 好生水旁故 名。
147.	草石蠶 (本草27) 別名： 地 蠶， 土 蛹， 甘露子， 滴 露， 地瓜兒。	S. sieboldi Miq.	根	Stachydr- ine, (alk.) Stachyose Arginine, Choline, Vit. B ₁ .	消腫，止痛。	河北，湖北。	蠶蛹，皆以 根形而名， 甘露，以根 味而名。

第十七 馬鞭草科 VERBENACEAE

148.	蕎 草 (本草16) 別名： 馬 唐， 馬 飯， 羊 麻， 羊 蔓 軒	Caryopte- ris, divaricata, Max. (Cleroden dron d., S. & Z.)	根		為利尿劑，治 虛腫、利小便 。	江西，湖北。	其氣猶臭， 故謂之蕎， 蕎者猶也， 朽木臭也。
------	--	---	---	--	-----------------------	--------	----------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
149.	海州常山 (圖經)	Clerodendron trichotomum, Thunb. (<i>C. villosum</i> , Bl.)	葉	Carbohydrate-N	爲利尿、健胃藥。	江蘇，琉球，台灣。	
150.	石 菖 (本草20)	Lippia nodifera, Rich. (<i>Phylachinensis</i> , Lour.)	草		取其葉萃爲煎劑，治月經不順及淋病等，將新鮮物搗碎，取其津汁，爲腫物塗布用。	四川，湖北，江西，廣東。	
151.	腐 婢 (本草24) 別名： 赤小豆，	Premna microphylla, Turcz. (<i>P. japonica</i> , Miq.)	花		化瘰，治頭痛，療疔瘡、惡腫。	浙江，福建，湖北，四川。	
152.	馬 鞭 草 (本草16) 龍牙草， 鳳頸草。	Verbena efficina- lis, L.	葉 萃 根	Verbenalin (gl.) Invertin	內服，能催促分娩後胎盤之難剝離、及產後排泄物之久滯者。	處處有之。	穗類鞭鞘，故名馬鞭。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
153.	牡 荆 (本草36) 別名： 黃 荆， 小 荆， 楚。	Vitex Negundo L. (V.canna- bifolia S. & Z.)	子 莖 汁 根	Ess. oil Resin.、 Alkaloid, trace.	治腓腸筋之痙 攣及下肢之浮 腫。	河北，四川， 廣東，廣西。	古者刑杖以 荆，故字从 荆，牡荆作 樹，不爲蔓 生，故稱爲 牡。
154.	欒 荆 (本草36) 別名： 頑荆，	V. rotund- ifolia L.	果 實	Ess. oil (Pinen, camphen, Terpinyl- acetate.)	治頭痛(由感 冒所起者)、 耳鳴、眼球充 血、淚液多量 流出。 一次量 1—5gm	山東，山西。	本品有欒華 功用，故名 。
155.	蔓 荆 (本草36)	V. trifolia, L. Var. Ovata, Mak. (V. t., L. Var. unifoliol- ata, Sebaur.)	果 實 莖 枝	Ess. oil (Camphen α-Pinen, Dipenten- alcohol.) Alkaloid.	1) 爲解熱、強 壯、清涼藥 。一次量 2—6gm 2) 爲疝氣(浴 湯)、拘攣 、頭痛藥。	山東，廣東。	蔓荆，當蔓 生故名。

第十八 紫草科 BORAGINACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
156.	鷄腸草 (本草27)	Eritrichium, pedunculare. DC. (Trigonotis, P. Bthe.)	草	Alkannin	1) 爲收斂劑， 止大小便及 赤白痢。 2) 爲消腫藥， 治毒腫。 3) 爲殺虫劑， 治漆瘡頭瘡 惡瘡。	生中部及北方 各省濕地中。	本品之苗葉 似鷄腸，而 色微深，故 名。
157.	紫 草 (本草12) 別名： 紫 丹， 紫 芙， 苳 蒨， 貌， 地 血， 鴉 衛 草。	Lithospermum, officinale, L. Var. erythrorhizon, Clarke. (L. murasaki Sieb)	根	Acetylshikonin 【shikonin】 Violet Pigment.	1) 治凍傷濕疹 水泡及皮膚 病（作軟膏 塗之）。 2) 爲切傷火傷 良藥（煎汁 塗布之）。 3) 爲紫色染料 。	中部及北方各 省。	此草花紫根 紫，可以染 紫，故名。
158.	生瓜菜 (本草27)	Trigonotis Peduncularis, Bth. (Eritrichium P., DC.) (有毒)	草		治傷寒及頭痛 。	四川資縣（古 資州）。	本品之苗叢 生，葉青而 圓，似白莧 菜，夏開紫 白花，結細 實，其味作 生瓜氣，故 以名之。

第十九 旋花科 CONVULVACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
159.	旋 花 (本草18) 別名： 旋 蓄， 筋 根， 續筋根， 鼓子花， 美 草， 天劍草， 獾腸草， 纏枝牡丹。 。	Calystegia Sepium, R. Br. (Convol- vulus, S., L.) (C. japon- ica, Chois)	根 花	Glucose 17.5% Saponin Resin, Ash 4.3% Flavones	根莖葉花，爲 筋骨折斷之接 着劑，能癒合 切傷及治丹毒 之效。 又爲利尿劑， 治糖尿病。	四川，湖北， 河北，東北各 省。	其根主續筋 ，故南人稱 爲續筋根。
160.	菟 絲 子 (本草18) 別名： 菟 縷， 菟 蘘， 菟 蘆， 菟 邱， 赤 綱， 玉 女， 唐 蒙， 火龍草， 野狐絲， 金絲草。	Cuscuta japonica, Chois, (a)C.chin- ensis, Lam.	種子	Resin, Glucoside.	爲強壯收斂劑 ，治陰萎遺精 等。 一次量 4—8gm 取莖之榨汁塗 顏面，能除去 面黧。	河北，江西， 湖北。	傳說菟絲初 生之根，其 形似兔，掘 取割其血， 以和丹服， 立即變化， 則菟絲之名 ，或出此歟 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
161.	蘿 菜 (本草27)	<i>Ipomoea aquatica</i> , Forsk. (<i>Convolvulus</i> , <i>reptans</i> , L.)	草	Protein 1.6% Fat 0.2% Vit. C ₃ , B ₂ .	治胎毒，腫物打撲傷（搗碎貼局所）。	生於水濕地。	蘿與蔞同，此菜惟以壅成，故稱為蘿菜。
162.	甘 藷 (本草27) 俗名白菘，又名番藷。	<i>Ipomoea Batatas</i> , Lam. (<i>I. fastigiata</i> , Sweet.) (<i>Convolvulus</i> , b., L.)	塊根	塊根中含 Starch 24.6% Glucose 4.17% (新鮮物) Protein 1.3% Fat 0.1% Diastase, Ash 3.7% (Mn. Ca. Cu...0.57 mg%, Ti),	1) 為緩和滋養劑。 2) 為澱粉原料。 3) 為食料品用。	各地均有。	

(成分續) Vits, A₂, B₂, C₂, Tannin 4.24%, Pentosan 1.375%, (風乾物), Inosit, gum, Dextrin, Chorogen acid, Ipomoein, Phytosterol, Phytosterolin, Carotene, adenine, guanine, Betaine, Choline.

蔓中含 Adenine, Betaine, Choline, (食植)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
163.	牽牛子 (本草18) 別名： 黑丑， 草金鈴， 盆甌草， 狗耳草。	J. hederacea. Jacq. (Pharbitis h. L.) (Pharbitis Nil, Chois.)	種子	Pharbitin (係樹脂配糖體峻下成分) 2% Fatty. oil (Olein) 11% Convolvulin, Anthocyanins.	爲瀉藥(末：0.5—0.7) 又本品昔時爲峻下藥，凡患腰部以下之水腫及閉尿症者可服。 1—3gm	印度原產，南洋，台灣。 【藥典】 牽牛子，牽牛子脂，複方牽牛子散，複方大黃丸。	此藥始出田野人牽牛謝藥，故以名之。

第十二 蘿摩科 ASCLEPIADACEAE

164.	白 薇 (本草13) 別名： 薇 草， 白 薇， 春 草， 蕝， 骨 美。	Cynanchum, atratum, Bge. (Vincetoxicum, a., M. & D.)	根	Cynanchol	爲解熱利尿劑，對間歇熱發作時之灼熱及卒中患者之四肢浮腫，有緩弛之效。 一次量 1—2gm	河北，山東，廣東，東北各省。	微細也，其根細而白也。
165.	白 菟 藿 (本草18) 別名： 白 葛， 牛皮消。	C. caudatum, Maxim. (Endotropis C., Miq.)	根莖	Cynancoxin	爲利尿劑，治馬病有特效。	山東	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
166.	白 龍 鬚 (本草20)	Cynanchum, japonicum, Hemsl. (1) Vincetoxicum j., M. & D. (2) Usnea barbata Fr. Var. Cinchonarium, Arg. (3)	根	(3) 之成分 Usnin acid, Barbatin acid, Barbatol acid, Emulsin.	為驅風劑。	(1)(2)產於湖南。 (3) 各處均有	白龍鬚生近水旁有石處，細如棕絲，直起無枝葉，因形相似龍鬚，故名之。 (3) 屬地衣類。
167.	白 前 (本草13) 別名： 石 籃， 嗽 藥。	C. japonicum, Hemsl. Var. Purpurascens, Maxim. (Vincetoxicum p. M. & D.)	根		根為鎮咳藥，治氣管支炎及肺結核。 一次量 1—2gm 又治腳氣。	中部各省。	
168.	蘿 摩 (本草18) 別名： 藿， 芫 蘭， 白環藤， 雀 瓢， 研合子， 羊婆奶， 婆婆絨線包。	Metaplexis, Stauntonii, Roem. et. Sch. (M. japonica, makino) (Pergularia, j., Thunb.) (M. rostrata, Turcz.)	子 葉		1) 種子為強壯藥，治消削病。 2) 絨毛為止血藥。	河北，山東，江蘇。	漢高帝用子，傅軍士金瘡，故名研合子。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
169.	徐長卿 (本草13) 別名： 鬼督郵， 別仙蹤。	<i>Pycnostelma chinense</i> Bge. (<i>P. paniculatum</i> , KS.) (<i>Asclepias</i> p., Bunge.)	根		1) 爲強壯劑。 2) 爲鎮靜劑，治量車壘船者。	河北，山東，湖北，東北各省。	徐長卿人名也，常以此藥治邪病，人遂以名之。

第二十一 夾竹桃科 APOCYNACEAE

170.	水甘草 (本草16)	<i>Amsonia elliptica</i> , Roem. et Sch.	全草		治小兒風熱丹毒，同甘草煎飲。	江西，安徽大通。	生在水旁，功同甘草。
171.	夾竹桃 (羣芳譜)	<i>Nerium Odorum</i> . Soland.	葉，皮	葉： <i>Neriscorein</i> , <i>Neriodorein</i> , 樹皮及根： <i>Neriodorein</i> , <i>Neriodorin</i> , <i>Karabin</i> , 甙性結晶及少量之精油， 根： <i>Fetty oil</i> , <i>Kanerol</i>	爲強心劑，有毒，須注意。 【藥理】葉及樹皮之成分有似 <i>Digitalis</i> 製劑之強心作用。 (藥植)	印度原產，今各省栽培之。	其花似桃，其枝似竹節，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
172.	絡 石 (本草18) 別名： 石 鯪， 石龍藤， 懸 石， 耐 冬， 雲 雲 英， 雲 丹， 雲 珠， 石 血。	Trachelospermum, divaricatum, K. Sch. T. jasminoides, Hem.	根， 葉		1) 消散諸瘡。 2) 止渴去咽頭腫痛。 3) 治腰臀部骨節痛及關節疼痛。	甘肅，陝西， 四川，湖北， 江西，江蘇， 浙江，福建， 廣東。	以其包絡石木而生，故名絡石。

第二十二 龍膽科 GENTIANACEAE

173.	龍 膽 (本草13) 別名： 陵 游	Gentiana, scabra. Bge. (G. buergeri Miq.) (a) G. barbata, Froel. (b) G. olivieri, DC.	根	Gentiopirrin (含2%係苷質)， Gentianose (含4%三糖體)， Gentiama rin (非結晶性苷質)， Gentiin (結晶性苷質)， Gentisin (色素，含於歐產龍膽中)。	根為苦味健胃藥，治胃病消化不良。又作解熱藥用。 劑量一次丸散錠 0.2—1gm 液劑5—10gm	山東，浙江，湖北，廣東，(原產歐洲中部)。 【劑製】有浸膏，流浸膏，複方龍胆酊，又為丸劑散劑之成形藥用。	葉如龍葵，味苦如膽，因以為名。Gentiana, 為西歷紀元五百年前Illyria國王Gentius, 首知本品之藥效者。Scabra, 為銳之意，即苦味強烈之意。
------	-----------------------------	--	---	---	--	---	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
174.	蒼 菜 (本草19) 別名： 鳧 葵， 水 葵， 冰鏡草， 曆子菜， 金蓮子， 接 余。	Limnanth. emum, nymphoi- des, Hoffm.et. Link. (Villarsia n., Vent.)	全草 ， 根		可作細菌培養 材料用。	福建，江西， 江蘇，湖北， 河北。 生池沼水澤間	其葉似蒼， 故稱蒼菜。
175.	睡 菜 (本草28) 別名： 瞑 菜， 綽 菜， 醉 草， 癩婦箴。	Menyanth. es. trifoliata, L.	草	Menyar- thin, gl. Meliatin, gl. (Loganin.) Fatty oil, Carotene, Sacchara- se, Emulsin, Trimethyl -amine, Choline.	爲催眠藥。 一次量 1—1.5gm 又爲麥酒之苦 味附加用。	生於池塘。	食之令人思 睡，故名睡 菜，亦名瞑 菜。
176.	當 藥	Swertia chinensis, Franch. (Swertia japonica, Makino)	草	Swertiam- arin. Oxygenti- sin, (gl.) Swertisin. Inosit.	爲苦味健胃藥 ，治消化不良 ，爲龍膽之代 用品。	中國各省，日 本。	當藥者治病 甚得當之意 。Swertia 荷蘭人植物 學者 Emanuci Swert (1690年代) 之人名。

第二十三 馬錢科 LOGANIACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
177.	醉魚草 (本草17) 別名： 鬧魚花， 魚尾草， 擔木。	Buddeia japonica, Hemsl. (B. curviflora, H. & A.)	葉，花	醉魚草素甲 (Buddeoflavonol- eside) 醉魚草素乙 (Buddeos- ide) 醉魚草素丙 (Melanos- ide) 及醉 魚草酵素 (Buddeo- diastase) (薛愚)	用於魚中毒及 解諸魚骨哽。	南方各省及西 藏各地。	漁人捕魚， 漁人采花及 葉以毒魚， 盡閉固而死 ，呼為醉魚 兒草，池沼 邊不可種之 。
178.	密蒙花 (本草36) 別名： 水錦花。	Buddeia officinalis Max. (B. madagascariensis, Hance.)	花	Buddelin (黃鹼體) (會廣方)	花以酒與蜜浸 出，治目中障 翳，目中赤脈 及羞明怕日。	甘肅，陝西， 四川，湖北， 貴州，雲南， 廣西。	其花繁密蒙 茸如簇，故 名。
179.	鈎吻 (本草17) 別名： 野葛， 毒根， 胡蔓草， 斷腸草， 黃藤， 火把花。	Gelsemium elegans, Bth. (1) Medicia elegans, Gard. (2) Leptopter. is, sumatrana Blume. (3) Rhus Toxicodendron, L. var. (4) radicans, Miq.	根， 葉 根	Alka'oid Fisetin Toxicoden- dron acid.	治神經痛，氣 喘，百日咳。	福建，廣東， 雲南。 湖北(4)	鈎吻，言其 入口則鈎人 喉吻也，或 言吻當作挽 字，牽挽人 腸而絕之也 。 第四種原植 物，屬漆樹 科。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
180.	番木鱉 (本草18) 別名： 馬錢子， 苦實把豆， 火失刻， 把都。	Strychnos Nux vomica, L.	種子	Strychnine, Brucine, Von.icin. Igasurine, Loganine, Tannin, Chlorogen acid, Cu.	1) 治末梢中樞神經麻痺及消化不良。 劑量一次 0.01-0.05gm (爲散劑丸劑)。 2) 爲苦味健胃劑。一次量 0.5-1gm	原出後印度及北澳洲。但中國之西藏，安南之東京，早已栽培。	狀似馬之連錢，故名馬幣。 又似木鱉因出回回國(今中亞細亞)，故名番木鱉。

第二十四 木犀科 OLEACEAE

181.	連翹 (本草16) 別名： 連， 異翹， 旱蓮子， 蘭華， 三廉。	Forsythia suspensa, Vahl. (Lilae perspensa, Lam.) (Syringa s., Thunb.)	果， 葉， 根， 莖	Saponin, Phillyrin, (gl.)	對腸胃頸淋巴腺結核，有排膿去毒，緩弛腫脹及疼痛之效。 一次量 1-3 gm 又爲解熱劑。	甘肅，陝西，湖北，山東。	其實似蓮作房，翹出衆草，故名。
182.	秦皮 (本草35) 別名： 樗皮， 石櫟， 石櫟， 盆盆， 苦。	Fraxinus bungeana. DC, Var. pubinervis, Bl. (a) F. bungeana, DC	皮		爲解熱鎮痛藥，治縷麻室斯痛風，熱性下痢等。 一次量 1-3gm	陝西	秦皮，本作樗皮，其木小而岑高，故因以爲名。又名秦木因出秦地，故得秦名也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
183.	白 素 馨 音譯： 耶悉若花	Jasminum grandiflorum, L.	花	Ess. oil 0.18%, Benzyl acetate, Linalool, Jasmon. Indol. Anthranilic acid.	1) 茶葉附加香氣用。 2) 製香精用。	印度，意大利，台灣。	
184.	迎 春 花 (本草16)	J. nudiflorum, L. (J. sieboldianum, Bl.)	花	Syringin, (gl.) Jasmiflorin, (gl.) Jasmipicrin (Bit.)	花為發汗利尿劑。 葉為消毒劑，治腫毒惡瘡。	河北，陝西，江蘇。	本品於舊正月開花，故名迎春。
185.	黃 素 馨	J. officinale, L.	花	Ess. oil, Benzyl acetate, Indol. Anthranil-methylester.	1) 茶葉附香氣用。 2) 製香精用。	印度，台灣，意大利。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
186.	茉莉 (本草14) 別名： 奈花，	Jasminum Sambac. Ait. (Nyctant- hes S., L.)	花 根	Ess. oil (Formic Acetic- benzoic- linalyl ester, Anthranil- ic methyl ester, Indol.) Paraffine.	爲洗眼藥(結 膜炎)，又爲 茶之賦香料。	江蘇，福建， 廣東，雲南， 台灣。	稽含草木狀 作末利，佛 經作抹利， 本胡語，無 正字。
187.	女貞 (本草36) 別名： 貞女， 冬青， 蠟樹。	Ligustrum lucidum Ait. (L. ovalif- olium Hassk.) (L. japon- icum Thbg.)	葉 種子	Syringin gl. Sccharose Emulsin, Invertin	葉爲解熱鎮痛 消炎劑，子治 頸淋巴腺結核 、水腫、腹水 等。	四川，湖北， 湖南，安徽， 江蘇，浙江， 福建，廣東， 雲南。	此木凌冬青 翠不凋，有 守貞之操， 故名。
188.	齊墩果 別名： 洋橄欖，	Olea europaea, L.	果 實	果實： Fatty oil 22%， (Olein 93%， Stearin), Lipase, Chloroph- yll. Ash	1)爲灌腸劑、 注射藥溶劑 、軟硬膏。 2)爲藥用肥皂 原料。 3)爲食品品。	波斯	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(Cu, Zn), Mannit, Oleuropein (gl.) 葉： Mannit Oleasterol, Olestran- ol, Homo- lestranol Oleanol, Pentatria- kontan, 樹皮： Oleanitol, Ipuranol.	【藥典】有洋橄 欖油，樟腦洋 橄欖油，錫粉 洋橄欖油，藥 用肥皂，氣仿 擦劑，氣仿油 ，石炭酸洋橄 欖油，斑蝥油 ，斑蝥硬膏， 引赤紙等品。		
18).	木 犀 (本草34)	Osmanthus fragens, 別名： Lour. 巖 桂, (Olea f., 桂 花, Th.) 金 桂, 丹 桂, 銀 桂。	花	Ess. oil 0.1%, Protein 0.6%,	1)潤髮，辟臭 、化痰、生 津、美顏色 2)治風虫牙痛 。 3)木犀花露： 明目，除口 臭，含嗽牙 齒。	廣西桂林，浙 江杭州。	
190.	枸 骨 (本草36)	Osmanthus Aquifoli- um, B. 香木齒桂 et H. (1) ，杠谷樹 (Ilex ，柎。 cornuta Lindl.) (別名貓兒 刺) (2)	皮， 種子	皮： Caffeine	枝葉及樹皮， 治癰疔及腫物 ，又對百日咳 亦有效。	浙江，江蘇， 江西，湖北。	此木肌白如 狗之骨，故 名。 第二種原植 物，屬冬青 科。

第二十五 安息香科 STYRACAEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
191.	安 息 香 (本草34)	Styrax Benzoin		Benzoic acid Cinnamic acid, Vanillin, Lubanol, Resin 80%, Ash 2.5%	爲矯臭及芳香性防腐劑，祛癢鎮痛劑，又爲安息香酸及其鹽類之原料。	安南，暹羅，蘇門答臘，爪哇，馬來羣島，後印度。	此香辟惡，安息諸邪，故名。又說此香出安息國，故名。

(備考) 安息國名，古代波斯地方之王國，其名因建國之王阿息克而來。

按 Benzoe 之名稱，係十四世紀中葉著名之亞拉伯旅行家 Ibn Batuta，至蘇門答臘，得敬神之香，名 Luban djawi，有爪哇神香之意，嗣後歐人即依此字轉變爲 Benjawi, Benjui, Benzui 等，今德式拉丁定爲 Benzoe，英美式定爲 Benzoinum。

192.	摩 廚 子 (本草31)	S. Japonicum, S. et. Z.	果皮 種子	Egosaponin, Fatty oil Egonol oil.	汁味香美，肥潤可茹，又爲滋補劑用。	四川，廣東，雲南，貴州，安南，緬甸，波斯。	摩廚子，如瓜，可爲茹，其汁香美，如用油然。 陳祈暢異物志云，木有摩廚，生自斯調，厥汁肥潤，其澤如膏，馨香馥郁，可以煎熬，彼州之人，以爲嘉肴。
------	-----------------	-------------------------	----------	--	-------------------	-----------------------	---

第二十六 栲樹科 EBENACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
193.	裨 栲 (本草30) 別名： 添 栲， 綠 栲， 青 栲， 烏 栲， 花 栲， 赤棠栲。	Diospyros Embryopt- eris, Pers. (D. glutin- osa, Koen.) (D. cordif- olia.)	果	ugar, Tannin 15%,	有止渴利尿潤 肺作用。	河北，湖北， 江西，陝西， 甘肅。	裨乃栲之小 而卑者，故 謂之裨，他 栲至熟則黃 赤，惟此雖 熟亦青黑色 ，搗碎浸汁 ，謂之漆， 可以染蓋 扇諸物，故 有漆栲之名 。
194. a.	栲 (本草30)	Diospyros chinensis, Bl. (D. Kaki, L.)	果	果實中含 Sugars 16%, (Cane Sugar, Grape sugar, Fruit sugar.) Pentose mannite.	栲開胃消痰， 止渴潤心肺， 栲蒂治欬逆（ 吃逆）及夜尿 症，栲澁治下 痢及腹痛。	河北，河南， 江西，湖北， 陝西，甘肅。	栲（音士） 從牙，俗作 柿，非也， 柿音肺，削 木片也，胡 名鎮頭迦。 按柿，說文 赤實果，从 木才聲，才 篆文从屮， 正書宜作柿 。

(成分續) (爲栲乾表面白粉之主成分)，malic acid (0.3%)，Shibuol，
 (爲栲中澁味之主成分)，Lycopin C₅₀ H₅₆，Karotin (以上二者，爲栲
 中色素之主成分)，Zeaxanthin, Tannin, Protein 2.3%, Amylase,
 Catalase, Metaoxydase, Peroxydase, Cellulose, Pectin, Vits, A₁,
 C₁。

栲蒂中含 275°C 熔融之無氮結晶性物質。(食植)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
b.	柿 霜 (本草30) 別名： 柿 餅， 白 柿， 柿 花， 乾 柿。	Sugar of dried, Persimmon.		大部分由葡萄糖及果糖而成。	1) 治反胃咯血、血淋痔疾。 2) 解痘瘡入目及桐油毒。		將柿果去皮乾燥後，即生出粉狀之糖粉，集此糖粉而固結之，即為柿霜。
195.	君 遷 子 (本草30) 別名： 檳 棗， 楞 棗， 牛 爛 柿， 丁 香 柿， 紅 藍 棗。	D. Lotns, L.	果	Sugars 16%, Protein 6.5%, Fat 0.8%, Malic acid Oxidase.	為清涼劑。	河北，山東， 湖北，廣東。	君遷子，似馬爛，即今牛爛柿也，以形得名。
196.	烏 木 (本草35) 別名： 烏 欖 木， 烏 文 木， 翳 木。	Maba ebenus, Spr. (M. elliptica, Forst.)	木	Black Pigment, flumic acid.	解毒，併治霍亂吐瀉。	海南，雲南。	其木漆黑，故名。

第二十七 磯松科 (藍雪科) PLUMBAGINACEAE

197.	白 花 藤 (本草18)	Plumbago Zeylanica, L.	根	Plumbagin α-methyl -8 oxy- naphtoqui -non.	根為通經藥， 并解蛇毒。 粉末為除痔藥。 汁液為疥癬藥， 并為引赤發泡劑。	廣東	
------	-----------------	------------------------------	---	--	---	----	--

第二十八 紫金牛科 MYRSINACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
198.	硃砂根 (本草13)	<i>Ardisia crenata</i> Sims. (<i>A. lentiginosa</i> , Lindl.)	根		治咽喉腫痛。	湖北，浙江， 福建，廣東。	本品葉似冬青，背赤，根大如筋，赤色，故以名之。
199.	百兩金 (本草13)	<i>A. hortorum</i> , Max.	根	Ardisic acid A. Ardisic acid B. p-hydroxybenzo-phenone.	為祛痰藥及消炎藥，治風濕及咽喉腫痛。	雲南	
200.	紫金牛 (本草13)	<i>Ardisia chinensis</i> , Benth. (<i>A. japonica</i> , Bl.)	根		為祛痰劑，解毒劑，能去風痰，解毒清血。	浙江，福建， 湖北，四川。	
201.	杜蘅山 別名： 杜恆山，	<i>Maesa Doraena</i> , Bl. (<i>M. coriacea</i> , Champ.)	葉，莖		治溫瘧寒熱，煩渴，頭痛，心躁。	南方各省。	

第二十九 杜鵑花科 (石南科) ERICACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
202.	地蜈蚣草 (本草16)	Cassiope Stelleriana, DC.	根 草		療癰腫，解蜈蚣毒。	生村落墘野間。	本品左右蔓延，葉密而對生，如蜈蚣然。
203.	木 藜 蘆 本草17) 別名： 黃藜蘆， 鹿 驢。	Leucothoe Grayana, Maxim.	葉	Grayano- toxin. $C_9H_{14}O_3$	1) 葉為煎汁，有殺虫作用，治疥癬及毛虱，洗家畜皮膚，有驅除寄生虫之效。 2) 投葉於便所中，有殺蛆之效，對內容3斗之糞便壺中，投葉之粉末20兩，蛆3日以內，完全死滅，其後經過3日間，不見有新蛆之發生。		
204.	櫻 木 (本草36) 別名： 馬醉木，	Lyonia japonica, D. Don. (Andromeda J., Th.) (Pieris, J., D. Don.)	葉	Androme- dotoxin, Asebotin Asebopur- purin, Aseboquer- -citrin.	葉之煎汁，為害蟲之驅除劑，治家畜皮膚寄生蟲及蠅蛆，又治疥癬，消蛇毒。	江蘇，安徽，浙江。	牛馬若食此藥，陷於昏醉，故名馬醉木。 Pieris，因保護文藝及學術之女神Pieriden之名而來。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
206.	緞木 (本草35)	<i>L. ovalifolia</i> , D. Don. (<i>Pieris o.</i> , D. Don.)	木	Andromedotoxin.	為強壯劑。	浙江，湖北。	木紋側戾，故名緞木。
206.	南燭 (本草36) 別名： 南天燭， 南燭草木， 男菝， 染菝， 猴菝草， 草木之王， 惟那木， 牛筋， 烏飯草， 黑飯草， 楊桐， 桴 名文燭。	<i>L. ovalifolia</i> , D. Don. (<i>Andromeda o.</i> , Wall.)	枝葉 子		枝葉為收斂劑，強壯劑。子為強壯劑，固精、增強體力。	江蘇鎮江，浙江，湖北。	取汁漬米，作烏飯，食之，健如牛筋，故一名牛筋。
207. a.	映山紅 映山紅 杜鵑花 山躑躅	<i>Rhododendron indicum</i> , Sw., (<i>Azalea indicum</i> , L.) (a) Var. <i>ignessens</i> Sweet. (b) Var. <i>macranthum</i> , Maxim. (c) Var. <i>Kaempferi</i> , Maxim.	花 花 花	Andromedotoxin. Ericolin.	映山紅，杜鵑花，山躑躅，均開紅色或紫色花，有微酸味，無毒。	各地山中。	杜鵑花，以杜鵑啼時開，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
207. b.	石 南 (本草36) 別名： 風 藥，	Rhododen- dron Metterni- chi S. et. Z. (R. hyme- nanthes, Makino; Var. pentamer- um, Mak.)	葉	Rhodotox- in, $C_{31}H_{50}O_{10}$ Tannin.	葉爲強壯劑， 催淫劑，又爲 利尿藥，鎮痛 劑，解熱劑， 治頭痛。 女子連服，則 亢進情慾。	中部各省。	生於石間向 陽之處，故 名。桂楊稱 爲風藥，充 茗及浸酒飲 ，能愈頭風 ，故名。
208.	羊 躑 躅 (本草17) 別名： 黃躑躅， 黃杜鵑， 鬧羊花， 警羊花， 老虎花， 玉 枝， 羊不食草 。	R. sinense Sw. (Azalea sinensis, Lodd.) (A. mollis, Blume.) (A. japon ica, Gray.) (R. globri- us, Nakai. Var. aurcum, Nakai.)	花 根皮	Androme- dotoxin. (Aseboto- xin.) $C_{31}H_{50}O_{10}$ Rhodoja- ponin. $C_{18}H_{28}O_6$ Sparassol $C_{10}H_{12}O_2$ (Everin- säure- methyl- ester.) (藥植)	花及根浸酒內 服，治痛風及 俄麻質斯，但 有劇毒，須特 別注意。	山西，河北， 河南，安徽。	羊食其葉， 躑躅而死， 故名。鬧當 作惱，惱亂 也。 本品爲毒劇 藥，當注意 。

第三十 鹿蹄草科 PIROLACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
209.	鹿 蹄 草 (本草16) 別名： 小秦王草 ，秦王試 劍草。	Pirola elliptica, Nutt. (P. japonica, Sieb.)	全草	Ericolin, Arbutin, Urson. Gallic acid (木新)	生藥之汁液， 塗布於創傷及 毒蟲咬傷者有 效。又全草為 煎劑，治腳氣 病，又有止血 之效。	產於江西、福 建、廣東、廣 西、湖北、四 川、陝西等省 之山林中。	葉形象鹿蹄 ，故名鹿蹄 草，能合金 瘡，又名試 劍草。

第三十一 山茱萸科 CORNACEAE

210.	松 陽 (本草35) 別名： 椴子木	Cornus macrophylla, Wall.	木皮		木治折傷、止 痛、清血。 木皮治痢疾。	江蘇，湖北， 湖南，江西， 浙江。	其材如松， 其身如楊， 故名松楊， 椴普涼，其 陰可蔭涼， 故曰椴木。
211.	山 茱 萸 (本草36) 別名： 蜀酸棗， 肉 棗， 魁 實， 鷄 足， 鼠 尖。	C. officinalis, S. et Z.		果實含有酒 石酸蘋果酸 沒食子酸及 245°C 融點 之結晶性酸 。(漢植)	為強壯藥，治 遺精、多尿症 及腰痛。 一次量 5gm	山東，陝西。	本經一名蜀 酸棗，今人 呼為肉棗， 皆象形也。

第三十二 繖形科 UMBELLIFERAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
212.	白 芷 (本草14) 別名： 白 芷， 芳 香， 澤 芬， 苻 離， 寶 莞， 藹 蕪， 藥。	Angelica anomala, Pall. (<i>A. glabra</i> , Makino.) (<i>A. refracta</i> , F.S.) (<i>A. japonica</i> , Gray.)	根	Ess. oil 0.1%, Angelico- toxin, Phelland- ren, Oxy-penta- decylic acid.	1) 爲鎮痛劑， 治頭痛、眩 暈、牙痛、 腫物之疼痛 等。 2) 爲陣痛催進 劑及通經藥。 。一次量 4—8 gm 3) 爲痔及諸瘡 之浴湯劑。	四川，湖北， 江西，江蘇， 河北，東北各 省。 【藥理】少量之 Angelicoto- xin, 可使血管 運動中樞、呼 吸迷走神經及 脊髓等興奮； 大量起痙攣， 發生一般之麻 痺(漢藥)。	初生根幹爲 芷，白芷之 義，或取於 此。 Angelica, 天使之意， 其藥顯著， 如天使然， glabra, 爲 無毛之意。
213.	獨 活 (本草13) 別名： 羌 青， 獨搖草， 護羌使者 ，胡王使 者，長生 草。	Angelica grosse- rrata, Max. (<i>A. polyclo- ada</i> , Fr.) (<i>A. inaeq- ualis</i> , Max.)	根	種子： Fatty oil 17%, Ess. oil	爲治風要藥， 治頭痛感冒及 項背部凝痛。 劑量一次 6—10 gm	河北，雲南昆 明。	一葉直上， 不爲風搖， 故曰獨活。
214.	都 管 草 (本草13)	<i>A. kusiana</i> Maxim.)	根	Ess. oil Sugars.	根治風腫，癰 毒，解蜈蚣、 蛇毒。	廣西	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
215.	當 歸 (本草14) 別名： 乾 歸， 山 蘄， 文 無。	Angelica polymor- pha, Maxim, Var. Sinensis, Oliv, (A. sinen- sis, Diels.) (A. anom- ala, Var. chinensis, U S D.) (Ligusti- cum acuti- lobum, S. et Z.)	根	Ess. oil 0.2%, Resin, Lactone. 【藥理】精油，使大腦鎮靜、延齡諸中樞興奮與麻痺（漢藥）。 【新藥】Eumenol, 係德國 E. Merck 公司出品，為通經藥及鎮靜藥。	服本品，可使血液善於循環、身體溫暖、對於四肢，有冷感及切創之疼痛及臟躁病等有效。 劑量一次 1—3 gm 對月經困難者，尤有效。	四川，湖北，江西，浙江，廣東，雲南。	古人娶妻，為嗣續也，當歸調血，為婦人娶藥，有思夫之意，故有當歸之名。又當歸，治惡妊婦產後血上衝，卒取效，血昏亂者，服之，即定，能使氣血各有所歸，當歸之名，或因此出。Ligusticum 由地名而來，acut lobum，為裂片尖銳之意。
216.	羌 活 (本草13)	Angelica sylvestris, L. A. korea- na, Maxim,	根		羌活與獨活，為治風之要藥，均用於顏面神經麻痺、四肢癱瘓、手足不遂及關節風濕等。	河北祁州。遼甯，吉林，朝鮮。	獨活自羌中來者為良，故有羌活之名。
217.	馬 蘄 (本草26) 別名： 牛 蘄， 胡 芹， 野茴香。	A. yabea- na. Mak.	根 苗		苗及子，為消化健胃劑。	生於池沼中。	凡物大者多以馬名，此草似芹而大故也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
218.	葶 (本草26) 別名： 苦 葶， 葶 藜， 旱 芹。	Apium graveole- us, L.	草	Ess. oil 1.7%, Protein 1.3%, Vits A ₂ , B ₁ , C ₂ . Mannite, Cu 0.7mg%, Apiin, Apigenin, Inosite, Asparagin, Glutamin, Choline, Linase.	搗汁洗馬毒瘡 并服之，又塗 蛇蠍毒及癰腫 瘰癧。	山東	苦菜也。
219.	此 胡 (本草13) 別名： 地 薰， 芸 蒿， 山 菜， 茹 草， 柴 胡。	Bupleur- um falcatum, L.	根 莖	Saponin, Fatty oil, (Linolic glyceride) Phytoster- ol. Rutin C ₂₇ H ₃₀ O ₁₆ (食植)	為解熱藥，治 瘧疾之惡寒戰 慄及潮熱，又 除胸膈部之苦 悶。 一次量 2-5gm 【藥理】因溫刺 而發熱之家兔 ，用柴胡及其他 七種漢方解 熱藥之前劑， (20:100)對 體重 1kgm，使 其服25cc柴 胡最有效，在 1-1.5 小時 內，降至常溫 或常溫以下， 後又徐徐上昇 ，又柴胡能阻 止蟪蟲之發育 ，似能使之消 滅。(漢藥)	北方各省，福 建，雲南。 準藥典採用柴 胡	此古柴字， 嫩則可茹， 老則采而為 柴。故苗有 茹草之名， 而根名柴胡 也。Bupleur- um為牛 肋之意， falcaus 鐮狀之意， 因其葉形相 似也。 有北柴胡， 銀柴胡二種 。
220.	南柴胡	Bupleur- um Sacchalin- ense, Fr. Schm.	根 苗		與北柴胡同。	福建	生南方者， 稱南柴胡。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
221.	阿月渾子 (本草30) 別名： 阿育丸實	Carum Ajowan Benth, et Hook.	果實	Ess. oil 3—4%, Thymol, Cymol, Pinen, Dipenten Terpinen.) Fatty oil 25—32%, Protein 17%,	治霍亂用。	東印度，波斯， 埃及，阿富汗。	藥典採用阿 月渾油，阿 月渾水，阿 月渾流浸膏 等。
222.	芎 藭 (本草14) 別名： 川 芎， 胡 藭， 香 果， 山鞠窮。	Conioseli- num univittat- um Turcz. (Cnidium officinale, Mak.) (Apium graveo- lens, L.)	根	Ess. oil 1—2%, (Cnidium- lacton, Sedanolid, Sedanon- säure, Cnidium- säure.)	爲逆上及頭痛 之特效藥，治 子宮痙攣及臟 躁症 (Hyst- herie)。 一次量 0.8—4gm	四川，陝西， 甘肅，浙江， 江蘇。	人頭穹窿窮 高天之象也 ，此藥上行 ，專治頭腦 諸疾，故有 芎藭之名。 本品出蜀中 者爲良，故 名川芎。

【藥理】川芎精油，使局部呈刺激作用，少量使血管運動呼吸與反射諸中樞興奮，大量對心臟有麻痺作用，對末梢血管，有少擴張性。
(漢植)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
223.	胡 荽 (本草26) 別名： 胡 菜， 香 葵， 蘆 葵。	Coriand- rum Sativum, L.	根 葉	葉含 Protein 1.8%, Vit. C ₃ Ess. oil 0.3%, (主成分含 70%之 d- Linalool, 20%之 P-cymol.) Fatty oil 19%, (Petroselin- säure, Oelsäure, Linolsäure Palmitin- säure), K. Malat 4%, Pentosan, Vit C. (植研)	爲健胃驅風祛 痰藥。劑量0.5 —2gm。又爲 香味料用。		荽，許氏說 文作葎云， 藿屬，可以 香口也，其 莖柔葉細而 根多鬚，綫 綫然也。張 騫使西域， 始得種歸， 故名胡荽。
224.	三 葉 別名： 野蜀葵， 鴨兒芹。	Cryptota- enia japonica, Hassk. (C. canad ensis, DC.)		Pentosan 4.968% (無水物) Ess. oil 0.007%, (葉最多根 次之，莖最 少) Fatty oil.	治蛇蜂螫傷。 (中典)	栽培於田園中 。	本品之葉互 生，有三小 葉，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
225.	胡 蘿 蔔 (本草26)	Daucus, Carota, L.	根	全草含 Ess. oil 0.5—1.6% 根含 Carotin	根爲消化健胃劑。 子治久痢。	處處有之。	元時始自胡地來，氣味微似蘿蔔，故名。
<p>(成分續) (紅色素) 0.02—0.13%, Fats 0.3%, Protein 1%, Sugars 6%, (蔗糖及葡萄糖), Pentosan 8.9%, Ash 1—8% (Cu, Mn, Ti), Vits A₂, B₂, C₂, G₁, Malic acid, Pectin, Choline, Xanthophyll, Asparagine, glutamine, Inosit, Adenine, Hystidine, Phytosterine, Lecithine.</p> <p>種子中含 Ess. oil 1% (Limonene, Pinene, Cineol, Carotol), Fat 13%, Daucucine, Ash 8.5%. (食植) (本新)</p>							
226.	阿 魏 (本草26) 別名： 阿 虞， 薰 渠， 哈昔呢。	Ferula Assa foe tida, L. (F. scoro- dosma, Benth et Trim.)	樹脂含 61.6% 之 Asaresino. tannol 之 Ferulasäur -eester. 約 0.6 之遊	爲驅風祛癩癢通經劑，又爲驅虫劑。	波斯，阿富汗，埃及。	夷人自稱曰阿此物極臭波斯國呼爲阿虞。	
<p>(成分續) 離 Asaresinotannol, 約 25% 之 gum 質, 約 6.5%, 之揮發油, 遊離之 Ferulasäure 等, 其他含 Umbellsäure 及含硫揮發油 C₇H₁₄S₂, C₈H₁₆S₂, C₁₀H₁₈S₂, C₁₁H₂₀S₂ 等。</p>							
227.	馱 齊 別名： 馱齊香， 格蓬香膠	Ferula galbanifl- ua, B. et B.	滲 出 液	Ess. oil (Pinen, Cadinen) Umbellife- ron.	製硬膏，治風溼痛、潰瘍、鵝眼等症。	波斯，阿富汗，土耳其。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
228.	懷 香 (本草20) 別名： 茴 香， 八角珠。 (F. officinale All.) (F. capillaceum Gilib.) (F. dulce, Mill.)	Foeniculum, Vulgare, Mill.	果實	葎含 Fat 0.3%, 藥含 Protein 2.2%, 果實含 Ess. oil 3%, (此油之主成份為Anethol 50 60%,其他為Fenchon, Phellandren, Pinen, Dipenten, Methylchavicol, Can.phen, Anisaldehyd, Anisic acid.) Fatty oil 9%, Sugars 4—5%, Starch 13%, Ash 8—9% (Cu 1.2mg%), Emulsin, Linase. (生藥, 本新)	為健胃, 驅風 祛痰, 催乳諸 藥用。	中國、日本、 英、法、德、 奧、意、比、 荷諸國。	臭肉加本品少許, 即無臭氣。曰茴香。【藥典】茴香水, 茴香精, 茴香油, 茴香精, 複方甘草散, 小兒散, 阿片安息香酊。旃那糖漿, 複方旃那銨劑, 硫酸銨水。
229.	藜 本 (本草14) 別名： 藜 茛, 鬼 新, 微 莖。	Nothosyrnium japonicum, Miq.	根莖	Ess. oil 1.3%, (Nothosyrnol, C ₁₁ H ₁₄ O ₂) Dimethoxy-allylbenzene.) Palmitic acid. (食植)	對流行性腦脊 髓膜炎所起之 劇烈頭痛與頸 部強直有緩弛 之效。 一次量 2—4gm	雲南昆明, 江 西, 東北各省 。	根上苗下, 似禾藜, 故名藜本, 本根也。
230.	水 蕪 (本草26) 別名： 芹 菜, 水 英, 楚 葵。	Oenanthe-stolonifera DC.	葉莖	Protein 2.0%, Fat 0.25% Pentosan 5%, Ess. oil (食植)	為強壯劑。	河北, 浙江, 湖北, 廣東。	蕪當作蕪从艸蕪聲也, 後省作芹从斤, 亦諧聲也, 按蕪即蕪字地名, 為湖北之蕪州蕪縣, 地多蘆芹, 故字从芹。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
231.	前胡 (本草13)	Peucedanum de-Cursivum, Maxim.	根	Nodakenin gl. $C_{20}H_{24}O_9$ Ess. oil, Tannin, Sugars, Fatty acids, Spongosterol. (本新)	爲鎮痛鎮咳及祛痰藥，治氣喘、百日咳、氣管支炎。 一次量 8gn	浙江杭州，河南信陽，湖北，江西，廣西。	
232.	蒔蘿 (本草26) 別名： 小茴香， 慈謀勒。	P. graveolens, Bth. et Hk. (Anethum graveolens, L.)		果實含 Ess. oil 3—4%, (Carvone, d limonene, Phellandrene.) Fatty oil 16—17%, Mucilage, Amines, Emulsin, 莖葉含 Ess. oil 1.5%, (α -Phellanthrene, Terpinen, Limonene, Carvone, Dillapiol, n-octyl-alcohol.) Ash 9.7% (本新) (食植)	1) 果實爲西菜之香味料用。 2) 爲健胃劑，及解魚肉中毒用。	四川萬縣、重慶，山西，陝西，蒙古。(南歐原產)	蒔蘿，係英語及德語 Dill 之譯音 Anethum，爲果實有奇烈之味者，graveolens 有濃厚香氣之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
233.	防 蕤 (本草17) 別名： 房 蕊， 梨 蓋， 利 茄。	Peucedan- um. japonic- um, Th.	根		根治感冒及痛 風，有毒性須 注意。 有云要起皮膚 炎。	河北	莖葉似葵花 ，子根香味 似防風，故 名防蕤。
234.	蜘蛛香 (本草14)	Pimpinella calycina, Max. Var. brachyca- rpa. Kom.	根		治瘟疫。	四川，東北各 省。	本品之草根 ，黑色，有 粗鬚，狀如 蜘蛛，故名 。
235.	蛇 牀 (本草14) 別名： 蛇 粟， 蛇 米， 虺 牀， 馬 牀， 牆 牀。	Selinum japonicum Miq. (a)S. Mon- nieri. L. (Cnidium monnieri, Cuss.) (Cnidium japonicum Miq.)	種子	Ess. oil 1.3%, (l-Pinen, Isoborne- ol, Isovaleri- anylborn- olester)	內服治陽事不 起，劑量一次 3—5gm 外用治子宮寒 冷，除粘液性 分泌物及陰門 癢痒症。	江西，江蘇， 福建，廣東， 雲南，河北， 東北各省。	蛇虺喜臥於 下，食其子 ，故有蛇牀 蛇粟之名。
236.	蕤 蕪 (本草14) 別名： 薇 蕪， 斬 蕪。	S. sp.	花草		治咳逆定驚氣 。	安徽	其莖葉脆弱 而繁蕪，故 以名之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
237.	邪 蒿 (本草26)	Seseli Libanotis, Koch.	草	Hesperidin.	爲驅風藥，可 代防風用。	河北，山東。	此蒿葉紋皆 邪，故名。
238.	防 風 (本草13) 別名： 銅 芸， 回 芸， 回 草， 屏 風， 蘭 根， 百 枝， 白 蕞。	Siler divaricat- um, Bth. et Hk. (Stenoco- elium d. Turc.)	葉 花 種子	Ess. oil 0.05% (於)	爲治風要藥， 對於頭痛、頸 部強直、遊風 、關節痛，均 有效。 劑量一次 1—3gm	雲南元謀，河 北，東北各省	防者禦也， 其功療風最 要，故名。

第三十三 五加科 ARALIACEAE

239.	五 加 (本草36) 別名： 五 佳， 五 花， 文章草， 白 刺， 追風使， 木 骨， 金 鹽， 豺 漆， 豺 節。	Acanthop- anax. spinosum, Miq. (Panax s., Linn.) (A. acule- atum, Seem.) (Periploca Sepium Bung.)	皮 根	Protein Tannin 7% Ash 7.5%	皮及根爲強壯 劑，治陰痿。 又治疝氣腹痛 等。	江西，江蘇， 浙江，安徽， 湖北，廣東， 陝西，河北， 東北各省，福 建永安上耳。	此藥以五藥 交加者爲良 ，故名五加 。今藥肆中 所用之五加 皮，大部分 爲第四種原 植物，屬蘿 摩科。
------	--	--	--------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
240.	摠 木 (本草36) 別名： 鵲不踏 (A. spinosa L.) A. chinesis, L. var. glabrescens, Mats.)	Aralia canescens, S. et Z.	內皮	α及β-Taraligin (水解成Taraligin等)。 Protocatechinsäure, Cholin等。	1) 根用於胃瘕之初期。 2) 樹皮治糖尿病腎臟病，又有利尿作用。	四川劍閣，湖北，浙江，廣東，東北各省。	【藥理】本品之煎劑，有似Adrenaline之拮抗作用，因含有Choline之故。 【新藥】Pirokishin，為胃腸病注射藥。
241.	士 當 歸 (拾遺5) 茶 芎， 水白菜。 S. et Z.)	A. cordata Th.	根	Choline, Guanine, Xanthine.	為強壯劑，鎮靜劑，通經劑。	河南密縣及江淮諸山野，咸有出焉。	
242.	八角金盤 本草從新 別名： 金剛纂	Fatsia japonica Dcne. et Planch.	葉	Fatsia-saponin, Fatsin (gl)	為祛痰藥，一次量 10gm	浙江湯溪南山。	新藥 Fatosin，為祛痰藥。 【藥理】用 Fatsinsapotoxin 1 : 102400 或 Fatsin 1 : 4000 之稀釋度，完全呈溶血作用，而前者對於局部刺激作用尤強，注射千倍溶液 5cc 於家兔耳殼，一小時後發紅，即引起無菌的化膿。 (食植)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
243.	通脫木 (本草18) 別名： 通草， 活梵， 離南。	Fatsia papyrifera Bth. et Hk. (Tetrapanax, P., Koch.) (Aralia P., Hook.)	花粉 內韋	Inosite	本部為利尿劑 及解毒劑。 花粉用於蟲瘻 ，惡瘡痔疾及 頸淋巴腺結核 等。	湖北	藥肆中所謂 通草，皆係 脫通木，本 品古時用以 代紙，或作 裝飾用。
244.	常春藤 (本草18) 別名： 士鼓籐， 龍鱗蕨， 爬山虎 ，木葛。	Hedera Helix, L. (Var, colchica, C. Koch.)		葦含 Gum, R. sin. 葉含 Hederin (gl), Inosite, Chlorogen acid, Carotin, Cutose, Ash 2%, (Zn, Mn, Cu, As), 種子含 Hederin, Pigment, Fat. oil (本新)	為止血藥，治 衄血。(取液 汁內服)又為 消腫藥，治癰 疽及腫毒。	生山野間	藏器曰，小 兒取藤打地 ，能作鼓聲 ，故有士鼓 之名，李邕 改為常春藤 。
245.	人 參 (本草12) 別名： 人 蔘， 黃 參， 血 參， 人 蔘。	Panax Ginseng, C. A. Mey. (P. schin- eng, Nees.) (Aralia	根	Ginsenin, Panaqui- lon, Panaxin, Panaxsapo- -genol. (以上gl.)	補血強壯興奮 。一次量 1—3—8gm 新藥 Ginsen- in, 用於神經 衰弱，貧血， 性慾減退等。	遼寧東之長白 山，吉林寧安 (寧古塔)， 河北永年，山 西長子，雲南 姚安，安徽舒 城，朝鮮(故	人參應書人 蔘，因字劃 多簡寫人參 (蔘乃藥效 徐徐發現之 意)，其根 似人形，故

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
	鬼蓋神草 土精 地精 海腹，瓣面還丹 吉林參 高麗參 東洋參 西洋參。	quinque-folia, A. Gr.) (美國種) (Panax q.) Linn.)		Ess. oil (Panacen) Pentose Fatty oil (Linolic acid, Palmitic acid, Stearic acid.) Carotene (Vitamin A.)	【藥理】人參之甙溶性成分，有使大腦鎮靜，延髓諸中樞興奮及麻痺之作用。另由純酒精抽出之一種配鹽物成分，能抑制人工的過血糖及糖尿，故人參與糖類之新陳代謝，當有密切之關係，使新陳代謝興奮而有利尿作用。 (漢植) 【新藥】 Ginsenin (強壯劑)	新羅百濟諸地) 美國，日本福島長野。	名人參。 Panax, 為萬能藥之意。 Ginseng, 為人參之中國音。
246.	竹節人參 (秘傳花鏡)	Panax repens Maxim P. japonicum. C. A. Mey. forma typicum.	根	Panaxsaponin.	為祛痰劑，強壯劑。 新藥 Asmon 為祛痰鎮咳藥。	野生於山地森林間。 浙江	

(小二仙科)
第三十四 蟻 塔 科 HALORRHAGACEAE

247.	水 藻 (本草19)	Myriophyllum spicatum, L.	草	Myriophyllin, Pigment, Protein 18%, Fat 1.3%, Ash 20%,	清涼劑，消毒劑。	河北，江蘇。	藻乃水草之有文者，潔淨如澡浴，故之藻。
------	---------------	---------------------------	---	---	----------	--------	---------------------

(待宵草科)
第三十五 柳葉菜科 OENOTHERACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
248.	火炭母草 (本草16)	Circaeaeru -bescens. Fr. et Sav.	葉		治癰腫疼痛。	山東	
249.	芡 實 (本草33) 別名： 菱， 水 栗， 沙 角。	Trapa natans, L. (T. bispin- osa, Roxb.) (T. quadr- spinosa, Roxb.) (T. chine- nsis, Lour.) (Canton, Br. FH.) (T. bicor- nis, L.)	果肉	生果成分： Protein 1.99% Fat 0.73% Stach 52.20% Glucose 3.22% Ash 2.78% (Fe, Mn, P.) 乾燥物成分 ： Protein 11% Stach 60% Ash 2.6% (食化)	1) 治濕痺腰脊 膝痛及小便 不禁，遺精 ，白濁帶下 等。 2) 食用。 3) 治胃癆。	河北，湖北， (生池澤中)	其葉支散， 故字從支， 其角梭峭， 故謂之菱， 而俗呼為菱 角也。

第三十六 使君子科 COMBRETACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
250.	使君子 (本草18) 別名： 留求子	Quisqualis indica, L.	瘦果	Sucrose 8%, Alkaloid Fat 27%, (成分續) (Oleic acid, Linolic acid, Palmitic acid, Unknown fatty acid, Stearic acid, Arac- hitic acid, Phytosterol.)	爲蛔蟲驅除藥 ，用於小兒諸 病。	四川合江，福 建邵武、沙縣 ，廣東新會、 東莞，廣西南 寧、百色，安 南東京、河內 ，台灣。	相傳潘州郭 使君療小兒 病，多是獨 用此物，後 醫家因誤爲 使君子也。
251.	毗梨勒 (本草31) 別名： 三果	Terminal- ia belerica, Roxb.	果實	Fatty oil 25%, Tannin 11%, KI.	1)助消化。 2)治赤白痢。 3)治大風脫髮 。	廣東，波斯及 南洋一帶。	‘Balila’ 係波斯俗語 。本品木似訶 梨勒，而子 亦相似，但 圓而毗，毗 即騰也，故 名。我人謂 之三果，樹 及子均似胡 桃。
252.	訶梨勒 (本草35) 別名： 訶子	T. chebula Retz.	果實 核	Chebultic acid 3.5% Tannin 32%, Fatty oil 37%, Ellagic acid Ash 2.3%,	助消化，又治 赤白下痢用。	廣東，馬來。	訶梨勒，梵 言‘Harit- aki’，意 即天主持來 也，土人又 稱爲‘Har- ara’。

第三十七 桃金娘科 MYRTACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
253.	桉 樹 俗名： 藍油木， 有加利。	Eucalypt us globulus Labill.	葉	新鮮葉含 0.7% 之 Ess. oil 其主成分為 Eucalyptol Cineol, Eucalypt- en Pinen.	1) 解熱，治腸 炎及膀胱疾 患(用10% 浸劑及酞) 。 2) 為皮膚刺激 劑，治神經 痛及風溼症 。	按樹原產於澳 洲，於 1920 年頃移植於雲 南昆明，現已 繁盛年年結實 矣。 福建永安一帶 ，亦有移植。	【藥典】 桉樹葉， 桉樹油。
254.	丁 香 (本草34) 別名： 丁子香， 雞舌香。	Eugenia caryophy llata, Willd. (Caryoph- yllus armaticus L.) (Jambosa c., Ndz.)	花蕾 皮葉	Ess. oil 15%, (Eugenol, Caryophy llen, Gallotann ic acid 13%), Caryophy- llen.	為健胃劑及解 毒劑。	荷蘭，印度羣 島，南菲律賓 ，檳榔嶼。	齊民要術云 ，雞舌香俗 人以其似丁 子，故稱為 丁子香。

第三十八 千屈菜科 LYTHRACEAE

255.	指 甲 花 別名： 散沫花	Lawsonia inermis, L. (L. alba. Lamk.)	葉： Lawson (橙黃色色 素) Mannit 花： Ess. oil 種子： fatty oil	1) 為局部貼劑 ，治創傷及 動物之傷痕 。 2) 有促進人體 健美之效， 為染色劑。	原產亞拉伯， 今波斯、印度 錫蘭、臺灣及 福建長汀、連 城，均有。	本葉粉末， 古代在亞拉 伯已作化妝 品之用，為 手足及指甲 之染色劑。
------	---------------------	---	---	---	---	--

(瓜木科)
第三十九 八角楓科 ALANGIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
256.	大 空 (本草36)	Marlea platanifol- ium, S. & Z. (Alongium D., Harms.)	根 皮		1) 作末和油塗 ，可殺蟲及 虱。 2) 搗末篩蔬圃 中殺蟲。	湖北襄陽。	

第四十 安石榴科 PUNICACEAE

257.	安石榴 (本草30) 別名： 金 罌， 若 榴， 丹 若。	unica Granatum, L. 驗，【如石榴皮鹼(Pelletie- rine)異石榴皮鹼(Isopelle- tierine)，甲石榴皮鹼(Met- hylpelletierine)，偽石榴皮 鹼(Pseudopelletierin.)】 及 Chebulic acid, Gran- atin, Tannin 等。果實含 有轉化糖 (Invert sugar) 12%，枸橼酸(Citric acid)， 蛋白(Protein 1.5%，維丙 素(Vit, C ₃)，脂肪 1.1%； 花含 Punicin, anthocyan 等。	根皮	根皮與樹皮 中，含有約 1%之生物	根皮及幹皮為 織蟲驅除劑。 劑量一次用10 —15gm。 果皮為收斂劑 ，治下痢(由 單純腸炎所起 者)直腸出血 等，又用於疝 痛、蛔蟲、蟻 蟲等之驅除藥 。劑量一次 30—60gm	地中海東部原 產。 中國各地均有 。	博物志云，使 漢張騫出使 西域，得塗 林安石國榴 種以歸，故 名安石榴，實 榴者其果實 如瘤之狀。 Punicus 為 Carthago 之意，此樹 因其附近頗 多，Gran- atus為粒狀 之意，其種 子為粒狀， 充滿果實之 中。 印度語： Gulnar。 梵言： Dadima。
		【藥理】石榴皮鹼之中毒，最 初引起春蟲興奮性亢進，次 陷於呼吸運動麻痺，偽石榴 皮鹼之作用亦同，但稍弱耳 。Pelletierine HCl之 0.0 02%溶液，對織蟲興奮，作 用甚著。			中華藥典，採 用石榴皮。 美國藥典，採 用鞣酸石榴 皮鹼。		

第四十一 胡頹子科 ELAEAGNACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
258.	胡 頹 子 (本草36) 別名： 蒲頹子， 盧都子， 崔兒酥， 半含春， 黃婆孃。	Elaeagnus pungens, Th. E. Simonii Carr.)	葉	Fat, K, Ca, Oxalate Tannin	葉治咳嗽、氣 喘。 根治吐血。 子治痢疾。	北方各省。 湖北，江蘇， 江西。	

第四十二 瑞香科 THYMELAEACEAE

259.	沈 香 (本草34) 別名： 沈水香， 伽 羅。	Aquilaria Agallocha, Roxb. (Aloexyl- on agallo- chum.)	木	Ess. oil Resin.	1) 爲薰香料。 2) 治氣逆氣喘 極效。 3) 治閉尿症(因陰唇及尿道口之腫脹所起者)，一次量 1—3gm	廣東瓊州，東 印度。蘇門答 臘。	木之心節置 水則沈，故 名。 梵書名阿迦 羅香。
260.	密 香 (本草34) 別名： 木 密， 沒 香， 多香木， 千歲樹， 阿 麩。	A. Agallo- cha, Roxb.	木	Ess. oil Resin.	去臭，辟穢。	廣東，廣西， 安南。	木密，香密 也。形似槐 樹，種五六年，便有香氣。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
261.	芫 花 (本草17) 別 名：杜芫，赤芫，去毒魚頭，痛兒，草收。	Daphne Genkwa, S. et Z. (D. Fortu- nei, L.)	花	Genkwan- in, Apigenin, Sitosterol, Benzoic acid. 刺激性油狀 物質 (會廣方)	爲利尿劑及祛 痰劑，并治慢 性胃炎。 劑量一次 1.5—2gm. 又治瘡毒，解 菌毒，殺蟲魚 。	山東，江蘇， 江西，湖北， 福建，河北邯 鄲，浙江鎮海 。	根名黃大戟 ，又名蜀桑 。
262.	瑞 香 (本草14)	D. odora Th. (D. sinen- sis, Lam.) (D. indica, Herb.) (D. japon- ica, S. & Z.) (D. Mezer- enur, L.) (白瑞香)	根	Daphnin (水解爲 Daphnetin 等)。 Mezerein- säure. (漢植) Umbellif- eron. (植研)	瑞香之鮮葉或 乾葉，爲粉末 貼於瘍瘡，有 清涼之感，去 疼痛。瑞香皮 內服，治瘍瘡 痛風及癩疾。 劑量一次 0.05—0.5gm 又可外用。 白瑞香皮，外 用爲發泡引赤 藥，治慢性皮 膚病及痛風。	浙江，湖北， 四川，江西， 福建連城、芷 溪。 歐洲及亞洲西 部高加索等地 。	
263.	蕘 花 (本草17)	Wickstro- emia japonica, Miq. (W. trich- otoma, Mak.)	花		1)化痰止咳。 2)治傷寒溫瘧 。	河南中牟，陝 西咸陽。	蕘者饒也， 其花繁饒也 。

第四十三 仙人掌科 CACTACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
264.	仙人掌 (本草20) 【嶺南雜 記】 霸王樹	Opuntia monacanc. ha Haw. (Cactus opuntia, L.)	根	果實： Sugar, Protein. 種子： Fatty oil	果實有甘味， 為滋養劑。 為家畜之滋養 劑，尤佳。	南方各省，廣 被栽培（墨西 哥原產）。	本草卷二十 所載之仙人 掌草，乃非 本品，恐係 蕨科之鳳尾 草。

第四十四 紅木科 BIXACEAE

265.	大風子 (本草35) 別名： 大楓子	Hydnocar- pus anthelm- intica, Pierre. Gynocard ia odorata, R. Br.	種 子	Protein 14%, Fatty oil 40—50%, (Hydnoca rpic acid, Chaulmo- gric acid) Gynocard in.	大風子油，治 癩病及象皮病 。又治梅毒及風 癩疥瘡。 【藥典】大風子 油，大風子油 丸。 【新藥】 Eklumo, Antileprol, Hydnol, Gynocarin, Hydnocarin.	廣東，安南， 緬甸，暹羅， 印度，東印度 。福建永安余荆 山。	緬甸(Burm 稱大風子曰 “Kalaw” 暹羅(Siam)稱為“Lu krabo” 印度(Ass- am)稱為“ Lemtam” 本品能治大 風癩疾，故 名。
267.	柞 木 (本草36) 別名： 鑿子木	Xylosma racemosa, Miq.	皮 葉		1)皮治黃疽， 鼠瘻，難產 。2)葉治腫毒癰 疽。 3)木為柄鑿及 製梳用。	南方各省。	此木堅韌， 可為鑿柄， 故俗名鑿子 木，方書作 柞木。

第四十五 堇菜科 VIOLACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
267.	見腫消 (本草16)	<i>Viola mirabilis</i> , L.	葉	Salicylic acid.	消癰腫及狗咬，搗葉貼之。	江西高安。	以其效名。
268.	紫花地丁 (本草16) 別名： 箭頭草， 獨行虎， 羊角子， 米布袋， 草堇菜。	<i>Viola Patrinii</i> , DC. (<i>V. chinensis</i> , Don.) (<i>V. mandshurica</i> , W. Beck. Var. <i>cilata</i> Nakai.) (<i>V. primulifolia</i> , Lour. Var. <i>chinensis</i> Ging.) (<i>Gueldenstedtia multiflora</i> , Bge.)	草 根 葉	花中含蠟其 中有34.9% 之飽和酸 (主成分 Cerotic acid)5.8% 之未飽和酸 10.3%之醇 類約17%之 炭化氫。 (食植)	草治癰疽疔腫，頸部淋巴腺結核、惡瘡等。 (將生根搗碎，貼布患部，能吸出膿物)。 根煎之為止瀉痢及催眠劑。	處處有之。 山東，浙江， 湖北，陝西。	本品夏開紫 花結角，平 地生者起莖，溝壑邊者起蔓。 第四種原植 物，屬堇科。

第四十六 檉柳科 TAMARICACEAE

269.	檉 柳 (本草35) 別名： 赤 檉， 赤 楊， 河 柳， 雨 師， 垂 柳， 人 柳， 三 眠柳， 觀音柳。	<i>Tamarix Chinensis</i> , Lour. <i>T. juniperina</i> , Bunge.	木 莖 葉		解酒毒，利小便，又為透發麻痺疹之特效藥。	北方各省，江蘇，福建，廣東。	天之將雨而檉先知之，起氣以應，又逢霜雪不凋，乃木之聖者也，故字從聖。
------	---	---	-------------	--	----------------------	----------------	------------------------------------

第四十七 龍腦香科 DIPTEROCARPACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
270.	龍腦香 (本草34) 別名： 片腦， 梅花腦， 金脚腦， 蒼龍腦， 米腦， 速腦， 婆律香， 羯婆羅香。 。	Dryobalanops aromatica, Gaertn. (D. camp hora, Colebr.)	油	Borneol, Camphene, Terpeniol, Sesquiterpene.	1)爲香料用。 2)治婦人難產。 。	暹羅，(現改名泰國 Siam)。	

第四十八 金絲桃科 GUTTIFERAE

271.	胡桐淚 (本草34) 別名： 胡桐蠟， 胡桐律。	Calophyllum, Inophyllum.	滲出物	Ess. oil 12%, Resin, Saponin.	1)治牙痛出血。 。 2)治頸部淋巴腺結核。	廣東。	是胡桐樹脂也，胡名淚。
272.	都念子 (本草31) 別名： 倒捻子， 海漆。	Garcinia Mangostana, L.	種子	Mangostin Sugar Resin Vit, C1.	1)果實治痰嗽噁氣，活血補血。 2)汁止腸滑又爲染紅色用。 。 3)葉止下痢。	江西，廣東羅浮。	本品之味甘美，食之必倒捻其蒂，故謂之倒捻子，訛爲都念子也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
273.	小 連 翹 (漢藥學) 弟切草， 乙切草， 晉切草。	Hyperic- um erectum, Thunb.		全草： Fannin, 花： Ess. oil (第切草油 呈血紅色)	1)內用爲止血劑，治吐血、咯血、衄血、子宮出血等。 一次量 3—5gm。	浙江鎮海及西天目，雲南昆明。	

(效用續)2)外用以其生汁或煎液，爲金瘡斬傷及其他皮膚病之塗洗用。3)因咳嗽聲啞時用之。4)弟切草油，爲皮膚刺激劑，對神經痛、腰痛、風溼症、創傷、腫物等塗布用。

【新藥】Otoginin，係由本植物莖葉所得之鞣酸製劑，對於風溼性疾患、神經痛、關節炎、腰痛等症，供注射之用。

第四十九 山茶科 THEACEAE

274.	山 茶 (本草36)	Carnellia japonica, L. (Thea japonica, Nois.)	種子 葉	種子： Fatty oil 66%，(油 酸甘油酯) Camellin (山茶素) Saponin, 本肥皂素之 溶血指數爲 1:1000。 葉： Quercetin	山茶油代洋橄欖油，供食用及塗頭髮用。山茶油爲軟膏之基礎劑。山茶素有心臟作用。葉止血及湯火傷用。	南方各省。	其葉類茗，又可作飲，故得茶名。
------	---------------	--	---	--	---	-------	-----------------

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
275.	茗 (本草32) 別名： 茶， 蒨， 檳， 護， 苦。搽。	Thea sinensis, L. (Camellea Thea, Link.) (C.theife- ra, Griff.)	葉， 種子	種子： Fatty oil 18—23%， Coffeine, Saponin Camellin (gl.) 葉： Coffeine 1—3%，	1)為強心利尿劑。 2)為興奮劑。 3)神經痛藥。 4)為製茶精原料。	中國，日本， 台灣，印度。 最著名者，為 杭州龍井，安 徽祁門，福建 武夷，雲南普 洱，台灣烏龍 ，印度，錫蘭 紅茶。	茶即古茶字， 音途，詩云， 誰謂茶苦，其 甘如薺是也， 早採為茶，晚 採為茗。 茶普通常用者， 有紅綠二種， 綠茶係採得去 苦水，便可泡 飲者，紅茶係 蒸焙而成者。 茶普通為止渴 之用，惟徽州之 松蘿茶化食，六 合之苦丁茶， 滇南之普洱茶， 消食辟瘴。
<p>(成分續)Theophylline, Choline, Quercitrine, Theobromine, Xanthine, Hypoxanthine, Adenine, Asparagin, Guanine, Cytosin, Catechin, Tannin 9.5%, Chlorophyll, Xanthophyll, Carotin, Quercetin, (以上四種為色素)；β：γ-Hexenol, n-Butyraldehyd, iso-Butyraldehyd, iso-Valeraldehyd, α, β-Hexenal (以上為香氣)；Oxydase, Peroxydase, Thease, Katalase (以上為酵素)，Vits. C₁, E₂, G₂, A., Legumin (蛋白質)，Ash 3.8—8.4% (K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, Ti.) (食植)(本新)</p>							
276	皋蘆 (本草32) 別名： 瓜蘆， 苦登。	Thea sinensis, L. Var macrophy- ylla, Sieb. (Camellia thea, Link, Var, mac. Sieb.)	葉	Coffeine 2.2%，	止渴，明目， 除煩，消炎， 利尿。	南方各省。	本品之葉似茗， 土人謂之過羅或物羅， 皆夷語也。

第五十 獼猴桃科 DILLENIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
277.	獼 猴 桃 (本草33) 別名： 獼猴梨， 藤 梨， 陽 桃， 木 子。	Actinidia arguta, Pl. A.chinen- sis, Pl. Trochosti gma, a. S. & Z.	果實 莖 葉 汁		果實止暴渴， 解煩熱，壓丹 石，下淋石熱 癰。 藤中汁治反胃 ，和生薑汁服 之，又下石淋 。 除果實之皮及 核乾燥者，為 收斂劑用。	陝西，河北。	其色如桃而 獼猴喜食之 ，故名。 閩人呼為楊 桃。
278.	羊 桃 (本草18) 別名： 鬼 桃， 羊 腸， 葦 楚， 銚 子。	A.chinen sis, Pl.	莖 ， 根		黃汁洗風癢及 諸瘡腫。	陝西，浙江。	羊桃似家桃 ，花赤，子 小，苦不堪 食民。
279.	木 天 蓼 (本草36)	A.polyga ma Miq. (A.volubi lis Pl.) (Trochost- igma v., S. et Z.)	種子 莖 葉 根	Matatabic acid, Polygamol	為痛氣腰腹痛 藥，用粉 3—5gm 【藥理】果實中 所含之Mata tabic acid, 對動物呈麻醉 作用，初大腦 ，次脊髓，最 後麻醉延髓。 【新藥】 Polygamol (為強心利尿 劑)。	中部各省。	其樹高而味 辛如蓼，故 名。 天蓼酒： 以木天蓼一 斤用酒三升 浸之。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
280.	水含藤 (本草18) 別名： 大瓠藤	Actinidia polygama, Miq.	藤汁	Polygemol	解煩渴心燥 癆。	廣東嶺南及北 海。	多生在路旁，行人乏水處，便吃此藤，故以為名。

第五十一 梧桐科 STERCULIACEAE

281.	梧桐 (本草33) 別名： 櫛。	Sterculia platani- folia, L. f. (Firmiana P., R. Br.) (S. tomen- tosa. Th.)	種子 內皮 葉	Coffeine Mucilage. Arabinose. Galactose.	1) 子供食品， 有興奮作用。 2) 內皮燒研， 治腸痔。	河北，陝西， 江蘇，雲南。	梧桐名義未詳，爾雅謂之櫛，因其可為棺，左傳桐棺三寸是矣。
282.	胖大海 (拾遺7) 大海子， 安南子， 大洞菓。	Sterculia scaphigera wall.	果實		治傷風、咳嗽、 氣喘。	安南大洞山西 貢，暹羅會安。	其形如乾青菓，以水泡之，層層脹大，如浮藻然。

第五十二 木棉科 EOMBACACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
283.	木 棉 (本草36) 別名： 古 貝， 古 終。	Bombax malabari cum. DC. (B. hepta phylla, Roxb.)		種子： Fatty oil 18-22%， 毛茸： Ash 3.5%， Ca 0.16%， Fe 0.37%， 樹皮及幼根： Gummi.	樹之樹膠及幼 根陰乾者研末 ，為收斂劑止 血劑，治下痢 及赤痢，和牛 乳為緩和劑。 又對骨折及月 經過多，有效 。	原產印度，宋 未始入江南， 今則遍及江北 及中州，惟兩 廣頗盛。	本品為木本 ，抽其毛茸 紡紗，可織 為布帛，故 名。

第五十三 錦葵科 MALVACEAE

284.	苘 麻 (本草15) 別名： 白 麻	Abutilon avicennae Gaertn. (A. theo- phrasti, M d.) (Sida tiliaefolia, Fisch.)	種子	Fat 16%， Protein 20%， Ash 5%，	子實治赤白冷 熱痢。 取皮織布及打 繩索用。	北方各省，江 西，浙江，安 徽，福建。	苘音頃，一 作頃，又作 縵，種必連 頃，故謂之 頃也。
------	-----------------------------	--	----	--	---------------------------------	---------------------------	---

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
285.	蜀葵 (本草.6) 別名： 戎葵， 吳葵。	Althaea rosea, Cav.		種子： Fat 12%， Starch 9%， Protein 21%， Allantoin- ase. 花： Dioxyben- zoic acid, Althaein, Sterine, Ash 9%， (Fe 3%)，	苗利腸胃，根 葷利尿及治淋 疾。 花治婦人帶下 及解虫毒。 種子用於皮膚 病。	原產四川，今 處處有之。	葉似葵，蜀 其所自來， 故名。
286.	黃蜀葵 (本草16)	Abelmo- schus e., Moench. (Hibiscus Manihot, L.) (H.escule- ntus, L.)	種子 根 花	Vit C ₁ Fatty oil 16%， Pectin 根含粘液 (Araban. Galactan, Rhamnos- an.)	1)代歐蜀葵根 ，爲丸劑之 賦形藥。 2)爲粘滑劑， 拾胃腸炎。 3)在工業上， 爲製紙之糊 料。	四川。 藥典採用黃蜀 葵根，黃蜀葵 糖漿。	葉似蜀葵， 開淡黃色花 ，故名。 Hibiscus蜀 葵之古名 Manihot爲 巴西之土名 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
287.	綿 別名： 草 綿	Gossypium arboreum L. (G. barba- dense, L.) (G. herba- ceum L.) (G. Nanki- ng, Meyer.)	種 子 種 毛	Gossypol (有Phenol 性頗毒), Fetty oil (Palmitine oleine.)	1)種毛爲藥用 脫脂綿原料 。 2)種子爲催乳 劑，一次量 5gm, (作 煎劑)。又爲 綿子油 原料及點燈 用。 3)新鮮根爲通 經藥，一次 量2gm。	草棉原產印度 及亞拉伯，公 歷紀元前八世 紀，已知應用 ，從此傳入歐 美及亞洲，今 遍及中國美國 埃及巴西及祕 魯。	【藥典製品】 製精綿(脫 脂綿)，火 綿，膠綿， 昇汞綿，礮 酸綿，石炭 酸綿，水楊 酸綿，碘仿 綿，止血綿 ，精製綿紗 ，卷軸帶。 【新藥】 Lacfomil, Lactagol, Mamain, Neomilch- in.
288.	木 芙 蓉 (本草36) 別名： 地芙蓉， 木 蓮， 華 木， 柶 木， 拒 霜。	Hibiscus mutabilis, L. (H. siner- sis, Mill.)	葉 花		1. 有解熱解毒 之效。 2. 有排膿止血 之效。 3. 治惡瘡用。	各地均有。	此花艷如荷 花，故有芙 蓉木蓮之名 ，八九月始 開，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
289.	扶 桑 (本草36) 別名： 佛 桑， 朱 槿， 赤 槿， 日 及。	H. Rosa sinensis, L.	葉 花		治癰疽腮腫。	廣東。	時珍曰，東海日出處，有扶桑樹，此花光艷照日，其葉似桑，因以比之。
290.	木 槿 (本草36) 別名： 椴， 朝 開， 暮 落 花， 櫛， 薺， 籬籬草， 日 及， 花 奴 玉 蕊。	H. syriacus, L.	皮 根 花 子		葉，女子洗髮用，花治赤白痢及利尿用，皮根有制瀉及催眠之效。又治婦人帶下及疥癬痔疾。救荒本草載，可取幼芽幼葉煮之，供食用（花含粘液）。	各地均有，（小亞細亞原產）。	木部有粘漿為繅花，供婦女洗髮用。
291.	冬 葵 (本草16) 別名： 葵， 滑 菜， 露 葵， 冬 葵 子。	Malva verticillata, L. (M. pulshella, Bern.) (M. chinensis, Mill.)	根， 莖， 子		子為利尿劑，治泌尿症、淋疾、妊娠時水腫及胎盤不脫離時，又為乳汁分泌催進劑。一次量 1—3 gm	河北，江西，陝西。	以秋種葵，覆養經冬，至春作子者，謂之冬葵。有錦葵，莧葵，黃葵三種，與冬葵為同屬之植物。

第五十四 田麻科 TILIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
292.	黃 麻 (拾遺4) 別名： 牛泥莖， 三珠草， 天紫蘇。	Corchorus capsular is, L.	莖 草	Pigment. Cellulose 71%， Fat 11%，	葉爲治血病要藥，療婦人血崩，子同風茄，可製麻藥，治咳，療肺。	南方各省及東 印度。	黃麻爲麻之一種，夏秋之際，葉腋間開黃色小花，故名。

第五十五 葡萄科 VITACEAE

293.	地 錦 (本草20) 別名： 血見愁， 血風草， 草血竭， 馬蠟草， 地 膜， 地 噤， 夜 光， 承 夜， 漿瓣草， 雀兒臥草， 獼猴頭 草。	Quinaria tricuspid ata, Koehne (I) Partheno- cissus t., Pl. (II) Vitis inco- nstantans, Miq. (III) Euphorbia humifusa, Willd (IV) E. thynif olia Th. (V) E. chama- esyce, Bunge. (VI) (IV), (V), (VI), 原植 物屬大戟科。	全草	1) 爲止血藥及消腫藥，治血痢，大腸瀉血，婦人血崩，小便血淋，金瘡出血，惡瘡見血。 2) 治瘡癰腫、背瘡、風瘡、疥癬。 3) 爲皮膚洗滌劑。	安徽。 四川，湖北， 河北。 東北各省，蒙古。	本品蔓延着地，葉光淨，露下有光，故稱地錦。
------	--	--	----	--	--------------------------------------	-----------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
294.	紫 葛 (本草18)	Vitis Coignetiae Pull.	根 皮		治癰腫惡瘡。	生山中及田野間。	
295.	千 歲 菓 (本草18)	V. flexuo- sa. Th.	根 果		爲強壯劑，能 補五臟，強筋 骨。	江蘇，湖北。	此藤冬不凋，葉大者盤薄，故曰千歲菓。
296.	烏 蔽 莓 (本草18) 別名： 五葉葎， 龍 草， 拔龍葛， 赤 葛， 五爪龍， 赤潑藤。	(V. parvifolia, Roxb.) V. japonica Th. (Cissus j., Willd.) (V. tenuifolia, Wight.)	藤 根	Araban Mucilage KNO ₃	爲消腫藥，治癰癤、疔瘡、蟲咬。	山東，江西，江蘇，湖北，浙江，東北各省。	五葉爲白蔽，故曰烏蔽。
297.	藟 蓂 (本草33) 別名： 燕 蓂， 嬰 舌， 山葡萄， 野葡萄。	V. Labrusca, L. (V. ficifolia, Bge.) (V. Thunbergii, S. & Z.)	果	Sugars 16%, Acid's. Vitin. Ac. salicylic trace. Anthranilic acid.	果實止渴，藤止渴利尿。根消腫，治一切腫毒及風腫。	江蘇，江西，福建，河北，湖北。	藟蓂藤汁味甘，子實似葡萄而小，味酸甘，亦堪爲酒。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
298.	白 藪 (本草18) 別名： 白 草， 白 藪， 兔 核， 貓兒卵， 崑 崙。	Vitis serjanifolia, Bge. (Ampelopsis S., Bge.) (V. aconitifolia, Bge.)	根		爲止痛消腫藥， 治療癰腫、 湯火灼傷。	山東，河北， 湖北，江西。	白藪服餌方 少用，惟飲 酒方多用之， 故名白藪。 。
299. a.	蒲 萄 (本草33) 別名： 葡 萄， 蒲 桃， 草龍珠。	V. vinifera L.		果汁中： Inversugar, (14-24%) Calcium tartrate, Potassium bitartrate,	果實生食，治 下腹充血症， 肝臟病等。葡 萄酒爲興奮性 飲料，療身體 之衰弱及虛脫。	葡萄原產隴西 五原，檉煌山 谷，今處處有 之。	葡萄漢書作 蒲萄，可以 造酒，人酹 飲之，則醅 然而醉，故 有是名。 漢書言張騫 使西域還， 始得此種， 而神農本草 ，已有葡萄 ，則漢前隴 西舊有，但 未入關耳。

(成分續) Malic acid, Citric acid, Tannin, Pentosan, Pectin, Gum, Inosit, Leucin, Tyrosin, Lecithin, Quercetin, Ess. oil (係由葡萄酒釀造時所得之粕，或自蘭地製造之殘渣中，以水蒸氣蒸溜而得者)，Vit. C. A, Eoric acid, Ash 0.5% (gold 痕跡)。

果皮中：Boric acid, Oenin (紅色素)。

葉中：Quercetin, Oenidin(嫩葉中紅色素)。Carotin, Cholin, Wax, Naringin.

根及藤中：Gum, Galactan, Sugars, Enzymes, Boric acid. (食植) (本新)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
299.	蒲 萄 酒	Vinum		Jenidin	爲興奮劑。	山西，湖北，	
b.	葡萄酒，	(Grape juice Wine) (Fermen- tation)		(酒中之紅 色素) Alcohol:		江蘇，浙江， 安徽。	
	白蘭地。	Cognac (Brandy) (Distilled)		釀酒 12% 燒酒 40%			

第五十六 鼠李科 RHAMNACEAE

300.	枳 椇 (本草31) 別名： 蜜椇， 蜜屈律， 木蜜， 木傷， 木珊瑚， 鷄瓜子， 木名： 白石木， 金鈎木， 交加枝， 枳椇。	Hovenia dulcis. Th. (H. acerba Lind.) Cvar, glabra, makino.)		果實含多量 之葡萄糖及 蘋果酸鉀， 有引起利尿 作用。	1)果實爲利尿 劑， 劑量一次 2—5gm 又解酒毒。 2)果實有甘味 ，可生食。	河北，福建， 廣東。	枳椇，爲屈 曲不伸之意 ，此樹多枝 而曲，其子 亦卷曲，故 以名之。 相傳古代誤 投此果實於 酒中，致酒 變敗，釀酒 家深忌之。
301.	白 棘 (本草36) 別名： 棘 刺， 棘 絨， 赤龍瓜。 花名： 駝 葵， 馬 胸， 刺 原。	Paliurus ranosiss- imus, Poir. (Zizyphus r., Spr.) (P. aublet- ia, Schult.)	子 葉 莖 花		爲強壯劑，消 腫劑，治虛弱 及陰萎，排膿 止痛，治療 癰疽。	江西，廣東。	獨生而高者 爲棗，列生 而低者爲棘 ，故重東爲 棗，並東爲 棘，二物觀 名，即可辨 矣。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
302.	鼠 李 (本草76) 別名：楮 李， 鼠 梓， 牛 李， 皂 李， 趙 李， 牌。	Rhamnus japonicus, Maxim. var. genuina. Maxim. (a)R. dahuricus pall. (R. utilis. Decne.	果 實 皮	Kamphenol, Chrysophanic acid. Emodin, rhamnin Kamphenol.	爲緩下利尿劑。 一次量 0.5gm(末)	中部各省，河北。	子名，山李子，牛兒子，烏棧子，烏菓子。
303.	棗 (本草29) 別名：乾 棗， 良 棗， 美 棗。	Zizyphus vulgaris, Lam. (Z. sativa, Gaertn.) (Z. sinensis, Lam.)	果實， 皮 葉， 根， 子	果實含粘液質 (Mucilage)， 糖 (Sugar)， 鞣酸 (Zizyphic acid)， 蛋白 (Protein) 1.1%， 脂肪 (Fat) 0.2%， 皮含鞣酸 (Tannin)， 葉含甙素 (Zizyphine.)	果實爲緩和劑，與諸藥配合，理胃和血，治咳嗽聲啞喉痛胸肺諸症；又爲下劑，利尿劑，又解秦椒之中毒用。	河南鄭州許昌，山東利津兗州，浙江義烏，江蘇，湖北，河北，東北各省。	大白棗，小白棘，棘者酸棗也，因棗樹高，故重東，棘樹低，故並東，東者次，棗棘皆有刺針，會意也。
304.	苦 棗 (本草29) 別名：酸 泄	Z. vulgaris Lam.	果實		治傷寒症。	各處均有。	此棗色青而小，味苦不堪，人多不能食。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
305.	酸 棗 (本草36) 別名： 山 棗， 槭。	Z. vulgaris Lam. var. spinosus. Bge.	果實	Sugar	酸棗仁為神經強壯劑，對失眠症有效。又為健胃及鎮靜藥。	北方各省，廣東。	
306.	仲 思 蜜 (本草29) 別名： 仲 密	Z. sp.	果實		為滋補劑，祛痰鎮咳劑。	河北。	相傳北齊時有仙人仲思，得此蜜種之，因以為名。

第五十七 鳳仙花科 BALSAMINACEAE

307.	鳳 仙 (本草17) 別名： 急性子， 旱珍珠， 金鳳花， 小桃紅， 夾竹桃， 海 蕪， 染指甲草， 葛婢。	In patiens Balsamina L.	子， 花， 根， 葉	種子： Saponin Fatty oil (食植)	種子為解毒藥，治魚中毒。誤吞銅錢，以根莖解之。	山東，浙江，福建，廣東。(原產地東印度，土耳其)	其花頭翹尾足俱翹翹，然如鳳狀，故以名之。
308.	坐 穿 草 (本草17)	I. Textori, Miq.	苗		1) 壯筋骨。 2) 用於跌打損傷。	江西。	

第五十八 清風藤科 SABIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
309.	清風藤 (本草18) 別名： 青藤， 尋風藤。	Sabia japonica Maxim.	藤		治風濕用。	江西，廣東， 浙江台州天台山。	

第五十九 無患子科 SAPINDACEAE

310.	藥華 (本草35)	Koelreuteria, paniculata Laxm. (Sapindus chinensis, L.)	花	Gum, Yellow dye.	治目痛淚出， 傷背，消口腫， 合黃連作煎劑， 療目赤爛。	河北，甘肅。	
311.	荔枝 (本草31) 別名： 離枝， 丹荔。	Litchi chinensis, Sonn. (Nephelium Litchi, Camb.)	果肉 核	Saccharose 5%, Glucose 66%, Protein 1.5%, Fat 1.4%, Vit. C ₂ , Citric acid.	果肉為滋養劑， 并治領淋巴 腺結核。 種子治胃痛、 疝痛。	福建莆田，漳 州龍岩，福州， 廣東番禺， 東莞，四川。	此木結實時 ，枝弱而蒂 牢固，不可 摘取，必以 刀斧，剝取 其枝，故以 為名，剝音 利，與荔同 。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
312.	韶子 (本草31)	Nephelium lappaceum, L.	果肉	Fat 35%, Vit C ₁ Ash 2%, Saponin	治暴痢。	廣東。	
313.	龍眼 (本草31) 別名： 桂圓， 龍目， 圓眼， 益智， 亞荔枝， 荔枝奴， 燕卵， 驪珠， 蜜脾， 鮫淚， 川彈子。	Nephelium Longana, Camb. (Euphoria l., Lam.)	果肉 核	Saccharose 0.22% Glucose 26.91% Tartaric acid, 1.26%, Fat 0.5% Protein 5.6%, Amylase Peroxydase, Ash 3%, 核含 Saponin Fat 1.57%,	肉為滋養強壯劑，治健忘，神經性心悸亢進、神經衰弱之不眠等。一次量 2-8gm	福建莆田、仙遊、同安、龍溪，廣東廣州、北海，廣西鬱林、北流，貴縣，台灣，琉球，東印度。	形象龍目，故名。
314.	龍荔 (本草31)	Nephelium sp.	果實		果實有毒，生食令人發痢。	廣東。	本品狀如小荔枝，而肉味如龍眼故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
315.	無患子 (本草35) 別名： 菩提子， 桓， 唵婁， 肥珠子， 木患子， 油珠子， 鬼見愁。	Sapindus Mukorossi Gaertn.	果實	果皮含約4 %之 Sapindus- saponin C ₄₁ H ₆₁ O ₁₃ .	花治眼痛，對 眼險浮腫，防 淚之時常流出 ； 果實解河豚毒 ，去疔及癩麻 質斯等之痛。	浙江，福建， 湖北，廣東。	相傳昔有神 巫，以此木 作棒，能殺 百鬼，故名 。果皮稱延 命皮，為石 鹼之代用品 。
316.	文 光 果 別名： 文冠果	Xantho- ce- ras sobifolia, Bge.	果實		滋養品。	河北。	形如無花果 ，肉味如果 。

第六十 七葉樹科 HIPPOCASTANACEAE

317.	天 師 粟 (本草29) 別名： 婆羅子	Aesculus chinensis Bge.	果實	Fat 32% Starch 36% Ash 2.8%	治胃痛。	陝西，四川， 河北。	相傳張天師 學道於此所 遺者，故名 。
------	-------------------------------	-------------------------------	----	--------------------------------------	------	---------------	------------------------------

第六十一 衛矛科 CELASTRACEAE

318.	扶 芳 藤 (本草18) 別名： 滂 藤	Euonymus japonicus Th. Var. radicans, Miq.	葉 藤	Xantho- phyllidrin chloroph yll. Wax.	驅風。	江西，江蘇， 山東。	
------	-------------------------------	--	--------	---	-----	---------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
319.	衛 矛 (本草36) 別名： 鬼 箭， 神 箭。	E. Th nb ergianus, Bl. (E.alatus, Regel.	莖		爲產婦科藥， 通經、止血崩 、及產後敗血 。	江蘇，浙江， 湖北，山東， 河北，東北各 省。	齊人謂箭羽 爲衛，此物 幹有直羽， 如箭羽子亦 自衛之狀， 故名。

第六十二 冬青科 AQUIFOLIACEAE

320.	冬 青 (本草36) 別名： 凍 青	Ilex Fedu- -nculosa, Miq. (Ligustr- um Ibota, Sieb.) (Xylosma racemosa, Miq.)	葉 皮 子	Ibotin (gl)	子爲驅風劑， 葉治痔瘡。	浙江，福建， 江西，湖北， 廣東，四川。	本品因冬月 青翠，故名 。
------	-----------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	----------------------------	---------------------

第六十三 漆樹科 ANACARDIACEAE

321.	都 威 子 (本草31)	Anacardi- um occident ale, L. (Acajuba o., Gaertn.)	子 及 皮 葉	子： Fatty oil 45%， Stach 8%， Sitosterin, Cardol, Anacardic acid, Lignoceri- nic acid, 莖： Gallic acid.	子實以火焙乾 ，作飲料，止 渴潤肺，祛痰 鎮咳，并治氣 喘。	雲南，廣東。	
------	-----------------	---	------------------	--	--	--------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
322.	<p>菴羅果 (本草30)</p> <p>別名： 菴摩羅， 迦果， 香蓋果， 檸檬果。</p>	<p>Mangifera indica, L.</p> <p>(成分續)</p>		<p>果肉含 Suger 9%, Citric acid</p> <p>Carotin (色素), Vits. Ag. C₃(Vit. A 之含量與 Butter 相等, Vit C 之量, 與檸檬汁相等或在此以上); 葉含Mangiferin, Mangin (gl), Benzoic acid, Piuri. (Yellow dye.) (本新, 食植)</p>	<p>1) 果實有美味, 供食用止渴, 又作菓子醬或蜜餞。</p> <p>2) 果皮以水煎, 為峻下藥或利尿劑。</p> <p>3) 治婦人經脈不通, 丈夫營衛中血脈不行。</p>	<p>南方各省及台灣(東印度原產)。</p>	<p>菴羅, 菴摩羅, 均梵音, 華言清淨是也。俗名芒果(Mang)。台灣稱為樣仔。</p>
323.	<p>薰陸香, 乳香 (本草34)</p> <p>別名： 馬尾香, 天澤香, 摩勒香, 多伽羅香。</p>	<p>Pistacia lentiscus L. (P. mutica F. & M.) P. khinjuk Stocks. P. Terebinthus, L. Vat. Mutica, A. & H.</p>	<p>滲 出 物</p>	<p>Resin Tannin Pistaciin Ess. oil Sterines. (本新)</p>	<p>為薰香料, 嗽口料, 填齒料, 丸劑及硬膏之粘合劑; 工業上造假漆, 玻璃及磁器之固定劑。</p> <p>【新藥】 Mastisol, 為癒創外用藥, Oettingenscher Lack, 為絆創膏之代用品。</p>	<p>土耳其 Chios 西南部地中海南岸。</p>	<p>薰陸即乳香, 為其垂滴如乳頭也。</p>

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
324.	熊 糞 香 (本草34) 別名： 石吧嗎油	Pistacia terebint- hus L. (Shorea robusta, Roth.) (Vatica laccifera, W. et A.)	滲 出 物	樹幹之滲出 物，含14% 之揮發油(α-Pinen) 83—8)% 之樹脂。 果實合76% 之液體脂肪 酸36.9—37 .6%之脂肪 油。 樹皮含23% 之鞣酸 (植研)	治面部色素沈 着。同白附子 、冬瓜子、白 及、石榴皮等 分爲末，酒浸 三日，洗面後 敷之，久則面 容如玉。	暹羅柬埔寨， (Cambodia)	本品即熊糞 樹之脂，色 白氣香。
<p>(成分續)</p> <p>0.46 Homocatechol monoethyl ether.</p> <p>0.53 3-Methoxy-4 ethylphenol.</p> <p>2.42 Unidentified-phenolic.</p> <p>9.38 3-Methoxy 4-ethoxytoluene.</p> <p>4.78 Homocatechol. di meth-ether.</p> <p>10.52 C₁₀ H₂₀ O₂</p> <p>8.51 C₁₇ H₃₂ O₂</p> <p>6.48 C₂₇ H₃₂ O₂</p> <p>7.27 C₂₈ H₃₄ O₂</p>							
325.	黃 蠟 (本草35)	Rbus Cotinus. L. (Cotinus Coggygia, Scop.)	木	Fustin, Oxyflavon Fisetin, Quercetin, Myricetin. (本新)	洗赤眼及湯火 燙瘡。	河北，河南， 湖北，四川。	藥用木黃， 可染黃色。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
326. a.	鹽欬子 (本草32) 別名： 鹽欬木， 鹽梔子， 鹽梅子， 鹽棗子， 木 鹽， 天 鹽， 奴奴鹽， 酸 桶， 五 構。	Rhus javanica, L. (R. chine- nsis, Mill.) (R. semia- lata, Murr.)	莖 生 物 內 皮	Tannin 63—77% Fat Resin Gum.	子除痰飲，療 瘡，止渴解酒 毒，黃疸。	河北，山東， 甘肅，四川， 湖北，廣東， 浙江。	其味酸鹹， 故有諸名。
326. b.	五 倍 子 (本草39)	Galla	子	Tannin 63—77%	1) 為收斂劑， 內服治下痢 及出血，外 用為撒布劑 。 2) 在醫藥上， 為鞣酸之製 造原料，在 工業上為製 造墨水及鞣 皮用。	同 上	藥典採用五 倍子軟膏， 五倍子阿片 軟膏等。

(備考) 五倍子，係鹽欬木之稚芽或葉柄，因五倍子蟲(係同翅目蚜蟲科之昆蟲 *Schlechtendalia chinensis* J. Bell.) 之刺傷而生成一種囊狀寄生物，此虫在五倍子中，營極複雜之世代交替時無翅翼，至秋季，將離去或欲移轉其他寄生時，則生翼翅。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
327.	漆 (本草35) 別名： 漆	Rhus vernifera DC. (R. vernicifera, Stokes.) (R. vernix Th.) Semecarpus vernifera, H. et K. (台灣產)	種子， 藥， 汁	Wax 24%, Lobinin. Urshiol, Hydrouros- hiol. (中國產) Laccol (台灣產， 安南產，日 本產) Thitsiol (緬甸產)	乾漆為通經及 驅蟲驅除藥。 一次量 2—5gm 生漆為塗料用 , 漆液含 Urushiol 觸皮膚起中毒 作用，發漆疹 。	陝西，四川， 湖北，安徽， 浙江，福建， 江西，廣東， 台灣，安南， 緬甸，日本。	漆木作漆， 木汁，可以 髹物，其字 象水滴而下 之形也。
328.	婆羅得 (本草35) 別名： 婆羅勒	Semecarpus anacardium, L. (Laufer)	種子	Semecarpol 0.1%, Cardol Bhilawanol 46%, Gallic acid, Anacardic acid, Dioxybenzol, (本新)	1) 補腰腎。 2) 可染髮令 黑。	波斯，馬來。	波斯語 Biladur 意即重生果 也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
331.	巴 豆 (本草35) 別名：巴 菽，剛 子，老陽子，江 子，巴 霜。	<i>Croton Tiglium</i> , L.	子 根	種子中含 Protein 18%, Fatty oil 33—45%	種子為峻下劑，治頑固性便秘。劑量一次 0.04—0.2mg	四川，湖北，廣東，福建詔安四都。	巴豆出巴蜀，其形如菽豆，故名。藥典採用巴豆油，巴豆軟膏，巴豆搽劑，其中所含之 C. otin 有猛毒性。
332.	藺 茹 (本草17) 別名：離 婁，掘 棍，草藺茹。	<i>Euphorbia adenochlora</i> , Morr. et Dcne. (<i>Galarhoeus a. M. et D.</i>) (<i>E. palustris</i> Gray 草藺茹)	根		為清血藥，消腫藥，殺虫藥，排腫，治惡血，緩疽腫痛，殺疥蟲。	山東	藺茹本作蘆菔其根牽引之貌。
333.	澤 漆 (本草17) 別名：漆 童，貓兒眼，睛 草，綠 草，五鳳草。	<i>Euphorbia helioscopia</i> , L. (<i>E. lunulata.</i>) (<i>E. peplus</i> Seem.)	莖 葉	Phasin-3ap Euphorbin Ca malate Saponin Butyric acid, (本新)	為解熱利尿藥，治間歇熱，治顏面四肢等浮腫。劑量一次 1—3gm	甘肅，陝西，湖北，江西，江蘇，廣東，台灣。	是大戟苗，生時摘葉，有白汁，故名。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
331.	續隨子 (本草17) 別名： 千金子， 千兩金， 拒冬， 苦藤豆， 聯步。	Euphorbia Lathyris, L.	草中 之汁	Aesculetin Euphorbon Enzymes, Protease, Peroxyda- se, Gum-resin 種子中含 fat 40—46% (本新)	爲利尿劑，治 水腫腹水等； 又爲通經藥， 治月經閉止及 子宮內月經之 鬱積等。 劑量一次 3—7gm	四川，浙江， 台灣。 (南歐原產)	葉中生葉， 數數相續而 生，故名， 冬月始長， 又名拒冬。
335.	大戟 (本草17) 別名： 印 鉅， 下馬仙。	E. pekin- ensis, Rupr. E. lasioca- ula, Boiss.	根	Euphorbon Gum-resin Ca-oxalate Starch 及 一種之 Alkaloid. (漢藥)	1) 爲峻下劑， 用於慢性胃 炎時，可使 胃腸之內容 物排泄，又 能下惡血。 2) 有利尿之效 ，若用過量 ，對孕婦有 墮胎之虞。	湖北，江西， 廣東，山東， 河北，東北各 省，河南禹州 ，廣西南寧。	其根辛苦戟 入咽喉，故 名。
336.	甘遂 (本草17) 別名： 甘 遂， 陵 桑， 陵 澤， 甘 重澤， 苦 澤， 白主鬼	Euphorbia Sieboldia- na, Morr. et Denc. (Galarhoe- us. S. M. et D.) (E. corall- oides. Thunb.)	根		根爲利尿劑， 治面目浮腫， 水腫、腹滿、 脚氣腫痛、疝 氣偏腫、兩便 不通。	陝西及中部各 省。	

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
337.	白附子 (本草17)	Jatropha Janipha, Lour. (Manihot Loureirii. Pohl.)	根		治中風失音、 偏正頭痛、喉 痺腫痛、小兒 吐涎。	西部各省，朝 鮮。	
338.	菴摩勒 (本草31) 別名： 餘甘子， 菴摩落， 迦果。	Phyllanth. us, Emblica, L. (Emblica officinalis, G.)	種子	Myrobala nin, Oleoresin, Tannin.	1) 治風虛熱氣 。 2) 爲旗壯劑。 3) 取子壓汁， 和油塗頭， 生髮去風癢 。 4) 解金石及硫 黃毒。	廣東，廣西， 四川，安南， 波斯，印度。	波斯語 Amelah, 梵語 Amalakan, 此果之味， 先苦後甘， 故名餘甘。
339.	蓖麻 (本草17) 別名： 蓖麻	Ricinus commun is, L.	種子	種子含 30—50%之 Fatty oil (Ricin, Ricinoleic acid.) Glyc/PO ₄ Proteolyt- ic, Phytinase, Lipase. 葉含 1.4% 之Ricinine (alk.) Pigment, Enzymes. Ash 10% (本新)	油爲瀉劑，又 爲飛機滑磨油 印刷油，頭髮 油用。 【新藥】 Castarol (脫臭)， Lacris (糊狀)， Ricina (乳劑)， Risicol (固形)， Chocoricin.	福建建甯、泰 甯，浙江，廣 東，東北各省 ，安南，印度 ，日本。	葉似大麻， 子如牛婢， 故名。 箠亦作蠶， 蠶牛虱也， 其子如麻點 ，故名蓖麻 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
340.	烏 柏 (本草35) 別名： 鹽 臼	Sapium sebiferum, Roxb. (Croton, s., L.) (Stillingia S., Mich.) (Excoeca- ria s., Muell.)	油 葉 根 皮	種子含 Fatty oil 60%, (主成分爲 Palmitin, Lauric acid, Myristic acid, Margaric acid.)	白子可壓搾成 油製燭，又治 皮膚病及腫物 。葉爲黑色染料 。根皮爲利尿劑 劑。劑量一次 2—7gm	江蘇，浙江， 廣東，湖北。	烏柏，烏喜 食其子，因 以名之。

第六十六 遠志科 POLYGALACEAE

341.	遠 志 (本草12) 別名： 苗名小草 ，細草， 棘 蕤， 萋 繞。	Polygala tenuifolia, Willd. P. sinensis Hoatt. (蒙古產) P. sibirica, L. P. japoni- ca, Houtt. (日本產)	根	Saponin (內含Sene- gin 0.7%) Resin 0.8%, Polygalit C ₆ H ₁₂ O ₅ (1.5 Anhy- droman- nit.) Onsicin C ₂₄ H ₄₇ O ₅ (結晶性物 質) Fat. oil Ash 6%,	爲祛痰劑，代 美遠志用， 劑量一日 5gn (爲液劑) 藥典製劑，有 劑劑液浸膏糖 漿等。	河北，山西曲 沃，河南禹州 ，山東，四川 ，福建永安余 荆山，蒙古， 東北各省，朝 鮮，日本。	本品功能益 智強志，故 有遠志之稱 。
------	--	---	---	---	--	---	------------------------------

第六十七 楝 科 MELIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
342.	楝 (本草35) 別名： 香楝， 楝枏。	Cedrela sinensis, A. Juss. C. odorata, Lour. Toona sinensis, Roem.	葉 根 內 皮	Protein 5.7%, Fat 0.4%	樹皮及根皮煎 汁，為收斂劑 ，治婦人之血 崩、產後出血 、月經不順、 及淋疾等。 又治神經痛、 及肝臟、脾臟 等之疾患。	甘肅，河北， 雲南昆明。	
343.	楝 (本草35) 苦楝子， 川楝子， 金鈴子。	Melia Azedarach L. (Var. japonica Makino.) (M. Toose- ndan, S. & Z.) Var. (subt- ripinnata, Miq. var. semperflo- rens. Mak.) (M. japon- ica, Don.)	果實 皮	果實含 Fat. oil 60%, 皮含 Tannin 7%, (本新) Margosin (Bitter) (食植)	皮為蛔蟲及蟯 蟲驅除劑。 一日量 10gm, 又外用為疥癬 及及麻瘋等之 洗滌劑。 子實治急性熱 症，膀胱炎及 疝氣等。 莖葉在農業上 為殺蟲劑，(苦 楝莖葉3.75 kgm 水 10L 煎汁用之)。	四川重慶，江 蘇，浙江，江 西，陝西，福 建，廣東，雲 南。 【新藥】 Sauveran 以苦楝皮與海 人草為主劑， 為蛔蟲驅除藥 。	楝葉可以練 物，故謂之 楝，其子如 小鈴，熟則 黃色，如金 鈴，象形也 。 墨西哥藥典 ，採用苦楝 皮 Cortex raticis, Meliae, 為 驅蟲藥。 本品因出四 川，稱川楝 子。

第六十八 橄欖科 BURSERACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
344.	返 魂 香 (本草34) 別名： 馬精香， 振靈香， 却死香， 驚精香。	Boswellia serrata, Roxb. (B. glabra, Roxb.) (Canarium balsamif- erum, Willd.)	根中 之汁	Resin 56% Gum 20% Ess. oil 9% (Anisaldehyde, Methylch- avicol,) Enzymes, Arabinose Dioxyben- zol, Xylase. (本新)	爲消毒藥及回 蘇藥。	內傳云產西海 聚窟州。	焚其根中之 汁，其氣甚 香，凡有疫 死者，燒豆 許薰之，再 活，故曰返 魂。 “Indien Frankin- cense”
345.	橄 欖 (本草31) 別名： 青 果， 患 果， 諫 果。	Canarium album, Raeusch. (C. comm- une, Vill.) (C. luzoni- cum, Gray.) (Pimela a., Lour.)	果實 核	Protein 1% Fat 0.6% Fat 66% 核	實果生津液、 治咽喉；汁解 酒毒、河豚毒 及一切魚鼈毒 。 一次量 4—10gm	福建，廣東。	此果雖熟， 其色亦青， 故俗呼青果 。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
346.	木 威 子 (本草31) 俗名： 烏 欖	C.Pimela Koenig. (Pimela nigra, Lour.)	果實		果實為清涼劑。 。	廣東。	
347.	膽 八 香	Canarium strictum, Roxb.	滲 出 物	Resin 29%, Ess. oil 12%, Amyrin, Azulen, Anethol, Heptan, Phelland- ren, Sesquiter- pene.	為薰香料，去 臭除穢。	安南東京。	
348.	沒 藥 (本草34) 別名： 末 藥	Commiph- ora Myrrha, Engl. Balsamod- endron M., Nees.	滲 出 物	Resin 25—40% Gum 60% Ess. oil 5% (Myrrrol) Ash 5% Commiph- oric acid, Myrrholic acid, Arabinose Oxydase, Galactose, Xylose. (生藥)	為抑制氣管支 、膀胱、子宮 等分泌過多之 藥。 又為通經強壯 鎮痙藥。 沒藥乳香合用 ，為止痛消腫 藥。	北非洲，亞比 西尼亞，索馬 里 (Somali) 亞拉伯，波斯 。	藥典製劑為 酊、浸膏、 硬膏、軟膏 等。 【新藥】 Myrrholin ，為創傷軟 膏。

第六十九 苦木科 SIMARUBIACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
349.	梛 (本草35) 別名： 梛， 椿梛， 大眼桐， 虎目樹， 臭 椿。	Ailanthus cacoden- dron S. & T. A.glandu- losa, Desf.	根皮 莢	樹皮： Fatty oil (Palmitin, Stearin, Olein,) Cerylalco- hol, Phytoster- in, Phlobaph- ene, Tannin, 葉： Ellagitannin, Gallotannin.	殺虫，止瀉血。	江蘇，山東， 河北，東北各 省。	香者名椿， 臭者名梛， 山梛名梛， 椿梛易長而 多壽考，故 有椿梛之稱 ，莊子言大 椿以八千歲 爲春秋是矣 。

第七十 芸香科 RUTACEAE

350.	降 真 香 (本草34) 別名： 紫藤香， 雞骨香。	Acronych- ia laurifo- lia, Bl. (Cyminos- ma resin- osa, DC.) (Jambolif- era, peduncul- ata L.)	木部	Ess. oil	療折傷膿瘍， 止血定痛，消 腫生肌，平氣 喘。	廣東，廣西， 雲南，貴州， 陝西，安南， 暹羅，琉球。	相傳燒此香 ，烟直上， 感引鶴降， 故有降真之 名。
------	--	---	----	----------	----------------------------------	--------------------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
351.	橙 (本草30) 別名： 金 魁， 鵝 殼， (又有新 會橙， 美國臍橙， 日本夏 橙， 鉤頭橙， 臭 橙， 代 代， 酸 橙， 甜 橙， 柳 橙， 香水橙， 等等)。	Citrus Aurantium L. (酸橙，鉤 頭橙) (1) C. bigara- dia, Risso. (同上) (2) C.auranti- um Var. amara, Engl. (臭 橙) (代代花) (回青橙) (3) C. sinensis var brass- illiensis, Tanaka, (美國臍橙) (4) C. sinensis Osbeck (甜橙廣橙) (新會橙) (5)	果汁中含 (Citric acid, malic acid, Gallic acid.) Sugars, Hesperid- in, Isohesper- idin, Aurantium- orin, Stachydrin xanthoph- yll, Carotin. Protein Vits. A. B. C.	1) 橙皮爲芳香性，苦味建胃藥及橙皮油原料。又爲疝氣劑藥。 2) 果汁爲枸橼酸之製造原料。 3) 果皮炭化成脫色力較強之植物炭。 4) 橙葉爲鎮痙藥。 5) 橙花製橙花水及橙花油原料。	(1)(2) 浙江黃巖。 (3) 浙江黃巖、杭州、塘棲、蘇州虎邱、日本。 (4) 浙江黃巖、上海(花旗蜜橘)，南京(美橘)。 (5) 廣東新會、福建、浙江、湖南。	橙柚屬也，可登而成之，故字從登，又諧聲也。 (3) Citrus natsudaia, Hayata 日本夏橙，代代。 其揮發油之主要成分爲 l-Limonen n-Decylaldehyd, caprylsäureester, 而特有之香氣爲, Umbelliferon 及 Aurapten.	

(成分續) 果皮中含 Hesperidin (未熟果中特多), Naringin, Stachydrin, Ess. oil, (Limonen) Fatty oil, Carotin, Pectin, Enzymes, Vits A. B. C,

葉中含 Ess. oil 0.23%, (Linalylacetate, Citronellal-Geraiol-Capronate);

花中含 Ess. oil 0.5%, (l-Pinen, l-Camphen, Dipenten);

種子中含 Fat...39%, Protein...19%, CaO...0.7%.

【藥典採用】未熟枳實，橙皮，橙皮糖漿，橙皮酊，苦味酊，複方金雞納酊，金雞納酒，治瘧莖皮(Cortex Condurango)酒，橙花油，橙花水等。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
352.	柚 (本草30) 別名： 欖，條， 壺柑， 臭橙， 朱欖， (又有文 旦，香 圓，香 橙，沙 田柚， 坪山柚， 宜昌橙， 日本柚等 名稱)。	Citrus decumana Linn (1) Citrus grandis, Osbeck (2) 文旦 C. aurant- ium L. Var, decumana L. (3) 朱欖，酸欖 C. grandis, var. Wentanyu Hort. (4) 文旦柚，六 月柚 C. grandis var. Shatinyu, Hort (5) 沙田柚 C. grandis, var. Pinshanyu Hort. (6)	果皮 果汁 花	果皮含 Pectin, Ess. oil Naringin (gl), Peroxyda- se, Amylase Rhamnase Vits A, C Hesperidin 果汁中含 9%之 Citric acid, Sugar 14%, Lycopin, Amylase, Peroxyda- se, Vit. A ₁ B ₂ , C ₅ . Ash 0.5%, (B. O ₃) 花中含 Ess. oil, Naringin, Indol.	(1) 果皮為精 油原料，又用 作蜜餞，為調 味品。 (2) 果汁，為 枸橼酸製造之 原料。	(1)(2) 3) 產 浙江溫州(俗 名拋)，福建 漳州(俗名欖)，又浙江平 陽所產之大紅 拋及四季拋， 係 C. grandis 之變種。 (4) 文旦柚， 產福建漳州、 長泰及長江流 域。 (5) 沙田柚， 產廣西容縣、 沙田。 (6) 坪山柚， 產福建漳州、 浦南。 (7) 香圓，產 湖北宜昌，江 西，安徽，浙 江等省。 (8) 香橙，產 江蘇洞庭山及 浙江塘棲。 (9) 宜昌橙， 產湖北宜昌， 貴州，廣西等 省。	柚色油然， 其狀如齒(音 友古酒尊)， 故名欖，亦象 形。 閩產錄異載 文旦者，初係 小旦文姓所種， 在長泰縣溪東， 不過四五 十株云。 據胡昌熾云， 香圓為柚及 枸橼雜交而成。 日本柚，有 香橙及羅漢 橙二種，採 用為柑橘接 木。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		坪山柚 <i>C. grandis</i> , var. Shangyuan Hu (7) 香圓 <i>C. junos</i> , Tanaka(8) 日本柚, 香 橙 <i>C. ichang-</i> <i>ensis</i> , Swingle 宜昌橙 (9) <i>C. sabon</i> Sieb. (10) 朱欒(日本 種)	葉	葉中含 Ess. oil 菲列瀋產收 油率1.7%, 其主成分為 Dipenten, Linarol, aldehyd (Citral)		(10)朱欒, 產 日本九州。	
353.	橘 (草本30) 別名: 黃 橘, 扁橘, 寬皮 朱 橘, 橘 綠 橘, <i>C. nobilis</i> 乳 橘, Var. 包 橘, <i>deliciosa</i> , 沙 橘, Swingle. 油 橘, <i>C. subcom.</i> 穿心橘, <i>pressa</i> ,	<i>Citrus</i> <i>deliciosa</i> , <i>Tenove</i> . <i>C. nobilis</i> Var. <i>deliciosa</i> , Swingle. <i>C. subcom.</i> <i>pressa</i> ,	汁	果汁中含 Sugars 11.6%, Citric acid 2%, Vit. C ₁ , β-Carotin (果肉之黃 色素)。 Ash 0.24%.	橘實, 潤肺止 渴、開胃、(惟酸者聚痰) 。橘皮, 化食消 痰, 治反胃吐 食, 又能消魚 積。 橘皮, 去白為 末, 治嘔雜吐 水。	福建, 浙江, 江西, 廣東, 湖南, 湖北, 四川, 雲南, 貴州。 (1) 早橘產浙 江黃岩。 (2) 甜橘產廣 東潮州及台灣 。 (3) 酸橘產廣	橘從喬, 音 鵠諧聲也, 又雲五色為 慶, 二色為 喬, 喬雲外 赤內黃, 非 關非霧, 郁 郁紛紛之象 , 橘實外赤 內黃, 剖之 香霧紛紛,

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
354.	柑 (本草30) 別名： 木奴， 朱柑， 黃柑， 乳柑， 石柑， 沙柑， 又有溫州 柑，新會 柑，椪， 暹羅蜜橘 等。	<i>Citrus nobilis</i> , Lour. 柑 <i>C. poenensis</i> , Tanaka <i>C. n.</i> , var. <i>P. Hayata</i> 有柑 (1) <i>C. tardifera</i> , Tanaka (2) 椪橘，椪 <i>C. suavissima</i> , Tanaka (3) 甌柑，真柑， 乳柑 <i>C. tankan</i> , Hayata (4) 蕉柑，桶柑， 招柑，暹羅蜜橘 <i>C. suhoensis</i> , Tanaka (5) 四會柑，大柑 <i>C. chachiensis</i> , Hort. (<i>C. n.</i> var. <i>Chachikan</i> Wong) (6) 茶枝柑		果實含 Citric acid 2—4.5% Sugars 10.9% Hesperidin, B-Carotin Garicaxanthin, Violaxanthin, Lutein (以上四者 為果肉之色 素) Vit, C ₁ 果皮含 Hesperidin, Ess. oil (主成分 d-Limonene.) 葉含 Ess. oil	柑皮效用與橙皮同，其青皮之效，比橙皮更強，往往用於肝臟之變硬及痲痛。一次量 1—3—5gm 又為蜜柑油之製造原料。	分布於廣東，福建，浙江等省。 (1) 廣東潮州。產曰蜜柑，福建漳州產曰盧柑，台灣及日本產曰椪柑。 (2) 椪產浙江黃岩。 (3) 甌柑產浙江溫州。 (4) 產於潮州者稱蕉柑，招柑，產於漳州台灣者稱桶柑，上海人稱之曰暹羅蜜橘。 (5) 四會柑產廣東新會，年可產一千五百萬斤。 (6) 茶枝柑產廣東。	柑未經霜時猶酸，霜後甚甜，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
355.	金 橘 (本草30) 別名： 金 柑， 盧 橘， 山 橘， 給客橙。	Citrus japonica, Th. (Fortune- lla japonica, Swingle) 金橘 (1) Fortunella crassifolia Swingle 金彈 (2) F. obovata Tanaka 朋橘 (3) F. margar- ita, Swingle 羅浮 (4) F. hindsii, Swingle 金豆 (5) F. polyan- dra, Tanaka 長葉金柑 (6)	果實	Ess. oil Sugar 9%, Protein 0.8%, Pentosan, Galactose Vit C.	下氣快膈，止 渴解醒，辟臭 ，皮尤佳。	(1) 安徽，江 西。 (2) 浙江穿山 、黃巖、溫州 。 (3) 浙江溫州 ，福建漳州， 江蘇揚州，南 京花神廟。 (4) 產甌江北 之羅浮地方故 名，黃岩、穿 山亦有。 (5) 浙江溫州 、台州，福建 ，廣東，廣西 及香港等地。 (6) 廣東汕頭 及海南島。	此橘生時青 蘆色，黃熟 則如金，故 有金橘盧橘 之名，(盧 黑色也)。 (1) 別名圓 金柑(胡昌 熾)，樓(羣芳譜)丸 金柑(日本)。 (2) 金彈(黃岩誌，溫 州誌)，寧 波金彈(日 本)。 (3) 別名長 壽金柑(福 州)，壽星 橘(湖北通 誌)，壽橘 (南京)。 (4) 別名牛 奶金柑(汝 南圖史)， 金棗(花歷 百詠)棗橘 (宣州府誌)，牛奶橘 (湖北通誌)。 (5) 別名山 金柑，山金 橘(韓直齋 橘錄)。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
356.	枸 櫞 (本草30) 別名： 香 櫞， 香泡樹， 陳 橙， 洋檸檬。	Citrus medica, Linn. Citrus limonia, Osbeck. Citrus limon, Burm.	果實 果實 實果	果肉： Citric acid 果皮： Ess. oil (Limonen Phellandr en, Cital, Citronellal Linalool, Geranyl acetate) Hesperidi- ne, (Bitters.)	果皮爲芳香劑 ，枸櫞油原料 及調味劑。 果肉爲枸櫞糖 製造原料。 【藥典】檸檬油 ，檸檬精，芳 香精，芳香 糖漿。	廣東，廣西， 福建，浙江， 湖南，湖北， 四川，(原產 印度)廣東新 會，地中海沿 岸，馬來半島 ，西班牙，美 國加州。	又名 黎檸檬子， 宜母子。
357.	佛 手 (本草30) 別名： 佛手柑	C. medica, L. var. sacrodac- tylis, Swingle. C. m. var. Chirocarp us, Lour.	果 實 皮	Ess. oil Hesperidi- in.	化痰止咳。	廣東，福建， 浙江，江蘇。也。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
358.	枳 (本草30) 別名： 枳實， 枳殼。	<i>C. trifoliata</i> , L. <i>Poncirus t.</i> , Rafin. (<i>Pseudaegle trifoliata</i> , Makino) (<i>Citrus t.</i> L.) (<i>Aegle sepiaria</i> , DC.)	果實 皮 花	Ess. oil Limonen, Linalool, Linalool-acetate, anthra-nyl-methyl-ester.) Isosakuranetin.	枳殼爲苦味健胃劑，治胃之膨滿壓重，使嘔吐靜止，增進食欲及消化，又用於呼吸器患者之咳嗽、水腫、腹水、便秘等。 一次量 2—8gm 枳實亦爲苦味健胃劑，治胃酸及嘈雜。 一次量 1—5gm	原產中國中部，現北迄山東，南至廣東均有栽培，但四川者爲最佳，江西次之，福州又次之。	枳木似橘而小，葉如橙而多刺，春開花秋結實，生時皮厚而堅實，色青綠，熟時皮薄而空虛，色黃棕。枳實乃實之嫩小皮厚中實者，故曰實。枳殼乃實之老大皮薄中虛者，故曰殼。
359.	枸 橘 (本草36) 別名： 臭 橘， 唐 橘。	<i>Triphasia trifoliata</i> , DC. (<i>T. aurantiola</i> , Lour.) (<i>Limonia t.</i> , L.)	果實 核 皮 葉		實治痛氣解酒毒，核治腸風下血不止，皮治中風，葉爲消腫藥。	處處有之。	本品之實爲球形，黃色，大如彈丸，狀似枳實而殼薄，不香。其幹多刺，人家收種爲藩籬用。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
360.	白 鮮 (本草13) 別名： 白 羶， 白羊鮮， 地羊鮮， 金雀兒根。 。	Dictamnus albus, L. (D. fraxin ella Pers.)	根 皮	Dictamni- ne, Fraginell- on, Irigonell- in, Choline, Saponm, Ess. oil (Fraxinel- lon.) Saponin. Dictamno- lacton,	1)治黃疸。 2)治風瘡疥癬 、赤爛、眉 髮脫脆。 3)爲通經藥， 并治陰部腫 痛、產後餘 痛。	四川，河北， 山東，江蘇。	鮮者羊之氣 也，此草根 白色，作羊 羶氣，其子 纍纍如椒， 故有諸名。
361.	吳 茱 萸 (本草32)	Evodia rutaecar- pa, Bth. (Boymia r., S. & Z.)	葉 果實	Evodene (果實中香 氣之成分) Evodine Evodiami ne, Rutaeca- rpine, (Alk.) Ess. oil Ocimen. (本新，藥 植)	爲香辛性健胃 藥，治腹痛吐 瀉、便秘消化 不良。 又爲驅風，收 斂殺蟲藥，并 治霍亂及中暑 。 一次量 8gm 【新藥】 Rutamin.	茱萸南北均有 ，入藥以吳地 產者爲佳。	建甯府重陽 日，登高飲 茱萸酒，名 茱萸爲辟邪 翁。(福建 志) Evodia, 爲 芳香之意， Rutaecar- pus之ruta 爲果實之意 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
362.	食 茱 萸 (本草32) 別名： 檄，藪， 艾 子， 越 椒， 攬 子， 辣 子。	Xanthoxy- lum ailantho ides, S. et Z. (Fagara a., Engl.)	葉 果實	Ess. oil (Terpen, Methylno ny.keton)	果實為健胃藥， 治便秘及消 化不良。又治 霍亂及中暑。 一次量 2—7gm 葉治感冒及瘧 疾。	福建	王維詩：獨 在異鄉為異 客，每逢佳 節倍思親， 遙知兄弟登 高處，遍插 茱萸少一人 。
363.	芸 香 (拾遺5)	Ruta graveolens L.	全草	全草 Ess. oil 0.06%, (其主成分 含80—90% 之 Methyl- n nonyl- keton 及 Methyl-n- heptyl-ket- -on. Methyl-n- heptylcar- binol, Methyl- nonylcar- binol, Aethyl- acetate, Pinen, Cineol,) Rutin, Flavonol (gl.)	1) 為鎮痙藥， 驅風藥，通 經藥，墮胎 藥。 2) 截癩瘡。 3) 治瘡毒，解 毒，搗汁 服之(職方 考，入夷方 者，搗以自 隨，如嚼此 草，無味， 即知中蠱， 急服其汁， 吐之可解。) 法國及瑞士藥 典：採川芸香 草；芸香水； 芸香浸膏，芸 香醋等。 西班牙及荷 牙藥典： 採用芸香油。	福建永安，雲 南昆明及各地 。 (歐州原產)	芸香有二種 ，五葉者名 五葉芸香， 蕝葉者，名 蕝葉芸香， 治癩瘡。 芸為盛之意 ，繁盛於野 ，香氣甚強 ，故稱芸香 。 Ruta 為 希臘古名。 Graveole- ns, 有濃厚 芳香之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
364.	常 山 (本草17) 別名： 恆 山， 五 草， 鷄 尿 草， 鴨 尿 草， 蜀 漆。	Orixa japonica Th. (Celastrus), S. & Z.)	根 葉 莖	Orixine, (alk) Orixidin, Isoorixin, Kokusagin Ess. oil 0.01% (Camphene, Linalool) Umberiferon, 4 quinaz- olone, isofebriq- ugine, febriq- ugine (alk) Dichroines (有 α , β , γ 三種)	根及葉為間歇 熱之特效藥， 亦為截瘧之要 藥。 一次量 藥為3 gm, 根1—2gm.	四川重慶、萬 縣、廣漢(古 蒼州)，陝西 南鄭(古漢中)，湖北宜都 ，廣東清遠， 雲南，湖南， 江西。	葉名蜀漆， 根稱常山。 據1948年美 國化學會誌 第二十卷第 六號所載， 常山所含之 生物鹼成分 ，其藥效有 奎甯之百倍 云。
365.	藥 木 (本草35) 別名： 黃 藥， 黃 柏， 檀 栢。	Phelloden- dron amurense, Rupr. (P. chine- nse wil.	內皮	Berberin, Palmatin, Obakunon, Obakulac- ton.	為健胃劑，治 腹痛及消化不 良，又為解熱 劑，治熱性下 痢熱性黃疸。 一次量 1—2gm	河北，東北各 省。 福建清流。 【藥理】由黃藥 製出之鹽酸小 檗鹼，對於大 腸菌傷寒菌及 霍亂菌等，有 殺菌作用。	【新藥】 Tanvonin, Pulvis waka 健胃整腸。
366.	茵 芋 (本草17) 別名： 因 預， 莞 草， 卑 共。	Skimnia japonica Th.	葉	Skimiani- ne, Skimmine, Dictamni- ne.	1)為驅蟲藥。 2)葉葉之煎汁 ，有撲滅植 物害虫之特 效。	江蘇銅山(古 彭城)出者最 佳。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
367.	秦 椒 (本草32) 別名： 大 椒， 檄， 花 椒。	Xanthoxy- lum piperitum q. v. (X. Alatum Roxb.) (X. Alatum Rorb. var. Planispin- nim, R. & W.)	果實	Ess. oil 2% (Xanthox- ylin 無氮 結晶性物質 , Xan'ho- xinic acid 山椒酸 Xan- thoxin)	果皮治咳嗽及 關節痛， 一次量 0.8—1.5gm, 又為驅虫驅除 藥及香料之調 製用。 種子有利尿作 用，治水腫腹 水盜汗等。 一次量 3—4gm	【藥理】 家兔，對於 Xan hoxin 之中毒症狀， 為激烈之癲癇 狀痙攣，繼之 以呼吸中樞麻 痺而死，魚類 對此植物之感 應，尤為銳敏 。	本品出陝西 甘肅，因秦 地所產，故 名秦椒。 Xanthoxy- lum, 木部 黃色之意。 Piperitus 果實之香氣 ，如胡椒之 意。
368.	蔓 椒 (本草32) 別名： 豬 椒， 豕 椒， 彘 椒， 狗 椒， 金 椒。	X. Bungei pl. (Zanthox- ylum Bungean- um, Max.) (Z. nitid- um, Bungl.) (Z. simul- ans, Hance.)			根莖實為驅風 藥，治風寒溼 痺及膝痛，煎 湯浴之。 根燒末服，治 痔症。 枝葉煎汁如流 膏，治通身水 腫，日服3次 ，每空心服一 匙。	生雲中(山西)山谷及丘冢 間。	此椒蔓生， 氣臭如狗彘 ，故名。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
369.	蜀椒 (本草32) 別名：巴椒，漢椒，川椒，麩點椒，山椒，花椒。	X. alatum Roxb. (中國產山椒) X. piperitum, DC. (Fagara p., L.)		果實： Ess. oil 2—4% (Phellandren, Geraniol, Citronellol, Terpene, Dipenten), Sanshol (辛味成分) 子： Limonen. 葉： Ess. oil (Citral, Citronellol, Geraniol), Saponin, 根： Berberine (本新，漢植)	1) 爲食品香料。 2) 爲健胃劑。 3) 爲蛔蟲驅除藥。	四川，陝西，河南，山東，福建清流大豐山。	本品原產四川，故名蜀椒。 據 Stenhouse 記載，中國產山椒中精油，發見 Xanthoxylm 依溝口氏記載有 Xanthoxin (不含氮結晶性物質) 及 Xanthoxinsäure, (結晶形物質) 二種成分。 (漢植)
370.	崖椒 (本草32) 別名：野椒	X. schini-folium. S. et Z. (Z. marit-schuricum Benn.) (Fagara s., Engl.)	果實 葉	Ess. oil (Esdragol 90%, Bergapten)	果實內服爲鎮咳藥，外用貼乳房之腫痛用。 葉作粉末，爲消炎劑，外用治打撲症。	安徽，山東，江蘇，東北各省。	

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
371.	地 椒 (本草32)	Xanthoxy- lum. Sp.	實		1) 治淋瀝腫痛。 2) 作殺蟲藥， 治牙痛。		此椒覆地而 生，故名。

第七十一 蒺藜科 ZYGOPHYLLACEAE

372.	東 廬 (本草23) 別名： 沙蓬米， 登相子， 沙米， 登粟。	Nitraria Schoberi, willd. (N. siberi- ca, Lam.)	子		爲滋養強壯劑， 久服不餓， 牧牛食之，尤 肥。	山西，甘肅。	本品爲救荒 食物，河西 人云，「貸 我東廬，償 爾田梁，」 其意頗深。
373.	疾 藜 (本草16) 別名： 旁通， 屈人， 止行， 休羽， 升推， 茨。	Tribulus terrestris, L. (T. lanug- inosus, L.)	果實	Fatty oil 3.5%, (主成分爲 54.7%之 Linolic acid, 23.9%之 Oleic acid Elaidic acid.) Phlobaph- en (gl.) Phylloery thrin, Ess. oil, Resin KNO ₃ , Vit, A ₂ Tannin. (植研，本 新)	1) 果實治諸瘍， 使腫物之 疼痛緩解。 2) 促乳汁之分 泌及通經用。 一次量 2-5gm 3) 爲強壯劑。 本品有刺，利 用之作籬，以 阻人行，今兵 家以鐵線作之， 爲布防之用。	生道上及牆上。	疾疾也，藜 利也，其刺 傷人甚疾而 利也。 易云，據於 疾藜，言其 凶傷。詩云 ，牆有茨， 不可掃也， 以刺恆穢， 方用甚稀。

第七十二 亞麻科 LINACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
374.	亞麻 (本草22) 別名： 壁虱， 胡麻， 鷄麻。	Linum perenne, L. L. usitati- ssimum. L.	種子	Fatty oil 35%, (Linolic-, Linoleic- Isolinoleic oleic-, Palmitic-, Myristic glyceride) Mucilage Linamarin Lipase, Protase, Lecithin, Vits. A ₂ B ₂ .	1)內用爲煎劑 ,治腸及尿 道炎, 一次量 1—3gm 2)外用爲巴布 劑及灌腸劑 。 3)製亞麻仁油 用。	山東,陝西, 雲南。 原產地高加索 ,移植至法國 ,土耳其,埃 及英國,瑞典 ,蘇聯,比利 時,印度北美 等處。	藥典採用亞 麻仁,亞麻 仁油。 【新藥】 Linoval, Liophen

第七十三 牻牛兒科 GERANIACEAE

375.	牻牛兒 (救荒本 草) 別名： 風露草， 神輿草， 鬥牛兒。	Geranium nepalense. Sweet.	全草	Tannin, Gallic acid Succinic acid, Protocate- churic acid, Brenzcat- echin, Geranium oil, Mucilage, Resin,	爲止瀉藥，治 腸炎及赤痢。 一次量 2—7gm 【藥理】牻牛兒 製劑，使腸肌 緊張亢進，尤 能制止縱走肌 之運動，緊張 增加，大部分 基於對肌肉自 己之作用，制 止縱走肌之選 動，似由交感 神經之興奮而 起者。	浙江鎮海。 【新藥】收斂止 瀉整腸劑： Atamin, Atominoze, Eutolmin, Gennopon, Pignoul.	牻牛兒，爲 藥效甚靈驗 之意。 Geranium 爲鶴之意， 其蒴果之形 如鶴嘴然。 Nepalense 爲 Nepal (印度地名)之意。
------	--	----------------------------------	----	--	--	--	---

第七十四 酢漿草科 OXALIDACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
376.	五 斂 子 (本草31) 別名： 五稜子， 陽 桃。	Averrhoa Carambola L.	果 實	Sugars. Vit. B ₁ , C ₂ , KH Oxalate.	果實生津止渴。 。	廣東，福建。	其果實大如拳，上有五稜如刻起，作劍脊形，南人呼稜爲斂，故以爲名。
377.	馬 檳 榔 (本草31) 別名： 馬金囊， 馬金南， 紫檳榔。	A. caram- bola, L.	果 實	Sugars Vit B ₁ C ₂ KH Oxalate.	難產時細嚼數枚，以開水送下，須與即產，又治惡瘡、腫毒。	雲南沅江。	本品蔓生結實，大如葡萄，紫色味甘，內有核似大楓子，核內有仁，亦甜。
378.	酢 漿 草 (本草20) 別名： 酸 漿， 三 葉 酸， 三 角 酸， 酸 母， 醋 母， 酸 箕， 酸 鴉， 雀 兒 酸， 雀 林 草， 赤 孫 施， 小 酸 茅。	Oxalis cornicul- ata, L.	草	KH Oxalate.	1)將莖及葉揉碎，貼布諸瘡疥癬等。 2)葉之煎汁，治淋疾。 3)爲研磨劑，磨擦白銅器具，可發美麗之銀光。	即生於暖地原野道旁及田澤陰濕之處。	

第七十五 豆 科 LEGUMINOSAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
379.	相 思 子 (本草35) 別名： 紅 荳， 郎君子， 美人豆， 紅漆豆。	Abrus precator- ius, L.	子	子含 Abrin, (gl) Abrussic acid, Hemag- glutinin Lipase, Urease. 葉含 Glycyrrh- izin. (本新，植 研)	爲眼炎（赤眼） 解熱、殺蟲 藥。 外用爲糊泥， 治神經痛、皮 膚病。 （本品有毒， 應用時，須注 意）。	南方各省（廣 東嶺南），台 灣，印度，西 印度及非洲。 【新藥】 Abtunol	相傳昔有人 沒於邊，其 妻思之，哭 於樹下而卒 ，因以名之 。 【命名考】 本品屬名 Abrus, 爲 希臘語 Abpos之轉 變，美麗之 意，印度人 以此爲襟飾 。又種名 Precatori- us, 爲珠數 之意，印度 人以此製珠 數。
380.	海 紅 豆 (本草35)	Acacia Richii, A. Br. (A. confu- sa, Merril.)	豆		主治人黑皮黧 黯、花瓣、頭 面遊風、宜入 面藥及澡頭。	廣東，四川。	本品生南海 人家園圃中 ，春開白花 結莢枝間， 其枝纒纒如 綴珠，若大 紅豆而扁， 皮紅肉白， 以似得名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
381.	合 歡 (本草35) 別名： 合 昏， 夜 合， 青 裳， 萌 葛， 烏 賴 樹。	Albizzi- ju fibriss- in, Dur. (Acacia J., Willd.) (Mimosa Kalkora, Roxb.)	皮	Saponin Tannin 9%	1) 樹皮爲煎劑，有驅蟲、強壯、興奮、利尿作用。 2) 浸膏外用，治打撲、骨折、癰疽等症。	江蘇，河北，湖北，福建。	賴之庭除，使人不忿，故稱合歡，其葉至暮即合，亦云合昏。
382.	刺 蜜 (本草33) 別名： 草 蜜， 給 敦 羅。	Alhagi maurorum Medic. Derv. (A. mann- iferum.) (A. camel- orum.) Desv. (Hedysar- um a., L.) 波斯語 Faranjab- in.		Sugar 36%, Melecitose Mannite.	治骨蒸發熱，寒咳暴刺，下血開胃，止渴除煩。	西亞細亞及新疆吐魯番。	李延壽北史云，高昌(即交河今新疆吐魯番縣)有草，名羊刺，其上生蜜，味甚甘美，胡人名爲給敦羅。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
383.	落花生 (遺拾7)	Arachis hypogaea I.	種子	Protein 42%, (Conavachin.) Fatty oil 40--50%, (Arachidic acid, Palmitic acid, Oleic acid, Linolenic acid, Lignoceric acid), Vits. B, E. Lecithin Cu...0.677 mgm% Arachin, Adenin Arginin, Betain Cholin. (食植)	1) 種子供食用。 2) 落花生油，為食用，點燈用，肥皂原料及減摩擦用。又為洋橄欖油之代用品及人造白塔油之原料。	本品之原產地為南美洲，今各處均有。	本品因花謝後，子房入於地中生長而結果實，故名。 日本藥局方採用落花生油。 【新藥】 Ophthalmol.
384.	黃耆 (本草12)	Astragalus Hoantchy, Franch. (A. reflex- istipulus, Miq.)	根 (地下莖)		1) 內服為止汗劑，有閉塞皮膚分泌孔作用，治發汗過多，肺結核症之盜汗及制止汗之分泌(含有膽汁色素者)。 2) 促水腫及癰疽瘡等毒素之排出等。 一次量 0.5—1.0— 7.0gm	山西，四川，河北，東北各省。	耆長也，黃耆色黃，為補藥之長，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
385.	蘇枋木 (本草33) 別名： 蘇木	CaesiaIpin- ia Sappan. L.	木	Sappanin, Brasilin, Ess. oil, Ash 0.52%, CaO,	1) 治產後之眩 暈、月經變 調、腸炎、 赤痢、打撲 症。 一次量 3—10gm 2) 爲染料用。	廣東，廣西， 暹羅，緬甸。 (印度原產)	本草載，海 島有蘇枋國 ，其地產此 木，故名。 省呼爲蘇木 ，用染綠色 。
386.	雲 實 (本草17) 別名： 買 實， 雲 英， 天 豆， 馬 豆， 羊石子。	C. sepiaria Roxb. (C. japon- ica, S. & Z.)	根 子 花		1) 種子治瘧疾 、間歇熱等 症。 2) 治赤痢。 3) 爲寄生蟲之 驅除用。	浙江，江西， 湖北，陝西， 河北。	
387.	山豆根 (本草18) 解 毒， 黃 結， 中 藥。	Cajanus indicus, spr. (C. flavus DC.) (Cytisus C. willd.) (Euchres- ta japonica Benth.)	根	Matrin. Cytisin (alk.)	山豆根之乾燥 者，治扁桃腺 等咽喉病用（ 取其一片，含 於口中，將其 汁嚥下，療咽 喉之腫脹）， 又緩解諸瘡之 疼痛。 一次量 1—3gm	廣東，廣西， 四川。	印度語： Dahl 馬來語： Cācang

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
388.	刀 豆 (本草24) 別名： 挾劍豆	Canavalia ensiformis DC. (<i>C. gladiata</i> , DC.)	莢	Protein... ...19.28%, Fat 2.64%, Cbhyd.....	1)為滋養強壯劑。 2)刀豆煎湯，為病後衰弱之恢復用。	廣西	以莢形命名也。
				(成分續) ...54.11%, Pentosan...6.46%, Canavalin, Concanavalin, Lecithin, Phytosterine, Cystine, Thyrosin, Amylase, Allantoinase, Catalase, Lipase, Pectase, Peroxydase, Tryptophane, Urease. (本新, 食植)			
389.	阿 勃 勒 (本草31) 別名： 婆羅門皂 莢，波斯 皂莢， 阿 黎， 清瀉山扁 豆。	Cassia Fistula, L. (印度語： Amaltus)	果 實	Pectin, Anthra- quinone, Citric acid Sugars, Tannin.	為清瀉劑，劑量一次4—8gm。	埃及，東印度，婆羅門，波斯，西印度，南非洲，南美洲。	本草載生拂林國(東羅馬帝國君士但丁堡)爾(Consantinople)
390.	注 芒 (拾遺) 別名： 决 明。	<i>C. mimosoides</i> , L. (<i>C. procumbens</i> Lour.) (<i>C. sensitiva</i> , Roxb.) <i>Lathyrus Davidii</i> , Hce.	子		1)為利尿劑，治腎臟炎。劑量一次15—30gm 2)為健胃劑，代茶用。又有化痰止咳之功。	山野道旁間。	注芒莢藥甘美而滑，可作酒麴，嫩時採以為蔬，及點茶食，約甚香美。(醫典)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
391.	望江南 (救荒本草)	Cassia occident- alis, L.) (C. sophera, L.) (C. torosa, Cav.)		種子含 Emodin, Tannin, Fatty oil, Ess. oil Schleim, Mucilage, Toxalbum- in, 葉含 Oxymethyl- anthquin- on glycoside.	1) 種子內服， 治下痢腹痛。 。 2) 葉莖之絞汁， 治毒蛇及 瘰癧之螫傷。 。	福建，杭州笕橋，(原產地) 熱帶亞細亞。	Occiden- talis, 爲西 方之意。
392.	決 明 (本草16)	Cassia Tora, L. (C. obtusi- folia, L.) 印度語： Tora	子	Emodin. (Glucosid) Phytoste- rine, Glucosen- nin.	內服治綠內障、 結膜炎、膿 漏眼等，并減 輕其疼痛。 一次量 2—4gm 搗碎貼布毒虫 之螫傷。	廣東，陝西西 安，台灣，琉 球(南亞細亞 原產)	以明目之功 而名。
393.	紫 荊 (本草36) 別名： 紫 珠	Cercis chinensis, Bge.	木 及 皮		爲清血劑，解 毒劑，消腫劑。 。	湖北，河北， 江蘇，浙江。	其木似黃荊 而色紫，故 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
394.	薰 草 (本草14)	Coumarou- na 別名： 佩 蘭， 零陵香， 香 草， 燕 草， 薰 草， 黃零草。	全草	Ess. oil	1) 治傳染性熱 性病、頭痛、 、牙痛、胃 痛、鼻茸、 腰腎痛結石 等。 一次量 1—4gm 2) 爲香料用。 3) 爲救荒食物	河北，江蘇， 江西，廣東。 (歐洲原產)	古者煨香草 以降神，故 曰薰。
395.	檀 (本草35)	Dalbergia hupeana, 別名： 黃 檀， 望水檀， 不知春。	皮， 根， 皮		皮和榆皮爲粉 食，可斷穀救 荒。 根皮塗瘡疥， 殺蟲。	四川，湖北， 河南，山東， 江蘇，安徽， 江西，浙江， 福建，廣東， 雲南，貴州， 印度。	檀善木也， 其字從賣， 以此賣者善 也。 檀有黃檀紫 檀白檀三大 類。 本條之檀， 專指黃檀而 言。
		黃檀有普 通黃檀， 雲南黃檀 ，兩粵黃 檀，橫對 黃檀，紫 黃檀，花 黃檀，藤 黃檀，小 黃檀，南 嶺黃檀， 印度黃檀 等九種。					

號	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
396.	<p>藟 豆 (本草24)</p> <p>別名： 沿籬豆， 蛾眉豆， 扁 豆， 鵲 豆， 藤 豆， 千石豆。</p>	<p>Dolichos Lablab L. (Lablab rularis, Savi.)</p>	莢	<p>Protein 23%, Fat 1.8%, Ash 3.5%, Allantoinase, Emulsin, HCN. Vit. C₁ (本新)</p>	<p>1) 治霍亂、中暑、吐瀉及魚介獸肉之中毒。 一次量 1—3gm 2) 子粒幼嫩時，連莢食之。</p>	湖北，廣東。	<p>藟本作扁，莢形扁也，沿籬蔓延也。</p>
397.	<p>檇 豆 (本草24)</p> <p>別名： 黑小豆</p>	<p>Dumasia truncata, S. et Z.</p>	莢		<p>婦人產後冷血，炒此豆令焦黑，服之有效。</p>		<p>檇乃自生稻名也，此豆原是野生，故名。</p>
38.	<p>海 桐 (本草35)</p> <p>別名： 刺 桐</p>	<p>Erythrina indica. Lam.</p>	皮	Alkaloids	<p>皮治霍亂，赤白痢，疥癬及牙痛。</p>	南方各省。	<p>生南海山谷中，樹似桐而皮黃白色有刺，故以名之。</p>
399.	<p>解 毒 子 (本草18)</p> <p>別名： 地不容， 苦藥子。</p>	<p>Euchresta japonica, Bth.</p>	根		<p>解 蠱 毒，辟 瘴 癘，退目赤，消痰降火，治咽喉腫痛。</p>	四川	<p>本品能解一切毒故名。</p>

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
400.	格 注 草 (本草17)	Gleditschia glauca HK.	根 莖		治 濕 虛 諸 痔 瘡 痛 等。	山 東	有 毒
401.	皂 莢 (本草35) 別名： 皂 角， 鷓 鴒 子， 烏 屎， 懸 刀。	G.sinensis Lam. (G. horrida, Makino.) (G. japonica, Miq.)	莢 及 刺	Gledit-saponin C ₅₉ H ₁₀₀ O ₂₀ Arabinose 【藥理】皂莢之鹼皂素(Saponin)對山羊白血球之溶血作用為 75000 倍。	皂莢為祛痰鎮咳利尿藥，又治淋疾，皂角刺治療癰及惡瘡。	浙 江，江 蘇， 北 京，南 方 各 省。	Gleditschia 為德國醫學者兼植物學者 Toh Theod Gleditsch 之名，Horrida 為多量銳針之意。
402.	大 豆 (本草24) 別名： 烏 豆， 黑 大 豆， 菽，未。	Glycine Soja Benth (Soja hispida, Moech.) (Dolichos Soja, L. Var. nigra.)		大豆藥含 Ca ₃ (PO ₄) ₂ Fat 3-6%, Amylase, urease. 黑豆之色素，為 Kuro-marnin, (分解為 Cyanidin-chloride)	大豆為重要營養品，可製豆粉豆腐，醬油等；又可榨油及工藝用。油粕可充肥料及家畜之飼料用。	栽 培 品。 產 於 非 洲 及 亞 洲，我 國 東 北 最 盛。	豆 未 皆 莢 殼 之 總 稱 也， 篆 文 未 象 莢 生 附 莖 下 垂 之 形，豆 象 子 在 莢 中 之 形。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

(成分續) 黑豆中含 Fat 16—23%, Protein 36—43%, Carbohydrate 16.2—23.9%, Ash 4.80—5.13% (內含0.03%之 MnO 及 0.084%之 TiO₂), 又乾燥物 1 kg 中, 含 Cu 12.156 mg, Vit B (大豆含相當多量), A (含於胚部中), Cane sugar (在含水炭成分中占 40%), Pentosan 4%, Methylpentosan 1.527%, Arabinose, Galactose, Maltose, Stachyose, (以上為含水炭成分), Lignin (含於大豆粒與莢連絡部分, 即蔽於胚芽背面之一小部分), Saponin (大豆含兩種肥皂素, 均不呈溶血作用) Adenin, Arginin, Choline, Histidin, Trigonellin, Kreatinin,

(以上六種, 為大豆中含氮之有機鹽基)

Imidazolylethylamine (含於腐敗之大豆中),

Glycinin, Glutelin, Legumelin (以上三者, 為大豆中之蛋白質),

Valine, Leucin, Phenylalanine, Lysin, Glutamic acid,

Aspartic acid (以上數種, 為蛋白質中之氨基酸),

β-Oxy glutamic acid (含於大豆蛋白質分解物中),

Phytosterine (一名 Sojasterol, 由此可再分離為 Dihydrostosterin 及 Soja r-Sitosterine),

Stigmastereine, Lecithin, Kephalin (由壓搾豆粕中, 可得 0.56%),

Allantoin, Genistein (gl), Phloroglucin, Isoflavon, Mg Lactate,

Diastase, Allantoinase, Urease (以上三種酵素, 存於大豆種子中),

Lipase, Phosphatase, Invertase, Uricase, Protease,

Lactase, maltoglucose (以上各種酵素, 含於發芽之大豆中)。(食植)

402.	大豆黃卷 (本草24)	Bean Sprouts 別名: Black 豆 藥 Variety		Protein 9.1%, Fat 1.6%, Vits A ₁ , E ₂ , C ₂ . Asparagin Choline Xanthine Hypoxan- thine Urea	治溼痺、筋癱、 、膝痛, 除胃 中積熱, 療水 病滿脹。		黑大豆, 為 藥芽生五寸, 甚便, 乾 名為黃卷, 熬過服食所 須。
------	----------------	---	--	--	---------------------------------------	--	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
402. b.	大豆豉 (本草25)	Bean velish Black variety		Protein 18.9% Fat 6.7% Cbhyd 24% Ash 18.3%	1) 爲調味劑。 2) 解瘧氣煩躁，治牲畜胎毒。 3) 蒸末，可止盜汗。	波出襄陽錢塘者，香美而濃。	劉熙云，豉嗜也，調和五味，可甘甜也，許慎謂豉，爲配鹽幽菽，乃鹹者豉也。
402. c.	豆 黃 (本草25)	Bean ferment Black variety		Protein 18.9% Fat 10.1% Cbhyd 1.5% Ash 22.5%	爲強壯劑，能健脾胃，使人肥潤，體肥有氣力。	蒲州豉味鹹，陝州豉汁淡而味佳。	用黑豆蒸熟，舖席上，以蒿覆之，待上黃，取出晒乾，搗末用之。
403.	黃大豆 (本草24) 別名： 毛 豆	Glycine soja, S. et Z. Var. flava.	莢， 油	Protein 38.45(8.5)% Fat 19.29(3.2)% Cbhyd 21.55(4.6)% Ash 4.59% (新鮮品 Ash...1% 內含 Cu...0.95 mgm%)	1) 黃大豆可炒食，又爲榨油製豆腐造醬用。 2) 利大腸，消水腫，治痘後生瘡。		括弧外數字，爲乾燥品之%，括弧內爲新鮮品之% (中藥誌，本新)。
403. a.	豆 油 (本草24)	Soybean oil		Lecithin Ketone Vit. E, Sterins, Palmitin 15%, Olein 56%, Linolein 19%, Arachidic acid, Linolenic acid 5% (本新)	1) 爲調味品。 2) 塗瘡疥用。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
403. b.	醬 油	Soybean sauce yellow variety		濃厚品： Protein 3.8% Cbhyd 20.4% 稀薄品： Protein 2.4% Cbhyd 20.1%	1) 爲菜蔬調味 用。 2) 治魚肉菜蔬 蕈毒。		
403. c.	醬 (本草25)	Soybean Paste		濃厚品： Protein 14.2% Fat 5.2% 稀薄品： Protein 9.7% Fat 2.8%	1) 爲菜蔬調味 及增加香氣 用。 2) 治魚肉菜蔬 蕈毒。		醬者，將能 制食物之毒 ，如將之平 暴卒也。
403. d.	豆 腐 (本草25)	Bean curd yellow variety		Protein 8.4% Fat 3% Cbhyd 1.3% Ash 0.9% Vit Bo Arginine Histidine Lysine	1) 爲滋養品， 作菜蔬用。 2) 治赤眼腫痛 。		豆腐之法， 始於漢淮南 王劉安，凡 黑白黃綠泥 豌豆各豆，皆 可爲之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
404.	白 豆 (本草24) 別名： 飯 豆	Glycine soja, S. et Z. Var. alba		Protein 41.6% Fat 16—20% Cbhyd 20—25.8% Ash 4.7% Genistein, Glycinin 4%, Arginine 12.7%, Histidine 5.8%, Lysine 5.8%, (本新)	作醬作腐用。		飯豆，小豆 之白者也。
405.	甘 草 (本草12) 別名： 蜜 甘， 蜜 草， 美 草， 蔞 草， 蔞 通， 國 老。	Glycyrrhi- za glabra, L. (西 班牙甘草) G. glabra, L. Var. glandulif- era Regel, et Herder (中國甘草) G. echina- ta L. (蘇聯甘草) G. uralen- sis, Fisch, G. palladi- flora, Maxim.	根	Glycyrrhi- zin, Glucuronic acid, Mannite, Asparagin Glucose, Protein, Sacchara- se, Urease, Resin, Ca, Mg, NH ₄ .	1) 爲緩下鎮咳 祛痰藥， 一次量 4—8gm, 2) 爲矯味及丸 劑賦形藥。 3) 爲解毒藥 (解 馬肉菌毒、 竹筴等毒)。	華北，蒙古， 西班牙，蘇聯 南部，意大利 ，匈牙利。 【藥典及準藥 典製劑】甘草 ，甘草浸膏， 甘草素，複方 甘草散，亞砒 酸丸，古加藥 喇叭丸，木鱉 油丸，炭酸木 鱉油丸，炭酸 癒創木酚丸， 樹膠散，複方 加那砒劑，亞 細亞丸，硫酸 阿託品丸，水 楊酸水銀丸， 魚石脂丸，複 方木鱉油丸， 大風子丸。 【新藥】Glabin	本品味甘， 故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
406.	肥皂莢 (本草33)	Gymnocladus chinensis, Baill. (Gleditsia horrida Makino.)	果實 種子	Saponin, Fatty oil Dialose (本新)	爲祛痰劑，利尿劑，治淋疾。 ○ 一次量 2—6gm (爲丸散) 又爲浴湯劑，(石鹼代用)。	處處有之。	【新藥】 Tusoin Exorin (祛痰劑)
407.	小 青 (本草15) 馬 藍	Indigofera tinctoria L. (Polygonum tinctorium Lour.) (Isatis tinctoria L.)	葉	Indican, gl. Enzymes, Cytase, Indoxylase Fe (本新)	生痔瘻癰腫、瘡癤，治血痢、腹痛；研汁服，解蛇毒。	山東，江蘇，湖北，四川，福建。	
407. a.	藍 澱 (本草16)	Indigo.		Indigotin	1)爲解毒劑，治熱瘡、疥瘡、止血殺蟲。 2)爲染料用。		澱，其滓澄澱在下也，澄去水，則可得青藍色沈澱。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
497. b.	青 黛 (本草16) 別名： 靛 花	Blue cosmetic,		Indigo residues	1) 爲解毒劑， 傳熱瘡、惡 瘡，治蛇犬 等毒。 2) 爲染料用。	山西太原，江 西南康。	黛眉色也， 減去眉毛， 以此代之， 故謂之黛。
408.	百 脈 根 (本草12)	Lotus cornicul- atus. L.	根 草	HCN. Glucoside, Urease. Linamar- in. (本新)	爲清涼劑，止 咳劑。	甘肅，四川， 湖北。	
409.	苜 蓿 (本草27) 別名： 木 粟， 光風草。	Medicago denticu- lata willd. (<i>M. sativa</i> L.)		Vits, A ₂ , B ₁ , C ₅ , E ₃ , K, P.otein 3%, Fat 0.3%, Arginin, Cystin, Histidin, Leucin, Lysine, Phenylal- anin, Serin, Tyrosin, Valine.	1) 爲蔬菜用。 2) 爲牧草，作 牛馬之飼料 用。 3) 搗汁煎飲， 治沙石淋痛 。	苜蓿原出大宛 ，漢使張騫， 帶歸中國，然 今處處田野有 之。	苜蓿，郭璞 作牧宿，謂 其宿根自生 ，可飼牧牛 馬也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
410.	黎 豆 (本草24) 名別： 狸 豆， 虎 豆。	<i>Mucuna capitata</i> W. et A.	豆	Fatty oil 2%， Mucunine (本新)	滋養品。	南方各省。	豆子作狸首文，故名。
411.	血 藤 (圖經)	<i>M. ferruginea matsum.</i>	根		攻血，治氣塊及慢性盲腸炎。	江西，福建邵武、長汀。	
412.	綠 豆 (本草24) 附： 綠豆芽	<i>Phaseolus Mungo, L. var. radiatus</i> Bak.	莢	Protein 22—24% Fat 1.5—2.2%	解食物及瘡瘡之毒，去浮腫。	栽培品。	綠以色名也，砒中毒時，以綠豆泥鷄子清和黑豆之煎汁解之。

(成分續) Cbhyd 57%， Ash 4% (Cu 0.83mg%)， Vits, A₁, B₂, Saponin, 炭水化物之成分為 Pentosan 5.27%， Galactan 1.03%， Dextrin 3.40%， Amyl 57.00%，

酵素之成分為 Nucrease, Urease, Desamitase, Diastase, Invertase, 綠豆根含 Aseo saponin, 莢含 Etepsin.

綠豆芽之普通成分，為乾燥分 36.78%，蛋白質 2.50%，脂肪 0.15%，炭水化物 3.18%，灰分 0.32%；炭水化物中各成分之含量，為 Amyl 0.15%，Glucose 0.77%，Pentose 0.02%，Cellulose 0.83%，有機鹽基及蛋白質之成分，為 Adenin, Arginin, Choline, Lysin, Leucin, Iso-Leucin, Valin, Alanin, Hypoxanthin, Proline, Aspartic acid, Glutamic acid.

維生素為 Vits A, B₂, C. (中藥誌，上海食物，食植，本新)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
413.	赤小豆 (本草24) 別名： 赤豆， 紅豆， 答。	P. Mungo, L. var. subtrilob- ata, Fr. et Sav.	英	赤小豆之普通成分： Protein 19—21% Fat 0.76—1.19% —1.19%	赤豆治脚氣，消腫利尿。 赤豆粉爲洗粉用，汁去煩熱、止小便，芽治漏胎、傷胎。	江蘇，浙江，河南。	此豆以緊小而赤點色者入藥。
<p>(成分續) Cbhyd 56—57%， Ash 3.0—3.43%， Vit B₂, E, 赤小豆之特殊成分：含鹼皂體三種 Saponin I (針狀結晶，熔點 203°C) Saponin II (鱗片狀結晶，熔點 196°C)， Saponin III (板狀結晶，熔點 201°C)；所含有機鹼基之成分： Adenin, Trigonellin, Cholin. Allantoin, Kræatinin. 所含蛋白質之成分： Arginin, Histidin, Lysin. Tyrosin. 又類蛋白質： Phaseolin. 其無機成分，在灰分中檢出 Al，又由乾燥物 1kg 中，得 5.85mg 之 Cu。 (中藥誌) (食植)</p>							
414.	豌豆 (本草24) 別名： 胡豆， 戎菽， 回鶻豆， 回回豆， 青小豆， 青斑豆， 麻豆。	Pisum sativum, L. var. Arvense Poir.	英	豌豆之普通成分，其乾燥物： Protein 21—25% Fat 1—2% Cbhyd 55—58%	作醬及醬油之原料。	原產埃及。	其苗柔弱宛宛，故得豌豆名，種出胡戎回鶻，嫩時青色，老則斑麻，故名，有胡戎、回回、青斑、麻累諸名。
<p>(成分續) Vits, A₂, B₂, C₃. Ash 2.3—3.2%， (灰分中含 0.268% 之 Al)，又乾燥物中，含 11—52.91mgm% 之 Cu。 其特殊成分爲 Lecithin (乾燥物中含 1.05%，粗脂肪中含 27.37%)， Cholesterin, Betaine, Trigonelline. Choline, Adenine, Lysine, Erepsin, Leucine, Arginine, Triptophane, Phytin, Vernin, Asparagine, Glutamin, Allantoinase, Urea, Pepsin, Trypsin, Amylase, Maltase, Catalase, Lipase, Nuclease, Phosphatase, Saccharase, Urease. (本新) (食植)</p>							

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
415.	補骨脂 (本草14) 別名： 破故紙， 婆固脂， 胡韭子。	<i>Psoralea corylifolia</i> , L. 印度語： Babchi 梵言： Vakuchi	子	Fatty oil 20% Ess. oil Alkaloide Glucoside Resin 9.2%	為強壯劑，治衰弱症、腰痛、遺尿及腸結核症之下痢。 一次量 1.5—3gm	四川，廣東。	補骨脂，言其功也，胡人評為婆固脂，胡韭子，因其子之狀相似，非胡地之韭子也。
416.	檀 香 (本草34) 別名： 旃 檀， 真 檀， 紫 檀。	<i>Pterocarpus indicus</i> , Willd. (<i>P. santalinus</i> , L. f.)	木 部	Santalin 16%, Pigment, (紫檀酸) <i>Pterocarpin</i> , Santal, Homoptero carpin, Ash 1—2%	為鎮痛及止血劑，治諸瘡及創面，取其粉末為撒布劑，或為泥狀貼布之。 又為紫檀酊之原料，在工業上為貴重之木材。	雲南，江蘇，印度南部，土耳其斯坦。	釋氏呼為旃檀，以為湯沐，猶言離垢也。 番人訛為真檀，雲南人呼紫檀為勝沉香，即赤檀也。 本品之新者色紅，舊者色紫，有蟹爪文，新者以水浸之，可染物，真者揩壁上色紫，故有紫檀色之稱。
417.	欄 木 (本草35) 別名： 花欄木	<i>Pterocarpus indicus</i> , Willd. (<i>P. flavus</i> , Lour.)	木		1) 治產後惡露衝心。 2) 木材可作床几器皿扇骨。	廣東，安南。	木性堅，紫紅色，亦有花紋者，謂之花欄木，俗作花梨誤矣。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
418.	葛 (本草18) 別名： 雞齊， 鹿藿， 黃斤。	<i>Pueraria hirsuta</i> , Schneid. Br. (<i>P. thunbergiana</i> , Bth.) (<i>Pachyphizus</i> , T., S. & Z.)	葉 根	Glutamic acid, Campherol (gl.) Asparagin Butyric acid, Adenine, Histidine. (黃色結晶性物質，熔點 185°C) Starch	葛根爲發汗解熱之要藥。 又用於熱性病，醫口渴，去嘔氣及頭痛。 一次量 1.5—5gm	山東，河北， 湖北，浙江， 江西，廣東。	葛從曷，諧聲也。
419.	榼藤子 (本草18) 別名： 象豆， 榼子， 合子。	<i>Pursaetha scandens</i> , O. ktze. (<i>Entada s.</i> , Bth.) (<i>Mimosa S.</i> , Roxb.)	子	Soponin Glucoside Alkaloid Raffinose	治喉腫及痔瘡出血。	廣東	其子象榼形，故名。
420.	鹿藿 (本草27) 別名： 鹿豆， 豈豆， 野綠豆。	<i>Rhynchosia volubilis</i> , Lour.	莢		治蠱毒，女子腰腹痛，腸癰瘍氣，頸淋巴腺結核，井止頭痛。	江蘇，江西， 湖北，廣東。	豆葉曰藿，鹿喜食之，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
421.	苦 參 (本草13) 別名： 苦 蕒， 苦 骨， 地 槐， 水 槐， 菟 槐， 驕 槐， 野 槐， 白 蜜。	Sophora flavescens Ait. (S.amara, Lour.) (S. angus tifolia, S. & Z.) (S. Kronic Hcc.) (S.galego- ides, Pall.) (S.sororia lce.)		根： Matrine, (A'koloide) 種子： Cytisin, (Sophonin) Fatty oil	健胃劑及蠅虫 驅除藥， 一次量 5—15gm 【藥理】 Matrin，對家 兔之致死量， 體重 1kgm， 用 0.4gm，初 大 腦 麻 痺，次 癱 瘓，中 樞 興 奮，發 強 癱 瘓， 遂 起 橫 膈 膜 及 呼 吸 運 動 神 經 末 梢 之 麻 痺 而 斃。	原產地西伯利 亞，今處處有 之。	苦參味苦之 意， Sophora， 山亞拉伯語 Sophora 轉變而來， angustifo- lia，為狹葉 之意。
422.	槐 (本草35) 別名： 櫟	S.japonica L. (Styplnol- obium j., Schott.) Mimosa cornicul- ata, Lour.		果實： Sophorin (gl), Quercetin, Rutin, Rhamnose Rhamnini- ose, 葉： Cathartin, Rutin, 花： Yellcorv dye, 皮： Amylase 莖： Amylate, Cytisin, Urea.	果實治痔疾， 花為止血劑， 治頭血、咯血 、腸及膀胱出 血。 劑量一次 8gm	福建邵武及各 地。	吳澄註云， 槐之言懷也 ，懷來人於 此也。 春秋元命包 云，槐之言 歸也，古者 樹槐聽訟其 下，使情歸 實也。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
423.	羅望子 (本草31)	Tamarindus indicus, L. (T. officinalis, Hook.)	種子	Arachidic acid, Tannin, Fatty oil 5%, Protein 14%, Cbhyd 63%, Ash 2.5%, (本新)	治熱病，下痰，通經絡，療小兒疳病。	廣西，(非洲熱帶原產)。	
424.	胡蘆巴 (本草15) 別名： 苦豆	Trigonella foenum-græcum, L.	種子	種子： Mucilage 28%, Protein 22%, Fatty oil 6%, Ash 4%, Lecithin, Choline, Trigonelline, Phytosterine, Saponin, Mannose, Galactose. (本新)	1) 爲滋養緩和劑。 2) 適用於健胃、驅風、腎臟病、陰囊水腫、脫陽、下腹諸症。		本品出歐洲南部，小亞細亞，埃及，船客將種蒔於嶺外，今粵點均有，然不及舶來者之優。所謂胡蘆巴者，係由諸外邦傳來之蘆蕪子也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
425.	蠶 豆 (本草24) 別名： 胡 豆	<i>Vicia Faba</i> , L. (<i>Faba sativa</i> Var. <i>equina</i> , Pers.)	莢	Protein 8.76-29.44%, Fat 0.46—1.81%, Cbhyd.....13.78—27.55%,	治水腫、脚氣、快胃，和臟腑。	南方及西方各省。	此豆蠶時始熟，其豆莢狀似老蠶，故名蠶豆，(李時珍)。張騫使外國，得胡豆種歸，指此也。今蜀人呼此為胡豆，(太平御覽)。

(成分續) Ash...1.3—3.16% (以上%最少數為新鮮品，最多數為乾燥品) 乾燥品中含有 0.8mg.n% 之 Cu 又 Pb 少許，Vitamine B (新鮮品中含量甚富)。

Vicine (Alk), Convicine, Vernin, Phasin, Phytin, Lecithin, Phytosterin, Pentose, Galactose, Arabinose, Inosite, Arginine, Betaine, Cholinæ, Guanine, Trigoneline. (上食，本新，食植)

426.	薇 (本草27) 別名： 垂 水， 野碗豆， 大巢菜。	<i>V. gigantea</i> Bge.	草		為利尿劑，去浮腫，利大小腸。	四川，湖北。	許氏說文云，薇似藿，乃菜之微者也，王安石說云，微賤所食，因謂之微。
427.	翹 搖 (草成27) 別名： 搖 車， 野蠶豆， 小巢菜。	<i>V. hirsuta</i> Koch. (<i>Ervum h.</i> , L.)	莢	Fat 0.7% Ash 3.24% N subst 27% HCN enzyme, Vicianinase, Allantoinase. (本新)	為清血劑。	江蘇，江西，四川。	翹搖，言其莖葉柔婉，有翹然飄搖之狀，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
428.	白 莢 菜 (本草16)	V. sp.	子		爲強壯劑，治陝西西安。 泄精、腰痛， 補腎。 又爲通經藥， 治月經不通， 催生下衣。		
429.	豇 豆 (本草24) 別名： . 豨， 躑。	Vigna sinensis Hassk (V. catjan- g, Miq.) (Dalichos s., L.) (D. catian- g, L.)	莢	Protein... 22—23.8 7%, Fat 2.2%, Cbhyd 49—58%, Ash.....3.5%,	健胃補腎，生 精止渴，解 毒。 但水腫者忌 腎，不宜多食	此豆處處有之	此豆紅色居 多，莢必雙 生，故有豨 、躑、躑之 名。
(成分續) (Cu.....0.7mgm%)							
Vigine, Phaseolin, Vits, A ₂ , B ₂ , C ₂ ,							
豇豆之色素：豇豆和水煮沸，濾過，得紫黑色之溶液，以洋紙浸此液中染之，風乾後，得灰鼠色之紙，逢酸變赤色，已變赤色者，逢鹼變灰鼠色，終退色，惟此色素之特性，尙未明瞭。(邦藥)							
430.	紫 藤 (本草18)	Wistaria chinensis. DC. (W. florib- unda, DC) (W. multi- juga, V.H.) (Kraunhia floribunda Lunb. var typica Makino.) (Glycine sinensis Sims.)	子	Wistarín, Resin. (本新)	根爲煎劑，治 水腫病。 子實對酒，有 防腐作用。		開紫色花， 故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
431.	黃 環 (本草18) 別名： 凌 泉， 就 葛， 大 就， 生 芻， 根 藟。	W.chirensis DC.	根		爲祛痰鎮咳劑，利尿劑。	四川	此物葉圓而色黃，故名。
432.	預知子 (本草18) 別名： 聖知子， 聖先子， 盍合子， 仙沼子。	Unidentified.	子仁 根		殺蟲療癩，治諸毒，塗一切蛇蟲咬傷。	四川，貴州。	相傳取子二枚，綴衣領上遇有蟲毒，則聞其有聲，當預知之，故有諸名。
433.	豬 腰 子 (本草35)	Unidentified.	莢		治一切瘡毒及毒箭傷，研細，取3—6gm，浸酒服之，并塗布之。	廣西柳州。	本品蔓生結莢，內子色紫而肉堅，大若豬之內腎，狀酷似之，故名。

第七十六 薔薇科 ROSACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
434.	龍芽草 (救荒本草) 別名：石打穿，仙鶴草。	<i>Agrimonia pilosa</i> , Ledeb. (<i>A. japonica</i> , Koidz.)	全草	Ess. oil fannin. <i>Agrimoni-</i> <i>ne.</i>	1) 爲收斂劑， 治細菌性赤痢 及肝臟、脾臟 、膿瘍等症。 2) 爲止血劑。 一次量 1.0gm	自生於山野， 福建特多。	由本品所提 取之仙鶴草 素(<i>Agrim-</i> <i>onine</i>)，爲 動物性止血 劑之要藥， 治外傷出血 、痔血、齒 科出血，子 宮出血等症 。
435.	扶 移 (本草35) 別名：修 楊， 唐 棣， 高 飛， 獨 搖。	<i>Amelanc-</i> <i>hier</i> <i>canaden-</i> <i>sis</i> , Medic, Var. <i>japonica</i> , Miq. (<i>A. asiati-</i> <i>ca</i> , Koch.) (<i>Aronia</i> <i>asiatica</i> , S. & Z.)	皮	HCN	去風血、脚氣 、疼痛、損 血，痛不可忍 ，取白皮火炙 ，酒浸服之， 有效。	南方各省。	移乃白楊同 類，故得楊 名，移楊， 江東呼爲夫 移。
436.	山 糖 (本草30) 別名：赤瓜子， 鼠 糖， 猴 糖， 牙 糖， 杭 糖， 繁 糖， 羊 糖， 常 糖， 山 糖。	<i>Crataegus</i> <i>cuneata</i> , S. & Z. (<i>Mespilus</i> <i>c.</i> , S. & Z.) (a) <i>C. pinn-</i> <i>atifida</i> , Bge. (<i>C. oxyac-</i> <i>antha</i> , L. Var. <i>pinnata</i> , Regel.)	果實 木 葉	Protein 0.7% Fat 0.2% Cbhyd 10% Ash 0.6% Vit. C. Citric acid Pentosan HCN Ca oxalate (木新)	食其果實，可 使肉食消化， 并治疝氣及產 後陣痛(山分 省)。 婉子宮收縮所 起者)。 劑量一次 1-3gm	山東，江蘇， 浙江，湖北， 河北，東北各 省。	山糖味似糖 子，故亦名 糖。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
437.	榲 桲 (本草30)	Cydonia vulgaris, Pers. C.oblonga Mill		果實： Saccharo- se, Malic acid, Tartaric acid, 種子： Amygdal- in, Fatty oil. 葉： Nitrilglyc- oside.	種子爲洗眼及 淋疾之洗滌劑 用。	山東，浙江， 湖北，河北， 東北各省。 (南歐原產)	榲桲性溫而 氣捰，故名 。捰音字，香 氣也。
438.	榲 子 (本草30) 別名： 木 桃， 和圓子。	C. japoni- ca, Pers. (Chaenom- eles, Maulei, Lavall.) (Pyrus j., Thbg. Var. Pygmaea, Max.)	果 實	Mucilage 乾燥品： Pectin 16%, Malic acid 14%, Saccharo- se 9%, Invertsug- ar 35%, Ash 5.6%,	1) 治下痢惡心 及霍亂患者 ，並治脾腸 筋之痙攣。 2) 解暑氣用。 3) 製林檎鐵浸 膏用。	陝西，甘肅。	木瓜酸香而 性脆，木桃 醱澀而多渣 ，故謂之榲 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
439.	木 瓜 (本草30) 別名： 楸	C. sinensis Thouin. (Pyrus cathayen- sis, Heml.) (P. sinen- sis Poir.) (Chaenom- eles s.,)	果 實	Malic acid, Tartaric acid, Citric acid, Vit. C ₁ ,	治腓腸筋之痙 攣及霍亂時所 發之轉筋。 一次量 3—6gm 木瓜酒供飲料 用。	木瓜產南方各 省及波斯。	郭璞註云， 木質如小瓜 ，酢而可食 ，則木瓜之 名，取此義 也。 或云木瓜味 酸，得木之 正氣，故名 。
440.	模 楸 (本草30) 別名： 蠻 楸， 癩 楸， 木 李， 木 梨。	Cydonia sinensis, Thunb. (C. vulga- ris, Pers.) (Pyrus cydonia, L.) (Mespilus germani- ca L. (西洋模楸)	果 實 子	Pectin, Amygdalin Mucilage, Malic acid, Tartaric acid, Boric acid, Arabinose Xylose, Pigment, Fatty oil.	1)果實治肺病 ，有特效。 2)觀賞用。 3)木材製琴瑟 等樂器之胴 部及家具用 。 4)西洋模楸， 製罐頭食品 用。		木李生於吳 越，故鄭樵 通志謂之蠻 楸云，俗呼 爲木梨，則 模楸，蓋蠻 楸之訛也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
441.	枇 杷 (本草30) 別名： 無憂屬	Eriobotrya japonica L. (Mespilus j., Thbg.)		未熟果實： Invert sugar (汁液2.74%)， Saccharose 4.3%， Malic acid 及 Citric acid 2.0%	1) 葉治慢性氣管支炎，對久咳不止者有特效。 一次量 3—5gm 2) 果實製枇杷醬，釀枇杷酒用。		其葉形似琵琶，故名。

(成分續) Tartaric acid,

成熟果實：Invert sugar 6.0%， Saccharose 4.94%， Malic acid 0.6%， Pentosan 0.3%， Pectin 3.3%， Sacch. Eryobotryde. (為新發見之酒精酵母，將來枇杷酒製造業盛行時，為主要之發酵菌)， Peroxydase,

Amylase, Boric acid, (果肉中含 1.2mgm%， 果皮中含 3.7mgm%)。

花：Ess oil (比重 0.9993 有似荷蘭芹之香氣及苦味)。

種子：含 0.1% 以上之 HCN，新鮮之仁，含 0.016% 之 HCN。

葉：Saponin, Saccharose 0.7%。(本新，食植)

442.	蛇 莓 (本草18) 別名： 地 莓， 蠶 莓。	Fragaria indica, Andr. (Duchesneae i., Focke.) (D.fragaroides, Sm.)	汁		1) 草為煎劑，中部各省。有解熱通經之效。 2) 汁傳湯火傷及蛇傷。		近地而生曰地莓，蠶老時熟紅於地，其中空者為蠶莓，中實植紅者為蛇莓。
------	--------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
442.	水楊梅 (本草16) 地 椒	Geum japonic- um. Th.	草	Gein (分解爲 Eugenol) (綜植)	1)用根莖之煎 汁，治疔瘡 腫毒。 2)爲利尿劑。		生水邊，條 葉甚多，生 子如楊梅狀 ，故名。
444.	不凋木 (本草36)	Osteome- les anthyllid- ifolia, Lindl. Var. Subrotun- da, Koidz.	木		爲強壯劑。	陝西	本品四時不 凋，故名。
445.	醋 林 子 (本草32)	Photinia glabra, Maxim (Crataeg- us g., Th.) (Mespilus g., Colla.)	果 子		果實爲收斂劑 ，治久痢及痔 漏下血。 以鹽醋藏者， 食之，生津止 渴醒酒。	浙江，福建， 四川。	以味得名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
446.	棠 梨 (本草30) 別名： 甘 棠， 杜。	(a)Pirus betuliac- folia, Bge. (b)P. bac- cata, L. (P. bacca- ta, L. Var. Mandsch- urica, Max.) (P.toringo- sieb.)	果 實	樹皮： Toringin, Pirus- Quercetin (日藥誌)	1)果實為消化劑，收斂劑。 2)樹皮汁，為黃色染料，供紙絹錦之染色及食品之着色用。	浙江，甘肅，湖北。	果實經霜後採食，味甘酸甚適口，又採花曬乾，磨粉和麵作燒餅食之。(救荒本草)
447.	鹿 梨 (本草30) 別名： 鼠 梨， 山 梨， 陽 榘， 羅。	P.callery ana. Decne.	果 實 根 皮		果實為食品，根皮治疥癬及一切瘡，煎汁洗之。	山東，江蘇。	
448.	林 檎 (本草30) 來 禽， 文林郎果， 苹果， 蘋 果。	P.malus, L. (Malus pumila, Mill. Var. Domestica Schneid.)	果 實	果實含酸 (Malic acid, Citric acid, Tartaric acid,	為清涼止渴劑，貧血症強壯劑，治小兒消化不良。 粉末苹果：去果皮及心，壓碎低溫乾之，可得十分之一粉末。	山東，河北，朝鮮，日本青森北海道，美國。	此果味甘，能來衆禽於林，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	-----------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Tannic acid), 醣 (Glucose, Fructose, Saccharose, Pentose, Galactose, Sorbit). Pectin, Fat, Vitamin A. B. C. 果肉切後放置時, 成棕色者, 乃 Oxydase 與 Quereitrin 之相互作用, Boric acid, 痕跡之金。

果皮含 Triacontan, Malol, Ess. oil; 皮部葉部含 Phloridzin.

【藥理】1) 林擒汁與剔出家兔腸管之粘膜面作用, 則呈一時性之緊張下降。

2) 注射 Phloridzin 於動物, 能使尿中之糖分增加。

【藥典】林擒鐵浸膏, 林擒鐵酊。

【新藥】Aplona, Pomaton, Gedarmin. (治小兒消化不良)。

449.	<p>柰 (本草30) 別名： 頻 婆</p>	<p>P. malus, L. Var. (tomentosa, Koch. (Malus pumila, Mill., Var. Dulcissima. Koidz.)</p>	<p>果 實 根</p>	<p>與林擒同。 Phloridzin</p>	<p>果實生津止渴 耐飢。</p>	<p>北方各省。</p>	<p>篆文柰字，象子綴於木之形，梵言謂之頻婆，猶云端好也。</p>
450.	<p>梨 (本草30) 別名： 快 果， 果 宗， 玉 乳， 蜜 父。</p>	<p>P. sinensis Lindl. Var. Culta Makino.</p>	<p>果實：</p>	<p>Glucose, Fructose, Sucrose, Malic acid, Tartaric acid,</p>	<p>1) 果實製梨酒及梨醬；糞熟果汁，有鎮咳之效。 2) 梨皮為熊果葉 (Uva ursi) 代用品，有利尿之效。</p>		<p>梨者利也，其性下行流利也。</p>

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(成分續) Citric acid, Tannic acid, Pectin, Sorbit, Asparagin (含於未熟果實中), Glykodrupose (gl.) Boric acid...6mgm%, Vits. A, B, C, Peroxydase, Amylase, Ess. oil (Acetaldehyd, Linarol.) 皮: Arbutin...0.3%, Tannin...3%, Wax(融點 68°C, 綠色, 存於外皮)(食植)。			
451.	海 紅 (本草30)	<i>P. spectabilis</i> Ait. 別名: (Malus spectabilis Bork.) (<i>M. floribunda</i> , Sieb.) (<i>M. microcarpa</i> , Torr.)	果實	Cbhyd 14% Protein 0.1% Fat 0.1% Ash 0.3% Vit. C ₂ . (木新)	果實為收斂劑, 治洩痢。	四川, 湖北, 河北。 東北各省。 南方各省。	凡花木名海者, 皆從海外來, 海紅乃花名, 出新羅國。
452.	探 子 (本草31)	<i>P. sp.</i>	果實		果實生食止痢, 熟和蜜食之, 止嗽。	南方各省。	其實如梨色黃味甘酢而核甚堅。
453.	沙 棠 果 (本草31)	<i>P. sp.</i>	果實		食其實, 可卻水病。	廣東	此果色紅, 味美, 如李而無核。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
454.	狼牙 (本草17) 別名：牙子，狼齒，狼子，犬牙，抱牙，支蘭。	Potentilla cryptotaenia, Maxim.	根		治金瘡出血、膀胱出血、線虫、諸虫、虫瘡、癢痛、毒蛇傷螫。	湖北，中部各省，東北各省。	其牙似狼之齒牙，故名。
455.	翻白草 (本草27) 別名：雞腿根，天藕。	P. discolor Bge. P. formosana, Hce.)	根		有止血解熱之效，治諸出血及間歇熱等。劑量一次2—6gm	生近澤田地，高不盈尺。	翻白以葉之形名，雞腿天藕，以根之味名也。
456.	蛇含 (本草16) 別名：蛇銜，威蛇，小龍牙，紫背龍牙。	P. Kleiniana. Wight. (P. Wallichiana, DC.) (Duchesnea sundiaca, Miq.)	根 葉		1) 治蜈蚣、蛇、蠍虫傷、咬傷。 2) 治金瘡出血。 3) 治風毒癰腫。		按劉敬叔異苑云，有田父見一蛇被傷，一蛇含一草著瘡上，經日，傷蛇乃去，田父因取草治蛇瘡，皆驗，遂名曰蛇銜草。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
457.	巴 旦 杏 (本草29) 八担杏， 忽鹿麻， 苦扁桃， 甘扁桃。	Prunus Amygdal- us stockes. (P.A. stoc -kes Var. Dulcis Mailion.) (Amygda- lus communis L.)	核	Fatty oil 41—57% Protein 16.5% Cbhyd 3% Ash 3% Amygdalin Amandin, Arginine, Formic acid, Glutamic acid, Phytoster in, Emulsin, Asparagin Vicianase, Salicinase Lactase, Manninot- riase, Cytase. (本新，生 藥)	甘巴旦杏種子 供食用，苦巴 旦杏種子，製 巴旦杏油及苦 巴旦杏水為鎮 咳藥及鎮癆藥 用。	苦巴旦杏原產 北方各省(關 西)及小亞細 亞，移植地中 海沿岸，法國 南部，非歐北 部及北美，甘 巴旦杏原出小 亞細亞，移植 南歐法國南部 ，希臘，西班牙， 摩洛哥等 處。	巴旦杏有二 變種，甘者 稱甘巴旦杏 (即甘扁桃))，苦者， 稱苦巴旦杏 (即苦扁桃 小)，藥局採 用巴旦杏油 ，苦巴旦杏 水。
458.	杏 (本草29) 別名： 甜 梅	P.Armen iaca. L.	果實：	Sucrose, Malic acid, Citric acid,	杏仁為鎮咳劑 ，治氣管支及 喘息等。 劑量一次 1—4gm	北方各省，東 北各省。 (蒙古原產)	杏字篆文象 子在木枝之 形。

(成分續) Pentosan, Methyl salicylate, Fectose, Pectin,
Vitamine C, Apricose, Peroxydase, Urease,
β-Carotin, Lycopin. (以上二者為黃色素)。

核仁：Fatty oil 35—50%，Amygdalin, Emulsin. (食植)

【藥典】製杏仁水用，杏仁水為鎮咳鎮癆藥，劑量一次 1—1.5cc.

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
459.	李 (本草29) 別名： 嘉慶子， 麥李， 御李， 冬李， 季春李， 御黃李， 均亭李， 擊李， 饅李。	P. commu- nis, Huds, (F. domes- tica, L.)		花：NH ₃ Isoamyl- amin, 滲出物： Prunose, 根皮： Phloridzin 葉： Amygdalin HCN. 果實： Vit. C ₁ Protein 1%	果實爲食用， 助消化，葉及 核仁，鎮咳用 。花擦面能使 光潔。	處處有之。	李乃木之多 子者，故字 從木子，但 木之多子者 衆矣，何獨 李可稱木子 ，蓋李味酸 屬肝，爲東 方之果，則 李於五果屬 木故得專稱 爾。

(成分續) Cbhyd. 20%, Ash 0.5%, Citric acid, Malic acid,
Glycosuccinic acid, d sorbit, Pectin, Methylsalicylat.

核仁：Fatty oil 31%, Amygdalin, Ess. oil, Emulsin. Allantoinase.

(本新)

460.	郁李 (本草36) 別名： 冀李， 鬱李， 車下李， 符李， 雀棣， 棠棣。	P. japoni- ca, Th. (P. gland- ulosa, Th.) (P. sinens- is, Pers.) (Amygdal- us Pumila, Sims.)	核		種子稱郁李仁 ，爲利尿劑。 治水腫腹水。 劑量一次 2—4gm	中部各省。	郁，山海經 作楛，馥郁 也，花實俱 香，故以名 之。
------	--	---	---	--	---	-------	--

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
461.	梅 (本草29)	Prunus Mume. S. et Z.	果 實	未熟果實含 氰酸有毒。 果實之酸味 , 含枸橼酸 及苹果酸。	爲鎮咳藥嘔解 熱祛痛劑, 又 爲驅虫劑, (由 口中吐出蛔 虫時用之)。		梅從每, 諧 聲也, 又梅 者媒也, 媒 合衆味之意 。 榔梅: 以梅 接在柳上者 , 曰榔梅。
462.	桃 (本草29)	P. Persica, S. et Z. Var. Vulgaris, Maxim. (Amygda- lus persica, L.) (Persica Davidiana, Fr.)	總出物: Peachgum Arabinose Galactose. 莖幹: Gum, Naringon- in, Boric acid 核仁: Eatty oil 45%,	白桃花爲利尿 劑及緩下劑, 治水腫及便秘 。 一次量 3—5gm。 桃仁爲鎮咳劑 , 一次量5gm 葉爲桃葉水 (爲 大葉櫻葉 Folia Pruni. macrophyll- ae 之代用品) 之原料, 治頭 痛霍亂、腹痛 , 一次量 3—6gm; 又煎湯洗浴, 治汗泡濕疹。		桃性早花易 植而子繁, 故字從木兆 , 十億日兆 , 言其多也 。	

(成分續) Amygdalin 3.6%, Emulsin, Ess oil 0.4%, Lactase, Allantoinase.

白桃花: Kaempherol (Albamyricetin), Cumarin.

葉: Amygdalin, Prupersitin, Cumarin, Mg-Ca-oxalate.

樹皮: Naringenin, Triacontan, Pentatriacontan.

果實: Cbhyd 4.8%, Protein 0.7%, Fat 0.1%, Ash 0.3%, Ess. oil, (Acetaldehyde, Linalylformate, Cadinene,) Protopectin, Paraffins, Caprylic acid, Valerianic acid, Malic acid, Citric acid, Peptidase,

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
----	----	-----	------	----	----	----	----

Protease.

【日本準藥典】採用桃仁，白桃花。

【新藥】Persica. (瀉劑)

(木新，食植，綠植)

463.	櫻桃 (本草30) 別名： 蟬桃， 含桃， 荆桃， 朱櫻， 櫻珠， 蠟櫻， 山櫻。	P. pseudo- cerasus, L. Var. Spontanea Maxim.	果實： Sucrose, Pectin, Inosit, Citric acid Malic acid Succinic acid, Furmic acid,	1) 果實新鮮品 或蜜餞煎鹽 藏，或製酒 ，汁、醬、 罐頭等，供 食品用。 2) 葉治蛇咬， 搗汁傅之。	江蘇，浙江， 江西，河北， 東北各省。	本品雖非桃類，因其形似桃，故稱櫻桃。
------	--	--	--	---	---------------------------	--------------------

(成分續) Acetic acid, Amygdalin, Boric acid, Keracyanin (外果皮之紅色素)。

花：Vitamin C.

葉：Cumarin.

核：Ess. oil 0.016%， Fatty oil 30—39%， Benzaldehyde, HCN (含於新鮮核中)， Benzoic acid 0.006—0.064%。(食植)

464.	榿木 (本草35) 別名： 標山	P. spinulosa, S. te Z.	木	Ashed	木為染綠色用 。 葉可釀酒。	南方各省。	此木最硬， 梓人謂之榿 筋木。
------	---------------------------	---------------------------	---	-------	----------------------	-------	-----------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
465.	山 嬰 桃 (本草30) 別名： 朱 桃， 麥 櫻， 英 豆， 李 桃， 梅 桃。	<i>P. tomentosa</i> , Th.	果 實	Protein 0.5% Cbhyd 4.83% Fat 0.16%	實味不佳，但能益脾，止瀉。	河北，甘肅，東北各省。	此嬰桃，俗名李桃，又名奈桃，前節櫻桃，名櫻，非桃也，此物山間有之，故名。
466.	鞋 核 (本草36) 別名： 白 核	<i>P. undulata</i> , Wall.	核 仁		為強壯劑，治眼病。	山西，陝西，甘肅，江蘇。	實大如烏豇，形圓而扁，有文理，似胡桃。
467.	月 季 花 (本草18) 別名： 月 月 紅， 勝 春， 瘦 容， 調 雪 紅。	<i>R. indica</i> , L. (<i>R. se-nepaliflorens</i> Curt.)	花	Ess. oil	活血、消腫、敷毒。	江蘇，福建，(亞洲東南部原產)	本品因逐月開花不結子，故名。
468.	金 櫻 子 (本草36) 別名： 刺 梨 木， 山 石 榴， 山 雞 頭 子。	<i>R. laevigata</i> , Michx. (<i>R. trifoliata</i> , Bosc.) (<i>R. nivea</i> , DC.) (<i>R. hystrix</i> Lindl.) (<i>R. ternata</i> , Poir.)	子 花		子為強壯劑及收斂劑。花治痢、殺蟲，染鬚髮變黑。	南方及中部各省。	金櫻當作金罌，謂其子形如黃罌也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
469.	薔 薇 藤 (本草18)	R. multiflora, Th. 別名: (R. Linkii, Dehn.) 山 棘, 牛 棘, 牛 勒, 刺 花。	種 子 根	Fat 8%, Multi-florin 0.7%, Kampferol Rhamnose Quercetin Glucoside	爲利尿劑及下劑。 劑量一次 10—15gm	湖北, 廣東。	此草蔓柔藤, 依牆而生, 故名。
470.	覆 盆 子 (本草16)	Rubus coreanus 別名: Miq. 葎 蓋, 西國草, 畢楞伽, 木麥莓, 插田蔗, 烏蘆子。	果 實	果實: Citric acid 2%, Sugars, Methylsalicyl, Pectin, Anisaldehyde, Flavene, Malic acid Formic acid, Vit. C ₂ , 藥: Lactic acid, Succinic acid, Emulsin, Mg. Ca. Lactate 1%, K ₂ O 2.9% (本新)	爲強壯劑, 治除萎、身體發溫、營養佳良, 皮膚麗質增加, 排尿量節制。 又製覆盆子糖漿用, 此糖漿有美味及鮮紅色, 種種合劑附加用。	中部及西方各省。	子似覆盆之形, 故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
471.	懸 鈎 子 (本草18) 別名： 沿鈎子， 葫， 山 莓， 木 莓， 樹 莓。	R. palmatus, Th. (a)R. incisus, Th.	果實	Glucose, Fructose, Saccharose, Malic acid, Citric acid, Tartaric acid. (植研)	1) 治痛風。 2) 神經過敏、體弱，服之有效。 3) 外用治丹毒。	江蘇，江西。	莖上有刺如懸鈎，故名。
472.	蓬 蘽 (本草18) 別名： 覆 盆， 陵 蘽， 陰 蘽， 寒 莓， 割田蘽。	R. Thunbergii, S. et Z.	果實，莖，葉，皮		果實為強壯劑。	福建，江西，浙江，廣東。	本品生於丘陵之間，藤葉繁衍，蓬蓬纍纍，故名。
473.	地 榆 (本草12) 別名： 玉 鼓， 酸 楮。	Sanguisorba officinalis, L. (Potierium o., B. & H.)	根	Sanguisorbine. (Saponin) Flavone, Tannine, Sugar. (食植，綜植)	為收斂劑及止血劑，治下血、吐血、咯血、月經過多等症。 一次量 1.5—3.0gm	河北，湖北，江西，東北各省。	其葉似榆而長，初生布地，故名。Sanguisorba 為紅果之意。

第七十七 杜仲科 EUCOMMIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
474.	杜 仲 (本草35) 別名： 思 仲， 思 仙， 木 綿， 綿。	Eucommia ulmoides. Oliv.	皮	Rubber 22.5%， Resin 70%， Ash 2.5% (本新)	治關節之疼痛 及脊柱之彎曲 筋之軟弱。 劑量一次 1—4gm	湖北，河南， 陝西，山西。	昔有杜仲服 此得道，因 以名之。

第七十八 金縷梅科 HAMAMELIDACEAE

475.	蘇 合 香 (本草34) 別名： 蘇 合 油， 蘇 香， 帝 香， 流 動 蘇 合 香。	Liquidam- ber Orientalis Miller. Liquidam- ber Altingiana Bl.		Balsam (Cinnamic acid Cinnamein Styrocin Storesinol Storesin.) Ess. oil (Styrol, Vanillin, Styrocam pher.) (植研)	1) 為祛痰劑， 治氣管枝、 喘息、慢性 氣管枝炎。 2) 為塗布劑， 治疥癬等皮 膚症。	產於小亞細亞 ，西南方之 Mughla, Samos, Rhodes. 及北敘利亞 Nordsyrien) 等處。	此香原出古 蘇合國(即 今波斯)， 因以名之。 藥典採用流 動蘇合香 Styrax liquidus) 蘇合香酒精 。
------	---	--	--	---	---	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
476.	楓 香 脂 (本草34) 別名： 膠 香	L. formosana, Hce. (L. acrifolia, Max.) (L. maximowiczii Miq.)	滲 出 液 藥	Resin, Borneol, Cinnamic acid 16%, Cinnamol. Ess. oil (Phellandren, Limonene, Pinene, Camphene Aldehyde)	1) 治一切癰疽、瘡疥、金瘡、咯血。 2) 爲皮膚病之 罨包劑。	江西，廣東， 陝西，湖北， 福建南洋。	係由楓樹所得之香脂。
477.	楓 柳 (本草37)	L. sp.	皮		治風齩齒，痛風等症。	湖北，甘肅。	

第七十九 茅膏菜科 DROSERACEAE

478.	錦 地 羅 (本草13)	Drosera Burmanni, Vahl.	根		治惡性瘡疾、瘡毒，以根與酒研和服之，有效。	廣西慶遠山岩間及鎮安歸順，柳州，江西泰和等處。	此物之根似蕁薺及括樓根。
------	-----------------	-------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	--------------

第八十 虎耳草科 SAXIFRAGACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
479.	澁 蕨 (本草36) 別名： 巨 骨	Deutzia scabra, Thunb. (<i>D. crenata</i> , S. & Z.) (<i>D. Fortunei</i> , Carr.)	皮		爲退熱劑，去 胃中熱及皮膚 中熱，止遺溺 ，利尿道。	江蘇，江西， 湖北。	
480.	土 常 山 別名： 甘 茶	Dichroa febrifuga Lour. (真正常山) (<i>Hydrangea</i> <i>Thunbergii</i> , Sieb.) (土常山) (<i>H. aspera</i> Dom.)	葉	Dichroin Hydrangin $C_{10}H_9O_3$ (甜味成分) Phyllo- dulcin <i>Isophyllo-</i> <i>dulcin.</i> <i>Umbellife-</i> <i>rone</i> <i>Quinazol-</i> <i>one</i> <i>Febrifugi-</i> <i>ne</i> , (Alk. 此成 分最有效) <i>Isofebrif-</i> <i>ugine.</i>	1)本品有甜味，對患糖尿病者，可爲蔗糖之代用品。 2)醬油中添加甜味。 3)有解熱效能，治瘧疾甚有效。	浙江黃巖、天台，廣東清遠，福建永安、大嶺尾，河北正定(恆山)，四川重慶(巴蜀)湖北南漳(古漢中)、宜昌(宜都)，陝西恩施(建平)，西康雲南，貴州，安南，緬甸，南洋羣島。	據中國特效藥研究所報告，認定 <i>Dichroa febrifuga</i> , Lour. 一種，爲真正常山，其所含生物鹼成分之藥效，確比奎寧爲優云。
481.	虎 耳 草 (本草20) 別名： 石 荷 葉	<i>Saxifraga</i> <i>sarmentosa</i> , L.	草		以葉之絞汁， 治耳疾，又用 於毒虫之整傷 。	河北，陝西， 甘肅，浙江。	其葉似虎之 耳形，故名 。

第八十一 景天科 CRASSULACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分 效 用	產 地	備 考
482.	昨葉荷草 (本草21) 別名： 瓦松， 瓦花， 向天草， 鐵腳婆， 羅門草， 天王鐵塔 草。	Cotyledon fimbriata, Turcz. Var. ramosiss- ima, Maxim. (Sedum r., Franch.) (Umbilic- us r., Max.)	草	1) 爲清涼劑， 治口中乾痛。 2) 爲收斂劑， 治血痢大腸 下血。 3) 爲通經藥。 4) 染烏髻髮。 5) 治風狗咬傷。	河北，浙江， 江蘇，山東， 東北各省。	瓦松如松子 作層，故名。 生屋瓦上及深 山石縫中。
483.	屋 遊 (本草21) 別名： 瓦衣， 瓦苔， 瓦癩， 博 邪。	C.malaco- phylla, Pall. (Sedum m- Franch.) (Umbilic- us m., DC.)	草	1) 爲解熱劑， 止渴、利小 腸膀胱氣， 去皮屑浮熱。 2) 治犬咬。	河北，山東。	屋遊，生屋 上陰處，即 古瓦屋上苔 衣也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
484.	景 天 (本草20) 別名： 慎 火， 或 火， 救 火， 據 火， 護 火， 辟 火， 火 母， 八寶兒。	Sedum alborose- um, Bap. (S. purpu- reum, Linp.) (S. ergthre- ostictum, Miq.)	葉 花	Malic acid Ca malate	1) 葉花莖等， 貼於腫瘍， 有消炎鎮痛 之效。 2) 煎汁用於痔 疾。 3) 治丹毒。	景天生泰山川 谷，今南北皆 有，人家種於 中庭或盆盛， 養於屋上。	
485.	佛 甲 草 (本草20)	S. japonic- um, Sieb.	草		治湯火灼磨 貼之。	江西，浙江， 陝西，甘肅。	本品附石向 陽而生，似 馬齒莧而細 小。

第八十二 十字花科 CRUCIFERAE

486.	蕓 薹 (本草26) 別名： 油 菜， 胡 菜， 寒 菜， 蕓 菜， 菜 芥。	Brassica campest- ris. L. Var. Oleifera, DC. (B. chine- nsis, L.) (B. camp-	油	藥 藥： Vits, A ₂ , B ₁ , C ₃ , D ₂ , G ₂ , Fat...0.1% Cbhyd.....2.2% Ash 0.9% (Cu... 1.1	1) 油菜為菜蔬 用，於開花 前，取葉莖 及花蕾煮食 ，又為醬漬 用之。 2) 菜油治遺精 (夢中洩精)。		此菜易起蠶 ，須採其嫩 食，則分枝 必多，故名 蕓薹，而淮 人謂之菜芥 ，因其子可 榨油，俗名 油菜，羌隴
------	--	---	---	---	--	--	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		estris, Var. Chinoleifera. Vichoever) (B. paracinensis, Bailey.)		mgm%), Irosite, Amylase, 子: Fatty oil ...38—44% (Lignoceric inic acid, Behenic acid,	又為諸瘡之 淨血藥。 3) 菜油傳頭髮 用。 4) 菜油為烹飪 時之油料及 點燈用。		氏胡，其地 苦寒，能歷 霜雪，謂之 寒菜，種自 胡來，亦名 胡菜。

(成分續) Arachidic acid, Palmitic acid, Stearic acid, Erucic acid, Linolic acid, Linolenic acid, Oleic acid.), Phytosterine, Phytin, Ess. oil (CH₂:CH. CH₂. CH₂. N:C:S)...0.4—0.6%, Gluconapin Inosite, Lipase. (食植)

487.	芥 (本草26) 別名： 青芥， 刺芥， 芥菜。	B. juncea, Coss. (B. cernua Forbes et Hemsl.) (B. nigra, L.) (Sinapis j., L.)	子	葉： Protein 1.2%， Cbhyd 2.7%， Vit C ₃ , Ash 0.6% 莖： Vit. C ₃ ,	1) 子為皮膚刺 激劑，治神 經痛、風濕 症及肺炎。 2) 子為咖喱粉 原料。	中國，日本， 荷蘭，意大利	芥者界也， 發汗散氣界 我者也。 (王安石字 說)。 其氣味辛烈 ，菜中之介 然者，食之 有剛介之象 ，故字從介 (王禎農) 。
------	---	---	---	---	--	------------------	---

(成分續) 子: Fatty oil 30% (Arachidic acid, Behenic acid, Erucic acid, Lignoceric acid, Linolenic acid.)

Phytosterine, Phytin, Cho'ine, Vit. C₃, Sinapine (係一種生物鹼成硫
氰酸鹽含於白芥子中), Ess. oil. 0.5—1% (Sinigrin + Myrosin →
Allylcyanide) Amylase Anseroxydase, Emulsin, Maltase, Myro
sinase, Peroxydase, Saccharase. (本新, 綠植, 生藥)

【藥典】採用芥子，揮發芥子油，脫脂芥子，芥子精。

【新藥】Pasta Sinapis, Sinap, Masta-Cream 外用刺激劑。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
488.	甘 藍 (本草16) 別名： 藍 菜， 包心菜。	B.oleracea, L. Var. Gongylodes, L. (B.oleracea, var. caulorapa, DC.) (B.caulorapa, Pasq.)		Vits, A ₁ , B ₁ , C ₃ , Pentose. Fat 0.2%, Protein 1.8%, Cbhyd 2.8%, Arachidic acid, Palmitic acid,	久食益腎、補髓，利臟腑，通關節經絡，明耳目，益心力，壯筋骨。	原產河東隴西羌胡，今四川及各地均有之。(歐洲原產)	本品經冬不死，春亦不枯，久貯不腐，經時柔軟，保留香氣，為重要之蔬菜，因其味甘美，其功與藍相似，故名甘藍。

(成分續) Myristic acid, Linolenic acid, Linolic acid, Oleic acid, Phytosterin, Carotin, Xanthophyll, n-Hentriakontan, Palmiton, Glycerophosphatase, Peroxydase, Catalase, Amylase, Protease, Ess. oil (Sinopin) 0.14%。(食植)

489.	菘 (本草26) 別名： 白 菜， 小白菜， 青 菜， 山東菜， 黃芽菜， 窖 菜。	B. chinensis, (B. pekinensis, Rupr.) (B. Pe- tsai Tsai Bailey.) (Sinapis, P., Lour)	藥	Vits. C ₁ , A, 西洋種含 Vits. A ₂ , B ₂ , C ₃ , D ₁ , E ₁ , G ₂ .), Cu...1 mg %, Fat...0.1% Protein 1.1%, Cbhyd.....2.5%, 含氮(N)	1)利胃腸，治瘵氣，止熱氣咳，冬汁尤佳，(但痢疾及流行性感胃之咳嗽，均忌食)。 2)治漆毒生瘡(白菜搗爛塗之)及飛絲入目，(白菜揉爛帕包滴汁二三		菘性凌冬晚凋，四時常見，有松之操，故曰菘，今俗謂之白菜，其色青白也。
------	--	---	---	--	---	--	------------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				0.115%, (N 中之75% 爲遊離氨基酸, 8% 爲膠狀蛋白, 17% 爲其他氮化物), Peroxydase, Catalase, Amylase. (食植)	點入目即出)。		
490.	蕪 菁 (本草26) 別名: 蕪菁, 蔞青, 九英菘, 諸葛菜, 大頭菜。	B. Rapa. L. (B. campestris, Var. napa, Bab.)	根: Pentosan 6—14%, HCNS. 莖: Pentose, Glucose, Sucrose Pectin, Vitamine E, (蕪菁葉汁中多量含有), C. 子: Fatty oil, Ess. oil (Sinigrin)	1) 根葉, 消食止渴、治咳, 解熱毒風腫。 2) 子明目, 療黃眼。			蕪菁與菘蘿相似, 南北皆有, 北土尤多, 四時常有, 爲菜中之最有益者。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
491.	薺 (本草27) 別名： 護生草	Capsella Bursa- pastoris, Moench.		全草： Pentosan ...10.31%， Galactan...3.09% Choline, Acetylcho- line. (此物質有 血壓降下作 用) Bursin acid, (爲止血有 效成分)， Pot. fnm arate,	1)爲止血劑， 治肺出血， 子宮出血， 流產出血， 月經過多等 ，可爲北美 黃連，或麥 角之代用品 。(劑量： 用流浸膏20 滴一日3次)。 2)爲止瀉藥， 治腸炎及赤 白痢。 3)爲利尿劑及 解熱劑。		薺生費澤故 謂之薺，詩 云誰謂荼苦 ，其甘如薺 是也。

(成分續) Inosite, Vits, A₂, B_{2a} C₁, Mn...17.6mgm%,
Cu.....1.5mgm%。

種子：Diosmin (此物質爲球晶，配糖體之一，水解生 Rhamnose，含於綠色果皮之表層中)，Fatty oil 28—34%，爲黃棕色之液體，外觀似菜油，味不快，乃純然之乾性油。比重 0.9269，碘化數 152.56，比菜油芥子油蘿蔔油高，爲十字科植物油類中之最高者，鹼化數 185.91，比較的低帶有菜油族之通性。

【藥理】本品浸膏，注射於溫血動物，則血壓下降，對切斷腸管或子宮有緊縮作用。

【新藥】止血利：Viscibursin (Horstein)。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
492.	葶 藶 (本草16) 別名： 丁 藶， 葷 藶， 大 室， 大 適， 狗 薺。	Draba nemorosa. L.	子		爲利尿劑，治 水腫，又治咳 嗽及呼吸困難 。 劑量一次 1.5—3gm	陝西，河北， 山東，江蘇。	
493.	大 青 (本草15) 別名： 菘 藍， 大 藍。	Isatis tinctoria, L. (I.oblong- ata, DC. 菘藍，大藍) (I.indigo- tica, Fortune.)	葉	Isatin (gl) Indican, Chymase. Oxydase,	1)大青之葉， 製藍色染料 用。 2)爲解熱藥， 治斑疹傷寒 及扁桃腺炎 等症。	湖南，江蘇。	其莖葉皆深 青，故名。
494.	焯 菜 (本草26) 別名： 蕓 菜， 辣米菜。	Nasturti- um montanum Wall. (焯音罕)	葉， 莖	Vitamine C4.	爲消化劑，治 飲食不消，利 胸膈、蓄冷痰 ，心腹痛。	南方各省。	焯味辛辣如 火焯人，故 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
495.	萊 菔 (本草26) 別名： 蘆 菔， 蘿 蔔， 雹 蕒， 紫花菘， 溫 菘， 土 酥。	Raphanus sativus, L.		根部： Glucose (存於汁中))， Hydratop- ektin， Pentosan， Adenine， Arginine， Choline Histidine，	1) 萊菔子，為 健胃祛痰， 一次量 2—5gm 2) 油，治皮膚 病用，又工 業上用。 3) 萊菔湯稍腫 用。 4) 根止渴及為 消化藥用。		萊菔乃根名 ，能制麩毒 ，是來蘇之 所服。 馬來稱為 Lobac 西藏稱為 Laphug 日本稱為大 根 (Daikon)

(成分續) Trigonelin, Raphanol, Rettichol, Ess. oil (Methylmercaptan, 此物含硫黃，為汁中之一種特有臭氣，由蛋白質之腐敗而生成者)， Vits. B₁, C₂, Iodine, Bromine (含於紅皮蘿蔔中) Diastase, Glucosidase, Oxydase, Catalase.

葉：Ess. oil (α - β -Hexenal, β - γ -Hexenol), Vitamine A (含量甚富，與魚肝油相匹敵)。

種子：Fatty oil 30—43% (Stearis, -Erucic, -Oleic-glyceride) (食植)

496.	白 芥 (本草26) 別名： 胡 芥， 蜀 芥， 白芥子。	Sinapis alba, L. (Brassica a., H. & K.)	種 子	Fatty oil (Arachid- ic acid, Erucic acid, Lignoceri- nic acid, Linolenic acid.) Sinapin, Sinalbin, Emulsin, Lactase, Linase, Myrosina- se. (本新)	1) 子發汗，治 喘咳。 2) 有皮膚引赤 作用。 3) 為辣味香料 。	山西，四川。	本品子粗大 白色，故名 白芥，其種 來自胡戎而 盛於蜀，亦 名胡芥蜀芥 。
------	--	---	--------	---	---	--------	---

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
497.	葶 藶 (本草27) 別名： 大 薺， 大 薺， 馬 辛。	Thlaspi arvense. L.	子	Sinigrin, Fatty oil 34%, Lecithin, Myrosin, Myrosina- se. (本新)	子爲強壯劑， 又爲眼藥，治 眼目赤腫熱病。 。	江蘇，安徽， 陝西，東北各 省。	

第八十三 白花菜科 CAPPARIDACEAE

498.	白 花 菜 (本草26) 別名： 羊角菜， 風鳥草。	Pedicella- ria pentaph- ylla, Schrank. (Gynandr- opsis, P., DC.)	子	Fatty oil 25% Ess. oil (本新)	煎湯洗痔，搗 爛敷風溼痺痛 ，搗油飲止瘡 。	河北	本品秋開小 白花，故名 。
------	--	---	---	--------------------------------------	---------------------------------	----	---------------------

第八十四 罌粟科 PAPAVERACEAE

499.	博 落 迴 (拾遺) 別名： 落 迴， 勃勒回， 號筒草，	Bocconia cordata, Willd. (Macleya c., R. Br.)	全 草	Macleynine (Protopiave) (Alk) 1%, Cheleryth- rine β-Homo- chelidonin	爲驅蟲劑，治 惡瘡及一切皮 膚病(注意： 本品有大毒， 祇可外用，不 可入口內服，	湖南，安徽， 江西，江蘇， 浙江，福建。	原產中亞及 東亞。
------	--	--	--------	--	--	----------------------------	--------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(Allocryptopin), Sanguinarine. (本新)	以免危險)。		
500.	白 屈 菜	Chelidonium Majus. L.		全草中含 Chelidoni- ne Cheleryth- rine, Protopin 等三種之 Homochel- idonine, Berberine, Sparteine 等Alkaloid 及Chelido- nic acid, Malic acid	1)內用為鎮痛劑，治胃腸疼痛；又為胃痛特效藥，一次量用浸膏 1—2gm。 2)外用為疥癬藥及消腫藥，以生汁塗布之。	產北平及各地	【新藥】 Chelidonium Phosphoricum (德國 E. Merck) (綜植)
501.	延 胡 索 (本草13) 別名： 玄胡索	Corydalis ambigua Cham. et Sch. (C. decumbens. Pers.)	根 (塊莖)	Corydaline A to K 11 alkaloids, Bulbocap- nin, Berberine, Protopine, Tetrahy- dropalmit- ine.	為鎮痛劑，治頭痛腹痛(由攝取冷食所發者)，疝痛及分娩後之後陣痛及制止子宮大出血。 劑量一次 4—5gm	生浙江甯波，黑龍江，西伯利亞。	本品因避宋真宗諱，遂改玄為延也。 【新藥】 Bulbocapnin hydrochlorid. (E. Merck), Eufusin.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
502.	紫 堇 (本草26) 別名： 苜 蓿， 水苜蓿， 楚 葵， 蜀 芹， 赤 芹。	<i>C. incisa</i> , Pers.			花及葉之煎汁，為脫肛之罌包用，塊莖為鎮痛劑。	浙江，江西。	
503.	麗 春 草 (本草15) 別名： 仙 女 蒿， 定 參 草， 虞 美 人， 麗 春 草。	<i>Papaver rhocas</i> , L.		花及莖： Rhoeadine (Al) Mecocyan. in (gl) (為花之紅色素) Anthocyanidine, Gallic acid Malic acid Rhamnose. 根： Rhoeadine 種子皮： Paramorphine, Narcotine. (本新，植研)	1)花煎茶為含嗽劑。 2)製麗春花糖漿，為鎮咳藥。 3)根治黃疸。	山東，山西，河南，河北。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
504.	罌 粟 (本草23) 別名： 罌子粟， 米囊子， 御 米， 象 穀。	Papaver sommifer- um L.		殼：Wax, Cerin, Morphine 0.16—0. 28% (成分續) Meconic acid, Lactic acid, Succinic acid, Ceryl palmitate, Caoutchouc, Enzmes, Saccharase; 汁：Opium. 種子：Fatty oil 55%, Protein 20%, Pentosan 3.6% Ash 6%, Morphine 0.06%, Lecithin, Emulsin, Linolenic acid, Phytosterin, Diastase, Lipase, Nuclease, Protease, Oxydase.	種子爲止痛藥 ，果殼爲鎮痛 藥，治腹痛。	中國，印度， 土耳其，小亞 細亞。	其果實狀如 罌子(與壺 或甕同)， 其種子如粟 似穀，而可 以供御，故 有諸名。 Papaver 爲 拉丁古名， 其意爲幼兒 之粥，昔時 因使小孩善 睡，粥中加 罌粟之乳汁 與之。 Sommifer- um 爲睡眠 之意。 (Somnus 睡眠)。
505.	阿 芙 蓉 俗名： 鴉 片， 阿 片， (採未熟 果實之津 汁而成) 罌粟津液 大烟，烏 烟。	Opium 計解： Opium= OπLV 爲 OπVS 之 變小字，乃 罌粟汁 (Mohnsaft)之意。 英別名： Amphion 法別名： Thebaïq- ue		阿片之主成 分，爲多數 之生物鹼， 此等生物鹼 與末康酸 Meconic acid, (3-oxy-γ- pyrone—2 —6—dicar bonic acid), C ₇ H ₄ O ₇ ·2H ₂ O (約4%)	1)爲鎮痛劑， 止瀉劑，安 眠劑，吸引 劑，治下痢 疝痛，腹膜 炎盲腸炎等 。 2)爲嗎啡，可 待因，怕怕 非林及阿片 製劑之原料 。	中國，印度， 土耳其，小亞 細亞，日本。	阿方音稱找 也，以其花 色似芙蓉而 得此名(本 草綱目)。 又考鴉片之 輸入中國甚 早，唐貞元 時代(西歷 八百年頃) ，阿刺伯商 人，已有輸 入罌粟者， 至明中葉(十五世紀末

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		Thebaica 爲埃及上部 之地名 Thebais 轉 變而來。 拉丁別名： Meconium Laudanum		】，乳酸 (Lactic acid 約 1.2%)， 蘋果酸 (Malic acid)， 琥珀酸 (Succinic acid)， 蟻酸 (Formic acid)， 硫酸 (Sulphuric acid)，)，東洋貿易，爲葡萄牙人所壟斷，當時阿刺伯人所運送至麻刺甲之貨品，有鴉片一物，華言亦謂之阿芙蓉者，實阿刺伯語 Afion 之音譯也。(見清代通史)。

(成分續) 等化合，成爲鹽類而存在者；阿片生物鹼，如次表所列，種數頗多，各種阿片非全部所含有者，其中之某種或含量極少或付缺如，此係由工業的製造時之母液所分離者，其中各種阿片所含有最著名之生物鹼爲 Morphine (土耳其產 12—18%，最多至 20%，波斯產 6—16%，中國產 4.3—11.2%，日本產 10—11%) Narcotine (4—8%，中國產及印度產頗多)，Codeine (0.2—0.8%，有時超過 3%)，Papaverine (0.5—1%) Thebaine (0.2—0.5%)。

中國產阿片含 Narcotine 高，Morphine 低，約爲 6.94%。

阿片之成分，依化學之構造上，分類如次：

【I】異喹啉 (Isoquinoline) 衍化物： 1)Gnoscopine $C_{22}H_{23}NO_7$ (熔點 232—233°C，發見者 T. U. H. Smith, 1878) 2) Hydrocotarnine $C_{12}H_{15}NO_3$ (55—56°C, Hesse, 1871) 3) Codamine $C_{20}H_{25}NO_4$ (126°C, Hesse, 1870). 4) Cryptopine $C_{21}H_{22}NO_5$ (218°C T. U. H. Smith 1867). 5) Laudanidine (Tritopine) $C_{20}H_{25}NO_4$ (184—185°C, Kander, 1890). 6) Laudanine $C_{20}H_{25}NO_4$ (166°C Hesse, 1870).

- 7) Laudanosine $C_{21}H_{27}NO_4$ (89°, Hesse, 1871). 8) Narceine $C_{23}H_{27}NO_8$ (170°, Pelletier, 1835). 9) Narcotine $C_{22}H_{23}NO_7$ (176°, Derosne, 1803). 10) Oxynarcotine $C_{22}H_{23}NO_8$ (Beckett, Wright, 1875). 11) Papaveraldin (Xanthalin) $C_{20}H_{19}NO_5$ (211°, T. U. H. Smith, 1893). 12) Papaverine $C_{20}H_{21}NO_4$ (147°, Merck, 1848). 13) Protopine $C_{20}H_{19}NO_5$ (208°, Hesse, 1871).

【II】菲 (Phenanthrene) 衍化物：

- 14) Codeine $C_{18}H_{21}NO_3$ (155°, Robiquet, 1832). 15) Morphine $C_{17}H_{19}NO_3$ (230°, Ludwig, 1688). 16) Neopine (*β*-Codeine) $C_{18}H_{21}NO_3$ (127—127.5°, Dobbie, Lauder). 17) Porphyroxine $C_{19}H_{23}NO_3$ (134—135°, Merck 1837). 18) Pseudomorphine (Oxydimorphine) ($C_{17}H_{18}NO_3$)₂ (爲嗎啡之二次變成物 Pelletier, Thibouméry, 1835). 19) Thebaine $C_{19}H_{21}NO_3$ (193°, Thibouméry, 1835).

【III】造造尙未明者：

- 20) Aporheine $C_{18}H_{16}NO_2$ (88—89°, Pavesi, 1904). 21) Lanthopine $C_{23}H_{25}NO_4$ (200°, Hesse, 1870). 22) Meconidine $C_{21}H_{23}NO_4$ (58°, Hesse, 1870). 23) Papaveramine $C_{21}H_{25}NO_6$ (128°, Hesse, 1888). 24) Rhoeadine $C_{21}H_{21}NO_6$ (245—247°, Hesse, 1865). 25) Narcotonine $C_{21}H_{21}NO_7$ (Wrede, 1937).

其他成分爲不含氮之中性物質 Meconine $C_{10}H_{10}O_4$ Meconoisine $C_6H_{10}O_2$ (0.01—0.3%) 及 Caoutchouc 類似物, 脂肪 (Fat) 蠟 (Wax) 樹脂 (Resine), 蛋白質 (Proteine), 糖 (Sugar), 粘液 (Mucilage), 色素 (Dye) 氧化酵素 (Enzymes), 灰分 (Ash 2.3—3.5%, 爲 Ca, K & Mg Salts) 及水分 (Water 5—20%)。

阿片之浸膏總含量爲 59—70%, 平均爲 65%。

【藥典及準藥典製品】鹽酸嗎啡, 磷酸可待因, 鹽酸阿朴嗎啡, 鹽酸狄奧甯, 鹽酸海洛因, 阿片生物鹼鹽酸鹽, 阿片末, 阿片浸膏, 阿片酊, 阿片安息香酊, 芳香阿片酒, 陀氏散, 阿片浸膏丸, 阿片錠, 阿片吐根錠, 複方怕怕非林錠, 阿片坐藥等。

【新藥及新製劑】

I) 可溶性阿片總生物鹼: Algopan, Alopon, Kamopon, Landanon,

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	---------	-----	-----	-----	-----

Meconarcein, Narcopon, Panloide, Panmorphon, Papon, Pantopon, Pleistopon, Pulvis Narcopon, Vasiopon Injection, Tinctura Narcopon II)可溶性阿片總生物鹼與司可朴拉明配合劑: Allopon scopolamin, Laudanon scopolamin, Narcopon scopolamin, Pantopon scopolamin, Pavinal scopolamin, Pavon scopolamin, Scopomorphin, P-Markotin Vasiopon scopolamin.

III)可溶性阿片總生物鹼與阿托品配合劑: Atomor, Mohiatropin injection, Laudanon-atropin, Narcopon-atropin, Narcopon atropin Injection, Pavinal-atropin, P Marukotin-atropin, Vasiopon-atropin.

IV)磷酸氫化可待因製劑: Antitussin, Beffectin, Hydrocodein Phosphoricum, Paracodin.

V)鹽酸氫化可待因製劑: Dicodid, Eucodal, Pavinal, P-Marukotin.

VI)怕怕非林製劑: Ataxin papaverin, Ingelheim Papavel, Otreon.

VII)怕怕非林與愛佛特林: Tussidrin (鎮咳, 祛痰)。

VIII)怕怕非林與立麝香草劑: Melan (治百日咳)。

IX)阿片及吐根製劑: Expect. T. Morphetin. (鎮靜, 鎮咳)

X)中耳炎治療劑: Otagan, Otitol.

(綜植)(日局方註五)

第八十五 樟 科 LAURACEAE

506.	樟 (本草34)	Cinnamomum camphora, Nees.	木部及根部 含樟腦 (Camphor)及樟腦油 ,此油中,	樟樹為製樟腦 及樟腦油原料 ;樟腦油,治 淋疾,代白檀 油用。	江西,廣東, 雲南,福建, 台灣,浙江。	其木理多文 章,故謂之 樟。
------	-------------	----------------------------------	--	---	----------------------------	----------------------

(成分續)可提取樟腦6%,其餘之芳香成分如次: Camphen, Campher, Carvacrol, Cineol, Dipenten, Eug nol, Limonen, Phellandren, Pinen, Safrol, Cadinen.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
507.	樟 腦 (本草34) 別名： 龍 腦	Camphor		$C_{10}H_{16}O$ 熔點 175-179°C 比重 0.986 0. 993	1) 爲強心、呼吸器疾患、阿片中毒解毒藥，急性虛脫治療藥。 2) 爲防蟲藥。 3) 爲樟腦製品原料。 4) 爲人造橡牙原料。		

【藥典及準藥典製品】精製樟腦，樟腦丸，樟腦石蠟，樟腦軟膏石蠟，樟腦洋橄欖油，樟腦酒，樟腦精，石炭酸樟腦精，阿片安息香酊，樟腦擦劑。

【新藥及新製劑】I) 樟腦油劑：無痛樟腦油，無痛樟腦注射液，Cadonol，II) 樟腦水溶液劑：水溶樟腦，Camafeton, Camphonasin, Camphorin, Camphosin, Camphursin, camratin, Kamacol, Karonasin, Hexeton, Qusmin, Vitacampher.

III) 葡萄糖加樟腦液：Camphonasin glucose, Camphor Iodion, Candenin.

IV) 葡萄糖加樟腦食鹽水：Campholoid, Neulysin.

V) 樟腦求啓林溶液：Camphor Lösung (Hext), Gadamin, Kamphzyl.

VI) 樟腦與膽汁成分製劑：Cadechol, Camphochol, Felamin.

VII) 樟腦油製劑：Camphosan, Capsolin, Japonol, Kusunol, Mibnol, Novonol, Sescol.

VIII) 復麻質斯神經痛劑：Camporisin, Cataroisin Jod Kamthyl, Jod-Neulysin, Neo-Neulysin, Picalsin.

IX) 其他：Kantiros (丹毒治療劑)

Resola (毒素吸着外用劑)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
508.	菌 桂 (本草34) 別名： 筒 桂， 小 桂， 桂 皮。	C. Cassia, Bl. (C. aroma- ticum, Nees.) (C. obtusi- folium, Var. Cassia, P. & E.) (Laurus cinnamo- mum, Andr.)	皮	皮： Ess. oil 1—2%， (Cinnamic aldehyde 80%， Cinnamic acid 1%， Cinnamyl- acetate	爲健胃、矯味 、矯臭之用。	廣西，廣東， 安南，交趾。	菌者竹名， 此桂嫩而易 捲如筒，即 古所謂筒桂 也，筒似菌 字，後人誤 書爲菌，習 而成俗，亦 復因循也， 其皮稱桂皮 。

(成分續) Phenylpropylacetate, Methyl-O Cumaraldehyde), Salicyl-
aldehyde, Coumarin, Furfurol, Tannin, Ca oxalate, Ash 1.5%,
花: Ess. oil (Cinnamic aldehyde, Hydrocinnamic aldehyde.

(本新，植研)

509.	桂 (本草34) 別名： 肉 桂， 牡 桂， 棧。	C. Loureiri Nees.	皮	Ess. oil 1%， (Cinnamic aldehyde, Camphene Cineol, Linalool, Eugenol.)	爲芳香性健胃 劑，矯味及矯 臭劑。 一次量 0.1—1gm 貧血及四肢冷 痛，服之有效 。 一次量 1—5gm	廣西，廣東欽 州，雲南。	凡木葉心， 皆一縱理， 獨桂有兩道 如圭形，故 字從圭。
------	--	----------------------	---	--	---	-----------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
510.	天竺桂 (本草34) 別名： 山 桂	<i>C. pedunculatum</i> , Nees. (<i>C. japonicum</i> .) (<i>Laurus</i> , p., Thunb.)	皮 及 葉	Ess. oil 6%, (Eugenol, Methyleugenol, Linalool, Phenolen, Phellandren, Linalool, Safrol.)	1) 治腹內冷氣、 脹痛。 2) 治破產後惡 血。 3) 治血痢、腸 風、補暖。 4) 葉之精油， 為肥皂香料。 。	浙江杭州、台 州。 福建，廣東。	原出杭州天 竺，故名。
511.	月 桂 (本草34)	<i>Laurus nobilis</i> , L.	子 葉	Fatty oil 25%, (Myristic acid) Ess. oil 1%, (Cineol, Eugenol, Geraniol, Lauren, Pinene, Phellandrin, Sesquiterpene.)	月桂葉有佳快 香氣，為興奮 劑及嗜好品， 食品等添加香 料用。 月桂油為軟膏 ，塗腫物、腸 疝痛、脫臼、 挫傷，痛風及 治皮膚病等； 果實之煎汁， 為河豚之解毒 劑。	浙江杭州、台 州。 原產地小亞細 亞及地中海沿 岸。	吾國古代， 以登科為折 桂，其後以 月中有桂， 故謂之月桂 ，李潛放榜 後，有詩云 ，恩波舊是 仙舟客，德 字新添月桂 名。 歐州古時， 以此樹枝作 環，為名譽 的表章。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
512.	山胡椒 (唐本草)	<i>Lindera glauca</i> , Bl. (Benzoin g., S. & Z.)	果實	木及花： Ess. oil 1—1.2%, (Cineol, Liuarol, Geraniol Citronello)	主治心腹冷痛， 破氣化滯。	出雲南木邦土 司及熱帶諸地 。	果實爲漿果， 形似胡椒， 色黑，顆 粒大如黑豆 。
513.	釣樟 (本草34) 別名： 烏樟， 榆， 枕， 豫， 黑文字。	<i>L. sericea</i> , Bl. (<i>L. umbellata</i> , Thunb., (Benzoin sericeum, S. & Z.) (B. U. Rehd.)	葉 皮 莖 根	Ess. oil (Terpenes 51%, Cineol 7.7%, Linalool 11.4%, Geraniol 7.1%, Esters 11.4%, Limonene Dipentene Terpineol Carvone.)	根皮爲粉末， 內服治霍亂； 外用，取粉末 ，撒布傷口， 制止出血用； 煎汁爲疥癬及 諸瘡之洗滌劑 ； 在工業上，製 揮發油，供香 料用。 其木材有香氣 ，可爲牙簽之 製造原料。	河南商邱（古 睢陽）。 湖南，廣東， 日本。	樟有大小二 種，此即樟 之小者，其 根似烏藥香 氣，故名， 烏樟。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
514.	烏藥 (本草34) 別名：旁共、鱗蝕、矮樟。	L.strychni-folia, Vil. (I) Daphnidi-um s., S. & Z. (II) Cocculus laurifolius, DC. (III) (I)(II) 爲天台烏藥，(III) 爲衡州烏藥屬防已科。	根	天台烏藥之根： Ess. oil Linderan, Linderen, Linderol, Linderol-ester, Linderic acid. 衡州烏藥之葉及皮含結晶性生物鹼 Cocclaurin, 其鹽酸鹽之含量爲 1.6—2.0%	1) 天台烏藥，爲芳香性健胃劑。 2) 治喘息、胃痙攣、中風、小兒蟲、痢疾、疝氣、霍亂等。 衡州烏藥，爲驅蟲藥及利尿藥，又治腦溢血，感覺鈍麻、充血性頭痛等。 一日量 4gm	天台烏藥產地：浙江，江蘇，江西，安徽，湖南，廣東，廣西，海南，福建，(天台烏藥最佳)。 衡州烏藥產地：江西，湖北，湖南，廣東，四川。	衡州烏藥之成分 Cocclaurin, 其生理作用，極似箭毒素，犯中樞發癱瘓，對溫血動物之中毒狀甚苦，起全身之間代性溼學呼吸及隨意運動之麻痺等，適用於家兔之靜脈內，其最小致死量，對體重 1kgm, 爲0.07gm。
515.	詹糖香 (本草34)	L. Thunbergii, Mak.			爲消毒劑，治毒腫惡瘡。	廣東，廣西，福建，安南。	詹言其黏，糖言其狀也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
516.	楠 (本草34) 別名： 楠	Machilus Nanmu, Hemsl. (M. macrophylla, Hemsl) (M. neurantha, Hemsl) (M. Thunbergii S. & Z.) (M. macroantha, Nees.) (Persea, N. Oliv)	皮	Ess. oil (Eugenol)	霍亂吐瀉不止，取本品木粉，煎汁服之，煎湯洗轉筋及足腫，枝葉亦同。	四川，貴州，福建。	南方之木，故字從南。

第八十六 肉豆蔻科 MYRISTICACEAE

517.	肉豆蔻 別名： 肉果， 迦拘勒。	Myristica fragrans, Houtt. (M. mosc-hata, Thb.) (M. officinalis, L.)	果實，花	Ess. oil 3-10%, (d-Borneol, 1-Camphen 80%, Cymol, Dipentene Eugenol,	肉豆蔻，為芳香性健胃藥、矯味藥、矯臭藥及香味料，又為製肉豆蔻揮發油及肉豆蔻榨油之用；揮發油，為化粧品及興奮劑用；榨油（脂肪油）為調製軟膏硬膏及蠟劑之用。	栽於熱帶地方，印度諸島，麻六甲，蘇門答臘，廣東等處。	本品花實皆似豆蔻而無核，去殼只用肉，故名。
------	---------------------------	---	------	--	--	----------------------------	-----------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(成分續) Isoeugenol, Geraniol, d Linalool, Myristicin 4%, Isomiristicin, Myriticol, d Pinene, Sofrol, l-Terpineol, Terpinenol.) Fatty oil 30—40%, (Myristine, Oleine, Linoleine, Butyrine, Capryline, Laurine, Phytostriene.), Ipuranol, Wax, Resin, Saponin, Xylan, Starch, Tannin, Pigment, Ash 2—4%, Sugars. (本新)(生藥)			

第八十七 蠟梅科 CALYCANTHACEAE

518.	蠟 梅 (本草36) 別名： 黃梅花	Meratia praecox R. et W. (Calycant. hus, P. L.) (Chimona- nthes fragrans, Lindl.)	花： Ess. oil (Borneol, Cineol, Campher, Linalool, Pinene, Sesquiter- pena'coh. o.) 子： Alkaloid (Calycant- hin Isocalyca- nthin.) (植研)	1)花解暑生津 。 2)製芳香油原 料。 3)樹皮浸水磨 墨有光采。	河北，江西， 陝西，浙江。	此物本非梅 類，因其與 梅同時，香 又相近，色 似蜜蠟，故 得此名。
------	-----------------------------	--	--	---	------------------	---

第八十八 木蘭科 MAGNOLIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
519.	莽 草 (本草17) 別名： 茵 草， 芒 草， 鼠 莽， 東毒苗。	Illicium religiosum S. et Z. (I. japonicum, Sieb.)	果實 葉	果實： Ess. oil (Safrol), Shikimin, Shikimic acid, Hananom- in, 葉： Ess. oil (Sofrol, Eugenol, Methyleh- avicol.) (食楨)	葉：外用治金 創打傷瘰癧， 內用治丹毒， 乳管。 果實製香油， 又治痲痛。	廣東，陝西， 四川，及日本 長崎。	本品有毒， 食之令人迷 罔，故名。 莽草實有猛 毒，不可與 大茴香誤用 (形狀與大 茴香相似， 但較小細， 日本稱爲 Shikimi)。 將本品搗碎 與陳粟米粉 混和，投入 水中，魚吞 之即死浮出 ，但人取食 之無妨。(弘景)
520.	八角茴香 別名： 大茴香， 船茴香， 谷茴香， 原油香。	Illicium verum, Hook, (I. anisatum, Lour.)	果實	Ess. oil 1.6—5%, (Anethol 80%, Anisic acid, Anisaldehyde,	爲健胃、興奮 、驅風藥，又 治痲痛。 劑量一次 1—3gm 又爲香味料。	廣西，福建， 安南東京，菲 律賓。	此茴香，原 來自番舶其 果實裂成八 瓣，一瓣一 核，故有諸 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Anisketone, Caren, Cineol, Gynol, Dipenten, Limonene, Methylchavicol, l-Phellandrene, d-Pinene, Safrol, Terpeneol, Dioxybenzoic acid, Farnesol, Furfurol, Hydroquinone, Quinic acid, Fatty oil 2.6%, Phytosterine Saponine, Starch.

521.	南五味子 (本草13)	Kadsura chinensis Hce. K. japonica Dun	果實	Mucilage, (Araban, Galactan.)	果實為強壯劑及鎮咳劑，其與草之粘液，供製紙之樹料用度。	浙江杭州、紹興、福建永安、南印	本品皮肉甘苦，帶有鹹味，故名五味子。南產者其色紅。
------	----------------	---	----	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------

522.	辛夷 (本草34) 別名： 木筆， 迎春， 辛雉， 侯桃， 房木。	Magnolia Kobus, DC (M. consp- icua, Salisb.) (M. denu- data, Desr.) (M. yulan, Desf.)	花 樹皮	花蕾： Ess. oil (Citral, Safrol, Anethol, Methylch- avicol, Cineol, Eugenol.) Caproic acid, Oleic acid 樹皮： Kobushi- cusare. (植研)	花內服，治頭痛及瘡毒等，一次量0.5—2gm 外用治肥厚性鼻炎，搗汁塗之。 樹皮治頭痛、腰痛及骨痛。	浙江，江蘇，浙江，安徽，雲南，河北，遼甯，吉林，鴨綠江沿岸。	開紅花者曰木筆。 開白花者曰玉蘭。
------	--	---	---	--	--	--------------------------------	----------------------

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效 用	產 地	備 考
523.	浮羅羅勒 (本草34)	M. hypoleuca, S. & Z. Var.	皮		爲健胃劑，又有驅蟲之效；嫩芽嫩葉，爲救荒食物。	撒馬爾罕 (Samarkand) 唐時稱康國，西域國名。	本品之皮，似厚朴，有酸味。
524.	木 蘭 (本草54) 別名： 杜 蘭， 林 蘭， 木 蓮， 黃 心。	M. obovata Th., (M. liliflora, Desr.) (M. purpurea, Curtis.) (M. gtauca Th.) (Buergeria o., S. & Z.) (Tatauma, o., Hnce.)	皮 花	樹皮含有厚皮成分 Trimesic acid, d- quercitol (c.a) Maggiacurare 花芽含苦味芳香成分。 (植研)	樹皮及花芽，治頭痛及眩暈，且有利尿之效。 【藥理】將木蘭科中之辛夷、木蘭、厚朴及泰山木所抽出之結晶，與無晶形之毒素，施之於犬、兔、鼠、蛙等，最初起興奮作用，後即使之麻痺；溫血動物，則因呼吸停止而死；此種毒素之作用，雖屬相同，但似有強弱之差異。	四川，湖南，山東。	其香如蘭，其花如蓮，故名。 其木心黃，故曰黃心。
225.	厚 朴 (本草35) 別名： 烈 朴， 赤 朴， 重 皮， 厚 皮。	M. officinalis, Reh & Wil. (中國種) M. obovata Thunb. (日本種)		樹皮含 Ess. oil (Machilol) Magnolol Atractylen 類似物及同樣芳香結晶 木部含 Hocurare	爲健胃劑，治腹痛痙攣嘔吐及驅蟲劑。 一次量用粉末 6gm, 或取 20 gm 爲煎劑。	四川，貴州，陝西，湖北，河北，安徽，江蘇，福建浦城。	其木質朴而皮厚，味辛烈而色紫赤，故有厚朴烈赤諸名。 【藥理】本品能有所選擇而使運動神經末梢麻痺。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
526.	北五味子 別名： 葳蕤， 玄及， 會及。	Schizandra chinensis Baill. (Kadsura c., Turcz.) S. sphenanthera, R. & W.)		Mucilage	為鎮咳劑，治肺結核及氣喘；又為強壯劑，治腸結核患者之早晨下痢及眩暈。 一次量 1-2-5gm	河北，山西，陝西，山東，朝鮮，北美。	五味子北產者色黑，入滋補藥，必用北產者為良。

第八十九 防已科 MENISPERMACEAE

527.	木防已 (本草18) 別名： 廣防已， 滇防已。	Cocculus trilobus, DC. (C. Thunb- ergii, DC.) (C. ovalif- olius, DC.) (C. diant- herus, H. & A.)	莖 根	Trilobine, Homotril- obine, Trilobami- ne (Alk), Mufongch. in A. $C_{32}H_{24}N_2$ O_2 Mufongch. in B. $C_{14}H_{22}$ $N_{14}O_{11}$ (以上二種 係中國種成 分)	為利尿劑，治水腫淋病等，一日量約4gm為煎劑。 【藥理】 Trilobine 能使溫血動物之呼吸中樞及心臟麻痺，對家兔之致死量為0.15gm，對體重1kgm，靜脈內注射0.05gm，皮下注射0.15gm，Trilobine 無利尿作用，對溫利發熱之家兔，有解熱作用。 (邦藥)	廣西，雲南及東方各省。 福建西北各縣。	【新藥】 Zinomin， 係本植物之總生物鹼，配合水楊酸劑而成者，為神經痛治療劑。
------	--------------------------------------	---	--------	--	---	------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
528.	漢防己 別名： 粉防己， 土防己， 金線釣葫蘆。	Menispermum dauricum DC. (1) Sinomenium acutum R. & W. (2) (日本種)	根	Sinomenin Disinomenin Dehydrosinomenin Acutumin Sinaetin Diversin Paralysin Convulsin (以上日本種成分) Dauricine Hanfongchin A. (Tetrandrine) $C_{33}H_{40}N_2O_6$ Hanfongchin B. $C_{35}H_{38}N_2O_6$ Hunfangchin C. $C_{32}H_{42}N_2O_6$ 以上中國種(許植方)	1) 為利尿劑。 2) 治痛風為效。 【藥理】以 Sinomenin 之多量，注射於動物時，則反射機能亢進，發作劇烈痙攣，遂陷於中樞性麻痺而死；Divulsin 之作用，與前者類似，其全身中毒症狀，為呼吸障礙及反射機能之興奮，Parasinomenin 之作用亦與 Sinomenin 一致，惟其作用頗強耳。	陝西，湖北，四川，廣東清遠，廣西，浙江於潛。	防己為防病之意，Sinomenium acutum 鏡之意。 【新藥】Sinomenine hydrochloride, Parasinomenin, hydrochloride. 以上二者，為本植物生物鹼鹽之水溶液，為注射劑，對筋肉及關節、痲質斯、神經痛及肩凝腰痛等，有特效。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
529.	千金藤 (本草18)	Stephania hernadifo- lia Walp. (S. japon ica, Miers) (S. longa, Lour) (Cissamp- elos h.)		Stephani- ne, Proto- stephani- ne, Epistepha- nine, Metaphan- ine, Pseudoep- istephan- ine, Stephano- line, Homoste- phanoline 及 $C_{31}H_{36}$ N_2O_6 等 8 種。 結晶性 Alkaloide. (邦藥)	1)用於虛勞及 惡性瘧疾有 效。 2)治毒蛇咬傷 。	福建南部及南 方各省。	
530.	防 已 (本草18) 別名： 解 離， 石 解， 倒地拱。	Stephania tetrandra Moore. (台灣種)	根	Tetrandri- ne 2 other alkaloids	1)根為驅風藥 ，治顏面神 經麻痺，關 節痠麻質斯 及氣管支性 喘息。 2)治毒蛇咬傷 。 3)為消腫退熱 藥，搽水腫 風腫，去膀胱 熱、傷寒熱 。	雲南，廣東， 台灣。	防已，如險 健之人，幸 災樂禍，能 首為亂階， 若善用之， 亦可禦敵， 其名或取此 義(李杲) 。解離，因其 紋解也。

第九十 小蘗科 BERBERIDACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
531.	小 蘗 (本草35) 別名： 子 蘗， 山石榴。	Berberis Thunber- gii DC. (B. Maxim -owiczii, Regel.) (B. Chine- nsis, Desf.)	皮 木	Berberine, Oxyberbe- rin, Tetrahyd- roberberin Oxyacant- hine, Tetrahyd- roshobak- umin, Berbamin, Canadin, Columba- min, Jatrorrhiz- in, Yellow Pigment. (本新)	1) 皮治口瘡， 殺諸蟲去心 腹熱，治血 崩。 2) 枝葉煎湯， 為洗眼藥。 3) 為健胃劑。 4) 木部為黃色 染料用。	陝西，甘肅， 福建西北各縣	
532.	鬼 臼 (本草17) 別名： 九 白， 天 白， 鬼 藥， 解 毒， 解 毒， 馬 目， 毒 公， 毒 母， 毒 草， 毒 草， 米 律， 草 田， 橋 田， 唐 婆， 鏡 角， 盤 八， 草 葉， 山 荷， 獨 腳， 荷 草。	Diphylleia cyuosa, Michx. (D. Grayi, Fr. Schm) (Podophy- llum versipelle Hce.)	塊 根		殺蟲毒，解百 毒，下死胎， 治癰疽，療蛇 毒。	陝西，南方各 省。	有毒。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
533.	淫羊藿 (本草12) 別名： 仙靈脾， 放杖草， 葉杜草， 千兩金， 乾雄筋， 黃蓮祖， 三枝九 葉草， 剛前。	Epimedi- um macran- thum Morr. et Dcne Var. violaceum Franch. (E. Davidi Franch.) E. sagitta- tum, Bak.) (Acerant- hus s, S. & Z.)		Icariin 加水分解為 Icaritin (gl.) 【藥理】據宮 崎氏說，淫 羊藿之催淫 作用，由於 精液分泌充 進作用，因 知覺神經之 刺激，使精 囊充滿間接 的有興奮。	為補精強壯劑，治陰萎臟躁症(Hysterie)、神經衰弱、健忘等。 一日量 8gm	阿西，四川， 湖南，江蘇， 山東。	四川北部有淫羊，一日百遍合，蓋食此藿所致，故名淫羊藿。 Epimedi-um 為希臘古名， Macranthus, 為大花之意， Violaceus, 為紫堇色(花色)之意。
534.	千年健 (拾遺5)	Holboellia angustiss- ima Diels.			為強壯劑及驅風藥。 又治胃痛。	安南，廣西。	以之入藥酒，老人服之，可壯筋骨，可療風痛，可治胃痛。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
535.	南 燭 (本草36) 南天竹, 牛 筋, 烏飯草, 草木之王。	Nandina domestica Thunb.(1) (Lyonia ovalifolia D. Don.) (2) (Andromeda o, Wall.) (3) (2)(3)二種 屬杜鵑花科	果 實 樹 皮	Nantenin (Domestini) (alk.) (1) Nandinin (2) Nandazurin (3) Domestitin (4) Berberin (alk.)	1) 果實為鎮咳藥, 治百日咳及氣喘有效。 一日量 5—10gm 2) 葉為強壯劑。 市舊品, 為白色果實及未熟果實。 1. 3. 無色結晶 2. 濃藍色 4. 黃色	產於浙江, 江蘇。 取汁浸米, 為烏飯食之, 健如牛, 故曰牛筋。	【藥理】 Nandinin 最顯著之作用, 如 Strychnin, 為起激劑之標準, 麻痺知覺神經之末梢, 以致痛覺觸覺麻痺或鈍麻。

第九十一 木通科 LARDIZABALACEAE

536.	通 草 (本草18) 木 通, 附 支, 丁 翁, 萬年藤。	Akebia quinata, Decne.	莖 種子	Akebin 【→Akebinogenin】 Ash 8.2% (鉀鹽39%) Fatty oil 【新藥】 Akebin	1) 為利尿劑, 治妊婦浮腫及腎臟病, 并有排膿通經作用。 2) 去胃癌之熱。 3) 為突眼之洗滌用。	江蘇, 安徽, 湖南, 陝西, 山東。	有細孔, 兩端皆通, 故名通草。 灰分含鉀鹽甚多, 故有利尿作用。
------	---	------------------------	---------	--	---	---------------------	--------------------------------------

第九十二 毛茛科 RANUNCULACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
537.	烏 頭 (本草17) 別名： 川烏頭	Aconitum chinense, Sieb. (四川產) A. Fische- ri, Reich. A. Napell- us, L. (歐產，藥 典採用物) A. japoni- cum, Thunb.	塊 根	Aconitine, Mesaconi- tine, Hypaconi- tine, Jesaconit- ine (Alk.)	內用為鎮痛劑 ，治胸膜炎， 肺炎，神經痛 ， 一次量 0.025 —0.05 gm 外用治神，經 痛及關節痛。 【藥典】有酞劑 ，浸劑浸膏劑 等，又為製烏 頭素之原料。	原產中歐山脈 地方，英美德 奧諸國栽培尤 盛，吾國以四 川綿州產者為 最多。	主根之幼稚 ，作倒圓 錐狀，似烏 之頭故名。 Aconiton, 為希臘古名 。 本品有猛毒 ，古代作毒 矢用，其浸 膏名射罔， 獵人以之塗 箭，射禽獸 十步即倒， 中人亦死， 中此毒者， 以甘草煎汁 小豆葉浮萍 冷水齊煎， 皆可一味禦 之。
a.	附 子 別名： 黑附子， 川 附。	Autumn root, (A. autumn- nale, Lindl.)	根	Aconitine	1)健脾胃，止 風寒咳嗽， 治暴瀉久痢 脫陽。 2)有通經墮胎 作用。	四川。	附子為烏頭 之稚根，如 子附母而生 者。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
b.	側子 薊子。	Daughter root.	根		1)治癱瘓風痺 ，筋骨痠痛。 。 2)有墮胎作用 。	四川。	側子乃附子 之側生根。 有猛毒。
c.	漏籃子 別名： 虎掌， 木鼈。	Small daughter root.	根		治惡痢冷漏瘡 ，惡瘡痲風。	四川。	漏籃子乃附 子之極細者 ，小而漏籃 ，故名。(有 毒)
538.	天 雄 (本草17) 別名： 白 朮	A. Hemsl- eyanum, Pritz., A. Wilsonii Wil. A. varieg- atum, L.	根	Aconitine, Aconitic acid.	爲鎮痙劑，治 痙瘓。 爲驅風劑，治 關節痛。 爲強壯劑，力 作不倦，併治 失精。 爲解毒劑，治 禽蟲毒。	四川。	天雄爲附子 中不生稚根 在地中經年 長大長，猶 如長而不生 子然，故名 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
539.	牛 扁 (本草17) 別名： 扁 持， 扁 毒。	A. Lycoc- tonum, L. (A. barba- tum, Patr.) (A. Cynoc- tonum, Reich.)	根	Lycaconi- tine 0.001%, Myoconi- ne, Flavone C ₁₀ H ₁₃ O ₂ , Phytoste- rol, Acolyctin (本新)	1) 莖葉煎服， 對四肢之關 節痛、黃疸 、便秘及尿 道有效。 2) 能殺小蟲及 牛蟲，療牛 病。	山西，四川， 湖南，廣東， 雲南。	療牛蟲甚效 ，故名牛扁 。
540.	狼 毒 (本草17)	A. Lycoc- tonum, L.	根	Ditto	1) 有猛毒，能 殺鼠及一切 飛禽走獸。 2) 治乾溼蟲疥 、積年乾癬 及風瘡。	甘肅，陝西， 山西，山東， 湖北。	
541.	草烏頭 (本草17) 烏 喙， 土附子， 奚 毒， 耿 子， 毒 公， 金 鴉。	A. uncina- tum, L. A. japoni- cum Thumb. A. Volubi- le, Pall. A. Kusne- zoffii Reich. A. villos- um, Maxim.	根	Aconitine Mesaconi- tine Hypaconi- tine Jesaconi- tine (植研)	1) 內用為鎮痙 劑，治胸膜 炎、肺炎、 心囊炎等熱 性病。 又治神經痛 。 2) 為鎮痛性塗 擦劑，治痛 風、癱瘓質 斯及神經痛 。	浙江，江蘇， 福建，日本。	草烏頭為野 生種，其子 根與母根比 較小細者。 本品有毒， 誤食則神經 恍惚，人事 不省，至於 發狂，引起 種種煩悶。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
542.	白頭翁 (本草12) 別名：野丈人，胡王使者，奈何草，翁草。	Anemone cernua, Thunb. A. chinensis, Bunge.)	根 草	Anemonin Okinalin (植研)	1)根為消炎性收斂劑，又為止血劑，治赤痢之裏急後重及熱性下痢，一次量 5gm 2)治月經閉止。 3)草治浮腫及心臟病。	生於山野向陽之地，福建。	近根處，有白茸，狀似白頭老翁，故此為名。丈人胡使奈何皆狀老翁之意。
543.	升麻 (本草13) 別名：周麻	Cimicifuga foetida, L. Var, simplex, Huth (1) (C. davurica, Maxim.) (2) (C. racemosa, Nutt.) (3) Actea spicata, (4) Astibe chinensis (5) F. et S. A. polyandra, Hems. (6) Hoteia chinensis, Max. (7)	根	Cimicifugine (Alk) Salicylic acid, Tannine, Fatty acid.	1)解麻疹痘疹、腸傷寒等之熱及諸瘡之毒，使前額之頭痛鎮靜。 2)為發汗劑。 3)對扁桃腺腫，有消炎止痛之效。	四川，河北，廣西，廣東。(1-2) 河北，東北各省，陝西，浙江，廣西，廣東。(3-5)	其葉似麻，其性上升，故名。 第五種至第七種；屬虎耳草科。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 號
544.	女 萎 (本草18)	Clematis apiifolia, DC. (<i>C. virginiana</i> , Lour.)	莖		1) 爲止瀉劑， 治腸鳴下痢。 。 2) 助消化。	河北。	
545.	威 靈 仙 (本草18)	<i>C. chinensis</i> , Retz. (<i>C. terniflora</i> , DC.) (<i>C. japonica</i> , Houtt. Var. <i>Simsii</i> , Makino.) <i>C. minor</i> . DC.	根		爲鎮痛利尿劑， 治偏頭痛顏 面神經麻痺痛 風等症。 一次量 3—5gm 又治尿酸症。	陝西，河南， 福建。	威言其性猛 也，靈仙， 言其功神也。 。
546.	仙 人 草 (本草20)	<i>C. paniculata</i> . Th. <i>Veronica</i> <i>Polita</i> , Fr.	根	Chlorogen acid.	爲發泡劑，揉 其葉貼於腫物 部分，漸次帶 赤，生水泡愈 潰瘍。 又此藥搗碎投 於河流，則魚 類致死。	生於江西，江 蘇，東北各省 部分，漸次帶 浙江等之塔 庭間。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
547.	黃藥子 (本草18) 別名： 木藥子， 大苦， 赤藥， 紅藥子。	C. recta, L. (C. mand- schurica, Rupr.)	草		1) 治諸惡腫， 疔瘡，喉痺， ，蛇犬咬毒， ，研水服之。 。 2) 爲止血藥， 治吐血、咯 血、鼻血、 產後血暈等。 。	河北，山東， 東北各省。	
548.	黃連 (本草13) 別名： 王連， 支連。	Coptis Teeta, Wall. C. occide ntalis, Auct. C. Anemo- naefolia, S. & Z. (雲南種) C. chinen- sis, French. (四川種) C. japonica Makino. (日本種) C. trifolia, Salisb. (三葉黃連)	根 莖	Berberine, Coptine, Coptisine, Worenine, Palmitin.	爲健胃劑及止 瀉劑。 一次之用量 治消化不良 0.3—0.5gm 嘔吐及腹痛 1.5—2.0gm 腸炎之下痢 3—4gm 凡蛔蟲由口中 吐出之際，服 本品，頗有效 。	四川，廣西， 湖南，湖北， 貴州，陝西， 浙江，雲南， 福建清流、將 樂。	其根連珠而 色黃，故名 。 Coptis切斷 之意，即其 葉細裂之意 。 【藥典】 黃連， 黃連浸膏。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
549.	兔 葵 (本草16) 別名： 天 葵， 菘， 雷丸草。	Eranthis pinnatifi- da, Maxim.	苗	Mucilage	下諸石五淋，四川。 止虎蛇毒、諸 瘡，搗汁飲之 ，塗瘡，能解 毒止痛。		
550.	芍 藥 (本草14) 將 離， 犁 食， 餘 容， 鈺， 白金芍藥 ，赤木芍 藥。	Paeonia albiflora, Pall. (P. sinen- sis, Hort.) (P. edulis Salisb.) (P. alleifl- ora, Pall, var. trichocar- pa, Bunge.)	根	Asparagin Benzoic acid,	爲鎮痛藥，治安徽，湖北， 腹痛（山寄生江蘇，四川。 虫所起之脫痛 ，添莖述，因 冷氣所冒而腹 痛，加肉桂爲 通則），爲瀉 藥，治下痢， 又爲通經藥。 一次量 1—2—7gm		芍藥，猶焯 約也，焯約 美好貌，此 草花容焯約 故以爲名。 albiflora爲 白色之意。 芍藥根，爲 安息香酸及 安息香酸鹽 之代用品。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
551.	牡丹 (本草14) 別名： 鼠 姑， 鹿 韭， 百兩金， 木芍藥， 花 王， 花 神， 富貴花， 洛陽花， 天香國色。	P. Moutan, Sims. (P. arbor- ea, Don.) (P. offici- nalis, H. & T.) (P. suffru- tiosa, Andr.)	根 皮	Paeonol (gl) $C_9H_{10}O_3$ Ess. oil 0.4%, Bezoic acid, Phytoster- in, Paeonin. (花之紅色 素) Arabinose, Glutamin,	1) 爲鎮痛藥， 治頭痛、腰 痛、關節炎 等。 2) 爲婦科藥， 治月經不順 產後諸病， 并除婦人下 部之硬塊及 瘀血。 3) 緩和創傷之 疼痛。 【日本準藥典】 採用牡丹皮。	四川，陝西， 山東，河北。	牡丹，以色 丹者爲上， 雖結子而根 上生苗，故 謂之牡丹。 Paeonia, 爲希臘神話 中醫神 Paeon之名 , Moutan , 爲牡丹之 中國音。
552.	毛 茛 (本草17) 別名： 毛健草， 水 茛， 毛 草， 天 灸， 日 灸， 猴 蒜。	Ranuncul- us acris, L. R. japonic- us, Th. R. propin- quus, Meyer.	莖	Protoane- monin Vitamine C.	凡惡寒癱痺疼 痛之未潰者， 搗藥傅之，可 消腫，已潰之 腫物，搗藥 貼之，有吸出 膿汁之效。	北方各省。	其汁液有苛 烈刺激性及 辛辣味，引 起流淚及皮 膚發泡。 藥葉之汁， 與梅子及飯 粒混練，齒 痛時貼於患 部，有除痛 之效。
553.	回回蒜 (救荒本 草) 別名： 水胡椒， 獨虎草。	R. Pensyl- vanicus, L. F. Var japonicus, Maxim.	草	Protoane- monin.	1) 藥葉果實之 汁液，爲發 泡劑。 2) 藥治間歇熱 。	生於澤地。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
554.	石龍芮 (本草14) 別名： 地 楮， 天 豆， 石 能， 魯果能， 水 董， 苦 董， 董 葵， 胡椒菜， 彭 根。	R. sceleratus, L. (R. holop hyllus. flancc.) (R. oryzet. orum. Bunge.)	草	Proto- memonin.	莖葉揉出之汁液，塗於惡瘡癰腫及僕麻質斯之患部有效，治毒蛇咬傷亦效。	河北，東北各省，南方各省。	生於石上，其葉莖芮短小，故名。

第九十三 睡蓮科 NYMPACEAE

555.	蓴 (本草19) 別名： 荇， 水 葵， 露 葵， 馬粟草， 蓴 菜。	Brasenia Peltata, Pursh. (B. Schre- beri, Gmel.) B. Purpur ea, Casp.	草	葉之背面分泌似瓊脂(寒天，洋菜)之粘液，新葉粘液質頗多。	1) 葉供食用。 2) 莖葉揉碎，塗布癰疔有效。	江蘇，浙江。	蓴本作蓴，從純，純乃絲名，其莖似之。詩云，薄葉其荇，即蓴也。
556.	芡 實 (本草33) 別名： 雞 頭， 雁 喙， 雁 頭， 鴻 頭， 雞 雞， 卵 菱， 葦 子， 水流黃。	Euryale ferox, Salisb.	種 子	Protein 11.8%, Fat 0.2%, Cbhyd 75.4%, Ash 1.2%,	1) 種子供食用，又為滋養。 2) 強壯劑，治遺精。 2) 為鎮痛劑，治痛風及腰腳關節痛。	生雷澤池澤中。	芡可濟儉歉，故謂之芡。其苞形類雞雁頭，故有諸名。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
557.	蓮 藕 (本草33) 別名： (子) 蓮， 蓮 實， 藕 實， 荷， 藕， 石蓮子， 水 芝， 澤 芝。 (根) 藕， 藕 節。 (花) 蓮蕊鬚， 佛座鬚， 蓮 花， 芙 蓉， 芙 渠， 水 華。 (葉) 荷 葉。 別名： 錢 荷。 (蒂)荷鼻 (葉莖)荷 (殼)蓮房， 蓮蓬殼。	Nelumbo nucifera, Gaertn. (Nelumbi um speciosum, Willd.) (Nympha- ea Nelumbo, Lour.)	蓮子(乾燥品)： Vitaminæ C ₂ Nelumbine Protein 15.9%, Cbhya 70%, Raffinose Fat 2.8%, Ash 3.9%, (Cu, Mn, Ti.) 發芽種子之 芽中： Asparagin 蓮根(藕)： Vitaminæ C, Asparagin 2%, Arginin, Trigonelin Tyrosine, Lecithin, Starch 9.7%, Pentosan,	蓮子為滋養強壯劑，凡有下痢傾向及遺精者服之有效。劑量一次 3gm 藕止渴，解酒毒。 花揉碎貼布腫物，促膿之吸收。 荷葉為強壯劑，治神經衰弱及遺精。 又為解熱劑，并治夜尿症。 為利尿劑，治水腫；為解毒劑，治菌費中毒。 為止血劑，治咯血及子宮出血。 劑量一次 3—5gm	蓮藕：湖南、湖北、江蘇、江西、浙江、福建、河南、四川等省之湖池波澤皆有。 蓮子：以湖南之湘蓮，浙江之處蓮，福建及江西之建蓮為佳。 (福建建寧建陽，出品最佳)。	本品之實曰蓮，其根莖曰藕，其花與葉曰荷，蓋蓮者連也，花實相連而出也，其節生二柄，一為葉，一為花，盡處乃生藕，為花葉根實之本，花葉常偶生，故根莖曰藕，或曰藕善耕泥，故子從耦，耦者耕也。 按荷為葉名為柄名，蓋柄乃負葉負花者也，含有負荷之意。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				Saccharose, Glucose, Protein 1.7%, Fat 0.1%, Ash 1.1%, 葉： Vitamine C Nelumbine (Akl.) (含於葉柄 花軸及胚中) (本藥，食 植，植研)			
558.	萍蓬草 (本草19) 別名： 水粟， 水粟子， 川骨。	Nuphar japonicum DC.	子 根	Nupharin Rhamno- san, Nupharid- in. (食植)	爲止血、健胃、 強壯藥，治 神經衰弱及婦 人病，又治金 創切傷等。 劑量一次 8gm	萍蓬草，生南 方池澤中。	本品夏開黃 花，結實如 蓬，如粟， 其根及藕， 可爲救荒食 物。

第九十四 石竹科 CARYOPHYLLACEAE

559.	雛鬲草 (本草20)	Arenaria Ser. pyllifolia, L.	草	Saponin	1)爲祛痰劑， 治氣管支炎。 。 2)治丹毒及頸 淋巴腺腫。	廣東。	
------	---------------	---------------------------------------	---	---------	--	-----	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
560.	紅 茂 草 (圖經) 別名： 長生草， 禿瘡花， 地沒藥， 通泉草。	Dianthus caryoph- yllum, L.	草	Ash 5% :- (CaO 45%, Fe 5%,) Ess. oil: - (Benzyl estes, Salicylic ester, Phenylet- hylol, Eugenol, Heptacos- an.) (本新)	治癰疽瘡腫， 煅研爲末，冷 水調敷。	生古道邱壘荒 蕪諸地。	
561.	瞿 麥 (本草16) 別名： 蘧 麥， 巨句麥， 大 菊， 大 蘭， 石 竹， 南天竺草 。	Dianthus superbus, L. Var. Longicaly- ciaa Williams. D. Fischeri Spreng.	種 子， 花		1)爲利尿劑， 治水腫及淋 症，對血淋 (即膀胱或 腎臟出血， 感疼痛時) 有特效。 2)爲通經藥及 陣痛催進劑 。 一次量 2-4-8gm 用多量恐有 流產，對妊 婦須禁用。	北方各省。	凡生於兩旁 謂之瞿，子 頗似麥，其 穗旁生，故 名瞿麥。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
562.	翦 春 羅 (本草16) 別名： 翦紅羅	Lychuis coronata, Thunb. (Agrostemma, Banksia, Meerb.) (L. grandiflora, Jacq.)	花，葉		火帶瘡癩腰生者，採花或葉，搗爛，蜜調塗之，爲末亦可。	河北，江西。	翦春羅二月生苗，柔莖綠葉，入夏開深紅色花，花大如錢，凡六出，周迴如翦成可愛故名。
563.	翦 草 (本草 8)	L. sp.	根		治惡瘡疥癬及牙痛。	江蘇，浙江台州，安徽婺州。	
564.	蜀 羊 泉 (本草16) 別名： 羊 泉， 羊 飴， 漆 姑 草， 瓜 槿 草， 牛 毛 黏。	Sagina Linnaei Presl. Var. Maxima, Maxim. (S. maxima, Gray.) (S. sinensis, Hce.)	汁		1)塗漆瘡、禿瘡、惡瘡。 2)療麤齒。	生階墀間陰溼處及花盆中，原出四川。	能治漆瘡，故曰漆姑。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
565.	王不留行 (本草 6) 別名： 禁宮花， 剪金花， 金盞銀臺， 道灌草。 。	Saponaria Vaccaria, L. (Vaccaria, vulgaris, Host.) Melandry- um apricum Rohrb. (中國產) M.firmum Rohrb. (朝鮮產)	莖 種子	Soponin Lactosin $C_6H_{10}O_5$ $\cdot 2H_2O$ 醣 類 (植研)	種子有止血鎮 痛及催乳作用 ， 一次量 3—5gm 外用治切創傷 ， 出竹刺。	北方各省，(歐洲原產。)	本品性走而 不住，雖有 王命而不能 留其行也。
566.	繁 縷 (本草 27) 別名： 瘦 縷， 蕪 縷， 葵 縷， 滋 草， 鷓腸菜。	Stellaria aquatica Scop. (S. Media, Cry.) (S. fecun- da, Hance.) (Cerastium a, L.) (Larbreaa., DC.)	莖葉 種子	Ash 13%, (無機鹽) Fat. oil 4.8%, (植研)	1) 爲淨血劑， 去分娩後之 子宮收縮痛 ， 又能促進 乳汁之分泌 。 2) 治盲腸炎。 3) 葉莖燒灰和 麻油，貼於 瘡腫物之患 部。	生溼地坑渠之 側。	此草莖葉甚 繁，中有一 縷，故名。

第九十五 落葵科 BASELLACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
567. a.	落 葵 (本草27) 別名： 蔘 葵， 藤 葵， 藤 菜， 天 葵， 繁 露， 御 菜， 燕脂菜。	Basella rubra, L. (B. alba, L.) (B. nigra, Lour.)	葉 子實	Vit. A ₃ , B ₃ , Saponine, Mucilage, Fe. (本新)	1) 葉爲緩瀉劑， 利大小腸。 2) 揉其莖葉， 貼粘指股瘡 (虎口腫) 用。 3) 小孩食之， 能使髮黑。 4) 子爲粘滑劑， 可作而脂。	廣東。	時珍曰，落 葵葉冷滑如 葵，故得葵 名。
567. b.	燕 脂 (本草5) 別名： 藤 脂， 經 赦， 染絳子。	Basella rubra, L.	花	Red Pigment.	1) 汁爲清血解 毒藥，解疔 毒。 2) 治乳頭破裂 。	河北，廣東廣 州。	燕脂產於燕 地，以紅色 花汁染粉， 調脂飾女面 之用，故名 燕脂。 本品有五種 製法，一以 紅藍花汁染 胡粉而成， 二以山燕脂 花汁染粉而 成，三以山 榴花汁作成 ，四以紫鑿 (一名紫梗))染綿而成 ，五以落葵 子染粉而成 。

第九十六 馬齒莧科 PORTULACACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
58.	馬齒莧 (本草27) 別名： 馬 莧， 五行草， 五方草， 長命菜， 九頭獅子 草。	Portulaca oleracea, L.		Vitamine C, Urea, Fat 0.4%, Ash 1.6%,	1 治細菌性赤痢。 2) 爲乾癬藥及諸瘡之貼布劑。 3) 內服治麻症及婦人陰部之粘液性分泌物。 4) 治毒蟲及蛇之咬傷。	處處有之。	其葉比並如馬齒而性滑利似莧，故名。

第九十七 商陸科 PHYTOLACCACEAE

569.	商 陸 (本草17) 別名： 遂 葛， 當 陸， 章 柳， 白 昌， 馬 尾， 夜 呼。	Phytolacca acinoso, Roxb. (P. octan- drae, Bunge.) (P. pekin- ensis Hnce.) (P. kaem- pferi gray.) (P. decan- dra maxim.)	根	Phytolacc. atoxin, Saponin. KNO ₃ 新鮮根汁有 猛毒，誤食 起中毒或致 死，須特別 注意。 【藥典】採用 商陸，商陸 浸膏。	爲利尿劑，治 肋膜炎、慢性 腎臟炎、腳氣 腹水、心臟水 腫等。 本品爲劇藥， 劑量一次 0.5gm, 一日 1.5gm。	福建德化戴樂 山，河北，湖 北，四川，東 北各省。	此物能遂葛 (音遂湯) 水氣故曰遂 葛，訛爲商 陸，或云枝 枝相值，葉 葉相當，又 名當陸。
------	--	--	---	--	---	------------------------------------	---

第九十八 莧 科 AMARANTACEAE

號 碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
570.	牛 膝 (本草16) 別名： 牛 蓼， 百 倍， 山 萹 苈， 對 節 菜。	Achyran- thes bidentata, Blume. (A. aspera) L. Var. bidentata, Bl.) (A. Japon- ica, Nakai.)	根 葉	Ash 8%, Soponine.	1) 治脚氣、關節炎、痛風，并使腰脚之筋强健。 2) 又用於打撲症、切傷、癰症、腹痛等之疼痛緩和，并治間歇熱。 一次量 1—2gm 3) 作蔬菜用。	四川。 今處處有之。	其莖有節似牛膝，故以為名。 Achyranthes, 其意如麥稈之花，此花淡黃色，有似麥稈之光澤，bidentata, 有二齒之意，因有二齒尖銳宿存性小苞。
571.	莧 (本草27) (甲) 白 莧	Amarant- us. A. mango- stans, L. (A. polyg- amus, L.)	菜	KNO ₃ Vit. C ₅ , Protein 1.4%, Fat 0.2%, Cbhyd 2.2%, Ash 1.9%, Ca 0.32%, Fe 8mgm%,	1) 白莧為解熱劑。 2) 葉供食用。	栽培品。	莧之莖葉皆高大而易見，故其字從見，指事也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
	(乙) 紅 莧 別名： 雁來紅， 後庭花， 老少年， 錦西風， 赤 莧， 蕒。	<i>A. gangeticus</i> , L. (<i>A. tricolor</i> , L.) (<i>A. melanocholicus</i> , L.) (<i>A. tristis</i> , L.)	菜	Vit. C ₂ , Pretein 3.5%, Fat 0.2%, Cbhyd Ash 3.1%, Ca 0.46%, KNO ₃ 0.5%, Fe 23mgw%,	1)紅莧，治赤痢。 2)作蔬菜用。		
	(丙) 人 莧	<i>A. blitum</i> , L. (<i>A. sylvestris</i> , Desf.) (<i>A. oleraceus</i> , L.)	菜	KNO ₃			
	(丁) 野 莧 別名： 蝶蟹兒	<i>A. Viridis</i> , L.) (<i>A. Blitum</i> L. Var. <i>oleraceus</i> , Hook. f.) (<i>A. japonicus</i> , Sieb.) (<i>Euxalus</i> v., Moq.)	菜	Vit. C ₅ ,	1)供食用，尤適於妊婦之食用。 2)治眼疼。 3)能通便。		<i>A. inamo- enus</i> , Willd. forma <i>viridis</i> , Makino.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
	(戊) 紫 菀 別名： 老槍殼， 龍鬚。	A. candatus, L. (A. alopecurus, Hoch.)	葉	KNO ₃ Oxalates, Betaine.	紫菀，殺蟲毒， 治痢。		
572.	青 葙 (本草15) 別名： 草 蒿， 萋 蒿， 靛崙草， 野雞冠， 雞冠草。	Celosia argentea, L. (C. margaritacea, L.) (A. pyramidalis, Nor.)	藥	KNO ₃	1)花及根之陰 乾者，煎服 ，治熱性病 及月經不順 。 2)種子之煎汁 ，洗眼用。 3)治皮膚之瘡 疹及疥癬。 4)為強壯劑。	中部及南方各 省。 (印度原產)	子名青箱子 ，又名草決 明。
573.	雞 冠 (本草15) 別名： 鷄 頭， 鷄冠花。	C. cristata, L.	子， 花， 莖	Fatty oil	1)種子及花， 有止血止瀉 之效，能治 赤痢、痔漏 、子宮出血 、腸出血等 ，一次量 4—8gm。 2)治肝臟病及 眼病。	處處有之。 (印度原產)	以花狀命名 。

第九十九 藜 科 CHENOPODIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
574.	<p>萹 菜 (本草27) 別名： 著蓬菜， 甜 菜， 不斷草。</p>	<p>Beta vulgaris, L.</p>		<p>菜含 Saponins, Betaine, Phytoster- ine, Ash 12%, (Ca, Fe, Cu), Vits. A₁, B₁, C₁.</p>	<p>1)爲甜菜糖原 料。 2)在法國供酒 精釀造之用。 3)爲西餐中之 生菜食品(Salad)用 。</p>	<p>南歐地中海， 沿岸原產。</p>	<p>萹菜，即著 蓬也，萹與 甜通，因其 味也。 萹菜南人蒸 魚食之，大 香美。</p>
<p>(成分續)根含 Protein 2.2%, Fat 0.2%, Ash 0.6%, Sugar 10—18%, Soponin, Leucin, Isoleucin, Tyrosin, Betaine, Lysin, Arginine, Histidin, Phenylalanin, Urease, Tyrosinase. 子含 Saponin. (本新)</p>							
575.	<p>灰 藜 (本草27) 別名： 灰滌菜， 金鎖天。</p>	<p>Chenopod ium album, L.</p>	<p>葉 莖 子</p>	<p>Ess. oil, Leucin, Betein, Paracho- lesterin, Ash 4.9%,</p>	<p>莖葉搗爛，傳 疔瘡腫毒及虫 蠶蜘蛛等咬傷 ；煎汁含嗽， 治齒痛。</p>	<p>河北至湖北。</p>	<p>此葉莖葉上 有細灰如沙 ，而枝葉翹 翹故名。</p>
576.	<p>藜 (本草27) 別名： 萊，紅心 灰藜， 鶴頂草， 胭脂菜。</p>	<p>C. album, L.</p>	<p>葉</p>	<p>Betain, Leucin</p>	<p>乾葉煎汁含於 口中，治齒 痛。 生菜絞汁，治 毒蟲刺傷。 果實燒灰，和 麻油，塗小兒 頭瘡。</p>	<p>河北至湖北等 省。</p>	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
577.	地 膚 (本草16) 別名： 地 葵， 地 麥， 落 帚， 獨 帚， 王 簪， 王 帚， 掃 帚， 益 明， 涎衣草， 白地草， 鴨舌草， 千心妓女。 。	Kochia scoparia, Schrad. (Chenopo- dium s., L.)	葉 莖 子	Saponine.	為強壯劑及利尿劑，治淋疾及膀胱疾患， 一次量 6—10gm	湖北，四川， 陝西，河北， 山東。	地膚地麥，因其子形似也，地葵因其苗味似也，鴨舌因其形似也，妓女因其枝繁而頭多也，益明因其子功能明目也，子落則老莖可為帚，故有帚慧諸名。
578.	菠 薐 (本草27) 別名： 菠 菜， 波斯菜， 赤根菜， 鸚鵡菜， 鼠根菜。	Spinacia oleracea, L.		根含 Saponin 菜葉之普通 成分： Protein 1.6—2.4% Fat 0.2—0.3% Cbhyd 1.6—3.2% Ash 1.76 —2.00%，	1)為緩下劑，凡久病大便不通及患痔漏者，宜常之食。 2)為稀液分泌促進劑，通腸胃助消化。	菠薐菜，西部亞細亞原產，今各地均有。	菠薐種出自西國，有僧將其子攜來云本是頗陵國之種，語訛為波薐耳（劉禹錫嘉話錄）。 唐太宗時，尼波羅國（即尼泊爾）舊稱為廓爾喀，在西藏南喜馬拉雅山地），獻波薐菜即此也（唐會要）。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	---------	-----	-----	-----	-----

(成分續) (Ca...0.103, Fe...0.0195, Cu...0.0014, P...0.038, K...0.400)

Vits. A₂, B₁, C₃, G₂, K.

特殊成分: Spinatsecretin, Pentosan, Chlorophyll, Chlorophyllase, β -Carotin, Lecithin, Betaine, Stearines, Hentriacontan, Cerotinic acid, Linolenic acid, Malic acid, Citric acid, Urease, Peroxydase, Katalase, Amylase, Proteose.

【藥理】據別開爾(Bickel 氏云, 本品之浸膏, 對胃液胰液等, 有強分泌促進作用, 歸於 Spinatsecretin 物質之作用。

又本品對貧血症之恢復, 有顯著之促進作用。

【新藥】粉末菠薐草, 菠薐草素 (Spinacin) (有分泌增進造血作用)。

第 一 百 蓼 科 POLYGONACEAE

579.	蕎 麥 (本草22 別名: 花 蕎, 烏 麥, 花 麥。	Fagopyr- um esculent- um, Moench. (F.emarg- inatum, Meisn.) F. Vulgare Hill. Polygon- um, fagopyrum L.	葉: Rutin..... ...0.7%, Rhamnose Anthocy- an, Quercitrin Ca oxalate 莖: Rutin 0.1%, Rhamnose 果實: Pentose, Xanthoph- yll, Phlobaph- en.	為滋養強壯劑 , 製麵食用。	北方各省。	蕎麥之莖弱 翹而然易長 易收, 磨麵 如麥, 故曰 蕎回藜, 而 與麥同名也 。
------	---	---	---	-------------------	-------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(成分續) 種子: Protein 6.4%, (Arginin, Brolin, Cholin, Globulin, Glutenfibrin, Glutenin, Glutamic acid, Glycin, Histidin, Leucin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, Varin). Cbhyd 77.5%, (Starch 67%, Saccharose 1—2%), Fat 1.2%, Ash 0.9%, (P ₂ O ₅ ...0.45%, MnO ₂ ...0.106%, TiO ₂0.16%, Cu...0.7mgm%, Al), Vitamin B ₁ , Diastase, Lactase, Linase, Maltase, Phosphatide, Protease, Urease. (本新, 食植, 植研)			
580.	苦 蕎 麥 (本草22)	Polygonum thunbergii Sieb, et Zucc. var typicum Franch et Sav. (P. sinarum, Desr.)	根		1) 莖葉煎服, 治癩麻質斯。 2) 爲止血劑, 揉葉塗布之。	雲南, 甘肅, 河北, 湖北。	Fagopyrum tataricum Gaertn.
581.	蕎 蕎 薯 (本草16) 別名: 扁 竹, 扁 辨, 扁 蕓, 粉節草, 道生草。	P. aviculare, L.	根	Oxyanthra-chinon (gl.) Tannin Resin Wax Ess. oil Flavone Sugar 2.5%, Ash 2.44% Zn.	爲利尿止瀉驅蟲藥, 治黃疸、霍亂、腹痛、下痢、蛔虫等。 一次量 3—8gm 又治女子之除癩及痔。	河北, 湖北, 江西, 東北各省。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
582.	毛 蓼 (本草16)	<i>P. barbatum</i> , L. (<i>P. lapathifolium</i> , Ait. Var. <i>incanum</i> , Led.)	葉 莖	Pigment.	1) 治潰瘍及頸 淋巴腺炎， 研碎納瘡中 ，引膿生肌 。 2) 作湯洗，兼 洗足，治脚 氣。	福建，湖北， 四川，浙江。	毛蓼生山足 ，似馬蓼， 葉上有毛， 冬根不死（ 有毒）
583.	拳 參 (本草13)	<i>Bistorta</i> L. <i>R. viviparum</i> , L.)	根	Tannin 17%, Gallic acid Ca oxalate 1.1%, Starch 29.5%, Protein, 10%, Flavone, Pararabin, Phloroglucin, Oxy_methylantraquinone, Ellagic acid.	爲赤痢及口腔 炎之收斂劑。 又治慢性痔瘡 及腫瘍等。	河北，甘肅， 山東。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
584.	馬 蓼 (本草16) 別名： 大 蓼， 墨記草。	<i>P. Blumei</i> , Meisn.	葉 莖		1) 爲解毒劑。 2) 爲蛔蟲驅除劑。	下溼地。	凡物大者，皆以馬名之，俗呼大蓼是也。
585.	蛇 薺 草 (本草16)	<i>P. chinense</i> , (<i>Polygonum sinense</i> , Hook.) (<i>Ampelgoum chinense</i> , Lindl.)	根 葉	Indigo.	治蛇虺毒蟲等 螫傷，取根葉 搗傅咬處，當 下黃水。	山東，廣東， 四川。	
586.	虎 杖 (本草16) 別名： 苦 杖， 大蟲杖， 斑 杖， 酸 杖。	<i>P. cuspidatum</i> , S. et Z. (<i>P. Reynoutria</i> , Makino.) (<i>P. sieboldi</i> , Hort.)	根 莖	Polygonum (<i>Cuspidatum</i> .) Emodin 1.2%, Polydatosid, Anthraquinone, Wax. Yellow dye.	1) 爲利尿通經 淋病藥，并 治肋膜炎。 一次量 6—8gm 爲煎劑。 2) 爲鎮咳劑。	江蘇，江西， 湖北，四川。	杖言其莖， 虎言其斑也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
587.	赤地利 (本草18) 別名： 赤薜荔， 五毒草， 五 莢， 蛇 菔， 山蕎麥。	P. cymosum, Trev. (Fagopyrum c., Meisn.) (P. chinense, L.) (P. triangulare, Wall.) (P. volatile, Turcz.) (P. acutatum, Lehm.) (P. dibotrys, Don.)	根	Oxymethyl-anthraquinone.	1) 治赤白冷熱諸痢。 2) 取葉揉之，治手指之腫物。 3) 療癰疽毒瘡。 4) 治蟲蠶蛇犬咬傷，摩醋傅之。	山東，四川，南方各省。	
588.	蓼 (本草16)	(P. Hydro-piper, L.)	子 葉	Polygonic acid, Tannin, Ess. oil, Formic acid, Valerianic acid, Melissinic acid, Malic acid Gallic acid Phytosterine.	子實為利尿劑，治水腫及下諸瘡之毒用。 新鮮莖葉，以食鹽揉之，絞汁，治霍亂及日射病用。	湖北，江蘇，廣東，雲南，東北各省。	蓼類皆高揚，故字從蓼，(高料)，高飛貌。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
589.	水 蓼 (本草16) 別名： 虞 蓼， 澤 蓼。	Polygonum Hydropiper, L. forma aquaticum Mak.	莖 葉	Phytost- erine.	1) 爲解熱利尿 藥。 2) 捕魚用。 3) 爲臭蟲驅除 藥。	湖北，江蘇， 雲南，廣東， 東北各省。	生於淺水澤 中，故名水 蓼。
590.	蠶 繭 草 (本草16)	P.japonicum, Meisn.	草 葉		諸蟲如蠶類咬 人，恐毒入腹 ，煮服之，亦 掃傳諸瘡。	湖北，江蘇。	
591.	何 首 烏 (本草18) 別名： 交 藤， 夜 合， 地 精， 陳 知 白， 馬 肝 石， 桃 柳 藤， 九 真 藤， 赤 葛， 瘡 帶， 紅 內 消。	P. multiflorum, th. (P. chinense, Houtt.) (Pleuropterus, cordatus, Turcz.)	根	Oxymeth- ylanthra quinone 衍化物 1.8%, Lecithin 3.7%, Starch 45%, Fat 3%, Ash 4.5%, (本新，植 研)	1) 爲強壯劑， 治神經衰弱 老衰、腦病 ，肺病等。 2) 治佝僂病、 腺病、癰疽 及頸淋巴腺 炎。 3) 生藥貼腫物 ，有吸膿之 效。 4) 因含Anth- raquinone 衍化物，能 整調消化器 ，減輕病勢 。	江蘇，廣東， 四川，湖北， 福建建甯。	昔何公（何 係順州南河 縣人）服此 藥，有奇效 ，白髮變黑 ，故號何首 烏。 Polygon- um 多節之意， Multiflor- um 多花之意。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
592.	薺 草 (本草16) 別名： 鴻 鵠， 龍 古， 遊 龍， 石 龍， 天 蓼， 大 蓼。	P.orientale, L. (P. pilosum, Roxb.) (P. cochinchinensis, Meisn.) (Lagunea c., Laur.) (P. hispidum, Kth) (P. Dioscoridis Wallr.)	子，莖，葉，花		莖葉，治疝氣去癍，葉醫毒蟲咬傷，果實去熱，治煩渴及頸淋巴腺炎。 花止痛消食。		此蓼甚大，而花亦繁紅故曰薺白鴻，鴻亦大也。
593.	紫 參 (本草12) 別名： 牡 蒙， 童 腸， 馬 行， 衆 戒， 五鳥花。	P. tenuicaule, Biss. et mre.	根	Tannin 19.7%	利大小便，治癰腫諸瘡，療吐血衄血。	河北，山東，甘肅，東北各省。	
594.	藍 (本草16) 別名： 大 青	P. tinctorium, Loar.	藥汁	葉含靛原質(Indican)，浸於水起加水分解後，氧化成靛(Indigo)，鹼性還元劑還元，成靛白(Indigo white)。	葉為染料。子為解熱及解毒藥(乾葉煎服)，蜂等毒蟲所刺者，以葉汁塗之，有效。	山東，四川，廣東。	因其莖葉，可染青色，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
595.	金 絲 草 (本草13)	P. Virgini- anum L. (P. filifor- me Th.) (P. virgin- icum, L.)	草		1) 爲止血劑， 治吐血、咳 血、下血、 血崩。 2) 爲消腫藥， 療癰疽疔腫。 3) 治瘴氣。	江蘇，江西， 福建，廣東， 湖北，四川。	
596.	海 根 (本草16)	P. virgini- cum, L. Var. filiforme Nakai.	根		治霍亂腹痛， 燕毒、癰疽惡 腫；蛇咬，和 酒及水磨服并 傅之。	浙江會稽。	
597.	大 黃 (本草17) 別名： 黃 良， 將 軍， 火 參， 膚 如。	Rheum officinale Baill. R. palmat- um, L. R. undula- tum, L. R. tanguti- cum. Tschirch.	根 莖	根莖含 Chryso- ph- anic acid, Rheo-emo- -dine, Rhein 以上五種， 約含 10%。 Rheochry- sin,	爲健胃緩下瀉 藥， 一次量 0.5—3gm 爲丸散或煎劑 服之。(爲緩 下藥時，取浸 膏 0.5—1gm ，作成丸劑或 水劑後用之) 。生根搗碎，與 醋混和，用於 癰風白癬等有 效。	四川，陝西， 甘肅，山西， 河北。	大黃，其色 也，將軍之 號，當取其 駿快也。 Rhem 爲希 臘古名 Undulat- um 爲波狀 之意。 因其葉形成 波狀也。

(成分續) Rheochrysodin, 有瀉下作用。

Aporetin, Erythroretin, Rheoretin 三種樹脂物質, Catechine, Glucogalline, Tetrarine, Rheosmine, Cinnamic acid, Gallic acid, Tannin, Verosterol, Anthraquinone 15%, Pentosan, Arabinose, Glactose, Glutamin, Oxydase, Alizarin, Flavonæ, Ca oxalate.

葉含 Oxymethylantraquinone 0.6%, Oxalic acid 4.2%, Ca oxalate 4.1%, Malic acid, Citric acid.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
<p>【藥典】大黃，大黃浸膏，大黃糖漿，複方大黃丸，小兒散，重曹大黃散，大黃酊，水性大黃酊，複方蘆薈酊。</p>							
598.	酸 模 (本草19) 別名： 山羊蹄， 山大黃， 蓆， 酸 母， 菴 蕪， 當 藥。	Rumex acetosa, L.	根 莖葉	Oxymethyl authraqu -inone, Chrysopa -nic acid, KH oxala- te, Chloroph- yllase, KHoxala- te, Vitamine C.	1)取根搗碎， 或搾汁，治 疥癬等皮膚 病。 2)解突然所發 之熱及腹部 膨脹（可服 生根之汁） 。	江蘇，湖北， 東北各省。	酸模乃酸母 之音轉，以 味而名。
599.	羊 蹄 (本草19) 別名： 秃 菜， 敗毒菜， 蓄， 牛舌菜， 羊 蹄， 大黃， 鬼 目， 東方宿， 連蟲陸， 水黃芹。	R.crispus, L. (R. japon- icus Meisn.)	根： 葉： 莖葉	Emodin Chrysopa -nic acid, Anthraqui -none, Tannin Ess. oil Ca oxalate Emodine Brassidin- ic acid,	1)治頭秃疹癬 等皮膚病， 取生根搗碎 或搾汁塗之 。 2)為緩下劑， 大黃代用品 。 一次量 5gm	河北，河南及 各地均有。	羊蹄以根名 ，牛舌以葉 名，秃菜以 治秃瘡名也 。

第一百零一 馬兜鈴科 ARISTOLOCHIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
600.	馬兜鈴 (本草18) 別名： 都淋藤， 獨行根， 土青木香， 雲南根， 三百兩， 銀藥。	Aristolochia bebilis S. et Z. (A. recur- vilabra. Hce.) (A. conto- rta. Bunge.)	實 根		1) 爲鎮咳祛痰 解熱藥，治 喘息氣管支 炎及失聲， 劑量一次 1-3gm 2) 外用治痔出 血及肛門周 圍腫脹。 3 爲毒蟲毒蛇 之解毒藥。		本品蔓生附 木而上，葉 脫時，其實 尚垂，狀如 馬項之鈴， 故名。
601.	杜 衡 (本草13) 別名： 杜 葵， 馬蹄香， 土 鹵， 土細辛。	Asarum Blumei, Duch.	根	Ess. oil 1.4%, (Safrol, Eugenol.)	爲鎮咳祛痰利 尿藥，治氣管 支炎，喘息水 腫者。 劑量一次 1-2gm	浙江	杜衡葉似葵 ，形似馬蹄 ，故俗名馬 蹄香。
602.	細 辛 (本草13) 別名： 小 辛， 少 辛。	Asarum, Sieboldi, Miq. (朝鮮種) Asarum, Blumei Duch. (中國種)		Eudesmin Pinosesin- ol, Sesamin, l-Asarinin Ess. oil 3%, (Methyl- eugenol,	爲喘咳及癱麻 質斯之要藥， 并治頭痛及眼 球齒牙關節疼 痛，由咽喉炎 所起之嚔下困 難，慢性胃炎 之作酸嗜雜， 由鼻粘膜所起 之嗅覺消失等 。 一次量 1-2gm 一日3次	陝西華陰，浙 江東陽、臨海 ，福建永安余 荆山，朝鮮， 東北各省。	因其根細而 味極辛，故 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
							(成分續) Asarylketon, Phenol, Pinen, Eucarvon, Safrol, Palmitic acid.
							【藥理】細辛之藥效，歸功於所含精油之鎮靜作用。

第一百零二 蛇菰科 BALANOPHORACEAE

603.	瑣 陽 (本草12)	Cynomorium coccineum L. Balanophora fungoaa, Bunge.	草		強壯，益精， 利大便。	四川，湖北， 甘肅肅州，東 北各省。	銷陽生韃靼 田地，野馬 或與蛟龍遺 精入地，久 之發起如筍 ，上豐下儉 ，頗似男陽 ，故名。
------	---------------	--	---	--	----------------	--------------------------	---

第一百零三 桑寄生科 LORANTHACEAE

604.	桑上寄生 (本草37) 別名： 寄 屑， 窠 木， 童 宛， 葛。	Loranthus yadoriki S. et Z.			1) 為強壯劑， 安胎藥及消 腫藥，并有 催乳作用。 2) 為鎮靜催吐 通經藥。	河北，四川。	
605.	柳 寄 生 (本草37)	Viscum album L.	汁	Viscin, Inosite, Saponine, Phenylet- hylamin,		北方及中部各 省。	此即寄生於 柳上者。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	----------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Cholin, Propionylcholin, Acetylcholin, Caoutchouc, Galactan, Cerylalcohol, Urson, Fat (Arachic acid, Myristic acid), Alkaloide, Glucoside.

第一百零四 檀香科 (白檀科) SANTALACEAE

606.	白 檀	Santalum album, L.	木 部	Ess. oil 【Santalol, Santalal, Isovaleraldehyd,	1) 爲白檀油原料。 2) 爲香料用。 3) 治淋病。	東印度，東爪哇，蘇門答臘，馬來羣島，婆羅洲，暹羅，雲南。	
------	-----	--------------------	-----	---	-----------------------------------	------------------------------	--

(成分續) Norcamphen (Santen), Santalen, Teresantalol, Norisoborneol, Santalon, Teresantal acid, Lactone】.

【藥典及準藥典製品】 白檀油，薩羅白檀油膠囊。

【新製劑】 Allosan, Blenal, Bersanang, Camphosan, Gonocystol, Gonorol, Gonosan, Heidesan pillen, Hexos, Kawakavin jasper, Kawasantal, Noiol Pageol, Piconal, Pulsan, Sangonol, Santacol, Santal Perle, Santol, Santyl, Salosantal, Thyresol.

607.	百 蕊 草 (本草12) 別名：金引草	Thesium, Chinense Turcz.	莖 根	取莖葉之乾燥者煎服，治頭瘡及頸淋腺炎等。	原野甚多，寄生植物，往往附着於其他活植物之根上。產於四川及陝西等省。	本品形似瓦松，莖葉俱青，有如松葉而無花生於地下，與瓦松有別。	
------	---------------------------	--------------------------	-----	----------------------	------------------------------------	--------------------------------	--

第一百零五 蕁麻科 URTICACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
608.	苧 麻 (本草15)	Boehmeria nivea Hk. et Arn. (Urtica n., L.) (U.utilis, Hort.) (B.tenaci- ssima Roxb.)	葉 根	Chlorogen acid.	1) 根搗碎與蜜 混，去毒清 血散熱，治 淋病消渴。 2) 葉爲止血劑 ，治創傷出 血瘀血。 3) 爲安胎藥。 4) 皮之纖維爲 織物用。	福建，廣東， 浙江，陝西， 四川，雲南。	苧麻作紵， 可以績紵， 故謂之紵， 凡麻絲之細 者爲經，粗 者爲紵。
609.	赤車使者 (本草14) 別名： 小錦枝	Elatostem. ma umbellat. um, Bl Var. majus Max. (E. japon- icum, Wedd.) (Procris umbellata S. et Z.) (Pellionia u. Wedd.)	根		爲驅風藥。	湖北，四川， 雲南。	

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
610.	水 英 (本草16) 別名： 魚津草	<i>Pilea</i> sp.	葦 葉 果 根		治骨風。	浙江，廣東， 四川，湖北。	此草原生池 澤及河海邊 ，故名。
611.	蓴 麻 (本草17) 別名： 毛 蕨	<i>Urtica</i> <i>Thunberg-</i> <i>iana,</i> <i>S. et Z.</i> (<i>U. dioica,</i> <i>Thunb.</i>)	嫩毛 葉	Formic acid, Acetic acid, Butyric acid, 不含氮刺激 性酸性物質 <i>Urticin</i> <i>Lutein.</i>	1) 遇蛇咬生葉 搗汁塗之。 2) 風疹初起時 ，點汁可一 夜消失。 3) 痛痛時煎草 沐浴有效。	江蘇，湖北， 雲南，四川， 貴州。	觸蓴麻之嫩 毛即發泡， 且疼痛。 歐洲民間藥 ，為糖尿病 藥。

第一百零六 桑 科 MORACEAE

612.	波 羅 蜜 (本草31) 別名： 囊伽結	<i>Artocarp-</i> <i>us</i> <i>integrifol</i> <i>-ia,</i> <i>Forst.</i> (<i>Polyphe</i> <i>ma Jaca,</i> <i>Lour.</i>)	瓢 核 仁	Vitamiu C ₁ , Sugars 19%, Ash 0.94%, Yellow dye, Morin, Cyanoma- claurin.	1) 瓢止渴、解 煩、醒酒、 益氣、令人 悅澤。 2) 核仁補中、 益氣、令人 不飢。	福建，廣東， 雲南。 安南，波斯。	波羅蜜，梵 語也，因此 果味甘，故 借名之。
------	-------------------------------	---	-------------------------	--	---	-------------------------	---------------------------------

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
613.	楮 (本草36) 別名： 穀， 穀 桑。	Brousson- etia Papyrifera Vent. (Streblus cordatus, Lour.)	皮 葉 子 莖	Lignin 4.75%, Ca CO ₃ Cerotinic acid, Lipase, Amylase, Protease, Zymase.	1) 楮實為強壯劑。 2) 白皮為利尿劑，治水腫，利小便。 3) 皮為織布及製紙原料。	河北，湖北， 浙江，江蘇， 廣東。	楮本作杓，其皮可織為紵故也。
614.	大 麻 (本草22) 別名： 火 麻， 黃 麻， 漢 麻， (雄) 菜 麻， 牡 麻， (雌) 苴 麻， 苧 麻。	Cannabis sativa, L. (C. chine- nsis, Del.)	種子 花： 雌本 全草	花： Caurabin, Canrabin ol, (以 上樹脂)， Fat. Wax, Choline, Ess. oil, Ash 15%, 葉： Carotin 0.2%,	1) 全草為鎮痛鎮靜催眠劑，治胃痙攣，偏頭痛，喘息，用0.2—1.5gm為散劑。 2) 為熏烟劑。	山東，河北， 湖北，東北各 省。 (印度原產)	麻從兩尤在 广下，象屋 下派麻之形 也，尤晉派 ，广者儼， 漢麻者，以 別胡麻也。

(成分續) Ess. oil, Ca malate, Bitterstoff.

種子: Protein 19%, Fat 31%, Ash 5%, Ess. oil, Vit. E₂, Lecithin, Phytin, Phytosterine, Linolenic acid, Glycuronic acid, Inosite, Edestin, Muscarin choline, Trigonelli e.

【藥典】 印度大麻草，印度大麻酊，印度大麻浸膏。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
615.	栝 (本草36)	Cudrania triloba Hce. (C. tricus- pidata, Bur.) (Maclura t. Carr.)	木 根 皮		木白皮，根白 皮，為強壯劑 ，治洩精。 葉作飼蠶，取 絲作琴瑟，清 響勝常。	山東，廣東， 中部各省。	栝生於山石 中，故字從 石。
616.	奴 栝 (本草36)	C. triloba, Hce.	刺		其刺，治老婦 血癥，男子疝 癖。 葉可飼蠶。	山東，廣東， 中部各省。	此樹似栝而 小有刺。
617.	無 花 果 (本草31) 別名： 映日果， 優曇鉢， 阿 𪗇。	Ficus (arica L. (F. hirta S. et Z.)		果實： Water 80%， 乾燥物：— Water 28%， Dextrose 50%， (Sucrose 5%， Pentosan 3.96%)， Citric acid,	1) 乾果焙為粉 末，為咖啡 之代用品， 鮮品為無花 果醬。 2) 煎汁治痔疾 (洗滌罨包)。 3) 乳汁去疣， 又為殺虫藥 ，治腸內奇 生虫。 4) 乾果緩下。 5) 葉殺虫。	江蘇，浙江， 福建，廣東， 廣西，雲南， 湖北。(原產 ：地中海沿岸 ，土耳其，波 斯)。	本品不花而 實故名。 梵語 Anjira

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Malic acid, Acetic acid, Cerotic acid, Lecithin, Vits, A, C, Feptoe, Peroxytase, Amylase, Ash 2.5%(H₃BO₃...0.0022%, Mn O...0.068%, TiO₂...0.080%).

未熟之果實: Caoutchoc, Cradin (配布通化酵素), Cerin.

藥: Pepsin, Papain, Tyrosin, Glutamin, Cerotinic acid, Stigmasterin, Phytosterin, Sitosterin, Urea, Peroxydase, Amylase, Cradin, Ash...8.26%.

【製劑】 無花果糖漿, 複方無花果糖漿, 鎮咳果實等。

【新藥】 Caricin, Califig.

618.	天 仙 果 (羣芳譜)	Ficus erecta, Th. (F. pumila Thunb.) (F. japon ica Bl.)	果實	Glucose. (植研, 食 植)	果實含葡萄糖 甚富, 適於生 食, 又治痔疾 有效; 樹皮之纖維, 為造紙原料。	生於暖地之海 邊。	
619.	木 蓮 (本草18) 別名: 薛荔, 木餛頭, 鬼餛頭, 石 蓮。	F. pumila, L. (F. stipul- ata Thunb.) (F. Hance- ana, Max.) (F. erecta Auct.) (Tenarea heteroph- ylla Gasp.	種子皮部含 凝膠質約13 %, 加水分 解成 Glucose, Fructose, Arabinose. (植研)	葉治背瘡(取 葉絞汁, 和蜜 飲數升, 以滓 傅之即癒)。 藤汁, 壯陽固 精, 消腫散毒, 止血下乳, 治 久痢腸痔及 惡瘡疥癬一切 癰疽。 取其果實之種 子, 用已冷却 之沸水洗之, 成凝膠狀物, 為夏令之清涼 飲料。	木蓮延樹木垣 牆而生, 四時 不凋, 厚葉, 莖強, 大於絡 石, 不花而實 如蓮蓬而 梢長。	木蓮餛頭, 象其實形也 。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
620.	葎 草 (本草18) 別名： 勒 草， 葛勒莖， 麥苗草。	<i>Humulus japonicus</i> S. et Z. (<i>H. aculeatus</i> , Nutt.) (<i>H. lupulus</i> , L.)	莖 草	Ess. oil Tannin Resin	爲苦味健胃藥。 。一次量 1—2gm 爲香蛇麻腺 (Lupulin 忽布)之代用品 供麥酒(啤酒)釀造用(苦味原料)。		此草莖有細刺，善勒人膚，故名勒草，訛爲葎草。
621.	桑 (本草36) 別名： 子名椹	<i>Morus alba</i> L. (<i>M. indica</i> L.) (<i>M. constamtino-politana</i> , Poir.) (<i>M. bombycis koidz.</i>) (<i>M. nigra</i> , L.)	桑 椹 根 白 皮	桑椹：普通成分 Water84.71% Invertsugar...9.19% Acid1.86% Protein0.36% Ash 0.66% 特殊成分： Glucose, Fructose, Tannin, Malic acid Succinic acid,	1) 桑根白皮用爲水腫之利尿藥，又爲喘咳之祛痰藥，一次量4.5—9gm 外用縫金瘡傳爲口瘡。 2) 桑葉爲蠶之飼料，桑葉煎汁蒸膏服，去老風及宿血；又治手足麻木不知痛癢，採霜降後桑葉，煎湯頻洗。 3) 桑椹(即桑實)清涼止渴，製酒，利尿消腫。	東亞原產。	徐鍇說文云桑若，東方自然神木之名，其字象形，桑乃蠶所食葉之神木，故加木於桑之下而別之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(成分續) Antocyan (紫黑色色素), Vits A, B.			
	桑葉 (風乾物)			Adenine, Choline, Trigoneline, Asparagin acid, Invert sugar...4%, Pentosan...7.3%, Galactane...2.5%, Tannin, Pectine...9.12%, Carotin, Chlorophyll, Xantophyll, Amylase. Ess. oil (Iso-Butyl aldehyde, Hexenal, Hexenol) Vit C ₃ Mn ₃ O ₄ , MnO ₁ TiO ₂ .			

第一百零七 榆 科 ULMACFÆ

622.	榆 (本草25) 別名： 白者名粉 ，零榆。	Ulmus campestris L. (U. slnensis)	內皮含 Starch, Mucilage, Tannin 3%, Sitosterin, CaO, Phytoster- in, Phlobaph- ene Stigmaste- rin. 葉含 Hexylen- aldehyde, BaSO ₄ 核仁含 Fat 26% (Butyric acid, Capric acid.) Lipase. (本新)	1) 榆白皮為利尿劑及下劑，又分晚時服之則出羊水， --次量 2—5gm 2) 樹皮治疝氣、祛痰及解毒藥。 3) 為粘滑性強壯劑。 4) 榆仁醬，利大小便，殺諸虫，但不能多食。	河北，湖北， 陝西，甘肅， 東北各省。	王安石字說云，榆審俞柔，故謂之榆。
------	------------------------------------	--	--	---	---------------------------	-------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
623.	蕪 莢 (本草35) 別名： 蕪 莢， 無 茹， 蕪 蕒。	U. macro- arpa. Hce.	子		蕪莢仁及蕪莢 醬，為驅蟲劑 ，治小兒疳疾 及體內寄生蟲 ， 一次量 2--6gm	河北，東北各 省。	有刺，實為 蕪莢。
624.	榔 榆 (本草35)	U. Parvif- olia. Jacq. U. Pumila H. & A.) (U. Chine- nsis pers) (U. Chine- nsis Loud) (U. Virga- ta Roxb) (Planera Parvifolia Sweet.) (Micropt- elia p., Spach.)	皮		皮為利尿劑， 下熱淋，利尿 道。	江蘇，湖北， 福建。	狀如榆，其 皮有滑汁， 秋生莢如大 榆。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
625.	檉柳 (本草35) 別名：檉柳， 鬼義。	Zel ova acuminata Planch. (Ulmus Keaki sieb.) (Z. sinica Schneid.) (Z. keaki Maxim.) (Planera jap nica, Miq.) (P. acumi- nata, Lindl.) (Corychor- us hirtus, Thunb.)	葉 皮		皮為退熱劑， 治頭痛，又為 鎮痛劑，治妊 婦腹痛。 葉治大爛瘡， 腫爛惡瘡。	江蘇，浙江。	其樹高舉， 其木如柳， 故名。

第一百零八 山毛櫸科 (殼斗科) FAGACEAE

626.	栗 (本草29)	Castanea vulgaris, Lam. (C. sativa mill.) (C. japon- ica Blume.)	果 實	Protein 5.7% Fat 2.0% Cbhyd 62% (Starch 25% Saccharo- se,	栗樹皮，在工 業上，為染料 及鞣皮料用。 葉之煎汁，對 裝所腐蝕者， 為洗滌劑用。	浙江會稽諸暨 ，山東兗州， 河北天津良鄉 。	栗說文作栗 ，從齒，音 條象花實下 垂之狀也。
------	-------------	---	--------	---	--	---------------------------------	----------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		(C. chinensis assk) (C. vesca Gaertn) (C. pubinervis schneid) (C. crenata S. et Z.) (Fagus castanea, L.)	花 皮 葉	Glucose, Pentosan) Vit. B ₁ , Lipase, Arginine Quercetin Pigment Carotin)			
627.	柯 樹 (本草35) 別名： 木 奴	Pasania cuspidata Derst.) (Quercus, c., Thb.)	皮		白皮治大腹水 病。	江西，江蘇， 廣東，湖南， 福建。	波斯家用， 木為船舫。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
628.	橡 實 (本草30) 別名： 橡 斗， 皂 斗， 櫟 棧， 柞 子。	Quercus Bungeana, Forbes. (Q. chine- nsis, Bge.) (Q. serrata Th. Var. Chinensis, Wenz.)	果 葉 皮 根皮		實爲健胃劑， 收斂劑，治血 痢不止、痔瘡 出血、下痢脫 肛；又治惡瘡 癰腫。	所在山谷皆有。	
629.	櫟 (廣羣芳 譜) 柞， 榧。	Q.serrata, Th. (Q.acutis sima, Carr.)			1)樹皮爲鞣皮 染料用，嫩 葉及殼斗， 亦爲染料之 用，種子可 食，葉供野 蠶之飼料用 。 2)樹皮煎之， 爲收斂劑， 治疝氣、淋 病、痢疾； 又煎湯沐浴 ，治惡瘡。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
630.	懈 實 (本草30) 別名： 懈 檄， 槎 檄， 大葉檄， 檄榿子， 枹。	Q.serrata, Th. Q.dentata Th. (Q.obova. a, Bg.) (Q.yunn nanensis, Fr.) Q.glandu- lifera, Bl.	仁		1)本品烘焦成 粉末，和熱 湯沸，加砂 糖，對腺病 患者及佝僂 病小兒，供 食品用。 2)葉治腫物， 驅除蠶虫， 又治淋病之 赤尿。 3)樹皮為鞣皮 及染料用。	河北，陝西， 雲南，東北各 省。	
631.	橘 子 (本草30) 別名： 苦橘子， (附) 鈎栗， 別名： 巢鈎子， 甜榿子。	Quercus sclerophy lla, Linde. (Q.cuspi- data, Th. var. sinensis, DC.)	核 皮 葉		1)本品作粉食 饑食，為滋 養品。 2)為收斂劑， 止渴止洩痢 。	四川，廣東， 中部各省，處 處山谷有之。	鈎栗為滋養 強壯劑。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
632.	無食子 (本草35) 別名： 沒石子， 墨石子， 麻茶澤。	Oak galls from Quercus infectoria Oliv	子	Tannin 60%， Gallic acid 2%， Ellagic aci l, Cyclogalli. pharic acid, Glucose, Sugar, Pektase, Starch, Ash 2%	1)爲收斂劑， 治赤白痢、 血痢不止、 小兒久痢、 產後下痢。 2)治牙痛。 3)爲製造鞣酸 之原料。	阿刺伯，波斯。	波斯人每食 以代果，故 番胡呼爲沒 食子。

第一百零九 樺木科 BETULACEAE

633.	樺 木 (本草35) 別名： 檣	Betula (a)B. chin -ensis Maxim. (b)B.alba, L. Var. vulga is Regel.) (c)B.utilis Don.	皮	Tannin, Fat.	皮治黃疸及乳 癰腐爛，小便 熱短，染黑鬚 髮。	北部及西部各 省，東北各省 ，四川，湖北 。	畫工以皮燒 烟燻紙，作 古字，故名 檣，俗省作 樺也。
------	---------------------------	---	---	-----------------	----------------------------------	---------------------------------	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
634.	榛 子 (本草30) 別名： 栗	Corylus, heterophylla, Fisch. (C. Avellana, Baker.) C. mandshurica. Max. (C. rostrata, Ait Var.)	仁	Protein 16.2%, Fat 50.6%, Cbhyd 16.5%, Ash 3.5%,	爲滋養品，健胃劑。	陝西，甘肅， 四川，浙江。	此果關中甚多，關中，秦地也，榛之從秦，蓋取此意。

第一百一十 胡桃科 JUGLANDACEAE

635.	胡 桃 a. (本草30) 別名： 羌 桃， 核 桃， 播羅子， (梵書) 唐楸子， 陳平珍果， 陳倉胡 桃， 油胡桃。	Juglans regia, L. (Wil.) Var. Sinensis, D. C. (J. regia, Lour.) (J. japonica, Sieb.)	核仁： Protein 15.5%, Fat 63.2%, Cbhyd 10.4%, Ash 1.5%, (Mg, Mn, Ca PO ₄ , Fe), Vits A ₁ , B ₂ , C, E ₁ ,	核仁：內用爲滋養強壯劑，鎮咳劑，或用於感冒及風溼症，所搾取之脂肪油，稱胡桃油，爲下劑及驅蟲除藥；外用爲皮膚病藥，治疥癬凍瘡，腋臭。 藥：內用治粘液漏，外用煎汁爲腺病性眼炎之罌布劑。果皮：爲染髮劑及梅毒等之淨血劑。	山東青州關裏，河南，陝西。 德國及瑞士藥典，採用胡桃葉；法國藥典採用油及假果皮。	此果外有青皮肉包之，其形如桃，胡桃，乃其核也，本出羌胡，漢時張騫使西域，始得種還，植之秦中，漸及中土，故名之。
------	---	---	---	---	---	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	---------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Lauric acid, Myristic acid, Arachidic acid, Linolenic acid, Sitersterin, Phytosterin, Phytin, Lecithin, Juglansin, Oxydase.

青皮: Juglon, Hydrojuglon, Ellagic acid, Citric acid, Malic acid, Emulsin, Tannin, Peroxidase, Ash 7%.

果殼: Xylan, Ash 10%, (Fe 6.9%, Mn 0.8%).

根皮: Juglon, Tannin, Saponin, Paraffin, Fats.

葉:Tannin, Inosit, Juglon, Ess. oil

【新藥】 Juglin (皮膚病腋臭劑), Jugol (妊娠嘔吐治療劑)。

b.	山 胡 桃 (羣芳譜) 山核桃	J. mandsh. urica Max. (J. cathayensis Dode.) (J. sieboldiana, Maxim.)			核仁可供食用，又榨油用，果殼製活性炭用，木材供建築及器具之用，樹皮供染料用。	四川，浙江餘杭，東北各省。	本品為胡桃屬，多生於山地，故名。
636.	櫻 香 (本草34) 別名： 兜婁婆香， 化香樹。	Platycarya strobilacea, S. et Z. (Fortunaea chinensis, Lindl.)	根		嫩芽可供食用；果實可染黑色，有香氣，燻烟可以驅蚊。根治頭癩肺毒，葉投於水中，供捕魚之用。	中部各省。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
637.	必 栗 香 別名： 花木香， 麝 香。	<i>P. strobil- acea</i> S. et Z.	木		爲殺虫劑，能殺虫魚。	生高山中。	

第一百十一 楊梅科 MYRICACEAE

638.	楊 梅 (本草30) 別名： 杭 子	<i>Myrica rubra</i> , S. et Z. (<i>M. sapida</i> Wall.) (<i>M. nagi</i> , DC.) (<i>Morella</i> r., Lour.)	皮 果 實	Myricitrin 及其分解物 Myricetin, Tannin, Rhamnose Vit. C ₁	1) 皮爲收斂劑，治下痢及打撲症。 2) 爲殺虫藥，解毒藥，又爲黃色焦茶色之染料。 3) 果實供食用。	浙江，江蘇，江西，安徽，湖南，福建，廣東，廣西。	果實之形如水楊子，其味如梅故名。 Myricitrin 及 Myricetin, 有腎臟直接作用及由心臟之充進，並有強力利尿作用。
------	-----------------------------	--	--------------	---	---	--------------------------	--

第一百十二 楊柳科 SALICACEAE

639.	柳 (本草35) 別名： 小 楊， 楊 柳。	<i>Salix babylonica</i> L.	藥	Salicinase Vit. C	藥治漆瘡、湯火瘡、惡瘡及丹毒；枝及根白皮，爲消腫藥，亦治齒痛。	處處有之。	楊枝硬而楊起，故謂之楊；柳枝弱而垂流，故謂之柳。
------	------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	---------------------------------	-------	--------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
640.	白 楊 (本草35) 別名：獨 搖	Populus tremula, L. Var. villosa, Wesm.	皮 葉	Salicin, Silicase, Populin Corticin Tannin Pectin Ca malate Ash 3.3%, (Ca, Fe, Si,) Salicin Ash 8.87%, (Ca, 4.4% Fe 0.2%)	木皮去風痺宿 血，折傷血滲 ，在骨間痛不 可忍及皮膚風 癢脚氣腫等症 。 又治口瘡及牙 痛。 葉治齲齒。	北方各省。	木身似楊微 白，故曰白 楊，因風獨 搖，故亦名 獨搖。
641.	水 楊 (本草35) 別名：青 楊， 蒲 柳， 蒲 楊， 蒲 移， 移 柳， 菴 苻。	Salix purpurea, L. Var. serica, Wimm.	葉 莖 內皮 根	Salicin. Populin. Salipurposid. Salicin, Salipurposid.	皮內用為解熱 健胃苦味藥， 又其煎汁，為 骨膜炎、腫物 打撲傷等之罌 包劑； 葉之絞汁，亦 為腫物等之罌 包劑，乾葉為 米櫃或書箱之 害虫防止劑。	山東，河北。	楊枝硬而楊 起，故謂之 楊，多宜水 淡蒲菴之地 ，故有水楊 蒲柳菴苻之 名。

第一百十三 金粟蘭科 CHLORANTHACEAE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
642.	及 已 (本草13) 別名： 獐耳細辛	Chloranthus serratus, R. et S. (Nigrina S., Thunb.)	根		治頭暈目赤， 一切瘡疥及牛 馬諸瘡，可煎 汁浸并傳之。	生山谷陰虛軟 地，其草一叢， 莖頭四葉， 隨着白花，根 似細辛有毒。	本品浸汁， 調瘡疥膏， 甚有效驗。

第一百十四 胡椒科 PIPERACEAE

643.	南 藤 (本草18) 別名： 丁公藤， 丁公寄， 丁 父， 風 藤， 石南藤。	Piper aurantia- cum, Wall. (Chavica Wallichii Miq.)			1) 爲強壯劑。 2) 爲驅風藥。 3) 治喉咳。 4) 止金瘡痛。	安徽，江蘇， 湖南。	生依南樹， 故號南藤， 始因丁公用 有效，故又 稱爲丁公寄 ，丁公藤。
644.	蒟 醬 (本草14) 別名： 蒟 子， 土華茛， 扶惡土， 婁 藤。	P. Betle. L. (Chavica B., Seem.,) (P. Fuku- kudzura, Sieb.)	藥	Ess. oil 1%, (Chavicol, Chavibetol) Betelph- enol, Allylbenz. catechin) Caryophy- llen, Cineol, Eugenol, Menthon.) Vit. C1, Starch.	1) 爲健胃止瀉 祛痰藥。 2) 爲嗜好品。	廣東，廣西， 雲南，四川， 台灣及熱帶諸 地。	蒟子可以調 食，故謂之 蒟醬。 印度語： “Pan”

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
645.	畢澄茄 (本草32) 別名： 毗陵茄子	P. Cubeba L. f. (Cubeba officina- lis Miq.)	果 實	Ess. oil (Terpen, Cadinen, Cæren, Cineol, Camphen Cubeb camphor, Pinen, Dipentene Sabinen, Tu. pinen- ol, Azulene.) Cubelin, Cubebic acid, Resin, Gum, Fat, Starch.	爲利尿劑及防 腐劑，治淋疾。 。 一次量 2—3gm 爲散劑，丸劑 ， 祇劑。 【藥典】畢澄茄 實，畢澄茄浸 膏。	廣東，海南， 爪哇，印度， 西印度。	畢澄茄，毗 陵茄子，皆 番語也。
646.	草 茛 (本草14) 別名： 草 發， 阿梨訶陀 。	P.longum, L. (Chavica Roxburgh. ii, Miq.) (P. officina- narum, DC.)	果 實	Piperine 5%, P.peridine Ess. oil 1%, (Cadinen Aldehyde)	1)爲健胃劑， 止瀉劑，與 奮劑， 一次量 1—2gm 2)爲殺蠅藥。 3)爲香辛料， 飲食物加味 用。	廣東，廣西， 琉球，馬來半 島，印度。	印度語 Pippala, (Sans.) Peeplamo- ol (Hind) 草茛草撥， 乃番語之譯 音。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
647.	胡 椒 (本草32) 別名： 味履支	P.nigrum. L. (P. anom- aticum, Lam.)	子 實	Piperine 9%, Piperidine Chavicin, Hypoxan- thin, Methyl- pyrrolin, Ess. oil (1-Phella- ndren, Sesquiter- pen, Caryophy- llen Dipenten) Fat 12.5% Phytoster- in, Resin, Stach.	1) 爲健胃驅風 食慾增進藥 , 一次量 0.5gm (用粉末) 2) 爲調味料。 【藥典】胡椒, 亞細亞丸。	雲南, 安南, 東西印度, 麻 六甲海峽沿岸	本品生西戎 , 其味辛辣 似椒, 故名 胡椒。

第一百十五 三白草科 SAURURACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
648.	<p>蕺 菜 (本草27)</p> <p>別名： 魚腥草， 蕺 菜， 十 藥， 重 藥。</p>	<p>Houttuyn- ia cordata, Th. (Polypa a cochinch- inensis, Lour.)</p>		<p>Ess. oil (Methyl-n -nonyl- ketone, Myrcen, Caprinc acid, Laurinald ehyd, (特有之惡 臭成分) Cordarine (alk. 有發 泡性)。</p>	<p>1) 爲利尿劑及 解毒劑，治 水腫淋疾及 梅毒等， 一次量 3—5gm 2) 治腫眼溼疹 痔疾等，煎 汁洗滌或罨 包，或以生 葉貼之。 3) 取新鮮葉火 焙後，爲發 泡藥。</p>		<p>本品有十種 藥之效能， 有稱爲十藥 ，其葉有魚 腥氣，俗稱 魚腥草， Houttuyn- ia 爲十八世 紀之荷蘭醫 師兼博物學 者 Mat Houttuyn- ia 之名， Cordatus 爲心臟形之 意，因其葉 形似心臟形 也。</p>
649.	<p>三 白 草 (本草16)</p>	<p>Saururus Loureiri, Decne. (S. ch'ne nsis, Baill.) (Saururo- psis c., Turcz.) (S. Cumin- gii, DC.) (C. ce nu- us, Thunb.) (Spath um chinensis, Lour.)</p>	根		<p>1) 爲利尿劑， 治水腫及脚 氣。 2) 煎湯，洗癬 瘡。</p>	生池澤畔。	<p>因葉上有三 白點，故名 。</p>

II 單子葉植物 MONOCOTYLEDONEAE

第一百十六 蘭 科 ORCHIDACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 號
650.	白 及 (本草12) 連及草， 甘 根， 白 給， 紫 蘭。	Bletia hyaciinthi- na, R. Br. (Bletilla striata Reichb.) (Cymbidi- um, striatum, Sw.) (Limodor- um s., Thunb.) (Epidend- rum s., Thunb.) (E. tuber- osum, Lour.)	根	Mucilage Ess. oil (植 研) Glycogen (本 新)	1) 爲止血劑， 治吐血及肺 結核有特效 ，但須繼續 久服。 一次量 2—6gm 2) 外用治瘡毒 諸瘍，促肉 芽發生，止 疼痛。 3) 粉末和油煉 ，治湯火傷 。 4) 爲粘合劑。	浙江，湖北， 四川，雲南。	其根白色， 連及而生， 故曰白及。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
651.	石 斛 (本草20) 別名： 石 蓴， 金 釵， 禁 生， 林 蘭， 杜 蘭。	Dendrobium moniliforme Sw. (D. moniliforme, Kr.) (Epidendrum m., L.) (D. japonicum, Lindl.) (Onychium j., Blume.) (D. catenatum, Lindl.)	莖	Dendrobine C ₁₆ H ₂₅ O ₂ N 及其他二種生物鹼 (D. nobile L. 及中國產市售品含0.3%之生物鹼。	1)能促進液之分泌滋潤，熱病之唇齒，乾燥、口渴引飲等症。 2)為強壯劑，治陰萎、盜汗、消削等症。 3)為強靜劑，治關節炎之疼痛。 4)為健胃劑。 劑量 0.5—5gm	浙江雁宕，福建崇安、武夷山及湖北，四川。	石斛生岩石或古木之上，其莖狀如金釵之股，故古有金釵石斛之稱。
652.	天 麻 (本草12) 別名： 赤 箭	Gastrobia elata Hl.	根 根莖曰天麻 幼莖曰赤箭		為眩暈及頭痛之特效藥，緩解四肢之肌肉疼痛(因白雲或溼潤所起者)，並治上下肢之知覺鈍麻(因言語障礙(因卒中)所起者)等。 一次量 2—5gm	四川，雲南，陝西南鄭(古漢中)所產者均佳，貴州亦有產，不適用。	本品之莖如箭竿，其色赤，故名赤箭，其根曰天麻。

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
633.	釵子股 (本草13) 別名： 金釵股	Luisia teres Bl. (Epidend- ruim t., Thunb.) (Cymbidi- nm triste Lindl.)	根		根治熱痰、惡 性瘧疾、扁桃 腺炎等。	廣東，四川。	石斛名金釵 花，此草狀 似之，故名 。

第一百十七 晏華科 CANNACEAE

654.	晏 華 (藥圃回 春)	Canna indica, L. Var. Orientalis Hook.	花		1) 有止血之效 ，治金瘡及 其他外傷之 出血用。 2) 爲變質利尿 及發汗藥。	雲南開化，(原產美洲熱帶)	
------	-------------------	--	---	--	---	---------------	--

第一百十八 薑荷科 ZINGIBERACEAE

655.	山 薑 (本草14) 別名： 美 草	Alpinia japonica, M q. (Globba j. Thunb.)			花及子爲健胃 劑，治雀亂、 消食、解酒毒 。 根治腹中冷痛 。	福建，廣東， 安南。	山薑根及苗 似薑而大， 作樟木臭。
------	-----------------------------	---	--	--	--	---------------	-------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
636.	益智子 (本草14)	Amomum amarum, A. arbore- um, Lo r.	果 實	Ess. oil (Terpen, Sesquiter- pen)	1) 爲強壯劑， 治多尿症、遺 精等。 2) 止腹痛及神 經性心悸亢 進。 3) 爲芳香健胃 劑。 一次量 1—4gm		脾主智，此 物能益脾胃 ，故名。
636.	高良薑 (本草14) 別名： 薑 薑， 紅豆蔻。	Alpinia kumatake Mak. A. officin- arum. Hance. (A. chine nsis Roscoe.) (Polygona -tum Sibiricum, Red.)	根 子	Ess. oil (Cineol, d- α -Pi- en, Camphor- id, Campherol Cadinen, Galangin, Sesqui- terpene) Alpinin (結晶性黃 色素) Starch 23%, Fat 5%, Ash 4%, (Mn) Ess. oil 1.1%, (Cineol) Tannin Resin.	爲芳香性健胃 劑及調味劑 一次量 1—2 m 製劑有酞劑。	廣東，貴州， 四川，台灣， 中古時代由阿 刺伯傳至歐洲	此薑始出高 良郡，故得 此名。 (按高良即 高州今廣東 茂名縣)。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
658.	白豆蔻 (本草14) 別名： 多骨， 小豆蔻。	Amomum cardamo- mum L. (Elettaria C. Wtite et Maton)	果實	Ess. oil (Cineol, Campher, d-Borneol d- α -Terp- ineol, Terpinyl- acetate), Pentosane Fat, Starch.	芳香健胃劑。 一次量 0.3—1gm 【藥典】小豆蔻 ，芳香精，芳 香散，芳香酊 ，苦味酊，大 黃酊。	廣東，暹羅， 爪哇，蘇門答 臘，印度錫蘭 。	
659.	豆 蔻 (本草14) 別名： 草 果， 漏 蔻。	Alpinia costatum Roxb.	仁		1) 爲芳香性健 胃劑，能解 酒毒。 2) 治瘧疾。	廣東。	豆象形也， 凡物盛多曰 蔻，豆蔻之 名，或出此 義。
660.	草豆蔻 (本草14)	Amomum globosum Lour. (Alpinia globosa Horon.)	果實	Ess. oil 4%, Campher.	同 上	南方及西方各 省。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
661.	縮 砂 薔 (本草14) 別名：縮 砂	A. xanthioides, Wall. A. villosum, Lour.	果實	Ess. oil (Borneol Bornylace- tate, d-Campher, Linalool, Nerolidol) Fat 4%, Cbhyd 24%,	爲芳香性健胃劑(小豆蔻代用), 又爲驅風藥。 一次量 2—6 m 爲粉末或丸劑。	廣東, 東印度, 暹羅, 波斯。	時珍曰, 名義未詳, 藕下白藟多薔, 取其薔藏之意, 此物實在根下, 仁藏殼內, 亦或此意歟。
662.	薑 黃 (本草14) 別名：速, 寶鼎香。	Curcuma longa, L. Amomum curcuma. Mur.		Curcumin (黃色素), Fat 3%, Starch 30%, Ess. oil 5%, (Campher, Camphen, Curcumen Carvone, Phellanar- en)	1) 爲止血劑, 治吐血、衄血、血尿。 一次服 8gm. 2) 治痔疾、膿腫、創傷, 爲粉末塗布之。 3) 爲薑黃紙(檢查或磷酸鹽等用)原料。 4) 爲食品着色劑(咖喱粉鹽漬物著色用)。 5) 布帛黃色染料。	四川, 廣東, 台灣, 南洋, 及熱帶各地。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
663.	鬱 金 (本草14) 別名：馬迷，紫透香。	Curcuma longa, L. Var. Macrophylla, Miq. C.aromatica Salisb.	根莖	Ess. oil 6%, (d-Camphen, Campher, Sesquiterpene, Pheranthren) Curcumin, (黃色素) K.oxalate, Starch.	1) 治胃潰瘍及腹痛。 2) 爲止血劑，治血淋。	甘肅，四川，西藏，印度及熱帶各地。	鬱金無香而性輕揚，能致達酒氣於高遠，古人用治抑鬱不能升者，恐命名因此也。 Curcuma, 由印度土名 Kurkum 所出，longa 爲長之意。
664.	山 奈 (本草14) 別名：山 蘇，三 奈。	Camphor-ia, Galanga, L. (K. rotunda, L.) (Hedychium spicatum, Ham.)	根莖	Ess. oil (Borneol, Camphen, Cineol, Ethyl-methyl-p-cumarate, Cinnamic ethyl-ester), Pentadecan, Starch.	1) 爲芳香性健胃藥，一次量 1—4gm 2) 爲薰香料用。 【日本準藥典】採用山奈。	南方各省，印度。	山奈俗訛爲三奈，或三賴，皆土音也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
665.	蓬 莪 朮 (本草14) 別名： 蓬 藥， 莪 述。	K. pandu- rata, Roxb. (Curcuma zedoaria Rosc.) (C. rotun- da, L.)	根 莖	Ess. oil (Cineol, d-Camph- er, d-Borneol d- α Pin- en, Sesquiter- penalcoh- ol, Sesquiter- pen, Zingiber- en.) Curcumin, Zedoarin, Resin, Gum, Starch.	爲芳香健胃藥， 治消化不良， 一次量：用 粉末 1.5—4. 5gm或10%浸 劑；又爲祛痰 劑及止痛藥。	南方各省，印 度錫蘭邦培。	
666.	薑 荷 (本草15) 別名： 覆 蘆， 蘆 草， 轉 苳， 嘉 草， 薑 荷。	Zingiber Mioga Rosc.			1) 嫩葉及花序， 供食用。 2) 莖與葉乾後， 可製纖維， 供草履草 繩等之製造 原料。 3) 根治腎臟病。 (4) 稻麥芒入目 中不出，以 汁注目即出。	南方各省。	薑荷似芭蕉 而白色，花 軸自地下莖 抽出。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
667.	生 薑 (本草26) 別名： 乾 薑， 干 薑。	Zingiber officinale Roscoe.	根 莖	辛味成分： Zingeron ($C_{11}H_{14}O_6$ 結晶物，熔 點 $0-41^{\circ}C$), Shogaol ($C_{17}H_{24}O_8$ 不揮發性油 狀物)； 芳香成分： Ess. oil 1.4—2%, (Cineol, Citral, Camphen, Borneol, Chavicol, Geraniol, Linalool, Methylhe- ptenon, Nonylald- ehyde, Zingiber- en, Zingiberol); Fatty oil 3.7%, Resin, Starch, K-Malate.	1) 生薑為芳香 健胃劑及鎮 吐、鎮咳祛 痰藥。 一次量 2—6gm (煎丸散) 2) 乾薑為驅風 、消化藥。 一次量 4—12gm (煎) 【藥典】生薑， 生薑糖漿，生 薑醇，芳香醇 ，酸性芳香醇 ，芳香散，複 方大黃散，複 方牽牛子散。	中部及南方各 省。 安南，印度， 非洲。	薑能禦禦百 邪，故謂之 薑(王安石 字說)。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
668.	廉 蕒 (本草14) 別名： 蕒 蕒， 蕒 蕒。	Z. sp.	根		爲消化劑，治 胃冷吐水不下 食。	廣東	

第一百十九 芭蕉科 MUSA EAE

669.	甘 蕉 (本草15) 別名： 芭 蕉， 天 苜， 甘 苜， 香 蕒， 紅 蕉， 水 蕉， 牙 蕉， 佛手蕉， 仙人蕉， 紅毛蕉， 木瓜蕉， 粉 蕉， 北 蕉。	Musa sapientum L. (M. parad- isiaca, L.) (De Cand- olle) (M. Corn- iculata, M. odorata M. semini- fera, M. nana, Lour. (M. Basjo. S. et Z.)	果實： Protein 1.3%， Fat 0.6%， Cbhyd 1.6%， Ash 1%， K, Na, Mg, P, Ca, Cu, As... 6mgm (%)， Vits. A, B, C, E. G. Ess. oil (Amyl acetate)， Starch 0.5%， Succharo- se,	1)果實生食， 止渴潤肺。 2)莖葉爲利尿 劑，治水腫 脚氣。 3)根治癰腫結 熱，搗爛傳 之。	廣東，四川， 福建，台灣。	蕉不落葉， 一葉舒則一 葉蕉，故謂 之蕉，俗謂 乾物爲巴， 巴亦蕉意也 。 又芭蕉結實 ，其肉甚甜 ，故名甘蕉 ，因帶一種 芳香，通俗 稱爲香蕉。
------	--	---	--	---	------------------	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				(成分續) Glucose, Fructose, Malic acid, Tannin, Mannan, Caoutchouc, Pectin, Carotin, Chlorophyll, Xanthophyll, (Pigment), Liastase, Maltase, Invertas.			
				花: Arginine; 莖: Tannin. 葉: K salts, Pisang Wax.			

第一百二十 鳶尾科 IRIDACEAE

670.	射 干 (本草17) 別名： 烏 扁， 烏 鑿， 烏 吹， 烏 蒲， 鳳 翳， 鬼 扇， 仙人掌， 扁 竹， 紫金牛， 野薺花， 草 薺， 黃 遠。	Belamcan- da, Chinensis, Lam. (Pardent- hus c., Ait.) (B. punc ata, Moer.ch.) (Moraca c. Thunb.) (Ixia c., Linn.)	根 莖	Belamcan- din (gl.) C ₂₄ H ₂₄ O ₁₂ Iridin (gl.) C ₂₄ H ₂₈ O ₁₄	1) 根解熱、祛 痰及利尿劑。 。 2) 治齒痛。 3) 治脚氣。 4) 根莖治扁桃 腺炎。 5) 治周圍膿瘍 。	山東，江西， 陝西，廣東， 湖北，四川， 福建大田。	射干之形， 莖梗疎長， 正如射之長 竿之狀，故 名。 Belamcan- da, 產於麥 拉白爾地方 ，本屬植物 之土名。
------	--	---	--------	---	---	-------------------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
671.	番紅花 (本草15) 別名： 泊夫藍， 撒法郎。	Crocus sativis, 1. (<i>C. officinarum</i> , <i>Pers.</i>) 荷蘭名： Safran 德國名： Safran, 英名： Saffron, 本草綱目撒 法郎，係撒 法郎之誤刊。	花	雌蕊含 α Crocin, β -rocic, γ -Crocin, 三種色素， Picrocrocin, in, (水解為葡 萄糖及 Safranal), Fatty oil 6%, Ess. oil 0.6%.	1) 爲芳香劑及 著色劑。 2) 有鎮咳麻醉 作用。 3) 治月雖困難 。 藥局製劑：有 番紅花酊，番 紅花阿片酊， 番紅花糖漿， 番紅花硬膏等 。	產小亞細亞， 希臘，埃及， 波斯，西班牙， 土耳其，瑞 士，英、法、 德、奧諸國。	番紅花，係 出西番諸國 之紅藍花， 元時入食饌 用。 原名 Crocus，爲 希臘古名， 希臘神話 Crocus，謂 一眉目清秀 之青年，死 後變爲此花 者。
672.	藍 實 (本草15) 別名： 馬蘭子， 荔 實， 馬棘子， 馬 薤， 馬 帚， 鐵掃帚， 刺 草， 旱 蒲， 豕 首， 三 豎， 馬 蘭。	<i>Iris</i> <i>ensata</i> , Th. (<i>I. graminea</i> , Thunb) (<i>I. triflora</i> Babbis) (<i>I. pallasii</i> Fisch) (<i>I. oxype</i> <i>ta'a</i> , Bunge) (<i>I. caricifolia</i> , Pallas.) <i>I. fragrans</i> , Lindl.) (<i>I. longifolia</i> Royle.)	根 葉 子 花		1) 爲止血劑，河北 治吐血衄血 金創。 2) 爲利尿解熱 藥。 3) 消癰腫。		此草可爲馬 刷，故一名 馬帚。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
673	鳶 尾 (本草17) 別名： 烏 園	<i>I. tectorum</i> , Max.	根	Tectorinia $C_{22}H_{42}O_{11}$ (加水分解 成 Tector- igenin 與 Glucose)	根爲吐劑緩下劑，並治眩暈；又治腫物。	山東，湖北，浙江，四川。	以象形命名。

第一百二十一 薯蓣科 DIOSCOREACEAE

674. a.	薯 蓣 (本草27) 別名： 山 藥， 諸 蕒， 玉 延， 土 蓣， 山 蓣， 山 芋。	<i>Dioscorea</i> : (I) 北方種 <i>D. Batatas</i> , Decne. (II) 湖北種 <i>D. quinguloba</i> , Thunb. (III) 南方種 <i>D. japonica</i> Th.	根 莖	Protein 2.7%, Fat 0.2%, Starch 16%, Ash 0.6%, (Cu... 0.8 mgm%, Diastase, Glutamic acid, Glucosamin, Mucin, Arginine, Choline, Leucin, Tyrosin, Allantoin. (本新，植 研)	1) 治慢性腸炎。 2) 治夜尿、遺精、盜汗。 3) 爲強壯劑及祛痰劑。 4) 因地下莖多肉，可供食用。	爲栽培品，福建明溪及各地均有。	
------------	--	---	--------	---	---	-----------------	--

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
b.	薯 榔	<i>D. rhipogonoides</i> Oliv.	塊 莖		1) 爲染料用。 2) 造洋墨汁用。 3) 根和阿片灰乾後，以水煎之，止痛及止下痢用。	福建沙縣，台灣，琉球。	
675.	零 餘 子 (本草27)	A. Ditto.	果 實		爲強壯劑，煮熟，去皮食之，勝於山藥，美於芋子。		零餘子大者如雞子，小者如彈丸，在葉下生。
676.	土 芋 (本草27) 別名：土 卵，黃 獨，土 豆。	<i>D. sativa</i> , L. (form, domestica, Makino)	根	Starch 22%,	1) 爲解毒劑，生研水服，當吐出惡物便止。 2) 爲強壯劑，熟食之，甘美不饑，厚人腸胃，去熱咳。	山東，江蘇，湖北，四川，廣東。	土卵似小芋，肉白皮黃，漢人名爲黃獨，可蒸食之。
677.	華 蘼 (本草18) 別名：赤 節，百 枝，竹 木，白 拔 葵。	<i>D. Tokoro</i> Mak. (<i>Smilax chinensis</i>)	根	Saponin Dioscori ne, Dioscin.)	爲毒魚藥(取根搗碎，投於流水中，魚食之，即發毒而被捕)。	河南，湖北，四川。	

第一百二十二 石蒜科 AMARYLIDACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
678.	仙茅 (本草12) 別名： 獨茅， 茅瓜子， 婆羅門參。	Curculigo ensifolia, R. Br. (C. orchio- ides Geartn.) (Hypoxis o., Kurz.) (C. stans. Labiil.) (C. malab- arica, Wight.) (Hypoxis minor Seem.)	根	Tannin 4%, Fat 1%, Ash 9%, Resin, Starch.	為強壯劑，治 神經衰弱、步 行無力、老人 失溺， 一次量 2—9gm	江西，江蘇， 浙江，四川， 湖南，湖北， 廣東，婆羅門 。	本品藥似茅 ，久服輕身 ，故名仙茅 ，梵音呼為 河輪勒隨。 其根獨生， 始因西域婆 羅門僧獻方 於唐玄宗， 故今江南呼 為婆羅門參 ，言其功補 如人參也。
679.	石蒜 (本草13) 別名： 烏蒜， 老鴉蒜， 蒜頭草， 水麻， 一枝箭， 漢連酸。	Lycoris radiata, Herb. (Amaryll is r., Herit.) (A. sarni- ensis, Th.) (Nerjine japonica Miq.)	鱗 莖	Lycorine, Homolyco- rine, Pseudolyc- orine, Pseudoho- molycor- ine, Lycoren- ine, Sekisanine Sckisano- line, 及 C ₁₈ H ₄₁ N ₂ O ₁₇ 等八 種生物鹼。	為祛痰劑及催 吐劑（吐根代 用品）。 一次量 1.5—4gm 毒性強，須注 意。	浙江，江蘇， 江西，福建， 湖北。	Lycoris 希臘神話海 中女神之一 ，Radiata 為放射狀之 意，因花蓋 為放射狀故 也。 蒜以根狀名 ， 箭以莖狀名 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
							<p>【藥理】 Lycorin 內服或皮下注射，起嘔吐，又有解熱作用，其藥理作用與吐根鹼 (Emetine) 同，而其毒力，則依 Emetine, Cefaeerine Lycorine 之次第而減弱，催吐作用，則次第增強。</p> <p>【新藥】 Sexanol 為祛痰劑，Melysin 為 15% 之鹽酸 Dihydrolycorine 水溶液用，治赤痢，及肺吸虫 (皮下注射)。</p>
680.	水仙 (本草13) 別名： 金盞銀花。	Narcissus Tazetta, L. Var. chinensis Roem.	鱗莖	Lycorine (Narcissin), Narcitine Glucoman. nan. (植研)	鱗莖絞汁，塗 癰腫、乳腫及 惡性腫物。 花治婦人病。	河北，江蘇， 山東，福建龍 溪。	此物宜卑溼 處，不可缺 水，故名水仙。 金盞銀花， 花之狀也。

第一百二十三 百合科 LILJACEAE

681.	雍 (本草26) 別名： 蒜 子， 菹 子， 火 葱， 菜 芝， 鴻 薈。	Allium Bakeri Regel (A. splen- dans, Miq.) A. exser- tum, Baker.) (Caloscor- dum e., Herb.)	鱗莖	鱗莖含炭水 他物和鏡酸 ，呈 Formalde- hyde 之反 應。 (植研)	雍白為食用， 內服為健胃整 腸劑。 外用為塗布劑 ，治火傷。	北部及中部各 省。	
------	---	--	----	--	--	--------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
682.	胡 葱 (本草26) 別名： 洋 葱， 玉 葱， 蒜 葱， 回回葱。	A.Cepa, L.	鱗 莖	Protein 2.4%, Cbhyd 6%, Fat 0.1%, Ash 0.3%, Ess. oi 0.015%, (全草含0. 00466%), Allyl disulphid· Allyl propyldis- ulphide, Phytin, Arginin, Vitamine B, C, Formic acid, Malic acid, Citric acid, Phosphor- ic acid, Quercetin, Quercetr- in Inulin, Mannite, Mannose, Maltose, Maltase, Amylase, Dextrina- se, Emulsin. 子： Gum 15%	1)爲食用。 2)爲興奮、祛 痰、發汗、 利尿藥。 3)爲瘡瘍，痛 風等用。	四川(今各地 均有)，原產 地，波斯，俾 路芝。	其來自胡葱 ，故稱胡葱 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
683.	冬 葱 (本草26) 別名： 慈 葱， 太官葱。	A.escule- ntum, L.	葱		效用與葱同。	處處有之。	本品之莖柔 細，可以終 冬，太官上 供宜之，故 有數名。
684.	葱 (本草26) 別名： 菜 伯， 和事草， 鹿 胎， 扎。	A.fistulo sum L.	葱	Vits, B1, C2, G1, Phytin, Malic acid, Protein 1.4%, Fat 0.3%, Cbhyd 4.6%, Ash 0.8%, Cu... 0.92 mgm%, P2 O5).	地下莖，刺激 神經，促消化 液之分泌，預 防消化器內寄 生虫之發生。 又治癱瘓賈斯 及腦之健康有 效。		葱從葱外直 中空，有葱 通之象也， 扎者，草中 有孔也，故 字從孔。
685.	山 韭 (本草26) 別名： 菹， 藏。	A. japoni- cum Regel.	草		為利尿劑，潤 腸劑。 又腎病宜食之 。	山東	本品山中有 之，與家韭 相似，但根 白，葉如燈 心苗，人皆 采而食之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
686.	孝文韭 (本草26) 別名： 諸葛韭	A. Ledebourianum, Schult.	草		為整腸劑。	內蒙古。	本品生塞北山谷，狀如韭，人多食之，最初係後魏孝文帝所種，又有諸葛韭，孔明所種，此韭更長。
687.	山 蒜 (本草26) 別名： 澤 蒜， 葛。	A. nipponicum, Fr. et Sav.	鱗莖		1) 治子宮、血腫、月經閉止等。 2) 治胃腸炎及胃癌。 3) 治毒虫螫傷。	處處有之。	山蒜生山石間，澤蒜生水中，根似蒜而臭。
688.	韭 (本草26) 別名： 草鐘乳， 起陽草。	A. odoratum L. (A. uliginosum, G. Don.) (A. tuberosum, Roxb.) (A. senescens, Miq.)	鱗莖	Protein 2.1%, Cbhyd 3.3%, Fat 0.4%, Ash 0.8%, Vit. C ₂ , 非與鎳酸煮沸，亦呈Formaldehyde反應。	1) 全部供食用，有保持身體溫熱之效。 2) 韭子制止下痢、多尿、遺精及疝痛。 3) 鱗莖有止吐血及衄血之效。 4) 韭根搗汁塗漆瘡有效。	栽培品。	韭字象葉出地上形一種而久生故謂之韭。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
69.	蒜 (本草26 別名： 小蒜， 茱蒜， 葷菜。	A.s tivum L.		鱗莖： Protein...1.3%， Cbhyd 9. %， Fat 0.2%， Ash 0.7%， Ess. oil0.7%，	效用與大蒜同。	處處有之。	蒜字從算音 蒜語聲也， 又象蒜根之 象，中國初 惟有此，後 因漢人得葫 蒜於西域， 遂呼此為小 蒜以別之。

(成分續) Allyl disulphide, Allyl propyldisulphide, Alliin, Allisin, Choline, Inulin, Myrosinase.

藥：Protein 1. %， Fat...0.3%， Ess. oil, Allyl disulphide, Allyl-propyldisulphide.

690.	葫 (本草26 別名： 大蒜， 葷菜。	Allium scorodopr. asum, L. Var. vivi- parum, Regel.	鱗莖	鱗莖： Arginin, Homocyst- in, Scorodose Glucomin- al, Ess. oil, 藥： Diallylsul- phide, Inulin, Leek oil Vit. C ₂ .	1) 為食用。 2) 健胃，利尿， 消化，殺 蟲，治療。 【藥理】對家兔 體重1kgm，投 以 0.6gm 之 Glucominal， 則血壓急激下 降，遂至呼吸 停止而死。 精油之 0.5% ，水溶液，在 五分鐘內，可 殺滅傷寒 (Typhus) 菌 。	【新藥】 Allisatin (瑞士 Sandoz) Allus (東 京)。	張騫使西域 ，始得大蒜 ，因大蒜原 出胡地，故 有葫名。 Allium 古名 Scorodop- rasum，由 Scorodon (西洋大蒜) 與 Prason (葷) 結合 而成， Viviparus 為胎生之意 ，於莖頂生 無性芽，因 在母莖上發 芽之故。
------	---------------------------------	---	----	--	--	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
691.	蒼 葱 (本草26) 別名：山葱，沙葱，水葱。	A. Victori- nalis, L. (Cepa v., Moench.) (A. ellipt- icum, Wall.) (A. plant- agineum, Lam*)		Leek oil, Allyl disul- -phide.	除瘰氣惡毒， 久食強志益膽 氣。	河北，湖北， 甘肅，四川。	蒼葱生山原 平地山地及 水澤中，故 有諸種名稱 。
992.	蘆 薈 (本草34) 別名：奴會，訥象。	Aloe vulgaris Lam. A. ferox Mill.) A. ofrica- na L.) A. succo- trina Lam.) A. vera L.)	浸 膏	Aloin 12% Resin 12.5%, Emodin, Ess. oil, Cinnamic acid, d-Arabin- ose, Oxydase. Barbaloin 25%, Isobabalo- in Sicaloin.	健胃劑 0.01 —0.03gm 緩下劑 0.06 —0.2gm 峻下劑 0.3— 0.5—1.0gm 【藥典】蘆薈， 蘆薈浸膏，蘆 薈丸，蘆薈錢 丸，蘆薈鷄納 錢丸，蘆薈藥 喇叭丸，複方 大黃散，複方 蘆薈酊。	南非洲好望角 ，西印度居拉 舍 (Curassao) 島所可脫拉 (Socotra) 島 紅海沿岸，波 斯。	蘆薈，諒係 Aloe 之音 譯，象膽以 其味苦如膽 也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
693.	知 母 (本草12) 別名： 蜆 母， 連 母， 蟻 母， 貨 母， 地 參， 水 參， 茨 蒞， 苦 心， 兒 草， 蘼。	Anemarr- hena saphodelo. ides, Bge.	根 莖		為解熱藥，對熱性病者，為清涼劑止渴用，又治潮熱（伴有咳嗽者）。 一次量 0.8—2gm	河北，江蘇。	宿根之旁，初生子根，狀如蜆蠶，故謂之蜆母，誤為知母。
694.	天 麩 冬 (本草18) 別名： 天門冬， 麩 冬， 頭 勒， 頭 棘， 天 棘， 萬歲藤。	Asparagus lucidus Luidle. (A.falcat- us, Benrh.) (A.insula- ris, Hance.) (Melanth- ium cochiric- hinense Lour.)	根		為鎮咳，解熱，利尿劑及強壯劑。 一次量 2—5gm 又治痛風心臟水腫等。 一次量 0.05—0.5gm	山東，廣東，江蘇，四川。	本品浸灰，汁中去苦味後，為糖漬，供嗜好性食品。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
695.	龍鬚菜 (本草8)	A. schob- eroides Kunth. (A. Wri- ghtii, A. Gr.) (A. Siebol- dii Max.) (A. parvi- florus, Turcz.) (A. micra- nthus S. & Z.)	根	Asparagin Protein 2.8%, Fat 0.2%, Vits. A.B.	爲利尿劑。	生東海南邊石 上。	本品一名蘆 筍，以醋浸 食之，和肉 蒸，食味甚 佳，西餐多 採用之。
696.	鈴 蘭 別名： 君影草	Convallar- ia majaris, L. 【藥理】本植 物之成分， 有似洋地黃 之強心作用 ，缺乏局所 及呼吸之刺 激作用， Convallat- oxin 比 Digitoxin 作用強十倍 。	花 ， 全 草	Convalla- marin, Convallin (水解成 Convalla- maretin 及 Convallar- etin) Convallato- xin.	爲強心利尿劑 。 一次量取 0.5gm 爲煎劑或用酒 劑。 0.5cc Convallatox- in 供皮下注 射用 0.005-0.05cc 【德國法國瑞 士蘇聯藥典英 美津藥典】採 用鈴蘭根，鈴 蘭流浸膏，鈴 蘭酹。 【新藥】 Convallon.	歐洲北美，北 亞日本，東北 各省。	花如鈴形垂 下，故名鈴 蘭。 Convallar- ia 爲谷間之 百合 (Conv- allis 谷之 意)，此花 開於谷間， 有百合香氣 (Majaris) 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
697.	貝 母 本草13 別名： 商， 蛭， 苦 菜， 苦 花， 苦 草， 空 實， 勒 母， 川 貝， 浙 貝， 象 貝。	<i>Fritillaria</i> a.川貝母： <i>F. Roylei</i> <i>Hook</i> b.浙貝母： <i>F. Verici-</i> <i>llata,</i> <i>Willd.</i> Var. <i>Thunber-</i> <i>gii</i> <i>Baker.</i> (<i>F. Thunb.</i> <i>ergii</i> <i>Miq.</i>) <i>F. collic-</i> <i>ola,</i> <i>Hance.</i>) <i>Uvularia</i> <i>Cirrrosa,</i> <i>Th.</i>)	I) 川貝母： Fritilline C ₂₅ H ₄₄ NO ₃ 熔點 21.°C, Fritilarine C ₁₉ H ₃₅ NO ₂ 117°C Verticine C ₁₈ H ₃₃ NO ₂ 224— 224.5°C, Verticill- ine C ₁₉ H ₃₃ NO ₂ 148— 150°C, Fritimine C ₃₈ H ₆₂ N ₂ O ₃ 167°C II) 浙貝母： Peimine C ₁₉ H ₃₀ NO ₂ 223°C Peiminine C ₁₈ H ₂₈ NO ₂ 135°C	1) 爲鎮咳祛痰藥，治山感胃氣管炎肺結核等而起之咳嗽頭痰不化等。 一次量 3—5gm 2) 爲催乳及止血劑，治乳癰乳汁不大，衄血及吐血不止。 【藥理】 Fritillari e, 使溫血動物之中樞神經系麻痺，障礙呼吸與血管運動，使心臟之收縮不完全，且減少搏動數，而使血壓下降。	四川，浙江象山、杭縣、黃巖、江蘇，山西，河北，雲南，東北各省。	形似聚貝子，故名貝母。 詩云言采其商，卽此，一作蛭，謂其根狀如蛭也。 <i>Fritillus</i> , 爲骸子壺之意，因其花形相似也， <i>Verticillata</i> 謂其葉輪生之意。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 材 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
698.	萱 草 (本草16) 特名： 忘 憂， 療 愁， 册 棘， 鹿 葱， 鹿 劍， 妓 女， 宜 男， 黃 花 菜， 金 針 菜。	Hemeroc- allis Wlva, L. (H. distic- ha, Doun.) (a)H. fla- va, L. (b)H. min- -or, Mill. (H. gram- inea, Andr.)	花	Vit, A. B. C. 乾燥品： Protein 11.7%, Fat 0.3%, Asparagin Colchicin.	1) 爲食用。 2) 爲利尿劑。 3) 爲強壯劑。	福建，廣東， 湖北，河北。	萱本作諛， 諛忘也，詩 云，焉得諛 草，言樹之 背，謂憂思 不能自遣， 故欲樹此草 玩味，以忘 憂也。
699.	土 苳 苓 (本草18) 別名： 土 草 薺， 刺 豬 苓， 山 豬 蕒， 仙 遺 糧， 冷 飯 團， 硬 飯， 山 歸 來， 山 地 栗， 草 馮 餘 糧。	Heterosm- ilax japonica, Kth. (Smilax pseudo chira, Thbg.	根		1) 爲驅梅之目 的用。 一次量 5—10gm 2) 爲健胃劑， 強壯劑。	四川，湖南， 湖北，廣東。	苳苓，豬苓 ，山地栗， 皆象形也。 相傳昔禹行 山乏食，采 此充糧而棄 其餘，故有 馮餘糧之名 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
700.	玉 簪 (本草17) 別名： 白仙鶴	Hosta sieboldia na Engl.	葉 根	Starch	根搗汁服，解 斑蝥毒，下魚 骨哽，塗癰腫 ；藥治蛇虺傷 ，以汁渣傅之 。	北方各省，山 東，湖北，四 川。	均以花之象 形命名。
701.	百 合 (本草27) 別名： 番 韭， 強 瞿， 蒜腦諸。	Lilium Brownii spoe. (L. japon- ica sims.) (L. longif- lorum, Franch.)	根 花 子	Starch Protein 4.0% Fat 0.1% Colchicein	爲清涼、退熱 、滋養、強壯 、鎮咳祛痰藥 劑量 5—10gm	四川，湖北， 江西，廣東， 陝西。	百合之根， 似紫瓣合成 也。
702.	山 丹 (本草27) 別名： 紅百合， 紅花菜， 川強瞿， 連 珠。	L. Concol- or. Salisb. L. Sinicum Fl.	根 花		根治瘡腫。 花能活血，其 蕊傅疔瘡惡腫 。	北方各省，浙 江。	百合紅花者 名山丹。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
703.	麥 門 冬 (本草16) 別名： 禹 非， 忍 凌， 不忍草， 川 冬。	Liriope spicata, Lour. (Ophiogon, s., Ker.) (L. graminifolia B ker.) (L. g., Var. densiflora Maxim.) (O. gracilis, Kth.) (O. japonicus, Ker.)	根	Mucilage	根莖爲鎮咳祛痰藥，又治面部浮腫，去熱止渴。 一次量 1.5—5gm 果實富滋養分，爲滋養緩和強壯藥。	麥冬名烏非，齊名愛非，楚名馬非，越名羊非。又產四川錦州者，俗名瓜黃，產浙江杭州者，名蘇冬，比較蘇冬味爲濃厚。	麥鬚曰麩，本品根似麥而有鬚，葉如非，而凌冬不凋，故名，後人簡寫爲麥門冬。人家階前多植之，有沿階草，階前草之名。
70.	蚤 休 (本草17) 別名： 蚩 休， 蟄 休， 重 臺， 三 層， 重 樓， 金 綫， 河 車， 草 甘， 白 甘， 七 草， 花。	Paris polyphylla Sm.	根	Paridin.	1) 治驚癇、搖頭、弄舌。 2) 治癩疾癰疽。 3) 治中蟲蛇毒鼠莽毒。 4) 治扁桃腺炎，有特效。	中部西部，及南方各省。	蟲蛇之毒，得此治之，即休，故有蚤休，整疊三層，因其葉狀也，金綫、重樓，因其花狀也，甘遂，因其根狀也，紫河車，原其功用也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
705.	王 孫 (本草12) 別名： 牡 蒙， 黃 孫， 黃 昏， 旱 藕。	P.tetraph- ylla, A. Gr. P.quadrif- olia, L.	根	Paridin P ristyph- nin Asparagin	爲健胃強壯劑。 四肢及腰部之 冷感疼痛時， 服之有效。	江蘇	
706.	黃 精 (本草12) 別名： 黃 芝， 戊己芝， 菟 竹， 鹿 竹， 仙人餘糧， 救窮草， 米 鋪， 重 樓， 龍 御， 垂 珠， 烏孫崑， 野生崑， 雞 格。	Polygona- tum falcatum, A. Gr. P.chinen- se, Kth. (P.sibiri- cum, Red.) P.gigante- um, Dietr. Var. Thunberg- ii, Maxim. (P.Canicu- -latum, Miq.) P macropo- -dum, Turcz.	根莖之醃浸膏，對各種生物鹼試藥，起陽性反應。 【藥理】黃精浸膏，對過血糖，有顯著抑制作用。	爲滋養強壯劑及解熱藥，治病後衰弱症、間歇熱、痛風、骨膜炎等，又爲蛔蟲驅除藥。 一次量 1—5gm 糖漬品，供食用。	湖南，浙江，廣東樂昌，廣西南寧，雲南昆明，營口，朝鮮。	黃精爲滋補要藥，以其得坤土之精粹，故謂之黃精。 傳說黃精爲仙家服食之要藥，取黃精根莖，不限多少，細切，陰乾搗末，每日以水調服，不拘多少，一年之內，可返老還童。(聖惠方) Polygonum 爲多節之意，因地下莖之節頗多也。 falcatum 爲鐮狀之意，其葉之形狀相似也。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
707.	萎 蕤 (本草12) 別名： 玉竹， 地節， 藏蕤， 萎 蓐， 萎 香， 香 萎， 女 萎， 莢。	P. officinale, (P. Thunbergii, M. & D.) (P. Vulgare, DC.) (Convallaria polygonatum, L.)	根	Convallarin, Convallamarin, Mucilage, Mannose, Sugars, l-arabino- se.	1) 爲滋養強壯劑，治身體衰弱者。 2) 制止多汗、多尿、遺精等。 3) 治腰脚部之疼痛，除顏面之黑點。 4) 外用，治打撲傷。 5) 製澱粉，供食用。	甘肅，山西， 山東，河北， 四川，江蘇。	萎蕤，草木葉垂之貌，此草根長多鬚，如冠纓下垂之纓而有威儀，故以名之。凡羽蓋旌旗之纓纓，皆象萎蕤者也。
708.	萬 年 青 (拾遺5) 別名： 千年蓋， 冬不凋草。	Rhodea japonica Roth. Rhodea chinensis	根 莖	Rhodein (gl.) $C_{20}H_{44}O_{10}$ $2\frac{1}{2}H_2O$ 熔點 190°C 無水物熔點 253°C	有強心利尿作用，爲洋地黃之代用品。 【藥理】 Rhodein, 有似 Digitoxin 之強心作用。	產於各處暖地。	取其四季常青，有長春之意，江浙婚禮，多用之伴禮。 【新藥】 Rhodealin.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
709.	<p>菝 葜 (本草18 別名： 土茯苓， 菝 葜， 金剛根， 鐵菱角， 王瓜草。</p>	<p>Smilax china L. (S. ferox, Wall.) (S. japon- ica A. Gray.) Coprosm- anthus j., Kunth.)</p>	根 莖	<p>Soponin (Parillin, Smilacin) Cinchonin Tannin, Resin.</p>	<p>治瘧毒痛風、 癱瘓賁斯、關 節炎及下痢等 ，又為利尿及 發汗藥。</p>	<p>江西，浙江， 福建，廣東， 山東，湖北。 (中美洲原產)</p>	<p>菝葜，猶斌 結也，斌結 短也，此草 莖蔓，堅強 短小尖銳， 故以名之。</p>
710.	<p>鹿 藥 (開寶)</p>	<p>Smilacina japonica, A. Gr. Tovaria j., Baker.</p>	根		<p>為強壯劑，益 老起陽，療風 血，去諸冷。</p>	<p>甘肅武陵。</p>	<p>本品根莖似 黃精，鹿好 食之，故名 。 鹿食九種解 毒之草，此 其一也。</p>
711.	<p>山 慈 姑 (本草13 別名： 金 燈， 鬼燈藥， 朱 姑， 無義草。</p>	<p>Tulipa edulis, Bak., T. gramin- ifolia, Baker. Orithyia e., Miq.</p>	鱗 莖	S ach	<p>1)為緩和滋養 藥。 一次量 4—7gm 2)可供食用。 3)為澱粉原料 。</p>	<p>山東，江西， 浙江，湖北， 湖南，福建連 城。</p>	<p>山慈姑，生 山中溼地， 葉似車前， 根莖如慈姑 ，故名。</p>

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
712.	鬱金香 (本草14) 別名： 草麝香， 茶矩摩。	T. Gesneriana, L.	根 花	Tulipine, Salicylic acid, Tulipine, Arginine, Cyanin, Salicylic acid,	1)為薰香及釀酒用。 2)治臟躁病用。	廣西，貴州， (小亞細亞原產)。	本品原係鬱人(鬱林郡，今廣西貴州)所貴，因以名之。
713.	藜蘆 (本草17) 別名： 山葱， 鹿葱。	Veratrum album, L. 白藜蘆 V. nigrum L. 黑藜蘆 V. viride solander. 綠藜蘆	根	Jervin (Viridin) Rubijervin Pseudojervin, Protoveratrin, Chelidonic acid, 以上白藜蘆成分 Cevadin 綠藜蘆成分	1)在獸醫術上，為催吐劑用。 2)在農業上，為殺蟲劑及殺諸蟲及馬疥癬，羊疔瘡癢。 3)治疥癬、白禿、蟲瘡。	白藜蘆產歐洲中南部，亞洲北部；綠藜蘆，產北美洲；黑藜蘆，產河北，山西，陝西，湖北，四川，東北各省，福建永安余荆山。	黑者曰藜，其蘆有黑皮裹之，故名。

第一百二十四 百部科 STEMONACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
714.	百 部 (本草18) 別名： 婆婦草， 野天藤冬。 。	Stemona tuberosa, Lour. (Roxburg- hia, Stemona, Steud.) (R. glorio- soides, Roxb.) (R. viridi- flora, Smith.) (S. sessili- folia, Miq.) (S. japon- ica, Miq.) (Roxburg- hia j., Blume.)	根 全 草	Hodorie (alk) Stemonine Stemonid- ine (alk)	1) 爲鎮咳劑。 一次量 2—6gm, 2) 爲驅蟲劑， 治腸內及頭 虱等皮膚寄 生虫。 【藥理】本植 物中之生物 鹼，使呼吸 興奮性減退 ，對於心臟 ，無顯著作 用。	福建，湖北。	其根多者百 十連屬，如 部伍然，故 以名之。

第一百二十五 燈心草科 JUNCACEAE

715.	石 龍 芻 本草15 別名： 龍 鬚， 縮雲草， 西王母簪。 。	Juncus balticus Willd. Var. japonicus, F. Buch. (J. baltic- us, Deth.)			聚爲強壯劑， 利尿劑。	山西	刈草束束曰 芻，此草生 水石之處， 可以刈束養 馬，故謂之 龍芻。
------	--	--	--	--	----------------	----	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
716.	燈 心 草 (本草15) 別名： 虎鬚草， 碧玉草。	Juncus, effusus L. Var. decipiens, Buch. J. comm- unis) (Scirpus capsular- is, Lour.)	全 草	Araban Xylan.	1) 爲利尿藥， 用粉末 2—6gm。 2) 爲治淋藥， 用煎劑。	江蘇，浙江， 福建，陝西。	以效用名之。 燈心草爲粉 末頗難，須 以水和粳米 粉研捏，塗 於燈心草， 俟乾研磨後 ，投於水中 ，則燈心上 浮，採集之 ，乾燥即得 。
717.	地 楊 梅 (本草16)	Luzula campestr- is, DC. Var. capitata Miq. (L. mulli- flora, Lej.)	子		治赤白痢，取 葷子，煎湯服 。	中部各省。	生於濕地， 苗如莎草， 四、五月有 子，似楊梅 。

第一百二十六 雨久花科 PONTEDERIACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
718.	蕹 草 (本草19) 別名： 蕹 菜， 蕹 菜。	Monochoria vaginalis, Presl. Var. Plantaginea, Solms. (M. hastafolia) (Pontederia v., Burm.)	莖		1) 治暴熱、喘 息、小兒丹 毒。 2) 用蒸魚食， 甚美。	福建，廣東。	生水旁，葉 似澤瀉，五 、六月採莖 暴乾用。

第一百二十七 鴨跖草科 COMMELINACEAE

719.	鴨 跖 草 (本草16) 別名： 碧竹子， 竹雞草， 竹葉菜， 淡竹葉， 藍姑草， 耳環草， 碧蟬花。	Commelina communis, L. C. polygama, Roth. C. vulgaris Schmid.	全 草	Mucilage, Starch.	1) 爲強心利尿 藥。 2) 搗汁點喉痺 腫痛。 3) 治瘰癧。 4) 解疔腫、丹 毒、蛇犬咬 、癰疽等毒 。	原產南美、印 度，今各處均 有。	本品初夏開 碧色花，如 蛾形，兩翼 如翅，結角 尖曲，如鳥 喙，因以名 之。
------	--	--	--------	----------------------	---	------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
720.	杜 若 (本草14) 別名： 杜 蓮， 若 芝。	Polia japonica, Hornst. Alpinia chinensis, Rosc.	根		爲強壯劑，治 眩暈，并能明 目益精及胸脇 下逆氣。	生湖北，山東 等省之山谷林 野陰處。	

第一百二十八 穀精草科 ERIOCAULACEAE

721.	穀 精 草 (本草16) 別名： 戴星草， 文星草， 流星草。	Eriocaulon 花 australe, R, Br. E. sieboldi- ianum, S. et Z.			1) 草煎汁洗眼 及治一切眼 病。 2) 爲解熱劑及 利尿劑。	處處有之。	穀精草，因 穀田餘氣所 生，故名穀 精草。
------	--	---	--	--	---	-------	--------------------------------

第一百二十九 浮萍科 LEMNACEAE

722.	水 萍 (本草19)	Lemna minor L.		Iodine, Bromine.	爲解熱利尿藥 。 一次量 1—2gm (浮萍發汗， 勝於麻黃)。	生於雷澤池澤 溝渠間。	本草所用水 萍，乃小浮 萍，非大蘋 也。
------	---------------	-------------------	--	---------------------	--	----------------	-------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
	紫貝浮萍	<i>L. polyrrhiza</i> , L. <i>Spirodela</i> , P., <i>Schleid.</i> <i>L. major</i> , Griff. <i>L. orbiculata</i> , Roxb.			紫貝浮萍，治吐血及癩病。		紫貝浮萍，而青背紫，七月採揀淨以竹篩攤晒，使乾用之。
	青 萍	<i>L. paucicostata</i> , Hegelm.			將青萍之莖及葉搗碎，和醋，塗於腫物，有助長作用，且使腫口易於開裂。		

第一百三十 天南星科 ARACEAE

723.	白 菖 (本草19) 別名： 水菖蒲， 蜚 蒲， 昌 陽， 水 宿， 溪 蓀， 蘭 蓀。	<i>Acorus calamus</i> , L. (<i>A. cochinchinensis</i> , Schott.) (<i>Orontium c.</i> , Lour.) (<i>A. aromaticus</i> , Gilb.)	根	Ess. oil 2—3% Pinen, Camphen, Campher, Calamen, Calameon, Calamenol Asaron, Parasaron,	菖蒲根為芳香性健胃劑，製劑有酊劑，流浸膏劑等。一次量 3—7gr	浙江，江蘇，江西，四川，湖北，廣東，印度及北半球各國。	
------	--	--	---	---	----------------------------------	-----------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
(成分續) Asarylaldehyde, Eugenol, Sesquiterpene, Azulen, Methylalcohol, Methylamin, Trimethylamin, Acorin, Calamin, Cholin, Palmitic acid, Heptylic acid, Tannin, Starch. Ash 6%.							
724.	萹 蒲 (本草19) 別名： 石萹蒲， 水劍草， 堯 韭， 昌 陽。	A. gramin- eus, Ait. (A. terre- stris, Spr.) A. Calam- us, Lour.) (A. Tatar- inowii, Schott.)	根	Ess. oil 0.8%, Asaron $C_{12}H_{16}O_3$ Sesquiter- pene, Phenols, Palmitic acid.	爲清涼健胃劑，又爲驅風藥。一次量 0.5—2gm (爲散劑或液劑)。外用治齒痛、齒齦出血及浴湯劑用。	四川，浙江，江西，湖北，廣東，福建。	萹蒲乃蒲類之昌盛者，故曰萹蒲。
725.	海 芋 (本草17) 別名： 山 芋， 觀音蓮， 羞天草， 隔河仙， 天 荷。	Alocasia macrorrh- iza Schott. (A. odora, A. koch) (A. Comm- utata, Schott.) (Arum m., Linn.) (Caladium o., Lindl.) (Colocasia indica, Benth.)	根	Arrow- root Starch.	1) 根爲健胃、腹痛、霍亂、疝氣等藥。 2) 搗根治腫物用。 3) 根莖辣味強，富澱粉質，煮熟除辣味，得供食用。 4) 將其根莖搗碎，取汁，塗飛機翼翅，可防日晒雨淋(見美國航空雜誌)。	四川，廣東，福建永安余荆山。	本品春生苗，高四五尺，大葉如芋葉而有幹，夏秋間抽莖開花，如一瓣蓮花，碧色花中，有蕊長作穗，如觀音像，在圓光之狀，故俗名爲觀音蓮。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
726.	蒟 藟 (本草17) 別名： 蒟 頭， 鬼 芋， 鬼 頭。	Amorpho- phallus o jak, k. Koch. (Comoph- allus K., Schott) (Arisaema K., Sieb) (Brachys- patha K.Koch, (Hydros- me Rivieri, Engl)	根 葉	Konjak- Mannan. 【→Laevi- dulinose】 Protein 0.06%, Fat 0.01%, Ash 0.37%, 含Coniin類 似之Alkal- oide.	1) 爲利尿劑。 2) 爲硬膏製造 原料。 3) 爲洋黃耨膠 (Tragacan- -tha) 之代 用品。 4) 爲食品。 5) 爲布帛及裱 畫用之糊料。 6) 爲塗料用。	四川，福建， 江蘇。	日本準藥典 ，採用蒟藟 粉。 (Fulvis Konjac)
727.	由 跋 (本草17)	Arisaema ringens, Schott. (A. Siebol- dii, De Vriese.) (A. praec- ox, De Vriese.)	根		治毒腫結熱， 對馬之諸病有 效。	江蘇。	由跋，是虎 掌新根，大 於半夏一二 倍，四畔未 有子牙，其 宿根，卽虎 掌也。

號碼	中 名	拉丁名	藥 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
728.	斑 杖 (本草17) 特名： 虎 杖	A. serratum Schott. (A. japonicum Bl. Var. serratum, Engl.)	汁		有毒，效用與天南星同。	廣西。	斑杖，係天南星之變種，小葉較闊，邊緣有鋸齒，其莖有紫棕之斑，似蝮蛇之色。
729.	虎 掌 天南星 (本草17)	A. Thunbergii Bl. (Arum dracontium Thbg.) (A. japonicum Bl.)	根	根含多量澱粉、有毒，煮沸則有毒成分消失，得為食用。	1) 為鎮瘳祛痰劑，對癲癇及幼兒急病之癲癇發作，供緩解之用。 2) 治金瘡、折傷、瘀血。 3) 治蛇蟲咬傷、疥癬、惡瘡。	湖北，陝西。	其根四畔有圓牙，看如虎掌，故有此名。
730.	芋 (本草27) 別名： 土 芝， 躑 鴉， 芋 頭， 紅芽芋。	Colocasia antiquorum Schott. (Arum Colocasia, Willd.) (A. esculentum L.) (C. Prunipes, Koch.)	塊 根	Starch 20%, Pentosan 5%, Mucilage Protein 2.2%, Cholin 0.04%, Fat 0.1%, Ash 0.97%, Cu..... 1.5mgm%,	1) 芋為滋養品，普通充菜蔬用，又可當糧而充饑年，惟野芋有毒，不可食。 2) 芋葉汁，塗蜘蛛傷。	芋原產於東印度及馬來半島，中國各地皆有，而以閩粵淮楚尤多。	說文云，芋猶呼也，大葉實根，駭呼人也，呼音芋，疑怪貌，又芋魁之狀若鴉之躑坐，亦名躑鴉。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
731.	半 夏 (本草17) 別名：守田，水玉，地文，和姑。	Pinellia tuberifera Ten. P. ternata Breit. Arum ternatum, Thbg. A. macro- num, Bge. Atherurus t., Bl.	根	Phytoster- in Ess. oil Fat, Alkaloid (與Coniine nicotine相 似)	爲瀉嘔(妊婦))祛痰劑，又 治咽喉腫脹及 疼痛。 一次量 1.5-5-10gm 【藥理】半夏有 催吐作用，因 其含有 Phyt- osterin 及揮 發性生物鹼， 此物能麻痺末 梢性運動，並 對獨立神經系 ，有似菸鹼之 作用。 【新藥】 Esvomin, Tuhatul.	北部各省，陝 西，山東，江 蘇，四川，湖 北，福建。	禮記月令， 五月半夏生 ，蓋當夏之 半也。 Pinell 人名 ，ternatus 爲三數而成 之意，因其 葉由三小葉 而成。
732.	野 芋 (本草27)	Zantedes- chia aethiop- ica, Spr.	根， 葉		1)野芋有大毒 ，能殺人， 誤食之，煩 悶垂死。 2)本品磨醋， 傳蟲瘡惡癬 。	野芋生溪澗側 ，非人所種者	野芋形，葉 與芋相似， 有云芋種三 年不採，成 野芋。

第一百三十一 棕櫚科 PALMAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
733.	檳 榔 (本草31) 別名： 賓 門， 仁 類， 洗瘰丹。	Areca Catechu Willd, (A·Catechu, L.) (A. hortensis, Lour.)	種子	Arecoline 0.2%, Arecaidine (Arecaine), Arecarat, Arecolidine, Guvacoline, Guvacine, Isoguvacine (以上為生物鹼) Choline, Red tannin, 15% Resin, Catechine Fat 14%, (Laurine, Myristine, Oleine, Palmitine Stearine.) Mannose, Galactose.	1) 為健胃劑，治腸炎及赤痢及裏急後重，一次量 0.5—4gm, 2) 為家畜驅蟲劑。 3) 在眼科，為瞳孔縮小藥，用氫溴酸檳榔素，一次用 0.004—0.006gm 4) 為繸虫驅除藥用粉末 4—6gm 【藥理】生物鹼中，生理的作用較強者，為檳榔素(Arecoline)，此物類似毛果芸香鹼(Pilocarpine)及菸鹼。對於中樞神經及末梢臟器作用之程度，介乎二者之間。 【德國藥典】採用檳榔子(Semen Arecae)及氫溴酸檳榔素。	南方各省，東印度，馬來島，菲律賓，檳榔嶼，台灣。	賓與郎，昔貴賓之稱，交廣人，凡貴賓至，必先呈此果，若邂逅不周，則相嫌恨，其義，蓋取於此。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
734.	大 腹 子 (本草31) 別名：大腹皮	A. Dicksonii Roxb. (Pinanga D., Bl.)	子皮		大腹皮及大腹子，均治日射病、霍亂、水腫等。 一次量 1—2—5gm	廣東，雲南。	大腹以形名，所以別鷄心檳榔也。
735.	桃 榔 子 (本草31) 別名：姑 榔，麵 鐵 黃 櫻。	Arenga Engleri, Becc. (Didymosperma, E. warb.)	果皮		子為淨血藥，粉作餅餌，為滋養強壯劑，皮織布及繩索。	廣東。	其木似檳榔而光利，故名桃榔，姑榔，麵，言其粉也，鐵，言其堅也。
736.	莎 木 麵 (本草31) 別名：莎 木	A. saccharifera, Labill. (Sogueius Rumphii, Roxb.)		Tapioca, Sugar.	為滋養強壯劑，健胃劑。		張勃吳錄地理志云，交趾攬木皮中，有白粉如米屑，乾之，搗末，以水淋過，似麵，可為餅食者，即此木也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
737.	麒麟竭 (本草34) 別名： 血 竭	Calamus Draco, Willd. (Daemon- orops D., Bl.) and other species such as D. propin- quus, Becc. D. ruber, Mart.		Gum, Resin 82%, Dracoalb- an, Dracores- en, Benzoic acid, Cinnamic acid, Phlobaph ene.	1) 爲收斂劑， 治金瘡出血 ，跌打損傷 ，一切疼痛 。 2) 治一切惡瘡 疥癬。	爪哇，蘇門答 臘，廣東廣州	此物如乾血 ，故謂之血 竭。 本品爲紫錫 樹之脂。
738.	黃 藤 (本草18)	Calamus Margarit- ae, Hce.	藤		1) 解飲食中毒 。 2) 利小便。	南方各省。	
739.	省 藤 (本草18) 別名： 赤 藤， 紅 藤。	C. Margar- itae, Hce.	藤		1) 爲驅蟲劑，南方各省。 治蟻虫，糞 汁服之。 2) 爲驅風藥， 治齒痛打碎 含之。	南方各省。	

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
740.	櫻 桐 (本草35) 別名： 栝 桐	Chamaero- ps excelsa, Th. (Trachyc- arpus e., Wendl.) (T. Fortu- nei, Wendl.)	子	Mannan, Galactan, Saccharo- se.	筍及子花，止瀉痢腸風。 皮止鼻衄、吐血、並治赤白痢崩中帶下，燥存性用，主金瘡疥癬，生肌止血。	浙江，江蘇，四川，南方各省。	皮中毛縷如馬之鬣鬣，故名，櫻俗作栝，鬣音岡，鬣也，栝音并。
741. a.	椰 子 (本草31) 別名： 胥 餘， 越王頭。	Cocos nucifera L.		果肉： Fat 48%， Protein 3.73， Vits A ₁ ， B ₂ ， C ₁ Ash 1.18%， 壳： Xylan， Ash0.3%， (K, Na, Ca) 特殊成分： 椰子蛋白質 中，鹽基性 氮之分布，	1) 胚乳可製油，內部乳汁，供食用，可為奶油之代用品。 2) 椰子油，為軟膏基礎劑及肥皂原料。 3) 椰子汁，釀酒用。 4) 葉可蓋屋，材供建築，果皮外之纖維，可製繩索，內層可製瓢。	廣東，台灣，安南及熱帶各地。	熱帶地方，稱椰子為植物之王，吾國南方人稱君長為爺，則椰名蓋取於爺義也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	----------	-----	-----	-----	-----

(成分續) 爲 Histin 之N 0.96%, Histilin 之N 3.68%, Arginin 之N 29.95%, Lysin 之N 6.41%;

鹽基性氨基酸: Histin...1.44, Histidin...2.42, Arginin...15.92, Lysin...5.80, 蛋白質之水解生成物, 就氮基研究之結果, 爲 Glutamic acid 19.09%, Asparagic acid...5.12%, Alanin...2.67%, Selin...1.76%, Prolin...5.51%.

椰子油中之成分: 飽和酸爲 Capronic acid...0.2—2.0%, Caprylic acid...6.0—9.5%, Caprinic acid...4.5—10.7%, Launic acid...45—51%, Myristic acid...16.5—20%, Palmitic acid...4.3—7.5%, Stearic acid: 未飽和酸爲 Oleic acid...2—10.3%, Linolic acid...1%; 並以上各酸之甘油酯。

不鹼化物: 0.2—0.3% 爲 Phytosterin,

椰子精油 (Ess-oil) 之成分, 爲 Nonyl alcohol, Methyl-heptyl-keton, Methyl-undecyl-ketone,

椰子果肉中之糖, 爲 Galacto-araban, Galacto-Mannan.

椰子果汁: Water 93—95.32%, Protein...0.05%, Sugar...4.15%, Ash...0.43%, Vit...C₁ Cocosit, Oxydase, Catalase, Diastase。

(食植)

b.	沙吾椰子	Metroxylon Rumphii Kön.	種 仁	Saccharose, Galactane Mannane Starch.	食用。	南洋羣島。	
----	------	-------------------------------	--------	--	-----	-------	--

第一百三十二 莎草科 CYPERACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
742.	蒨 草 (本草23) 別名： 自然穀	Carex macrocephala, Willd. C. anthericoides, Presl.	子		子有滋養分，能健腸胃，可作救荒食物。	山東，浙江。	
743.	崖 稷 (本草20)	C. siderosticta, Hce. C. pachygy- na, Fr. & S. Pseudo- Carex plantogin- ca, Miq.	根		為通經藥，治婦人血氣。	河北，山東， 湖北，東北各 省。	生福州石崖 上，苗高一 尺，其狀如 稷。
744.	莎 草 (本草14) 別名： 香附子， 草附子， 水香稜， 水巴戟， 水莎， 水候莎， 莎結， 雀頭香， 續根草， 夫須， 地蕨根， 地毛。	Cyperus rotundus, L. (C. hexas- tachyus, Rottb.) (C. odora- tus Osbeck.) (C. levis- imus. Steud.)	根 草	Ess. oil 0.5%, Cypren, Cyperol, Ess. oil 1%, Fat.	1) 根莖名香附子，為婦科要藥，治婦人慢性子宮炎、慢性子宮內膜炎、月經困難及胎前產後諸症。 2) 治霍亂吐瀉、腹痛。 3) 其草可為笠及雨衣。	江西，江蘇， 廣東，雲南， 河北，山東。	本品疎而不沾，故字從草從沙。 日本準藥典，採用香附子。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
745.	蒭 草 (本草23)	Scirpus Eriophor- um, Michx. (S. cyper- inus, Kth.) (Eriophor- um cyperin- um, L. (Var. concolor, Makino.) (Var. nipponic- us, Fr. & S.)	子		其苗似茅，可 織席爲索。 子亦堪食，如 粳米。	生於水邊。	
746.	荆 三 稜 (本草14) 別名： 京三稜， 草三稜， 石三稜， 黑三稜， 雞爪三稜 。	S.maritim us, L. S. decum- anus, W.	根		1) 治硬塞子宮 血腫、產後 腹痛、月經 閉止等， 一次量 2—4gm 本品對妊婦 ，須禁忌。 2) 莖上白穰柔 韌，可以織 物。	北方各省，中 部各省。	本品葉有三 稜，生荆楚 地，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
747.	烏 芋 (本草33) 別名： 芋 薺， 地 栗， 鳧 茈， 鳧 茨， 黑三稜， 芎。	Scirpus tuberosus Roxb. Eleocharis t. Schult E. planta- ginea R. Br.	球 根	Protein 1.4%, Cbhyd 20.1%, Fat 0.1%, Ash 1.4%, (Cu...0.7m gm%), Vit. C ₁ , Adenine Choline Trigoner- ine.	1) 治黃疸。 2) 爲健胃藥， 消渴、下食 、開胃。 3) 解誤吞銅物 。 4) 製澱粉用。 5) 供食用。 6) 爲祛痰藥。	浙江，江蘇， 山東，湖北。	烏芋，其根 如芋，其色 烏也，鳧喜 食之，故爾 雅名鳧茈， 後遂誤爲鳧 茨，又誤爲 芋薺。

第一百三十三 禾本科 GRAMINEAE

748.	地 筋 (本草13) 別名： 菅 根， 土 筋。	Andropo- gon contortus, L. (Heterop- ogon c., Beauv.) (H. hirtus, Pers.)	根 莖 花		爲清涼劑，止 渴除熱，在腹 臍利筋。	陝西南鄭(古 漢中)。	
------	--------------------------------------	--	-------------	--	--------------------------	----------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
749.	茅 香 (本草14) 別名： 香 麻， 嗝尸羅。	A.schoen- thus, L. (Cymbop- ogon s., Spr.) (C.martini Staps)	葉 花	Ess. oil 1%, Phellandr- ea d-Piperit- on.	花為健胃劑， 暖胃、止嘔吐。 苗葉作浴湯可 驅風，且身上 有香氣。	四川劍南，陝 西，山西，河 南，福建福州。	茅香根如茅 ，有香氣， 故名。
750.	蜀 黍 (本草23) 別名： 高 梁， 荻 梁， 木 稷， 蜀 秫， 蘆 稷。	A.sorgh- um, Brot. Var. Vulgaris, Hack, (Sorghum vulgare, Pers.) (Holcus Sorghum, L.)	種 子	Cbhyd 70%, Protein 9%, Fat 3—4%, Ash 1.4%, (Cu 0.4m gm%) Histidin, Cystin, Arginin, Lysin, Hordein,	1)在東北各省 為重要食糧 ，又為家畜 之飼料。 2)為高粱酒之 原料。 3)雌蕊之柱頭 ，(即子實 先端之毛) ，作煎劑， 治腎臟病。		本品之種， 始自蜀，故 稱蜀黍，其 實原產於南 非洲，西歷 紀元前四千 年，埃及已 經栽種，由 此經小亞細 亞、印度而 入中國，北 方各省尤盛 ，以東北各 省產量最多 ，年可出四 百八十萬噸 。

(成分續) Tryptophan. (以上為蛋白成分) Apigenin...1% (山包穎所
得之色素)； Palmitic acid, Myristic acid, Stearic acid, Oleic acid,
Linoleic acid, Ceryl alcohol, Phytostrin, (以上為高粱種子中脂肪油
成分)； Stigmasterin, Sitosterin, Ceryla'cohol, Carbonyl'alcohol,
(以上為胚芽及種皮油之成分)； 氫氰酸 (HCN) 新鮮葉中含量較多，乾葉
含 0.0358—0.1036%，不可為軍馬飼料，因易中毒而斃命之故。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
751.	蘆 粟 (本草23) 別名：粟， 秬 粟， 秠 米。	A. sorgh- um, Brot. Var. Saccharat- us, Koerm. (Sorghum sacchara- tum, Pers.) Holcus sacchara- tus, L.	種子 汁	Protein 9.5%, Cbhyd 72%, Fat 4.7%, Ash 2.5%, Vits. A ₁ E ₂ , Formic acid, Malic acid, Tartaric acid, Citric acid, Aconitic acid, Galactosø, Leucin, Cystin, Asparagin Glutamin, Pigment.	1) 粟米養腎氣 去脾胃中熱 。 2) 粟泔汁，和 臭粉皮煎， 治疔痢。 3) 紅棕色蘆粟 ，製糖及酒 精用。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
752.	蕪 草 (本草經) 別名： 黃 草， 萊 竹， 萊 蔞， 蔘 草， 盤 草， 王 芻， 烏脚莎。	Arthraxon ciliaris, eouv. (A. japon- icus, Miq.) (A. Langs- dorffian- us, Hochst.) (Andropo- gon lasiscoles Steud) (Lasiolyt- rum hispidum, Steud.) Pleuropli- tis L.			汁液，供黃色 藥料用。	中部及南方各 省，山東。	
753.	雀 麥 (本草22) 別名： 燕 麥， 杜姥草， 薺， 青裸麥， 牛屎草。	(a) Avena fatua, L. (b) A. sat- iva, L.	種 子 苗	Protein 15.6%, Cbhyd 67%, Fat 3.2%, Ash 1.7%, Vit. B ₂ Trigonell- in malonic acid.	本品之澱粉， 被糖尿病者吸 收後，不致立 即分解成糖， 恰如 Inulin, Laevulose 等 之關係，適用 於糖尿病者， 名爲燕麥療法 。	生故墟林野下 。	此野麥也， 燕雀所食， 故名。 燕麥爲麥中 最富於蛋白 質及脂肪者 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
758.	龍 常 草 (本草15) 別名： 棕 心 草	Diarrhena japonica Cry. Var. Koenigii Hack. (Onoea J., F. et S.)	莖		1)治風溼。 2)可以織席。	四川。	俾浴五月采 ，繫角黍之 心，故亦稱 為棕心草。
759.	芒 (本草13) 別名： 杜 榮， 筴 芒， 筴 茅。	Erianthus japonicus Beauv. (Miscan- thus sinensis, Anders.) (Eulalia J., Trin.) (E. densa Baker.) (Sacchar- um J., Thunb.)	莖		1)根莖為利尿 劑，止渴劑 。 2)敗芒箔，為 通經藥。 3)草皮可為履 及繩索。	陝西，江西， 廣東，雲南， 東北各省。	芒，爾雅作 筴，今俗謂 之筴茅，可 以為籬笆故 也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
760.	白 茅 香 (本草14)	Hierochloa borealis, Roem. et sch. (H. Bungeana, Trin.) (H. odorata, Wahlbg.)	根	Cumarin Ash 8.4%	白茅香根和桃葉煎湯，洗小兒遍身疥癩。	廣東，安南，浙江。	
761.	大 麥 (本草22) 別名： 牟 麥	Hordeum vulgare, L. (H. sativum, Jess. Var. vulgare, L.) (H. hexastichon, L.)		種子： Protein 10.5%, Fat2.2%, Cbhyd..... 66%, (Starch60%), Ash2.6%,	1) 爲食用及飼料。 2) 爲滋養強壯。 3) 爲腳氣藥。 4) 製啤酒原料。	北方各省。	大麥形以小麥而大皮厚，故謂大麥。 麥之苗粒皆大於米，故得大名，牟亦大也，通作麩。

(成分續) (As...55mgm%, Cu...12mgm%), Vits A₁ B₂, Pentosan 2.8%, Arabinoxylan, Galactose, Maltose, Mannose, Raffinose, Inosit, Phytin, Lecithin, Sitosterin, Dihyrositosterin, Phytosterin, Histidin, Hypoxanthin, Sinistrin, Tryptophan, Acetoin, Cumarin, Lauric acid, Linolenic acid, Palmitic acid, Lactic acid, Malic acid, Succinic acid, Erepcin, Pepsin, Trypsin, Amylase, Catalase, Cellobiase, Diastase, Lichenase, Linase,

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

Lipase, Maltase, Mannanase, Nuclease, Oxydase, Saccharase, Uræase;

莖: Aconitic acid, Citric acid, Malic acid, Malonic acid, Tricarballic acid, Asparagin, Betain, Cholin, Guanin, Hordenin, Xanthin. (本新, 食植)

762.	穉 麥 (本草22) 別名: 穉麥蘖	Hordeum nudum, L.	種 子	Hordenine	1) 滋養強壯, 作餅食良。 2) 發芽助消化 。	四川, 山東, 河北。	穉麥蘖, 其 殼厚而粗曠 也, 爲大麥 之一種, 普 通充馬糧, 人亦食之, 非常健康。
a.							
b.	麥 芽	Malted Barley (英)		Vits. A ₁ , B ₁ , C ₂ . Fat 1.2%, Lecithin, Maltose 50%, Saccharo- se,	1) 爲滋養強壯 劑及脚氣藥 。 2) 製麥酒(啤 酒)及麥芽 糖等原料。 3) 供食用。		

(成分續) Glucose, Fructose, Xylose, Amylan, Galactan, Pentosan, Starch, Dextrin, Hordein, Glutenin, Albumin, Globurin, Betain, Cholin, Histidin, Urea, Vernin, Edestin, Cumarin, Emulsin, Amylase, Glucase, Cellobiase, Katalase, Lichenase, Lipase, Maltase, Mannanase, Oxydase, Pektase, Peptase, Peroxydase, Phytase, Seminase, Trehalase, Xylanase.

麥芽有助澱粉性食物消化作用, 一次量 1—3gm。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
763.	白 茅 (本草13) 別名： 茅 根， 茅， 干 茅。	Imperata arundina- cea, Cyr. (I. pedice- llata, Steud.) (I. koenig- ii, Beauv.) (Sacchar- um spicatum, Thbg.)	根 花 莖		1) 爲利尿強壯劑，治肺癆及淋疾。 2) 爲清涼劑，治口渴。 3) 爲止血藥，通瘀血。 一次量 3—10gm	山東，廣東， 江西，江蘇， 河北，雲南。	
764.	淡竹 葉 別名： (根名) 碎骨子	Lophathe- rum elatun- Zoll. (L. gracile Brong. Var. elatun, Hack.) (L. japon- icum steud) (L. Lehm- anni Nees.)			葉爲解熱利尿用，劑量 一次量 1—10gm 根能墮胎、催 生。	浙江，四川， 福建，廣東。	野生於原野 路旁，春生 苗，高數寸 ，細莖綠葉 ，其莖與葉 ，儼然如竹 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
765.	粳 (本草22) 別名： 秈 (白粳米) O. Praecox Lour. (紅米)	Oryza sativa, L. (白粳米) O. Praecox Lour. (紅米)	種 子	打光之白粳 米：— Protein 8.6%, Fat 0.5%, Starch 80%, Ash 0.7%, (Cu. Ni. Co. As 7mgm%) Oridine, Myricyl alcohol, Phytin, Lecithin, Arabano- lan, Lipase, Urease. 糙米：— Vits. A ₁ , B ₂ , G ₁ .	1) 爲常用食糧 。 2) 製澱粉用。	南方及中部各 省。	穀有早中晚 三收，晚稻 名爲粳，梗 米，即今人 常食之米， 有赤白大小 異族四五種 。
a.	飯 (本草25)	Cooked rice		Protein 1.8%,	常備食品。		大抵取粳秈 粟米爲之。
b.	粥 (本草25)	Rice congee		Chhyd 21.3%,	有利腸胃。		粥字象米在 釜中相屬之 形。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
c.	青精飯 (本草25)	Rice candy from malted, rice.			滋養強壯。		
d.	飴 糖 (本草25) 別名： 飴	Rice candy from malted rice.		Maltose cbhyd 89.5%,	消痰、潤肺、 止咳、健胃。		糖之清者曰 飴，形怡怡 然也。
e.	稻 藥 別名： 穀 芽	Rice malt			助消化。		
f.	米 糝 (本草25) 別名： 米皮糠	Rice Polishings (Aleurone layer.)		Orizinin, Vits. A ₁ , B ₃ , G ₁ , Adenine, Choline, Wax, Protein 11.5%, Fat 7.1%, Cbhyd 63%, Ash 4%	1) 爲脚氣藥。 2) 製乙種維生 素原料。 3) 爲牲畜飼料 。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
g.	穀 類 (本草22) 別名： 糯穀芒	Rice Husks (Awns)		Saccharo- se, Glucose, Pentose, Adenine, Betain, Choline, Guanin, Guanidine Inosite.	治黃病，為末 ，酒服，又解 蠱毒，煎汁飲 。		
h.	精 糠 (本草22)	Rice bran		Protein 12.5%, Fat 18.2%, Cbhyd 35.3%, Ash 12.6%, Adenin, Cholin, Hypoxant- hin,	1)為脚氣藥。 2)製乙種維生 素原料。 3)為牲畜飼料 。		

(成分續) Phytin, Orydin, Oryzanin, Allantoin, Arachidic acid, Behenic acid, Lignoceric acid, Palmitic acid, Oleic acid, Phytosterin, Sitosterin, Dihyrositosterin, Stigmasterin, Myricyl alcohol, Diastase, Lipase, Phytase.

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
766.	稻 (本草22) 別名： 糯， 稔， 米。	Oryza sativa, L. Var. glutinosa, Mats.		Protein (Glutenin, Albumin, Globurin) 65%, Fat (Phytosterin, Olein, Palmitin) 0.2%, Starch 79%, Ash 1.1%, Vitamin B. Dextrin, Glucose, Maltose,	1)粉爲撒布劑。 2)爲散劑、丸劑之賦形藥。 3)釀酒用。 4)食用。 【藥典】 米澱粉。 [新藥] Vitamin B. Oryzanin, Spelzon, Beriberol, Eukirin, Phytin.	南方及中部各省。	稻從音(音函)，象人在白土治稻之義，稔(音杜)則方言稻音之轉爾。 其性黏軟，故謂之糯。
767.	秈 (本草22) 別名： 早稻， 占稻。	O.sativa, L. (Anname-se upland, Rice.)	種子		爲常用食糧，滋養強壯。	安徽，福建，東北各省。	秈音仙，爲粳屬之一種，成熟最早而顯明者，故謂之秈，種自古城國來，故謂之占。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
768.	陳 廩 米 (本草25) 別名： 老 米， 火 米。	Stored rice, Brown rice.	種 子		1)有消食健胃 、止渴、利 尿之效。 2)作醋用。		即粳米久入 倉陳赤者， 以廩軍人， 故名。
769.	稗 (本草23)	Panicum Crusgalli, L. (P. Crusc- orvi, L. (Echino- chloa C., Beauv.)	種 子	Protein 10%, Ash 3.10%, KCl 3.10%,	1)稗米作飯食 ，宜於脾， 因比大麥、 玉蜀黍、粟 等，消化率 優良。 2)以葉之煎汁 ，為漆瘡之 洗滌用。 3)苗根，治金 瘡出血不已 ，搗傅或研 末搽之，即 止。		稗音敗，乃 禾之卑賤者 也，故字從 卑。
770.	稷 子 本草23) 別名： 龍 瓜 粟， 鴨 瓜 稷。	P. frume- ntaccum, Roxb. (P. stagn- inum, Hance) (Echinoc- hloa f., Roxb.)	種 子	Protein 5.8%, Cbhyd 74%, Fat 5.8%, Ash 3.6%,	種子供食用， 或充飼料。	山東，河北。	稷，不粘之 稱也，亦不 磨之貌也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
771	稷 (本草23) 別名： 稷， 黍。	P.miliaceum, L. P.milium, Pers.	種 子	Protein 11%, Cbhyd 7.1%, Fat 0.9%, Ash 1.2%, Vits, A1, B2, C1, Formic acid, Ericacic acid, Margarinic acid, Ricinolic acid, Valerianic acid, Choline, Linamarase, Silica.	稷性不粘，可作飯食。	湖北，西方及北方各省（東印度原產）。	稷從禾從麥，髮音卽，諧聲也，又進力治稼也。 稷，謂其米可供祭也，禮記祭宗廟，稷曰植黍，爾雅云，黍，稷也，其實稷稷黍，皆一物，語音之輕重耳。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
772	黍 (本草23) 別名： 赤 黍， 白 黍， 黃 黍， 大黑黍， 牛 黍， 燕 頷， 馬 革， 驢 皮， 稻 尾。	P. miliac- eum, L. Var. glutinosa Bretsch.		Protein 9.7%, Cbhyd 77%, Fat 0.9%, Ash 1%, (Cu ... 0.6 mgm%)	白者亞於糯， 赤者最粘，可 蒸食，均可作 餉，或可釀酒 。	北方各省。	黍可爲酒， 從禾入水， 會意也。 黍乃稷之粘 者，有赤白 黃黑數種。
773	狼 尾 草 (本草23) 別名： 狼 茅， 童 梁， 董 蔕， 稂， 孟， 宿田翁， 守 用。	Penniset- um japonicum Trin. (P. compr- essum, R. Br.) (P. chine- rse, Nees) (Gymnot- hrix, J., Kunt.) (G. horde- iformis, Beauv.) (Alopecu- rus h., Osbeck.)			1) 種子可作飯 ，爲救荒食 物。 2) 狼尾似茅， 可以覆屋。 3) 其葉頗韌， 可以織履。	狼尾生澤地。	狼尾，其穗 象形也，秀 而不成，巖 的在田，故 有宿田，守 田之稱。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
774.	蘆 (本草15) 別名： 蘆， 葭， (筍名蘆) 花名蘆葦)	Phragmites communis, Trin Arundo p., L.) (P. longivalvis, Steud.)	根	Protein 1.4%, Cbhyd 2.8%, Fat 0.2%, Ash 0.7%, Protein %, Cbhyd 51%, (Glucose, Saccharose), Asparagin 0.1%, Arginin, Ash1.4%.	蘆根爲健胃劑及鎮嘔藥，一次量 8—30gm 爲豚、鰻、蟹、河豚中毒之解毒藥。		葦之初生曰葭，未秀曰蘆，長成曰葦，葦者偉大也，蘆者，色蘆黑也，葭者嘉美也。
775. a.	竹 (本草37) 別名： 苦竹 (子名竹實，竹米)	Phyllostachys P. bambusoides, S. et Z.	葉	Xylan, Betain, Choline, Urease, HCN gl. Vit. C ₂ Cellulose 42%,	葉燒末和豬膽，爲殺虫劑，治小兒耳瘡頭瘡、疥癬；根治心肺等熱毒；苦竹茹，水煎服，治尿血。苦竹瀝，治口瘡、目痛及牙痛。	江蘇，江西，浙江，福建。	竹種類頗多，入藥者惟箬竹、淡竹、苦竹、甘竹、慈竹（見754號）耳，產於中部及南部各省，有竹實（一名竹米），又名竹肉），係竹間開小花結實者，食之令人心曠清涼，出四川益州。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
b.	筴 竹	<i>P. bambu- soides.</i> S. et Z. Var. Kashirod- ake Mak.	汁		筴竹葉煎湯， 治逆咳氣喘及 霍亂轉筋。 筴竹根作湯， 爲消毒劑。 葦竹茹，治傷 寒勞復產後煩 熱。 箬竹瀝，治風 痿、化瘰、平 氣。		
c.	淡 竹 (本草16)	<i>P. nigra,</i> Munro Var. Hen onis, Makino.	葉 根 汁		淡竹葉治療咳 、氣喘、淡竹 根煮汁服，消 痰、去風熱， 同煎煎湯，洗 婦人子宮下脫 。 淡竹茹，爲解 熱止血藥，止 口渴（於熱性 傳染病之恢復 期，有熱感時 ）並治吐血、 衄血、子宮出 血、逆吃等， 劑量每次 2—7—10gm 淡竹瀝，對老 年人或衰弱者 ，爲解熱祛痰 劑，又用於分 娩後之破傷風 病等。 一次量 30—100gm		李時珍云， 淡竹瀝，治 中風失音不 語，養血清 痰，風痿、 虛痿，在胸 膈，使人癡 狂，痰在經 絡四肢及皮 裏膜外，非 此不達不行 。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
A	鬼 齒 (本草37)	Bamboo roots dec yed.	根		1) 煮汁服，下 魚骨哽咽。 2) 煎湯服，治 小便尿血。 3) 以文火燒炭 ，使不變性 ，(存性) 入輕粉少許 ，油調，塗 小兒頭瘡。		此係腐竹根 ，入地而成 者。
B	竹 筴 (本草27) 別名： 竹 萌， 竹 芽， 竹 胎， 竹 子。	Bamboo soots, of 773 a. b. etc. and 734		營養成分： Protein 2.1%， Fat 1—4%， Cbhyd 3. 19—5.61%， Ash0.8%， (P ₂ O ₅0.046， Ca O0.007， Fe ₂ O ₃0.003，	筴爲苦竹、簞竹、 慈竹等之筴， 產於中部及南 方各省，有冬 筴、春筴、毛 筴、鞭筴、鹽 鞭筴、鞭筴乾 諸種，有消渴 、利水、利膈 、下氣、化熱 、消痰、爽胃 之效。		

(成分續) NaCl...0.06 Si O₂ 等)，Vitamin C₂。

特殊成分：Pentosan 20% (Xylan, Araban), Hexosan, Glucose, Fructose, Sucrose, Cellulose, Lactic acid, Tartaric acid, Citric acid, Gluconic acid, Oxalic acid, Adenine, Arginine, Asparagine, Betaine, Choline, Guanine, Hypoxanthine, Lignine, Tyrosine, Xanthine.

(食植) (本新)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
C	酸 筍 (本草27)	Bamboo Shoots seasoned	莖		莖根作湯食， 止渴、解醒、 利膈。	廣東。	取筍大如臂者，用沸湯泡去苦水，投於水中，浸二三日取出，再以醋煮之即成。
D	仙 人 杖 (本草37)	Bamboo Shoots decayed	根		1)治嘔逆反胃。 2)治小兒驚癇及夜啼。 3)煮汁服，下魚骨硬。		此係筍將成竹時立死者，色黑如漆，五六月收之，另有仙人杖草，見草部。
E	竹 黃 (本草37) 別名： 天竺黃， 竹 膏。	Tabasheer Silicaceous concretion of the bamboo.		KOH 1.1%, Silica 90.5%, Al ₂ O ₃ 0.9%, Fe ₂ O ₃ 0.9%, Ca & C	1)明目、療金瘡。 2)治中風、痰壅、失音不語。 3)治小兒驚風、驚熱。	生於天竺者，名天竺黃。	係苦竹、淡竹等，受一種病的作用，於節間分泌液後，漸乾涸凝結而生之石狀物質。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
776.	甘 蔗 (本草33) 別名： 竿 蔗， 蔗， (音遮) 糖 梗。	Sacchar- um officinar- um, L.	程	程： Saccharo- se 7%， Protein 0.22%， Fat 0.5%， Ash 0.5%， (程灰分中 所含無機質 之百分數：	1)為矯味及賦 形藥。 2)消痰止渴， 利大小腸， 和中下氣。 3)為砂糖原料 。	廣東，福建， 廣西，四川， 浙江，台灣， 琉球。	凡草皆正生 嫡出，惟蔗 側種根上庶 出，故字從 庶。 甘蔗，謂其 莖如竹竿也 。 諸字，蓋音 蔗之轉也。

(成分) CaO...1.14, MgO...3.53, Fe₂O₃...0.11, K₂O...36.61, Na₂...0.88, SiO₂...27.97, SO₃...17.38, P₂O₅...4.76, Cl...0.997, 由 Cl 所分得之 O...0.216, 共計 95.164%, 又根部含 Mn₃O₄...4.54%), Arabinose, Glycine, Asparagin, Glutamin, Leucine, Tyrosine, Guanine, Xylan, Tannin, Laccase, Tyrosinase, Oxydase, (以上三種酵素，存於幼莖之汁中)。

甘蔗莖汁液之呈暗棕色者，係莖中所含之 Laccase，對於 Polyphenol 之作用，又 Tyrosinase，對於 Tyrosine 之作用所起者，由工場粉碎器，所得莖汁液之呈暗綠色者，因莖中之有機酸類，對於 Laccase, Polyphenol 及粉碎器之鐵所起之作用，係與低鐵鹽相互作用，所形成者也。低鐵鹽類，因氧化酵素迅氧化成爲高鐵鹽類，因莖中所含之 Polyphenol，變爲特有之暗綠色化合物。

甘蔗莖節所包被之脂蠟：約 60% 之脂肪質（其主要成分爲 Oleic acid, Linolic acid, Palmitic acid, Stearic acid, Capronic acid 等之甘油酯及 Lethicin, Phytosterine 氧化酸，樹脂酸等），與 35% 之蠟（其成分爲 Cerotinic acid 及 Myricylalcohol）。

甘蔗乾葉中，含 0.0358—0.1063% 之氫氰酸。

甘蔗之汁液，含 Sucrose 20%, Glucose, Citric acid, Malic acid, Lactic acid, Aconitic acid, Myricyl alcohol, Galactoxylan, K₂O 等。
(食植) (本新)

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
778.	梁 (本草23) 別名： 青梁米， 黃梁米， 白梁米。	Setaria italica, Beauv. Vel. Kth. (Panicum i., L.)	種 子	Protein 11.5%, Cbyhd 73%, Fat 2.4%, Ash 0.9%, Lysine Histidine, Arginine, Amylase.	種子供食用。	北方及中部各 省。	梁者，良也 ，穀之良者 也，或云種 出自梁州， 或云梁米性 涼，故得梁 名。又穗大 而毛長粒粗 者，為梁， 穗小而毛短 粒細者為粟 。
779.	秫 (本草23) 別名： 黃 糯， 糯 粟， 糯 秫。	S. italica, Beauv. Var. glutinosa (Panicum italicum L. Var. glutino- sa.)	子		有赤白黃三色 ，皆可釀酒熬 糖，作糕食 之。		秫即梁米粟 米之粘者。
780.	粟 (本草23) 別名： 小 米， 粳 粟， 粟 蘗， 粟 芽。	S.italica, Beauv. Var. germani- ca, Trin, Malted millet.	種 子	Protein 9.7%, Cbhyd 77%, Fat 1.7%, Ash 1.4%, (Cu... 0.56 mgm%)	1)供食用。 2)為小鳥之飼 料。 3)釀造餡及酒 用。 4)為漆瘡及眼 之洗滌用。	各國皆栽培之	許慎云，粟 之為言續也 ，續於穀也 ，粘者為秫 ，不粘者為 粟，即梁之 變種也。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
781.	狗 尾 草 (本草16) 別名： 莠， 光明草， 阿羅漢草。 。	<i>S. viridis</i> , Beauv., <i>Panicum</i> <i>viride</i> , L. <i>S. glauca</i> , Beauv.	種 子 莖		種子似稗，可 採食之，備救 荒用。	生於山野中。	莠草秀而不 實，故字從 秀。 穗形象狗尾 ，故俗名狗 尾，其莖治 目痛，故方 士稱為光明 草，阿羅漢 草。
782.	菅 茅 (本草13)	<i>Themeda</i> <i>gigantia</i> , Hack. (<i>Anthist-</i> <i>iria</i> , <i>Ciliata</i> , Henry.) <i>A. caudata</i> Nees. <i>A. gigant-</i> <i>ea</i> , Cav.	根		根為清涼劑， 止口渴，為利 尿劑，利小便 治淋，又為通 種藥。	生山上。	菅茅似藍茅 而長，入秋 抽莖，開花 成穗如荻花 ，結實堅黑 ，長分許。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
783.	黃 茅 (本草13) 別名： 菅， 黃 菅， 野 菅， 菅 根。	T. triand- ra, Forsk. Var. japonica, Hack. (Anthist- iria arguens, Willd.) (A. japon- ica, Willd.) (Andropo- gon ciliatu , Thunb.)	根		其根強韌，可 製例子，可作 繩索。		黃茅似菅茅 ，而莖上開 葉，莖下有 白粉，根頭 有黃茅根亦 短，而細， 梗無節，秋 開花穗如菅 。
784.	小 麥 (本草22) 別名： 麥	Triticum vulgare. Vill. (T. sativ- um, Lam. Var. vulgare, Hack.)		種子： Protein 12%, Fat1.4%, Cbhyd..... 71%, Ash.....2.5%, (Cu... 0.7 mgm%), Vits. A. B. G.	1)為小麥澱粉 原料。 2)為營養劑， 撒布劑及賦 形藥。 3)供食用，製 麵粉、麵食 、麵包、餅 乾等。 4)由麩素(G' luten)製 造味精。	中部及北方各 省。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----

(成分續) Albumin, Gliadin, Glutenin, Globulin, Leucosin, Asparagin, Arginin, Cholin, Histidin, Allantoin, Betain, Urca, Phytin, Lecithin, Sitosterin, Dihydrositosterin, Parasitosterin, Phytosterin, Paracholesterin, Saccharose, Mannose, Raffinose, Inosit, Starch, Dextrin, Arachinic acid, Malic acid, Lignocericin acid, Triticonucleic acid, Sinapin, Tryptophane, Amylase, Carboxylase, Ereptase, Katalase, Lenamara e, Lichenase, Maltase, Peroxydase, Protease, Phytase, Tyrosinase, Urease, Uricase.
 藥: Aconitic acid, Citric acid, Malic acid, Malonic acid, Saccharase, Ash...3.5% (SiO₂...50%, Ba.)

A	麥 麩 (本草22) 別名: 麥 皮	Wheat bran.		Protein 17%, Fat... 4%, Ash3.5%, P ₂ O ₅ 50%,	1)為消化劑。 2)治脚氣。 3)製乙種維他命原料。		麩，乃麥皮也。
---	-----------------------------	----------------	--	---	----------------------------------	--	---------

(成分續) K₂O...2 %, MgO...17%, CaO...3%), Vits...A₁, B₂. Phytin, Phytosterin, Sitosterin, Hydrositosterin, Mannan, Arabinoxylan, Vanillin, Oxydase, Peroxydase, Phytase, Tyrosinase.

B	蒸 餅	Steamed bread.		Protein 8.2%, Cbhyd 52%,	1)為消化劑。 2)為利尿劑， 通尿道，治 淋疾。		本品係小麥粉和醱糟蒸成食品之餅，故名。
---	-----	-------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
C	醬 (本草25)	Flour sauce, Wheat soy.		Protein 7.8%, Cbhyd 35%, Fat 0.4%, Ash 11.3%,	1)爲滋養性食 品。 2)爲調味劑。		醬者，將也 ，能制食物 之毒，如將 之平暴卒也 。
D	麩 粉 (本草22)	Wheat starch			1)爲滋養性食 品。 2)爲緩和劑及 糖類之製造 原料。		
E	麩 筋 (本草22)	Wheat gluten.		Protein 22.4%, Water 75%, Ash 0.7%,	1)爲素食要物 ，養食甚良 。 2)爲味精之製 造原料。		以麩與麵， 水中揉洗而 加者。
F	麥 麩 (本草22)	Wheat dextrine.			1)消渴止煩。 2)爲丸錠劑之 賦形藥。		麥蒸熬過磨 作之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
785.	玉蜀黍 (本草23) 別名· 玉 米， 玉 麥， 玉高粱， 玉蜀秫， 戎 菽， 包 穀， 番 麥， 紅鬚麥， 御 麥， 南蠻黍。	Zea Mays, L.		雌蕊： Phytosterol, Peroxydase, Glucose, Galactan, Xylan. 根葉： Xanthophyll, Arginin, Trigonellin, Aconitic acid, Citnic acid,	1)花柱為利尿劑，治糖尿病，一次量8gm，為煎劑。 2)根葉對小便淋瀝砂石，痛不可忍，煎湯頻飲解之。 3)子實為健胃劑及葡萄糖之製造原料。 4)為食川及釀酒之用。	南美洲原產，中國各地均有。	本品苗葉似蜀黍，故名。

(成分續)Malic acid, Xylan, Saccharase, Amylase, Maltase, Pektase.

種子(白色者)：Fat 2.1%， Protein 7.7%， Cbhyd 73%， Ash 1.2%，
Vits. B₂, G₁, Dihydrostosteric acid, Paraphytosterin, Phytostarin, Sucrase.

(黃色者)：Fat 4.4%， Cbhyd 75%， Protein 8.6%， Ash 1.8%，
(Cu...0.23mgm%， As...30mgm%) Vits A₂, B₂, E₁,
G₁. Galactan, Pentosan, Phytin, Glutamin,
Glutathione, Gluteline, Guanidine, Zeaxanthin,
Quercetin, Isoquercitrine, Tryptophane, Lecithin,
Sitosterin, Acetaldehyde, Furfurol, Formic acid,
Capronic acid, Caprylic acid, Caprinic acid,
Arachinic acid, Lactic acid, Malic acid, Succinic acid, Amylase, Diastase, Lichenase, Lipase,

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
----	-----	-------	-----------	-----	-----	-----	-----

Maltase, Phytase, Succharase.

【美國準藥典】玉蜀黍花柱。

【新藥】Pistin, Takalidin (以上二藥，係由玉蜀黍雌蕊所製之利尿劑)。

786.	菰 (本草19) 別名： 菱白， 菱米， 菱草， 蔣草。	Zizania aquatica, L. (Z. latifo- lia, Turcz.) (Hydropy- rum lalisolium Griseb.)		Protein 1.2%, Fat 0.1%, Cbhyd 2.8%, Csh 0.5%	1)菱白煮食， 止渴及小兒 水痢。 2)作菜蔬用。	菰原出河北， 山東，今處處 有之，生江湖 陂澤中。	江南人呼菰 為菱，以其 根交結也。
787.	蓬草子 (本草23)	Z. sp. (Hydropy- rum setaria)	子	Protein 8.5%	種子可作飯， 為救荒食物。		
788.	寒具 (本草25) 別名： 捻頭， 環餅， 餠。	Cake, Fried.			利大小便、潤 腸。		寒具冬春可 留數月，及 寒食禁烟用 之，故名寒 具。 寒具捻頭也 ，以糯粉和 麩麻油，煎 成，以糖和 之，可留數 月，宜禁烟 用。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
789.	黃 蒸 (本草25) 別名： 黃 衣， 麥 黃。	Cake, Yellow.			治食黃黃汗。		以米麥粉和 罨，待其薰 蒸成黃者， 故名。 用米麥合磨 成粉，和水 成餅麻葉裹 之，待生黃 衣，取出晒 乾，備用。
790.	饊 (本草25) 別名： 黍	Cake, Sweet.			粳饊養脾胃， 厚腸、益氣、 和中。 黍饊，縮小便 ，堅大便。		饊，以黍糯 合粳米粉， 蒸成，狀如 凝膏也。
791.	糜 米 (本草23)	Rice, Malt.		Vits, A1, B ₂ , C ₂ , Hordenine	為消化藥，消 宿食、開胃。		此以米作藥 ，非別來名 也。
792.	糟 (本草25) 別名： 香 糟	Mash. Fragrant malt		Protein 16.2%, Fat 2.4%, Cbhyd 24%	有防腐性，能 藏物不散。		糯、秫、黍 、麥，皆可 蒸釀酒醋， 熬煎傷飴， 化成糟粕。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
a.	酒 精 (本草25)	Distilleris dregs.			1)爲消化劑。 2)爲消腫用。		
b.	乾 餾 糟 (本草25)	Mash candy.			治反胃吐食。		
793.	米 酒 (本草25)	Rice wine.		Alcohol 6.1% (老酒) 10.0% (黃酒) 11.7% (紹興酒) 15.3% (花彫) 17.5% (五加皮)	1)爲嗜好性飲 料。 2)爲蔬菜之調 味料。	南方及中部各 省。	說文，酒就 也，所以就 人之善惡也 ，一說酒字 篆文，象水 在甬中之狀 。
794.	燒 酒 (本草25) 別名： 火 酒， 阿刺吉酒 。	Spirits from, Kaoliang.		Alcohol 49—81% 20.3% (白玫瑰) 31.5% (高粱) 66.55% (白酒)	少飲興奮，過 飲傷胃。	北方各省。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
795.	醋 (本草25) 別名： 醴，酢， 苦 酒。	Vinegar.		Acetic acid 2%	1) 爲調味劑。 2) 助消化。 3) 消癰腫。	山西，江蘇鎮江，浙江，廣東。	醋措也，能措置食毒也。
796.	糉 (本草25) 別名： 粽， 角 黍。	Dumplings.			係舊歷端午應時食品。 楚俗，投粽於汨羅水，祀屈原。		糉俗作粽，古人以菰蘆葉裹黍米煮成，尖角如糉櫚葉心之形，故曰糉，曰角黍。

第一百三十四 水龍科 HYDRICCHARITACEAE

797.	龍舌草 (本草19)	Ottelia alismoides, Pers. (O. japonica, Miq.) (O. indica, Planch.) (Stratiotes a., L.) (Damasonium i., Willd.)			草治癰疽湯火灼傷及乳癰腫毒，搗和傅之。	生南方池澤湖汨中。	
------	---------------	--	--	--	---------------------	-----------	--

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
798.	苦 草 (本草19)	Vallisneria spiralis, L.	草	Protein 15%, Fat 1.3%, Ash 29%, Croton.	治婦人白帶， 煎湯服之。	生河北，江蘇 湖澤中。	

第一百三十五 瀉澤科 ALISMATACEAE

799.	澤 瀉 (本草19) 別名： 水瀉， 及瀉， 鵝瀉， 禹孫， 芒芋， 瀉。	Alisma plantago, L. (A. cardifolia, Thunb.) (Sagittaria sagittifolia, L. Var. typica, Makino.)	根	Protein 7%, Stach 23%, Ess. oil Resin Ash 1.4%	爲利尿劑及清 涼劑，治水腫 淋疾、糖尿病 等，又對眩暈 ，亦有效。 一次量 2-8gm	生於池沼及水 澤中，出北方 各省，河南， 四川，浙江， 福建建甌。	去水曰瀉如 澤水之瀉也。
------	---	---	---	--	---	---	-----------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
800.	慈 姑 (本草33) 別名： 水慈蕪， 白慈姑， 青慈姑， 白地粟， 藉 姑， 河鳧茈。 (荷名) 槎丫草， 燕尾草， 剪刀草， 箭搭草。	Sagittaria sagittifo- lia, L. Var. Sinensis, (S. chine- nsis, Sims.) (S. macro- phylla, Bunge.) (S. trifolia L. f., Makino.)	塊 莖	Protein 5.6%, Cbhyd 23%, Fat 6.2%, Ash 1.6%, Vit. B ₄ . Starch 55.32%, Dextrin 1.75%, Galactose 1.43%, Invert- sugar 5.54%, (Sacrose, Raffinose) Reduced- sugar..... ... 0.67%, (Glucose, Fructose) Asparagin 0.8%, Betain 0.073%, Cholin 0.036%	1)爲菜蔬用。 2)治難產胞衣 不出，搗汁 服之有效。 3)塊根搗碎， 塗布火傷時 之患部。	生江湖及近水 河溝沙磧中。	慈姑一根， 歲生十二子 ，如慈姑之 乳諸子，故 以名之。

第一百三十六 香蒲科 TYPHACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
801.	香 蒲 (本草 9) 別名： 蒲 黃， 甘 蒲， 醮 石。	Typha latifolia, L. T.japonica Miq. (T.orient alis, Presl.) (T.latifol- ia, Brets.) (T.angus- tata, Boryy. et Chaub.)	花 粉	花粉： Iso-Rham- netin (gl.) Fatty oil (Palmiti- ne, Stearine, Linoleine, α -Typha- sterine.) 根莖： Cbhyd 70%, Starch 25%, Ca malate Enzyme haemoly- tic, Pigment.	1)花粉爲止血 藥，治吐血 、衄血、血 尿、腸出血 、子宮出血 等，又爲消 炎性利尿劑 。 2)舌突然腫大 時，塗蒲黃 有效。 3)爲撒布劑， 治濕疹及創 口。 4)爲蜂之飼料 。	生於沼澤等水 邊。	山南人稱本 品爲香蒲， 以菖蒲爲臭 蒲也。 花上黃粉， 名爲蒲黃。 Typha 希臘古名， latifolia 廣葉之意。

丑 裸子植物 GYMNOSPERMAE

第一百三十七 麻黃科 GNETACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
802.	麻 黃 (本草15) 別名： 龍 沙， 卑 相， 卑 臙。	Ephedra, sinica stapf. (草本麻黃) E. equiset- ina, Bunge. (木本麻黃) E. vulgar- is, Rich. Var. helvetica HK. et Th. (印度產麻 黃)	莖	l-Ephedr- ine, d-Pseudo ephedrine d-Nor- pseudoep- hedrine, l-Methyl- ephedrine α -Methyl -pseudo- ephedrine l-Noreph- edrine Ess. oil	1) 爲鎮咳劑， 治百日咳， 肺結核、喘 息。 2) 爲發汗劑及 利尿劑。 一次量 5-8gm	內蒙古東部林 西街道，華北 ，四川，河南 ，雲南，南西 伯利亞黑海歐 洲西南部。	本品因其味 麻，其色黃 故名。 歐洲產麻黃 不含 Ephedrin 而含 Pseudoe- phedrine。

【藥理】鹽酸麻黃鹼，有散瞳作用而壓上昇，發汗及呈副腎素狀之作用。

麻黃根之作用與麻黃鹼相反而壓下降，呼吸數增大，末梢血管擴張，根與節，有止汗作用，配藥時，須注意除去。

Pseudoephedrine 有強力利尿作用。

【新藥新製劑】I) 麻黃素劑：Ephedrin(Merck), Ephetonin, Asthmatol.

II) 麻黃素與副腎素合劑：Adephin, Rasedrin.

III) 麻黃素與怕怕非林合劑：Tussidrin.

IV) 麻黃與桔梗合劑：Campanol, Hustol.

第一百三十八 松杉科 PINACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
803.	琥 珀 (本草37) 別名： 江 珠	Amber (st.)		Succinic acid 3—8% R sinoids C ₁ H ₁₈ O	爲鎮靜劑，又 爲止血劑，能 止血、生肌、 合金瘡。	雲南麗江，朝 鮮、日本。	時珍云，虎 死則精魄入 地化爲石， 此物狀似之 ，故謂之虎 魄，俗文從 玉以其類玉 也。
804.	鑿 珀 (本草37) 別名： 鑿 珀	Black amber (st.)			磨滴目醫赤障 。	新疆吐魯番（ 交河）。	因其色黧黑 ，故名。
805.	杉 (本草34) 別名： 黏， 沙 木， 檜 木。	Crypome- ria japonica, Don. (Cupress- us j., L.) (日本杉) Cunningh amia sinensis, R. Br. (C. lance olata, Lambt.) (Pinus l. Lambt) (Belis jaculifolia Salisb.) (中國杉)		葉部： Ess. oil (α -Pinen Dipenten, Cadinen, Sesquiter- pen), 木部： Ess. oil (Cadinen, Cryptome- riol, Machiol, Suginen), Xylol. 種子： Arginin. 葉： Cedrol, 木部： Terpineol, Cedrol.	1)精油爲芳香 料及治淋疾 。 2)樹脂爲被覆 藥，杉脂硬 膏原料，蚊 香材料。 【藥典收載品】 杉脂，杉脂硬 膏，黃荊硬膏 。 【新藥】	福建，浙江， 四川，湖北， 貴州，雲南， 日本。	Gonosalbin, Cryptal, Sestarin.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
806.	檜 別名： 扁 柏	Juniperus chinensis L. (J. cernuus, Roxb.) (J. japonica, Hort.) (J. Thunbergianii, H. & A.) Chamaecyparis obtusa, S. et Z. (日本種)		葉： Ess. oil (1- α -Pinen, d. Limonen, Cadinen, Bornylacetat, Sesquiterpenalcohol) Stearic acid, Undecylenic acid, 木部： Hinokinin Hinokiol, Ess. oil (l. Cadinen d α . Pinen Camphen, Borneol, Campher, l-Rhodinic acid) Juniperic acid. (扁柏酸) 根部：Ess. oil (Pinen, Terpineol, Isoborneol, Cadinen, Sesquiterpenalcohol, Chamaecypariol.) 果實：Ess. oil (Cedrol Cedrene.)	1) 精油用於顯微鏡，油浸裝置。 2) 檜之精油，為尿道消毒及淋疾藥。 3) 木部中所得揮發油之主要成分 l-Rhodinic acid 0.1% ，對結核菌殺菌力及發育阻止力甚強。 (見臺灣大學熱帶醫學研究補冊第一號)		【新藥】 治淋用： Gonccrol, Hysagosulin, Obutal, Tujol, Santujol.

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
807.	杜 松	Juniperus communis L. J.conferta Parl. J.rigida Sieb. et zucc.	果 實	Ess. oil (Pinen cadinen, Silvestrin Junipen, Junipenol)	1)內用爲利尿劑，治水腫，尿道生殖器疾患。 2)爲發汗劑。 3)外用治痛風及風濕症。	匈牙利，奧大利，意大利，法國南部。	日本準藥典：杜松實，杜松木髓膏。 【新藥】 治淋劑 Libanol 杜松實油劑。
808.	海松子 (本草31) 別名： 新羅松子	Pinus koraiens is, S. et Z. P. protop. hylla.		Fat ...74% (Olein, Linolein, Palmitin) Protein14.8% Ash 2.6% Vits. A ₁ , B ₂ .	滋養強壯劑。	雲南，東北各省。	
809.	松 (本草34)	Pinus.			1)松脂內用爲消腫、止痛、(緩解打撲症之疼痛)及祛痰藥。 一次量 0.5 2.0gm 外用爲軟硬膏之基礎劑用。 2)松節油，爲溶解劑及精製松節油，透明松香之原料。		松柏爲百木之長，松猶公也，柏猶伯也，故松從公，柏從白。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
A1	二 鍼 松 別名： 馬尾松， 山 松。	P.massoniana, Lambt. (P. sinensis Bth.)		黑松子： Arginine 赤松葉： Ess. oil 0.4% (Borneol acetate,) Glucokinin	【藥典收載品】 松脂，松脂硬 膏，松節油， 精製松節油， 透明松香，木 蠟油，木蠟油 軟膏，木蠟油 彩漿，強發泡	【新藥】 Terpichin Kriobin 消炎劑。	
A2	黑 松	P. Thunbergii, Parl. (P. sylvestris, Thunb.) (P. massoniana S. et Z.) (P. densiflora, Hort.)		赤松皮： Glucokinin 黑松枝： Ess. oil (Camphen)	軟膏，白吉利 軟膏，威卿遜 軟膏。		
A3	赤 松	P.densiflora, S. et Z.		黑松赤松幹 根： Ess. oil (Turpentine, Pinen, Camphen, Seaquiterpen)			

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
B	三 釵 松	P. Bungea- ta, zucc. (P. excor- ticata, Hort.)		黑松滲出液 : Ess. oil 23%, Resin 73%, (Pinitic acid, Popinolic acid, Popininc acid.)			
C	五 釵 松	P. pentap- hylla, Mayr. P. parvifl- ora, S. et Z.		赤松滲出液 : Ess. oil 25%, (Bornylac- etate) Resin 70%, (Densipim- -aric acid)			
810.	長 松 (本草12) 別名: 仙 茆	P. pumila, Regel.	根		治癩病。	陝西。	其葉如松， 服之長年， 功如松脂及 仙茆，故有 二名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
811. a.	柏 (本草34) 別名： 側 柏， 榲 柏。	Thuja orientalis, L. (Ejota o., Endl.) (Th. or B. chinensis, Hort)		子實： Fat 葉： Ess. oil Pinen, Caryophyllen) 滲出液： Ess. oil 2.75%, Resin.	側柏仁(榲子仁)，爲鎮咳 祛痰藥，治氣 管支炎及喘息 。一次量 1—4gm 又爲滋養強壯 劑，取 6gm 爲粉末，或作 煎劑服之。 側柏葉，爲收 斂性止血藥， 治吐血，衄血 、腸出血、子 宮出血及赤痢 等， 一次量 3—6gm		
b.	羅 漢 柏	Thujaopsis dolabrata S. et Z.			羅漢柏葉，治 黃疸， 一次量 7—15gm		

第一百三十九 紫杉科 TAXACEAE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
812.	紫 杉	Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.		葉含有無晶形之紫杉鹼 (Taxin), 歐洲產 T. baccata 中, 所含有之配物 Taxicatin, 在東方產紫杉, 尚未檢出。	葉為通經及利尿藥。 【藥理】紫杉鹼 (Taxin), 使血壓降低, 心臟運動緩慢, 而靜止於擴張期。中毒致死之原因, 為心臟靜止。	產於各地。	
813.	榧 (本草31) 別名: 榧子, 榧子, 赤果, 玉山榧, 玉山果。	Torreya nucifera, S. et Z. (T. Fargesii, Fr.) (Taxus n. Kmpf.)		葉: Ess. oil (60%之Limonen) 及 2.7%之縮水木糖 (Xylan) 核果: Protein 10%, Cbhyd 23%, Fat 48%, (Palmitic acid and Stearic acid 9%, Oleic acid 19%, Linolic acid 72%) Ash 2.6%, Torreyol. 葉: Ess. oil (1-Limonene 約60% Camphene Pinene, Cadinene, Torreyol C ₁₅ H ₂₆ O)	1) 為十二指腸虫驅除藥, 取果實 10gm 服之。 2) 助消化, 治痔疾, 殺諸虫。 【新藥】Kayanol (係由榧實製取之油, 用以驅除十二指腸虫者), Tropinal。	江西玉山, 甘肅永昌, 浙江杭縣, 湖北, 四川, 雲南。	榧亦作排, 其木名文木, 斐然章采, 故謂之榧。

第一百四十 銀杏科 GINKGOACEAE

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
814.	銀 杏 本草30) 別名： 白 果， 公孫樹， 鴨脚子。	Ginkgo biloba, L. (Salisbur- ia adiantifo- lia, Sm) (S.macro- phylla, Koch.)		果實： Protein 5.30%， F t 1.54%， Starch 68%， Ash 1.57%， Sugar 6%	1) 果實為鎮咳藥用，2-6 gm 煮食。 2) 果皮為皮膚刺激劑，搗碎貼布之。 3) 葉為害虫防治用。	銀杏生江南，以安徽宣城者為佳。	本品形似小杏，而核色白故名。

(成分續) (Sucrose, Glucose), Formic acid, acetic acid, Propionic acid, Butyric acid, Caproic acid, Valerianic acid, Ginko acid, Globuline (Ginkgoin), Albumine, Prolamine, Gluteine, Bilobol, Ginnol, Cinkol, Pentosan, Asparagine, Sitosterine, Phytosterine, Histidine.

果皮：Ginkgolic acid, Bilobol, Ginnol.

葉：Ginnol, Shikimic acid, Sitosterine, Flavone. (食植)

第一百四十一 蘇鐵科 (鳳尾松科) CYCADACEAE

815.	鳳尾蕉 (秘傳花 鏡) 別名： 鳳尾松， 蘇 鐵， 鐵 樹， 海 櫻， 火 蕉， 窟莽樹。	Cycas revoluta Thunb. (蘇鐵) Phoenix dactylife- ra, L. (無漏子) 果實名無漏 子(本草綱 目31)無漏 果(本草拾 遺7)金果 ，番棗，波 斯棗，海棗 ，千年棗， 萬歲棗。	果 實	果實： Sugar 5.2%， Protein 3%， Fat 1%， Cbhyd 75%， Ash 2% (As 0.01 mg%)， Sacchara- se, Mannite, Mannana- se, Galactoar- aban,	1) 果實為收斂劑，通經藥，并為消化、鎮咳、祛痰藥。 一次量 12gm， 為煎劑，或 4gm 為粉末。 2) 本品之澱粉，治痢疾及嘔吐。 3) 治刀傷，用蘇鐵葉燒焦，和豚脂煉合塗之。	雲南，廣東，福建，江西，台灣，琉球，波斯，東印度。	蘇鐵謂其將枯死時，打入鐵釘則復蘇故名，無漏子，殆係番音。
------	--	--	--------	---	---	---------------------------	------------------------------

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
					(成分續) Cumarin, Galactomannan, Malic acid, Tartaric acid, Adenine, Pholine, Histidine, Inosite, Formaldehyde.		
					樹幹: Arginine, Formaldehyde. (本新, 藥植)		

乙 羊齒植物 PTERIDOPHYTA

第一百四十二 卷柏科 SELAGINELLACEAE

816.	卷 柏 (本草21)	Selagine- lla 别名: involvens 豹 足, Spr. 求 股, S. tamar 交 時。 iscina 萬 歲, spring) 長生不死 草。	莖 葉		1) 爲下血藥及脫肛藥。 2) 葉燒灰, 混茶油, 治小兒腦膜炎。 3) 葉爲煎劑, 治婦人病用。	湖北, 廣東, 陝西, 山東。	
------	---------------	--	--------	--	---	-----------------	--

第一百四十三 石松科 LYCOPODIACEAE

817.	石 松 (本草21)	Lycopodi- um 别名: clavatum L. 日蔭蓼。	胞 子 莖	Fatty oil 50%, (80—86% Lycopod-ic acid) Lycopodin (Alk)	1) 爲撒布劑, 治皮膚癬癩症。 2) 爲丸衣用。 【藥典】採用石松子。	生浙江天台山, 寒帶, 溫帶山地蘇聯、德意志、瑞士等國。	
------	---------------	---	-----------------	--	--	------------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
818.	玉 柏 (本草21) 別名： 玉 遂	L. obscurum L. L. japonicum Thbg.	全 草		使身體健全，精神愉快，并有止渴之效。	生石上。	

第一百四十四 木賊科 EQUISETACEAE

819.	木 賊 (本草15)	Equisetum hyemale, L.	莖	Fat, Starch, Resin, Sugar Silica (SiO ₂) Equisetine (alk.)	爲收斂劑(治腸出血，痔出血)，利尿劑，發汗劑及眼疾藥， 一次量 2—7gm	陝西，山西。	其莖富於硅酸，供金工、木工之磨擦材料。
820.	問 荊 別名： 接續草， 筆頭菜。	E. arvense L.	莖	Fat (Linolenic acid, Phytosterol.) Equisetonine (Sap) Equisetin (Alk) Silica.	爲利尿劑。		Equisetonine, 水解化生 Equisetogenine 及 Fructose, Arabinose

第一百四十五 水龍骨科 FILICALES

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
821.	鐵線草 (本草13)	<i>Adiantum flabellatum</i> , L.	根	Bitters, Ess. oil, Tannin.	祛痰藥。	江西。	
822.	石長生 (本草20) 別名： 丹草， 丹沙草。	<i>A. monochlamys</i> , Fat. (<i>A. venustum</i> , Den. Var. m., Luers.)	莖， 葉， 根		爲祛痰藥及婦人病藥。 一次量 2—6gm 又治諸瘡及疥癬等。	陝西。	
823.	貫衆 (本草12) 別名： 鳳尾草， 草烏頭， 黑狗脊， 百頭， 貫節， 貫渠。	<i>Aspidium falcatum</i> , Sw. (<i>Aspidium orientale</i> , Stuart.) <i>Woodwardia radicans</i> , Stuart) (<i>Athyrium brevifrons</i>	根 莖		1) 爲止血劑，治血崩，產後出血，用4gm煎服，止金瘡及鼻血，取粉末4gm塗敷之。 2) 爲驅蟲劑，殺三蟲去寸白。 3) 爲解毒劑，	陝西，湖南，湖北，廣東，雲南，東北各省。	此草葉莖如鳳尾，其根一本而衆枝貫之，故草名鳳尾，根名貫衆。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
		Var. angustif- rons.) (Polystic hum f., Diels. (Cyrtomi- um Fortunei, J. Smith.)			治斑疹毒及 漆毒。		
824.	陰地蕨 (本草15)	Botrychi- um ternatum, Sw.	根 苗		治腫毒及吐血 。	河北，江蘇， 浙江。	
825.	水 蕨 (本草27)	Ceratopter- is thalictro- ides; Brongn. Ello .ocar- pus oleracea, Kaulf.	苗		治腹中痞積， 淡煮食一二日 ，即下惡物， 忌雜食，一月 餘乃佳。	水蕨，似蕨生 水中。	

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
826.	烏 蕨 (本草21) 別名： 石 髮， 石 衣， 石 苔， 石 花， 石馬鬣， 鬼 鬘。	Davallia tenuifolia Sw. (Odontos- oria, t., Sm.)	草		1) 爲利尿劑， 治膀胱氣， 并療黃疸。 2) 治婦人血崩 。 3) 治湯火傷灼 。		生山谷石上 及木間陰處 ，青翠茸茸 者，似苔而 非苔也。(又烏蕨是瓦 松，生於石 上者)。
827.	狗 脊 (本草12) 別名： 狗 青， 百 枝， 強 脊， 扶 筋。	Dicksonia Barometz, Link. Aspidium B., Willd. (Polypodi- um B., Lour.) (Cimboti- um B., Sm.) Osmunda japonica, Thunb.	根 莖	Starch	爲強壯利尿藥 。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
828.	螺 磨 草 (本草20) 別名：鏡面草	Drymeglossum carnosum H.K. (Taenotis c., Mett.)	草		1) 爲消腫藥， 治癰腫、風 疹、腳氣腫 、搗爛傅之 ，又煮湯洗 腫處。 2) 爲止血藥， 治小便出血 、吐血、衄 血。 3) 治齲齒痛。	蔓生石上。	葉狀似螺磨 ，微帶赤色 ，而光如鏡 背，有小毛 ，小草也。
829.	海 金 沙 (本草16) 別名：竹園菱	Lygodium japenicum, Sw.	胞 子	Fatty oil Spores.	爲利尿劑，治 淋病水腫。 一次量 3—7gm 又爲鎮靜藥。	貴州，湖北。	本品因其色 黃如細沙也 ，謂之海者 ，神異之也 。
830.	蘋 (本草19) 別名：茱菜， 田字草， 四葉菜。	Marsilia quadrifolia, L.	草 汁		1) 爲清涼劑， 利尿劑，止 消渴，去暴 熱，下水氣 ，利小便， 搗塗熱瘡。 2) 爲解毒藥， 搗汁飲，治 蛇傷毒入腹 內。		蘋，爲蘋蘩 蘊藻之菜。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
831.	骨碎補 (本草20) 別名： 胡躑躅， 猴躑躅， 石毛躑， 石菴閩。	Polypodi- um, Fortunei, Kze. (<i>Drynaria</i> F., Sm.)	根		根主治破血， 止血，補傷折 。		開元皇帝， 以其主傷折 ，補骨碎， 故命此名。
832.	綿馬	<i>Dryopteris</i> filix-mas Schott. (<i>D. crassir-</i> <i>-hizoma</i> , Nakai.)	根 莖	Filicin, Filmaron, Flavarspi- dic acid, Albaspidi- in, Aspidinol.	為驅蟲劑，治 絲蟲及十二指 腸蟲。 一次量，用醃 浸膏5—10gm 。		【藥典】 綿馬根，綿 馬浸膏。 【新藥】 Tritol, Filmaron oil.
833.	金星草 (本草20) 別名： 金釧草， 七星草， 鳳尾草。	Polypodi- um hastatum Th.	葉 根		1) 為消腫藥， 治背癰瘡結 核。) 為解毒藥， 解硫黃及丹 石毒。	生南方及西方 各省，背陰石 上淨處，及竹 管中或背陰古 瓦屋上。	即石草之有 金星者。
834.	石蕒 (本草20) 石皮， 石蘭， 石韃。	<i>P. Lingua</i> , Sw. (<i>Cycloph-</i> <i>orus</i> , L., Desv.) (<i>Niphobus</i> L., Sm.)	葉		1) 消腫、止血 、利尿、益 精氣。 2) 治淋病及赤 尿。	陝西，福建。	蔓延石上， 生葉如皮， 故名石蕒。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
835.	蕨 (本草27) 別名： 藍	Pteridium aquilinum Kuhn. Pteris aquilina, L.	根 莖	Glucoside, Hexyl n- aldehyde Starch, Pentosan, Adenine, Ergosterin	1)根爲利尿劑 , 解熱劑。 2)根莖製澱粉 , 爲緩和滋 養藥。 一次量 4—7gm	各處山中有之	蕨初生無葉 , 狀如雀足 之拳, 又如 人足之蹶, 周秦曰蕨, 齊魯曰藍, 初生亦類藍 脚故也。
863.	仙人掌草 (本草20)	Pteris multifida, Poir.	葉		治腸痔瀉血, 與甘草浸酒服 。 焙末, 油調, 摻小兒白禿瘡 。	生合州筠州。	於石上貼壁 而生, 如人 掌形, 故以 名之。

丙 蘚苔植物 BRYOPHYTA

第一百四十六 蘚苔類 MUSCI

837.	井中苔 (本草21)	Moss.	全草		療湯火傷, 約生於廢井中。 瘡、漆瘡、水 腫、解野葛 巴豆諸毒。		
838.	船底苔 (本草21)	Moss.	全草		治鼻洪、吐血 、淋疾。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
839.	垣 衣 (本草21) 別名： 垣 羸， 天 韭， 鼠 韭， 昔 邪。	Moss.	全草		治黃疸及咳逆。	生古垣、牆陰、或屋上。	
840.	土 馬 鬣 (本草21)	Polytrichum commune L.	全草	Saponin.	治鼻衄不止，耳上溼瘡。	生背陰古牆垣上。	

丁 同節植物 THALLOPHYTA

第一百四十七 地衣類 LICHENES

841.	石 蕊 (本草21) 別名： 酶 苔， 石 湍， 雲 茶， 蒙頂茶， 石 芥。	Cladonia rangiferina, Web.	全草	Rangiform acid, Fumaric acid, Atranorin	1) 爲興奮劑，清涼劑。 2) 在化學上爲指示劑。		
------	--	----------------------------	----	---	------------------------------	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
842.	石 耳 (本草28) 別名： 靈 芝	Gyrophora vella, Ach.	全草	Gyrophor- ic acid.	1) 爲強壯劑， 能明目益精 ，并治瀉血 脫肛。 2) 洗淨作茹， 勝於木耳。	浙江天台、寧 波，河南宣州， 江西廬山， 安徽黃山，四 川西部。	生山石崖上 ，遠望如烟 。
843.	桑 花 (本草21) 別名： 桑 錢， 桑 蘚。	Parmelia sp.	全草	Usnin acid, Caparin.	1) 治鼻洪、吐 血、崩中帶 下、大便後 血。 2) 治熱咳。	生桑樹上白癭	
844.	松 蘿 (本草37) 別名： 松 落， 金線草， 松上寄生 。	Usnea longissima Ach. (U. Plicata Hoffm. Var. annulata, Muell.)	全草	Usnin acid, Barbatin acid, Methyl barbatin acid, Ramalimic acid, (以上爲地 衣酸) Lichnin (炭化氫) (植研)	1) 利尿，強心 ，鎮咳(治 肺結核)， 祛痰，解熱 。 2) 治頸淋巴腺 炎。 一次量 1—4gm	山東。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
849.	鹿角菜 (本草28) 別名： 猴 葵， 愛蘭苔。	Chondrus ocellatus, Holmes. (Carrage- ea) 紅藻類杉海 苔族鹿角菜 屬	全草	80% Pararabin (氧化之成 粘液酸 Mucic acid.) Protein. 6.3%	1)爲粘滑劑， 強壯劑。 2)煮之，爲糊 料，可作防 水布料。 3)可供香雲紗 染色原料。	生山東海州， 登萊沂密海中 及福建東山 浦鄉。 (原產地愛爾 蘭及大西洋北 部)	鹿角以形名， 猴葵因性 滑，愛蘭苔 ，以地名也 。
850.	水 松 (本草19)	Codium tomentos- um, Stack.	全草		治水腫，催生 。	生南海及安南 海水中。	水松，狀如 松。
851.	鷓 鴒 菜 (拾遺8) 別名： 海人草 (紅藻類)	Digenia simplex Ag.	全草	有效成分雖 尙未明，但 知含有配醣 物 Pararabin 及蒼蘆鹼 (Betain)等 。	爲蛔蟲驅除藥 。 一次量 以10—20—40 gm 爲煎劑。 【藥理】 以本品製劑 Macnin之2% 溶液，對豚之 蛔蟲作用，在 一小時後，漸 呈麻痺狀態。	福建漳州、漳 浦，台灣，琉 球。 【新藥】 I) 鷓鴒菜成 分： Anthenin, Ascaris, Digenin, Helminal, Kaisonin, Macnin, Neu-Maruk- onin. II) 鷓鴒菜成 分與其他配合 劑： Digelaxin, Digelmin, Sauveran.	產於福建漳 浦鷓鴒島之 海石上，故 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
852.	乾 苔 (本草21) 別名： 海 苔， 苔 菜， 青 苔。	Enteromorpha, Linza Ag. Phycoseris crispata, Ktz.	全草	Protein 16%, Cbhyd 69%, Fat 1.1%, Ash 34%	1) 治淋巴腺腫及痔疾。 2) 作菜蔬用。	爲細長之管體，似絲綿生淺海中，冬春時採長數寸者，乾燥之。	真正綠藻類 絲藻族石莖 科乾苔屬。
853.	石 花 菜 (本草28) 凍瓊脂， 璠 枝， 洋 菜， 寒 天。	Gelidium Amansii Lanx. (G. corne- um, Lamr.) (G. cartil- agineum, Grev.) (G. linoid- es, Kiityz.)	凝 漿	Gelose 60%, Protein 2.3%, Fat 0.1%, Cbhyd 72.5%, Ash 2.9% (SiO ₂ , CaO, MnO, TiO ₂ , MgO H ₃ BO ₃), Galactose, Fructose, Pentose, Mannan, Iodine 0.05%	1) 本品之凝漿，供食料及製菓子醬罐頭食品。 2) 爲細菌培養基原料。 3) 爲柔軟粉膠紙之原料。 4) 爲緩下劑及粘滑性包攝劑。 5) 爲糊料。 6) 同冰糖煎，溫服，治氣管支炎有效。	福建平潭及南日島(福清之南莆田之東南)。山東青島烟台，台灣，日本北海道，千葉靜岡。	【藥典】 凍瓊脂 【新藥】 緩下劑： Olgar, Panas, Petrolagar, Regal, Regulin.

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
854.	昆 布 (本草19) 別名： 綸 布	Laminaria japonica, Aresch. L. saccha- rina, L.	全草	Protein 9%, Fat 0.2%, Cbhyd 58%, Ash 14% (Fe, Ca, I. As), Algin acid, Mannit, Galactan, P. ntosan 8.1%, M thylpe- ntosan 0.8%, Glucose, Fructose.	1) 為強壯變質藥，治甲狀腺症，淋巴腺腫及惡瘡等。 2) 軸部為帶軸藻 (Laminaria) 之代用品。 3) 為碘 (Iodine) 及甘露醇 (Mannitol) 及食用昆布原料。 4) 為家畜、家禽飼料。	產於近海。	
855.	海 帶 (本草19)	L. religio- sa, Miyabe.	全草	Protein 8%, Fat 0.1% Cbhyd 55%, Ash 12.5% (Fe. Ca. I. As.)	1) 為變質藥，治甲狀腺症、淋巴腺腫。 2) 為婦科藥，有催生作用。 3) 為利尿劑，治水腫。 4) 作菜蔬用。	出東海水中。	登州人乾之，以束器物。

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
836.	海 蘊 (本草19)	Mesogloia decipiens, Sur. (Cladosip- hon. d., Sur.)	全草	Protein 0.7%, Fat 0.4% Cbhyd 0.6%, Ash 24.4%	治甲狀腺症。	生於海中。	細亂絲也， 其葉似之， 故名。
857.	紫 菜 (本草28) 別名： 紫 莖	Porphyra laciniata, Ag. (P. purpu- rea, Ag.)	全草	Protein 27%, Fat 0.8%, Cbhyd 38%, Ash 15%, Iodine, Mucilage, Fucose, Mannose, Galactose, Glykose, Stachydr- in, Chloroph- yll, Chromopr- otein, Vits. A ₁ , B ₂ ,	1) 治甲狀腺症 及脚氣。 2) 乾嚼之，治 肺壞疽初起 ，唾臭痰者 有效。 3) 作菜蔬用。	生浙江、福建 、廣東海邊， 附石正青色， 取而乾之，則 呈紫色。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
858.	海 藻 (本草19) 別名： 海 蘿， 落 首， 藻。	Sargassum siliquast- rum, Ag.	全 草	Protein 4.2%, Fat 0.8%, Cbhyd 57%, Ash 16.7%, (Fe, I. Ca, As.) Iodine 0.02%	1) 爲利尿劑， 治水腫淋疾 ，溼性脚氣 等。 2) 治甲狀腺症 。 3) 爲碘之製造 原料。	本品生東海池 澤，有二種， 馬尾藻，生淺 水中，大葉藻 生深海中。	
859.	石 蓴 (本草28)	Ulva Lactuca, Le. Jol. Phycocer- is rigida, Ktz.	全 草	Chlorophy -llase. Chlorophy -lxantho- phyll, Carotin Iodine 0.004%	1) 治甲狀腺症 。 2) 爲利尿劑， 治水腫。 3) 爲食用。	石蓴生南海， 附石而生，似 紫菜色青。	

第一百四十九 菌 類 FUNGI

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
860.	香 蕈 (本草28) 別名： 香 菇， 椎 茸。	Agaricus Bretschne -ideri, Kalich et Thiin. (Cortinell. us shiitake, P.Henn.)		Protein 14—16%, Cbhyd 59—65%, Fat 1.5—1.99% Vits A ₁ , B ₂ , D (乾 香蕈，含有 多量之 Vitamin D),	1)香蕈為調味料。 2)益氣不飢，治風破血。 3)松蕈治洩瀉不禁，食之有效。	有自寄生於諸枯木樹上，亦有用人工方法培植者，各省均有出產。	蕈字從覃，覃延也蕈味雋永，有覃延之意，故名。

(成分續) Ergosterin (菌傘部成熟時，含有多量之 Ergosterin，由紫外線之照射，變為 Vitamin D), Mannitol 2.5—8.4%, Pentosan 1.5%, Methylpentosan 1.6%, Glycogen, Adenine 0.02%, Choline 0.02%, Leucine 0.12%, Proline 0.015%, Trimethylamine, Alanine 0.08%, Phenylalanine, Glutamic acid 0.025%, Oxalic acid 0.193%, Palmitic acid (在固形脂肪中占 80%), Cerotinic acid (在固形脂肪中占 10%), Linolic acid (在液體脂肪中占 80%), Oleic acid (在液體脂肪中占 10%)。 (食植，植研)

【附錄】福建產紅菇，菌傘表面呈紫紅色，其香氣與味不及香菇，含有多量之 Mannitol，閩人以此為補品，產婦喜食之。

861.	天 花 蕈 (本草28) 別名： 天 花 菜	Agaricus ostreatus, Jacq.			1)為美味食品。 2)益氣殺蟲。	天花菜出山西五台山，形如松花而大，香氣如蕈白色，食之甚美。	
------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
862.	葛 花 菜 (本草28) 別名： 葛 乳	A. sp.	全 草		醒酒，治酒積 。	諸名山皆有之 ，惟太和山采 取云，乃葛之 精華也。	
863. a.	木 耳 (本草28) 別名： 木 蛾， 木 蠖， 樹 鷄， 木 櫛， 木 菌。	Auricular- ia, Auricula- Judae, Schr. Hirneola, Polytricha Fr. Peziza auricula, Exidia a., Fr.	全 草	Protein 9.42%, Cbhyd..... ...65.37%, Fat 1.18%, Ash..... ... 5.43%, Vits, A. B, C, D. Mycose.	1)為蔬菜之調 味品。 2)為滋養品。 3)治牙痛，以 木耳荊芥等 分煎湯瀨漱 。	木耳生於朽木 之上，無枝葉 ，乃溼熱餘氣 所生。	曰耳，曰蛾 ，象形也， 曰櫛，以軟 溼者佳也， 曰雞，曰蠖 ，因味似也 。
b.	白 木 耳 別名： 銀 耳	Tremella fusiform- is, Berk. Goschna, Turc.	全 草	Protein 6.6 Fat 3.12 Cbhyd 68.01 Ash 5.51 (Ca 0.643 P... 0.250 K... 0.987)	1)為滋養強壯 劑，治肺病 。 2)為貴重食品 。	四川，貴州。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
864.	雞 嵯 (本草28) 別名： 雞 菌	Clavaria cornicul- ata, Schaeff.	全 草		1)本品作羹甚 美，為佳良 之調味品。 2)益胃，清神 ，治療。	本品出雲南， 生沙地間，丁 蕈也。	本品之味如 雞，故名（ 又廣西橫州 出雷菌，遇 雷過即生， 須疾采之， 稍遲則腐或 老，作羹甚 美亦如雞嵯 ）。
865.	麩 蕈 (本草28) 別名： 肉 蕈， 口 蕈。	Clavaria pistillar- ius, L. Agaticus campest- ris, L.	菌 體	Protein 36.09%, Cbhyd 31.02%, Fat 3.54%, Ash 14.27%, (Ca 0.131%, Fe 0.1885%, K 3.169%), Vits. A. B. D.	1)為蔬菜之調 味品。 2)益腸胃，化 痰，理氣。	山東，河北， （埋桑楮諸木 於土中，澆以 米泔，待菇生 採之）。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
866.	冬虫夏草 (拾遺5)	<i>Cordyceps sinensis</i> , Sacc. 此係核菌類植物麥角菌科之菌，寄生於動物鱗翅類中蛾類之幼虫體中，以虫體為營養而萌發者，故虫體當已死亡。 (漢藥)	蟲草		為強壯劑，治神經衰弱，坐骨神經痛，止咳（對肺結核有特效）化痰，并能補精益陽，療一切虛損。 用量 一次量 1—2gm	西藏，貴州，四川江油縣化林坪打箭爐，雲南麗江、烏蒙山。	本品冬為蟲，夏為草，為一種奇異之藥品。據本草從新云，產於雲南，冬在土中，身活如老蠶，有毛能動，至夏則毛出土上，週身俱化為草，若不取，至冬復化為虫，此不過一種傳說而已。
867.	鬼 筆 (草本25)	<i>Itthyphallus rugulosus</i> , Fisch.	菌體		治瘡疔癰疥癰瘻，曬乾，研末，和酒塗之。	生於各地陰溼污穢之處。	本品之頭如筆，紫色，朝生暮死，一名朝生暮死花，又名狗溺苔。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
868.	馬勃 (本草21) 別名： 牛屎菰， 灰菰， 馬妥， 馬朶。	Lashiosha- era, Fenzlii, Reich. (Lycoper- don boviste, L.) (L. gemm- atium, Batsch.) (L. pirifo- rme, Schaeff.) Bovista maxima, Diel.	胞 子	Leucin, Tyrosin, Urea, Ergosterin Lipoids, Gemmate- in. (本新)	1) 爲止血劑， 治吐血、咯 血、衄血。 劑量一次 0.4-0.8gm 2) 治惡瘡馬疥 ，拌蜜塗之 。 3) 治聾失不出 及魚骨硬咽 。 4) 治扁桃腺炎 。	生溼地及腐木 上。	本品紫色虛 軟，狀如狗 肝，彈之粉 出。
869.	芝 (本草28) 別名 茵	Mush oom	全 草		芝有六種，均 爲強壯劑，青 芝兼明目補肝 ，赤芝補心， 黃芝益脾，白 芝止咳益肺， 黑芝利尿補腎 ，紫芝治耳聾 ，利關節。	青芝生泰山， 赤芝生霍山， 黃芝生嵩山， 白芝生華山， 黑芝生常山， 紫芝生高夏山 谷。	芝本作之， 篆文象草生 地上之形， 後人借之字 爲語辭，遂 加草以別之 。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
870.	蘚 菌 (本草28) 別名： 蘚 蘆	Mushroom	菌體		爲殺蟲劑，治 虻虫、蟻虫、 蛇螫毒、惡瘡 及白禿。		蘚當作菹， 乃蘆葦之屬 ，此菌生於 其下，故名 。
871.	地 耳 (本草28) 別名： 地踏菰	Mushroom	菌體		爲滋養強壯劑 。		地耳亦石耳 之屬，生於 地上，狀如 木耳，春夏 兩中，雨後 須速採，見 日卽不堪。
872.	土 菌 (本草28) 別名： 杜 蕈， 地 蕈， 菰 子， 地 雞， 地 獐頭。	Mushroom	菌體		燒灰，傳瘡疥 疔腫	地生者爲菌， 木生者爲櫛， 江東人呼爲蕈 ，地蕈似釘， 江東人呼爲土 菌。	
873.	舵 菜 (本草28)	Mushroom	菌體		治癭結氣，瘵 飲。		此卽海船舵 上，所生之 菌。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
874.	雷 丸 (本草37) 別名： 雷 矢， 雷 實， 竹 苓。	Mylitta lapides cens, Hor.	菌 體	Pectin	為殺虫劑，解 毒劑。	四川。	此物生土中 ，無苗葉， 而殺虫解毒 之功頗大， 猶雷之丸也 。
875.	茯 苓 (本草37) 別名： 茯 靈， 伏 兔， 松 腴， 不死麩， 抱根者伏 神。	Pachyma, Cocos, Fr. P. pinetor- um, Hor. P. solidum Oken.	菌 體	Pachymo- se 84%, Cellulose 2.8%, Glucose Fructose N 0.076% Ash 0.23% (Fe, Ca, Mg, K, Na, Ce, P ₂ O ₅) (本新，棕 植，植研)	為利尿劑，治 水腫及淋疾。 一次量 1.5—3gm 又治神經性心 悸亢進及健忘 等，但遇盜汗 及多尿症禁忌 。	雲南，浙江。	蓋松之神靈 之氣伏結而 成，故謂之 伏靈、茯神 也，俗作苓 者，乃係傳 寫之誤。
876.	豬 苓 (本草37) 別名： 豕 囊， 緞豬屎， 地烏桃。	P. Hoelen, Rumph.	菌 體		為利尿劑，治 水腫（山脚部 上行者）及淋 疾，為止渴劑 ，治糖尿病患 者之口渴。 一次量 2—3gm	生衡山山谷及 濟陰晁甸。	其塊黑似豬 屎，故以名 之。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
877.	杉 菌 (本草23)	Polyporus arcularius Fr.	菌體		治肺壞疽。	廣西宜山。	生積年杉木上，狀若菌。
878.	竹 蕈 (本草28) 別名： 竹 肉， 竹 蕈， 竹 蕈。	Puccinia corticoides, Berkl. et Br. (Stereost- ratum c., Magn)	菌體		1) 治赤白痢，和薑醬食之。 2) 苦竹肉，灰汁鍊過食，殺三菌。	竹肉生朽竹根上，狀如木耳，味甚佳，惟苦竹生者有毒，以灰汗煮二度，煉淨，依常菜茹食之。	蕈得溼溼之氣而成也，竹肉，因其味也。
879.	柘 耳 (本草28) 別名： 柘 黃	Epiphyte on Cudrania triloba, Hce.	菌體		治肺癰。		
880.	楊 槐 耳 (本草28)	Epiphyte on Diervilla japonica, DC.	菌體		主治老血結塊、破血、止血，養服之。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
881.	皂 莢 蕈 (本草28)	Epiphyte on Gleditsch- ia.	菌 體	Emulsin Phosphat- id, Mannit, Trehalose, Chitin 2.8%, Cellulase, Oxydase, Tyrosinase Ash 2.48%	治腫毒初起， 磨醋塗之。	生皂莢樹上似 木耳，不可食 ，采焙乾備用 。	
882.	桑 耳 (本草28) 別名： 桑 櫚， 桑 蛾， 桑 鷄， 桑 黃， 桑 臣。	Epiphyte on Mulberry.	菌 體		黑色者，為通 經藥，黃熟陳 白者，止久痢 ，金色者，為 止血藥。		桑櫚以下， 為軟耳之名 ，桑黃以下 ，為硬蕈之 名，其功性 則一也。
883.	桃 寄 生 (本草37)	Epiphyte on Peach.	菌 體		治小兒中蠱毒 ，腹內堅痛， 面目青黃，淋 露立骨，取二 兩為末，如茶 點服，日服四 五次。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
884.	槐 耳 (本草28) 別名： 槐 朮， 槐 菌， 槐 雞， 赤 雞， 槐 蛾。	Epiphyte on Sophora.	菌 體		治五痔脫肛， 下血，婦人陰 中瘡痛。		此為槐樹上 所生之菌。
885.	榆 耳 (本草28)	Epiphyte on Ulmus.	菌 體		為營養品。		
886.	柳 耳 (本草28)	Epiphyte on Willows.	菌 體		治反胃，吐痰 。		此為柳樹上 所生之菌。
887.	石 刺 木 (本草37)	Epiphyte Woody.	根 皮		破血，產後餘 血結塊，煮汁 服，有效。	石刺木寄生於 木上，生南方 林竄間，江西 人呼為勒刺， 樹似棘而大， 枝上有逆鈎。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
888.	麥 奴 別名： 麥 角	Ustilago carbo, Tul. (Claviceps purpurea Tulasne.)		Ergotami- ne, Ergotinine Ergotoxin (以上生物 驗), P.Oxy.Phe- -nylethyl- amin,	1) 爲止血劑， 治內部器官 及子宮出血 。 2) 爲陣痛催進 劑，一次量 用0.5 2gm (丸散浸膏)。	蘇聯南部，西 班牙北部，摩 洛哥。	

(成分續) 4- β -aminoethylglyoxaline, Amino-Secale-Sulphonic acid, Ergothionine, Agmatine, Isoamylamine, choline, Betain, Ergosterol, Ergosterine, Fatty oil, Sclerverythrine (色素)。

【藥典】 麥角，麥角浸膏，麥角流浸膏。

【新藥】 均爲止血及子宮緊縮藥。

A) 麥角成分：Ergotin inject, Ergotinol, Ernutin, Cornutol, Gynergen, Ryegostin, Secacolnin, Sec rtin, Systogen, Tenosin, Thyramin.

B) 麥角和其他成分配合劑：Adortin, Ergoptol, Erystypticum, (綜植)

839.	落葉蕈松	Fomes official- is, Fries.	菌 體	Agaricine, Fat. Resin.	1) 爲止汗藥， 治肺病盜汗 。 Agaric- ine 之 一次量 0.005—0.0 5gm 2) 製 Agaric- ine 原料。	產於蘇聯之阿 爾享葛爾及日 本之北海道。	
------	------	-------------------------------------	--------	------------------------------	---	----------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
890.	<p>麵</p> <p>(本草25)</p> <p>別名：酒母，釀母。</p>	<p>Chinese yeast.</p> <p>Leaven</p> <p>mother,</p> <p>Brewer's dregs.</p> <p>註附：醇素</p> <p>Faex</p> <p>(拉丁名)</p> <p>Hefe</p> <p>(德名)</p> <p>麥酒酵母菌</p> <p>Saccharomyces cerevisal Meyen.</p> <p>B. P. C.)</p>		<p>Zymase,</p> <p>Invertase maltase, Saccharase, Phosphatase, Saccharophosphatase, mannanase, Endotryptase, Vitamine, B₂ G₂, Aspartic acid, Nucleic acid, Glycogen, Mannan, Phosphatide, Xanthin, Guanin, Adenine, Alanine, Leucin, Tyrosin, Prolin, Methionin, Ergosterin, Faecosterin, Ascosterin, Neosterin, Zymosterin.</p>	<p>為消化藥。</p>		<p>麵以米麥包糴而成，故字從麥從米從包，省文會意也，酒非麵不生，故曰酒母。麵造法各有不同，有小麥麵，大麥麵，麩麵，白麵，米麵等之別。</p>
891.	<p>神 麵</p> <p>(本草25)</p>	<p>Spiritleaven</p>		<p>Ess. oil</p> <p>Glucoside,</p> <p>Lipase,</p> <p>Fatty oil</p>	<p>助消化，治赤白痢，婦人產後有回乳之效。</p>		<p>取諸神聚會之日造之故名。</p>
892.	<p>紅 麵</p> <p>(本草25)</p>	<p>Red yeast</p>		<p>Carotinoid</p> <p>Diastasc.</p>	<p>助消化，治赤白痢，療婦人血氣痛及產後惡血未盡，解山嵐瘴氣。</p>		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
893.	女 麴 (本草25) 別名： 麴 子， 黃 子。	Virgin yeast.			助消化，止洩 痢，下胎，破 冷血。		此乃女人以 完麥，釀成 黃子，故有 諸名。

附錄一 植品性加工品

PHARMACA ARTIFICIOSE EX FLANTIS FACTA

894.	兒 茶 (本草7) 別名： 孩兒茶， 烏參泥， 阿仙藥。	Catechu, Gambir- Catechu.	浸 膏	Catechin, Catechu- tannic acid, Qnercetin Catechnr- ed Fat, Wax.	爲收斂藥，治 下痢及尿道炎 ，在工業上供 鞣皮用。	印度馬拉加海 峽中治烏及其 沿岸。 蘇門答臘，爪 哇，暹羅洲， 新幾內亞。	藥局製劑， 有酞劑，浸 膏，錠劑，糖 漿，糖餅， 注射液等。 本品係由茜 草科 Uncaria Gambir Roxb.之葉 及梢所製成 之乾燥浸出 物及由合歡 科 Acacia catechn, Willd 與 A. suma, Kurz, 之木 心所製成之 乾燥浸出物 ，再混入棕 櫚科 Areca catechu, Will之果實 搾汁乾燥而 成，或以水 煎熬而令乾 燥而成。
------	---	---------------------------------	--------	---	------------------------------------	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
895.	藤 黃 (本草18) 別名： 海 藤	Gutti	樹 脂	Cambodic acid, Garcinolic acid, Gummi-gutti.	爲峻瀉藥，治 緣蟲及水腫。 一次極量 0.5gm 工業上供顏料 及假漆之用。	產於印度，安 南，暹羅湄公 河及甘僕狄亞 (Cambodia)， 岳州及鄂州 產之。	係由海藤流 出之黃色樹 脂故名。 本品係由金 絲桃科之藤 黃樹 (Garcinia, Morella, Desy.) 及 其種族之幹 皮上，在開 花前鑿刻所 滲出之濃稠 乳狀液，曝 乾凝固而成 之樹脂也。 藤黃樹本草 綱目稱海藤 。
896.	元 明 粉 (本草11) 別名： 玄明粉， 白龍粉。	Compound of Glauber- Salt and Liquoirice	混 和 物		爲瀉藥，解心 熱煩燥及五臟 之宿滯。		用朴硝與甘 草末煎熬而 成者，仙經 中有云『修 鍊朴硝號玄 明粉也，服 此方益無病 長生』可知 ，此藥爲神 仙家所珍重 者。

附錄二 植物學名及科屬未明之部

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
897.	占 斯 (本草37) 別名： 炭 皮， 良無極。	Chan Szu.	皮		1) 治惡瘡癰腫。 。 2) 解狼毒之毒。 。	生上洛是木皮， 狀如厚朴， 色似桂白，其 理一縱一橫。	
898.	赭 魁 (本草18)	Che K'uei	根		1) 爲治虫劑。 2) 其汁赤如赭， 爲染皮製靴用。	蔓生於山谷之 草木上，產於 福建及南方各 省。	其根如料（ 酒器），有 汁如赭，故 名。
899.	吉利草 (本草13)	Chi Li Ts'ao Tribulus terrestris L.	根		解蠱毒。	此草生交廣， 莖如金釵股， 形類石斛， 根類芍藥。	吳黃武中， 江夏李俱徙 合浦遇毒， 其奴吉利偶 得此草，與 服遂解。
900.	藜 車 香 (本草14)	Chieh Ch'e Hsiang.	草		1) 去臭及蟲魚 蛙蠱（凡樹 木蟲蛙者， 煎此香冷淋 之有效）。 2) 治霍亂，辟 惡氣。 3) 薰衣用。	江蘇徐州，廣 東海南。	爾雅云，藜 車芑與，郭 璞云香草也 。 本品高數尺 ，黃葉白花 ，與蘭香、 零陵相類似 。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
901.	質 汗 (本草34)	Chih, Han. 質汗(汗音寒)乃番語之譯音。		以檉乳【羅望子, (榕, 甘露) Tamarind manna], 松淚(松脂 Pinus resin)甘草(Glycyrrhiza), 地黃(Rehmannia) 等藥, 和熱血煎之即成。	爲傷折之要藥, 治金瘡、傷折、瘀血內損, 補筋肉, 消惡血、下血氣, 婦人產後諸血結、腹痛內冷不下食, 並以酒下服之, 亦傳病處。	出西番諸地(新疆、西藏、青海、西藏一帶)。	番人試藥, 以小兒斷一足, 以藥納口中, 將足蹋之, 當時能走者良。(本草34)
932.	九 仙 子 (本草18) 別名: 仙女嬌	Chiu, Hsien, Tzu.	根		治咽痛、喉痺、散血, 以新汲水或醋磨汁, 含嚥甚良。	出均州太和山, 一根連綴九枚, 大者如鷄子, 小者如半夏。	
903.	城東腐木 (本草37) 別名: 地 主	Ch'eng, Tung, Fu mu.	木		1) 治心腹痛, 止洩便膿血。 2) 凡蜈蚣咬者, 取腐木漬汁塗之, 或研末和醋傅之。		城東古木, 在土中腐爛者, 名爲城東腐木。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
904.	秦 荻 藜 (本草27)	Ch'in ti li.	子 草		本品和醬醋食之，消食順氣。 子治腫毒，搗末醋和封之，日易三次。		山海經云，秦山有草，名曰藜，如荻，可以爲菹，此卽秦荻藜也。此物於生菜中，爲最香美者。
905.	槌 胡 根 (本草16)	Ch'ui hii Ken.	根		潤五臟，止消渴，除煩、去熱、明目，功如麥門冬。	生江南川谷蔭地，苗如萱草，其根似麥門冬，用時須去心。	
906.	鸞 抱 (本草18)	E. Pao	根		治風熱上壅，咽喉腫痛及解蠶箭藥毒，搗末酒服有效。	在宜州山林下，附石而生，作蔓似大豆，其根形似萊菔。	
907.	放 杖 木 (本草36)	Fang chang Mu.	根		爲驅風藥及強壯藥。	生溫括陸婺諸州(浙江安徽)山中。	其樹如木天蓼，老人服之，一月放杖，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
908.	伏雞子根 (本草18) 別名： 承露仙	Fu Chi Tzu Ken	根		1) 解百藥毒。 2) 治黃疸瘡癩 中惡寒熱。 3) 傳癰腫。	生四明及天台 山蔓延，生葉 圓薄似錢。 根似鳥形者良 。	
909.	鳳眼草 (拾遺3)	Fung Yea tsao			治一切風痺， 活血，去風。		本品之小葉 ，中心白色 ，儼如鳳眼 ，故名。
910.	菊花參 (拾遺3)	Chii hua Shen			功用同人參， 比較遜。	產雲南東川府 巧家汎江邊。	葉似菊花， 功同人參， 故名。
911.	紅海粉 (拾遺8)	Hun hai feng			治痰藥。	廣東嶺南。	
912.	淮 木 (本草37)	Huai Mu 百歲城中木 城裏赤柱。	木		1) 治久欬上氣 。 2) 治婦人漏血 ，赤白沃。 3) 治難產。	為古城中之木 ，生晉陽平澤 。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
913.	甘 藤 (本草18) 別名： 甜 藤， 感 藤。	Kan Téng	汁		汁止渴解熱， 調中益氣，通 血氣，利五臟 。葉研細，傳蛇 蟲咬傷。	生江南山谷， 其藤大如雞卵 ，狀如木防己 ，斫斷吹之， 氣出一頭，其 汁甘美如蜜。	
914.	靈 壽 木 (本草36) 別名： 扶老杖， 梔。	Ling shou Mu	根 皮		止水。	生四川劍南山 谷。	其木有節， 可作杖，老 人用之，能 延年益壽， 故名。
915.	透 骨 草 (拾遺4)	To'u Ku to'ao	莖 葉		1) 治風氣疼痛。 2) 取本品之汁， 浸龜板煨 膏，合金瘡 ，入骨補髓 ，兼治難產 。	蒙古。	
916.	落 雁 木 (本草18)	Lo Yen Mu	莖 葉		1) 治風痛，傷 折脚氣腫 滿、虛脹， 以粉木皮同 煮汁洗之。 2) 治婦人陰 浮泡，以椿 木皮同煮汁 洗之。 3) 治產後血 氣痛，并傷 折內損諸疾， 煮汁服之。	本品生廣東南 海，山西代州 雁門，四川雅 州。	藤蘿高丈餘 ，雁過皆綴 其中，或云 雁銜至代州 雁門而生， 以此爲名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
917	麤 目 (本草31) 別名： 鬼 目	Chi mo	果 實		本品之蜜餞者，為美味食品，惟多食，則發冷痰。	廣東安南九真武平興國。	本品之果實，狀如麤目，故名。其大者如木瓜，小者如梅李，色黃味酸，蜜浸食之佳。
918	馬 尾 蓮 (拾遺3)	Ma Vei lian	根		治小兒傷風及痘科用。	雲南。	
919	木 麻 (本草36)	Mu Ma	葉		為通經藥及強壯藥，取葉釀酒飲之。	生江南山谷林澤間。	本品之葉，似胡麻，故名木麻。
920	辟 虺 雷 (本草13) 別名： 辟 蛇 雷	Pi Hui Lei	根		解蛇虺毒，辟癘疫，治咽喉痛痺，消痰，祛大熱頭痛。	出四川峨眉鶴鳴諸山。狀如蒼朮，大者若拳。	此物辟蛇虺有威，故以雷名之。
921	百 葳 藤 (本草18) 別名： 百 靈 藤	Po Ling Teng	皮		治盜汗及一切風痛。	生浙江台州山中。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
922.	石 荆 (本草33)	Shih Ching	灰		燒灰淋汁，沐頭，生髮，(爲生髮劑)。	河南。	石荆似荆而小，生水旁，一名水荆。
923.	石 瓜 (本草35)	Shih Kua	子		治心痛，煎汁洗風痺。	出四川眉峨山中及雲南鎮雄(古芒部)。	本品之形似瓜，其堅如石故名。
924.	兜 納 香 (本草14)	Tou Na Hsiang	全 草		治惡瘡腫癢，止痛生肌。	意大利。	
925.	獨 用 將 用 (本草16)	Tu Yung Chiang Chiin	根 葉		治毒腫、乳癰、解毒、破惡血。	出四川劍閣(古劍州)。	
926.	紫 金 藤 (本草18) 別名： 山甘草	Tzu Chin Téng	皮		1)爲強壯劑。 2)治惡瘡腫毒。	生福州山中。	
927.	醜 鬪 菜 (本草27)	T'i Hu Ts'ai	草		爲通經藥(月水不利，搗葉絞汁，和酒煎服一盞)。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
928.	天 仙 藤 (本草18)	T'ien Hsien Téng	根		1)解風勞，治 疝氣痛。 2)治傷寒發汗 。	生江淮及浙東 山中。	
929.	草 鼓 (本草26)	Ts'ao Chin	花		1)供食用。 2)為健胃劑。	出巴西諸國。	草狀如韭， 其鼓出花中 。
930.	草 犀 (本草13)	Ts'ao Hsi	根		解一切毒氣， 虎狼蟲虺所傷 ，溪毒野蠱、 惡刺等毒，並 宜燒研服之， 臨死者亦得活 云(李珣)，又 治癰瘡欬嗽、 痰壅、喉痺、 瘡腫、丹毒等 ，煮汁服之(陳藏器)。	浙江，安徽， 江西，廣東。	其解毒之功 如犀角，故 曰草犀。
931.	五 子 實 (本草31)	Wu Tzu Shih	子 實		霍亂金瘡，宜 食之。	廣東潮州。	葵淵廣州記 云，五子實 大如梨，而 內有五核， 故名。
932.	越 干 餘 算 (本草19)	Yüeh Wang Yü Suan	草		治水腫。	越王餘算生南 海水中，如竹 算子，長尺許 。	劉敞叔異苑 云，昔晉安 越王渡南海 ，將黑角白 骨作算籌， 其有餘者，棄 水中，而生 此，故葉白 者似角，遂 名之。

第二編 動物性藥品

MEDICAMENTAS ANIMALES

甲 脊椎動物門 VERTEBRATA

子 哺乳類綱 MAMMALIA

第一 人類 HUMAN

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
933.	天靈蓋 (本草52) 別名： 腦蓋骨， 頭顱骨， 仙人蓋， 天石， 髑髏骨。	human cranium (英)	頭 蓋 骨		內用，治肺結核之消耗熱盜汗，及間歇熱。一次量 3—4gm。 外用，治下疳及濕疹。		人之頭蓋骨。
934.	亂髮 (本草52) 別名： 血餘	Burnt hair (英)	髮灰		治咳嗽五淋、大小便不通、小兒驚癇、并有止血之效。		人之髮灰。亂髮，乃梳節下之髮也。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
935.	人胞 (本草52) 別名： 胞衣， 胎衣， 紫河車， 混沌衣， 混沌母， 佛袈婆， 仙人衣。	Human Placenta (英)	胎盤	含有催進陣痛及能使母體乳腺發育之刺激素 (Hormon) 胎胞成分含 Estrone 卵巢成分爲 Estradiol Progesterin Progesterone	1) 用於神經衰弱、陽萎、不孕等。 2) 爲陣痛催進劑。 3) 爲乳汁分泌劑，一次用 5gm。		人之胎盤。新亞所出之胚生蒙 (Placemon)，係胎胞之製劑。
936.	臍帶 (本草52) 別名： 命蒂	Umbilical cord (英)			1) 止癢。 2) 解胎毒。 3) 傳臍瘡。一次量 5gm。		臍者，人之命蒂也。
937.	乳汁 (本草52) 別名： 蠟汁， 人精， 仙人酒， 人乳， 蟠桃酒。			水分 87.73 -88.55% 蛋白質 1.53 -2.81% 脂肪 2.97 -3.56% 糖分 7.61 -4.82% 鹽類 0.16 -0.21%	1) 補五臟，令人肥白。 2) 治眼球的充血及流淚症 (點入眼球)。		初生男兒，無疳婦人之乳白而稠者佳。

號碼	中 名	拉丁名	藥部 中份	成 分	效 用	產 地	備 考
933.	童 便 (本草2) 別名： 人 尿， 輪迴酒， 洩， 還元湯。			小便含尿素、尿酸、馬尿酸、脈、食鹽、硫酸鹽、硝酸鹽。 附錄： 妊娠尿中含 Estriol Estradiol Pregnane- diol. 馬雌尿中含 Equilin Equilin Hippulin.	內服，治咯血、吐血、慢性呼吸器痛等。		以不食草腥酸鹹十二歲少年所排出之尿為佳，最初與最終所排泄之部分棄去，採取中間所放出一部分。
939.	人 中 黃 (本草52) 別名： 金 汁				為解熱藥，治流行性感胃及天然痘。 一次用 1—2gm。		以竹筒入甘草末於內，竹木塞兩端，冬月浸炭坑中，立春取出，懸臨風處，陰乾，破竹取草，曬乾備用。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
940.	人中白 (本草52) 別名： 千年冰， 萬年霜， 秋白霜。		滑 白 涎	尿酸鈣 磷酸鈣 氯化鈉	治消耗熱及偏 頭痛，去浮腫 ，止衄血。 一次用 2—3gm 本品加入參成 濃液，作強壯 藥。		經數年間， 尿桶之內壁 ，或底面凝 着之灰白色 無晶形之薄 片或塊片， 剝取乾燥之 ，即得。
941.	秋石 (本草52) 別名： 秋冰				治肺結核患者 之消耗熱。		秋月，童便 和石膏而成 者。

第二 猿 類 PITHECI

942.	a. 猿 膽 (和藥)	Macacus fuscatus Blyth. (獼猴)			治慢性胃炎， 胃痛，小兒之 消化不良等。		取獼猴之膽 囊乾固而成 者。
	b. 猿 頭 霜 (和藥)				治頭痛， 一次用 3—4gm。		猿之頭部為 黑燒。

第三 翼手類 CHIROPTERA

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
943.	蝠 蝠 霜 (和藥)	Vespergo abramus Temm. (蝙蝠)			治慢性氣管支 炎。		由蝙蝠除去 上翼及足部 黑鱗而成。
944.	夜 明 砂 (本草48) 別名： 天鼠尿， 石 肝。				1)內用，治夜 育症、綠內 障、間歇熱 。 一次用 1—4gm。 2)外用，治齒 疳、耳漏腋 臭、爲塗布 劑或撒布劑 。		即蝙蝠之糞 。
945.	寒 號 蟲 五 靈 脂 (本草48)	Pteropus Pselaphon Lay. (寒號虫)			1)內用，治腹 痛、抽搐、 子宮出血、 月經過多、 驚風、癩瘋 等， 一次用 3—8gm。 2)外用，對齒 痛，爲塗布 劑。 3)細末煎湯， 治產後血崩 。		五靈脂爲寒 號蟲之糞。 (大蝙蝠科 大蝙蝠之糞)

第四 食蟲類 INSECTIVORA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
946.	猬皮 (本草51) 別名： 蝟巢	Erinaceus europacus L. (猬) (食虫目蝟科)	皮		內服，治痔疾 腸出血， 一次量 1—4gm。		由蝟之毛皮 黑燻而成。
947.	鼯鼠 (本草51)	Talpa Mogura Temm. (鼯鼠)			爲霜，治咽喉 之腫脹，去疼 痛。		由鼯鼠黑燻 而成。

第五 食肉類 CARNIVORA

948.	熊膽 (本草51)	Bear-gall. (英名) Ursus torquatus Schinz. Var. Japonicus Schleg. (熊) (食虫目熊科)	膽 囊		內用，爲鎮痙 藥，治胃痛、 驚風等，又爲 下痢、黃疸、 腸內寄生蟲之 驅除藥， 一次量 1—3gn。 外用，爲點眼 藥，治視力障 礙，又爲塗布 劑，治齒痛及 痔疾。		取熊之膽囊 ，挾於竹串 ，以文火灸 之，後懸於 高處風乾， 待膽汁凝固 ，用板挾成 扁平狀。
------	--------------	---	--------	--	--	--	---

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
949.	熊 骨 a. (本草51)	Bear-bone (英名)	骨		治關節痲痺 斯及小兒急痢 。		
	b. 熊 掌 (本草51)	Bear Paw		Protein 55.2% Fat 43%	為高貴食品。		
950.	虎 (本草51) 別名： 虎 膽	Felis Tiglis L. (虎)			內服治驚風， 小兒之下痢， 精神狀態之不 安等。	山中央亞細亞 至東南西南亞 細亞。	山虎之膽囊 乾燥而成。
951.	虎 骨 a. (本草51)				為鎮靜劑，治 驚風、癲癇、 及四肢腰背諸 骨節之疼痛。 一次量 1—5gm。 又惡犬咬傷， 湯火傷灼，以 骨末炙焦塗布 之；又患脫肛 者，取杏仁少 熬，搗碎加骨 霜研和塗之。		用其頭骨頸 骨或脛骨以 色黃者為佳 ，以槌碎骨 去髓，塗以 酒或醋，於 炭火上炙成 黃色，然後 供藥用。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
b.	虎骨膏 (本草51)		膏		治虛弱，骨痛， 風痛。		由虎骨煎汁而成。
c.	虎骨酒 (本草51)		酒		治骨節疼痛。		脛骨二兩，搗碎炙黃，混和羚羊角一兩，新芍藥二兩，浸於酒中，即成。
952.	狐膽 (和藥) 附： 狐舌， 狐肝。	Canis Japonicus Gray. (狐)	舌 肝		爲回蘇藥，對 卒然失精，陷 於人事不省者 有效。 民間藥： 取狐舌之乾燥 者，煎服，治 瘧疾。 狐肝燒灰，治 風痲 破傷風 。		取狐之胆囊 乾燥而成。
953.	鼬鼠 (本草51) 別名： 黃鼠狼， 鼬鼠， 地猴。	Mustela itatsi Temm. (鼬鼠)	肉 肝 舌		肉煎油，治瘡 疥殺蟲。 心肝治心腹痛 ，殺蟲。 舌燒灰，治食 傷。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
954.	獺 (本草51) 別名： 水獺， 水狗。	Lutra vulgaris Erxl. (獺)	膽囊 肝臟		獺膽，爲滋養 強壯劑，內服 治肺結核，又 爲點眼藥，治 角膜炎；通俗 食獺肉，對痛 風有特效。 獺肝內服，治 咳嗽。 一次量 3—5gm， (乾燥後研成 粉末用之)。		取其膽囊乾 燥而成者。 取其肝臟乾 燥而成者。
955.	海豹油	Phoca vitulina L. (海豹)	油		據德國人威爾 肯(Dr. Wilk- ens)氏試驗， 海豹油與魚肝 同樣，爲滋養 劑，瑞典藥典 收載本油，認 爲與魚肝油相 同，又文格特 (Wingard)氏 採本油爲醫藥 品；又本品用 於燈油製革及 軟肥皂等之製 造。		由海豹中所 得之脂肪油 。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
956.	<p>膾膾獸 (本草51) 別名： 海狗， 骨貓， 骨狗， 膾膾。</p>	<p>Otaria ursina Gray. (膾膾獸)</p>	<p>翠丸</p>		<p>膾膾獸之翠丸，稱海狗腎，將膾膾獸之陰莖翠丸及膾，連切乾燥而成，為催淫劑，治陰萎，對羸弱者內服，為滋養強壯劑。由膾膾獸所得之脂肪油，亦可代魚肝油用，惟稍有不快之味。</p>		
957.	<p>靈貓香 (本草51) 別名： 靈狸香， 神狸香， 文狸香， 香狸香。</p>	<p>Viverra civetta Schreb. (靈貓) Zibethum. civet. (靈貓香)</p>	<p>油</p>	<p>含 0.1% 之 Saktol 熔點 95°C, Zibethen (為一種醃，有麝香之香氣)，揮發油，脂肪，游離氨。</p>	<p>內服為神經系之鎮痙藥。一次量 0.1—0.5gm。又用於香料之製造。</p>		<p>本品由靈貓雄性生殖器兩側所存腺囊之分泌液採集而成，有特殊香氣。</p>

第六 齧齒類 RODENTIA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
958.	狼 尿 (本草51) 別名： 狼， 毛 狗。	Wolf dung (英名)	尿		治療癱及骨硬。 。	蒙古小庫倫。	
959.	明月砂 (本草51) 別名： 望月砂， 兔 糞。	Fatbits dung (英名) Lepus brachyurus, Temm) (拉丁名)	尿		除目中浮翳， 除五疳，痔瘻， 殺虫，解毒。 。		(商齧目兔 科兔之糞) 。
961. a.	海狸香 (本草51)	Cast rium	分 泌 物	海狸香脂 (Castorin)， 揮發油，膽 脂 (Choles- trin)，安息 香酸，酚， 碳酸鈣等。	為鎮痙藥，治 神經病，能減 輕疼痛性及痙 攣性症狀。 一次量 0.1—0.5gm	海狸棲息於北 美及自西伯利 亞至北歐河湖 之附近。	本品為海狸 (Castorbi- ber L. 下 腹部之分泌 囊。
b.	海狸香醇	Tinctura Castorii		山海狸香 1 分及稀酒精 10分而成。	治臟躁症 (Hy theria) 一次量 1—3gm。		

第七 長鼻類 PROBOSCIDA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
961.	象牙 (本草51)	Elephas maximus L. (象) Ivory (象牙, 英文) (象科)	牙		諸鐵及雜物入肉, 刮牙屑和水敷之, 立出。 骨刺咽中, 磨水服之亦出。	暹羅, 安南。	
962.	象皮	Skin of Elephant (英)	皮		治疔疔及金瘡。		

第八 有蹄類 UNGULATA

963.	鹿 (本草51) 別名： 斑龍	Cervus elaphus L. C. affinis (Hodgson) C. xanthopygus Milne-Edwards) (鹿偶蹄目 鹿科)			鹿血, 治陰痿補虛, 止腰痛、鼻衄、折傷、狂犬傷; 鹿肉, 補中益氣、強五臟、生者療中風、口僻、割片敷之; 鹿皮, 治一切漏瘡, 燒灰, 和豬油納之, 日五六易, 瘡乃止。		
------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
964.	鹿茸 (本草51)	Young harts horn (英名)	嫩角	蘇俄國立內分泌研究院，近來提製一種鹿茸精(Pantocrin)，其成分含有刺激素(Hormon)及磷。	臨床上證明鹿茸精，確能治元陽衰弱、神經紊亂、心臟疲乏、膿毒症、癆，並能增進消化。 鹿茸原藥，為性之增進劑，治神經衰弱、精液漏洩等。 用量3—5gm。	關東長白山、黑河、海參威、雲南思茅。	鹿之舊角晚夏脫落，新生之幼角長約5—6cm時，質柔軟取而乾燥之。 本品為菌叢狀，富於血管，其發育旺盛，密生棕色之毛茸，故有鹿茸之名。
965.	鹿角 (本草51)	Harts horn (英名)		膠質25%，磷酸鈣50—60%，碳酸鈣，氮化物等。	除鬱血，去腫脹，令血行良好；又治癰腫、癩疽、微毒等， 一次量3—10gn。	關東長白山、黑河、西江、海參威、雲南思茅。	本品長約90cm，質堅，外面光滑，呈白色或淡棕色，處處有疣狀突起，橫斷而鬆疎，有細孔。
966.	鹿角膠 (本草51)			膠質，軟骨質等。	為止血藥，治吐血、咯血、腸出血、子宮出血、盜汗、多尿症、四肢疼痛等。 一次量3—5gm。		以水浸漬鹿角，凡七日，取濾液，煮沸，加酒成膠，於陰所乾燥之。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
967.	鹿角霜 (本草51)				內服，治惡性腫瘍，去腫脹疼痛。		爲鹿角煎膠時之漉渣。
968.	犀角 (本草51)	Rhinoceros horn (英名) (奇蹄目犀科犀之角)		【藥理及成分】犀角之熱浸液及蒸餾液，無解熱之效，對於毛茛菪香鹼(Pilocarpin)，有拮抗之作用；又犀角不含生物鹼，大概爲硫酸。	犀角爲解熱、解毒止血劑，治麻疹、痘疹、吐血、衄血、腦膜炎等。 一次量 2--8gm	安南金龍頓，緬甸仰光，暹羅，印度，非洲。	印度犀，祇有一角，產於斯馬托拉及馬來者，則額上另有一角，非洲犀，亦有二角。
969.	羚羊角 (本草51)	Antelope gutturosa Pall. (羚羊，羴羊)			羚羊角，有減低血壓退熱功能，治腦出血、腦膜炎、腸傷寒等症；又治震顫麻痺，一次用量 2—5gm。	產於蒙古之深山及非洲美洲等地。	其形狀似牛角，長約3cm。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
970.	麝 香 (本草51) 別名： 射 父， 麝 香。	麝香(Moschus) 係麝(Moschus L.) 雄性腹部與陰部中間之包皮腺。	腺體	Muskon, Cholestrin 碳酸鈣， 磷酸鈣， 蛋白質。	1) 為強壯、興奮、回生藥。 2) 廣用於香料。	四川打箭爐，雲南，西藏，張家口，蒙古，牛莊，西伯利亞，安南，東京。	有麝香醇，麝香乳劑，麝香水劑等。
971.	牛 膽 a. 稠厚牛膽		胆汁	胆汁酸、牛膽酸之鹼鹽，胆汁色素，膽脂及無機鹽類。	治消化不良、慢性胃炎、肝臟之分泌機能障礙，肝及脾之腫大、密尿症等。 一次量 0.7—1gm。		為棕綠色濃厚之液，味初甘而後苦。
b.	乾燥牛膽			同 上	同上，一日數次，每次 0.3—0.5—1gm 外用為創傷撒布劑。		為淡黃色之粉末，有引濕性。
972.	牛 脂		脂肪	硬脂、軟脂、油脂及其他脂肪酸之甘油酯。	治諸瘡、腋臭，又為軟膏之基礎劑。		凡液臭，以牛油塗後，再用鹼腦麝香一日塗一次。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
973.	野猪膽	爲野猪 <i>Sus Leucomystax</i> Temm.			與熊膽同。	熊棲息於山中樹林茂盛之所。	
974.	猪油 豚脂	<i>Adeps Suillus</i> (拉丁) <i>Lard</i> (英)		此脂肪之主成分爲 <i>Stearine</i> , <i>Palmitine</i> <i>Oleine</i> 等。	爲軟膏基礎劑，製安息香豚脂單鉛硬膏，藥用肥皂等。		由豚之新鮮脂肪組織中熔出，除去水分而成者。
975.	猪膽 (本草50)	爲豚 (<i>Sus scrofa</i> L.) 之膽囊。			1) 使脈搏充實，減除胃部之膨脹。 2) 利大便。		
976.	酥 (本草50) 別名： 酥油， 正酥， 酥酸。	酥即乳皮 (<i>Rahm</i>) 係哺乳動物牛、羊、水牛、馬、驢等，浮游於乳汁表面之脂肪球之凝集物。	乳皮	水分 22.83% - 74.46% 脂油 18.18% - 70.20% 蛋白 2.69% - 4.10% 乳糖 2.31% - 4.08% 灰分 0.56% - 0.59%	內用，爲滋養劑，清涼，緩下劑。 外用，治丹毒及皮膚發疹。		爲乳白色之脂肪油，味甘美。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
977.	酪 (本草50) 別名： 牛 酪， 水刀圭。	爲乳皮之精 製品，所謂 牛酪 Butt- er) 是也。		水分 10% 脂油 97.7% 蛋白 1% 乳糖 0.3% 灰分 1% 眞牛酪含揮 發脂肪酸之 甘油酯化合 物。	回 上		爲白色或淡 黃色軟膏狀 物，有甘 酸及鹹味。
978.	乳 腐 (本草50) 別名： 乳 餅， 乳 腺， 乳 團。	乳腐 (Kae- se) 係乳汁 加酸所析出 之乾酪素， 即乾酪是也		水分 40.42% 蛋白質 24.80% 脂肪 28.00% 乳糖 1.65% 灰分 5.43%	1)使身體之營 養狀態佳良 。 2)尿及糞便之 排泄，得可 整調。		爲蒼白色帶 黃色似豆腐 之物。
979.	阿 膠 (本草50) 別名： 傅致膠， 覆盆膠。	以阿井之水 煎黑牛 (<i>Bos taur.</i> <i>us L.</i>)或黑 驢 (<i>Asinus</i> <i>vulgaris</i> <i>Gray.</i>) 之 皮所製之膠 質。		爲黃色或棕 黑色板狀或 棒狀薄片， 透明有光澤 。	治虛勞 (係體 液脫泄及精力 虛耗所生之消 削病)，止出 血，利小便， 調月經 (產前 產後用之)， 一次量 3—5gm		本品出山東 東阿縣，故 名阿膠。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
980.	黃明膠 (本草59) 別名： 牛皮膠， 水膠， 廣膠。	Gelatina flava		爲黃色或棕 黑色透明柱 狀或板狀之 膠。			由牛皮所煎 之膠質。
981.	白明膠 別名： 白阿膠， 筋膠。	Gelatina alba		本品爲純粹 之 Glatin， 加水分解， 生成 Glycocol Alanin, Leucin, Acid aspa. ragin. Ac d glut. amin, Phenylala. nin, Cxyprolin Lysin, Histidin, Arginin 等 。本品所製之 新藥，爲 Gelamol, Gluton, Gelanthum Kaloderma 等。 本品之製劑 ，爲鋅白明 膠，滅菌白 明膠液，甘 油白明膠， 含碘白明膠 等。	白明膠內服或 注射，爲止血 藥，治咯血。 又製膠囊及細 菌培養基之用 ，又作照相材 料，凍結食品 時之原料。		由動物之骨 皮筋等，加 水煎煮而成 ，爲無色無 味透明薄片 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
982.	馬 骨 (本草39)	Os Equi			治小兒頭部之 溼疹。		將馬之骨骼 曬乾，燒灰 製之。
983.	馬 頭 骨 (本草53)	Os Caputis Equi			本品和酸棗仁 ，治不眠症。 一次量 0.5—1gm		取馬頭骨燒 灰製之。

第九 遊水類 CETACEA

981.	龍 涎 香 (本草50)	爲真甲鯨(抹香鯨 <i>Physeter macrocephalum</i> L.)之腸 及膀胱所分 泌之凝結物 。		爲半透明有 光澤之塊片 ，熱之或燃 之，發佳香 ，其成分爲 <i>Ambrein</i> ， 白色物質， 含85%。	爲芳香劑，其 香氣及功能 不亞於麝香。 一次量 0.5—2gm。	產於暖國之海 洋。	
985.	鯨 蠟 (本草50) 別名： 鯨腦油	<i>Cetaceum</i> 取存於鯨類 頭部腔窩中 油質之固 形成分精製 而成。		<i>Palmitin- saure cetyleter</i> ， <i>C₁₅H₃₁·C O·O·C₁₆ H₃₃</i>	以減少刺激爲 目的，促催咳 嗽下痢等。 一次量 1—2gm， 外用製軟膏蠟 膏等。 在工業上，用 於蠟燭及石鹼 等之製造。		

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
986.	鮫魚 (本草44) 別名： 人魚， 孩兒魚。	在動物學上 稱為儒艮 (<i>Halicore</i> <i>dugong</i> Erxl.)。 【傳說】秦 始皇驪山陵 中所用之人 膏，即人魚 所熬之膏。			食之能使陰草 勃起(古稱為 長生不老之藥)。 藥)。	產於印度羣島 、波斯灣、紅 海之沿岸、澳 洲及琉球等處 。	此魚之浮於 水面，恰如 人之游泳， 故名人魚， 德國稱為海 之處女，英 國稱為海女 。

第十 常節類(貧齒類) EDENTATA

987.	穿山甲 (本草43) 別名： 鱗鯉， 龍鯉。 石鯉，石 鱗鯉(穿 山甲科) 。	<i>Manis</i> <i>Pentadac-</i> <i>tyla L.</i>			1) 促乳汁分泌。 2) 使痘瘡之斑點快發。 3) 治下肢關節之疼痛。 4) 去腫瘍疥癬腫脹之疼痛。 5) 治感冒。 一次量 2—4gm。	產於廈門、汕頭、海南、台灣、印度、希瑪拉耶之森林中岩窟內。	
------	---	--	--	--	---	-------------------------------	--

丑 鳥類綱 AVES

第十一 猛禽類 RAPTORIFES

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
983.	鴛 霜 (本草49) 別名： 鴟 霜	由鴛， (<i>Milvus</i> <i>ater</i> <i>melanotos</i> L.) 之體 部或頭部黑 燒而成。			本品為內服劑 ，頭部治頭痛 、眩暈、癲癇 等；體部治癲 癇。		

第十二 燕雀類 PASSERES

989.	白 丁 香 (本草48) 別名： 雄雀屎， 雀 蘇， 青 丹。	本品為雄雀 (<i>Passer</i> <i>montanus</i> L.)之糞。			本品乳和汁點 雀羣棲於房屋 眼，治結膜炎。 、角膜炎、角 膜翳等。		
990.	蒿 雀 (本草48)	蒿雀 (<i>Emberiza</i> <i>Personata</i> Temm.)之 生肉，供藥 用。			1)食生肉，治 陰痿，為性 之增進藥。 2)內服為止血 藥。		

第十三 攀禽類 SCANSOPES

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
991.	啄木鳥 (本草49) 別名： 劉木， 鴛。	Gecin us canus Gm. G. awoke- ra T. Lyngipic- us kisuki Seebohmi Hargitt				肉爲霜，治痔 瘡及齧齒及疼 痛（插入或塗 布之）。	
992.	杜鵑 (本草49) 別名： 杜宇， 子規， 陽雀。	Cuculus P. lioceph- alus Lath.				爲霜，治療癩 ，貼於瘻孔。	

第十四 鶉鷄類 GALLINACEI

993.	鶉 (本草48)	Gallus domestic- us, Briss.	Water 74.4% Protein 23.50 Fat 1.22 Ash 1.02 (P...0.189 K...0.413) 以上爲鷄肉 之營養成分	肉爲滋養強壯 劑，又有利尿 及制止子宮出 血之効。		藥用品以烏 骨鷄爲佳， 其肉味，雌 者優於雄者 ，雄者優於 老者。
------	-------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	--	--

國 藥 提 要

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
934.	鷄 子 (本草48) 別名： 鷄 卵， 鷄 蛋。	Ovum		鷄卵全體之平均成分， 爲 水分 74.00 蛋白質14.0 脂油 10.5 灰分 1.5% 其中卵白之平均成分， 爲 蛋白質20.4 水分 78.0 灰分 1.6 各部分之主要成分： 卵殼含碳酸鈣 90.0 磷酸鈣 5.70% 卵白含蛋白質12—14% 卵黃含卵磷脂15—16% 及多量之脂肪等。	有增進營養， 制止下痢之効。		卵殼約占全卵之13.4% 。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
933.	卵黃 別名： 蛋黃	Vitellus Ovi		卵黃之普通成分，爲 水分 53.13 蛋白質（不含磷者） 14.15 脂肪 30.72 含水炭 0.32 灰分 1.63 (Ca 0.127 F... 0.526 K... 0.263) 特殊成分爲 卵黃素 (Vitellin) 核素 (Nucleine) 卵磷脂 (Lecithin) 膽石醇 (Cholesterin) 脂肪色素， 維生素 (Vitamins A, B, D, E, G.)	1) 治衰弱症及貧血症。 2) 治產後之下痢。 3) 治小兒之發熱等。		依 Muggia 氏研究，對貧血之小孩，可以清潔之卵黃，盛於已消毒之玻璃杯中，與 0.7% 之食鹽水二倍量混和，濾過，初以 1 cc 行皮下注射，漸次增量至 10cc 爲止，可得良好結果。

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
996.	鷄 肝	Hepar Galli 取鷄之肝臟 乾燥而成。			1) 治夜盲症。 2) 治睡中遺尿， 以雄鷄之 肝和等分之 桂心研細， 製為丸劑如 小豆大，每 服一丸。		
附錄	雞 內 金	係鷄盹內之 黃皮。			1) 內服，治消 化不良及胃 痛，而且嘔 吐者；又氣 噎不通，小 便不禁等， 一次量 2—3gm 2) 外用，治發 背腫毒，用 乾燥品，研 碎調油搽之 。		

第十五 遊禽類 NATATORES

997.	鷓 鴒 (本草47) 別名：鷓鴣飼， 水老鴒。	Phalacro- corax Carbo L.	肉		食其肉，可為 利尿劑，治浮 腫。	棲於河流。	
------	----------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------	-------	--

寅 爬蟲類綱 REPTILIA

第十六 龜鼈類 CHELONIA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
998.	璫 瑁 (本草45) 別名： 玳 瑁	Chelonia imbricata L.			爲解毒及解熱藥，痘瘡及藥物中毒時，爲內服劑。	產於大西洋、印度洋、台灣、琉球之海濱。	藥用時，以其鱗浸水，或煮沸成柔軟體，剝離後，乾燥之。
999.	鼈 甲 (本草45) (附) 鼈 油	爲鼈 (Trionyx japonicus Gray. (鼈科)之背甲，橢圓形，中部硬，邊緣柔軟，有肉鱗，表面呈橄欖綠色。		鼈油之恆數： 比重 0.9229 酸數 0.45 鹼化數 193.7 碘數 121.09 屈折率 1.4737 半鹼屈折計度目 72.2 脂肪酸之融點 32.8°C	爲解熱藥，對肺結核患者稽留性之高熱及患瘧疾之發熱時有效，對瘧疾患者，以醋浸漬本品，蒸乾成粉末，每次用2—3—10gm，於熱發作前夜，服一次，翌日即發作日之朝及發作時各服一次，單味以酒送之，或添雄黃少許亦可。		脂肉和水煮沸，油浮於水面，分取之即得。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1000	龜 甲 (本草5)	Clemmys Japonica Gray. 龜，水龜 (龜鱉目石 龜科)			龜甲有解熱作用，對瘧疾有效，又治子宮出血，制止帶下，對小兒之頸部，有促進骨門閉鎖之效。 一次量 2—10g n		
a.	龜 板 (附) 龜板膠				龜板用於產後之腸炎及腹痛。 用 量 2—10g m c		

第十七 蛇 類 OPHIDIA

1001	白花蛇 本草43) 別名： 百步蛇， 斷蛇， 白蛇， 寒鼻蛇。	Agkistrod on acutus Ganther. (白花蛇)			治癩疾(癩瘋)、癩性白斑、惡性腫瘤、梅毒風溼、中風、半身不遂、關節痛、刺經痛等，俱內服劑。 一次量 2—5g. n o	原產於廣州，故名虺蛇，有白花蛇酒，白花蛇散，白花蛇膏等製劑。	藥用品頭及尾有毒，除去。
------	---	--	--	--	---	--------------------------------	--------------

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1002	烏蛇 (本草43)	Natrix vibakari Boie (烏蛇)			內服，治癩疾及疥癬。 一次量 2—5—8gm。	棲息於新州黃州等之山嶺地帶。	
1003	蛇蛻 (本草43) 別名： 蛇退皮， 蛇皮。	以黃領蛇 (Elaphe Climacop- hora Boie) 之皮 為最多。			治小兒之瘰癧、成人之咳嗽、角膜之潤濁等症。 又小便不通，燒湯溫服之。		為諸種蛇類所遺之脫皮。
1004	蝮蛇 (本草43) 別名： 反鼻蛇， 地扁蛇。	Trigo oee -phalus blmheffii Boie. (蝮蛇) 藥用品為蝮蛇之乾燥骨骼及肉質。		Ch lester- ine Palmitic acid S earic acid Taurine	元來為癩疾及惡性肺病之內服藥，民間為滋養強壯劑。 一次量 2—5gm。		藥用品係除去頭尾者，其牙放出毒液，人若觸之，有劇痛，致腫脹遂致死，塗以烏賊之墨汁，可解其毒。
a.	【附】 蝮蛇灰， 反鼻霜， 五八霜。				為止血劑，又治遺尿症，本品27gm，丁香9gm，為細末，每夜用3gm，以白湯送服；治便血，以本品和人參、紫檜、麒麟血各6gm，鼯鼠霜9gm，研勻服之。 又治脫肛、腫痛，以火炙本品，用酒送服。		為蝮蛇黑燒而成。 現今用其乾燥品。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1005	蛤 蚧 (本草43) 別名： 蛤 蟹， 遷 蟾。	Phrynoccephalus frontalis			爲滋養強壯劑，補肺腎，定喘嗽，治久咳。又治淋疾，并有利尿之効。	廣州，貴縣，南寧，百色。	本品雄者爲蛤，雌者爲蚧，夜聞其鳴聲，一日蛤，一日蚧，遂因其聲而命其名。

卵 兩棲類綱 AMPHIBIA

第十八 有尾類 URODELA

1006	鯢 魚 (本草44) 別名： 人 魚， 納 魚， 鰻 魚。	Magalobatrachus Maximus Schleg (鯢魚) Samandracula maculosa 外國產鯢魚	Samandracula Samandracula 對神經中樞有作用，注射於犬之皮下，對體重1kg.n, 致死量0.7—0.9mg。	食之可治神經衰弱及血道患者。		鯢聲如小兒，故名。
------	--	---	---	----------------	--	-----------

第十九 無尾類 ANOURA

1007	山 蛤 (本草42)	Rana japonica Blgr.		除其皮部與內臟，以醬油浸後炙之，治小兒之疳疾。	棲息於原野草叢之間。	
------	---------------	---------------------	--	-------------------------	------------	--

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1008	蝦蟇 (本草42) 別名：蝦蟇 蝦蟇	Rana rugosa Schleg.			解熱，消炎。		俗云，蝦蟇置於其處，一或避之常慕而返，故名蝦蟇。或作蝦蟇，蝦言其聲，蟇言其斑也。
1009	蟾蜍 (本草12) 別名：蟾蜍科 癩蝦蟆。	Bufo vulgaris Laur.		由皮膚托腮突起處所得之白色乳液，呈鹼性反應，有麻醉性，由耳下腺與背腺所分泌之液，為酸性，有毒性。	治惡性腫毒，發疔，打撲之切傷等。又治蛇咬傷，以本品之霜，和胡麻油或瓜葉之絞汁塗之。	本品之原產地：江蘇四川。	晝間潛伏於樹洞床下等陰所，夜間出而捕食昆蟲。
1010	蟾酥 (本草42)			由其皮膚所分泌之有毒成分，為 Bufotalin 及 Bufonin，有似洋地黃素 (Digitalin) 作用。	本品內用，治小兒之疳疾；外用，對乳兒頭部之瘡疹，和乳汁塗之；對齲齒之疼痛，點滴新鮮分泌液；製為膏藥，治癰疽腫脫疔等，成人一次之內用量 0.003—0.005 gm。		本品係採蟾蜍之皮膚所分泌毒汁，與糊化之澱粉質密和作成餅狀之物。

辰魚類綱 PISCES

第二十 硬骨類 TELEOSTEI

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1011	海馬 (本草44) 別名： 水馬， 水雁。	Hippocampus coronatus T. & S.	肉		1) 食之，能催陰莖勃起。 2) 爲粉末內服，治腹痛。	海馬出廣東南海，福建，海南島。 棲身於海底藻類茂盛之處。	是魚蝦類，狀如馬形，故名(陶弘景)。其首如馬，其身如蝦(宗爽)。
1012	河豚 本草44)	Tetrodon porphyreus Sieb. T. nerioides, T. rubripes Schleg.		1) Tetrodotoxin $C_{16}H_{22}NO_{12}$ (河豚酸) 2) Tetrosin 含氮鹽基性物質 3) Tetropeptide $C_5H_{11}O_5$ 無氮結晶性物質	肉有美味，爲佳肴；製爲醬，內服，治癩疾、關節之疼痛、食道之狹窄等。 --次量 3-7g.n。	棲息於海濱，喜在多砂礫海之中層游泳。	河豚有三十種，卵果有毒，使人麻醉，食肉時，須注意除去，以免危險。
a.	河豚卵巢毒素 河豚酸	Tetrodotoxin.		【藥理試驗】本品之動物試驗(皮下注射)，對體重1kg之動物，其最小致死量如次： 南京鼠用0.0041mgm， 家兔用0.004mgm，以體重之約50000分之一，可使動物毒斃。			

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
b.	河豚毒素溶液			以河豚毒素，溶解 0.5% 之石炭酸水中，其 1 cc 之河豚毒素含有量，等於對洋兔之體重 1000 gm，本品之最少致死量，乘 25/7。	治癩性神經痛及一般神經痛。		
1013	石首魚 (本草44) 別名： 黃花魚， 鯨魚， 黃魚， 鮫魚， 江魚， 石頭魚。	Sciaena schlegelii Bleeker.			鯨能消化食物，治急性下痢；耳石內服，治尿淋瀝，尿閉症等。蜈蚣咬傷，以白鯨皮貼之。	石首魚喜棲息於淺海多泥土之處。	乾者名鯨，魚鯨能養人，人恆想之，故字從鯨。
1014	鯉魚 (本草44)	Cyprinus carpio L.	生肉 鱗片 胆汁	營養成分如次： 水分 78.86% 蛋白質 18.91% 脂肪 0.83% 灰分 1.37%	1) 有利尿作用，治浮腫、黃疸、腳氣、咳嗽。 2) 催進乳汁之分泌。	產於河流湖沼等深淵中。	

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1015	鱧 魚 (本草44) 別名： 烏 鱧， 文 魚， 黑 鱧， 玄 鱧。	Muraenesox cinereus Forsk.	肉 胆 汁	營養成分如 次： 水分 80.08% 蛋白質 17.14% 脂肪 1.76% 灰分 1.03%	1) 爲利尿劑， 治浮腫。 2) 凡患白禿 者，以鱧之 胆汁，溶於 胡麻油中塗 之。	產於淺海之泥 地。	
1016	鰻 魚 (本草44) 別名： 鰻鱺魚， 蛇 魚， 白 鱻。	Anguila japonica T. et S.	油 及 生 肉	營養成分： 水分 69.24% 蛋白質 18.09% 脂肪 11.53% 灰分 1.14%	1) 本品營養價 甚富，內服 ，治肺結核 、陰萎及瘰 癧等。 2) 驅除腸內之 寄生蟲。	棲息於河川之 淡水中及混淡 水之近海，於 河口之近旁尤 多。	乾者曰風鰻 ，其油膏外 用，治療及 癩瘡。
1017	鱮 魚 (本草44) 別名： 泥 鰕	Misguruns serrata Cuv.	生肉	營養成分： 水分 77.21% 蛋白質 18.43% 脂肪 2.69% 灰分 1.56%	防身體之冷卻 ，醒宿醉，治 痔疾。	潛於池沼水田 及泥溝中。	

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1018	鯨魚 (本草44) 別名： 草魚， 鰻魚。	Solmo perryi Brevoort.	內臟		食內臟，能使胃腸之機能旺盛。膽，治一切骨鯁及竹木刺在喉中。	鯨生於江湖中，似鯉。	
1019	鱧魚 (本草44) 別名： 白鱧， 參魚。	Zacco platypus T. & S.	本品之乾燥物		食之，胃部有暖感，單純性腸炎，可使輕快。	產於河川湖沼中。	
1020	鰻魚 (本草44)	Hyporhamphus sajori T. & S.	肉		食之流行病之傳染得可減少。	產於各地之沿海。	

第二十一 硬鱗類 GANOIDEI

1021	鱒魚 (本草44) 別名： 鮭魚	Acipenser mikadoi Hilg1.	肉		其肉營養分甚富，食之使精神狀態佳良。		
------	---------------------------	--------------------------------	---	--	--------------------	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1022	魚 膠 (本草44) 別名：鱈膠，魚白膠。	取諸魚之鱈 (以石首魚 為主)，即 浮囊，煮沸 所得之膠質 。		膠素 Glutin 70%， 灰分 0.5—12%， 營養成分： 水分 76.02% 蛋白質 17.67% 脂肪 5 15% 灰分 1.16%	1)內用，爲止 血劑。 2)供英法痔瘡 膏之製造用 。 3)在工業上爲 酒類之清澄 劑。 或織物之添 加光澤用。		日局方規定 採歐產鱈魚 屬之魚鱈， 除去外皮及 血管，取其 內皮切片乾 燥之。

乙 節足動物門 ARTHROPODA

子 昆蟲類綱 INSECTA

第二十二 膜翅類 HYMENOPTERA

1023	蜂 蜜 (本草23) 別名：百花精，蜂蜜。	係在蜜蜂 (Apis Japonica Rad.) 之巢內所釀 成之蜂蜜。		比重 1.427% 水分 19 98% 果糖 39.24% 葡萄糖 34.71% 蔗糖 1.08% 有機物及灰 分 5.02%	爲調味劑。		
------	-----------------------------	--	--	--	-------	--	--

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
a.	精製蜂蜜	Mel depuratum		蜜蜂含葡萄糖，果糖及微量之蠟酸。	1) 為營養劑，使心臟機能增強。 一次用 20-30 gm。 2) 為緩下劑。 一次用 50-100 gm。 3) 為賦形藥，丸劑及凍劑之調製時用之。 4) 在非常時期，為甘油之代用品。		係除去易起發酵之蛋白質及花粉等浮遊物之純品，乃有佳香之黃色澄明濃稠液。
1024	黃 蠟 (本草39) 別名： 蜜 蠟	Cera flava		Cerotic acid Myricin Cerolein	內服，治出血性下痢。 外用，治切傷及打撲症。 一次量 1-2gm。		於採蜜後所殘留之蜂巢，加熱湯壓搾熔出之粗製黃蠟，再熔融凝固而成者。
1025	白 蠟 (本草39)	Cera albe		成分與黃蠟同，其物理的恆數如次： 比重 0.967% 酸數 4.6-7.9% 脂數 80.4-93.5	內服，治出血性下痢。		係黃蠟曬白而成。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1026	露 蜂 房 (本草39) 別名： 蜂 窠	本品爲大黃 蜂 (Vespa man darina sm.) 之巢 (胡蜂科革 蜂之巢)			治初生兒之強 直症，搖弱， 癱瘓陰萎等。 一次量 2 3gm。		此房懸在樹 上，得風露 者，故名。

第二十三 鞘翅類 COLEOPTERA

1027	斑 蝥 (本草40)	Cantharis: Cantharid. es: 本品爲地膽 科昆蟲 Mylabris cichorii Fabricius 及 M. Side F. 之乾燥 屍體，中華 藥典採用本 品。		Canth. rid. in 應在 1% 以 上。	1) 爲利尿劑， 治水腫， 一次用 0.01—0.02 gm, 一日 3 次， 爲散劑或水 劑內服用。 2) 外用有引赤 發泡生毛之 効。 3) 對弛緩性潰 瘍，與白糖 澱粉樹膠末 等混和，撒 布之。	山西，山東， 湖南，湖北。	斑言其色， 蝥刺言其毒 矛刺也。 藥典有斑蝥 火綿膠，斑 蝥硬膏，斑 蝥酊(中典)斑蝥油， 引赤紙(日 方)等。 【注意】 本品之粉塵 入眼，起劇 烈炎症，吸 入氣管，刺 激甚烈，故 將本品粉碎 或篩過時， 應以溼布蒙 被顏面，再 覆以面罩， 眼之部分須 用保護眼鏡 ，篩粉用之 篩，宜保管 專用，不可 混用，以昭 慎重。
------	---------------	---	--	------------------------------------	---	------------------	---

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1028	芫青 (本草40) 別名：蛇青，芫青，青娘子。	Lytta Vesicatoria Fabricius		Cantharidin 0.3-0.6% Ash 6-10%	為皮膚發泡劑。	原產於西班牙及法國南部。芫青喜在樗、忍冬、白楊、榛、接骨木等樹上棲息。	
1029	葛上亭長 (本草40) 別名：豆斑貓	為Epicanta Gorhami Mars 之乾燥屍體 (日本第四版藥局方採用本品)。		成分及効用與前二品同。	同上	原出雍州，今處處有之。	此蟲黑身赤頭，如亭長之着玄衣赤幘，恆於葛上得之，故名。
1030	地膽 (本草40)	Meloe coarctatus Most. 乾燥品供藥用。			與斑蝥同。	幼蟲潛於山中之樹皮下，成蟲棲息於草間。	
1031	蜚蠊 (本草39) 別名：天仙子，蛤蜊。	Holotrichia Paralleta Motsch 乾燥品供藥用。			內服，治小兒之驚風癇。一次服1-2gm。又治大人之癩癩。	棲息於鳥獸之死骸及廁所之近旁。	本品屬金龜子之類。

第二十四 鱗翅類 LEPIDOPTERA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1032	白 僵 蠶 (本草39)	蠶 蛾 (<i>Bombix mori</i> L.) 之幼蟲中， 有一種細菌 <i>Musccardine</i> (<i>Botytis bassiana</i> Bals.) 寄生， 由所發之 硬化症而斃 死，體軀硬 固，表面蒙 白粉狀，此 命名之所由 來也。			內服，治小兒 之瀉嘔夜啼及 扁桃腺炎，氣 管支炎等。 一次量 1-3gm。		蠶風病死其 色白白，故 曰白僵，死 而不朽曰僵 。
1033	蠶 沙 (本草39) 別名： 原蠶沙， 晚蠶沙。	爲夏蠶幼蟲 所排泄之糞 。			由腹部冷感， 腰部及下肢冷 氣所起之疼痛 ，半身不遂， 頭痛，子宮出 血等症， 一次服 3-5gm， 又婦人血崩， 取本品10-15 gm，和酒加熱 後服之。		蠶之尿用沙 。

第二十五 雙翅類 DIPTERA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1034	五穀蟲 (本草40) 別名： 糞蛆， 屎蟲。	爲夏月糞尿 中所生長昆 蟲。 蛆蠅 Fristalis tenax L. 之幼蟲，採 集之，浸於 流水中，經 二三日，洗 淨後，乾燥 之，研成粉 末。			本品爲霜，內 服，治小兒疳 疾。 一次量 1-2gm。		
1035	楊 雞 (本草40) 別名： 紅 娘	爲同翅目野 蟲科之昆蟲 。			治陰痿，瘰癧 ，橫痃，便毒 。		
1036	九 香 蟲 (本草39)	Nezara antennata, Scott. (異翅目， 椿象科)。			爲強壯劑，補 脾腎。	產於貴州永寧 ，衛赤水河中 。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1037	蟬 蟲 (本草41)	Polyphaga sp. 土別蟲，蟬 產蟲(爲蟬 蠶之一種)。 。			通經，催乳， 治折傷。	凡米糠及確白 倉下，灶脚， 麵牆牆壁下土 中溼處有之。	

第二十六 半翅類(有吻類) HEMIPTERA(RHYNCHATA)

1038	蟬 蛻 (本草41) 別名： 蟬 退， 蟬 花。	本品爲鳴喇 (Graptops- altria corolata- stal) 之脫皮。			緩解小兒之搗 搗夜啼，去表 在性之熱，又 治中耳炎。 一次服 3-5mg。		
1039	蟲 白 蠟 (本草39)	本品係取 Ericerus Pelii west. 之幼蟲皮膚 所分泌之白 色蠟絲，加 熱烱融後， 以布濾過， 去渣，注入 冷水中，使 固結者，即 蟲白蠟也。	本品由 C82.2 33%， H13.5 75%， O4.19 而成，共集 成式爲 C ₁₀₈ H ₁₀₈ O ₄	本品有止血、 鎮痛及促肉芽 之發生作用， 治打撲切傷等 。	此蟲爲集團， 羣棲於女貞、 水蠟樹等，產 於湖南、湖北 、四川、雲南 、廣東、福建 等省。		

第二十七 直翅類 ORTHOPTERA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1040	螻蛄 (本草41) 別名：螻蛄 總 蛄 (螻蛄科)	Gryllotalpa africana Pall.	爲霜供藥用。		爲利尿劑，治 水腫淋疾等； 又有催下痢之 効，於食前 一次服 3-5 gm。	棲息於田間中	
1041	螳螂 本草39	Tenodera aridifolia Stoll.	乾燥品供藥 用。 (螳螂科螳 螂)		爲鎮痙鎮痛藥 ，治小兒之驚 風及痛風。 一次服 3-5 gm。	棲息於樹林繁 茂之草叢中。	
1042	桑 螵 蛸 (本草39)	係產於桑樹 枝梢下螳螂 之卵塊，			治陰萎、遺精 、閉尿症、遺 尿症、月經閉 止等。 一次服 1.5-4 gm。		

丑 多足類綱 MYRIOPODA

第二十八 蜈蚣類 CHILOPODA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1043	蜈 蚣 (本草42) 別名：(唇脚目大天龍蜈蚣科)	Scelopendra Sp. 龍蜈蚣科)			1)內服，治小兒之驚風癲癲。 2)有墮胎作用。 3)毒蛇咬傷，為黑燒貼之。 4)治關節癱瘓質斯，凡逢蜈蚣中毒，取蜈蚣搗碎塗之，又塗鷄屎，桑汁，白鹽亦可。	棲息於山野溪澗之落葉、腐木等之下，或壤溜之底面。	

寅 蜘蛛類綱 ACHNOIDEA

第二十九 蝎 類 SCORPIONIDAE

1044	蝎 (本草40) 別名：主蠲蟲，蠶尾蟲。	(Salled:scorpions) Bathus martensii, Karsch. (全蝎目，極全蝎科)。		【成分研究報告】據野氏之研究報告，摘要如次： 1. 蝎毒之本体，為毒性蛋白質。 2. 毒性蛋白質，對水稀鹽酸及鹽類之溶解性，至少得分為二種之蛋白	藥用品，用蝎之鹽漬物，治胃寒、風疹、小兒驚癇風、中風、半身不遂、口眼喎斜、語謇、手足攣攣、身掣及痛氣及子宮脫出、帶下等，內服一次量0.2—0.5gm，又治諸虛毒腫，以全蝎七枚	蝎原產於山東青州及華北一帶，江南舊無之，唐開元初，有主蠲以竹筒盛過江，至今往往有之，故俗稱為主蠲蟲，藥用品有全蝎，用尾者謂之蝎尾。	【特徵】蝎體似蝦，頭上有2—5對小單眼與一對複眼，口在頭之前端，大顎頗小，隱於前頭部之下，末端為螯狀，小顎長大，似脚狀，末端有大螯，頭胸部短無關節，在
------	----------------------------	--	--	--	---	---	---

號碼	中名	拉丁名	製用部份	成分	效用	產地	備考
				<p>質。</p> <p>3. 由蠟之毒，性蛋白質，可作二種之微細結晶，又此蛋白質分解時，得類似 Erocine 及 Tyrosin 之結晶。</p> <p>4. 蠟之毒，蛋白質分解，成無害物質之氣及酵素 (Pepsin), Trypsin, 高氯酸鉀及亞氯酸鉀等。</p> <p>5. 蠟毒中除毒蛋白質以外，含較多之卵磷脂 (Lecithin) 及膽石脂 (Cholestrin)。</p>	<p>，梔子七個，和麻油煎黑，去渣，入黃蠟，化成膏傅之。</p> <p>諸痔發癢時，用全蠟不拘多少，燒烟燻之，有特效。</p> <p>凡逢蠟之刺傷，可以濃烏頭酊塗布之，同時用 5—6 滴，和冷開水服之。</p> <p>據岩野氏所稱，於末節之針，於所在部位以外，並無其他毒物；依麥氏研究，此毒液，存在於腺之中。</p>	<p>【藥理檢查】久保田教授，對於蠟毒，曾行化學的及藥物學檢查，謂蠟毒係一種蛋白質毒，而為一種麻醉毒。</p>	<p>胸部之部分，有與四對，腹前腹而成，後腹由七，前腹由六，後腹由六，關節而成，呈細長之尾狀，有縱走之線，其最後之關節為囊狀，有毒力者，其雄者比雌者強，又墨西哥產之蠟，比中國產之蠟，毒性更強。</p>
a.	蠟油	Oleum Scorpions			<p>投全蠟二十個之生體於扁桃油一斤中，浸漬之，即成，為蛇毒之解毒劑所常用。</p>		

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1015	蛛 蜘蛛 (本草40) 次 蛋， 屬 蟪， 蜘蛛。	Spider (英) (買蜘蛛口)			1) 治惡疾。 2) 毒蟲之刺咬 傷者塗之， ，可解其毒 。		蛛蜘蛛種類頗多，入藥者僅數種，以腹小尻大腹內有蒼黃者為真，西者為假，去頭足研碎用。

卯 甲殼類綱 CRUSTACEA

第三十 節甲類 ARTHROSTRACA

1043	鼠 婦 (本草41)	Porellio aevis L. tr. 焙殺後，供 藥用。			為利尿劑及通 經藥。	棲息於床下芥 溜穴藏等。	
------	---------------	---	--	--	---------------	-----------------	--

丙 軟體動物門 MOLLUSCA

子 頭足類綱 CEPHALOPODA

第三十一 二鰓類 DIBRANCHIATA

1047	烏 賊 (本草44) 別名： 墨 魚， 纒 魚。	Sepia esculenta Hoyle		新鮮品： 水分 78.84 蛋白 18.00 脂肪 1.76 灰分 1.16 (P... 0.198 K... 0.273)	1) 為營養劑，使精神狀態佳良。 2) 治夜盲症。 3) 促月經來潮。 4) 催乳腺分泌。 5) 在工業上取其墨汁(於肝臟附近墨汁囊中取之)精製之，為水彩畫之顏料用。		
------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--	---	--	--

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1048	烏賊油	山鎗烏賊 (<i>Loligo bleckeri kefertoin</i>) 錫烏賊，烏賊等肝臟中所採得之脂肪。		精製品為淡黃色透明之油液，無不快臭氣，比重0.9316。	為魚肝油之代用品。		
1049	烏賊骨 別名： 海螺蚶	Cuttle bone (英) (十足目墨魚之骨質)		碳酸鈣，磷酸鈣，膠質。	內用，治帶下、子宮出血、腸炎、胃痛等。 外用，治角膜翳、流淚症(由結膜之炎症所起者)、下疳、陰囊之溼疹、弛緩性潰瘍等， 一次用量4—8 gm。		
1050	章魚 (本草44)	<i>Cetopus</i> (<i>ctopodia</i> L.)		營養成分(乾物) 水分 18.82% 含氮物 73.14% 脂肪 1.28% 灰分 6.75%	1) 食之，強筋骨。 2) 其煎出液，洗滌痔疾用。	產於近海。	

丑 腹足類綱 GASTROPODA

第三十二 有肺類 PULMONATA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1051	蝸 牛 (本草42)	Eulota Periomph- ala Pfr. (蝸牛科) 其體及殼， 供藥用。			脫肛，痔疾及 排尿之不利 時用之。(外 用)	蝸牛棲息於陸 上，冬期蟄伏 於落葉或石下 ，梅雨之時節 旬外出。	
1052	蛭 蝨 (本草42) 別名： 蛭蝨螺， 托胎蟲， 鼻涕蟲， 土 蝨， 附 蝨， 陵 蝨。	Philomycus bilimeatus Benson.			1) 內服，治顏 面瘰癧、驚 風等。 2) 外用，治脫 肛及腫瘍之 疼痛。 3. 治蜈蚣之咬 傷(以本品 貼傷處)及 蝮蛇咬傷(以本品之乾 煙品，燒為 霜溶解於水 ，塗於創傷 處)。		【生態】蛭 蝨生於池澤 及陰地沙石 垣下，形狀 似蝸牛，體 長 45mm， 不負殼，頭 上有一對觸 角，背面前 部具橢圓形 之小甲，其 右側有呼吸 孔，雌雄同 體，後頭有 粘液腺，分 泌粘液，其 遊行所經之 路徑，殘留 有光澤之 銀灰色綫痕 ，逢砂糖及 食鹽，則立 即分泌粘液 ，緣起壅擊 而致死。

第三十三 前鰓類 PROSOBRANCHIA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1053	石決明 本草46) 別名： 千里光， 九孔螺。	本品爲鮑 (<i>Haliotis</i> <i>gigantea</i> Chem) (櫛鰓目石 決明科)。 之貝殼，產 於暖海廣東 瓊州、水東 、北海、平 海。		肉之營養成 分如次： Wat r 73.00% Protein 24.58% Fat 0.44% Ash 1.98%	1) 殼，治視力 障礙及綠內 障(由硝子 體、脈絡膜 、網膜、視 神經疾患所 起者)，又 解肺結核者 之消耗熱； 又爲利尿劑 ，治淋疾。 一次量 3—5gm。 2) 肉之效用， 與殼同。 3) 肉爲美味食 品。		決明，千里 光，以功名 也，九孔螺 ，以形名也 。
1054	貝子 (本草46) 別名： 貝齒， 海哈。	貝子爲寶貝 (櫛鰓目寶 貝科) (<i>Cypraea</i> <i>tigris</i> L.) 及安子貝 (<i>C. mauri-</i> <i>tiana</i> L.) 所得之貝殼 。			爲利尿、止瀉 及魚肉中毒之 解毒藥。 一次量服 2—3gm。 外用，治角腹 髒及生殖器之 損傷。	棲息於琉球台 灣海濱之岩礁 間。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥 用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1035	田 螺 (本草46) 別名： 田 螺	Helix Paludina Lam. 貝殼及厝， 供藥用。		營養成分如 次： Water 75.766%。 Protein 19.102% Fat 0.517% Ash 4.585%	貝殼內服，治 胃痛、胃擴張 、腸炎驚風等	棲息於淡水沼 澤及水田之泥 土中。	
1036	蓼 螺 (本草46) 別名： 赤 螺， 紅 螺。	Rapana benzoin L.				食其肉，可除 結核性之病原 。	
1037	海 螺 (本草46) 別名： 法 螺， 吹 螺， 梭尼螺， 假猪螺	Triton toritonis L. Turbo marmora- tsu, Linne. (橫鰓目卷 螺科，大海 螺)			1) 凡患目痛時 久者，取生 螺之汁洗之 ，或入黃連 末在內，取 汁點之，立 癒。 2) 和菜羹食， 治心痛。	棲息於暖海之 岩礁間。 產於廣東、福 建、浙江寧波 鄞縣(古明州)、寧海、臨 海、黃巖、溫 嶺及琉球等處 。	屬名甲香。 螺與螺同。

號碼	中名	拉丁名	適用部份	成分	效用	產地	備考
1033	蝸 蕨 (本草46) 別名： 螺 蚌， 川 蛭，	Melania libertina Gold. 肉及貝殼， 均供藥用。			肉爲利尿劑， 治黃疸浮腫。 貝殼研碎內服， 治胃痛嘈雜 及胃酸過多。		

真 瓣鰓類綱 LAMELLIBRANCHIATA

第三十四 單柱類 MONOMGARIA

1039	牡 蠣 (本草46) 別名： 蠔， 蛤 蠣， 牡 蛤， 古 贛。	牡蠣 (Ostrea cusullata Born) (原瓣帶目 牡蠣科) 之貝殼，充 藥用。	牡蠣殼： 水分 17.0% 動物質 11.0% 炭酸鈣 73.0% 磷酸鈣 2.1% 鹽類 2.1% 牡蠣肉： 肝糖變粉 (Glycogen) 2.377% 水分 81.8% 蛋白質 8.45% 脂肪 1.52% 灰分 2.70% (Ca 0.107% P 0.114% K 0.209%) Vitamins A,B,C,D. G.	1) 爲制酸劑， 治胃酸過多。 一次量 2—5gm 2) 治虛勞盜汗， 以本品與 麻黃黃芪等 分混和，爲 粉末。 一次量 6gm 3) 治遺精，將 本品磨成末， 空腹時用 酒送服。 4) 治睡鳴，將 本品溶於米 醋中塗之。 5) 治金瘡出血， 將本品研 成末塗之。		
------	--	---	--	--	--	--

第三十五 同柱類 HOMOMYARIA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1060	蜆 (本草46) 別名： 扁 螺	Corbicula atrata Prime. 生肉及貝殼 ，供藥用。		營養成分如 次： Glycogen 1.006% Protein 18.40% Fat 0.84% Water 79.57% Ash 1.19%	食生肉，有利 尿制汗之効。 貝殼爲制酸劑 ，治胃酸過多 及嘈雜。	棲息於河川湖 沼之泥砂中， 淡水與河水交 流之河口殊多 。	
1061	文 蛤 (本草46) 別名： 花 蛤， 黃 蛤。	Cytherea meretrix, L. (完備帶目 蛤科) 貝殼供藥用 。		Glycogen 0.36% Water 81.12% Protein 13.19% Fat 0.81% Ash 1.88% Vitamin A, B, D.	醫口渴、解熱 、助食物之消 化，併有利尿 作用，又爲眼 窩神經痛鎮靜 一次量服 3-6gm。	產於有淡水流 入之清靜淺海 砂泥地。	此貝殼在製 劑室，可供 膏藥之容器 用。
1062	蚌 本草46 別名： 鶻 蛤， 含 漿， 合 漿。	Anodonta chinensis A. Japonic marts.		Water 81.81% Protein 7.48% Fat 1.11% Ash 5.90% Ash 0.67% (Ca 0.146%) Vitamin	1) 內服，治下 痢、浮腫、 帶下等。 2) 外用，治溼 疹。 (貝殼供藥用)	產於淡水之湖 澤池沼中。	

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1063	淡菜 (本草46) 別名：西施舌，殼菜。	Lutriaia unttalli conrad. Mytilus edulis, L.		Glycogen 2.53% Water 79.23% Protein 16.69% Fat 2.625% Ash 1.455%	1) 為營養並性的增進藥，治陰萎。 2) 治腹痛、腰痛、下痢、腸出血、子宮出血等。	產於淺海多泥砂之海底，福建雲霄。	西施舌之水，供藥用。
1064	魁蛤 (本草46) 別名：蚌，瓦礫子。	Arcagrano-sa, L. A. inflata Reeve.		Glycogen 1.067% Water 82.40% Protein 15.79% Fat 0.42% Ash 1.75% Vitamin A, B, D.	1) 肉為營養增進劑，治陰萎、下痢等。 2) 貝殼用於由月經不順所致之下腹部硬結等症。	福建漳州，浙江寧波，台州，溫州。	

第三十六 異柱類 HETEROMYARIA

1065	真珠 (本草46) 別名：珍珠，蚌珠，真珠。	生於真珠貝 (Avicula martensii Dkr.) 及鮑魚之貝中。		水分 2.23% 碳酸鈣 91.72% 有機質 5.94%	內服，治上部充血不眠及癰痢、遺精等。(研為粉末服之)。 一次量 0.5—1gm 外用，為點眼藥，治角膜翳(振盪合劑)。	廣東南海、廉州、北海及印度洋中之錫蘭島、波斯灣及美國加州沿岸	
------	------------------------------	--	--	-------------------------------------	---	--------------------------------	--

丁 蠕形動物門 VERMS

子 毛足類綱 CHAETOPODA

第三十七 蚯蚓類 OLIGOCHAETA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效 用	產 地	備 考
1063	蚯 蚓 (本草42) 別名：地龍，曲蟻，土龍，歌女。	Perichaeta Sieboldii Horst. und Phetropoda	乾 燥 物	Pyrosine, Alanine (α -amino- propionic acid) Phenylala- nine, Leucine (α -amino- isocaproic acid) Lysine, Valine (α -amino- isovaleria- nic acid) Adenine, Choline, Epiguanine Guanidine, Xanthine, Cholestrin, Palmitic acid, Stearic acid.	本品為有名之 退熱藥，又治 癩疾、驚風、 頭痛、關節疼 痛，排尿困難 ，蛇虫、寄生 虫等。 一次用量為 5—10gm。		

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
a.	蚓 蚓 油	以活蚯蚓，投於洋橄欖油中，經數日浸漬而成。			治痛風、神經痙攣、打撲傷、火傷等。		

丑 環蟲類 ANNELIDA

第三十八 蛭 類 HYRUDINEA

1037	水 蛭 (本草40) 別名： 馬 蟻， 馬 蟻， 馬 蟻。	Hirudo nipponica Whitman (顎蛭目， 蛭科)。	生 活 體 及 乾 燥 物		<p>1) 乾燥品，為【藥理實驗】內服劑，對水蛭前半體之月經閉止，浸膏，有使血液凝固緩慢之效。</p> <p>2) 生水蛭為吸血用，但一次吸血者，不能再用。</p> <p>3) 治鼻痔，水蛭炒一分，和皂莢一個同研為末，傅之。</p>	<p>水蛭使用法： 水蛭之健全者，有吸吮血液之機能，接觸之，則活潑團結，須以鹼性水時養之，不可疏忽。用水蛭吸血時，須先將其欲接着之身體部分，以冷水洗淨，以白糖水擦之，另取半個，穿適當大小之孔，投入水蛭，與萍果向體部接觸，此時水蛭厭忌酸性之萍果，可吸着體部。</p>
------	--	--	---------------------------------	--	--	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1068	水蛭浸膏	Hirudin 由水蛭之頭部及頸部所製之浸膏。為淡棕色之小板狀物或疏鬆之粉塊，易溶於水，不溶於醇及醚。			對婦人病，有防止血液凝固之效，用0.001—0.005gm，溶解於蒸餾水或生理食鹽水中注射之。		

戊 棘皮動物門 ECHINODERMATA

第三十九 沙蠟類 HCLOTHUROIDEA

1069	沙 蠟 別名： 海 鼠	Stichopus japonicus Sel. 生體或為霜，供藥用。		乾燥品： 水分 $\geq 1.55\%$ 含氮物 55.51% 脂肪 1.83% 灰分 21.05%	1) 為滋養劑，有壯陽作用。 2) 對熱病者，有清涼作用。 3. 催醒宿醉。		
------	-------------------	--	--	---	--	--	--

第四十 海星類

1070	海 燕 (本草46)	Asterina pectinifera			為滋陰藥。	出海中礁巖間。	
------	---------------	----------------------	--	--	-------	---------	--

已 腔腸動物門 COELENTERA

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1071	珊瑚 (本草8)	Corallium elatior, 別名: Rindley, 鉢擺娑, C. konojoi 福羅(梵 語)	(珊瑚綱, 石珊瑚目)		去目中醫, 點 眼去飛絲, 消 宿血; 爲末, 吹鼻, 止鼻衄 、鎮心, 止驚 痢, 又治癩疹 之目疾。	珊瑚生廣東南 海、廣州及波 斯。	

第四十一 雜 類

1072	海參 (拾遺10)	Stichopus japonicus, 別名: Selenka 刺參, (拉丁名) 光參, Sea slug, 遼參, Soaked, 廣參, Sea cucum 肥皂參, bar 瓜皮參, (英名) 海瓜皮, Bicho de 海男子。 mar (法名)	營養成分: Protein 21.45% Fat 0.27% Chyd 1.37% Ash 1.13% (Ca 0.118 P 0.22 Fe 0.0014 K ... 0.070)	1) 補腎, 滋陰 、益精, 壯 陽。 2) 治金瘡及疽 毒破爛者, 以海參爲末 搽之, 即癒 。	海參出遼寧、 吉林等處者最 佳, 色黑肉糯 、多刺, 名遼 參; 出山東膠 州、登州者亦 佳。 出廣海者名廣 參, 色黃, 出 福建者, 皮白 肉厚, 梗纒無 刺, 名肥皂參 。 光參出浙江 、皮大而軟, 無刺名瓜皮參 、品不佳。	本品爲海產 動物, 其性 溫補足敵人 參, 故名, 海參。 共有刺者名 刺參, 無刺 者, 名光參
------	--------------	---	--	--	---	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
				Histidine... ... 1.7 % Lysin 3.83 % Tryptophan... ... 0.9 % Tyrosine... ... 4.36 % (上海食物)			
1073	燕 窩 (拾遺10) 別名： 燕 菜	Collocia brevirostris L.		營養成分： Protein 49.83 % Ch'yd 30.55 % Ash 6.19 % (Ca 0.429 P ... 0.030 Fe 0.0049, K 0.040 %) 特殊成分： 蛋白質中之 主要成分如 次： Arginine... ... 2.7 % Cystine 2.4 % Histidine... ... 2.7 % Tryptophan... ... 1.4 % Tyrosine 5.6 %	燕窩為調理虛損勞之高貴食品，能養肺陰化痰止咳，療小兒痘疹。	燕窩出福建漳州、泉州、廣東崖州沿海處及南洋羣島。	燕窩，係燕取小魚，黏之於石上，久而成窩者，有紅黑白三種，紅色最難得，白色名官燕，均上品，黑者名毛燕，品較次。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1074	魚翅 (拾遺10) 別名： 沙翅片	Selachidei et Batoidei (拉丁) Shark's fin, dried (英)		Protein 83.53% Fat 0.28% Cbhyd 0.20% Ash 2.24% (Ca 0.146 P.... 0.194 Fe 0.015% K.... 0.177)	1) 爲宴會餽饋 所必需之珍 貴菜蔬。 2) 補五臟，長 體力，消魚 積，解蟲毒 ，益氣開膈 ，清痰健胃 。		本品係沙魚 腹下之翅， 普通以三片 爲對，蓋脊 翅一划水翅 二也。

第三編 鑛物性藥品

MEDICAMENTA MINERALES

第一 元素類 ELEMENTE

號碼	中名	拉丁名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1075	硫 黃 (本草11)	硫黃 (Sulphur 拉丁, 英 Schwefel 德) 產於火 山及溫泉地 方, 意大利 西西利島產 量最富。		天然產者, 除含單體元 素硫黃 S 外 , 夾雜砷, 鐵, 石灰, 粘土等。	1) 治療疾, 一次服 0.5—2gm 2) 外用, 治疥 癬, 禿頭病 , 陰部癩爛 及潰瘍等。	山西、四川、 湖南、廣東、 江蘇、台灣、 日本、意大利 西西利島。	硫黃本草中 有 a 至 e 各 種名稱, 現 今藥用品, 有至 g 各名 稱。
a.	石 硫 黃 (本草11)	本品秉純陽 火石之精氣 而結成, 性 質通硫色賦 中黃故名 (時 珍)。			治禿頭, 殺蟲 疥及鼻惡瘡。	山西、江蘇、 湖南、四川、 雲南。	
b.	石 硫 赤 (本草11)	此即硫黃之 多赤者, 一 名石亭脂, 生羌道山谷 。			壯陽, 治瘡殺 蟲。	四川, 甘肅。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
c.	石 硫 青 (本草11)	此係硫黃之 多青色者， 生武都山谷 。			同 上	四川綿竹(古 武都)。	
d.	天 生 硫 (拾遺2)	係硫黃泉附 近之岩石所 結成垂乳狀 者。			為強壯劑，又 治癰症，殺蟲 ，治瘡，止瀉 痢。	雲南昆明。	
e.	倭 硫 黃 (拾遺2)	本品以出日 本者為佳， 故有此名。			同 上	琉球，日本， 呂宋 (Luzon 菲律賓北部) 。	
f.	昇華硫黃	Sulphur Sublimatum.			為各種硫黃製 品之原料。		本品由粗製 硫黃昇華而 成。
g.	精製硫黃	Sulphur deparatum			1) 內用，為緩 下劑及發汗 藥。 2) 外用，治皮 膚病。		本品以昇華 硫黃為原料 ，與氨水作 用，除去所 夾雜之硫酸 硫化砷等， 成純粹之硫 。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
h.	沈降硫黃	Sulphur praecipit- um			1) 內用，為緩 下劑。 2) 外用，為軟 膏劑。		本品以精製 硫黃與煨製 石灰作用， 成多硫化物 ，以鹽酸分 解之即得。
1076	鉛 (本草 8) 別名：青金，黑錫，水中金。	鉛(Plumb- um) 含方鉛 礦(PbS) 白 鉛礦(Pb CO ₃) 赤鉛 礦(Pb Cr O ₄) 綠鉛礦 【Pb ₃ (PO ₄) ₂ 】 等礦石中。		為單體之鉛 Pb	1) 消瘰癧腫 ，殺蟲，烏 鬚髮。 2) 為鉛鹽之製 造原料。 3) 為工藝品之 材料。	產於雲南，湖 南之水口，浙 江之永嘉，湯 溪，福建之閩 侯，四川。 廣東之蕉嶺及 瑞士，北美洲 ，日本等地。	
1077	錫 (本草 8) 別名：白鐵，鉛，賀。	Stannum 由天然產生 之錫石中提 取之。		為單體之錫 Sn	1) 錫置空氣中 水中不鏽， 用以塗銅鐵 器，并作器 具及馬口鐵 等。 2 為錫化物原 料。 3) 治惡毒風 疔。	雲南，廣西賀 縣(古臨賀) ，湖南衡陽， 桂陽，江蘇無 錫。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1078	自然銅 (本草8) 別名： 石鐵鉛	Native copper (英)		二硫化鐵 $Fe S_2$	爲接骨劑。	廣東開平百定山，雲南東川及各銅坑中。	本品色青黃如銅，不從礦煉而成，故名。
1079	金 (本草8) 別名： 黃牙， 太真。	黃金(Gold) 爲單體元素，成爲砂金，或爲粉金，混入河底之砂礫中。又與他金屬抱合，夾雜於石英、綠岩石、片麻岩等岩石中。		爲單體之金 Aurum, Au.	1) 爲貨幣及裝飾品用。 2) 爲金箔金粉水金化學的金製品之原料。 3) 金粉爲丸衣用。 4) 鍍金用。	黑龍江，吉林，遼寧，熱河，新誠，甘肅，蒙古，河北，山東，四川及俄國烏拉山，東印度，墨西哥，美國，巴西，澳洲，紐西蘭，日本。	金古有直接爲治病之用，現今則變爲下列各化合物後用之。
a.	可溶性金 別名： 膠狀金	Aurum colloidale			治微毒、腺病，癌腫等， 一次用 0.03-0.66gm		
b.	氯化金鈉	Auro natrium chloratum		$Au Cl_3 \cdot N Cl \cdot 2H_2O$	1) 治脊髓勞、癱瘓、微毒、痙攣性脊麻痺等，一次用0.005—0.01或0.03gm。(一次極量0.03一日極量0.2gm，爲水劑或丸劑(夾白陶土)等，內服，但現今不常用。 2) 爲試藥用。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
c.	氯化金	Aurum chloratum		$Au Cl_3$	爲惡性及微毒 性新生物之腐 蝕藥。		
d.	氯化金鉀	Auro Kalium Cyanatum		$2KAuCN_4$ $\cdot 3H_2O$	1) 因防腐力強 ，治瘰癧， 用靜脈注射 (一次用) 0.0 3 - 0.05 gm ，因奏效不 確實，有副 作用，應用 者不多。 2) 爲試藥用。		
1030	銀 (本草 8) 別名： 白金， 鐻， 鑿。	銀 (Silver Silber) 純 銀產者甚稀 ，多成硫化 銀，氯化銀 ，鏷化銀等 ，存於斑岩 片麻岩中。		單體之銀 Argentum Ag.	1) 銀粉爲丸衣 用。 2) 爲銀鹽之製 造原料。 3) 爲貨幣及美 術工藝品之 材料。	熱河、察哈爾 、遼陽、鐵嶺 、河南、福建 、廣東、廣西 、貴州、及蘇 聯烏拉山、墨 西哥、祕魯、 智利、德國之 Freiberg, Schneeberg, 日本之但馬、 岩代、石見等 處。	爾雅白金謂 之銀，說文 云，鑿白金 也。 梵書謂之阿 路巴。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
a.	膠 狀 銀 膠 質 銀， 可 溶 性 銀	Argentum colloidale			1) 爲制腐劑及 殺菌藥用 0.01—1% 溶液爲創傷 面洗滌劑。 2) 克來台氏 (Crede 軟膏 含本品10% 。		
b.	蛋 白 銀	Argentum protinum (Protargolum)			爲殺菌劑，其 0.25%溶液， 用於點眼， 0.25—2% 溶 液，治急性淋 病，5—10% 溶液，治婦人 尿道炎。		
c.	硝 酸 銀 (熔製硝 酸銀)。	Argentum nitricum 結晶硝酸銀 ，添硝酸少 許熔融之， 傾入鑄型中 凝固之，名 爲熔製硝酸 銀。			1) 外用，爲腐 蝕及收斂藥 。 2) 製熔製硝酸 銀及硝酸鉀 銀用。 3) 爲照相術所 賞用。 4) 爲試藥用。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
d.	硝酸鉀銀 別名： 硝酸銀棒	Argentum nitricum cum kalio Nitrico (拉丁)			在眼科上為腐蝕藥。		
e.	亞耳敢近	Alb rgin		係硝酸銀及膠蛋白所成之有機化合物。	1) 供牙科止痛用，一小塊嵌齲孔中。 2) 用 0.15% 液灌腸，治赤痢或急性腸炎。 3) 治淋症，用 0.1—0.2% 液注入。 4) 預防白濁，用 5% 溶液。		
1081	水 銀 (本草 9) 別名： 汞， 靈 液。	水銀 【 Mercury (英) Quicks lber (德) Hydrargy- rum (拉丁)】 少量成滴狀，散於岩石之間，多與硫黃化合物成辰砂而產出。		單體之水銀 Hg	1) 治梅毒用。 2) 治頭虱、衣虱、陰虱等。 3) 為汞化合物之原料。 4) 工業上用途甚廣。	湖南長沙，貴州石阡、遵義、思南、都勻、四川、廣東、廣西及奧國、西班牙、意大利、英國、秘魯、墨西哥、日本之德島等地。	

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1082	鐵 (本草8) 別名： 黑 金， 烏 金。	【 Ferrum iron, (英) Eisen (德)】 含於磁鐵礦、 樹鐵礦、 赤鐵礦等石 中。		鐵依熔融與 鍛煉之狀態 ，有生鐵(鐵 鑄鐵)熱鐵 (鍛鐵)鋼 鐵三種之分 別；鐵上所 生之銹名爲 鐵銹，或鐵 衣，煅鐵時 在砧上打落 之層，名爲 鐵落，此時 如塵飛散者 ，名爲鐵屑 ，又以鐵置 於器中，以 水久浸，所 得之液，名 爲鐵漿。			
1083	鐵 華 粉 (本草8) 別名： 鐵 粉， 鐵 霜。	Ferrum pulveratum (拉丁名) Iron Powder (英名) (鐵粉)		鐵華粉即鐵 粉，古法取 鐵成葉，先 以鹽水浸， 曬乾，置醋 缸中，埋陰 處一百日， 取所生之銹 用之。現今 用法：取純 鐵錢以白 砂磨之，搗 去銹後，搗 成一束，以 鐵作粉層 ，再於鐵臼 中搗成細末 ，以篩篩過 即得。	此鐵粉含純鐵 98%，內服， 治貧血， 一次用 0.1—0.2gm。		

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效	用	產地	備考		
1081	石炭	石炭		石炭除含純1) 粹之炭外，混夾硫黃等雜質。	治諸瘡毒及金瘡出血。	2) 為燃料用。	3) 其乾餾所得之煤膏，為製造藥品、色素、香料之重要原料。	4) 乾餾時所得之煤氣，為燃料用。	山西大同、晉城、陝西延長、榆林、河南焦作、安陽、河北開梁、井陘、山東濰縣、泰安、遼寧撫順、本溪湖、江西萍鄉、湖北大冶、貴州安順、浙江長興。	本品色焦如炭故名。普通稱煤，專指黑煤而言。
1085	金鋼石	Diamond		炭 C	1) 為裝飾品，作釵釵服佩。	2) 鑽玉，彫刻玻璃及水晶瓷器。	3) 磨水塗湯火傷。	東印度，婆羅州，烏拉山，好望角，西巴補瓷，美國加利福尼亞州。	本品之砂，可以鑽玉，補瓷，故名。	
	(本草9)	(Mineral Coal)	係							
	煤	炭	太古時代，							
	鐵	炭	植物經地球							
	烏	金石	之變動，埋							
	焦	石	入土中，遠							
			歷年月，次							
			第變化而成							
			，有無烟煤							
			、黑煤、褐							
			炭，泥炭之							
			別。							

第二 氧化物 OXYDE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1086	代 赭 石 (本草10) 別名： 土 朱， 赭 石。	爲赤鐵鑛 (Rotheisen- glanz) 之變種。		由赤鐵礦 Fe_2O_3 與粘 土而成。	1) 治出血症 (吐血、衄血、腸出血、子宮出血、內傷)，產後遲滯、驚風、陰萎、狐憑等，每次服 2-5gm 2) 在工業上爲鑲鍍及白銅器之研磨用，因本礦粉末質細，不使器物生疵也。		
1087	磁 石 (本草10) 別名： 慈 石， 吸鐵石。	採取磁鐵鑛 (Magnetis- stein) 而成。		高氧化鐵 31% 與低氧 化鐵69%之 化合物 $Fe_3O_4 = Fe_2O_3 + FeO$ 含27.6%之 氧72.4%之 鐵。	治關節痛風之 疼痛及癱瘓， 每次服粉末 0.3-1gm。 又以水或酒浸 數日，服其浸 液亦可。		慈石取鐵如 慈母招子， 故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1083	鉛 丹 (本草8) 別名：鉛施高熱製黃丹，朱。	Minium (拉丁，英) 鉛施高熱製之。		爲氧化鉛與過氧化鉛之化合物。 $2PbO + PbO_2 = Pb_3O_4$	1) 工業上製造玻璃及顏料用。 2) 在醫藥上製造鉛丹硬膏用。 3) 外用，治結膜炎，腋臭及切傷等。	產鉛諸地，均有產出。	
1089	密陀僧 (本草8) 別名：沒多僧，爐底。	Lithargyrum. 由方鉛礦提取銀後之副產物。		氧化鉛 PbO	1) 在藥用上爲鉛醋及單軟膏之原料。 2) 在工業上爲顏料用。		
1090	無名異 (本草9) 別名：黑石子，土子。	爲不純之軟錳礦 (Pyrolusite)		主成分 二氧化錳 MnO_2 並雜鐵質。	1) 內用，治皮下溢血之疼痛(由撲打傷起)及骨折。 服1-3gm 2) 外用，治切傷、腫毒、癰疽。	阿剌伯(古食國)廣西宜山(古宜州)、桂林、廣東番禺(廣州)、四川、陝西	無名異，庚詞也。

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1091	砒 石 別名： 信 石， 人 言， 砒 霜， 砒 石。	昔時採白砒石 Native arsenic) 或砒霜(即不純之無水亞砒酸)供藥用，現今應用純粹之無水亞砒酸。		砒石之成分 為砒 As 砒霜為無水亞砒酸 As ₂ O ₃	1)內治貧血、萎黃、惡性瘧疾及皮膚病，服亞砒酸 0.005gm。 2)又治瘡腫、狼瘡，並破壞骨髓用。 3)製砒酸及玻璃脫色用。 4)為還元劑用。	原出江西上饒(古信州)。	砒性猛如貔，故名。因出信州，稱為信石。又隱信字為人言。
1092	禹 餘 糧 (本草10) 別名： 太乙餘糧	Clay iron stone (英) (泥鐵礦之球粒)。		外殼為褐鐵礦 (Limonite H ₂ Fe ₄ O ₉) 由氧化鐵粉塊和粘土等而成。	1)為止瀉藥，治腸炎及赤痢。 2)為止血藥，治子宮出血。 每次用 7—10gm 3)外用，為撒布劑，治潰瘍。	浙江紹興會稽山。	相傳夏禹，在會稽山分糧食，其剩餘者，乃化此物云。(本草)

第三 硫化物 SULPHIDES

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1093	雄 黃 (本草9) 石 黃 重 黃 黃金石。	天然之雄黃 (Realgar) ，爲鷄冠石 與銀神鉛等 礦石共同產 出，又伴粘 土石膏等產 生。		二硫化砷 As_2S_3 或 As_2S_2	1) 療疥癬、惡 瘡。 2) 爲毒蛇、毒 虫整傷之解 毒藥。 3) 工業上爲燐 火及顏料用 。	雄黃生甘肅武 都山谷燉煌山 之陽；湖南零 陵津市；石黃 出四川慶符(古 石門)。雲 南，暹羅。	本品生山之 陽，是丹之 雄，故名。 本品以蘇片 (紅熟爲良。)
1094	雌 黃 (本草9) 別名： 黃 砒， 峴崙黃。	天然之雌黃 (Auripig- ment; Orpiment) 伴鷄冠石， 產於粘土質 地段及火山 之噴火口近 旁。		三硫化砷 As_2S_3	治微毒性發疹 、瘰癧、癩病 、白癬、頭部 溼疹、毒蛇咬 傷，並防止眉 毛之脫落，以 本品貼上或拿 擦之。	與雄黃同。 各國均有出。	本品生山之 陰，故名。 本品以黃亮 者爲佳。
1095	辰 砂 (本草9) 別名： 硃 砂， 丹 砂。	Cinnabar 辰砂爲天然 之赤色硫化 汞，存於真 岩、粘板岩 之礦脈中。		赤色硫化汞 HgS	1) 爲鎮墜藥， 凡患眼球充 血(因血行 障礙而逆上) ，夜中惡 夢恐怖者， 每一次服 0.5-1.5g 。 2) 爲丸衣用。	湖南沅陵(古 辰州)，四川 涪陵(古涪州)，遼寧錦縣 ，貴州銅仁， 漢口，雲南。	因出辰州， 故名辰砂。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
109	銀朱 (本草9) 別名：猩紅，紫粉霜。	Cinnabar (vermilion)		赤色硫化汞 HgS	1) 在製劑上，為丸衣用。 2) 在工業上為紅色原料。 3) 治疥癬、丹毒及虱之驅除用。		本品係用水銀煉成紅色，故名。
1097	礬石 (本草10) 別名：太白石，鼠鄉。	礬石 (Miespickel) arsenik- kies)		硫砷化鐵 FeAsS 或 FeAs ₂ + FeS ₂ 含砷 34.0% 硫 20.0% 鐵 4.6%	1) 內服，使瘧疾之發作頓挫。 2) 外用，使瘰癧潰散。 3) 殺鼠及蟲類。	陝西南鄭(古礬中)，江蘇銅山(古彭城)，江西南康，山東壽陽(古汶陽)，湖南零陵。	(許氏說文)

第四 氯化物 CHLORATE

1098	食鹽 (本草11)	Natrium chloratum, Chlornatrium, Sodium chloride)		氯化鈉 NaCl	1) 為重要營養品。 2) 以1-2%溶液，為吸入劑，治氣管支炎。 3) 為食品之鹽漬及農工業之重要原料。	海鹽產於遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東七省。 池鹽產於山西、陝西、甘肅、寧夏一帶。 井鹽產於四川(以自流井為最富)。	
		天然含於海水、池水、井水及泉水中。					

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1099	戎 鹽 (本草11) 別名： 光明鹽， 胡 鹽， 羌 鹽， 石 鹽， 巖 鹽， 水晶鹽。	本品成爲岩 鹽或山鹽， 天然產出， 德國施太史 夫特(Stass- furt)產者 ，質純可供 藥用，其他 產品，非精 製後不能應 用。		不純產品， 除含大量之 NaCl 外， 夾雜 KCl MgCl ₂ ， CaCl ₂ ， MgSO ₄ ， CaSO ₄ ， Fe 等。	爲緩和藥，治 頭痛及炎性， 眼疾之疼痛。	甘肅、寧夏、 新疆、內蒙古、 波蘭、德國、 法國、英國、 瑞典、西班 牙。	前人以爲西 番所食之鹽 ，故稱戎鹽 。
1100	礪 砂 (本草11) 別名： 礪 砂， 狄 鹽， 北庭砂。	礪砂 (Salmiak) 之天然品， 產於噴火山 之近旁及石 鹽石炭中， 並含於海水 及動物體中 ，人工品以 鹽酸與氨水 或鐵鹽與石 灰作用而成 。		氯化銨 NH ₄ Cl	1)在醫療上， 爲祛痰劑， 罌包劑及銨 鹽之製造原 料。 2)工業上，爲 起寒劑、鍍 金及電池製 造用。	陝西、甘肅、 新疆、廣東新 安平海。	本品性毒， 服之令人礪 亂，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1101	輕 粉 (本草9) 別名： 水銀粉， 峭 粉， 膩 粉。	有天然產者 (Hornque- cksilver Hg ₂ Cl ₂)， 內有人工製 者，見甘汞 條。		一氯化汞 Hg ₂ Cl ₂	與甘汞同。		輕言其質， 峭言其狀， 膩言其性， 昔蕭史與秦 穆公鍊飛雲 丹第一轉， 乃輕粉，即 此。
a.	甘 汞	Hg lragv- rum Chloratum Mite (Calomel)		(I)昇華製 法：以昇汞 與汞密研昇 華即成。 (II)溼道製 甘汞：以食 鹽溶液與硝 酸亞汞作用 而成。 (III)蒸氣 製甘汞：熱 灼尋常甘汞 導其蒸氣於 濃縮器，與 水蒸氣接觸 濃縮之即成 。	1)為最有效之 瀉劑， 一次用 0.2—1gm 2)為利尿劑， 一日三次， 每次用 2gm 3)為微毒劑， 一日數次， 每次用 0.001—0.1 gm。		甘汞因製法 不同，外觀 與生理作用 亦異，於顯 微鏡下檢之 ，溼道製品 最細，昇華 製品最大， 生理作用溼 道製品最強 ，惟化學的 集成，則毫 無差異。

第五 矽酸鹽 SILIKATE

號碼	中 名	拉丁名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1102	雲 母 (本草8)	雲母 (Mica)		含矽酸 45% 礬土 39% 鉀 12% 水 4% 現綠色彩者，因含有氧化錳之故。 曰雲母： $H_2KAl_3 \cdot SiO_4)_3$	1) 治慢性腸炎，小兒下痢，猩紅熱，淋病，婦人帶下等，每次服粉末 3-10gm。 2) 外用，為撒布劑，治切傷、火傷、溼疹等糜爛症。	雲南、湖南華容。	雲母以五色立名。
1103	白 石 英 (本草8)	Quartz (英) 白石英，為天然廣汎之礦物，凡普通之白砂皆屬之。		本品雖為純粹之矽酸，往往夾有氧化錳及礬土等，化學上氧化矽 SiO_2 之成分如次： O 53.33% Si 46.67%	1) 治糖尿病、陰痿、橫隔膜、壅攣、排尿困難等。 2) 為玻璃製造原料。	廣東北江，福建閩清，貴州安順。	英亦作瑛，玉光也，石英乃石之似玉而有光瑩者。
1104	紫 石 英 (本草8)	Amethyst (英，德)		石英帶有紫色者，因含有氧化錳之故。	內服，治小兒痿弱、橫隔膜、壅攣等。本草載婦人無子，服之即孕。	山東沂水大觀山，浙江諸暨，貴州安順。	凡入丸散火煨煉淬七次，碾末以水飛過日晒乾入藥。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1103	蒙 石 (本草10) 別名： 青蒙石	Micose schist of olue_olack Colour (英) 雲母之一			為消化藥。	蒙石江北諸山，往往有之，以肝山出者為佳，有青白二種，以青者為佳。	
1106	馬 腦 (本草8) 別名： 瑪 瑙， 文 石。	Agata (英)			去目之醫障(研為細末點之)，慰目赤爛。	新疆、寧夏、雲南、山東。	色綢紅文理交錯，似馬之腦，故名。 梵語摩羅迦隸。
1107	金 星 石 (本草10) 別名： 銀星石	Golden Coloured Mica (英) 雲母之一種。		$KH_2Al_3(SiO_4)_3$	去昏明目，解毒殺虫。	產於浙江樂清之金星溪，福建永春雙髻山，安徽歙縣之龍虎溪，新疆于闐諸地。	其石似鐵鑛而鬆，色如黃金。
1108	陽 起 石 (本草9) 別名： 羊起石， 石 生。	Actinolite or Tremolite (英) 透角閃石之一種。 (陽起石與滑石相混，產於石灰岩、蛇紋岩、綠泥片岩中)。		陽起石，含無水矽酸土，石灰鐵等，其集成式如下： $CaSiO_3$ $MgSiO_3$ 或 $Ca(MgFe)(SiO_4)_3$	1) 為強精藥，治陽痿不起。 2) 治月經變調，子宮內經血蓄積帶下等，煨為粉末服 3-7gm。	山東臨沂(古沂州)，歷城(古齊州)，鄒鄒，四川廣漢(古益州)山西，雲南大關。	因有起陽之性，故名。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1109	浮石 (本草9) 別名：輕石，海浮石，水花。	Lapis Pumicis (拉丁) Pumice (英)		本品由正長石而成，含矽酸60—80%。並夾雜土，石灰，鉀，鈉，鎂，錳，鐵等，往往有微量之氯化物及痕跡之鈉鹽。	治糖尿病(煩渴)，氣管支炎(咳嗽)，肢麻，膀胱，結石(排尿困難)，脫腸，糜癩，下疳，瘍疔等，為散劑服 2—8gm。	廣東新安北海	本品富氣孔性成，海綿狀能浮游於水面，故名。
1110	滑石 (本草9) 別名：畫石，番石。	Talcum (拉丁) Talc (英) Talk (德)		本品主由矽酸鎂 $3\text{MgSiO}_3 + \text{H}_2\text{SiO}_3$ (氧化鎂64% 矽酸32%)而成，並夾粘土石灰及鐵等。	1)為撒布劑，使皮膚滑澤易乾燥。 2)為丸劑之衣及錠劑之滑澤劑。 3)為利尿劑 2—6gm。	福建泰寧，廣東，雲南，四川。	本品性滑利，質滑膩，故名。滑石由蛇紋石、輝石等苦土礦分解而成。
1111	石脂 (本草9) 別名：陶土，高嶺土。	Bolus (拉丁) Kaolin (英) Ton (德)		陶土主由矽酸鋁 $\text{Al}_2(\text{HSiO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 而成，含氧化矽46.4% 鋁39.7% 水分13.9% 不純品夾碳酸鎂碳酸鈣，砂石等。	1)為吸着劑，解昇汞磷及毒菌等之毒，並治急性胃腸炎，腸傷寒，霍亂等。 2)為包攝藥，治胃腸出血及胃潰瘍。 3)為撒布劑。 4)為丸劑之賦形藥。	福建永春、德化、連城，山東，河南，陝西。	石脂有五色石脂及赤石脂、白石脂等，藥典採用精製之白石脂，即白陶土。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1112	伏 龍 肝 (本草7) 別名： 灶心上	Earth in the hearth (英)		主由矽酸， 氧化鋁氧化 鐵而成，夾 雜驗類及上 類。	有制止妊娠嘔 吐之效。 劑量一次用 8—10 gm。		本品係灶中 釜月下之黃 土，以灶有 神，故名伏 龍，伏龍者 灶神也。

第六 硼酸鹽 BORATE

1113	蓬 砂蓬砂 (本草11) 別名： 硼 砂， 盆 砂。	天然產於礦 石或湖水中		焦性硼酸鈉1) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	1) 分析化學上 ，為硼砂身 用。 2) 為收斂劑， 用於口內炎 、齒齦炎、 咽喉炎(喉 頭腫痛)等 。	四川，西藏， 印度，波斯， 意大利，德國 ，美國加洲。	陳出盆中結 成，謂之盆 砂，如盆消 之義也。
------	--	----------------	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------

第七 硫酸鹽 SULPHATE

1114	石 膏 (本草9) 別名： 細理石， 玉火石。	石膏 Gypsum 在於岩層中 ，亦有存於 火山之噴火 口及溫泉中 ，有玻璃石 膏雪花石膏 ，纖維石膏 等種別。		石膏有軟硬 二種，軟者 為含水硫酸 鈣 (CaSO_4 $2\text{H}_2\text{O}$)，硬 者為無水硫 酸鈣 (Ca SO_4)。	為清涼解熱 藥，對感冒及熱 性傳染病之發 熱時用 2— 6—10 gm，為 煎劑服之，有 止渴之效，又 為繃帶之固定 及美術模型製 粉之原料用。	原產於湖北應 城，今各地均 有。	本品煨研醋 調固密，甚 於脂膏，蓋 兼質與能而 立名也。
------	-------------------------------------	---	--	--	---	------------------------	--

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1115	明 礬 (本草11) 別名：山明礬石及礬石	明礬 Alumen 由明礬石及冰石製之。		硫酸鉀鋁 $Al_2K_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$	1) 為收斂劑，治齒齦出血、鼻痔、口腔潰瘍、鵝口瘡、腋臭等。 2) 在工業上，為媒染劑用。	湖北礬山，安徽廬江，浙江平陽，福建福鼎。及意大利來伯里(Neapel) 西西利(Sicilien)	礬者燔也，本品燔石而成，且色白光明，故名。
a.	鐵 明 礬	Alumen Ammonical Iron Alum		$(NH_4)_2SO_4$ $Fe_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	1) 為收斂劑用。 2) 在容量分析化學上為標示藥用。		
b.	銻 明 礬	Alumen Chroni Cum Chromium Alum		K_2SO_4 $Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	1) 為媒染劑用。 2) 為標示藥用。		
1116	綠 礬 (本草11) 別名：皂礬、青礬、綠礬、硫酸鐵	天然產之綠礬 (Green Vitriol) (英) 由硫化鐵礦之氣化而成，夾雜錳、鐵，共存於鐵礦中。		主成分為硫酸低鐵 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$	1) 治胃腸出血及萎黃病，一次用 0.15-0.25 gm。 2) 外用，燒灼成綠礬後，治結膜炎、白癬、膿疱疹、腋臭等。	甘肅安西(古瓜州)，新疆吐魯番(古沙州)，陝西西安，安徽銅陵，河南沁陽(古河內)。	本品可染綠色，故又名綠礬。 本品煨過變赤，稱為綠礬。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1117	膽礬 別名：石膽、銅勳、硫酸銅。	天然產之膽礬 (Chalcanthit) 由黃銅礦 (即硫化銅) 分解而成。		硫酸銅 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	1) 為點眼藥，治結膜炎。 2) 為催吐劑。 3) 本品熾灼後，治咽喉炎、扁桃腺炎、下疳、腋臭、帶下及狂犬咬傷等。	甘肅天水 (古秦州)，山西永濟 (古蒲州)，江西上饒，廣東曲江。	膽以色味命名，因其似礬，故稱為膽礬。
1118	皓礬 別名：硫酸鋅	天然產硫酸鋅之結晶，發現於鋅閃礬中。		硫酸鋅 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	1) 內用，為催吐劑，一次服 0.3—1 gm 2) 為收斂劑，供點眼尿道及腔之洗滌用。		
1119	凝水石 (本草11) 別名：水寒石、瀉利鹽。	Double Salt Magnesium Sulphate And Potasium Sulphate (英)		硫酸鎂硫酸鉀之複鹽。	1) 為瀉藥及利尿解熱藥。一次服 10—15 gm 2) 治慢性胃炎及水腫。一次服 1—2 gm	凡鹵地精鹽之下，恆有生焉。	本品折片投水水能凝動，故名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1120	朴 消 (本草11) 別名： 芒 硝， 消石朴， 皮 消， 鹽 消， 英 消。	Natrium Sulfuricum (拉丁) Sodium Sulphate (英) Grauber Salz (德)		芒硝(含水 硫酸鈉) Mirabilit Na ₂ SO ₄ · 10H ₂ O 燒芒硝爲無 水硫酸鈉。 Thenardit Na ₂ SO ₄	1) 爲緩下藥， 治便秘用 10—15gm 單味或加荷 香酒服之。 2) 慢性胃病及 熱性病用， 2—5gm 配大黃服之。 3) 外用，爲嗽 口或洗眼用。	芒硝含於礦石 或海水及鹽泉 礦泉所溶存之 ，以產天津者 爲佳，山東威 海衛者次之。	消是本體之 名，乃堅白 之號。朴者 ，未化之義 也，以其芒 消，英消， 皆從此出， 故曰消石朴 也，又朴消 中揀出形似 麥芒，號曰 芒消。
1121	玄 精 石 (本草11) 別名： 玄 英 石	Sublimate Hydrous Sodium Sulphate (英)		含水硫酸鈉 之昇華物。	治傷寒，除風 溼，益精氣。	山西永濟(古 蒲州)解縣， 陝西，四川， 雲南。	玄精是鹹鹼 津液，流滲 入土中，年 久結成石片 。

第八 硝酸鹽 NITRATE

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1122	消 石 (本草11) 別名： 硝 石， 硝 火， 硝 焰， 硝 苦， 地 霜。	消石有二種，本草所載之消石，為硝酸鉀，又稱智利硝，產於南美洲智利，為硝酸鈉之產地，其結晶於地露，取其水浸出，蒸發析出結晶。		硝酸鉀 KN ₃	1) 在醫藥上，為利尿劑及硝酸銀棒、硝石紙等用。 2) 在工業上，為火藥原料。 3) 在化學上，為氧化劑用。 4) 有防腐作用，供貯藏火腿香腸等肉製品之用。	出山谷川澤及諸國地，東印度等熱帶地方產量最佳。吾國原產於四川、甘肅、新疆、河北等省。	本品力能消化諸石，故名。

第九 碳酸鹽 CARBONATE

1123	白 堊 (本草7) 別名： 白善土， 白粉土， 畫 粉。	白堊 (Kreide)，係前世紀所繁殖有孔虫類 (Foramini-fera) 之死殼而成，往往構成廣厚地層而發現者。		主由無晶形碳酸鈣而成，夾少許之礬土、矽酸鋁、碳酸鎂、碳酸鈣、磷酸鈣、有機質及痕跡之氧化鐵。	1) 內服，治吐血、子宮出血、腸炎等。 劑量 一次服 5-10 gm。 2) 外用，治陰門炎、膿瘡、疹等。	原出河北邯鄲，今處處有之。以黃為正色，則白者為惡色，故名。後人諱之，稱為白善。	
------	---	---	--	---	---	---	--

號碼	中 名	拉丁名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1124	粉 鉛 本草8) 別名： 解錫， 白粉， 水粉， 官粉。	Plumbum Carbonic_ um (拉丁) Lead Carbonate (英)		鹽基性碳酸鉛。 $2\text{Pb}(\text{CO}_3)$ $\cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$	1) 香妝上爲白粉用。 2) 工業上，爲白色顏料用。 3) 爲軟膏，硬膏及撒布劑用。 4) 治腋臭，溼疹，膿痂疹，火傷等。	廣東惠州，江蘇蘇州，雲南昆明，蘇聯西伯利亞，日本京都大阪。	製法有中國古法及英、法、德國、荷蘭各法，均以鉛與醋酸及碳酸氣接觸，生成鹽基性碳酸鉛。
1125	石 鐘 乳 (本草9) 別名： 鐘乳石。	Stolactite (英)		爲石灰石之一種，主成分爲碳酸鈣。 CaCO_3	爲催乳劑，又治喘息，腸炎等。 每次服粉末 3—7gm	生於山間之洞穴內。	石之津氣鍾聚成乳，滴溜成石，故名(李時珍)。
1126	爐 甘 石 (本草9) 別名： 爐先生	爐甘石 (Zinkspath) (爲菱錳礦) (碳酸錳) 與白雲石(碳酸鈣) 苦土之混合物。		主由碳酸錳而成，夾有碳酸鐵、苦土、鉛、石灰等，含52%之Zn。	1) 爲眼藥用，治眼險絲、結膜炎等，對白斑翳，有特效。 2) 止血，消腫，治下疳及陰瘡。	四川，湖南，山西，雲南，河北。	爐火所重，其味甘，故名。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1127	方解石 (本草9)	石方解石 (Kalkspath)		主成分爲碳酸鈣，夾雜少許之氧化鐵，苦土，及礬土。	1) 治慢性胃炎及黃疸，每次服粉末 3—5gm。 2) 去蟲毒。	江西萍鄉，安徽貴池，浙江杭縣，四川灌縣，其有名產地爲英國冰島(Iceland) 及日本遠江美濃。	敲破塊塊如方解，故以爲名。
1128	石 灰 (本草9) 別名： 石 璽， 鍛 石。	煨製石灰 Calcaria usta		煨製石灰(氧化鈣) CaO 消石灰即氫氧化鈣 Ca(OH) ₂	1) 內用，治吐血、下痢、瘧疾等。每次用 0.2—2gm, 爲丸劑服之。 2) 外用，治丹毒、雀斑、疥癬、皮膚發疹、疣贅等，爲腐蝕藥。 3) 在工業及化學上，用途甚廣。	處處有之。	石灰石封窖中，經焚燒而製成之灰質，故名。 石灰生成石灰石，普遍擴布於地面。 石灰有煨製石灰(燃燒石灰石而成)，消石灰(煨製石灰吸水而成)等名稱。

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效用	產地	備考
1129	綠青 本草10)	Grünspan (德)		主由鹽基性 碳酸銅 $\text{CuCO}_3 + \text{Cu}(\text{OH})_2$ 而成，夾少 許之氧化鋁 、氧化鐵、 氧化銅、矽 酸及砷等。	1) 治風痰迷悶。 2) 治腋下狐臭。 3) 供畫家畫綠色用。	四川廣漢(益州)，廣東曲江(韶州)，廣西右江及歐洲烏拉山(有多量出產)。	本品之色綠青，故名。 按本草所載扁青，層青，碧青，白青，空青，均為類似之物。

第十 有機物 ORGANIC SUBSTANCE

1130	石腦油 (本草9)	石油 Petroleum (拉丁, 英) Steinöl (德)		不純品，除含炭化氫外，混夾氣、硫、氧少許。純石油之成分，依產地稍有不同，美國產者，由脂肪族飽和炭化氫 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ 、壬烷、癸烷而成，並含少許之芳香族炭化氫；蘇聯產石油，由脂肪族未飽和炭化氫及芳香族炭化氫而成。	1) 民間以純品3—10滴，為膠囊劑，作驅蟲藥；又為神經痛、凍瘡、皮膚病等塗擦劑用。 2) 治疥癬毛虱。 3) 為點燈用，加熱用，殺蟲用，植物成分提煉及其他石油製品之製造用。	山西長治(舊潞安府)陝西府施(舊延安府)延長(古玉門酒泉)甘肅州)四川重慶(古綦州府)，廣東南雄，雲南，台灣及緬甸，蘇聯之裏海沿岸，美國，日本，北海道，信濃，越後，遠江，羽後等處。	由地中天然噴出，或貯於地殼之空洞中，依採集之法，初由地中所得之粗製石油，混夾氣體炭化氫及低溫沸騰之炭化氫，易點火，為危險品，應由剴溫蒸餾，取15—300°C所得部分，可供點燈之用。
------	--------------	--	--	--	---	--	--

第十一 雜 類 MISCELLANEA

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1131	墨 (本草7) 別名： 烏 金， 陳 玄。	上墨以松烟 ，用膠皮汁 解膠和造。			1) 爲止血劑， 治吐血、血 尿、血痢、 腸出血、產 後血暈，以 墨溶於醋或 湯中服之。 每次用 4—8grn。 2) 飛絲或摩擦 入目，以墨 汁點滴之。	以北平南京， 徽州出者爲佳	墨，烟煤所 成土之類也 ，故從黑土 。
1132	百草霜 (本草7) 別名： 灶額墨， 灶突墨。	此爲灶額及 烟爐中墨烟 ，平時採野 外所生雜草 ，在灶中燃 燒，於灶額 結成烟煤， 此卽爲百草 霜。			1) 爲止血藥， 治衄血、吐 血、腸出血 、子宮出血 等。 2) 爲止瀉藥， 治單純性腸 炎及赤痢。 3) 使瘧疾之發 作頓判。 劑量一次 4—8 gm。 4) 外用，塗布 白癬頭部溼 疹等。		

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1133	釜 臍 墨 (本草7) 別名： 鍋底墨， 釜 煤。	釜或鍋底之 中心即臍附 近所附着之 墨。			1) 治吐血、咯 血、霍亂之 吐瀉及分娩 時，因羊水 早下，胎兒 難產時，為 內服藥。 劑量一次 4—8gm。 2) 外用，為撒 布劑，治切 傷及口腔之 潰瘍。		
1134	冬 灰 (本草7)	冬灰經三四 月方撤爐， 其灰全燥而 質益重。			1) 外用，治黑 色素斑、疣 贅、鼻痔等 。 2) 治犬咬，熱 灰敷之。		
1135	不 灰 木 (本草9) 別名： 石 綿	不灰木即石 綿 (Asbestos)			不灰木和玄精 石、炙甘草、 貝母、天南星 、白礬水、生 薑等，為複方 ，治肺熱咳嗽 等。	出山西上黨澤 州，潞州。	本品之色白 如爛木，燒 之不燃，故 名。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1136	石 鹼 (本草7) 別名： 灰 鹼， 肥 皂。	Sapones (拉丁) Soap (英) Seife (德) Savon (法)		為高級脂肪 酸及油酸之 鹼鹽。	1)內用，為制 酸劑，治消 化不良； 2)為祛痰劑， 治氣管支炎 。 3)外用，洗滌 皮膚之污垢 用。		狀如石類故 亦得驗名。 古代以灰汁 燃燒蓼科植 物所得之灰 ，以水浸出 之液，與小 麥粉密和， 為固塊形狀 ，如石之鹼 ，名為石鹼 ，現今以鈉 鹼液與豚脂 洋橄欖油等 ，鹼化而成 藥用石鹼。
1137	扁 青 (本草10) 別名： 石 青， 回 青， 大 青， 天 青。	Lapis lazuli			1)明目。 2)治折跌，癰 腫，金瘡。 3)畫家所用之 石青，即本 品也。	生西南山谷中	本草載，而 今貨石青者 ，有天青， 大青，西夷 回回青，佛 頭青，種種 不同，而回 青尤貴。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用部份	成 分	效 用	產 地	備 考
1138	花 乳 石 (本草11) 別名： 花蕊石				爲止血劑，金瘡出血，刮末敷之，即合，不作膿；又療婦人血量及一切失血傷損。	陝西	黃石中間，有淡白點，以此得花之名。

第十二 化石及結石 FOSSILIA ET CALCULUS

1139	龍 骨 (本草43)	爲古代(中世紀至洪積紀時代)象類動物柱牙象(Mastolon)之骨骼，埋沒土中化石者，往往從地下掘出，謂之龍骨。			<p>1) 爲鎮靜劑，治心悸動(山精神之激動所起者)，止惡夢，制虛汗(雖在冬季，用餐時，每易發汗)。</p> <p>2) 治下痢、遺精、子宮出血、帶下等。</p> <p>3) 爲強壯劑，有固精之效。</p> <p>劑量一次量 1—3gm (爲散劑)。</p>	四川成都，山東沂州，山西太原，岱州五台山，河北，蒙古。	<p>龍骨爲一種奇異藥品，茲錄神祕傳說於次：</p> <p>【傳說】據云，龍之形有九似，頭似駝，角似鬼，眼似鬼，耳似牛，項似蛇，腹似蟹，爪似鷹，掌似虎，生活時，其形不彰而能化，故死亦不能見。中藥之龍骨，多視爲猛獁或牙象之骨，然事實似包含種種動物化石。</p>
------	---------------	--	--	--	---	-----------------------------	---

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1140	牛 黃 (本草50) 別名： 正 寶， 西 黃。	爲牛膽囊或 消化器內所 生之凝結物 (即病的產 物結石而成)。			爲解熱鎮痙藥 ，治癲狂及小 兒之搖弱、夜 啼、牙關緊急 、破傷風、健 忘等。 一次服 0.2—0.5 gm ，又爲解毒藥 。		牛黃產我國 及印度，波 斯，以中國 產者爲上品 ，惟產量不 多，價值與 黃金相等， 波斯稱牛黃 爲配速阿石 (Pesoar)， 係有消毒之 意。
1141	馬 糞 石 爲馬 (本草50)(Equus 別名： 鮮 谷 L.) 之腸內 所生成之結 石。			成分尙未詳 ，大概由磷 ，酸鎂、碳酸 鈣、碳酸鎂 等無機成分 而成。	治小兒之驚 癇，或作解熱藥		本品爲貴重 藥之一，其 價值與牛黃 及狗寶(犬 體所得之結 石)相同。 西藏及蒙古 之喇嘛僧， 以此物爲祈 雨之用。

號碼	中 名	拉 丁 名	藥用 部 份	成 分	效 用	產 地	備 考
1142	石 燕 (本草10)	爲石燕屬 (Spirifer) 之一種貝類 化石。 Fossil of Spirifer Sp. (英名)			1) 療眼目醫障 。 2) 治難產及赤 白帶下。 3) 治小便淋痛 及傷寒尿瀉 。	湖南零陵，廣 西。	
1143	石 蟹 (本草10)	爲蟹(可推 測爲角目蟹 或扁沙蟹之 近緣種)之 化石。 Fossil of Carb. (英名)			1) 解一切藥毒 及蠱毒。 2) 催生落胎。 3) 敷瘡腫(醋 摩)解金石 毒(熱水磨 服)。	廣東崖州及南 海。	

補 遺

號碼	中名	拉丁名	藥用部份	成分	效 用	產 地	備 考
1144	苦參子 (拾遺) 原名： 鴉膽子 別名： 苦榛子	(備考續) 治痢，用鴉 膽子去殼， 搗去油一錢 ，文蛤醋炒 各三分，糊 丸，硃砂為 衣，或鴉膽 黃丹各一香 錢，亦可， 烏梅肉丸， 硃砂為衣， 二方俱丸， 豆大，粥皮 或鹽梅皮， 或桂圓肉， 或香蕉皮包 吞，約11— 12丸，立止 裏急復重。	子 仁	其仁多油而 氣味甚烈，引 入胃易致去 嘔，故皆去 油作霜，或 窶吞之。不 治久痢，易 愈者，用苦 參子，烏梅 ，柯子三分 ，等分研和 ，用蜂蜜捏 為丸， 每次用 1—2gm。	主治痢疾、痔 疾。凡痢之偏 於熱者，用之 有捷效，以治 下鮮血之痢、 瀉血水之痢， 則尤效。味極 苦，入胃易致 引嘔，應以膠 囊或桂圓肉盛 之吞服。 每次服五六十 粒，約 2gm 服二次即癒。	福建，廣東， 雲南諸省多有 之。	鴉膽為雜草 類之一種，梧 結子形如梧 子，又似益 智仁而小。 外殼蒼褐， 殼中有仁， 大如米粒， 肉白多油， 可供藥用。 參子僅見 於本草綱目 拾遺與綱目 苦參條中， 載甚合，可 參照本書16 5頁421號本 文。
1145	髮菜 (上食)	Rivularia Pisum, Ag. 屬髮藻科		Protein 20.3% Fet 0.33% Cbhyd 56.4% Ash 8%	供素菜原料。		
1146	葛仙米 (幾暇格 物編)	Nosto: Paludosum 屬念珠藻科		Protein 14.63% Fet 0.23% Cbhyd 51.16% Ash 15.16%	為菜食原料及 製點心用。		

國藥提要跋

這部國藥提要是禪定先生一生心血的結晶，作者以三十餘年的研究心得和教學經驗，把中國數千年來奉爲國藥寶典的本草綱目提綱提要，用科學的方法整理出來，加以解釋，並參照東西文獻編著成書，成爲我國現代國藥學之巨著。就中許多的民間特效藥，歷代相傳沿用，本有說不出的神祕，現在却被作者揭穿了，當然還有不少沒有經過洗禮的東西，這些則需要我藥學界同人之繼續研究，共同檢討，更進一步發揚而光大之。作者年逾花甲，好學不倦，昔曾兩度同事，見其平日潛心學問，勤懇教人，並爲後學矜式，故常以師事之。今先生執教於浙江省立醫學院，於教學之暇，致力創作，完成此書，誠爲吾道之福音。然先生所期者，不止於此書之付梓，深望藉此起帶頭作用，願吾道同人本先生之意志，益加奮勉，繼起研究，並由理論做到實際，使我們國藥更提高一步，成爲科學的大衆的實用的藥物。

一九五〇年四月

林公際跋於福建省立醫學院

