

本

州

綱

目

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根
莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草
中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲
毒故有五形焉金本水五氣焉香臭臊五色焉青赤
黑五味焉酸苦甘五性焉寒熱溫五用焉升降浮
辛鹹五味焉辛鹹五性焉涼平五用焉沈中炎

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代
有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭不分
苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生耶于是剪繁去複繩繆補遺析族區類振綱

分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十

種分爲十類曰山曰芳曰陞曰毒曰蔓曰水曰石曰

苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移

併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種陶宏景註。七十種有名未用

李氏藥錄一種魏李當之 吳氏本草一種魏吳普

唐本草三十四種

唐蘇恭

藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟詵

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋馬錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種

明汪機

本草綱目八十六種

明李時珍

附註

宋雷斅炮炙論
唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對
唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註
宋寇宗奭衍義

南唐陳士良食性
唐慎微證類

本草綱目卷之二十一
二

陳承別說
元王好古湯液

金張元素珍珠囊
吳瑞日用

明汪穎食物

王綸集要
憲王救荒

陳嘉謨蒙筌

甯原食鑑

草之一
山草類上三十一種

甘草 本經

黃耆 本經

人參 本經

沙參 本經

薺芎 別錄

桔梗 本經

長松 拾遺

黃精 別錄

菱藟 本經

委蛇 附

知母 本經

肉蓯蓉 本經

列當 開寶

瑣陽 補遺

赤箭 天麻 本經

朮 本經

狗脊 本經

貫眾 本經

巴戟天 本經

遠志 本經

巴棘 附

百脈根

唐本

淫羊藿

本經

仙茅

開寶

玄參

本經

地榆

本經

丹參

本經

紫參

本經

王孫

本經

紫草

本經

白頭翁

本經

白及

本經

三七

綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草

本經上品

釋名蜜甘

別錄

蜜草

別錄

美草

別錄

落草

別錄

靈通

珠記事國

老

別錄宏景曰此草最為眾藥之主經方少有不

非

君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也

甄

權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解

眾

藥有功效故有國老之號

集

解別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二

西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷

中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕

乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘆大苦郭璞注蘆似地黃又詩唐風云采芴采芴首陽之巔是也蘆與芴通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅蘆大苦之註爲甘草者非矣郭璞之註乃黃蘗也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而漘漘似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚙不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦

非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近
之今人惟以大徑寸而結緊斷紋者爲佳謂之粉
草其輕虛細小者皆不及之錙績霏雪錄言安
南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根脩治

雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人
每用切長三寸擘作六七片入甕器中盛

用酒浸蒸從巳至午取出暴乾判細用一法每斤
用酥七兩塗炙酥盡爲度又法先炮合內外赤黃
用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸溼炙之至
熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大
抵補中宜多用
瀉火宜生用

氣味甘平無毒

寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則
溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽

也入足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經
徐之才曰木苦參乾漆爲之使惡遠志反大戟芫
花甘遂海藻權曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟遂
芫四物相反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘

本草綱目卷之二十一
草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也
東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花二方俱有甘草皆
本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相
反並乃不爲害非妙達
精微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延

年

本經○腫音
時勇切腫也

溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七

十二種石一千二百種草

別錄

主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦

人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之

甄權

安魂定魄

補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利

百脈益精養氣壯筋骨大生用瀉火熱熟用散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺李杲

吐肺痿之膿血消五發之瘡疽好古解小兒胎毒驚

痢降火止痛時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮延胡

索苦棟子尤妙元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消

腫導毒震亨主癰腫宜入吐藥時珍

發明

震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德

載物之君子也欲達下騰須用稍子杲曰甘

草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之

以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足

而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒

除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中

急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協

和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之

緩其寒寒熱相雜者用之得其平好古曰五味之

用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而木草言甘

草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沈可上可下

可外可內有和有緩有補有泄居中之道盡矣張

仲景附子理中湯用甘草恐其下也皆緩之之意小柴胡湯有

湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有

柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有

調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳

髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意

又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣

非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中
滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味
入脾歸其所喜此升降浮沈之理也經云以甘補
之以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中
黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元
老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知
斂神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔
吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與
之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉
於宵人之意與○頌曰按孫思邈千金方論云甘
草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入
腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試
之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪
肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒
藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥
或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時
先取炙熟甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽吐出
仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大便出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方

新舊十五傷寒心悸 脈結代者甘草二兩水三升煮一服七合日一服

傷寒傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩類要 蜜水炙水二升煮一升半服五合

日二服 張仲景傷寒論 肺熱喉痛 有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半入阿膠 肺痿多涎 肺痿吐涎沫頭半片煎服 錢乙直訣 肺痿多涎 眩小便數而不

欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五分服 張仲景金匱要

畧 肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每日取小便三合調

甘草末一錢服 小兒熱嗽 甘草二兩豬膽汁浸五廣利方 宿炙研末蜜丸綠豆大

食後薄荷湯下十丸初生解毒小兒初生未可便

名涼膈丸聖惠方初生解毒與殊砂蜜只以甘

草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點

兒口中可爲一蜺殼當吐出胸中惡汁此後待兒

饑渴更與之令兒智慧無初生便閉甘草枳殼煨

病出痘稀少王璆選方初生便閉各一錢水半

蓋煎服小兒撮口發噤用生甘草二錢半水一

全幼心鑑小兒撮口蓋煎六分溫服令吐痰涎後

以乳汁點兒口嬰兒目澀月內目閉不開或腫羞

中甘草一匱玉函嬰兒目澀明或出血者名慢肝風

用甘草一截以豬膽汁炙爲末每小兒遺尿草大

用米泔調少許灌之幼幼新書小兒遺尿草大

煎湯夜服之小兒尿血甘草一兩二錢水六合

危氏得效方小兒尿血煎二合一歲兒一日服

盡姚和方小兒羸瘦甘草三兩炙焦爲末蜜丸

眾至寶方小兒羸瘦豆大每溫水下五丸日二服

金匱大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便秘要

玉函大人羸瘦四沸頓服之良外臺秘要赤

本草綱目卷之二十三

白痢下

崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效

○梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻舌腫塞口不治

七個煨剉以水三升煎一升分服

甘草煎濃湯熱漱太陰口瘡甘草二寸白礬一栗

頻吐聖濟總錄乃神授極奇秘用甘草三大兩生

集發背癰疽方乃神授極奇秘用甘草三大兩生

搗篩末大麥麩九兩和勻取好酥少許入內下沸

水澆如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片

及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未

成者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙○又一法甘

草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小

刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是

瘡腫發背皆甚諸般癰疽一斗同浸瓶中用黑鉛

效一片蘇頌圖經諸般癰疽一斗同浸瓶中用黑鉛

病者飲酒至醉寢後即愈也此九度令一切癰疽

諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤搥碎河水浸一宿揉取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以瓷罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦解之或微利無妨名癰疽秘塞半甘草二錢國老膏外科精要方

癰疽秘塞

半甘草二錢

能疎導下惡

乳癰初起

仍令草二錢新汲水煎服

直指方些

小癰癤

發熱時卽用粉草節曬乾爲末熱酒服二錢連進數服痛熱皆止

外科精要方

痘瘡煩渴

粉甘草炙枯樓根等分水煎服之

甘陰

下懸癰

生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿卽破破則難

愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盃塘水井水不用以文武火慢慢蘸水炙之自

早至午令水盡爲度劈開視之中心水潤乃止細剉用無灰好酒二小盃煎至一盃溫服次日再服

便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡
興化守康朝病已破眾醫拱手服此兩劑即合口

也乃韶州劉從周方陰頭生瘡之蜜炙甘草末頻頻塗
李迅癰疽方

陰下溼癢甘草煎湯日洗三代指腫痛甘草煎湯
五度古今錄驗

金凍瘡發裂甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗黃芩
方末入輕粉麻油調敷談堃翁方

湯火灼瘡甘草煎蜜塗方蠱毒藥毒甘草節以真麻
妙每用嚼嚙或水煎

服神妙直指方小兒中蠱欲死者甘草半兩
當吐出

金匱玉函牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升或煎
水飲之即死

千金方飲饌中毒未審何物卒急無藥只煎
水飲之即死

金匱玉水菘菹毒菜中有水菘菹葉圓而光有毒
函方誤食令人狂亂狀若中風或作

吐以甘草煮汁服之即
解金匱玉函妙方

黃耆

本品經

釋名黃芪

綱目

戴糝

本戴

樞

別錄又

芟草

別錄又

百

本別王孫

藥性論

○時珍曰

耆長也

黃耆色黃爲

補藥之長故名今俗通作黃芪或作著

者非矣著乃著龜之著音

尸王孫與牡蒙同名異物

別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十

集解

月采陰乾宏景曰第一出隴西洮陽色黃白

甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗新

者亦甘而溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者

而冷補又有赤色者可作膏貼俗方多用道家不

須恭曰今出原州及華原者最良蜀漢不復採用

直州寧州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多有之

根長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三

寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃
紫花其實作莢子長寸許八月中采根用其皮折
之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆赤水耆
木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫
今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂
真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉
中白色此爲異耳承曰黃耆本出綿上者爲良故
名綿黃耆非謂其柔韌如綿也今圖經所繪憲州
者地與綿上相鄰也好古曰綿上卽山西沁州白
水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥苜
蓿根味苦而堅脛俗呼爲土黃耆能令人瘦用者
宜審嘉謨曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤
水二鄉俱屬隴西時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖
小又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃紫花大如
槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭
箠者爲良嫩苗亦可燉淘茹食其子收之十月下
種如種菜法亦可

修治

數曰凡使勿用木者草真相似只是生時葉短并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於

槐砧上用時珍曰今人但搥扁以蜜水塗炙數次以熟爲度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟

切用者

根氣味甘微溫無毒

本經

白水者冷補

別錄元素曰味甘氣溫平

氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門之才曰茯苓爲之使惡

龜甲白鮮皮

主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五

痔鼠瘦補虛小兒百病

本經

婦人子臟風邪氣逐五

臟閒惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢

益氣利陰氣

別錄

主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背

內補甄權助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧瘰贅

腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻

痰嗽頭風熱毒赤目日華治虛勞自汗補肺氣瀉肺

火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛元素主

太陰瘡疾陽維爲病苦寒熱督脈爲病逆氣裏急

好古

發明宏景曰出隴西者溫補出白水者冷補又有

用白水黃耆虛而客冷用隴西黃耆大明曰黃耆

藥中補益呼爲羊肉白水耆涼無毒排膿治血及

煩悶熱毒骨蒸勞赤水耆涼無毒治血退熱毒餘

功並同木耆涼無毒治煩排膿之力微於黃耆遇

闕卽倍用之（元素曰黃耆甘溫純陽其用有五補諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛活血生血內托陰疽爲瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛治脈弦自汗瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃耆治氣虛盜汗并自汗及膚痛是皮表之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脈不至補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外三焦之藥也（杲曰靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃耆既補三焦實衛氣與桂同功特此桂甘平不辛熱爲異耳但桂則通血脈能破血而實衛氣耆則益氣也又黃耆與人參甘草三味爲除躁熱肌熱之聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃耆（溫分肉益皮毛實腠理不令汗出以益元氣而補三焦震亨曰黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜若面黑形實而瘦者服之令人胸滿宜以三拗湯瀉之○宗奭防風黃耆世多相須而用唐許裔宗初仕陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脈沈而口

噤允宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周
時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟
霧其夕便得語也杲曰防風能制黃耆黃耆得防
風其功愈大乃相畏而相使也震亨曰人之口通
乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻
不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎
無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事
今投以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通神
不可同生也杲曰小兒外物驚宜用黃連安神
丸鎮心藥若脾胃寒溼吐腹痛瀉痢青白宜用益
黃散藥如脾胃伏火勞役不足之證及服巴豆之
類胃虛而成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命
當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘
寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今
立黃耆湯瀉火補金益土爲神治之法用炙黃耆
二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大
盞煎半盞溫服機曰蕭山魏直著博愛心鑑三
卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者爲吉不用

藥逆者爲凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危爲安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作爲膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也漿行色灰不榮也漿定也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老溼潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰潰而斂遲也凡有諸症並宜此湯或加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄怠臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參爲君黃耆爲臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘疹陰瘡者當以黃耆爲君人參爲臣不可執一也

附方

新舊五

小便不通

綿黃耆二錢水二盞煎一盞溫服小兒減半
總微論

酒疸黃疾

心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃者二兩

木蘭一兩為末酒服方

氣虛白濁

黃芪鹽炒半兩茯苓一兩為末

每服一錢白湯

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩

下飲食或先渴而後發瘡癩或先癰疽而後發渴並

宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽

之疾用綿黃耆箭箬者去蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤溼飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半

生用一服亦可煎服名黃芪六一湯點服早晨日

午各一服亦可煎服名黃芪六一湯點服早晨日

老人悶塞

綿黃耆陳皮去白各半兩為末每服三錢用大麻子一合研爛以水濾漿煎至

乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過

二服此藥不冷不熱常服無秘塞之患其效如神

和劑腸風瀉血

黃耆黃連等分為末麩糊丸綠豆局方大每服三十丸米湯下孫用和

秘寶

尿血沙淋

痛不可忍黃耆一人參等分爲末以

蜜二兩淹炙令盡不令焦點末吐血不止黃耆二錢半紫

食無時以鹽湯下永類鈴方背浮萍五錢爲末每服一欬嗽膿血咽乾乃虛中

錢薑蜜水下聖濟總錄涼藥以好黃耆四兩甘草一兩爲肺癰得吐黃耆

末每服二錢點湯服席延賞方爲末每服二錢水一中盞煎至甲疽瘡膿生足趾

六分溫服日三四服聖惠方肉突出時常舉發者黃耆二兩藺茹一兩醋浸一

宿以豬脂五合微火上煎取二合絞去滓以封瘡口上日三度其肉胎動不安腹痛下黃汁黃耆川

自消外臺秘要芎藭各一兩糯米一合水一升煎半升陰汗溼癢綿黃耆酒炒爲末以

分服婦人良方眞人濟黃耆人參各一兩爲末入眞龍急方腦一錢用生藕汁和丸綠豆大癢疽內固

每服二十丸溫水下
日日服 本事方

莖葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡
別錄

人參
本經上品

釋名人澆
音參或澆**黃參**
吳普**血參**
別錄**人銜**
本經**鬼蓋**
本經

神草
別錄**土精**
別錄**地精**
廣雅**海腴**
廣雅**皺面還丹**
時珍曰

人澆年深浸漸長成者根如人形有神故謂之人
澆神草澆字從澆亦浸漸之義澆卽浸字後世因
字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日
久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尙作澆字別錄
一名人銜銜乃澆字之訛也其成有階級故曰人
銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土
而補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地之精
靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上

黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人漢一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗樞云搖光星散而爲人參人君廢山瀆之利則搖光不明人參不生觀此則神草之名又可證矣

集解

別錄曰人參生上黨山谷及遼東二月四月

人形者有神普曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑

莖有毛三月九月采根根有手足面目如人者神

宏景曰上黨在冀州西南今來者形長而黃狀如

防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣

味薄於上黨者次用高麗者高麗卽是遼東形大

而虛軟不及百濟並不及上黨者其草一莖直上

四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三椹五

葉背陽向陰欲來求我椹樹相尋椹音賈樹似桐

甚大蔭廣則多生采作甚有法今近山亦有但作

行紫團山所出者謂之紫團參保升曰今沁州遼州澤州箕州平州易州檀州幽州媯州并州並出
人參蓋其山皆與太行連亘相接故也珣曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以杉木夾定
紅絲纏飾之又沙州參短小不堪用頌曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北樵場及閩中來者
名新羅人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近椶漆下溼潤處初生小者三四寸許一椶
五葉四五年後生兩椶五葉未有花莖至十年後生三椶年深者生四椶各五葉中心生一莖俗名
百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如
人形者神泰山出者葉幹青根白殊別江淮閒出一種土人參苗長一二尺葉如匙而小與桔梗相
似相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋采根土人或用之相傳
欲試上黨參但使二人同走一舍人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自

如其人參乃真也宗奭曰上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十歧者其價與銀等稍爲難得土人得一窠則置板上以新綵絨飾之嘉謨曰紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名白條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神其類雞腿者力洪時珍曰上黨今潞州也民以人參爲地方害不復採取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉僞者皆以沙參薺芩桔梗采根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺芩體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味俗名金井玉闌也其似人形者謂之孩兒參尤多贗僞宋蘇頌圖經本草所繪潞州者三椹五葉真人參也其潞州者乃沙參之苗葉沁州兗州者皆薺芩之苗葉

其所云江淮土人參者亦薺芘也並失之詳審今潞州者尙不可得則他處者尤不足信矣近又有薄夫以人參先浸取汁自啜乃曬乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁銜太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚詳不能備錄亦略節要語於下條云爾

脩治

宏景曰人參易蛀唯納新器中密封可經年不壞炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛

過麻油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年一法用淋過竈灰曬乾罐收亦可李言聞曰人參生時背陽故不喜見風日凡生用宜咬咀熟用宜隔紙焙之或醕酒潤透咬咀焙熟用並忌鐵器

根氣味甘微寒無毒

別錄曰微溫普曰神農小寒

毒元素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也又曰陽中微陰之才曰茯苓馬蘭爲之

使惡溲疏鹵鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡阜莢黑
豆動紫石英元素曰人參得升麻引用補上焦之
元氣瀉肺中之火得茯苓引用補下焦之元氣瀉
腎中之火得麥門冬則生脈得乾薑則補氣杲曰
得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣又爲
瘡家聖藥震亨曰人參入手太陰與藜蘆相反服
參一兩入藜蘆一錢其功盡廢也言間曰東垣李
氏理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參阜莢是惡而
不惡也古方療月閉四物湯加人參五靈脂是畏
而不畏也又療痰在胸膈以人參藜蘆同用而取
涌越是激其怒性也此皆精
微妙奧非達權衡者不能知

主治補五臟安精神

定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身

延年本經療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐

逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘別錄主五

本草綱目卷之八

勞七傷虛損痰弱止嘔噦補五臟六腑保中守神

消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣逆上傷寒不下食

凡虛而多夢紛紜者加之

甄權

止煩躁變酸水

李珣

消

食開胃調中治氣殺金石藥毒

大明

治肺胃陽氣不

足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心肺脾胃中

火邪止渴生津液

元素

治男婦一切虛證發熱自汗

眩運頭痛反胃吐食痰瘡滑瀉久痢小便頻數淋

瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋

血崩胎前產後諸病

時珍

發明

宏景曰人參爲藥切要與甘草同功杲曰人

皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云

病人汗後身熱亡血脈沈遲者下痢身涼脈微血

虛者並加人參古人血脈脫者益氣蓋血不自生須

得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單

用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以

生無陰則陽無以化故補氣須用人參羊肉之屬是

須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是

也蓋人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也好
古曰潔古老人言以沙參代參取其味甘也雖然
人參補五臟之陽沙參補五臟之陰安得無異雖
云補五臟亦須各用本臟藥相佐使引之言聞曰
人參生用氣涼熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣
主生物本乎天味主成物本乎地氣味生成陰陽
之造化也涼者高秋清肅之氣天之陰也其性降
溫者陽春生發之氣天之陽也其性浮微苦者火土
化成之味地之陽也其性浮微苦者火土相生之

味地之陰也其性沈人參氣味俱薄氣之薄者生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則

宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生

金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃蘗佐人參孫

真人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生脈散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火

而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天

元之真氣非補熱火也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並

宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之

正誤 數曰夏月少使人參發心疝之病好古曰人參味甘溫補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此

補之肺受火邪則反傷肺腎真陰陰虛火動勞嗽吐血此酒色過度損傷肺腎真陰陰虛火動勞嗽吐血

欬血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤服參者甘溫之劑則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參者爲補而死者多矣○言聞曰孫真人云夏月服參生脈散清暑益氣湯三劑則百病不生李東垣亦言生脈散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而雷斅反謂發心疰久患非矣疰乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅積豈有發疰之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節齋王綸因而和之謂參者能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬二家不察三氏之

精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草芩朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蠍則不可也凡人面白面黃面青鰲悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脈之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲瀦弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢能食脈弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補

者也若自汗氣短肢寒脈虛者必用也如此詳審
則人參之可用不可用思過半矣機曰節齋王綸
之說本於海藏王好古但綸又過于矯激丹溪言
虛火可補須用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜
汗等證四物加人參黃蘗知母又云好色之人肺
腎受傷欬嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者
獨參膏主之是知陰虛勞瘵之證未嘗不用人參
也節齋私淑丹溪者也而乃相反如此斯言一出
印定後人眼目凡遇前證不問病之宜用不宜輒
舉以藉口致使良工掣肘惟求免夫病家之怨病
家亦以此說橫之胸中甘受苦寒雖至上嘔下泄
去死不遠亦不悟也古今治勞莫過於葛可久其
獨參湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節齋之說
誠未之深思也楊起曰人參功載本草人所共知
近因病者吝財薄醫醫復算本惜費不肯用參療
病以致輕者至重重者至危然有肺寒肺熱中滿
血虛四證只宜散寒消熱消脹補營不用人參其
說近是殊不知各加人參在內護持元氣力助羣

藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣古方治肺寒以溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂邪之所轉其氣必虛又曰養正邪自除陽旺則生陰血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠哉庸也好生君子不可輕命薄醫醫亦不可計利不用書此奉勉幸迂勿曰

附方

舊九新六十八

人參膏

用人參十兩細切以活水二

火緩緩煎取十盞瀝汁再以水十盞煎取五盞與前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之浦江鄭兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脈大無倫此陰虧陽絕之證也子令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能

動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤
而全安若作風治則誤矣一人背疽服內托十宣
藥已多膿出作嘔發熱六脈沉數有力此潰瘍所
忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一十六
斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起
有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋予曰急作參
膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而
瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食
變證不一者以參者歸**治中湯**頌曰張仲景治胸
木等分煎膏服之最妙**治中湯**痹心中痞堅留氣
結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之即理中湯
人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升
每服一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至
唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或
爲散皆有奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶
隱居百一方云霍亂餘藥乃或難求而治中湯四
順湯厚樸湯不可暫缺常須預合自隨也唐石泉
公王方慶云數方不惟霍亂可醫諸病皆療也四

順湯用人參甘草乾薑附子炮各四君子湯治脾胃氣

虛不思飲食諸病氣虛者以此爲主人參一錢白

朮二錢白茯苓一錢炙甘草五分薑三片棗一枚

水二鍾煎一鍾食前溫服開胃化痰不思飲食不

隨證加減和濟局方開胃化痰拘大人小兒

人參焙二兩半夏薑汁浸焙五錢爲末飛羅麩作

糊丸綠豆大食後薑湯下三五丸日三服聖惠

方加陳橘皮五錢胃寒氣滿人參末二錢生附子末

半錢生薑二錢水七合煎二合雞子脾胃虛弱不

清一枚打轉空心服之聖濟總錄脾胃虛弱思

飲食生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩胃虛

銀鍋煎成膏每米飲調服一匙普濟方胃虛

惡心或嘔吐有痰人參一兩水二盞煎一盞入竹

尤宜瀝一盃薑汁三匙食遠溫服以知爲度老人

簡便方胃寒嘔惡不能腐熟水穀食卽嘔吐人參

生薑三片水二盞煎反胃嘔吐飲食入口即吐困

一盞溫服拔萃方反胃嘔吐弱無力垂死者上

黨人參三兩大兩拍破水一大升煮取四合熱服日

再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮粥與噉李

直方司勳於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂與此

方當時便定後十餘日遂入京師絳每與名醫論

此藥難可為儔也食入即吐一人參半夏湯用人參

李絳兵部手集生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取三升霍

亂嘔惡人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白

霍亂煩悶人參五錢桂心半錢水霍亂吐瀉煩躁

人參二兩橘皮三兩生薑一兩水妊娠吐水酸心

六升煮三升分三服聖濟總錄以生地黃汁湯

不能飲食人參乾薑炮等分為末以和劑局方

虛氣喘

自汗盜汗氣短頭暈人參五錢熟附子一兩分爲四帖每帖以生薑十片流水二盞

煎一盞食遠溫

喘急欲絕

服上方寸匕日五六服效

肘後產後發喘

乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩水二盃煮汁一盃調參

末服神效

產後血運

人參一兩紫蘇半兩以童尿聖惠方

產後不語

人參五錢水煎服婦人良方

發熱自汗人參當歸等分爲末用豬腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟

取汁一盞入藥煎至入產後秘塞出血多以人參

分食前溫服永類方

橫生倒產

人參末各一

錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生薑自然汁三匙攪勻冷服卽母子俱安神效此施漢卿方也

糊丸綠豆大每服五十丸食遠棗湯下不過兩服

即愈此昆山神濟大師方也一加乳香二錢

選方百一心下結氣凡心下硬按之則無常覺膨滿

由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人

參一兩橋皮去白四兩為末煉蜜丸梧子大每米

飲下五六十房後困倦蓋人參七錢陳皮一錢水

丸服千金不傳虛勞發熱愚魯湯用上黨人參銀

再服趙永庵方州柴胡各三錢大棗一

枚生薑三片水一鍾半煎七分食遠肺熱聲啞人

溫服日再服以愈為度奇效良方

二兩訶子一兩為末肺虛久欬人參末二兩鹿角

噙嚙丹溪摘玄末肺虛久欬膠炙研一兩每服

三錢用薄荷豉湯一蓋葱少許入銚子煎一二沸

傾入蓋內遇欬時溫呷三五口甚佳食療本草

止嗽化痰礬成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大

止嗽化痰礬成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大

止嗽化痰礬成膏入參末煉蜜和收每以豌豆大

一丸放舌下其嗽即小兒喘效發熱自汗吐紅脈

止痰自消簡便方花粉等分每服半錢蜜水喘效嗽血急嗽血吐氣喘

調下以瘥為度經濟方脈無力者人參末每服三錢雞子清調之五更初

服便睡去枕仰臥只一服愈服盡睡去枕仰臥只一服愈服深者再服咯血者

作水調藥尤妙忌醋醎腥醬麪鮮醉飽將息乃佳沈存中效嗽吐血人參黃耆飛羅麪各一兩百合

靈苑方五錢為末十丸食前茅根湯下朱氏集驗方用人參乳香

辰砂等分為末烏梅肉和丸一丸日虛勞吐血困倦法當補陽生陰獨參湯主

一服之好人參一兩肥棗五枚水二鍾煎一鍾服熟睡

吐血下血俱出心肺脈散血如湧泉須臾不救用吐血下血因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻

渴	以	蜜	三	三	瘥	蜜	以	試	談	謂	錢	用	東	頃	用	人
方	愈	丸	四	因	為	盡	蜜	效	堃	神	水	蓮	流	再	二	參
人	為	梧	服	方	度	為	二	方	翁	奇	一	子	水	華	錢	焙
參	度	子	○	沙	沙	度	兩	陰	後	鍾	鍾	心	陀	一	入	側
一	名	大	集	淋	石	每	將	虛	生	煎	煎	服	中	服	飛	柏
兩	玉	每	驗	石	淋	用	蘿	尿	小	七	分	日	藏	立	羅	葉
粉	壺	服	用	淋	淋	一	蔔	血	子	食	食	三	經	止	麩	蒸
草	丸	百	人	方	方	片	逐	用	多	前	前	服	止	血	二	焙
二	忌	丸	參	同	消	蘊	片	紅	患	溫	溫	無	血	不	錢	荆
兩	酒	食	栝	渴	引	藥	蘊	皮	此	服	服	柳	止	以	以	芥
以	麩	前	樓	飲	飲	食	炙	大	病	日	日	枝	等	新	新	穗
雄	炙	麥	根	人	人	之	令	蘿	子	再	再	齒	分	汲	汲	燒
豬	燂	門	等	清	清	仍	乾	蔔	累	蘇	蘇	縫	為	水	水	存
膽	○	冬	分	調	調	以	再	一	試	東	東	出	參	調	調	性
汁	鄭	湯	生	服	服	鹽	炙	枚	之	坡	坡	血	柳	如	如	各
浸	氏	下	研	一	一	湯	勿	切	累	得	得	麥	枝	稀	稀	五
炙	家	日	為	錢	錢	送	令	作	如	此	此	門	每	糊	糊	錢
腦	傳	二	末	雞	雞	下	焦	四	所	自	自	冬	服	服	服	為
子	消	服	煉	子	子	以	以	片	言	言	言	各	一	少	少	末
												二	錢			

半錢爲末蜜丸芡子大每嚼一丸冷水下○聖濟
總錄用人參一兩葛粉二兩爲末發時以燻豬湯

以瓶收入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餈

虛瘧發熱用人參二錢二分雄黃五錢爲末端午日

吞下一方加神麴等分忌諸般熱物立冷痢厥逆六

沈細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十片

經驗下痢噤口煎一盞細細呷之或加薑汁炒黃

連三錢經老人虛痢不止不能飲食上黨人參

爲末每服方寸匕米湯調傷寒壞證凡傷寒時疫

幼妊婦誤服藥餌因重垂死脈沉伏不省人事七
日以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復

脈湯人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷

服之少頃鼻梁有汗出脈復立瘥蘇韜光侍郎云

用此救數十人予作清流宰縣倅申屠行輔之子

婦患時疫三十餘日已成壞病令服此藥而安

王璆百傷寒厥逆此陰極發躁也無憂散用人參

一兩方傷寒厥逆此陰極發躁也無憂散用人參

半兩水一鍾煎七分調牛膽南方夾陰傷寒事後感

星末二錢熱服立甦三因方夾陰傷寒事後感

寒邪陽衰陰盛六脈沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔

吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各一兩

本

卷之二十一

三

下痘疹險證

保和湯見黃

驚後瞳斜

小兒驚後瞳不正者人

參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎

直指方

小兒脾風

多用人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水煮過

酒

毒目盲

一人形實好飲熱酒忽病目盲而脈濇此熱酒所傷胃氣汚濁血死其中而然以蘇

木煎湯調人參末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑

此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮

一婦嗜酒胸生一疽

而愈 參末服數日 酒毒生疽

脈緊而濇用酒炒人

參酒炒大黃等分爲末薑湯服一

狗咬風傷 腫痛

錢得睡汗出而愈效 丹溪醫案

置桑柴炭上燒存性以盃覆定 蜈蚣咬傷 嚼人參

少頃爲末摻之立瘥 經方 蜈蚣咬傷 塗之

醫學 蜂螫傷 人參末傅之 脇破腸出 急以油抹

集成 證治要訣

枸杞汁淋之內喫羊腎粥
十日愈 危氏得效方
氣奔忤疾 虎杖見

蘆 氣味苦溫無毒 主治吐虛勞痰飲 珍時

發明 吳綬曰人弱者以人參蘆代瓜蒂震亨曰人參入手太陰補陰中之陽蘆則反能瀉太陰

之陽亦如麻黃苗則發汗根則止汗穀屬金而糠之性熱麥屬陽而麩之性涼先儒謂物物具一太

極學者可不觸類而長之乎一女子性躁味厚暑月因怒而病呃每作則舉身跳動昏冒不知人其

形氣俱實乃痰因怒鬱氣不得降非吐不可遂以人參蘆半兩逆流水一盞半煎一大盃飲之大吐

頑痰數盃為大熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰服瘧藥變為熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰

蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

沙參 本經上品 **校正** 併入別錄有名 未用部羊乳

釋名 白參

吳普

知母

別錄

羊乳

別錄

羊婆孺

綱目

鈴兒草

別錄

虎鬚

別錄

苦心

宏景曰

此與

人參

一名

識美

一名

志取

是

爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名

又有紫參乃牡蒙也時珍曰沙參白參宜於沙地

故名其根多白汁俚人呼爲羊婆孺別錄有名未

用羊乳卽此也此物無心味淡而別錄一名苦心

又與知母同名不知所謂也鈴兒草象花形也

集解 二月八月采根暴乾又名羊乳一名地黃三

月采立夏後母死恭曰出華山者爲善普曰二月生苗如葵葉青色根白實如芥根大如蕪菁三月采宏景曰今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳保昇曰其根若葵根其花白色頌曰今淄齊潞隨江淮荆湖州郡皆有之苗長一二尺以來叢生崖壁閒葉似枸杞而有叉了七月開紫花根如葵根

大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月采根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏此為小異藏器曰羊乳根如薺芫而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當薺芫苗作蔓折之有白汁時珍曰沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而團扁不光八月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉開開小紫花長二三寸狀如鈴鐸五出白蕊亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八月九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往繫蒸壓實以亂人參但體輕鬆味淡而短耳

根氣味苦微寒無毒

別錄曰羊乳溫無毒普曰沙參岐伯藏神農黃帝扁鵲無

毒李當之大寒好古曰甘微苦之才曰惡防己反藜蘆

主治血積驚氣除寒

熱補中益肺氣

本經

療胃痹心腹痛結熱邪氣頭痛

皮閒邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛

益氣長肌肉

別錄

去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠

養肝氣宣五臟風氣

甄權

補虛止驚煩益心肺并一

切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒

大明

清肺火治久

欬肺痿

時珍

發明

元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也

好古曰沙參味甘微苦補陰甘則補陽故經之藥又為脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故

潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔之可也

時珍曰

人參甘

苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故
內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補
肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜之一
補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

附方

舊一

新二 **肺熱欬嗽**

沙參

半兩

水煎

服

卒得疝氣

小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者沙

參搗篩爲末酒服方寸匕立瘥

肘後方

婦人

白帶

爲多因七情內傷或下元虛冷所致沙參

白帶

爲末每服二錢米飲調下

證治要訣

齊芎

音齊尼並上聲

別錄中品

校正

併入圖

杏參

釋名

杏參

苗名

隱忍

時珍曰齊芎多

汁有濟芎之

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云芎藭

白麩根

荒救

苗名

隱忍

狀故以名之濟芎濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

芫也郭璞云卽薺芫也隱忍說見下文

集解

宏景曰薺芫根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處毒皆自然歇

不止入方家用也又曰魏文帝言薺芫亂人參卽此也薺芫葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛爲異又不如人參相對耳恭曰人參苗似五加而潤短莖圓有三四極極頭有五葉陶引薺芫亂人參誤矣且薺芫桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉旣相亂惟以根有心爲別爾頌曰今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而小異根似桔梗但無心爲異潤州陝州尤多人家收以爲果或作脯啖味甚甘美兼可寄遠二月八月采根暴乾承曰今人多以蒸過壓扁亂人參但味淡爾宗奭曰陶以根言故云薺芫亂人參蘇以苗言故以陶爲誤也機曰薺芫苗莖與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參近於誤也當以人參薺芫桔梗三註參看自明矣時珍曰薺芫

苗似桔梗根似沙參故姦商往往以沙參薺芩通
亂人參蘇頌圖經所謂杏參周憲王救荒本草所
謂杏葉沙參皆此薺芩也圖經云杏參生淄州田
野根如小菜根土人五月采苗葉治欬上氣救
荒本草云杏葉沙參一名白麩根苗高一二尺莖
色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪
閒開五瓣白盃子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色
灰黝中閒白色味甜微寒亦有開碧花者嫩苗燂
熟水淘油鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充
果又陶宏景註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治
蠱毒謹按爾雅云莠隱忍也郭璞註云似蘇有
江東人藏以爲菹亦可淪食葛洪肘後方云隱忍
草苗似桔梗人皆食之搗汁飲治蠱毒據此則隱
忍非桔梗乃薺芩苗也薺芩苗甘可食桔梗苗苦
不可食尤爲可證神農本草經無薺芩止有桔梗一
名薺芩至別錄始出薺芩蓋薺芩桔梗乃一類有
甜苦二種則其苗
亦可呼爲隱忍也

根氣味甘寒無毒主治解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇

蠱咬熱狂溫疾署毒箭大利肺氣和中明目止痛

蒸切作羹粥食或作齏菹食皆食之壓丹石發動

孟詵主欬嗽消渴強中瘡毒疔腫辟沙蝨短狐毒時珍

發明時珍曰薺芫寒而利肺甘而解毒乃良品也

兼解眾毒者惟薺芫汁濃飲二升或煮嚼之亦可

作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野

僉載云各醫言虎中藥箭食清泥而解野豬中藥

箭脛薺芫而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈

千金方治強中為病莖長興盛不交精出消渴之

後發為癰疽有薺芫丸豬腎薺芫湯方此皆本草

所未及者然亦取其解

熱解毒之功爾無他義

附方

新舊四強中消渴

豬腎薺芩湯治強中之病莖

之後即發癰疽皆由恣意色慾或餌金石所致宜

此以制腎中熱也用豬腎一具薺芩石膏各三兩

人參茯苓磁石知母葛根黃芩栝樓根甘草各二

兩黑大豆一升水一斗半先煮豬腎大石取汁一

斗去滓下藥再煮三升分三服後人名為石櫛樓根

芩湯○又薺芩丸用薺芩大豆茯苓神磁石櫛樓根

熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沉香

各半兩為末以豬肚治淨煮爛杵和丸梧子大每

服七十丸空心鹽疔瘡腫毒生薺芩根搗汁服一

湯下並千金方薺芩肉桂各一兩為末每用方

度

金翼方面上肝炮薺芩肉桂各一兩為末每用方

薺芩根搗末飲服方寸七解鉤

濟總錄解諸蠱毒立瘥陳延之小方寸七解鉤

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒八兩水六升煮取三升每服五合日五服

仲景金匱玉函解五石毒薺芑生搗汁多服之
立瘥蘇頌圖經

隱忍葉氣味甘苦寒無毒主治蠱毒腹痛面目青

黃林露骨立煮汁一二升飲時珍主腹臍風壅欬嗽

上氣蘇頌

桔梗本經下品

釋名白藥別錄梗草別錄薺芑本經時珍曰此草之根

本草一名利如一名符扈一名房圖方書並無見

蓋亦庚詞爾桔梗薺芑乃一類有甜苦二種故本

經桔梗一名薺芑而今俗呼薺芑爲甜桔梗也至

別錄始出薺芑條分爲二物然其性味功用皆不
同當以別錄爲是

本草綱目卷之三十一

別錄曰

桔梗生

嵩高山

山谷及

冤句一

八月采

根

生苗

宏景曰

生苗

宏景曰

近道

處處

有之

二三月

生苗

可煮

食

桔梗

能療

瘰癧

毒甚

驗俗

方用

此乃

名薺

薺今

別有

薺

明滑

澤無

毛為

異葉

生又

不如

人參

相對

耳

恭曰

薺

桔梗

葉有

差互

者亦

有葉

三四

對者

皆一

莖

直上

葉既

相亂

惟以

根有

心為

別耳

頌曰

今在

處

有之

根如

指大

黃白

色春

生苗

莖高

尺餘

葉似

杏

葉而

長橢

四葉

相對

而生

嫩時

亦可

煮食

夏開

小

花紫

碧色

頗似

牽牛

花秋

後結

子八

月采

根其

根

有心

若無

心者

為薺

薺關

中所

出桔

梗根

黃皮

似

蜀葵

根莖

細青

色葉

小

青

色似

菊

葉也

根脩

治

腥澀

不堪

凡使

勿用

木梗

真似

桔梗

只是

分已

來并

兩畔

附枝

子槐

砧上

細剉

用生

百合

搗

膏投

水中

浸一

伏時

濾出

緩火

熬令

乾用

每桔

梗

四兩用百合二兩五錢時珍曰今但刮校補畏龍
去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用

氣味辛微溫有小毒

普曰神農醫和苦無毒黃帝
扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒

李當之

大寒權曰苦辛時珍曰當以苦辛平爲是

之才曰節皮爲之使畏白芨龍膽草忌豬肉得牡
蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒白粥解其醜
味時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也

主治胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

本經

利五臟腸胃補血氣除寒熱風痹溫中消穀療喉

咽痛下蠱毒

別錄

治下痢破血積氣消聚痰涎去肺

熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇

甄權

下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除

邪辟溫破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痹明大

利竅除肺部風熱清利頭目咽噎胸膈滯氣及痛

除鼻塞元治寒嘔李杲主口舌生瘡赤目腫痛時珍

發明好古曰桔梗清肺氣利咽喉其色白故為肺部引

經與甘草同行為舟楫之劑如大黃苦泄峻下之

藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑升

之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一

味不能下沉也時珍曰朱肱活人書治胸中痞滿

不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景
傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中
消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦
辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少
陰證二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒

甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔
湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荆芥防風連翹
遂名如聖湯極言其驗也按王好古醫壘元戎載
之頗詳云失音加訶子聲不出加半夏上氣加陳
皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味子酒毒加葛根
少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫菀肺痿
加阿膠胸膈不利加枳殼心痛加黃耆發斑加防
加卮子大黃面腫加茯苓皮膚痛加黃耆發斑加防
風荆芥疫毒加鼠黏子大黃不得眠加卮子震亨
曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之
痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗開之
後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之

附方

舊七十胸滿不痛 桔梗枳殼等分水二鍾煎傷
新七胸滿不痛 一鍾溫服 南陽活人書

寒腹脹

陰陽不和也 桔梗半夏湯主之 桔梗半夏
陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

南陽活人書

痰嗽喘急 半升煎四合去滓溫服 童子簡要

濟眾 肺癰欬嗽 胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者桔

梗湯主之 桔梗一兩甘草二兩水三升煎少陰咽痛 少陰證溫再服朝暮吐膿血則瘥 張仲景金匱玉函方

喉痹毒氣 桔梗二兩水三升煎少陰咽痛 少陰證一兩甘草二兩水三升煮一升分服 張仲景傷

咽痛者可與甘草湯不瘥者與桔梗湯主之 桔梗 一兩甘草二兩水三升煮一升分服 張仲景傷

寒口舌生瘡 上方同 齒齩腫痛 桔梗薤苡仁等分 論 寒口舌生瘡上方同 齒齩腫痛為末服之永類方

槽風痛 牙齦腫痛 桔梗為末 棗瓤和丸 阜子大牙 綿裹咬之仍以荆芥湯漱之 經方

疳臭爛 桔梗香等分 燒研 肝風眼黑 目睛痛肝 疳臭爛傅之 衛生易簡方 肝風眼黑目睛痛肝

梗丸主之 桔梗一斤黑牽牛頭末三兩為末 蜜丸 梧子大每服四十九丸溫水下日二服 保命集

鼻出血 桔梗為末 水服方寸匕 日四 吐血下血 服一加之生犀角屑 普濟方

上方同
打擊瘀血
在腹內久不消時發動者桔梗爲末米湯下一刀圭
肘後要方

中蠱下血
如雞肝晝夜出血者苦桔梗爲末以酒未毀或鼻破將死者苦桔梗爲末以酒

服方寸匕日三服不能下藥以物拗以灌之心中
當煩須臾自定七日止常食豬肝臙以補之神良

一方加犀角等分
初虞古今錄驗
妊娠中惡判水一鍾生薑三片

煎六分溫服
小兒客忤
死不能言桔梗燒研三錢

備急方
張文仲

蘆頭
主治
吐上膈風熱痰實生研末白湯調服一

錢探吐
時珍

長松
拾遺

釋名 仙茹 時珍曰其葉如松服之長年

集解 藏器曰長松生關內山谷中葉似松葉上有

薺芑長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張

天覺文集云僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮

哀苦不堪忽遇異人教服長松示其形狀明采服

之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代間土人多以

長松雜甘草山藥為湯煎甚佳然本草及方書皆

不載獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此韓愈醫通

云長松產太行西北諸山根似獨活而香

根氣味 甘溫無毒 **主治** 風血冷氣宿疾溫中去風

藏器 治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入

甘草少許水煎服旬日即愈又解諸蟲毒補益長

年時珍

附方

一新

長松酒

滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香

乃酒中聖藥也熟地黃八錢生地黃黃芪蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔製半夏製天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡椒仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒一尊煮一袋審久乃飲韓氏醫通

黃精

別錄上品

校正

併入拾遺救荒草

釋名

黃芝

瑞草

戊己芝

五符

菟竹

別錄

鹿竹

別錄

仙人

餘糧

宏景

救窮草

別錄

米舖

蒙筌

野生薑

蒙筌

重樓

別錄

雞格

別錄龍銜廣雅垂珠頌曰隋時羊公服黃精法云黃精

及一名菟竹時珍曰黃精為服食要藥故別錄列于

草部之首仙家以為芝草之類以其得坤土之精

粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地之涓精故

名為戊己芝是此義也餘糧救窮以功名也鹿竹

菟竹因葉似竹而鹿兔食之也垂珠以子形也陳

氏拾遺救荒草即此也今併為一嘉謨曰根如嫩

薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米舖曰

集解別錄曰黃精生山谷二月采根陰乾宏景曰

而短根似菱蕤蕤根如荻根及菖蒲概節而平

直黃精根如鬼臼黃連大節而平雖燥並柔有

脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉花實皆可

餌服酒散隨宜具在斷穀方中其葉乃與鈎吻相

似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊

遂致死生之反亦為奇事數曰鈎吻真似黃精只

是葉頭尖有毛鉤子二箇若誤服之害人黃精葉
似竹也恭曰黃精肥地生者卽大如拳薄地生者
猶如拊指萎蕤肥根頗同小者肌理形色大都相
似今以鬼臼黃連爲比殊無彷彿黃精葉似柳及
龍膽徐長卿輩而堅其鉤生葉如柿葉殊非
比類藏器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不
如正精正精葉對生鉤吻乃野葛之別名二物殊
不相似不知陶公憑何說此保昇曰鉤吻一名野
葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似柿者當別是
一物頌曰黃精南北皆有以嵩山茅山者爲佳三
月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對
莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀
如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生
薑而黃色二月采根蒸過暴乾用今遇八月采山
中入九蒸九暴作果賣黃黑色而甚美其苗初
生時人多采爲菜茹謂之筆菜味極美江南人說
黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻所產之異耳時珍曰黃
蘇恭言鉤吻蔓生恐南北

精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如萎蕤俗采其苗爍熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青黏是萎蕤見萎蕤發明下又黃精鈎吻之說陶宏景雷斅韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今攷神農本草吳普本草並言鈎吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天姥曰天地所生有食之令人不死者乎天姥曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鈎吻不可食之入口立死人信鈎吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎按此但以黃精鈎吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相似與神農所說鈎吻不合恐當以蘇恭所說爲是而陶雷所說別一毒物非鈎吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見

鈎吻條

根脩治

斲曰凡采得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切暴乾用頰曰羊公服黃精法二月三

月采根入地八九寸爲上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃

正以炒黑黃豆末相和得所捏作餅子如錢大初

服二枚日益之亦可焙乾篩末水服洗曰餌黃精

法取甕子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋

蒸至氣溜卽暴之如此九蒸九暴若生則刺人咽

喉若服生者初時只可一寸半漸增之十日不

食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天

根葉花實皆可食之但以相對者是正不對者名偏精也

氣味甘平無毒

權曰寒時珍曰忌梅實花葉子並同

主治補中益氣

除風溼安五臟久服輕身延年不飢

別錄補五勞七

傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴

食之駐顏斷穀大補諸虛止寒熱填精髓下三尸

蟲

時珍

發明

時珍曰黃精受戊己之涓氣故為補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火既濟

木金交合而諸邪自去百病不生矣神仙芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盈骨髓堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好寶貨百日下中尸名彭矯好五味六十月下尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根為精氣花實為飛英皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延年精煎神錦註云以黃精自然汁拌研細神錦于柳木甌中蒸七日以木蜜丸服之木蜜枳棋也神錦不知是何物或云朱砂也禹錫曰按抱朴子云黃精服其花勝其實服其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗爾非大有力者不能辦

也日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及
亦餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美
易食凶年可與老少代糧謂之米舖也慎微曰徐
鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見
野草枝葉可愛取根食之久久不飢夜息大樹下
聞草中動以為虎攫上樹避之及曉下地其身歘
然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之
不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢
安有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒饌置往來之
路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之
草卽是黃精也

附方

舊一
新四

服食法

聖惠方用黃精根莖不限多少
細剉陰乾搗末每日水調末服

任多少一年內變老爲少久久成地仙臞仙神隱
書以黃精細切一石用水二石五斗煮之自旦至
夕候冷以手接碎布袋榨取汁煎之渣焙乾爲末
同入釜中煎至可丸丸如雞頭子大每服一丸日三

服絕糧輕身除水補肝明目黃精二斤蔓菁子一斤淘

百病渴則飲水錢日二大風癩瘡營氣不清久風

心每米飲下聖惠方鼻壞色敗用黃精入脈因而成癩

服延年益壽聖惠方納粟米飯中蒸至米熟時食之聖濟總錄

虛精氣黃精枸杞子等分搗作餅日乾為末煉蜜

萎蕤音威縷釋名女萎本經上品葳蕤吳普萎苾音威委萎爾雅萎香綱目榮

爾雅玉竹別錄地節別錄時珍曰按黃公紹古今韻

音行錄根長多鬚如冠纓下垂之縷而有威儀故以名之

凡羽蓋旌旗之纓縷皆象葳蕤是矣張氏瑞應圖

云王者禮備則葳蕤生于殿前一名萎香則威儀

之義於此可見別錄作萎蕤有文也說文作萎

音相近也爾雅作委萎字相近也其葉光瑩而象
竹其根多節故有熒及玉竹地節諸名吳普本草
又有烏女蟲蟬之名宋本一
名馬薰卽烏萎之訛者也

正誤

宏景曰本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有
萎蕤而功用正同疑女萎卽萎蕤惟名異爾

恭曰女萎功效故別錄墨書乃萎蕤全別今本經朱書
是女萎功效故別錄墨書乃萎蕤全別今本經朱書

本草女萎萎蕤同傳陶云是一物蘇云二物不同

於中品別出女萎一條然其主霍亂洩痢腸鳴正

與上品萎蕤相合則是更非二物矣頌曰觀古方

書所用胡洽治時氣洞下有女萎丸治傷寒冷下

結腸丸中用女萎治虛勞下痢小黃耆酒中加女

萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍

亂洩痢故也又治賊風手足枯痺四肢拘攣茵蘘

酒中用女萎初虞世治身體癱瘍斑駁有女萎膏

乃似上品本經朱書女萎緣其主中風不能動搖

及去疴好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈

卷之七 萎蕤

甲湯及治腳弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方治風熱項急痛四肢骨肉煩熱有萎蕤飲又主虛風熱發卽頭痛有萎蕤乃似上品別錄墨書萎蕤緣其主虛熱溫毒腰痛故也二者旣別則非一物明矣且萎蕤甘平女萎辛溫安得爲一物時珍曰本經女萎乃爾雅委萎二字卽別錄萎蕤也上古鈔寫訛爲女萎爾古方治傷寒風虛用女萎者卽萎蕤也皆承本草之訛而稱之諸家不察因中品有女萎名字相同遂致費辯如此今正其誤只依別錄書萎蕤爲綱以便尋檢其治洩痢女萎乃蔓草也

條見本

集解

別錄曰萎蕤生太山山谷及邱陵立春後采

采

宏景曰今處處有之根似黃精小異服食家亦

用之

頌曰今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹

強直

似竹筍有節葉狹而長表白裏青亦類黃

精而

多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青

花結圓實時珍曰處處山中有之其根橫生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相值亦可采根種之極易繁也嫩葉及根並可煮淘食茹

根脩治

斲曰凡使勿用黃精並鉤吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃點爲

不同采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

氣味甘平無毒

普曰神農苦桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛之才曰畏鹵鹹

主

治女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足

久服去面黑黧好顏色潤澤輕身不老

本經

萎蕤主

心腹結氣虛熱溼毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚

出別錄時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安

加而用之良

甄權

補中益氣

蕭炳

除煩悶止消渴潤心

肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食無

忌

大明

服諸石人不調和者煮汁飲之

宏景

主風溫自

汗灼熱及勞瘧寒熱脾胃虛乏男子小便頻數失

精一切虛損

時珍

發明

杲曰萎蕤能升能降陽中陰也其用有四主

生黑黓時珍曰萎蕤性平味甘柔潤可食故朱肱

南陽活人書治風溫自汗身重語言難出用萎蕤

湯以之爲君藥子每用治虛勞寒熱疝瘕及一切

不足之證用代參者不寒不燥大有殊功不止于

去風熱溼毒而已此昔人所未闡者也藏器曰陳

壽魏志樊阿傳云青黏一名黃芝一名地節此卽

萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯
 和漆葉為散服主五臟益精去三蟲輕身不老變
 白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胸中
 寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰
 乾用昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽
 百歲也頌曰陳藏器以青黏即葳蕤世無識者未
 敢以為信然時珍曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精
 與此說不同今攷黃精萎蕤性味功用大抵相近
 而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同
 名一名地節與萎蕤同名則二物雖通用亦可
附方 舊一 **服食法** 以二月九月采萎蕤根切碎一石
 新六 接爛布囊榨取汁熬稠其渣曬為末同熬至可丸
 丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脈
 強筋骨治中風溼毒去面皺顏 **赤眼瀉痛** 葳蕤赤
 色久服延年 耀仙神隱書 **赤眼瀉痛** 葳蕤赤
 歸黃連等分煎湯薰 **眼見黑花** 赤痛昏暗甘露湯
 洗 衛生家寶方

服二錢水一盞入薄荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分臥時溫服日一服聖濟總錄小便

卒淋半入滑石二錢分三服太平聖惠方一盤發

熱口乾小便澇用萎蕤五兩煎乳石發熱萎蕤三

草二兩生犀角一兩水四升癩後虛腫小兒癩病

煑一升半分三服聖惠方癩後虛腫產後血氣

前虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤子龍膽茯苓

附錄鹿藥開寶志曰鹿藥甘溫無毒主風血去諸

根並似黃精鹿好食其根時珍曰胡洽居士言鹿

食九種解毒之草此其一也或云即是萎蕤理亦

近之姑附以俟考

附錄委蛇

音威貽別錄曰味甘平無毒主消渴少

氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多

葉而兩兩相值子如芥子時珍
曰此亦似是菱蕤併俟考訪

知母

本經中品

釋名 𧈧母

本經音遲說文作芪

連母

本經

𧈧母

提或作蕤又音貨

母 地參

本經

水參

又名水參須水浚

蕤

爾雅音覃

苳

別 兒草

別錄又名兒踵草女雷女理鹿列韭逢東根野蓼昌支時珍曰宿根之旁初生子根

狀如𧈧蟲之狀故謂之𧈧母
訛為知母蠅母也餘多未詳

集解

別錄曰知母生河內川谷二月八月采根暴乾宏景曰今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至

難死掘出隨生須枯燥乃止禹錫曰按范子云𧈧母出三輔黃白者善郭璞釋爾雅云蕤母也生

山上葉如韭頌曰今瀕河懷衛彰德諸郡及解州潞州亦有之四月開青花如韭花八月結實

本草綱目卷之二十一 知母

根脩治

數曰凡使先於槐砧上剉細燒乾木白杵
搗勿犯鐵器時珍曰凡用揀肥潤裏白者

去毛切引經上行則用酒浸
焙乾下行則用鹽水潤焙

氣味苦寒無毒

大明曰苦甘權曰平元素曰氣寒
味大辛苦氣味俱厚沈而降陰也

又云陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經
氣分時珍曰得黃蘗及酒良能伏鹽及蓬砂

主

治消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣

本經**療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內**

疸多服令人洩

別錄

心煩躁悶骨熱勞往來產後孽

勞腎氣勞憎寒虛煩

甄權

熱勞傳尸疰痛通小腸消

痰止嗽潤心肺安心止驚悸

大明

涼心去熱治陽明

火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥

臭元瀉肺火滋腎水治命門相火有餘好安胎止

子煩辟射工溪毒時珍

發明

權曰知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之泉曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉

無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源

之陰仲景用此入白虎湯治不得眠者煩躁也煩

出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以

清腎之源緩以甘草粳米使不速下也又凡病小

便闕塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生

水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉

肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而

不渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以

化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱

使陰氣行而陽自化小便自通方法詳載木部黃

藥下時珍曰腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食苦以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃蘗條

附方

新舊二久近痰嗽

用自胸膈下塞停飲至於臍臑

豆三十枚去油研勻每服一字用薑三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽宜止壯人

乃用之一方不用久嗽氣急知母去毛切五錢隔

巴豆醫學集成久嗽氣急紙炒杏仁薑水泡去

皮尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸薑湯下

以絕病根鄧妊娠子煩因服藥致胎氣不安煩

筆峯雜興方不得臥者知母一兩洗

焙爲末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下醫者

不識此病作虛煩治反損胎氣產科鄭宗文得此

方於陳藏器本草拾遺中用之
良驗楊歸厚產乳集驗方
之狀用知母二兩爲末蜜丸梧子大
每粥飲下二十九丸陳延之小品方
溪毒知母連根葉搗作散服亦可
一二升夏月出行多取其屑自隨
許投水上流便無畏兼辟射工亦
可煮湯浴之甚佳肘後良方
擦之日三次
衛生易簡方
嵌甲腫痛
知母燒存性研
多能方

肉菴蓉

本經上品

釋名 肉松容 吳普黑司命

吳普時珍曰此物補而不峻故有從容之號從容和

貌 緩之

集解

別錄曰肉菴蓉生河西山谷及代郡鴈門五月五日采陰乾普曰生河西山陰地叢生二

月至八月采宏景曰代郡鴈門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生河南開至多今第一出羹補虛乏極佳亦可生噉味甘出北國者形短隴西形扁黃柔潤多花而味不嘉也恭曰此乃論而少花巴東建平閒亦有而不嘉也恭曰此乃論草蓿蓉也陶未見肉者今人所用亦草蓿蓉刮去花代肉蓿蓉功力稍劣保昇曰出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草蓿蓉四月中旬采長五六寸至一尺以來莖圓紫色大明曰生敦落樹下并土塹上此卽非馬交之處陶說誤爾又有花蓿蓉卽暮春抽苗者力較微爾頌曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝所生今西人去大木閒及土塹垣中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也五月采取恐老不堪故多三月采之震亨曰河西混一之後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者蓋蓿

蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而爲之又以草
蓰蓉充之用者宜審嘉謨曰今人以嫩松梢鹽潤
之偽

脩治

敦曰凡使先須清酒浸一宿至明以稷刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草

樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所

氣味甘微溫無毒

別錄曰酸鹹普曰神農黃帝鹹雷公酸李當之小溫

主治

五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精

氣多子婦人癥瘕久服輕身

本經

除膀胱邪氣腰痛

止痢

別錄

益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治

女人血崩

甄權

男子絕陽不興女人絕陰不產潤五

臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰

痛明

發明

好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經

峻補精血驟用反動大便滑也敦曰強筋健髓以

說出乾靈記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以

酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益

人勝服補藥宗奭曰洗去黑汁氣味皆盡

矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效

附方舊一補益勞傷精敗面黑用菘蓉四兩水煮

四度下五味以米煮合爛薄細切研精羊肉分爲

粥空心食藥性論腎虛白濁肉菘蓉鹿茸山藥

米糊丸梧子大棗湯每汗多便悶老入虛人皆可

下三十丸聖濟總錄

焙二兩研沉香末一兩爲末麻子仁汁打糊
丸梧子大每服七八丸白湯下濟生方消中

易飢肉菘蓉山茱萸五味子爲末蜜丸梧子大每鹽酒下二十九丸醫學指南破傷風

病口禁身強肉菘蓉切片曬乾用一小盞底上衛生總錄

列當宋開寶

釋名栗當開寶草菘蓉開寶花菘蓉日華

集解志曰列當生山南巖石上如藕根初生掘取

暮春抽苗四月中旬採取長五六寸至一尺以來

莖圓白色採取壓扁日乾頌曰草菘蓉根與肉菘

根氣味甘溫無毒主治男子五勞七傷補腰腎令

本草綱目草部 卷十二
人有子去風血煮酒浸酒服之

開寶

附方

舊

陽事不興

栗當好者二斤卽列當搗篩畢以好酒一斗浸之經宿取起隨

性日飲之 咎 般食醫心鏡

鎖陽

補遺

集解

時珍曰鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生鞑靼田野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類

男陽卽肉菹蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於菹蓉也時珍疑此自有種類如肉菹蓉列當亦未必盡是遺精所生也

氣味甘溫無毒主治大補陰氣益精血利大便虛

人大便燥結者啖之可代菘菘羹粥彌佳不燥結
者勿用

震亨

潤燥養筋治痿弱

時珍

本草綱目第十二卷上終

本草綱目草部第十二卷下

草之一 山草類

赤箭

本經上品

天麻

宋開寶

校正

天麻係宋本重出今併為一

釋名

赤箭芝

藥性

獨搖芝

抱朴子

定風草

藥性

離母

本經合

離草

抱朴子

神草

吳普

鬼督郵

本經

弘景曰

赤箭

赤箭亦

是

葉生其端根如人足又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又有鬼箭莖有羽其主療並相似而有益大乖異並非此赤箭也頌曰按抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離

母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之以

做十二辰也去大魁數尺皆有細根如白髮雖相

須而實不相連但以氣相屬爾如菟絲之草下有

伏菟之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤

箭之異陶隱居已云非俗所見菟絲之下有伏菟

亦不聞有見者殆其種類時有神異者而如此爾

時珍曰赤箭以狀而名獨搖定風以性異而名離

母合離以根異而名神草鬼督郵以功而名天麻

即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下

集解 別錄曰赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室

雍州扶風郡志曰天麻生鄆州利州太山嶓山諸

處五月采根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直

上如箭幹莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃

熟其根連一二枚猶如天蓼冬之類形如黃瓜

亦如蘆蕨大小不定彼人多生噉或蒸煮食之今

多用鄆州者佳恭曰赤箭是芝類莖似箭籜赤色

端有花葉赤色遠看如箭有羽四月開花結實似

枯苦楝子核作五六棱中有肉如麩日暴則枯萎

其根皮肉汁大類天蓼冬惟無心脈爾去根五六

寸有十餘子衛之似芋可生噉之無乾服之法頌

曰赤箭今江湖間亦有之然不中藥用其苗如蘇
恭所說但本經云三月四月八月八月八月八月八月
而今方家乃三月四月五月六月七月八月九月十月
與本經參差不同難以兼著故但從今法又曰天
麻今汴京東西湖淮南州郡皆有之春生苗初
出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如箭籜狀青
赤色故名赤箭莖中空依半以上貼莖微有尖
小葉稍頭生穗開花結子如豆粒大其子至夏
不落卻透虛入莖中潛生子內其根形如黃瓜連
生一二十枚大者至重半斤或五六兩其皮黃白
色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內采
初得乘潤刮去皮沸湯畧煮過暴乾收之嵩山衡
山人或取生者蜜煎作果食甚珍之宗奭曰赤箭
天麻苗也與天麻治療不同故後人分爲二條承
曰今醫家見用天麻卽是赤箭根開寶本草又於
中品出天麻一條云出鄆州今之赤箭根苗皆自
齊鄆而來者爲上蘇頌圖經所載天麻之狀卽赤
箭苗之未長大者也赤箭用苗有自表入裏之功

天麻用根有自內達外之理根則抽苗徑直而上
苗則結子成熟而落返從籜中而下至土而生此
粗可識其外內主治之理今翰林沈括最爲博識
常云古方用天麻不用赤箭不用天麻一物也
天麻赤箭本爲一物明矣機曰赤箭天麻一物也
經分爲二以根與苗主治不同也產不同地者各
有所宜也時珍曰本經止有赤箭後人稱爲天麻
甄權藥性論云赤箭一名天麻本自明白宋人
馬志重修本草重出天麻遂致分辨如此沈括筆
談云神農本草明言赤箭采根後人謂其根如箭
疑當用莖蓋不然也譬如鳶尾牛膝皆因莖葉相
似則用其根何足疑哉上天品五芝之外補益上藥
赤箭爲第一世人惑於天麻之說遂止用之治風
良可惜哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天麻
子從莖中落下俗名還筒子其根暴乾肉色堅白
如羊角色呼羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼
醬瓜天麻皆可用者一種形尖而空薄如玄參狀
者不堪用抱朴子云獨搖芝生高山深谷之處所

生左右無草其莖大如手指赤如丹素葉似小莧
根有大魁如斗細者如雞子十二枚繞之人得大
者服之延年按此乃天麻中一種神異者如人參
中之神參也數曰凡使天麻勿用御風草根莖斑葉背白有青點
似只是葉莖不同御風草根莖斑葉背白有青點
使御風草即勿使天麻若同用令人有腸結之患
正誤藏器曰天麻生子平澤似馬鞭草節節生紫花
搗傳癰腫承曰藏器所說乃與赤箭不相干乃別一
物也時珍曰陳氏所說乃一種天麻草是益母草
之類是也嘉祐本草誤引
入天麻下耳今正其誤

脩治

一數曰脩事天麻十兩剉安于瓶中用蒺藜子
敷日脩事天麻十兩剉安于瓶中用蒺藜子

從已至未取出焮焦蓋于天麻上以三重紙封繫
拭上氣汗刀劈焙乾單搗用若御風草亦同此

法時珍曰此乃治風痺藥故如此脩事也若治肝
經風虛惟洗淨以溼紙包於糠火中煨熟取出切

片酒浸一宿焙乾用

赤箭氣味辛溫無毒

志曰天麻辛平無毒大明曰甘暖權曰赤箭芝一名天麻

味甘平無毒好古曰苦平陰中之陽也

主治殺鬼精物蠱毒惡氣久

服益氣力長陰肥健

本經輕身增年消癰腫下支滿

寒疝下血

別錄

天麻主諸風溼痺四肢拘攣小兒風

癰驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年

開寶治

冷氣痛痺癱瘓不隨語多恍惚善驚失志

甄權

助陽

氣補五勞七傷鬼疰通血脈開竅服食無忌

大明

治

風虛眩運頭痛

元素

發明

果曰肝虛不足者宜天麻芎藭以補之其用

麻痺不仁風熱語言不遂時珍曰天麻乃肝經氣

分之藥素問云諸風掉眩皆屬于木故天麻入厥

陰之經而治諸病按羅天益云眼黑頭眩風虛內

作非天麻不能治天麻乃定風草故為治風之神

藥今有久服天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風

之驗也宗奭曰天麻須別藥相佐使然後見其功

仍須加而用之或蜜漬為

果或蒸煮食當深思則得矣

附方 新天麻丸 消風化痰清利頭目寬胸利膈治

倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻鼾

面目虛浮並宜服之天麻半兩芎藭二兩為末煉

蜜丸如芡子大每食後嚼**腰脚疼痛** 天麻半兩夏細

一丸茶酒任下普濟方**腰脚疼痛** 天麻半兩夏細

袋二箇各盛藥令勻蒸熱交互熨痛處

汗出則愈數日再熨 衛生易簡方

赤箭天麻

日

還筒子 主治定風補虛功同天麻

時珍

附方 新益氣固精 補血黑髮益壽有奇效還筒子

故紙酒浸春三夏一秋二冬五日焙研末二兩各

任下鄭西泉所傳

尤 直律反 鄧才雜興方

釋名山薊 楊枹 枹薊 馬薊 山薑 山連

錄吃力伽 其根幹枝葉之形似薑芥也西域謂之

吃力伽 故外臺祕要有吃力伽散揚州之域多種

吳尤是也枹乃鼓槌之名古方二尤通用後人謂之

以大塊紫花爲勝古方所用者皆白朮也宗奭曰蒼朮長如大小指肥實皮色微褐其氣味辛烈須米泔浸洗去皮用白朮粗促色微褐其氣亦微辛苦而不烈古方及本經止言朮不分蒼白二種亦宜兩審時珍曰蒼朮山薊也處處山中苗高二三尺其葉抱莖而生梢間葉似棠梨葉其腳下葉有三五又皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑葉肉白有油膏白朮枴苗可茹葉稍大而毛根如指栽蒔一年卽稠嫩苗如拳者彼人剖開暴乾謂之大狀如鼓槌亦有良言白而肥者是浙朮瘦而削朮亦曰片朮陳自良言昔人用朮不分赤白黃者是幕阜山所出其力劣昔人用朮不分赤白自宋以來始言蒼朮苦辛氣烈白朮苦甘氣和各自施用亦頗有理並以秋采者佳春采者虛軟易壞嵇含南方草木狀云藥有吃力伽卽朮也瀕海所產一根有至數斤者采餌尤良嘉謨曰浙朮俗名雲頭朮種平壤頗肥大由糞力也甚燥白勝于浙俗名狗頭朮雖瘦小得土氣充也

朮寧國昌化池州者
並同歙朮境相鄰也

朮白朮

氣味甘溫無毒

別錄曰甘權曰甘辛梟曰味苦而甘性溫味厚氣薄

陽中陰也可升可降好古曰入手太陽少陰足太

陰陽明少陰厥陰六經之才曰防風地榆爲之使

權曰忌桃李菘菜雀肉青魚嘉謨曰咀後人乳汁

潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊土氣以助

脾也主治風寒溼痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎

也

餌久服輕身延年不飢

本經主大風在身面風眩頭

痛目淚出消痰水逐皮閒風水結腫除心下急滿

霍亂吐下不止利腰臍閒血益津液暖胃消穀嗜

食別錄治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢

除寒熱止嘔逆甄權反胃利小便主五勞七傷補腰

膝長肌肉治冷氣瘕癖氣塊婦人冷癥瘕大明除溼

益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足

脛溼腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃

芩安胎清熱元素理中益脾補肝風虛主舌本強食

則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脈爲

病逆氣裏急臍腹痛好古

發明好古曰本草無蒼白朮之名近世多用白朮

治皮間風止汗消痰補胃和中利腰臍間血
通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣
在血主血無汗則發有汗則止與黃耆同功元素

曰白朮除溼益燥和中補氣其用有九溫中一也
去脾胃中溼二也除胃中熱三也強脾胃進飲食
四也和胃生津液五也止肌熱六也四肢困倦嗜
臥目不能開不思飲食七也止渴八也安胎九也
凡中焦不受溼不能下利必須白朮以逐水益脾
非白朮不能去溼非枳實不能消痞故枳朮丸以
之爲君機曰脾惡溼溼之府氣化則能出焉用白朮
生故曰勝胱者津液之府氣化則能出焉用白朮
以除其溼則氣得
周流而津液生矣

附方

舊七新

枳朮丸

消痞強胃久服令人食自不
停也白朮一兩黃壁土炒過

去土枳實麩炒去麩一兩爲末荷葉包飯燒熟搗

和丸梧子大每服五丸白湯下氣滯加橘皮一

兩有火加黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾

薑五錢木香三錢有食加神麴麥蘖各五錢所
古家枳朮湯寒氣不足則手足厥逆腹滿脅鳴相
珍

逐陽氣不通即肢冷陰氣不通即骨疼陽前通則

惡寒陰前通則痺不仁陰虛則遺尿名曰氣分宜

一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分宜

此主之白朮一兩枳實七個水五升煮三升分三

服胸中軟即散**白朮膏**飲食滋補止久泄痢上好

仲景金匱玉函**白朮膏**白朮十兩切片入瓦鍋內

水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入器內以渣

再煎如此三次乃取前後汁同熬成膏入器中一

夜傾去上面清水收之每服二**參朮膏**治一切脾

三匙蜜湯調下千金良方**參朮膏**胃虛損益

元氣白朮一斤人參四兩切片以流水十五碗浸

以一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏入煉蜜收之每

白朮三兩澤瀉五兩水三升**五飲酒癖**一留飲水

煎一升半分三服梅師方**五飲酒癖**停心下水

癖飲水在兩脅下三痰飲水在胃中四溢飲水在

五臟閒五流飲水在腸閒皆因飲食冒寒或飲茶

過多致此倍尤丸用白朮一斤乾薑炒桂心各半

斤為末蜜丸梧子大每溫水服二三十九丸惠民

和劑四肢腫滿白朮三兩咬咀每服半兩水一盞

局方不拘時候中風口噤升煎取一事白朮四兩酒三

服本方遍身冷直口噤不識一人白朮四兩酒三

方產後中寒瀉一兩生薑五錢水一升煎服兩至

寶頭忽眩運黃土用朮三斤麴三斤搗篩酒和好食

梧子大每飲服二十丸外臺祕要溼氣作痛片煎汁

忌菘菜桃李青魚外臺祕要溼氣作痛片煎汁

葵膏白湯點中溼骨痛服不飲酒以水煎之盞頓

服良集簡方熱血虛者吃力伽散用白朮白茯苓

方煎服婦人肌熱白芍藥各一兩甘草半兩為散薑

棗煎服王小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

燾外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

燾外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

燾外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

燾外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

燾外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能風瘙癢疹

白朮為末酒服方寸面多黥黯雀卵色苦酒漬朮

七日二服千金方寸七脾虛盜汗白朮

方肘後白汗不止白朮末飲服方寸七

四兩切片以一兩同牡蠣炒一兩同石斛炒一兩

同麥麩揀朮為末每服三錢食遠粟米湯下日三

服丹老小虛汗白朮五錢小麥一撮水煮乾去

溪方產後嘔逆別無他疾者白朮一兩二錢生薑

鑑幼心產後嘔逆一別無他疾者白朮一兩二錢生薑

三服婦脾虛脹滿脾氣不和冷氣客于中壅遏

人良方橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每脾虛洩

食前木香湯送下三十丸效指迷方每脾虛洩

瀉白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨為末

心溼瀉暑瀉白朮車前子等分炒為末久瀉滑腸

法溼瀉暑瀉白朮車前子等分炒為末久瀉滑腸

白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩為老小滑瀉

末棗肉拌食或丸服之簡便方瀨湖集簡方老人

常瀉 白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔

下七八十丸 小兒久瀉 脾虛米穀不化不進飲食

黍米大每米飲隨大小服之末薑汁麩糊丸瀉血

萎黃 腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥者

蒸熟搗和乾則入少酒丸 梧子大每孕婦束胎

枳殼麩炒等分為末燒飯丸 梧子大一月一日每

牙齒日長 漸至難食名髓 張銳雞峯備急良方

本草綱目草部 卷之二十一 下 朮

蒼朮釋名

赤朮

別錄

山精

抱朴

仙朮

綱目

山薊

時珍曰

異

者

山之精也服之令人長生辟穀致神仙故有山精
仙朮之號朮有赤白二種主治雖近而性味止發
不同本草不分蒼白亦未可據今將本經并別錄
甄權大明四家所說功用參攷分別各自附方庶
使用者有
所依憑

修治

大明曰用朮以米泔浸一宿入藥宗奭曰蒼
朮辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上粗

皮用時珍曰蒼朮性燥故以糯米泔浸去其油
切片焙乾用亦有脂麻同炒以制其燥者

氣味苦溫無毒

別錄曰甘而微苦性溫而和赤朮甘而辛
白朮

烈性溫而燥陰中陽也可升可降入足太陰
陽明手太陰陽明太陽之經○忌同白朮

主治

風寒溼痺死肌瘰癧作煎餌久服輕身延年不飢

本經主頭痛消痰水逐皮閒風水結腫除心下急痛

及霍亂吐下不止暖胃消穀嗜食別錄除惡氣弭災

疹宏景主大風癘痺心腹脹痛水腫脹滿除寒熱止

嘔逆下泄冷痢甄權治筋骨軟弱疰瘕氣塊婦人冷

氣癥瘕山嵐瘴氣溫疾大明目暖水臟劉完素除溼

發汗健胃安脾治痿要藥李杲散風益氣總解諸鬱

震亨治溼痰留飲或挾瘀血成窠囊及脾溼下流濁

瀝帶下滑瀉腸風時珍

發明宗奭曰蒼朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈古方及本經止言朮未分蒼白只緣陶隱居

言朮有兩種自此人多貴白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮爲最要藥功效尤速殊不詳本草原無白朮之名嵇康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白朮字用宜兩審(杲曰本草但言朮不分蒼白而蒼朮別有雄壯上行之氣能除溼下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之殊其餘主治則同(元素曰蒼朮與白朮主治同但比白朮氣重而體沈若除上溼發汗功最大若補中焦除脾胃溼力少不如白朮腹中窄狹者須用之(震亨曰蒼朮治溼上皆有用狹者須用之(震亨曰蒼朮治溼上皆因傳化失常不得升降病在中焦食氣血六鬱降將欲升之必先降之將欲降之必先升之故蒼朮爲足陽明經藥氣味辛烈強胃健脾發穀之氣能徑入諸經疎洩陽明之溼通行斂滯香附乃陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平(楊士瀛曰脾精不禁小便漏濁淋不止腰背酸疼宜

用蒼朮以斂脾精精生于穀故也宏景曰白朮少
膏可作丸散赤朮多膏可作煎昔劉涓子接取
其精而丸之名守中金丸可作長生頌曰服食多
單餌朮或合白茯苓或合石菖蒲竝擣末但日水
服晚再進久飲之更善今茅山所造朮煎非真也
如飴糖酒調飲之更善今茅山所造朮煎非真也
也陶隱居取其精丸之今乃膏煎恐非真也
慎微曰梁庾肩吾答陶隱居賚朮煎啟云綠葉抽
條紫花標色百邪外禦六府內充山精見書華神
在錄木榮火謝盡采擷之難啟旦移中窮淋漉之
劑又謝朮蒸啟云味重金漿芳踰玉液足使坐致
延生伏深銘感又葛洪抱朴子內篇云南陽文氏
漢末逃難壺山中飢困欲死有人教之食朮遂不
飢數十年乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故朮一
名山精神農藥經所謂必欲長生常服山精是也
時珍曰按吐納經云紫微夫人朮序云吾察草木
之勝速益于己者並不及朮之多驗也
久視遠而更靈山林隱逸得服朮者五嶽比肩又

神仙傳云陳子皇得餌朮要方其妻姜氏得疲病服之自愈顏色氣力如二十時也時珍謹按已上諸說皆似蒼朮不獨白朮今服食家亦呼蒼朮爲仙朮故皆列于蒼朮之後又張仲景辟一切惡氣用赤朮同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言朮能除惡氣弭災疹故今病疫及歲旦人家往往燒蒼朮以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚譫語亡夫之鬼憑之其家燒蒼朮烟鬼遽求去夷堅志載江西一士人爲女妖所染其鬼將別曰君爲陰氣所侵必當暴泄但多服平胃散爲良中有蒼朮能去邪也許叔微本事方云微患飲癖三年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向左臥壯時不覺酒半杯後覺酒止從左下有聲脅痛食減嘈雜飲酒半杯卽止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礪石輩利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣白揣必有澼囊如水之有科白不盈科不行但清

者可行而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡溼而水則流溼莫若燥脾以去溼崇土以填科白乃悉屏諸藥只以蒼朮一斤去皮切片爲末油麻半兩水二瓊研濾汁大棗五十枚煑去皮核搗和丸梧子大每日空腹溫服五十九丸增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除自

附方

舊三新服朮法

烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳

輕捷蒼朮不計多少米泔水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片暴乾慢火炒黃細擣爲末每一斤用蒸過白茯苓末半斤煉蜜和丸梧子大空心臥時熱水下十五丸別用朮末六兩甘草末一兩拌和作湯點之吞丸尤妙忌桃

蒼朮膏

雜興方除

風溼健脾胃變白駐顏補虛損大有功效蒼朮新
 者刮去皮薄切米泔水浸二日一日一換取出以
 井華水浸過二寸春秋五日夏三日冬七日漉出
 以生絹袋盛之放在一半原水中揉洗津液出紐
 乾將渣又搗爛袋盛于一半原水中揉至汁盡為
 度將汁入大砂鍋中慢火熬成膏每一斤入白蜜
 四兩熬二炷香每膏一斤入水澄白茯苓末半斤
 攪勻瓶收每服三匙侵早臨臥各一服以溫酒送
 下忌醋及酸物桃李雀蛤菘菜青魚等物○吳球
 活人心統蒼朮膏治脾經溼氣少食足腫無力傷
 食酒色過度勞逸有傷骨熱用鮮白蒼朮二斤
 浸刮去粗皮曬切以米泔浸一宿取出同溪水一
 石大砂鍋慢火煎半乾去渣再入石南葉三斤刷
 去紅衣楮實子一斤川當歸半斤甘草四兩切同
 煎黃色漉去渣再煎如稀粥乃入白蜜三
 斤熬成膏每服三五錢空心好酒調服
 薩謙齋瑞竹堂方云清上實下兼治內外障服茅
 山蒼朮洗刷淨一斤分為四分用酒醋糯泔童尿

各浸三日一日一換取出洗搗曬燥以黑脂麻同

炒香共爲末酒煑麩方入制蒼朮丸疎風順氣

五十九丸○李仲南永類痛蒼朮一斤洗刮淨分作四

養腎治腰腳溼氣痹痛蒼朮一斤曬乾又分作四分

分用酒醋米泔鹽水各浸三日曬乾又分作四分

用川椒紅苒香補骨脂黑牽牛各一兩同炒香揀

去不用只取朮研末醋糊丸梧子大每服五十蒼

丸空不用鹽酒送下五歲後加沉香末一兩

朮散治風溼常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔

童子小便浸竹刀刮去皮半斤以無灰酒浸半斤以

掘一坑炭火煨赤去炭將浸藥酒傾入坑內卻放

朮在中以瓦器蓋定泥封一宿取出爲末每服一

錢空心溫酒或鹽湯下○萬表積善堂方六制蒼

朮散治下元虛損偏墜莖痛茅山蒼朮刮淨六斤

分作六分一斤倉米泔浸二日炒一斤酒浸二日

炒一斤青鹽半斤炒黃去鹽一斤小茴香四兩炒

黃去苒一斤大茴香四兩炒黃去苒一斤用桑椹

子汁浸二日炒取末為末
每服三錢空溫酒下
胃固真茅山蒼朮刮淨一斤分作四分一分青鹽

分兩炒一分川椒一兩炒一分川棟子一兩炒一分

糊丸小茴香破故紙各一兩炒並揀朮研末酒煮麩

平補固真丹治元臟久虛遺精白濁婦人赤白帶

下崩漏金州蒼朮刮淨一斤分作四分一分川椒

一兩炒一分川棟子一兩炒一分川椒一兩炒一分

末二兩酒洗當歸末二兩炒取淨朮為末入白茯苓

丸梧子大每空鹽酒下三十九丸
虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶

下血崩便血等疾以小茴香食鹽各一兩同炒一

一斤分作四分一分川棟子一兩炒一分川椒一兩

分兩補骨脂各一分兩同炒老酒各半斤同煮乾

肉各一兩同炒為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

焙連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五

固真丹

瑞竹堂方固真丹

固元丹

治元

十丸男以溫酒女以醋湯空心下少陽丹
此高司法方也末王璆百一選方

日刮皮曬乾為末一斤地骨皮溫水洗淨去心曬
研一斤熟桑椹二十斤入薤盆揉爛絹盛壓汁和

末煉蜜和丸赤小豆大每服二十丸無灰酒下
末煉蜜和丸赤小豆大每服二十丸無灰酒下

三服一年變髮返黑三年面交感丹補虛損固精
如童子劉松石保壽堂方人子茅山蒼朮刮

鐵甕城申先生方也久服令人有子氣烏髮此
淨一斤分作四分用酒醋米泔鹽湯各浸七日曬

研川椒紅小茴香各四兩炒研陳米糊和丸梧交
子大每服四十丸空心溫酒下聖濟總錄

加丸一升水降火除百病蒼朮刮淨一斤分作四分
一分破故紙炒黃蘗皮刮淨一斤分作四分

酒炒一分童尿浸炒一分小茴香炒一分生用揀
去各藥只取朮藥為末煉蜜丸梧子大每服

六十丸空心鹽湯下鄧才筆峯雜興方坎離

丸

滋陰降火開胃進食強筋骨去溼熱用蒼朮刮

紙淨一斤分作四分一兩炒一分川芎一兩

炒只取朮研末川藥皮四斤分作四分一兩

一斤取朮研末川藥皮四斤分作四分一兩

次研末和勻煉蜜丸梧子大每服三十丸早用酒

下午用茶晚用白湯**不老丹**補脾益腎服之七十日亦

米泔浸軟切片四斤一兩酒浸焙一斤醋浸焙一斤

斤鹽四兩炒一斤四兩四兩炒赤白首烏各二斤泔

浸竹刀刮切以黑豆紅棗各五升同蒸至豆爛曝

乾地骨皮去骨一斤各取淨末以桑椹汁和成劑

鋪盆內汁高蜜和丸梧子大每空月精華待乾以

石白搗末煉蜜和丸梧子大每空月精華待乾以

此皇甫敬之方也**靈芝丸**治脾腎氣虛添補精髓

王海藏醫壘元戎**靈芝丸**通利耳目蒼朮一斤米

泔水浸春夏末棗肉蒸和丸梧子大每服三五十

切曬石白為末棗肉蒸和丸梧子大每服三五十

丸棗湯空服補脾滋腎生精強骨真仙方也

水漂澄澄取底用脂麻二升半去殼研爛絹袋濾去

渣澄漿拌朮暴乾每服三錢米湯或酒空心調服

孫氏集**面黃食少**一男婦面無血色食少嗜臥蒼朮

效方**面黃食少**一斤熟地黃半斤乾薑炮各一

兩春秋七錢夏五錢為末糊丸梧子乾薑炮各一

大每溫水下五錢為末濟生拔萃方**小兒癖疾**朮

四兩為末羊肝一具竹刀批開撒朮末線**食生米**

縛入砂鍋煮熟搗作丸服生腸胃遂至生蟲久則

男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂至生蟲久則

好食生米否則終日不樂至憔悴黃不思飲食

以害其生用蒼朮米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅

丸梧子失每服五丸食前米飲下日三服益昌

伶人劉清嘯一娼名曰花翠年逾笄病此惠民局

監趙尹以此治之兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受

溼則穀不磨而成此疾蒼朮能去溼**腹中虛冷**不

暖胃消穀也楊氏家藏經驗方

暖胃消穀也楊氏家藏經驗方

暖胃消穀也楊氏家藏經驗方

暖胃消穀也楊氏家藏經驗方

飲食食輒不消羸弱生病米二斤麩一斤炒為末

蜜丸食輒不消羸弱生病乾薑三兩腹加當歸三兩脾溼水瀉注下困弱

羸弱加甘草二兩不化腹痛甚者淡桂二錢每服一兩水一盞半煎一盞溫服脈弦

頭微痛去芍藥加防暑月暴瀉壯脾溫胃飲食所

風二兩保命集炒蒼朮米泔浸一夜焙等分為末糊丸飢瀉久

子大每服三五丸痢子椒朮丸每服二蒼朮丸食前溫水下惡痢久者加桂

保命脾溼下血蒼朮二盞煎一盞食前一兩分作二服水

以此下桃花腸風下血蒼朮不拘多少以阜角接

丸保命集末麩糊丸如梧子大每服五丸溼氣身痛蒼朮

空心米飲下日三服婦人良方溼氣身痛

切水煎取濃汁熬膏補虛明目
白湯點服簡便方
健骨和血蒼朮
浸四兩熟地黃焙

二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒
下三五十九日三服普濟方
青盲雀目
方聖惠

蒼朮四兩泔浸一夜切焙研末每服三錢豬肝三
兩批開摻藥在內紮定入粟米一合水一碗砂鍋

煑熟熏眼臨臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治
又方不計時月久近用蒼朮二兩泔浸焙搗為末

每服一錢以好羊子肝一斤竹刀切破摻藥在
內麻紫以粟米泔煮熟待冷食之以愈為度
眼

目昏濇
兩為末每服一錢茶酒任下
聖惠方
各二

嬰兒目濇
將藥氣熏眼後更嚼取汁與服妙
幼

幼新風牙腫痛
末蒼朮鹽水浸過燒存性研
書
臍蟲怪

病腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行遶身匝癢
難忍撥掃不盡用蒼朮濃煎湯沐之仍以蒼朮

本草綱目卷之二十一 狗脊

本草綱目卷之二十一
未入麝香少許水調
服夏子益奇疾方

苗主治作飲甚香去水景宏亦止自汗

狗脊

本經
中品

釋名強脊

別錄

扶筋

別錄

百枝

本經

狗青

吳普恭曰此藥
苗似貫眾根長

多歧狀如狗之脊骨而肉作青綠色故以名之時

珍曰強脊扶筋以功名也別錄又名扶蓋乃扶筋

之誤本經狗脊一名百枝別錄草薺一名赤節而

吳普本草謂百枝為草薺赤節為狗脊皆似誤也

集解

別錄曰狗脊生常山川谷二月八月采根曝

根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端

圓青赤皮白有赤脈宏景曰今山野處有之與

菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直

上有刺葉圓有赤脈根凸凹龍嵒如羊角強細者

是頌曰今太行山溜溫眉州亦有之苗尖細碎青
色高一尺以來無花其莖葉似貫眾而細其根黑
色長三四寸多歧似狗之脊骨大有兩指許其肉
青綠色春秋采根暴乾今方亦有金毛者陶氏
所說乃有刺葦非狗脊也今江左俗猶用之
曰凡使狗脊勿用透山藤根形狀一般只是入頂
苦不可餌也時珍曰狗脊有二種一種根黑色如
狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細
而葉花兩兩對生正似大葉蕨比貫眾葉有齒面
背皆光其根大如搦指有硬黑鬚簇之吳普陶宏
景所說根苗皆是拔蕨蘇恭蘇頌所說卽真狗脊
也按張揖廣雅云拔蕨狗脊也張華博物志云拔
蕨與葦蘇相亂一名狗脊觀此則昔人以蕨莖爲
狗脊相承之誤久矣然拔蕨葦蘇狗脊三者形狀
雖殊而功用亦不甚相遠

根脩治

數曰凡修事火燎去鬚細剉了酒浸一夜
蒸之從巳至申取出曬乾用時珍曰今人

惟剉炒去毛鬚用

氣味苦平無毒

別錄曰甘微溫普曰神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李當

之小溫權曰苦辛微熱之才曰草薺爲之使惡敗醬莎草

主治腰背強關機緩

急周痺寒溼膝痛頗利老人

本經

療失溺不節男女

腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子

傷中關節重

別錄

男子女人毒風軟腳腎氣虛弱續

筋骨補益男子

甄權

強肝腎健骨治風虛

時珍

附方新男子諸風

四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛蘇木葶薺川烏頭生

用等分爲末米醋和丸梧子大每室女白帶

虛衝任服二十丸溫酒鹽湯下普濟方

鹿茸丸用金毛狗脊燎去毛白蘇各一兩鹿茸酒
蒸焙二兩爲末用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大
每服五十丸空方固精強骨金毛狗脊遠志肉白
溫酒下濟生方
末煉蜜丸梧子大每酒病後足腫但節食以養胃
服五十丸
湯漬洗
吳綬蘊要

貫眾
本品經

釋名貫節經本貫渠經本百頭本經又名草鴟頭別黑
綱鳳尾草圖經時珍曰此草葉莖如鳳尾其

狗脊目綱鳳尾草根一本而眾枝貫之故草名鳳尾其

根名貫眾貫節貫渠者魁也吳普本草作貫中
俗名貫仲管仲者皆謬稱也爾雅云灤音灼貫眾
卽此也別錄一名伯萍一名藥藻皆字訛也金星
草一名鳳尾草與此同名宜互考之弘景曰近道

本草綱目卷之二十一貫眾

皆全似老鴨頭故呼為草鴨頭

集解

月別錄曰貫眾生玄山谷及冤句少室山二

莖有黑毛叢生冬夏不死四月花白七月實黑聚

似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草

郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大

如蕨莖幹三稜葉綠色似雞翎又名鳳尾草其根

紫黑色形如犬爪下有一黑鬚毛又似老鴨郭璞

貫節是矣時珍曰多生山陰近水處數根叢生一

之葉而無鋸齒青黃色面深背淺其根曲而有

尖嘴黑鬚叢簇亦似狗脊根而大狀如伏鴨

根氣味苦微寒有毒

為之才曰藿菌赤小豆

主治腹

中邪熱氣諸毒殺三蟲

經本

去寸白破癥瘕除頭風

止金瘡

別錄

為末水服一錢止鼻血有效

蘇頌

治下血

崩中帶下產後血氣脹痛斑疹毒漆毒骨哽解豬

病

時珍

發明

時珍曰貫眾大治婦人血氣根汁能制三黃

海藏治夏月痘出不快快斑散用之云貫眾有毒而能解腹中邪熱之毒病因內感而發之於外者

多效非古法之分經也又黃山谷煮豆帖言荒年以黑豆一升按淨入貫眾一斤剉如散子大同以

水煮文火斟酌至豆熟取出日乾覆令展盡餘汁

葉有貫眾每日常空心嚼豆五七粒能食百草木枝食鯉魚玉蟬羹為肋肉所哽凡藥皆不效或令以

貫眾濃煎汁一蓋分三服連進至夜一啞而出亦可爲末水服一錢觀此可知其軟堅之功不但治血治瘡而已也

附方

新十五

鼻衄不止

貫眾根末水服

普濟方

諸般下血

腸風

酒痢血痔鼠痔下血黑狗脊黃者不用須內肉赤

色者卽本草貫眾也去皮毛剉焙爲末每服二錢

空心米飲下或醋糊丸梧子大每米飲下三四

丸或燒存性出火毒爲末入麝香少許米飲服二

錢普**女人血崩**貫眾半兩集簡方**產後亡血**過

濟方徹痛者用貫眾狀如刺蝟者一個全用不剉

心腹去毛及花萼以好醋蘸溼慢火炙令香熟候

只揉末米飲空人心每服**赤白帶下**療者用上方治

冷爲甚效飲婦人良方

二錢甚效飲婦人良方

湯之亦驗名獨聖**年深欬嗽**出膿血貫眾蘇方木等

方同上方

薑三片 煎服 日二服 久欬漸成勞瘵 痘瘡不快

鳳尾草 為末 用魚鮮 蘸食之 聖惠方 草各五分

快斑散 用貫眾 赤芍 藥各一錢 升麻 甘草 各五分

入淡竹葉 三片 水一盞 半煎七分 溫服 王海藏

方頭瘡 白禿 貫眾 白芷 為末 油調塗之 聖惠方 漆瘡

作癢 油調 貫眾 末塗 雞魚骨 哽 分 為粗末 綿包少

許含之 燕汁 久則 隨 解輕粉 毒 齒縫 出血 臭腫 貫

痰自出 普濟方 血痢 不止 眾黃 連 各半 兩 煎

水入冰片 少許 時時 漱 眾 鳳尾草 根 卽 貫

之 陸氏 積德 堂方 便毒 腫痛 貫眾 酒服 二錢 煎酒服

陳解元 吉言 所 便毒 腫痛 貫眾 酒服 二錢 煎酒服

傳 集簡方 便毒 腫痛 貫眾 酒服 二錢 煎酒服

花主治惡瘡令人洩錄別

巴戟天 本經上品

釋名不凋草日華三蔓草時珍曰名義殊不可曉

集解別錄曰巴戟天生巴郡及下邳山谷二月八

狀如牡丹而細外赤內黑不用之打去心恭曰其苗

俗名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠宿根青

色嫩根白紫用之亦同以連珠多肉厚者為勝大

明曰紫色如小念珠有小孔子堅硬難擣宗奭曰

巴戟天本有心乾縮時偶自落或抽去故中心或

空非自有小孔也今人欲要中閒紫色則多偽以

大豆汁沃之不可不察頌曰今江淮河東州郡亦

有但不及蜀州者佳多生山林內地生者葉似

麥門冬而厚大至秋結實今方家多以紫色為良

蜀人云都無紫色者采時或用黑豆同煮欲其色

紫殊失氣味尤宜辨之又有一種山葎根正似巴

戟但色白土人采得以醋水煮之乃以雜巴戟莫

能辨也但擊破視之中紫而鮮潔者偽也真巴戟

紫又有微白糝有粉色而理小暗者真也真巴戟

嫩時亦白乾時亦煮
治使紫力劣弱耳

根修治

數曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟
漉出再酒浸一伏時漉出同菊花熬焦黃

去菊花以布拭乾用時珍曰今法惟以酒浸一
宿剉焙入藥若急用只以溫水浸軟去心也

氣味辛甘微溫無毒

大明曰苦之才曰覆盆子
爲之使惡雷丸丹參朝生

治大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志

益氣

本經療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞

益精利男子

別錄治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣

治風癩

甄權治一切風療水脹日華治腳氣去風疾補

血海

時珍出仙經

發明

好古曰巴戟天醫經血分藥也權曰病人虛損加而用之宗奭曰有人嗜酒日須五七盃

後患腳氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米不用大黃一兩剉炒同為末熟蜜丸溫

水服五七丸仍禁酒遂愈

附錄

巴棘 別錄曰味苦有毒主惡疥瘡出蟲生高地葉白有刺根連數十枚一名女木

遠志

本品經上品

釋名 苗名小草

本經細草 棘菀 蔓繞 本經時珍

之能益智強志故有遠志之稱世說載謝安云處則為遠志出則為小草記事珠謂之醒心杖

集解

別錄曰遠志生太山及冤句川谷四月采根葉陰乾弘景曰冤句屬兗州濟陰郡今此藥

猶從彭城北蘭陵來用之去心取皮一斤止得三兩爾亦入仙方用小草狀似麻黃而青志曰莖葉

似大青而小比之麻黃陶不識也禹錫曰按爾雅云蔓繞棘蕘郭璞注云今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草頌曰今河陝洛西州郡亦有之根形如蒿根黃色苗似麻黃而青又如畢豆葉亦有似大青而小者三月開白花根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處商州出者根乃黑色俗傳夷門出者最佳四月采根曬乾古方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草時珍曰遠志有大葉小葉二種陶宏景所說者小葉也馬志所說者大葉也大葉者花紅

根脩治

用甘草湯浸一宿暴乾或焙乾用仍

氣味苦溫無毒

之才曰遠志小草得茯苓冬葵子

景曰藥無齊蛤恐是百合也權曰是蟻

主治欬逆

傷中補不足除邪氣利九竅益智耳目聰明不

忘強志倍力久服輕身不老

本經

利丈夫定心氣止

驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃

別錄

殺天

雄附子烏頭毒煎汁飲之

之才

治健忘安魂魄令人

不迷堅壯陽道

甄權

長肌肉助筋骨婦人血噤失音

小兒客忤

日華

腎積奔豚

好古

治一切癰疽

時珍

葉主治益精補陰氣止虛損夢洩

別錄

發明

好古曰遠志經氣分藥也時珍曰遠志入足少陰腎經非心經藥也其功專於強志益

精治善忘蓋精與志皆腎經之所藏也腎經不足則志氣衰不能上通于心故迷惑善忘靈樞經云腎藏精精合志腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭又云

人之善忘者上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺
虛則營衛留於下久之不以時上故善忘也陳
言三因方遠志酒治癰疽云有奇功蓋亦補腎之
力爾葛洪抱朴子云陵陽子仲服遠志二十年有
子三十七人開書
所視記而不忘

附方

新舊三心孔惛塞

多忘善誤丁酉日密自至市
買遠志着巾角中還爲末服

之勿令人知

胸痹心痛

逆氣膈中飲食不下小草
丸用小草桂心乾薑細辛

蜀椒炒出汗各三兩附子二分

炮六物搗下篩蜜和
丸梧子大先食米汁下三丸日三服不知稍增以

知爲度忌豬肉冷水生

喉痹作痛之涎出爲末吹

葱菜范汪東陽方

喉痹作痛之涎出爲末吹

直指腦風頭痛不可忍

遠志末吹乳腫痛遠志焙

方二錢以滓傅一切癰疽

遠志酒治一切癰疽發背

之袖珍方一切癰疽

癰毒惡喉侵大有死血陰

本草綱目卷下 遠志 百脈根 三

毒在中則不痛傳之即痛有憂怒等氣積怒攻則
 痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不
 可近傳之即清涼或氣虛冷潰而不斂傳之即斂
 此本韓大夫宅用以救人方極驗若七情內鬱不
 問虛實寒熱治之皆愈用遠志不以多少米泔浸
 洗搥去心為末每服三錢溫酒一盞調澄少頃飲
 其清以滓傳患小便赤濁遠志甘草水煮半斤茯
 處三因方神益智仁各二兩為末
 酒糊丸梧子大每空心棗
 湯下五十丸普濟良方

百脈根

唐本草

集解

恭曰出肅州巴西葉似苜蓿花黃根如遠志

根肅州歲貢之千金外臺大方中亦時
 用之今不復聞此或者名稱又不同也

根氣味苦微寒無毒主治下氣止渴去熱除虛勞

補不足酒浸或水煮丸散兼用

唐本

淫羊藿

本經中品

釋名

仙靈脾

唐本

放杖草

華日

棄杖草

華日

千兩金

華日

乾

雞筋

華日

黃連祖

華日

三枝九葉草

華日

剛前

華日

本經

弘景

人好爲陰陽西川北部有淫羊一曰百遍合蓋食
此藿所致故名淫羊藿時珍曰豆葉曰藿此葉似
之故亦名藿仙靈脾千兩金放杖剛前皆言其功
力也雞筋黃連祖皆因其根形也柳子厚文作仙
靈毗入臍曰毗此
物補下於理尤通

集解

別錄曰

淫羊

藿生上郡陽山山谷恭曰所在

皆葉形似小豆而圓薄莖細亦堅俗名仙

靈脾是也頌曰江東陝西泰山漢中湖湘間皆有

之莖如粟稈葉青似杏葉上有刺根紫色有鬚四

淫羊藿

月開白花亦有紫花者碎小獨頭子五月采葉曬
 乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似
 黃連關中呼為三枝九葉草苗高一二尺許根葉
 俱堪用蜀本草言生處不聞水聲者良時珍曰生
 大山中一根數莖莖粗如線高一二尺一莖三極
 一極三葉葉長二三寸如杏葉及豆藿面光背淡
 甚薄而細齒有微刺

根葉修治

敦曰凡使時呼仙靈脾以夾刀夾去葉
 四畔花枝每一斤用羊脂四兩拌炒待

脂盡為度

氣味辛寒無毒

普曰神農雷公辛李當之小寒權

曰甘香微辛溫之才曰薯蕷紫芝為之使得酒良

主治陰痿絕傷莖中痛

利小便益氣力强志

本經 堅筋骨消癰癰赤癰下部

有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子

別錄機曰無子字誤當作有子

丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人昏耄中年健

忘一切冷風勞氣筋骨攣急四肢不仁補腰膝強

心力

大明

發明

時珍曰淫羊藿味甘氣香性溫不寒能益精氣乃手足陽明三焦命門藥也眞陽不足者

宜之

附方

舊三新五

仙靈脾酒

益丈夫興陽理腰膝冷用淫羊藿一斤酒一斗浸三日逐

時飲之

偏風不遂

皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙

食醫心鏡

不津器中用無灰酒二升浸之重封春夏三日秋

冬五日

後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡再

合無不效驗合時切忌三焦欬嗽不腹滿不飲食氣

雞犬婦人見聖惠方末煉蜜丸目昏生翳靈

盆子五味子炒各一兩為末煉蜜丸目昏生翳靈

梧子大每薑茶下二十丸聖濟錄末病後青盲

脾生王瓜即小栝樓紅色者等分為末病後青盲

每服一錢茶下日二服聖濟總錄為末病後青盲

日近者可治仙靈脾一兩淡豆豉一百粒小兒雀

水一盃半煎一盃頓服即瘳百一選方小兒雀

目仙靈脾根晚蠶蛾各半兩炙甘草射干各二錢

仙茅 宋開寶

湯下每服五分米牙齒虛痛頻漱大效奇效方

釋名獨茅

開寶

茅瓜子

開寶

婆羅門參

久服

輕身故名

仙茅梵音呼爲河輪勒陁頌曰其根獨生始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗故今江南呼爲婆羅門參言其功補如人參也

集解

頌曰仙茅生西域葉似茅其根粗細有節或如筆管有節文理黃色多涎自武城來蜀中

諸州亦皆有之今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟腹畧闊面有縱文又似初生櫻欄秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色二月八月采根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子時珍曰蘇頌所說詳盡得之但四五月中抽莖四五寸開小花深黃色六出不似卮子處處大山中

有之人惟取梅嶺者用而會典成都歲貢仙茅二十一斤

根修治

數曰采得以清水洗刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大以生稀布袋盛於烏豆水

本草綱目 卷二十一
中浸一宿取出用酒泔溼蒸之從已至亥取出暴
乾勿犯鐵器及牛乳斑人鬢鬚大明曰彭祖單服
法以竹刀刮切糯米泔浸
去赤汁出毒後無妨損

氣味辛溫有毒

珣曰甘微溫有小毒又曰辛平
宣而復補無大毒有小熱小毒

主

治心腹冷氣不能食腰腳風冷攣痺不能行丈夫

虛勞老人失溺男子益陽道久服通神強記助筋

骨益肌膚長精神明目

開寶

治一切風氣補暖腰腳

清安五臟久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明耳

目填骨髓

李珣

開胃消食下氣益房事不倦

大明

發明

頌曰五代唐筠州刺史王顏著續傳信方因
國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方當時盛

行云五勞七傷明目益筋力宜而復補云十斤乳
石不及一年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時
開元傳天寶亂方書散上都僧不空三藏
禁方不傳與司徒李勉尙書路嗣供給事齊
始得此方封服之皆得力尙書路久服金石無效得
僕射張建封服之皆得力尙書路久服金石無效得
此藥其益百倍齊給事守晉雲日少氣力風疹繼
作服之遂愈入九月採得竹刀刮去黑皮切如豆
粒米泔浸兩宿陰乾搗篩熟蜜丸梧子大每日常
心酒飲任便下二五丸忌鐵器禁食牛乳及黑牛
肉大減藥力機曰五臺山有仙茅患大風者服之
多瘡時珍曰按許真君書云仙茅久服長生其味
甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能養骨滑能養
膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也又范成大虞
衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化爲
筋不復有血肉食之補人名乳羊沈括筆談云夏
文莊公稟賦異於人但睡則身冷如逝者既覺須
令人溫之良久乃能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知

紀極弱觀此則仙茅蓋亦性熱補三焦命門之藥也
惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛
者服之反能動火按張杲醫說云一人中仙茅毒
舌脹出口漸大與扇齊因以小刀斨之隨破隨合
斨至百數始有血一點出曰可救矣煑大黃朴消
與服以藥摻之應時消縮此皆火盛性淫之人過
服之害也弘治閒東海張弼梅嶺仙茅詩有使君
昨日纔持去今日人來乞墓銘之句皆不知服食
之理惟藉藥縱恣以速
其死者於仙茅何尤

附方

新仙茅丸

壯筋骨益精神明目黑髮鬚仙茅

浸三日刮皮焙乾取一斤蒼朮二斤赤水夏浸
五日刮皮焙乾取一斤枸杞子一斤車前子十二
兩白茯苓去皮茴香炒柏子仁去殼各八兩生地
黃焙熟地黃焙各四兩爲末酒煑糊丸如梧子大
每服五十丸食前溫酒定喘下氣補心腎神祕散
下日二服聖濟總錄

米泔浸三宿曬炒團參二錢半阿膠一兩半炒雞
臍脰一兩燒爲末每服二錢糯米飲空心下日二

服因方三

玄參

本經
中品

釋名黑參

綱目

玄臺

吳普

重臺

本經

鹿腸

吳普

正馬

別錄

逐馬

藥性馥草

開寶

野脂麻

綱目

鬼藏

吳普

時珍

曰玄

黑

色也

一名

咸

多

未詳弘景曰其莖微似人參故得參

名志曰合香家用之故俗呼馥草

集解

別錄

曰玄

參

生河

間川

谷及

冤

句三

月四

月

生

苗其

葉

有毛

四四

相

值似

芍藥黑莖莖方高四五尺葉亦
生枝間四月實黑弘景曰今出近道處處有之莖

似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合
香恭曰玄參根苗並臭莖亦不似人參未見合香

志曰其莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾卽紫黑色新者潤膩陶云莖似人參蘇言根苗並臭似未深識頌曰二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一五七枚三月八月采暴乾或云蒸過日乾時珍曰今用玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以爲臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種

根修治

數曰凡采得後須用蒲草重重相隔入甌蒸兩伏時曬乾用勿犯銅器餌之噎人喉

喪人目

氣味苦微寒無毒

別錄曰鹹普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒元素曰足

少陰腎經君藥也治本經須用之才**主治腹中寒**日惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目本經主暴

中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒

血瘦下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰

腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益精

別錄熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤癭癰癥甄權

治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣止健忘

消腫毒大明滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯

時珍

發明元素曰玄參乃樞機之劑管領諸氣上下清

肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒

陽毒汗下後毒不散及心下懊懽煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用玄參以此論之治胃中氤氳之

氣無根之火當以玄參為聖劑也時珍曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法宜壯水以制

火故玄參與地黃同功其消癭癧亦是散火劉守真言結核是火病

附方 舊二 諸毒鼠瘦 玄參 酒日日飲 年久癭癧

生玄參搗傅之日 赤脈貫瞳 玄參為末以米泔煮

濟急 發斑咽痛 玄參升麻湯用玄參升麻甘草各

仙方 發斑咽痛 玄參升麻湯用玄參升麻甘草各

陽活 急喉痹風 不拘大人小兒玄參鼠黏子半生

人書 急喉痹風 不拘大人小兒玄參鼠黏子半生

癩 聖 鼻中生瘡 玄參末塗之或以水浸 三焦積

惠方 鼻中生瘡 玄參末塗之或以水浸 三焦積

熱 玄參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每

服 玄參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每

小腸疝氣

黑參酒服出汗即效為丸每服一錢半空心燒

香治癆

一斤和勻入瓶中封閉地中埋罽十日取出

出更用炭末六兩煉蜜六兩同和入瓶更罽五日取出

取出燒之常令聞香疾自愈頌曰初入瓶中封固

地榆

本經中品

校正

併入別錄有

釋名玉豉

酸赭

弘景曰其葉似榆而長初生布

又名玉豉時珍曰按外丹方言地榆一名酸赭其

味酸其色赭故也今蘄州俚人呼地榆為酸赭又

訛赭為棗則地榆酸赭為一物甚明其主治

之功亦同因併別錄有名未用酸赭為一云

集解別錄曰地榆生桐柏及冤句山谷二月八月

今處處平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如榷子紫黑色根外黑裏紅似柳根弘景曰其根亦入釀酒方道家燒作灰能爛石故煮石方用之其葉山人乏茗時采作飲亦好又可燻茹

根氣味苦微寒無毒

別錄曰甘酸權曰苦平元素曰氣微寒味微苦氣味俱薄

其體沈而降陰中陽也專主下焦血果曰味苦酸性微寒沈也陰也之才曰得髮良惡麥門冬伏丹砂雄黃
主治婦人乳產痙痛七傷帶下五漏止痛

止汗除惡肉療金瘡

本經
止膿血諸癭惡瘡熱瘡補

絕傷產後內塞可作金瘡膏消酒除渴明目

別錄
止

冷熱痢疳痢極效

開寶

止吐血鼻衄腸風月經不止

血崩產前後諸血疾并水瀉

大明

治膽氣不足

李杲汁

釀酒治風痺補腦擣汁塗虎犬蛇蟲傷

時珍

酸赭味

酸主內漏止血不足

別錄

發明

頌曰古者斷下多用之炳曰同樗皮治赤白痢宗奭曰其性沈寒入下焦若熱血痢則可

用若虛寒人及水瀉白痢卽未可輕使時珍曰地榆除下焦熱治大小便血證止血取上截切片炒用其梢則能行血不可不知楊士瀛云諸瘡痛者加地榆癢者加黃芩

附方

舊八新六

男女吐血

地榆三兩米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合

聖惠

婦人漏下

赤白不止令人

血痢不止

地榆曬研每服

二錢摻在羊血上炙熟食之以捻頭煎湯送下一方以地榆煮汁作飲每服三合

赤白

下痢 骨立者地榆一斤水三升煮一升半去滓再
煎如稠餈絞濾空腹服三合日再服 崔元

亮海 **久病腸風** 痛癢不止地榆五錢蒼朮一兩水
上方 二鍾煎一鍾空心服日一服 活

法機 **下血不止** 二十年者取地榆鼠尾草各二兩
水二升煮一升頓服若不斷以水

漬屋塵飲一小盃 **結陰下血** 腹痛不已地榆四兩
投之 肘後方 炙甘草三兩每服五

錢水一盞入縮砂四七枚煎 **小兒疳痢** 地榆煮汁
一盞半分二服 宣明方 葵如飴糖

與服便已 **毒蛇螫人** 新地榆根搗汁飲兼 **虎犬咬**
肘後方 以漬瘡 肘後方

傷 地榆煮汁飲并為末傅之亦可為 **代指腫痛** 地
末白湯服日三忌酒 梅師方

愈 汁漬之半日 **小兒溼瘡** 地榆煮濃汁日洗 **小兒**
干金方 二次 壬金方

面瘡 焮赤腫痛地榆八兩水一斗煎 **養白石法** 七
五升溫洗之 衛生總微方 月

七日取地榆根不拘多少陰乾百日燒爲灰復取
生者與灰合搗萬下灰三分生末一分合之若石
二三斗以水浸過三寸以藥入水攪之
煑至石爛可食乃已 曜仙神隱書

葉主治作飲代茶甚解熱

蘇恭

丹參

本經上品

釋名赤參

別錄

山參

日華

郟蟬草

本經

木羊乳

吳普

逐馬

景弘

奔馬草

時珍曰

五參

五色配

五臟

故人參入脾曰

玄參

入腎曰

黑參

壯蒙入肝曰

紫參

丹參入心曰

赤參其苦參則右
腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義

爾炳曰丹參治風軟脚可逐奔
馬故名奔馬草曾用實有效

集解

別錄曰

丹參

生桐柏川

谷及

太山

五月

采根

暴乾

宏景曰

此桐柏在義陽是淮水發源之

山非江東臨海之桐柏也今近道處處有之莖方有毛紫花時人呼爲逐馬普曰莖葉小房如荏有毛根赤色四月開紫花二月五月采根陰乾頌曰今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖方有稜青色葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花成穗紅紫色似蘇花根赤色大者如指長尺餘一苗數根恭曰冬采者良夏采者虛惡時珍曰處處山中有之一枝五葉葉如野蘇而尖青色皺皮小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫

根氣味苦微寒無毒普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯鹹李當之**大寒**宏

景曰久服多眼赤故應性熱今云微寒**主治心腹**恐謬也權曰平之才曰畏鹽水反藜蘆

邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩

滿益氣本**養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除**

風邪留熱久服利人

別錄

漬酒飲療風痺足軟

宏景

主

中惡及百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精

甄權

養神定志通利關脈治冷熱勞骨節疼痛四肢不

遂頭痛赤眼熱溫狂悶破宿血生新血安生胎落

死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻血邪心煩惡

瘡疥癬癭贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉

大明

血通心包絡治疝痛

時珍

發明

時珍曰丹參色赤味苦氣平而降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也

按婦人明理論云四物湯治婦人病不問產前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之

崩中帶下調經脈其功大類當歸地黃芎藭芍藥
相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死胎止
也故

附方 舊三丹參散 治婦人經脈不調或前或後或

不下兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼用丹參洗淨
切曬為末每服二錢溫酒調下 婦人明理方

落胎下血 丹參十二兩酒五升煮取三升溫服寒

疝腹痛 小腹陰中相引痛白汗出欲死以丹參一

小兒身熱 汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒

驚癇發熱 丹參摩膏用丹參雷丸各半兩豬膏

錄以摩兒身上日婦人乳癰 丹參白芷芍藥各二兩
三次 千金方 丹參同煎七上七下瀝去滓盛之每

半斤微火煎成膏去滓
傳之孟誥必效方
熱油火灼除痛生肌丹參

調取羊脂二斤煎三上三
下以塗瘡上肘後方

紫參

本經中品

釋名 牡蒙

本經

童腸

別錄

馬行

別錄

眾戎

別錄

五鳥花

綱目

曰紫參王孫並有牡蒙之名古方所用牡蒙多是
紫參也按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連萼狀
如飛禽羽舉故

俗名五鳥花

集解

別錄曰紫參生河西及冤句山谷三月采根
火炙使紫色普曰紫參一名牡蒙生河西或

商山團聚生根黃赤有文皮黑中紫五月花紫赤
實黑大如豆宏景曰今方家皆呼為牡蒙用之亦
少恭曰紫參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉
紅白肉淺皮深所在有之長安見用者出蒲州牡

蒙乃王孫也葉似及己而大根長尺餘皮肉亦紫
 色根苗不相似頌曰今河中晉解齊及淮蜀州郡
 皆有之苗長一二尺莖青而細其葉青似槐葉亦
 有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫而
 似水菘者根淡紫黑色如地黃狀肉紅白色肉淺
 而皮深三月采根炙紫色又云六月采曬乾用
 時珍曰紫參根乾紫色肉帶紅白狀如小紫草
 范子計然云紫參出三輔有三色以青赤色為善

根氣味苦寒無毒

別錄曰微寒普曰牡蒙神農黃
 帝苦李當之小寒之才曰畏辛

夷 主治心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便

本經

療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴

益精別錄治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通

甄權

主狂瘧癰瘡歟血汗出

好古

治血痢

好古

牡蒙治金瘡

破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除腳腫發陰

瘍

蘇恭

發明

時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沈也入足厥陰之經肝臟血分藥也故治諸血病及

寒熱瘧癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏喙丸所用牡蒙即此物也唐蘇恭註王孫

引陳延之小品方牡蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風溼痺證不治血病故今移附于此

附方

舊一紫參湯治下痢紫參半斤水五升煎二新二

服張仲景吐血不止紫參人參阿膠炒等分爲金匱玉函草以糯末烏梅湯服一錢一方去

人參加甘草聖惠方面上酒刺五參丸用紫參丹參米湯服胡桃仁杵和丸梧子

兩爲末胡桃仁杵和丸梧子大每服二十丸茶下普濟

王孫

本經中品

校正

併入拾遺旱藕

釋名牡蒙

宏景

黃孫

別錄

黃昏

別錄

旱藕

齊名

長孫

又名

王孫

海孫吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡蒙木部合歡一名黃昏皆與此名同物異

集解

別錄曰

王孫

生海西川谷及汝南城郭垣下

赤文

整延相當

宏景曰

今方家皆

呼爲黃昏云牡蒙市人少識者恭曰按陳延之小

品方述本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙

無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及己而大根長

尺餘皮肉皆紫色藏器曰旱藕生太行山中狀如

藕時珍曰王孫葉生顛頂似紫河車葉按神農及

吳普本草紫參一名牡蒙陶宏景亦曰今方家呼

紫參爲牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王

孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參

牡蒙爲二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己但

古方所用牡蒙皆爲紫參後人所用牡蒙乃王孫

非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃王孫也蓋紫參止痛血證積聚瘡痂而王孫主五臟邪氣痹痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

根氣味苦平無毒

普曰神農雷公苦無毒黃帝甘藏器曰旱藕甘平無毒

主

治五臟邪氣寒溼痺四肢疼酸膝冷痛本經**療百病**

益氣

別錄

旱藕主長生不飢黑毛髮

藏器

紫草

本經中品

釋名紫丹

別錄

紫芙

音

苳莫

廣雅音紫戾

藐

爾雅音藐

地血

吳普

本草綱目卷之二十一
鴉銜草

時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作莛草獠人呼為鴉銜草

集解

別錄曰紫草生陽山山谷及楚地三月采根陰乾宏景曰今出襄陽多從南陽新野來彼

人種之即是今染紫者方藥都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國者染色殊黑比年東山亦種之色小淺於北者恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟時珍曰種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采則根色黯惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟氣皆令草黃色

根修治

敷曰凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用

氣味苦寒無毒

權曰甘鹹寒入手足厥陰經

主治

心腹邪氣五疳補中益氣利九竅本經通水道療腫

脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皸別錄治惡瘡癩癬

甄權治斑疹痘毒活血涼血利大腸時珍

發明頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙

獨行方治疏豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及

肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉濇者宜用之已出而

紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能

導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤為有益又曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾氣實者

猶可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理

一藥用之非矣

附方

新舊三六

消解痘毒

紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服直指方

嬰童疹痘

三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩對以百沸湯一盞泡封勿泄氣

待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便

痘毒黑疔

紫草

利者勿用煎服亦可
三錢雄黃一錢為末以胭脂調

癰疽便閉

紫草

銀簪挑破點之極妙

小兒白禿

紫草煎汁塗之

小便卒淋

紫草一分新水煎服直指方

產後淋瀝

方同上

咬人

紫草煎油塗

火黃身熱

午後卻涼身有赤點或黑點者不可治宜

烙手足心背心百會下廉內服紫草湯紫草吳藍一兩木香川黃連一兩水煎服三十六黃方

白頭翁

本品經

釋名野丈人

本經胡王使者

本經奈何草

別錄宏景曰處處有之近

根處有白茸狀似白頭老翁故以為名時珍曰大人胡使奈何皆狀老翁之意

集解

恭曰其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似

燾頭正似白頭老翁故名焉陶言近根有白茸似

不識也太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁保昇曰所在有之有細毛不滑澤花

蕊黃二月采花四月采實八月采根皆日乾頌曰

處處有之正月生苗作叢生狀似白薇而柔細稍

長葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風而

搖與赤箭獨活同也陶註未述莖葉蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者皆誤矣宗奭曰白頭

翁生河南洛陽界其新安山野中屢嘗見之正如蘇恭所說至今本處山中及人賣白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也機曰寇宗奭以蘇恭爲是蘇頌以陶說爲是大抵此物用根命名取像當準蘇頌圖經而恭說恐別是一物也

根氣味苦溫無毒

別錄曰有毒吳綬曰苦辛寒權

明曰得酒良花子莖葉同

主治溫瘧狂狃寒熱癥瘕積聚瘦氣

逐血止腹痛療金瘡

本經**鼻衄**

別錄**止毒痢**宏**赤痢腹**

痛齒痛百節骨痛項下瘤癧

甄權**一切風氣暖腰膝**

明目消贅

大明

發明

頌曰俗醫合補下藥甚驗亦衝人杲曰氣厚味薄可升可降陰中陽也張仲景治熱痢下

重用白頭翁湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥鼻衄無此不效毒痢有此獲功吳綬曰熱毒下痢紫血鮮血者宜之

附方 舊二 **白頭翁湯** 治熱痢下重用白頭翁一兩新三 黃連黃蘗秦皮各三兩水七

升煮二升每服一升不愈更服婦人產後痢虛下極者加甘草阿膠各二兩 仲景金匱玉函方

痢咽痛 二春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木香二兩水五升煎一升半分三服 聖惠方

陰癩偏腫 白頭翁根生者不限多少搗傅腫處外一宿當作瘡二十日愈 外臺祕要

痔腫痛 白頭翁草一名野丈人以根搗小兒禿瘡塗之逐血止痛 衛生易簡方

白頭翁根搗傅一宿作瘡半月愈 肘後方

花主治瘧疾寒熱白禿頭瘡 時珍

本草綱目音 卷二十一 三

白及

本經下品

校正

併入別錄白給

釋名 連及草

本經 甘根

本經 白給

時珍曰其根白色連及而生故名白及其

味苦而曰甘根反言也吳普作白根其根有白亦通金光明經謂之罔達羅喝悉多又別錄有名未

用白給即白及也性味功用皆同係重出今併為一

集解

別錄曰白及生山谷葉如藜蘆根白相連九月采

普曰莖葉如生薑藜蘆十月花直上紫赤色根白連二月八月九月采弘景曰近道處處有之葉似

杜若形根似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊保昇曰今出申州葉似初生櫻苗葉及藜蘆三四

月抽出一莖開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用頌曰今江

淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似柝欄兩指大青色夏開紫花二月七月

采根時珍曰韓保昇所說形狀正是但一科止抽
一莖開花長寸許紅紫色中心如舌其根如菱米
有臍如鳧苳之臍又如
扁扁螺旋紋性難乾

根氣味苦平無毒

別錄曰辛微寒白給辛平無毒
普曰神農苦黃帝辛李當之大

寒雷公辛無毒大明曰

甘辛杲曰苦甘微寒性瀼

陽中之陰也之才曰紫石英爲之使惡理石畏李

核杏仁反烏頭主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣

賊風鬼擊痲緩不收

本經

除白癬疥蟲結熱不消陰

下痿面上疔炮令人肌滑

甄權

止驚邪血邪血痢癩

疾風痺赤眼癥結溫熱瘡疾發背癰癥腸風痔瘻

撲損刀箭瘡湯火瘡生肌止痛

大明

止肺血

杲李

本草綱目卷之二十一
白給主伏蟲白癰腫痛別錄

發明

恭曰山野人患手足戰痲者嚼以塗之有效
爲其性黏也頌曰今醫家治金瘡不瘥及癰

疽方多用之震亨曰凡吐血不止宜加白及時珍
曰白及性濇而收得秋金之令故能入肺止血生
肌治瘡也按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一大囚
囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至
于嘔血人傳一方只用白及爲末米飲日服其效
如神後其囚凌遲劊者剖其胸見肺閒竅穴數十
處皆白及填補色猶不變也洪貫之聞其說赴任
洋州一卒忽苦咯血甚危用此救之一日卽止也
摘玄云試血法吐在水盥內浮者肺血也沈者肝
血也半浮半沈者心血也各隨所見以羊肺羊肝
羊心煮熟蘸白及末日日服之

附方

新舊一鼻衄不止津調白及末塗山根上仍以
水服一錢立止
經驗方

心氣疼痛

白豆及石榴皮各二錢為末煉蜜丸黃重

舌驚口

白及末乳汁調塗
婦人陰脫等分為末烏藥

裏一錢

納陰中入三寸腹內
疔瘡腫毒白及末半

熱即止

日用一次廣濟方
酒調白及末二錢服

之去水

攤於厚紙打跌骨折
其功不減自然銅古

上貼之

袖珍方打跌骨折
其功不減自然銅古

銖錢也

刀斧傷損白及石膏煨等分為末
手

永類方

亦可收口濟急方
末油調傳

皸裂

白及末水調塞之
湯火傷灼白及末油調傳

勿犯水

濟急方湯火傷灼
白及末油調傳

三七

綱目

釋名山漆

綱目金不換
時珍曰彼人言其葉左三右

本名山漆謂其能合金瘡如漆黏物
也此說近之金不換貴重之稱也

本草綱目
卷二

時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中采根

集解 暴乾黃黑色團結者狀畧似白及長者如老

法以末糝豬血中血化爲水者乃真近傳一種草

春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有歧尖莖

有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不

香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷

出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡

根與南中來者不類恐是

劉寄奴之屬甚易繁衍
根氣味甘微苦溫無毒主治止血散血定痛金刃
箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或爲末摻之
其血卽止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不
止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷

諸病時珍

發明 時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡

者隨卽嚼爛罨之卽止青腫者卽消散若受杖時

亦良大抵此藥則血不衝心杖後尤宜服之產後服

附方 新藥故能治一切血病與驢蹄紫礦相同

赤痢血痢 三七錢研末入核湯瀕湖集簡

同淡白酒調一二錢服卽愈 同大腸下血 研末

產後血多 山漆研末米湯 同男婦赤眼 十分重者以

妙塗四圍甚無名癰腫 塗卽散已破者研末乾塗 虎

咬蟲傷

山漆研末米飲服三錢
仍嚼塗之並同上

葉主治折傷跌撲出血傅之卽止青腫經夜卽散

餘功同根

時珍