

千金翼方



千金翼方卷第二十 雜病方

朝宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂 重校

內閣撰文十書舍人加四取金匱華希閣校刻

備急第一 十怪鬼擊附

蠱毒第二 猫鬼附

藥毒第三

從高墮下第四

金瘡第五 火瘡漆瘡附 炙瘡

沙蟲第六 水毒惡刺 蠅虻狗咬 狐刺蛇咬附



瘦病第七

陰病第八

備急第一

方二十七首  
論一百

阿魏藥主一切尸疰惡氣療人有親近死屍惡氣入腹終身  
愈遂至死凶醫所不療亦主一切疰神効方

阿魏藥

三兩碎之  
加子大

右一味以餽餽麩裹半兩熟煮吞其白三服服滿三七日永  
差忌辛油麪生冷酢滑以酒服之即差

玉壺丸主萬病皆用之

雄黃

八角附子

炮

藜蘆

礬石

燒

巴豆仁

各二兩  
去皮

丹砂

二兩



右六味以王相曰  
次內礬石又三千杵次內藜蘆又三千杵次內雄黃又三千杵次內丹砂又三千杵次內附子又三千杵次內白蜜又三千杵訖更治萬杵佳無丹砂用眞珠四兩代之每內藥卽下少蜜恐藥飛揚盛密器中封之勿洩氣安清淨處大人九如小豆許欲服藥下病者宿勿食平旦服二九不知者煖粥飲發之在膈上者吐膈下者和但噫氣而已卽愈一切萬病量之不過一九二九莫不悉愈必以王相天晴明日合之大有神驗若非此日合之極不中用徒事苦耳

倉公散主萬病方

礬石

燒千金作生礬者

皂莢

炙去皮子

雄黃

研

藜蘆

熬



右四味等分爲散主卒鬼打鬼排鬼刺心腹痛吐下血便死  
不知人及卧魘齧脚腫不覺者諸惡毒氣病攻藥如大豆  
竹管中吹鼻得嚏則氣通便活未嚏更吹之以嚏爲度

備急丸主暴病脹滿方 大黃 乾薑 巴豆去心熬

右三味等分先搗大黃乾薑下篩研巴豆如脂內散中合搗  
一千杵卽用之蜜和爲丸亦佳密器貯之勿令歇氣主心腹  
暴病若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以  
水若酒服大豆許三四枚捧頭起令得下喉須臾不差更服  
三枚腹中轉鳴得吐利卽差

千金丸主百鬼病風疰夢與鬼神交通邪病腹脹惡腫氣卒中

忤方 一舉石燒附子皮去雄黃 眞珠 巴豆仁 藜蘆

蜈蚣二枚 麝香半兩 犀角三分

右九味搗三千杵每服二九如小豆不知至三九五更

服至日中解解乃食白米粥忌熱食酒肉五辛一切皆忌之

眞珠附著散主諸風鬼疰毒氣猶鬼所著方

眞珠 雄黃 丹砂 蜀椒并去目天雄 旄草各半兩 細辛

乾薑 桂心略 蜈蚣一枚

右一十味爲散酒服方寸匕日再

大附著散主一切蜚尸鬼疰風痺百處痛如鍼刀刺痛嘔逆澀

飲五勞七傷萬病方



附子炮去烏頭炮去人參 莽草 雄黃 朱砂

乾薑各七蜈蚣炙 蜥蜴各二 芫青入分 細辛錢一 鬼臼

右一十二味搗散酒服半錢七日再

太一神明陷水丸主諸病破積聚心下脹滿寒熱鬼疰長病

逆吐噫辟除眾惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胸中結氣咽中

閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之桃手心中慍慍如

有蟲狀毒注相染滅門方 雄黃 丹砂 桂心 礬石燒

大黃 藜蘆各二兩或 附子炮去 眞珠各一兩半 烏頭入枚炮

犀角 鬼白 麝香 射干 牛黃 人參各一兩 芫青五枚

杏仁三十枚去皮 蜈蚣炙 蜥蜴各一枚 蟹螯去翅 雉足熬 地膽



各七當歸三兩巴豆仁一分

右二十四味搗末蜜為丸搗三萬杵丸如小豆先食服

日再服不知稍稍加以藥二丸著門上令眾惡不近傷

之無不即愈若至病家及視病人夜行獨宿服二丸眾邪不

近亦可佩之

蜥蜴丸主癥堅水腫蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注膏血相注惡氣

鬼忤蛄毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所嚙獠犬所咬

鳩毒入人五臟服藥以殺其毒毒即消婦人邪氣鬼忤亦能遣

之方

蜥蜴

蜈蚣

地膽

麈蟲

杏仁

去皮尖

雙仁熬

各二枚

各五十枚

各四十枚

蟲蟲

各卷十枚

去翅足熬

巴豆仁

朴硝

各七

澤瀉

千金作

赤桑雞

澤瀉

各七





桃奴 鬼督郵 犀角各半兩 乾薑 甘草各款冬花

芍藥 甘遂各五分 虎骨炙一兩半 蠅蜋炙十枚

右二十味別治巴豆杏仁如膏內諸藥末研調下蜜搗

杵丸如麻子大食前服三丸口一不下加之不取吐下者

丸日一服有人風冷注癖堅二十年亦得愈

金牙散主鬼疰風邪鬼語口疰或在腰脊胸脇流無常處不喜

見人意志不定面目脫色目赤鼻張唇乾甲黃等並治之方

金牙燒 大黃 曾青 甘草炙 蛇蛻皮炙 雄黃 蜂房炙

丹砂 眞珠 蘭茹 乾漆炙 野葛 貝母各一分干金作二枚

蜈蚣炙 蜥蜴 附子各一枚炮去皮 毒公三枚干金作三分 芎藭干金作一分



石長生 椒目 鬼白 鬼督郵 滑石 鼈甲 炙狸骨

烏頭炮 狼毒 蕪荑 鬼箭 藜蘆 雷丸各半兩 蜋

亭長各七枚 石膏 凝水石各五分 干金作一兩 牛黃 胡鷄

干金各三分 桂心 人參 狼牙各一兩 桔梗干金半兩 鐵精各三分

分 芫青 徐長卿各十枚 螫螯四枚熬干金作十四枚

右四十五味為散酒服一刀圭日再稍加如葛蟲皆隨大小便出矣

大金牙散主南方百毒瘴氣疫毒脚弱腫痛濕痺風邪鬼症方

金牙燒 雄黃 丹砂 龍膽 防風 由跋 大黃 曾青

茯苓 桂心 松脂 乾薑 烏頭炮去皮 螫螯去翅足熬 亭長

細辛 消石 野葛 大戟 商陸 蛇蛻熬 芫青 鸛骨



芫花 附子炮去皮 寒水石 蜀椒汗去口者 人參 貫衆 龍

骨 露蜂房熬 巴豆去皮 蜥蜴 蜈蚣炙 礞石燒 天雄

骨炙 石胆 莽草

右三十九味各等分爲散以絳囊佩帶之男左女右未食以漿水或酒隨意服一刀圭以知爲度

小金牙散主南方瘴氣疫毒脚弱風邪鬼疰方

金牙五分燒 女萎千金作萎 細辛 乾薑 桂心 天雄炮去皮 莽

草 草解各三分 犀角屑三分 烏頭炮去皮 麝香 虎

杖 黃芩 雄黃 失砂 蜀椒汗去口者 蜈蚣一枚 黃

連一兩 黃分



右一十九味為散訖肉牛黃麝香更搗三千杵温酒服一

七日三夜三以知為度絳囊盛帶之辟不祥弔喪問病皆

大鼻良于金用由 跋無虎杖

又大金牙散方所主與前方同傳屍骨蒸病家合佳

金牙二兩 燒 鸛骨 石膏各二兩 大黃 鼈甲炙 梔子仁 鬼督

郵 桃白皮 鼈甲炙 銅鏡鼻 乾漆各一兩 熬 莽草千金作一分

桂心 芍藥 射干 升麻 鳶尾 馬目毒公 犀角屑

羶羊角屑 甘草炙 狼毒 蜂房熬 細辛 乾薑 芒消各半

金作各三分 龍胆 徐長卿 狼牙 由跋 雄黃 眞珠各三分

射罔一分 蠃蝦各三分 地胆 檮雞 烏梅一分 莞青各七



雷丸七分干金六分巴豆去皮心桃奴各十枚鐵精赤小豆各一蛇蛻

一尺盤螿針七分干白朮龍牙胡鷲矢杏仁去皮尖

草子各一兩半

右五十味為散酒服一刀圭加至兩刀圭日三夜一以知為

度絳囊感帶之男左女右一方寸七省病問孝夜行途中晨

昏霧露亦如此密封勿洩氣清齋七日合之一一如法童子

沐浴寂靜無人處合勿令人知買藥勿爭價千金無杏仁有荒花一分

太一神明丸主腹中癥瘕積聚支滿寒熱鬼疰長病欬逆吐血

殺鬼邪氣蠱注胸中結氣咽中如有物宿食久寒方

雄黃兩四真珠丹硃各二兩藜蘆附子炮去皮各一兩半盤螿二十枚



地胆二七枚杏仁八十枚去皮去皮礬石一兩巴豆七枚赤足足

蛇炙二枚鬼白三兩特生礬石五兩煨煨白白浴照浴照食平食平

右一十三味下篩吹咀礬石令如麥人桑白皮如錢大十

枚令於鐵器中熬桑白皮焦黑止搗二千杵肉丹砂雄黃諸

藥合搗四千杵白蜜和為丸服如小豆大縱不知病進退遠

臍相逐上下不定按之挑手心中慍慍如有蟲狀病走皮中

相次即取一丸摩病上急接手下皮青不青當白黑若有赤

病死皮中也若為蜂蛇所中中惡服一丸一丸著瘡中若不

知更加至三丸卒得飛尸腹中切痛服三丸破一丸傅瘡上

即愈夜夢寤驚恐問病臨喪服一丸漬一丸塗之止惡邪氣



不敢近人卒中鬼魅狂言妄語一九塗其脉上一九塗人中  
即愈鬼魅逐人以一九塗門戶上鬼不敢前蠱毒病一宿  
食明旦服一九不知增至二九至三九以知爲度癥結痞  
勿食服四九但欲癥消服一九日二病下如雞子白或下  
蟲下後以肥肉精作羹補之狐鳴以一丸向擲之狐即於其  
處死神秘不妄傳

桔梗丸主諸疰萬病毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消并酒

滌方 藜蘆熬皂莢炙巴豆仁熬桔梗各二兩附子炮去皮

右五味末之蜜和搗萬杵丸如桐子欲服宿勿食平旦飲服  
兩丸仰臥勿眠至食時若膈上吐膈下利去惡物如蠶吐

薑子或長一尺二尺下後大虛作雞羹補之三四日將養

不盡更服如初

十疰丸主十種疰氣疰勞疰鬼疰冷疰生人疰死人疰尸疰

疰食疰土疰等方

雄黃去皮心各二兩 巴豆去皮心各二兩 人參 甘草 炙 麥門冬去蘂本

估榎炮去 附子炮去 皂莢各一團炙 蜀椒一兩半干

石二十味末之蜜和空腹服一丸如小豆大日三稍加以知

為度極效千金無蘂本有細辛

大麝香丸主鬼疰飛尸萬病方

雄黃一兩 巴豆仁去心 杏仁各五枚去尖 蟹螯去翅 亭長各七





地胆 芫青各七分 蜈蚣一枚 蚘蜴各一枚 生麝香三分 丹砂二分 干金一分

礬石燒干金 大黃無干金 牛黃 犀角肩 細辛 獺狂炙 藜蘆

鬼臼 桂心 礬石燒 附子炮去皮 眞珠各半兩

右二十三味爲末蜜和搗三千杵飲器如小豆一九日二蛇

蜂蠟所中以摩愈一方地胆作蚘蚘胆干金有莽草無大黃

蜈蚣湯主惡疰邪氣往來心痛徹胸背或走人皮膚移動不定

苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣一枚 牛黃分 大黃三分 人參 丹砂各三分 附子四分 干金

炮去皮 細辛 鬼臼 乾薑 當歸 桂心各一兩 麝香一分 干金半兩

黃芩半兩



右一十三味咬咀以水一斗煮十一味取三升去滓下午

麝香末攪令均分三服

鶴骨丸主遁尸飛尸積聚脇下痛連背走無常處或在藏

腹中或奄奄然而痛方

鶴脛骨

三分寸金作三寸

丹砂一金一兩桂心

藜蘆

野葛

各半兩

芫青

蟹螯

熬

巴豆

各十四枚去皮心熬千金四上枚

牡蠣熬雄黃

莽草

各一兩

蜈蚣

一枚炙

右一十二味搗篩蜜丸服如小豆大二九日三以知為度方

丹砂作丹參

江南度世丸主萬病癥堅積聚伏尸長病寒熱疰氣流行皮中久病著牀肌肉枯盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡注忤口



三金聖方 卷二十一  
噤不開心痛方

蜀椒

三兩汗去

人參

細辛

甘草

各二兩炙

附子

炮去皮

紫苑

各一兩半

乾薑

茯苓

大黃

真珠

丹砂

麝香

野葛

桂心

雄黃

鬼臼

各一兩

蜈蚣

二枚炙

巴豆

枚去皮心熬

烏頭

炮去皮

牛黃

各半兩

右二十味搗末蜜丸飲服小豆大二丸稍加至四丸日二加

獺狂一兩尤良

大度世丸主萬病與前同方

牛黃

大黃

雄黃

細辛

真珠

甘草

炙

人參

射罔

丹砂

鬼臼

莽草

附子

炮去皮

蜀椒

各一兩汗去

目開口者

乾薑

乾薑

千金作

麝香

鬼箭

茯苓

桂心

紫苑

各二兩

巴豆

仁枳



枚去野葛尺一蜥蜴蜈蚣各一  
地膽五十莖青枚檮雞三十

右二十六味搗末蜜丸飲服二丸如小豆日二先食後

細辛丸主風入五藏悶絕常自燥痛或風注人身冷疰鬼

尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外鍼灸流移無有常

處驚悸腹脹氣滿又心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退

陰下濕癢或大便有血小便赤黃房中勞極方

麻黃去節干秦苑人參黃芩牡蠣蜀椒汗去目

芍藥各三柴胡干金乾薑桂心各五茯苓桔梗當歸

白朮千金十獨活各一烏頭炮去附子炮去皮干甘草炙

石南莽草天雄炮去桔櫻杜仲炙牛膝細辛各二



味干金 防風 一兩半干金五分

右二十六味搗篩為散仍別稱之合和平旦以清酒服

七訖如人行七里久勢欲歇更飲酒五合佳

芥子薄主遁尸飛尸又主暴風毒腫流入四肢頭面諸風方

白芥子 一升蒸熟

右一味搗下篩以黃丹二兩攪之分作兩處疎布袋盛之更

蒸使熱以薄痛處當更迭蒸袋常使熱薄之如此三五度 定即

太一備急散主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱毒疰

吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃 二兩 丹砂 一兩 附子 五分炮去皮 桂心 一分 藜蘆 七銖 野葛 二十銖 蜀椒



半兩汗去 芫花錄 巴豆仁三十五箇  
目閉口者去心熬

右九味惟巴豆別治如脂餘下篩以巴豆合和更搗之

調礬器中貯之密封勿洩氣有急疾水服錢五七可加至

錢七老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢

當汗出此所謂如湯潑雪手下皆驗秘之千金非賢勿傳也

千金分兩小異

治暴心痛面無色欲死方血脈不通中不出更難治者

以布裹鹽如彈子燒令赤置酒中消服之利即愈

還魂湯主卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死口噤

拘口不開去齒下湯湯入口活不下者分病人髮左右捉踏肩



北京中醫藥大學圖書館版權所有

引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黃

四兩去節  
千金三兩

桂心

二兩

甘草

一兩

杏仁

七十枚去

皮尖數仁

右四味咬咀以水八升煮取三升分三服

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉以酒服一升圭日三血化為水

論曰凡諸大備急丸散等藥合和時日天晴明四時王相日合之又須清齋不得污穢於清淨處不令一切雜人猫犬六畜及諸不完具人女人等見則藥無靈驗不可具言若不能如法則必不須合之徒棄財力用之與朽木不殊余以武德申合玉壺丸時值天陰其藥成訖後卒不中用終棄之此等多是上古藥



聖愍苦厄人遂造此方以救之皆云買藥不可爭價當知其

意云爾王叔和云此方有如年延續胎及諸般形並出即

蠱毒第二 論一首 方七首

論曰亦有以蠱涎合作蠱藥者食飲中與人者惟此一種令人

積年乃死

治人中蠱人有行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼

喚將去方

凡中蠱之狀令人心腹切痛如物嚙或吐血下 不急治食

人五藏盡則死驗之法唾至水中沉者是也取敗鼓皮燒作

末水服方寸匕須臾自呼蠱至姓名可語令知則愈矣





治人有中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變狀無常方

牡羊皮方廣犀角肩芍藥 牡丹皮 黃連各一梔子水

囊荷四兩

右七味咬咀以水五升煮取一升半分三服千金以水九升煮取三升

治蠱毒方 榭木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一

升空腹服之即吐出

又方 燒蝟皮灰以水服方寸匕差

又方 榭木北陰白皮 桃根皮各五兩 蝟皮灰 亂頭髮灰各

生麻子汁五升

右五味先以水濃煮榭木桃根取汁一升和麻子汁煮灰等



一 方寸七令病人少食訖服一升行百步須臾著盆水

翎適吐水盆中當有如牛涎犢胎及諸蟲形並出即差

治猫鬼方 燒臘月死猫兒頭作灰末以井華水服一錢

二 立差大驗

治猫鬼方 相思子 巴豆 麩 革麻子 各一枚 朱砂 半兩 峭粉 二分

右五味搗作末以蜜蠟和為丸帶之即不著人先著者酒服

麻子大一枚 良 舒金作朱砂 各二合

又方 多災所痛處干壯自然走去甚妙 代 蘇 干 合

藥毒第三 方一十 二首

野葛毒方 雞子一枚打破並吞之須臾吐野葛



又方 煮甘草汁冷飲之

又方 服雞矢汁

解諸藥毒雞腸散方

雞腸草分三薺芫

升麻各一

藍子

全土分一芍藥

當歸

甘草

各三分炙干  
金各二分

右八味搗篩為散水服方寸匕多飲水為佳若蜂蛇等眾毒

蟲所螫以鍼刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕痊藥

箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥

內瘡中趁瘡深淺令至底上有好血出即休若服藥有毒水

服方寸匕毒解病愈

野葛毒口噤方

取青竹去兩節拄臍上內冷水注中煖即易



之須臾口開開卽服藥立活忌酒數易水

解一切諸毒方 甘草三兩

右一味以水五升煮取二升去滓內梁米粉一合更煎

蜜半兩服七合須臾更服之

治鈎吻衆毒困欲死面青口噤逆冷身痺方

薺芫八兩

右一味咬咀以水六升煮取三升冷如人肌服五合日三服

凡夜二服

又方 煮桂汁飲之

又方 煮藍汁飲之

凡六畜五藏著草自動搖得諸醋鹽不變色及墮地不汚又與



犬不食者皆有毒殺人

凡食飲有毒者澆地地墳起者殺人

凡肉汁在器中蓋密氣不洩者皆殺人

凡脯肉熟肉皆不用深藏密蓋不洩氣殺人

若中此毒者皆犬糞灰水服方寸匕良

治惡毒藥方 狗活草一把去兩頭

右一味以水五升銅器中煮取汁搜麩作粥食之

藥毒不止解煩方 甘草二兩 梁米粉一升 蜜四兩

右三味以水三升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪

令調內白蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲一升



從高墮下第四方十一首

膠艾湯主男子絕傷或從高墮下傷損五藏微者唾血甚  
血及金瘡傷經內絕者方  
阿膠炙艾葉熬芎藭甘草

當歸各二兩乾薑一兩芍藥

乾地黄各三兩

右八味咬咀以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服  
羸人三服此湯正主婦人產後及崩中傷下血多虛喘欲死腹

痛下血不止者服之神良千金一方  
只四味

墜馬落車及口開崩血腹滿短氣方  
大豆胆

右一味以水一斗煮取二升半去豆一服令盡劇者不過作

治落馬墮車及諸傷腕折臂脚痛不止方  
當歸各



芎藭一兩澤蘭一兩蜀椒去目及閉者汗當歸一兩桂心一兩附子炮去皮半

兩甘草三兩炙干金五分

右七味微熬令香搗篩為散酒服方寸七日三九

皆服之十日愈小兒傷損亦同

又方干金名黃耆黃耆散芍藥各三兩蜀椒一合去目及閉口者汗烏頭半兩炮去皮

大黃一兩當歸一兩附子炮去皮乾薑一兩桂心一兩續斷一兩乾地黃一兩

通草各二兩

右一十二味搗篩為散先食訖温酒服一方寸七日三

地黃湯主因損小便血出方

地黃一兩柏葉一兩黃芩一兩阿膠炙甘草炙各一兩



右五味咬咀以水七升煮取三升去滓內膠煮取二升五

分三服

治瘀血腹中與瘀不出滿痛短氣大小便不通方

荊芥

半兩干金半分

大黃

芎藭

各三兩

麝蟲

三十枚熬桂心

甘草

各二兩

當歸

二兩蒲黃

桃仁

四十枚去皮尖及雙仁者干金三十枚

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治折腕瘀血蒲黃散方

蒲黃

當歸

各二兩

右二味擣篩為散酒服方寸匕日三先食訖服之

又方

蟲蟲

去足翅熬干金二十枚

牡丹皮

等分干金一兩

右二味擣篩為散酒服方寸匕血化為水





又方 取菴藎草汁服之亦可散服之日二

又方 大麻根若葉搗取汁數升飲之即血下氣通蘇息無

者乾者煮汁亦得并主痰血心腹脹滿短氣

又方 茅根切擣絞取汁温和酒服一升日三良

金瘡第五方六十

金瘡止血散方 鈞樟根兩三當歸芎藭乾地黃續斷各

兩鹿茸半兩龍骨二兩

右七味搗篩為散以傅血即止酒服一錢七日五夜三

治金瘡箭在肉中不出方 白斂半夏洗去滑各三兩

右二味搗篩為散水服方寸七日三淺者十口出深者二十



日出終不住肉中效

金創腸出令入方

磁石燒滑石各三兩

千金有鐵精二兩

右二味搗細篩為散白飲服方寸七日五夜二三日當

治刀斧所傷及冷瘡牛領馬鞍瘡方

續斷

松脂各一兩

鹿角

牛骨腐者

亂髮燒各二兩

右五味搗篩細為散以猪脂半觔并松脂合煎令和下鐺於

地內藥攪令泠凝用之瘡有汁散傅之

金瘡煩悶方

白芷

芎藭

甘草炙各二兩

右三味熬令變色搗篩為散水服方寸七日五夜三

消石散主金瘡先有石發煩悶欲死大小便不通方



消石 寒水石 栝萸 澤瀉 白歛 芍藥兩

右六味搗篩為散水服方寸七日三夜一稍加之以通

琥珀散主弓弩所中悶絕無所識方

琥珀隨多少搗篩為散以童便服之不過三服差

弩筋散主弓弩所中筋急不得屈伸方

故敗弩筋五分燒作灰 秦芫五分 杜仲半兩炙 大棗三枚 附子炮去皮 當歸

各一兩 乾地黄半兩

右七味搗篩為散以溫酒服一方寸七日三稍加至二七以

知為度

續斷散主金瘡筋骨續絕方

續斷三兩半 芎藭 菴蓉 當歸



酪一細辛兩半附子炮去皮乾薑三蜀椒汗去目者桂心各三芍藥分

人參一甘草炙蛇銜草兩乾地黃兩五石正平各

右一十四味搗篩為末酒服方寸匕日三夜一分千金有

今錄驗又有杜蘅甘草細辛一芍藥一麻辛一黃香一大黃一

藍子散主金瘡中藥箭解毒方式 劉風 大烈

藍子合升麻兩王不留行一甘草炙四兩各一一一一一一

右四味搗篩為散水服二方寸匕日三夜三又以水相方寸

匕如泥塗瘡上乾易之毒即解

澤蘭散主金瘡內塞方 澤蘭一防風一蜀椒去目者石膏一

乾薑一附子炮去皮細辛一辛夷一芎藭一當歸各半炙草一



右一十一味搗篩爲散酒服方寸七日三夜一膿多倍甘草

渴加栝蓐半兩煩熱加黃芩半兩腹滿短氣加厚朴三分

中瘀血更加辛夷半兩

蒲黃散主被打腹中瘀血方

蒲黃升當歸

桂心各一兩

右三味搗篩爲散酒服方寸七日三夜一

甘菊膏主金瘡癰疽止痛生肉方

甘菊花

防風

大戟

黃芩

芍藥

甘草各一兩

芍藥

細辛

黃耆

大黃

蜀椒

去目閉者汗

杜仲

各半兩炙

生地黄

四兩

右一十三味搗篩以臘月猪膏四升煎五上五下芍藥色黃

膏成綿布絞去滓傅瘡上日三



桃仁湯主金瘡瘀血方

桃仁

五十枚去皮尖及雙仁

蝨蟲

去翅足熱

水蛭

熬二日十枚

大黃

五兩

桂心

兩半

右五味切以酒水各五升煮取二升服一合日三服明日

更一服

馬蹄散主被打腹中瘀血方

白馬蹄

燒令煙盡

右一味擣篩為散酒服方寸七日三夜一亦主女人瘀血消

之為水

金瘡內漏方 還自取瘡中血著杯中水和盡服愈

金瘡腹中有瘀血二物湯方 大麻子仁三升葱白二十枚

右藥使數人各擣令熟著九升水中煮取一升半頓服之若



血去不盡腹中有膿血更合服之當吐膿血耳

金瘡內漏血不出方 牡丹皮

右一味為散水服三指撮五日尿出血

治金瘡內房驚瘡方 燒婦人褲襠作灰傅之

金瘡方 取馬鞍草擣篩薄瘡一宿多差冬用乾葉末或是馬鞭草

麥門冬散主金瘡乳癰諸腫煩滿方

麥門冬去心石膏研柏子仁 甘草炙各二兩桂心一分

右五味搗篩為散酸漿和服方寸七日三夜一煩滿氣上脹

逆長服之佳

治金瘡出血多虛竭內補散方 菴蓉 芍藥 當歸 芎藭



乾薑 人參 黃芩 厚朴 桑白皮 吳茱萸 黃耆

桂心 甘草 各一兩 蜀椒 三分去目 閉口者汗

右一十四味搗篩為散飲服方寸七日三 千金無桑白皮 白芩分兩小異

治金瘡煩滿方 赤小豆一升以苦酒浸之熬燥復漬之滿三

度色黑治服方寸七日三

治金瘡苦不差方 白楊木白皮熬令燥末服方寸七日三服

又以末傅瘡中即愈

治金瘡刺痛不可忍百方不差方 蒜白朮大棗豉明血出燒入

葱一把水三升煮數沸漬瘡即止

治金瘡頭痛大便不利方 大黃 黃芩 各半





右二味搗篩爲末鍊蜜和丸先食飲服七丸如梧子大日三

金瘡以桑白皮裏令汁入瘡中或石灰封並妙

凡金瘡出血必渴當忍暈燥食不得飲粥及漿犯卽血出

凡出止不止粉龍骨末於瘡上立止

又方 割取人見著鞋上有斷乳十枚布瘡上立止乳字

又方 利貝子末服一錢七

又方 煮葛根食如食法務令多

兵瘡方 擣車前汁傅之血卽止

又方 以人精塗之差

又方 以柳絮裏傅之血便止



又方以熟艾急裹數日乃解

又方以人尿屎相和絞取汁飲三升頓服令盡

金瘡驚而堅腫劇者人方搗生地黄蟾蜍傅之燒

其外令温地黄燥則易瓦冷則易

凡刺在肉中不出方牛膝根莖搗傅之即出雖已合猶出也

正觀中有功臣遠征被流矢中其背胎上矢入四寸舉天下名

手出之不得遂留在肉中不妨行坐而常有膿出不止永徽元

年秋命余診看余為處此瞿麥丸方瞿麥二兩雄黃半兩玉不

留行乾地黄各五麻黃去雀李根皮薔薇根皮茅根

敗醬防風牛膝大黃藍實石龍芮

炙各二兩



右一十四味搗篩爲末鍊蜜和丸如梧子酒服十九日二稍  
稍加至二十九以知爲度忌豬魚生冷等可直斷口味  
鏃及折刺入身中四體皆當合此藥服之令四體皆緩  
其鏃必自跳出余嘗教服此藥與斷肉遂日日漸瘦其鏃  
跳出一寸戴衣不得行因卽錯却乃得行動已覺四體大  
緩不比尋常終冬至春其鏃不拔自然而落取而量之猶  
得三寸半是以身必須斷口味令瘦肉緩刺則自出矣故  
以記之

又方 磁石末傅之止痛斷血

凡金瘡深不用早合若合則以滑石末粉則不合治

凡竹木刺在肉中方 以羊矢和豬膏塗之出矣

又方鹿角末水和塗之即出三三不藥如去對并

治因風水腫方卒刺涉水成腫取韭並鹽擣置上以火

上熱出即愈

火燒瘡方取新牛屎承熱塗之

又方燒桃葉鹽合煮作湯洗之

又方以醬汁塗立愈

又方桑灰水傅乾則易

又方井底青泥塗之佳

又方青羊髓塗之佳

無青羊白黑羊亦得

治灸瘡及湯灸所損晝夜啼呼不止兼滅癩方



羊脂半兩

豬脂分

松脂半兩

蠟分

右四味於松明上以小銚火燒豬脂等皆消以杯盛取汁之松明是肥松木節也

治灸瘡膿壞不差方

臘月豬脂升薤白千枚金

胡粉兩

右三味先煎薤令黃去之綿裹石灰一兩煎數沸去之入胡粉膏中令調塗故帛上貼之日三度

又方

白蜜兩

烏賊魚骨一枚

一作一兩

右二味搗末相和塗上三五度差

治火瘡方

柏白皮兩

竹葉兩

甘草兩

右三味以豬膏一觔煎三沸三上三下藥成去滓待冷塗之



集驗百地  
黃四兩

治漆瘡方 湯漬芒消五兩令濃塗乾即為勿佳

又方 取市上磨刀石槽中泥津塗之

又方 取礬石內湯申洗之

又方 羊乳汁塗之

又方 漆姑草拔傅之

又方 末質衆塗之

沙蟲第六方方三十一首

治沙蟲毒方 以麝香大蒜合搗以羊脂和著小筒申帶之

又方 雄黃 正朱砂 常山分等



南京中医药大学图书馆版权所有

右三味五月五日午時童子合之

又治水毒方

凡水毒中人似射工初得之惡寒頭微痛

疼心中煩懊四肢振煖腰背百節皆強筋急兩膝疼或

而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷二三日則腹中生蟲食人

下部肚中有瘡不痛不癢令人不覺急治之過六七日下部

出膿潰蟲上食五臟熱盛煩毒下痢不禁八九日名工不能

醫救矣覺得之當早視若瘡正赤如截者爲陽毒若瘡如

魚齒者爲陰毒猶小緩不過二十日殺人欲知是中水毒當

作五六斗湯以小蒜五升咬咀投湯中消息勿令大熱去滓

以浴若身體發赤斑文者則非他病也

水毒方 擣蒼耳取汁服一升綿沾汁滓導下部中日三

又方 取蓼一把擣取汁服一升不過三服

又方 取藍一把擣水解以洗面目身令遍

又方 取蛇莓根爲末水飲之并導下部生者用汁夏月常多

賣此藥屑入水浴以方寸匕投水正流無所畏又辟射工凡

洗浴以少許投水盆中卽無復毒也不王時之問服如其

蠅蠖尿瘡方 取吳茱萸東引根下土以醋和塗

又方 燒鹿角爲末和醋傅上已有瘡汁出者燒道邊故薄席

傳之瘡表裏相當一名浸淫取豬牙車骨年久者槌破燒令

脂出熱塗之





蠟螻瘡方 取赤小豆末醋和塗之乾即易小兒以水和

又方 取棟木枝若皮燒灰傅上乾者膏和亦治小兒禿

又方 取槐白皮半觔切醋浸半日去痂洗之日五六

狐尿刺方 凡諸蠍蟻之類盛暑之時多有孕育著諸物上必

有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不王相之間則成其疾

名曰狐尿刺日夜礮痛不識眠睡百方治之不差但取鳧公

英莖葉根中斷之取白汁塗之令厚一分塗即差神驗

凡熱傷瘡及狐尿刺腫痛不可忍并風寒者皆燒馬屎若生桑

木起得煙多薰之汗出即愈

惡刺方 五月蔓菁子搗末和烏牛乳封之無即凡牛乳亦得



又方 取野狐矢燒灰臘月猪膏和封孔上

又方 取桑灰汁熱漬冷即易

又方 以針沙和膠清塗之

又方 取故鞋網如棗大婦人中衣有血者如手掌大倒勾棘

針二七枚三味合燒作灰以臘月猪膏和塗之蟲出

又方 蔓菁子升五

右一味微熬研末小兒尿一升合內瘡口中周血厚一寸以

煨火燒一升投內瘡於中漬之立愈

又方 煮槐白皮取湯漬之

又方 以苦瓠煮作湯漬之



又方 取五月五日蛇皮燒灰臘月豬膏和傅之

又方 取故鞍韉旃燒灰臘月豬膏和封之蟲出

又方 取樗根白皮切一升泔漬煮三沸內孔中亦可漬

肉刺方 割頭令血出內鉛丹如米許暴之

又方 以刀割却以好墨塗遍差

狗咬方 卽以冷水洗瘡任血出勿止之水下血斷以帛裹卽愈

蛇咬方 以人矢厚塗以帛裹縛登時毒消

蛇毒方 重臺末唾和封差大驗

蛇蜂毒方 取瓦子摩其上唾二七訖然後拋瓦子却安舊處

癭病第七 方九首



治五癭方 取鹿麝酒漬令沒火炙乾內於酒中更炙令香

咽汁味盡更易盡十日即愈 干金作十具

又方 小麥麪作一斤干金特生礬石十兩海藻斤

右三味取三年酢一升漬小麥麪暴乾更浸令酢盡各搗為

散每服兩方寸七日四五服藥含咽之忌薑五辛豬魚生菜

辛菜吹火讀誦及大語用氣

又方 昆布 海藻各三兩 松蘿 海蛤 白斂 通草 桂心

各二兩

右七味搗為散每以酒服方寸七日三服

又方 小麥一升醋一升昆布洗海藻洗各二兩



右三味搗爲散食後飲服方寸七日三以差爲度

又方 昆布 海藻 松蘿 半夏洗 細辛 土瓜各一兩 龍

通草 白鯁 海蛤各二兩

右一十味搗篩酒服方寸七日再不得作生活勞動也

又方 昆布二兩

右一味切如指大酢漬含咽汁盡愈

又方 海藻斤 小麥麩升

右二味以三年酢一升以溲麩末暴乾往反令酢盡合搗散

酒服方寸七日三忌弩力一作怒

陷脉散主二十三十年瘦瘤及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大



如杯孟十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令

人驚惕寐卧不安體中掣縮愈而復發治千金云陷種散

烏賊魚骨 石硫黃各一 白石英 紫石英 鍾乳粉各一

乾薑 琥珀 大黃 蜀附子各一兩炮去皮 丹參三分

右一十味搗為散貯以韋囊勿令洩氣若瘡濕即傅無汁者以豬膏和傅之日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止勿惜意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩益

佳千金有切驚尿一兩

治瘻方 葛蒲二兩 海蛤 白欬 續斷 松蘿 桂心 海藻

蜀椒汗去 醋倒掛草 半夏各一 羊靨二百 神麴三



右十二味各搗下篩以醬清牛羊髓脂丸之一服三丸如梧

子曰一服

陰病第八方一十首

治丈夫陰下癢濕方 以甘草一尺水五升煮洗之生用

又方 以蒲黃粉之不過三

治丈夫陰腫大如斗核中痛方 雄黃一兩礬石二兩甘草一尺  
研末 生用

右三味以水一斗煮取二升洗之神良

治丈夫陰頭癰腫師所不能醫方 鼈甲一枚

右一味燒焦末之以雞子白和傅之

治丈夫陰頭生瘡如石堅大者方



下刀剖虎牙及豬牙末豬脂煎令變色去滓日三塗之

又方 烏賊魚骨末粉之良

治妬精瘡方 丈夫在陰頭節下女人在玉門內似甘瘡

蝕之大痛其甘卽不痛以銀釵綿纏臘月豬脂薰黃火上煖

以釵烙瘡上令熟取乾槐枝燒滿塗之以麝香傅瘡上令香

黃礬青礬末傅之小便後卽傅之不過三度

治男女卒陰申生瘡癢濕方

黃連 梔子 酪 甘草 黃蘗 蛇床子

右五味下篩粉之乾者以豬脂和塗上深者綿裏內申日三

治陰部痛癢生瘡槐皮膏方 槐白皮 赤小豆 白芷





甘草生當歸各二兩棟實桃仁各五十枚去皮尖雙仁

右七味切以苦酒漬一宿旦以豬膏一升微火煎白芷

成去滓摩上日再并內下部申三寸差

治陰菑頭瘡方

槐子

黃連各半兩

桃仁二兩去皮雙仁

水豆分一

當歸分三右五味作末粉瘡上日三

治陰頭生瘡方

蜜煎甘草塗之即差大良效

治陰瘡黃汁出方

煮黃蘗汁冷漬傅蛇床黃連末極效

又方

桃仁二七枚煮令黃去皮尖雙仁末之酒服良

又方

生地黃一把并葉搗取汁飲之良

千金翼方卷第二十終



南京中医药大学图书馆版权所有

千金翼方卷第三十一 萬病

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

內閣揆文中書舍人加四級金匱華希閱校刻

總療萬病第一

阿伽陀丸理萬病第二

耆婆療惡病第三

躑躅療冷第四

總療萬病第一

論曰後生志學者少但知愛富不知愛學臨事之日方知學為



南京中醫藥大學圖書館版權所有

可貴自限孤陋寡聞所以弊其如此忌寢與食討幽探微緝綴  
 成部以貽未悟有能善斯一卷足為大醫凡膈上冷少腹滿腸  
 鳴膀胱有氣冷利者當加利藥服訖當利出汗澱青黃水清  
 輕者一兩度加利藥去病即止重者五六度加利藥得日三度  
 大利方得盡其根源病乃永愈其利法至已時以來兩行三行  
 即定亦是如舊終不成利病也凡病在上膈久冷痰癥積聚疝  
 痕癥結宿食堅塊欬逆上氣等固病終日吐唾逆氣吐衝胸脇  
 及咽喉者此皆胃口積冷所致當吐盡乃差輕者一二度重者  
 五六度方愈其吐狀初吐冷沫酸水次黃汁重者出赤紫汁若  
 先患瘧人當出黑血下吐藥大吐吐時令人大悶須臾自定不



令人虛憊得冷飲食已耳不虛聾手足不痺亦有人當吐時因  
中有一塊物塞喉不能得出者飲一二合藥酒須臾即吐出  
物如拳許大似蝦雞子中黃重者十塊輕者五六塊

右件等疾狀病之根本若今日不出此根本之疾雖得名醫  
與一二劑湯藥狎定於後食觸其病還發善醫者當服此藥  
一出根本即終身無疾矣

吐利出痰法

凡長病人 虛羸人 老人 貴人

此等人當少服積日不已病當內消也不須加吐利藥  
凡加吐利藥傷多吐利若不止者水服大豆屑方寸匕即定卒

無豆屑嚼藍葉及烏豆葉亦得定丈夫五勞七傷陽氣衰損羸瘦骨立者服之即差旬月之間肌膚充悅腦滿精溢仍加補藥

加法在後章方

療風方用藥多少法

慙節風 貳拾兩酒五斗

賊風

熱風

大風 用藥與歷能同

偏風

猥退

癱緩風 拾貳兩酒叁斗

右以上風皆帶熱須加冷藥仍須

得利佳也

賊風掣癱

捌兩酒貳斗

濕風周痺

貳斗酒

熱病後汗不出

初覺三服一服一升蓋年久服一升

食熱如針刺

捌兩酒貳斗



口喎面戾一日不合肆兩酒壹斗年久拾貳兩酒叁斗

頭面風似蟲行捌兩酒貳斗起卽頭旋肆兩酒一斗

心悶欲嘔吐項強欲陰雨卽發者捌兩酒貳斗

因瘡得風口噤脊背反張如角弓服五服一蓋

### 療冷病方

積冷痰癢瘦者肆兩酒一斗強者陸兩酒一斗半痰飲疝瘕陸兩酒一斗半

宿食吐逆肆兩酒一斗噉癖腸鳴噫捌兩酒一斗半

癩疥癬塊啾嗽上氣二拾兩酒五斗奔豚冷氣六兩酒一斗半

噎噦嘔痢六兩酒一斗半久疰捌兩酒二斗

卒中惡忤心腹脹滿氣急垂死三服一門一蓋當大吐吐血



瘴氣服

蠱毒服

溫瘧服

瘡瘻服

冷痢一六兩酒

久勞一八兩酒

療婦人方

其風冷等準前

帶下

十二兩酒三斗

崩中

六兩酒一斗半

冷病絕產

六兩酒一斗半

月水不通

六兩酒一斗半斷緒二斗

產後諸疾

二斗

月水不調月前月後乍多乍少

四兩酒一斗

落身後病

六兩酒一斗半

重者子宮下垂

十二兩酒三斗

大排風散主一切風冷等萬病方

芫花

狼毒

欒荆

天雄

五加皮

麻花

白芷

紫苑

烏頭

附子



莽草 茵芋 枯藁 荆芥 躑躅

蕤花 王不留行 大戟 赤車使者 麻黃

石斛 半夏 石南 薯蕷 牛膝

長生 藜蘆 狗脊 人參 菴蓉

蛇牀子 菟絲子 葶藶 車前子 秦朮 各七

薏苡 五味子 獨活 藁木 柴胡

牡丹 柏子仁 芍藥 吳茱萸

桔梗 杜仲 桂心 橘皮 續斷

茯苓 細辛 乾薑 厚朴 茯神

山茱萸 防己 黃耆 蜀椒 巴戟天





高良薑

紫葳

黃芩

當歸

菖蒲

乾地黄

通草

各四分

右六十七味勿熬鍊直置振去塵土卽搗麤篩下藥三

米貳升麴末貳升上酒一斗五升淨淘米以水五升煮米

熟停如人肌下麴末熟搗次下散搗如前次下酒攪之百遍

貯不津器中以布片蓋之一宿旦以淨杖子攪三十匝空腹

五更溫一盞服之以四肢頭面習習爲度勿輒加減非理造

次必大吐利欲服散者以絹篩下之一服方寸七只一服勿

再也水飲漿酒皆得服之丸服者蜜和服如梧子七丸惟不

得作湯服也須補者藥少服令內消卽是補也

千金方有自  
吳茱萸黃無麻



花半夏赤車使者高良薑紫葳止六十四味名芫花散一名  
 登仙酒又名三建散按後加減法中有遠志而此方中無  
 此脫遠志也

凡服此藥法先多服令人大吐下利三五度後乃少服方可  
 益也其加增藥法如左

麻花

烏頭留行

王不留行

赤車使者

麻黃

躑躅

茵芋

芫花

五加皮

白芷

莽草

附子

橘藁

荆芥

天雄

芎藭

藁木

薯蕷

巴戟天

細辛

獨活

當歸

黃耆

乾薑



厚朴

防己

山茱萸

大戟

葶藶

桔梗

牡丹

栝子仁

狗脊

薏苡

秦艽

菖蒲

右三十六味並主風多者患之者準冷熱加減之

菴蓉

芎藭

續斷

蛇牀子

桔梗

王不留行

芫花

天雄

附子

躑躅

茵芋

當歸

秦朮

芍藥

乾薑

狗脊

葶藶

石南

蜀椒

乾地黃

菖蒲

薯蕷

石斛

牛膝



細辛

柴胡

車前子

桂心

柏子仁

五加皮

杜仲

薏苡

右三十二味主濕痺腰脊患之者準冷熱加減之

石南

芎藭

續斷

牛膝

乾地黄

秦艽

藁木

狗脊

萆薢

通草

石斛

薤白

菟絲子

杜仲

天雄

附子

右一十六味主攣急躄曳患之 準冷熱加減之

莽草

防己

藜蘆

右三味主身癢疥瘙患之者準冷熱加減之



紫苑

牡丹

茯苓

茯神

柏子仁

蕞花

人參

遠志

細辛

右九味王驚癇患之者冷熱加減之

蜀椒

長生

躑躅

右三味主鬼魅患之者準冷熱加減之

紫苑

芫花

藜蘆

右三味主蟲毒患之者準冷熱加減之

高良薑

桔梗

芫花

山茱萸

茯苓

人參

柴胡

牡丹



蕤花

藜藿

巴戟大

芍藥

乾薑

附子天

烏頭

麻黃

莽草

右一十七味主固冷積聚腹痛堅實患之者準冷熱加減之

厚朴

橘皮

桔梗

大戟

藜蘆

半夏

乾薑

藁本

人參

吳茱萸

右一十味主腹痛脹滿吐逆患之者準冷熱加減之

茯苓

厚朴

芫花

半夏

細辛

烏頭

黃芩

柴胡

山茱萸

右九味主痰實患之者準冷熱加減之



北京中医药大学图书馆版权所有

厚朴

乾薑

紫苑

茯苓

桔梗

蕤花

烏頭

人參

細辛

柴胡

右一十味主胸滿痛患之者準冷熱加減之

紫苑

薯蕷

石斛

細辛

巴戟天

牡丹

當歸

人參

菖蒲

五味子

桔梗

柏子仁

吳茱萸

山茱萸

地黃

右一十五味主補五臟虛損患者準冷熱加減之

柏子

續斷

黃耆

薯蕷

芍藥

巴戟天

五味子

右七味主益氣患之者準冷熱加減之



肉蓯蓉

蛇牀子

五味子

附子

天雄

萆薢

枯藁

薯蕷

遠志

巴戟天

菟絲子

牛膝

柴胡

車前子

細辛

茯苓

杜仲

五加皮

石斛

右一十九味主益精髓患之者準冷熱加減之

乾地黄

菟絲子

天雄

附子

右四味三補骨髓患之準冷熱加減之

當歸

藥木

白芷

乾地黄

五加皮

石斛

菟絲子

薯蕷



北京中醫藥大學圖書館版權所有



五味子 厚朴

右一十味主長肌肉患之者準冷熱加

五加皮 杜仲 續斷

右三味主陰下濕癢患之者準冷熱加減之

茯苓 人參 栝藹

右三味主消渴患之者準冷熱加減之

栝藹 茯苓 芍藥 橘皮

秦丸 山茱萸 車前子

右七味主利小便患之者準冷熱加減之

葛蒲 栝藹 山茱萸



右三味主小便利患之者準冷熱加減之

人參補心 細辛益肝 菟絲子補腎 狗脊補腎

右四味主明目患之者準冷熱加減之

芎藭 白芷

右二味主止淚患之者準冷熱加減之

細辛益肝 遠志補心 人參補心

右三味補益氣患之者準冷熱加減之

石南木 葶藶 狗脊 車前子 石斛

右五味補養腎氣患之者準冷熱加減之

蜀椒 當歸 麻黃 桂心 吳茱萸



紫菀

薺花

藜蘆

附子

半夏

烏頭

菖蒲

遠志

細辛

芫花

五味子

右一十六味主欬嗽上氣患者準冷熱加減之

蛇牀子

石斛

細辛

薯蕷

橘皮

右五味主下氣患者準冷熱加減之

附子

乾薑

人參

桂心

橘皮

厚朴

右六味主霍亂患者準冷熱加減之

黃耆

通草

厚朴

山茱萸

葶草



紫菀

當歸

白芷

主崩帶下

黃芩

蛇牀子

素

芎藭

牛膝

枳實

紫葳

右一十四味主月閉患之者準冷熱加減之

麻黃

枳實

柴胡

桂心

芍藥

主傷寒

通草

菖蒲

遠志

人參

主健忘

黃芩

乾薑

蜀椒

主下痢

紫菀

茯苓

芎藭

右一十六味主唾稠如膠患之者準冷熱加減之

論曰所加之藥非便此方所須普通諸方學者詳而用之

阿伽陀丸主萬病第二

阿伽陀藥主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方



紫檀

小藥

茜根

鬱金

胡椒

各五兩

右五味搗篩爲末水和內臼中更搗一萬杵九如小麥

乾用時以水磨而用之

諸咽喉口中熱瘡者以水煮升麻取汁半合研一丸如桐子大

旦服之二服止禁酒肉五辛宜冷將息

諸下部及隱處有腫以水煮牛膝乾薑等取汁半合研一丸如

梧子大旦服之四服止禁酒肉五辛生冷醋滑

諸面腫心悶因風起者以水煮防風取汁半合研丸如梧子旦

服之二服止不須隔日禁酒五辛醋肉

諸四體酸疼或寒或熱以水煮麻黃取汁半合研一丸如梧子



巨服之禁酒肉及麪五辛

諸腫下部有瘡吞一丸如梧子大又煮艾槐白皮取汁半合

一丸灌下部二度禁酒肉

諸卒死服者多活看其人手腳頭面腹腫觀顏色無定若有此  
色而加痢者並不堪治以冷水半合研二丸如小豆灌口一服  
不差更與一服若損惟白粥鹽醬禁酒肉五辛

諸被魘禱當心常帶一丸又以水一酸棗許研一丸如小豆服  
之三服止無所禁忌

諸被蛇及惡獸等毒若未被其毒直須辟除隨身帶行便即遠  
離入草已被毒者以麝香一相思子大又以水一酸棗許若藥



一丸如小豆於水內研服并以紫檀以水研取汁用研藥塗其  
瘡毒處禁酒肉五辛諸被一切鬼神及龍毒氣者其人飢渴寒  
熱時來時去不知痛處或恍惚龍毒者其人昏昏似醉膚體  
駁或青取藥一丸如梧子以水酸棗許共藥研灌鼻及服二服  
止無所禁忌

諸被鬼撓亂失心癲狂莫問年月遠近以艾汁一酸棗許研藥  
二丸如小豆服之若無青艾取乾艾水浸取汁用亦得四服止  
并帶一丸常可隨身口味無所禁忌

諸傳尸復連夢想顛倒身體瘦損不知病所乍起乍卧先以水  
研雄黃一梧子大取汁酸棗許研二丸如小豆大服之二服止

并挂一丸著病者房門上及帶一丸隨身口味無忌

諸消渴者以朴消少許以水攪消取汁半合許研二九如小  
服之七服止禁五辛酒肉麪

諸患麻不問遠近以苦消少許以水攪取一酸棗許汁研藥二

丸如小豆大服之便止禁酒肉

諸患丁腫以水一升煮玄參取汁研藥服三服止又以水半吞  
研玄參根取汁和藥塗上三遍不須隔日惟食白粥飯自外鹽  
以上皆不食

諸卒胸膈熱眼暗口臭以水煮苦竹葉取汁半合研藥一丸如

梧子二服止禁酒肉





諸難產以蒜蔣二七水煮取半合研藥一丸服之若無蒜蔣研  
薑黃取汁研一吞一丸空吞亦得將息如產時

諸熱瘡無問遠近以水煮大黃取汁半合研藥一丸如橋  
之止又水研大黃取汁以藥一丸研塗瘡上日三遍禁房麩  
辛宜冷將息

諸吐血若因熱吐者不問遠近服之並差冷吐者不

治以薑蒲汁一酸棗許研藥二丸如小豆服之四服止須微暖  
將息忌酒肉五辛

諸鼻中血不止以刺薊汁一酸棗許研二丸如小豆服之并研  
灌鼻二服灌止若無刺薊之時取乾者水煮取汁依前法服禁



酒肉五辛

諸噎病以水研栝藿取汁一雞子大研藥一丸如小豆服之  
服止忌生冷

諸赤白帶下以牡丹皮刺薊根各二分以水二升煮取一升分

五服研藥一丸如梧子服之五服止禁生冷五辛酒肉

後補法

地榆二分

桑螵蛸二分

云桑耳

右二味二升煮取汁一合分作三服取汁一合研藥一丸服

之

諸得藥毒以冷水半合研藥一丸如桐子服之二服止禁酒肉



五辛宜五日冷將息

諸辛得惡忤以人乳汁半合研藥一丸如梧子大灌鼻以水合研藥一丸如梧子灌口三日禁食

諸寒瘧以水一升煮恆山一兩取汁半合研藥一丸如梧子大服之二服止先取藥如麻子大以冷水研灌鼻中三四嚏病者垂頂卧便得痛癢又更灌一邊今相續然後服藥七日少食禁如前

諸蠱甘濕以生犀角白檀香以水煮取汁一雞子殼許研藥二丸如小豆并蚘蛇膽一丸共研服之三服止若甘濕藥及蚘蛇膽各丸之以綿裹內於下部中爲度止

諸益神色除諸病辟惡氣每日以白蜜如棗核大研藥一丸如

小豆大長帶少許亦禁如前

諸草藥毒迷悶以泥裹冬瓜燒絞取汁半合研一丸如梧子服

之若無冬瓜用水服之三日慎食

諸心勞虛弱以水煮茯神人參取汁半合研一丸服之十服以

上止慎生冷

諸心風虛熱以竹瀝漬防風擣絃取汁半合研一丸如梧子服

之七服止慎酒肉五辛醋麪

諸心驚戰悸以水一升切茯苓牡蒙遠志各二分煮取汁半合

分三服一服研一丸服之五服止



諸多忘恍惚以水煮人參取汁半合研一丸服之五服止亦可  
七服慎如前

諸瘟疫時氣以水煮玄參取汁一合研一丸如小豆服之四服  
止量宜緩急惟得食粥及冷食餘皆禁

若患勞家遞相染煮服時并取艾作炷長三寸門闔當心灸七  
壯卽解

諸嘔血水煮白檀生薑取汁半合研一丸如梧子服三服止七  
日慎食如前

諸噦病水一升煮通草橘皮各半兩取汁三合分再服研二丸  
如小豆服之二服止慎生冷



諸小兒驚啼以水煮牡家取汁半合研一丸如梧子塗乳上令  
兒飲乳母慎酒肉五辛

諸產後血結以生地汁半合研一丸如梧子服之服止血  
消下忌食酒肉

諸熱風痺風氣相擊令皮膚厚澀關節不通以防風牡荊子各  
一分畢撥一分以水一升煮取汁三合分三服每一服研一丸  
如梧子大服之十服止慎酒肉五辛

諸熱風上衝頭面上癢鼻中癢兼行時寒熱若食嘔吐以人參  
一分防風生薑各二分以水一升五合煮取汁三合分三服取  
汁一合研一丸如梧子服之七服止慎如上法



諸黃疸以黃芩苦參各二分以水一升煮取五二分三服一服  
研一丸如梧子服苦渴肉茯苓梧蓐苓二分依前以水煮服  
得與粥

諸卒失音不語以防風一兩和竹瀝擣絞取汁半合研一丸如  
梧子二服止卽語重者不過五服禁酒肉醋麪生冷等

諸懷孕三月以上至臨產不問月日多少忽染種種疾或好傷  
落及至水腫天行時氣此醫人不許服藥惟得此藥三服以上  
重者不過十服卽差母子不損平安分解前件諸病可作湯研  
藥服之甚良

諸產後先痢鮮血後雜膿及腹中絞痛橘皮桔梗各二分生薑

一兩水一升煮取半合分三服一服研一丸如梧子服之七日  
慎生冷油膩醋麪

諸小兒新得風癩以竹瀝半合研一丸如梧子服之二服止  
如前

諸女子數傷胎帶一丸如酸棗大夜即解安頭邊不得著身每  
旦服一丸如梧子三日止無忌

諸卒腹脹水煮當歸取汁半合服一丸如梧子二服止慎生冷  
諸臍下絞痛以水煮芎藭取汁半合研一丸如梧子三服蠶七

日慎食生冷

諸蛇蝎蜈蚣毒以水磨鬱金取汁半合研一丸如梧子服之三





服止並研一丸如小豆遍塗瘡上忌如前

諸霍亂因宿食及冷者吐逆腹中絞痛吐痢若冷者以桔梗  
薑以水煮取汁一酸棗研二丸如小豆二服止因熱者用楮  
仁以水煮取汁依前法服皆慎生冷

諸疰病以水煮細辛取汁一酸棗許研二丸如小豆服之五服  
止冷者溫將息

諸中惡以水煮甲香取汁一酸棗許研二丸如小豆服之

耆婆治惡病第三  
方一十  
論一首

論曰疾風有四百四種總而言之不出五種卽是五風所攝云  
何名五風一曰黃風二曰青風三曰白風四曰赤風五曰黑風



其風合五臟故曰五風五風分五種蟲黃風生黃蟲青風生青  
蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五  
若食人腫語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人心遍身生  
若食人肺鼻柱崩倒鼻中生息肉若食人腎耳鳴啾啾或如車  
行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痺若食人筋肢節墮落五風合  
五臟蟲生至多火於骨髓來去無礙壞於人身名曰疾風疾風  
者是癩病之根本也病之初起或如鍼錐所刺名曰刺風如蟲  
走名曰遊風遍身掣動名曰瞶風不覺痛癢名曰頑風肉起如  
桃李小棗核從頭面起者名曰順風從兩腳起者名曰逆風如  
一錢團圓赤白青烏斑駁名曰癘風或遍體生瘡或如疥癬

如魚鱗或如榆莢或如錢孔或癢或痛黃汁流出肢節壞爛悉  
爲膿血或不癢不痛或起或滅青黃赤白黑變易不定病起  
由皆因冷熱交通流入五臟通徹骨髓用力過度飲食相違  
至不節虛動勞極汗流遍體因茲積熱徹五臟飲食雜穢蟲生  
至多食人五臟骨髓皮肉筋節久久壞散名曰癩風是故論曰  
若欲療之先服阿魏雷丸散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後  
與藥療千萬無有不差胡云迦摩羅病世醫拱手無方對治名  
曰正報非也得此病者多致神仙往往人得此疾棄家室財物  
入山遂得疾愈而爲神仙今人患者但離妻妾無有不差

阿魏雷丸散方

阿魏

紫雷丸

雄黃

紫石英各三分

朱砂

滑石

石膽

雌黃

藿蘆

白欬

犀角

各半兩

盤螯

去足翅

芫青

去足翅各四十枚

牛黃

伍分

紫釰

右一十五味擣篩為散空腹服一錢七清酒二合和藥飲盡

大饑即食小豆羹飲為良莫多食但食半腹許即止若食多

飽則蟲出即遲日西南空腹更一服多少如前若覺小便似

淋時不問早晚即更服藥多少亦如前大饑即食若覺小便

時就分子中尿尿出看之當有蟲出或當日即出或二日三

日乃出或四日五日出或殺藥人七日始出其蟲大者如人

指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七八枚或十枚



或二三十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝血色白蟲似人  
涕唾或似魚 或似蠶鼓汁青蟲似綠或似芫青色黑蟲似  
黑色或似爛樅又似黑豆鼓其蟲得藥者死死者卽從小便  
中出大便中亦有出者不淨不可得見若出黑色蟲卽是黑  
風不可理之無方可對若出黃蟲卽是黃風當用小便七八  
升大甕盛之如竈法安甕不津者盛小便中常令使暖入中  
浸身一日再三度一入中坐浸如炊二三斗米項若心悶卽  
出湯數食莫令饑虛則於人無力七七四十九日卽爲一徹  
以差爲度或一二年忌房室房室脉通其蟲得便病卽更加  
其患非冷熱風治如此此是橫病非正報也若出青蟲卽是

青風患氣由冷風至多其蟲皆青卽是東方木中毒風青蟲  
宜服自身小便亦名青陽亦名還中水服法空腹服一七  
一服六合旦起日初出卽服服不過一升饑卽食不得食  
辛豬肉雞犬穢食臭惡之食大噀怒房室皆忌之服法第一  
忌之至二七日一日再服服別四合服小便常取空腹服之  
則不過一升三七日一日三服至四七日小便出卽服乃  
至周年以差爲度服之不過一升百日外小便至少一日之  
中止可一度二度服之大香美好如羹如漿忌法三年犯則  
難差不犯永愈青蟲如此是橫病非正報也出白蟲者卽是  
白風赤蟲者卽是赤風同爲一等療二風由熱爲根蟲皆赤



白乃是南風西風入五臟通徹骨髓成患爲疾此之二風與  
苦參消食酒飲之除患最疾熱去其患卽愈

苦參消石酒方

浸酒法  
在後

苦參

消石

好清酒

右二味先與清酒下消石浸之

二七日或三七日然後與苦參同入酒甕中盛浸之七日漸  
漸服之飲法空腹服之一日三服初七日中一服如半雞子  
許七日後可飲一升任情飲之多則爲善患去則速風動亦  
多勿使醉吐寧漸少飲不用多飲赤白二風此藥至日無有  
不愈餘非難治何以故熱爲根本故苦參能治熱消石除熱  
消蟲赤白二蟲但聞消石氣皆變爲水能去熱根本若患赤



白二風不問年月多者五年以外加黃消石加酒苦參乃至三四兩無有不愈乃至三十年無鼻柱肢節墮落者但非蟲皆悉永愈第一忌房室大瞋怒大熱食禁粘食五辛生大脂酪白酒豬魚鷄犬驢馬牛羊等肉皆爲大忌自餘不禁此爲對治非正報也若人頑痺不覺痛癢處者當作大白膏藥摩之一日三四度七日徹或二三日徹乃至七七四十九日名曰一大徹頑痺卽覺癢乎復如本卽止摩若不平復但使摩之以差爲限不過兩大徹三大徹無有不愈鍼刺灸燒割劫亦不及摩之爲良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈

# 大白膏方



白芷

白朮

前胡

吳茱萸各一升

芎藭二升

蜀椒

細辛各二兩

當歸

桂心各二兩

苦酒四升

右一十味以苦酒浸藥經一宿取不中水豬脂十觔銅器

煎令三沸三上三下候白芷色黃膏成貯以瓶中隨病摩之

即愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

### 大黑膏方

烏頭

芎藭

雄黃

胡粉

木防己

升麻

黃連

雌黃

藜蘆

礬石各半兩

杏仁去皮尖

巴豆各四枚

黃蘗一分

松脂

亂髮各如鷄子

右一十五味擣篩為末

以豬脂二升合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傳先以



鹽湯洗然後塗之勿令婦小兒雞大見若患人眉睫墮落  
生者服藥後經一百日外門以鐵漿如其眉睫處所一  
度洗之生毛則速出一大徹眉睫如本與不患時同也

### 浸酒法

苦參去上黃皮薄切麩乾搗令散莫使作末秤取三十觔取  
不津甕受兩斛者甕底鑽作孔甕中底頭著二三十青石子  
如桃李鷄子許丸過底孔上二三寸然後下苦參下消石末  
酒一時著甕中遺童子小兒年十三四者和合調停然後卽  
與五六童故紙繫甕口用小甕口合土泥之莫使漏氣取酒  
服時法孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞



孔勿漏洩不得開甕口取酒酒欲盡時開甕日取苦參滓急  
絞取酒其滓去邪其酒密處盛之莫使漏氣服酒法一  
前無有不愈若患不得差除者皆由年多十年者更作  
酒至兩劑無有不愈依法如前雖用良醫治之亦須好酒須  
行忠直不得不孝不義患除則速矣

論曰苦參處處有之至神良黃消出龍石窟其狀有三種一者  
黃消石二者青消石三者是白消石其形如鹽雪體濡燒之融  
似曲蟻見鹽爲水消石真者燒鍊皆融真偽可知三種消石黃  
者爲上青者爲中白者爲下用之殺蟲皆不如黃者最良黃消  
石立殺人身中橫蠱去蠱至速除大風大強藥青消石者至神


大藥出在烏塲國石孔中自然流出氣至惡大臭蜂蛇飛蟲皆  
共宗之其氣殺蟲消石與苦參酒相入治熱至良去風至速  
稀有有用時乃勝於白消石比青消石體狀也如似世間膠漆  
時亦如陳密亦如飭鋪少必枯體澤又似塵汙脂密氣味至惡  
此藥道士貴服則去人身中橫蠱不能得用時先與二升酒浸  
之二十日多日爲佳其勢倍效皆大驗然後與苦參同浸  
論曰黃青白消石等是百藥之王能殺諸蟲可以長生出烏塲  
國採無時此方出耆婆醫方論治疾風品法中黃力三藏譯後  
演七卷治疾風品法云服藥時先令服長壽延年符大驗蕩除  
身中五臟六腑游滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無

疑符力亦是不思議神力先服藥者無有不效又生造藥入藥  
中時令童子小兒和合訖即告符書鎮藥符鎮在甕腹令  
壞久久為好一切神不敢近之矣

論曰疑師不治病疑藥不服之服之即不得力決意不疑者必  
大神驗一切藥有從人意即神疑人必失及久多必損不疑久  
者有益治病當有愈醫論如此說是以令知服藥先服藥符大  
驗遺諸惡氣藥勢必當有效朱砂書空腹服之訖即服藥一如

前說

朱砂書



先服此符然後服藥一服之後更不須再服書符用六合目  
勿令小兒女子六畜雞犬等見之符成不忌

論曰病起從上者名爲順病病則易治治則病疾愈從下起  
名爲逆病難治倍藥可差

論曰患在五臟骨髓者非湯藥不愈患在皮膚肉脉中者鍼刺  
可差湯藥益人精神久有益患易除愈盡其根源鍼灸雖得目  
下解急於人神濁養性延年要是湯藥非鍼灸之所及也湯丸  
散酒延年益壽燒灸鍼刺於人不利

論曰疾有多種所患不同有蟲癩疥癩風癩金癩木癩水癩火  
癩土癩酒癩變癩此皆律癩



蟲癩者得卽生瘡膿血潰爛眉髮墮落三年爛壞蟲如馬尾此  
患難治加藥乃愈

疥癩者狀如癬癢身體狂癢十年成大患加藥乃愈

風癩者風從體入或手足刺痛風冷痺癱不療二十年後成大  
患加藥乃愈

金癩者是天所爲負功德崇初得眉落二年食鼻鼻柱崩倒難  
治加藥乃愈

木癩者初得先落眉睫面目癢如復生瘡三年成大患宜急治  
之加藥乃愈

水癩者先得水病因卻留停風觸發動落人眉鬚宜急治之經



年病成加藥乃愈

火癩者先於身體生瘡如火燒瘡或斷人肢節七年落眉睫

年成大患難治加藥乃愈

土癩者身體瘡癩如鷄子彈丸許急治之六年成大患加藥乃

愈

酒癩者飲酒大醉不覺卧黍穰中經夜方起遂即成疾眉鬚墮

落速治可差

麩癩者遍身有瘡生蟲其蟲形如麩舉體艾白此病難治加藥

乃愈

凡三十九種病或面疱起身體頑痺不覺痛癢或目員失光或





言音癱重或瞋蒙多睡或從腰髖或從足踵種種不同莫能識者病非一般或所得各異若眉鬚墮落皆由風冷因濕得之因汗入水冷氣大過或飲酒大醉濕地而卧或立當風衝露或房室過度流汗極體取冷風入五臟遂成斯患是故論出患之所根本藥之分劑未來病者按而用之無有不愈

浸湯方

桃柳各十助 葭蓉

藜蘆

烏頭去皮

茵芋

丹參

楮葉 白羊

柏葉

檠皮

大黃

鬼扇

桑甲 藁本

棗葉

松葉葉

食茱萸各二助

鹽

伍升

右一十八味細剉內大金中以水七斛煎取汁四斛去滓內



槽中令病者卧浸旦至食時便出日中時復八日西復出其湯常欲得煖以自消息出湯即用十種粉粉身不得使風被覆温卧使身汗流病即差若風多不可加藥如左

葫藿 艾葉 土瓜根 虎掌各三觔 菟絲 木防已

狐骨各二兩 礬石二兩 大鹽一升 馬牙消三兩 右一十味搗篩

為散出湯用粉粉身使風不入諸癩病生瘡一切諸惡瘡上用粉粉之宜差矣

又作酒法

茵芋 烏頭去皮 天雄去皮 附子去皮 蜀椒 防風

石南 乾薑 桂心 躑躅花 莽草 甘草各一



右一十二味以絹袋盛之清酒一斗漬之春秋七日夏五日冬十日一服三合日三服以知為度不知漸增禁如禁  
仙人黃靈先生用天真百畏丸治一切癩病方

淳酒二斗以銅器中煮之減半然內藥丹砂 水銀 桂心 乾薑 藜蘆

烏頭炮去皮蜀椒汗出口者柏子仁 菖蒲各一兩 右一十味搗

篩為散內酒中訖復下淳漆二升攪令相得可丸如梧子作

九百丸日服一丸日三十日眉鬚生三十日復本也

九霄君治十種大癩不可名狀者服之無病不愈方

用三月庚寅日取蔓青花四觔陰乾末之五月辛酉日取兩井水一升內銅器中煎之令濃然後內桂心末 附子末炮



藜蘆末

各一兩

乾漆末

四合

石榴末

一斗

右五味藥末攪使相

和煎令成丸如彈丸大服一丸即愈若不差者不過三四丸即愈大驗此方出九霄君守朴經

### 仙人治癩病神驗方

取松葉不問多少煮三五遍令苦味盡累乾搗末如麩先食服二方寸七日三漸增之或可至四兩隨人多少至一筋饑即服之能愈萬病又益壽延年殺三蟲食人五臟動發若病難忍四肢重不仁婦人產後餘疾月水往來不得續男女少者藥悉主之

### 礬石釀酒方



礬石燒石膏

代赭

恆山

遠志去

蜀椒去目閉者

狼毒半夏洗

芒消

礬石

玄參

麻黃節去

防風 桔梗

秦朮

石南

石韋去毛

黃連

莽草 乾地黃

凝水石

菟絲子

甘草炙各一兩白石英一觔

杏仁三十枚去皮尖熬

右二十五味擣篩盛韋囊中以乾麴三觔米三斗作酒酒熟

合藥封之冬十日春七日夏三日秋五日出藥去滓服酒如

一鷄子酒勢盡復進之所治無有不愈日再十日知三十日

愈百日面白如桃李花色耳目聰明邪氣蕩除去魂還復服

藥當齋戒有效驗矣



躡躡療冷第四 方六首

鹽麴主一切風冷氣等萬病方

麴末五升

鹽末

五升

右二味熟擣分作五袋旦取二袋

令熱以薄袋各受一升內藥於中更遞盛之於室內卧以躡躡袋以被覆之取汗其藥冷即易初一日一夜限以十度炒之於後連日連夜數炒頻躡不得暫停其藥既易多無方即棄之別取新者惟候遍體汗盡其病方差特須細心多日久候汗盡乃止未盡其間數有悶亂惟食香漿粥飯持息生冷所卧牀上數白孰羊皮刺風汗並盡然後乃補之三部脉微弱者勿用之

補酒方

石韋

十兩 去毛

石南

三兩 炙

仙靈脾

十四兩

細辛

五兩

右四味切和

水一斗煎取二升去滓經宿澄杏仁一升去皮尖及雙

以水八升研取汁煎取二升半經一宿以二汁合之計得四

升半以乾麴一斗五升先以五加皮汁浸麴停一宿其次

下石韋等汁一時合和以上黍米七升分為七酸三日下酸

凡三十九日即熟取麻子一升淨擇炒令香熟擣作末以絹

袋盛內酒中經三日量力稍稍服之以知為度其補日與躡

麴日等盡補以來大小便不得出屋忌房室喜怒若犯忌後

發難差其無酒補者則補方如左



羊膈肝腎心肺

一具以熱湯淨洗膈白餘藏皆生細切

鼈牛酥

胡椒

畢撥

各一 豉心半升葱白三握去

鬚細切

右五味合和以水六升緩火

取三升絞去滓和藏等并餘汁並內膈中以繩急繫口更

絹袋一口稍小於羊膈煮之若熟乘熱出以刀子并絹袋刺

作孔瀝取汁空腹服令盡餘者任意分作羹粥食之其無五

臟可得用羊骨以補之其方如左

生羊骨

兩具打碎

右以水一石微火煎取三斗依食法任意作羹粥食之其不

食肉者以油麩補之方如左

生烏麻油升浙粳米泔清汁

升右二味合和微火煎盡泔清汁惟有油在即止停冷以用

作食補法如左

以上油合鹽汁合

右二味先以鹽汁和





油攪令鹹淡得所卽用以漉麪一升依常法作餅飪煮五六  
沸漉出置冷水中更漉出置盤上令乾後更一葉葉擲  
又煮如常法十度煮之麪毒乃盡以油隨意多少和鼓

足以燒食天好

丙釀法主婦人絕產及冷結氣宿食不消男子五勞方

生地黃

五升細切以水洗漉乾持取升

麪末

右二味合和內小甕子

中密塞口勿洩春夏秋三十日冬埋入地三尺四十九日出

之炮乾搗篩以糯米作粥一升以散二方寸匕和服之日三

隨意服之不限侍節便以爲常食取飽足已更不得餘食

也服盡以來其病並差七日後任如常食

第二十卷終

