

金創口授

附青洲鑿於

全

ヤウ

867



武 9
364
867
門 補 卷

青洲先醒金創口授
同醫談花 製骨口授

外科神書

越山所持



外科神書

青洲先生金創口授

傷^傷虽^有小^所 几^之金^患瘡^也ヲ^也療^也セント^也欲^也セ^也ハ^也医^也先^也患^也者^也ニ^也向^也ヒ^也氣^也ヲ^也丹^也田^也ニ^也収^也メ^也心^也ヲ^也動^也セ^也サル^也ヲ^也肝^也要^也ト^也ス^也兎^也角^也死^也生^也ヲ^也論^也シ^也テ^也療^也治^也猶^也預^也ス^也ル^也モ^也ノ^也奈^也ガ^也洲^也ハ^也不^也然^也生^也死^也ヲ^也不^也空^也論^也先^也治^也療^也ヲ^也施^也ス^也シ^也強^也テ^也死^也生^也ヲ^也論^也ス^也ル^也ハ^也必^也先^也名^也利^也ニ^也拘^也リ^也仁^也術^也ヲ^也忘^也レ^也シ^也者^也ニ^也去^也テ^也ガ^也ラ^也ヲ^也危^也篤^也ニ^也テ^也難^也治^也ニ^也思^也ハ^也暫^也ク^也見^也合^也セ^也別^也室^也ニ^也就^也テ^也能^也治^也法^也ヲ^也ユ^也夫^也シ^也考^也フ^也可^也倘^也治^也療^也中^也ニ^也死^也レ^也ハ^也也^也上^也ノ^也謗^也ヲ^也免^也ス^也又^也治^也易^也症^也遲^也滯^也ニ^也反^也ハ^也ハ^也是^也亦^也世^也人^也免^也ラ^也招^也ク^也此^也差^也別^也平^也常^也ニ^也心^也得^也有^也ベ^也シ^也サ^也テ^也又^也自^也然^也ノ^也性^也戒^也損^也傷^也ハ^也子^也細^也ナ^也シ^也唯^也詳^也口^也論^也或^也翻^也争^也等^也ノ^也金^也瘡^也ニ^也是^也非^也氏^也公^也議^也ノ^也檢^也使^也アリ^也若^也危^也篤^也ノ^也症^也ナ^也レ^也ハ^也檢^也使^也来^也ラ^也ガ^也ル^也前^也ニ^也療^也セ^也ント^也思^也ハ^也其^也親^也族^也ハ^也勿^也論^也其^也如^也ノ^也役^也人^也ニ^也疾^也ノ^也大^也小^也淺^也深^也且^也何^也ヶ^也所^也ト^也シ^也テ^也委^也細^也ニ^也カ^也セ^也自^也身^也懷^也中^也



シ并瘡^治療中急変アリ此少モ不苦ト云證文カセ取置ヘシ若
療治中檢使来ラハ大患ノ变故治療遅延ニ及ヒテハ変ヲ生シ蓋
公儀ヲ勞シ奉ラシ事ヲ恐レ檢使ヲマタス治ラ施シタリト云ハハ事
故ナク済ムモノ之如ク大患ハ拾別ノ事其他死スル程ニテモナ
キ疾ナラハ檢使ニ對シ成タケ輕キヤウニ執成シ置ヘシ對テ方
ノ思ヒハモ達ニ大ニ悦フ事ト

治法先患心者ノ室ニ入氣ヲ能鎮ノ人參調榮湯杯煎セシメ
兼テ回生散生神散杯ヲソナヘ置ヘシ療治ニカカリ俄ニ氣ヲ引入ル
氏杯用ル為ニ必蘇合香圓延齡丹ナト用ユヘカラズサテ又可備具
縫^縫周^周五^五步^步ホイト^{傷深ケ}毛引^{金創鍼}油^{油ヲ能扱}小手^手鉄^鉄
木綿^{木綿}其^{其所}ノ寸^寸尺^尺アリ^{アリ}雜^雜印^印縫^縫糸^糸各^各尺^尺寸^寸程^程ヲ^ヲ針^針ニ^ニ付^付置^置シ
金瘡^{金瘡}肉^肉厚^厚延^延動^動指^指ニ^ニ木^木綿^綿ヲ^ヲ卷^卷テ^テ疾^疾内^内ニ^ニハ^ハレ^レム^ムヲ^ヲナ^ナキ^キヤ^ヤウ^ウニ^ニ能^能ク^ク瘀^瘀血^血ヲ^ヲ洗^洗去^去ル^ル可^可指^指ニ
テ^テ取^取兼^兼六^六毛^毛引^引ヲ^ヲ用^用ユヘシモトハホツシニテ洗ヒシガ予ハ常木綿ヲ用
ルニサテ疾ノ内ニ瘀血焼酎等ヲスホイトニテ能ク吸ヒ可取焼酎熱
ニ過レハ肉ハセル之免角心ヲ落付ケテ了寧ニ洗フ可洗ノ内出血シ
テ不止事アリ指ニシカト押止ムヘシ他家ニテハ擦リクスリ又燒金
ナトアテルアレ此甚惡シ後必膿ヲ催スナリ若血止ラ又片直
ニ可縫^縫先^先疾^疾真^真中^中ヲ^ヲ縫^縫コ又^又正^正中^中ト^ト疾^疾端^端ト^ト正^正中^中ヲ^ヲ縫^縫ヒ夫
ヨリ次第ニ間クハリ縫フヘシ大抵針ノ間五分位宛ニ可縫糸ニ
雞子白ヲ引モ善シ又津液ヲ塗モヨシ一寸余リノ疾ナレハ何

燒酎^{燒酎} 癩^癩深^深キハ燒酎^{燒酎}六^六分^分ニ
ロウ^{ロウ}サ^サワ^ワア^アトル^{トル}四^四分^分ヲ^ヲ用^用

金瘡^{金瘡}ニ^ニヨ^ヨリ^リ經^經
タル^{タル}ハ^ハ創^創口^口頑^頑肉^肉
加^加ク^ク脹^脹リ^リキ^キリ^リ燒^燒酎^酎
ニ^ニテ^テ能^能ク^ク洗^洗ヒ^ヒ温^温ム^ム
レ^レハ^ハ和^和ク^クモ^モク^ク備^備創^創
口^口ハ^ハセ^セテ^テ底^底強^強ニ^ニ度^度
ニ^ニ縫^縫ニ^ニト^トモ^モ人^人患^患シ^シ疾^疾
ニ^ニテ^テ取^取兼^兼六^六毛^毛引^引正^正
ク^ク縫^縫コ^コ創^創内^内ニ^ニセ^セイ
肉^肉ヲ^ヲ引^引キ^キ手^手鉄^鉄ニ^ニテ^テ切^切
去^去ル^ルト^トシ

右^右品^品備^備ニ^ニ備^備ヘ^ヘ可^可置^置之^之又^又四^四ヲ^ヲニ^ニツ^ツ燒^燒酎^酎雞^雞印^印酢^酢ヲ^ヲハ^ハル^ル器^器ニ
夫^夫ヨリ^リ燒^燒酎^酎ヲ^ヲ手^手引^引加^加減^減ニ^ニワ^ワカ^カシ^シ綿^綿中^中ニ^ニ浸^浸シ^シ疾^疾口^口ノ^ノ四^四辺^辺ヨリ^リ徐^徐々^々洗^洗ヒ
指^指ニ^ニ木^木綿^綿ヲ^ヲ卷^卷テ^テ疾^疾内^内ニ^ニハ^ハレ^レム^ムヲ^ヲナ^ナキ^キヤ^ヤウ^ウニ^ニ能^能ク^ク瘀^瘀血^血ヲ^ヲ洗^洗去^去ル^ル可^可指^指ニ
テ^テ取^取兼^兼六^六毛^毛引^引ヲ^ヲ用^用ユヘシモトハホツシニテ洗ヒシガ予ハ常木綿ヲ用
ルニサテ疾ノ内ニ瘀血焼酎等ヲスホイトニテ能ク吸ヒ可取焼酎熱
ニ過レハ肉ハセル之免角心ヲ落付ケテ了寧ニ洗フ可洗ノ内出血シ
テ不止事アリ指ニシカト押止ムヘシ他家ニテハ擦リクスリ又燒金
ナトアテルアレ此甚惡シ後必膿ヲ催スナリ若血止ラ又片直
ニ可縫^縫先^先疾^疾真^真中^中ヲ^ヲ縫^縫コ又^又正^正中^中ト^ト疾^疾端^端ト^ト正^正中^中ヲ^ヲ縫^縫ヒ夫
ヨリ次第ニ間クハリ縫フヘシ大抵針ノ間五分位宛ニ可縫糸ニ
雞子白ヲ引モ善シ又津液ヲ塗モヨシ一寸余リノ疾ナレハ何

レナイナヤヲ入ルニ五寸以上ノ痲ニ二寸或二寸半モ入ルニ給ハ尤
突羔ニ或雞子煎ヲ交ルモ善シサテ肉ノ厚キ所ハ五六分モカ
ケ縫フハ浅キ所ハ三分許ニテヨシ縫テ后痲ノ四邊ニ六口ウサワ
アトル椰子油ノ類ヲヌル痲ノ腫ナル手當之創口ニハハルサニ或ハ
金瘡油ヲ可塗次ニ玉子木綿三枚重子ヲ貼ス雞子ハ痲浅ケレ
ハ白ヲ用ユ痲深ケレハ黄ヲ用エルニ其上ヨリ 酢木綿三枚重子
置ク又其上ヨリテヘンスイフニテ蓋ヒ貼ス予ハ二番ヲ用ユ或ハ先
鋒ヲ貼スフタ羔ハ痲木綿ヨリ余程大ニシテ不動ホドニスベシ次ニ枕木
綿ヲ置ク是ハ木綿ヲ三重ニシテ蓋羔ノ上ヲ今一度ハルニ卷木綿
ノ片ハ玉子木綿等 動カサル為ニ其上法ノ如ク卷木綿ニテ
動搖セサルヤウニ能ク可調護 燒酎ヲ温ノ浸シ徐ニ重
ツト木綿ヲハギ可取キ荒クスレハツニナリテ取レルナリ 尤下ノ一

重ハ其終 置テ可診倘其木綿血ニ染テアラハ其終 残シ置キ
其上ヨリ前日ノ如ク木綿ヲハルベシ安ニ手荒ク木綿ヲハナセハ再出
血シテ止カタキ事アリ若 血染テナクハ取去テ佳ニ夫ヨリ三日四
日ノ間ハ始ノ如ク玉子木綿三枚酢三枚前ノ如クスレ四日ヨリ木綿
灸皆取去リ羔茶ニ貼スルニ是則金創ノ愈シ茶之灸方アリ撰
ムニ先尋常ノ痲ニハ前衝ヲ貼ル 能愈ルニ五日或七日ノ
后縫タル糸ヲ毛引ニテ試ミ動シ見ルニ糸シカトシマリアルハ肉イマ
ダ十分ニ愈合サルト知ルニ糸ユルミアルハ肉愈付タルト知ニシ肉
接タル状ヲ見定ハ見合テ 糸ヲ切抜去ルニシヤハリ羔茶ヲ
貼スニ最モ一鍼宛間ヲ隔テヌク可ニ度ニ不残不可抜キ荒クス
ハ出血スル事アリ 創ノ内膿氣アル者ハメイナヤヲ前ノ如クカスハ
シ膿尽タラハ可止膿尽テ任水氣アルモノハ水氣尽ル迄サスニ

何レモアマリ深クサスベカラズ

金創悪候

直視上竄

瘡口乾燥

謔語

欠神氣不通

面赤如狂

面赤目黄

血脱

搐搦

喘氣逆

小便不通

額上生汗

反張

吐吐噦

寒戰咬牙

下利或自利

唇失色

身強直

脉浮大数及沉遲

右諸症ヲ見ス者不治ト可心得

凡死生ヲ試ニハ童便ヲ與テ三度共ニ吐スル者ハ死スニ度受ル者ハ生ク不受者ハ死症也

一分八所ノ創

兩手脉所

結喉

會阴

兩膝頭

乳下動脈

天庭

鳩尾

耳下動脈

又別 八所

足阳明經多血

大阳穴

足大阳動脈


神聖通

阴股動脈

カランスナード子ツキツナード

ヘルナード

右何レモ多心知



如此頭ニ三ツノ合目アリ前ヲ顛ト云子ツキツナード

是之中ヲ顛ト云カランスナード是之后ヲ顛ト云ヘルナード

指ヲ切リ流シタル多出血ス血管ヲ絶シ

止ルナリ三毒散ヲ用テ印ヲ捺テ指ヲ洗

冷水ヲ指ヲ洗ハ

ヨリ出ル者之洗血ノ出ル脉道ヲ丸手ニテ按住シ右ノ手ニテ法ノ

如ク洗ヒ手早ク脉道ノ傍一步許去テ可縫一針ヌヒサヘスレ

ハ肉ヒツタリト合テ血ハ止ムモノ血ノ出ル脉ヲ按テ止ラザレバ

脈道ノ下タノ肉ヲカケテ指ニテ押上脈道ヲ塞クヤウニ縫フハシ
燒金杯ヲ用ユレハ后腐ヲ生スルニ若又前ノ如クスト虽出血不止ハ
糸ヲ切ステ、縫直スヘシ糸ヲ少シ筋違ニ絡脈ノ下エカケ絡ヲシ
メ括ルヤウニスヘシ必止ムモノニ又深キ脈道ハ唯止サヘヒツタリト縫
片ハ肉合テ血ハ自然ニ止ムモノニ筋違ニ縫フニ誤テ絡ヲ刺ス者ナ
カレ必針口ヨリ再ヒ血出ルモノニ少シ深ク縫ヘシ口傳ニナクテ筆
ニ尽シ難シ

頭創

頭ハ神經ノ出ル源ニ是ヨリ一身工廻ラズルニ身中ノ主タル事ハ
心藏ヨリ重シ胎内ノ赤子モ先頭ヨリ成テクルモノニ頭ニ神經ノスチ
ニ十有脊骨ニ至リ分テ六十アリ前ニモ云如ク頭ニ三ツノ合目ア
リ此合目ニカリタル癩ハ必死スルニ都テ頭腦ヲ包ム皮六枚アリ皮膚層

肉薄皮薄キ英ニ枚之上皮ヲトフラーマダラト云下皮ヲヒイマ
カマタラト云ニ其アマタラト肉トノ間ニセイ^{ニイノ語ク}区ト云モノアリ所謂
神經ニ已ニ癩付タルハ大切ニ癩浅クシテ鉢ヲ包ム右ノ薄皮ニ
アタラスシテ皮膚層肉ハカリ切タルハ療治シテ生ヲ可得勿論打撲
或損傷又ハ右ノ合目ヨリニニ歩モ去タル癩ハタト、薄皮ギレ腦ニ癩
付タリ凡腦ヲ包ム^{ニイ}薄皮英ダニキレサレハ生ヲ得ヘシ都テ一身ノ肉何如
モ肉ト骨トノ間ノ白皮ヲセイ^{ニイ}区ト云セイ^{ニイ}区ハ油皮及之腦ト云モノハ白
蠟ヲタキタル様ナルモノニテ子バキモノニサテ又頭ノ骨ヲ打込^{ニイ}
シニハテヤマンタト云器ニ引上ル事アレ是ハ引上スシテ可ニテアマシ
ト云ハ三ツ目錐ノ如キモノニ夫ヲ骨ニモモコ引上ルニ夫ニテハ腦ニ癩
物入りテ及テ惡シヤハリ夫ナリニ法ノ如ク縫片ハ長肉ニテ碎ケシ
骨ハ自然ト癩リ出ルニシカシ妄ニ抜去ル不可血出ルモノニ自ラ

出ルヲ待テ取ヘシ

頭ノ骨ニカミリタル創ハ油入ル羔ヲ禁ステキステイ●ヲ貼ス
ヘシ但シ浅創ノ者ハ油入羔若シカラズ

水石ニアタリ破レタル者ハ法ノ如ク縫ヒ可療破レサル者ハ打撲
ノ法ヲ以テ可治腫痛甚キ者ハ毛ヲ切去イクユントヒクルマシラ
可付能痛ヲ止ル羔ノ葉テ保生一ヲ用ユ今ハ和經一ヲ子フ或
神州一ヲ用カンフラニテ蓋スヘシ右ノ方ニテ痛不止ハ口ウサワア
トルヲ塗リ其上ヘテハニスイフニテ加工可付若夫ニテモ不止ハイン
クエニトスツテ一トシ或ハハウホーリヨニ善シ尚腫痛不止ハ患寒
冷熱シテ高腫シ痛ノ如クナルニ極テセイテト骨トノ間ニ瘀物
滞リタルニ試ミニ細管ヲ以テ前齒ニテ吸シメサセ管ノ先ヲ指シテ
彈キミルヘシ瘀物アル者ハ痛所ニ徹シテ忍難キモノニ或ハ苦藥

秤ヲ咬切ラセ見ルヘシ瘀物アル者ハ痛所ニ徹シミルヘシ忍難キモ
ノニ或ハ苦藥 秤ヲ咬切ラセ見ルヘシ得咬ミ切ヌ者ニ此ハ刺テ瘀
物ヲ抜去可シ然シ急處ヲサケテ可刺モシマタ其傍捨置寸ハ瘀物
腦ニ入り耳ナトヨリ膿汁出テ死スルモノニ都テ頭骨ニ破レアルモノハ如
斯シテ可試

面創

面創ハ凡テ鍼目近ク縫ヘシ痕ツカヌ為ニサレ凡余リ近キニ過レ
ハ又膿ヲ催スニ又眼胞ハ肉ウスキ所ニ隨分シワノヨラヌ様ニ縫フ
ベシ又油入タル羔ヲ忌ムニ大ニ痛ヲナシテ苦ムモノニ予ハ缺唇ノ治
ニ隨ヒ無名異麒麟血ヲ雞子白ニテ煉貼ス一眼ノ瘀ニテモ兩
眼氏ヲヒ可置兩方氏内ハ通シテアルモノニ又玉ヘカ、リシ創ハ
目ヲ少シ動スヘカラス神水出ルモノハ失明スルニ夫モ至テ小瘀ナレ

ハ失明セサルニ凡至ノ疾ハ多ク膿ハモノニ膿暗ハ必失明ノ点茶
ノ外治方ナシ神水ハ能澄タル水也

耳創

耳ノ創ハ唯常ノ如クニ縫フハ縫目粗詰スルニ外測ヲ一鍼豎
ニ縫ベシフシテ右ハ常ノ如ク縫フニ傳圖右

鼻創

鼻ノ疾ハ正面ヲ切り兩傍ハ及フ者ハ先正面ヲ縫テ右兩傍ニ可縫
三鍼ナレハ三鍼一下キニ通シアトニテ一ツ宛結ブベシルテ面部
ノ疾ハアルタケ綴白ラヌ様可縫

咽喉創

咽喉ノ疾ハ氣道ヲキレバ速ニ死ス前ヲ喉ト云後ヲ咽ト云
食道ヲ切シハ間々タスカル事アリ結喉ヨリ上ハ多クハ苦シカラズ結喉

氣道ニ至テ行
又據ニシテ行
死ス

ヨリ下ハ甚六ヶ敷キニ兩旁エ五ヶ敷ニテアル疾ハ死セヌ者ニ都テ
此辺ノ疾ハ皮ヲ撮ミアゲサシロカエテ可縫口授ニ

胸膈創

膈膜ヲ貫クハ肺部エロル故ニ喘咳或吐氣杯乾シテ甚六
ヶ敷者ニ上ニ逼迫ニテ吐血ナトスルハテレメシエハリニシラニ疾ニ
付内ヨリ泊夫藍ヲ五フ此疾ハ其疾藏府上へ迫ル故腸ナト
乳ノ下へムケテ出タルヲ見タリ乾萎存連人參或童便ヲ加用
ニ右ハ調榮一宜シ心ハカル者ハ血飛出テ即死ス元氣能トテ
アテニテラズ心血ハ薄紅色也胸ヲ穿タリ切タリスル者ハ腔工
血落ル事アリ痰汁交リ血出ルモノニ其時ハ疾ヲ下ニ成様ニシテ
脈ヨリ血ヲ押シ腎ノ藏ハ迷アケ元々可返突疾ハ浅キ様ニシ
テ深キモノニスボイトニテ能々可洗凡テスボイトニテ洗シマト

ハ随分ヨク吸取ベシ不縫シテメイチマヲ挿ムハ然レ廣キ
創ナス少シ可縫五歩ヤ一寸ノ瘡ハ不可縫メイチマハ左突
カヌハ口ウサワアトルニヲ、リウニヲ可加
肺ニ瘡ツキタルレハ喘アリ其外創ニ縫ハハ肺氣洩テ
胸ニ滿シ糶ムニ先肺ヲ縫テヲサメ而シテ外ヲ可縫肺縫
様口傳

背創

背瘡ハ四五推ニアタル者深キハ難治之浅キハ不苦豎瘡ハマ
タシモノ事横瘡ハセイテヲ切故氣絶スルモノニ乾姜黄芩
黄連人湯生神散童便回生散ノ類ヲ用ユ急所ニテ氣絶
シテ右ノ葉ニテ懸ラズハ生牛ノ腦ヲ割テ人ヲソノ内ニ收メ温ム
レハ必蘇ス若脉絶シタルト全ク死セシ人ハ蘇生セズ其術ハ

平常ニハ行ヒ難シ余リ騷動ニ

都テ急所ニアタル瘡ハ一夜ノ内ニ乾燥シ紫黑色ニ成腫痛
寒熱煩渴スル者ニ格別急所デモ無ニ一夜ノ内ニ如此症ヲ
見ス事アリ凡テ七惡中ノ一症ヲ見スハ難治タル事心得アルハシ
外ヨリハ別ニ術ナレ附テハ續命一或ハサフランノ末ヲ童便
ニカキ交セ可多クハ不治之黑色ニナルハ血氣ノクラサル故ニ此
ノ治法可考

藏府創

藏府ハ瘡付モノハ難治之但シ藏ハ多ク救ヒガタシ府ニア
タルモノハ間々スクフベシ小瘡ハ治ヲ得テ可愈胃府ニアタルハ食
ヲ吐ニ唾血ナトシテ又吃逆スルニ脾藏ハ血色紫黒ニ肝藏
ハ膿血色ニシテ腎ノ藏ハ水交リ出ツ脊ノ十四椎ニ當ルニ

肝ハ右ニ位シ存外大ニ脾ハ左ニ位ス古来素難ノ説今事實ニ
合セス按左右ノ字倒置セシナラン小腸ノ府ハ臍左ニ当ル水交リ
ノ血出大腸ハ右ノ方ニアリ糞ナド出ル胆ノ血ハ青黄ニ肝ノ下ニ
リ膀胱ハ横骨ノ下ニアリ小便出ル其内大腸ノ瘕ハ治シ易
シトス

納腸術

先如法アラヒ上下ノ位ヲ見ルヘシ逆ニ納レハ度テ愈ズ收納テモ腹
痛ナド為ナリタトハ三四尺出タルモノニテモ初初尺許スラリ入ルモノ
ニ残り~~カ~~成テ六ケ敷モノノ水ト氣ト滿テ有テ堅ク張ル故ニ
入兼ルニ其術ハ腸ノ出タル処ヨリ四寸上ヲ摘ミ手ニテ徐々ト挿入ル
ルニ古人創ヲ切ヒ口ケ入ルニアリ拙シ不可取今少シ~~ニ~~成テ入兼
ルハ針ヲ以テ四五処可刺氣洩テ入易キニ此子術ハ口授面命ナラ

テハ全ヲ得難シ何腸ノ創ハ常ノ如ク縫フテ糸ハ女結ニ一方ヲ
結ヒキハヨリ切ステ一方ヲ肉ノ外へ出シ置クニ六七日ヲ歴テ可抜
スラクト抜ルニ~~カ~~如圖可結口授ニ又腸出テ時移レハ強ハリテ
入難キモノナリ菘菜ヲ以テ和ケ入ルニシ或難ノ脈ヲ割キ少シ腸
ヲ去リ患者ノ腸ヲ包ト置ハ必温リテ和カニ成テ~~カ~~昼夜難ニ
ミ羽モカユレハニ三日療治セス凡格別腸モ不出其終ニテ余モ
保ツニ併シ腸ニ創付深手ノ者ハ急ニ療治セ子ハ惡シ腸ヲ
納ルニハ患者ノ呼吸ヲ候ヒ隨テ徐々ニ可納呼吸ニ腸ヒツ
マルノ理ニ

腸ノ外ノ脂膜モ腸ノ治法ニ從ヒ糸ヲ幾条モ外ニ出シ可置又
一処ニカタマリテ高ク突腫スルニ

金創出血過多之經

腋下ハキノ厥陰肝經ニテ血多出血如之章以脊背推兩内股横
骨足皆出血多キ如手足ハ三陽經ヲ打キリ三陰經ノ残ハ治シ易
シ三陰經ヲ打キリシハ治シ難シ

突創

鎗及竹ノ類ニテ突タル創ハスボイトニテ能ク瘀血ヲ洗ヒ吸ヒ可
取然シテ后又スボイトニテバルサシ或イヘリコシヲ入ルニ其アトニ
メイチヤヲサスヘシ左突ニ雞子黄ヲ交テ用ユ若ハナハダシキ者ハ
レノニ雞子黄ヲ交サスニ或前ノ羔ニ椰子油ヲ加ヘ用ユ又突創内愈
ス間ニ外愈スルモノナレバ不縫シテ治ヲ施スニ

箭創

矢^ハ創ハ鏃アルモノハ拔去テ洗フヘシ治法突創モ同シメイチヤハテキ
ステモトヨシヲ用ルニ毒失ニアタリシ^ハ疾ハ水^ヲ以テ能洗ヒ葉ヲ貼スルニ

煩渴セハ水ヲ与フルモ可シ

鉄鉋創

他ノ創ハ治法大ニ異ニ打込タル如ハ皮卷込テ腐ルニ拔出シ夕
ル跡ハ肉サケテ大キク成ルニ玉ノ残シモノモヨリ奥ノ方段々大キ
ク成モノニ探リテ玉ノ所在ヲ知り玉ヌキヲ以テ拔去ヘシ打込シ
カリ出血其止メハ宜シイツマテモ不止ハ惡症ニ至テ氣逆ノ甚キ
モノニ吐氣起リ或ハ腋中物ナク胸中へ迫リ込諸葉効ヲ不得
ニ乾姜^ヲ連人參^一宜シニ貼シテスツトユルモノニ硝
毒残リテ腐^リ返レハ甚ク敷モノニ兎角急ニ愈スキウ
ニスヘシ又玉探リ不當肉中ニハサマリ在ハ苦シカラス其終ノ
イチヤヲ五本モ七本モハイル程サスヘシ次第ニ瘀物出テ未ルニ
隨ヒ玉自然ニ出ルモノニ玉打スケタルハ兩方ヨリメイチヤヲサスニ

筋疾

筋ヲ切ル者ヲ子●筋疾ト云血止難キ者ニ脉道トハ達ヒ口大キク
血出ルモノニ是ヲ縫法ハ筋ノ下ニ針ヲアテ筋ノ下ヲク、リ一方ノ
皮ノ上へ通スヘシ知ヨリ皮ノ上へ通サレ又乳ハ腸ヲヌウ法ニ隨ヒ糸
ヲ女結ニシテ可置而肉ヲ法ノ如ク可縫ニ日又ハ三日許通リ筋
ヲ縫ニ糸ヲ抜キ取テヨシ血止テ出ヌ者ニ別ニ羔茶アリ其方ハ
決勝ヲ用ユ凡出血不止モノハ縫后上ヨリ貼ス暫クチヲ以テヲサヘ
居ルニ麒麟羔ニテハ止難キ故右ノ羔ヲ用ルニ且筋ヲタシノ茶
ヲ可与愈テ后難屈伸者ハ圭支加木附子用テ頻ニ屈伸サ
スヘシ子ルホノ疾ハ切離レタルハ却テ不痛少シヤリタルハ痛強

湯火傷

湯傷ハ皮膚ノ、故輕シ火傷ハ火毒深クハル故重トス火毒ニテ
腐リ強キハ披針ニテ切左突ニ血竭ヲ交貼ス蓋ニハテヘシテ
貼ス腐肉去ス赤竜羔宜シ火傷煩劇スル者四順清涼飲ニ
宜シ或圭支加竜骨牡蛎ノ類可ニ

放平治法

痛風ニテ難屈伸者ハ難治ニ他ノ諸腫物愈テ治放平
ナルモノハ治ヲ施シテ必効アリ先油茶ヲニ三日或四五日以前
ヨリ塗置其マ、手術ヲ施シ備延ヒタラハ添木ヲカケ毎日引
ニ卷木綿シテ蓋茶ニヒタスヲ蓋スニ尤蓋茶ハ跌撲打
傷ニモ用ルニ大傷ナトニテ手足指ナト愈テヒツ付キタルハ皮ヲ
切放シテ麒麟羔ヲ貼シ后手術ヲ施シ油茶ヲ貼ス
放平油方

蚯蚓十箇

右燒酎漬置取アケテ竹篋ニテ腸ヲ去リ

切テ广油一合ノ中ニ入炭火ニテ煎シ七分位ニナルヲ度トナス

蝸牛汁五箇 右打碎キ皮甲ヲ去リ广油一合入レ煮貯フ

粒蝸ノ油六分ニ蝸牛ノ油四分加フルヲ放平油ト云何知ニテモ

筋脈牽急者以油ヲ塗ルナリ

麒麟羔 放平切疾ノ愈シ羔

白雲 十枚 血竭 二枚 右二呆煉合創口ニ貼スルニ

卷木綿寸尺

頭鼓 九半幅 頭柱 五半二尺 頭卷 五半四尺 腹卷 七本幅

脊鼓 八本一丈八裂 五本二尺 腸鼓 五本一丈 咽卷 七半四尺

袈裟卷 本九尺

右ノ外手足等寸尺見斗ニ

金瘡縫法圖

① 如此耳ノ横疾ハ先輪ヲ豎ニ針縫ヒ而縫ヒシ齧齧セサル為ニ

② 如此鼻梁ノ横ニ切レタルハ如圖針ヲ通シニ糸トモ一ドキニシメルバシ然ノ

③ 腸ヲ縫ヒ如此糸ヲテ結ニニ一方ノ糸ヲ結ヒテハヨリ切ルニ糸數アラ

④ 纏ヒ縫ヒ如

⑤ 如此十文字ノ疾ハ圖ノ通り隔達ニ縫フヘシ


⑥ 如此大創ハ圖ノ通り先正中ヲ縫夫ヨリ次第ニ縫ヒシ創愈テ糸

⑦ 抜ケモ如此次第ヲ以テ抜ケベシ

⑧ 如此カキ創ハ角ヨリ縫ヒシメ夫ヨリ次第ニ縫ヒシ然ラサレ角

⑨ 如此出血甚シキ創ハ血管 際ヨリ縫ヒシ然ルハ血管

⑩ 如此出血故出血止ル



- 如於ニツモニツモ并テアル創ハ五分位ニ間ヲ、キムカヒナガ
 一ヒニ縫フヘシ然セガレハ引ツリヒツク縫ノ不合ノ必離ルヘシ
 又至テハ創ハ先スリヒ縫ヒシテ夫ヨリ一ツニ合シテ本縫ヲ引
 寄テ縫フベシ
- 如於縫様ハ前ノ圖ノ縫ヒカニテ不止片状ヲ通り血管ヲ縫ヒシ
 一ハレハ止血セガル事ナシ 此術前ノ如於圖ノ下ニ出ス筆者誤ル
- 如於眼胞ノ創ハ先下ヲ故倒ノ通り縫ヒ上ハスリヒ縫ヒスヘシ

缺唇治法

缺唇ハ先缺ヲ以テ左ノ方ノ缺目ヨリ先ニ切ベシ右ノ方ハ切易ク
 右ハ至テ缺ヲ入クシ此難ヲ先ニ易ク右ニ切ベシ次ニドヲ切リ夫ヨ
 リ缺正中ヲ縫ヒ次ニ上ヲ縫ヒ然シテ下ヲ縫ヒシ都テニ針此定法ニ不
 縫先焼酎ヲ以テ能ク洗ヒ蟾蜍ヲ水ニテ解キ塗ルヘシ此ハ血氣ヲメクラ
 ス術ニ縫終テ無名異決勝ヲ難子白ニ煉創上ニ貼スヘシ夫ヨリ

カスカイ羔ヲ貼シ卷木綿スベシ缺唇ノ術ハ甚難キモノニ或而缺
 唇或唇長短或鼻中ニ缺入ルノ類是皆難症ニシテ術ヲ施ス事
 元難キニ

予足元陽經ノ創ハ愈易シ陰經ノ創ハ愈難シ

金瘡方品

調榮湯 治金創傷損脫血者

當歸 川芎 芍藥 白朮 茯苓 人參
生苜 川骨 牛膝 消 九分 甘竹 三分

右十朮以水六合煮取三合去滓分温服日三夜一

家方心連湯 一名回生散 治一切暈倒

香附 紫檀 人參 各三錢 爵金 甘草 粉六
胡椒 錢 白檀 十錢 或加丁香佳之

右七朮為末白湯或冷水送下或煉密一有茄子無丁香

生神散

人參 蒲黃 炒 胡椒 甘竹 絲 泊夫藍 五分

右五朮為細末白湯送下自七分至一錢
金瘡氣付之方

牛皮消 一錢 或 右一朮水煎服

三台散 治諸制手痛氣急息迫

辰砂 硝石 ヲクリカニキリ 右三朮為末

テキステ ノ方 骨ニ掛リタル創ニ用淺敷ハ用ルニ不及

乳香 五錢 雞子黃 テレメニテイ ア 五分

右テレメニ器中ニハロウサワアトルヲ少シ入研枚ヲ以テスリ合口白
色ニ成ルヲ候ヒ別ニ器ニタル水氣去ルナリ其時上ノニ面ヲ加フ骨ニ
アリシ創ハニ番代ニ用ルニ

保生湯 金創打撲

川骨 川芎 當歸 白朮 杏仁 丁香 檳榔

圭支 人参 名不 茸州少 或倍木香 加、誤、カ、或、ハ、ホ、丁、ノ、誤、リ、カ

右十朶水煎服 二方無川骨有薄荷大黃以脹大便秘者倍大黃

腦髓ノ出ルニ付ル奇法

未食ノ小兒ノ糞ヲ陰干ニシテ革解ノ末ヲ少シ加ニ藥練ノ

搗汁ニテ餅キ付ヘシ

上愈ニテ内ニ膿アル者不針ニテ破ル方

生桑木五寸ニ切ニ方ヲ燒ケハ水出ルニ其処ハ竹管ヲウケテ

創ニ灌クニ

又方 鷓鴣ノ旧ヲ器ニ入熱灰ノ上ニ置テ湯ニ付ヘシ

又方 川骨ノ末ヲニギ服ス

又方 芭蕉ノ卷葉阴乾トシ羔ニ交貼シ桑ノイカ霜ヲ服ス

切口皮ノ卷ヲ開カシムル方

大角豆ヲ煮テ紙ニ包ミ頻リニ蒸スヘシ

カスカイ羔眼胞ノ創ニ貼ス

水子松脂 赤石脂 各十 松脂 乳香 沒藥 芦荟

各ハ 右七朶為末雞子白ニテ煉貼ス

又方 乳香 三 油 五 右二朶煉法如常

又方 松脂 赤石脂 各四十 松脂 瀝青 各三十 乙切油 十六

右五朶如常焚キ諸藥消シテサシギハニ徐々赤石ヲノ和

又方 雞子白ノ飛 白麵 右二朶和調

眼胞ノ疾付藥

黃柏 十 薺萇草 各十 ハルサニ 五分

右三朶和調

目疾藥 眼家膿ソコヒニモ用ル奇方ニ

芦眼石一匁 寒水石五合 黄連五分 石羔七分 枯荅四分

右五味為末蜜煉貼ス

又方 水仙根スリ絞リ入ル又竜胆汗ヲ入ルモ佳シ
腸ノ蓋シ茶

救金瘡脱血欲死者方
葵根カミツレ 野菊 右二味焼酎ニテ剪シ蒸ス

消石一匁 駢引中七厘 カシラ三厘 右三果芥苳汁ニテ用エ
治反張灸法 百會 腫中各七壯

治反張方 茄子蒂霜 荆朮 鹿角霜各六
右三果為末白湯送下三四匁

又方 倉谷ヲ刺ス事左右二寸 右毫針或氣付針ヲ用エ
テベンスイダンノ方 牲冷能去瘀血治金瘡打撲者

ホルトカル二百 黄蠟二百五 松脂 松脂 乳香 没薬各二

アルメニヤ国一赤土 用古遠東壁ノ土代
血竭粉 極木葉三撮

カラナデイヤノ方 治金瘡

蠟油戸油 牛脂各四 テレノニテイナ二十 乳香 没薬
各五 銅青十匁 右四果油ヲ煮去滓余茶ヲホシ入

インクエニトト テイテスイーヒ止 血和痛愈創

テレノニテイナ十 乙切中 黄蠟十匁 ホルト二十匁
右四果合煮テ能トカシ 少シサマシ 乳香 没薬 鉛粉各五

突痂洗茶 雞子黄ミツ 右末羊 徐々入攪セ貯ス

艾葉 茨花 蕨 乙切州 阿仙茶 松脂各一

右六果以水五合煮去滓口フサニ合入スホイトニテ洗フ或フラントラ
入ルモヨシ上ニハハルサニテ塗リテニスイフニ付ヘシニ番或カウサテ
イヤモ宜シ

治突創大熱小便閉方

ヲクリカシキリ 四葉 右藥末ニシテ酢天目ニ盃カキ交置ケハ湯

上ルニ後能澄タル處ヲ服ス

苧菜 治小便不利余茶不効者

野菊花 金銀花 葵 燈心草 野薔薇

青木葉 右ホカ一本
作艾葉 右六果水可蒸加松実佳ク

治小便不利方

山菊花 ヲクリカシキリ 大黃 野薔薇 蔓 ハコヘ 右ホカ

右五果為末白湯送下

古癩洗茶方

ユケビシヤコシ 塩各十 フラント一合 口フサニテ

右四果煎シ大綿浸シ洗フ若腐リ強ケル胆菴油ヲ加油ナ

キハハ末モ可シ

治毒箭傷奇方

テリヤアカ 雞冠一雄黃 雞子黃

右三果能交貼ス内服モテリヤアカヲ用ユ毒甚キ所ハエロシメテ切取

蝦夷毒箭ヲ治スル方

的里亞加 雞冠一雄黃 右三果交合

蝦夷毒箭烏頭番椒ヲ鏝ニ付射ルニ以毒六犬糞ノ枯タル

ヲ吞シムヘシ大和半斤ノ毒ハ与右烏頭ノ類ヲ用ユ其ハ破敵ヲ貼シ

膿ヲ吸出肉ヲリアカ緑豆ノ類可服吊乾燥スルホノ諸症ヲ

見ス者之毒箭ニアタル者ハ創口黒ク腫ル之腐ヲシテ取ルヘシ
又服茶黄連解毒加犀角ノ类可也

鉄鉋創メイチヤノ方 或破敵ヲ用ヒテ甚効奇也

左突^{十六}胆^六荅^荅 燒 銀蜜陀 乳香 松脂 枳脂^{各二}

乙切州^油 右七呆如常煉用其上ニテヘニスラ貼ス腐

肉去リテ半愈タル片口ウメントラ付ル也

金瘡油方 ハルサンノ代用

茨花 白百合油 乙切州油 雞子油^{各十}或雞油^{代用}

章腦^一テレメニ^{十四} 人油^三 マンライイカラ代用シテモ可也

七呆如常煉器ニ入貯フ

筋液シノ方 津蟹ノハサミ 羚羊角 鹿角霜^{鹽ヲ取}

右三味為末服ス

筋ヲ切痛甚キヲ治

テレメニ コルホーヤ 土竜油^各 右三呆煉貼ス

又方 蜜ノヲリヲ付ルモヨシ能痛ヲ止毒ヲ解ス

又方 鮒ノ油^{テケン} 右二呆蜜煉シテ貼ス

突厥血止方

没薬 乳香 濱麦 搗汁丹丸 カルシイ 銀蜜陀

芦薈^{各九} 右七呆雞子白ニテ煉貼ス

又方即映勝

芦薈^各 乳香 没薬^{各三} 血竭 硫黄

右五呆為末左突ニ貼シ貼ス或血竭硫黄ニ呆計ニニモ佳也

又方 源氏ノ落ニト云

鼠赤子^{十疋} 石灰^{一合} 艾葉 右搗交乾シ為末搽ス

湯火傷治方

醋 三十錢

車前子汁雞子白

右三果研交貼之能火毒ヲ去之焔硝傷ニ專用之

又方 酒ハ升樟腦十五錢右三果器ニ入レ密封經七日用ユ

又方 馬脂 右一果塗ルモ佳シ

又方 カルシイ 椰子油 右二果ヤワラカニ煉貼ス

又方 阿蘭陀カホニ 蜜 右二果堅ク煉貼ス

又方 石羔 章腦少右三果雞子白ニテ煉貼ス加竜腦尤

佳シ

又方 辰砂 石羔 馬油右三果煉合貼ス痛ヲ止ル

又方 酢 五合 塩少 右煎シ洗已后生芋ヲ搗テ酢ヲ和シ具

上ニ塗ル痛ヲ止ニ塗ル事不絶シテ若痛ヲ救フ

焔硝傷方 ホルトカル油ヲ塗ルモヨシ

同傷爛者 黑砂糖 十錢 辰砂 二錢 右二果水ニテ煉貼ス

作木刺抜ク法 一名 引拔茶俗稱ニ

黑猫頭 霜 右三果糊ニテヲシ交セ疾口ニ貼ス或草ハ子ヲ

加フ良シ

又法 鮭魚 右一果爲末貼スルモ良シ

又法 松菌 生栗 串柿 各霜 鯨裏皮

右草ハ子ヲ研碎シ煉交貼スルハ吸出スニ

又服茶方 芭蕉 卷葉 蜡 椰 右水煎服

箭根及鉄針入肉不見者貼スル方

雌鹿茸 牛蠟 蜡 椰

右三果糊ニテ煉貼ス或野雞足末トシ貼スルモ良シ

イシクエントホリホーリヨムノ方 性寒止諸痛又治脚氣痺急

蚯蚓油二百八 家猪油五百六十 右二果交和シ 薑二八二日

置キ其后 柿茶 葛苳 馬齒莧 瞿粟 穀 懸鉤 子和名

ハレハリラ アト ロシ ハヨウステ セヤ アノ レハヒヨウロ シ名 撮

霸王樹四撮 蠟 少許

右十果搗煉煎 煎ノ 二果ト 合シ 又蒲萄 酒ヲ 見合 セ加 工鍋 内ニ

煉布ニ テ濾 シ滓 ヲ去 リ用 ヲ

イン クエ スソ テト シノ 方 性寒一切面肺風粉刺酒皰及婦人

面生黎黑斑ヲ 治ス ルニ 有神 効并 足跟 疼痛 ヲ治 ス黄 龍齒

赤七 酢百 莖ヲ、リヨ ヒサ アヒ シ百 莖 石黄 龍齒 酢二 味乳

針ニ テ摺 交セ 一晝 夜置 別ノ 器ニ 入上 酢ハ カリ テ滴 シテ 下ニ

アル龍 齒ヲ 乳棒 ニテ ヒタ ト研 合口 ガア ロニ ト 石滴 ヲ置 タ

ル酢 ヲ火 宛ハ レ能 研合 用之

存録

ロウソクノ 方

乳香 茨花各二 没菜 青丹 荖石

右五果微 火ニ 煮テ 布ヲ 以テ 漉貯 フ

突創血止方 カルシイ 野ホ ウル スア ルテ ヤニ 酢ヲ 用テ 血竭

右兔ノ 腸モ シシ スレ 雞子 白ヲ 煉リ 貯フ

治打撲方 旋子 辰砂 各三 楊梅 皮 小麦 各二 酢少

雞子 白ニ ツ 右六 果煉 合患 上ニ 塗ル

又方 雞皮 正骨 家秘 方

菟藿 五莖 黃栢 豕椒 各三 白芷

右四 果酢 ニテ 解貼 ス予 家加 乳皮 皮香 ノ世 リカ

竜骨散 治金創及箭鏃所傷出血不止者

竜骨 滑石 枯礬石 寒水石 乳香 没菜

黃丹各三 乾粉少

右八果為末貼患上蓋膏或油二和貯入
金傷散 主治全上及落馬接傷者

白芨 白蘆 乳香 酪一 石灰 半斤 龜骨 黃丹

右六味為細方入黃丹研如淡紅色附患上

治打撲方 楊梅皮無名異 小麦 黃栢

右四果以酢煉或加辰砂火許佳之

同蒸茶 續斷 楊梅皮 薊薈 一錢 乳香

酒精 五錢 右水煎痛處ヲ蒸入

人參調榮湯 治金瘡出血暈倒者

人參 川芎 當歸 川芎 黃連 肉桂 白朮

大黃 杏 耳中 右十果水煎

八物加川芎 治全

茯苓 沢瀉湯 治金創傷即吐者 茯苓 澤瀉

甘州 圭支 白朮 生薑 右六果水煎

治反張方 無患子 虎杖根 右二果水煎

大乙羔 羔 妙愈 金瘡 矢疾之類不問輕重用之有奇

効 白朮 白芷 石羔 以酢清之 放用

乳香 沒藥 黃丹 各三

石為末以广油四兩暫煮之入黃臘 一兩即十錢 以柳枝

攪次入白芷煮須臾入諸藥能煮攪之數貼 明分量

止血散 劉寄奴 霜 右一果為末用

豆淋酒 治金創打撲產后角急反張或破傷風發產

者 黑豆 六合 雞屎 合 甲雞 白根

右洗炒豆合一雞屎炒乘投酒三升中密封使冷絹
漉去渣每服五合如人行五六里再進以汗出為知或水酒各
半有

縛血散 青洲秘方 治金創脫血欲死者

反鼻 燒人參各二 紫檀 血竭各一 麝 燒三分
右五果為末貼之或以獨參一服五合或一升

雷ニ打レタル者真黒クナル者之是ハ早ク其人ヲ横ニ臥サセテ松
明ヲ以テ其人ヲ燎ルヤウニスルニ左スレハ黒ニ次第ニ劣ルニサム
ル者ハ生ク誤テ水ヲカクレハ即死スルニ全身ヲ燒シテ正氣無キ者奇
方アリ 降真香 痲脹ニ由ル蒸之上品ヲ紫藤香
ト云紫色ニ 右一果細ニ對ニ全身ヲ黒ヲナルホトクス
ルニ又鼻ニ煙氣ヲカスルモ良

金創二十四時羔

小麦ニ合 牛油ニ合 右二果煮以或嵐色為度去渣
一奇法 此方即神君傳テ本多平八タニウ方ト云

椰子油ハ 乳香ニ合 白蠟 五十支 四季加減
右白蠟ヲ后ニ入文火ヲ以テ煮以解為度

金倉羔 乳香 沒藥 石灰 蜜陀 芦薈 枯荖
右以蔓藤葉汁共雞子白煉貼

楊栢散 治打撲 側豆 楊梅皮 黃栢 大山椒 凝血逐フ

右四果以酢煉貼 病ハ或加乳沒
救壓死怪鬼驚倒者方

梁上ノ塵ヲ取水ニテ用ユ又大指ノ間ノ血ノ劣ルホト咬並

ノ汁ヲ鼻ニ吹入レハシ或包莢ノ末ヲ吹込ニ佳シ

揮拾揮指 人参 麦門 茯苓 麩二

黃連湯

犀角 甘中 黃連 危子 生芩 当皈 芍藥 麦門

連壳湯 連壳 川芎 黃芩 硝石 荆芥

薄荷 甘中 或加反枯中

反枯中湯 反枯中 当皈 白朮 茯苓 桔梗 橘皮

生芩 藜胡 甘中 莎根 芍藥 或加白芷 紅花

芎皈調榮湯 人参 川芎 白朮 当皈 莎根

茯苓 生芩 橘皮 砂仁 牡丹 紫貝 甘中

右服痛加蒲黃

補虛湯 人参 白朮 当皈 黃芪 川芎 橘皮 甘中

願血湯 人参 沉香 川芎 芍藥 当皈 各四 白朮 甘中各一

荆芥沉香一

当皈 荆芥 人参 各一 干姜 芍藥 白朮 沉香 各三 甘中

治金創寒戰身強者

葛根一 加無患子 虎杖 十全大補 加荆芥 四逆一 加荆芥 虎杖 石方 臨機 可撰 典二

整骨治

凡テ正骨ノ手術ハ状ハ同シ様ニシテ甚工合ノ六ヶ敷者ニ筆黒ノ尽ス如非ス実物ヲ以テ其要ヲ得ニ其患如モ骨抜ケ或抜ル或ハ陥リ其業限リナケル其術モ變化ナシ尽其法ヲ舉難シ暫ク其規則ヲ挙ル而已故ニ其法ヲ異ニシテ其術ヲ別ニナスト虽其要ハ唯挽引ノ意ヨリ外ニ少ク故ニ其術ヲ廣ク究ハ其辨ヲ撰ム拔タルヲ入ル法

腰ノ拔タルヲ入ル法

先患者ヲ仰臥セシメ其患如豆ヲ折膝頭ヲ患者ノ患ル方ノ乳凹ニ押シ付テ片手ニ其拔タル乳ヲモミ合セテカヲ足ヲ乳凹ニ押付ル見セテ兩手ニテ脚ヲ以テ右ノ方ニ強ク挽クニ其モミ合スル時片手ニテ足ヲ乳凹ニ押付ル様ニスルハ患者ノ心ヲ奪ニ為ス

且挽引ノカヲ添ルモノニ

膝節ノ拔タルヲ治法

先膝ノ上腰ノ下凹ヲ水綿ニテシカト巻キ匠ノ兩足ヲカケ張患着ノ豆首ヲ兩手ニテ持テ股ヘフレ又様ニ挽クニ入りテ左貼茶ニテ巻水綿ヲ施シ莖茶ヲスベレ

腕骨ノ拔タル治法

先患者ヲ坐セシメ具足ヲ水綿ニテ立セ又様ニ能クニ患ル方ノ手ヲ取り其腕下ニ足ヲ踏当テ強ク挽クニ足ニテ強ク手ニテ挽ク片患者ノ鈎上ニヤウニスヘシ手足ノ力勢一時ニ異患者挽キ上ヲスモノ也故ニ其勢甚心ヲ内テ可施前術ニテ獨不入者ハ前ノ如ク膝クニ腕下ニ棒ヲ横ニテ人ニ荷ハセ其手ヲ下ニ挽クニ其他臂ノ拔ケ手首ノ拔タルモ足ヲ挽クノ法ニ從テ挽引可也

落加木凡

先患者ヲ坐セシメ医両手ノ大指ヲ患者ノ口中ハ入レ両方眞齒
ヲ押下ケ下頤ヲ中指無名指ヲ引上ル様ニスレハ忽チ入ルモノ然
テ補中益氣一ヲ頻ニ服サスベシ

凡テ手足ノ骨折レタルハ其折レタル處ヲ能ク挽ノバシ楊梅ヲ木
綿ニ塗リテ貼シ其上ヲ巻木綿ニテ細キ丸木ヲ疎簾ノ如クアミ
端ヲ綿ニテ巻テ患處ヲ能包右簾ノ下ヲ木綿ニテ上下セ又様ニ
シテ其上ヲヨククリ置ヘシ他家ニテ枚皮或枚ヲシメルハ宜キ又
又偕其簾上ヨリ頻ニ遠スベシ若木綿ニ茶汁染キ湿ヒ甚シキ
トキハ大ニ乾ニテ苦シカラズ必ス其患處愈凡内ハ患處ヲ不可取若シノ
タル後後ミタル中ハ其後ニシテ^漆置ヘシ其後ニテ加減甚大切ニ
強ケレハ血氣不通ニテ患處ノ上辺痛ヲ生ス後十日ハ折タル骨直ニ

ナラスニテ愈テ后マカルモノニ是按排ヲヨク^察シテ治
ヲ施スベシ

青洲先生活法

任脈膈下五分 氣海 左右ノ大指ニテ
スデイカニシメル

足太陽膀胱經 足兼山 左右大指ニテ
瓜方ニ入ル

清風 脊七椎
ニアタリ

臍傍 中脂ニ食指ヲ
重テ入ル

曲池 大指ニテ 手ノ陽明大指之經
メル

乳巖

和州五條某者母乳巖ヲ患フ初ノ見ニ杖ノ大ナ梅杖ノ塊アリ麻藥
ヲ服ヤシ凡ニ時許シテ割杖ノ重廿六錢五分扱八日目至熱大腫痛
ヲナス因越婢木烏轉ス是即チ破傷風也六七貼ニ人甚知アリ又
乳廻ニ赤色ヲナシ腋下亦同名左手腫氣ヲ生ス是即流注ナリ越婢
附ノ症也金瘡元ニ如此ノ症アリ全ク外乾ノ復ナリ皆主ノ凡ソ破
傷濕ニ越木ヲ用一古人未嘗ノ手段也能々究理スヘシ
又右ノ証ニ似テ紛レ易キ症アリ即纏腰風也此症ハ腋下及ヒ腰
ノ辺ニ赤色片雲ノ如クニメ横ニ纏フ其赤色ノ暈ノ中小瘡殺
多ク生シ瘡頭黃色ニメ膿氣アルカ如シ然トモ膿ハナシ水氣ナリ
且瘡痛ハ一ナク肉中深疼或中ノ疼者也是破傷濕ト別ナリ

風

前防敗毒ノユク所ナリ乳岩ノ療治中ニ折々此症^ヲ発スル者也或頭
湿テ発スル者モアリ其変症甚多シ盡ク述カタシ乳岩初取テ平
愈ス今年亦再発ス其形及肉ノ大^ク杏ノ如シ根ヲ結ヒ三角針テ
四五所刺シ密陀錠ヲ刺四五日ニ腐リ取ナリ此等ノ一一定ノ術
ニ非ス臨機應変ノ一ナリ術ノ变化不可言是必再発スル者ナリ
難治ト知ルヘシ都テ反肉再発スル者不治トス
乳岩療后風當^ルト動気ナト九リ心下痞鞭不能食モ人多
ク虚状ノ者也証ニ隨テ意ヲ用ヘキナリ柴胡姜桂羊瀉杯ノ

場合モアリ

乳岩^ヲ患ル婦經行ナキヨウニテハ療治ハケシキ也經行有モノハ
安シ妊娠スレハ卒ニ大クナルナリ

甚ヨク應スル者也或碎岩散兼用テ可也乳岩再発スル者ハ九百日
詩ニメ聚ル者也或一年ニメ聚ルモアリ或三年五年八九年ニメ再発スル
者モアリ其三年五年ニメ再発スル者ハ散聚散碎岩散ノ類常々
能用レハ再患ノナキ者也然レ再発スルハ藥用ト保養トノ不
及ナリ

乳^ノ癭大坂ノ一婦^ノ癭ヲ患フ其原ヲ尋ルニ五年以前乳癭ニメ久ク
治セズ遂ニ漏トナリ衆医療スレテ無サ効麻沸ヲカケ切開クニ漏ノ
中ニ皮ヲ生ス尿道ノ如ク成テアリ凡ソ乳癭ハ乳癭ノ治術拙
ヨリ癭ト成ナリ且患者ノ誤ヨリ成者アリ何レモ失治ノ者ヨリ成
ルト知ヘシ

癭癭

江州一僧八月下旬未テ診ヲ請フ耳ノ下ヨリ觀骨ハカケテ下ハ

腮へ及ぶ其大如橙耳下ハ堅軟ニノ觀骨ノ方ハ少シ軟也先生曰是附骨ヲ轉セス不治ナリ即胸瘤也

粉瘤

背脊顔ニ多或首筋ニ多シ

脂瘤

手足ニ多シ肉淺ク骨多キ処ニ生ス

肉瘤

耳前後肩井ノ辺ニ多ク出ルキリイルノ集テ出ル也

血瘤

面部等凡テ上部ニ多シ皮至テ溽キ者也

骨瘤

無常処而無運轉膜ト骨ノ間ニ酸瘰液ノ聚リ生ル者次才ニ長大ニ成ナリ隨テ骨モユカム者也變化多

端ナルモノナリ

石瘰

希ナリ

氣瘰

氣瘰ハ不可也然レ以湯液治者間有之ニ症ハ消長アリ氣ヲ白テ見ルヘシ

髮上瘰

此ハ別物ニ非ス矢張肉ニモ毛髮ノ延ニト欲テ旋環メ

有モノナリ

血瘰ハ瘰ノ内ニ血充滿メ動脈アル者也根本ヲ麻ノ糸ニノ緊扎

金瘡針ニ鼠脚錠ヲ添テ其穴ニ刺也尤針ヨリ少シ大ナル錠ヲサス

ヘシ昔程間ヲヘテ又ニ錠程サセハ府膏藥ノ頭眩モナキ也又一日程モ

又二三錠モサス三錠ヨリ以上ハ刺ヘカラス若頭眩ノナキ人ハ五六錠

モ刺ヘシ夫モ能ク見定テ后ニスヘシ右ノ糸ヲ毎日シムレハ自然ト

血ノ通ヒ多クナリテ瘰頭黒色ニナル堅クナル也毒條ヲサスニモ動

脈ナキ所ヲ見定テサスヘシ若動血脈ニサス片ハ至テ頭眩甚キ者

也初ヨリ終マテ糸針ニテ仕上ルナリ肉中ニ瘰ノ根脚肉殘

ル片ハ必其切タス跡ヨリ又翻肉スルヲアリ破敵ニ拔毒ヲ貼ス

此肉中根脚ヲ見合テ拔取ルル手術口授ニテハ得カクキヲアリ

黃連解毒其外証ニ隨テ用藥スル也頰防其眼眩

骨瘤ハ額又ハ頰辺ニ多生スル也或ハ臂膝杯ニ生スル者モアリ骨ト薄

膜トノ間ニ瘡液溜リ発スル也昔年禪府ノ儒生顔及項ニ瘡堅

瘡刺取之實如石也

今年江及曰片邑宗吉者眼胞ニ瘡ノ如キモノ出リ先生曰是石瘡ナリ

浪華ノ妓女骨瘤觀骨ニ生ス先生ヨリ針シ上鬚ノ根ヨリ肉ハ刺シ

大ニ瘡液ヲ出セトモ觀骨ノ高ハ素ノ如シ即手術ヲ以テ平ニ押付枕木綿

ヲイタシ巻木綿シテ置テ十日ニメ愈然凡久年大瘤ヲ包シ皮故

愈テ后モ皮垂カカリ顔ユカミアリ是ニ奇方数月申テ顔顔古キニ

復シテ年許ニメ冉モ美婦人ト成ル妙可歎可称其頃一人紀州海部

ヨリ右ニ同症ノ骨瘤ノ婦人来ル同術ニメ全愈

瘡ヲ治セント欲セハ飽マテ贅肉ヲ取ツクスヘシ不愈則后及花瘡トナ

ルナリ瘡ノ誤治シテ及花瘡スル者ハ多シ皆ソノ始贅肉ヲトリ尽サル也

肉瘡ハ瘡膏ヲ取贅肉ノ盡則愈瘡ヲ止ムヘシ膏ハ左突ニカユヘシ生

肉見ル

瘡膏ヲ以テ取ルハ多ク及肉スレナリ切斷シテ見縫ヘシ陰瘡ヲ取タルヲ以可也此理候シ出處ニヨルナリ

赤色ニハ破敵ヲ貼スル肉ト雖生肉ト贅肉トノ色難分別已ニ愈テ

欲セハ以消瘡散為煉藥毎日可予如龍眼肉ノ大ナ有三服愈テ后ト

雖凡半年許可令服之不然ハ毒不尽而后起脹スル者也考ヘシ

瘡膏藥ニテ瘡ヲ治スルニ贅肉ノ中ニハサシタル眼眩モ無レハ贅肉取尽テ

生肉ノ更ニ至レハ眼眩強シ考ヘシ此時ノ手術甚難シ

小兒胎瘤ニ症アリ一症ハ神經不循環メ溜ル故ニ針スルハ唯清水ノ出ツ

ヲ翼日見之則又溜ルニ日ヨリ必至死シテ脱シ三四日ニメ死者ナリ

此症ハ背肉ノ上尻ノ辺ニ出ル者也蘭人ノ説ト少シモ相違ナシ多ク脊髓ニ

附テ生ル者也又少シ下ニ生スルモノモアリ又出生ノ片ヨリ頭ニ出テ大ナル者

アリ或出生ニ三日ニメ出ル者アリ此症ニ青蛇膏數日傳レハヨク

消散シテ愈ルナリ

目上瘤常掩目見ル不能手ヲ以テ拳之ハ眼能見以カ割テ出シ杖大如桃以法縫傳藥如缺辰全愈者三人アリ

眼胞菌毒即麻菜ヲ服シ白色物凝テ肉ノ如キモノ如此ノモノ四壞ヲ出ス勿論出シキハ碎ル也后焼酎温メテ洗縫一三針ハルサチ付ルナリ是ハ痛ヲ止メ早ク愈ス効アル故ナリ縫タル上チ無名異卵白メ付ル五六日過テニ番ヲ貼

又同症ニ多クハ上胞内ニ生メ漸々大ニナリ胞ヲメ高ク瘤ノ如クナル尤大ナルモノ田螺ノ如シ目七壓メ赤也甚眼目痛ヲナス者也胞ヲ及テ視ハ裏ニアルチ小及鉄ニテ切ナリ内ヨリ粉脂ノ如キ者也出能紋リ出スヘシ又大ナル者ハ及二拘ラス矢張ヨリ切ナリ跡ハ白雲氣瘤時ニ依テ消長スル者也且動アル者ニ少痛アルモノナリ出血シテ死スル者ナリ付ヘカニス

瘡

大和五條工五瘡出色淡紅断セハカシ洛スヘシト思ヒ少シ藥ヲ與テ急ニ親類ヲ呼ビ不治ノ症ナルチ告ク不日ニ隣家ニ行少シ血出紙ヲ以テ拭之暫メ血如泉猪ヒ氣大脱頓死ス

金瘡

金創チ洗フニ焼酎ニテ先創ノ血出チ洗ヒ支ヨリ創チ洗フヨウニスヘシ紐ハ疵子分位メ指スヘシ長ク指片ハ愈一遲ニ三日指テ瘀汁尽片ハ取テ佳ナリ

刺

膏藥ニカブル人アリ此ニ左突紐ヲ用シト欲セハ雞子白少シ煉支ニ貼スヘシ又紫雲ナトニ代テモヨキ也又右ノ症ハ前衝ニ用ヒ難シ故ニ紫雲ニ決勝チ支前衝ニ代用ル也此紫雲ニ卵白ヲ煉支テ可ナリ如此患者ハ白雲ニテモカブルナリ

金創家眼中黄色ヲアラハス者ハ血虚ノ徵ナリ又曰吐逆テ上通ルモ
ハ乾姜黄連黄芩人多湯能應ル者也頭ノ疵ハ紐ヲ用ヒカルカヨレ
若シ用ユル片ハ隨分淺クサスヘシ又肥ノ出ルヲ治奇方アレト今ハ用ヒ
ステキステイヲ用ヒ眼胞ノ疵ハ前衛ヲ申ル片ハ麒麟血ヲ末トシ
加フヘシ頭ノ疵ハ手早ク洗ヒ縫ヘシ若シ肥トニ創アリテ煉耐肥中ニ入
ル寸ハ必ス膿ヲルナリ心得ヘシ若シ肥中膿トナル者ハ變異蜂起シ不可
救一アリ咽喉氣道ヲ疵シタル者ハ治得テモアレト半分モ創アレハ
終ニ泉下ノ客トナル食道ノ疵ハ半分位ノ疵ナレハ隨分治ヲ得ル也
都テ腹部ノ疵ヲ療スル膈膜ヨリ上ノ疵ハ難ト知ルヘシ然レト淺疵
ハ不苦亦膈從下之疵ハ腸ナト出ルモ治也鉄炮藥ハ能腐ス者也創
口初ハ乾涸シテ后ニ腐也金瘡家ニ上成血メ創ヨリ下冷ヘ或麻痺
スル者ハ創神經ニ懸ト知ルヘシ

燒耐ハ瘀血ヲ去リ新血ヲ生スルノ効アリ

陽經ノ疵者愈易ク陰經ノ疵ハ難治且屈伸ニ害アリ筋多キ故也若
氣血不順ト成麻痺シテ難屈伸者桂木附子ヘシ神經ヲメクラスモ
ハ桂枝木所湯ニシクハナシ專ラテ氣ヲ運スナリ氣能運レハ血此ニ隨
テ順ルナリ氣血復セサル者ハ子ヘカラス血脱ノ者ニ木附劑ヲ投ス
レハ陰陽負勝スル故ニアシ

突創ハ一寸以上者可縫一寸以下ハ不可縫

腋疵ハ紐ヲ用ルニ必貼膏スヘカラス以金創油塗之可也腸出モノハ
移時ハ硬而難入以燒耐ヨク洗ヘハ乃速ニ易入縫腸ニハ可緩糸
不則府固大ニメ大便出

箭創銚創ハ治法突創ト同シ能洗ヒ貼雞卵左突輕者前衛重者
波留左午

鐵炮疵、以燒耐洗之以左突、紅深入之、五日為膿、々々則鐵炮創、手術手段多キ者也、倉卒ニ述、尽難シ

鐵炮玉出、片ハ其修置ヘシ、若不取、氏不苦、又四五日過、レ破レ肉腐テ膿ニナリ、其時ニ探、レ玉出、ル一モアリ、紅ハ四五本、モ大クメ指ヘシ、諸瘡三四日ヲ經タル創ハ、燒耐ヲ洗、或縫ナトスル片ハ、后必ス破傷濕ノ變ヲ出シ、生ル者ナリ

咽喉ノ疵、血氣道流入テ、氣道塞リ、氣絶ル一有リ、是ハ急ニ手術ヲ以テ吐カシムヘシ、縫終テ、后又氣喉ニ血流一アリ、其術ヲ行ハ、能治也、手足ノ疵、動血脈ニ當リ、出血、ル寸世、医ニ三寸斗モ上、扎、氏血イヨク出テ止、ナル一アリ、思フニ、赤女中尺、決ヨリ、血ヲトルニ、上ヲ扎、レハ、能出ナリ、是ヲ以テ、此理ヲ考ヘシ、凡金創、出血ヲ止、ル一其理ヲ究、テ其動血ヲ知、片ハ、不止一ナシ

破傷濕、元風濕

先生曰、破傷風、ハ至テ難治ノ者也、角弓反張、ハ多クハ、不治也、始項背拘急、戰慄スル者、ハ輕症也、葛根湯、無患シ、虎杖、荳淋、酒言、諸蹇、淡反張、重証者、如聖散ヲ用テ、能應ル者也、是奇中ノ奇、鍼治ノ術アリ、此法親炙メ、可見。合谷穴也

破傷風、ヲ角弓反張スルニ、ハ如聖散ヲ用テ、効アリ、此ノ方ハ、余程ノ毒強キ者ニ用ユ

破傷濕、其名證治要訣ニ見タリ、然レ、氏予カ用ル、処ノ方ハ、異也、今症ニ逢フ、毎ニ越、不附ニ、虎杖、荳、ヲ加ヘ、用ルヨリ、外神方ナシ、荊防、敗毒ニ、加、虎杖、荳、用ル、症ニ、間々アリ

缺唇

缺唇、ハ小兒母ノ膿ニ、在片、居カ、一、惡キ、故、其、兒ノ、瓜ニ、テ、切、モ、ト、知、ヘシ

治療ヲスル片先鉸ニテ左ヨリ始テ法トス然ハ手術施カタル
切様ハ表ノ皮ヨリ裏ノ皮ヲ深ク切テ術トス先創ノ真中ヨリ縫
ヒ初ノ上下ト下トヲ縫ヘシ随分手早ク縫ヘシ手間取レハ腫出テ肉
ノ合加減アシ、合ロアシクハ見合縫直スヘシ鼻ノ中迄切タルヲ
縫ニハ糸ノ両頭ニ針ヲツケ一本ハ軟肉骨ヘカケテ縫也ニツキレノ者ハ
左右ノ内何レカ片方ヨリ鼻ノ内^口テ針ヲ鼻下ノ軟肉骨ヘスルニ針
ニカケ縫ハ^{右左}ヘユカマヌ者也心得ヘシ

小兒缺唇ハ小鍼細糸ニ縫ヘシ麻沸ハ不用四歳ヨリ一歳用エシ^{先通}
八歳以上ノ者用或忍レ或ハ痛苦ニテ大人ニハ二匙位用エ切口ハ蟾蜍ヲ燒耐ニテ
カルモノニハ少シ用ル^{トアリ}トキ付ヘシ縫終テ裏ノ方ノ切口ハハルサチ塗上ハ無名異ノ上品ヲ雞
子白ニテトキ付テヨシ或決勝ヲ交合^{トアリ}

痔漏

痔漏割テ出血不止者ハ決勝ニテ効無如何トモスヘカウ^ハサル症ニ硫黄ノ油
ニテ麒麟血ヲトキ患處ニ貼シ内菜四物加牛皮梢湯ヲ與レハ能止ル者
ナリ血ヲ止ル^ハ何レモ手術ニアル^{トナリ}

麻疹ノ后ニ痔漏或瘰癧瘰癧ヲ患モノ甚多シ是少ノ萌ノアル者麻
疹毒ニ依テ一時ニ登ル者ト見ユ^予先年此症ヲ治タリ皆疹后五
六日^ニ登タル故ニ皆解毒劑ヲ用テ効ヲ得タリ

翻花痔此内堅キ者ハ善症也如圖反花ヲナスト^虫昆滑ニ^ス且管アリ
テ膿汁出ル者ハ腐藥或切取テモ愈^ニ何程形大イナリ^ハ恐ル^{トナカシ}
最其強弱ヲ計テ治ヲ施^ス
今梅毒ノ大ナル者段々后衝ヲ貼ス
堅ク固リタル片切ヘシ軟片切ヘラス

鼻痔大ナル者且難取者ハ二度ニモ三度ニモ切ヘシ其内ニヤハリセニトニ
ヲサスヘシ 幸黃清涼飲

鼻痔反花^レタルモノ^ハ穴ヨリ外ニ出テ長大ニナリタル者是ヲウカツニ

斬片ハ出血不止也故鉄罐膏ヲ紙ニ貼シテ其根ヲ巻キ其上ヨリ糸ヲ
カケテジリくトシメ切也速ニ切シトスルハ出血ス而ノ其根ヲ切ヘシ又
鼻痔初起ハ挾リ鉸ニテ切ヘシ而メ毛引ニヒツカケテ取ヘシ而メ跡上
カットフヲ用テ紙ヲ條トシ夫ニツケテ刺ヘシ出血不止者ハ決勝ヲ塗
刺ヘシ大抵七日位ニ取尽ル者ナリ跡ハ白雲可ナリ最的確散每度
サシ入テ可ナリ

痔漏肛門ノ辺一面ニ腐ト雖凡一度ニ切ヘカラス幾度トモ切ヘシ一度ニ
切斷スレハ変証ハカリ難シ緩々ニスレハ誤ルナシ凡テ何ニテ七漏也
アル者ハ探リニテ終々探ルナリ穴ノ拔テアルヤ否ヲ見ヘシ糸ニテ扎リ
切ラハ痛テ七過ナシ織月刀切ハ痛モナシ速レ凡出血メ止難キナリ
能ク可考

疣痔ノ反花アリ形石瘡子如ク赤シ肛門ノ口アリ腸痔ト相似タリ

門生曰腸痔ナリト先生曰是疣痔及化也切取テ愈過テナシ置切シ

痔漏氣虛メ新肉難生者雞卵左突ヲ貼スヘシ
腸痔ハ用人多養榮湯芍飲膠艾湯或三黃二地湯治療メ取痔
后以調和煎使煎之脫血甚者縛血散四物加牛皮湯主之

痔漏ナトノ大患ヲ療メ后始終風寒ヲ堅ク慎ムヘシ否ハ風濕瘡曰ヨ
リ籠入シテ破傷風等ノ大患ヲ登スル也吊己ニ三人疔病ヲ登シ
死者ニ會ヘリ痔漏ヲ切テ后疼痛ヲ登者ハ左突ニ乳香加ヘ貼ス痔
漏篋仕イ様一日ニ二度ニ七及フ者ナレハ常ニ心ヲ付奥ニ生肉ノ生シタル先
ヲ突崩サスヨウ衝々引加減ニ塩梅スヘシ腫物ノ紐モ同シ此心得第
一ナリ

舌疽

腭ノ后咽喉ノ前軟肉ノ間ニ生ス初ヨリ
及肉状ヲナシテ生ス不治ナリ

舌疽附牙癰ハ口科ニメ不治者也然凡舌疽ハ近年ユ天シテ教今

救フヲ得タリ附牙癰ハ齒癰ノ二症ニ至テハ未タ治法ヲ得ス何
膏藥ノ一ニアラス清鮮劑ニテ治ル一ニ得タリ

上脰漏一名齒漏チ切リテ出血ス上ニ决勝チ付綿ヲ以テ指ニテ押へ止ル也
然レ久ク押イル故ニ一方チ割衣テ止タリ其方ア、クワカリスス硫
黃枯礬ノ末ヲ少シ加へ攪セテ口ニ含マシムレハ甚ヨク止ナリ

一人上脰漏アリ膿水常ニ貯フ之ヲ推只膿出ツ鯨探リチサシ視ルニ
漏内ニ入ル一七八分主方耳露飲ニ宜シ

牙漏上脰漏二種アリ上齒齲ニ穴アリ膿出ルモノ漏ハ何テモ其穴ヲ
切抜サレハ愈ヌ者也殊ニ口中ニハ靈液アル処故甚易愈所故ニ少シ刺タ
ル位ニハ忽チ愈シマウ故ニ廣ク切抜ヨウニスベシ此手術親灸ノ可見
筆ヲ尽シカタクシ

口脰ハ少シ上脰ノ鼻ニ生テ癰杖ヲナスチ云允テ及肉ノ形アリ

一婦人五十余歳舌疽ニメ舌傍少シ強リ及肉ヲ形アリテ齒齲ノ辺腐リ
及タリ先生云己ニ治期チ失ヒル故ニ辭ラレシ病人強請治故ニ其及
肉アル処へセツトシチ付其及肉ヲ抜テ竹サ如黃連湯ヲ用ヒ舌蕪菜
金一兩一步薰ロシニ其身泉容トナラシチ恐レ忍ビ難キチ忍テ
治チ受其日數ヲ計ルニ七旬ニ至リテ其全治ヲ告ク口中チ觀ニ
尽ク毒尽テ其路ノミアリ合藥ロウワトル是甚妙ナリ
紀州日高郡文右門者患舌疽有年先生曰不治ノ者ナリ先可
與黃連湯或竹サ如
黃連湯后以昆布浸水舌上ニヲキ以燒鏝尉火之數回如此スル
一三四日ニメ后服蕪菜チ二劑病勢少衰フ
舌疽上軟ナル者ハ瘡毒ヨリ来ル堅固ナル者真ノ舌疽軟ナル者
治シ易シ看法口傳ナリ
舌疽因梅毒而起者其瘡形凹陷而易治真ノ舌疽ハ必及肉ノ

腎アリ治療ハ深ク穿貫ノ上府肉有者ハ其腐肉切テセントシテ塗工
又薑茶中ハ甘草豆煎口ハサウチ含ム

懸痼風ハ遠ノ根ニ生ス漸々府肉リテ銀骨ニ及フ甚臭キ者也借借

藥ハ 涼膈 犀地 甘露 人中白 コウトシ

蛙喉ハ懸垂ノ長ナルチ云色常ヨリモ少シ白シ一日ニ二三寸モ長ルナリ

冰硼散チ付テ消タリ一ツハ扎テ取タリ

舌^紅木舌ノ如ク腫テ堅ク及肉状ノ如ク甚稀者ナリ硬キ所ニ

針シテ血チ取り金鎖匙チ付竹竹如黃連湯チ用ナリ

重舌ハ舌ノ下ニ少キ舌ノ如キモノ出ルナリ痰包ニ似タリト云凡瘡包

ハ大ニメ舌下腫タル如キ者ナリ何レ凡鉄ニテ切り金鎖匙チ吹可露

飲チ内服シテ愈

吻瘡ハ吻ニ生ル瘡チ云是ニ種ノ物ト云ハ八味逍遙散ニ宜シ

癩 癩疔

癩疔ノ水チ抜^一世医ノ能所知也然凡唯一時ノ快チ得ルノニ全

効ナシ且世医ハ管針チ以テ水チトル是拙ト云ツハシ長崎ニテ蘭

人ノ教ル処皆竹官針ナリ予之ヲ治ルニ術アリ先畢丸ノ所左チ

見究メ其刺ヘキ処チヨク見定披針チ下シ其針ニ添テ毛引チ今

針チ抜溜水チ去ルハシ然サレハ運轉ス針口失ヌ扱其溜水

尺ニテ后左穴大紐チカシ遊^ニ麥チ蓋ヒ膿ニナル迄水ト氣溜凡

紐チ扱ナルチ要トス紐ニ糸チ付テ指込テナリ先針セナル前十日モ鳥頭チ用ヒ十分

水氣溜リシ片針チ下ベシ扱右チ施シテ后二兩日チ縫ル内ニ天竺藥語

チ差シ囊腫初ニ倍ス致者ヘカラス其時清肝膠湿湯杯用シハ其熱

解スルナリ又ハ小柴胡加龍胆ノ一モアリ扱囊腫焮痛ノ膿

ニナルチ穴窺テ又毛引チ以テ紐ニツヘテ入膿チ去也膿尽テ后又紐

ヲ置尤針シテ右ハ囊癰ノ治ニ随ヒ清肝滲濕湯ニ轉スヘシ凡五
六十日ニ膜化シメ全愈ス

癰疔療メ膿ニテラントスル片必大執スルモノ也此時全業無効滲
濕湯ヲ用レハ熱サムルナリ又烏頭湯ヲ用レハ其毒ヲ動ス為也
癰疔刺シテ清水出者ハ膿シ易ク治療ヲ得効ナリ血水交リ出
必針ヨリ黑腐ナル者ハ甚ク敷大患也治方手段アリ全ク
血計リ出ル者ハ治療見合スヘシ

癰疔ニセントスル片先畢丸ヲ遠ク離テ刺片ト水出テ少シ側ヲ
刺サハ水出テ多シ陰囊ヲ引上テ旁ノ方ヨリ水ヲ取ナリ

癰疔之ヲ誤ルニ茎ノ本横骨ノ側之ヲ按ルニ穴アリ者指ヲ入テ
深クナル者ハ囊ヲ按セハ囊中ノ水膿中ニ入ル故ニ囊堅縮ル也即腸
ノ出ル者也大便スレハ囊ヨリ大便出ルモノ也是ハ謁ニ針スヘカラス即
腸出ナリ誤ルヘカラス可慎

癰毒

下疳瘡ヲ患テ茎ニ凝結スル者アリ乱刺シテ血ヲ取リ中黄ヲ貼スヘシ
或麻藥ヲ用ヒ切取モアリ凡テ麻藥ヲ用ユル者先初半瀉ノ類ヲ用
ヒテ心下ヲヌカスヘシ

梅毒ノ薰藥ハ毒ノ猛烈ヲ折者ニメ余効ヲ得ルモノ難シ

先生曰梅毒膿水尽テ后久ク肌肉ヲ生セサル者ハ蒜ヲ摺為泥患處ニ貼
シ其上ヲ燒金ニテ徐々ニ耐火スヘシ若蒜ナキ片ハ葱白ニ代ルモノ亦可ナリ
附骨疽治ヲ施テ后毒尽テ愈ント欲スレハ愈カサル者ハ陽虛也附子
一枚為末瘡上ニ布テ其上ニ艾灸ス

梅毒ニテ耳下ナトニ凝結シ破敵ノ莖ヲ付テ一向膿潰セス腐ラシテ
程ヨク止ル者アリ若少シツ、凝ル者ハ密陀錠ナト刺置漸クニ取ヘシ

梅毒強ク頭上ニ凝ル者ハ或浮腫アトアリテ頭痛スル者狂枝加苓
木附細辛防風湯ニ消毒毒葛根木附ナトモヨシ
同証山牛湯ニ天石忘鐘ニテ奇効アリ

鎖陰 鎖肛 鎖吻

鎖陰ハ人ニ依テ皆異ナル者ナリ先麻藥用テ剪刀ヲ以尿道ノ
下ヨリ切或一皮アル者或臍ニ薄皮アルモアリ或尿道ノ如キ
穴小キモアリ或臍計膜アルモアリ京師ノ娼ヲ療セシハ尿道
ノ如キ小穴アリ其穴ニ羽ニ重ノ小サキ囊ニ大豆ヲ入次第ニツメ三時
計置引出スニ内ヨリ皮皆出タリ又ヲ切テ治シタリ

浪華ノ一婦人ヲ療セシハ是ハ一皮切指ニテ探リシ臍ニ膜アリ初
指一本ニテ破リ夫ヨリ二本三本ニテ明タリ羔藥付ルハ膿質ニ白
雲ヲ塗テ置ナリ尿道ト肛門ニハ薄膜一重ニテ隔ル故ニ累年ニ術
ヲ施セハ誤リアル者ナリ終ク咳ヲ靜メテ療スハシ

鎖陰モ鎖肛ノ如ク披針ヲ以テ切開クヘシ何レ指ニ本位モ介ニ位ニ成ヘシ剪
開テ指ヲ二本位入テヨク探リ明ルト隨分孔大クナル者ナリ其子
宮追モツマリイルハ六ヶ敷也余程手練セサレハ治療出来又者ナリ
是ハ尿道ニ道ヲ水管ヲサシ置肛ノ方ヘモ大キ鯨莖ヲ指入置其尿道
切誤ラニテチ恐ルノミ矢張切肉ニ更サシタル者動搖シツヘシ跡ハ膿
質ニ破敵ヲ塗テ刺置ヘシ尿道ハ濡肉故隨分ト氣ヲ付ヘシ鎖肛菊
坐ヨリ小孔自アル者ハ治シ易シ陰門ノ下ノ端ニ小穴アリニ糞
汁出ル者ハ肛内中へ小サキヒ針ヲ入立ニ切更七分手指二本位入様
ニメ 兎角陰内ノ方ヘ披針ノ力ヌヤウニヒ氣ヲ付刺ヘシ何レ也ノ
塞リ易キ故也指入テヨク探リ羔ハ破敵入ル也且陰囊杯ノ
下或會陰ノ辺ニ小孔出来テ尿汁出ル者アリ此回探リヲ以テ

次第ニ肛門ノ方ヘ切ユクナリ左様ニスレハ下ヨリ肉上テ愈痔漏愈
形ノ同様ニメ切ユクヘシ右ノ如ク治療ノ使也門ノ処ヘユク故ニ無孔者ヨ
リ治療ノ便ナリ世医鎖肛ヲ治療スルト詔レ凡其口披針ヲ刺
テ継テ入ノミニテ切開キ孔ヲ大ニセサル故ニ悉ク治者少シ女子
モ陰門ト肛門トノ隔膜ヤフレテ夫ヨリ糞汁出ル者ハ不治ナリ
結毒ニテ唇口ヲ上下鎖ス者アリ中ニ穴アリ術ニ本ニ三粒位入ル言
語等ニ碍一ナシ此ヲ療スルニ藥線ニテ両ノ大海ヲ扎リ切リ羔ヲ
付テ愈合スヤウニ鑱ニテ后髮際ニ引シメオケリ日ニ膏貼テ
三十日計ニメ愈タリ或箱口ト云

駢指釋府ノ者ヲ療ス右ノ足小指一本ニメ爪ニツアリ切之ハ骨別
レテ二岐ナリ切タル片ハ白雲云決勝胎ス翌日ヨリ白雲ヲ貼ス
后流注ノ疵口ヨリ血水出テ甲大ニ腫タリ先生無名指ノ間ヘ鍼メ
左突繼テ入甲ノ腫タル処ニ先鋒疵ハ失張白雲ナリ藥ハ桂木附是ヲ
切ニハ手足ニ四五歩程甲ヘ切込ヘシ左ナクハ長肉ニ隨ヒ本ノ通りニナル
モノナリ或ハ常並ノ如ク切ニハ鈞ニテカケオクモ佳ナラシキ

失榮

先生嘗テ塾生ニ詔テ曰失榮委中毒氣癩癩ノ如キハ難治ニメ予
モ未タ榮覺スル一ナシ又治術ノ如何トモスヘキナシ予カ輩其
形狀ト症候トヲヨク知テ病ヲ誤ル一勿レ今ノ医ヲ見ニ其難治ナ
ルヲ不知危ニ臨テ救ハレサルヲ見テ初テ誤ナルヲ覺工石子顔ニ
テ更批キ掩ヒル一問多シ予二十三年以前和州五条驛匠工
某ナル者左ノ頭下ニ瘤状ノ如キ者ヲ榮シ二人連采リテ治チ乞
篤シ診メ后穴竊ニ連采ル者云此人ノ病所謂氣癩癩ニメ右采ヨリ
之ヲ治スル人ナシ恐クハ后ニ出血メ死ニ至ルヘシ早ク連采リ竊ニ

家人ニ告テ病人ニ聞ス^一勿レ伝ケレハ從者大ニ驚キ古来ヨリ不治
ノ先生又治術ナキト云クハ天下ニ治スル者ナシト后二三日ヲ經テ
出血ノ死ス

予膏テ失榮ノ太ナル者五宝丹ヲ水藥トテシ用タレハ瞑眩劇苦
楚ニ堪ス然レ失榮ハ十八九歳シタリ故ニ患者瞑眩ニ堪難ヲ忍テ二
三劑ヲ尺^ニセ^レハ^ハ瞑眩緩ム^ニ隨^ヒ失榮又本ノ如ク大腫テ遂死云云
和州一婦人来リテ治乞先生曰是失榮ニメ古今不治ノ者ナリ予
未タ治法得スト同辭ス患者強テ治ヲ請テ帰ヘラス故ニ篤ト是
ヲ診ニ未タ及花ニモ不及然レ口開キ難メ飲食ニ害アリ故ニ五
寶丹一劑ヲ與レハ腫少シク減飲食ヲ能ス又一劑ヲ作黃連
解毒ヲ十貼計リ與ヘ飯ラシムニ四月ヲヘテ死スト云云

淋漏

世ニ懸^ニ癪ト稱スル者多^クハ淋漏ニメ真ノ懸^ニ癪ハ稀ナリ淋毒尿道
ニ塞リ遂ニ膿ヲナシ會^ニ刃^ニ潰テ后少シク漏ル^ニナリ^陰尻或陰
囊ヨリモ漏ル者アリ然トモ大羊^ハ陰茎へ出ル也陰茎へ向ニ通セ
サルニ至リテハ難治ナリ之ヲ治スルハ^ニ枝^ニ穴アル者ハ先^ニ穴^ニ通^ニシ^ニ愈^ス
ヘ^ニ枝^ニ穴^ニ愈^ステ后本管ヲ治スルハ先便通毎ニ指^ニテ^ニ押^ニヘ^ニ小便
ノ便^ニサルヲ以テ要トス小便シ終リテ后ハ又其餘^ニ壓^ニテ^ニ絞^ニリ^ニ出
ス^ニヘ^ニ少^シシテモ溜^レハ愈カヌ^ルナリ服藥ハ大牡加^ニ薏^ニ消毒
一人甚難治ノ淋漏アリ導水管ヲ用テ小便ヲ通スル^ニ凡^テ
五十日計ニメ其口愈タリ

播州ノ人此症ヲ患フ甚難治ニメ龜頭ニ向小便不通色^ニ瘵^ニ治
スレ^レ愈^ス無^レ擾^レ會^ニ陰^ニ刃^ニ穴^ニチ^ニア^ケ夫^{ヨリ}小便ヲ取ヨウニメ返^シ
シタリ又陰囊ト茎トノ間ニ穴^ニア^ケ夫^{ヨリ}小便ヲ取ヨウニ返^シ

タル一モアリ毎日三四度モ小便溜ル寸ハ則て術ヲ施シメ小便ヲ通
シ取ヘシ會陰ヲ撲テテ小便閉者ニハ仲呂丸佳ナリ時ニ男子會陰
ヲ打テ其腫尿道管ヲ塞テ小便通スル一不能呼吸促迫シ
仲呂ニテ少シ緩メリ然レ一日ヲ經テ又如前呼吸促迫ノ苦ム此ニ
臨テハ利水劑テハ効ナシ因テ予小腹ヲサシテ通セシメタリ此術先
賢未登ノ術輕易●ノ支ニ非ス敬而可畏不可誤 閏四月廿八日

石淋ハ會陰ニ滯ル者ニ非ス茎中ニ生ル者ナリ又龜頭ノ口ニ石ア
ル者多シ下ヨリ切開キ出スヘシ若陰茎ノ中ノ方ヨリ切開キ石ヲ
取者ハ其疵愈スヘキ手段ハ鶴ノ羽ノ大ナル管ノ中ヲ又キ管ニ
作りハルサシチ塗尿道ニ刺入戸井ニメ愈ス手段スルアリ

石淋ハ龜頭ヘノ通路セマクナツテ遂ニ石ヲ結ヒタル者ハ大ナルハ批把
ノ杖ノ如クナルアリ中ナル者ハ大豆ノ如キ小ナル者ハ麥ノ如キ推出
ストキハ前ニヨル者ナリ龜頭ノ辺ニ押移ル寸ハ口ヲ廣ケルト隨
分出モノナリ妄ニ切出ス片ハ縫合メ后小水道小サクナツテ通路
宜シカラス夫故大抵ニテハ切ラス前口道ハコ又モノハ陰茎ノ下
ノ方ヨリ横ニ切出スナリ其口ニ小便出ル片ハ愈一ナシ故ニ師家ニ
一奇方アリ其小便ヲ洩サス全愈ス也又婦人モ石淋アリ
溺道廣キ故小キ石ハ出ヌナリ
石淋鹿城先生一婦人ヲ療セシハ其大サ旣大ニ出難ニ故ニ石
ノ中穴ヲ穿チ碎テ出セシ一妙ト稱スヘシ又一婦人擇山ノ
庄諸土ノ娘是又石淋ヲ患ル一七年其石大サ茶碗ノ如ク重七十
二匁アリ

治淋疾小解毒ニ夏枯草加倍膿淋ニ大解チ半紙一枚ニ包ム
程ノ大解ニ水一升六合八合ニ煎シ一日ニ用ヒ尽ス血淋痛甚
難耐者多ク藥甘州湯ニ夏枯草加倍スルナリ煎法如前或猪苓
加軍

淋疾疼痛甚荏苒トメ十八日^止猪苓湯ニ應鐘丸ニ兼用ス少モ
効アラス因テ雞穀應鐘ヲ子テ効アリ淋ノ治法甚多ク尽ク
勝言スヘカラス茲ニ略ス

産后諸症

産后痙病初起腮ヨリタルクナリ言語蹇澁ト両手ヲ握リ反
張スルナリ破傷風ト全ク同シ肩張ノ后反張ス主方小續命湯或
或葛根湯証ニ隨ヒ撰用ユヘシ又剛症アリ葛根湯ノ類彙彙症ア
リ十全大補湯加附子荊芥ノ類治方多ク合谷ニ針シテヨシ音

効ヲ得タリ是春林軒秘術也類彙ニテ得ヘシ紙筆ニテ傳難キ
アリ常ニ産后ノ諸症ニ疑アリテ明論ヲ問ス師門ニ入テ始テ豁
然タリ

産后痙病胞衣不下内ニ死シニ度位迫治法ヲヨクスレハ治久
者也前日戰慄ヲ死シ今日ハ氣分甚ヨシト云テ起居ヲ慎マ
ス風ニ當リ扱スル者ハ又前日死スル者也何レ調養ヲ慎マカル者
ハ必ス不治也方ハ荊芥沈香湯ニ洵丈藍甚妙也

産后戰寒ノ症必輕易ニスルコト勿レ五六死スル者從令戰慄止
ト云ヘ凡諸症蜂起シテ救フコト不能ニ至ル治療アリ産后戰慄ノ
症ニ於テハ世醫皆誤ナリ青洲先生此証ニ於治法論說卓然タリ
實可謂究理

産后痙病キリクトシテ手振フ者口禁者治ス又口ヲ閉者ハ

不治ヲ林示者ハ忽然トメ愈奇術アリ先年終田邑ニ産病有
先生門人下村中川兩人ヲ遣シ療之に不治即先生到テ施シ奇術
而安シ所握ノ手忽テ開ク所謂左右ノ合谷ニ針ス后髮髮降
ニ七針ス淺スヘシ合谷ハ掌中ト通スヘシ鐵鍼ヲ用ユ

産后戰慄ハ血氣不和邪氣虛ニ乘メ到ス処ナリ此調護ヲ失スル故
ナリ先其不和ノ血ヲ治スルヲ主トス戰慄四五発難治ノ兆ト知ヘシ
先四五発ノ中早ク荊艾沈香湯ヲ予ヘシ十全大補加荊炮姜或依症
加香附子ノ症アリ十全大補此方千金産后心腹痛ヲ治スト云処ニ
出タリ千金方ニハ芍藥黃芪湯トアリ白朮ヲ白芷ニ作恐ク
ハ誤ナラシ産后心腹痛ヲ能治スルナリ何レ産后熱戰ハ荊艾ヲ可

産后小水不利スル者ハ神經ノ循環セサル故也遺尿門ノ參芪加附
子湯ヲ予フヘシ方中ノ益智ヲ倍スルナリ又一奇方兼用鷓鴣一羽
腸ヲ去リ紅花人參各一兩ヲツメ燒テ性ヲ存シ末トシ酒服スル
此方ヲ與ヘテ數人ヲ治ス

産后血熱心胸ニ迫テ痛ム者ニ失笑散ヲ用ユヘシ實症ノ者ニハ瀉
心或抽實ノ霜効アリ且心胸ニ迫ル者虵畏ヲ兼ル者アリ玄菟
活

産后暴瀉スル者アリ胃風湯効アリ二三行ナル者ニハ速効アリ
十二三行ナルモノニハ與レハ効アリト雖下利止ナシ亦二三日遲シ其
内心中痞鞭スル証ニ甘草瀉心ニ轉スヘシ産后血暈早ク補虛
加附子炮姜荊艾ヲ用テ治スルナリ香附子一夜童便ニ浸シ明
日予シ用ユ^{是品常可製}又此症ニ童便計吞シム妙也又洎夫藍二分ヲ
リ三分ニテ楓ト煎シ用レハ立効ニ止ム一妙ナリニ番煎ハ渣ニ用ユ
産后ニ子宮腫レテ血塊ノ如キ者アリ謾ニ桃葉或大牡湯ナトノ破血

削チ以テスヘカラス十補加銀花或益母草ニ佳ナリ能消腫ナリ
産后血虚舌赤ク爛テ痛ハハ物湯ニ加鹿胎霜ヲ用テ治テ妙ナリ
産后下血不止者鹿胎霜ヲ白湯ニテ送下スレハ止テ妙ナリ
産后ノ癩ハ沈香天麻湯ヲ共ヘシ

子宮脱ヲ入ルニ薄荷ヲ湯ニ浸シ子宮へ當テ置テ后手術
ニテ能入ルト云フナリ交接ノ時出血スル者ハ医王方鹿胎霜ヲ加ヘル

流注 方筌詳治法

者ナリ

凡腫物流注状ヲ見スモノハ因チ論セス越本附チ共ヘテ佳ナリ正
宗ニ云流注ハ甚稀ナリ何レ流注ノ状ヲ見ス者其身疼瘡疔ア
ル故ニ此氣ヲ付テ見ルハ三正宗ノ説トハ大ニ異ナリ一人液下湯腫ニ
テ手ヲ以テ按ニ少シ痛アリ折節先生和州吉野竹林院
ニ依テ悉ラレシ留主ニテ塾生爭競ノ訟曰是痞癰ナリトテ
大壯ヲ投ス后先生診曰流注ナリト其左足ヲ見ルニ果ナリ疵アリ
因テ越本附ニ母系丸ノ氣用ス唯水氣血凝滯メ腫痛シ動搖
ナラザルニ越婢湯可ナリ若膿氣少テモ見者越本附ノ一ナリ
凡テ疵瘡ノ流注或破傷濕ヨリ流注ニ及者ハ越本烏ニ虎状茶ヲ
加ヘテヨク消散スルナリ流注ハ越本烏ニ紫丸ヲ強クカケテヨシ七八
ケ処モ出テ腰痛肩背ニ凝テ左手ニ疵アリ右ノ手足連モ凝有モ
ノ是流注ナリ虚脱状ニハ參苓木附ノ削ニ宜シ

瘰癧

瘰癧止初ハ元ニ夏枯草湯或海藻湯ヲ用テ消スル者也若
夫ニテモ消散セ又者ハ披針ヲ刺テ拔繼チ指シ置ナリ若瘰
浮タル者麻藥ヲ用テ瘰ノ核ヲ取ルニモアリ
賈氏曰瘰ニ夏枯草湯ヲ用ヒテ里物ヲ下ス者ハ能効アルナリ

吐血下血スレハ后服ヲ止ム一劑ヲ一日用ユハ食氣一日モナキモノナリ
故ニ止ムヲ得スシテ二日ニモ用ユルコトモアリ其凝堅キ者ハ弥應不
ナリ初起ハ効アレバ羔ヲ貼シ治テ癒止テ久クナル者ハ効ナキヨウニ思ルナリ
瘰癧ノ治法甚難シ輕易ノコトニアラス毒リニ言ヘカラス猶後ノ賢
者ヲ待ツ

雜 雜証

三木附 葛根木附ハ血ノ閉メ廻ラサル故ニ血滯凝ル者也血ノ凝滯
行ラズ功アリ故ニ痛強ク幸急等ノ症ニヨシ

桂木附 毒多クシテ氣廻ラサルナリ氣ノ廻ラヌ処チ循ス功アリ麻
痺癱瘓瘰癧結毒等ニヨシ

越木附 水腫ノ凝滯チ解シ循ス功アリ故ニ風濕痛風熱痛ニ
ヨシ桂木附ハ氣血俱ニ凝滯ス兔角血ト氣トカ閉メ不廻ニナリ
或痛ム症モアリ或ハ不痛メ子ル目的モアリ其不痛ナ如此目標ア
ルト云ハ予結毒ナトニテ頑肉トナルチ考ルニ人身中ニ氣血トノ廻リサヘヨケレ

ハ頑肉ニナル例ナシ然ニ頑肉ニ成ルハ血氣ノ凝滯シテ廻サル故ナリ先結
毒ノ者ニ桂木附チ子ヘ藥力ノ不及処ハ鑿ニテ割テ破敵ナトチ貼シ
貼シ頑肉チトク氣ト血トチ復ル片ハ全キ人トナル也宜ク之ヲ考ヘシ予家

所謂三木附ノ附子ハ皆炒烏頭奏効多クシ
痿弱ハ血氣ノ不和ヨリシテ氣廻ラサルモノ也故ニ痛痒ハ知レバ拳動
ナリ難シ治術ハ血ヲ和シ氣ヲ循ラヌ様ニスヘシ桂木附ヨシ幸急
ハ痿弱ト及セリ此氣ノ暢カルヨリ発ル者也拳動ハ少チレトモ
痛痒知ラサルコトアリ又痛痒ハ能覺ト虫幸急ノ甚モアリテ動
クコト不能アリ尤此症腹部拘牽メ痛処ニ引者ナリニ証俱ニ腫ク
変症アリト云凡大抵氣ト血ヨリ来ル者ナリ幸急ニ若耳附自ナリ

結毒ナト桂木附ニ消毒ヲ具ヘテ漸々羸瘦メ結毒治セズ此ハ毒
アリレハ血氣俱ニ虚シタルモノナリ攻敷素ニ不堪メ肉不生カ故ニ血ヲ生シ
肉ヲ生ル方奇良附子湯姜桂湯ノ類ナヘシ必効アリ梅瘡約言ナ
トハ專ラ此意ヲ云テアリ當ル散ノ類計ニ桂木附杯ノ行処知
ラナシ其一ツヲ知テ其ニヲ知ラスト謂ヘシ

當飯る藥散ノ一幸急服候脘傍ニ幸拘アリテ痛シ右ヲ按
口左へ痛ム左ヲ按セハ右ニ移ル其痛心下或ハ背七八椎ニ徹スナリ
耳炒乾姜湯ハ毒心下ニ急自汗盜汗スルヲ治ル又胞中痛ヲナシ
左ニ臥セハ左ニ痛右ニ臥セハ右痛等ノ証ヲ見ス者ヲ治ス皆毒心
胞道ルノ致所ナリ宜シク此方ヲ與フハシ氣上^レ迫^レ喘^レシ汗多出ル
症涎沫モ多ク吐ル者アリ世医此方ノ汗ヲ治ルヲ知サレ也此方
能ク汗ヲ治スルノユエニハ氣逆成血ニメ毒内ヨリ外発スル故ナリ

小兒頻ニ陰莖腫大ニナル者アリ先生梅木湯ヲ與ヘ火吹筒ヲ以テ頻
ニ陰莖頭ヲ吹シメタルハ愈タリ此術本草ノ付方ニ出ツ

先生曰凡瘍腫塊物動氣アリテ手ニ沁スル者針スヘカラス
消渴病七味白朮散ニ瓜呂根知母麥門ヲ加^レ黃連解^毒散ヲ兼用メ
食禁ヲ能シ食養生ニ六連根常食レハ飲ノ上湯ヲ三碗ツ用置
前方ヲ久服スレハヨク愈ト云ヘリ上焦渴下焦ノ渴アリ之能察^スヘシ
不食痼ニ抑肝扶脾湯柴胡ヲ倍シ三稜莪朮ヲ加^レ辰砂散或ハ
左金丸ノ類ヲ兼テ効アリ其他奇方アリ
小兒遺毒ニテ陰囊腐爛スル者葛骨珠沙花一味ヲ煎洗^シ内
ニ天解ヲ投スレハ愈ト云ナリ

畜血下利ノ症ニ瘀血ヲ^カ遂^フ劑ヲ用^テカ^ラサ^レ証アリ服候及古候
トニ考ヘシ不和症ノ強テ硝黃劑ヲ投スレハ直ニ死ニ至ル至^レ此症

千金玉黃土湯黃連解チ氣用メ効アリ畜血下利ノ症挑養ノ症而已
ニ非ス傷寒ニモ下血ノ症挑養ニモ限ラス猶見ヘシ

傷寒多汗増寒衣被チ迫クレハ汗漏テ不止又衣被チ去レハ
増寒忍ヘカラス數日不止者アルナリ世医是ニ柴桂湯柴胡姜桂湯
或桂枝加黃芩湯杯チ與ヘテ不愈メ謔語シ飲食不進終ニ危
ニ至ル者アリ此症ニ表虚而多汗者此病必自汗班チ見ス陶

節庵温經湯益元湯チ與レハ汗出テ諸症愈エ
婦人乳腫痛スル者チ治スルニ吉益東洞葛根加吉チ以テスレハ

其意不可論葛根加吉石チ予常ニ與フルニ甚奇効アリ然レハ
不穩レハ同シ其不然チ以テ之チ用レハ石羔チ用レバ佳ナリ一平且和解

湯ノ方中ニ葛根加石湯ノ配アリ予暫ク據之
委中毒ノ形ハ委中湯腫シ疼痛忍フヘカラスメ后黑府肉リ患汁

出テ膿ニハナラヌ又膝頭ナト次第ニ肌肉メ骨尖ル者ハ委中毒ノ徵ナリ
時毒ナトニメ委中湯腫シ痛ム者アリ世ニ此チ見テ動モスレハ委中毒杯

ト云モノアリ此症ハ脱因ナト決メナク及テ膝頭ナトノ腫ル者也忽クニ者
過スヘカラスハ物湯主之

風眼ノ初起ハ眼胞腫メ疼痛忍フヘカラス頭痛劇ク寒熱往來スル者
ナリ此時早ク治チ施セハヨク愈ルト云リ風眼張破ニ出血不止者犀

角地黄湯三黃瀉心氣用メ治スリ又出血止テ后看猶不止者通明湯
佳ナリ

友人先生ニ問テ曰七八歳女頻ニ兩足チ痿弱ニ立テ不能右之足心ニ
指頭ノ如キ水泡幾ツモ生テ火傷ノ如ク刺之ニ冷水多分出暫時ニ口

飲リ泡外紅暈アリ推之ニ微痛シテ麻痺風ノ如キト云レバ麻痺
風ニ非ス舌上色眼中脈中脈杖飲食杯無異家医手束子名杖

スルヲアタリス一医敗毒劑ヲ子テ破敵ヲ貼ス經一日而再診スルニ
五指頭腫テ點色也按之硬シ前日ニ比スレハ足跡ニ及ニテ腫降ス先生
答曰予嘗テ大人如此者ヲ治ス是元痿弱ノ甚シキ者也凡水泡ハ血
氣不經ノ致ス所也麻風水泡モ亦異ナラス皆氣ノ循ラサルヨリ如此
敗毒劑ハ標治其ノ痿弱ヲ治スヘシ桂木烏柴丸兼用十日ノ間ニ
一度之ヲ攻テ可ナリ

燥屎大便不通ノ症ニ密煎道寸硝黃ノ類用ヒテ無効衆医手ヲ
束テ如何モスヘカラサル証ニ一奇術アリ烟管ノ吹口ニ油ヲ塗直腸
ヘカシ布燥屎ヲ突碎ケリ次才ニ湿布テヨリ通也如此ノ症ニ石ノ術ヲ
施シ兩三人ヲ治ス又滌腸ノ方アリ

反鼻傷ヲ治ルニ内烏頭湯ニ紫丸氣ス咬処ハ柿炭ヲヌリ又痛
甚者ハ豕椒散加雄黃ヲ傳クヘシ痛立処ニ止ナリ然レハ少腫ヲ
灸ルヲアリ又中黃雄黃ヲ煉交セ咬処ニ貼ス

及鼻傷ノ劇症ニテリテハ一身腫ヲナシ呼吸息迫死セントス此症ハ針
ニテ其咬タル方ノ指ノ岐ヲサス清水出テ愈ニ此方法毎ニ行テ鱗アリ
ト又毒劇キ者紫金錠ヲ用ニ石解ヨリ解及鼻毒若四支厥冷
者四逆湯ニ兼用スヘシ

小兒解顱ヲ治ルニ其初起ナレハ急ニ葛根木附ニ紫丸兼攻之佳也
予己ニ数人ヲ治ルニ効アリ大ナルニ至テハ針刺モ及ス紫石モ達セザルナリ
七八年以前一人治ヲ諸フ頭顱已ニ解シ目上竄シ勢殆ト救フヘカラス
故ニ治ヲ拒メハ強テ針セシテ乞フ予辞曰針刺不可致者也若シ
又之ヲ針スレハ反命期ヲ促ス某日医ヲ数人轉スレハ不治トス
先生若針シテ治ルヲ得ハ吾カ幸也若不治凡亦何ヲ恨ミン
故ニ予遂ニ針ス深サ寸許ニメ清水玲瓏名者
牙謂靈液也逆出シ勢減少ス

ト云へ凡脱状衝ニ出ツ故ニ帰ラシム后二三日ニメ遂ニ死スト云

解顛ハ二三歳迄ニ多シ神經ノ病ニメ頭次弟ニ大ニナル者ナリ初起
搗搦ヲ発シ愈テ后十四五日ノ内ニ大陽ノ辺青竹助ハリニツノ
ナアタ開キタルハ不治ナリ初起ニ葛根不附此丸ニ氣テヨシ但
又背ヤ腰杯ニ解顛ノヤウニ玲瓏タル水氣アリテ腫ルノ者アリ矢

張解顛ト同シ者ナリ

解顛ハ必神經病ナリ小兒二三歳頃急ニ驚風ノ如クメ発搗
シ愈テ后二三日モ立チ天庭工青筋高ク出テ又少シク頭腫ル
氣味アル者ハ必解顛ノ徴ナリ早ク葛根不附此丸ヲ以テ
下タスヘシキヲクシテハ不治ナリ必氣ヲ付ヘシ凡テ鍼ナト入カラ
ス針ヲ入レテ見ル清液出ル者ナリ而此症ハ必手足痿弱ニ者也
諸ノ痛ムト云血氣凝滯スル也金創杯ニテ痛ムハ血氣ノ廻ラヌ故ナリ

氣行スレハ則止ムナリ天刑杯ニテ痛ム凡同シ毒ニ閉ラレテ氣廻ラサル故ナリ

洎夫藍ハ能ク胞中ノ毒ヲ解ス血虚ニメ讒詔スル者ニ其レハ了然
シテ爽ナリ金創或産后自七分至一毛

臟毒ノ者法ハ先肛門ヲ開キ見ルニ内蝕シテ甚廣クナリテ赤
小豆ノ如キ者ヲ下ス甚臭氣アル者ハ真ノ臟毒ナリ甚キニ至テ
ハ反花スル者ナリ先不治ノ者ト見ユ此ニ術アリテ治スル者ヲ得タ

リ 幾利須而留

先生曰癩癩ノ証ニ眼目緊縮スル者瞳子散大者ハ不治ナリ
没食子ハヨク胸中ノ膠痰ヲサハク者ナリ小昔龍或杏甘石
杯ニ配シ投スレハ十貼ニ過スシテ効アリ若十貼ニメ効ヲ見ヌ者ハ
不應ナリ不可其ナリ
其亦凡ノ効ハ甚緩ナル者ニテヨク解毒スル者ナリ毒ヲ解シ尽ス程

効ハナシ長服ニ非レハ効ヲ得ル難シ然レト虚状者ニ長ク服スルハ
腫癢スル一アリ油斷スヘカラス虚状ニテ腫ヲ癢スレハ毒ニ堪ヘス
故ニ遂ニ命ヲ損ス

翳花瘡ハ府肉瘡ニ先一度ハ治レト先難治ナリ先年一男子臉
骨ノ辺ニ血痣アリシヲ医治ヲ誤リテ半面及花セリ予府肉瘡ニテ功
レト眼胞ニ至テハ眼ヲ失セテテ恐レテ意ノ尽ニ術ヲ施セシ其ヨク取
テ殆ト常ノ眼ニ異ラス治シタリ然レ又兩年ヲ經テ彼眼胞ヨ
リ又少シ翳花セリ次第ニ彌漫ス因テ又右ノ術ニテ治シタレト
五六年ヲ經テ又癢シ遂ニ死ス
及花瘡ヲ視ルニ莖ニテ肉ヲコソケテ見レハ忽チ血ヲ出シ破
ハ忽チ出血スルナリ他人症ナレハ決シテ血不出及花瘡癢ル處ニ因テ生
肉ノ處連トリ尽ス愈ス是功斷スルノ術ナリ

府肉瘡ノ眼眩ハ大口中燥舌上黃黑胎ヲ生シ水ヲ好ム者也飲食不
惡寒癢癢ノ証ヲ癢スルナリ甚ハ煩渴煩悶ヲ癢シ毒心下ニ迫
リ遂ニ命ヲ損スル者ナリ油斷スヘカラス早ク黃連解毒或石連
耳加果頭湯杯ヲ手強ク用ユシ且冷水ヲ用屢漱テ可ナリ
凡胸腹及臟腑ニ近キ府肉瘡疔ノ類ニハ維ヲ刺スヘカラス脱症ヲ
見スナリ眼胞及唇辺ニ塊アル者ハ内ヨリ取ヘシ是先生ノ術也
橘皮土大黃湯ハ癬瘡ヲ治スルニ甚妙ナリ一人小瘡ヲ患テ癢兩
三ノ小サキ瘡出テ痒痛忍ヘカラス搔ケハ出血スル者アリ諸治
功ナシ予此方七八貼ニテ愈タリ
小兒生ナカラニメ足ソリカヘリ地ヲ跡一不能者ハ之ヲ治スルニ幼穉ナル
時術ヲ施テハ不治ナリ俗云小兒先七八歳ニ及テ治ヲ術ヲ施ヘシ
治術ハ先板ヲ以テ足底ノ形ヲ作り足底アテ其大指ノ間ヨリ不

綿ヲトリ結シ膝下へ引付ルナリ其常足ノ形ニ成テ以要トス日
ニ兩度フラントニテ莖シ引モトシ強テ歩行サスヘシ急ニ効ヲ取
テ欲^極勿レ壁^六樹木ヲ撓ルニ急ニスレハ撓カタシ緩々スレハ意ノ如ク
ナルト同シ此ハ世ニ間アリ術^施シ難シ一工夫アルナリ

走馬疔ハ不治ナリ云云去ル酉ノ六月八歳ノ小兒患走馬疔其膏
已及齧齒一三四枚先投之以蘆薈膏消疔飲加味清胃散加犀角
日二十貳ヲ尽ス兼用人中白散不日ニメ愈其后又漸^生ス

天形ヲ治セント欲セハ先難治ノ症ヲ知ルヘシ手ノ肌層津ナク粘
燥シテ光アル者又眼中光黄ニメ精神ナク或血^紫者又合谷肉
脱スル者此難治ナリ口眼喎斜スル者アリ又灸治出血温泉
ノ類皆无効温泉ニ浴スル者ハ輕病モ又難治ニ至ル出血ハ予之

ヲ談ニ云ニ暈倒ニ至ル出血セシ者アレト又亦及リテ益ナシ
及テ脱状ニ及フ者也

婦人久ク頭^上瘡患テ諸藥無効者ニ桃人承氣ヲ與ヘ桃花散
ヲ兼用シテ甚ヨク應^{ナリ}桃人油ヲ患處ヘ貼スルモ佳ナリ

膏藥ヲ用テ其敷肉ノ分ヲ知ラサレハ治ヲ誤ル一多シ其分ヲ
ヨク知テ治ヲ施スヘシ此ヲ知ル法坐肉ニ針ヲ下セハ其血シホクト
出テ不飛且鮮血ニ非スヨク意ヲ用テ其機ヲ察ヘシ

取蟾酥法蝦蟇ノ生タル者ヲカラ鍋ニ入レ武火ニ登セ漸々油出
ナリ油出尽タレハ火ヲ下シ皮骨ヲ油ヲ取ナリ 膏取法甚
不便利ナリ

乾牛丸 治遺尿

石一味糊丸久ク下利足跡時ニ水氣ヲ生スル者此方ヲ與ヘテ
愈ユ尺直穴抹ナトメ居中ニモ漏出ス者ヲ二三入治シタリト云
黒子大ニメ尖起スル者ハと妄ニ不可取間々反花スル者ナリヨク黒子ノ

根肉ヲ取尽セハ不再発ナリ一病人十五年以前腐菜ニメ取之漸
々反花メ如榴実来テ治チ乞フカラアシヌヲ付テ後衝ヲ貼ス假令治
ス凡亦反花セントス皮薄キ処故輕キ腐菜ヲ貼ス甚大効心得ヘシ
因火傷足ノ指皆屈而不伸愈付タリ先生及テ藥ヲ用テ四指ヲ
引伸シ白雲ヲ付テ丸木ヲ手ノ甲ヨリ四指ヲ結付テ置ナリ
後生肉赤クナリテ反肉ス青蛇ヲ貼ス愈

火傷ニメ膝臂ナト引付タル者チヨト見レハ虫度凡ニ上ニ浮ナリ
引付タル様ナレ凡決メ左様ハ非ス虫度ハ下ニアリナリ是ヲ切ハ甚
六ヶ敷ナリ龍髮刀ニテ先皮ヲ切り和ラカニ手ヲ以テ引片ハ虫
度自伸ナリ

腸痔ノ病者アリ一日ニ五六行セ下血シテ血液枯燥メ大ニ瘦タリ此
節近迎ニ上痢疾ヲ病ム故皆痢疾ノ治療ヲナスハ魚肉ヲ堅ク
禁ス先生ハ魚肉免シテ食良セシム先生門人ニ謂テ曰ク常ニ病症ヲ
明発スヘシト云ハ是カ為ナリ諸医皆ウトキ故如此見誤ルト多シ
且上病血ヲ下ス者ハ魚肉ヲ禁ス膿ヲ下ス者ハ堅ク禁スヘキナリ
足ノ甲ニ附骨疽ヲ患テ時ニ自然ト出血スル者アリ是足ノ甲陽
明經ニメ多血多氣ノ処故ニ出血スルナリ

癩疾ニテ毒肩背ニ発ル者ハ毒深シ故ニ難治ナリ又肩肉脱スル
者ハ難治ナリ又口眼喎斜スル者ハ治療メ終身追固凝スル者也
諸腫物能膿ヲ出スシカス上愈シテ膜隔テハ内ニ痰液滯リ又ハ
膿カヘル也婦人陰中腫レ痛ミ陰門ノ口肉腫硬クシテ指ヲサシハ振ヒ
倒レ痛著ニタエサルモノアリ絶テ交合ナトハナラサル者也此症ニ凉棠瀉
少湯ヲ用テ洗陰散ヲ以テ屢洗フテ治ナリ
銀ニ瘤ヲ生大カ挑実ノ如キニメ痛アリ衆医割テ血ヲ出テ

一林^杯計如此スル一敷度ニメ消シ又舊^口ノ如ナリ食スル一ナラス先生
葉線ヲカケ置一十五日ニメ落タリ血モ多ク不出伝是牙痔ノ
大ナル者ナリ

蘭唇ハ上唇ニ黒ク高クマユノ状ニ似タリ故ニ名ク腫テ痛ヲナス
切レハ出メ不止是モ疔ノ一種也方ニ黃連解毒湯梓皮巴豆ヲ
スリ交貼メ効アリ

婦人尿道破列衣シタルハ甚難シ先生モ三度追縫タレ未タ全
ク舊ノ如クナラスト云ヘリ是ハ元淋毒ニメ破レシト虫疑フヘシ
又産ニテ破レシ者アリ此ハ先深針ヲカケ強クヒキ揚ケ置テ縫
也導水管ヲ尿道ニサシヲキ細カニ縫フ小水ノ濕ス処ナル故
小水ノ度毎々^ニ鹽石異ヲ貼スヘイト云リ

治火傷痕法^付斑點愈メ后痕高クナル者アリ此ハ全ク最初ノ
治法アシキ故ナリ先披針ヲ以テ乱刺シ

ト皮膚腐リ爛ル^レナリ其時愈膏ヲ貼ス又斑點モ同シ一皮膚腐リ
テ又若下ニ皮點點アル片ハ又拔毒ヲ敷テ破敵ヲ貼ス下ノ黒
トリ尽ス后愈膏ヲ貼スルナリ此病ハ深キ病ニ非ス然^レモ此
モ不治アリ黒色ニナルハ不治ナリ

鼠毒ノ創^ニ薰^サ藥ノ法

綿實一匁 蒲黃一分

右二味^ニ薰^サ創

又方

犀角 嬰路躑躅

右二味細末細末白茅根煎汁ニテ送下此方^ハ鼠創
久ク不愈時ニ^ハ禱^ス語者^主之^ナリ

白雲ハ

疔新ナル者ニ用上火傷ハ牡蛎ヲ加フ

大赤ハ

専ラ火傷湯ノ流ニヨシ

前衝ハ

金瘡ニ貼ス何レ新疔ニヨシ肉長スルナリ

大玄ハ

左突破敵ノ輕キ処又肩或腰足ノ痛ニ貼ス

摧丸ハ

今用ハ血竭ニ硫黄ニ膏肉アルニヨシ

破敵ハ

同斷

遊奕ハ

蓋羔ナリ凝血散ス

疔風ハ古名ナレ疔実ハ破傷湿ナリ在再トノ一年二年ニ愈サルアリ

或突出メ高ク腫モアリ或膏ヲ入テ膿迫モ膏モアリ治方常

ノ破傷湿下同シ然シ高ク腫テ水ヲシレノ如キハ青蛇ヲトハ左突紫雲纏

蛇毒ハ風毒襲来ル状ヲ以テ名スル也或腰ヲ赤纏モアリ或ハ背月

ヲ纏モアリ調承ヲ共ヘテ効アリ紫円兼用ヨシ畢竟外内ニ内サ

入子ハ恐ルニ足ヲ入故ニ初ニ殺サン解毒湯ルイヨシ

天蛇毒一名蛇頭疔 爪ノ間ヨリ湿入テ腫痛ヲナス俗ニツマハラニ伝代指

指ニ疽ハ指ノ本腫テ痛ミヲナス俗ニ本フト云

瘰癧ハ指先腫テ痛ヲナス俗ニ指スキハ皆治法同シ

甲疽ハ天蛇毒ニ似タレ疔疼痛甚シ或痒痛ヲナシ或熱痛

ヲナス昼夜寢食セサルニ至ル高ハ破敵拔毒ヨク治ス

溺死ハ心下腫中ヲタリニ暖リアリ或呼吸如糸通者ハ

生スルナリ先水ヲヨク吐カセ治ヲ入ルナリ面色赤色ニテ者ハ春

仰テニ卧セ臍上ニ食塩ヲオキ灸ヲ大クシテ炷スハ次第ニ熱ヲ覺

レハ治スルナリ藥ハ杖浮湯ヨシ何レ利水ノ一ナリ

瘡ハキリイル先府肉テ后肉腐ル者ナリ毛孔粟粒ノ如クツラト

出テ按之片ハ毛孔ヨリ膿シクト出的トシ瘡頭十文字ニ切割キ灸ス

先毒ノ鬱結シタル處ヲ早ク切開キ膿血ヲ出ス是瘡ヲ療スル

先鋒ノ一術ナリ

陰狐疝 小服逆上リ或差引ノアルニ芍甘附ヨシ又此症ニシテ水ヲ取
アリ併中ニ膜アリ夫ヲ紐テ以テ膚ヲ取ラ子ハ再灸スルナリ此親
灸ノ知ヘシ亡女リニスヘリラス

師曰市場村某去冬十月比ヨリ瘡病ニ氣漸ク虚脱シ夜半ヨリ
眠睡催ス片ハ盜汗出四肢羸瘦シ故ニ医見之虚勞ス施治則
効ナシ故ニ治診之脉細微羸瘦骨立ト云ウナレト虚勞ノ微ナシ
能ク見レハ膚ノ層漫腫脱スル中ニ肉厚ニユル故按之膚爛甚シ
即取液流注ナリ故ニ之ヲ刺ス膿出三升餘神効内托ヲ子ヘ一週ニ
差得タリ凡医ノ病ヲ探ルル甚恐入者ナリ全骸虚勞ノ舌ハ赤色ニ
ナリ薄クナルカ真ノ虚勞ナリ是虚勞ノ舌候ナリ夫ヲ知ラス
シテ漫ニ虚勞ト云ハサルナリ

俗ニ云氣腫ト称スル者ハ多肥ニ生ス清テ膿ヲ流シ又口開テ膿
出ス如此スルハ六七度モアルナリ挑養ニ杜仲ヲ加テ二貼ニメ治タ
リ青竹助ハ膿病ノ卒ニ肩ニ凝テ氣絶スルヲ伝三稜針ニテ三四回
ヲ刺ニ血出ヌモノナリ其披針ニテ切レハ出ル者ナリ前ノ三稜針
ニテ刺タル穴ヨリモ皆血出ルナリ一処開討百骸皆利スト是ナリ凡
テ是悉瘡ノ病ハ皆刺絡法ノ書別ニアリ

腎囊風ハ經行ノ時其婦ニ交レハ此症ヲ生スト云禁殺生曰經行ノ
時交合ヲナセハ其兒必癩トナルナリ矢張其意ナリ又蕃蒲ノ陰所
ヨリ脊背逆モ生ルアリ或周身ニ発ルモアリ肌表ノ毒ナリ内葉
猪苓接骨木湯或蒼朮前王大黄羔付ヘシ
阿片此水ヲ取法ヲ承囊花則瞿粟花也花落テ后壳ニ小刀ヲ以テ

置筋破り置ハ白液出ツ竹窠ニテ取日ニ三度ニ日程ニ取也主治
喘息或遺尿一切息迫ノ証ニ用テ妙ナリ毎日二重許粟粒大
不可大過瞑眩甚シ

制礪礪法

千年ニ経タル馬屎桶ヲ見レハ殆滞リ有ナリ夫

ヲ取テ日ニ干シ直ニ水少シ入兼露罐ニテ取ヘシ其后茶碗ニ入
上ヨリ蓋ヲシテ泥封シ目張ヲメ霜月ニ陰地ニ埋メ来三月ニ
出ス可上ニ氷ル者アリ此乃礪礪也

虎杖根ハ癡血ヲ散ス虎杖茎ハ破傷湿灸火ヲ治ス

吐ノ劇証世医所難ナリ隨其夏苓湯或依竜肝劑難奏効
者吾師福井氏常ニ愁之自作一奇方名之曰三聖湯主治痞
胞膈之鬱氣上吐噦能進飲食尤治吐之聖劑也

紅花 檳榔子 香附子

右三味水煎或隨症加茯苓陰乾葉蘭宜令服此湯奏奇効

瓜藤疔者難治ナリ

吾州先生医譚終

越山所持

紀州和歌山縣第貳大區二小區湊
通所南貳丁目三番地

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

