

善
510.87
12-1
27

27



63298

正德山人書

卒死第一

方九十四首

灸法十

備多

卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨鼻上一二百息牛舐必瘥牛不肯舐者鹽汁塗

面上牛即肯舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得

以人溺解之
此漏鵲法

又方灸鬩斗鬩兩脇下解急方云又治尸厥

針灸法

針間使各百餘息又各鼻下人中一名鬼客廳用

治魘死不自覺者方

慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語

取東門上雞頭為末以酒服之

治卒覺死方

擣韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳張仲景云灌口中

治鬼魘不悟方

伏龍肝為末吹鼻中

艾方 皂莢為末如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死回生佳法

方云治中惡

辟鬼方

雄黃如棗大係左腋下令人終身不魘張文仲云男左女右

艾方 艾兩斤大趾叢毛中各灸七壯附後方云華佗法

治中惡方

葱心黃刺鼻孔出血出愈附後方云八寸無苦

方 大豆一七粒為末雞子黃并酒相和頓服

方 使人尿其面上可愈 用後方云此扁鵲法

方 灸胃管五十壯愈

中惡并蠱毒方

冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

方 溫一升猪肪頓服之 **又方** 車軋脂如雞子大酒服

方 忤方 此病即人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治此皆參取而用之

鹽八合以水二升煮取一升半分二服得吐即愈

方云治鬼擊 若小便不通筆頭七枝燒作灰末水和服之

即通

方 犢子屎半盞酒二升煮服之亦治霍亂 用後方云治鬼擊大牛亦

用

又方書墨為末水服一錢匕

又方臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠交亦佳

灸法治卒死

灸手十指爪下各三壯餘治同上方備急方云治卒死又而張目反折者

壯灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨關百

壯

又方湯治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死

絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者勿病人髮左右

從踏肩引之藥下復增取盡一升須臾方立蘇方

麻黃冬兩 桂心貳兩 甘草壹兩 杏仁北米於石粒

方四味咬咀以水八升煮取三升分三服肘後方云張仲景方無桂

治 市中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉酒服一乃圭日二血化為水

治 鬼擊病方

鬼擊之病得之無漸卒者人如刀刺狀如胃氣腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口

治 鬼排

雞朶白如棗

青花麻豈把

右一味以酒七升煮取二升熱服須臾發汗若不汗熨斗盛火炙兩脅下使熱汗出愈

又方 艾如雞子大二枚以水五升煮取一升頓服

又方 吹酥少許鼻中

灸法

灸人中一壯立愈不瘥更灸○又灸臍上一寸七壯不兩踵白肉際取瘥又灸臍下一寸三壯

治五絕方

夫五絕者一曰自然二曰墮墜三曰溺水四曰驚寐五曰產乳絕

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下

溫者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩手抱起徐徐解之心下尚溫者以麩解覆口鼻兩人吹其兩耳

又方

強臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方

禱皂夾細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方

刺雞冠血出滴者口中即活男雌女雄

又方

雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方

皂莢為末以葱葉吹入兩鼻中逆出更吹

①梁上塵如大豆許各兩一沙竹筒中四人各捉一筒
同時吹兩耳兩鼻即愈

②豕鼻口眼耳中并捉一髮一撮如筆管大掣之立活

③雞血塗喉下
又方藍青汁灌之

④灸四肢大節陷大指本支名曰地袖各十壯

執喝方

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

⑤令喝人仰卧以執土壅臍上令人尿之臍中温即愈

⑥可飲執熱湯亦可內少乾薑橘皮及甘草煮飲之稍稍咽

勿頓使飽但以執土及熬灰土壅臍上佳

⑦濃煮蓼取汁二升飲之即愈不差更灌

⑧張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人頭

湯入腹須臾即蘇

又方使人噓其心令暖易人為之

又方抱狗子若雞者心上熨之

又方屋上南畔瓦熱熨心冷易之

又方灌地漿一盞即愈

又方地黃汁一盞服之

又方水半升和麪一大抄服之

又方落水死方

以竈中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死者伏

於甑上使頭小垂下抄鹽一方寸匕內竹管中吹下

孔中即當吐水水下因去甑下死者著灰中壅身使

出鼻口即活

又方掘地作坑數斛灰內坑中下死人覆灰濕徹即活

勿令大熱博人灰冷更易半日即活

夏方取大甑傾之死人伏其上令死人口臨甑口然葦草火

一二七把燒甑中當死人心下下令煙出小入死人口鼻口

中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人口

身及甑勿令甚熱當令火氣能使死人心下足得暖

卒無甑者於岸側削地如甑空下如竈燒令暖以死

人著上亦可用車轂為之勿令隱其腹令死人口低頭

水得出并炒交數斛令暖以粉身濕更易溫者

但埋死人暖灰中頭足俱沒惟開七孔

倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得

綿裹皂莢內下部中須更水出

裹石灰內下部中水出盡則活

倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

麥沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易

又方竈中灰一二石埋死人從頭至足出七孔即活

又方盆兩脚踏著生人兩肩上下死人背向生人背即負持走

行吐出水便活

又方解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活

治冬月落水凍四肢直口嚔尚有微氣者方

以大器中熬灰使暖盛以囊薄其心上冷即易心暖

氣通目得轉口乃開可溫粥粥稍稍吞之即活若不

先溫其心便持火炙身冷氣與火爭即死

燒方

後懸蹄以夜半時燒研細篩以豬脂和傅亦治

石入水手足腫痛方

擣生胡麻薄之

酒醉中酒恐瀾方臟方

以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯

方擣茆根汁飲一二升

方凡醉不得安卧不動必須使人搖轉不住特忌當風

席地及水洗飲水交接

方飲酒頭痛方

竹茹五兩以水八升煮取五升去滓令冷內破雞子

五枚攪勻更煮一沸飲一升使盡痰

石飲酒腹滿不消方

煮鹽湯以竹筒灌大孔中

治飲酒中毒方

煮大豆二升飲汁三升

又方酒漬乾椹汁服之

治病酒方

葱白

豉各五升

右一味以水四升煮取二升頓服

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入

心氣虛令人錯謬失常方

芍藥

人參

白薇

括萎根

枳實

知母

甘草

生地黄

酸棗仁

茯苓

參兩外其藥作茯苓令

干味以咀以水一斗煮取二升分三服

治遠月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻人賣升

黃芩

實兩用後用黃蘗

右一味為末蜜和丸含之千金翼用黃蘗實兩

治酒醉不醒方

數葛根汁一斗一升取醒止
連服方不醒大醉

飲酒令人不醉方

柏子人

麻子人各貳兩

右一味治下篩為一服進酒三倍

又方葛花

小豆花各等分

右一味合為末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及

枇杷葉飲並能倍酒

又方九月九日菊蕊為末臨飲服方寸匕

又方 小豆花葉陰乾百日為末服之

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾為末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾蔓菁根二十七枚二遍熬為末取兩錢許酒後水煎

治惡酒健噴方

穴在井中倒生去半燒灰飲之勿令人知

又方 取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

柳花

臘月鼠頭灰

石二味等分為末黃昏時酒服一杯

又方 酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安

猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲

又方 正月一日酒五升淋確頭擣一下取飲之

又方 故甌中葉耳子七枚燒作灰黃昏時暖一杯酒呪言

與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方 白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方 刮馬汗和酒與飲終身不飲

又方 虎屎中骨燒末和酒與飲

又方 鸕鷀屎燒灰水服方寸匕永斷

又方 取毛鷹一過吐毛水煮去毛頸服

又方 故紡車絃燒灰和酒與服

又方 驢駒衣燒灰酒飲方寸匕

又方 自死蟻蠟乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗

又方 酒各吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方 酒漬汗靴替一宿平日空腹飲即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之 **又方** 臘月馬腦和酒服之

蛇蟲等毒第一 論法一首 方百二十三首

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾内生椒二兩枚裹著須臾即出 附後方

蛇尾即出若無以刀割蛇尾截令皮斷乃捋皮倒脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭瀝血著口中即出

又方 以患人手中指等截一歲大猪尾以器盛血傍蛇瀉

血口中按出之

治卒為蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

蠍螫方

服小蒜汁滓薄上用後方二五治蠍蛇螫

方 乾搗葵取汁服之

方 蛇咬方

人及厚塗帛裹即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不瘥更消注之

方 以母猪耳中垢傳之用後方二五牛耳中垢亦可用

治蝮蛇毒方

令婦人騎度三過又令坐上

方 以射罔塗腫上血出即愈

方 生麻楮葉合搗以水絞去滓漬之

又方 令婦人尿磨上

又方 末薑薄之乾復場

治諸蛇毒方

雄黃

乾薑 各等分

右二味為末和射罔著竹筒中帶行有急用之

又方 雞屎二七枚燒作灰投酒中服之

又方 以麩圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒著

二二二度瘥

又方 雄黃為末傳上日一易

又方 鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之

又方 擣紫葺取汁飲一升以滓封瘡上以少水灌之

又方 梳中垢如指大長一寸炙和傳之

又方 取合口椒葫荇苗等分擣傳之無不瘥

又方 男子陰間毛二七枚合豆之有汁即咽却秘方也

又方用銅青傅瘡上

又方擣大蒜和胡粉傅之

又方口嚼大豆葉塗之良

又方猪脂和鹿角灰塗之

又方炙梳汗出製之

入山草辟瘴蛇方

乾薑

麝香

雄黃各等分

右三味擣為粗散以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒塗

瘡集驗方云如無麝香以射罔和帶之瘡救急方云以蜜和為膏傅瘡處良

又方常燒殺羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫人瘡已愈餘毒在肉中淫淫痛癢方

大蒜

小蒜各壹升

右二味合擣以熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內磨中良

又方 燒死鼠為末傳之

治眾蛇螫方

灸上三七壯無艾以火頭稱磨孔大小變之

治虎咬磨方

濃煮葛根汁洗十數徧及擣為散以葛根汁服方寸

匕日五其甚者夜二

又方 青布急卷為繩止一物燒一頭燃內竹筒中注磨口

熏之妙

又方 煮鐵令濃洗磨

又方 嚼栗子塗之良

虎法

凡入山燒水牛殺羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫毒治亦難痊慎之慎之

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥塗之濕則易雌者用當丸牽溝下沈傳之若值無雨可用新汲水從屋上淋下取泥

又方取齒中殘飯傳之又猪脂封之又射罔封之又礪砂和水塗上立愈

治蠍螫方

若著手足以冷水漬之小微暖則易之著餘處者冷水浸故布搨之小暖則易之

又方生烏頭為末唾和傳之

六蜂螫毒方

取瓦子糜其上唾一二七遍置瓦子故處

治蜂螫方

猪脂

蜜各伍合

蠟

右二味和煎如膏候冷以塗之

又方 燒蜂房為末膏和塗之

用此方之石先煮蜂房洗之又燒塗之

又方 酥脂塗之立愈

又方 燒牛屎灰苦酒和塗之

又方 齒垢塗之

又方 溲酢沃地取泥塗之

又方 嚼鹽塗之

又方 以人尿新者洗之

又方 尿泥塗之

又方 反手掩地土干傳之

凡蠟螫蟲聚人影著處便令人病瘡其狀身中忽有

處疼痛如芒刺亦如刺蟲所螫後益心細瘡癩作聚如菜更

子狀四邊赤中央有白膿如疥亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰脇骨治之法初得之摩犀角塗上止其毒治如火丹法余以武德中六月得此疾經五六日冥心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠹螻形以刀子細細盡取蠹螻腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由矣

治蠹螻方

殺羊髭燒灰臘月猪脂和封之

治疥瘡封之

治疥瘡酛和胡粉塗之

治蠹螻疥瘡方

燒鹿角為末以苦酒和傳瘡上已有汁者燒道傍弊蒲席傳之

又方槐白皮半斤切以苦酒一升漬半日刮去瘡處以洗
日五六遍仍以赤小豆為末以苦酒和傳之燥復易
小兒以水和

又方嚼大麥以傳之日二 又方燕巢中土以豬脂和傳

又方熟嚼梨葉以水和塗燥復易之

又方爛擣馬鞭草以傳上燥則易之

又方取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治二種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲

外臺云正黑狀如大飛牛有一長角在口前如弩檠臨其角端曲如上

弩以氣為矢因水勢以射人入水或聞其在水中鈽鈽作聲

更須得水沒其口便射人此蟲長鵝鵝能食之其初始

脫先惡寒噤瘳寒熱筋急仍似傷寒亦如中戶便不能言
前曰小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是其證始得三四日當急
治之治之稍遲者七日皆死初未有瘳但惡寒噤瘳及或
瘳似蠟螫亦似癩疽瘳射工中瘳有二種其一種瘳正
黑如蠶子皮周邊悉赤或衣犯之如有芒刺痛其一種作
瘳久久穿或晡間寒熱其一種如火灼燥起似此者最急
數日殺人 備急方一有四種其一種突起如蠟

治射工中人寒熱或發瘳偏在一處有異於常者方

取鬼臼葉一把清酒中熟搗絞取汁服一升日三

又方取生吳茱萸葉一握斷去前後取握中熟搗以水

一升煮取七合頓服 **又方**取胡切帖瘳灸七壯

又方取蜈蚣大者一枚火炙治為末苦酒和以傅瘳上

又方取赤苋菜熟搗絞取汁每服一升日四五服

又方白雞菜取白頭者二枚湯和涂中毒處

又方升麻 參兩

犀角

烏扇根 各參兩

右二味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服相去

如一炊頃盡更作

治射工中人已有瘡者方

取芥子爛搗芸酒和厚涂瘡上平日痛便止

又方取狼牙葉冬取根搗令熟薄所中處又飲四五合汁

治射工中人三種瘡方

升麻 貳兩

烏扇根 參兩

右一味咬咀以水二升煮取一升適寒溫盡服滓薄上

五香散治江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡方

甲香

犀角

鼈甲

升麻

薰陸香

烏髮

丁香

沈香

黃連

青木香

羚羊角

黃芩

甘草

牡蠣

吳茱萸

黃蘗陸分

右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸匕日

三并以水和少許洗之仍以雞子白和塗腫上乾則易

射工毒膏治射工惡核卒中惡毒方

野葛壹升

巴豆

烏頭

蜀椒

茵芋

躑躅

附子

丹砂各壹兩

雄黃

大黃各柒兩

右十味治下篩以水中水猪膏二斤煎三上三下去滓

內丹砂雄黃末攪全凝以棗核大摩痛上勿近眼凡合

名膏皆母令產婦女人小兒雞犬六畜見之惟宜清淨

治沙虱毒方

斑猫二枚一枚熬為末服一大枚燒令煙絕為末著瘡中

又方大蒜十枚止一物合皮安熱灰中炮令熱去皮刀斷

蒜頭取熱柱所著毒處

又方麝香

大蒜

右一味合擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傳瘡上

又方雄黃

朱砂

怕山各口等分

右二味取五月五日中時令童子合之取傳瘡上

治石蛭方

山水中陰囊草木上石蛭著人則穿人肌膚行人肉中及屋脊起如蟲行道之狀

凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽塗脚脛及足趾間跌上及著鞋鞋蛭不得著人也已著者有灸其

道即愈

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而無物其診法
初得之惡寒微似頭痛目匡疼心中煩懊四肢振愀腰背
百節皆強兩膝痛或翕翕而熱但欲睡日醒暮劇手足逆
冷至肘膝二三日腹中生蟲食人下部肚中有瘡不痛不
癢令人不覺不急治過六七日下部出膿潰蟲上食人五
臟熱成毒煩下利不禁八九日雖良醫不能治矣覺得之
急早視其下部若有瘡止赤如截肉者陽毒最急若瘡如
鯉魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知
是中水與非者當作五六升湯以小蒜五升投湯中
消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異

者非也當以他病治之

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方

吳茱萸壹升

生薑切壹升半

犀角

升麻

橘皮各貳兩

烏梅拾肆枚

右六味哎咀以水七升煮取二升分二服

又方浮萍草曝乾為末酒服方寸匕

又方取梅若桃葉擣絞取汁三升許或乾以少水絞取汁

飲之小兒不能飲以汁傅乳頭飲之

又方擣蒼耳汁服一升又以綿裹杖沾汁導下部日三瘥

又方擣蓼一把以酒和絞取汁一升飲之不過二服瘥外

肘後作
梨葉

又方擣藍一把水解以塗瘡浴面目身體令徧

又方 擣蛇莓根為末水飲之并導下部生者用汁凡夏夏
行常多齋此藥膏入水以方寸匕投水上流無所畏
又辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無毒
治猫鬼野道病歌突不自由方

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水服方寸匕日
一。針灸方見第十四卷中

又方 臘月死猫兒頭燒灰水服一錢匕日二
治猫鬼眼見猫狸及耳雜有所聞方

相思子 草麻子 巴豆各壹枚 朱砂末 蠟各肆錢

右五味合擣為丸先取麻子許大含之即以灰圍患人
前頭著一斗灰火吐藥火中沸即畫火上作十字其猫
鬼並其死矣

治蜘蛛咬毒方

人及傳又油淀傳又炮薑貼之又胡孫果傳之

又方 烏麻油和胡粉如泥塗上乾則易之

治馬嚙人及躡人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢貳寸長鼠屎貳枚

右一味合燒為末以猪膏和塗之立愈外臺方二公治遂成瘡君爛經久不

愈者肘後方二公用馬鞭皮燒末猪膏和塗

治馬齧人陰卵脫出方

推內入以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封之且忍勿小便即愈

治犬馬嚙及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中

取灰汁熱漬瘡常以汁器有火數易汁勿令爛入肉

三數日清之有腫者多灸石燻之日一消止

治馬血入瘡中方

服入糞如雞子大復以糞傅瘡上

又方取婦人月水傅之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

便取馬腸中柔以塗之大良外其方云取其屎燒灰服方寸匕

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈又以石灰傅之

又方飲醇酒取醉即愈

又方燒雞毛作末以酒服方寸匕

又方以沸湯令得所浸洗之取瘥

論曰凡春末夏初大多發在狂必誠小弱持杖以預防之防

而不免者莫出於灸百日之中一日不闕者乃得免難若
初見瘡癢痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦
夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看
灸時一度火下即覺心中醒然惺惺了了方知咬已即狂
是以深須知此此病至重世皆輕之不以為意坐是死者
常年有之吾初學醫未以為業有人遭此將以見問吾了
不知報答以是經吾手而死者不一自此銳意學之一解
已來治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虛故將
來學者非止此法餘一方皆須沈思留心作意慇懃學之
乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也聊因
方末申此一二言不盡意耳

又曰凡刺犬咬人七日輒應一發二七日不發則脫也要

過百日乃得免耳每到七日輒當擣韭汁飲一升又當
終身禁食犬肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之則
禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食
便發不宜飲酒能過一年乃佳集驗方云若重發者生食良
之不必令其人知初得蠶
毒便為之則於後不發也

治獬犬毒方

頭髮

猬皮 各等分

右二味燒灰水和飲一杯口噤者折齒內藥

又方 擣地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲

之亦可為末服方寸匕日三兼傳上過百日止

又方 擣韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治愈後復發者

又方 刮虎牙若骨服方寸匕服已發狂如獬犬者服即愈

又方 燒虎骨傳瘡及灸又微熬杏仁搗研取汁服之良又

取燈臺殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜

又方 用韭根故梳一枚以水一升煮取一升頓服

又方 挑東南南枝白皮一握水一升煮取一升分二服叶出

又方 取獭犬腦傳上後不復發

又方 蝦蟇交粥飲服之 又方 服莨菪子七枚日一

又方 梅子末酒服之 又方 以豆醬清塗之日三四

治狂犬嚙人方

蛇脯一枚炙去頭搗末服五分七日三

又方 搗莨菪根和鹽傳日三 又方 青布浸汁服二升

又方 飲驢尿一二升

凡犬嚙人方

燹杏人五合令黑碎研成膏傅之

又方取竈中熱灰以物瘡中常裹擊之

又方燒白死蛇一枚入之焦為末內瘡孔中

又方鼠屎為末以臘月猪膏和傅之外其方云用鼠膏

又方飲生薑汁一升治狂犬咬韭汁亦佳外其方云亦治

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹

之瘡

又方以沸湯和交雞毒磨上又方燒犬尾為末傅瘡日三

又方以鹽垢少少內瘡中又方火炙蠟以灌瘡中

又方以熱牛屎塗之佳又方以苦酒和交塗瘡中

治小兒狗咬方

月一日以水一升灌之勿令狗主打狗若月盡日三

升水灌之

灸法

凡狗犬所齧未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日灸
二壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒及猪犬肉
治猪齧方

松脂煉作餅上貼上

又方 屋雷中泥塗

被打及諸傷損第一論一首 方九十三首

論曰凡被打損血悶捨心氣絕不能言可擘開口人中令
下咽即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安麥著
以手袖掩其口鼻眼上一食鹽活眼開與熱小便一升
治被打擊頭眼青腫方

又肥猪肉令熟搗上用此皮方一云治血聚

又方 墙上朽骨唾於石上研磨塗之乾即易

又方 炙猪肝貼之

又方 大豆黃為末水和塗之

治被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃膏升 當歸 桂心各貳兩

右三味治下篩以酒服方寸匕日二夜一

又方 劉寄奴 延胡索 骨碎補各壹兩

右三味以水二升煎取七合復內酒及小便各一

合熱溫頓服

又方 蟻蟲 黃蟲 水蛭各壹拾枚

桃人伍拾枚 桂心貳兩 木黃伍兩

石六味咬咀以酒水各五升煮取二升分五服

又方 生地黄黃汁三升酒一升半煮取一升七分合分二服

方治從高墮下痰血脹
心面青短氣欲死者
又方 苣荬子為末傅瘡上

白馬蹄 治被打腹中痰血并治婦人痰血化血為水方

白馬蹄燒令煙盡搗篩酒服方寸匕日三夜一

治被毆擊損傷聚血腹滿煩悶方

豉一升以水三升煮二沸分再服不瘥重作更取麻

子煮如豉法不瘥更煮豉如上法

治有痰血者其人喜忘不欲聞人聲曾中氣塞短氣方

甘草 壹兩
茯苓 貳兩
杏仁 伍拾枚

右三味咬咀以水一升煮取九合分二服

治從高墮下傷折痰痛煩躁啼叫不得臥方

取鼠屎燒末以猪膏和塗痛上即急裹之附錄
治從高墮下及為木石所逆或因落馬凡傷損血凝滯
氣絕欲死無不治之方

取淨土五升熬令溜分半以故布數重裹之以熨病
上勿令大熱恐破肉冷則易之取痛止即已凡有損
傷皆以此法治之神效已死不能言者亦活三十年
者亦瘥

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷方
以酢和麩塗之

當歸散治落馬墮車諸傷脫折臂脚痛不止方

- 當歸
- 桂心
- 蜀椒
- 附子各一分
- 澤蘭 壹分
- 芎藭 陸分
- 甘草 伍分

右七味並熬令香治下篩酒服方寸匕日二凡是傷損
皆服之十日愈小兒亦同救急方云治墜馬落車後打
此散呼吸之門不復大
痛十三日筋骨相連

黃芩散治腕折方

黃芩

芍藥各各二兩

乾地黄

附子

續斷

桂心

乾薑

通草各各兩

大黃壹兩

蜀椒壹合

烏頭半兩

右十一味治下篩先食酒服五分匕日二

千金金黃
無大黃

治折骨斷筋方

乾地黄

當歸

羌活

苦參各各兩

右四味治下篩酒服方寸匕日二

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉搗取汁飲一升無生麻者乾麻汁服亦主墜墮搗打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內磬中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

生地黄不限多少熟搗用薄所損傷處肘後方云小

之以裹傷處以竹片夾裹令編縛令急勿令轉動一日可十易一日蹉若血聚在折處以刀子破去血

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

以水二升漬豉三升取汁服之

治同前

右酒服方寸匕日二肘後方治從高墮下者若為

又方筋骨傷初破時以執馬屎傅之無癢

又方 大豆一升水五升煮取二升以淳酒六七升合和豆

汁服之一日盡如湯沃雪

用後方云浴墮連環血無大豆用小豆佳

又方 羊腦壹兩

髮交

胡粉

胡桃脂兩

右四味搗和調如膏傅上生布裹

治頭破腦出中風口噤方

大豆一斗熬去腥勿使太熟搗為末熟蒸氣偏合甑

下盆中以酒一斗淋之溫服一升覆取汗傅杏人膏

瘡上

又方 治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或產婦墮

胎凡得此者大重不過五劑

方見第八卷中

治丈夫從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡傷

經崩中皆主之方

阿膠

艾葉

乾薑

各二兩 芍藥 各二兩

右四味以水八升煮取二升去滓內膠令消分二服羸人分三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止者服之悉愈

大膠艾湯 治男子傷絕或從高墮下傷五臟微者唾血及

余瘡傷經者方

阿膠

艾葉

甘草

當歸

芍藥

各二兩

乾薑

壹兩

芍藥

乾地黃

各三兩

右八味以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人分三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止者神良

竹皮湯 治為兵杖所加木石所逐血在胸背及脇中痛不

得氣息方

青竹刮取茹

亂髮各如雞子大貳枚

右二味於炭火上炙令焦燥合搗下篩以酒一升煮三沸上一服盡之二服愈

治墮馬落車及搗間崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取一升去豆一服令盡劇者不過二作

治墮馬落車馬間心腹積血唾吐無數方

乾藕根為末以酒服方寸匕日三如無取新藕汁服

桃人湯治從高墮下落大木車馬間胃腹中有血不得氣

方

桃人 拾肆枚 大棗 貳拾枚 大黃

消石

甘草 各二兩

蒲黃 各二兩半

右六味咬咀以水三升煮取一升絞去滓適寒溫盡服之當下下不止漬麻汁一杯飲之即止

又方

治腹中疼血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通

桃人

蜚蠊 各三枚 荆芥 半分

大黃

芍藥 各三兩

當歸

桂心

甘草 各二兩 蒲黃 伍兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

又方

治墮落痰血方

桃人

伍拾枚 水蛭

蜚蠊 各三枚

甘草

桂心

當歸 各二兩

芒消 各二兩

大黃 肆兩

右八味咬咀以水八升煮取一升絞去滓適寒溫服一

升日二服

深師方無芒消

又方

桃人伍拾枚

蜜蟲

麝蟲

水蛭各叁拾枚 大黃伍兩

桂心貳兩

右六味以酒水各旦五升合煎得二升適寒溫飲一升日三服

又方

治脫折瘵血方

桃人肆拾枚

亂髮壹握

大黃如指節大壹握

右二味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃人

以酒三升煮取一升盡服血盡出用後云仲景方用大黃叁兩非帛子如手

大交亂髮如雞子大交用吹單布方壹尺交桃人肆拾玖枚敗蒲壹握長叁寸切甘草壹握如指大以童

子小便量多少煎湯成內酒壹大瓊次下大黃分溫為三服別到敗蒲半領煎湯以浴衣被重覆服藥須通

利數行痛楚立瘥利及浴水亦勿在即瘥血也

又方

挑人陸拾枚

大黃陸兩

桂心貳兩

右二味以酒六升煮取三升分二服當下血瘥

海黃散 治從高墮下有瘀血方

蒲黃 捌兩

附子 壹兩

右二味為末酒服方寸匕日三服知增之以意消息

又方 治腕折瘀血方

蒲黃 壹斤

當歸 貳兩

右一味治下篩先食酒服方寸匕日三

又方 蠶蟲 貳拾枚

牡丹 壹兩

右一味治下篩酒服方寸匕血化為水

備急方云治久宿血在諸骨節

及外不去者
貳味等分

又方 取菴藎草汁飲之亦可服

又方 凡被打及產後惡血及一切血皆煮續骨木汁二升

飲之

治從高墮下崩中方

當歸

大黃各貳分

右一味治下篩酒服方寸匕日三

治杖瘡方

石灰柒斤

新猪血壹升

右一味和為丸熟燒之破更丸燒二徧止為末傅上

又方

釜月下土為細末以油和塗訖臥羊皮上

又方

服小便良

治竹木刺在皮中不出方

羊采燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不重塗土乃言

不覺刺出時一二云用乾羊采末

又方 薔薇灰水服方寸匕日二服十日刺出

又方 酸棗核燒末服之
又方 鑿柄燒灰酒服一斗匕

又方 頭垢塗之即出

治刺在肉中不出方

煮山瞿麥汁飲之日三瘥止

又方 用牛膝根莖生者併擣以薄之即出瘡已合猶出也

又方 白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫者

又方 鹿角燒末以水和塗之立出又者不過一夕

又方 嚼白梅以塗之
用後方用烏梅

又方 嚼豉塗之
又方 溫小便漬之

治又刺不出方

服王不留行即出兼取根為末貼之

治惡刺方

苦瓠開口內小兒尿煮兩三沸浸病上

又方 蒼岩根火煮浸之冷復易神方也

又方 李葉棗葉擣絞取汁點上即效

又方 濃煮大豆汁漬取瘡

治惡刺并狐兔刺方

以烏父驢尿漬之

又方 溫白馬尿漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐兔刺

主之方

燒黍稷苦牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒熏汁

出愈

方 熱蠟內瘡中新瘡亦善

方 以鳧公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗為佳瘡止

余以自癩五年七月十五日夜左手手中指背癢着癩
搗至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色
如熟小豆色當聞長者之論有此治方試復為之手
下即愈痛亦即除瘡亦即瘳不過十日尋得平復此
大神效故疏之蜀人名曰癩菜關中名苟乳也數苟切

瘡中水腫方

白灰

胡粉

炭各等分

右二味脂和塗瘡孔上水出則痛止

治手足卒中刺中水毒方

擣韭及藍青置上以火炙執徹即愈

治瘡因風致腫方

檫木根皮一片濃煎內鹽一把漬之

治破傷風腫方

厚漆杏仁膏燃麻燭遙炙之

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入腹則殺人方

溫桑灰汁漬冷復溫之當更令熱神祕

治刺傷中風水方

服黑牛執家一服一升二服即止

又方 蠟一兩執家耐煎薄裹上令水出愈

又方 魚目燒灰傳之 又方 熟黃芷搗之

又方 刮箭羽下漆塗之

治瘡犯露腫方 凡八九月月中刺手足
犯惡露腫殺人不可輕

生桑枝二枚內燂灰中推引令極執斫斷正以枝頭

挂瘡口上熱盡即易之盡二枚則瘡自爛仍取燕白

擣綿裹著熱灰中使極熱去綿取薤白薄瘡上以布帛急裹之若有腫者便作用薤白最佳

治擦瘡方

生柳葉二斤細切以水一斗五升煮取七升適寒溫洗之日三肘後方云老柳皮尤妙

又方以礬石下滓泥塗之取瘡止大驗

又方濃煮鼠杏葉以洗擦上亦可擣葉取汁塗之

又方爛擣七姑草封之救急方云七姑草和芒消塗之

又方貫衆為末以塗上乾以油和之即愈

又方蓮葉燥者一片以水一斗煮取五升洗瘡上日再

又方羊乳汁塗之又方芒消五兩湯浸以洗之

又方取猪膏塗之又方礬石著湯中令消洗之

又方宜取猪肉嚼碎糝塗之

火瘡等病第四論一首 方七十一首

論曰凡火燒損慎勿以冷水洗之火瘡得冷熱氣更深轉入骨壞人筋骨難痊初被火燒急向火更多雖大痛強忍之一食久即不痛神驗治火燒悶絕不識人以新尿冷飲之及冷水和蜜飲之口噤絞開與之然後以下方治之

治火瘡方

拖子 肆拾枚

白斂

黃芩 各伍兩

右三味咬咀以水五升油一升合煎令水氣歇去滓待冷以淋之令溜去火熱毒則肌得寬也作二日任意用膏傳湯散治之

又方熬油麻為末和拖子人塗之惟厚為佳已成瘡者燒

白塘灰粉之即燥立瘥

治火燒瘡方

死鼠頭一枚以臘月猪膏煎令消盡以傅乾即傅之
瘥不作癩神效亦治小兒火瘡

治火瘡敗壞方

柏白皮切以臘月猪膏合淹相得煮四五沸色變
澤傳瘡上肘方云柳白皮

又方 柏白皮

蛇銜

生地黄

茄子入

黃芩

苦竹葉 各壹分

初六味咬咀以羊髓半升煎二上三下去滓塗上瘥止

治火爛瘡方

竹葉

甘草 各貳兩

柏白皮 肆兩

右三味咬咀以猪脂一斤半煎三上三下去滓冷以傅之
之集驗方用生干地黃肆兩

又白皮嚼熟涂之

治一切湯火所傷方

初著即以女人精汁塗之之瘥

治湯火入肉爛壞方

杏仁 附子 貳兩 甘草 壹兩 羊脂 伍兩 松脂 雞子

在五味咬咀以不中水猪膏五兩煎涂之

治湯火所損晝夜啼呼止痛滅癩方

松脂 各貳分 猪膏 蠟 各壹分

右取松脂破鈿中切脂爵蠟著松明上少傾鈿火

燒諸香消以盃承汁傅之
松明是肥松木節也

治灸火

當歸各壹兩 胡麻外臺用羊脂各陸分

右藥末吹咀以猪膏五合煎去滓傳之

又方 松脂 伍兩

右一味合煎燥紙貼之日三

又方 取車軋脂塗上

又方 凡灸瘡不愈每日別灸上六七壯自差

又方 石灰一兩燒為細末綿篩猪脂和令相得微火上煎

數沸以暖濕心先洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以

藥貼瘡上急灸之又擣蒜傳之

治灸火瘡腫急

擣竈下黃土以水和煎令熱漬之

治灸瘡中風冷腫痛方

但向火灸之瘡得熱則瘡快至痛止日六七日愈

雜白膏 治灸瘡生肉止痛方

薤白 當歸各貳兩 白芷 壹兩 羊髓 壹斤

右四味以咀合異煎以白芷色黃藥成土淨取傳之日三

又方 治灸瘡膿壞不瘥方

薤白 壹握 胡粉 石灰 各壹兩 臘月猪脂 壹斤

右四味先煎薤白令黃去之綿裹石灰煎數沸去之次

入胡粉內膏中令調塗故布貼上日三

又方 白蜜 壹兩 烏賊骨 貳枚 一方作壹兩

右二味相和塗之

治針灸瘡血出不止方

燒人屎灰以傅之

方 死蜣螂為末以猪脂和塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚
傅裹之既止痛又速愈無石灰亦可用若瘡甚深未宜
速合者內少滑石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴
當忍之噉燥食并肥膩之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥
及漿犯即血動溢出血殺人又忌嗔怒六言突思想陰陽行
動作勞多食酸鹹飲酒執羹臃掌瘡瘻後猶爾山百日半
年乃可復常也

治金瘡大散方

五月五日午日使四人出四方各於一山里內採一大
草木葉菜每種各半把勿令漏脫一事日正午時細

切碓擣并石灰極令爛熟一石草斷一斗石灰先繫
大實中桑樹令可受藥取藥內孔中實藥令堅仍以
桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不洩氣只以
桑皮纏之使牢至九月九日午時取出陰乾百日藥
成擣之日曝令乾更擣絹篩貯却凡一切金瘡傷折
出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即
瘡不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須暖水洗
令血出然後傳之此藥大驗平時無事宜多合以備
倉卒金瘡之要無出於此雖突厥贊汗黃末未能及
之肘後方云用百草心五月五日作七月七日出

又方燒乾梅爲炭擣末傳之一宿即瘡亦治打傷

又方礞石擣末傳之止痛斷血

又方 取桑白汁塗桑白皮裹之或石灰封之妙

又方 麻葉三斤以水三升熟煮取一升半為一服

又方 飲麻子汁數升 小品方云治毒箭所傷

又方 蛭蚓屎以水服方寸匕日三

又方 杏仁石灰為細末以猪脂和封之 亦主犬馬金瘡止痛大良

治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方 擣車前汁傅之血即絕連根取用亦效

又方 柳絮封之

又方 以人精塗之

又方 飲人尿五升愈

又方 以蜘蛛幕貼之血即止

又方 治金瘡出血多至虛竭方

茯苓 甘草 芍藥各肆兩 蜀椒 冬三兩 乾薑 貳兩

當歸

芎藭

桂心

黃芩

吳茱萸

人參

厚朴

白朮

古今錄驗作桑白皮

黃耆各兩

右十四味治下篩以酒服方寸匕日三

又方

當歸

參兩

乾薑

參分

芍藥

辛夷

各五分

甘草貳分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一

治金瘡內漏血不出方

牡丹交為散水服二指撮立止出血

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和服之愈

又方

蒲黃

貳兩

七月七日麻勃

膏兩

右一味酒服一錢匕日三夜一

一物湯

治金瘡腹中瘀血方

大麻子 叁升

大葱白 貳柒枚

右使數人各持令熟著九升水煮取一升半頓服若血出不盡腹中有膿血更合服當吐膿血

內寒散 治金瘡方

黃耆

當歸

芎藭

白芷

乾薑

黃芩

芍藥

續斷 各貳兩

附子 半兩

細辛 壹兩

鹿茸 叁兩

右十味治下篩先食酒服五分匕日二稍增至方寸

治金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色

黑服方寸匕日二

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥為末照方寸匕日二又以傅瘡愈
治金瘡若刺瘡痛不可忍百治不瘥者方

葱一把以水三升煮數沸取漬洗止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃

黃芩

右一味為末蜜和丸如梧桐子大先食服十九日三
日金瘡不止令唾止痛呪法

呪曰某甲今日不良為某所傷上告天皇下告地王
清血莫出濁血莫揚良藥白晷不如熟唾日二十七遍
唾之即止

我按先師本法男師在左女師在右卜白東王六公下
白西王母北斗七星黃姑織女請制水之法清日明

心不痕不膿不疼不痛羅肺得肺羅肝得肝羅
肉不任軀媿儂夫自來小兒為日不吉不良某甲
刀斧槊箭熊虎湯火所傷三啞三呵平復如故急
如律令此法不復須度受但存令稽急歌誦之非止
治百毒所傷亦治癰疽隨所患轉後語呼之良驗一
切瘡毒亦皆用之

續斷散治金瘡中筋骨方

續斷

伍兩

細辛

蛇銜

地榆

乾地黄

當歸

芎藭

芍藥

茯苓

各叁兩

人參

甘草

附子

各壹兩

乾薑

蜀椒

桂心

各半兩

右十五味治下篩酒服一升寸匕日三

石金瘡腸出方

礞石

滑石

鐵精及白炭三兩

右三味為末粉腸上後用礞石末飲服方寸匕日五夜

二腸即入

又方取人屎乾為末以粉腸即入

洗祕傷腸出不斷者方時後方云云治腸出欲燥而草土著腸者

作大麥粥取汁洗腸推內之常研米粥飲之二十日

稍稍作強糜百日後乃可瘥

地黃膏治金瘡火瘡灸瘡不能瘥者方

生地黃切膏并搗絞取汁叁合 薰陸香 松脂 杏仁

蠟各壹兩 羊腎脂五合 烏麻油貳斤 石鹽壹兩研如粉

右八味先下蠟微火令消次內羊脂令消次下油次下

松脂令消次下杏仁次下薰陸次下地黃汁次下石

以微火煎令地黄汁水氣盡以綿漚停凝一切諸瘡
傷皆用傳之日三夜一頓生冷猪雞魚肉此膏治瘡法
先食惡肉不著痂先從內瘡乃至平復無痂不畏風不
膿大大要妙

治金瘡血出不止方

蒲黃壹斤

當歸貳兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二

又方取葱葉炙取汁塗瘡上即止若為婦人所驚者取婦

人中衣火炙令熱以熨瘡上

又方取豉二升熬湯清食頃絞去滓內蒲黃三合頓服及

作紫湯服之

紫湯方在產育篇中

治金瘡箭在肉中不出方

白斂

半夏各五分

右二味治下篩酒服方寸匕日三淺瘡十日日出深瘡二十日出終不住肉中

治卒中箭不出或肉中有聚血方

取女人月經布燒灰屑酒服之

治箭鏃及諸刀刃在咽喉胃膈諸隱處不出者方

牡丹皮壹分

白鹽貳分用後作白斂

右二味治下篩以酒服方寸匕日二服出

又方取栝婁汁涂箭瘡上即出

又方酒服瞿麥方寸匕日三瘡

治毒箭所中方

搗藍汁一升飲之并以薄瘡上若無藍取青

汁服之并淋瘡中鐵不出擣死鼠肝塗之鼠腦亦

又方煎地黃汁作丸服之百日箭出

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方雄黃為末傅之當沸汁出愈

又方擣葛根汁飲之又葛白屑熬黃傅瘡止血

又方內鹽臍中灸之 **又方**貝齒末服一錢匕大瘡

又方黃蘗根汁飲三升

治中射罔箭方

藍子 伍合 升麻 捌兩 王不留行 封草 各肆兩

右四味治下篩冷水服一方寸匕日三夜一又以水和

塗瘡乾易之

治針折入肉中方

刮象牙爲末水和聚著針上即出

又方以鼠腦塗之

又方磁石吸鐵者著上即出

重刊孫真人備急千金要方卷之二十五

還書日期

本校畢業生，現讀生及研究生均須照上述日期還書，若無其他讀者借閱，即可續借，本校教員與其他人員則須在每年第三學期末歸還所借書籍。

書 號 碼

善
510.87
12-1

V.27

著 譯 者

孫思邈

書

名 (重刊孫真人) 備急千金要方

號 數 借 期 還 期

出借得

出借得不

借閱者注意

(一) 加意愛護勿失原有
形狀

(二) 損壞或遺失應照原價加倍
賠償

(三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者
須持書至館聲明但本館於必要收回時須
即繳還

(四) 逾期不歸還者應照章納金

圖書號數

善
510.87

V.27

圖書冊數

12-1

登記號數

63298

